



Theodore
Besterman

391





VNIVERSALIS
Plantarum
HISTORIAE
Tomus III.

UNIVERSALIS

Plantarum

HISTORIAE

Tomus III.

REVERBUNTUR TE QUAMDIU ERIT
SOLE ET DURANTE LUNA. PSALM. LXXXV.



HISTORIA PLANTARUM UNIVERSALIS

Tomus III.

Auctoribus

JOHANNE BAUHINO,

Archiatro.

JOH. HENRICO CHERLERO,

Doctore:

Basilienſibus

Quam recensuit et auxit

DOMINICUS CHABRAUS,

D. Genevenſis

Jureis verò publici fecit,

FR. LUD. AGRAFFENRIED.

Dñs in Gertzenſee etc.

EBRODUNI.

MDCLI. *Apple*

Aggice medicum ſuis honoribus convenientibus uſui ipſius:
etenim ipſum creavit Dominus. Ecce. xxxix. i.



HISTORIA
PLANTARVM
VNIVERSALIS NOVA
ET ABSOLVTISSIMA
CVM CONSENSV ET DISSENSV
CIRCA EAS.

Auctoribus

IOH. BAVHINO ILL. CELS. VVIRT.
ARCHIATRO

ET

IOH. HEN. CHERLERO PHILOS. ET MED. DOCT.
BASILIENSIBVS.

Quam recensuit & auxit

DOMINICVS CHABRÆVS MED. DOCT.
GENEVENSIS.

Iuris verò publici fecit

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED.
Dominus in Gertzenlee &c.

Continens

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IPSO
Prototypo maxima ex parte depictas: earumdem Satum, Cultum, Mangonia: item Vires omnige-
nas, Preparationes, Extractions, ac Distillationes præcipuas: Exoticarum Orien-
tis atque Occidentis, aliarumque ante nostrum seculum incognitarum,
supra mille Historias novas: Synonyma: Equiuoca: Succe-
danca: & præcipuarum Linguarum appellationes.

In primis verò

PLACITA VETERVM GRAECORVM, ARABVM, LATINORVM.
& posterioris seculi Scriptorum:

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM
obscurarum & deprauatarum.

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt: Ac continentur
pleraque omnia, quæ

THEOLOGICI, IURISCONSULTI, MEDICI, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETAE
Grammatici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Ut meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

TOMVS III

EBRODVNI.

CIO. IO. CLI.

HISTORIA

PLANTARVM

VNIuersalis NOVA

ET ABSOLUTISSIMA

CVM CONSENSV ET DISSENSV

CIRCA 1628

IOH. BATHONIO ILL. CELS. AVRT.

ARCHIATRO

IOH. HEN. FREYERII, MEDICI V. M. P. NOBIS

RAVENSBERGII

DOMINICI THOMAE, MEDICI

AVRT. NOBIS

FRANCISCO THOMAE, MEDICO

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

AVRT. NOBIS

TOMVS III

ERBORDI

GID. 16. 1628

STANCES

SVR L'IMPRESSION DE LA GRANDE
Histoire des Plantes faite sous les Auspices de Noble &
Magnifique Seigneur, Monseigneur FRANÇOIS
LE VYS DE GRAFFENRIED Seigneur
de Gertzenzee, Baillif d'Yuordon.

DONCQVVS par le moyen de ce MECENE illustre
En fin nous possédons ce précieux thresor,
Qui donne à la nature autant & plus de lustre
Qu'elle en peut recevoir des perles & de l'or,
Elle avoit réservé ceste mere chérie
D'estaller les beautés de sa tapisserie
Dans ce riche tableau qui doit ses premiers traits
A la main de Baubin, à un autre grand Maître
L'entier acheuement de ses plus beaux pourtraicts,
La vie à cet Heros lequel l'a fait renaistre.

Que doit à l'univers le Monarque Alexandre
Après l'avoir conquis estant victorieux :
Après tant de combats son corps réduit en cendre
Et rongé par les vers, est-il plus glorieux ?
Les faueurs que recut ce sage & ce grand Maître
Auquel il confessoit de deuoir son bien estre,
Luy ont bien erigé un plus auguste autel,
Lors que par son moyen ceste sçavante plume
Descriuit autresfois au vif le naturel
De tous les animaux dans son digne Volume.

Quand ce grand Conquerant, cet Empereur Auguste
Eut annulé l'arrest donné par un Autehur
Contre ses diuins vers, comme estant trop iniuste,
Et qu'il se fut porté pour leur grand protecteur :
A til plus obligé le poëte Virgile,
Conseruant son ouurage, ou mesme aussi sa Ville,
Que s'y mesme, viuant encor dedans ses Vers,
Qui ont gravé son nom au Temple de memoire,
Et fait briller l'esclat de son illustre gloire
Jusques aux derniers bords de ce grand Vniuers ?

Ainsi, ô grand Heros, imitant ces Monarques
Tu laisseras un iour à la posterité
De ta noble Vertu des glorieuses marques
Receuant le loyer que tu as mérité.
Tu eterniseras ton renom & ta gloire
Dedans les monuments de ceste belle Histoire :
Si tu peux rappeler un homme du tombeau
Qui pourra conseruer dedans maints corps la vie,
Ne pourras tu produire un effect aussi beau,
Empeschant que la sienne aux tiens ne soit rauie ?

A. 77. 61.

I.P. DAPLES Med. pract. Lauch
& pracc. Class.

in domo
moua
Attention des f. 11.
de la p. 11. 12.
de la p. 11. 12.
d. 7. 10. 13. 2.
DAPLES - -

CLARISSIMO DOCTORI MEDICO

Dn. Dn. DOMINICO CHABRÆO
Plantarum Historiæ Restauratori meritissimo.

Epigramma Græcum:

Ποῖν πολλὰς θεραπεύεις νόσους ἀντάξῃ πολλὰν
ἄμειβας Ἀρχιᾶτριν χερσὶν ἀλεξικάκοις.
φαίδμα⊙ ἀλλ⊙ ἴση Ἀσκήσι⊙ αὐτὴς ἡγήσῃς
Ταΰτομινν Βοταῖων βίβλον ἐγχείρας ἑλόν.
Ἀνέ⊙ ἔργον ἐπὶ δέξῃ νόσους θεραπεύσας ἑσθέρων
Νῦν δὲ νεκρὸς, μὲν ἀνθανοῦα περὶ σε θείων.

Epigramma Latinum:

ARs tua dat conclamatas producere lucēs:
Quicquid & illa facit cuncta stupenda facit.
Eripere at tenebris & reddere Nomina luci,
Nomina in æternos pene sepulta dies,
Hoc opus, hic labor est, nobis miracula sunt hæc
Quæ superant cunctas nobilis ætis opes.
Talia tu præstas, dum reddis pene sepulto
Bauhino opratum doctæ CHABRÆÆ diem.

Epigramme François:

TON Art peut prolonger la vie des humains,
Et nous faire admirer les œuvres de tes mains:
Mais pouvoir surmonter tant de fâcheux obstacles
Qui se sont opposés à un dessein si beau,
Lors que tu rappellois ton Bauhin du tombeau,
Cet œuvre incomparable approche des miracles.

Idem LP. DAPLES Med. pract. Laus.
& prac. Claf



*PRÆPOTENTIBVS, NOBILISSIMIS,
GENÉROSISSIMIS, STRENVISSIMIS, SPLEN-
DIDISSIMIS. ET EXCELLENTISSIMIS*

Dn. Dn. CONSVLIBVS, PRAE-
TORIBVS, AMMANIS, MAIO-
RIBVS, SENATORIBVS, CIVI-
BVS ET POPVLIS

FLORENTISSIMARVM RERVMPVBLICARVM, AC

CANTONVM

TIGVRI, BERNÆ, LVCERNÆ, VRIÆ, SVITIÆ, VN-
DERVVALDIÆ, TVGII, GLARONÆ, BASILEÆ, FRIBVR-
GI, SALODORI, SCAPHVSII, ET ABBATISCELLÆ:

atque in genere

*TOTI INCLYTÆ, POTENTISSIMÆ, ET
FELICISSIMÆ*

HELVETIORVM CIVITATI.



ELEBRET POTENTISSIMI
& EXCELLENTISSIMI
CANTONES,

Pyramides
Memphis, Turrim Pharos, Muros
Babylon, Templum Ephesus, Co-
lossum Rhodus: celebrent prisca se-
cula præcellētiora reliqua sua omnia:
celebrent nostra sua Mirabilia:

celebret VESTRA HELVETIA tractus in quibus ita variant
tempestates, vt vnâ eademq; die in Hyemem, in Ver, & in Ae-
statem incidas: præcelsos celebret montes in quorum verticibus
summis niues & gelu, depressioribus locis viridâtia pascua, par-
tibus imis segetes maturæ: infinitæ alia celebret quæ miraculi
loco esse possint: Leuis hæc momentî, Nos maiora de magnis.

TOM. III.

Athenienſium Reſpublica quæ ex compluribus collecta erat Populis, Achæorum quæ duodecim conſtabat Urbibus, & Iſraelitica quæ tribubus totidem, internis breui conſectæ fuere diſidiis: In tot populis Veſtris, moribus, ſtudiis, & religioſo cultu plurimùm à ſe inuicẽ diſſitis, ſumma & perennis Concordia. Liberis Ciuitatibus minimè tutam cum ſummis Principibus familiaritatem pronuntiauit Græcæ princeps Eloquentiæ: VESTRAE cum finitimis omnibus Monarchis innocentia fœdera. Aucta ad hæc in hocce temporũ articulo Veſtra fœlicitas, aſſerta ſecuritas, dum reciprocantibus procellis, incurſionibus, præliis, & proſcriptionibus totum lacerabatur Europæus Orbis: dum ara, foci & penates armis incedeſcunt: dum ſanguini eorũ non parcebatur pro quibus fundendus erat ſanguis: dũ obmutefcebat inter militaria ſigna Libertas: dum Aquilas ſuas Romanum horrebat Imperium: dum denique res eius eò redigebant alij, vt ſaluę eſſe non poſſent niſi beneficio ſeruitutis: alij verò durioribus id ſanabant remediis quàm pericula erant. Sic mouiſtis gubernaculum POTENTIſſIMI CANTONES, ſic ſecundo uſi eſtis vento, ſic aduerſo reſtituiſtis, ſic dubium & communem vobis vendicaſtis.

Hęc miramur, hęc ſuſpicimus, hęc immortalitati conſecrare annitimur: eoque præſertim, quòd, læuiente vndique Marte, ſic fuerit exulantibus Muſis aſylũ aliquod, ſic Apollini apud VOS litare licuerit, ſic tandem emicuerit quę diu latuerat Virtus, & conditam retegendi ſit facta poteſtas.

*Eccl. ſiſt.
cap. 24*

Qui quaſi Philon omnia implet ſua Sapientia: Qui vt Euphrates ingenium fœcundat: Qui proſert vt Lucem diſciplinæ cognitionis: Qui ſcientiam hominibus dedit vt in Mirabilibus ſuis gloriã conſequatur, ſub nouiſſimi ſæculi extrema præfulgẽs excitat lumen, IOANNEM ſcilicet BAVHINVM, Virum in omni ſciibili peritiſſimum, rei verò Herbariæ ſtudioſiſſimum: Virum qui toto, nec breui, vitæ curriculo, in ea exornanda & perficienda ita diligenter & feliciter laborauerat, vt hac in parte *ὅτι ὁ Θεὸς ἐπαυρομένης τῆς πνεύματός ἐόντας* longè poſt ſe reliquiſſe omnium calculo meritò cenſeatur: Virum qui, factò apud Antiquos & Recentiores ſpicilegio, abſolutiſſimam conſcripſerat plantarum

rum

rum historiam, Vnum quiddam ex multis, Concentum ex dis-
sonis: Virum qui, vt alter Phidias, ex auro, argento, ære, marmo-
re, & viliori etiam materia, fecerat simulacra, qualia ex quacun-
que fieri optima poterant. Virum tandem, qui Naturę ingressus
sanctuarium, quęcunque in eius maiestate & penu speculatus
erat, doctę, eleganter & dilucidę aperuerat. Sed perierant tantę
eruditionis viri Lucubrationes, resque penes irritos māsisset
conatus, si non apud VOS renasci ipsi contigisset, nisi touisset
Lucina in ortus primordiis, si non in blandę obstetr. cantes
manus incidisset.

VOBIS igitur POTENTISSIMI CANTONES na-
tales ille debet suos: VOS meritō Patronos ac Mecænates suos
nuncupat. NOS verō VNIVERSALIS eius PLANTA-
RVM HISTORIAE Tertiam, Maximam, & Extremam
Partem publici facturi juris, eā omni cum debita submissione
splendidissimo NOMINI VESTRO inscribere gestimus.
Sed PARTEM EXTREMAM, de qua, quod Sapiens
olim in genere, *Rei Finem meliorem esse Principio eius*, dicere au- Ecd. cap. 7.
simus. Plantas Spinis Armatas, Genti quę libertatem armis
affecuta, eam fortissimę tuetur. Plantas Umbelliferas, Genti
apud quam ab hoc bellorum æstu penę exusti saluberrimum
nacti sunt umbraculum. Plantas Coronarias, Genti quę tutis-
simum censetur Coronarum præsidium. Plantas Lactę tur-
gentes, Lactę & melle fluentis amplissimę regionis Principi-
bus. Plantas Galeatos ferentes flores, strenuissimę & bellico-
sissimę Genti. Aquis gaudentes Plantas, Genti apud quam
præcipuorum Europę fluuiorum ortus. Plantas tandem in
summis nascentes Alpibus, earundem Dominis.

In nostris nunc tantum est Votis, POTENTISSIMI
CANTONES, vt VESTRIS sit accepta EXCEL-
LENTIIS huius Operis Nuncupatio: Vestrīs dignum cen-
seatur aris quod promimus Munus, humillimę nostrę Monu-
mentum obseruantię quod æternitati sacrum facimus: Veli-
tis, jubeatis sub Auctoritatis Vestrę munimine à Liuis inju-
riis tutum esse hunc Fœtum.

Vt deinde protector & susceptor vester Deus vnanimita-
tem, psalm. 69
& 45.

tem, pacem & prosperitatem perpetuet vestram: vt operian-
tur confusione & pudore qui Vobis mala quærunt, contur-
bentur qui vos turbant: vestrorum inimicorum conterantur
arcus, arma confringantur. Vt is tandem cuius ope tam sæpe,
tam fortiter, & tam foeliciter pro communis patriæ libertate
Psal. 146. dimiculistis: Is qui confortauit feras portarum vestrarum, nec
fecit taliter omni Nationi, Vestra augeat in dies Magnalia, ita
vt, quemadmodum antehac, sic & deinceps, de Vobis sem-
per dicantur gloriosa: Fiat, Fiat, Exaudiat de habitaculo suo
Virtutum Dominus:

Vota sunt

POTENTISSIMI CANTONES,

EXCELLENTIIS VESTRIS

Humillimè deuotissimorum

FRANCISCI LVDOVICI à GRAFFENRIED
Ebrodunensis Ditionis pro tempore Præfeti:

&

DOMINICI CHABRÆI M. D.
Illust. Celsit. Vvirtemb. à Consiliis Medicis,
Vrbisq; Ebrodunensis Medici ordinarij,

*Ebroduni Heluetiorum Calendis Septembr.
Anno reparata salutis M. DC. LI.*



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXV.

CAPITATÆ NON SPINOSÆ, VT SCABIOSÆ, IACEÆ, &c.
ET SPINOSÆ, VT CARDVI, &c.

PAPPVM & Carduorum florem docti quidam dicunt, quod id quoque in lanuginosam quandam subflan-
tiam, & veluti floccum sufficit. Presens fortè & apertiùs hec genus quis spinosum dicat, si omnes species
aut differentia tales essent. Nunc quando spinis carentes multæ, in ceteris nihilominus satis inter se affines vi-
dentur, in eo tamen potissimum cognatas sciat herbaria studiosius, quod capitata, seu speciei quoddam insigne, fe-
rant, quæ deinceps dicuntur. Quæ obrem Capitata generalissima voce dicere placuit, quorum maximum
numerus implebit Carduorum familia, eam Naturæ peculiari cura moniente, multiplici modo: quippe hic
caulis, illic solus in spinis obseptum horret: illic florem ac semen, & in plerisque pappum caulem summis & è
capitibus emicantem, nihilominus minacibus spinis munitum vides: quæ omnia ingeniorum maxima, non so-
lum admirari, sed & rationibus scrutari, & audientibus coniecturis ventitare sunt ausa. Cui verò scire aut
absque indignatione sacra Parentis sciscitari nobis sit integrum, cur plantas spinis armavit: Siccine dictos de-
ceat naturam examinare, nec certum ferre responsum? Eamus ulterius scrutatum, aliæque ratione eam pro-
uicemus, certiora utilioraque querendo, sed ea lege ac ordine, ut eam tanquam fertilem, benignam, & salutaris-
ram agnoscamus & admiremur. Carduis tamen præmittentes ac intericiientes alias capitatas, sed illis qua-
dam ratione cognatas.

DE SCABIOSIS.

CAPVT I.



VSQVAM reperimus Veteres
Scabiosæ meminisse, nisi fortè
aliqua ex Scabiosis quarum
magham varietatem ex multis
vnus obseruauit Clusius, [qui
nullas prouincias adire memi-
nit, in quibus earum peculiare

flora Aetii aliquid genus non inuenerit,] sit Plora Aetii,
quam cum nomine tantum expresserit, nullâ ad-
iectâ descriptione, de eo vix quicquam certi sta-
tui potest.

Stœbe.
Error quo-
undam
Stœbe non
est.
Pluribus autem plantis potest accommodari
Scabiosæ nomenclatio (non secus atque Ploræ
Aetii) vt Iacæ, morsui Diaboli, ac similibus facie
& viribus. Nec defunt, qui Scabiosam eam esse
contendant, quæ Stœbe ab Antiquioribus inscri-
bitur. Sed horum error manifestatur. Scabiosam
enim vocatam non esse Stœben illud abundè
ostendit, quod hæc foliis constat laciniatis, sub-
hirvatis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, at-
que etiam maiore: in quorum cacumine flores
emittent in cæruleo albicantes: & in pratibus, &
campestribus prothentur. At Stœbe folia ferat
aculeata, & in lacubus, stagnis, paludibus, aliisque

Tom. III.

locis aquosis nascatur. Vnde rectè Fuchsius, nec
rerum notæ, nec vlus, nec vlla ratio, conuincere
potest Scabiosam Officinis & vulgò dictam esse
Stœben.

Scabiosarum genera non leuibus de causis, vt
Clusio videtur, ad phyteuma Dioscoridis refert
Fab. Columna. Sed hæc Clusii opinio recipien-
da non videtur: Phyteuma Dioscoridis ad ama-
toria conuenire nonnulli prodiderunt: Scabiosæ
autem hanc facultatem esse concessam, nemo
prodidit.

Scabiosam igitur vt dictum, quidam Phyteu-
ma volunt, Stœben alii, alii Cirsium, sed frustra.
Actio vt Tabernamontano videtur Lepa, vel
Lepa dicitur: Lat. Plora & Herba apostematica:
Germ. Scabiosen / Scabiosen fraut / Apostenen
fraut / Pasemen fraut / & Grindfraut / Belg.
Scabiose: Gall. scabieuse. It. & Hisp. Scabiosa,
in Candia Serabro Corbho: Angl. Scabius: Boh.
Fawias: Hung. Sepreu fii, quod ex ea scopas
faciant: Polon. Driafueto / & Driafachi. Scabiosa
quidem secundum quosdam à scabro herba
habitu dicitur, quod vulgata quidem conuenit,
iuxta verò alios quod scabiei medeatur, quod

Phyteuma
Diosc. Co-
luma.
Columna
refutatur.

Cirsium no-
est.
N. mina
linguarum

HISTORIÆ PLANTARVM

Locus Collectio Tempus
 vox plora præterens videtur.
 N. scutur in campestribus & pratis. Colligitur
 mensio Iunio, seruiatur per annum. Si aqua ex
 hac distillanda sit colligitur vnâ cum radicibus
 circa finem Maij. Floret Iunio, Iulio, Augusto:
 deinde semen profert.

Vires & v. lus Pflora Generum.
 Omnia Scabiofæ genera calidam & siccam
 temperaturam obtinent, authore Trago. Sed ap-
 pud Veteres, si Plora sit, externis tantum corpo-
 ris partibus, aduersus tumores & contractiones
 neruorum & venarum radix tula emplastri in-
 star apponebatur. Nostri verò Medici miris eam
 extollunt l. uerbis, & rectè quidem, autoritate
 nonnu in verum quorundam nixi, quos S. Vi-
 banum composuisse ferunt, qui sic habent.

Urbanus pro se nescit pretium [virtutes alij]

Scabiofa
 Scabiofa
 Nam purgat pectus [caput alij] quod comprimit
 agra senectis.
 Lenit pulmonem, purgat laterum regi. mem.
 Abscessus [apostema alij] frangit si lucum bibira
 tangit.

Purgat. Apostema. Anthrax. Pleurisia. Modus a qua distil- landi & v. tendi.
 Tribus vniuersis anthracem liberat horis.

Herba vino d. coctis, pleuritico morbo mēde-
 tur. Aduersus eundem morbum Maio mēse A-
 quam distillare solent ex ea herba hoc modo. Sca-
 biofam vnâ cum radicibus colligunt circa finem
 Maij: contundunt & distillant in balneo aque
 feruentis: deinde per aliquot dies ponunt ad So-
 lem, de qua propinant singulis vicibus potan-
 dum mensurâ ii aut iiii. cochleariâ, non tan-
 tum pleuritico, sed & contra pectoris vitia & a-
 postemata, tussim, pestem, omnisque generis tho-
 racis affectus. Aqua hæc conseruatur per annum.

Defici.
 Apostematibus alij rursus è Scabiosis tale confi-
 ciunt medicamentum. Accipiunt manipulum Sca-
 biofæ herbæ desiccate, dulcis radicis d. s. & x in
 minutas partes vnciâ vnâ, fucus 12. seminis fœni-
 culi vnciâ vnâ, seminis Anisi tantundem. Iris
 vnciâ dimidiâ, quæ omnia per noctem in
 mensura aque macerant, postero illa die supra
 tertias decoquentes, postea verò Saccharo vel
 rosaceo nelle indulcorant, vesperique ac mane
 calidum haustum inde præbent, quo Apostema
 maturat, emolliri ac per tussim excreabile fieri
 affirmant. Succus Scabiofæ omnis generis scabiei,
 ploris & Lepre vsurpatus per se vel in balneis
 utilissimus est, quo etiam futiles capitis abgun-
 tur, si cum eo caput abluatur. Pollere autem hanc
 imprimis aduersus scabiem, nomen illi inditum
 per se manifestat. In hunc autem vsum non mo-
 do eius decoctum quotidie potandum præcipi-
 tur: sed & herbæ ipsius succo, per se, aut in vnguentis
 addito, scabiola corpora illinunt. Prodest om-
 nibus pectoris vitis, & resp. ratiore interueni-
 bus organis: quippe quæ & eorum inflammationes
 purulentas dissiciat, & omnia pectoris excre-
 menta expurget. Anthracibus, siue Carbunculis
 pestiferis vti inter illa miranda vtilita hos lethæ-
 les abscessus tuum herarum spatio prorsus abo-
 lere exstimetur. Scabiofa porro herba est admo-
 dum madidissima, cuius succus calidus impositus
 vulnibus ligaturis extrahit. Item ad carbunculos
 efficax, vnde etiam in Germania nomen illi im-
 positum Apostemētrauit. Extractum Scabiofæ
 efficax admodum in pulmonum affectibus, ac
 præsertim peripneumoniciis. Camerario com-
 mendauit C. Hoffmannus Archiater Ill. principis
 Elect. Brandenburgici. Scribit Arnol. de Viliâ.
 quicumque de nouo passus fuerit rupturam, si
 omni mane sumat de succo Scabiofæ vnciâ ii. cum
 curatum ita infra nouem dies ad summum. In si-

Succo.
 Vitiâ pecto-
 ris.

Pulmon.
 Extrahum
 S. abiofa

Eruptura.
 Tormosa.

à nobis propositis, quâ tiam sculptâ emimus,
 non tamè omnino caret ramis, vt icon demōstrat.
 De Scabiosis hisce nostris dubio procul loqui-
 tur Castalp. quando ait. Aliæ folio casso constant,
 aliæ integro, quæ scissa ferunt folia in aris potis-
 simè. zitate inter stipulas nascantur ex melle salp.
 relictas: caule cubitali, aut ampliore: ramis ad la-
 tera: parvis paucis foliis, subhirsutis, vtrinque di-
 uisi, modò crassius ad similitudinem Certeræ, Cer-
 teræ: modò tenuius vt papaueris spumer: cacuminibus
 ramu-


gno sagittarij. Scabiofæ radices eruendas præci-
 pit Coler. & in taleolas oblongas scindendas, de
 filo suspendendas & resiccandas, & sicubi infans
 torminibus affligatur, vel etiam scabie laboret, in
 potum demittendas: hunc enim iecur repurgare,
 & scabiosam cutem omnem decidere.

SCABIOSA MAIOR COMMVNIOR

hirsuta folio laciniato & non laci-
 niato, & latifolia.

Inter Scabiofæ genera, vulgatissima est ea, quæ
 Inter scia proueniens radice habet longam re-
 ctam: caules sequicubitos & duos cubitos altos,
 admodum hirsutos, inanes, quibus sæpè plura eas
 pita insident: folia ex geniculis aduersa, canâ la-
 nugine pubescentia, formi Valerianæ maioris,
 profundius subinde laciniata, aliâ minis, sapore
 subacri: flores
 cæruleos ex
 confertis cor-
 niculis quadri-
 partitis con-
 gestos.

Hæc scabio-
 fa aut mira bi-
 liter ludit aut
 differentias ali-
 quas habet: Scabiosa nō
 laciniata.



monstrat icon
 nostra Fuchsi-
 ana: quæ quæ-
 dam folia hab-
 bet iuxta radi-
 cem ferè pe-
 dem longa,
 quadam multò
 breuiora pro-
 tatione loci v-
 bi prouenit,
 quæ non sunt
 laciniata vel
 profundè diui-
 sa, ac etiam vix
 versus superio-
 ra aut rariis.
 Icon nostra se-
 cunda, quæ ita
 sculpta empta
 quodammodò
 exprimit Sca-
 biofam commu-
 nem folio
 non laciniato:
 Est mihi
 inter siccas plā-
 ta quædam la-
 tiori & breuiori
 folio hirsuto,
 quæ accedit ad
 iconē tertiam
 Scabiosa lai-
 cissima.

Delicij

Varietas aut huius natura.

Scabiosa lai-
 cissima.

Scabiosa folio casso, est integro, Castalp.

Certeræ.



Pflora Aetii

Scabiosa
dissectifolia
maior Thais

Media

Scabiosa in-
regisfolia
Thais

Scabiosa
maior sava-
rum vulga-
rior Lob.

Scabiosa al-
tera campe-
stris siue se-
getum Lob.

Scab. maior
flore ex ca-
ruleo purp.
Tab.

lorum capitulum infidet, in latitudinem suum, flosculis ad caeruleum vergentibus: feminibus acervatis subhirsutis: radice singulari: tota planta admodum amara est, & subadstringens: putatur hæc apud Aetium Plora esse, cuius vitæ fumo arborum eructæ moriuntur.

Scabiosam communiorem hirsutâ folio la-

cinatio duplicem assignat Thaisius, quas sic describit. Scabiosa 3, siue dissectifolia maior, foliis est in lacinias diuisis, Valerianæ sylvestris ferè modo, pilosis, caule sesquicubitali, flore ex cyaneo rubicundo, villosa, pratis familiaris. Quarta siue dissectifolia media, caule exurgit cubitali, hispido: folia circa radicem obtinens integra, paucas nonnunquam serratas incisiones in ambitu suscipientia, oblonga, nigricantia, pilosa, mucronata, quincunciali longitudine, fescunciali ferè latitudine: reliqua deinde profundas ac frequentiores incisiones acin lacinias diuisiones admittunt, prioris istius generis speciei recte, sed tamen illius foliis multò sunt minora. Idem Scabiosam communem folio non laciniato ita depingit. Scabiosa 1, siue integri-folia, foliis similium neutiquam dissectis caulem protrudit cubitalem, hispidum, asperum, geniculatum: folia oblonga, plantaginis acuta ferè, mucronata, asperiora, & pilis horridiora, quincunciali ferè longitudine (quâ radici videlicet ea propiora sunt,) vnciali autem latitudine & quandoque fescunciali, ac ex quolibet caulibus geniculo bina semper ex aduerso sibi opposita, nihilque dentata vltimum impressionis omnino habentia. Quandoque tamen huius generis stirpibus quibuldam, rariores ac superficiales in ambitu quorundam foliorum eius nodi impressiones apparent: sicut & in minoribus foliis summum ferè caulis contingentibus, vna atque altera iuxta pediculum laciniata dissectio habetur. Flos huic speciei est ex cyaneo rubicundus, villosus. In pratis quandoque reperitur.

Scabiosa maior satorum vulgaris, siue Plora Aetii dubitat in Aduers. Lobelius: pro qua in Obseru. p. 191. iconem habet hoc titulo: Scabiosa maior satorum: Quæ icon minùs placet nostrâ Fuchianâ, pro Scabiosa vulgaris: videntur enim in ea quedam folia multum ad Centaurium collinum accedere: quamvis capitula differant. In Icon. autem Plant. hæc figura est p. 536. sub inscriptione: Scabiosa maior satorum vulgaris. Sed præter hanc alia rursus ponitur p. 537. sub hoc titulo: Scabiosa altera campestris siue segetum & satorum: Et hæc sanè melius exprimit nostram vulgarem Scabiosam.

Tabern. Icon. p. 158. & Hist. p. 546. Scabiosa 2, siue maior flore ex caeruleo purpureo, & Groß Puerblum Scabiosen, Adfer Scabiosen. Item Icon. p. 159. & Hist. p. 547. Scabiosa arvensis siue

segetalis, sexta in Hist. Adfer Scabiosen, in omnibus similis secundæ, ex ceptis foliis maioribus in caulibus.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 1, siue Officinarum hirsutissima foliis modo crassius, modò tenuius vtrinque diuisis: flore ex caeruleo: alio Bersilico colore tincto: hinc duæ figuræ apud Tabernamontanum. Item: Scabiosa 7, siue maior sator, vulgarior Lobelii. Tabern. non distinguit suam Scabiosam maiorem ab arvensi colore, Tragus id quidem fecit: Lobelius dicit suam Scabiosam maiorem satorum hirsutam non glabram, cur igitur traditur à C. Bauhino pro specie particulari. Is apud Matth. ait, Scabiosa 3, siue Officinarum, quæ hirsutissima est & notissima, omnibus in pratis & etiam inter segetes proveniens, foliis modò profundius laciniatis. floris etiam colore variat.

Dicitur Scabiosæ primum genus Trago: Scabiosa vulgaris Fuchio. Scabiosa communis, Dodon. gall. Scabiosa, Lacunæ quoad descriptionem Lonici. Scabiosa maior, Castor. Tabern. & Cæmer. hort. Scabiosa maior vulgaris Penz & Lobelii. H. Lugdunensi. Scabiosa vulgarior inter segetes natens, Clusio. Scabiosa scabra hirsutaque Gesn. hort.

Apollinari sub inscriptione Apostemenfraut. vires tradit, sed figuram non vique adeò bonam ponit, quæ exprimere videtur Scabiosam Fuchii.

Scabiosam maiorem & communiorem Montbelgardi passim in segetibus, vt in horto Il. C. VV. in monte Vitium la Chau in superiore parte dumetorum obseruari florentem Iulio & Augusto. Hæc ibi variat folio nunc non profundè inciso, nunc profundè laciniato. Item in colle è regione pontis ultra fluvium l'Allan dictum, forè ab antiquis Alduadubis. Obseruari Genex florentem Iunio, Lugduni Maio, Basileæ Augusto in monte propè Leurach in Schelberg propè Balneum admirabile Ducatus Wirr. cum flore Septembri.

Lobel. Scabiosa maior satorum ad eandem ad quæ minor efficacissima: cordi, hepatis & visceribus peramica, vt cuius succo epoto tertium viciarium pondere cum Mithridati aut Theriacis in sudorem mouendo febres extirpat & pestifera etiam abiguntur. Omnes fœditates cutis ista abstergit. Scabiosa scillo folio Cælapini tota admodum amara est & subadstringens: celebratur à Recentioribus ad scabiem malignam, & lepram, tum pectus succi eius, aut aquæ distillatæ, tum ablutio ex eius decocto, aut inunctione: necat lumbricos, discutit abscessus internos, præcipuè thoracis & pulmonis: & interna vlcera siccantur: dantur aquæ distillatæ vncie tres singulis diebus ter vel quater ad thoracis abscessus, tussim, pestem, & vlcera: vlcenibus quoque præhumidis opitulatur exterius illita. Plura in genere diximus.

Icones duæ vltimæ incuriâ typographica hic fuere transpositæ.

SCABIOSA MINOR VULGARIS.

Cvbitum altos caules tollit, inanes, propter cæteram rubescentes, leuiter hirsutos, in alas diuidos: quibus insident flores ad caeruleum accedentes, Matth. caeruleo albicantes, conglomerati, quorum singuli in quinque lacinias; quarum vna maior, diuisa sunt: succedente capitulo aristis nigris horrido, folia inferiora oblonga, Bellidis maioris ferè, serrata, superiora profundè ad costam incisa, singulis segmentis serratis, pinguia, ætronrentia, sapore leuè & nonnihil acri: radice



Scabiosa
genus Fuchs
fit

Scabiosam quam minorem vulgarem voco, Fuchsius cum apud illum esset post. comm. scriptis Scabiosæ, genus faciebat. Eandem Tragus tradidit pro Scabiosa quinta & sexta: flos alteri ex caruleo purpureascens, alteri verò planè candidus.

Scabiosa
Math.
Scab. minor

Math. eam pingit in prior. comm. nomine Scabiosæ in post. cum magis. Lat. & Ital. titulo. Scabiosa minoris, cuius plurimus titulus: flores folioli, carulei & albi aut pallidi, qui de flore scens, capitulum relinquunt tubulide: rotundis ocellis refertum, colore pavonis pennas imitante, tanto sanè naturæ artificio, ut diligenter rem inuentes in admirationem trahat. Idem in Hist. germ. & Epit. cum addit. Camer. ait, Scabiosa minor. Græcis dicitur: *ἰσχυρὸν* & *ἰσχυρὸν*. Lippesmenz frant.: solus israelit inferioribus pro ambitum denticulatis; humi accubantibus, tubalbicantibus oblongis & lili. hirtis, verò e quæ in caule sunt, tenuiora, & magis diuisa spectantur. Caulem mittit tenuem, teretem, rectum, ramosum: flores caruleos, stipatos aut pallidos, è quibus capitula oriuntur colore tubulidi: speciosis obducta ocellis: Radix est illi palmaris, multifida, subcandicansque.

Scab. minor
difficilis fol.
Camer.
Scab. laevis
Gefn.
Scab. minor
vis differe
ria Thales

Camer. hort. Scabiosa minor diffilis folis. Gefn. hort. Scabiosa altera laevis, & ita etiam vocabat eum ei conuierem.

Thalium in Hircynia Scabiosæ minoris vulgaris plures differentias inueniri scribit, quæ ordine recensendæ hic sunt. Scabiosa eius s. siue foliis Bellidis sylvestris maioris maior, sit nobis prima. Hæc caule assurgit cubitali, tereti, geniculato, cuius priora folia iuxta pediculos suos canaliculatos in aliquot lacinias profundius inciduntur, parte anteriori ipsius subrotundiori, ac in ambitu dentata: reliqua deinde (quorum semper bina ex vno geniculo è contratio sibi coherent) integra sunt, breui ac imbricato pediculo innixa, non incisa, in ambitu tantummodò ferrata, vncias duas longa, vnam lata, colore ac forma folia Bellidis sylvestris maioris exprimentia: post hæc superioris caulis parte, qua ipse brachiata adnata producere incipit folia alterius figuræ consistunt, tenuiora, in plures tenuiores ac angustiores lacinias diuisa. Flos huic speciei conglobatus est, caruleus, Succisæ similis.

Huius minor species siue Scabiosa eius sexta obis secunda: Ex vna radice quæ nigra est, plu-

res profert tenuiores, teretes, ac dodrantales coliculos, non ita foliosos, ut prior, sed ferè prorsus nudos, nisi infiore parte: Folia priora huic sunt in breuioribus & canaliculatis pediculis, Bellidis sylvestris maioris foliis eidem similia, propè pediculum lacinia vti plurimum, reliqua parte serrata: post quæ reliqua quæ deinceps sequuntur folia, diuersa ab aliis existunt forme, frequenter in tenues & strictiores lacinias diuisa: flores carulei, conglobati.

Scabiosa eius siue tenuifolia candida seu maior, quæ nobis minor tertia est: eadem prodest cubitali, tereti, calami frumentacei crassitudine, lignosa, geniculis nodosis prædita: folia ei propè radicem sunt in obliquo & canaliculato pediculo veluti in costa quadà cõstituta, in plures at tenuiores lacinias & per euidentia admodum à se vtroque latere interualla se iunctas, ac in ambitu dentatas, diuisa, quorum pars extrema mucronem constituens latior est & crenata: quæ deinde superior in parte caulis exoriantur, ea quantò subinde ferè sua breuiora sunt, tantò & in strictiores lacinias diminuantur: inter alas autem versus caulis seminum brachiola vtriusque profilunt, confimilibus sed longè breuioribus foliolis exornata: flores deinde emergunt Scabiosæ non nihil similes ex pallidiori flauedine albescentes. Eleganter hæc cæteris Scabiosæ speciebus omnibus.

Scabiosa Thalio siue tenuifolia media s. minor nostra Radicem obtinet nigram, multifidam, 6 sunt tenues coliculos teneriores, teretes, minus foliosos: folia priora multo minor quàm prædicta specie, diuisa in lacinias tenues, latiores tamen paulò quàm sunt foliorum reliquorum subsecquentium lacinia quæ nimirum existunt admodum tenues & angustæ ac fœniculaceæ quodammodò: flores sunt ut prioris speciei.

Scabiosa eiusdem s. seu tenuifolia minima priori [nobis s.] coliculus est dodrantalis, teres, tenuis, prorsus nudus, propè radicem solummodò planta hac folia protrudente in canaliculatis pediculis lacinia, breuiora cæteris duabus iam positis speciebus, ac tenuiora. In summo caulis florem continet caruleum in orbiculato capitulo succisæ similis, ex cuius ambitu exterius breuiora quædam ac tenuiora progrediuntur sursum porrecta, adnata in brachiolorum exiguorum modum, semel geniculata ac bina ad geniculum ex aduerso locata folia, cõtinentia, in quorum cuiuslibet summo aliud ac breuius florum emergit capitulum conglobatum ac caruleum. Locis autem prodest aridioribus in collibus apricis ac meridionalem Solem exipientibus.

Est & 10. nobis 6. Scabiosæ tenuifolia species, Scab. Thal. quam foliosam nominat author, propterea quod coliculus qui ipsi dodrantalis est, ac geniculatus à radice vsque in summum cacumen folijs in frequentes, tenues ac fœniculaceas lacinias diuisis, eleganter exornatur, quorum ad quodlibet geniculum bina ex opposito sibi correspondent. Flos huic est in globum collectus, caruleus. Huius autem libuit hic meminisse obiter, licet, quod Thalio sciat in Hircynia ipsam nondum reperire: attamen in vicinis montibus non rarò sese conspiciendam ea offert: nec dubitat admodum in ipsa Hircynia alicubi eam quoque existere.

De Scabiosa minore vulgari loquitur Lobelin Advers. ubi p. 237. quærit, Peristerion siue Columbaria dodrantalis in aquaticis, desiccans & adstringens, qualem Aeginecea memorat, an sit Scabiosa

Scab. Thalio
siue tenuis
fol. candida
minor

Scab. Thalio
siue tenuis
fol. media

Scab. Thal.
siue tenuis
fol. min.

Scab. Thal.
siue foliosa

Scabiosa minima tradēs eā foliis esse foliis Verbenae, incifuris per ſumma altioribus, laciniis, ſimilibus tamen, & altera ſuperficie albidis, ad terram ſtratis, lationibus, minūſ ſerratis. Caulē plurimū aſurgit recto, pedē & cubitū alto, gracili, ſupernē in ramulos rectos ſparſo: hilares flores, rotundi villoſique, ex cæſo cærulei vel glauci, Morſus Diaboli: femine compreſſo, radice puſilla quantus parvus digitus, parum fibroſa. Hac plurimū, inquit, utuntur Monſpelienſes Pharmacopœi &c. Quod autem exſtimemus Lobelium tradere Scabioſam à nobis deſcriptam, Icon ab eo ſita Obſp. 196. & Icon. plant. pag. 375. titulo Scabioſa minoris Adv. 231. noſtram opinione cōfirmat. ſed Cur Cluſ. in Hiſt. ſua poſtrema iconem Lobelianam poſuerit pro ſua Scabioſa montana quinta ignoramus. H. Lugd. p. 1066. Scabioſa Matthioli minor.

Tabern. Icon. p. 166. Scabioſa minor 1. item pag. 161. Scabioſa minor 2. & Scabioſa minor 3. Adhuc p. 162. Scabioſa minor 4. Klein Scabioſen. Hiſt. lib. 1. p. 543. Scabioſa 9. ſive minor 1. Scabioſa Scabioſa 10. ſive minor 2. Scabioſa 11. ſive minor 3. & p. 549. Scabioſa 13. ſive minor 5. Item Hiſt. pag. 551. Scabioſa 20. & 21. abſque iconē, quæ ſemper intelligenda, vbi ſimpliciter Scabioſa ſcribitur, flore cæruleo vel purpureo, interdum albo, Herbariorum ſcēmina, à qua mas parum diſſert. Ego exiſtimo has quatuor Scabioſas eſſe tantūm vanetates ludentiſ naturæ Scabioſæ minoris vulgaris, nescio cur in Hiſt. pro 12. ſciat 13. meliſ placet ordo in iconibus: Si quod exiſtimat Frater ſcabiola 20. Tabernamontani eſt eadem cum noſtra vulgari minori Tabern. non debebat ſeparare à ſuis minoribus: an Tabernam. bene deſcribit iudicent lectores.

C. Bauh. Phyt. Scabioſa 1. ſive capitulo globoſo maior, Scabioſa minor ſive Columbaria eidem Ic. Plant. Phytēma Dioſcoridis Columz. Variat flor. colore, quod communiter eſt cæruleus, aliis purpureo ſcens albus. Item, Scabioſa 3. ſive capitulo globoſo minor 1. 2. 3. & 4. Tabern. Variant tantūm foliorum diſſectionibus, alteri enim tenuiſſimē diſſecta, ad mediū neruū: alteri non item: tertia etiam folia inferiora habet penitus non diſſecta, cuius nomine 3. [imō 4. Frater non bene obſervat] apud Tabern. icones habentur. Item apud Matth. Scabioſa 2. ſive minor, Scabioſa 20. Tabern. Scabioſa foliis Bellidis Thaliō. Has duas cur C. Bauh. ſeparat?

Scabioſam minimam prope Monſpelii Agidiam portam ad rivulum, & agrorum margines, Norbonæ plurimam, ac etiam in Apenninis Bononiæ meminit Lobelinus: Matthiolum minorem in pratis & campis ſtribus, in agris non cultis ſecus itinera, & in collibus terrenis. Phytēmatidis Columzæ Neapoli toto æſtis propter caliditatem ubique viarum per margines, vidi ſcūm, florida capitula viſuntur, ſed æſtate magis. In hortis Ill. C. Vvrit ſponte ac vrbi Montbelg. viciniſ locis paſſim provenit florens Junio. Hæc Scabioſa quibudam in locis eſt valde parva, aliis in locis maior, & iuncos ferens caules cubitales vt Montbelgardi, vbi cum candido flore reperi. Quæ Monſpelii provenit ſatis parva eſt & hiſtulosa. Baſileæ obſervavi florentem Auguſto propē Leuraſch in monte, & quā itur Mouters adhuc vegetat & florentem Octobri. Genovæ pulchrē virentem Februarii principio quā itur ad montem Saleuz, & alibi, vt prope fluvium Arre ſlorentem Maio. Tiguri quoque vidi Montbelgardi vires tota hieme.

Tom. III.

Sapore eſt amaro Scabioſa minor Matthioli Vires. vt in eiſdem Epit. cum addit. Camerarii videre licet: quare excaſcit, extenuat, abſtergit, aperit, & craſſa, lentaque expectorat. Herba ipla in puluerem pota, aut ſuccus ex melle delinctus, pectus, & pulmones abſtergit, craſſaque, ac glutinoſa per os eiicit. Idem præſtat eiſ decoctum potum, ac ſcabiem ſanat. Id quod & ſuccus facit in vnguentis additus. Folia cruda contuſa, & peſſetis carbunculis adnata, miniſ eiſ eorum perniciem cōferent: Datur vtiliter earundem ſuccus quatuor vnciarum pondere, cum theriacæ draſacina peſſilentia affectis, prima ſtatim die, verūm à potionē agros ſudare oportet: Si iterum, atque iterum medicamentum repetere. Datur item contra ſerpentium venenoſorum morſus, herba verò exterius imponitur. Illius Scabioſa ſuccus, cum Chryſocollo, & Capſuræ monacho, lentiginēs, alphas, impetiginēs, & cæteras cuius infectiones abſtergit, oculorumque per ſe, & Scabioſa cum ſucco Fœniculi, albugines delet. Scabioſa minimā Lobeli, plurimū utuntur Monſpelienſes Pharmacopœi propter inibi maioris Scabioſæ penuriam, non modò ad ſanguineum ſerum putridum educendum, deſcandūque, & Thoracem pulmonēque congerie pituitola expediendam: ſed etiam ad Morpheas Arabicasque Elephantiaſes, & Græcorum lepras ſquamulave, reprimendas, item impetiginēs, ſacriginis excretionēs, pruritus, cuiſque ſcabiēs ſcadas: Tineam abluunt lixivio, in quo maduerit aut decocta fuerit Scabioſa. Succo vitur Tragus. Dioſcorides hanc ad amatoria vtilem eſſe ſcripſit, ſed modum omiſit, quare incognitus adhuc erit, præſertim cū n potius magica, quā phyſica facultate hoc efficere poſſit, ſicuti in aliis, quæ appendæ collo, vel domui, vel taſſæ, vel ſimili modo viles ad aliquid eſſe prædicantur.

SCABIOSA PROLIFERA.



interdum etiam tertii, ſed imperfeſti: primis floribus ſuccedebant ſemina Scabioſæ 5. [quam Scabioſam glabram carnioſis foliis diximus] ſimilita: radix ſubſulca, & multis fibris prædita, ſed non vinax.

Lobel. icon. plant. p. 539. Scabioſa prolifera. Tabern. Hiſt. p. 549. Scabioſen mit neben blumlein 17. Scabioſa prolifera: Belg. cabioſen mes

Niſquam Locus Deſcriptio
ſpōtē naſcentem conſpexi (inquit Cluſ. in poſt. Hiſt.) Scabioſam quæ mihi in cultoribus B. Agreis hortis obſervata, floribus ex purpureo ſab-cæruleis in caput congeſtis, ad cuius latera in orbem ſan-debantur multi longiſculi petioli, è quibus dependebant alii minores flores maiori-bus colore ſimiles, & ex his interdum etiam tertii, ſed imperfeſti: primis floribus ſuccedebant ſemina Scabioſæ 5. [quam Scabioſam glabram carnioſis foliis diximus] ſimilita: radix ſubſulca, & multis fibris prædita, ſed non vinax.

A 3

Xinder fous. C. Bauh. Phyt. Scabiosa 14. siue
prolifera Lobelio.

SCABIOSA RVBRA PEREGRINA
 quibuldam Indica.

Descriptio
 Foliorum
 Infus.

PLanta hæc, licet vna sit & singularis, & Scabiosæ minori vulgari similis, plures tamen foliorum figura differentes species, vt illa, induit.



Quippe ima, quæ propter radicem sunt, reliquis latiora, quadam crenata, quædam lacinijs sed minus profundis diuisa, longo pediculo hærent, veluti repanda. Quæ sequuntur superiori versus, altius secta, profundioribusq; lacinijs diuisa, veluti in plura alia subdividuntur, quorum singulæ partes infimis

crenatis, non magnitudine quidem, sed specie & figurâ quodam modo respondent. Sunt inter hæc quædam adhuc profundius & minutius secta. Suprema, quæ ad ramorum diuicationes exoritur, vel paucis aliquot incisuris, minus tamen profunda, vel nullis planè constant, & per ambitum tota æqualia, angusta, breuioribus pediculis donata. Ima folia cum caule modicè hirsuta sunt.

Scabiosa
 Indica Clu-
 fio. Camis.

Nos existimamus à Clus. in Hist. post. lib. 4. p. 3. depictam pro Scabiosa 6. Indica ac sic descriptam: Cubitali aut ampliore assurgit caule, satis gracili, qui in multos tenues ramos diuiditur, extimâ parte veluti umbellam flosculorum in caput congestam gestantes, exterioribus flosculis, qui reliquos ambiunt, masculis, in quinque lacinijs diuisis, quemadmodum & interiores flosculi, qui minores omnes autem coloris elegantis rubri sunt, & ad purpureum quodammodo tendentis: his succedunt stellata, vt in alijs Scabiosarum generibus, femina, in caput metæ formâ congesta.

Flosculi.

Folia.

Radix.

Tempus.

Varietas.

Folia non ab similia habet illis quæ conspiciuntur in Pannonica *αχελαιο*: sunt enim similiter incisa, viridiora tamen, & splendentia, caulem atque ramos in singulis internodijs ex aduerso amplectentia. An radix viuax esset & perennis in id dubitabam, quia anno primùm 1591. florentem obseruabam, semine mihi misso natam eodem anno. Sed sequens annus annuam esse me docuit. Floret Æstate & Autumno: semên sub Septembris finem, aut Octobris initium maturum fuit. Accipiebam id semên ex Italia Scabiosæ Indicæ nomine: quod quibuldam amicis communicatam. Florem variavit, qui fuit, illis referentibus, multò dilutior. Memini etiam Viennam mihi missum Scabiosæ semên ex Hispanijs, quod flores dedit eodem anno quo fatum, sed illi etiam rubri dilutiores.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 5. siue peregrina rubra,

quibuldam Hispanica rubra.

Hæc Scabiosa à me obseruata est florens in loco & nio, Iulio & Augusto in hortis Di. Griennigeri tempus. Pharmacopœi in Pfortzheim, & Basilea in Di. Martini Medici Poloni, & Di. Zvingeri & eius fratris Iselini cum semine maturo Septembri.

SCABIOSA LATIFOLIA
 albo flore.

Meminît Clusius in post. Hist. in hortis Belgicis pænè similem Scabiosæ ochroleuco flore, cuius tamen flores essent didiores: Aliam præterea latioribus folijs, firmioribus caulibus, & florum niueorum capitulis interdum singularibus, plerumque tamen binis aut ternis coherentibus & simul nascentibus. Hæc ille quicunem habet hoc titulo, Scabiosa alba Belgicorum hortorum.

Eandem Lobel. Obseru. & Icon Plant. p. 538. posuit pro Montana Scabiosa calidarum regionum: Hist. Lugd. patro. pro Scabiosa montana calidarum regionum Lobelij & Penæ.

Suspiciamus nos hanc vidisse nondum florentem Iulio apud D. Griennigerum Pfortzheim, dicebatur esse flore albo, folia inferiora similia vulgari parua, sed maiora, alia laciniata, ad vulgarem hirsutam accedentia.

SCABIOSA PARVA ODORATA
 flore folijs inaculis infectis.

Plucherrima atque grata oculis, atque natibus Descriptio
 Est Scabiosa hæc, quæ lignosam longamque radicem habet, ex qua folia exeunt diuersa, nam



in imo vel sunt sylvestri Erucæ, paria, vel Coronopo similia, minora verò atque hirsuta, in caule verò similia lacinijs Scabiosæ vulgaris minori, sicui & flores, qui purpurei ex albo colore sunt, nec vt in alijs, ex cæruleo purpurei, in capitulis rotundioribus, atque singuli flores Ocimi flores imitantur, nam galericulati sunt, & per ora laciniati, admodum similes exoticæ Ocyro, folijs purpureis maculis infectis simbriaticis, atque etiam, quod in alijs Scabiosis non obseruatur, benè odorati sunt.

Fab. Colum. nou. pl. p. 31. & 32. Phytœyna minor, Scabiosa parua, floribus Ocimi laciniatis atque odoratis.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 4. siue Scabiosæ globoso flore similis, odorato flore. Is eandem cum minore Tabern. diceret, n. floribus Ocimi laciniatis ac odoratis esset.

Floret Æstate, atque etiam Hieme propter cœli

Scabiosa
 alba folijs
 latioribus
 geminis
 capitulis.

Scabiosa
 calidarum
 regionum.

Flores.

Phytœyna
 minor
 Scabiosa.

Scab. flori-
 bus, Ocimi.

coeli amenitatem. In montibus oritur Amal-
foe oræ.

SCABIOSA CVM PVLCHRO
femine riuos.

Descriptio



Simplice &
dignosa ra-
dice albicante
figitur, paucis
& iis quidem
exiguus fibris
capillata: cau-
lis dodrantalis
aliquot diuisi-
tis concavus,
teres, hirsu-
tus, folia ten-
uiter dissecta,
superiorum fo-
liorū Colum-
baræ Scabiosæ
modo, pilis ob-
sita, capitulis
radiata, subie-
cta folia oblo-
ga: semen per
omnia simile

Scabiosæ Hispanicæ magnæ dictæ, tomentosum,
calathio membranaceo coronatum, vnguis ferè ma-
gnitudine, pellucidum, striatum, in cuius medio
stella parua quinquepartita, ex feminis autem si-
nu capillamenta quadam parua atque rigidius-
cula prominent.

Locus.

Alia species

Descriptio

An Scab.
Hispanica
minor Cla-
sia?

Scab. affina
minor folio
laciniato
Lob.

Scab. peregr.
bellula mi-
nor C. Bauh.
C. B. m.

Talis ea est quæ mihi ex Prouincia per infi-
gnem Parmacopæum Jac. Rainaudicum missa.
Postquam verò nostra figura iam esset parata,
aliam eiusdem speciei accepi ab erudito Medico
D. Salzmanno Argentinenſi lectam propè Se-
lion in Galloprovincia. Ea altitudinem nostræ
figuræ non excedit, estque vix trium aut quatuor
vnciarum, nulla diuisura, folia vt prioris dissecta,
pilosa: flosculi iidem ad plantulæ proportio-
nem magnitudine prædictis cedentes, iudem-
que radiatis foliolis sed angustissimis suffulti,
striati, emicantibus staminibus nigris ac longis.
Prioris plantæ flores sua magnitudine appingi
curauimus. Maior maioris est: minor minoris
plantulæ.


Ad Clus. Hispan. & Hist. post. Scabio-
sa Hispanica minor, siue 2. maiori Hispanicæ
(quam à pulchro semine denominamus) per simi-
lis & sola magnitudine differens: est enim per
omnia minor, folia tenuius incisa, caliculi & flo-
res minores ex cæruleo purpureo: cum His-
panica maiore iisdem locis nascitur, atque eodem
etiam tempore floret, & semen ad maturitatem
perducit.

Lobel. Obs. p. 293. Scabiosæ affinis minor, folio
laciniato Scabiosæ aut Erucae, flore cæruleo vul-
garis Scabiosæ, spithis longiusculis virentibus
sesquialibus, Rosarum gratiæ, stellæ modo
radiato. Semen membranaceis involucribus argutis
implicatur, Scabiosæ maioris Hispanicæ ritu. Vnde
hæc apud nos oritur ætenuo singulis anhis
semine. Mutton noster primus hæc mecum
communicauit.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 16. siue peregrina stellata
minor, Clusio Scabiosa Hisp. minor. In maritimis
Adriaticis reperta, parua & repens apud nos in

hili sesquialibus enata. Suspicio Præter Scabio-
sam in maritimis Adriaticis reperitur eandem
esse cum maritima mea parua & diuersam ab His-
panica minore Clusii.

SCABIOSA MARITIMA PARUA.



Longiuscu-
lam agit
radicem, satis
crassam, mul-
torum capitū,
pro quorum
numero canes
emergunt do-
drantales, & si
accedat cultus,
etiam cubital-
es, ramosi, folia
inferiora
tenuia, folio-
rum Scabiosæ
semine pul-
chro sectioni-
bus diuisa, triū
vnciarum lo-
gitudine, at su-
periora angu-
sta & veluti

Descriptio

graminea, nullam agnoscunt diuisionem: capitu-
la pro plantulæ modo magna, flosculis magnis re-
serta, præsertim circa margines (colore in sicca
planta purpurante) capitū obvallant folia oblon-
ga viridia, vt in Scabiosa Hispanicæ maxima pul-
chro semine, at enim hæc semen non ita pulchrum:
quamuis interum membranis quid hæc pilis
magnis obtutum: Huius semen nobis misit flater
C. Bauhinus cum hac inscriptione, Scabiosa parua
maritima ex Clusio insula: facta Montbelgardi
in Horto E. C. prouenit, attulit etiam plantam sic-
cam rediens Patavio dodrantalem vel paulo ma-
iorem pro Scabiosa maritima vera Cortuso.

Locus

Scab. parua
marit.
Clusio.

Scab. ma-
rit. Ger-
manica.

SCABIOSA GLABRA CARNOSIS FOLIIS
virentibus, flore ex cæruleo
purpureo.

Radit Clusius in Pannon. p. 535. Scabiosa
Pannonicæ secundum genus siue Scabio-
sam alpinam, quæ in post. Hist. 4. ab eo dicitur
Scabiosa montana siue quinta, quam ita de-
scribit. Quinta autem fena habet folia, humi sparsa,
Scabiosæ vulgarioris, & inter legetes nascenti
ferè similia, minime quidem villis obsita, sed car-
nosa, præ viriditate quodammodo splendentia,
aliquot crenis incisa, sapore si manducantur len-
to, & gummoso, deinde aliquantulum acri: ex ho-
rum medio crescit palmatis canis, aliquando
paulo amplior, gracilis, rotundus, cuius inferio-
rem partem ambiunt quaternæ aut fena folia,
profundi & tenuibus laciniis diuisa, bina semper
ex aduerso sita: extremo cauli insidet capi-
tulum vt in vulgari Scabiosa ferè, è multis flosculis
quinque foliolis constantibus congestum, quo-
rum exteriore maiores sunt, eleganti colore ex
cæruleo purpureo præditi, villis quibusdam
nigris singulorum flosculorum sedem ambi-
bus: radix longa, nigra, crassiusculis albis fibris
capillata.

Scab. Pannon.
2. siue alpe-
na Clus.

Descriptio

HISTORIÆ PLANTARVM

Locus & tempus.

Inuenitur in fummis Sneberg & Snealben Austruæ & Stiriz alpium iugis, in tenui gramine nascentes, vbi florer Augusto: similiter in depressioribus nudisque circa Viennam collium superciliis, vbi Iunio & Iulio floribus onustam legebam. Cur Clusius, qui in Pann. figuram omisit in post. Hist. pro Scabiosa sua quinta iconem posuerit Scabiosæ minoris sive Columbariæ Lobelij, vti antè dictum, nescimus, considerandum an aliquis error Typographicus. Est autem Lobelij Scabiosa minor eâ cui ante titulum fecimus Scabiosæ vulgaris minoris. Hoc etiam considerandum in descriptione Clusij modò proposita nobis quidam videri respondere nostræ Scabiosæ glabræ foliis rigidis viridibus:

Clus. notatur.

SCABIOSA GLABRA FOLIIS rigidis viridibus.

Locus. Descriptio. Cuius.



Montbelgardi in horto Ill. E.C. in insignem magnitudinē adoleuit, rigidis striatque caulibus, per quos foliorum est situs aduersus, veluti ex geniculis: multa tamen ea sunt, sequipalmata, quædam dodrantalia, longis hærentia pediculis, duarum triumve vnciarum latitudine, segmentis paucis longèque diffusis inferiore parte diuisa, vltimo segmento quod mucronem constituit, trium vnciarum longitudine aut maiore: rigida sunt ea, viridantia & vtrinque glabra: surculis autem peculiaribus palmam aut dodrantem longis hærent flores ex manifestis capitulis squarosis albicantibus, hirsutis. Semen longum hirsutum. Quam Scabiosam vocamus glabram Frater C. Bauhinus siccam dedit cum his nominibus. Stoebe Theophr. Cortuso & Brassauole, Guilandino Scabiosa alba, Bononiæ collecta, quæ ipsimet postea in Phyt. vocatur Scabiosa 9. siue latifolia glabra alba, Clusij Scabiosa 4. & maior Pannonica: Stoebe Theophrasti aliquibus credita Scabiosa alba dicta Bononiæ. An Clus. Pann. p. 539. Scabiosa 4. (8. in Hist. post. lib. 4. p. 53.) siue maior Pannonica albo flore.

Floris. Semen. Scabiosa glabra. Stoebe qui busdam. Scabiosa alba.

In Tabern. Hist. p. 546. Scabiosa 7. montana, Berg Scabiosen/ siue icon. Item p. 546. Scabiosa montana peregrina, & Scabiosa Norbonensis. Ex semine per Fratrem Bononia allato, mihi quæ communicato, provenit Scabiosa glabra Montbelgardi in horto Ill. C. V. viti. cum foliis non mollibus vt in aliis, sed solidioribus: peruenit ad cubiti altitudinem, rudimenta florum tantum apparuerunt.

Locus. & tempus.

SCABIOSA MONTANA CALIDARVM regionum maior Lobelij.

Locus:

Colles amat, inquit, hæc plagæ temperatioris, vt Pedemontis propè Riuiam, &



Norbonæ, vbi notam vocant Herbarij, folio angustiore, albidiores, parum hirsuto leu. usque laciniato ad imum caulem Verbenacæ, aut vulgaris Scabiosæ: superiora verdè in ramulis plusculis, gracilioribus, altius diuisis, & flores per Ianium & Iulium prominentibus purpureos [albos contingit in Obsetu.] Scabiosa paræ, aut laceæ, capitulis squammatim compactis, vbi semen Trifolij Alaphutidis, pulum, copiosum, involucri membranis areata concinnitate efficitis, angustias plicarum fornicum pusillorum cohibentibus.


Iconem à Lobelio in Obs. p. 291. in Ec. plant. p. 538. ab Hist. Lug. p. 110. pro montana Scabiosa calidarum regionum proposita, Clusius in post. Hist. lib. 4. p. 4. posuit sub titulo Scabiosæ albæ Belgicorum hortorum: ea sanè icon benè replet nostram Scabiosam glabram foliis rigidis, verum descriptione Lobelij in Adv. p. 133. non competit in omnibus.

Frater C. Bauhinus phyt. ait p. 526. Scabiosa Lobelij est Scabiosa maior Matthioli, cuius capitula ait non rectè pingi & squammata pingi debuisse. Verum ego Fratri assentiri non possum: non solum figura Lobelij, verum & descriptio plurimum variat à descriptione & figura Matthioli Scabiosæ maioris.

Icones.

C. Bauh. nor.

SCABIOSA MULTIFIDO FOLIO, albo flore, vel potiùs Ochroleuco.



Cvbitales Descriptio. Caules, rotundi, graciles, firmi, virentes, nodosi, eos ad singula genicula amplectentibus binis folijs ex aduerso semper respondentibus, quæ tenuibus & profundis lacinijs adeò diuisa sunt, vt alata videantur, color ex cinereo virens, sapor amarifculus: quæ verdè secundum radicem nascuntur, antè quàm planta in caulem assurgat, latiora hænt, minoribus quæ lacinijs diuisa ex summis

ex summis

ex summis alis ramos fert tenues, & nudos, qui sustinent plana capitula, & candidis siue potius *dyxerunt* [præsertim antè quàm explicentur] inodiosisque floribus simul nascentibus congesta, qui quinis foliis [quorum tria inferiora manifeste sunt] constant, paucis intus staminibus: floribus succedunt hirtuta semina vulgaris Scabiosæ seminibus minora, in orbiculare caput congesta: radix minimi digiti crassitudinem interdum æquans, multisque exiguis fibris in lateribus prædita, viuax est, & lingulis annis nouos caules profert.

Synonyma

Clus. Pannon. p. 537. Scabiosa 3. siue multifido folio, albo flore: item p. 538. Scabiosa 3. In Hist. post. lib. 4. p. 3. Scabiosa leptura *dyxerunt* flore.

Camer. hort. Scabiosa Buarica pumila, folio tenuissimo, flore purpurascete vel incarnato, non ab similibus Pannonicæ.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 6. siue multifido folio. Tabern. Icon. & hist. Scabiosa 18. maior alba, *Grosß weiß Scabiosen* inueni in Allaria prope hohen Königsberg & Schlestadtium. An Tabern. eandem intelligat cum Clusio nescio, figuram eius assumpsit.

Locus

Nullum est Austriæ inferioris pratium siccus editior eue loco situm, nullus ager gramineus, nulli ferè aruorum margines, in quibus non nascatur hoc Scabiosæ genus, adeoque fertile est in gerendis floribus & pertinax, vt sola bruma illius luxuriam coërcet, alioqui Iunio florere incipit: frequens etiam est in Morauia.

SCABIOSA LATIFOLIA RUBRO FLORE & alia purpurante ex nigro flore.

Descriptio



Cubitalis tant caules, rotundi, nodosi siue geniculati, nonnihil hirsuti, concavi: in singulis geniculis bina folia ex aduerso nascuntur, non multifida instar aliarum Scabiosarum, sed lata, in ambitu tamen crenata. Verticæ foliis interdum maiora, ex breui petiolo pendencia, colore ex viridi dilutior prædita,

amro & acri sapore: ex alarum sinu rami etiam prodeunt foliati, qui ex lateribus pediculos protrudunt, floribus vulgaris Scabiosæ modo congestis, ornatis, coloris rubescentis, nullius odoris: deinde semina simul congesta, angulosa, hirsuta, Cnici ferè interdum magnitudine stellata coronâ insignita: radix minimi digiti crassitudinem nonnunquam æquat, longa, nigricans, statim à capite quædam fibræ satis magnas spargens, & subinde ex lateribus nouos caules producens.

Scab. latifolia purpurante ex nigro flore.

Est & alia [2. in Pann. quarta in post. Hist.] quæ magnitudine iam dictam [primam in Pann. 3. in

Tom. III.

Hist.] superat, maioræque & nigriora habet folia; purpurascentem ex nigro florem: in reliquis factis conueniunt: [solum autem sic descripsit, Hæc Scabiosa per omnia maior alia inuenitur maioribus & nigrioribus foliis purpurascentem ex nigro flore: alioqui nihil differens.]

Eadem est ni fallor cum Clusii Scabiosa, cuius binos adseruamus ramos à Fratre C. Bauhino in horto Patauino collectos, sesquipedales, hirsutos quibus folia Verticæ amula ex longo intervallo proximè & immediatè hærent, quædam trium aut quatuor vnciarum, duarum, triumve lata, aduersa, pilosa, pallidè virentia, per ambitum serrata, in acumen abeuntia. Ex superiorum combinatione geniculata, ramuli sursum vergunt terni, medio vtrumque lateralem excedente, qui florum capitula sustinent, iuniora quidem & primulùm prorumpentia Succisæ similia: foliis angustis, stellatim in orbem positis, Asteris lutei modo, veluti basi subnixa; flores in sicca planta valdè rubebant.

Deser. no. Scabiosa.

Clus. Pann. p. 535. Scabiosa 1. siue latiore folio, rubro flore. In Hist. post. lib. 4. p. 1. Scabiosa 3. siue latifolia Pannonica rubro flore. Item in Pann. Scabiosa 2. siue latifolia purpureo flore. In hist. post. Scabiosa latifolia Pannonica purpureo flore, seu 4.

Synonyma

Lobel. icon. Pl. p. 518. Scabiosa rubra Austriaca.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 11. siue latifolia rubra. Item Scabiosa 13. siue Virgæ pastoris folio Tabern. Scabiosa latifolia peregrina Tabern: conuenit multum cum 11.

Scab. rubra Austriaca Lib.

Tabern. Icon. & Hist. Scabiosa 8. latifolia peregrina: semper oder rot Scabiosen. Item hist. Scabiosa 1. latifolia, 2. reyt Scabiosen Scabiosa rubra Austriaca: sissitur eum eandem plantam bis tradere.

Prouenit vtraque Scabiosa Clusii in omnibus ferè caduis siluis iuxta species, locisque vmbrosis per vniuersam Pannoniam Austriamque infra Anisum. Floret Maio & Iunio, quo tempore semen plerumque etiam maturescit.

Locus & tempus

SCABIOSA MAIOR CVM PVLCCHRO temine.



Clusius sic

Descriptio

describit: Folia vulgaris Scabiosæ maioris foliis similia habet, laciniata videlicet, altè incisa, mollia, lanugine pubescentia: caules nodosos, rotundos, interdum cubitales, quorum geniculis folia inter se opposita: summis iam capitula insident & multis caliculis membranaceis

paleaceis composita, qui singulares flores conti-

B

nent cādicantes; quibus deciduis, in medio quasi singulorum caliculorum umbilico, exigua quadam stella subnigra conspicitur, quatuor, quinque, aut sex interdum radiis constans: paulatim verò hi caliculi excrecentes expanduntur, donec semen hirsutum & crassum [quo caliculi sustinentur] maturescere incipiat: radix candida, crassa, vulgari similis. *Clusius* in hac sua descriptione tam in *Hisp.* quam in *post. Hist.* non meminit foliorum longorum floribus subætorum stellatim dispositorum, ut in *Astere Attico* luteo *Monspel. montano*: icon quoque eius, quæ eadem apud *Lobelium*, ea non demonstrat: an cultura id faciat considerandum: nos cultam, *Clusius siluestrem* exhibet, ac vocat scabiosam maiorem *Hispanicam* primam, pingitque in *post. Hist.* solo *Scabiosæ* nomine.

Clus. not. sur.

Scabiosa maior Hispanica prima Clusio.

Lobq. Obs. p. 292. & Icon. plant. p. 539. Scabiosa maior Hispanica floribus albis.

H. Lugd. p. 310. Scabiosa Hispanica Clusij maior. Dodon. lat. in fol. Scabiosa peregrina. An Cæsalp. lib. 13. cap. 58. Scabiosæ genus peregrinum breue: foliis non adeò scissis: apitulis sphericis, amplis: seminibus circumdantibus, crassis, quibus singulis stylus insidet, stellam gerens, iucundo aspectu? Tabern. Icon. & Hist. Scabiosa 5. maior Hispanica, Spanische Scabiosen. C. Bauh. Phyt. Scabiosa 15. live peregrina stellata maior. F. b. Columna p. 100. Scabiosa Hispanica maior, femine in uno hirsuto. An Lanaria herba vel Struthium? Semina huius plantæ ad nostram separam appicta sunt. Camer. hort. Scabiosa Hispanica elegans planta.

An Lanaria herba vel Struthium?

Locus & tempus.

Crescit iuxta vinearum margines & semitas, locique incultis agro *Salmanticensi*, per reliquam etiam *Hispaniam*, haud dubiè & in aliis calidiorebus. Floret istic mense *Iunio*. Apud *Germanos* verò, qui illam semine ex *Italia* misso interdum natam colunt, seriùs: sed cum magnâ ex parte circiter *Autumnum* flores præbere soleat, plerumque inane succedit semen, [licet aliquando benè maturum colligere meminerit *Clusius*] & subsequens hyems stirpes corrumpit. Vident tamen qui ramis in terram demissis propagare & conservare studuerunt: sed operam lulerunt. Vidi *Basileæ* in horto *Di. Zvvingeri* semine vix maturo *Septembri*, & habeo *Montbelgardi Octobri* florentem, rarò autem apud nos maturitatem acquirit semen, nec herba hiemem perfert.

SCABIOSA MAXIMA DUMETORUM folio non laciniato.

Descriptio

*R*adices habet perennes fibrosas, longas, etiam ad cubitum, latis crassas, ac multas capillares, intus albas, extrâ nigricantes: apor ingratum cum dulcedine & amaritudine aliqua, odor indicibilis: folia priora palmum longa vel breviora, ac etiam longiora, lata duos aut tres digitos, similia foliis *Succisæ*, maiora, molliora: quæ per caules folia per geniculos modò bina, interdum ternaria, quæ versus superiora redduntur glabra, & minùs mollia, serrata, non dissecta ut in vulgari, pulchrè virent: caules bicubitales vel tricubita-



les, crassi, plures, ab vna radice oriuntès, caui, circa inferiora purpurascetes & hirsuti; in superioribus partibus & ramis, glabri: & iuxta flores itèr hirsuti. Flores in extremitatibus ramorum, similes *Scabiosæ vulgaris*, necnon etiam *Scabiosæ minoris*: Differunt hi flores à floribus *Succisæ* cui tota similis herba: quòd maiores [vti & folia herbæ maiora] flo-

res in circumferentiâ magni hiantes, qui non sunt in *Succisâ*, color etiam dilutior quàm in ea & *Scabiosarum* amulus, iucundi odoris: flore decedente inter semina non sunt foliola ut in *Succisâ*: Semina sunt longa, hirsuta, compressa, cum quatuor angulis. Icon melius exprimit *Scabiosam* folio ferè integro *Clusij*, qui describit.

An *Cæsalp. lib. 13. cap. 59. Scabiosa alia in sylvis* Synon: *Succisæ* similis. *Gels. hort. Scabiosa tertia maior* quam ab duobus aliqui denominant [vt *Dodonæus*] &c. *Per Gesneri maiorem Scabiosam* intelligo nostram dumetorum diuersam à *Dodonæi* *Ovina*.

Gels. not. ebr.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 12. siue Muttensis latifolia maxima Clusij: Scabiosa latifolia purpurascens flore. Hæc à latifolia rubra non solùm magnitudine differt sed etiam hirsute: in hac enim caulis asperimus est, folia etiam hirsutissima, frequens in nostris montibus. Clusij Scabiosam latifoliam purpurascens flore huc non refero.

An *Thalio Scabiosa integrifolia. Hanc verius Scabiosam latifoliam vulgarem credimus.*

Hæc *Scabiosa* interdum eta & in pratis humidis montium iuxta *S. Hippolitum* abundat, vbi vulgarem non vidi: quamvis minor sit ibi copiosa. Abundat etiam montosis locis circa *Tigurum*: Florebat adhuc copiosè *Augusto* & *Septembri*. Eandem inveni cum essem *Basileæ* in *Monte Moutets*, florètem *Octobri*. Item in monte *Rosberg* propè *Mafmunster*. Transiit *Montbelgardum* in *Hortum E. C.* vbi facillè provenit & duravit.

Locus & tempus

SCABIOSA MINOR INTEGRIFOLIA seu maculata.


Descriptio

*S*cabiosa 2. *Thalij* siue integrifolia minor seu smaculata, rariùs obuia, colicolum producit tenue, teretè, scabrum, dodrantalem: folia pauciora circa radicem, octona ferè, vncias duas longa, semissem lata, non hirsuta ut priora, stigmatibus quibusdam nigricantibus exasperata, alias læuoris quid obtinentia, carnosa, quorum ex superiori ordine vnum atque alterum quandoque in ambitu paucas dentatas impressiones recipit: flore ut in cæteris *Scabiosæ* speciebus ex cyaneo subrubicundo.

SVC.

SUCCISA SIVE MORSVS

Diaboli.



Quā radici, minimi ferē digiti crassitudine, fibræ longæ, albæque circumnascuntur, ea præcisā seu præmoris apparet, sapore misto acri & amaro: filia oblonga, acuminata, Scabiosa, quamquam nō dissecta, sed vel integra vel paulum quid, præsertim quæ superiorem obtinent locum, serrata, magis

superā quā infriā virentia, & hic quidem pilis, illic nullis prædita, extremis marginibus ruboris cuiusdam vestigio tinctis, bina ex aduerso per caulem, ignaviore sapore quā radix: caulis cubito altior, rectus, & in alas diuisus: flores cærulei aut purpureo violacei, Scabiosa.

Differentia C. B.

Differentias has, inquit C. Bauhinus, obseruauit, quod alia communiter sit glabra alia hirsuta: glabra, alia maior, alia minor: maior alia & communiter foliis integris, alia foliis dissectis. Variat & flore, qui communiter cæruleus, aliquando purpureus, rarius albus.

Veteribus nomen a

Succisa

Morsus diaboli

Quo nomine Veteres aut Posteriores Græci plantam hanc nuncupant, & an eam cognouerint, nondum certū compertum est. Latino & conuenienter huic herbe nomen, quidam Succisam vocant: quod eius radices præmoræ sint: alii eadem de causā Morsum Diaboli nuncupant, sed nomine ex superstitione indito. Quasi verō, vt nugantur superstitioni, Cacodæmon quidam huius radicem magnæ efficacæ, ad multa vitalem futuram, inuideat hominibus, atque ob id ubi suocuerit, statim eam dentibus succidat, atque circumrodāt. Et hanc superstitionem sapiunt etiam Germani, qui Teuffels abbiß. Belgæ, qui Oniuela beet: Galli, qui Mors du Diable: Itali, qui Morsu di diuolo, & Angli, qui Deuctles bit appellāt.

Scabiosa

Morsus diaboli cur dicitur

Ad Scabiosas pertinet & Succisa. Et hinc ait Lobel. in Aduers. Non video quid negotii sit hanc non esse Scabiosis vnam probare quod quidam contendunt: verūm adeo Scabiosis est similis, vt plerumque pro iisdem accipiat: eundem tamen discrimen in radice, à qua tota, Diaboli morsus dicitur, quod nomen Herbarii retinent, nam Antiquis non debetur. Cū itaque sit multis crassis fibris sparsis, depacta, præcisā apparet quā crassiores coeunt fibræ plures, quasi præmoris foret à quopiam cacodæmone: tamen si eadem ferē cernatur in plantagine: quare malunt alii dictam ab vrida vi quā mordicat bubones & carbunculos pestilentes, quibus magno leuamento admouetur.

Geris Geum Pyncocomon Dufc.

Esse quosdam scribit C. Bauh. Phyt. qui Gerim (Geum, Fuchl.) Veterum censeant: Columnam Tom. III.

verō p. 37. Pyncocomon Dioscoridis esse statuere: alios ad Iaceas, alios ad Scabiosas referre: quibus tam similis, ut plerumque pro Scabiosa accipiat. Quidam Niginam Plinii esse putare.

Niginam Plinii Synon.

Succisa seu Morsus diaboli dicitur, Math. Dodon. lat. in fol. & C. Bauh. Iacea nigra, Brunf. & Dorstb. Morsus Diaboli, eisdem & Trag. Dod. gall. Lon. I ob. Adv. Obf. pag. 295. & Ic. Plant. pag. 596. H. Lugd. Tabern. & Camer. Succisa, Fuchl. Calt. Scabiosa folio integro, Calt. Pyncocomon, Columnæ.

C. Bauh. Phyt. Succisa 1. vel glabra. Item Succisa 2. vel hirsuta, solā hirsutia caulis & foliorum à prædicta differens. Cur igitur separat Frater

C. B. not.

In pratis & viis quibuslibet occurrit multa: Particulariter obseruauit Succisam in quodam prato prope Monspelium, Geneuz florentem mente Iunio. Cū Basileæ essem copiosè in monte Moutets florentem Octobri inueni: vt & alibi Tiguri circa Fagesee inueni iuuenem valde pilosam. Montbelgardii abundat etiam iuxta vites nostras in monte la Chau dicto, infra & supra, incipiens florere Augusto, foliis prioribus hirsutis: vnde atuli Montbelgardum in Hortum E. C. Semen maturum Novembri ac etiam citius: ea nunc durati in horto in flore aliqua rubedo.

Locus & tempus

Eadem, auctore Trago, cum Scabiosis vires obtinet uterque Morsus Diaboli, ideoque illo pro Scabiosis, & vicissim Scabiosis pro illo vt tutū pollinamus. Morsus Diaboli cum flore, herba, & radice in vino decoctus, facit ad omnia ad quæ Scabiosa, maximè verō ad discutit: dos sanguinis grumos, & aduersus pestem. Eadem potest aqua ex herba trahitur. Hec sicut & succus herbe vitulo mixtus excoct & sanat quasvis papulas, omneque fluentem scabiem illit. Amara, et est herba, teste Dodonæo, calido, siccoque temperamento prædita, ad vtriusque secundum ordinem intentum referenda. Aduersus diuturniores tonsillarum fauciumque tumores, qui ad suppurationem egre perueniunt, nulli secunda: adhaerentem faucibus pituitam abstergit, digerit eadem, & discutit: tumoresque eorum partium citò tollit, decocto in ore sæpius retento aut gargarizato, præsertim mollis rosacei exiguo addito. Possè verō & quæcunque Scabiosa, fertur, & aduersus ictus virulentorum, venena, & pestilentes morbos non minùs efficacem & impositam pestilentes etiam bubones discutere: tum & decoctum eius si bibatur, vteri dolores lenire, statimque pellere. Morsus Diaboli [inquit Dorstb.] herba & radix eadem vires habent, calefaciunt & siccant primo gradu. Radix contusa ac inflammationi imposita eam extinguit. Herba adhuc viridis vsui est, contra omnes affectus exteriores corporis, introsumi non debet quia calorem adfert. Egregium indicium Dorstenii [vt & Apollinis eundem opinionis est] qui fibrata contrarius, is enim præter dicta exhibet hanc plantam & eius aquam in morbis calidis.

Vires Viribus Scabiosa

Sanguinis grumi

Papula Tempera.

Tumores faucium

Bubo pestifer

Inflammatio


SCABIOSA FRUTICOSA FOLIO NON dissecto peregrina.

ADuersis pediculis longiusculis caulem amplexa folia ordine per caulem nascuntur, oblonga, acuminata, medio latiora, hirsuta, incana, Plantaginea, nisi alius esset nervorum decursus

Descriptio

caulis teres, arborescens, albicat, pilosus, florem sustinet s. glomeratum: semen eius pulchrum, album sublongum, crassiusculum, desinens in latam pelliculam, vt Scabiosa magna, cum pulchro semine, quod missum ab Hortulano Florentino, nomine, Scabiosa arborescentis semper virentis. Lobeo facie & virgultis Valeriana rubra, sed floribus & semine Scabiosa Hispanica.

Scab. peregrina Lob.



Lobel. Obl. p. 292. Scabiosa peregrina, rara elegantiz rutilidum haecenus literis prodita. Plant. Icon. p. 540. Scabiosa peregrina. H. Lugd. p. 1108. Scabiosa peregrina Lobelij. An Camer. hort. Scabiosa fruticosa siue arborescens Cæsalpinis?

Tabern. Icon. & Histor. Scabiosa 16. peregrina foliis

non dissecta frembe Scabiosen. C. Bauh. Phyt. scabiosa 17. siue folio non dissecto stellata.

Scabiosam fruticosam primam vidi Lutetia apud Io. Robirum hortulanum regium, florentem mente Augusto: eius semen accepi Stutgardia, quod latum in Horto E. Wirt. Montbelgardi prouenit.

SCABIOSA GRAMINEA ARGENTEA.

Descriptio



Scabiosa capillum, mediocri magnitudine, argenteo villo tomentosum, numerosis circumcirca acuminatis foliis stipatum.

Camer. hort. Scabiosa Graminea argenteo flore. purpureo. C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Scabiosa argentea angusto folio.

Prouenit in monte Vicentino Sumano dicto: vnde ad C. Baubinum misit Palschalis Gallus. Florentia missa Camerario, nascitur etiam in sodinis

Scab. graminea Camer. Scab. argentea C. B. Locus & Tempus

ferri Styria. Mihi dedit DD. Zyvingerus collectam in monte Sumano Vicentia. In Euganeis montibus vix vna aut altera obseruata H. Chergero, nedum Maio perfecte florens.

SCABIOSA MONTANA OMNIUM MINIMA.

Scabiosarum omnium minimam hanc animus Descriptionis fuisse Lobelio Verbenam paruum facere, nisi



in montibus cretaceis & incultis obuia foret. Nam seculipal-nares pedale siue paucos edit cauliculas, foliis in imo sepius donatos angustioribus, inter Sesamoidem & Scabiosam minimam, floribus dilute purpureis, & squamosis capitulis non diuersis.

Lobel. Aduers. pag. 233. Scab. omnium minima Lob.

p. 540. Scabiosa omnium minima. H. Lug. p. 1109. Scabiosa montana omnium minima, Penz. C. Bauh. Phyt. Scabiosa 18. siue montana minor.

Tabern. Hist. pag. 149. Scabiosa 17. Scabiosa montana minor 7. Minima cognominata, siue icone.

SCABIOSA GLOBULARIS QVAM QUINAM VOCANT.

Descriptio D Viam lignosamque habet radicem albicantem, fibratam, in plura interdum capita diuisam: caules



promit multos palmares, nonnunquam cubitales, ramosos, interdum simplices, graciles, hirsutos: & in his folia pilosa exigua, semunciam aut vnciam longa, mollia, crispata, quæ verò circa radices sunt, duabus vncis longiora sunt. Sapor his nullus euidens: flores extremis hærent ramulis

Aphyllantis Angullaræ, glomerati, staminulis contenti caruleis, parui.

Dodon Gall. Scabiosæ; genus, Belg. Schæz. Scabiosa pes Schæz.

Scabiosa / hoc est, *Scabiosa* ouium. Gesn. hort. *Scabiosa* tertia maior, quibusdam ab ouibus denominata, vt Dodonæo, qui hanc magnitudine mediam facit.

Scab. media
Lob. Lobel. in Advers. p. 232. Media *Scabiosa* ferrato angusto folio, flore Globulariæ. Obseru. p. 297. *Scabiosa* media: *Scabiosa* media flore Globulariæ: *Aphyllantis* genus quorundam, albis floribus, varians agro Louanensi. Icon. Plant. p. 536. *Scabiosa* media.

Scab. minor
Dod. linc. H. Lugd. p. 110. *Scabiosa* media Lobelii. Eadem cum *Aphyllante* 1. quæ habetur p. 864. Quæ ait Dodonæum tertium *Scabiosæ* genus fecisse: [Putat in Historia gallica. Est enim ipsi in Latina in fol. *Scabiosa* minor, siue secunda]

Camer. hort. *Scabiosa* ouilla Dodonæi.


Tabern. Icon. *Scabiosa* minor quinta: *Flein* *Scabiosen* Hist. lib. 1. p. 548. *Scabiosa* 12. minor 4. in descriptione 13.

C. Bauh. C. Bauh. Phyt. *Scabiosa* 19. siue arvensis minor folio non dissecto, Gesnero *Scabiosa* tertia. Duplex est, altera foliis hirsutis: sed non crenatis vt rectè T. b. tr. pingit. & apud nos frequentior: altera quæ foliis est crenatis vt Lob. floribus est cæruleis, rariùs albis. De Gesneri *Scabiosa* iam diximus nostram sententiam. Tabern. in descriptione suam dicit esse foliis crenatis.

Locus & Tempus. Quum essemus Monspelij reperi Speciem florentem mente Octobri circa Gargen. Hanc etiam obseruauit vere & Iunio inter Monspelium & Lugdunum. Inter Chastenoy & Nommay pagum Montbelgardensem locis aridis florentem Iulio: plantam in Horto Ill. E. C. ubi progenit: huius vnicam plantam reperi flore albo & cum semine Augusto, inter Morvilars arcem & Gruningen in Sundecouia. In marginibus agrorum Septentrionalium, teste Lobelio, latior multo & maior adolefcit, quam in caldis.

APHYLLANTI AFFINIS SCABIOSA quinta Clus. Bellidi affinis.

Idescriptio



lo, sapore amaro: pedicelli breues, aliquando satis longi, inter folia surgentes, flores gestant cæruleum, glomeratum, Globulariæ, cui nec ita dissimile semen.

Clus. Pann. p. 539. *Scabiosa* 5. montana repens: & p. 540. *Scabiosa* 4. (scribendum erat 5. nam dicitur Tom. III.

criptioni quintæ respondet.) in post. hist. *Scabiosa* 10. siue repens: *Scabiosa* montana [minor, addit inter nomina] repens siue 10.

An C. Bauh. Phyt. Bellis 12. cærulea frutescens quam ex Cæalp. in illa nasci tradit.

Scabiosa montana minor repens siue 10. Clusii nascitur in omnibus Pannoniæ & Austriæ montibus glabris & asperis, inter saxa & talebras sparsa, gramineis etiam quibusdam siccioribus incolisque agris, veluti supra Neapolim Austriæ. Floret Aprili & Maio: semen Iulio & Augusto maturefcit.

Cæterum non dubium est; inquit Clusius, Vire: quin decem meæ *Scabiosæ* iisdem facultatibus sint præditæ, quibus reliqua *Scabiosarum* generæ: quandoquidem omnium est idem temperamentum.

APHYLLANTES ANGVILLARÆ siue Globularia Bellidi similis.



floris pul. Descriptio

Acherimi glomerati figura Globulariæ dixerunt quidam: constat autem in staminibus cæruleis densè fardis, insidens caumini cælis palmæ & l. l. quipalmæ, rariùs cubitalis, rotundi, striati, rubescentis, foliis vestiti multis, interdum vnicis, interdum ab eadem radice multiplices: alia per

terram sparguntur folia, Bellidis proxima foliis, glabra, retuola, gustu amara: radix lignosa, dura, fibris donata, rubra, exterius intus rim alba.

Clus. Pann. p. 541. post. Hist. lib. 4. pag. 5. Globularia seu *Scabiosa* pumilum genus quod vulgo apud Herbarios rei ludiosos Globulariæ nomen inuenit, Anguill. (vt dicit in Hist. post. Clus.) *Aphyllantes* tempore ad Viennenses mulierculæ quæ in suis hortis alunt Blau. Ruffbarque, id est, cæruleam Bellidem nuncupant, quo nomine etiam in Belgicis hortis culta dicebatur. Gallis: *Marguerites blanches*. Is Viennensi agro, nunc uero flore variat: tem nonnunquam conspicitur.

Cæalp. Bellis montana, in asperis nascens: foliis ab radice Bellis præteritis, rotundioribus: cauliculo simplici, sæpe nudo; aliquando paucis foliolis, in cacumine capitulum rotundum, cærulei coloris: herba amaro gustu prædita.

Anguill. epist. 12. pag. 186. *Aphyllantes*, id est, *Frodisflora*: Is le Bonibus liberum telinquitur dicium, an Bononiensium Bononiarum a quibus esse possit.

Lob. in Adv. p. 199. Bellis cærulea Globularia Monspehensium. Is describit & depingit p. 200. atque in Obsp. 253. Bellis cærulea nostra Aduersi est *Aphyllantes* & *Frodisflora* Anguillæ. Mont.

Bellis cærulea frutescens C. B. Locus & Tempus.

Globularia Clus. Scabiosa pumila Aphyllantes Anguill. Bellis cærulea.

Bellis montana Cæalp.

Aphyllantes Anguill. An Bononiarum Bonon.

Ab mont. & pens Clus.

HISTORIAE PLANTARVM

Gesnerius in annotatione quadam manuscripta: Aphyllanthes Angullaræ non probat, quod & veluti globulus caruleus sit & in petris montium nascatur, inde & Sphæranthemum petreum dixerit.

Sphæranthemum petreum Gesnerii Tabern.

Tabernicon. & Hist. lib. 2. p. 43. & 44. Bellis carulea siue 6. Blaw Maslieben. Bellis carulea Apula siue 7. Floemaßlieben auß Sicilia. Bellis carulea Mo. speliaca. siue 8. Blaw Maslieben von Nompelien. Tres habet figuras quas dicit d. f. f. foliorum magnitudine.

Bellis carulea d. f. f. foliorum magnitudine C. B.

C. Bauh. Phyt. Bellis 10. siue carulea caule nudos Aphyllanthes 3. Lugd. Hanc inquit C. Bauh. Lugdun. eandem dicat cum Bellide carulea Penz obuenit tamen differentia in eo, quod hæc in cauliculis folia non obtineat, florem etiam maiorem, mod. & folia dupl. tripl. longiora. Bellis n. carulea caule folioso: Aphyllon frondiflora & Bonotaria Angullaræ: Bellis carulea Lobelij. v. rians magnitudine & foliorum latitudine. Hinc tres apud Tabern. figura, Bellidis caruleæ, & Apulæ, & Morspeliacæ nomine. Sed quicquid C. Bauh. de Aphyllanthes 3. H. Lugdunensis, tamen ego non separo à Bellide carulea Penz. Nec enim Hist. l. x. Aphyllanthes folia penitus admittit in descriptione. quâ si legisset C. Bauh. inuenisset, et pauca in caule, aut nulla concedere. Pauca certe Lob. appingit Bellidi suæ caruleæ.

Bellis caule folioso C. Bauh.

C. Bauh. mor.

Locus & tempus.

Globulana Clusij passim potest per Austriam & Pannoniam in gramineis campis, siluis à fruticibus & arboribus paulo liberioribus, interdum etiam grammolis viarum & semitæ in marginibus copiose crescit. Vidimus Bononiæ in horto S. Saluatoris al. burgo di S. Catharina, florentem Aprili. Burmij Rheiorum & in alijs montibus circa Curiam. Basileæ in monte prope Kauulichen p. g. m. tribus miliaribus à Basileæ. Genæ ad radicem montis Saleuz, & in monte Thuri, virentem Februario, & florentem mense Aprili, Maio, Junio, & Iulio, vt & Morspeli florentem etiam April.

ratio.

DE DORONICO CAP. II.

Doronicum non est Mamiras d. Geßnerii

Quæstio grauis nec minus sæpe in pulpitis & Athes. ab acutissimis ingeniorum viris agitata circumfertur. Doronicum sitne Veterum Aconitum Pardalanches, Arnabo Pauli, aut eiusdem Mamiras, necne? Scribit Gesn. se non animaduertere posse [eiusdem sententiæ Fuchsius] quid impedimento sit, quominus Doronicum vulgare, Mamiras Aeginetæ vocetur: Sed Guilandini contrarium statuens rationibus deinde acquiescens, sic in contrarium it. Doronicum profectò, Arnabo & Mamiras, vt vocabula tria, ita res etiam tres diuersæ sunt. Ruellius apud A. Quatium Mamiram interpretatus est Doronicum, ita vt Lector suspicari possit, ipsius autoris eam interpretationem esse, quod fidi interpretis non est, & fortè multis imposuit. Syluius etiam verba de Doronico ex Serapione non bona fide recitat: &c.

Doronicum non vidit Matth. Icon. scissia Alci. icones Matth.

Doronicum non vidisse Matthiolum, nisi quando cum Marantha in priotibus comm. pro Aconito primo Pardalanche cognominato fictitiam figuram exhibuit. Et hinc factum vt in postremis comm. Lat. & Ital. præter prioris commentarii falsam imaginem tres alias icones, omnes Doronicum vulgare exprimentes, dederit, quas ita inscribit. Et quidem primam imaginariâ: Aconitum Pardalanches Dioscoridi, Aconitum Pardalanches Plinij, Aconitum Pardalanches Theophrasti. De 4. & postrema in titulo dicit,

Matth. Gerba sua re. tractat.

Aconitum Pardalanches minus, quod falsè Doronicum vocant. Sed hæc verba falsè Doronicum vocant, reuocat in ipso textu dicens. Doronicum vulgare plantam misit Ant. Cortusius, qui me primum admonuit Doronicum inter Aconita esse recensendum, quod certò sciret, factò à se pluries periculo, extingui facillè canes, qui horum radices deuorant. Cæterum Matthiolum passim in suis comm. Aconitum primum Pardalanche, quod Dioscoridis cognominat, scribit Theophrastum Theliphonium & Scorpionem appellasse, vocari germanis wolfsbeer & Solwurz. Hisp. Concelha, gall. herbe de la Tria. Sed mirum cum hæc nomina adscribere, cum nondum innotuerit eius planta pro Aconito: nec etiam quadrent ea Doronico pro Aconito exhibito. Gesnerium rectè sensisse fictitiam plantam esse non dubito, quatenus radix eius fictitia est, licet eam adhuc in post. comm. tueatur, se ipsum reprehendens quod noluerit consentire Maranthæ, dicenti, Doronicum vulgare esse venenum: esse Doronicum (quod sit venenatum hominibus) posthac Demonicum appellandum. In Hist. germ. Aconitum Pardalanche pingit, mutata prior radice, sed eadem fictitiâ. Si prior vera erat, relinquenda: si ab eo tempore alteram nascitur, cur non & florè pingit, ac declarat qualis sit.

Aconit. Pardal. Disce Theophrasti Scorp. Theoph. Matth. re. prech.

Demonic.

Camer. notatur.

Figmentum Matthioli retinet Camer. in eiusdem Epit. ac Hist. germ. pro Aconito Pardalanche, ac insuper secundam addit, cui titulum Aconitum Pardalanches Theophrasti, fecit. Huic appingit solum angulosum, quale in Matth. figuris non obseruatur. Sed is & tertiam habet, hæc in descriptione, Aconitum Pardalanches minus. Officinis Doronicum nominatum. Huic priorem congenerem dicit Camerarius in Epit. ac Arabum Doronicum esse negat, càmque venatores qui contra vertiginem comedunt Schwindel frant vocat ait, de prima verò nihil certi indicat. Nos hæc etiâ omittimus, ac cæteras duas proponimus.

Arabum Doronicum non est.

Probatur Doronicum non esse Mamira.

Quod autem Doronicum [inquit Matth. in epist. ad Fallop.] cuius passim in Myropoliis est vltus, Mamiras non sit, tamen contrarium sentiat Fuchsius in Nicolai Myrepsi annotationibus, ego quidem non ambigo, dissentio tamen à Guilandino, quod Doronicum nostri vltus, tam id, quod in Orientalibus prouenit regionibus, quàm aliud, quod in Europa nascitur, non existimem esse legitimum. Nam quamquam hoc probare nititur Guilandinus Ruellii, Leonici, Fracastorii, Manardi, Cardani, Mundellæ, Brasauli, & nostra etiam autoritate: nil tamen assert, quod iure aliquo admitti possit. Quippe quantum ad me attinet, nescio quo pacto Borussus ille augeat me autore affirmare Doronicum vulgaris vltus, legitimum esse Doronicum, de quo scilicet Mauritaniam, quum id ego nunc quam affirmauerim. Atqui si meam de Doronico deheam in medium afferre sententiam, dicam ingenuè legitimum hos carere. Cum enim Auicennæ Doronicum exaltat, & siccet ordine tertio, suaq. vi valenter status dissoluat, non video cur Doronicum nostrum legitimum appellari possit, ac debeat, quum nulla in eo reperitur qualitas, quàm non obscura dulcedo, cuius nullus est inter Arabes, qui meminerit: &c.

Doronicum nostri vltus adulterium

Doronicum legitimum

Doronicum Angull.

Angullaræ interrogat an Aconitum à Matth. pictum sit verum, respondit se verum non vidisse. Si Doronici, inquit, in monte S. Angeli responderent descriptioni Dioscoridi & Theophrasti Aconitum Pardalanches, non dubitandum esset easdem esse plantas.

Mara

Aconitum Pardalianches est Doronicum. Error quorundam.
 Marantha lib. 1. cap. 11. asserit Aconitum pardalianches esse Doronicum vulgare, non tamen venenatum ait hominibus, aut Doronicum negat.

Dod. gall. figmen.
 Doronicum [inquit Lonic. impressi anni 1569.] est radix nota Officinis, foliis Cyclamini, Theophrasto Thelyphonum, species Aconiti autore Matthiolo, qui nominavit Aconitum Pardalianches minus: quidam voluit esse Zurumbet Serapionis & Arnabonem Pauli, & Carnabum & Carnabadium Actii, sed malè.

Acon. Pardalianches. Dod.
 Dodon. gall. pro Aconito Pardalianche exhibet figmentum Matthioli. Ast lat. de purg. licet eodem Pardalianches titulo duas describat species, easque lat. in fol. etiam exhibeat pictura, tamen fictitiam Matthioli figuram respuit, ac dicit, Aconitum Pardalianches quod exhibeo & describo, herbarum studiosi plurimi Doronicum appellant: Pharmacopœi passim pro Doronicum medicamentis admiscunt. Quod tamen Arabes Doronicum nominant, aliud longè ab hoc Aconito Pardalianche est. Hoc enim Auicenna Strangulatore Leopardi: Doronicum verb. Durinigi appellat. Adhæc Durinigi ait calidum & siccum in tertio gradu, cui & ipsæ Arabes Serapio consentit. Strangulatori vero Leopardi suas ex Theophrasto & Dioscoridis vires adscribit, quæ multum à Durinigi viribus recedunt. Et ita Dodonæus cõcludit, quod omnia miscet, ac Pardalianches suum cum Pardalianche Veterum cõfundit. Sensus verborum eius hic est. Aconitum Pardalianches suum non esse Doronicum quia viribus Doronicum à suo Aconito Pardalianche discrepet. Sed falsum, Aconitum suum Pardalianches quod exhibet, à Doronici viribus non recedit, sed ab Aconiti Pardalianches à veteribus commemorati. Nec enim quod exhibet Aconitum Pardalianche, Veterum Pardalianche est, cuius facultates suo Pardalianche falsè adscribit. Sed falsum est eius fundamentum quod sc. Aconitum Pardalianches vocet Auicenna, quod is picturâ expressit. Nam Auicenna Durinigi vocat.

Strangulator Leopardi.

Pardalianches Dodonæus Pardalianches. Strangulator Leopardi.

Zob. contra-ria scribit. Doronica. G. ria. Doronicum eriplex.

Discrimen Doronicis ab Aconito Pardalianches.

Aconitum Matthioli.

mentis & effectibus prodita essent, vt lecta, non explorata, subdunt. Plinianum non esse idem inficiari eius interest, qui non meminit, pleraque omnia in stirpium historia illum accepta ferre Theophrasto. Ecquid loci isti commento Pardalianche relicto, dicent consulissimam & stirpium exploratores indefessi Italorum doctissimi, qui nullum visum sibi visum, vel auditione cognitum, plerique omnes nobis asserbant, querebanturque ea spe frustra se lustrasse penè quantum est Alpium & cautiorem, nemorum & mortuum, perpetuo illo dorso à Lemano Clauennam, indeque ad Veronæ Baldique denexa, nusquam tamen comparuisse. Nostri ita interim Doronici plurimum diuersis locis obuium habuisse: eoque nobis tamentum inuicis suadebant istum Senensem Commentatorem, cui imposuisset hæc leuiuscula, quam supra agnouimus, differentia, quasi vnâ quampiam nouam & sui generis sanxisse. Indicio esse, quoties curauit recudenda illa commenta, toties variatam Iconem: nec nisi vnâ miscellam, caule, floræque mutilam, semel chartæ mancipatam, tot vbique gentium vestigatoribus sedulis repertam fuisse. Historiæ fidem item temerariam audacia, vt qui nullo facto periculo (nec enim potuit) illic de creuerit Pardalianchen. Quo verò fastu, altu, & palpo magni nominis eruditus inculcet illud, *Palpare & videre*, quoniam Matthioli non scribit mendacia, se ridere & mirari: fore tamen iam, vt senior eoque moderator factus, fateatur se lapsum, luceatque Doronici, sibi notum antea, quod læste nefas, illi Esculapio Cortusio primum innotuit, & per illum mortalium generi sit receptum. Quod maleficium cum nostræ memoriæ pleniusque notum esse cœuissimum, & Cortusio in hortulo suo Patauii inter colloquendum respondissemus, id verum quidem esse, ceterum minime mirum: vt qui experimento certum haberemus, Aloë saluberrimâ interfici vulpes, easdemque eneas amygdalis amaris ex Plutarcho meminissimus, annuit ille Italice cuidam compatri suo Pharmacopœo, qui vulgatum exemplum de Nucce vomica subdidit, eâ nempe feles, canes, auresque interimi, quæ tamen tuò & magno commodo aduersus lethifera & Epidimicos morbos in Eleutheriis Liberantis, datur homini. Immo itò proinde Doronicum verbo diro dum infame facit, quàm multum sciret & parum saperet, perspicuum facit: Dæmones quippe felices vocari vel Monachi norunt, qui Cacodæmones haud atrociori conuicio incessunt, quàm ille Doronicum è republica Medicorum exigere ritur. Tantillam rem, tam valde vulgatam, captum superasse tanti Commentatoris, stupet vulgus, qui Philomelis, Alaudis, Hirundinibus, aliisque delicatioribus auiculis non solum non noceat, sed interdum ci-bus, sæpissimè remedium vnicum & panchraiston sit. Quam multis tu Principibus, nos pauperibus, Doronici ignoratione, exitio fuissimus, quâ tam stragem plus quingentis abhinc annis dedissent Medici, freti electuariis de Gemmis & aromatibus, & aliis Cordi amicis, quibus frequentissimè vsi sunt, tæque monere possunt, Doronico netantopere conuicieris, sed potius dosim metiaris; alioqui Croci, Moschi, similiaque dato quaternum drachmarum demensum homini, & comperies Dæmonium tuum. Quin thus etiam, multo quibusdam minore mole, meminimus perneciem atulisse. Tantæ expectationis Commentatoris intererat, saltem hæc postrema Com-

Pistum. Pardalianches fontium.

Pardalianches.

Cortusius ridetur.

In Doronico maleficium.

Aloe Eul-pib. Genena-fem. Amygd. amara. Nuc. Geminica.

Dira Mat-thioli.

Doronicum.

Thuris. commentum.

HISTORIAE PLANTARVM.

ntariorum manu & mole, an Pardalianche eodem necaret modo, quo cetera Aconita, res: quippe si nominis etymon & senem omittum perpendas, videtur, aut sola (aut certe comite veneno) strangulatione, id patrare: quemadmodum Fungi, papposque excrementa Typhe & Cannarum, quæ belluis, præsertim ficiis & angustis meatibus nec ruminantibus, si cum esca pauca multum cõsertum vorarint, mortem mibuntur suffocando. Quin non semel audimus venatores afflictores, se frustra dedisse Nipellum, Helleborum, & alia toxica à feris statim vomitu reiecta: at ubi pauxillum Taxi addidissent, prorsum nullum animal euadere, quippe nauicare, sed euomere nihil. Pereunt igitur partim veneno, partim oculo spiritus, puta ad fauces tracheam & diaphragma: plerumque etiam euo nere bilem, mucum, cibum, veneni autem nihil, nisi ob ficiatatem, serd, ut perparum. Non igitur respiciemus nos Doronicum, sed veterum moderate: si non vt aromate, saltem liceat nobis vt Theriaca & antidoto quapiam: cuiusmodi instituisse vides in Elde gemens Melux, & aromaticum Eleotuario, celebres Medicos, quos temerè intertia & leleris reos facis. Sed hæc fultus paulo mox, in Paride & Nipelli muscis, non munitus tuis, quos multi equè cantu Herbarij, jatque te nò miris sagaces, nequiquam venati sunt. Iste descripte radi ex à nobis Aconita censita, vt omnes congeneres. sic sapore pendè eodem sunt, nempe ignauiore, subdulci, & emplastico. Quò magis adducitur, vt credamus Dioscoridis legitimum esse Aconitum, quippe assnt ille, oculorum scilicet remediis blandis, temperatiusque calore & crassiss nonnihil, emplastica, pauxilla adstrictione, digerente. Et hæc Lobel, quem mirari lubit, quid sibi velit cur prioribus vltima contraria scribat. An forte dum acriter nimis in Matth. inuclitur sui ipsius oblitus fuit: Is in obseru. pap. 570. & Icon. plant. 648. triplicis sui Aconiti differentia imagines exhibet sub his titulis. 1. Doronicum minus officinarum, hoc pingit longo folio, de quo specialis infra. 2. Doronicum brachiata radice cancri, forcupularum ritu. 3. Doronici tertij varietas: Aconitum Pardalianches Dodonæi.

Taxi nocu-
mentum.

Doronicum
m. 14. 14. 14.
dum

Exculatur
describit.

Aconita.

Lobel. re-
preh.

Doronic
differentia
Casp.

Aconitum
eur indicat-
tum
Mamiras
Pauli
Helenium
Pliny.

Casparinus Doronica differte scribit pro crassitie & longitudine radicum, & foliorum asperitate, ac latitudine, paucisque alijs, adferri & inter merces peregrinas ex Oriente radiculam eandem, in antidotis expgitam: Hoc ob similitudinem radice cum cauda Scorpionis iudicatum esse Aconitum pardalianche, facto experimento: Esse præterea qui, Doronicum Mamiras esse putent apud Pauli. Is autè Plinij Helenium iudicat. H. Lugd. p. 735. Somnium Matthioli pingit sine floribus. In appendice verò p. 16. Aconitum Pardalianches primum vocat, & iconi, quam prius propoluerat adpingit ramulum foliorum floribus onustum, de quo ait. Præcessit inter Aconitorum genera Pardalianchis figura, qualem Matth. exhibuit, verissima, & certissima, quamvis falsam ac commentitiam esse quidam existimant, sed multa radice tantum picta cum folijs. Ego integram nactus à Sephariario Treuorensi, in cuius orto plantæ aliquot multis iam annis viuunt, & vigent. controuersiam pertinaciorum de hoc Aconito, quod his oculis conspexi, iactatam inter Gesnerum ac Matthiolum, vt diuinam, Matthiolo fidem suam, quæ labare videbatur, asserui, & plantam ostendi, minimè decuitam, &c. Manifesto autem errore contraria scribit.

Radix, aitin vno loco, prorsus ea specie est, quam Matthiolum delineauit ac expressit: in altero dicit, figura Pardalianchis, qualem Matthiolum exhibuit, verissima & certissima, sed mutila cum folijs & radice picta: verissimam perhibet figuram Matthioli, sed mutilam cum folijs radicem agnoscit: ficcine patrocinator Matthioli? Labat certe fides Matthioli ac etiam Lugdunensis.

C. Bauh. Phyt. est Aconitum 3. quod se nunquam vidisse scribit.

Historia insuper præter falsas has duas & commentitias imagines, quatuor adhuc figuras habet tres quidem p. 1737. quarum primam inscripsit Doronicum Romanum, Aconitum Pardalianches antiquorum Dodonæi [Clusii ad Dod. gall. p. 583. teste C. Bauh. cui est Doronicum s. siue radice Scorpionis] Alteram, Aconitum Pardalianches minus Matthioli (C. Bauh. phyt. hoc cum præcedenti idem facit) Terram, Aconitum Pardalianches Plinii [Aconitum 5. Casp. Bauh.] Quattam, Aconitum Pardalianches Theophrasti ex Matthiolo. Est & hoc 4. C. Bauh. in. Sed cur separat C. Bauh. Phyt. suum Doronicum s. siue radice Scorpionis ab Aconito suo 3. 4. & 5. quod non fecit Matthiolum.

Figura 4.
H. Lugd.

Acon Pard-
minus
Acon Pard-
Pung.
de. Pard.
Theoph.
C. Bauh.
mor.

Tabern. Icon. & Hist. Doronicum primum. Monachi in Mesuem describunt Doronicum & dicunt Ianuensem & Luminare maius loqui sub nomine Doronici de Trasi. Doronicis non rectè, aliqui [Clasius Doronicum 4. facit] ad numerant inquit G. Thierus, Calchum alpinum. Est cur nobis Alisma Matthioli, de quo post Doronicum.

Trasi.
Calcha al-
pinæ
Alisma
Matthioli.

Gaudet montibus vmbrosis, inquit Lobelius Inueni autem ego spontaneum in mor te Appennino inter Bononiam & Florentiam, & Bononiæ florentem vidit in orto mense Aprilis: inter Comum videri Italæ & Mundris. Ferrariæ in orto Monasterij S. Dominici à l'Angeli. Portaui cum paucis rotundis folijs virens mense Ianuario, in orto Di. Cortusij, & mense Martio florem protrudens in orto Di. Truciani: vidi missum Neapoli D. Guilandino. Florentie in orto Nicolai Ferrariensis mense Aprilis defloruerat: Bernæ, Basileæ in orto Di. Dis Felicis Plateri. Lugduni habebam in orto vti & alij, florebat mense Maio & Iunio, flore in pappo euanescente succedit semen paruum, nigrum, striatum, Montebelgardii in orto Ill. C. VV. mihi etiam egregiè provenit florens Aprilis & Maio.

Disputatur hodie vt dictum antè, an sit Doronicum venenatum, quod de nostro alii affirmare nolunt, & in Antidotariis id admittunt, alii verò reiciunt. Admittunt hoc Bononienses in suo Antidotario. Admittit & Iulius Alexandrinus, nec à compositionib. auferri vult, ne, inquit, ablato eo medicamento compositio tota pereat, formaque claudicat.

Vires

In Germanica Mattholi editione ad inflationes corporis, præsertim vteri, commendantur Doronici radices. Lumbricos necant & expellunt, intestinorum obstructions reserant, viinam prouocant, faciunt contra cordis palpitationem, syncope correptos reuocant, venenis aduersantur, in theriacam adduntur: eadem in puluerem trita, & cum confusis scibus mistæ venenum iaculantium virus domant impostitæ. Has radices sapius Iohannes de Voedè Rhizotomus, teste Lobelio, sine noxa ullòne percepto incommode impunè deuorauit vt & Gesn. quamvis canibus perniciosam prodantur.

Vterus.
Lumbrici
Obstruc-
tiones
Vena
Puluer
Radices s-
ne noxa de-
uorant.

Cæterum

*Math. no-
tat.* Caterum mirari subit Matthiolum cur Doronici vsum in Hist. germ. approbet, qui antea in comm. eum penitus damnaverat, ita scribens. Doronicum inter Aconita esse recensendum, me primum admonuit Cortusius quod certò sciret, factò à se pluries periculo, extingui faciliè canes, qui horum radices deuorant. Vix ego id credere poteram, sed interim datis cuidam meo cani vulgarij Doronicorum quaternis drachmis, crudis carnibus occultatis, is post septimam horam obiit. Sed id mirum profectò mihi fuit, quod ipsemet canis toto illo tempore, quo superuixit alacer, lætus, ac hilaris semper fuit, nihilque symptomatis passus est, imò quod maius dici potest, quadam cum domesticà canicula pluries venenem exercuit, & conantibus nobis audissimè comedit. Quo factum est, vt ego profectò crediderem, me hoc factò periculo frustratum iri. Atqui paulò post præter omnium nostrum sententiam, is repente admodum, ac si morbo comitiali percussus esset, totus in terram cecidit, vbi horrendo spasmo correptus, spumanti ore paulò post conuulsus interiit. Cortusio itaque nobilissimo, hoc amplissimum munus futura posteritas acceptum referat, ipsumque nouum vitæ nostræ custodem appellitet. Huic Nymphae violas, & Lilia fundant: hunc suauissimis vestiant rosas, & Baccharum cingant. Ac interim desinant Medici, quibus hominum vita cordi est, exitioso, & perneccabili Doronico vti. Expellant & illum Pharmacopœi suis à Myropolis, & interdican pii, & optimi principes, qui Rempublicam gubernant, ne posthac venenum hoc præsentissimum veneat. O quam misera sunt eorum conditio, qui superiori ætate nos præcellerunt, quorum ferè nemo simplicia medicamenta rectè nouit, quique sæpe venenosæ auxiliis vsi sunt, vbi saluberrimis antidotis vti putant. Erit itaque Doronicum posthac Dæmonicum, non Doronicum appellandum, quod Diabolus in huius locum Thelyphoni genus hoc intrulerit. Hinc autem fit, vt ego errorem quoque meum iam agnoscam, quod noluerim Maranthæ concedere. Doronicum vulgaris vsus esse Aconitum Pardalianchen, cùm viderem id innocuè sumi in medicamentis ab hominibus: verum non ob id fieri putò, quod canibus sit venenum, homini verò salubre medicamentum, vt quidam mihi respondent, quibus cùm de huiusce Doronici exitiali facultate sum locutus: sed quòd non tanta quantitas propinetur à Medicis, quàm homines necare valeat, aut quòd rarò exhiberi soleat absque aliis antidotis, quæ venenolam eius vim dissipant, & extingunt. Nam quæ canes occidunt, & lupos, facile adducor, vt credam, eadem homines quoque necare: vt de vomica nuce ego faten possum, quippe qui sciam hac tantum mulierem iam senescentem esse extinctam, quæ casum è quo sibi cibum parauerat super instrumento ferreo ab hoc parato attriuerat, super quo eius filius superioribus diebus Nuces vomicas aliquot in particulas confecerat, quibusdam necandis canibus, qui eum nocte obtrabant.

*Doronicus
ejus dam-
natur.
Ex- mplum
extincti
canis.*

Admonitio.

*Deploratio
prioris se-
culi.*

*Dæmonicum
Thelyphoni
Error Mat-
th.*

Caterum, malum ego cùm Auic. Fuchsi. Coll. Florentino, Gesn. Camer. hort. & alius pro Doronico Garyophyllorum dimidium substituere: Aut Rutam, aut Aristolochiam, quàm Doronicum nostrum pro Veterum Düringi vsurpari. Tractatus quid pro quo; Zurumbet æquali pondere, aut duas tertias de Garyophyllis pro Doronicis accipit. Sed & Bononienses in Antjd. par pondus Zedoariæ Doronici loco sumunt. Idem Tom. III.

*Substitutæ
Garyophylli
Rutæ. Ari-
stolochiæ.*

Zurumbet

Zedoaria

quoque cum Gesn. & Adolpho Occone Galan-
gam substituunt. Caueant autem sibi Medici
& Pharmacopœi ne cum Math. in comp. pro
Doronico Antoram siue Antutoram, Aconitum
pro Aconito sumant.

DORONICVM FOLIO SVBROTVNDIO ferrato.

Caulem habet aliquando cubitalem, rosum-
dum, striatum, viridem, intus concauum, ca-
pitulum in summo caule magnum, ex multis
stipulis luteis concauis, & quinque crenis diuisis
congestum, quod ab alis longiusculis & in extre-
mo crenatis foliis, fulgore auri splendentibus



saporis actis & amari: radix ex viriditate candi-
cans, minimum digitum crassa, geniculata, & qua-
si squamata, internodiisque distincta; sed nodis
sursum tendentibus, non infernè, ex inferiore
geniculorum parte longas agens fibras albas sa-
tis crassas, & propagines in lateribus, gustu ferè
succei è glycyrrhizæ radice expressi & densati.

Clus. Pann. p. 518. Doronicum Austriacum 2. si-
ne icone, cui in Hist. post. iconem addit, & Doro-
nicum 3. Austriacum 2. inferibit. C. Bauh. Phyt.
Doronicum 4. siue latifolium ferratum.

Inuenitur in Ettscher, Dutrenstein, & quibus-
dam aliis Austriacarum; Stytiacarumque Alpium
ingis, inter saxa. Floret Iulij initio, aut etiam se-
ptuaginta, in hortos verò translatus, vbi non diu per-
manet, Maio plerumque.

Hoc vnà cum Doronico maximo venatores, Vites
pastoralesque montani, qui Rupicaprarum radi-
cem appellant, aduersus vertigines non minus
commendant, quàm Auriculæ Vrsi flauo flore
radicem; viribusque firmandis adprimè vtilem
esse ferunt.

DORONICVM FOLIO LATO, FLORE magno,

Humilius est plerumque iam dicto hoc Do-
ronicum, & capite floris maiore, foliis à pe-
diculo statim parè orbiculatis, vt in Cyclamino
alioqui superiori non dissimilibus: radicem item
nodi & propagines neque in hoc, vt nec in præ-
cedenti, deorsum tendunt (nodi autem in hoc
C

Descriptio

C

HISTORIAE PLANTARVM.



Synon.
Doronic. latif.
fol. flore
magno.

Locus

Nascitur Veitzalpen supra Neuberg in Stitia, & eodemquo præcedens tempore floret.

DORONICVM MAXIMVM FOLII hyosciami Peruani modo cau- lem amplectentibus.

Descriptio



pediculo nullo; sed instar foliorum Peruani Hyosciami latifolij, Tabacum mains vulgè vocati, caulem latiore basi amplectenti, viridia, hirsuta: flores extremis alarum ramulis insident magni, vicenis aut tricenis oblongis foliis, & orbem satis latum ambientibus constantes, lutei coloris, odoris expertes: semen ut aliorum Doronici generum, striatum; virentis tamen coloris, quod cum suo pappo, auræ leni flatu defluit, initium ab exteriori ambitu faciens, quemadmodum & in reliquis Doronici generibus: radix ex viridi candidans, nodosa, squillulæ similis est: sed ubi propaginis aucta est, crassior fit, & ex multis veluti corporibus in vnicum conflat, & coalescit.

Synon.

Clus. descriptionis auctori, est in Pannon. p. 523. Doronicum 5. siue Austriacum maximum.

minus apparentes aut anfarum instar longè à matre sese spargunt; sed quasi matri contiguae sursum tendunt & extra terram folia promittentes, fibris in tellure sese firmant.

Clus. Pann. p. 520. Doronicum Austriacum. Item pag. 521. Doronicum 3. Hist. post. Doronicum 4: Scitacum. C. Bauh. Phyt. Doronicum 5. siue latifolium alterum flore magno.

Hist. post. Doronicum 7. Austriacum, 3. C. Bauh. Phyt. Doronicum siue maximum foliis caulem amplectentibus.

Secundum riuos è montibus labentes, locis vmbrosis in descensu iugi Vvechsfel primum obseruabam [inquit Clusius] vnde in hortum translatum mihi egregiè propagatum fuit: sed postea longè maiore copiâ, decliuibus, siluosis tamen, locis Escheri & Herrenalben inueniebam Augusto flores proferens, cum in Vvechsfel floret lunij initio. In hortis cultum Maio flores dat, veluti & in montanis siluis ultra Drauum, Pannoniâ interamni, ubi anno 1579. frequentissimum etiam obseruabam: semen in hortis Iunio matuum.

Locus

Tempus

DORONICVM GRAFFOY dictum.

Radix rugosa, tuberibus hinc inde inæqualis, Polypodij radicem crassitudine, longis perplexisque fibris donata, quæ in sicca ligularum instar plantæ nonnihil conspiciuntur, sapore insigniter dulci: talis est Graffoy radix sicca, quæ eo nomine delata viridis & plantata, produxit pediculis hærentia folia crassiusculis, aut nullis aut raripilis donatis, sui similibus vbique, nec foliosa appendice Doronici vulgaris modo auctis: ita quoque & folia atro-virentia, rugosa, duriora, minùsque hirsuta quàm Doronici vulgati, sensim in acumen desinentia, obiter per margines sinuata.

Descriptio

Basileæ in officinis prostat nomine Graffoy ut in Officina Egredi Pharmacopœi Io. Heitzman: qui viridem allatam radicem ex Alpibus Valesianis plantauit in ollam: ea verò translata in hortum Martio incipiebat caulem & florem deponere.

Quidam vulgares comedendam suadent ad vertiginem, quam verè nescio, mihi sapor satis nauosus quamvis dulcis, qui fortè subuertendo ventriculum ingrata dulcedine potius fortè vertiginem excitaret.

Vires

DORONICVM FOLIO FERE plantaginis oblongo.



Herant teneri, pusilli: folia mollicella, oblonga, uti plantaginis: nonnihil ex viridi fluorescentia, conspicuè hirsuta, Pilosellæ modo, vel Cucumeris agrestis, sed atretanti læuia, ambitu rotundo, sed nonnihil lacinioso & superne angustato, Cucumeri agrestis, quàm Cyclaminis similiorè, terna vel quaterna:

Descriptio

quaterna: pediculis innatis radici exigua, tereti, orbiculata, sed infernè in angustum sensim adducta, subtus & transuersa quasi squamularum torulis articulata, apprimè scorpionis cadaver & caudicellam exprimentis, plusculis donata fibris: color candidus, sapor dulcis, amaricatus, & lentorem multum pauxilla coniunctum attractioni præfert: sesquipalmum altus caulis floribus in summo donatur luteolis, aut pallidis, radiatis, Buphtalmi, aut Mediæ Consolidæ.

Synonyma

Lobel. Adu. descriptionis authori dicitur Doronici planta, Doronico vulgatori & minori proflus eadem. Obs. p. 370. & Ic. Plant. p. 648. Doronicum minus Officinarum.

Clus. Pann. p. 517. & Hist. post. lib. 4. p. 16. Doronicum angustifolium, Doronicum Lobelii primum, longiore folio, ad Plantaginis folium quodammodo accedente.

C. Bauh. Phyt. Doronicum 2. siue Plantaginis folio.

Locus

Frequens hæc nunc in hortis Belgicis & Anglis. Burdigalâ delatam etiam habuit Clusius.

DORONICI SPECIES EX HORTO

Ferrariensi folio longo hirsuto.

Descriptio



Hæc à Clusio, cuius figuram propono, ni fallor, ita describitur. Eorum Doronici generum, quæ in Austriacis, Senniciisque iugis à me observata, primû caule est breui, pedali ducunt, molli, hirsuto, striato: folia illi rara, parua, crassa, longiuscula, supinâ parte admodum viridia, & quodammodo splendens, omnino

tamen villosa, pronâ autem lauiâ, dilutius virentia, atque caulem ambiunt, angustiora sunt, omnia potè peracris saporis: summo caule vnicum plerumque fert florem Tertio Lobeliano similem, sed magis aureum, quo evanescente, succedit exiguum semen nigricans, lanugine & pappo coronatum quod leui aura excutitur, & venti arbitrio fertur: radix parua, geniculata, & internodiis distincta, nigricans, crassioribus candidioribus aliquot fibris donata, gustu aromatico.

Clus. Pann. p. 517. Doronicum 1. siue minus. Hist. post. Doronicum 2. Austriacum 1.

C. Bauh. Phyt. Doronicum 3. siue longifolium hirsutum.

Locus

Primum suum Doronicum Clusius observabat in Sneberg, deinde in Snealben & Neuberger: nusquam verò maiori copia quam in summo Etscheri iugo, inter saxa, tenui, nigraque terra leuiter tecta. Floret Iulio, nonnunquam etiam Augusto, quo mense semen subinde maturitatem consequitur.

Tom. III.

Doronicum folio longo serrato.

Mollicellâ lanugine & colore ex viridi flavescente cum Doronico vulgari conueniunt folia, figurâ tamen alia, utpote longa, parum lata, vnciam circiter, & in ambitu serrata: reliqua petenda ex descriptione Doronici folio rotundo.

Descriptio

Reperi in Rhætia florens mense Iulio.

DORONICVM GERMANICVM FOLIIS

semper ex aduerso nascentibus, villosis.



Terna aut Descriptio

quaterna, autore Clusio, summa cellule fundit filia, Plantaginis latifolia: ferè æqualia, longiora tamè, & ad Digitalis, luteum seu pallidum florem ferentis foliorum similitudinem magis accedentia, nervis distincta, mollia, viridia, supernè nonnihil villosa, infernè candidiora & leuiorabina semper ex aduerso

nascentia, gustu nonnihil amaro, & acri: caulem habet ferè cubitalem, nudum, rotundum, hirsutum, qui superiore parte in paucos ramulos diffusus, calicem sustinet hirsutum, ex quo magnus emergit orbis multis flosculis luteis in quatuor foliola diuisis, constans: eum orbem ambiunt quindena, aut plura folia, Doronico latifolio similia, latiuscula, & per extremum crenata, coloris flui elegantis: semen floribus succedens, ut in Doronici generibus, in pappum evanescit: radix minimi digiti crassitudinem pæne æquat, nodis quibusdam informibus distincta, multique fibris donata, lateribus propagines fundens, & singulis annis noua germina proferens.

Clus. Hist. post. Doronicum 5. Germanicum; Doron. Germ. Pannon. p. 520. Doronicum Austriacum 4. quoad descriptionem: descriptio enim ibi sine icone. Figura namque quæ inibi proponitur caret descriptione, estque Doronici illius, quod folio subrotundo serrato inscripsimus, itque Hist. post. Doronicum tertium, Austriacum verò secundum cognominat.

In omnibus ferè pratis sublimioribus ad Alpium radices, tum in ipsis Alpibus, Austriacis sitis frequens est: præsertim verò in Weichsel, ad cuius radices Maio florebat, in ipso autem iugo quâ Septentrionem, & Orientem spectat, ferè. Ernebam (inquit Clusius) etiam his proximis annis in cædus syluis ad Mœnum amnem sitis, circiter mille passus infra urbem Francofurtam ad sinistram. Memini etiam in montanis Belgicæ cædus syluis erutam, ad nos Machliniam aliquando adferri, Damasceni appellatione.

Locus & tempus

C. 2

ALISMA MATTHIOLI SIVE
Plantago montana.

Descriptio



Obliquam agit radicem & veluti reptatē, rufam, quæ ex triūverfo multas longas fibras demittit, radicem Heliebori nigri æmulas, rariores, tenuiores, sapore acri aromatico & grato: folia crassiuscula per terram sparguntur plantaginis more, quatuor, quinque, sex, vel septem, alia

vinciam longa, aut paulò plùs, plantaginis foliorum æmula, alia palmum, vncià latiora, leuiter in acumen definitia, Digitalis luteæ ferè formâ, hirsuta, nervis secundum longitudinem donata, non tamen omnibus à pediculo vsque deductis, sed ex medio nervo oblique nonnihil & in arcum exporredit: *caulis* vt plurimum singularis inter hæc surgit, Doronico similis, cauis, hirsutus, cubito minor, nonnunquam maior, vnâ aut alterâ oppositorum foliorum acutorum, multò inferioribus minorum, coniugatione donatus: summo fastigio *florem* gestans vnicum. Doronici similem ferè, formâ & odore, maiorem tamen, totum luteum, foliis stellatis Calendulæ discum luteum in pappum facientem obvallantibus, & calyce foliolo viridi, hirsuto: *semen* pappo cristatum, longum, striatum, hirsutum, compressum, acre, odoratum, à Doronici feminibus multum differt: est vbi & caulis in ramos diducitur, quorum singuli flores singulos sustinent.

Matth. lat.
p/ur.

Fallitur Matthiolus existimans hanc plantam omnibus notis Alisma Dioscoridis repræsentare: ita vt non dubitet asserere eam esse legitimum Alisma: eius quidem effigiem exhiberet, si flos non esset luteus, nec montes inhabitaret, sed aquosos, vt Dioscorides de suo Alismate scribit, amaret tractus. Descriptio quam Matth. suo Alismati accomodat, est Plantaginis aquaticæ. Quam pinxit autor (inquit Camer. in Epit.) pro Alismate, non candidum, sed aureum gerit florem in hirsuto subrubentēque cauliculo, pedali, odore sternutamenta cientem, qui tandem in pappos abit. Hanc Boh. vocant *Augelsky kraut* / *Engelkraut*, Heluetij *Mutterwurz*, & plantaginem alpinam.

Pharmica
H. L.
Alisma al.
pinum.

Caltha al.
pina
Doronicum
mali.

In figura Matthioli & Dalechampij (qui eam Ptarmicæ nomine pingendam curavit, vt fusiùs dicitur) non erant omittendi nervi nec pili, quamvis interdum obscuris appareant. Geshero de hort. vti videtur, Alisma alpinum fortè nominari meretur, herba plantaginis foliis, flore Doronici, sternutamenta mouente. Idem hanc Caltham alpinam vocat, ac aliquos [Clusium teste Camer. in Hist. germ. Matth.] Doronici non rectè adnumerare scribit.

Lobel. in Aduers. pag. 133. hanc describit, vocatque Nardum Celticam alteram, ac ait Rondeletium Nardi Gallicæ speciem coniecasse. Idem alibi dicit Commentatorem fastiditis cæterorum iudicijs, mutat picturam indicat sufficisse pro Alismate, & nesciri eius plantæ sit. Nobis autem figura Aduersariorum non multum placet, quàm melior est Matthioli, quamvis non agnoscat suum Nardum pro Alismate Matthioli, sed hoc adaliam plantam referat. In observ. porro pag. 170. ipsi videtur Nardus Celtica altera, Caltha alpina Gesneri, plantago alpina quorundam.

Nardus
Celtica Aduers.
Nard. Gallica.
Adu. figura mala.

Dodon. lat. in fol. Chrysanthemum latifolium inscribit, ac Germ. waldblum vocat, atque esse qui Alisma Diosc. velint [idem eius opinionis fuit in Hist. de floribus] sed Chrysanthemum latifolium cuius appellandum quàm temerè Alismatis nomen ei tribuendum.

Plantago alpina
Chrysanth.
latifol. Dod.

Hæc planta est Doronicum quatum Clusio in Pann. Doronicum sextum Pannonicum in Hist. post. quod ipsi non dissimile videretur illi plantæ, quam Matthiolus pro Alismate exhibet.

Doron.
Clus.

Hort. Lus. Alisma Matthioli alpinum, Caltha alpina Gesneri, Engel tranck / laugen kraut / Mutterwurz / Schmere blumen / Plantago alpina, Damasonium quorundam.

Tabern. duas habet figuras vnius plantæ in Icon. & Hist. lib. 2. p. 410. 1. Damasonium Dioscoridis, Groß Lucienkraut. 2. Damalonium alterum.

C. Bauh. phyt. Alisma siue 2. folio hirsuto, flore luteo. Huius, inquit Plantæ, tres apud auctores extant figuræ. Quatum prima est Alismatis seu Damasonij nomine apud Matt. fol. lat. pag. 604. lib. 3. cap. 157. & icon. 4. pag. 606. qui folijs glabris vnicò nervo medium folium percurrente pingit. Hunc imitatus Lugd. pag. 1057. Damasonij Matthioli nomine ipsius figuram proponit: & etiam pag. 1069. Ptarmicæ nomine descripsit. Sic & pag. 924. Nardi Celticæ alterius Penæ nomine, ita vt vnius plantæ quatuor figuras duferas pinxerit. Secunda est Chrysanthemi Latifolij apud Dodonæum pag. 263. qui glabris quidem pingit foliis, sed nervis aliquot per folium latis: hunc imitatur Tabernamontanus Icon. pag. 738. Damasonij primi Dioscoridis nomine: & Lugdunensis pag. 1358. qui figuram Dodonæi nomine Chrysanthemi latifolij posuit. Tertia est Lobelij Icon. pag. 313. Nardi Celticæ alterius seu plantaginis alpinæ nomine: qui hirsuta & nervosa pinxit folia.

Huius plantæ tres figuræ apud auctores.
Alisma

H. Lugd. 4.
eiusdem plantæ figura.

Chrys. latifol.

Nardus
Celtica.

Doronicum 6. Pannonicum, quinto Germanico non valde dissimile, satis copiosè nascens Clusius inueniebat vicinis Nemethvyyvar arcibus aduaram siluarum decliuis, florens Maio. Plantago montana, vti mihi primò denominata est, in Rhætia circa Burmum reperta, vbi in montibus collegi mense Iunio anno 1561. in peregrinatione mea Rhætica cum Gesnero. Hæc planta à me etiam reperta est in Lotharingia monte Balon, florens adhuc Augusto cum semine maturo, maxima pars defloruerat: inde transfuli in Hortum E.C. Montem Belgardum, verum perit. Sicca mihi etiam allata per Doctissimum Medicum D. Petrum Turnerum Anglum caule multò maiori, in quo erant duo, tres, quatuorve flores, vt in Dotonico, fortè culta fuerat in horto.

Iocus & tempus

Nascam pecorum emendat, herba in puluerem redacta ac propinata. Potiunculæ ex huius Merique decocto parata vrinæ copiam cuiusdam dysuria laboranti exhibuit Lobelius.

Vires.
Nasced pecorum.
Dysuria.

TVSSILAGO ALPINA FOLIO
longo.

Descriptio.

Tussilago
alpina au-
rea Gesn.

Hellebori
fibras i-
mitatur quo-
dāmodo Tuf-
silaginis huius
Alpinæ radix
transversa, fi-
brofa, fapore
vt mihi videtur
nonnulli
aromatico: fu-
la crassa, quā-
dam palmo
longiora, par-
te inferiore
hirsuta, per
margines ter-
rata, multo
breuiora, la-
tioraque ado-
lescenti, quā
adultæ plantæ,

caules interdum cubitales, summum cacumen or-
nat flus magnus Doronici, vel Calthæ aut Plantæ-
ginis Alpinæ Iohannis Fabricii (a qua tamen dif-
fert) aliquando duos tandem in pappum abeun-
tes.

Gesn. in annot. propria manu ad plantam scrip-
ta, Tussilaginis species alpina, quā a flus o-
lore auream cognominat. An Aster montanus
luteus de quo H. Lugd. p. 334.

C. Bauh. Phyt. Tussilago 3. siue alpina folio o-
blongo, à Fratre Io. Bauhino accepta.

Locus &
tempus.

Hanc plantam primò obseruauimus in horto
Gefneri cū ei conuiueremus anno 1560. post in
nostra peregrinatione per Alpes Rheticas in
prealto monte Braulio & Albulæ florentem Iulio,
tandem in Sabaudico monte altissimo Thuiri di-
cto, aliquot milibus à Geneua, vb. etiam flore-
bat menfe Iulio.

CONSOLIDA AVREA NEMORVM,
limoni folio, non Alisma
montanum.

Locus &
tempus.

In Atræiæ Gallicæ syluosis densissimis quæ no-
stro H. Morgano perelegans floruit hoc menfe
Iunio Londini, radiatis multis in ambitu foliolis,
Nardi Montanæ, aut Doronici florem & colorē
simile habentib⁹, foliolis est inquit Lob. & Pen.
in Adu. Inigræ Betæ, aut potius Limoni, atritis vi-
rentibus, carnosiss, aliquantū hirsutis, crassiss,
venosis, Doreæ similibus, amplexis pedales
Doronici cauliculis binos aut ternos: floribus
radiatis Doronici, aut Calendulæ, & conco-
loribus, scitè pestinatim confertis, & com-
missis foliolis, antequam pandantur, ele-
ganti spectaculo: radice nullius filamentis al-
bidis sparsa in cespitem summum, Bellidis
modo: sapore Mediæ Consolidæ, tantū acrimoniæ
prodentis, aut Herbæ Doreæ, cuius etiam vites &
quandam aromaticitatem æmulatur.

Tom. III.



Alismate Matthioli conuenit: nondum tamen
vidi.

CYANVS.
CAP. III.

Hæc def. C. B. &
criptio habet
multa [non
omnia, vt
C. Bauh. sen-
tire videtur]
quæ conue-
niunt Tussi-
lagini nostræ
Alpinæ longi-
foliæ. Alisma
tertium [inquit
idem C. Bauh.
Phyt.] siue A-
lismati affinis
Doreæ foliis,
consolida au-
rea nemorum,
Limonii folio
Aduers. p. 125.
Icon. Plant.
pag. 29. cum
nondum tamen

Alismati
affinis De-
ruefol C. B.

DE cyanō
flore, non
lapide nobis
sermo est. Is
igitur ligno-
saria habet,
multisque fi-
bris capillatam
radicem vbi
excreuit: vn-
de caules plu-
res surgunt
cubitum & ses-
quicubitum al-
tis angulosis, ca-
li, lanugine
incani, in ra-
mos diuisi: fo-
lia infima,
Lob. acutis la-
cinis sinuata,
Scabiosa aut
Dentis Leonis
more, alia lon-
ga, culmum la-
ta, per longitu-
dinem heruo-
sa, cassia, albi-
cantiaue, flores
ex capitulis
squammatis
compactis se
explicant cor-
niculis lacinia-
tis constantes,
colore com-
muniter ceru-
leo, & vt no-
men loquitur
cyaneo: alias
albo, alias pu-
niceo Gesn.
crebris in me-
3

Potentilla
Floris; can-
ciliatur co-
lor saccha-
re.

Echylisma
amygdali-
num.

Flora
Succus fo-
lorum, aut
pulvis.
Aphtha.
Cafus.
Morb. re-
gus.
Verus
Mania
Facultas
Cecubosa.

Ischuria

Dentitis
Erysipelas

dunt. Matthiolus flores Cyani cum feminibus in vino coctos, contra aranearum & Scorpio- num puncturas exhibet: floribus eius concilia- tur color elegans Saccharo, cuius usus omni va- cat periculo. Flores Cyani probè cum aqua tun- duntur, quæ per densum deinde linteum trans- mittitur: hac aqua si extrahatur ecchylisma A- mygdalinum, pulchro colore cæruleo placebit, magisque si in candidis patinis inferatur mensæ, inperis passulis Corinthiacis, sine sale: ad pu- trida vlcera valent florum Cyani contusorum succus instillatus, aut pulvis aridorum inperisus: idem succus ad aphthas confert & putrida oris vlcera collutione. Præcipitatis ab alto; & san- guinem spuentibus, propinquant Cyani maioris flores ex aqua Plantaginis. Camerario florum assumptus pulvis efficax est contra morbum re- gum. Italice mulieres ad præfocationem vte- rinam, suffitu ex floribus Cyani vtuntur. Io. Wittichius vtitur floribus Cyani ad febrem Epi- demiam cum mania. Condrellis & Scabiosis con- generem, affinisque facultates & temperiem Cyano inesse crediderunt Atai nostri [inquit Lobel. eoque non tanta infelicitate Sympo è Ci- chorio Guillelmi Placentini ad æstus viscerem & iccoris immiscere soliti: Astringendo, siccando- que plantaginis ritu refrigerant flores. Conta- giosis febribus, ruptis, vullis que auxiliantur. V- tuntur Cyani floris decocto aliqui in palpitatio- ne cordis. In Saxonia eius manipulum in cere- uisia cum butyro coquant & exhibent in ischero & ischuria. Cum aqua florum destillata extra- hatur succus ex canero viuo contuso & eo gingi- uæ puerorum in dentitione illinuntur. Pulvis florum vnâ cum capitibus puluerisatis, exsiccatis prius, erysipelati vultu inpergitur.

CYANUS ALPINUS RADICE perpetua.

Descriptio



proximum vsque folium tempe cum caule con- tinuatis: capitula squammata flores sustinent Cyani vulgaris, sed longè maiores, simbratos, & è cæruleo purpurascentes, nonnunquam & albos, corniculis circiter vncialibus purpurascentibus, quo etiam colore prædita sunt flamina, apicibus tamen cinereis.

Verbascula
Tragi.

Tragus hunc Cyanum inter Verbasci genera 4. loco recenset, Verbasculumque inscribit, sed

Numerosis
fibris &
mediocriter
crassis in vnam
radicem coeun-
tibus viuacem
& perennem,
ingrato sapo-
re, figitur: cu-
bitales & al-
tiores caules
sunt gens lanu-
gine multâ vil-
losos, argulo-
sos, quibus ad-
nascuntur folia
Lychnidis co-
ronatæ, lon-
giora, latiora,
lanuginosa,
mollia, alis la-
tiusculis ad

quâ ratione non video. Is ait à Dioscoride Ly- chnitidem, Lucernare, & Tryallida nominari. Alt Thryallis, vt Dodon. testatur, flore rubet, cum tamen Tragus suo Verbasculo cæruleum attri- bat. Cyanum siluestrem, inquit præterea, Germa- nicè wald forn blum appello, quoad commodius emer- gat nomen.

Dicitur hæc plâta Matth. in suis comm. qui tan- tum pingit. Dod. gall. & Lat. in fol. Lob. Obl. p. 296. & Icon. Plat. 548. Galt. H. Lugd. p. 347. Camer. in Hist. Matth. germ. & Epit. & hort. Cyan. maior. Lobel. Advers. p. 236. Cyan. maior hortensis. Lo- nic. wald forn blum/ cyanus silu. verbasci spe- cies siluatica. Tabern. cyanus montanus. Gesn. Cyan. hort. cyanus exoticus Reichio, cyanus montanus vel siluaticus. Czfalp. cyanus flore grandi. C. Bauh. Phyt. cyanus s. siue montanus latifo- lius, vel Verbasculum cynoides.

An præterea Matth. in prior. comm. in Diosc. lib. 4. c. 10. Pilosellæ genus, flore cyani simili- tudine; maiore tamen, foliis Echii: Hanc Pilosellam in post. comm. cum mag. fig. vt imaginariam non meminit.

Cyanum montanum siue alpinum ex monti- bus in hortum transfusi Genevæ. Basileæ cum essem inueni in monte wasserfal/ nec non in in hortis florentem Iunio & Octobri obseruavi. Montbelgardum attuli ex montibus circa Mon- ioye, in hortum meum, vbi hilariter prouenit, mi- réque serpit, florens adhuc Octobri, quemad- modum etiam transplantatum in Horto z. c. Bononiæ in horto ad S. Saluatorem aliquando vidi.

Huiusce plantæ vires, nullus Antiquorum; Vires quod Matthiolus sciuit; scriptis mandauit: non desunt tamen Recentiores, qui putent cyanum propria dote pestilentibus morbis, aduersari: maioris pulvis datur vtiliter ab alto de uolutis, & sanguinem reicientibus, ex aqua Plantaginis; aut Portulacæ, aut maioris Symphyti, aut Equistii: succus illitus recentia vlcera glutinat, & oris vlcera sanat.

SERRATVLA.



Qvam Ser. Descriptio
ratulam
vocamus à
Betonica dif-
fert. Hæc au-
tem caule re-
cto, rigido,
striato, glabro,
rubente, ad cu-
bitos duos at-
collitur, qui cis
summitatem
in ramos mul-
tos finditur:
folia, aliis inte-
gra, Betonice
paria, aliis Sca-
biofæ instar la-
ciniata, vtram-
que atroui-
rentia, hirsuta,
arguta, spinu-
la.

lastrum mitium agmine serrata: capitula crebra extremis furculis insident, oblonga squarrosa, atrorubentia, è quibus flores emicant, laceæ nigra, purpurei siue carnei coloris: radices è crebris

H. Lugd. 1577.
p. 1068.

Fach.

T. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.

Tacea avo-
matica aut
euryphyll-
ata
Serrathia.

H. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1.
Locus.

Vites
Ruptura.
Vlcera.
Hamorrhoi-
des.

Enterocela.

fibris parvis componuntur, sapore subamaro, tandem & eo quem Cyanus manu exhibet.

H. Lugd. p. 1068. Iacea rubra maior laciniosa. Item p. 1377. Serratura. Duæ figuræ & descriptiones vniuers plantæ.

Quod C. Bauh. in suis in Hist. animaduersionibus non obliuiscit, sed ipsemet eadem eodem errore lapsus est, tradens bis eandem plantam.

Tabern. tres habet icones, Serraturæ tinctoriæ: 1. 2. 3. 4. Scharten fräuter / ferber scharten. Verum mihi videntur lusus naturæ, nec diuersarum plantarum icones. Is porro Iaceam aromaticam, & Iaceam Caryophyllatam cognominat, propter odorem quo prædita est radix, Boh. Euphr.

Serratura, à foliis minutim circumquaque serratis, nomen habet. Serratura dicitur Matth. passim in suis in Dioscor. comm. Dodon. lat. in fol. Lob. Adv. p. 231. Obs. p. 287. Ic. plant. p. 334. Cast. Camer. ad Hist. germ. & Epit. Matth. item de hortis. Clus. Serratura Matthioli. Thal. Centauroides aut Centaurium maius siluestre Germanicum. An Solidago Sarraceni Lonicero. An Calsp. lib. 13. cap. 53. Cerretta, seu Serretta ab insectoribus lanarum appellata, quæ herba lanaria dici possit.

Nulquam non occurrat, autore Clusio, in siluis cum Pannoniæ tum Austriæ, atque etiam in plurimis vdis pratis siluis contiguus: frequens in Francofurtensi agro. In siluosis etiam Bohemæ pratis nasci scripsit Matthioli. Pena etiam in nemorosis & decliuibus Pedemontis & Septentrionalium Nortmanniæ & Angliæ. Serraturam collegi Tubingæ, præceptor meus D. Fuchsius in com. scriptis vocabat Scabiosa 8. genus. Geneuæ repertum. Dom. Dalechampius vocabat Iaceam rubram maiorem. Montbelgardi habeo in Horto E. C. primo anno caulem protulit.

Datur villiter, autore Matthioli, potanda ex albo meraco ruptis, & ab alto deuolutis: idem præstat radix puluiscata, & zi. pondere in vino calide potata in vino decocta, ac deinde illita, vlcera misericè mundat, carne replet, & cicatrice obducit: hæc morrhoidum quoque dolores mulcet fori adhibita: folia, & radix simul contusa & imposita vulnera & enterocelas sanare creduntur. Serraturam calidam & siccam in secundo gradu statuit Tabern. qui radicem ad vsum medicum colligendam præcipit, quamprimum folia protuberent.

CYANVS PVLCRVS SEMINE centaurij maioris.

Descriptio

Cultura proficit hæc herba, si qua alia plurimum: spontaneæ caule vix palmaris sæpe singularis: in hortis bicubitalis & multis ramis brachiatus, firmus, striatus, medullâ albâ donatus: folia priora duo orbiculata, alia quæ sequuntur longa vncias duas vel tres, laciniosa, quæ veluti crispantur, nonnihil hirsuta, superiora in lacinias insigniter tenues diuiduntur: extremis ramulis insident capitula parua oblonga, squamis raris sed longis, purpurascens, laciniosis, imbricata: florem ferentia stamineum purpurascens: semina Centaurij maioris, minoris, nitido laudore lubrica, infernè nigricantia. Zozia alba circa partem superiorem cincta, umbilicum coronante ruffo, longoque barbitio, ut pulchre aspergillum aquæ lustrali intingi solitum



imitentur: inest femini medulla alba: radix: solet singularis esse lögica. Nostri icon non placet.

Lobel. & pen. Synon. na Adv. p. 139. plantula non inelegans, caule sesquipedali, pedali, femine Carthami. Obleru. p. 16. Chondrilla. rara purpurascens flore femine nitido deciduo: an Chondrilla al-


tera Matth. Belg. Crupina, detorto vocabulo à Gruyppen hoc est, repere, quia semen manu contritum se subducit ac proreptit: An hæc Chondrilla rara purpurea Lobelij, sit Matthioli Chondrilla altera, siuista inquit Hist. Lugdunensis, & Lob. id quod iam monuimus capite de Chondrilla.

Camer. hort. Chondrilla rara Lobelij siue Crupina Belgarum. Tabern. Icon. Chondrilla H (spanica Narbonensis, Spanisch Condriellen. Hist. Herb. Condrilla purpurea quibusdam Crupina. Tota planta est sapore amaricante.

C. Bauh. Phyt. p. 215. Chondrilla purpurascens flore Lob. Chondrilla rara; diuersa est à priore [Matthioli intelligo] quia hæc multo tenuiore est folio minorque: illa Italica, hæc Narbonensis. Nullam nōm Chondrillam italicam cui hæc Narbonensis similis sit aut cum qua comparari possit.

Provenit Montbelgardi in Horto E. C. Montpelij obseruauimus. A Tabern. colitur in hortis, ei missa ex Hispania. Hetruriz, & agri Narbonensis collibus non procul à Lupo monte exit, Lob.

CYANVS PERAMARVS REPENS folio Lauendulæ.



Ins ob-
struata
hæc (inquunt
Lobel. & Pena
Aduer.) non alio
quàm ad
Cyanū aut Iaceam
referenda,
foliolis oblongis,
angustis,
Lauendulæ, rigidis
illius plantæ,
quæ incanis,
albidis, Cyani
& Iaceæ mediam,
vnâ interiecta planta,
proximè descriptissimus,
similibus in cauliculis
gracilibus,
viticosis,
palmar-

Crupina
Belgarum.
H. Lugd. 1577.
Lob. not.
Condriella
altera Lob.
Camer.
Chod. Hist.
Narbonensis.

C. Bauh.
not.

Cyanus lat.
cca.

palmaribus, pedilibus, & sesquipedalibus: quorum singulis summis staminei flores singuli lacee, obsoleta purpura, & poculis squammosa infertione conflatis prodeunt. *Radix* digitum paruum aequat. Tota planta gustu perquam amaro & ingrato. Lobel. Obs. p. 296. Cyanus peramarus lupinus capitulis squarrosis Sesamoidis parui. Icon. Pl. p. 548. Cyanus repens.

C. Bauh. Phyt. Cyanus 3. siue repens latifolius. Subter Seleti pratenis ramulos ad Sellam novam & alibi agri Monspelici reptando latitat, iniquiunt Aduerf. ex quibus desumpta praemissa descriptio.

CYANVS LINIFOLIUS

repens.

Descriptio



A Valerado Dourez plantam siccam habuimus hoc titulo Heliochrysi species, cauliculus do-drantalibus, folia ferè Lini, valdè crebra, vicia paulò longiora, angusta capitula longa, squammosa, similia Stœchadi citrinæ alteri in-nodora, verum squamæ breuiores videntur, è quibus erumpit tomentum candi-

cans: saporem insignem non animaduertio.

Hanc plantam etiam optimè exprimit figurâ Lobelii Obs. p. 296. cui titulus Cyanus repens alter Cyanus peramaro repenti non absimilis, sed exilioribus multò foliolis & candicantibus capitulis argentei nitoris.

Icon. Plant. p. 549. Cyanus minimus repens.

C. Bauh. Phyt. Cyanus 4. siue repens angustifolius.

XERANTHEMVM. CAP. IV.

Descriptio



A Nguloso est caule, incano, lanuginoso, palmari & altiori, singulari plurimum & in ramis diuaticato: per quem folia alternatim disposita, denso tomento candicante vndique obfita, vicia duas aut tres longa, culmum lata: singulorum ramulorum extremis singula baxent capitula oblonga, ex

quarum candidantibus & lucidis, nitidis contexta, in acumen desinentibus cum stria rubente: flos stellatus, squallidus & exsiccus, foliis constat acuminatis rubentibus: capitulorum squammas imitantibus, sed longioribus: quorum medium occupant stamina numerosa confertaque, rigida, candida, hirsuta, inter quæ latent semina lata, veluti spinæ albæ, mollia: *radix* singularis lignea.

C. Bauh. Phyt. p. 533. Iacea 24. siue incana altera, Cyani capitulis, folio integro. Stœbe incana altera Lobelii.

An Gesn. de hort. Parmica alia Monspelii dicta, vera [ut existimant] Aretio? An Cæsp. lib. 13, cap. 54. Quædam Cyano similis quam Dios-

coridis Parmicam vocat? An Lobel. Aduerf. p. 235. Incana altera Cyani aut Iacæ capitulis & flore propior Cyano quam Iacæ, quam quidam arbitrati Parmicam siue Sternutariam primam? An eadem in Obs. p. 295. Incana Iacæ altera? Adv. Parmica vulgaris Herbariorum? An Icon. Plant. p. 544. Stœbe incana altera Cyani aut Iacæ capitulis & flore, Parmica vulgaris Herbariorum?


Xeranthemum vocabit præceptor meus Gesnerus, ob siccitatem & equaliditatem florum etiam recentium. Hanc plantam habeo siccam, eandem etiam mihi attulit Gener Cherlerus collectam collibus quos aux Garignes vocant propè Monspelium.

Parmica

Stœbe incana

Locus & Tempus.

XERANTHEMVM ALIVD, SIVE Parmica quorundam.



C Vitali inquit Clusius cuius descriptione & iconem exhibemus] assurgit Parmica Austriaca caule candicante, Cyani æmulo: folia illi infimâ caulis parte secundum radicem numerosâ, longiuscula, angusta, supernè molli lanugine incana; acidulculi saporis, in ipso autem caule rariora: caulis in aliquot

Descriptio

ramos se spargit, sustinentes capitula, è squamis veluti argenteis imbricatis sibi inuicem incumbentibus contexta: è quibus emergit flos venustus & elegans, duodecim aut quatuordecim foliis constans, duris, siccis, mucronatis, coloris initid albi, deinde ex caruleo quodammodo purpuracentis, aut illius æmuli qui in Sesamoidis minoris Matthioli flore elucet, nullo odore commendatus, sed solâ venustate gratus, & immarcescibilis: coloris enim gratiam retinet per multos annos è trabe suspensus, aut inter chartas repositus: in ipsa verò planta [si non euellatur] senescens subfulcum contrahit colorem: seminem non multum absimile Sesamoidi minori, tenuius tamen, & copiosum, inter albam lanuginem latet: *radix* singularis est, nigricans,

HISTORIÆ PLANTARVM

dura, capillaribus quibusdam fibris septa, sed annua.

Math. in Diosc. in prior. comm. Ptarmicam latine Sternutamentariam dictam in Hetruria frequentissime prouenire scribit. Nascitur autem & in Tridentino agro, præsertim Ananici tractu, folia incana, Oleæ modo oblonga; unde & Oliuella à multis vulgò nominetur. Sed in post. comm. cum magnis hg. Lat. & It. Ptarmicam alteram inscribit, ac aliam esse plantam ait, quam Ptarmicam appellare libeat, hanc Diosc. Ptarmicam non esse. Lethores perpendat an figura Ptarmicæ Matthioli sit vera icon alicuius plantæ aut fictitia, aut malè expressa: in comm. cum magnis hg. Lat. & Ital. & in hist. Germ. flores non nihil mutat & alios appingit, multa omittit eorum quæ antè de ea scripserat, vt loca vbi viderit & nomen Oliuella, quod antè ei tribuebat. Non amplius Dioscoridis Ptarmicam censet. Et hinc apparet quàm falsò in prior. comm. scripserit capitulo florum & herbæ vim quandam ad eam acrem inesse, vt olfacta statim sternutamenta excitet. Hæc enim vis Ptarmicæ Diosc. debetur. Falsum ergo etiam est huius Galenum meminisse. Si Matthioli Ptarmica est eadem cum Austriaca vt vult Lobelius inepitè picta est.

Lobel. Icon. Pl. p. 545. Obf. p. 295. Ptarmica Austriaca, Ptarmica Matthioli, Ptarmicæ vulgari cognata, peregrinæ venustatis: Herbarij eam in hortis colunt propter elegantis effigiatæ floris gratiam, similitudine & concoloris Sesamoidi parum, sed aspectu hilarioris è capitulis squamulis lucidis argenteis compactis, sibi imbricatis incompunctis. Folia Oleæ. Huius semen in Belgium Viennâ Austriæ ad amicos misit Clusius, quæ feliciter adoleuit. Ptarmicæ nomen huic plantæ impositum Clusius, non quòd sternutamenta moueat, sed quòd reliquis notis satis aptè cum Dioscoridis Ptarmica conueniat: tenues enim habet virgas, folia Oleæ, incana, molliora tamen, & Anthemidis præne florem. Austriacam cognominauit, quia primum in Austriâ infra Anilum flumen, præsertim verò circa Viennam totius Austriæ metropolim, spontè nascentem inueniebat: conspiciebat etiam in Pannoniâ Transdanubiana, Tirmauiensi itinere. A mulierculis Rhyzotomis Scabiola appellatur, sicquæ in totum annum seruatur, & venalis proponitur.

Camer. hort. Ptarmica Austriaca, Cyanus Hierosolymitanus. In Hist. germ. & Epit. Matth. Ptarmica. 1. wilder Borniam / Oliuella, hanc reuocat Matth. in dubium. Sunt qui Diosc. Ptarmicam faciunt, sed falluntur, Tertiam proponit Clus. cum pulchris lucentibus rubellis floribus. Camerarius proponit iconem Matth. nec demonstrat quæ sit, sed diuersam facit à Ptarmica Clusij, in eo non consentiens Lobelio & fratri C. Buhino.


Gerard. Ptarmica Austriaca. C. Bauh. Phyt. 533. Iacea 26. siue oleæ folio altera: Ptarmica altera Matth. H. Lugd. Ptarmica Austriaca Lob.

Xeranthemum aliud in Sabaudia reperi florens Iulio, prouenit etiam mihi hoc mense Lugduni in horto florens. Inter siccas plantas Vaserandi Dourcz reperi inscriptam titulo Stæbes Galeni. Stutgardia collegi semen in horto Illust. Ducis, quod à me feminatum Montbelgardi. Indicauit nobis Dominus Nicolaus Agierus: se obseruasse in Austriâ & copiosam in Italia. Floret Iulio.

Sib persuadent, teste Clusio, illius decoctum pueris & infantibus propinatum, aduersus fascinationes valdè vtile esse. Rura Italica ex Mat-

thioli Ptarmica scopas, quibus pavimenta vertuntur, conficiunt, nec in alium usum colligunt.

XERANTHEMI FORTE species.



Puilla incana Descriptio
na Iacea altera folio Oleæ, per omnia similis Incanæ alteri capitulis & floribus, exotica Syria plantula: sed cauliculus minus diuisus, palmatis & sesquipalmatis: folia maiora, Oleæ, magisque incana, minime serrata, capitula habitiora, nitidius argenteis squamis, gustu insipido, minime amaro.

Lobel. Obf. Puilla incana Lob. Iacea altera folio Oleæ, Ptarmicæ species. Lobel. 294.

Casp. Bauh. Phyt. pag. 533. Iacea 25. siue Oleæ folio. Iacea Oleæ folio C. B.

CATANANOE DALECHAMPII, flore Cyani, folio Coronopi.



Catananoe Descriptio
Dalechampii dicta, folia habet Coronopi, hirsuta, candidiora, sepe integræ, aliquando vno aut altero denticello inequalia, sapore nullo eccellente: caules bicubitales, in varios fissi ramos, nò sine filiis, teretes, pilis breuibus, sed aliquantum asperis obstiti, lac manant: ramorum satis longorum extremis insident, singulis singula squarrola capitula, squammis pulcherrimis membranceis pellucidis albicantibus striâ rufescente per medium decurrente, laxo connexu incumbens, & tanquam æstu nimio squallidis compactæ: quæ in flores expanduntur cartuleos, Cyani æquales: sed foliorum formâ longè diuersa, quippe latiuscula, non corniculata, extrêmâ orâ cilioreorum ritu crenata

Viret. Falcat. aris. Gæpa.

crenatâ, quorum singulæ adnatæ fibræ ex purpureo flauelcentes, apicibus luteis: medium occupat cinnus foliolorum conculcatorum violaceorum: *radix* subest crassa, longâ, exterius rubens.

Sesamoides parua Lob. Hæc à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Matth. not. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Locus *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Lob. not. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Matth. lapsus. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Camer. error. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Matth. not. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Catanance prior. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

H. Lugd. not. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Sesamoides: cerulea. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Coronopus *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.


Locus & tempus *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Sesamoides: cerulea. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides* à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549.

Tom. III.

dis copiosè provenire, atque etiam in Longobardia, legitur apud Hist. Lugdunensem.

CATANANCE AFFINIS SESAMOIDES paruum flore magis completo Camer.



AD Inty. Inty. Camer.

Abacca

potius ego res-

ferrem [in-

quit Camer.]

hanc plantam,

cum radix la-

te non pau-

co turgat &

multis quo-

que doctis &

rei herbariæ

peritissimis

hæc sententia

arideat. Flores

Cichorio figu-

ra respondent

& ali simplic

foliorum tex-

tura constant,

alii densius

stipantur, co-

lore elegant

ceruleo, stamina in medio lutea habentes, è quibus relinquatur semen subnigrum, angulosum; pusillum, squamatis capitulis inclusum: quod an purgandi vim obtineat neminem experientia cognovisse arbitror. Vnum hoc scio in parva quantitate exhibitum nihil efficere. Sapore est omnino dulci, nihil vel minimùm amaritudinis obtinente.

Huius figuram & descriptionem posuit Camer. in Hist. germ. & Epit. Matth. p. 945. hoc titulo *Sesamoides paruum flore magis completo*.

C. Bauh. Phyt. p. 217. *Chondrilla* 15. *Sesamoides* dicta cerulea altera. Apud Matth. *Sesamoides* 2: siue paruum flore magis completo Camerarii.

Sesamoides paruum flore magis completo. Chondrilla Sesamoides cerulea.

IACEA NIGRA VULGARIS capitata & squammosa:



NUllum rei

herbariæ

studiosum a-

deo tenues

progressus in

stirpium co-

gnitione fecit

se arbitramur

qui Iaceas vul-

gò appellatas,

quarum ma-

gnus est nume-

rus ad Scabio-

sarum classem

pertinere cum

Clusio statim

non agnoscat.

Vocatur autem

hæc Iacea ni-

gra ad differen-

tiam Tricoloris

Viola, quæ &

Scabiosa Clusio. Inscriptio: nus ratio. Viola Tricolor.

Descriptio
Radix.
Folia.

Caulis.
Flores.
Sapor.

Scabiosa
Vulgaris
Tragi
Cirsium
Buglossum
grande.
Spina mul-
li.
Diuersa à
Scabiosa.
Nomen à
colore vio-
laceo imposi-
tum
Gesta Scabi-
os.
Geum Pli-
nianum.

Hysciris.
Lombrina
Benon
Herba della
ferita.
Matrefillon
Stoebe
Aphyllantes
Varietas in
flore.
Icon Dodo-
nei.

Hysciris
Plinij.

Medium.

Iacea nigra

Sanicula
adrupta-
va.
Succisa
Schvvenck.

ipsa Iacea nuncupatur. Huic quædam cum Cy-
anis communia, radicis latis crallæ, lignosæ sapor,
cum nausæa adstringens: folia priora aliquid com-
mune habent cum Cichorij folijs, sunt enim
nonnihil laciniata: præ virore nigricantia, lanu-
gine canâ repleta, potissimum quæ per caules,
angusta & rigidiuscula: caules striatis, fractæ contu-
maces, similiter lanuginosi: flores è squammoso
nigricante capite, Cyani vulgaris, pleniores, co-
lore purpurascens: herbæ sapor non perinde in-
gratus vt Morfus Diaboli, subdulcis, cū astrictio-
ne, siccatas efficiat multò, calor propè nullus.

Plantam hanc, ni fallor, Tragus, inter Scabio-
sas refert. Describit autem Scabiosam vulgarem
pratensem cognominat, & ad caput Dioleoridis
conicit, vbi Cirsium describitur. Idque ait se non
sine ratione facere, quòd non tantum descriptio
huic competat, sed & nomina, Buglossi nimirum
grandis, & spinæ mollis, quoque conueniant.

Ast Iaceam nigram diuersi omnino generis ef-
se à Scabiosis, contrà quàm aliqui putarunt, sta-
tuit Gesner, de hortis, ac ait, Iacea, siue estres her-
bæ, flores habent violacei coloris, vnde & no-
men forsan illis impostum. Ia enim Græcis vio-
læ sunt: quàmquam Iacea nomen vetus non est.
Scaliger alicubi Getiam pro Iacea scribit, tan-
quam à Geo factò nomine, nimirum quòd nigra
cognominata in hoc genere radices, vt Geum
Plinianum, odoratissimas habeat, vt ipse scribit:
ego hæcenus odorem illum non inueni, cum
tres aut quatuor species norim, omnes Centau-
rio maiori cognatas: hortus quidem dignissima
fuerit species illa, si inueniatur, quæ Scaligero
Cinnamomum aut Nardum olet, veluti Baccharis
quædam. Idem Gesn. Centaurij maioris & Iaceæ
pratensis species minor.

Anguil. epist. 12. Hysciris Plinij, quibusdam
Græcis dicta Scabiosa, Bononiensibus Lombrina,
& Patauij Herba della ferita.

Dod. gall. & Lat. in fol. pag. 124. Iaceam nigram
cognominat, quam plerique Matrefillon voce (vt
apparet) corruptam appellant, & alij Stoebe spe-
ciem faciunt: videtur ipsi à quodam non temerè
dici posse: absque folijs siquidem flos eius sit, ex
folijs densè confarctis staminibus constans, ex
quo Aphyllantes nomen acceperit. Is varietatem
in flore agnoscit: nam flores ei tribuit coloris
è purpura rubentis rariò albi. Sed icon Dodo-
nei est apud Clusium pro Iacea Austriaca 6.

Errat Senensis inquit Lobelius, qui huius fa-
cultates Violæ flammæ asserit, & à Scabiosis dis-
cernere nesciuit: sed decepit illum nomenclatura
Iaceæ vtrique communis. Cæterum qui hanc
Plinij Hyscirem diuinant, ferendū sunt: tamen
si plurius ducant virum quàm effigiei cōiectu-
ram, cum vtraque consentiente sit opus: Folia illi
nigricantia, hirsuta, rigida: flores ex purpureo ni-
gicant in ventricosos poculis squammulis com-
pactis semine Cyani aut Cartami. Eidem Obs.
pag. 292. Iacea nigra vulgarior, Iacea nigra vulga-
ris: Hysciris Plinij Anguil. Medium Diole. Mu-
tono.

Tabern. icon. & Histor. Iacea nigra Schwarz
floctenblum, Iacea 1. & 2. Angl. 5. napice-
de. Germ. Chirurjis Bruch Sanicfel, Sanicula ad
rupturas aut Sanicula rupturarum, multum ha-
bens similitudinis cum Stoebe, H. Lugd. p. 1068.
Iacea nigra Dodonæi. Schvvenck. Succisa, Iacea
nigra Brunfels.

C. Bauh. Iacea 1. siue nigra pratensis lasifolia: a-
hequando folijs inferioribus laciniatis. Iacea 2. si-

ue angustifolia: Item Iacea 3. siue nigra altera hirsu-
tuto capite, Iacea nigra Dod. Hist. Gall. & Lobel.

In pratis, teste Lob. & Dodonæo, ac locis her-
bosis, negligentius cultis, tum & iuxta sepimenta
agrorum ac pratorum frequenter occurrit. Inter
vitia pratorum censeri potest, ab hac etenim bo-
ues & iumenta abstinent, nec scenum, cui admix-
ta pascuntur. Iunio ac Iulio, nō rarò & Augusto,
cum flore videtur. Iacea nigra vulgaris capitata
visâ Gencuæ florens Maio: Basileæ in pratis quâ
itur Moutets, & quâ itur Frenzack (Iunio & O-
ctobri: propè Menimontii Augusto. Lugduni etiâ
vidi. Montbelgardi passim secus vias & in pratis)
ac in horto Ill. E. C. prouenit semine maturo Iulio
& florens adhuc Octobri.

Gargarizata oris, faucium, laryngum vlcera, &
quævis vitia emendat, apostematibus & vulnere
sauciatis medetur, inquit Lobelius. Calida est ac
sicca, sed non adeò vt Succisa siue Morfus Dia-
boli commendatur etiam ad faucium, tonsilla-
rum, vultusque tumores, veluti succisa, sed facul-
tate & potentia minor est, teste Dodonæo. Com-
mendatur à Chirurjis apud Tabern. ad quascun-
que rupturas & affectus internos decocto propi-
nata. In quem vsum & puluerem eius in cibo &
potu offerunt. Ad relaxationem Iaceam albam &
nigram adhibet Fontanus.

IACEA CVM SQVAMIS CILII instar pilosis.

Hæc (qualem habemus) in dodrantales 7. a-
mos hincitur, graciles, angulosos, stri-
tos, aliquantulum hirsutos, folijs ami-
ctos vncilibus & scleuncialibus, semuncia-
li latitudine & angustioribus, datis, subhir-
sutis: flores tingit purpurâ saturatior, stami-
neos, Iaceæ vul-
gari similes, è
capitulo pari,
toto nigrican-
te, cuius squa-
mæ singulæ pi-
los breues ag-
minatim cir-
cumcirca, cilij
instar, possi-
dent.



Clus. in Pân. pag. 58. Iacea montana hirsuto capite: i-
conem autem p. 545. inscribit nomine Iaceæ
Austriacæ 1. Hist. flor. post. lib. 4. p. 7. Iacea mon-
tana hirsuto capite siue 6. Au-
striaca. Is figuram habet quam Lobel. & Dodo-
næus posuerunt pro Iacea nigra, diuersam tamen
statuit à vulgari, nos volumus dare meliorem
figuram, verum sculptor non benè expressit flores
& squammas. Hanc puto intelligere fratrem
C. Bauhinum per Iaceam 3. siue nigram alteram
hirsutocapite.

Siccam habeo munere Vldanici Chelii Medici Locus &
Argentinenfis, mihi etiam data Basileæ à Richne-
re cum hac inscriptione, Iacea nigra vulgaris.

Anno

Anno 1600. D. Agerius dedit nomine Iaceæ capite hispido collectam propè Argentinam. Cretic in montanis Austriz & Pannoniæ pratis, florens Iulio & Augusto.

IACEA CVM SQVAMVIS PENNATIS

siue capite villoso elatior
& humilior.

Descriptio **R**amis multis brachiata est, usque cubitalibus & longioribus, striatis, angulosis, subhirsutis: cumusmodi sunt & folia per ramos alternatim disposita, breuiora, latioraque quàm Iaceæ nigra vulgaris, scilicet nunc aut vnciam longa, latitudine vnciali, acuminata, crenata, infima verò palmum

& sesquipalmū aquant, capitula Iaceæ vulgaris magnitudine respondent, verum singula squamæ longo barbitio pōnato, nigricante reflexo à mucrone oriente comata sunt: siue & medio cūmpit Iaceæ vulgaris, purpureus. Caliculi circa Monspelum cœlo, longè est stragorior, foliaque possidet interdum



sinuata potius quàm crenata.

Synonyma

Elatior est Clusio in Pann. p. 543. Iacea 2. siue montana villosa capite: hanc pingit p. 544. pro Iaceâ Austriacâ villosa capite secunda: Hist. post. lib. 4. p. 6. Iacea montana villosa capite, siue 4. elatior. p. 7. Iacea 4. Austriacâ villosa capite.

C. Bauh. Phyt. Iacea 6. siue nigra 5. villosa capite, folio integro: & alia huius species humilior. Camer. hort. Iacea Pannonicâ Clusii capite hirsuto.

An Thallio Cyanus Sylvestris montanus integris foliis maximus in Iaceâ genere?

Minorem habeo inter meas plantas siccas. Maxima dein mihi nata est in horto Ill. e. c. Montbelgardi, attulit etiam Gener Cherlerus in monte Lupi collectam. Elatior & humilior Iacea Clusii in montanis Pannoniæ & Austriæ pratis nascuntur. Florent Iulio & Augusto, & semen subinde proferunt, quod maturitate siccum florem & calicibus excutit.

IACEA MONTANA SQVAMMOSA

maior semine nigro.

Descriptio

Nivmetosa ab eadem radice promit folia, oblonga, vulgatissima Iaceæ haud ab similia, nec tactu mentis aspara, sapore nonnihil calide, substringente ramen: caules plerumque cubitales, striatos, ramosos, foliis angustioribus, & interdum paucis lacinis secundum pediculum præditos obitos, vti in vulgatissima: capitula in

Tom. III.

extremis ramis crassiora, non hirsuta, sed multis squamis tenuibus, & si vel digitis leuiter attingas, crepitantibus prædita, internè candicante; superne verò, quæ se flos explicat, fusca: flos multis exiguis foliolis ex purpurâ candicantibus, in quinque lacinias diuisis constat, è quorum medio purpurascens tabulus exilit, in summo veluti farinâ aspersus, quem ambiunt purpurea maiora longioraque foliola, quinque inæqualibus laciniosis etiam constantia, vti vulgatissima: semen Cnico forinâ simile, sed exiguum, nigrum, paulò maius quàm vulgaris, subadstringentis gustus: radix etiam vulgatissima similis est, fibrosa, nigricans.

Clus. Pann. p. 542. Iacea Austriacâ 1. siue montana squarroso capite maior. Hist. post. lib. 4. p.

6. Iacea squamato capite 1. montana.

C. Bauh. Phyt. Iacea 4. siue nigra tertia squarroso capite maior.

Provenit copiosè in montanis Pannoniæ & Locus & Austriæ pratis, florens Iulio & Augusto, ac subinde de semen proferens, quod maturum statim è valculis reptans, siccum florem excutit.

IACEA MONTANA SQVAMMOSA

minor semine albicante.

Hæc priori ferè per omnia similis, paulò tamen humilior, ut quæ rarè cubitalem superet altitudinem, foliis minùs asperis, & aliquantulum incanis, paulò dilutiore flore, semine minore nec nigro, sed candicante & cineraceo, linguam etiam magis exalfaciente.

Clus. Pann. p. 542. Iacea 2. siue montana squarroso capite minor. Hist. post. lib. p. 6. Iacea squamato capite 2. montana.

C. Bauh. Phyt. Iacea 5. siue nigra 4. squarroso capite minor.

Idem 5. quibus præcedens locis etiam hæc Locus nascitur, sed maturus plerumque floret, & semen Iulio perficit.

IACEA MONSPESSVLANA CUI IN

Squamis fibræ nigra, interdum
acaulis.



Spontanea Descriptio
Spalmum vix superat interdum acaulis, cultura in cubitalem altitudinem proficit, multis ex radice crassiusculis pro ductis caulibus striatis, hirsutis, intus fungosis, multum ramosis, folia pumila per terram sparguntur Cyani foliorum æmulla, incanâ lannigine obfusa, laciniosa, alia integra; reliqua per ramos fortuito posita nascuntur: capita foliis oblongis;

D 3

minimè dissectis, acuminatis obuallata sunt, mediocris magnitudinis, mollicella, squamis longiusculis compacta, quarum oras fimbria nigra ambit, acumè verò in pinnatas spinulas innoxias fasciat: *flor* albus stamineus in pappos abit, habui etiam flore purpureo.

Iacea pumila Lob.

Lobel. in Adv. p. 235. vocat hanc Iaceam pumilam, quam etiam depingit proptè spontè prouenit. Multò enim ramulosior & maior euadit culta in hortis, ita ut alia ferè videatur planta. Hanc etiam exhibet in Icon. Plant. p. 542. hoc titulo. Iacea pumilis, serpens, acaulis fermè, flore cyaneo & albo.

Flor duplex.

Est C. Bauh. Phyt. Iacea 12. siue humilis, Hieracij folio, varians floris colore, qui cæruleo absolute purpurascit, aliquando albus est.

H. Lugd. pag. 1193. Iacea humilis, Hieracij folio Penz.

Locus. & tempus.

Monspelij obseruavi flore albo, quæ sine vllò caule primò erat, sed postea caules producebat multos in terra sparso: florebat Vere. Hanc dein habui etiam flore albo & purpureo tum Lugduni, tum Genevæ in hortis meis, ubi hiemem perferabant, ac vicebant, Maioque mense floreabant. Rarè occurrit Lobelio, & ferè Norbonensium est, marginibus satorum ad pontem Monspelio diffusum, via quæ Frontignanam itur.

IACEÆ GENVS STOEBE SALMANTICA, folijs mollibus lanuginosis, caule infirmo.

Descriptio



Folia omnia habet mollia & lanuginosa Erucæ instar laciniata, caule infirmum ramulosum, in terram procumbentem, cuius flores summis ramis innascentes superiore maiores, barbulis exterioribus Cyani æmulis, purpureis (quibus intermixti villi quidam lutei) medium florem occupantibus: *semen* superiori

simile, vel Cyani semini: *radix* digitalis, albicans, non viuax, sed quam subsequens hiems corrumpit.

Stoebe salmantica.

Clus. Hist. p. 359. sine icône Stœbes Salmanticensis prioris genus, à Salmanticensibus ad Cyanos relatum. Hist. post. lib. 4. pag. 9. Stœbe Salmantica 2.

Icon Clusii.

Icon apud Clusium in post. Hist. p. 9. non malè videtur quadrare eius descriptioni: verum Lob. eam ponit, ut monemus capite de Cœtario collino pro sua Iacea nigra differente planta: & Dodon. pro Cyanoide flore, quam verò Dod. intelligat plantam asserere non possumus; quædam enim in eius descriptione cum hac planta conuenire videntur.

C. Bauh. Phyt. p. 531. Iacea 17. Stoebe dicta maior altera folijs Erucæ.

Nascitur abundè Salmanticensi agro in aruorum & vinetorum marginibus. Floret Iunio, Iulio & Augusto, & subinde semen profert. In Belgica non nisi altero à sato anno.

Locus & tempus

IACEA MONTANA CAPITIS magno strobili.



Descriptio.

Pumila est plâta duarum trünne vnciarum altitudine, interdum dodrantalis aut maior, *folia* cauli longitudine vix cedunt: primùm nascencia accedunt formâ ad priora Centaurij folia, sūt lata & sublonga, sequuntur alia, in profundas lacinas æquali sicut diuisa, subtus densa mollique lanugine candicante oblita,

quæ etiam superius non omninò destituuntur, plerumque tamen vindantia, quædam interdum non laciniata aut parum: *caliculus* quoque tomentosus est, inque ramos subinde diuiditur, sæpè simplex, cuius cacumini insidet caput magnum, Scolymi, squamis argenteis aut ex argenteo rutilantibus, purpureisnubibus, perquam tenuibus molliùsq; per oras latefcentibus cristatiliq; compactile: medium obtinent pappi quos *flor* reliquit, staminibus purpurantibus constans: *radix* satis crassa, simplex aliquando, interdum plurimum capitum nigricans.

An Monach. in Mel. Chamæleon albus & Carduus pinca?

Camet. pag. 78. Iacea pumila siue nana: Penzæ montana, & Carduus pinus Norbonensium; Theophr. Chamæleon non aculeatus.

C. Bauh. Phyt. p. 531. Iacea 13. siue humilis montana capite Pino simili.

Lobel. in Adv. pag. 367. Theophr. [omissa hæc vox in Icon.] Chamæleon non aculeatus.

H. Lugd. p. 1192. Iacea montana, in apricis & glareosis montium locis, Aprili florens, semen Iunio maturescens.

Iacea montana Lob.

Iacea montana Dalechampii mihi oblata est dum essem Monspelii, allata ex monte Ceti, quam postea inueni in montibus propè tres Pontes Mense Iunio. Io. Renauldus Pharmacopœus iphi transmissit maiorem multò, excedentem palmum, ex vno caule duo capita producentem. Vidi etiam folia, quæ palmum excederent. Lugduni mihi prouenit lata.

Locus & tempus

SCABIOSA SQVAMMATA ARGENTEA.

Ignosâ radice firmata, caules cubitales & bi- cubitales striati, subhirsuti, multis alis con-

cavi;

cant: folia multiplici celsura dissecta, ad Centaurii maioris speciem minorem accedunt, nigriora, teneriora: exteius ramulorum capitula nascuntur turbinata; concinnis lucentium squammarum & candidantium scandulis imbricata.

Synonyma

Clus. Hist. p. 359. & p. 361. Stœbe Salmantica altera: in post. Hist. tertia, ad Scabiosas seu Iaceas referenda; à Salmanticensibus Stœbes nomine insignita, quod extrema folia utcumque aculeata sint. Hac pro Scabiosa videntur.

Lobel. Obs. p. 294. Ic. Plât. p. 544. Stœbe argentea Salmantica minor, Stœbe



Stœbe arg.
Salm. n. 1.
Hist.

Salmantica 2. Clusii. H. Lugd. p. 1109. Stœbe Salmantica altera Clusii.

Iacea capitulosa squamata argentea.

C. Bauh. Phyt. 590. Iacea n. siue capitulo squamato argenteo. Iacea alba, Tabern. Scabiosa squamata lo. Bauhini. Iacea 18. siue Iacea Stœbe dicta tertia foliis profunde incisis. Stœbe Salmantica altera Clusii. Stœbe argentea Salmantica minor Lob. Tabern. Iaceam albam huc non refero nec mihi videtur mea Scabiosa squamata argentea, quamvis figura Tabern. aliquatenus conveniat, & quod dixit capitula ex albo lucentia: Iacea mea squamata argentea eadem est cum Salmanticensi 2. vel eundem speciei Belgica.

C. B. m.

Tabern. icon. & Hist. 543. Stœbe minor, Heist. Stœben frâu: Figuram habet Clusii.

locus &
tempus.

Memini me habuisse Genecum in horto plantam similem Centaurio maiori tenuifolia, ut eandem penè existimarem donec omnia diligenter perpendere. Valerandus Dorez hanc dicebat esse Stœben Anguillare. Stœbe Salmantica altera Clusii nascitur Salmanticensi agro frequens in aruorum & vinearum marginibus. Floret Iunio, Iulio, Augusto, & subinde semen profert. Apud Belgas non nisi altero à latu anno floret.

IACEA SQVAMMATA CRETICA,
quibusdam Scabiosa Cretica dicta.

Descriptio

Habet multa folia longâ, supra tellurem expansa, instar maioris Scabiosæ Matthioli, crasso nervo prædita, & secundum illius longitudinem, non modo multipliciter faciniata, sed ipsæ etiam lacinie in minores alias sectæ: caulibus deinde emergit cubitalis & amplior, striatus, durus. non dissimilis Iacæ primo loco hoc capite descriptæ, per quem spatia sunt folia iam dictis minora & minus laciniosa: finditur deinde in varios ramos, minoribus adhuc foliis, & raris sectis præditos: extremi rami sistent squamata capitula, quæ producunt deinde florem multis longioribus fasciulis purpureis, interdum omnino albis, & valde sectis constantem, ex quorum

medio exilit stilus pallescens: euanido flori, succedit semen non dissimile prioris semini, multâ lanugine involutum: radix satis crassa, & fibris quibusdam prædita, instar radicis Stœbes Hispanicæ, quæ an viæ sit, me latet.

Peregrino semine (Cretâ allato) Scabiosæ nomine nata est planta Clusio, quæ ipsi in post. Hist. tertium est Iacæ genus ad Scabiosarum classem cum reliquis Iacæ & Stœbes ab ipso descriptis generibus petiunt: Iacea squamata capite 3. Cretica.

An Scabiosa Cretica Anguillare?

Scabiosa
Cretica.

An Scabiosa
sa Candia?

Stœbe argentea incana Aldroandi.

Stœben aliam ab argentea Salmantica vidit Descriptio Lobel. Obs. p. 294. operâ D. Hermetis Clerici Medici Niuernensis etiam foliis & caule argenteæ Stœbes, sed delicatioribus virgultis, & foliis tomento crasso incanis.

CENTAVRII MAIORIS Species tenuifolia.



Descriptio

Centaurii maioris speciem facio, capitulorum augmento: radicem habet minimi digiti crassitudine dodrantalem, sapore Cyani nauseoso: folia Scabiosæ squamata argentea, tenuiter dissecta; albidiora, sapore amaro prædita: caules vnius, duorum, aut trium interdum cubitorum, altitudine pro locorum ubi provenit ratione, in multos ramos fissi, foliis etiam tenuioribus Absinthii ferè Pontici vestiti: flores Cyani formâ, staminei, minores, purpurantes, & capitulis emicant turgidulis turbinatilibus, Scabiosæ squamata argenteæ; paulò minoribus, squammulis asperis pilosis imbricatis, non lucidis, ut in Argetheæ illa: semina parva, oblonga, rufa, quaternis costulis striata, quibus pili adherent: Tanta huius plantæ similitudo cum Scabiosa argenteis squamis ut eandem existimarem.

Est hæc Gesneri Centaurii illa species, quam circa Bisileam in muris & asperis locis nasci tradit: Est H. Lugd. p. 1192. Iacea alba: Tabern. icon. p. 153. & Hist. lib. 1. p. 539. Iacea alba, Weisfloedenblum; Iacea 2. species Stœbe: capitulis ex albo lucentibus squamatis: foliis ex cinereis albis. In capitulis autem pilos appingit Tabern: qui in argentea Scabiosa non sunt.

C. Bauh. Phyt. Iacea 19. siue Iacea Stœbe dicta 4. Centaurium maius in muris Gesnero. Stœbes Salmanticæ alterius altera species Clusio. Iacea alba Lugd. Item p. 532. Iacea 23. Iacea incana Cyano similis, Clusio Cyano minori similis.

Centaurii
species.
Gesner.
Iacea alba
Tabern.

HISTORIAE

Gerard. Angl. Iacea flore albo white flowered Knapweede. Non bene dicitur flore albo. H. Lugdun. p. 192. Iacea alba. An Lob. Adv. p. 236. Cyanus minimus: Cyanus noster minimus, inquit, in Obl. pag. 294. viticulis Sparteis, perpusillis colliculis, qui humenti solo Belgico longè maior conspiciuntur.

An Stoebe Salamantica quarta Clusii?

Locus & Tempus.

Montspelij tota æstate & Autumno conspiciuntur. Basilæ abundat in muris vrbis, potissimum circa Colberg, inter portâ Strein & Eschen, extra urbem & intra, in itinere versus Mourets inueni florentem Octobri & eundo Krenzack: & veniendo Montembelgardû propè pagum Gagen: euulsi plantandam in Horto E. C. Dalechampsii curatur depingendam nomine Iacæ albæ, verum figura non placet. Brisaci Brisgoia ad Rhenum florens adhuc Octobri & Nouembri.

IACEA MONTANA NARBONENSIS.

Locus

Hanc nouam subdere visum fuit, propter nonnullam inter se similitudinem. Cautibus & collibus Castrî n. cui conterminis Montspeliensis agri nonnullam à Lobelio reperta. Cauliculus niger dodrantali & pedem alto, rotundo: folia

Iacæ luteæ & Chamæleonis læuis Theophr. media edente, altera parte incana, glauca, tantillum hirta: flores Iacæ aut Cirsij, sed minores: radix sequisipalmaris, gracilis, minulque fibrata, gustu cyaneo amaricat.

Lobel. Obseru. pag. 294. Ico. Plant. pag. 543. Hist. Lugd. pag. 1193. Iacea montana Narbonensis. Casp. Bauhin. Phyt.



pag. 531. Iacea 15. siue montana.

CENTAURIUM COLLINUM GESNERI flore purpureo & albo.

Descriptio

Similitudo huic cum Centauro maiore: De Centauro autem collino, Matthioli, qui eam Scabiosam maiorem in post. comm. cap. de Stoebe, inscripsit, hæc tradit. Primo statim ex ortu folia profert longa, nullis in ambitu lacinis, at quæ his succedunt plûs, minoris modo, dissecta cernuntur, quæ verò in caule, & ramis sunt: minora habentur, & magis lacinata. Caules gerit ætate sequisipalmares, teretes, striatos, incanulosque qui circa cacumen suos fundunt ramos, in quorum fastigiis capitula oriuntur in acutum desinentia, compacti squamarum ordine cõtectæ, Cyani modo, è quib. flores prodeunt ferè etiam

PLANTARVM:

similes, sed rufescentes. Hos denique sequitur semen paruum; & subnigrum Lychnidis coronariæ simile, Radice nititur pollicari crassitudine & sæpè maiore, brachiataque, sapore subdulci, pastinacæ proximo. Nascitur inter fruges, & in campis non cultis, argilloso præsertim solo. Quæ quidem notæ maxime arguunt magnam inter Scabiosam, & Stœben intercedere differentiam. Si quidem Stœbe folia fert aculeata, & in lacubus, stagnis, paludibus, aliisque locis aquosis nascitur. Hæc Matthioli, cuius licet figura nobis placeat, displicet tamen seminis descriptio. [Id enim obleruauimus paruum, oblongum, rufum, & superiori parte pilosum esse.] Sed displicet etiam quod vulgaris Scabiosæ vires huic insuper inscribat, sibi persuadens esse vulgarem. Matthioli glossator pulchram habet iconem. Verùm non demonstrat, an vires scabiosæ, huic conueniant, vel Scabiosæ vulgari minori, cuius etiam figuram nouam posuit.

Camer. mor.

Gesn. hort. Centaurij maioris species Collina maior, foliis dissectis. Lobel. & Pena Aduers. p. 232. Iacea nigra maior laciniosa vulgari ab inscio Matthioli supposita. Item p. 234. Iacea maior folio multum lacinioso, Dentis leonis, maiusculis vasculis floris lutei. Obl. p. 292. Iacea maior, & pag. 293. Iacæ maioris folio multum lacinioso varietas. Num Cyanoidis flos Dæd. eadem? an non potius congener? Nonnunquam Mechlinia in hortis floribus albis, & capitulis spinosis vitæ. Ic. Plant. p. 541. Iacea maior. Lobelium in Aduersariis per Iaceam maiorem int. Illegit Centaurium nostrum non dubitamus, an eius capita bene vocet vascula, aliis diiudicandum relinquimus: An etiam in Obseru. & Icon. veram eius figuram exhibuerit dubitamus, quia Clusius in Hist. in folio proponit pro Stoebe Salamantica 2. cuius descriptio non conuenit cum nostro Centauro collino: licet videatur icon non malè respondere suæ descriptioni. Considerandum igitur an icon illa non sit alienius plantæ differentis à nostro Centauro collino siue Iacæ maioris Lobel.

Iacea maior.

Dodonæus proposuit iconem nomine Cyanoidis floris, qui qualis sit asserere non possumus. Frater C. Bauh. refert ad Iaceam spinosam Mispelensem. Thal. Cyanus silu. maior aruensis, Matthioli Scabiosa maior.

Tabern. icon. p. 153. Hist. lib. II. pag. 540. Iacea tertia, flocculentum, Item icon. p. 158. & Hist. pag. 546.



Scabiosa maior flore purpureo, Croß braun Scabiosen. Exissimatus Tabern. duobus locis eandem plantam tradere, idèd fratri C. Bauhino duas diuersas statuendi, non consentimus adhuc, donec nobis ostendantur diuersæ plantæ consimiles.

Gerard.

Gerard. Angl. Iacea maior, Great Mafsell. Item antè Scabiosa flore purpureo, purple flower Scabious.

C. Bauh. Phyt. p. 526. Scabiosa 8. siue maior squamatis capitulis, Matth. maior. Lob. Montana Scabiosa calidarum regionum in qua capitula non rectè pinguntur: Hæc floribus est ex purpura subrubentibus: reperitur floribus paucioribus minoribus candidis. Item pag. 530. Iacea 8. siue rubra latifolia laciniata Tabern. Iacea tertia. Item apud Matth. Scabiosa maior squamatis capitulis: Scabiosa quinta Trago. Matthioli Scabiosa montana videtur potius ponenda cum Iaceis, quàm inter Scabiosas: præterea conferenti descriptionem & figurâ Matth. cum descriptione & figura Lobelii Scabiosæ montanæ calidarum regionum, manifestum erit diuersas ab illis exhiberi plantas: Scabiosam maiorem Matthioli aliquoties obseruavi colore purpurascente & albo, sed non variantem numero aut magnitudine florum.

H. Lugd. pag. 1066. Scabiosa Matthioli maior. Item p. 1108. Scabiosa montana Dalechampii. Vtrobique describitur & depingitur eadem planta, quod seuerus Censor non obseruauit.

An porro Trago lib. 1. cap. 80. Scabiosa tertia, Scabiosæ 3. genus?

An Dodon. lat. in fol. p. 125. Aphyllantes 3. foliis magis incisus, &c?

Segetum potius quàm pratorum, in Gallia & Anglia plurima. Horti Belgici hanc vt præstantiorem ad vsum Medicum colunt: tamen in Angliæ leges bus. Conuenit æ conterminis abur de proueniat, teste Lobelio. Fuchsius cum apud eum essem vocabat Scabiosæ quartum genus: vidi Tubingæ: Lugduni, Geneva, & Tiguri. Valerandus Dourez dicebat Luminariam Theophrasti Dalechampio. Frater C. Bauhinus attulit mihi siccam plantam cum hac inscriptione Cleomæ Otravii Horatiani Guilandino. Basileæ cum essem reperi cum flore purpureo & albo in vase ferfal/ Brengard & Leirach. Montbelgard abundat iuxta vites: prouenit etiam in Horto r. e. Flore albo vidi Heidelbergæ in horto Di. Sprengeri cum semine maturo Iunio, vnde attuli seminiferam Montbelgard in horto Ill. E. C. vocabat Iaceam albam.

IACEA LATIFOLIA SPINOSIS capitulis pulchris flore purpureo.



Tom. III.

Ultis ramis brachiata cubitalibus & longioribus, striatis, angulosis subhirsutis, recto apertis, interdum coccinis: folia infima pedalia circiter, palmati latitudine in profundas lacinias sinuatas laciniis diuisa, & Cichorii syluestris similia, hirsuta, aspera, superiora verò per ramos passim multo sunt minora, Cyani

aut Hieracii foliorum diuisurâ & magnitudine, vique ad ipsum capitulum crebra. Cæterum capitula extremis ramis hærentia, turbinate sunt; Cyani aut Iacæ vulgaris capitulis paria, quorum singulæ squammæ flauescens aut rubentes, alioqui læues & politæ in quinas, senas, aut septenas radiatas spinas, deorsum vergentes desinunt: flores purpurei staminei, tandem in pappos facessunt: semina oblonga, Chnico aliquatenus similia, multo minora, variegata: radix crassiuscula.

Frater C. Bauh. aliquando dedit nobis, nomine Iacæ spinosæ, ramum huius plantæ, quæ non culta, ea est strigosa, foliis minoribus multo, non tamen angustis, vt in tenuifolia Narbonensi, sed latis etiam iuxta capitulum, laciniatis in spinis etiam differentia: plures enim quàm iam dicta & non ternæ.

An Clus. Pann. p. 546. Iacea 4. siue Iacea montana echinato capite. Hist. post. lib. 4. p. 7. Iacea montana echinato capite siue 7.

An C. Bauh. Phyt. p. 530. Iacea 7. siue nigra 6. echinato capite.

Alebat Argentina in horto suo D. Fridericus Meyer, qui referebat ex semine natam misso à Domino Agerio.

Locus:

Iacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia.

Caules huius cubitales, striati, asperis: folia aspera, angusta, vncias duas longa, quædam rariùs laciniata, aut cum quibuldam eminentiis: capitula parua, quæ squamis constant flauescens: glabris, nisi desinere in tres spinulas: foliis purpureis.

Lobel. & Pen. Adv. p. 234. Capitulis spinosis Iacea: ad Cellam nouam & vicinis vineis Montpelii minor spontè visitur alia Iacea nigra eadem prostrum radice & effigie, duntaxat tristiore aspectu: florem edit purpureum, interdum album, in squammoso & spinulis horrido capitulo, Calcitræ haud absimili.

An Dodon. hist. lat. in fol. pag. 125. Aphyllantes altera similis primæ (id est Stæbe Salmaticæ primæ Clusii): sed caule breuiore, capitulis minoribus, & foliis nigrioribus, saturatiùsque virentibus, squammulis capitulorum asperioribus & non nihil spinosis: flore purpureo è staminibus confarcto.

C. Bauh. Phyt. Iacea 10. siue Iacea Stæbe dicta squammis asperis. Aphyllantes 2. Dodon.

Iacea nomine passim prouenientem Montpelii obseruauimus, florentem Vere, Estate, & Autumno: Genet Cherlerus attulit ex Gallia Narbonensi.

Iacea purpurea Hispanica muricata.

Iacea lutea non multum absimilis, foliis setidis candicantibus, ramis cubitalibus & flexilibus, in quorum summo capite squammata, florem deprementia purpureum: radix valde crassa est longaque & glutinosa.

Clus. Hist. & Hist. post. lib. 4. p. 8. Iacea purpurea Valentina muricato capite, Granatenfibus vulgò Arzolla: proponebant nonnulli pro Poterio, cum tamen eius descriptioni non responderet.

Lobel. Obs. p. 433. Capitulis spinosis Carduus stellatus, seu Calcitræ altera, videtur eadem cum Iacea altera Granatenfium Clusii.

Descriptio

Iacea purp.
Valentina
muricato
capite luf.
Arzolla.
Poteriū nō
est.
C. A. Stellatus
seu Calcitræ
altera Lob.

Abundantissime inuenitur agro Granatensi
Locus & Valentino, locis humidis & umbratis, floret
Tempus. Martio.

CENTAVRIVM COLLINVM SIVE
jacea spinosa, flore
luteo.

Descriptio



Rigido & recto surgit caule, duorum trumve cubitorum altitudine, multis alis concavo, striato, anguloso, glabro: folia ramulorum exortui subiecta, alibiq; per caules & a radice ad Centaurii collini (cuius species videtur) folia accedunt, duarum trumve vnciarum longitudine, vncia

plus minus lata, in profundas lacinias ad costam vsque dissecta, rigida, dura, tactu aspera: capitula extremis harent ramorum, Iuglandis ferè magnitudine, squammis loricata, ex viridi flauescen-
tibus, per oras nigricantibus, aliquando lauibibus & sui vndique similibus, aliquando denticulatis marginibus, interdum in primam longiusculam mordacem & nigricantem desinentibus, nonnunquam inermibus: florum stamina in orbem explicantur, coloris lutei: radix minimum digitum crassitudine aequat, superiore parte subinde comosa.

Lobel. Aduers. pag. 234. Jacea maior, folio multum lacinioso, quam alias flore purpureo videre est in segetibus Montpeliciis, floribus luteis, venustis: Carthami siluestris nullatenus diuersam, capitulis, foliis, aut caulibus: Nisi quia tota asperiuscula: quam qui malit Plinij Hyosciriden, nobis secundum liceat. Obseru. p. 483. Cardui stellati varietas: Jacea lutea Clusij, Tragacanthum Clusij. Icon. pag. 542. Jacea maior lutea. Item pag. 13. Tom. 2. Carduus stellatus capitulis spinosis siue Calcatripa. Lobelius non agnouit Jaceam luteam ludere capitulis modò spinosis, modò non spinosis: modò vtrumque in eadem planta: ideò vnam in Aduersariis, & postea in Obseru. Clusij assumpsit figuram, ponens sub alio titulo, quam etiam hic habemus pictam nobis absentibus, non tamen rejicienda Lobelij in Aduersariis, quamvis non habeat spinas in capitulis vt interdum videtur.

Clus. Hist. Jacea lutea i. Hist. post. Jacea lutea, Salmanticenses vocant Tragacanthum. Tabern. icon. & Histor. Jacea lutea maior Geel Jaccè aut flocken Fraut. Figuram habet Clusij. Gerard. Angl. Jacea maior lutea yellowe snapweed.

Camer. hort. Jacea flore luteo spinosa.

H. Lugd. 193. Jacea maior lutea Penz. Item p. 1474. Jacea lutea Clusij, quoad descriptionem. Figura enim est Cardui capite tomentoso. Hist.

Foliorum
varietas.

Flores
Radix

Jac. maior
folio multo
lacinioso
Lob.

Tab. nota-
tur

Jacea lutea
Clus.


Jac. si lutea
spinosa
H. Lugd. er-
scr.

ria habet duas figuras, prior ex Adu. Lobelij: altera ex Clusio est p. 1488. errore Typographi posita nomine Cardui Erioccephali Dodonæi, quæ autem cap. 21. aliò transferenda est.

C. Bauh. Phyt. Jacea ro. siue lutea capite spinoso. Jacea maior lutea Aduers. collegit Monspelij, vbi progenit ad semitam, quæ itur Peraux, non procul à siluula, florens Iunio & Iulio: In Salmanticensi agro frequens nascitur ad vinearum margines & arido solo: floret Iulio: semen Augusto maturum est. Tabern. primum obseruauit in agris satis copiose in Burgundia inter Grandville & vesui: Interdum in segetibus Monspelicis videre fuit Lobelio.

Jac. lutea
cap. spinoso
C. B.
Locus
Tempus.

IACEA MVSCHATA.



Radix ligno-
sa lutea: cau-
lis rotundus, pe-
dalis: folia lō-
gosa, lata, mollia,
tomentosa, laci-
niis longis di-
uisa, alba vel ci-
nerea. Capitula
forma & colo-
re Jaceæ secun-
da [quæ Cent-
aurium murale
dicitur] tota pla-
ta satis suauis o-
dore prædicta
est, saporis ama-
ricus cum ad-
fusione qua-
dam. Ita descri-
bit Taberna-
montanus, cu-

Descriptio

jus & descriptionem & iconem probamus.

Eidem Icon. & Histor. Jacea Muscata, Jacea montana, Bergensstockblum / Groß Bismkraut. Herba muscata maior nuncupatur.

Egregius Medicus Petrus Turnerus Anglus olim attulit mihi cum hac inscriptione, Herba quam vocant suam moschatam, odore florum suauis Heidelbergæ provenit arenosis & siccis locis. Provenit in montibus & collibus sabulosis, potissimum in agris montosis, vt & circa domum montanam Erdtbachianam Schoenenberg: præterea inter Elektoralem domum Venationem dictam Neuten Schloß & pagum furnpym. Gaudet locis altis & apricis.

IACEA INCANA LACINIATA
capitulis Cirsij, flore vno
aut altero.

Hæc ex radice crassa, lignosa, caulem proferit palmarem, angulosum; incanum, nudum: folia habet multa ad radicem per terram sparsa, lata, Stœbes instar laciniata, molli lanugine incana: flor vnus vel alter, Jaceæ vulgari similis, ex capitulo squarroso prodiens, caulis summitati insidet.

Descriptio.

C. Bauh.

Casp. Bauh. Phyt. Iacea 14. [apud Matth. Scabiosa 5.] siue incana lacinata.

In montibus prope Capuam prouenit.

IACEA SPHÆRITIS.

AD Aphyllantem referri posse videtur, nec fortassis temerè, cuius icon in Cæsareo codice extat Sphæritidis nomine, nisi quod absque enatis staminibus depingitur. Nulla tamen Sphæritis à Veteribus descripta reperitur (teste Dodon. Lat. in fol. pag. 126.) præter Cupressi.

C. Bauh. Phyt. Iacea 21. Sphæritis ex codice Cæsareo Dodon.

STOEBE ET PHLOEOS Veteribus.

DE Stœbe, quam & Stibam alicubi & Phleum vocant, inquit illo loco Theophrastus vbi Stœbem [στίβην] appellat. Folia huic in fruticum genere veluti carnosa [σπαρτέφυκα] scilicet quia pulpa consistit vt Cupressus, Myrica & alia: alibi inquit, Phleus [φλέων] quam nonnulli Stœbem vocant, inter eas est, quæ iuxta spinam seu aculeum alterum quoque folium habent [στίβη τὴν ἀκανθὰς ἔχει τὴν ἐν σπίνῃ, & non vt vertit Gaza, iuxta folium aculeatum, altero quoque folio conduntur] vt Ononis, Tubulus: Iterum de Phleo inquit. Spinosorum quoddam genus ex toto spinosum est: quoddam spinoso folio constat: tertium genus est aculeatum, quod iuxta aculeum folium gerit. Phleus enim Tribulus, Capparisque peculiare nimirum obtinent, non solum caulem aculeatum, sed etiam folium hispidum habent. Erit omnino legendum esse annotauit etiam aliquando Dalechampius. Sed quod eo in loco subiungitur, Theodorus non bene omnibus his tribuit, peculiare scilicet habere, vt non solum caulem aculeatum, sed etiam folium habent hispidum [τὸ στίβην ἔχει τὴν ἀκανθὰς ἐν τῇ ῥίζῃ, ἢ τὴν καυλῷ] nam inferius peculiare id foli Cappari inesse traditur: Phleum autem & Hippopheum foliis mitibus constare, id est sine aculeis: ibidem tribuit Phleo folium carnosum multifidum: multaque radículas [πολλὰ ῥίζα] non in profundum: germinat, inquit, cum Virgulis, nec folia dimittit, non enim annua, sed diuturnior est. Hac omnia pulchrè conueniunt herbæ supradictæ. Sed alia apud eundem Theophrastum Phleum neutro genere appellatur; in stagnis nascens, cuius fructus placentaceus in lacu Orchomenio præguens Anthella vocatur: alibi sterile, quæ famia est, foliis Harundineis, de qua alibi dictum est à nobis.

Plinius Theophrastum sequutus malè intellectum: inquit quædam in folio, & in caule habet aculeum [in folio non, sed in caule habet. Falso igitur hæc Plinius, inquit Dalechampius, Stœbe Theophrasti folio minimè punit, sed præter folium, exarmatum spinosum fructum gignit, Tribuli alterius modo] vt Phleos quod aliqui Stœbem appellauerunt: inde error Theodori fluxit. Alibi Dioscoridem videntur inquit: Stœbe, quam aliqui Phleon vocant, decocta

Tom. III.

in vino præcipuè auribus purulentis medetur, item oculis ictu cruentatis: Hamorrhoidæ quoque, & dysenteria infusa.

Stœbe, inquit Dioscorides vulgaris est notitia, folia & semen astringunt: idè dysentericis infunditur decoctum, auribus quoque purulentis instillatur, imponitur etiam oculis cruentatis: ac folia cohibent sanguinis eruptionem.

De Stœbe Galenus lib. 7. simpl. med. disseruit his verbis. Stœbes fructus, & folia maximo sunt visci, adstringendi vim habentia mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente. Quamobrem decoctum eorum dysentericis iniicitur, & auribus pure fluentibus. tum vulnera magna conglutinat. Evidentiùs hæc præstat cum vino atro auctero: valenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates. Præterea folia viridia, si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis supprimendi: denique & oculorum ex ictu suffusiones illa iuuant.

Alia Stœbe Galeni est odorata & acris descripta lib. de antidotis, qua dolis aggesta patet eius ne accerent, imbecillia vina conferuabat. De hac ait. Quam incolæ Colymbada vocant, alii Stœbem, herba fruticosa, calida & acris valdè, parumper redolens, apuissima ad præseruandum vina: appellatur & Stœbe, quodcumque vas interponitur opplendi gratia: ne inuicem collidantur, vt natura fecit in pulmonis fabrica: nam carne molli, instar Stœbes cuiusdam, eius vasa fulciti scribit Galenus.

Id nondum in confesso esse scribit Dalechampius, An Stœbe Dioscoridis eadem cum Phleo Theophrasti, quam is lib. 6. cap. 1. à quibusdam Stœbe vocari dixit.

Nescio inquit Anguillara epist. 8. pag. 146. quid sit Phleon quod Gaza vertit Stœbe. Sed quo loco ita conuerterit Gaza, Anguillara non ostendit, nec nos hæcenus locum inuenimus.

Phleos & Stœbe (vt Honor. Bellus perhibet) vnum & idem est & ex aculeatarum genere. Phleum autem nomine neutro multum à Stœbe differt: plerique doctissimi viri ex confusione horum nominum in maximas tenebras incident, omnes qui Phleos & Phleum apud Theophr. confundentes eandem esse plantam putant frustra Stœben cognoscere conati sunt. Phloios quæ vocatur Stœbe à Theophr. lib. 6. cap. 1. enumeratur inter eas quæ præter spinam folium habent, vt Pimpinella spinosa, & non vt vertit Gaza: Plutarcho in vita Thelæi & Aëtio Stœbe. Quod Theophr. cap. 3. lib. 6. tribuat Phleo, Cappari & Tribulo folium hispidum, mendum esse suspicor, ait Bellus, &c.

Scabiosa minor tenuifolio Matthioli negatur esse, vt quidam voluerunt, S. æbe.

Stœbe Salmantica Clusii 2: est nobis laceræ genus siue Stœbe Salmantica foliis mollihus.

Stœbem Salmanticam tertiam Clusii, inscripsimus Scabiosam squammosam argenteam.

Stœbe & Scabiosæ Candiz Anguillaræ titulum fecimus, Iacea squammata Cretica, quibuldam Scabiosa Cretica.

Stœbes Salmantices genus, Centaurii maioris speciem fecimus tenuifolia. Stœbè argentea incana

E 2

Stœbe Galeni.

Stœbe alia Galeni.

Colymbada.

An Stœbe Dioscoridis eadem sit cū Phleo Theophr. Anguillæ redarguitur.

Phleos & Stœbe eadem sit cū Phleo Theophr. Phenon.

Gaza not.


Aequiuoca Scabiosa minor Galeni Scabiosa maior com. minor hirsuta Iacea Galeni Salmantica foliis mollihus. Scabiosa squammosa argentea.

Xeranthemum stoebe spinosa.
Stoebe Rosmarifolia
Pimpinella spinosa
Vulnaria rustica.
Sagittaria
Sparganium
Palma humilis.

Aldroandus quandam cognominavit. Stœbe incana, dicta est de nostro Xeranthemopo. Stœbem spinosam ex Dodongo proponimus. Stœbe Rosmarini folio Ponz. Stœbe Drosocor. Pimpinella spinosa differt à Galeni Stœbe: vt tradit Honor. Bellus, quæ opinio & nobis placet, vt ostendimus suo loco. Stœbe dicitur de Vulnaria rustica, de qua H. n. g. lib. 17. Sagittam quidam putant esse Stœben & Phlœo Theoph. vide lib. 8. Phleon apud Theophr. neutro genete cuius fructus Anthella in stagnis Cæalpina. Phleon Cordo de Chamatiphes, vide Hist. l. 3.

STOEBE SALAMANTICENSIS PRIOR Clusij, siue Iacea Intybacea.

Descriptio. **C**aulis cubiales, striati, subhirsuti, fungosâ Cmedulla fracti, valde ramosi: per quos ramolque conspiciuntur folia. Cichorij laciniata, nigricantia, hirsuta, duas, trêsvè vncias longa, vix



Stoebe Salmantica Clusij.

Stoebe Salmantica prior Clusij.

Aphyllantes Dod.

Iacea Stoebe dicta maior fol. Cichor. Locus & tempus.

culmum lata, in laciniâs nihilominus cæsa, vel serrata: capitula summis ramis hærent, Cyani paria, turbinatiora, glabris nitidisque & politis, albicantibus, per extremum rubentibus squammis imbricata, è quibus florum emicant stamina purpurea, quibus marcescentibus pappi dehiscente apparet capitulo.

Clus. Hist. & Hist. post. lib. 4. pag. 11. Stœbe Salmantica r. vel prior, ad Scabiosas seu Iaceas referenda, & à Salmanticensibus Stœbes nomine insignita, quod extrema folia vtrunque aculeata sint, ac istic Cabequela dicta, h. e. capitulum.

Lobel. Icon. Plant. pag. 543. Obliq. 291. & 294. Stœbe Salmantica maior Brancionis, quæ ima folia Scabiosæ Hispanicæ & Sequanorum Cirsij media habet. Radix oblonga, nonnihil fibrosa. E cubitalibus & duorum pedum caulibus in longioribus petiolis & squammoso capitulo flos Cyani purpureus. Semen Cnici sed minus. Vniuersa planta gustanti peramara, præscica, adstringens.

Dodon. Lat. in fol. p. 125. Aphyllantes. Is negat esse Stœbe.

Camer. hort. Stœbe Hispanica Clusij. H. Lugd. p. 119. Scabiosa seu Stœbe Salmantica prior Clusij. Tabern. Icon. & Hist. Stœbe maior, Gross Stœbenfraur C. Bauh. Phyt. Iacea 16. siue Iacea Stœbe dicta, maior folus Cichorij.

Creuit mihi Genevæ in horto ad aliquot cubitos. Primo vere florentem reperi in itinere Monspelio versus Frontig. Sata Montbelgardi in horto E. C. provenit per fratrem C. Bauhinum misso femine, nomine Stœbe. Frequentem tradit Clus. in Salmanticensi agro in aruorum & vine-


torum marginibus, florere Junio, Julio, & Augusto, & subinde semen proferre: In Belgia autem non nisi altero à sâtu anno. Prouenire obleruauit Tabern. in incultis locis secus vias ad agros & vineas inter Wormatiam & Francenthal.

STOEBE SPINOSA.

Exstat Stœbes spinosæ imago in vetere Cælo. Locu. faretæ bibliothecæ codice: huiusmodi spinosam Stœbem Dodon. suâ ætate reperiendam esse dixit in Cypro atque Peloponneso, vulgò Morrea, planis ac apricis locis, vnde aridam secum attulerit Dominus Bernhard. Paludanus stirpium diligens obleruator.

Dod. Lat. in fol. p. 123. Stœbe ex codice Cæsa. reo. Casp. Bauh. Phyt. Iacea 22. siue Stœbe spinosa, quam Cyani maritimi nomine se accepisse ait.

STOEBE CAPITATA ROSMARINI FOLIO Ponz, siue Chamæpitis fruticosa Cretica Belli, aut Iacea fruticans Pini folio Casp. Bauhin.




Ex albicante radice lignosa, & aliquantulum fibrosa, varij effertur canles teretes, modo Coronariæ Libanotis, triû circiter cubitorum, quadam canitie aspersi: profert folia vt ipsa Libanotis, sed longiora multo, & acuminata magis, quæ paulatim flaccidafacta, ita sese coarctant, vt omnind appareant Pinastri

folia, quæque supernè subirefcent, infernè albicant, cum quadam lanugine, vt & cauliculi: in ramulorum fistigis edit capitula quemadmodum Stœbe S. Salmantica prima Clusij, quasi magnitudinis Centaurij maioris, cui etiam flos similis est, nisi quod magis purpureasit: semen retinet Cnici, sed nigricans: perennis est planta.

BEHEN ALBVM RAVWOLFFII.

Ex radice folia prodeunt magra & acuminata Lapathi instar, rigida vt Pyri folia: ad quorum ima quatuor alia minora aduersaque disposita sunt: cuiusmodi etiam in cauliculis teretibus conspiciuntur: quorum quidam etiam ad cubitalem altitudinem assurgunt, superiora etiam planè adhaerent cauli, vt in Smyrnio Cretico. Horum summitatibus capitula squamata oblonga, luteâque insident singularia: è quibus flos quoque luteus emergit.

Radix



Rauvolf. itin. lib. 2. cap. 12. verum Behen Ar-
 abum, quod etiam nostro seculo vocant Behemē
 ackma. Item parte 4. inter fig. 288. Behemen
 abiad Arabum, id est Behen album.

Ad radices Libani prouenit hoc Behen al-
 bum auctor est Rauvolfius descriptionis
 auctor.

CENTAURIUM MAIUS

Veteribus.

CAP. V.

Ex Theophr. Centaurii vox, cuius etiam Hipp. lib. 1. de af-
 fect. intern. meminit, passim apud Theo-
 phrastum legitur. Ac primum quidem de Hist.
 plant. lib. 9. cap. 1. hæc habentur. 'Accidit verò,
 ut vel proprium succi colorem plantæ nonnullæ
 fiantur: aliis enim albus, ut lactuosus: aliis
 sanguineus, ut Centuriæ & spinæ quam Attra-
 xylidem appellant: aliis viridis, aliis albus color:
 sed plantis hoc in annuis, & anouerlario caule
 præditis, quàm in arborum genere. His addit
 dicto libro cap. 14. Centauris decem vel duode-
 cim annis durat, pinguis hæc, spissaque admo-
 dum est. Capite verò 9. eodem libro ait. Atilla
 veluti commientia, & è longinquo ducta appa-
 rent, Pæoniæ enim quam alii Glycy pedem vo-
 cant, noctu effudiendam præcipiunt: nam si in-
 terdiu, & à primo Martio vitus quispiam sit fru-
 ctum quidem legens, oculis periclitabitur, radi-
 cem autem si secat ei pedes procidit, *κνταυρίδα*
 quoque secantes [accipitrem] triorchyn nuncu-
 patu cauere, ut sine vulnere nō possint discedere,
 & alia huiusmodi de quibusdam aliis narrat.
 Precari autem in secando haud quidem absur-
 dum fortasse sit. Sed quæ addunt, absurda potius
 dixeris. Hæc Theophrastus, apud quem lib. 9. cap.
 1. hist. legendum censemus pro *κνταρίς*, *κνταυρίς*,
 scilicet errore, quum Plinius etiam ita legisse vi-
 deatur. Item lib. 9. cap. 14. *κνταυρίς*, ubi Gaza
 malè vertit Fel terra. Item lib. 9. cap. 9. hist. vbi
κνταυρίς legitur non benè vertit Febri fugax:
 sunt ea nomina Centaurii minoris: quamobrem
 non videtur animaduertisse in Theophrasto dis-
 crimem inter Centaurium maius & Centaurium
 minus. Gesner. lib. de Æuib. cap. de Triorchæ le-
 gendum putat Centauro. Plinius, ut apparet è
 Tom. III.

Centuria *Atraxylis*

Centauris

Centauris *Triorchis*

Theophr. *cor-*
rigitur.

Gaza error

Centaur.
minoris no-
mina.

capite 6. lib. 15. legit Centauridi, ubi locum Theo-
 phr. de iis qui Centaurium secant & à Triorchæ
 vulnerantur cap. 9. lib. 9. hist. malè vertit. Ego
 [Dalechita namque propriâ manu adscriptis] ni-
 hil mutandum censeo. Centuriem quod exulti-
 mem illam herbam esse, rubro succo turgentem, quâ
 quam sanguinem Drachonis vocamus.

Nas contrâ existimamus Theophrasti verba
 posse de Centauro magno interpretari, quan-
 doquidem ei radix subrubra, teste Dioscoride, di-
 cente: Centaurium magnum aliqui Narceon vo-
 cant. Folia habet Nuci regie similia, prælonga,
 colore viridia; ut in Brassica, sed ambitus ipsorum
 incisuras habet ad terræ modum. Caulum habet
 instar Lappathi, duorum cubitorum aut etiam
 trium, atque hic à radice multas propaggines ha-
 bet, in quibus capita sunt Papaueri similia, in
 ambitu oblonga. Flos est caruleus. Semen si-
 mile Cnicio; velut in lanuginosis floribus in-
 situm. Radix crassa, solida, grauis, ad cubitos duos
 extensa, succi plena, acris, cum quadam adstrictio-
 ne ac dulcedine, subrubra. Amat terram pin-
 guem, apicam, & syluas ac colles. Copiosa est in
 Lycia & Peloponneso, in Helide & Arcadia ac
 Messenia: & circa Phloë, & Lyciam, & Smyr-
 nam. In fine capitis post vires, appellata est
πανακή (Panacea) &c.

Plin. lib. 25. cap. 6. Diosc. descriptionem decla-
 rat his verbis, Centaurea curatus dicitur Chiron,
 quum Hercules excepti hospitio pertractanti arma,
 sagitta excidisset in pedem. Quare aliqui
 Chironion vocant. Folia sunt lata & oblonga,
 ferrata ambitu, densa ab radice; caules tereti
 cubitorum geniculati. In his capita ceu Papaueri.
 Radix vasta, rubescens, tenera, fragilisque,
 ad bina cubita, madida succo, amara cum quadam
 dulcedine. Nascitur in collibus pingui solo. Lau-
 daissima Arcadia, Elide, Messenia, Phloë, & Ly-
 cao, atque in alpinis, pluribusque aliis locis. In
 Lycia quidam & ex ea Lycium faciunt. Vis in
 vulneribus tanta, ut coherescere etiam carnes
 tradant, si coquantur simul. In usu radix tantum
 duabus drachmis bibenda, quibus dicitur, si fe-
 bris sit, in aqua trita: ceteris in vino. Et addit:
 Medetur & omnium morbis decoctæ succus.
 Hoc autem in Dioscoride ad finem habetur sic,
*ἐκ τῆς δὲ πανακῆς ἐκείνης αὐτὴ τὴν φλεγ-
 ματικὴν καὶ τὴν πυρετικὴν*. Quanquam hoc in plerisque
 exemplaribus non habeatur, sicut neque ea
 nomina, quæ paulò post ab Apuleio referuntur,
 & ad finem inter supposititia à Cornario relata
 sunt. Plinius tamen clarius ejusdem libri cap. 4.
 dicit. Quantum genus Panacæ ab eodem Chiro-
 ne repertum, Centaurium cognominatur. Distin-
 guit tamen Lucanus poeta hæc versu:

Ex Panacæ potens & Thessalana Centaurea.

Tertia [pergit Plinius ejusdem lib. cap. 6.] est
 Centauris Plinio cognomine Triorchæ. Qui
 eam secat, retum est ut non vulneret sese. Hæc
 succum sanguineum mittit. Theophrastus de-
 fendi eam, impugnatique colligentes tradidit
 Triorchæ accipitrum genere, à quo & nomen ac-
 cepit. Imperiti confundunt hæc omnia, & pri-
 mo generi assignant. Huc usque Plinius, cui
 Theophr. lib. 9. cap. 9. errandi occasio præ-
 buit.

Centaurium, ut refert Apuleius cap. 34. à Græc. *πλινίου* *lapp-*
dis dicitur Maronion, aliis Nesson, aliis Petre-
 thronia, quibusdam Limnites. Sed Prophete eam
 plantam nominant Hema heracleon, alij Chiro-
 roniam, alij Limnestin, alij Apogonifapon, alij

Polyhydion, alij Hemeroton, Egyptij Antiamas, Ital: Felterra, siue Vneferam. Maronion quidem appellatum est à Thracie monte Maronia, quoniam plurima ant probata illic nascitur. Quemadmodum à Chirone Centaura Chironia; Sic etiam à Nello, siue Nello, qui Centauri fuerunt, Nello appellata est Centauria.

Pelethronia Pelethronia dicta à monte Thessalix, vbi Lapithæ quondam equitandi artem, cuius ipsi periti, alios docuerunt, inter quos & Chiron Centaurus censetur. Limnitis, id est paludalis & stagnalis, dicta, quod secus aquarum scatebras & paludes, quas Græci λίμνες dicunt, nascitur. Et eadem est ratio cur aliqui Limnestin vocauerant & Limnesion. Hæma Heracleos (id est sanguis Herculis) appellata est, eò quod, quemadmodum Hercules immania monstra edomit: sic etiam herba huius radix à quacunque humani corporis parte fluentis sanguinis impetus domat. & consistere facit, seu quod radix ipsa & succus eius sanguinis modo rubescant. Polyhydion, id est, multi aqueam & succosam: succo enim plena est illi radix, & locis succosis ac pinguibus lubens etiam nascitur. Hemeroton dici potuit à māfuitudine & dulcedine quadā saporis quæ in radice sentitur: licet enim sapore sit acris & stipescante, nihilominus tamen dulcedine aliqua participat, ^{quæ} autem Græcis mansuetus dicitur. Appellatio Felterra ex minore Centauria maiori adiecta est contrario sensu. Constat enim rā ipsa maioris radicem dulci quodammodo sapore dotatam, minoris verò amaro: quare fel quod amarum est, minori & non maiori conuenit, quod Plinius etiam testatur vbi de minore agens dicit, Hoc Centaurion nostri fel terræ vocant, propter amaritudinem summam.

Conuenit radix ruptis, autore Dioscoride, conuulsis, pleuritibus, spirandi difficultati, tussis antiquæ, sanguinem spuentibus: non febrientibus cum vino, febrientibus cum aqua, ita vt radice trita drachmæ duæ dentur. Similiter ad tormina & veteri dolore. Dicit etiam mensiles & foetus, in collyrii figuram derafa, & vtero apposita. Eadem & succus facit. Est & vulneribus idonea, dum quidem humida est, contusa: arida verò prius madesfacta, atque ita contusa. Committit enim ipsa & glutinat. Quin & carnes dum coquantur inter se committit, si quis ipsam contusam simul coquat. In Lycia succum ex ipsa exprimunt, & pro Lycio vtuntur. Appellata est Panacea, quoniam omnes inflammatas affectiones ledat.

Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in vfu contrarios effectus præstat, id attestante Galeno: Gustu itaque acris simul adstringenque apparet cum leuicula dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostentat, menses prouocans, & factum mortuum euellens, viuūque corrumpens atque efficiens. Adstrictio verò, opera crassæ terrenæque frigiditatis, cum vlcera glutinet & sanguinem reiciendis proficit. Exhibetur autem eius drachmæ duæ, febrientibus quidem cum aqua, febri verò liberis cum vino. Porò secundum omnium simul qualitatum actionem, ruptis, conuulsis, dyspnoæ siue spirandi difficultati, tum inueteratæ tussis conuenit. Nec enim talibus euacuare solum quod præter naturam est oportet, sed partem quoque euacuatam corroborare ac confirmare: Eadem quæ radix & succus ipsius efficit:

*Maronion.**Nello.**Pelethronia**Limnitis**Limnestin*
*Hæma Heracleos**Polyhydion**Hemeroton**Felterra.**Vires ex*
*Diosc.**Rad. trita*
dusi
Alicui
Collyrium.
*Vulnera.**Lycij succo-*
dancum.
Panacea
*Ex Galeno.**Forma mor-*
*tui.**Dispensa.**Ex Plinio.*

Eadem quæ Dioscilli tradit etiam Plin. & Mederi ouium morbis: ac valere contra venena ac magicas artes, & radicem in vultu doloribus prodesse. Contrita & imposita, inquit Apuleius, tumorem fieri non patitur. Ad sugillationes & dolores succus perendus ex aqua summo facit. Ad vlcera recentia tam efficax est, & ad plagas glutinandas, vt etiam carnes coherescant, quæ ex aqua eius coquantur: In vino decocta & potui data, splenem perlanat.

Mirum nasci, inquit Humelbergius, tamdiu latuisse Medicos, & adhuc etiam multos ignorare quænam planta sit Centauria maior, ipsa quæ longè alia & diuersa herba vlos pro Centauria habuisse, quum tamen in multo vfu & honore atque pretio eam semper habuerint, & adhuc nostro tempore etiam habeant: sed ignorantibus ipsam esse Centauriam, alieno quæ hoc est Rheuponticum nomine, cuius radici assimilatur, appellantes. Nam quam vulgo nunc omnes Rheuponticum vocant, ea verè est Centauria maior, multi vltus contra iccoris atque lienis mala.

Rhaponticum igitur Pharmacopolarum nostrorum non est Rheum Ponticum sed potius Centaurium maius Iuglandis folio, de quo mox dicendum. Scabiosa alpina maxima, falsò ab aliquibus Centaurium creditur, cui antè monstrauimus. Quam nos paulò antè Centaurium collinum inficimus, eam Iaceam collinam maiorem dissectis foliis, Iaceam montanam squamulo capite, & Centaurides maius cognominat Schvvenckf. Cetaurium collinum maius C. Bauh. Centaurij maioris speciem Gesnerus. Centaurij maioris quædam species in muris & alperis locis nascens Gesneri, est nobis Centaurij maioris species tenuifolia. Panco autores comperit Hieron. Brunchvieg, quibus nota sit Centauria maior, quamquam quidam experti dicant esse Matricariam, quod non affirmat Apuleius, vt videre est apud Tragum lib. i. cap. 42. Enulm quoque Centaurium vocat. Centauria radice nomen quidam attribuant Centauri, autore Dioscoride, vt testatur idem Tragus lib. i. c. 42. & 56. Tragus adhuc lib. dicto cap. 42. Aquileiam Centaurium cognominat Germanicum. Dioscorides, vt legitur apud Tragum lib. & capite iam scripto Hyosciamum Centaurium vocat. Auicenna, inquit Campef. in spec. pharmac. bis ponit Centaurium in Theriaca, per ignorantiam omitteus Pentaphyllum. Pro Centauria ponit Polium Tract. quid pro quo. Non desunt qui sibi & aliis persuadere conentur eam plantam esse Centaurium, quæ Lyfimachia spicata dicitur. Androsæmum à recentioribus Chirurges Matrisylua dicta, inquit Cæsalp. lib. 9. cap. 43. fortè apud Theophrastum Centeria fuerit, quam recenset inter plantas succo sanguineo constantes. Androsæmum hoc Cæsalpini, est nobis Siciliana, de qua agemus H. n. g. lib. 19.

*Ouii morbi**Vlcera.*
Canceroma
Sugillationes
*Dolores.**Centaurij*
maioris mo-
nine donata
*planta.**Rheuponticum.**Centaurij*
maius Iug-
landis folio
Scabiosa al-
pina maxi-
*ma.**Centaurij*
maioris spe-
cies tenuifolia
Matricaria
*Enula.**Centauria**Gentiana.**Aquileia**Hyosciamum**Pentaphyllum**Polium**Lyfimachia**spicata.**Siciliana*

CENTAVRIVM MAIUS IUGLANDIS FOLIO.

Centaurij maioris caulis rebus, hominis pro-
Centatem assequitur, in ramos circa lumina-
tatem diuisus: folia amplissima in alæ formam
disposita, quarum singularia epithamam ferè long-
ga, trium aut quatuor unciarum latitudine, per
ambitum serrata, neruosa, glabra, latitudine vltima
at primum

Descriptio



*Centaurea
non est
Rheumpon-
ticum.*

*Discrimen
inter Rha-
ponticum
antiquorum
& officina-
rum.*

*Centaurea
Diosc. Tra-
go.
Herculis
sanguis.
Vnifera
Apogorisapo
Kantaurion.*

*Radix Rha-
pontica.*

at primum
prodeuntia so-
lia integra sunt
nec dissectione-
nem agnos-
cunt: capitula
suscultis ex-
tremis insident
squamis, & quibus emi-
cant flores sta-
minibus pur-
pureis contex-
ti, in pappo e-
nascuntur. Si-
men nitidum,
oblongum: ra-
dix rubens,
cassiuscula,
longa, recta:
Figura nostra
quae iam erat
facta minis
placet. Quia
autem ex em-
ptis sculptis e-
rant, nec tem-
pus meliores
fieri permisit,
his uti cogeba-
mur.

Tametsi do-
ctis inquit
Corn. videat-
ur Centau-
rium maius esse
id quod Offi-
cina hodie
Rheuponticum
vocant: &
huic etiam
Diosc. ac Plinii
descriptio ma-
gna ex parte

respondeat: tamen habent Officina aliud quod
pro vero Centaureo maiore ostendunt, quod ta-
men descriptionem Dioscori. nulla parte refert.
Rhaponticum illud Antiquorum auctore Ta-
gaulio, de simpl. med. purg. longè diuersum est
ab hac radice quae nunc ab Officinis Rheuponti-
cum nominatur. Nam Veterum Rhaponticum,
radix est fungosa, pondere levis, laxo contextu:
Hae verò grandis, solido concretu ponderosa.
Addi quod illa, si oris salina diluatur, colorem
reddat ad Crocum inclinantem: haec ne palli-
dum quidem, verum cum recens fuerit rubro
mader succo, siccata nequaquam inscit croco si-
lium: Leoniceus ac docti ferè omnes huius
seculi medici radicem Centaurii maioris, Galeni,
Plinii & Diosc. arbitrantur.

Trago lib. 1. cap. 42. dicitur Centaureum Dios-
coridis, quod alius nuncupatur Narce, alius Lim-
nefis, Magis Herculis sanguis, Romanis Phieri &
Vnifera & Fel terrae. Quodque Apuleius sequen-
tibus insigniuerit appellationibus, Pelethronia,
Limnites, Limnolitis, Apegorisapo, Polyctidios,
Hemerotos, Antiamas, & Fel terrae: Serapio
cap. 304. Kantaurion, & Kibir, alii verò
Centauream solidam dici assument. De Centau-
rio maiore praeterea loquitur Tragus cum ait.
Quod ad Rhaponticam radicem attinet, non de-
sunt inter doctos qui Centaureum maius esse af-

feruerit [vide Antonium Musam,] quod si ita est,
nobis quoque Germanis in altissimis Heluetiae
alpidibus, maxime verò in montanis Sedunorum
nobilissima ac decantatissima radix prouenit. E-
ius historiam Antonius Musa diligentissime des-
cripsit. Quod si verò quis querat, cur Aquile-
giam nostram Centaureum appellem, eum vicis-
sim ego interrogabo, quare Dioscorides Hyos-
cyamum, Rhaponticum, & Gentianam Centau-
rium vocauerit.

Centaurei magni radix, Rheipontici appel-
lationem hodie in officinis medicorum retinet,
nulla profecto alia de causa, quam quod tum
postquam in veri Rheipontici penuria medici
eius succedaneo Centaurii magni radice uti ce-
pissent: quae Rheo pontico, Dioscor. auctore,
forma & facultate similis est: sensimque è medi-
corum cognitione verum Rheum Ponticum
abiisset, eò tandem ventum sit, ut quum proflus
iam ex illorum notitia exiisset, eius succeda-
neum verum esse Centaureum maius crederent,
adeoque eius nomen in Centaurii magni radice
transferrent, quod etiam hodie retinet.

Centaureum hoc maius Pharmacopolis ha-
ctenus improprie Rhaponticum dici testatur
Cordus in Dioscor. notatque Ant. Musam, quod
absque necessitate hoc negarit. Idem ait alibi
Fellis terrae appellationem male ad maius Cen-
taureum transiisse apud Theophr. Gazam. Idem
in Hist. Centaureum maius vocat, de scribit, ac di-
cit in omnibus hodie Pharmacopoliis & à cun-
ctis Medicis Rheu siue Rhaponticum appellari
magno errore.

Huic Gesn. addit figuram, à quo in Obs. silua
Centaureum maius Germanicum appellatur: de
hort. verò, Centaureum maius vulgò Rhaponti-
cum alterum foliis Iuglandis ferè.

Centaurea maior dicitur Amato, de qua ait:
Hae absque ambagibus & controuersia vlla;
Rhaponticum Officinatum est. Caterum Theodorus
Gaza in Theophrasto, perperam huic Fel terrae
nomen indidit, quum hoc nomen minori Centaureo
potius obinsignem eius amaritudinè conueniat.

Ceterum contendat licet Musa Ferrariensis
Medicus clarissimus, radicem qua Rhapontici
loco plerumque Officina utuntur, Centaurii ma-
gni radicem non esse: is tamen hac in re decipi
[pace eius dixerim inquit Matth.] manifestè de-
prehenditur, cum ea radix, quae vulgaribus Rha-
pontici vicem explet, omnibus sanè notis Cen-
taureum magnum repraesentet. Quippe quod
crassa sit, grauis, compacta, tripedalis, & rubeo
succo praegrans, qui gustui non modò quadante-
nus sit acris: sed etiam cum aliqua adstrictione
dulcis, quin etiam [ut nos quoque obseruauimus]
striata, & fuculi modo contorta. Adde
quod & folia, caulis, capitula, flores, & semina
illi prorsus sint eadem, quibus constare Centau-
rium magnum Dioscorides & Galenus memoriae
prodiderunt. Ea, quae hodie ad nos conuehiunt,
Gargano praclarissimo Apuliae monte numerosa
nascitur: quin & in aliis Italiae locis, nempe in
Veronenfi agro Baldo monte, quem Benaci al-
luit vnda, sed infirma radice si ad Apulam com-
pares. Porro utriusque Centaurii vno tantum
capite mentionem facit Melues: sed adeò alte-
rum cum altero miscet, ac confundit, ut miran-
dum non sit, si à nonnullis ætatis nostrae diliger-
tissimis rei herbariae Inquisitoribus acriter fuerit
accusatus, etsi nouus quidam Melues ipsius
Commentator friuolis argumentis, horum do-
ctissimorum virotum censuris refragari nitatur.

Aquilegia

*Anton. Mu-
sa repreh-
Fel terra
male Cen-
taureum
maius dicitur
Error quorundam.*

*Cent. maius
Germ. Felis
Iuglandis*

*Centaurea
maior de
maius.*

Musa error.

*Centaurea
magnum.*

Locus.

*Confusio
Melues.*

*Auicenna
error.
Serap. er-
ror.*

Plinij error.

*Vires ex
Matib.*

*Nomina
linguarum*

*Centaurij
magnum
Dodonaei.
Centaurij
maioris duo
genera.
Differentia
eorum.*

*Dodonaei
reprob.*

*Lob. redar-
guitur.*

*Centaur.
maius Gual.
Centaurij
Diosc.*

*Centauria
maior.*

in tam aperto illius errore. Quinetiam Auicenna, qui cum illo pariter errat, & cum utriusque Serapio. Siqui dum is scripsit ex auctoritate Aben Mesuaj, Centaurij magni radicem lentam trahere pituitam, simul & bilem, & coxendicum doloribus opitulari. Quae tamen facultates Centaurij maioris non sunt, sed minoris, ut alibi explicabitur. Ceterum neque Plinius ab errore vindicari potest, qui tamen in Centaurij magni historia lib. 25. ca. 6. in omnibus serè Dioscoridi subscribat, in facultatibus tamen errasse videtur, quod Centaurio maiori amaritudinem cum quadam dulcedine tribuerit: cum amaritudo non in maiori, sed in minori tantum deprehendatur. Datur Centaurij magni radix Hydropicis, Icteticis, & Iocinorosis, tum vino macerata, tum in puluerem pota. Radicis recentis succus vixit pondere haustus, ac etiam vulneri illitus, auxiliatur à serpente demouiss. Hae Marth. passim in suis comm. qui pingit ac dicit, Centaurium magnum nil aliud est, quam radix praeteritae nuper aetati Rhaponticum credita, Graecis *νερταύριον* uel *νερταύριον* uocatum, Aphris Chantaurion Kibir, seu Sacurion habere, It. Centaurea maggiore, Gerin. Reupontich, Hesp. Ru'pontic, Gall. Rhepontice. Sed pingitur etiam his nominibus pro Centaurio magno à Camer. in Hist. Mith. germ. & Epit. eiusdem.

Arguill. dicitur Centaurium maius, in Apulia Rhaponticum uocatum.

Dodon. Hist. purg. & lat. in fol. Centaurium magnum duplex statuit, licet in Hist. gallic. vnius solum meminerit. Effigie & naturā abesse Centaurium paruum à maiore satis constat. Maioris autem duo genera [inquit Lob. in Aduer.] foliorum incisurā duntaxat differre videntur, magis quam radicem, quae utriusque cum maxima, equat carpum humanum: colore Pentaphylli: flavo succo, subrescente: flos & semen utriusque eadem: folia verò ex vno octona, aut septena, non pediculo, ut in alio, sed medio nervo aptata, tarsi aut serraturae modo, serrata & profundè laciniata: radices coniformes, quae sicutae utriusque Rhapontico falsò eadem olim putabantur. Iam utrius nullo discrimine vtuntur sanguinem spuentes & asthmaticis etiamque matricis foridibus educendis, vtiut Dodonaeus, quem artius possent hic erroris insimulare Cretici, quam eius Centaurij maioris iconem, ut non legitimam reculare. Nam illic potuit decipi, Arabes sequutus, qui vires maioris & minoris serè contrariis confuderunt, hic neutiquam. Vireta enim Belgica plurimas huius Serratifolij sunt plantas, vni optimas, & nulla nota à vulgatiore, nisi folijs iuglandis, discretas. Semen utriusque Cnici simile & par, in capitulo squarroso. Iacez nigrae maioris: flos ex purpura albicat. Hoc posterius, Belgicis hortis frequentius: rarius autem Alpinis tractibus, ubi alterum frequentius etiam spontè. Et hac inibi Lobelius. Sed quid sibi velit cum sua censura circa vires ex Dodonaeo adscriptas non video: eadem enim sunt non solum apud Arabes, sed etiam apud Dioscoridem & Galenum. Vocat autem is Centaurium maius suum duplex, Gall. *grand Centauree* Belg. *Groote Scentory*: Belg. *gread Scentory*. Ico. plant. p. 712. eundem cum D. d. lat. habet figuram hoc titulo. Centaurium maius. Sed & Clus. Hist. post. eam proponit hac inscriptione, Centaurium maius i. vulgare, Centaurium magnum quale à Dioscoride descriptum est, vulgaris omnino notitia. Est sine descriptione.

Celsalp. Centaurea maior in monte Gargano

Apuleiae nascitur eius radix in officinis pro Rhapontico venditur, exterius nigra, interius subrubens, crassa, & longae: folia ab radice fert erecta, familia Cerretae, sed multo maiora, sectionibus vtrinque digito latioribus, instar folij Nucis: caules fert rectos, ab eadem radice plures, paucis ramis, bicubitales, amphoraeque, in quibus pauca folia: cacuminibus capitula Cyathis grandiora, flore purpurascens: semen Cnici simile inter lanugines.

C. Bauh. Phyt. p. 183. Centaurium i. siue maius folio in plures partes diuiso, quod Officinatum est Rhaponticum: Rhapontica Centaurea maior habita Trago sine icon.

H. Lugd. p. 1287. Centaurium maius, vt & Camer. hort. quod hic ait à Centauro Chirone sic dictum, à quo *Βοτάνη* Achilles edoctus fuit. Affertur ex Apulia de monte Gargano siue S. Angeli dicto, ac pro Rhapontico venditur.

Tabern. Icon. & Hist. Centaurium maius, vulgò Rhaponticum. Schv. v. enckf. Centaurium maius, Centaurium maius serratifolium.

Centaurium maius folio Iuglandis prouenit mihi Geneuz in horto ex semine: Lugduni habebam in horto: Basileae vidi in horto Dr. Caelii Secundi Cunionis praceptoris, & Dr. Dis Theodori ZWingeri & Humelij Pharmacopoei, ipse etiam habui in horto patris florentem Maio quod excreuerat ad altitudinem hominis: Patuij in horto publico & Dr. Cortusij mense Februarii. Cutis Rhatorum in horto. Mortbelgardi in Horto Ill. E. C. satum aliquoties prouenit, verum perit priusquam caulem protulerit.

*Centaurij
maius folio
plures partes
diuiso.*

*Cent. maius
serratifolium.*

*Locus. &
tempus.*

CENTAVROIDES FOLIO GLABRO flore flauescens.



Cubitalis Descriptio.

Cubitalis est planta, caule glabro, ramoso, teretifolia dodrantalia & longiora, glabra, glauca, in multa segmenta ad costam vique diuisa, quae quidem segmenta, alias opposito situ respondent, alias verò minus, crassiuscula, nervo bifido per longum expositum.

Et, in ambitu raris denticulis crenata, aliàs integra, sapore oleraceo: singulis porrò ramulis singula insidè: capitula Oliuæ magnitudine, sed formā conicā, splendens, imbricata, tam accuratè squamularum commissurā contexta, vt laeua esse videantur, nec villā asperitate molesta, è quibus emicant flores staminei, dilutè flauedine imbuti.

Esti cum Centaureo collino luteo Monspeliensi *Discrimen* magna huic sit similitudo, omnia tamen in hoc inoffensā leuitate politiora sunt, squammæ item capitulorum viridantibus striis pictæ, obtusæ, nullis

*Discrimen
Centaurij
collino.*

aulis vel spinarum rudimentis donatz, cum Centaurium collinum luteum, Monspeliense squammas habeat minimè striatas, spinulis in ambitu ruffis, mucrone mordaci aculeato.

Stuckgardiz in horto Ill. n. c. donauit D. Schvvariz nomine Centauri maioris siue Rha- pontici Officin. la n etiam in horto Montbelgar- di vbi Augusto & Septembri floret. Consideran- dum an eadem sit planta, quam apud Fratrem vi- di siccam anno 1994. nomine Centaurii magni flore luteo & folio vndique glabro, ex monte Buldo.

CENTAVRIUM MAIVS ALTERVM
folio integro.

Descriptio



Hoc Cen- tauriū de- scribit, ni falli- mur, Clusius, dum ait. Longa habet folia, non in laciniis diui- sa vt vulgare; sed Armoracia foliis non dissi- milia, & ad Gla- sti foliorum hu- mi expansorum similitudinem plurimum ac- cedētia, per am- bitum tamen serrata, saturæ viriditatis, & a- mariusculi sa- poris: caules in- ter folia pro- mum bifidi aut trifidi, squamata capita sustinen- tes, Centaurii maioris primi æmula: florem villō- sum, coloris albescentis, inftar vulgaris: semen Nicot ferè simile, seu, vt verius dicam, vulgaris, summo hirsutum, & molli lanugine inuolutum: radicem valde crassam, duram, longam, denso cor- tice tectam, foris quidem nigro, interna verò par- te flauescēte, succumque croceum resudante, qui cum amaritudine quadam aromaticus est.

Synonyma

Lobel. Obs. p. 409. eandem cum Dod. lat. habet figuram hoc titulo, Centaurium maius alterum, Centaurii maioris varietas.

Cent. mag. alt. Dod.

Dodon. Hist. purg. & lat. in fol. p. 335. Centauriū magnum alterum folio rō dissēto, verum Lapa- thi modo, longo, lato, simplici atque indiviso, per ambitum tamen serrato: caule breviori, floribus; semine, radice, priori cōformibus. Atq. huius Cē- taurii maioris meminit auctor (qui Galenus fertur) libri de virtutibus Centaurii ad Papiam, Cratēā adducens testem, in libro eorum quæ effodiuntur: vbi duæ Centaurii species referuntur, maior & minor, ac maior foliis describitur Lapathi.

Cent. Lusi- tan. Clus. Rha- pontici Error Ba- manorum.

Clus. Hisp. & Hist. post. l. 4. p. 9. Centauriū ma- ius 2. siue Lusitanis Tagi accolis Rapōtis, hoc est, Rha- ponticum nominatum, vulgarem Pharmacopolarum etrorem sequutus, qui notius Centau- rium-maius, eo nomine donant.

Cent. ma- ius fol. dissēto C. Bauh.

C. Bauh. Phyt. p. 188. Centaurium maius 2. folio non dissēto. Cum Rha- pontico, inquit, folio He- lenii quidam idem volunt; ac illius folia subrus incana & villosa sunt, huius verò intenso sunt vi- rore, vt Clusius monet.

Locus:

Simplicis folii Centaurium maius Dodonæo; Hispania mittit, atq; adneq; Antverpiā radices, Tom. III.

terraq; commissa; subinde in hortis reuirescūt. Supra Olyssipponem, lapidosis iuxta Tagum col- libus duntaxat inueniebam inquit Clus., in Bel- gica peregrinum omnino: nam tameris radicē ad amicos inde miserim musco madido inuolutam, vt facilius conseruari posset, & postea etiā Olyf- sipone acceperim, numquam tamē istic persiste- re, aut illū acē ferre potuit. At Primū illud vulga- re foliis dissētis in omnibus hortis conspicitur.

CENTAVRIUM MAIVS, RHA CAPITA- tum folio Enulæ, tubus hirsuto & incano.

Descriptio



Folio est am- plo. Enulæ si- ue Verbasci ni- gri, magnitudi- ne & formā o- blongā, pronā parte lanugine cinericea obdu- cta, supina verò viridate, per am- bitum serrato; crasso nervo per longum decur- rente, à quo in margines obli- quæ porrigūtur vene, antequam ad oras pertin- gant in venulas alias diuisas, pe- diculo longius- culo, satis cras- so, villoso: caulis, vt scribunt Aduerlatiorum au- ctiores, rectus, capite fastigiatus, foris squa- mulis loricato, ac per maturitatem stamine pur- pureo pleno: semine dum circa Iunium & Iulium maturuit, Centaurii maioris vel Carthami lon- giore: radicem etiam fungosiorē, maiorem, & Rhabar- barato similior quàm Centaurio.

Dodon. gall. l. 3. c. 10. Græcè ῥαδὶς ῥηοῦ radix eius propriè appellatur. Arab. Rheu & Raueo ou Ra- uer. Plinio latine Rhecoma & Rhacoma. Sunt la- tina Rha diuersa genera, figurā non differentia, sed ratione locorum vbi proueniunt & inueniuntur.

Vnum quod supra Bosphorum nascitur, Græcè dicitur ῥαδὶς ῥηοῦ; Lat. Rha Ponticum, aut Rheum Ponticum. Mesuæo Raueo Turcicum: Rha de Turquie. Secundum prouenit in Barbaria & vo- catur Rhabbarum, à Mesæ & Pharmacol. Rha- barbarum. Tertium proueniens in India vocatur Rha aut Rheum Indicum, Medicis Arabibus Ra- uesceni aut Rauefeni. Vidimus, inquit, hinc in regionibus in horto Gasparis van der heiden Loüanii, qui seminauerat & coluerat magnā di- ligentiā. Floret Iunio. Item in Hist. Lat. in fol. p. 385. Rha siue Rheu, vt existimatur, icon. Nullam addit descriptionem, quod mirum, cum olim in Gallica scripserit se vidisse, & descripserit: iconi quidem postrema variat à priori, sed eiusdem plantæ videtur.

CENTAVRIUM SIVE RHAPONTICVM

alterum angustiore folio.

Valdè affine Capitato Rheo, quod ex Italico semine habent D. de Brancion & Georgius Ryensis: sed folia angustiora multo, acuti Lapathi

Descriptio

F

Rha pontica
altera Lob.

lio. Plant. Icon. pag. 288. Rha ponticum alterum
angustifolium.

CIRSIVM VETERIBVS.

CAP. V.

Cirsium
Diosc.Diversa lo-
cū.Diosc. refi-
tūm
Cirsium
Plinio.Diosc. locū
corruptū.Diosc. curri-
gūm

Cirsium [κίρσιον, Ald. cod. κίρσιον, male] ita de-
scribente Dioscoride, caule est tenero, bica-
bitali, triangulari [κίρσιον] ab imo foliis Rose pu-
sillis circumdato (πὺ κατωτέρω φύλλα πρὸς ποδὸν ἐστὶν) ha-
bentibus ex intervallo angulos spinosos, sed
molles, Buglosso similibus, modicè hirsutis, lon-
gioribus (μικρότερα, minoribus vet.) subcandidis,
& per extremitatem aculeatis. Est autem pars
summa caulis rotunda & hirsuta, illique insident
capitula in summo purpurea, quæ in pappos secula-
nugines solvuntur. Huius radicem memorie pro-
dunt Andreas laboranti loco adalligatam [ἀναδου-
μένην, ἀναδεδραμένην] vet. religatam, dolores varicū
[κακὰ τὰ πόδια] perperam Ald.] fedare.

Cirsion, inquit Plinius, cauliculus est tener
dultum cubitorum, triangulo similis, foliis spinosis
circumdatus: spinæ molles sunt: folia bouis lin-
guæ similia, minora, subcandida: & in cacumine
capitula purpurea, quæ solvuntur in lanugines.
Hanc herbam radicemve eius adalligatam, do-
lores varicum sanare tradunt. Et hæc Plinius
lib. 27. cap. 8. qui vt Cornarius attestatur, nihil a-
deo à Dioscoride euariat. nisi quòd folia non Bu-
glosso, sed linguæ bouis similia esse dicit. Buglos-
sum autem folium habere linguæ bouis simile, e-
tiam ipse Diosc. alibi dicit. Deinde minora folia di-
xit, vt qui μικρότερα, legit, quod hodie codices ha-
bent μικρότερα, id est longiora. Illud porò locum
[πὺ κατωτέρω φύλλα πρὸς ποδὸν ἐστὶν] deprauiatum esse, & pro ποδὸν
voca vocem aliam desiderari credit Sarracenus. Ne-
que enim ait is, verisimile fuerit vnus & eiusdem
herbæ folia ab imo roseorum speciem referre, pu-
sillaque esse reliqua verò quæ à caule proflunt,
Buglosso similia & longiora. De caule itidem, κί-
ρσιον πὺ κατωτέρω, legèdum videtur: quoniam pau-
lò post subdit Autor, πὺ ἀνωτέρω τὸ καυλὸν σπειραειν, hoc est, summam caulis partem rotundam esse.
Ita porò imam caulis partem summæ videtur
opponere, dum hanc scribit esse rotundam, illam
verò triangularem. Sed & γωνία seu anguli, de qui-
bus deinde agitur, minime ad folia, sed ad caulem

parta, auersâ
item parte in-
cana, & caulis
rectus, capite
fastigiatus squâ
mulis lorica, ac
staminibus
purpureis Cy-
naræ aut Car-
dii concolori-
bus pleno: sa-
men Cnici syl-
vestris cōpres-
sum agrè ma-
turat in Bel-
giorum radice Cen-
turiij maioris,
fungosior.

Lobel. Obs.
p. 153. Rha Pon-
ticum alterum
angustiore fo-
liis.

potius referri debere videntur. Esti verò suspēta
sit Sarraceno tota ista periculis, attamen verbum
verbo reddere satis duxit, quàm (quod fidum
Interpretem minime decet) citra codicis vilius
auctoritatem liberius quicquam immutare.

Apud Plinium inquit Leonice de error, seu e-
tiam in vetere quodā Diosc. codice cirsii [Cirsii &
rectius] folia linguæ bouis minora scribuntur:
quem puto errorem ex vocabuli Græci similitu-
dine & codicis mēdo quem Plinius habuit, con-
tigisse: quoniam pro μικρότερα, microtera scriptū
inuenit. Ego verò in multis codicibus Græcis non
solum impressis, sed etiam manuscriptis apud
Diosc. μικρότερα. id est, longiora, non autem μικ-
ρότερα, id est minora reperi.

Galenus, Paulus, & Aëtius Cirsion non ha-
bent.

Cæterum, varices, quos Græcorum Medici Erymō Cirs-
omties, Cirsos vocant, Cirsio, de quo nunc agi-
mus, nomen fecerunt: illis siquidem medetur.

Sunt autem qui grandem Buglossum appellant,
Romani Spinam mollem inter nothas Dioscori-
dis appellationes.

Cirsij descriptionem apud Dioscoridem intri-
catam esse scribit Anguillara, ideòq; fatetur, quid
sit, se dicere non posse.

Cirsij nomine sequentes donatur plantæ. Cirs-
ium Dod. gallici volunt quidam esse Cardium
pratense Tragi. Alij pro Cirsio tradunt Carduū
bulbosum Monspeliensium, siue Acanthum silu-
quorundam foliis laciniatis. An Cirsion minus
Lobelij Obs. pag. 11. est Cardus dictus Cirsium
folio laciniato nigrius? Leucacantha Anguillara
quorundam est Cirsium tomentolum radice bul-
bosa. Est Cirsium maximum Clusio, foliis carnosiss-
bulbosâ radice fortè Lucetianum. Cardus Cirs-
ium Monspeliacum folio longo, vtrinque glabra
Matthioli. Cirsium Anglicum radice Hellebori
nigri modo fibrosa. Cirsium foliis non laciniatis
viret Brasilez & Macrocalon. Cirsium Britan-
nicum Clusij repens. Cirsium Pannonicum I.
Clusio, folio non laciniato. Cirsium luteum Se-
quaniarum Lobelij, est carlina sylvestris Dodo-
næi. Ad Cirsium Dioscoridis conicit Scabiosas
tres vltimas Tragus, quarum vna fortè est facia
nigra Dodonæi, alia autem duæ colore tantum
inter se distinctæ, quæ sint, videant & flores. Si
Borrago Cirsion nō est (inquit Hermol. in Diosc.
coroll. 733.) mirum quam ob rem sit indicata Vete-
ribus, nisi quis Buglosso generibus contribuat.
cirsion & officinæ & vulgus Herbariorum vo-
cant Buglossum maius & minus, de his l. 3. Hie-
racium capitulis cardui benedicti, de quo præce-
denti libro egimus, vocatur à Turn. part. 1. p. 142.
cirsium. Hallucinatur qui herbam vel linguam
hircinam vulgò dictam, nobis Echion, cirsium
arbitrantur.

CARDVVS PRATENSIS
TRAGI.

Nonicellus est Tragi pratensis carduus &
Nimicibus spinis donatus. Caulis striatus,
glaber, trium, quatuorve cubitorum altitu-
dine, cui folia ex longis intervalis adna-
scuntur, pallidè virentia, alia cubitum lon-
ga, alia palmum; alia satis profundè laci-
niata, alia duntaxat serrata, mollia, & tene-
ra: ramis in quos caulis finditur insident
capita

Error Plin.
Diosc.Erymō Cirs-
omties.Platz Cirs-
ij nomine
donata, &
Æquiuoca.
Cardium
pratense
Tragi
Monspeli-
cium.Carduus
Cirsium
Dod. fol. la-
ciniato ni-
grius
Cirsium to-
mentolum
radice bul-
bosa.
Cirsium ma-
ximum silu-
Lucetianum.
Card Cirs-
ium Mon-
speliacum.
Cirsium an-
glicum.
Cirsium Britan-
nicum
Cirsium Pan-
nonicum I.
Carlina
syl. Dod.
Scabiosa
lacca
Borrago
Hierac. ca-
pitulis Car-
dus benedi-
cti.
Echion.

Descriptio:



capita satis magna, simul multa congesta, mollia, & quibus flores exeunt ex flauo pallentes: semen Cnici, minus: radix crassa.

Carduus pratensis, quod in nonnullis pratis nascatur nomen habet. quod verò folia in cibis quoque ut reliqua olera expectantur, idèd à mulierulis wisen fôl[Brassica graminea]

nuncupatur. Est autem inter omnes Carduus hic tenerimus, si spinas consideres molliusculas. Trago *dyela dyela* Diosc. & Plinii esse videtur.

An Cordo Obl. silv. p. 222. Herba carduaceis foliis, acanaceisque capitulis, in montanis pratis? Gesn. hort. Carduum pratensem Tragi exilimat Limoniam Theophrasti, quam G-zam malè Betam siluestrem verius scribit. Eidem de coll. stup. Acanthus silv. Hieron. Bock wisen fôl[Brassica pratensis] Groß fôl[Brassica graminea]. Item in cat. pl. Acanthus sylvestris, wisse Biaca vrsina. An eidem de coll. stirp. & Asent fôl[Brassica leporina] volens fortè scribere wisen fôl.

H. Lugd. p. 1443. Acanthus silv. Carduus pratensis Tragi. An eidem p. 583. Cirsium Dodonæi? Lob. Adv. & Icon. Plant. Carduus pratensis Tragi, Acanthi facie. Lonic. *Acanth dyela*; Carduus pratensis. Tabernaepud Vvirlung. Acanthus silv. Carduus pratensis, & Brassica pratensis.

Copiosum hunc Carduum vidi ad tipam Dubis inter Longueville & Bauans: Gener meus Theobaldus Noblot obseruauit circa Audincourt. Quam essem Geneuæ ex pratis montis Thauri transiui in hortulum: florere incipiebat Iulio, vti Montbelgardi, Angusto semine etiam maturo. Obseruauit præterea in monte prope oppidum S. Hippoliti: Item non longè à Basilea locis aquosis circa Binitze pagum in Marchionatu Baidensi, & Frater Casparus in pratis circa Birsam. Planta est, authore Trago hyemis contèptrix; & quæ frigora facile ferat. Aprilis mense quotannis noua candida folia è capillata exeunt radice: Iulio mense caules emittit.

CARDVVS BVLBOVS MONSPELIENSIVM, SIVE ACANTHVS SILV. quibuldum, foliis laciniatis.

Descriptio

Fecit foliorum non inepta similitudo ut Acanthi sylvestris nomen meruerit: sunt ea namque Acanthi seu Brassicæ vixina: foliis aliquatenus similia, admodum nigricantia, paulùm hirsuta, vel potius tomentosa, crassiuscula cum spinulis in extremitatibus laciniarum, quorum pediculi ad radicem rubescunt: caules bicubitalis, rubentes, impurissimè parte unà, quorum ramis longis capita insident aliquot Cirsii capitibus similia, miti squarrolo echino, floribus stami-

TOM. III.



neis purpurascensibus comato, qui tandem in pappo resoluuntur:

semen album, oblongum: radices ex vno capite plures dependent, turgidæ, bulbos imitatz, sapore nonnihil saluginoso, in quo & plantagineus gustus elucet.

Clus. Pann. p. 660. sine icon. Cirsio maximo similis planta; sed longè minor, quam in pratis Montpelianis olim eruere meminit, quam tum nonnulli pro Mòcana Nardo ipsi obtrudere volebant. Eadem tradit in Hist. post. pingitque l. 5. p. 149. hoc titulo Cirsio 5. [maximo] congener Carduus bulbosus Montpelienensis.

An Leucacantha Dioscor. Lobel. in Adu. Is autem etiam carduum bulbosum Montpelienisium & Albam spinam vocat, ac à Spina alba (quorundam) non parum dissidere scribit, contra quam nonnullis persuaserat vocum paritas. Icon. Plant. rom. 2. pag. 10. Carduus bulbosus Montpelienisium.

An Tabern. Icon. Iacea aculeata seu tuberosa Stachelstrauch/ Stedgünzel: Hist. Iacea 4. floche blum. Et postea inter nomina: Iacea aculeata & Consolida aculeata, à foliorum spinoso mucrone sic dicta, & ab ipso Iacea tuberosa à radicis tuberibus nuncupata, & inter Scæbes genera relata.

H. Lugd. p. 1465. Carduus bulbosus Montpelienisium, quem quàm proximè ad Leucacanthà Dioscoridis accedere Lob. existimat, & quidam carduum Triglochinum esse malunt. Sed hunc carduum credimus esse carduum dictum Cirsid folio laciniato, nigrius, Asphodeli radicibus bulbosis, de quo mox differemus.

Acanthus sylvestris quorundam floret mense Maio in pratis circa Monspelem locis vdis frequens inter Narcissos & Aristolochias, vbi non raro à nobis collectus.

CARDVVS DICTVS CIRSIVM FOLIO laciniato nigrius, & idem cum Asphodeli radicibus bulbosis.

Cirsio affinis est hic carduus, laciniatis spinosisque membranis caulem striatum ornantibus: at verò folia palmum aut sesquipalmum longa, glabra, nigricantia, profundis Carlinæ vulgaris laciniis incisà, rigidioribus spinis horrentia: scapi foliosam & spinosam simbriam habent, & in longos ramos diuiduntur in quorum extremitatibus flores purpurei, verùm capita squammata, singularia vnde emicant: radix latis crassa, à qua pendunt prælongæ fibræ nigæ, Hellebori nigri vulgaris æmula. Hæc descriptio est ex planta sicca collecta olim Basileæ & Geneuæ, quæ fortè bulbosa fuit.

Descriptio

Locus & tempus.

Card. Tr. globis.

An Dodon. hist. purg. in append. p. 452. & lat. in fol. p. 725. Spina Cirsii similis, prima? An Lobel. Obs. p. 319. Cirsion minus? An Hist. Lugd. pag. 1444. Acanthus sylu. alter Dalechampij. Acanthus sylu. 2. alius dictus Leimonia, qui in pratis nascitur: Herbarij quidam Carduum vocant: alij verò Leucacantham esse volunt.

Locus & Tempus.

Olim obseruavi hoc Cirsium cum esset Genueux in monte Thauri florens Maio: & idem florens Augusto in montibus circa Wasserfal. Hoc Cirsium collegi etiam in montibus circa S. Vrsane, & plantavi in horto Ill. E.C. Montbelgardi, idem etiam ni fallor Basileæ vidi in horto Di. Martini Chmielecij Poloni, delatum ex Wasserfall, sed foliis amplissimis, cultura fortè facit variè.

CIRSIVM TOMETOSVM RADICE
bulbosa quibudam Leucacantha
Anguillæ.

Descriptio.



litur, crassus, lanuginosus, inque ramos diuisus: flores singulis pediculis insident singuli; nutabundi. Cirsij vulgaris, coccineo colore præditi, & capitulo squarrolo emicantes, qui in pappos abeunt semina relinquunt paruum, album.

An Cirsii montanum vulg. Pann. Clus.

An Anguill. ep. st. 8. p. 147. Planta spinosa quam repent in lilytia & circa Pisam Hetrutiae videntur?

An Clus. Pann. pag. 660. Hist. post. lib. 5. p. 149. Cirsium 4. siue montanum 2. quod vulgare in Pannonia, in Belgicæ autem hortis coli meminit, folijs aliquantulum laciniatis. & Cirsio montano tertio paulò mollioribus, similibus ferè floribus, caule striato, & perenni etiam radice?

An Cirsii varietas duplex Lob. Acanth. pereg. Tabern.

An Lob. Oberu. pag. 31. Cirsij varietas duplex in Belgarum hortis? An Plant. Ico. p. 582. Cirsium maius?

Tabern. Icon. & Hist. par. 2. p. 150. Acanthium peregrinum frembo weddij. Hist. Lugd. 584. Cirsium maius singularibus capitulis. Camer. hort. Cirsium utrumque, tam spinosum, quam leue. Item, grande aliud biennè, & aliud exiguum perenne. In tanta breuitate, non possum distinguere Cirsia Camerarij.

Locus & tempus.

Leucacantham Anguillæ Patavij vidi mensè Martio in horto publico & Domini Cortusij. Frater Capl. Bauhinus attulit nomine Acanthæ

leucæ: vidi etiam Bisantij apud Dom. Doctorem Chiffet Medicum humanissimum, qui mihi misit plantam, quam Montbelgardi in Horto E.C. plantavi, folia sunt longa, radices similes Alphodelo vel Pæoniæ, magna & pulchra planta, similis Cirsio, caulibus & capitulis Centaurij floribus purpureis, vel Acantho sylvestri Dalech. qui in pappos resolvuntur, in quibus femina parua, alba, floret tota Æstate.

CIRSIVM MAXIMUM FOLIIS
carnosis, bulbosâ radice,
fortè Lutetianum.



Descriptio.

AD Cirsii generare recte Clusius etiam id Cardui, siue spinæ molle genus, quod in bicubitalem, & maiorem interdum altitudinem excrevit, pollicaris crassitudinis caule, striato, incanâ tomentâ, ne obstito: folia illi maiora quàm in superioribus generibus, magis carnosa, succi plena, viridia, in ambitu

dentata, mollibusque spinis hirta: capita in summo caule fumisq; ramis maiora iam descriptis, quæ in flamineo purpureo colore nitentes flores expansa, maturitate in pappum resolvuntur: radix multis crassis fibris, Alphodelinos bulbos ferè referentibus, & oblongis firmatur.

Cum hoc Clusij Cirsio idem fortè vel simile vidi Lutetiæ florens Augusto in horto Robini, cui folia erant glabra, & carnosiora quàm cæteris, lata non laciniata, spinulæ breues & molles in margine foliorum: flores cum capitulis similes nostro tomentosio laciniato.

Cirsium hoc maximum foliis carnosis bulbosâ Synon: radice, est Clus. in Pannon. p. 660. Hist. post. lib. 5. p. 149. Cirsium 5. siue maximum incano folio, bulbosâ radice, sine iconè. An Cæsalp. Cirsium alterum?

Nascitur in montanis pratis, etiam ad piscinâ. Locus & cum vdos margines, inter salices amerinas quoque, & harundines. Floret Iulio.

CARDVVS, CIRSIVM MONSPELIANVM
folio longo, glabro, Matthioli.

Adix & ima folia inquit Lobelius, Dipfaci modo & ortu. Buglossi angustifolij acutiora, & leuibus hirsutisq; spinis asperiora, longiora, viridula. Caulis vt plurimum singularis, binos ternosq; ubitos æquat, angulosus, rectus, incanus, tener, Sonchi modo. In quorum extremo flores, rotundis, oblongis capitulis. Cardui, purpureis, densis conflati staminibus: in pappos desinentibus, relicto exiguo, oblongo Cardui femine sulco.

Descriptio.

Leucacantha Anguillæ, de qua egimus sub Cirsio tomentosio, non malè hinc etiam conueniret, si teneamus an radices bulbosæ & amara, quæ deinceps diligentius obseruandæ.

Leucan-



Matthiola
Cirsium
Matth. no-
patitur.

in historia Germanica, non amplius Cirsium Dicolcoridis esse tradit. Planta de qua agimus, est Dodon. Lat. in fol. p. 725, spina altera ad Cirsii genus referenda, foliis Cirsii spinosioribus: flosculis concoloribus, sed tribus, quatuorve vovitis, quorum minora capitula non refertuntur: Hanc pro Cirsio Matthiolus depinxisse videtur.

Matthiolus plantam pingit [missam à Luca Ghino præceptore meo inquit Turn. part. 1. pag. 142.] pro vero Cirsio, sed nec Italium nomen indicat, neque Herbariorum, neque Officinarum, neque describit etiam, ut in eius cognitionem liceat pervenire. Cumque leuiter transeat, nec indicato plantæ odore, sapore, aut facultatibus, neque vetum Cirsium concedere possumus, nec penitus reiicere & confutare. Ex figura tamen ab illo proposita confutari posset quod eam plantam pro Cirsio habent, eodem modo quo ipse alios confutat Buglossum putantes esse verum Cirsium. Confutatio enim eius talis est: folia Buglossi vulgaris infima spinosa non sunt Rosæ similia, non potest ergo esse Cirsium: Ita quoque licet Matthiolus rescilire, Infima folia plantæ ab eo pictæ non referunt Rosam, sed longa & continua prodeunt, ergo &c.

Gesn. hort. Cirsium Matthioli Vveyselo Silesio. H. Lugd. p. 582. Cirsium Matthioli.

C. Bauh. apud Math. Cirsium Matthioli, Cirsium agri Pisani Calsalp. quod Cirsii montani 2. nomine Clusium hist. Bannonicæ describere credit Frater. Sed an Calsalpini Cirsium Pisani idem sit cum Clusii 2. merito dubito quia capitulum in Clusiano vnum esse solet, flos satis magnus, in Calsalpini Cirsio capitula tenuia tanquam in umbella: Figuræ etiam valde differunt.

Hanc, inquit Lobel. in. Adu. cum Guini Cirsio in Matthioli commentariis eleganter depictam, inueni, quoad licet, coniectamur: propterea quia idem Senensis virique sui similes, nullam descriptionem apposuit: Ruellio aliusque doctis, qui putarint hanc Buglossum angustifolium esse, ne utique pariter: si virentem, florentemque, viderent, vidisset. Sanè vix vlla in Dioscoride plenius descriptioni responderet & facultatibus, quam hæc, floribus non quidem Buglossi, sed papposis & la ruginosis, euandis, caducis.

Camerad Hist. & Epit. Math. Cirsium, rescript.

Tom. III.

ochsensung. Figuram & descriptionem quandam ponit Camerarius non suam sed Matthioli, Figura enim ex Matthioli commentariis desumpta.

Vt dictum obseruavi Montpelii, sicuti etiam Frater plurimis annis pōit iuxta Molendinum loco paludoso. Hanc plurimam prope pistrinum Oliuarum, & pone Molas farinarias, in locis vadosis Lani amnis Montpeliaci, & pratensibus lacustribusque litoreis à Grammontio luco in meridiem deuectus; quæ maris alluvionibus & Solibus feruidis longè latèque patètes planicies sale nivo opertas pedibus terebat Lobelius, Iunio 1566. Notissima hæc illic studiosis, alibi Italiae aut Gallia parum nota aut frequens.

Locus &
tempus

CIRSIVM ANGLICVM RADICE

Hellebori nigri modo fibrosa
folio longo.



Descriptio

Cirsium Anglicum videtur Spinam albam adumbrare, spithimeo caule & foliis Cirsii, cui refertur cōmōdè potest flos singularis Cardui bulbosi: Radix Hellebori aut Hellebori modo fibrosa provenit in pratis in villa vernacula lingua Arr. n. nōmine, guttu adstringere, præfecto, moderatè calido.

Angli examinent quantum Cirsium Butanienum Clusii, de quo mox infra, ab hoc differat: descriptio hæc Lobelii Obs. p. 414. miris succincta.

Lob. Icon. plant. p. 535 & Hist. Lugd. p. 584. Cirsium Anglicum.

Cirsium
Anglicum.

CIRSIVM FOLIIS NON LACINIATIS

viore Brassicæ & macrocauloni.



Descriptio

Multa profert folia Cirsium foliis non laciniatis viore Brassicæ, oblonga, Centauri maioris non laciniatis, foliorum prope modum ætula, Brassicæ foliorum colore & viriditate, satis carnosa, in ambitu crebris aculeis prædita: inter quæ medius exit caulis, cubiculis aut amplior, striatus, quem alternè ambiunt

F 3

Matth. rescript.

C. B. nat.

Cirsium
Lob.

Cirsium
Guini
Matth. rescript.

Cirsium
Camer.

folia superioribus minore, latiora pediculo eum amplectentia, & veluti membranaceas quasdam alas, ad proximam folia, secundum caulis, cui adnata sunt, longitudinem producentia, eâ de causâ caules quodammodo alii apparent: summus caulis in hispidum, multisque squamulis imbricatum caput definit, quod tandem in stamineum florem porpureo colore rubentem explicatur, & propendit: in superioribus alis nascuntur interdum ramuli quâdam lanugine obfusi, similes sustinentes flores, qui deinde, ut alii in pappum & lanuginem resoluuntur, semineque in eâ reliquis simile occultant: radix minimi interdum digiti crassitudine, aliquot fibris donata & viua, singulis annis propagines è lateribus fundit.

Semen.

Cirsij Dod.

Carduus
lymaCirsium al-
terum Lob.Locus &
tempus

Cirsij foliis non laciniatis virore Brassicæ meminit Dodon. Hist. purg. in append. p. 451. & Lat. in fol. p. 725. ubi Cirsion vocat, ac ita describit. Ex Carduorum & spinarum numero etiam Cirsion est: folia eius oblonga: Lactucæ quasi similia, verum acuminata, & per circumferentias aculeata, candidiora longioraque quam vulgaris Bugle: sili caules recti, bicubitales, in duas alas nonnullas discreti: in quorum singulis capitulum eminet spinosum ac hispidum, quod post floris vigorem deorsum reflexum nutat, tandemque in papposam lanuginem resolutur, flos porpureo rubet colore. Semen laue resplendet aliorum multorum Carduorum instar.

Lob. Adv. p. 251. Obseru. p. 314. & Icon. plant. p. 8582. Cirsium alterum.

Clus. Pann. Cirsium 3. montanum & pag. sequent. 659. ubi figura, Cirsium 3. Histor. post. ad Iconem, Cirsium montanum: ad descriptionem Cirsium 3. siue montanum 1. H. Lugd. p. 583. Cirsium aliud Dodonæi.

Clusius Cirsium suum crescens obseruabat in montanis quibuldam siluis Pannoniæ, ut supra Polonium & Nemethvuy var, aliis etiam ad Alpes tendentibus supra Badenses videlicet Thermas, & vicinis. Florebat Iunio.

CIRSIVM PANNONICVM 1. CLVSIO, folio non laciniato.

Descriptio



per circumferentiam prædita, cæsi coloris: ex horum medio, caulis emicat pedalis, aut etiam cubitalis, tennis, firmus, lanugine quadam obfusus,

QVina aut lena Cirsium hoc Clusij Pannonicum siue pratense [Eius enim descriptione mutamur cum nobis nec sint radices nec inferiora folia.] statim à radice promit folia, circiter tres uncias longa, vna lata, sensim mucroné deficientia, latiore vero circa pediculum basi, subhicta, & crebris spinulis

(per quem parla sunt folia iam dictis minora) vnicum in summo plerumque ferens caput, nonnunquam alterum & tertium, multis squamulis imbricatum compactis, nonnihil purpurascens & acutis asperum, quod in stamineum florem expanditur, vulgare Cirsium modo, colore porpureo: semen etiam illorum semini non dissimile, multâ lanugine inuolutum nascens: radix multis nigricantibus & duris fibris prædita est, eamque supremo capite hirsutam, veterum foliorum nervi remanentes efficiunt.

Nascitur inter arbores in declui montium locus & quorundam Pannoniæ: sed montanis pratis quæ secundum Danubium extenduntur, multò abundantius. Iunio floret, & subinde semen etiam profert.

CIRSIVM BRITANNICVM CLVSII repens.



Non mi- Descriptio
nus est
elegans Cirsij
genus, & haud
dubio proxime
huius collo-
candum, cuius
descriptionem
& iconem Clu-
sio anno 1581.
Londini com-
municavit C.
Vir. Thomas
Pennæus Lō-
dinenfis Me-
dicus. Planta
est caule sin-
gulari, cubitali
aut ampliore:
folia per caule
æterna, longa,
in ambitu spi-

nulas, minimèque pungentes habentia, quorum supinae partes virent, pronæ albicant, & canâ lanugine obducuntur in summo caule capitulum vnum Carduorum modo, quasi ex squammis mucronatis compactum, florem sustinens satis magnum ex multis apicibus, colore ex rubro purpurascens, ac tandem in pappum abeuntem: radix est nigricans, fibrata, quandoque per magnas fibras sese propagans. Floret Iulio & Augusto. Provenit in pratis ad radices montis Englebrov totius Angliæ celsissimi in comitatu Eboracensi.

Clus. Pannon. pag. 657. Cirsium 2. siue Britannicum, & pag. sequ. ad Iconem Cirsium 2. Histor. post. Cirsium Anglicum siue 2.

An verò Cirsia à nobis descripta, Cirsij Veterum facultatibus respondeant, ignorare nos cum Clusio fatemur: & iudicium de his ferre difficile. Nam neque Dioscorides suo Cirsio villas vires tribuit, nisi quas ex Andrea descriptit, de quibus antè à nobis dictum.

CARDVVS MOLLIS LAPATHI folio.

Pedali assurgit caule, vtrunque crasso, striato, nonnihil lanuginoso: folia illi circa radicem maiora



omnino incana, foliorum albx Populi instar, & densa lanugine obsita, gustu initio exsicicante deinde amariuscule, quæ verò caulem amplectuntur minora sunt & angustiora, ex quorum sinu circa summum caulem ramuli exeunt, terna, quaterni, aut plura sustinentes capitula squamata: Cyani, aut laxe capitulis respondentia: quæ, dum expanduntur, florem promunt ex cæruleo purpurascens, & semen deinde continent lanugine involutum, Cyani femini non valde dissimile, sed paulo maius, candicans, radix nigra, aliquot tenuibus fibris prædita, dura, viuax, è lateribus propaggines spargit.

Clus. Pannon. pag. 665. & 664. Carduus mollis [Hist. post. lib. 5. pag. 151. mollior] 2. siue Lapathi folio.

Hunc eruebat Clusius, circa secundum Sneberg, excelsi admodum montis, iugum, inter saxa nascentem, cū Auricula vrsi flauo flore, incano folio: deinde etiam in Etchero. Florebat viroque loco mense Iulio. Viennam relatus & in horto repositus semen tulit Augusto, deinde perit. Vbi tamen spontè nascitur, viuax est: nam superioris anni caules aridos retinentem, cūm floreret deprehendebat.

CARDVVS MOLLIS HVMI LIS & angustifolius.

Descriptio

Hvmilior hic est, neque palmarem altitudinem excedit, caule non minùs crasso quàm superioris, multis longis foliis exornato, supernè etiam virentibus, infernè cana [non tamen adeò densa, vt superioris folia] lanugine vestitis, & molles quasdam spinas in ambitu obtinentibus, gustus etiam amari, initio autem adstringentis: summo cauli infidet singulare capitulum squamatum, maius quàm præcedentis capita: ex quo stipes multa lanugine ex cæruleo purpurascens pubescens exoritur: semen obseruare non potui: nam tamen aliquot stirpes in horto magnà diligentia excoluerim, quas loco natali & florentes & nondum florentes erueram, ad frugem tamen non peruenerunt, sed paulatim flaccescentes, prorsus tandem contabuerunt & perierunt: radix nigra, & frequentibus subnigris fibris prædita, subinde noua germina è lateribus producit.

Clus. Pannon. pag. 665. Carduus mollis [Hist. lib. 5. pag. 151. mollior] tertius siue humilior angustifolius.

Crescit in fummis Snealben iugis, cum Auricula vrsi quarta, quæ glabro & splendente est folio, carnei coloris flore. Floret verò Iulio & Augusto.

Locus
Tempus

CARDVVS MONTANVS FOLIIS Helenii non spinosus.



Folius Helenii non spinosus, capite rubro, frequens in montibus Hermundurorum circa vrbes metallicas, non multum differens à Carduo molli latifolio Clusii, in cuius descriptione huius quoque meminit.

Descriptio

Camer. hort. Synonyma, pag. 35. Carduus montanus foliis Helenii non spinosus. Clus. Pannon. pag. 667. & Hist.

post. lib. 5. pag. 151. Cardui mollioris genus elegans, præaltum, & radice serpente in cultissimo horto c. v. Io. Camer. Carduus mollis Camerarii.

CARDVVS MOLLIS FOLIO laciniato.



Multa secundum radicem habet folia, cū hūmili sparsa & iacentia, tum surrecta, infernè cana molliorque lanugine obsita, supernè virentia, valde laciniosa, & ad medium vsque neutrum dissecta, calcitrax siue cardui muricato capite, mollioribus & tenerioribus foliis pæne similia: nullis tamen

Descriptio

spinis horrentia, gustu primum exsicicante, deinde amariuscule: à quorum medio vnus aut alter caulis assurgit cubitalis aut amplior, teres, rotundus, striatus, purpurascens, & molli quadam lanugine obsitus: inferiora folia pæne infimum

caulem sparsa: etiam lacinia sunt, licet iam dictis minora, quæ verò supremū caulem ambiunt, oblonga, angusta, nullis lacinis diuisa, mucrone ut plurimum purpureascentes: extremi caules in aliquot ramos interdum diuiduntur (magnā tamen ex parte singulares sunt, vnicūque sustinent caput) qui capitula sustinent, ex multis tenuibus squamis imbricatis dispositis composita, molliter echinata, quorum medium occupat stamineus & villosus flos, coloris purpurei elegantissimi: flori flaccido & euasido succedit semen angulosum: radix digiti crassitudinem nonnunquam æquat, subfusca, longa, aliquot fibris donata.

Synon:

Clas. Pannon. pag. 661. Carduus 1. siue mollis [mollior, Hist. post. lib. 5. pag. 150.] laciniato folio. Hunc aut. Clus. Gesnero atque Benedicto Aretio notum fuisse, nomine Edelstiel / Cardui inter Carduos spinosissimi, foliis referentibus folia herbe Mosbblumen nominatæ. Ast fallitur Clusius, multum enim distat Edelstiel ab eius Carduo molli laciniato folio. Demonstrant id aperte folia, herbe Mosbblumen, id est, Calthæ aquaticæ.

Clas. Lapp. 100.

Carmer. hort. Carduus mollis tenuifolius, cuius icon extat apud Clusium.

Inuenitur hic, inquit Clusius, totā illā montium catenā, quæ à Calenberg & Danubio, cui imminet ad Alpes vsque extenditur, & deinde per Leytenberg, rursumque per Prellenberg & Hamburgerberg ad Danubium duobus supra Polonium millaribus reflectitur. Floret Maio, semen perficit Iunio & Iulio.

CARDVVS SIVE SCOLYMVS

Satius, spinosus & non spinosus.

Descriptio.

AD culinarum cupedias satis Scolymus folia è radice promit pedem & sesquipedem longa, semipedem ferè lata, in lacinias latas subiectas diuisa, incano & cinereo tomento obrita, pouissimā parte pronā, nullo aculeo minacia, interdum nulla est lacinia angulolue qui non spinis rigidis luteisque minetur: caulis pedem vnum aut alterum altus, striatus, tomentosus, ramis aliquot donatus, in singulorum acumine caput gerit turbinatum, squamis magnis glaucis, carnosissimis, acumine obtuso, aliàs spina robusta præpilato, vique infimo crassiusculo tenero, vesco, albicante, compactū, quod sensim diuulsis squamis superius latebit, tandemque floris stamina purpurascens explicat.

floris stamina purpurascens explicat.

Scolymi duo habentur genera: satium, & spontè nascens de quo postea. Satiui quidem nulla verè genera sunt, licet genera dicat esse Matthiolus. Ex eiusdem siquidem stirpis semine, vterque tam spinosus,



Genera duo
Matth. no-
tatur.



quàm non spinosus enascitur.

Spinosus folia gerit non spinosa. Scolymus spinosus, magisque lacinia, tenuibus circumdata spinis: caulem quoque non spinoso simile, striatum, subalbicans, in cuius summitate echinatum aculeatumque extuberat caput, flore hyacinthinis: semine Cincinnati minore. Radice nititur crassa, firma, non in-

suaui.

Non spinosus folia fert ob radice amplexa, longitudine ferè cubitali, scissa, subhirsuta, cinerei coloris, nequaquam aculeata, paucis exceptis: caule ex medio foliorum erigit crassū, & in cacumine caput figura Pineæ Nucis, ex latis squamis coagratum. Caput hoc aliquando occultatur inter folia media: non procul à radice, quod si non auferatur tenellū, attollitur in dies cum caule supra folia, ac floret flos lanuginosus est colore purpureo: semina intus candidam lanuginem continet, oblonga, laxi cortice obtecta, candido, vel nigro: Fert & alia à latere capitula duo, aut tria, sed minora, quàm quod in medio continetur. Capitulum squamæ figura folij Laurini, aut Myrtini in aculeum desinunt: breuem, nunc robustum, nunc infirmum, nunc propè nullum: similiter & folia, quæ in caule aliquando aculeata, aliquando mitia sunt: differunt & colore squamarum: nunc enim subrubentes, nunc vides spectantur: capitulis quoque figura nunc oblonga, nunc rotunda: gustui gratissima.

Theophrastus spinosum intellexisse videtur, Cactus enim inquit. Quæ autem Cactus [Cattus Cacta] p. malle meo iudicio) nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, Græciæ nusquam habetur sui generis planta: hæc enim statim à radice caules in terram procumbentes emittit, folio lato atque spinoso, caules desquamati cibo idonei sunt, paululum amaricantes, qui in muria asserruari queunt: alium verò & caulem producit, quem Pternicen vocant, is quoque cibo aptus, sed referuari nequit, fructus spinosa facie (scandens) exepus lanuginosis seminibus, vescendo est, & palmarum cerebro similis, angustior appellant, (Plinius Al-calam legit) Athenæus A'xos) negat.

Spinosam Cinaram, inquit Dodonæus, Scolymum esse Dioscoridis, Fuchsius & plerumque aliis est. vilum fuit. Scolymus autem Dioscoridis folio est Chamæleonis aut Spinæ albæ: caule multum folioso: capite spinoso. Cinaræ autem spinosa huiusmodi non est: Nam tametsi caput spinosum illi sit, caulem tamen non habet multum foliosum, sed sæpè folijs vidualum, vel vno aut altero tantummodo folio ornatum. Conuenit magis hæc Cactus Cinaræ cum eo qui xidit à Theophrasto ac Plinio dicitur, &c.

Theophrastus porrò de Scolymo satiuo non spinoso, egit, ut puto, statim pest Scolymum, cum inquit

Cactus

Theophr.

Scol. Spin.

Pternis

Scalia. Al-

calia Plin.

Scolymus

Dioscorid.

Cactus

Scolymus

Dioscorid.

Cactus

Scolymus

Dioscorid.

Cactus

Scolymus

Dioscorid.

Cactus

Scolymus

Vernilago.

inquit: contratio modo se habere Scolymum, quam Chamæleonem [Theodorus Vernilaginē vertit;] hic enim quamvis foliis constet non aculeatis, tamen Acani speciem gerit, senescensq; flos in lanuginem, pappum vocatam, cōuertitur: pergitque ad ætatem vsque, aliud parturiens, aliud florens: seminis autem solum quale Lauriū, aut Myrthinum, aut cæterorum huiusmodi, exiguum humorem ac mediocrem habet, & arefactū relaxatur, & non amplius pungit: sed hæc verba transposita valde perturbata faciunt in codice græco lectionem. Scolymo satiuo non spinoso pleraque ex Theophrasti predictis adscripsit etiā Plinius: Ixinen, vt ille inter Cardui satiuū genera constituens.

Cinara Columella. Cinara Diofcoridi. Cinara Galenus.

Cæterum, apud Columellam Carduus satiuus Cinara vocatur: De Cinara apud Diof. mentio est tantum inter attributa: nam de Chamæleonte albo inquit, ex medio foliorum spinas erigere, Echini marini modo, aut Cinara. Galenus inter alimenta ex spinosis quæstia inquit: stimari Cinara ploris, quam conueniat: ab aliis Cynara proferri.

Figura Tragi. Card. i. spinosus Tragi.

Tragus l. 2. c. 15. describit Scolymū vrumq; spinosum quidē pro primo Cardui genere siue Scolymo, eumque depingit, figura autem [quæ etiam Cordo additū] non admodum placet. Non spinosū facit 2. Cardui genus, primo per omnia simile, exceptis aculeis spinivis, quib. hæc carere ait.

Lonic. diff. Tragi. Lonic. vstratur.

Lonic. duas exhibet picturas, duasque species [non genera vt Marth.] tradit, vnum Carduū aculeatum: alterum minorem non aculeatum, Cinaram Columellæ Tragi. Sed huius icon ex Trago inutilis est, vt etiam distinctio illa minoris.

Cardui genera Plin.

Esti vnius tantum Cardui [Scolymi] breuiter meminerit Diof. Theophrasto tamen Plinio, ac aliis probatis auctoribus [vt posthac etiam apparebit] plura Cardui genera traduntur, inquit Matthiolus. Verum vt primum de his, qui natura cultrice sponte proueniunt, sermo fiat, scire sanè conuenit quod eorum diuersa sunt genera: quorum tamen nomina propria, quod sciam, non habentur. Atqui Plinio l. 25. c. 23. duo tantum eorum genera produntur: vnum fruticosius statim à terra: alterum verò vnicauale & crassius. Satiuorum autem, qui tum in hortis, tum in agris seruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hetrusci vulgò vocantur Cardoni.

archoni

Namque it diligenti cultura aded teneri, fragiles, albiue euadunt, vt magno quidem apparatu, secundis cœnis pro bellariis cum sale, & pipere expectantur. Quo argumento ductus, equidem putauerim de his verba fecisse Theophrastum l. 6. c. 4. de plantarum historia, cum ita scribit. Quæ autem Cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, &c. Nostrates quibus vbique nunc Hetruria scater, ed ex Neapoli allati fuerunt. Neapolim verò (vt audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere, maxime conuenire videntur, quod scripserit, Cactum Siciliæ peculiarem esse plantam. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ij, quos in India Hetruscū vulgus appellat Carcioffiales verò alibi Archichiochi dicuntur: quorum item meminisse Theophrastus eodem loco, cum subdit. Alium verò caulem erectum producit, quem Perernicem vocant. Qui pro palmæ cerebro illud, quantum equidē teor; intelligit, quod Galenus encéphalon pluribus in locis appellari tradidit; & quod nunc corrupta voce Neapolitanis, & Siculis vulgò vocatur Cefiglione. Carduorum autem, quos vulgò Carcioffi vocari diximus, nobis plura sunt genera, variâ capitis formâ, distincta. Siquidem proferunt omē

Cactus heoph.

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

Carcioffi

nes echinata capitula, sed aliqui spinis sursum respicientibus constant, alii verò ad terram versis; nonnulli etiam aculeis vacat, (id est, quod Theophr. c. 4. l. 6. vult Scolymi capita oblonga esse, minimèque aculeata.) Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longis fastigientur, quibus verò in globis extuberent, dehiscenibus in altero squamatis spinis, in altero iidem squamis, veluti corticosis vnguibus, in vnum compactis, & coagmentatis, Nudis pineæ instar. Ex quo facile in eam sententiam deductus sum, ut crediderim, hæc Cardui speciem postremam Nudis pineæ æmulam, esse Carduū pineam Theophrasto vocatā, quod is loco antè citato ita de ea scribat. Est Carduus pinea ab radice foligera: qua de media feminalis Acanus, veluti malum extuberat: hæc ille. Cæterum Cardui aculeati genus & illud est, cuius echinati capitis floribus Hetrusci coaguli vice vtuntur, est Cardui satiuū omne genus idem suis floribus præstet. Sed faciliè potuit factū esse, vt ij, qui aculeis non rigent; humano cultu mitiores euaserint, cum naturā Carduorum omne genus spinis vacare nequeat. Hæc Matthiolus, quæ Theophrastum male intellexisse, ac à Gaza deceptum esse, constabit illi, qui consulet textū Gregum, vbi hic vertit Carduum Pineam, id quod ipsemet animaduertit: nam in post. comm. (vbi duas pulchras exhibet figuras) omisit hanc opinionem. Ixiam Gaza Carduum pineā vertit, ineptè & nimis confidenter. Est autē Ixia Theophrasti Chamæleonis genus. Is sibi præterea contradicere: nam Carduorum genera omnia proferte echinata capitula perhibet, quod falsum, vt ipsemet paulo post ait, nonnulli aculeis vacant. Omnes quidem structili tanquam laminarum ordine in metam & verticem fastigiantur.

Carduus, quæ Græci vocant Scolymō, secundum Galenum, Aëcum & Paulum, diuersus est à Cinara. Quidam tamen in eo duntaxat differre voluit, quod Carduus sit siluestris. Cinara autem satiuā: Mea quidem sententia [inquit Turn.] ex Plinio, Diof. & Theophrasto, palam est nostrum Artichock esse Scolymum & Cinaram. Sed illorū descriptionib. addendum profundè incula esse folia; ad medium vsque neruū: echinū autem cordi Pini similem esse, squamas tamen latiores esse crassioresque, quam Pini.

Bellon. l. 1. Obf. c. 18. videtur nolle Artichock satiuum, esse Scolymum, sed si eum benè intelligo potius Carduū vult. Sed melius iudicat Anguill. epist. 8. cum ait. Planta, quam Romani vocant Carduum, Theophr. Cacton, Græci recēiores, vt Galen. Cynarā, cultura & māgoniō reperitur sine spinis, vt affirmat Cassianus Bassus l. 12. c. 39. rei rusticæ, estque eadem cum Scolymō Diofcori.

Cinaram distinguit Dodon. in spinosam & non spinosam. Spinosa verò siue aculeatam Carduū vocat; eamq; à non spinosa nihil differre scribit; nisi quod foliorū eius omnes anguli, ac tōni squamæ, duris, pungentibus spinis armentur, vnde & Cardui nomē ei imposuit, ac ab It. cardo, ab Hisp. cardos, à Gall. chardons nuncupari ait; & degenerantē Cinara esse dicit. Nō spinosa verò, Cinaram Galeni esse tradit. Is olim figuras duas posuit, nūc in postremis Carduum spinosum duntaxat pinxit.

H. Lugd. quatuor proponit figuras, nullā quidem necessitate cogente. Harum duæ spinosæ, duæ non spinosæ: Spinosa est Cactus Matth. Carduus aculeatus, p. 1438. 2. est p. 1440. Carduus altus. Cynara sine capitis acuta, Dodonæi. Non spinosa. Cinara non aculeata Matthioli. Alia tera Cinara nō aculeata Dodon. Ambæ p. 1439. cū

Card. pinosa Theophr.

Card. Noli spinosi Matth. Lugd.

Gaza error

Matth. nō satiu

Carduus Scolymus altus

Diofcor. 2. Plin. corrigens

Cactus Theophr. 2. Cynara Gal Bellon. Cinara spinosa Dod. Carduus aculeatus

Cinara nō spinosa

H. Lugd. 4. figura Spinosa 2. Non spinosa H. Lugd. 2. miv. c. 1. fundit omnia.

HISTORIAE PLANTARVM.

59

Scolymus

Cinara

Articocum
Alcocolum
Articocolum
Tubula

Scolymus

A cane di-
uiditur

Scol. Dioc-
oridis
Theophrasti
Plin. taxa-
tur.

Scol. Dioc-

Casti à Sco-
lymis di-
uerfi.

Differentia

Cynara du-
plices

descriptione mutila. Apud Historiam mirè confunditur omnia. Pro Scolymo Dioscoridis Lugd. Cynaram siluestrem pingit: pro Scolymo autem Theophrasti, Carduum dictam spinam luteam, de qua inferius agemus, nunc verba H. Lugdunensis adscribamus. *Σχόλυμος* Græcorum, inquit, Latini Carduum interpretantur generatim. *κινάρεον* autem à quibusdam per i scriptam, teste Galeno, ab aliis per ypsilon, quidam corrupta voce *Articocum*, alij *Alcocolum* vocant, nunc vulgus Herbariorum, *Articocolum*, Arabes *Raxos*, *Haxos*, Alexander Trallianus *ἀρτυκίδιον*. Cynaræ nomen dedit puella eiusdem nominis, quam in hanc herbam conuersam fuisse fabulantur. Sunt qui à cinere dictam velint, quo, vt Columella & Palladius aiunt, lætatur. Hoc etymum Græcos id à Latinis mutuo sumpsisse indicat, tametsi contra huius vocabuli notionem, ex Græcia venisse in Latium vetustissimi quique Græci tum Poëtæ tum Oratores demōstrant, qui apud Athenæum Cynaræ spinæ meminere, Sophocles, Hecæus Milesius, Callimachus, & alij. Sunt qui potius à cane dictam malunt *κυνάρεον*, quod Apollinem cōsulentem Locro redditum est oraculum, urbem ibi conderet, ubi lignea cane morderetur, tandem in crure Cynara vulneratus, oppidum construxit. Sed Didymus apud Athenæum Cynolbaton potius, id est, canis sentem intellexit. Dioscorides de Scolymo tantum egit, de Cynara minimè, Scolymus Dioscoridis alius est, quam Theophrasti, quos Plinius confundit, his verbis: siluestrium genera sunt duo: vnum fruticosius à terra statim, (Scolymus est H. Lugd.) alterū vnicauale, crassius (Scolymus Dioscoridis iudicatur H. Lugd.) vtrique folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus: sed alter [nempe Dioscoridis: nam alterius luteus flos est:] florem purpureum mittit inter medios aculeos, celeriter canescentem, & abeuntem cum aura. Scolymum Græci vocant, &c. Præter vtrumque Theophrasti Scolymum sunt in hortis frequentes Casti, ac Cynaræ cum quarum folijs albi Chamæleonis folia Dioscorides confert. Gallix vulgus Castos appellat *Cardons*, Cynaras *Artichauts*, hac differentiâ, quod Castorum capita non mandantur, sed radicis pars suprema foliorum ima, cum tenellis, germinibus: contra in Cynara nullus earum partium vltus est, sed capitum solum. Præterea Castis & folia & capita nunquā non aculeata sunt: Cynaræ verò cum duplex genus sit, alteri pariter ea, vt & Castis, spinis armantur, alteri spinis carent, diuerso hac in re palatorum iudicio, quibusdam eā magis commendantibus quæ spinosa est, alijs contra eam, quæ spinis nullis pungit. Galenus, Paulus, Aëtius Scolymum stomacho prodesse adnotarunt. Cynaram autem vitiosum succum pignere, præsertim, vt Galenus ait, cum iam induruit, nempe melancholicè, aliàs verò biliosum & tenuem, ideoque elixam adiecto Cotiandro potius edendam, ex oleo, garo, & vino: vel absque ijs, si in patinis, aut sartagine cocta fuerit, quo modo eius strobilos, siue capita multi præparant. *Hæc inter alia habet Historia Lugdunensis de Scolymo satius confusè scribens.*

Hispida ponatur Cynara, quæ dulcis lacheo
Foranti veniat, nec phæbo grata canenti.
Hæc modo purpureo surgit glomerata corymbo,
Myrtolo modo crine viret, deflexaque collo
Nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pungit,
Nunc similis calatbo est, spinisq; minantibus horret.
Pallida nonnunquam tortos emittitur Achæantos.

Quibus Carduum altitem siue Caston & Cynaram hic videtur Columella delincaisse.

Cardui hortenſis siue Cynaræ species multæ sunt (inquit Camer.) capitulis non spinosis efculentis, eisque vel oblongis vel latiusculis discernendæ. Spinosisissimis præditus est quem Cardusi vulgò vocant, nec velsis, aculeis longis armatis. Colitur tamen opertus ac terra obrutus, vt scolones teneri gulæ arideant. Is Veterum Cardus est, de quo Theophrastus Idilio.

ὁ καὶ ἀρτυκίδιον

ἄσπερος οἷς παύμας ἄς τὸν πόδα καὶ τὸ ἐπὶ τῷ

sed longè sequens velut agnus ouilia cuius

Cuspide spina potius pungens discidis acuta.

Scolymus satius, ait C. Bauh. apud Matth. est Scolymus duplex, aculeatus & non aculeatus, & rursus capitibus figura nunc oblonga, nunc rotunda, hocq; maximum, mediocre & parum, cuius squamæ in aculeum desinunt breuem, nunc robustum, nunc infimum, nunc propè nullum: quorum color nunc subrubens, nunc viridis. Dicitur Carduus Plinio, Cinara Galeno & Columella.


Scolymus aculeatus, Casp. Bauh. Tab. Scolymus, Trag. Fuchl. Cord. in Dipsc. & hist. (cui & Carduus satius) Lobel. (cui & Castus Theophrasti) Cam. Carduus aculeatus, Matth. Carduus Lacun. Carduus hortenſis spinosus, Geln. hort. Cast. Carduus Scolymus, Lon. Carduus altilis, Lugdun. Castus, Matthioli eadem. Cynaræ aliud genus, Dodon. gall. Cinara, Dodon. fol. à cinere, vt habet Columella, quo stercoreari amat. Cardones Cæsalpino.

Scolymus non aculeatus, Casp. Bauh. Tab. Castus, Lonc. Carduus hortenſis non spinosus, Cast. Carduus hortenſis, Scolymus castus vel Cynara vulgò *Artichaut*, folijs sine spinis, Geln. hort. Carduus satius, Cæsalp. Cinara, Dod. gall. Lac. Cinara non aculeata, Lugdun. sæpè ex vno semine vtraque prouenit, vt speciatim aculeata ex semine non aculeata: quamvis & maiore & minore habeatur semine.

Clusius quoad iconem & inscriptionem Scolymum latuum preponit in post. Histor. herculito. Scolymus Diocor. Castus Theophrasti.

Scolymus hortenſis Morſſelji per totam hyemē durat, vid. hanc duplex esse, vnus folijs altissimis multum dissectis, alter folijs nigriorib. & obtusioribus minusque dissectis. Ibi colunt maxima copia sine vllis spinis. Ferunt magna capita sine spinis, quanquam interdum quædā habeant minimas in extremitate foliorum. Comedunt illa capita Vere. Hunc videramus olim copiosè Stutgardia in horto Ill. Ducis Wirtembergensi, ibiq; erant due species, vna spinis horrida, alia sine spinis. Basileæ etiam in hortis variis florens Septembri obseruauimus, habuimus etiā in horto. Apud Gelnherum meminimus visum spinis horridum. Genere copiosè colitur in hortis, optima & maxima capita vidimus adhuc mēse Nouēbris, in horto nostro virebat Ianuario, Maio interdum sunt eis capita, spinosum verò vt plurimum sepeunt ad dealbatores ē foliorū, quorum pediculos vocant de *Cardes*, Patauij in hortis vidimus spinosum & non spinosum. Montbelgardi in horto Ill. E. C. sunt nobis Scolymi spinosis folijs & capitibus, alter non spinosus capitibus mediocribus, cuius squamæ obtusæ, habemus etiā genus folijs non spinosis cum capitibus ita magnis vt patinam replant magnam, huic squamæ longæ, spinosæ: hoc genus hieme facillè absumitur.

CARDVVS

CARDVVS SIVE SCOLYMVS MAXIMVS
non spinulosus.

Cuius iconem hic exhibemus, fatemur nos oculis nostris non vidisse, ac propterea etiam sine ulteriori delineatione eam iconem proponere voluisse, ne novarum rerum cupidi haberent, quod temerè desiderarent. Hanc primum depinxit Lob. in Icō. Plant. Tom. 2. pag. 1. hac inscriptione. Cy-

nara maxima ex Anglia delata.

Nomina
linguarum

Carduus siue Scolymus sativus, à cinere [quo amat stercoreari] Cinara etiam, Græcè Galeno *κινάρα*, dicta videtur. Germanis *Stribildorn* à imitato nomine Gallico *Artichoch*. Belgis & Gallicis *Artichaux*: vnde & *Articocalus* & *Articoca* à nonnullis dicitur.

Cultura

Satio.

Colitur porro Cinara in hortis: stercoreatam & solutam terram diligit: quamvis & in pingui posset melius provenire. Secunda est circa Calendas Martias Luna crescente si fieri potest: semina in area spatiosius discreta, non altè impundenda sunt, sed tribus digitis comprehensa mergantur, donec ad primos articulos terra pervenerit: tunc leuiter terra operiantur, & herbis liberentur affiduè. Circa Calendas Nonembreis, [vel etiam citius in Germania] planta depimenda, multoque cinere stercoreanda: Idem genus stercoreis huic oleri videtur aptissimum. Singulis autem annis à caudice auferenda sunt plantæ siue foboles, cum aliqua tamen radicis parte vellenda, quæ circa Autumni æquinoctium disponenda sunt, Columellæ & Palladio auctoribus.

Mangoniū

Spinis autem catebunt Carduorum capita, ut ait Palladius, si cacumina seminum confingas, vel, ut olitores aiunt, si delibratis Lactuæ radicibus & dissectis, semina integra condantur. De Cynaræ cultura & usu consulendas & Aug. Galenus. Scolymus inquit Dioscorides, radicem nigram, crassamque habet, quæ graueolentes alarum hircos, & reliqui corporis virosi odorem emplastata inspersa in puluillum detrita Cornar. *καταμαρτυρεῖν non καταμαρτυρεῖν* emendat. Idem etiam decocta potaque in vino potest: nam pota itidem copiosam graueque olentem vrinam prolicet. Eo nomine quoque virulentæ tertie Gonorrhæ differentie præfens esse remedium expertus est Langius. Et Oribasius lib. 2. Synopseos: Cardui radix, inquit, magnam educit graueolentiam vrinarum copiam, si quis vino incoquat, & decoctum bibat. Et in deliciis ganeæ, Carduus aded frequens erat, ut sine eo nulla magnifica aut adicialis censeretur cœna. Huusolia conficta, & terrâ obruta albescent: &

Tom. III.

hyeme, si inter secula cum thyris decocta fuerint, grauisima. Caulis eius in vere pineas aculeatis foliorum squammis compactas gestat: quæ autem radicis eius pars tenerior, ut Asparagi, in iure cum butyro elixata [ad proliciendam Venerem utique sexus ed] æstate ad id viris in Veneris confectis languentibus, hyeme verò mulieribus ad Venerem pigris, ut Hesiodus refert, patrocinatur. Glaucias quoque prodidit Cardui esum ad prolis masculi conceptum plurimum confetre. Nil igitur mirum, mulieres Carduum aded ambire: ut diligentiori earum culturâ effectum sit, ut non tantum echinata Carduorum pineæ, sed radices, caulis, & folia per totam hyemem, quæ cætera contabescunt, nobis in cibum suppetant: ne quis omnino, ut fertur, sine Carduis sit dies. Galenus scribit Scolymi radicem copiosam vrinam graueolentem elicere, si quis eam in vino coctam bibat, ac proinde graueolentiam sanare tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc, sanè medicamento inest ex tota substantia, nimirum eam succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in sicco ordine completo, aut tertio incipiente, medicamentum indicat, siccum verò in secundo. De Scolymi viribus plura Plinius habet. Scolymus vrinam ciere præcipuè traditur: sanare lichenas & lepras ex aceto, Venerem stimulare in vino, Hesiodo & Alceo testibus: qui florente eo Cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, virosque in coitum pigeamus scribere, velut providentia naturæ, hoc adiumento tam validissimo. Item graueolentiam emendat radicis emedullatæ vicia, in vini Falerni heminis tribus decocta ad tertius, & à balneo iunono, itemque post cibum Cyathis singulis pota. Mirum est quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per venam effluere. Hæc Plinius.

Venerem
si aulat.

Ad masculum
conceptum.

Nulla dies
sine Cardui.

Succus purgatorius
Temperamentum ex
Galeno.

Vires Plin.
Lichen. Lepros.

Nunc nullis non hortis cardueta spectantur, plurimæ hortorum areæ Cynaris replete sunt, nec iam sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, opipara vel adicialis vlla sit cœna. Apponuntur capita nondum florescentia Asparagi modo iuribus incocta, eorumque pulpa estur cum sale & Pipere. Itali rarè decoquunt, sed cruda cum sale vorant. Scribit Aëcius Scolymum calidum esse in principio tertii gradus, siccum in secundo, id quod in Scolymo quem in Anglia se habere scribit Turnerus, nunquam animaduertit. Truncus Cynaræ auctore Iouberio ex melle potius condendus, aduersus pulmonis infarctum. Sumi verò debent Cynaræ caules terrâ obruti & candidiores facti, saporisque mitioris.

Vfus domesticus.

Actio cum
tradit
Turci
Truncus
Cynaræ
melle conditus.
Dilectus.
Cornarius
Scolymum
non nouit.

Patet verò ex hæcenus dictis Cornario Scolymum non fuisse notum, quem suo tempore in cibum non venisse affirmare audeat.

CARDVVS SCOLYMVS

Sylvestris.

Scolymus sylvestris satiuo persimilis, caule Descriptio
Sprocero hominis altitudinem assequente: folia amplissima, cætera satiuo, sed tomento copiosiori obducta, cuius nulla est lacinia quantumvis exigua, quam non arment spinarum mordacium flauescens spicula, quibus & singula capitis squamarum extrema, sed maioribus multo rigidioribusque horrent, ipsa verò capita Satiui capitibus magnitudine cedunt: flammineus confusis purpureus. Semen Cicuti.

G 2

Alarum
hirci.
Disse. cere
vig.

Ad Gonorrhæam
Sativam
Vrina graueolens.
In deliciis
habetur



Carduus
Spinosus
non
est.

quidem filu. semper spinosus manet.

An Brasauolz in exam. syr. de Eupat. Acantha leuce, siue Spina alba, vel Bedegar?

Anguill. epist. 7. Cinara multum spinosa cum magnis foliis spinosis, abundans in Abruzzo ad pontem di S. Clemente.

De hac, ni fallor, Matthioloquitur: quando ait lib. 3. cap. 9. Falluntur, qui putant, stirpem illam Ptenici non abscissilem (nostri eam *Carciosa* appellant) cuius (hunc errorem notat etiam Appollo rad.) flore coaguli vice Hetruria vititur, album esse Chamaleonem. Nam eorum error ex eo maxime diluitur, quod hæc contra Chamaleonis albi descriptionem in longo admodum caule echinatos suos proferat fructus. Idem cap. 12. de hoc Carduo Scolymus sylu. ait. Sunt præterea qui spinam albam [Carduum Echinopum] esse velint echinatum illam ac spinis rigentem herbam, quæ Hetruscis in lacte cogendo coaguli vicem explet. Item paulò post. Errant [& in hoc etiam errore Ruellius versatur] qui sibi persuadent, Spinam albam illud esse Cardui genus, quod à Tulcis, eò quod [ve paulò antè diximus] coaguli vicem præstet, vulgò vocatur *Presura*. Tandem cap. 14. Cardui aculeati genus & illud est, cuius echinati capitis floribus Hetrusci coaguli vice vtuntur. An Matthiolus ritè dicat Ruellium hanc spinam albam putasse, videant lectores.

Ruellius
error

Carduus
aculeatus.

An Scolym.
Diosc. Clus.
Hisp.

Chamaeleon
Monspeliensis

Scolymus
filu. Diosc.
H. Lugd.

Chardon.
nerette.

Clus. H. sp. fortè huius meminit, cum ait: Scolymus Dioscoridis abundanter & spontè nascitur pinguib. Lusitanæ arvis. præsertim ad Anam veteribus dictum flumen, vulgò Guadiana, & plerisque Bæticæ locis. Eadem tradit Hist. poltr. ac figuram Scolymi satini exhibet hoc titulo: Scolymus Dioscoridis, Cactos Theophr.

Lobel. in Adu. & Icon. plant. Tom. 2. p. 6. Scolymus filu. siue Chamaleontha Monspeliensis: Cardon? sylvestris coagulatori? Cinara silvestris.

H. Lugd. p. 1437. Scolymus Dioscoridis, Cynara sylvestris Penz. de qua ait. Scolymus hic circa Monspelium in latis agris secus vias profluit, quæ indigenæ vocant *Chardonnerette*. Officinæ Chamaleontam, nulla prorsus nota ex iis quas Dioscorides memorat reclamante: partu etiam cum adhuc tener est, in cibis grato, & germinibus, ac radicibus, quæ præsertim germinibus connectuntur [nam inferiores & aliis depactas ob lignosam duntè respuunt] seu tenuissimis. Hanc plantam Pena Scolymum siluestrem siue Cynaram

Turneto Scolymus siluestris multò habet angustiora folia, quàm præcedēs hortens, spinæque longiores multò pungentioresq; totusque fructus spinis acutissimis horret.

Ait Bellon. Obl. lib. 1. cap. 18. se non posse assentire ijs, qui *Artichaut sauvage* volunt Carduum esse Pinnij, & *Artichaut cultivé*, Scolymum: quando-

aculeatam refert. Hoc tantum interest, quòd folijs angustioribus, aridioribus, & multò defloribus spinis sit: flores item eleganti purpura multo conferti lanugine. Huius delibatis caulibus teneriusculis & capitulis nondum in flores erumpentibus vichitare rusticos Italos ait Pena. Eius flore lac densant in caseum: eiusdem florem vulgò credunt contra feminarum sterilitatè valere, & grandaui partus ad iussu vsq; teapus continere.

Camer. hort. Carduus spontaneus apud Bruttios, idèoque nostras hyemes minis ægè fert, quà delicatus ille, qui spinas magonio deposuit.

Honor. Bello in epist. ad Clus. dicitur Agriocinara: de qua postea.

Scolymum siluestrem florentem vidi mense Junio. Abundat multis in locis circa Monspelium, maxime prope Peroux, quà itur ad mirabilem quandam fontem, quem sibi persuadent esse lethalem rusticis. Fons autem erat acidus vt gustant Io. Bauh. qui videtur sequere instar Cacabi magni repleti aquà bulliente. Colore aquæ croceus est. Provenit item inter Monspelium & Nemausum, videlicet propè Colombier & Euzian: alibi non obseruauit.

Cynara
filu.

Card. spont.
rarius C.
mer.

Locus &
Tempus.

CARDVVS AGRIOCINARA CRETENSIS, ex quo Costus niger officinarum.

Locus.

SVPIA Chisami arcem in insula Creta auctore Bellon. in Oblea montis parte quà Calochierorum monasterium, cui nomen D. Ioannes de Prædermos, situm est. Artuchocæ siluestris genus creferit, pastoribus Agriocinara appellatum, cuius radicem cubitalis longitudinis, & humani cruris crassitudinis, fortis & intus nigram, pyri in modum turbinatam, Costi Indici loco in Aromatariorum officinis venalem esse asserimus. Intelligimus autem nigram illam radicem quam Costum nominant, quamquæ ab omni antiquitate in vlu esse credimus. Capita fert instar Cinare siue Artuchocæ, quæ pastores cruda mandunt. Eius flos maximè ex parte candidus est (licet & purpureus inueniatur) & suavis odoris. Ipsius radices Chamaleonis albi radicibus similes sunt, & folia Chamaleonis nigri folijs. Differt ab aliis Artichocis siluestribus multis Italici locis nascentibus.

Artichocæ
filu.
Deceptio

Costus.

Florum
Gai.
retas.

CARDVVS MARIANVS SIVE LACTEIS maculis notatus.



VNDULATO macularum lactearum virescentiumque discolori variata folia, lata longaque conspiciuntur, sinuata, & levis aculeis horrentia, nitida: caulibus digitalis striatus, lanugine villosa incanus, duos aut tres cubitos altus, in ramos diuiditur plures: echini intrastabiles rigidissimis aculeis.

Descriptio

auti Carduique spinis armati, Scolymi mediocri-
magnitudine, callosa squammarum cartilagine,
dulci, velcâ, florum purpurascens flamina ex-
plicant, quibus semen fecerit Carthami: radix
longa & crassa, esculentâ.

Bruffel. Fuchf. Corn. Trago [qui & Labrum
Veneris appellari alicui] Carduus Mariæ & Spi-
na alba dicitur.

Cordo in Diosc. dicitur Carduus Marianus. Is
eorum opinionem non approbat, qui cum Ama-
to Chamæleonem dicunt, ceu nec eorum, qui
cum Fuchfio, Corn. Trago, Lonic. Toxite Helffr.
& aliis Bedegar album, h. e. spinam albam esse af-
firmant.

Sed & Dodon. gall. Spinam albam Carduum
Mariæ Officinarum vocat, ac quorundam Agri-
cinarum facit, Donacitum, Erythreum, Spinam
regiam, Carduum rariptarium, & Bedegar Ara-
bum, non sine errore: Quem tamen errorem
animaduertit Dod. lat. in fol.

Carduum Mariæ vulgi, aliqui [huius fatiæ est
Anguill. epit. &] Silybum Veterum putant ab his
tamen merito dissentit Gesn. de hortis, qui re-
ctius de coll. hip. Cardui genus nuncupat, macu-
lis albis quod à pleuride vulgò appellari tradit.

Lobel. in Aduersf. Silybum, Carduus Mariæ &
Lacteus dicitur. Is reprehensionem ex Turnero
aduersum Dodonæum adducit, ob vires quas ex
Dioscoride vulgaribus plantis tribuit. Dodonæi
sedulitas, inquit Lobelius, vt multis aliis locis
laudanda, ita plerique minus tempestua, vbi
ignotis plantis facultates certas asserit, quas ex
Dioscoride accepit, magno detrimento ægrorum
& experimentatorum, qui quod vident à viro
bono, & veritatis amico scriptum, illic vt verum
arripiunt, & per experimenta mortes agunt.

Obi. pag. 479. Silybum siue Carduus lacteus,
Leucographis Plinii Aduersario eum. *Leucogra-*
phin Plinii quidem aliqui voluerit, sed hæc non le-
gitimus in Aduersariis, vt hoc loco scribit Lobe-
lius.

Icon. Plant. Tom. 2. pag. 7. Silybum, Carduus
Mariæ & Lacteus, Leucographis Plinii.

Malè Amatus Chamæleonem album facit, nec
congruit nomen eius gallicum *Cardine*, huius
plantæ. Sed & Toxites in onom. phil. pag. 241.
Acanthion leucon Carduum Marianum cognos-
minat, & diuersos eo capite confundit Carduos
p. 354. cum Tribulo S. crucis & Tribulo S. Mariæ.
Loniceri vocabula, spinæ alba & *Arzichaut* sanna-
ge non sunt approbanda: figura quoque non
multum placet. Tabern. Icon. & Hist. Carduus
Marianus siue lacteus. Is falsò spinam albam, seu
Bedegarim, credit.

Camer. hort. Carduus Mariæ vulgi, eidem in
Epit. & Hist. Matth. germ. Carduus lacteus: C.
Bauh. apud Matth. Carduus lacteus, Carduus
Mariæ.

H. Lugd. duas habet icones. Priorem p. 1464.
hoc titulo: Carduus lacteus Matthioli. Posterior
rem p. 1475. hoc: Leucographis Plinii, Carduus
Mariæ. Vtrobique describitur: in illa figura folia,
in hac capitula non placent. Tertiò describitur p.
1466. sub Silybo Penæ sine icone.

Theod. Dorst. qui Bedegar, Labrum veneris
& Spinam albam Carduum Mariæ cum Fuchfio
& aliis non sine errore opinatur [ait enim hanc
in omnibus conuenire cum descripta ne Spinam
albæ apud Diosc.] Etingii iconem, non Cardui
Mariæ proponit.

Cæterum, Carduus lacteus, Lactarius, D. Ma-
Tom. III.

riæ, Marianus, & lacteis maculis notatus Lat. con-
gruè dici potest, Germ. Mariendistel & frauwens-
distel, weiß wegdistel. Belg. Ouser vrouwen dis-
stel. Gall. Chardon de nostre dame. It. Cardo Ma-
riano, Cardo maculato, Scardacio bianco. Hisp. Car-
do pinto. Angl. Our lady distel. Boh. Oštro-
pes.

Paslim Montbelgardi prouenit, nec non Besi-
lez, Lugduni & Genevæ, in hortis, in quibus
olera seruntur, non rarò & secus vias locis incol-
tis, florens à Iunio in Augustum vsque: altero à
quo enatus est anno: interea & semen maturi-
tatem consequitur, quo maturo perit, vt pleri-
que Cardui, quibus non diuturnior est vita,
quàm ad seminis vsque perfectionem.

Radix exsiccata auctore Matthiolo in Epit.
Camerarii, abstergit, aperit, prouocat & attenuat.
Eius decoctum datur vtiliter potandum ad ioci-
noris, & valorum infarctus, & remorantes vi-
nas, quare confert hydropicis, ictericis, ac ne-
phriticis. Item menses elicit, tum potum, tum in
deflectionibus additum: Radicum siccatarum pul-
uis propinatur ex pituita cum Fœnieuli semine,
& longo Pipere ad lac augendum. Aqua, vt
Tragus perhibet, è foliis Cardui Mariæ destillata,
ac quantum mediocri haustu coninet pota, la-
terum morbo auxiliatur. Si huic potioni seminis
Cardui Mariæ tussimidiachmæ adie-
ceris efficacius id præstabit, quin & pestilentiali
veneno, & quibuscunque aliis corporis interitis
malis exigendis apprime conducit, aqua destilla-
ta inflammationibus incensi hepatis, & deliquio
animi in linteolis foëis imposta opitulatur. Cæ-
terum Cardui Leucographi folia tenera, demptis
spinis, aliquando olenbus non incommode ad-
di, testis est Dodonæus: ad quæ præterea vili-
a incognitum est.

Locus &
Tempus.

Vires
Decoctum
radicis.
Valorum
infarctus
Remorantes
vina.
Menfes
Puluis rad.
Lac. auger.
Aqua Fo-
lorum
Laterum
morbus.
Pestilentia.

CARDVVS LACTEVS PEREGRINVS

Camer.



Semen subal-
boicans in-
uenit anchor
inter Epithy-
mum è Creta
delatum; sed ad
frugem non
peruenit plan-
ta, frigore su-
perueniente
corruptâ radice,
& mox conta-
belcentibus fo-
liis, quæ tene-
riora erant &
plantæ familia il-
li Carduo quæ
isdem Lacteu
nuncupat. D.
Rauuolfius,
vel Bedegar
Arabum cum
An. Bedg.

Descriptio

Synacis herbis aliis ipsi communicatum; florè
purpureo pallescente, caule & albedo, spinis ni-
dis è luteo albescentibus. Fortasse idem fuerit.
Nos iconem ex sicca à Camer. delicatam pro-
ponimus.

Camer. hort. Cardui Mariæ vulgaris species, Card. Ma-
riæ quem Rauuolfius Carduum Lacteu vel Bu-
ria Camer.

G 3

ynon.

Card. Ma-

ria.

Card. Ma-

rianus.

Spinæ albæ

icon est.

Card. Ma-

ria Dyd.

Card.

Erser. Dod.

Card. Ma-

ria Vulgi

Silybū ve-

terum.

Card. la-

teus.

Dodon. re-

arguitur.

Silybū Lob.

Lob. lapsus

Leucogra-

phis Plinii

Chamæleon

albus Ama-

to.

Acanthion

leucon To-

xite.

Lonic. no-

menatura

venitur.

Tabern.

lapsus.

H. Lugd.

icones dua

tres de-

scriptiones.

Descriptio

Erser.

Nomina

linguarum

*Cord. la-
teus Syria-
cus.
Card. Ma-
ria Syria-
cus.*

deguar Arabum vocat. Item Icon. Carduus la-
teus Syriacus.

C. Bath. apud Matth. Cardui Matz altera spe-
cies ex Syria. An Honorii Belli Agavianus Cre-
tici filius spinosa quam Acanon Veteribus di-
ctam fuisse iudicat, ac à qua reliqua spinarum ge-
nera Acanacea nuncupata fuere.

CARDVVS GALACTITES IOH.

Bauhinii.

Descriptio.



Galactites
Carduus,
necur *radice*
fatis tenui &
simplici, *caulem*
tollens inter-
dum simplicem,
interdum ra-
mosum, cubita-
lem, sinuatum,
cano villo pu-
bescentem, mem-
branis spinosis
pinnatum, cu-
ius summum in
furculos ali-
quot fceffit,
capita sustinē-
tes Acellanæ
magnitudinis,
squarrola, quo-
rum singulæ

squamme in longam, acutam, inuolidam spinam
desinunt: hinc flores emicant purpurei, gratia
suz post multos annos tenacissimi: *semen* pappo
appenditur, oblongum, lubricum, candidum, a-
marum, cæterum folia palmo longiora, mitius
aculeata, profundis crebrique lacinis diuisa, ima
parte albida lanugine donata, supernâ virelunt,
fortuitis maculis lacteis respersa.

H. Lugd. p. 464. Spina alba altera Matthioli, &
alibi, Leucantha Monspelienum Dalecham-
pij. Dux figuræ vnius plantæ & nulla descri-
ptio.

Locus.

An Casalp. lib. 13. cap. 40. Spina alba alia?
Carduus Galactites floret vere secus vias non
longè à Monspelio.

ACANTHIVM VETERIBVS.

CAP. VII.

*Antiqua
Dioscoridis
lectio.*

*Est corrup-
ta*

*Acanthium
Plinio.*

Acanthium (πτερόκαυλος ὄφιον) inferitur in
hoc cod. vet. folia gerit spinæ albe similis,
in summis extremitatibus aculeata, quibus colle-
ctis, similiq; contextis, bombycinis similes ve-
stes fiunt. Huius *radix* & folia retrorsum disten-
tis opisthotonicis in potu auxiliantur. Et hæc est
antiquæ lectionis in Dioscoride descriptio. Per-
nisse autem huic lectioni aliquid, sermonis parum
seu quæ ductus ostendit. Quid autem desiderare,
& amissum instaurare? vi Marcelli verbis utar,
nos oporteat, id ex deprauata lectione & etiam
ex Plinio, & magis tutò ex Orbasio, manifestè
colligitur. Nam Plinius, qui de aculeatis plantis
qu. buld. in igitur. 24. cap. 2. Acanthium hoc his
verbis descripsit. Huius similis est Spina illa, quam
Graeci Acanthion vocant, minoribus multò foliis,
aculeatis per exu emittates, & aranco salanugine

obductis: quæ collectâ, etiam vestes quædam
bombycinis similes fiunt in Oriente. Ipsa folia
vel radices ad remedia Opisthotonis bibuntur.
Et sic etiam Orbasius legit. Patet ergo Diosco-
ridem ita esse restituendum. Spinæ albe similis
habet folia, in summis extremitatibus aculeata,
arenosa lanugine obducta, ena collectâ &c. Re-
liqua enim rectè habent. Hæc namque si quis
conculerit, omnia eadem vtrique esse inueniet,
præter ea, quæ Plinius ait, lanugine obducta, quæ
ad explendam Acanthij historiam tum necessaria
sunt, vt sine ijs non possit integer sensus esse
Dioscoridi, contrarie suo loco instauratis nihil
aptius audiatur. Quomodo enim quæso ex acu-
leatis foliis simul contextis vestes bombycinis si-
miles fierent. At ex lanugine ex foliis collecta
texturæ vestes bombycinis similes fieri nemo
negabit. Neque verò ignoro aliud esse bomby-
cem, aliud verò bombacem seu Xylum, gossy-
piumve: sed & Plinium imitari lubet, qui Xylo
quoque seu gossypio bombycin nomen tribuit
lib. 19. cap. 1. Quæ verò sit spina Acanthium di-
cta, & an in nostris regionibus nascatur, nemini
fatis notum esse arbitror. Quum enim nulla ta-
lis spina apud nos reperiat, ex Oriente peten-
da videtur. Galenus Acanthij folia & radicem
tenuium partium esse, & calidam vim habere af-
ferit, vt etiam conuulsis auxiliatur. Ita ex ipso
etiam Paulus.

SPINA ALBA SYLVESTRIS

Fuchio.



Descriptio.

Tres qua-
tuorve
cubitos altum
profert *caulem*,
sinuatum, ro-
mentofum, cui
membrane per
longum adna-
ta, valde spi-
nosa, sinuata,
albicante villo
obducta, quib-
us cōtinuan-
tur folia, selqui-
palmaria & do-
drantalia, in-
terdum cubi-
talia, sinuata,
spinis horren-
tia, similiter
vtrinque villosa
& candida, po-
tissimam minora, priusquam excreuerit caulis,
capita extremis ramorum hærentia mordacia *flora*
rem explicant purpureum, *semine* cum pappis se-
quente Cnici, minore, versicolore, amaricante &
acti, *radix* tenera, alba, subdulcis in adolescente
planta, quæ qualitates per ætatem mutantur.

An Ruell. lib. 4. cap. 16. Acanthion herba: Gorth.
Acanthion: Brunfels. in Dioc. Acanthion, albe
spinæ simile: Cordo in Dioscor. Chamæleon al-
bus, Carduus Dichotylus à quibusdam falsò ap-
pellatus: Braslauolo in Iyr. Eupat. Leucacanthi,
Cardui genus quadratum; Amato Acanthium,
quod in horto Azaroli Ferrariensis vidit, Anguill.
epist. 8. Onopordon Athenzi, in Calabria & in
Sicilia Anaperdæ, & ab Itals Scari d' Affno dictum?

Ryffius

Spina alba
ignorum
Fuchsi.

Ryffius in Diofcor. lib. 3. cap. 16. hanc intellexisse videtur, per spinam illam, quam in agris nasci tradit, & Acanthion esse, asserere non audeo. Corn. in Diofcor. Spinam albam Officinariam Bedegare vocat, ac à Carduo Mariano, weiff wegdisfel / wichdisfel / non bene, meo quidem iudicio, distinguunt.

Spina alba
filv. Fuchsi.

Fuchfio Spina alba filvestris, spinæ albæ alterum genus siue filvestre, proximè ad Diofcoridis descriptionem accedens, ideoque à Germ. Weiff wegdisfel / Gallis autem *Artichaut sauvage*, ou *Chardon commun* vocatum.

Spina alba
Tragi.

Tragus hanc spinam albam inscripsit, ac Germ. weiff wegdisfel nominat, & esse alteram apud Diofcor. spinæ albæ speciem (quæ Græcè *ἀκανθα λευκή* Arabibus Bedegare dicitur) neminem negare posse putat, & Spinæ albæ cognominem pro more suo recenset. Sunt autem hæc. Agriocinara, Donacitis, Erysiceprum, Spina alba, Auregia, Carduus Camptarius.

Amat. re-
preh.

Apud Amat. capite de spina alba ponitur figura spinæ albæ filvestris Fuchfii (ita enim à Fuchsi inscribitur icon, quæ eadem cum nostra est) licet in Amati contextu eius non fiat mentio.

Lonic. nota-
tur.

Lonic. cuius icon satis inepta cum Calepino etiam spinam albam seu Acanthium leucum vocat: ac præterea Leucacantham cognominat, licet Leucacantham Diofcor. separet. Eidem etiam spinæ albæ filvestris dicitur.

Card. 3.
Hæchio
Acanthium

Matth.
March. re-
preh.

Hæchio. in enchir. med. Carduus tertius, weiff wegdisfel Germanorum.

Matth. plantam nostram in post. comm. cum mag. fig. lat. & Ital. pro Acanthio depingit, ac dicit. Si planta in Italia nascitur, quæ legitimum Acanthium repræsentet, hæc præterea Acanthium mihi rectè repræsentare videtur. Siquidem folius est & albæ spinæ per extremitates aculeatis, & araneosâ lanugine obdus. Matthiolus suo more ex sola figura, non cognita planta de qua scribit, dicit repræsentare Acanthium: non agnoscit eam dadum esse exhibitam pro spina alba nec docet qualis sit, quam exhibet, nec ubi videtur.

Acanthium
Dod. gall.
Acanth. al-
eorum Lat.

Icones 2. Do-
don.

Dod. nota-
tur.

Dodon. lat. in fol. figuram, quam gall. ex Fuchfio olim simpliciter pro Acanthio posuerat, Acanthi alterius nomine proponit, addens aliam figuram pro Acanthio, quæ etiâ assumptis Lobel. in Obs. p. 476. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 1. Sunt igitur duæ figuræ vnius plantæ. Posterior ex Fuchfio, qualis etiam nostra, æquè bene exprimens Acanthium atque prior Dodonæi & Lobelii. Et licet duas habeat figuras & descriptiones, minus distinctè tamen de hoc Carduo scribit, nec ostendit quod potius Acanthio conveniat, nec etiam tradit, an eodem vel diversis proveniat locis.

H. Lugd. 4.
figura.

H. Lugd. duas vnius plantæ ponit figuras pag. 1446. vni hic titulus: Acanthium, Spina alba filvestris Fuchfii. Non placet & tertiam huius plantæ figuram p. 1466. poni sub titulo Silybi, siue Leucacanthæ Loniceri. Præterea Lonicerus non meminit Silybi, nec etiam vocat Leucacantham: pro Leucacanthâ pingit aliam plantam, quamvis in comm. in Diofcor. eam fortè intellexerit. Considerent lectores an huius plantæ non ponatur quarta figura p. 1472. pro Onopyxo tertio Dalechampi, & male fortè.

Castor. no-
natur.

Per Acanthium, cuius figuram ponit Castor, intelligo spinam albam filv. Fuchfii, quæ fortè Castori non bene nota, aliqui picturam floris posuisset, vel eam descripsisset, quum vulgaris sit planta, & ab aliis melius depicta.

Comiti à Neuenare in annot. apud Brunfels.

Tom. 2. p. 242. Carduus armentarius siue pectuaris, Germ. Viechdisfel: Carduus albus Brunfelsio.

Camer. hort. Acanthium, Onopordum aliis. C. Bauh. apud Matth. spinæ albæ filvestris, Acanthium Matthioli.

Hort. Lus. Acanthium vulgare.

Cz. latp. Carduus filvestris in rudibus nascens: foliis latis non scissis, candida lanugine hirsutis: capitulis hispids, non squamiosis, sed potius hirsutis: vñus eius ad lactis coagulationem, idè à quibusdam vulgo *Prasura* appellatus.

An hort. Lus. Carduus spinosissimus viarum flore purpureo; Onopordum 1. Tabern. Item Carduus spinosissimus flore albo, Onopordum 2. Tabern. Wegdisfel mit purpurbraunen vñd weissen blumen?

An Schvencxf. Carduus viarum vulgarior; Carduus vulgaris spinosissimus, Lob. Onopordum 1. Tabern. montanum?

An Ioh. Agricola Carduus pectiarius?

Tabern. Icon. & Hist. Acanthium vulgare flore albo, weiff wegdisfel. Acanthium vulgare flore purp. reo, wegdisfel mit purpurfarben blumen/wegdisfel: dicitur Græcè *ἀκανθα λευκή*, Lannis spina alba: Acanthium: Arabibus Bedeguar: Gall. *Espine blanche*. Ital. *Spina bianca*, Boh. *Tabern. in-
natur.*

Trubisly. Non placet poni duas figuras plantarum, quæ solo colore differant, non video etiam quomodo Acantha leuca & Acanthium idem esse possint: figuræ etiam duæ pro Onopordo 1. & 2. vix demonstrant discrimen nec etiam descriptiones. Montbelgard. abundat: Obervau. etiam Mospelii, & Lugduni: Genevæ solet hiemem perferre. Silesia provenit propè pontem Bisle extra portam S. Albani, mixtè tomentosa & cadidus inferitè & supernè, maximè folia minora priusquam florem ferat. Nascitur in vitæque Germania secus vias, tum & alibi. A Iunio in Augustum vsque floret: altero à quo enatum est anno: interea & semen maturitatem consequitur, quo maturo perit, ut plerique & alii Cardui, quibus non diuturnior est vita, quam ad feminis vñ. que perfectionem.

CARDVVS QVIBVSDAM DICTVS

Acanthium Lyncurialis vñd
Onopordon.



Magnam Descriptionem habet cū Spina alba sylvestri Fuchfii similitudinem: folia tomento candicante similiter obdusca, profundè secta, tota spinis armata: caulis membranæ aculeatis alatus sex septemve cubitorum altitudine: in ramorum, quos crebros habet, extremis flores gerit purpuratos iam dicti

Cardui, ex echino etiam simili.

Onopordum
Tabern. &
Dod.

Tabern. Icon. & histor. Onopordum i. weis wegdissel. Dod. lat. in fol. Onopordon inscribit, ac ait: Peregrinus hic Carduus Belgio est. Onopordon Herbarij appellant: Plinij tamen esse Onopordon affirmari nequit: nihil enim apud eum de Onopordi forma. Fortassis etiam Acanos est, quem Bellonius omnium Carduorum spinosissimum refert: & in Creta hac ætate Aconachiam vocari. Pauca autem de Acano à Veteribus prodita extant: pauciora verò etiam de Onopordo. Certius est Acanon spinam esse, quam Onopordon. Cur Dodon. non subnectit Onopordon, Acanthio cum quo plucima similia.

Acanth. Illy-
ricum.

Lobel. Adv. Acanthium Illyricum. Obi. p. 476. & Icon. plant. p. 1. Tom. 2. Acanthium Illyricum, Onopordon alterum Herbariorum & Dodonæi.

Acanth. Illy-
ricum.

Camer. hort. Onopordion vel Acanthium Illyricum, Lusit. Acanthium Illyricum Onopordum weindisch weis wegdissel.

Locus &
Tempus.

Acanthium Illyricum primò vidi Lugduni in horto meo ubi satum fuerat per Valerandum Dorez qui semen ex Sclauonia attulerat, in meo etiam horto vidit Lobelius: Carduus est spinosissimus qui affinitatem habet cum Carduo sylu. Fuchsij: satum Montbelgardi in Horto E. C. prouenit & flores protulit. Argentor. 1595. Octobri vidi in horto Frederici Moser, qui semen dedit nomine Cardui Dalmatici.

CARDVVS ACANTHOIDES.

Descriptio



Haud mi-
nora sunt
huic folia quàm
Carduo Mariz,
per ambitum
magis spinosa,
caeteris medio-
critè profun-
dis, sed quibus
nullæ asperæ
lactæ macule,
nec illius adeest
glabrities, quin
cano tomento
oblita sunt,
potissimè infe-
rius, superne e-
nim præualet
vitor inter cæ-
dorem tomen-
ti interlucens:
caulis duorum

caulitorum, quaternò alarum spinosarum versu pinnatus, capitula parua, sublonga, extremis ramorum plura simul congesta, nec pediculis distincta: [quo nomine tum à Carduo Mariz, tum ab Acantho sylvestri Fuchsij haud obscure discernitur, et in cæteris valde similis.] flores dilutè purpurascens, quos pappi albicantes excipiunt. Sapor huic plantæ nullus euident.

Locus &
tempus

Carduum hunc Acanthoidem florentem obseruavi Monspelij mense Martio. Colendissimus præceptor Gesnerus, cui omnes meos labores communicavi, Acanthium Matthioli fecit.

CARDVVS MONSTROSVS.

Descriptio.

DE Carduo hoc monstruosa formæ Cornu copiz representante, quem Ferdin. Imperat.



Hist. sua natu-
ral. lib. 28. cap. 1.
exhibet, & exi-
stimat fuisse O-
nopyxō Theophrasti,
quid dicam, nunc non
habeo. Vellem
Imperatorem di-
lectus descri-
pisse, & cum
Onopyxo
Theophr. con-
tulisse, locum-
que ubi eum
inuenit an-
notasse, quò
posteri ed facili-
us veritatem
indagare po-
tuisent.

CARDVVS NVTANS.



Similis est Descriptio

S Carduo syl-
uestri Dodonæi, verum hu-
milior multò,
caule pedem v-
num aut alteru
alto, in va-
rios scisso ra-
mos subhirsu-
tos, & mem-
branis spinosis
per longum a-
latis: folia mi-
nora, asperio-
ra, minùs pro-
fundè, cre-
bris tamè la-
ciniata, spino-
sa, & hirsuta,
per extrema
ramorum in-
terdum sine villis spinis, verum tomento tecta,
rotunda. Suum gerit vnusquisque ramus echi-
num, magnum, Cardui Mariani similem, deorsum
nutantem, squamis aculeatis, latioribus quàm
in Carduo sylvestri, compactum: strobili copio-
si, purpurei, interdum albi, latè se expandunt: radix
rubescens vel nigricans.

Dodon. hist. purg. in app. pag. 451. & Lat. in fol. Cirsion tertium tota sua stirpe magis spinosum.

Clus. Pann. pag. 660. capite de Cirsio ad finem, & Hist. post. lib. 5. p. 150. de hoc Carduo loquitur, cum ait. Non minùs vulgaris agro Viennensi, multisque Pannoniæ locis, & apud Francofurtum est quàm in Zelandia, Flandria, Hollandia: quæ marium, spina illa, quam Dod. inter Cirsij genera tertio loco recenset, magno, valde spinoso, nutantèque capite, è quo flos multis purpureis elegantissimisque staminibus constantem emergit, quem nunc flore variare aliquando meministi. Est semine Cirsij.

An Tabern. Icon. & Hist. Onopordum 2. weis wegdissel: Si intelligit Carduum nutantem, ut videtur, non probo eius figuram, eaque minùs illam demonstrat, quàm Fuchsianam.

Consi.

Lugd.
andem
bis
describit.
Drypis
Lonic.
Lonic.

Locus
tempus.

Descriptio

Considerandum aliis relinquo an nō ab Hist. Lugd. lib. 14. cap. 26. describatur & depingatur bis eadem planta. Primō p. 1479. nomine Drypidis simpliciter. Secundō pag. 1480. pro Drypide Scolymo, & Carduo siluestri Loniceri, Aculeosa Gazæ, Ruellii Oxycantha. Ego Drypidis nomen apud Lonicerum non inuenio, figura quidem est (quauis non admodum felix) in Hist. germ. lib. 5. cap. 29. nomine *Gentlein* haberet [Carduum vulgarem auenaceum dixeris] quem postea vocat Carduum siluestrem, & Scolymum syluestrem, qui sanē non videtur obseruasse Tragum l. 2. c. 10. varias species syluestrium Carduorum intellexisse & nō vnicā, vt Lonicerus describit.

Hort. Lus. Card. siluestris Dodon. capite grādi. Carduus capite nurrante floret Augusto. Abūdat circa muros & foss. s. vrbis, necnon in agr. s. vt inter *Audincourt* & *Arboretum*. Frater Casp. obseruauit etiam Basileæ. Flore albo obseruauit in ducatu Wirtemb.

CARDVVS CAPIT E TOMETOSO.



Tomentoso striato caule, crebrisq; ramis spicato ad duos aut tres quatuorve cubitos asurgit, qui licet non sit pinosus, vix manu potest attingi propter foliorum aculeos: folia cubiti 16-ga tomento viloso inferius incana; superius atrouirentia, & Echij modo aspera, ex plurib. foliis minorb. quæ ex certis intervalis qua-

terna, vtrinque bina, altero antrosum, altero retrosum posito, conflata, spinis longis rigidis acutis minacia: caput pugillari lapidi æquale, latum, squamis paruis longis & spinis parum mordacibus densissima lanugine intertextis: flos ex eius summo emicat, constans multis staminibus & diversis coloribus, qualibus Hyacinthus Fachel maximus, violaceus & cæruleus: apices involuntur vaginula alba, quæ suā albedine pulchrè hunc florem ornat, hanc vaginulam alia circumdat purpurea in quinque apices diuisa, sub floribus caro alba grati & aromatici saporis: semen lubricum cineraceum, striatum, oblongum, modicè compressum, dulce, tomento involutum: radix crassa, guttu non ingrato, sed aromatico, quali etiam caulis & foliorum, si excipias medullam albam siccam & insipidam: ubi capita excinduntur apparet lacteus succus.

figura ma-
Bauh. not.
Corona fra-
trum.

Lobel. not.

De eo Lobelius in Ad. cuius pictura non placet, ita vt mirari subeat, Patronum Matth. quod suum Matthiolium eā ornare ausus sit. Is in Obs. g. 482. vocat Coronam fratrum Herbariorum, & Carduum Eryoccephalum Dodon. In Icon. Plant. Tom. 2. pag. 9. Carduum tomentosum, Coronam fratrum Herbariorum: Item p. 10. Carduum tomentosum Aduersiorum. Dux figuræ vnius plantæ. Mala Aduers. poterat omitti, imò debebat.

Tom. III.

Camer. hort. & Dodon. lat. in fol. dicitur Carduus eriocephalus, vt & Clusio Pannon. p. 666. & Hist. post. l. 5. p. 154. de quo ait. Carduum eriocephalum vulgo Herbariorum satis notum flore albo variare obseruui. Eum autem qui est flore purpureo, sed longè humiliorem, aliquoties eruiere memini agro Salmaticensi in Hispaniis, cuius semen amicis in Belgicā misi cum hac inscriptione, fortè Corona fratrum, quoniam multis notis respondere conspiciebam ei plantæ quam Monachi in Meluem. commentatores sibi in Hispaniis obseruatam, Coronam fratrum appellarent, quod rami æquali altitudine nascentes, & suis capitibus eriophoris onusti, medium caput maiusculum summo cauli innatum, quodammodo in orbem cingerent, vt Monachi suū n. Abbatem aut Priorem solent. Ex eo tempore Coronæ fratrum nomen apud Belgicos herbarios hæc spina obtinuit: postea tamen à capitibus candicante lanā involutus, conuenientiore appellatione Carduus eriocephalus dici cœpit.

Flora alba.

Corona fratrum cur inferserit Clus.

Eriocephalus inde.

An Carduus tomentosus echino lanugine obdueto Mitch. in Diosc. An eiusdem Carduus caule rotundo sentela aranæ obducto, in Hist. Germ.?

Card. mop-
tan echino
lanugine
obducto
Matth.

Non placet tres figuras & tres descriptiones vnius plantæ diuersis locis ponere ab Hist. Lugd. quasi diuersæ sint stirpes. Huius prima est p. 1446. hoc titulo, Acanthium montanum Dalechampi: hoc quod in gelidis montibus, vt in monte Iura, nascatur, ita cognominauit. Altera est p. 1472. pro Onopordo, quod Onopordum Plinii rectè dici posse Dalechampus putat, & Parisienses seruata græci nominis significatione *Per d'Asne* vulgò vocare ait, & affirmat asinos eo gustato subultare, crebròque pedere: in locis cultis & pinguib. pecudum morsu non violatum ad hominis proceritate crescere. Tertia figura ponitur p. 1474. pro Iacea lutea Clusii, & describitur p. 1483. pro Carduo Eriocephalo Dodonzi, Carduo tomentoso Anglico, seu Corona fratrum Herbariorum. Melior itaque figura transposita est sub nomine Iacæ luteæ Clusii, quæ relegenda erat ad caput de Carduo Eriocephalo: pro Acanthio deterior exhibetur.

Card. Eriocephalus.

Huius figuræ est transposita.

Quam pro Spina Arabica figuram adieci apud Matth. (inquit C. Bauh. spinam Arabicam Diosc. & Plinii ceteri Cæsalpinus, ac Aduers. & Lob. Carduum tomentosum nominant, Suchaba Arabum Guilandino dicebatur. Hæc scæter, Ait Cæsalpino Arabica spina propè cubitalis est, rami infirmi, cum paucis foliis viridibus, modicè pungentibus. Carduo verò tomentoso teste Dodon. & Lob. caules crassi, ternum quaternumve cubitorum, incana lanugine obfusi, folia magna spinosa, pronā parte candidiora: quæ rationes faciunt vt non existimè Carduū tomentosū esse Spinā Arabicā Cæsalpini.

C. Bauh. not.

An Bacchanello Acanthium illud, quod quid sit nescit, etsi aliqui Carduum montanū pro specie Acanthii demonstrent?

An Cæsalp. Acanth. aliud in agrorū limitibus passim nascens maius & nigrum, in omnib. Spinæ albæ campestris simile, sed colore viridi, nigricante: capitib. nō tantā lanugine fudentib. vt Acanthiū?

An Monach. in Mel. dist. 6. cent. 189. Cardui genus, caule carens, qui Corona fratrum dicitur?

An Thallio Cardui species capitulo spinoso, candidā lanugine, squammas eius intercutiente?

An Rauuuoiff. in Itin. l. 1. c. 1. Carduus tomentosus circa Marsiliam, Leucacanthæ non dissimilis? Satus primo anno caule nō ferit, sed sequenti, postea perit, se suo semine decidui propagas. Olim colebā in horto meo Lugd. & postea Geneuē cā de

Locus. tempus.

CARDVVS CAULE CRISPO.



AD eubium & lesquicubium & aliis affurgit, caule digitali, lobitudo, viridante, membranosis laciniatis spinosis, crispo implexu undulatis, per longi tudinem adnatis donato fituloso, multis alis concavo: folia firmata dodrantalia aut minora, atrourentia, hispida, aculeis mordacib. crebris pungentia,



& Lat. in fol. per Carduum siluestrem alterum intelligat Carduum nostrum repentem? descriptio conueniret, si addisset radicem repetere, quod forte non obseruauit. *Figura Dod lat. est transposita.*

le posita est pag. 716. pro Carlina siluestri, Carduus sil. alter.

An H. Lugd. pag. 1471. & 1472. Onopyxus alter. An Spina Ceanotus Theoph. Anguillare & Lobelio?

Gels. coll. stirp. fol. 66. Carduus aruenis, Haber distel. Eidem hort. Carduus aruenis maior purpureo flore, qui flore nondum nato, modicum olebat Carduus aruenis.

Tragus hanc inscripsit Carduum siluestrem, acintei fruges, potissimum vero auenam enalsci scribit, ac dicit. Ex Carduis siluestribus alij proceritate viri attingunt, quidam humiliori statu contenti sunt, in vniuersum tamen omnes aculeatis, & dissectis foliis caulem ambientibus praediti, nec non capitulis [quorum alia rufos, alia candidos, nonnulla roseos gerunt flores, cetera Carduo puellarum, consimiles] in vertice spinosis emicantes. Eorum semina oblonga apparent, punicea ferè coloris, leuia, ac Carduo Mariae magis exigua. Vniuersa Carduorum iam descriptorum genera, quae agricolis & messoribus subinde impedimento sunt, nos vitia frugum, seu Carduos siluestres esse iudicamus, de quibus Vergilius in hunc modum.

Carduus & spinis surgit Palampus acutis, Germani Haberoderfeld distel vocant. Thalia Carduus auenarius, seu siluestris Tragi. Tabern. Icon. & Hist. Carduus aruenis, Aeter distel. Hort. Lus. Carduus aruenis, Catdus auenarius, Cardus silv. Tragi.

An Schvvenck. Carduus aruenis seu Auenarius Thalii, Carduus segetalis, Aculeosa Gazæ Aduers.

In agris passim abundat & vineis, vt & in Horto r. c. & aliis multis, in vrbe & extra. In multis locis Getmaniae & Galliae etiam obseruauit, florentem Iulio & Augusto.

CARDVVS CHONDRYLLOIDES
Dalechampi.

Carduus Chondrilloides Dalechampi ita cognominatus, quod foliis Chondryllam secundam valde imitetur. Crescit in asperis & saxosis, radice dodrantali, lignosa, dura, candida, obliqua, tenuissimis villis capillata: foliis proximè radicem multis, laciniatis, & circumrosis Chondrilla modo, breuib. & aculeatis, in superiore caule paucis.

H 2

CARDVVS SERPENS LAEVICAVLIS.

AD lesquicubium & aliis excrevit caule tenui, singulari, leui, striato, rubenti, cui folia alternatim adnascuntur Cardui caule crispi mihi dicti, modò tomentosa, modò glabra, modò angusta, modò latiuscula, minus profundè laciniata: scapus in aliquot furculos diuiditur, quibus insident echini plures, oblongi, parum admodum aut nequaquam mordaces, squammati, purpurascetes, odorati, ex quibus emicant flores staminei carulei, interdum albi: radix longè latè que sub terra serpit, tenuis, subinde nigricans, odore faui graui. Ea autem minus bene picta, sicuti & flores, in figura nostra ex Fuchsianis.

Considerandum an Dodon. Gall. lib. 4. cap. 73.

Tom. III.

HISTORIÆ PLANTARVM

qui pedalis est, in ramulos ferè duos tantum diuisus, teres, angulosus, in cuius cacumine capitulum nullum, sed eius vice corticosus vertex, ut in Borragine circinatus, velut in radios dispersitus: flos aureus, in pappos euascescens: Quod itaque Scolymo proprium esse vult Theophrastus, ut spinoso capitulo, quod Acanum vocat, is careat, id & huic Carduo commune est præter aliorum Carduorum naturam.

CARDVVS ARÆOPHYLLOS Dalechampi.

Descriptio.



sed laminularum positu, ordinibus, & scanst in æqualitate leuissimè tantum attritantum manus scabentia: flos purpureus est: semen paruum, oblongum, inter omnia Carduorum genera mollissimè & longissimè lanugine reconditum.

Dolendum Dalechampium non addidisse locum vbi hunc & præcedentem Carduum obseruauerit.

DE CHAMÆLEONE ALBO Veterum CAP. VIII.

DE Chamæleone Veterum dictus exordium petere liceat ab albo, huncque à nigro separare conueniat. Vires siquidem radicem, auctore Theophrasto, inter se distant, & ipsæ radices inter se specie differunt. Ita namque de albo Chamæleonte, quam Theodorus Vernilaginem vocat, inquit: radice distat à nigra: candida enim est, dulcis, crassa, & grauior olens, utilis traditur ad alui profusiuia decocta: dissecta Rhaphani modo digeritur in taleolas, & iunco transfigitur: valet & ad interaneorum animalia lata, acetabuli mensura in vino austero pota, sed præsumptâ uia palata: occidit & canes & fues: Canes quidem subacta in farina hordacea, cum aqua & oleo: fues autem cum Brassica: & si hominem ægotantem expecturi volueris an viuere possit, lauandum eâ radice triduo iubent: hoc enim si tolerauerit, moriturum nequaquam existimant: nascitur aquè omnibus locis folio Scolymi, verum ampliore, & terræ proximo: capite magho Acano simili: vnde quidam Acanum eum vocarunt. Alibi Ixiam

vocat, quæ in Creta habere lacrymam dicitur, alia autem apud eundem est Ixine: nam in eodem capite vtriusque meminit, tanquam diuersarum. Alia quoque intelligitur apud eundem nomine Chamæleontis seu vernilaginis: folio scilicet non aculeato, ut in Carduo satiuo diximus.

Chamæleonem album idèd Ixiam appellant, ait Dioscorides, quod quibidam in locis viscum ad ipsius radices inneniatur, quo etiam pro Mastiche vtuntur mulieres. Folia habet Silybo aut Carduo similia, sed Chamæleontis nigri folijs asperiora [χαλκίτρυψις]. Sic Orbafius, Plinius, itémque Serapion: codex Aldinus habet *μαλίστρα*, hoc est: crassiora, acutiora atque validiora. Caudem non promit: verum ex medio spinam echino marino aut Cinaræ similè erigit: flores verò emitit purpureascentes, capillorum figura, qui in pappos euascescunt: semen Cnici simile: radicem in laxis quidem collibus crassam, in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, odore graui, dulcem. Hæc pota acetabuli [uterque Goupili codex *modicum*] mensura, latum ventris lumbricum pellit. Sumitur verò in vino austero cum origani decocto. Hydriopids quoque commodè drachma in vino datur: etenim eos extenuat. Ipsius quoque decoctum contra difficultatem vrinæ bibitur. Aderiatur & in vino pota virulentarum bestiarum venenis. Canes autem, si quæ ac mures occidit, subacta cum polenta, aqua quæ & oleo diluta.

Chamæleonem, inquit Plinius, aliqui Ixiam vocant: duo generacijs: Candidiora asperiora folia habet, serpit in terra, echini modo spinas erigens, radice dulci, odore graui. Quibidam in locis viscum gignit album sub alis foliorum, maxime circa canis ortum, quomodo thura nasci dicuntur, vnde & Ixias appellatur: Hoc vt mastiche vtuntur mulieres. Quire vt Chamæleon vocetur, varietate foliorum euenit. Mutat enim cum terra colores, hic niger, illic viridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, atque alijs coloribus. Ex his candidus hydriopids sanat succo radices decoctæ, bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia, acetabuli mensura succi eiusdem, in vino austero, cum origani seapis [decoctis]. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes si quæ in polenta, addita aqua & oleo. Contrahit in se mures ac necat, nisi protinus aquam sorbeat.

Galenus albi Chamæleontis radicem ad lumbricum latum dari scribit, acetabuli mensura, cum vino austero, exhiberi ipsam & hydriopids, & similem esse temperamento nigri radici, præterquam quod amarior quàm illa sit.

Ixias [ἰξίς, seu ἰξίς] appellatio autem non huic albo Chamæleoni tantum sed & nigro iccirco rectè tribuitur, quod vtriusque radicibus gummi quoddam ἰξίς i. visci amulum adnascatur. Sic enim Plinius de Chamæleone in vniuersum, lib. 22. c. 18. Chamæleonem, inquit, aliqui Ixiam vocant: ac paulò post, nigri Chamæleontis (quod quibidam ἰξίς & ἰξίς vocari scribit) radices tradit viscum ferre vlcibus vtilissimum. Hesiarchius: ἰξίς, πῶς τις, ἢ καὶ χαυνοῖον. Galenus verò in lexico vocum Hipp. ἰξίς interpretatur, *quidam* τὴν αὐτὴν γὰρ αὐτὴν. Reperiuntur tamen nonnulli, in quibus sunt Cordus, Ruellius & Goræus, qui nomen hoc ad nigri Chamæleontis radicem contrahant, existimantque ἰξίς radicem esse nigri Chamæleontis, non quidem cuiusvis, sed eius tantum qui viscum profundit: quod locis tantum

Chamæleon alb Theophrastus Vernilago Galen.

Chamæleon alb Theophrastus Vernilago Galen.

Chamæleon alb Theophrastus Vernilago Galen.

Istacur dicitur Dioscorides.

Disce. illustr. præter Galen.

Genera duo Plinio Chamæleonem canis dicitur.

Chamæleon cur dicitur.

Plin. lex. disticta.

Chamæleon alb. Galen.

Ixias dicitur Galen.

Ixias dicitur Galen.

Ixias dicitur Galen.

tantum quibusdam & statis anni temporibus euenire asserunt : de quibus fule & doctè Sarracenus.

*Appellatio-
nei notha.*
*Chamaeleon
vnde dicitur*
Chamaeleon alium sunt qui Heryscop-
trum, qui Ixiā vocant, inquit Marcellus, Ægyp-
tii Ephē, siue Ephthofechm, Romani Carduum
minorem appellant. Descripsit Plinius herbam,
facileque est legentibus nouisse, ab animalium
genere, Chamaeleone lacerta Crocodilo minori,
per terram serpente, herbam humi repentem, yn-
dique spinis & aculeis fertilem, nomen traxisse.
Id autem non totius, aut paruum quarundam
figura & species fecit, sed mutationis colorum
euentus. Vt enim animal subinde & oculis, &
cauda, & toto corpore colorem mutat, reddique
semper quemcumque præter rubrum & candi-
dum [& si discrepent in hoc antiqui scriptores:
exciuntque aliqui candidum tantum,] eodem
modo & herba cum terra colores mutat: hic ni-
gra: illic viridis: alibi crocea: atque aliis colori-
bus. Nec alia nominis huius in herba quàm à co-
loris mutatione quam similem communemque
cum eo animali habet ratio in græca appellatione
est. Alioquin in censu Carduorum uterque
Chamaeleon est, candidus sc. & niger. Dico autem
Cai duos nunc pinosum omne illud genus: quod
siue aliud à terra erigatur, siue humilis serpat,
siue his aut illis, hacve parte aut illa aculeatum
sit, pinosum florem aliquem profert, in quo lanis
& pappi semina inuoluntur. Neque erit diffi-
cile diligenter pingua inculca loca, præsertim
que rudera mentibus Maio & Junio obseruantibus
vtrumque hoc genus & eorum discrimina
obseruasse: præcipueque ex floribus: qui ex la-
tiore veluti pyxide in altero purpurei prodeunt:
in altero quo mox colore describentur, &c.

*Carduus
est quæque
Chamaeleon*

*Discrimen
Chamaele-
onis albi &
nigri
Matth. re-
preh.*

*Ixiā, Cha-
maleon al-
bus & ni-
ger, tres
plantæ di-
uerse, con-
tra Matth.*

*Error
Matth.
Chamae-
leon refer-
tur inter
venena.
Ixiā &
Ixiā Ga-
za malè*

azarbe celebris hæcenus ignorauit [qui enim
scire potuit, cum Theophrastum græcè nunquam
legent, nec si legeret vellet, possit:] ad Scolymi ge-
nera reiecit. Sed tempero mihi æquè in his
arque in cæteris nauis suis latè explicandis,
quando cursum tantum ista nos, iustum aliquan-
do de omnibus volumen conscripturus: est ve-
hementer interim doleo, mihi cum tam indocto
impudentique homine, cuiusmodi ipse est nego-
tium intercedere. Sed omnis fortuna ferenda est.
Herculi quoque præcaces mulierculas alas
impegiisse legimus. Sic ille sanè edentulus senex,
iuuenem quinque & viginti annos natum impe-
ritæ acule, modò ipsemet suam toti orbi insi-
tiam declarat patefaciatque.

Plura qui uolet circa ea quæ tum obscura tum
controversa sunt in Ixiæ & Chamaeleonis tum
albi tum nigri historia, consulatis Marcellum,
Guilandinum & Sarracenum, nec non etiam
Gesnerum.

CHAMÆLEON NIGER Veterum. CAP. IX.

DE hoc Theophrastus ita scriptum reliquit.
Nigro Chamaeleoni solum inest albo fi-
mille, specie Scolymi, sed mirus, & læuis: tota
autem herba vmbrauli speciem representat: ra-
dice crassa, & nigra extrinsecus, sub fulua intrin-
secus, nititur: loca gelida, humidaque amat: illi
codices habent non ἰξία, id est, humida: sed ἀγρία:
id est, inculta: lepram & vitiliginem trita in ace-
to & tamentis illita expellit: nec non & canes
occidere potest: vltis annis quadraginta: hæc
Theophrastus.

*reddidit
Carduum
pinam.*

*Theoph. lo-
citò Gaza
Vires.*

A quo multa mutasse videtur Dioscorides,
cuius verba hæc sunt. Chamaeleon niger [qui &
Pancarpon, Vlophonon [Buphonon legit Si-
pont.] Ixiā, Cynomazum, Ocymastrum, Cnidium
granum, & Cynozolon inter Dioscoridis nothas
appellationes ab aliquibus vocatur, ab Ægyptiis
Sobel, à Romanis Carduus niger & Vernilaginum
dicitur] & ipse fultis Scolymo [Carduo Corn.] si-
milis est: ipsa tamen habet minora, tenuioraque
[ἰξία]. Restitueret Sarrac. ex Theophrasto
λεῖον, nisi vnus esset omnium exemplarium
consensus. Siquidem Theophr. loco modò cita-
to inquit, Nigro Chamaeleo [Vernilaginem vertit
Gaza] folio est Scolymi, at minore lauiorque [ac
rubro distincta. Caudem verò productè digitali
crassitudine, dodrantalem, ac subrubrum: qui
quidem vmbellam gerit [ἰξία οὐδὲν: fortè
ἰξία legendum, vt ad Chamaeleonem referatur:
vel ἰξία, vt ad proximè præcedentem vocem
καὶ ἰξία. Porro aliud quàm quod signat hoc loco
verba Dioscoridis, voluit Theophrastus, nimi-
rum totam stirpem vmbrauli speciem repræsen-
tare] floresque spinosos, tenues, Hyacinthi æmu-
los, & vesiculosos. Radix trita, additis atramenti
futori exiguo, cedrino oleo, & axungia, psoras
tollendi vi pollet. Eadem vnà cum sulphure ac
bitumine in aceto decocta inunctaque, lichenas
absterget. Eius autem decoctum collutione den-
tium dolores mitigat. Sed & cum pari Piperi &
Cera oblita radix, dentium doloribus auxiliatur.
Fouentur & eà dentes in aceto decocta & affu-
sa. Dolentem quoque dentem comminuit, si per
stylum calida illi adhibeatur. Maculas verò de-
purgat à Sole contractas, & vitilignes cum sul-
phure emendat: septicis medicamentis admisce-

*Ex Diosc.
Pancarpon.
Vlophonon
Cynomazum
Ocymastrum.
Cnidium
granum
Cynozolon.
Card niger
Vernilaginum
Diosc. lectio*

*Diosc. illu-
stratur.*

Phet.

tur, ac denique imposita, phagedænica offeratq; vlcera sanat & extirpat. Ceterum ut vocetur Chamæleo foliorum varietate cuenit. Nam pro locorum diffinitur, hic intensè viridia, illic albicañta, aliubi cyanea, aliubi denique rubra [Addit Orrib. *h. majus*, nonnunquam rufa] reperiuntur.

Ex nigris inquit, Plinius, aliqui marem dixere, cui flos purpureus esset, scemnam cui violaceus: Vno nascuntur caule cubitali, crassitudine digitali: Radicibus, earum lichenes curantur, cum sulphure & bitumine vnâ cõctis. Commanducatur verò dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Ferunt & hoc viscum vlcibus vtilissimum. Omnium autem generum earum radices scorpionibus aduersantur.

Chamæleo
niger Gale-
no.

Galenus de Chamæleonis nigri radice sic scribit. Habet quid venenosum. Quare extrinsecus vltus eius compedit ad scabiem, impetiginem, vitiliginem, & omnino quæcunque extersione opus habent. Miscetur etiam mollientibus ac discutiendis, medicamentis. Et phagedænica vlcera sanat imposita. Est enim sicca ordine tertio, calida secundo completo.

Ixia Sax-
trigine Cha-
mæleons co-
munis.
Error quo-
rundam.

Multi superiori capite, quæ ad Chamæleonem nigrum pertinent, adduximus, hic tamen rursus de eo admonendum duxi, quod communis vtri-que Chamæleoni Ixiæ vox & appellatio est: falsò tamen & sine causa: quum albo tantum adnascatur viscum, vnde ea facta est, illiusque propria, ceteras [appellationes] nigro relinquit. Dioscorides etiã ad albi tantum radices refert quod Plinius ait: Ferunt & hæc viscum vlcibus vtilissimum. Theophrastus de Ixia loquens, quam Chamæleonem non nominat: sicut neque in libri progressu, de Chamæleone vtroque agens, Ixiæ appellationis meminit. Quare etiam si vterque Chamæleo viscum producat, & inde Ixiæ appellatur: tamen aliud esse videtur medicamentum Theophrasto Ixia appellatum, quæ à Diosc. inter radices venenatas recensetur, & à Paulo. Aëtius tres diuersas radices facit, qui lib. 3. cap. 71. de Ixia agit, & mox sequenti capite de Chamæleone nigro & albo, qui priuatim strangulationem inducit. Est igitur Ixiæ radix peculiaris ab vtroque Chamæleone diuersa, & tamen fortassis id nigri Chamæleonis genus, quod Plinius à quibuldam Vlophonon vocati dicit: quæ appellatio etiam in supposititiis Chamæleoni nigro apud Diosc. attribuitur. Et ab eodem Diosc. Pauloque ac Aëtio, etiam Ixiæ ascribitur. Et propterea etiam Nicander Vlophonon ixiœon, id est, viscosum appellauit in Alexipharmacis:

Blattæ ma-
le interpr.
Niscander.

Nec hic fides habenda est, authore Cornario, interpreti eius qui Ixiæ genus blattæ esse dicit, quòd sit colore nigrum, odore verò in potu, Oëmi femini simile: quum Diosc. Paulus & Aëtius, palam inter radices recenscant. Plinius quod Ixiæ ab Ixo, id est, visco nominatam videret, vbi-que pro Ixia venenosa radice, viscum reddidit. Quod etiam si tolerari ac excusari possit, tamen *dispositum*, ad viscum arboreum & aucupis inferuentem, vitio non caret. De his & huius generis similibus plura apud Marcellum & Leonicenum habentur.

Æquiuocos
Chamæleon
album egrin-
per.
Saxina alba
sila. Fuch-
si.

Ceterum Chamæleonis vox absolute posita, album & nigrum, plantas viribus radicum diuersas, denotat. Chamæleonem album, quidam eũ Cardium esse dicunt, qui à nobis spina alba syluestris Fuchsi j in scribitur, & à Chamæleone differt, autoribus Euricio & Valerio Cordo. Inno-

tuit nostris regionibus; ait Tragus, Chamæleon niger verus. *Ass* fallitur Tragus. Est Echinopus de quo insiã. Chamæleonẽ Eustachius Roelsin, Amatus & Brunfelsius, exstimañt Cardium Marianum, sed à Chamæleone differt, testibus Euricio & Valerio Cordo, & Apolline. Falluntur, inquit Matthioli, qui putant stirpem illam Pternici nõ ab similem, Italici *Carciofo* appellatam [nos Scolymum syluestrem inscripsimus hoc libro,] aculeis hortentem, cuius flore cognũ vice vtuntur in Hetruria, esse Chamæleonem album.

Echinopus.
Carduus.
Marianus.
Scolymus
sila.

Anicenna eũ antè dictum idem de herba Me- zereon scribit, quæ Chamælea Græcis, quod de Chamæleonte Dioscorides, vt linguarum imperiti sæpè vocabulorum similitudine decipiuntur. Confirmat hoc Gesnerus de Ouiparis, dicens: Arabes Chamæleontem & Chamelæam, quam & Mezereon vocant nulla ratione confundunt. De Chamælea dictum lib. 5. Chamæleonem generis esse dixerim Carlinam hodiẽ medicis appellatam, quasi Cardinam: Cardus enim humilis est, cuius iidem duæ vel tres differentie sunt. De his mox agemus. Meminit idem Gesnerus de quadrap. Ouip. in Gallia & aliibi genus Cardui quoddam videtur foliis diuisis, albicantibus, amaris, non aculeatis, capitibus spinosis multis stellatum (vt ita dicam) aut muricem ferreorum instar radiatis, candidis, sed à Chamæleonte diuersum, vt iudicat. Dicitur hæc à nobis Calcitrapa, siue Cardus stellatus, de quo paulò insiã. Arnoldus de Villanoua in breuiar. lib. 3. cap. 21. Florem Chamæleontis cognũ vsum præfasse scribit. Atqui spina illa, cuius floribus multis Gallie locis hodie ad lac coagulandum vtuntur spina alba Græcorum est, quod & Ruellio placuit. De Leucacantha, siue spina alba vide insiã. Chamæleon est inter Disfaci nomenclaturas apud Dioscoridem, teste Gesnero. Tradetur hic paulò pòst. Perpendant lectores an Chamæleon Salmanticensis Clusii, sit Cardus Acarnæ Anguillaræ, & an idem cum Picnocomo Lobelij. Etingio vulgari, potius quàm vlli plantæ fauere nomenclaturam Chamæleontis ait Lobelius. Cardium benedictum Syluius voluit Chamæleontis speciem, cuius iudicium non probandum. Iacæ montana magno capite, est Chamæleon Theophrasti, differens à Chamæleonte Dioscoridis, vt vult Anguillara, qui sibi nõ notum ait. Malè Plantinus in Icon. Tom. 2. p. a. Branchæ vrsinæ spinosæ siue Acaothi aculeati iconem ponit, pro Chamæleonta Monspelienfium. In lacertarum genere Egyptus, Africa, & India Chamæleones passim & quotidie videt, hoc attestante Marcello. Ceterum de Chamæleonibus nobis dictis iamjam agemus. Inter hos autem primus sese offeret Chamæleon exiguus Tragi. Secundum locum dabimus Chamæleoni nigro Dioscoridis Maranthæ. Ab hinc sequetur Carlina caulifera vel Acaulos quæ à quamplurimis pro Chamæleone habetur. Quartus & postremus erit Chamæleo albus, à nobis inscriptus.

Chamælea.

Carlina 2.
23.

Spina al-
ba.
Disfaci.

An Cari-
dus Acar-
na Angu-
lata.

Eringium
vulgare.

Cardus
benedictus.

Iacæ mon-
tana ma-
gno capite.

Brancha
vrsina spi-
nosa.

Chamæleo-
nes lacerta.
Chamæleus
exiguus.

Tragi.
Chamal.
niger Diosc.

Marantha.
Carlina
caulifera.

Sel. Acaulos
Chamæleo
albus.

CHAMÆLEON EXIGVVS TRAGI.

Chamæleon exiguus Trago dictus *sila* in orbem per terram spargit Carlinæ, profundè lacinia, bifida, atroiuuentia, aculeis horrida: inter quæ aut nullo, aut breui cauli vnciali vel sesquiunciali bifido insidentia nascuntur capitula oblonga, in glandis formam, minora, quàm Carlinæ,

Descript.



Chamæleon exiguus Tragi.

cripsit Tragus: in margine verò Chamæleonem secundum, seu album exiguum nominavit, duxitque: Alterum verò Chamæleonis genus ferè ubique locorum præuenit, potissimum verò in asperis montibus, ac forti albaque terra: radices grauisissimi odoris. Augusto mense florem ostendunt in perfectione sua. Hic Chamæleo Ruellio optime fuit notus, vulgarissimus in culcis asperisque agris, maxime edito loco sitis. Hunc Succaham Arabum [Aucien. lib. 2. cap. 674. & Rhaf. & simplicap. 4.] esse semper putauit. Pertinet verò ad Chamæleonta album Dioscoridis, quod descriptio testatur, quæ huic ita conuenit, ut nulla nota relectare videatur, quod Ruell. lib. 2. cap. 8. diligenter obseruauit.

An Dodon. gall. Chamæleontem hunc Ruellij non confundat cum Carlinia sine caule [quam spinam Arabicam inscribit] iudicet alij.

Lonic. figuram Tragi habet sed hoc titulo, Hinc ober weis Eberwurts/Chamæleon exiguus siue albus.

Ryffio in Dioscor. dicitur Chamæleon albus, vulgo megdistel & nider distel / ac si Carduum vitarum & Carduum humilem dicat.

Lobelio in Obs. pag. 480. Icon. plant. Tom. 2. pag. 5. Carduus acaulis Septentrionalium, Chamæleon albus Cordi, Chamæleon exiguus Tragi. Apud Cordum hoc nondum admodum, licet hoc ipsum in Hist. Lugd. Dalechampi de Chamæleone exiguuo Tragi statuatur. Existimo potius esse eius in Dioscor. lib. 3. cap. 12. Crocodilion, quod Germ. wild Eberwurts vocant.

Clusio est Carlinia minor, tam in Pann. p. 667. [ubi tamen eius iconem non dat] quam in Hist. post. lib. 4. pag. 150. ubi icon, Carlinia minor purpureo flore inscribitur, & ex quorundam opinione non dissimilis esse iudicatur Chamæleoni Theophrasti, cuius meminerit lib. Hist. plant. 4. cap. 3.

Monachorum Cardui genus Corona fratrum [quia caput nigrum fiat tanquam Pater, Capitula verò tanquam Filij eius] & Fratres in modum Coronæ sunt, circumdantes ipsam Patrem dictam suspicor, licet Clarius, cuius iudicium magni facio circa stipes, Coronam fratrum ad Cardum in capite tomentoso mihi dictum, referre videatur: sed Clasio descriptio Monachorum in Mel. dist. text. constat. 239. manifestè contradicit.

linæ, squarrosa, nec vilis spinosa armata, & quibus flores emittant purpurei: radix minimi digiti crassitudine, longa, fibris aëliquot crassiusculis donata, oblique agitur, colore subrubente, præsertim intrinsecus, sapore aliquantulum aromatico.

Hunc Chamæleonem exiguum inscripsit

Carduus radice perenni, qui solet locis petrosis prouenire, Ginep à me obseruatus. Item Montbelgardi prope pontem Vauvaucourt, ac S. Hippotitum in descensu à Blauumontio: inter Vaudule & Chastillon inter montium conualles, florens Septembri. Montbelgardi ad Vites florens Iulio & Augusto. Angliæ collibus, Picardiæ, Gallobelgiæ factorum marginibus obuius & frequens. Crete in Pannoniæ montibus, frequens in siccioribus pratis, etiam in accliuatibus herbidorum collum.

CHAMÆLEON NIGER DIOSCOR

Marantha.



Chamæleon Descriptio

Chamæleon niger est umbellata spinosa, tam erecta aspectu cum n. flores, ut nihil pulchrius videtur possit: est enim umbellata loculis, siue filiquis oblongis densissimis acuturum spinarum circumplexis plena, in quibus flores purpurei, oblongi, in eis cardui, æneæ, Hyacinthus ænuli supereminet: sed illa filiqua

spinosa semen occludit Cnicus simile, githyægenibus in ea floribus, quod tandem illis decedentibus maturecet: sua vario colore maculis inspersa: caulem habet purpureum, doctantali altitudine, radicem tuncam foris inus radiceis Aridol. longæ colore, atque inter mille vix vix aut alteram vidimus, quæ non sit carnosa, quamquam Diosc. interdum exesam esse tradit, ætenui gustus est sed commendacari oportet.

Hic Chamæleoni (inquit Maranthi descriptio) autor, lib. 2. Meth. cognosc. simpl. cap. 7. omnes notæ pulchrè respondent, quas ei Diosc. assignat, præsertimque umbellata spinosa. Appellatur hæc planta à Theophr. lib. 9. cap. 23. Chamæleon niger, Vernilago nigra, ut verum Gæza, & non acceptatis nominibus Vlophonon & Cynoxilon, & Cynoxilon: Plinius hæc nomina exponens, inquit ita appellari propter grauiorem odoris.

Castori dicitur Chamæleon niger Dioscoridis. Bellon. verò Obs. lib. 1. cap. 19. & 25. videtur Gallos & Germanos Medicos frustra laborasse in depingendo Chamæleone, tam nigro hoc, quam albo.

Anguill. epist. 3. Cardacelli, & Cardoncelli, planta in Apulia reperi, cuius descriptio Chamæleoni nigro Dioscoridis omnino conuenit. Chamæleonem nigrum Antiquorum eum esse, minime asserere dubitat Sarracenus, quem & ipse Marantha pro Chamæleone nigro agnoscit.

Mittb. in Diosc. cum 179. fig. lat. & Ital. ait se

Locus & Tempus.

Synonyma

Chamæleon niger Theophr. Vernilago nigra.

Chamæleon niger Diosc. Castori.

Cardacelli Anguill.

Succaham Arabum

Chamæleon albus Diosc.

Dod. gall. an Carlinia acaulis.

Card. albus, siue humilis.

Card. acaulis Septentrionalium Lob.

Lob. narratur.

An Crocodilion Cor.

Carlinia minor Clusio.

Coronæ fratrum Monachorum in Mel. Clus. reseruat.

non habere, cur Chamæleonem nigrum à Marathæ Neapoli transmissum, Chamæleonem nigrum legitimum esse affirmet. Hæc, inquit, tametsi vmbellæ Hyacinthinis floribus scærentes proferat, cum tamen folia rubris maculis varia non sint, in caule nulla prorsus rubedo spectetur, manifesta radix acedinis tantillum haud resistit, exela non sit, non flavescat, nec caules digitali crassitudine videantur, cur legitimum Chamæleonem nigrum hanc plantam esse affirmem non habeo. Sed de his diffusius libro quarto nostrarum Epistolarum differimus, ad Marantham respondentem. Hæc Matthiolus, qui Chamæleonem hunc, Chamæleonem nigrum inscribit, ac meritò sententiam suam is censendam relinquit, qui rei plantarum maiorem, quam ille peritiam habent.

Chamæleon
niger Matt.

Camer. in Hist. Matth. Germ. & Epir. cum pro Chamæleone nigro pingit, virèque ex Veteribus vna cum descriptione attribuit, cum his nominibus. Chamæleon niger, dicitur Græcis *Καυαλέων* *μῆλιν*, Arab. Chamæleon melanos, It. Chamæleon nero, Germ. Schwarz Eberwur, Hisp. Cardo pinto: Gall. chard.nette, Boh. Dnpauwa carna. Meo quidem iudicio vires huius à veteribus traditæ Chamæleoni nigro rectè adscribit. Alii nomina non conueniunt. Is enim his nominibus Carlinam tradit. Huius iconem exhibet H. Lugd. pag. 1454. pro Chamæleone nigro Matthioli ac Fuchsi. Sed huic titulus non conuenit, dicendum erat Chamæleon niger alter Matthioli. Sequitur errorem Typographi in Matthiolo commissum, ubi figurè transpositæ, ut etiam sub Carlina dicitur. Sed huius & alteram figuram habet pag. 1455. pro Chamæleone nigro vero Dalechampi.

Nomina
Matthioli
non conueniunt.
Error H.
Lugd.

C. Bauh. apud Matth. dicitur Chamæleon niger alter Matthioli.

Chamæleon
niger alter
Matt. C. B.

Maranthæ & Anguillæ depictus Chamæleon (inquit Lobel. in Adu.) videtur aut verum esse Crocodylium, aut certè Germanici opinionem sustinere posse. Oberu. pag. 480. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 5. Chamæleon niger.

Chamæleon
niger Lob.
Locus

In Apulæ finitimis ac multis aliis locis, in campestribus & siccis locis Chamæleonem suum nigrum, maximè vberitate provenientem sapius collegit Marantha. Bellon. Obs. laudet affirmare. Chamæleonem nigrum neque in Germania, neque in Gallia, neque in Italia sed in Lemno nasci: nam præterquam quod stirpes per Italiam perquisiverit, sibi etiam fidem facere Aloisium horti Patavini præfectum: qui asserat, utrumque se cõquisivisse, sed nondum isthuc reperisse. Alii dicat quicquid velit Bellonius, ego Chamæleonem nigrum Maranthæ vidi apud Clariss. Virum D. D. Felicem Platerum, nomine Carlinæ ex monte Fracto. Ante paucos annos reperta est planta hæc (inquit Anguill.) quæ satis frequens occurrit iuxta oppidum Sebeniacum di Sebenitz Sclavoniæ, non longè à mari distans. Satis etiam frequens est in Samnio tra il Castello Zare.

Vires

Cum Chamæleonis nigri radices apud pagum quandam in insula Lemno, Liadochorio nuncupatum erui curaremus (verba sunt Bellonij,) plurimi Græci & Turcæ spectatum venerat quid ageremus: eas verò fruticulatim sectas filo trajiciebamus, ut facilius exsiccari possent. Turcæ in eo negotio occupatos nos videntes, similiter radices tractare & secare voluerunt: at cum summus esset assus, & omnes sudore maderent, quicunque eam radicem manibus tractauerant, sudoremque abstergerat, aut faciem digitis scalps-

rant, tantam pruriginem ijs locis quos attigerant postea senserunt, ut adugi viderentur: Chamæleonis enim nigri radix eâ virtute pollet, ut cuti applicata ipsam adeo inflammet, ut nec quicquam, nec Vrticæ vllæ centesimâ parte ita adurant: prurigo tamen non adeo celeriter sese prodit. Post vnam aut alteram potè horam, singuli variis faciei locis cutem inflammatam habere cepimus, ut tota sanguinea videretur; atque quò magis eâ confricabamus, tantò maior excitabatur prurigo. Fonti assidètes sub Platano, pro ludo habuimus initid, & risum? at illi plurimum indignati sunt: & nisi asseuerassemus nos nunquàm expertos tali virtute eam plantam pollere, haud dubiè malè nos multassent. Attamen hostia exculatio fuit ab illis faciliùs accepta, cum eodem incommodo nos affectos conspicerent. Mirum sanè, tantillæ radicis ingentem efficaciam nostro malo expertos esse. Et ex his appareat, quod ex instituto mulierculæ apud Marantham faciant, quæ radicis loco pediculi inficiunt ad puerorum pediculos enecandos. Quod præterea Dioscorides, dixit Chamæleonis nigri radicem commanducatam mordere, non semel expertus est Marantha, licet ea in primo statim gustus occurrit nullam ostenderit acrimoniam.

Excitat
pruriginem

Succus ad
enecandos
pediculos

Chamæleon
niger in ra-
dice Japuri

CARLINA CAVLIFERA VEL.

Acaulos.



Carlina radix, cuius præcipua est commendatio, longè latèque vagatur, profundèque intra terram agitur, crassitudine pollicari plùs minùs, superficie veluti coriacea & foraminulenta, coloris foris rufus, intus candido, sapore aromatico, nonnulli granum: integram verò è terra emergat in capita aliquot vel plurimum facit.

Descriptio.

Caulifera

sit, ex quorum singulis separatim folia in orbem supina oriuntur, palmum vnum aut duos longa, vnciam vnam aut alteram lata, profundis ad costam vsque incisuris diuisa, & veluti crispæ, aculeis minacibus horridæ, nonnulli tomentosa, viridantia, excepta pediculi infima parte atrorubente, in horum medio sessilis heret echinus orbiculatus, spinosissimis foliis vndique obtusus, & cuius vmbilico flores emicant flammæ, purpurealces, yallo soliorum argenteorum cincti: semen papposo tomento inuolutum, oblongum, hirsutum. Aliàs è lingulis capitibus caulis surgit pedem altus, atrorubens, lanugine quadam donatus, non sine foliis alternatim positus, in cuius summo echinus nascitur floridus, ut iam dictum, foliis, qualia in caule & circa radices conspiciuntur, circumcirca stipatus.

Carlina
bulgo disti-
genera dui

Carlina

Carlina
vulgo dicta
genera duo.

Carlina huius distinctio nostra non latuit Clusium. Ita namque ait in Pannon. p. 669. Crescunt in plenique Pannonie montibus Carlinæ siue Chamæleonis vulgo nuncupati bina genera. i. Vnum flore amplo, albo: quod nonnumquam in pedalem caulem assurgit, interdum verò prolixus est *ἄκρον*. Atque hanc etiam differentiam duplicem in Hist. post. lib. 5. p. 155. duplici expref. fit icon, quales Lobelius etiam habet, Vni titulus, Chamæleō albus Diofcoridis. Theophr. Alteri Carlina elatior, Chamæleon albus vulgaris.

Quia verò de hac Carlina auctores maxime dissentiant, singulorū placita ordine, quoad fieri poterit, quā breuiffimè enarrabimus.

Chamal. al-
bus est Car-
lina

Radix Ger-
anis.

Cardopatiū
Corn. nota-
tur.

Crocodiliū

Carlina
Monachi:
Succaha
Serap. Sp.
na Arab.
Diofcor.
Bedeguar
Serap.

Chamal.
albo Fuch-
si.

Cardopatiū
cor-
ruptū.

Pancratii.

Carlina non
est Chamæ-
leon.

Toxites. ta-
xatur.

Non conuenit [infit Corn. in Diofcor.] herbariis & officinis de Chamæleonibus. Quodam Carlinam dictam, Chamæleōnis albi radicem esse volunt. Alii prius albi radicem *weyffe Eberwurz* vocant: posteriores nigri, *Schouarze Eberwurz*, quasi radicem veris albam & nigram. Alii album Chamæleonem, *Diehdisseln* vocant: nigrum verò prius *Eberwurz* / eundemque Cardopatiū, & Carduum suillum. *suspiciamus* Cornatiū nō cognouisse discrimen inter duos Chamæleones quos nominat: is præterea videtur non bene *Eberwurz* distinguere à Carlina, cum de Crocodilio scribit: Quidam hanc vāldē difficul. alii *Schwarze garten* distil vocant. Alii Carlinam dictam, verum Crocodilum esse putant: siue à Carolo magno nomen id habet, cui ab angelo ad depellendam ab exercitu pestem offensa fertur: siue Carlina quasi Cardina siue Carduina dicta est.

Carlina [aiunt Monachi in Mef. dist. 6. c. 6. c. 189.] duplex: vna quæ non eleuatur à terra & hæc est *Succaha* Serapionis, & spina Arabica Diofcoridis. Altera quæ similima, præterquam quod eleuatur à terra, haud dubiè est Serapionis Bedeguar siue Bedegar, siue Bedoar [hæc namque voces vnum & idem significant] que in nonnullis Italiæ locis magis quàm altera, intelligitur pro Carlina.

Figuram habet Fuchsius Carlinæ cauliferæ satis laudabilem Hist. & Icon. pro Chamæleone albo, quem Carduum suarium & varium Latinis, Officinis & Barbaris Cardopatiū appellari tradit, ac de his vocibus ait. Cardopati nomen haud dubiè corruptum est, deducumque à dictione Pancration, nam sic olim esse nominatum Chamæleonem Apulcius testatur: aut à Carduo vario, à qua dictione, v. scilicet litera in p, & r in t, mutata, in Cardopatiū facilis est lapsus. Germanis *Eberwurz* / elegantius allusione ad Carduum suarium, nuncupatur, Gallis *Carline*, ou *Artichaut sauvage*: Chamæleon autem à foliorum varietate dici cœpit. Suarius autem Carduus dictus est, quod siue, si in polenta exhibetur, perimat. Ob quam etiam causam [Eberwurz] germanis nuncupatam puto. In glabretis montium prouenit, & in siluis, vt hinc etiam siluaticus Carduus cognominatus sit. Chamæleonem esse Carlinam negat Amatus in Diofcoridis lib. 3. cap. 8. Miror verò Lacunari in Diofcoridem lib. 3. cap. 8. eandem plantam, caule tantum variantem, facere lethalem & non lethalem.

Toxites in onom. philosoph. vir doctus (vt scibimet videtur) varia miscet nomina pag. 280. Acuntin Arabicam, Acuntin Egyptianam, Carlinam nigram, Cardopatiā, & *Eberwurz*. Hoc chaos quomodo componendum ipse videris.

Torn. III.

Qui Chamæleon albus tam ab Hetruscis, quàm cæteris ferè Italiæ incolis vulgò Carlina vocatur, nunquam Fuchsiū vidisse existimari (inquit Matth. in Diofcor.) quoddam cum procerō satis caule depingat. Hallucinantur Monachi cum sibi persuadeant, Carlinam [vt eorum v. ar. distinctione] caulem proferentem, quam legitimum Chamæleonem nigrum Diofcor. semper existimamus eiusdem esse spinam albam quam Græci *ἀκρόν* dicunt Mauritani Bedeguar. Item Carlinam alteram caule viduam esse spinam Arabicam ab Aphris Suchaa vocatam. Sunt qui velint Carlinam vtramq; nihil differre, nisi sexu, ac negant has plantas esse Chamæleones, illamque præsertim nigrum Chamæleonem esse nolunt, quæ caulem suum gerit, &c. An Galenus errarit dicendo radicem Chamæleonis aliquid lethale habere? Postea capite sequenti ait: Sunt qui volunt Carlinā vulgò dictam quæ caulem proferit, legitimum Crocodilum esse. Sed eorum opinio mihi quidē nullo modo iustificare potest: præsertim cum factō periculō us tanē viribus careat, quibus Crocodilū præstare scribunt: nempe quod radicis decoctum potum sanguinē per vires copiosum trahat. Adde quod Crocodilio radix sit longa, leuis, aliquantulum lata, & odore, vt Nasturtii, acuto. Illi verò Carlinæ generi crassā, nigram densā, exelagae non autē lata, nec leuis, nec Nasturtii odorem spirans. Non placet Matth. ex Carlinæ genere facere duas plantas, ex acauli album, quem non describit, ex altero nigrum, quem ipsemet fatetur,ymbellatū non ferre, quam Diofcor. in nigro Chamæleone requirit, sed echinatum capitulum petinde ac albus Chamæleo, quod illud ipsum eum omnino à suā opinione dimouere debebat, & ad credendum inducere Carlinam caulem fundentē non esse Chamæleonem nigrum, sed eandem cum acauli. Et hinc manifestum est, cum Chamæleonem album & nigrū non leui errore in Hist. Cameratii germi. & Epit. ab inuicem separare, ac descriptiones & vires Chamæleonis albi ipsis ex Veteribus attributas adscribere. Cæterū, de Chamæleone albo [cauli] inquit, vocatur Græcis *καυαίλιν* *καυοδ*, Mauritani, Chamæleon lente, seu Chamalium, Ital. Carlina & Chamæleon bianca, Germ. *Weiß Eberwurz* / Hisp. *Cardo pinto*, Gall. *Carline* siue *Chamæleon blanc*, Boh. *Pupawa biela*. Notandum apud Matthiolum errore Typographi figuram Chamæleonis nigri Matthioli esse substitutū, Chamæleonis nigri alterius. Et hunc errorem commisit etiam Camer. in Matth. Epit. in qua cum à Chamæleonte albo non differe scribit, nisi quod in caulem crescat. Hunc lapsū animaduertit in Hist. eiusdem getm. ac titulum ei fecit. Carlina caulescens, quondam Chamæleon niger.

Carlina, inquit Camer. in horto, sessili flore *ἀκρόν* & alia alioquin ab hac nihil diuerfa. Nam plerumque si eo anno floruerit, quo in hortum transfertur, sine caule permanet, sin minis, multo lætior altero anno assurgit & cauligera fit.

Matthiolum vt probet, ait Marantha, alteram Carlinam vulgò dictam, esse nigrum Chamæleonem Diofcoridis, quia eius facultas non est venenata, vt ex Galeno esse deberet, sed absque noxa deuorari solet, ad regionem configit, iniquiens in Græcia, & in Ponto fortasse talem plantam posse vni veneni fortiri: sed fieri posse, vt in Italia sit salutaris: quemadmodum in Persæ arbore, ac quibulcū aliis euenisse constat: verūta acceptari quidem hoc posset, si hæc vna nota, ac

Chamæleo.
albus Mat-
thioli.
Fuchsi, nota-
tur.

Monachi
hallucinantur.
Chamal.
niger Diof.

Crocodilum
non est.

Matth. re-
darguitur.

Matth. lap-
sus.

Error alius

Carlina a-
caulis &
caulifera
Camer.

Matth. no-
tatur. Car-
lina non est
Chamal.
niger con-
tra Matthi.

non omnes ferè aliæ dissentirent. Altera namque flores profert in capitulo, altera in umbella.

Aduersus
Matthiol.
& Fuchj.
Carlina *se-*
rum.
Spinam albam (apud Apollinem Rad. i. inelct. Hamech.) quidam contendunt Carlinam, id est Chamæleonem album, vel alteram caulem profertentem vocant nigrum Chamæleonem, quas alij sexu distinguunt, marem alterum, alterum feminam appellantes, folijs enim nullatenus penè differunt, at niger caule est dodrantem paulò altiore, non vacuo, floribus autem nullo pacto Hyacinthum æmulatur Matthioli, nec in omnibus Dioscoridis historiæ respondent. *Hæc* illæ, varia aduersus Matthiolum & Fuchsum scribens, sed obscurè: Maratham etiam carpit ac Anguillaram varia dicens etiam obscurè de Ixia & Ixine spina: Monachos aberrasse ait, qui hanc Spinam albam dixerint: Idem etiam offendit Amatum existimare cauliculo sam Carlinam esse Crocodilum, ac eam sententiam à Matthiolo oppugnari.

Chamal
vulg. Trag.
Eryngium.
Ego, inquit Tragus, Chamæleonem vulgarem [Eberwurg] Eryngij aut certè Chamæleontis nigri [quam Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiæ, alij Cynomazon, h; Ocyroides, alij Cnidion Conon, alij Conoxilon, Latini Carduum nigrum aut Vernilaginem, Ægyptij Sebel vocant,] genus existimo.

Cardopati
vulg.
Carlina
differt. Gels.
Gels. de hort. Carlina cum caule non videtur verus Chamæleo niger. Idem postea ait. Cardopatium vulgò dictum [vel Carlina] nonnullis herbatis, genus est Cardui, Eberwurg; eius differentiarum quedam sunt à magnitudine & floris colore, in aliis albo, aliis purpureo. Item caule, quo aliæ carent, aliæ habent. Ex his Chamæleo albus videtur cui flos purpureus caulis nullus: Silybum verò cui latior albioreque spina (seu flos spinosus) est: isque rursus vel cum caule vel sine caule. In Baldo monte Italiæ flore maximo pilei instar nasci audio. Ex eodem genere esse audio Ixinem spinam quæ Mastichen in radice fundat Hispanis cognita, Spanisch Eberwurg. Huius floris calycem, tum recentem, tum etiam siccum, noctu claudi, ad Solem verò aperiri, nupèr in hortulo meo miratus sum. Idem in deser. montis Fracti p. 63. Silybum, quam vulgò Carlinam vocat Germ. Radicem apri in colle dextro vallis Ejitalæ, cuius capitula carnosa, calyce floribus ac semine repletis, oprimi edulj loco nobis fuisse ex aqua cum sale, lautiore etiam pipere adiecto futura. Tandem de Quadruped. ouipar. lib. 2. ait. Chamæleonem generis esse dixerim Carlinam hodie Medicis vocatam, quasi Cardinam: Carduus enim humilis est, cuius itidem duæ vel tres differentiarum sunt.

Chamal. al.
buc.
Silybum.

Ixine Spina

Radix apri.

Chamæleon

Cardina.

Carlina Bgmo.

Chamal. niger Euchar.

Pancarpon.

Bouius Ixiæ esse scribit gummi viscosum, quod provenit ad radicem Chamæleontis, cuius magna habetur copia in monte Baldo, vulgò dicitur Carlina.

Eucharis pro Chamæleone nigro, Eberwurg, pingit Carlinam cauliferam. Lonic. lib. 5. cap. 23. pro Chamæleo Carduo suo Offic. & vulgi Cardopatio, aut ut ipsi magis ardet Pancratio, Gross oder schynwurg Eberwurg, pingit Carlinam vulgarem cauliferam.

Carlina vulgaris quæ existimatur Chamæleo niger si prouocaret sanguinem narium, non dubitaret Anguillara, esse Crocodilon Crateæ & Diosc. in quo addita verba quedam quæ non sunt in Orisatio & Cræta de semine rotundo.

Cord. in Diosc. lib. 3. c. 11. Chamæleo niger videtur ea Cardui species quæ à Germ. Eberwurg appellatur, Carlina Italiis: sciendum est inquit, nigrum Chamæleonem Ixiæ interdum inueniri ut Plinius lib. 22. cap. 18. ait: Ipse vidi in ea radice quam Eberwurg vocamus Ixiæ nasci. Hæc Cordus apud quem in annot. quadam contrarium asseritur, & Carlina nigra, Chamæleon niger verus ab hoc diuersus statuitur, ac hodie ab eruditiss in Italiâ ignorari asseritur.

Bellon. Obs. lib. 2. cap. 106. Carlina, quæ Antiochiæ provenit, quamque multi falsò Chamæleonem vocant. Carlina, inquit Lib. 1. cap. 18. non est Chamæleon niger nec albus.

Dodon. gall. Leucacantha (quæ distinguitur ab Acantha leuce) alijs dicta Polygonatum Phyllon & Ischias, Antiquis Romanis Spina alba: nunc Carlina aut Carolina, quæ buldam Cardopatium, Gall. Carline blanche, German. weiß Eberwurg, Item Spina alba, Carlina alba, Gall. petite Carline, Monachis Romanis dicitur a d'aleu, Lat. Spina Arabica, quibusdam Acanthis: Arab. Saibala, eorum opinio videtur valde verisimilis. Eadem ferè Latini fol. p. 714. tradit: Prior Carlina, [caulifera] inquit, & Cardopatium, ac à nonnullis Cardina dicitur, à Carolo magno primo eius nominis Romanorum Imperatore, cuius exercitus huius radice liberatus & præseruatus à peste olim fuisse fertur: Germanis Eberwurg: Belgis, Gallis, ac alijs quoque Carline. Dioscoridis est λευκοανθη: conueniunt radices validæ & amaræ: respondent quoque facultates. Appellatur verò Leucacantha, & alijs, sed nothis vocibus λευκοανθη, quibusd; λευκος: à Romanis Gniacardus, à Tursis verò Spina alba. Differens tamen ab ea Spina, quam Dioscorides λευκοανθη λευκος, hoc est, Spina albam facit. Alteram verò & Carlinam recentiores faciunt: & Carlinam humilem vel minorem appellant: flos medio stamineus rubentibus foliis, quædòque verò cardidis ambitu circumscriptus est: radix albidâ, foliis, non timidis, sapore minus acis aut amaricans, atque idcirco Medicinæ minus expetita. Falluntur autem non parum, qui ambas ad Chamæleones referre student: In Italiâ siquidem Germania aut Gallia nigram Chamæleones nascuntur, ut vnus, pro multis, testis est Petrus Bellon. lib. singularium 1. Figuras habet Chamæleontis albi & nigri Matthioli, in quo Matthiolum & Monachos etiam secutus ex vna planta duas facit: Ruellij præterea Chamæleon albus diuersus mihi videtur: denique quæd Carlinam acaulon alijs notis in postrema histor. describit, facit vt existimem illi non bene notam Carlinam, non magis quàm Matthiolo Carlinam eandem esse cauliferam & Acaulon, vel eos confusisse Chamæleonem minorem Tragi cum Carlina.

Carlina herbatarum inquit Lobelius in Aduers. è varietate non genere duplex, non est Leucacantha, sed Chamæleon albus Dioscoridis. Idem in Obseruat. Carlina herbatarum Aduersar. 367. Chamæleon albus Dioscorid. Helxine Phiniana Anguillara. Item Chamæleon albus caule donatus, Cardopatium, Chamæleon albus & niger, siue Carlina Officinarum. Chamæleon niger vulgaris Herbariorum. Chamæleon albus Fuchsj Germ. Eberwurg, Belg. Euerworte & Carlina. Galis item Carlina Aduersarij pag. 367. hæc ille, qui duas habet figuras vnam sine caule, alteram cum

Chamal niger Cord.

Cord. re-fellitur

Carlina à est Chamæleon

Leucacantha Dod galli

Spina alba

Carlina y no Leucacantha Diosc.

Carlina acaulon

Carlina Chamæleon non est.

Dod. notatur.

Carlina herbatarum Lob.

Helxine Phiniana

Lob. notatur.

cum caule. Dubito an Anguillara hanc Carlinam intellexerit per Ixinam Plinianam: Nec Chamæleonem album, dicere ausim. C. Bauh. apud Matth. Chamæleon 1. siue albus, siue acaulis. Ixia & Chamæleon albus Theophr. [Versiloginem Gazi vertit,] & Plinij: Chamæleon albus Matth. Cordo in Dioleorid. Carlina minor Dodonæi, Carlina vulgi Calsalpino. Cordopatum flore albo, caule nullo. Gesn. hort. Silybus vulgò Carlina Gesn. Fracto. Helxine Pliniana Anguill. Item Chamæleon 2. siue albus caule donatus. Chamæleon niger alter Matth. Hæc non videtur à præcedente differre nisi quòd caulem proferat. Non ausim dicere Chamæleonem album Cordi eundem cum Carlina siue Eberwürg; ab ea enim separat ille. Ac quum dicat Anguillara suam Ixinam spinam siue Chamæleonem album coopertum lanugine valde alba, & ipse separet à Carlina vulgari, ego non ausim eandem dicere.

Icon. Plant. Tom. 2. pag. 4. Chamæleon albus Dioscondis, seu & Schwenckf. cui & Carlina maior. Castori & Hærchio, Chamæleon albus, aliàs Carlina.

Brunfels. in Herb. p. 218. non describit Eberwürg; nec icon respondet: Est Cardopati minoris quorundam, de quo nò loquitur in contextu.

H. Lugd. tres exhibet figuras, quarum prima Carlinæ *fraxinæ* pag. 145; hac inscriptione: Chamæleon albus Matthioli. Reliquæ duæ sunt cauliferæ, quarum prior est p. 145 4. hoc titulo, Chamæleon niger alter Matthioli. [Hæc ponenda erat sub Chamæleone nigro Matthioli & Fuchsi] quæ eadem icon repetitur pag. 1476. pro Crocodilo, Carlinæ caulem habente.

Locus & Tempus. Carlinam ego reperi non longè à Montbelgardo eundo Andinonr; sed paucam, copiosam autem non longè à Blamontio, vnde transiit Montbelgardum in Hortum E. C. vbi sæpius floruit. Genex habui in horto, in monte Salure, abundat. Ea modò reperitur cum caule, modò sine eo iisdem locis, vt sæpius obseruavi: Abundat etiam in montibus propè fontem Admirabilem ducatus VVirtemberg. Quidam nobis asserbat eam quæ vnum caulem haberet vnus esse anni, quæ duos duorum, quæ tres trium: Loco dicto in montis planitie dicta aüss bûchen, terra multis in locis erat inuenta: dicebant, qui me deducebant, euerfisse apros, ac illos querere radices Eberwürg. Nascuntur Carlinæ albæ Dodonæi, in montibus altis, locis desertis, ac quandoque fecus vias: sed quæ caulem fert Germaniæ frequentior. Iulio & Augusto, tum & serius quandoque florent, ac semen maturum proferunt.

Vires. Echinus c. Carlinæ echinus spinis mandatus, conditur saccaro vel melle paratur, frigidiore ventriculo còducibilis, vt expertus est Amatus in quodā: valet radix contra pestilentem luem, quæ ab Angelo Carolo magno, vt eà exercitum à peste liberaret indicata creditur. Carlina eodem habet in curādis malignis vlcibus vltus quos Chamæleon niger: egregiam vim contra pestē & omnia venena habet si Cordo credimus. Dum Philippus Melanchton hypochondriacis doloribus confictaretur, eos vsu herbæ Chamæleonis mitigauit, & huius remedii efficacitatem eum prædicasse testatur Camerarius. Carlinæ radices, authore Dodonæo, præcipuè vltus est. Secundo ordine satis intenso exsiccatur: cum partium ac substantiæ tenuitate, tertio ordine resiccatur: sudores verò etiā mouet: ventris tinea ac lumbricos pellit: venę.

Tom. III.

nis omnibus resistit: pestis contagia non modò arceat, sed & eandē curat si tempestiuè propinetur: commanducata dentium dolores sedat: iocunioris ac lienis obstructions aperit: vrinæ citius promouet: hydropicis confert: datur & ex alto delapsis ac cæcis. Radix Carlinæ seu Chamæleonis vulgaris in puluere redacta, ac drachmæ pondere è vino sumpta, pesti aduersatur, quò nomine peccat: potissimùm autē subus nonnulli radicem hanc exhibent, persuadentes sibi hoc pacto tumentis & foetis à fæda & pestilenti luce conservari posse: Quidam eam Columbarū quòd mutas alias venentur, è radice Chamæleonis vulgaris: conficiunt, aliis nonnullis adiunctis. Eandē etiam in aceto decoctam commendat Fuchsius contra scabiem, imperiginem, & omnes cutis sceditates curatū difficiles, si eius decocto lauentur, quod dentium dolori etiam succurrere tradit. Ferunt hanc radicē vires his qui eam gestaerint augere, comitibus autem qui cum illo degunt, adimere. Sed credat hæc qui voluerit, ego, quòd sciam, nusquam in scriptorib. eius rei mentionem factā legi. Vtutiq; radices calidæ & siccæ sunt facultatis. Agyrtæ & qui radices hinc inde venales circumferunt, pleni ore Carlinæ radices prædicant, ac fieri potest, vt ad multa sit utilis.

CHAMÆLEO ALBUS.

Chamæleonem album vocant Carduum Descriptio. Quendam, curus folia, vt à Carlinæ foliis lanugine canescente, rasili, quæ vtrinque sunt obducta, differunt, ita cum iis conuenit incisoris, rariore tamen: sic vt latiores sint lacinie, spinosæ: aliàs verò cardui lactei seu Mariæ fol a latitudine adæquat, crassiuscula, heruosa: Hunc Lugduni in horto Pharmacoposi Bralerii, Chamæleonis nomine vidimus, multum à Carlinæ vulgari differentem.

An Clus. Pinnion. pag. 667. Carlina siue Chamæleon vulgò nuncupatus flore amplo albo?

An Gesn. hort. Ixine spina, quæ Mastichen in radice fundit Hispanis cognita Spanisch Eberwürg; ex genere Cardopati, siue Carlinæ? An Cordo in Dioleor. lib. 3. cap. 6. Chamæleon albus in Italia proueniens?

An Anguill. epist. 5. Helxine Pliniana quam esse Chamæleonem album Dioleorides dicit esse manifestum, ac à Theophr. dici *ixia*, & Gazi interprete Carduum Pineam? Item epist. 8. pag. 137. Ixine Theophrasti lib. 9. cap. 1. & 6. cap. 3. & 4. quam malè, Gazi modò vertit Spinam Ixinam, modò Carduum pineam. Ixines Latinis dictus Carduus Pineæ producens lachrymam reperitur in Orientalibus partibus: Considerent lectores an Anguillara non sit sibi contrarius dum epist. 5. *ixia*; & 8. *ixine* dicit, duas plantas differre.

Bellonius ni fallor de Chamæleone albo nostro hæc tradit. Frustra inter reliquas stirpes Chamæleon albus depictus fuit: nam nec in Germania, nec in Gallia, nec etiam in Italia nascitur. vnde certum est (cum venia sit dictum) istas tres nationes hallucinari: neque enim Carlina, neque alii similes, Chamæleon albus est. Hic radicem producit humanæ coxæ crassitudinem æquantem, pedalem, interdum etiam cubitalem longitudinem, aded odoratam, vt còclauem in quo reposita, Violæ odore ita repleat, vt capitis grauedinē inducat. Cretenses pastores,

Dentes
Obstructiones

Pulvis
Dosis

tumentis
Columbarum
allicium

Scabies

Vires gestæ
ibus auget

An carlinæ
flore amplæ
albæ Clus.

Anguill. sibi
contrarius

Chamal albus
Bellon.

& rustici pueri, præsertim apud *Rhymio*, eius gummi colligunt, quo feminæ pro masticatorio vtiuntur, vti mastiche in Chio, & Chondrilla gummi in Lemno. Cola vel Chamæleous vulgò nuncupant Chamæleonem album.

Chamæleous bellus

Honor. Bellus in Epist. ad Clusium meminit, huius Chamæleonis his verbis. Chamæleon albus, gummi, vt Maltix, ferens, copiosissimus est: radicem habet maximam, odoratam: Iunio & Iulio, circa echinum gummi distillat, quod pueri legunt, & aliquantulum masticant, postea digitis læuigant, & complanant, complicatūque in vesiculæ formam, super alteram manum fortiter impellunt, ita vt ex ista vesicula rumpatur & crepitum edat: quo ludi genere summo perè pueri delectantur. Quod autem, vt scribit Bellonius, loco masticis id gummi dentibus atterant, nondum scire potui: nam hic Cydoniæ neque legitur, neque curatur: radices vocantur *κάρδαμοι*.

TETRALIX VETERIBVS.

CAP. X.

Tetralix Theophr.

Plin. Lapsu

Tetralix à Theophr. hist. pl. lib. 6. c. 3. cum reliquis aculeatis plantis enumeratur, ac quidem inter æstatem germinantes, atque à quibusdam Ixinen [*ἰξίνη*] vocant. Sed & Plinius Theophrastum imitatus Tetralicem æstate florere prodidit Helxinen [Ixinen Theophr.] Quod vitium autem oris esse, non exemplaris, monstrant hæc, quæ lib. 12. cap. 17. scribit. Sed nos qualis esset Helxine vera, diximus lib. 21. cap. 16. vbi Helxinen [Tetralicem] & folio & caule spinosâ habere lanugines affirmat.

Tetralix spinosa differt ab Erica

Ex quibus colligere licet Tetralicem hanc spinosam ab Erica [Erihace CH.] quæ lib. 21. c. 16. ab Atheniensib. etiâ Tetralicem appellari perhibet, diuersam esse: quia Ericam spinis armatam esse nullus vnquam Herbariorū prodidit, id quod etiam perspicuum est ex Dioscoride & Plinio de Erica tractantibus. Deinde Tetralicem Ericam post primos Autumnii imbres florere, nempe ad Idus Septembres, & Calendas Octobres idem Plinius testatur.

Tetralix diuersa à Tetralice Plin.

Alio verò in loco Tetralicem & Ixinem florere tradit æstate: quanquam Theophrastus, ex quo hæc Plinius mutuatus est, Ixinem & Tetralicem non scribit florere æstate, sed germinare.

Ericem Athenienses, vt ait Plinius apud Hermod. Corol. 115. Tetralicem vocant, Eubœa Sifarum, siue, vt Varro, Sifaram (de hac diximus H. n. g. lib. 10.) Theophrastus Tetralicem non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat in genere fruticum, aculeatam & germinantem æstate: De hac Ericæ intelligat nec ne haud scio: quia tamen bis anno floret Ericæ, prima videlicet & vltima syluestrium, nec inter aculeatas ponitur: fieri potest vt alia sit Tetralix sua Theophrasto, alia quæ pro Erica Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem vocari makt. Caueant igitur lectores, ne Tetralices has posthac confundant.

Carduus Echinosus maior

Quia autem Tetralix à Theophrasto numeratur inter Carduos, hinc sit (vt scribit H. Lugd.) quod quidam eam esse putent, quam Tragus post Carduum vulgarem & Chamæleonem album pro vero Chamæleonte nigro pictam ostendit, de quo mox agemus sub Carduo Echinoso maiore.

CROCODILVM VETERIBVS.

CAP. XI.

Crocodilum, ita describente Dioscoride, *Crocodilum* Chamæleonis nigri figuram habet. Nascitur autem in syluosis stirpibus & arboribus confertis locis Hermod. radicem habens longam [his sequentibus vetus caret vsque ad vocabulum *acrem*, quæ lectio probatur & Hermod.] leuem, aliquantulum latam, odore, vt Nasturtium, acrem. Feruefacta in aqua [*ἐν ὕδατι*. Corneli. *ἐν ὕδατι*, in aceto] & pota [*πρωϊνὴν*, & non vt Ald. cod. *πρωϊνὴν*], lota, quidam etiam, sed non sine errore, legūt *ἐν πρῶτῳ* si per nates attrahatur] radix, valet ad copiosum sanguinem per nates pellendum. Datur & henosis eos euidenter adiuvans. Sed & semen ei rotundum est, ac duplex, veluti scutum [vt. omittit ista, quæ nonnulli adiecitia censent, & ex Tordylj historica huc perperam translata] quod quidem vrinam ciendi vim habet.

Ea Plinius sic videtur reddidisse. *Crocodilum* Ex Plinio: Chamæleonis herbæ nigre figuram habet: radicem longam, æqualiter crassâ, odoris asperi. Nascitur in sabuleis. Pota sanguinem per nates pellit copiosum, crassumque, atque lienem consumere dicitur.

In quibus Plinius legisse videtur *ἐν τῷ ὕδατι* *ἰξίνη*, id est, in tabuleis, pro *ἐν τῷ πρῶτῳ* *ἰξίνη*, id est, syluosis, vt habet Dioscorides: deinde pro *ἐν πρῶτῳ* aliquantulum latam, *ἰσοτάχην*, siue *ἰσοτάχην*, id est, æqualiter latam, siue æqualiter crassam, Oribasius subcrassam legit. Quem verò *ἐν πρῶτῳ* Dioscorides, Plinius suo more odorem asperum dixit. Oribasius radicem acrem, odoremque Nasturtio similem. Quod verò ad semen attinet rotundum, duplicis scuti figura, id à Plinio omisum est, & ab Oribasio, qui integras historias ex Dioscoride excubere consuevit. Præterea id à Dioscoride præter morem additum fuisse videtur, absoluta scilicet historia & viribus explicatis, atque falsò huic plantæ attributum, cum *ἐν τῷ ὕδατι* ferè omnia semen edant: Cnicus simile, Quare adiecitia hæc viri docti censent, & ex Tordylj historia, cuius semini figuram hanc Dioscorides assignat, huc à scitolo quodam nominum vicinitate decepto ascita fuisse. His adde, quòd in Cratœi fragmentis desunt verba illa, *οὐκ ἐστὶν ἰξίνη* *ἐν τῷ ὕδατι* *ἰξίνη*, id est, rotundum, & duplum vt scutum.

Galenus *Crocodilj* semen acre & aromaticum esse dicit, vrinæque ac menses ciere, vt calidæ sit facultatis & discussoria ac siccantis. Succum item caulis similem semini vim habere, & renibus affectis prodesse. At radicem expuitiones è thorace vehementer adiuuare, quæ acris quidem mints sit quàm semen, sed non rursus amara: & ducat etiam sanguinem per nates.

Differt à Chamæleone, inquit Martellus, *Crocodilum* quod eorum alter albus scilicet, sine caule in medio, inter folia Spinæ marino Echino similem proferit: Niger non vnam verum duas trèue aliquando coliculis potius quàm caulibus impositas ostendit, *Crocodilum* autem singularem mittit caulem & in caule spinosam Echinum. Est & alia differentia, quòd illi pinguibus campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & confertis arboribus locis. Differant & radice quæ in illis qualis ab hoc describitur: in *Crocodilio* longa cum latitudine aliqua, aliisque notis illis quæ descriptæ paulò

Differentia

*Crocodilii
nomenclatu-
ra obfcura.*

paulò antè funt. Nec multù liquet, teſte Lobelio, nomenclaturæ Cardui ratio, vt ne vix quidè antiquis probè cognita fuiſſe putemus. Nam antiqui Galenus, Onbaſius, Paulus duntaxat verba ex Dioſ. vidètur mutuari, aut à Crateua, à quo Dioſc. & Plinius, qui locis fabuloſis codicis errore, oriſciſcit, ſua ſumſere. Sed in Crateux fragmentis deſunt verba pauca. Ab Aëtio facta mentio maxime Crocodyliad. ſ.

Aquiuon.

Neque deſcriptio Dioſcoridis tam aperta, vt à tot aculeatis plantis facile ſit genuinum Crocodilium diſtinguere & internoſcere. Et hinc aliqui ſex quorum numero eſt Anguill. Amat. ex auctoritate Ruellii, quem tamen hac de re dubitare ſcimus, & Briſoti, H. Lugd.] Carlinam vulgarem ſuſpicantur eſſe Crateux, Dioſcondis, Plinii & Galeni Crocodilium. Horum opinionem reſutat Matthiolus & Io. Agricola: Negat Anguillara: Dubitat Geſnerus.

An Chamaleon exiguus.

An Chamaleon exiguus, Crocodilion Cordi in Dioſcor. lib. 4. cap. 12. quam ait Germanos Wild Eberturg vocare.

*Chamaleon niger Ma-
tanhia.*

Matanz & Anguillare Chamaleo niger, videtur Lobelio verum eſſe Crocodilium, aut certe genuini opinionem ſuſtinere poſſe.

*Carduus Echinopus mi-
nor.*

Crocodilii hiftoria ſubneſcit Lob. in Adv. plantam, quam Geſner. Echinopum minorem vocabat, & Dalech. Crocodilium Monſpeliſium.

Echinopus maior.

Crocodilii nomine exhibent Carduum Echinopum maiorem Lacuna, Lobel. & Geſnerus.

Eryngium maritimum.

Eryngium maritimum putat Caſalp. lib. 13. c. 19. Crocodilium Dioſcoridis, cuius ſententiam minimè probat Anguillara & Matthiolus.

Dipſacus.

Crocodilion dici, qui aliàs Dipſacus dicitur, teſtis eſt Dioſcor. lib. 4. cuius etiam nominis meminit Tragus lib. 2. cap. 106. & Geſn. in Aſcript. Dioſcoridis.

Dracunculus maior de quo lib. 19. diximus, vt videre eſt apud Tragum lib. 2. cap. 81. Apuleio dicitur Crocodilion, Colubrina & Dracontea.

Eucharius Roſſin in herb. pro budem, Dracontea, Viperina ſine Crocodilia pingit Biſtoram.

Crocodilium tandem confundi ab H. Lugdunenſi cum Tordyllo quod aliqui Seſeli Creticum vocant, videre erit ſuo loco.

ECHINOPVS MAIOR



Tom. III.

Altitudi-
vni- & alte-
ruius excreſcit,
caulibus craſſi-
tudine digita-
li, purpuraſ-
cente lanugi-
ne obductis,
ſtriatis, tactu
pinguibus,
manſu dul-
ciſculis: quos
folia ambiunt
latiore baſi
oblonga, tota
tactu glutino-
ſa, profunde
lacinata, ſu-
perne atroui-
rentia, inferne
ineana, vtri-

que pilofa, multis tamen numeris magis inferne quam ſuperne: in caulibus extremis eorumque aliis capitula exactè globofa naſcuntur, ſiſculis ex albo ceruleis: radix mediocriter craſſitudinis. Huius generis eſt & ille, cuius foliorum, quæ factis ſunt anguſta, lacinia nihil aliud quàm inſeſta prælongaque ſpicula ſunt.

Camer. hort. Sphærocephalus flore albo. In Epit. Matth. ſpina alba putata, aliis Echinopus, nonnullis Acanthium, vulgò Sphærocephalus, quibusdam Chamaleon niger, aliis Crocodilium, Germ. Biſem inöpf. Phurum eſt generum, & quibus hæc vulgatio cum altera ſpina alba putata flore ceruleo. Eidem apud Matth. Vermeinte weiſſe Bergdiſtel mit weiſſen blumen: ſpina alba, albis floribus. Item Vermeinte weiſſe Berge diſtel mit blauen blumen: ſpina alba ceruleis floribus: ſolus anguſtionibus & paulò rariotibus. Pro cerulea ſpina alba ponit figuram Matth. verum ego neſcio vnde colligat Matthioli ceruleam & minorem: conſiderandum an Camerarius tunc non intellexerit, carduum Sphærocephalum minorem annuum: cuius dat figuram in horto.

C. Bauh. apud Matth. ſpina alba altera Matthioli, Chamaleon verus Trago.

Lobel. Adv. Crocodilium Fuchſii, Echinopus ſeu carduus Echinatus Geſneri: Sphærocephalus Cordi. ſpina peregrina Dodonæi, Germ. weiſſe diſtel/ Belgis Rodiniſche diſtel. Obſ. p. 81. Crocodilion Fuchſii & Cordi, perpetuam Chamaleon verus Tragi. Adv. pag. 368. & 369. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 8. Ritro ſeu Ritro Theophrasti.

Dodon. gall. lib. 4. cap. 64. Chardon eſtranger, ſpina peregrina, Belg. Vremde diſtel, qui quomodo vocant Veteres neſcit, niſi ſit Aëthys ſylueſtris. Lat. in fol. p. 710. Carduus ſphærocephalus primus, quem Fuchſius quandoque Chamaleonem nigrum facere ſtudet, ſed poſtea rectius ſentiens ſpinam peregrinam vocauit, & Val. Cordus Sphærocephalum appoſitè appellauit.

Cordo Hiſt. Sphærocephalus carduus, ibi pulchra figura, ac annotatum: ſpinam albam in Italia quidam hodiè vocant, quærendum an Echinopus Veterum ſit: Crocodilium videtur.

An Anguill. epit. 8. pag. 142. Spina biancia, ſine alba Cicerenſium, foliis non multum pungentibus, quam Geſnerus cum illi conuenerem Echinopum exiſtimabat.

Apollin. rad. i. ſupra eleſt. Hamech: Spina alba ab Alexandrinis herbariis allata, quam melius Sillybum referre ait: mirum ibi dicere eandem eſſe cum Matthioli ſpina alba, cum non ſit hiſpida, at leuis admodum: Matthiolus autem dicat ſuam habere ſpinas rigentes.

Fuchſ. hiſt. cap. 139. Carduus niger aut Vernilagium Germ. Schwarz garten diſtel, qui parum an legitimus ſit Chamaleon niger addubitat. Eidem Icon. ſpina incognita.

Matth. in Dioſcoridem in prior. comment. & apud Aſcript. Spina alba, quam deſcriptioni Dioſc. adſcripſit, ait, frequentiffimam plantam, quæ ſuis echinis ac ſpinis tigens in excellioribus Ananiz vallis montibus laticèis abiegnis & piceis ſyluis reſerſis Iulio menſe viſatur. Eadem commemorat in poſt. comm. Lat. & It. cum mag. fig. vbi & ſecundam ſpeciem aſſignat, dicens: Eſt & aculeata altera planta, cuius hic imago ſecundo loco viſitur, quam quidam ſpinam albam eſſe ſentent, ſed plura in hac deſiderantur. Quidam

*Sphærocephalus fl. albo
Camer.*

*Spina alba
altera Matthioli
C. Bauh.
Crocodilium
Fuchſii. Lob.*

*Spina peregrina
Dod. gall.*

*Carduus
ſphærocephalus.*

*Sillybum
Apollo no-
tatur.*

*Chamaleon niger
Fuchſ.*

*Spina incognita
Fuchſ.
Spina alba
Matth.*

*Spina alba
plant. al-
tera.*

demonstrant pro spina alba Cardui genus, cui caput rotundum, quod videtur telis araneis textū figuram hic posuimus, non est vera spina alba, quamvis posset pro ea sumi. Figura quam ponit satis conuenit cum Echinopo: verum non describit: at tunc repetit in antheris Diof. descriptionem: quam etiam in postremis repetit pro Carduo nostro Galactite, quem cum sua Ananienfi spina miscere videtur, ibidem figura transposita, & primo loco posita quæ esse debet, & quam antè probauit rejicere, ac ita dubiè scribit quasi spina eius alba Cortusi, Spina Alba Ananienfis, & Spina alba quam olim pingebat, tres nunc censet plantas diuersas. In hist. Germ. videtur descriptio conuenire Carduo capite tomentoso: denique confusè scribit Matthiol. nec scire videtur quid viderit aut curare depingendum.

Matth. la-
psum Gary.

H. Lugd. 4.
figura
Spina alba
Matth.

Spina Ara-
bica

Chalceus
Tetralix
Spinosa
Tragi
H. Lugd. la-
psum Gary

C. Bauh. a-
nimadu-
erit in H. Lu-
gdun.

Acanthium
Turn.

Card. au-
nacus
Card. Gellio-
fis.

Vnius plantæ quatuor icones apud H. Lugdunensem. Ac prima p. 1462. pro Spina alba Matthioli: Est & altera planta aculeata, inquit, cuius iconem hic exhibemus quam quidem Spinam albam esse censet: sed multa in hac desiderantur. Hanc tamen depinxit Pena nomine Spinæ albae. Secunda p. 1467. pro Spina Arabica. Sunt qui Carduum illum tantoperè aculeatum quæ Matthiolus nomine Spinæ albae exhibuit, Spinam Arabicam esse opinentur. Tertia p. 27. Chalceus inscripta: Quarta p. 1483. pro Tetralice spinosa Tragi. Multa hoc loco displicent in histor. Lugd. Primum quod eandem figuram nempe Matthioli ponat duobus locis: nempe pro Spina alba & pro Spina Arabica: secundò eandem existimet Penæ Spinam albam. Tertio quod pro Spina Arabica exhibeat. Quarto quod alias duas figuras exhibeat Cardui Echinopi pro plantis diuersis Chalceio & Tetralice. Cui obsecro placeat Hist. Lugd. lib. 14. c. 28. Tetralicem spinosam Tragi vocare plantam non ita dictam à Trago, ac præterea eiusdem plantæ aliam ponere figuram cap. 27. cum inscriptione Chalceios, quasi illæ duæ figuræ & earum descriptiones non sint vnius plantæ diuersimodè descriptæ & depictæ.

Spinæ albae (inquit C. Bauh. in animadu. H. Lugdun.) pag. 1462. figura est absque descriptione. Spina Arabica p. 1467. figura eadem numero cum prioribus, addita tamen descriptione. Eadem tertio proponitur & Silybi siue Leucacanthæ Loniceri nomine p. 1466. describitur, non autem pingitur. Quarto Chalceios nomine pag. 1481. describitur. Quintò, repetitur & describitur pag. 1483. & Tetralix spinosa Tragi appellatur. Sextò, Ruthrum alterum dicitur, & ex Pena describitur, sed sine iconè, pag. 1482. En vnius plantæ sexies mentionem!

Quam herbam ego Acanthium censeo (ait Turn.) genus est Cardui, Branchæ vrsinæ modo foliis laciniatis, verum laciniis non ita longè ab inuicem distantibus: constrictum folium habet in se aliquid oblongum gossypio simile: capitulum Cardui sillonum echino simile, sed minus multò flores carulei: tota herba est viscida, odorèque graui prædita. Nusquam obseruaui, quàm in hortis Angliæ & Italiæ. Aiunt quidam, Heibarii dici Carduum asininum. Nullum eius nomen Anglicum hæcenus potui dicere. Commisici igitur cogor nomen ore thissel (Carduus auenaceus) vel Cortò dhisell (Carduus villosus) propterea quòd semina gravis Auenæ sine similia, foliæque constricta villum gossypij in se referant. Lucas Ghinus præceptor meus Bononiensis, interpretis pu-

blicus Diofcoridis, docuit me primus, hunc Carduum Matthiolo nunquam in Italia conspectum. Londini vidi in variis hortis.

Taberb. Icon. & Hist. Carduus Spharoccephalus. Trago dicitur, Chamæleon niger verus. Geln. de hort. Echinopus, quibusdam Spina alba aliis Crocodilum, aliqui Germani è Jungfrauen distel appellant. Cast. Durant. p. 404. Carduus. Spina alba, Arab. Bedeguar: Priorem, Matthioli figuram habet. Cronemb. de compos. medic. lib. 1. sect. 36. Certum se esse gloriatur de spina alba, & hanc quidem esse Bedeguar: Pingere exquisitam imaginem in Diof. suo Matthiolum, quam hæcenus non viderit. Quæ autem certitudo obsecro ex planta non viderit? Figuram Lonice, icon. Echinopi (quam ad ipsam plantam non existimo male factam) Lonice habet sub his nominibus, weiß garden distel, Jungfrauen distel, Zangarten distel, Löwenzahn, Alba spina.

Nostra opera est Carduus echinopus Bisem. L. eius distel à forma capitum similium pilis odoratis & mulco infectis, in Horto E. C. Montbelg. non solum diu durat hic Carduus & hiemem perfert, verum etiam seipsum disseminat: Inter scripta Gesneri inuenio dici Acanthium sylu. Bononiensibus. Accepi semen Lugduno à Dom. Sebastiano Heberlin nomine Charbons des Dames. Spina alba albis floribus Camerarij habetur in hortis, & spontè nascitur saxosis & fluuiis imminuentibus collibus: altera flore caruleo, peregrina cum sit, non nisi in hortis querenda erit.

Decoctum Spinæ albae albis floribus echinatis capitis vna cum caule & seminibus, quæ admodum sunt amara, misce prodest in doloribus dentium.

Vires

SPINA ARABICA VETERIBVS.

Spina Arabica, ab alijs Acanthis dicta, Diofcoridis videri videtur natura similis esse Spinæ albae, nimirum adstringens. Et ad fluxum muliebrem, & ad sanguinis educationem, & ad alias fluxiones: radix eius similiter idonea est. Nascitur in alperis locis.

Spinæ Egyptiæ siue Arabicae laudes, inquit Plinius lib. 24. cap. 12. in odorem loco diximus. Et ipsa spissat adstringitque distillationes omnes, & sanguinis excretiones, mensiumque abundantiam, etiamnum radice valentior. Ita vetus codex, inquit Corn. sed in vulgatis, Egyptia siue, voces desunt. Et hæc sunt quæ etiam Diof. habet, nisi quòd ἐν τῷ γυναικίον, Plinius mensium abundantiam reddidit: quum esset fluxus muliebri à mensibus siue menstrua purgatione. Cæterum locus quo se Egyptiæ spinæ laudes dixisse ait, est lib. 13. cap. 9. Nec mirus spina, inquit, celebratur, in eadem gente duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id utilissima nauium costis. Candida facili putrescit. Aculeus spinarum & in foliis. Semen in siliquis, quo coria perficiuntur galle vice. Flos & coronis iucundus, & medicamentis utilis. Manat & gummi ex ea, &c. At non satis animaduertit Plinius, aliam esse Spinam Egyptiam ex qua Acacia præparatur, quæque item Acacia appellatur, de qua & hoc loco, itemque lib. 24. cap. 12. vbi Acacia spinam vocat, agit, & de qua mox capite sequenti ii. ait: Gummi optimum esse ex Egyptia spina conuenit, vermiculatum, colore glauco, purum: sine cortice, denitibus adhærens: Et de hac spina in Egypto

Spina Arab.
Diof.
Vires

Spina Egypt.
Pina siue Arab.
Plinius

Plin. lib. 13.

Plin. error
confundens
acacia
cum spina
Arabica.

Egypto

Ægypto nascente, arborosa, ex qua & Acacia fit, & gummi, egit Diosc. lib. 1. cap. 12. Meminit eius & Theophr. lib. 4. & lib. 9. princ. ubi lacrymosum eius humorem esse ait, ipsumque ferre non in cortice, sed in vase: non satis animaduertit, inquam, Plinius, aliam esse hanc arborosam Ægypti spinam: aliam spinam Arabicam, quæ & ipsa Ægyptia vocatur, de qua superiore loco agit, ipsique omnia à Diosc. attributa adscribit. Hanc tamen Dioscor. naturam similem spinæ albe videri dicit. Sed Galenus simpl. spina Ægyptia, inquit, quam aliqui Arabicam nominant, similis est spinæ albe quæ apud nos est, magis tamen adstringente ac siccante vi prædita est.

Ceterum, hallucinantur qui sibi persuadent Arabicam spinam, cuius hic fit mentio, esse quam Acaciam vocant.

Spina Arabia à quamplurimis de Carduo in genere dicitur & habetur.

ACANTHA LEUCE, SPINA ALBA

Veteribus.

CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis locis, folia habens albo Chamæleoni similia, angustiora tamen & candidiora, lobbiplida, & spinosa: caulem duos cubitos excedentem, digiti magni aut etiam maiori crassitudine, subulbum, intrinsecus vacuum. In huius cacumine caput est spinosum, crinaceo marino simile, sed minus & oblongum. Flores sunt purpurei, in quibus semen velut Cnicus, sed rotundius. Huius radix pota facit ad sanguinis spumam, stomachicos, cæliacos: ciet etiam vinam, & ad tumores in cataplasmate imponitur. Decoctum ipsius colluitur in dentium dolore. Ad semen potum pueris qui conuelluntur auxiliatur, itemque aduersus serpentium morsus. Aiunt & Amuletum ex ipso appensum venenatas bestias fugare. Alibi Scolymus folia habet Chamæleonis & eius quæ Acantha leuce appellatur.

Spinam albam alii siluestrem Cinaram, inter notha Dioscoridis, alii Donacitum, alii Erysisceptrum vocant. Romanis est spina alba siue regia: aliis Carduus rampartius.

Inter spinarum genera, inquit Corn. meminit Plin. l. 24. c. 12. etiam spinæ albe, his verbis: spinæ alba semen contra scorpiones auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Nec alibi ipsam describit, nisi quod lib. 15. c. 28. In papyris & ferulis, spinæ quæ alba, caulis ipse pomum est, inquit.

Galenus spinam albam, id est, *λευκανθου λευκου*, quosdam composita voce *λευκανθου λευκου* nominare dicit, sed postea sub litera *λ* diuersam facit *λευκανθου λευκου* ab illa quam prius *λευκανθου λευκου* vocauit, & de hac ait, radix ipsius siccat, & moderatè adstringit. Quare & cæliacis & stomachicis prodest: & sanguinis educationes cohibet: & tumores in cataplasmate coëcet. Dentium etiam doloribus prodest, si quis decoctum colluat. Semen autem tenuium partium & calidæ facultatis est, ut etiam conuulsis in potu medeatur.

Non parua inter authores oritur contentio, quænam in aculeatarum genere, quas plurimas genuit natura, Spina alba legitime, notis omnibus ad stipulantibus, appellari possit. Verum etsi tantam litem transigere nequeant: interim tamè pro spina alba alii alias herbas ostendant, & qui-

que suam veram existimat. Quandoquidem sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent spinam albam eam aculeatam herbam esse, quam Carduum Marianum siue lacteum nominamus. Sunt alii, qui Cardum Echinopum maiorem vocant. Sunt præterea, qui spinam albam esse velint, illud Cardui genus quod Spinam albam quorundam inter binos, Spinam albam à Cortusio sibi mis-

ser habet Matthioli, quam veram existimat. Sed fallitur. Carduum Galactitem verè nobiscum dixerit. Habet Spinam albam & Anguillara, quæ Lobelius existimat esse Crocodilium Monspelien-
[sic] S. Sed qui plantas vñ cum descriptione conferent, dubitandi occasionem inuenient, ac nobiscum Carduum Echinopum minorem cognominabunt. Spinam albam siluestrem Fuchsi, siue Adanthium quorundam ad Diosc. spinæ albe delineationem quàm proximè accedere scribit Fuchsius, quem plures alii sequuntur. Spinæ albe arboris nomen, cum spina alba, herba eduli, [quam nos hodie Scolymum satium, Goropius verò Carduum vocat] confundit Plinius. Errant, & in hoc etiam errore Ruellius versatur, qui sibi persuadent Spinam albam illum Cardum esse, qui à Tulsis *Fesura*, à nobis Scolymus silu-

vocatur. Dalechampius spinam albam esse arbitratur, quam Eringium montanum appellamus, & ei quidem notis omnibus à Dioscoride traditis optime quadrare. Spina alba Diosc. non minùs accedere Carduum tomentosum Anglicum ait in Aduers. Lobelius. Hunc nos Cardum capite tomentoso nominamus. Carduus stellatus, teste Lobelio in Obs. est spina alba vera Rondeletio. Sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent spinam albam eam aculeatam herbam esse, quam aliqui Herbam Turcam, nos Cardum benedictum vocamus. In manifesto errore versantur, qui sentiunt Leucacanthā, ab Acantha leuce h. e. spina alba, nullo pacto differre. Spinæ albe Symphytū substituit Apollo in conf. Hamech. Spinæ albe loco in Syr. de Eupator. Muth. germ. Cyperum substituit. Ruellius aculeatæ arbutulæ radicibus, quæ candida est Dioscoridis Rhamnus, nobis autem Rhamnus primus, siue Monspelienis, omnes tribuit facultates, quibus legitima spina alba à Dioscoride commendatur. Cautos nos esse oportet ne res diuersas spinæ albe nomine confundamus. Nam præter iam dictam Rhamnum, Rhamnus cum spondylo siue tertius etiam spina alba cognominatur. Merito Matthioli repræ-

hendit Ruellium, quod spino albo (nobis Oxycantha Matthioli dicto) attribuat facultates spinæ albe Dioscoridis. Spina alba Brunckhauveigio sunt Rosæ siluestres albe. In spinæ albe locum cuius decoctum ad dentes firmandos laudatur, author ille Italici libri, *De gli ornamenti delle donne*, Caryophyllatæ radicem substituit. Sed argumento parum firmo.

Carduus
Marianus:
Echinopus
maior.

Carduus
Marianus:
Echinopus
maior.

Spina alba
quorundam
Carduus
galactites
Card. echinopum minor

Spina alba
siluestris
Fuchsi
Scolymus
satiuum.

Scolymus
silu.
Eringium
montanum.

Card. capite
tomentoso.
Carduus
stellatus.

Card. benedictus
Leucacantha.

Cyperus
Rhamnus,
siue Monspelianus

Rhamnus
cum spondylo,
siue
tertius.
Oxycantha
Matth.

Rosæ siluestres.

Caryophyllata.

SPINA ALBA QVIEVSDAM CAPITE echinato.

Perennis est planta caule ad cubitorum aliquot altitudinem surgente, striato, in ramos varios diuiso: folia plus minus doctantalia, quædam palmaria, tum alibi, tum ramorum diuicationi subiecta, pronā parte tomento incano vestita, alterā virdantia, lacinis diuisa ad costam vique profundis, quarum singule in vnciam & longiorem, rigidam, infestamque spinam desinunt,

Descriptio

Æquiuoca.
Acacia
Carduus

Acantha
leuce Diosc.

Acantha
leuce Galen.

Æquiuoca.



Spharoccephalus
max. Cam.

Card spha-
rocephⁿ acu-
tus Dod.
Spina alba
Lob.

Match. re-
preh.

Spina alba
altera
Math.

Math. no.
LAINF.

Locus &
Tempus.

spatia quoque
interiecta tota
spinis horret:
singulis ramis
caput insidet
sphaericum,
Cardui echinopi glomeri
simile; sed
spinosum.

Camer.hort.
Sphærocephalus maximus.

H. Lugdun.
pag. 1482. Car-
dus Sphero-
cephalus acu-
tus Dodonæi.

Lob. Adu.
 ἀκανθα λεύκη,
 Spina alba
 quam Bede-

guaram Arabes vocant, nectamen villis notis
notiorem facit Melius aut Scirpationis inter-
pretres, &c. Non est haec quam fribi missam olim
Patauii Senensis dat: ceteris omnibus jugula-
tis lentitius, vt suam amplitudo intruderet ir-
rendis argumentis, & plus alaturis ad suam
ipsum quam ad aliorum refellendam. Obseru.
pag. 431. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 9. Spina
alba.

Matth. in comm. in Diof. cum magnis fig. Lat. lib. 3. cap. 12. Spina alba altera, quam legitimam in contextu dixit, & accius primo loco imaginem in exprimere ait, misilſequē ad ſe Patauiſe Jac. Ant. Cortuſum, quē notis omnibus genuinam repræſentet. Siquidem foliis ſi albo Chamaeſolū ſimilibus. In comm. ital. cum mag. figur. inquit: Spina bianca. Spina alba ſi legitima proenit in Italia non poſſum aliud affirmare, quā ſi eam eſſe, quam miſit Cortuſus. In lat. comm. tranſpoſitā figurā, quē primo cēt loco debuit eſſe ſecundo ponit ſolam imaginem ſine deſcriptione præter repetitū fruſtrā ex Diof. quam olim attribuebat alteri plantæ: exiſtiſſimo hanc plantam illi fuiſſe ex ſola figura notam & tamen aſſerit legitimam ſuo more.

Casp. Baubin. apud Matth. Spina alba i. Matthioli.

An Fuchius de hac dicit in hist. vidimus herbam peregrinam siccam, quæ haud dubiè vera Spina alba erat? An Gesn. de coll. stirp. fol. 109. Spina alba Dioscoridis, Cardui genus? An Carduus Leucanthemus Schvvenckfeldij sit Spina alba Aduerfariorum?

Spinæ albæ nomine fuit nobis datum Cardui
semen quod in horto prouenit Geneuæ & ante
Lugduni prouenerat etiam : in horto nostro,
hiemem pertulit ac floruit Iulio. Obseruauit
etiam Bizantijs & Patanijs tum in horto publico,
tum in alijs.

ECHINOPVS MINOR.

Description

Digito minor est radix, rugosa, in plura capita
 hissa, ex quorū in vnoquoque caulis vnus
 pullulat dodrantalis & longior, propter lanugi-
 nem densam totus albicans; ex quo prodeunt
 crebra alternata *folia*, quorum quædam parum
 cauli longitudine cedunt, alia vnciâ paulo ma-



iora, tenuissi-
mè & ad co-
stitam vsque in-
cisa, spinosa,
infia lanugine
mollis candi-
daque veluti
& costa, pube-
scentia, super-
nè viridantia:
summo caulis
cacumini,
sphaericum in-
sidet capitulū,
minus quam
Echinosi ma-
ioris, *flosculis*
cyanei coloris
glomeratum.

Camer. hort. Sphærocephalus
Sphærocephalus annuus

flore cæruleo in satis magnum globum redactō.
Icon. p. 45. Sphærocephalus annuus.

Lob. in Ad. picuram habet Cardui cuiusdam *Lob. cand.*
huic plantæ correspondentem quem existimat *1897.*
Rutrum siue Rutrum Theophrasti secundum
Anguillaram : verum aliter se rem habere com-
periet, qui eorum descriptionem vel ipsam plan-
tam conferet cum Anguillara descriptione, Icon.
Plant. Tom. 2. pag. 8. Ritro floribus cartuleis Ad-
vers. pag. 36.

Hinc primo observavi inter Monspelium & Perous. Est vero mihi nunc in horto E.C. annua
 planta quæ quo anno fata caules & flores profer-
 ret Julio & Augusto, & Septembri semina matura-
 rat, quibus deciduis perit, ac sequenti anno ex iis
 renouatur.

DIPSACVS EX VETERIBVS.

CAP. XIII.

Diplacis quoque aculeatarum stirpium generi à Dioscoride ascribitur. *Caulem* habet alium, spinis horridum & *folia* Laetue foliorum æmula, caulem amplectentia [*σπειληνοτά των χυλίων*, vet. caret.] bina in singulis geniculis, prælonga, [*σπειμηνία*, sublonga *καυκασίων* vet.] quæ & ipsa aculeata sunt, ac ceu quandam bullas in dorsi medio inter foris quæ spinosas habent; concauos autem sinus [*καυκίδες*, in altero est *χαίτη*, alij *χαίλας*] qua parte folia illa copulantur, ad geniculum (*πρόσθον*, addit vet.) quibus aquas ex rore & imbribus in sese colligunt [*συνέχουσιν*, vet. *φυλάττειν* feruant,] vnde & Diplacis quasi sitientis, nomen traxit. At in acumine caulis singulis surculis singula infunt *capitula*, echino similia, oblonga & aculeata: quæ quidem arefacta candida spectantur, diuisa verò per longitudinem in media medulla vermiculos ostendunt. Huius *radix* è vino decocta cusaque, vique dum cerati Viri castitudinem acquirit sedis rimas & fistulas immissa sanat. Verùm hoc medicamentum ænè pyxide recondendum. Aiunt & ipsum myrricidarum, verrucarumque pensilium medelam esse. Ceterùm capitulorum vermiculi, folliculo illigati, & collo brachiove appensi febres quartanas curare peribentur.

Diplacum alij inter spuria Dioscoridis Crocodilon vocant, alij Chamæleonem, alij Onocardion, spuria.

dion, alii Veneris laurum, Romani Veneris labrum, alii Veneris Carduum, Aegyptii Sefeneor, alii Chir, alii Meles, Daci Sciaren.

Dipfacum ita describit Plinius, ut multum lucis Dioscor. afferat. Dipfacos, inquit, folia habet Lactuca, bullas spinosas in dorsi medio, caulem duorum cubitorum, iisdem spinis horridum, genicula eius binis foliis amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo subfistit ros saluus. In cacumine capitula sunt echinata spinis. Nascitur in aquosis. Sanat rimas sedis. Item fistulas decoctâ in vino radice, usque dum sit crassitudo cera, ut possit in fistulas collyrium mitti. Item verrucas omnium generum.

Galenus Dipfaci spinæ radicem secundo ordine ficcare dicit, & quid exterforii habere.

Dipfacum cum Chamæleone albo confundit Apuleius. Siquidem Chamæleonis albi, curationes & virtutes Dipfaco attribuit. Dipfaco autem præter paulo ante recensita nomina etiam hæc adscribit. Dipfacon quidam Græcorum nominant Cneoron, alii Meletam, Prophetæ Aphrodites Iutron, alii calycem Cardiacon, Aegyptii Semmeor, alii Cinaram rusticam, alii Statoron, alii Morariam, Hispani Analentidium, Aegyptii Gerbaste, alii Sapho.

Qui quidem Latine labrum veneris & Carduus magnus appellatur, à similitudine quadam Chamæleon dictus est, sc. ad herbam quæ inter aculeatas propriè sic vocatur, Humelbergio teste. Sed & Crocodili appellatæ eadem ratio est. Dipfacus verò appellata est à siti, quam Græci διψαζω dicunt, vel quia humorem illum contra eam paratum semper habet, aut quia iuxta fontes & locis humidis nascitur. Onocardi, id est, asinini Cardui, factum illi ex Græcia & Latina voce nomen, διψαζω enim asinus est. Meleta dicta videtur à capitulorum figura, oblongiori instar pomis quod Græci μύλον dicunt. Aphrodites Iutron, hoc est, ut inter Latinas appellationes habetur, labrum Veneris & αφροδίτη enim Græcis Venus est, αφροδίτη verò vas aquarum quo in balneis ad lauanda corpora utebantur, & quod Labrum Latine dicitur: sunt tamen non solum aquaria sic dicta vasa, sed olearia quoque & vinaria, in quæ oleum & cortina, & vinum è lacu transfertur. Calyx cardiacus appellata est à figura capitulorum quæ oblonga instar cordis existunt & bæccæ rosæcæ, antequam tota aperiantur: καρδία enim Græcis cor est, καρδία verò rosæ bæccam dum adhuc clausa est rosâ, & omne putamen in quo aliquid includitur, significat. Quemadmodum porro pro Chamælea Chamæleonem, sic etiam pro Cicete rustico Cinaram rusticam, id est, sylvestrem, reponendum censuit Humelbergius, eò quod spinæ albæ, quæ Cinara sylvestris etiam dicitur, sit quodammodo similis.

Illud nobis cum multis persuasum habemus Dipfacum Dioscoridis esse herbam quæ adhuc hodie Dipfaci sativi nomen à quamplurimis obtinuit. Huius Dipfaci est & alterum genus sponte proveniens, quod Dipfaco Dioscoridis nullis notis repugnare dicit Matthioli. Quam benè videndum postea. Dipfacum sylvestrem folio laciniato, non visâ prius Tabern. figurâ descriptum, ac ita inscriptum. Dipfacus, officinis & herbariorum vulgò Virga pastoris, non sine errore nominatur. Matthæus Sylvaicus Pandectarum author, in graviores errorum lapsus Tom. III.

qui quidem tantum à Polygono differt, quantum lepores ab uris. Dictamno Cretico, ut videre est lib. 13. Dipfaci nomen quoque adscriptum. Dipfacon tandem etiam de Aspalatho dicitur.

DIPSACVS SATIVVS.



Dipfacus sativus

Descriptio

Dipfacus sativus aut triu cubitorum aut etiam maiorem altitudinem assumit sequitur caule pollicari, recto, rigido, multis alis concauo, striato, spinulis quibusdam horrente, folia bina, opposita, ita contenta, inuicem sunt ut ea caulibus transadigat & concauum labrum excipienda aqua efficiant, am-

pla, longa, non minus caule horrida: capitula quæ pugnum impleant oblonga, vinctatis humilis nig. dissimilis, deorsum spectantibus minacia: inter quos flosculi emicant tubuli in star colore ex albo tantillum purpurascente: radice verò nuda laui candida.

In omnium ferè stirpium genere, si Trago credimus, duo stigma statuere licet, nimirum ut vnum sativum, alteram verò silvestre aut erraticum dicant. Id quod in hoc Carduo Dipfaco vel maxime locum habet. Est enim sativus quem iam descripsi, & lux spontis, de quo infra verba faciam. Alii et Lonic. in marem & sem. nani Dipfacum distinguunt. Sed error hic desumitur ex Pandectarum, ut bene monent Monachi, dicentes: Pandectarum errans subit antiamplius innotibus errandi. Quia in suo capite Dipfaco duo capitula Scapionis immiscuit, scilicet capitulum rosæ. quod est de Carduo Dipfaco, scilicet Labro Veneris, & cap. 381. quod est de Virga pastoris, scilicet de Sanguinaria seu Polygono. Cuius erroris Pandectarum etiam arguunt Fuchsius & Matthioli.

Dipfacus autem sativus dicitur Trago. Carduus Fullonum, Carduus Fullonius, hoc sativus: Isque vna figura utrumque comprehendit.

Matthioli. in prioribus com. Dipfacus si sit labrum veneris: In post. com. cum magnis figur. Latine & Italice Labrum Veneris, siue Dipfacus: In Hist. german. cum a Edition. Camer. Dipfacus, Labrum Veneris, & Carduus fullonum: In Epitom. Labrum Veneris. Aut autem Matthioli & subscibit Agr. icol. Me. dic. herb. in huius capitibus repositi verum nuncquam

comptum scribat. Reprehendit præterea Syluaticum. *Dipſacum* cum *Polygono* confundentem. Is autem suo more *Dipſacum* non describit in comm. nec notis satium à siluestri distinguit, quem olim non pigeat. Camerario apud Matthiolum est noua figura, dicenti esse quorundam *Spinam Selenium* Theophrasti, & *Galedragon* Xenocratis, apud Plinium.

Galedragon, cuius meminit Xenocrates, inquit Anguillara epist. 8. videtur Dioscoridis *Dipſacus*, qui dicitur *Labrum Veneris*, Græcis nunc *ἄνδρα βερλιδνε*.

Dipſacus vocatur à Matth. Trago, Cast. in cat. pl. Rob. C68. in lex. Euch. Roelsin, Turn. Fuchsio, & Tabern. Icon. & Hist. *Labrum Veneris* Matth. Corn. in Dioscor. Cast. Cæalp. Turn. *Dipſacus satius* Ponz in Baldo, Dodon. Gall. & Latin fol. Cord. in Hist. Geln. hort.

Ponz in Baldo. *Dipſacus satius*, vel *Galedragon* Xenocratis, Anguillario, seu *Spina Selenitis* Theophr. Guilandino.

H. Lugd. p. 1447. *Dipſacus* seu *Labrum veneris* Matth. Item *Dipſacus satius* alter Matthioli. Dux figura eiusdem plantæ.

Euch. Roelsin. pag. 59. *Cardo fullonum*, *Virga pastoris*, *Labrum Veneris*, *Bulen stroel*, *Carten disfel*, *hutenstas*, *frax Venus bade*, *weber farten*: duo genera vnum molle, alterum pungens, ambo calidæ naturæ, subitaneus calor, qui tamen facile euanescit. *Dechdisfel* habent aliquid frigiditatis. *Quanta* ignorantia Euch. qui hoc loco nescit quid scribat, & inepte p. 123. *Carduum Mariae* vocat *Labrum Veneris*: præterea iconem *Dipſaci* habet quam postea iterum ponit pag. 23. nomine *Virgæ pastoris* ac pro mare describit.

Lobel. Aduers. *Dipſacus satius* Fullonum. Obl. p. 487. & Icon. pl. Tom. 2. p. 17. *Carduus Fullonum*, siue *Dipſacus satius*, siue *labrum Veneris*.

Casp. Bauh. apud Matth. *Dipſacus satius* albo flore.

Planta hæc Græcis *Dipſacus* vocatur sicut & Lat. Item *ἀνδρῶν ἄνθη*: Lat. *Labrum Veneris*, *Carduus Veneris*, *Carduus fullonum* & vulgò *virga pastoris* Dod. Germ. *farrendisfel* / *farrenfraut* / *Bulen stroel* / & *weber farten*. Belg. *Caerden* / *Doldera Caerden*. Gall. *Cardon*, *Chardon de foulon*, *Chardon à carder*, *Verge à bergier*. Ital. *Dissaco* & *Cardo*, & *Cardo da panni*. Hisp. *Cardencha* & *Cardo penteador*. Angl. *Cassell*. Boh. *Stietka*. Hung. *Bogach fóro* / Polon. *Szezotki*.

Dipſacus autem, vti dictum, quasi sitiens dicitur, quod aquam in cohærentium foliorum sinu contineat, quæ ad sitis iniurias abigendas vtatur. *Labrum* verò *Veneris* à foliorum etiam positu, peluis vel lauacri speciem constitutente, humorem perpetuò continente.

Cardui fullonis nomen tolerari potest, inquit Tragus, modò sciamus *Carduum fullonum* nihil aliud esse quam *Dipſacon* Dioscoridis, quem aliqui *Crocodilion* vocant, alij *Chamæleonem*, alij *Oncardion*, alij *Veneris lauacrum*: Romani *Labrum Veneris*, alij *Carduum Veneris*: *Ægyptij* *Selenor*, alij *Chir*, alij *Meleta*, Daci *Sciarâ* vocant.

Dipſacum quidam Montbelgardi diligenter in hortis colunt. Sed & nos cum habemus in Horto E. C. Seritur in complunibus Italæ locis, præsertimque in agro Bononiensi, singulari à cultoribus adhibita diligentia ad lanificia. Iunio ac Iulio floret: echinata capitula Autumnò colligenda sunt.

DIPSACVS SYLVESTRIS, SIVE
Labrum Veneris.

VT satium Descriptio

Dipſaco congener est *ſylueſtris*, ita nõ paucis cum eo notis conuenit: pari cauſis spinosi altitudine ramorũ nque diuaticatione: *ſilicium* non diſpar amplitudo & lebrĩgmulus coitus, quæ spinis non ſecundum coſtam duntaxat minacibus armata, ſed & reliquo quoque folio, quib. opoſita parte co-

tyla reſponderet. Echini ſpinis vt longiorib. quàm Echm. ſatius horrent, ita & micoribus, minũque rigidis nec aduncis, ex quorũ ſinu flores emicant purpuraſcentes: *radix* & ſemen ſatium ſimilia.

Matthian Diosc. hb. 3. cap. 11. *Dipſaci ſylu.* nullis proſus repugnanubus notis, quas illi reddidit Dioſc. Inuenitur Autumnũ tempore, in eius capitulo iam exareſceto medullitũque diſſecto *virga ſavermiculus*, eſſi Marcellus dicit ſibi hunc nunquam compertum: *Dipſacus officinis* & *Herbariorum* vulgo *virga paſtoris* maior nomenatur. Id comm. cum magn. figur. lat. & ital. cen & Epit. Camer. *Labrum Veneris* alterum. In Hiſtor. german. *wilde farten diſſel*, *Dipſacus ſylu.* & ita etiam vocatur Dodon. latin. in ſol. pagina 723. Matth. *Marthiolum* quali ex hbris ſcriberet non viſatur. ſo *Dipſaco*, non oſtendit qua in re diſſertat ſylu, à ſatium: in hiſt. etiam Germ. tranſpoſita figura.

Fuchs. Hiſt. *Dipſaci* alterum genus ſpontè proueniens *Dipſacus purpureus*, floribus purpureis, Gall. *Chardon à foulon rouge*, in cauitate echini in quibũdam vermiculi reperi. Icon. p. 128. *Dipſacus purpureus*. Braun *farrendisfel*.

H. Lugd. p. 1448. & Ponz in Baldo *Dipſacus ſylu.* maior Fuchſii. *Carduus fullonum* Brunſelf. *Carduus fullonis erraticus*, Trag. *Labrum ſylu. Veneris*. Caſt. *Labrum Veneris* Corn. r. Dioſc. Lob. Icon. *Labrum Veneris* ſtoliculis purpureis Cæſ. *Dipſacus* Brunſ. Lacur. Lonie. Tab. *Dipſacus ſylu.* Dod. gall. & ſol. Cord. in hiſt. Gefner. hort. Thal. & Turn. *Molybdæa* Plin. *Dioſc. Chamæpion* in Plin. C. Bauh. apud Matth. *Dipſacus* 2. ſiue ſylu. flore purpureo.

Dipſaci ſylueſtris ſiue *Labri Veneris* nomina & autores qui de eo ſcripſere ſub precedenti *Dipſaco* ſunt annotata. Multis in locis prouenit ſpontè etiam in Horto E. C. Item quæitur Betoncourt: *Geneuz*, quæitur ad montem *ſaluez* & alibi. *Baſileæ* reperi cum ſuo flore purpureo menſe Octobris apud ſtuumum *Biſſe* in vrbe. Lugduni abundat. Inter *Horſbourg* & *Colmarium* copioſè prouenit. *Dipſacus ſylu.* ad *ſiſas* ſerè prouenire, & in aquoſis, ſcribit

Turnerus.

DIPSA-

DIPSACVS SYLVESTRIS FOLIO
laciniato.

Descriptio



Procera plāta est, duorum, triūve cubitorum, & interdū altior, radice crassā, simplici, albā: caule recto aduersis ramis brachiato, striato, aculeis horrido: folia valde ampla, longa, lataque, spinis duntaxat secundum costam & auerso folio, armata, non bullata, profundē lacinia, in labri formam coeū-

tia: atque hoc quidem genus laciniatum, flores habet albicantes, & vulgaris inftar quadripartitos, ex aculeorum carina, quibus echinus oblongus horret, mitioribus tamen & longioribus spinis quā in Dipsaco satiuo, nec vt in illo aduncis, semen oblongum striatum.

Dips. 2. Tabern. Icon. & Hist. Dipsacus secundus.

Tabern. Icon. & Hist. Dipsacus secundus. Dipsacus folio diffus. et filuestris copiosē provenit inter Horburgum & Colmariam, ibi collegi semen quod satum in Horto Ill. E. C. provenit, primo anno caulem non protulit, florebat lunio. Hunc Dipsacum obseruavi etiam inter Roufch & Colmariam.

Vires & V. quā folio-um virent.

Vires ex Veterib. antē sunt traditæ, nunc quid Neotorici sentiant, adscribendum. Aqua ē foliis Dipsaci destillata colluta viceribus & putredini oris opitulatur, inquit Tragus: folia capiti imposita phrenesin sedare tradunt: aqua quæ in foliorum concavo reperitur, caliginosis & rubentibus oculis prodest: eadem maculas faciei, maxime eas quæ oculis subsunt emendat & exterrit colutur: mulierculæ formæ studiosæ vsum huius optime tenent. Hodie verò, auctore Dodonæo, exigui est vsum in medicina Dipsacus, capita ad interpolandum laneos pannos vsurpantur. Dipsacus in Italia vulgaris est planta, auctore Matth. iis præcipue locis vbi lanificia exercentur: Si quidem echinato eius capitulo mangones tandem adhuc pannum pectunt, expoliunt, detractisque floccis concinnant. Vermiculus in capitulo quem collo adalligatum quartanis febribus remedio esse produnt, piscatoribus hamo affigendus maxime expetitur. In fluxu mensium nimio exhibet Io. Liebau drachm. Dipsaci satui cum ouo forbili. Quædā alæ facultates à Serapionis interprete & aliis recētorib. illi conceduntur, quæ non sunt genuinæ sed spurix & Polygono adscribendæ. Inneunte hyeme, ait Turnerus, Cardueles consueverunt ad Dipsacum, seminis caussā, cui us appetentissimi sunt, conuolare.

VIRGA PASTORIS VULGARIS.

Descriptio

Tota facie Dipsacum refert, quatuor & quinque cubitos alta, caule digitali, glabro, ostiis, ex quibus duræ mordacissimæ spinulæ oriuntur, secundum longitudinem striato, concavo, & in

Tom. II.



ram spectat & per nervos dispositis armata: ac capitula Dipsaco multum cedunt, Scabiosæ capitulis paria, flisculis albis, quadripartitis, labello paullo reliquis lacinis productiore, apicibus parum cineraceis, partim atropurpureis, confectim stipata: quos intercedunt nigricantes pilosæ & mollicellæ spinæ, secus quā in Dipsaco, longiores item, & in mucronē magis directæ. Montepeli cū degustare sapor mihi Ptaraginis videbatur cum quadam saligne, licet non esset apud mare.

Est hæc Trago Cardui fullonis tertium genus, quod ad Atractydis aliquod genus referri posse putat. Virga pastoris Matth. Lobel. in Ad. O. p. 437. Ic. Plāt. Tom. 2. p. 15. & Camerario, cui & Dipsacus. Dipsacus tertius Dod. gall. & Lat. in fol. cui & Galetrayō Plinii. Dipsaci species minor, Gesn. hort. Dipsa. minor siue Virga pastoris Thalic. Dipsacus filum minor C. B. u. apud Matth. & H. Lugd. cui & Plūbago Plinii quorundam.

Card. fol. iou. 3. Trago

Dips. minor.

Prope Arbouans provenit copiosē. Genevæ etiam obseruavi, & Basileæ interportam Stein & Eschen extra urbem mense Octobri. in vis ad vineas & prata, ac etiam ad fluvium Birie intra urbem, mense Augusto florentem. Genevæ mense Nouembri. Montepeli in prato vicino urbi florebat mense Aprilis & Maio.

locus & tempus.

CARDVVS ACANTHVS SIVE
Branchia vesina.

Acanthi folia humifusa, pedalia, profundē lacinia, mollia, intenso virore splendent, pilosa: inter hæc surgit caulis duū triūve pedum, rectus, quā medio ad summū usque fastigiū, thyrsum gerit florū candorū, quorū forma pictum imitata, oblonga, foliis coe. centur virentibus,

Descriptio

K 2

1/15.8
C.

Acantha
EUXIS.

Branca Ver-
fina Ital.
c'è alia à
Germ
Acanth. &
Branca Ver-
fina endon
c'è
Mac h. re-
gul. i. n. n.

Math. 7a
qu. 1. 100

Topiaria

*Melam-
phyllon.*

Marmor
ris.

Carol. Stephan. in pradio rustico; Acanthæ si-
ue Acanthos, siue Acanthi, inter herbas emol-
lientes meminit his verbis. Acantham, quæ in a-
petariis non venit, vulgus Brancam Vrsinam ap-
pellat, nisi mauis dicere, Brancam hircinam. Folia
enim habet cornibus hircorum similia. Cæterum
emollientiæ alui facultatem retinet, vnde à Vir-
gilio mollis Acanthus dicitur:

Et à medicis inter quatuor remolitiua, quæ appellantur, annumerat, quibus videntur in decoctione clysterum. Plinius lib. 22. cap. 22. Acanthus, inquit, est topiaria & vrbana herba, elato longèque folio crepidines marginum affurgentium,que puluinorum toros veliens. Duobus eius genera facit, aculeatum & crispum. Porò Acanthi folio Veteres ob pulchritudinem & figuræ elegantiam epistylia communicabant, & vestibus pretiosis figuram Acanthi foliorum circumtexebant. Vnde Virg.

Carol. Ste
phanus no
is.

Мамолар
депранига

Nomi
linguaru

Locus
Tempus

Acanthæ Dioscoridis radices ambustis & la. Vires
xatis commodant in cataplasmate impostæ. Potæ
egdem urinam ducunt, & aluum sistunt. Tabidis
item, ruptisque ac conuulsis prosunt. Eadem
ferè

ferè Plinius. Radices vřis luxatęque mirè prolunt. Item ruptis, conuulřis & pęthysin metuentibus incoctę cibo, maximè pitřana. Podagus quoque illinuntur tritę & calefactę calidis. Acanthus authore Galeno, vřm habet moderatè disutiendi. Radix autem sęcat & leniter sęcat, & tenuium partium est. Videtur Galenus, aut eius Amanuenses, quas facultates Dioscorides Acanthio attribuit Acantho assignasse. Interpres debuisse vertere apud Diosc. non luxationes sed torsiones aut ligamentorum tractiones. Acanthi satui folia, vt perhibet Dodonęus, temperie in calidi & frigidi medio quasi consistunt, nonnihil humida, emollientem ac leniter digerentem facultatem, veluti Maluę, obtinent. Enematis idcirco non minùs quàm Maluę vřliter incoquantur. Prořunt autem tabidis sanguinem spuentibus, rum ex alto delapsis, ab ictu, aut conatu aliquo supra vires lęřis, non mirùs quàm Symphiti maioris radices, quas substantia, lento succo, & qualitate proximè referunt.

CARDVVS ACANTHVS SIVE BRANCA

Vřina spinosa.



Acanthus sylvestris Scolymo similis aculeatus Dioscoridis, an Chamæleonta Möspeliensiu? an num potius hæc noua aculeata Branca Vřina, siue Acanthus aculeatus Lobeli? Brancę huius Vřine siue Acanthi varietatis, in agro Bononiensi Lombardię aded flores & folia similia sunt huic Acantho spinoso [fortè legendum, similia sunt Acantho satiuo] vt nobis

perfluat fuerit Dioscoridis esse Acanthum sylvestrem quem Dioscorides assimilauit Scolymo silv. & satiuo Acantho breuiorem & aculeatum dixit.

Quod genus Acanthi Plinius aculeatum & crispum ac breuius dixit, velut præcedenti capite monuimus, hoc esse videtur, teste Cornario, quod Dioscorides silvestrem Acantham appellauit, & cuius radicem eadem, quę Acanthum satiuum, posse prodidit.

Lob. icon. Plant. Tom. 2. pag. 2. Chamæleonta Möspeliensium quoad iconem. Huic enim incerta Typographi falsus impositus titulus. Si quidem hanc in Obs. pag. 477. Brancam Vřinam siue Acanthum aculeatum inscripsit. H. Lugd. p. 1445. Branca Vřina aculeata Lobeli. C. Baub. apud Matth. Secundus Acanthus silv. spinosus.

Anguill. epist. 8. pag. 147. Acanthus silv. Herbariis Bononiensibus Branca ostina s. luatica. Cam. apud Matthioli. Acanthi species spinosa spontanea circa Italiam Bononię, quę non malè Tom. III.

conuenit cum Acantho silv. quę etiam, quibusdam locis maritimis reperitur.

Vidimus Basileę in horto Dj. Dis. Lubi Locus & Zuingeri cui creuerat ex femine in sil. ex Crea. Tempus. vnde etiam nos accepimus è Cydonia à D. H. norio Bello Medico, ferendum in horto Ill. C. V. Virtemb. Montbelg.

CARDVVS BENEDICTVS.

C A P. XIV.



Succosa gra- Descriptio
Sili radice nititur: folia laciniata Sonchi aut Dentis leonis diuisurā spinulis pungentibus armata, colore quē in Borraginis foliis est cernere, hirsuta, vřis digitalis, multis alis concavis, lupinus partim, partim erectus, subpurpureus, fl. vřis, villosus, flores parui, lutei, spinis rubentibus ramosis, quas

multa lanugo intercedit, obuallati: quibus subsunt squammata conformia capitula inter folia circumcirca ambientia posita: semen in iis conuenitur oblongum, sublateum, floccis appendum: insigni amare tota planta est prædita.

Hunc circa Carduum magni Medici graniter lapsi sunt. Quorum quidam hanc herbam esse alteram Cnici silvestris speciem: quidam voluerunt eum per Atractylidem alteram hirsutiorē significari: quidam Acanthum satiuum esse statuerunt: alii verò Acanthum: nonnulli Scolymum fecerunt: quidam etiam Crassulam mediam: Senetionem & Chamæleonem, teste Dorsthenio, crediderunt, à quibus herbis singulis multis partibus discrepat.

Cnici silvestris alteram speciem esse Carduum benedictum, non sine graui lapsu crediderunt Ruell. Matth. Aduers. Lobeli. & Apollo.

Credidit namque Ruellius lib. 3. cap. 96. Atractylidem alteram hirsutiorē, seu alteram Cnici silvestris speciem [ambas namque has lib. 3. cap. 155. inter se confundit, eademque indicat] eam esse stirpem quę Carduus benedictus, vel sanctus appellatur. Eamque opinionem haudquam improbandam censet Matthiolum quandoquidem Carduus benedictus vocatus solo procumbit densa foliorum comā; & quodammodo humiculis cernitur, quin etiam fructum gignit amarum, barbæque modo hirsutum: & caules profert Sonchi modo rubentes. Quem Benedictum, seu sanctitatum Carduum plebeius consensus nuncupauit, alteram Cnici speciem esse iam diu doctis, & mihi (ait Lob. in Aduers.) persuasum est. Apollo rad. n. in Elect. Hamech. Lobeli & Matth. & Ruell. subscribit his verbis. Spinam albam quidam faciunt Carduum bene-

Aequiuoca

Cnicus silv.
Atractylis
Acanthus
satiuus
Acanthum
Scolymus.
Crassula
media. Senetio.

Chamæleo.

Carduus
sanctus

HISTORIÆ PLANTARVM

dictum id est, secundam Cnici siluestris speciem.

Atractylis hirsutior
Dod. gall.
et lat.

Atractylis & Cnicus silu. 2. Theophrasti, secundum Anguillare opinionem, nihil aliud est, quam Carduus sanctus. Hic à Dodon. gall. inscribitur cacthis hirsutior, Atractylidisque species fit Pharij & Theophr. isti. Latinus etiam, quæ de Atractylide Theophr. tradidit, Carduo benedicto adesse credit. Gesn. hort. Atractylidem hirsutiorum Fuchlij, Cnicum, & Atractylidem siluestrem cum quibuldam vocat, ac de genere Cnici agrestis cum Fracastorio lib. de cont. 3. cap. 3. esse scribit. Idem fecit & Fuchs. Hist. cap. 42. vbi Atractylidem hirsutiorum, inscribit, ac gall. *frassan saunage bonssu* vocat.

Acantha
Lonic.

Lonic. in Diosc. lib. 3. cap. 17. Acantham appellat, & Acanthum, Acanthepopiam, id est, Acanthum topiariam, cuiusque meminisse scribit Theophrastum Idyll. 1. & Galenum.

Acanth Germanica
Trag.
Herpicantha
Trag. notatur.

Licet autem illi Carduum benedictum Atractylidis speciem hirsutiam esse statuat Ruellium secuti, attamen Tragus lib. 2. cap. 114. Acanthum germanicam appellare maluit. Acanthum autem Germanicam, Acanthum sativam à Dioscoride Herpicantham vocatam esse sibi persuadet. Ego nojim Carduum benedictum vocare Dioscoridis Herpicantham, siquidem nomen illud melius conuenit Blanca vitiæ, quæ repit & serpit, quam Carduo benedicto annuæ plantæ, quæ non, repit.

Acanthium

Chamaeleo.

Carduncellus
italor.

Acanthium non videtur
Agricola.

Cnicus agrestis
An. gneraci.

Nomina
linguarum

Tragum sequitur Harchius in Enchir. med. duos faciens Acanthos satiuos, quod non placet. Carduus, inquit, Benedictus, Carduncellus quibuldam, sunt qui mollem seu Germanicum Acanthum, siue satiuum quem Diosc. Herpicantham & Melampphyllon nominare videtur, esse existiment. Acanthus German. quem nonnulli Cardum benedictum esse volunt. Carduum benedictum Acanthium facere sequentes authores, patefaciunt eorum dicta. Atractylis (inquit Fernel. meth. lib. 5. cap. 21.) hirsutior quibuldam, aliis Acanthium, Carduus benedictus. Lonic. lib. 5. cap. 25. Carduus benedictus, Acanthium. Multi se torquent, ait Ryff. lib. 1. cap. 12. in refor. n. pharm. germanica, vt Cardui benedicti nomen inueniant apud veteres Græcos & Latinos, si non sit Acanthium aut genus Chamæleontis, relinquam cum consueto nomine. Acanthium, inquit Cord. in Diosc. lib. 3. c. 18. est sine dubio Carduus benedictus, quem Pharmacopolæ Itali Carduncellum vocat. Idem lib. 4. cap. 190. ait. Alterum silu. Cnicum siue Cnecum siue Cnecum Theophr. lib. 6. cap. 4. Diosc. & alij Græci Acanthij nomine indicant.

An verò sit Carduus benedictus, Acanthium dubitat Io. Agricola, vt & Cronenburgus, dicens de comp. med. lib. 3. de oleo Hyperici. Carduum benedictum Syluius maluit Acanthium aut Chamæleontis speciem existimare, cuius iudicium hic probare nequeo, cum Græcorum pariter ac Latinorum repugnet.

Andernaco. Cnicus agrestis. Lob. Obs. p. 484. Icon. Plant. Tom. 2. p. 13. Tabern. Icon. & Histor. Camer. hort. Brunfels. Lacunæ, Dod. Lat. in fol. Cast. Lugdunensi, Theod. Dorst. & C. Bauh. apud Matth. Carduus benedictus. Cæsalp. Carduus sanctus.

Carduus benedictus dicitur Germ. Geseignes ter distel / Bornsturz Apoll nari (qui vires hoc nomine adler bit.) Klein freuz wartz Dorst. & Cardobenedict, quarum postrema vox etiam

Belgis innotuit: Gall. *Chard n benisist ou benis*: Ital. *Cardo benedetto*, *Cardo sancto*, siue herba rura: Hisp. *Cardo sancto*. Boh. *Card benedyt*: Hung. *Papa siu*, id est, Herba Papæ: in Lemno *carderacantha* dictione corrupta, teste Bellonio, id est, Spina alba.

Carduus benedictus prouenit passim in hortis transili. e. in Hortu E. C. nec vquam repenit sp. è proueniente, licet in variis regionibus hortis obseruauerim vt Basileæ, Montpelij Lugduni, Patavij, Bononiæ & Genevæ, florentem adhuc & pulchre ac copiose virentem mense Decembri ex semine deciduo. In Lemno Mediterranei maris insula locis campestribus nullâ adhibita culturâ frequens occurrit Petro Bellonio teste; apud Germanos & Belgas, tum & Italos ac Gallos studiosè in hortis colitur. Iulio ac Augusto floret, quo tempore ad medicinæ usum maximè colligendus ac reponendus est.

Tradunt, vt testis est Tragus, Carduum benedictum primum omnium ex India ad inuicissimum Imperatorum Fridericum ante annos aliquot honoris gratiâ missum, missique laudibus celebratum, vt qui in cibo & potu vsurpatus ab immenso illo præteruet capitis dolore, quem Græci *hikanastu*, Germ. *den Nagel*, hoc est, Clauus, quod in eiusmodi morbo tantus caput tenet dolor, vt clauus inter oculos (nam supra illos maxime grassatur) impactus videatur. Eadem planta in cibo & potu vsurpata, contra vertiginem valere, memoriam bonam facere, & amissum auditum restaurare, fertur. Folia Cardui benedicti in puluerem redacta, ac ex vino pota, pituitam malicæ humores absumunt, maxime si ex illis pilule, vt vocant, conficiantur. Eadem vsurpata vitia pectoris & sanguinem purgant, phthisicos proliant. Folia vino decocta & calida pota, tormina sedant, sudorèque eliciunt, calculos comminuunt, menses promouent. Foliolorum pulvis mensura Nucis juglandis corticis cum vino potus, aduersus pestem ne noceat præsentissimum est remedium, si intra spatium 24. horarum quem corripuisse eundem præstant folia in vino decocta & pota. Pulvis prædictus & decoctum his exhiberi debent qui putridis febribus ventriculi & quartanâ laborant. Sunt qui puluerem foliorum aut decoctum succumve omni veneno hausto aduersari testentur, asserentes puellam quandam Pauiz, cum venenum in scia in pomo quodam sumpisset, ad eò intumuisse, vt nec theriaca, nec alio quouis antidoto curari potuerit, tandem verò aqua Cardui benedicti destillatâ sumptâ periculo omni & veneno liberatam: nonnulli etiam referunt serpentem, cum puero cuidam in agro dormienti per os irrepsisset; aqua Cardui benedicti destillata per inferiora quamprimum secessisse, puerumque incolumem omnique periculo liberum superuixisse. Cardui benedicti aqua destillata, oculis indita, rubedinem & pruritum illorum iuuat: idem de succo intelligas velim. Folia tusa & imposta ambustis igni, acanthraci proliant: eadem & aqua stillatitia potest. Folia adhuc tusa & imposta Scorpionum & Serpentum iudibus medentur. Aduersus cancerum aliaque maligna & putrida vlcera vix aliud Cardui benedicti folijs, succo, decocto, aut aqua destillata est præstantius remedium: ac tradunt nonnulli maxima mala vitiaque hoc pacto sanata fuisse, imprimis verò referuntur iis mulierem quandam, cuius mammae

Locus & tempus.

Dolor capitis, si emicrania.

Vertigo.

Pituitam duct.

Pectoris vitia
Sudorem mouet.
Pestis.

Febres putrida


Venenum

Oculi.

Vlcera putrida

cancer

canthro ad costas usque absumpta fuerant, aqua destillata & puluere foliorum in ipso mundata & sanata fuisse, Vaporaciones, fomenta, defensiones, & balnea sudatoria, calculis & menibus eliciendis, ex Carduo benedicto parari ac confici recte possunt. Matthiolus comitialibus infantibus exhibet eius decoctum, aut instillatam aquam, aut pulueris drachmam. Herba tam recens quam sicca, & pota & adnota exterius, contumacia vlcera, & quae cacothae vocantur, sanat, cutemque obducit: quamobrem decoctis miscetur quae ligno Guaiaco ex vino, & aqua iis parantur, quos lues Gallica corripuit: Florum autem pappi vulneribus impositi, ea sine dolore sanant: ex foliis cum multo cataplasma tumores mox discutit pudendorum: Testatur Arnolus de Villa noua cap. 44. Practica, vid. se se quendam, cui ex putridis & canis vlcibus erosa fuerat ad ossa usque caro omnis tibiurum; qui quae bona omnia in curationem frustra expenderit, hac tandem ratione sanatum: recentia Cardui benedicti folia contusa cum vino generoso discoquebat, additaque postea liquefacta porci axungia, ebullite sinebat, tandem iniecta fatina triticea, continuò spathula agitabat quoad omnia in emplastri consistentiam coalescerent, quod calidum bis quotidie vlcibus imponebat. Auctor est Camerarius aquam Cardui benedicti vitreis organis, iterata destillatione, eximium esse furdastri remedium, si calida auri instillator. Plurimum verò tribuit si in remedia contra luen venerea n addatur, sic vt extractum eius non parum in eum vsum sit efficax: ex succo syrupus, non tantum in peste, verum etiam in aliis ventriculi & iecnoris imbecillitatibus apprimè vtilis est, nec non in colicis cruciatibus. Sacci ex tota planta expressi inspissati quae praecipua laus ad menses ciendos. Cardui benedicti planta magni vbique vsus contra putridos & malignos morbos. Extractum vtile in morbo Gallico, palpitacione cordis & in quartana. Aqua eius cum aqua Cuscutae & Ligustici in faciei rubedine vtilis est. Per se etiam, vt placet Io. Matthæo, multum confert, quando singulis diebus tres, vel quatuor vnciae cum sex vel septem guttulis spiritus vitrioli vacuo ventriculo agris peste correptis exhibentur. Accipit D. Deckler in Leipzig ad febres folia tenella è medio Cardui benedicti exsiccata, in puluerem redigit, de eo ter vespere sumendum cum vino calido propinat. Et hoc tanquam secretum iactat Io. de Monte de Experimentiis. Ex siccis foliis, cum paucis Cinnamomo, Feniculo & Saccharo puluerem parat seu tragacem Gesnerus, qua vitur cum paucis pane tosto madente vino, manè vel à cena. Hanc & lumbricos pellere, & valetudini in vniuersum, vt sperat, conferre testatur. In liquore stillatio ad arthritidem vitur cineribus Cardui benedicti Francisc. Indix de Gutta. Cardui benedicti effectum mirabilem cum Centauro in expellendis ranis vide cap. de Centaur. ex Schenckij obseruatione. Veluti autem amara vehementer Cardui hulus herba est, ita quoque exsiccans ac resiccans ordine secundo, & simul expurgans, apertens, abstergens & digerens.



rubore tincti: semen pappo adhæret oblongum, album, medulla dulci albâ.

Crico Diolcor. folia attribuit oblonga, per ambitum diuisa, aspera [speciem, munda Math. crassa, & rectè: nulla enim in totis asperitas] aculeata: caules cubitales, in quibus caput ad magnitudinem summorum Oleæ germinum: florem Croco similem: semen album aut fuluum, oblongum, angulosum. Non laborauit hoc in loco Dioscor. Cnici differentias annotare, siquidem vnam tantum speciem describit, & tamen inquit constare semine candido, interdum ruffo. Non distinguit, inquam, satium à siluestri, sed simpliciter Cnicum vocat: videtur autem Dioscorides Cnicum ruffum vocare genus syluestre, quod & ex descriptione foliorum significatur: nam folia oblonga, incisa, aspera, & spinosa nequaquam conueniunt domestico.

Fructum inquit Theophrastus aculeatum; ac veluti retortidum fert: florem vñ cum seminibus ipsis edit: folia illi sunt aculeata: multis caulibus constat, & ramos fundit: siluestri, urbanaeque describitur.

Plinius celebrari apud Aegyptios scribit Cnicon, Italia ignotam, ipsis autem oleo non cibo gratam: hoc faciunt ex semine eius, differentia prima siluestris & satia: syluestrium [vt Theophrasto] duæ species: vna mitior est, simili caule, tamen rigido [quam ille urbanae admodum similem dicit] itaque & colu antiquæ mulieres utebantur, exilis, quam quidam Atractylida vocant: semen eius candidum, & grande, amarum: Sed Plinius iis verbis potius domesticum demonstrat quam syluestre, & quia minor, & quia semen candidum.

Melues Carthamum vocat inter purgantia, quo nomine hodie videtur trades esse domesticum syluestrem: assumi ad purgationes domesticum, eligi semen album, leue, crassum & planum cuius medulla vntuosa, pinguis, & cortex tenuis: & melior flos est, qui est sicut pili Croci.

Theophrasto & Plinio, inquit Dodonæus, est urbana & satia, ad differentiam Atractylidis, quam siluestrem Crocum faciunt.

De Cartamo quod alicubi Tragus, Serapio duo scripsit capita nimirum centesimum vigesimum sextum de Churtal, & ducentodimum secundum de Cartam. Sed fallitur Tragus, Caput enim Serapionis 126. est de Avena scriptum, cuius titulum

caulem ramofque indigesta, nervosa, glabra, breuibus spinulis, per ambitum donata, fescenciâ aut vncias duas longa, vnciam ferè lata, in acumen desinentia, angustâ ceruicè ramis adhæret. ramulorū extremitas infidèr capitis inter folia, squamata, è quibus flores explicantur stamineo, saturo crocei

Cnicus
Diosc.

Diosc. notat
rur.

Cnicus
Theoph.

CARTAMVS SIVE CNICVS.

CAP. XV.

Tereti surgit caule singularique Carthamus, qui superius in ramos diuiditur: folia per

Synon. Churtal malè interpres Cartamum reddunt.
Dicitur *Cnicus* Matthiolo. Dodon. gall. & fol.
Cordo in Dioscor. Lacun. Castor. & Lonicero.
Cnicus, Turn. Gesn. hort. *Cnicus sativus*, Cordo
in h. flor. Celsalp. *cnicus sativus* Theophrasti, Lob.
Obl. p. 483. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 19. *Cartamus*,
Bruffelf. Fuchl. Lob. Aduerf. *Cartamus* Ca-
merario. *Cnicus vulgaris* Clusio. *Cnicus flore luteo*
C. Bauh. apud Math.

Nomina
linguarum *Krixov* & *kykxov* Græci: Latini similiter *Cnicum* &
Cnecum vocant, Officinæ Mauritinos secutæ
Cartamum & *Cartamum* absque aspiratione,
nonnulli *Crocum* seu *Cnicum hortense*, *Cro-*
cum *compitrem*, & *Crocū Stracenicum*: Germ.
wild Saffran: & cum Belg. *wilden garden Saff-*
fran, *disicel Saffran*, *feld Saffran*: Galli *Saffran*
bastard ou *saunage* & *grain de perroquet*, quodd eius
semine *Plittacos* alere soleant. Ital. *Zaffarano Sa-*
racinesco & *Hisp. Al. f. r. Alafan saluase* & semine
de *Papagaios*, quasi *Plittaci* semen, quod sc. audis-
simè hoc veloci soleant. Angli *Bastard* *Carton*
vocat. *Cartamom* Hungari appellant, *Tot sal-*
stany, h. e. *Saluonicum Crocum*.

Græcu. *Crocum* quidem hæ Nationes, ut puto, appel-
lant, quodd eius flore plerumque *Crocū* loco
rura vtantur. *Cartamum* autem vocant Officinæ,
à voce Mauritanica, quæ est *kartam*, vel ut vult
C. Bauh. *art* & *art* à *purgando*. *Cartamum*
tamen propriè semen vocari, *Cnicum* verò plan-
tam placet Fallopio. Sed & eodem autore se-
men, semen *Crocū hortensium*, & *Venetis* semen
Papagalli vocatur, ob rationem dictam. Mo-
nendus autem est lector meminere aliud esse
cardamum per d scriptum, & *Nasturtium* signi-
ficare.

Locus & Tempus. *Cartamum* sine *Cnicum* vidi Lugduni in hor-
tis & *Genevæ* ut in orto *Moleti Pharmacopœi*,
Basileæ, *Montbelgardi* satius in orto *E. C.* facile
provenit, verum semen non ita plenum medulla,
Scritur nonnullis Italæ, *Hispaniæ*, & *Galliæ* in
hortis & agris. *Plinius* lib. 25. cap. 15. *Italiam*
Vespassiani principatu hanc ignorasse ait, & in sola
Ægypto celebrem, ipsi autem oleo non cibo
gratam: Floret *Julio & Augusto*, semen interea
perficitur, & eodem quo sentur anno, exinde in-
arescit. Quicquid porrò de exterarum regionū
fertilitate prædicetur, certè & *Germania* suas
opes quas solum nostrum fundit, ostentare po-
test, & non minus quam aliarum rationes de variis
Dei donis gloriari. Habemus autem inter cætera
& *Cartamum* qui tanta copia apud nos prove-
nit, ut mercaturæ admodum celebri & magna
hinc inde distrahatur. Quo fit ut cum quæstiosa
sit planta, ab hortulanis *Argentinenfibus* & *Spi-*
renfibus quotannis inter æstivas fruges seratur.
Stationis verò hic apud illos observatur ritus. *Ap-*
prili mense semina *Cartami* ex ordine pangun-
tur, quæ inter paucos dies à satu erumpere so-
lent, licet dulcia illa semina testaceo quasi cor-
tice operta sint: postquam de terra erupere, bre-
ui deinceps tempore in altum tendunt, caules-
que emittunt: quæ capitula ferunt quæ *Julio* me-
se in florem sese explicant, quem è capitulis ac-
uleatis hortulani evellunt ac postea vendunt. *Aug-*
usto mense semen lapidosum inter candidam
lanuginem positum maturatur, ex quo *Cartamus*
quotannis reuiuiscit.

Flore, authore *Dioscoride*, in obsoniis vtun-
tur. Seminis tasi & expressi succus, cum aqua
mulla, vel iure gallinæ alium purgat, sed sto-
macho aduersatur: ex eo autem sunt osulæ, quas

placentolas vocant, adiectis succo *Amygdali-*
lis, *Nitro*, *Aniso*, & melle decocto, quæ alium
emollunt: hæ in partes quatuor finduntur, quæ
Nucis iuglandis in g. studinem implant: è quibus
ante cœnam duas vel tres fuisse suffatus est:
ratio temperandi hæc est: *Cnici* candidi *texta-*
rius, *Amygdalorum tostorum* & *delibratoirum*
Cyathi tres, *Anisi sextarius vnus*, *aphronitri dra-*
chma vna, cum carnibus triginta *carycarum*.
Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resolu-
endæ alui facultate donat. *Galenus* ad purga-
tiones *Cnici* semine duntaxat vtitur, & ad ter-
tium vsque ordinem excalcificationum esse scribit,
si quis foris eo uti velit. A quo dissentit *Mel-*
ueus, cui si credimus, calcificat ordine primo, sic-
cat secundo, agrestis tamen calidior & stic-
cior: minus flos putuitam & aquæ vomitu & de-
lectione vacuat sumptus, & clystere iniectus: ob
id morbis inde natis, ut colico affectu: & simili-
bus confert: thoracem quoque & pulmonem ex-
purgat, præteritum eclegmate sequente & oleo
suo: unde & vocem clamare reddit: *Iperma* quo-
que vsu auget, sed alimentum est prauum. Sto-
macho valde noxiu, in eoque & mammis lac
dicitur cogere, falsiudendum ac nauseabundum
est, & obstruens, facultate est *Lactariarum* plan-
tarum, sed remissa: terget, aperit, etiam flore cum
mulla sterum sanante. Ne ventriculum læsat, *Isternus*
ei misce stomachica *Anisum*, *Galangam*, *Masti-*
chen, acia vero, ut *Cardamomum* *Zinziber*, *Sal-*
panis, *Sal gemmæ*, addita, astior em ipsius cèle-
rant & intestinorum noxam prohibent. Sic me-
dullæ eius drachmæ decem cum *Cardamomi* au-
reo vno in catapotia *Cicerum* magnitudine, re-
diguntur, quæ sufficienter purgant, *Paulo* at flo-
re: eadem medulla panno ligata, *Oxymeliti* præ-
cipuè *Scillitico* dum coquitur mersa, purgato-
riū id facit. 3. Medullæ eiusdè aureos duodecim,
Penidiarum aureos quatuor, *Cardamomi*, *Zingi-*
beris ana aureum vnum, cum melle formā bolos
Nucis magnitudine, da vnum vel duos. Medulla
eadem ex iure galli vel gallinæ cum speciebus præ-
dictis cocta idem præstat *Galenus*. Oleum ex eo
semine, ut *Amygdalis* & *halano myrepfica*, ex-
trahitur: datur à *zuij* ad aureos quinquæ. Flos à
3j. ad aureos duos. Semen tamen, ut ait *Mat-*
thioli, quod gratissimum est *Plittacis* alimen-
tum, nihil penitus eos purgat. Non desunt qui
huius floribus *Crocum* adulterent. Prudenter
monet *Camerarius*, nostratis *Cnici* semen non
tam efficaciter purgare atque *Alexandrinum*, eâ-
que propter maiorem eius dosin parum sape ef-
ficere. Ex semine facta compositio *Diacarthami*
insigniter confert *hydropicis*, si restè paretur: *Diacarthami*
cuius cū descriptiones extant plures, eam præ-
fert *Dodonæus*, seu genuinam, quæ apud *Guido-*
nem Chirurgum legitur *Doctr.* Tract. 6. *Paupe-*
res, id attestante *Trago*, *flosculi Cartami* tuis,
condimenti vice vtantur, nec malè, cibos nam-
que croceo colore commendat & alium emol-
liunt: semen tustum ac in iure carniū aut *Cice-*
ris arietini bulliū ac potum, phlegma, lentos-
que ac viscosos humores trahit, non aliter atque
Epithimum melancholicos. His floribus panni
inficiuntur, & mulierculæ quoque in liniendis
suis lectis ijs vtuntur.

CARTHAMVS SIVE CNICVS

flore caruleo.

Clusus hunc sic describit. Vnicus plerum-
que Alteri *Cnico* est *caulis*: interdum statim
à radice

Purgat.
Officula.

Disti

Correptio.

Succum lac
cogit.Tempera-
mentum
Gal. &
MesuesCalica
Pellus.

Noxæ

Isternus
CorrigimusOleū ex
melle
DistiDiacarthami
m. iure.



bus flos colore diuersus: nam luteus non est, sed ex multis staminibus cærulei coloris constat: *semen* Cnici semine minus & subrotundum: *Radix* pollicaris crassitudinis est, carnosâ, succulenta, foris fusca, non annua, vt vulgaris radix, sed aliquot annis interdum permanens.

Camer. hort. dicitur Carthamus siue Cnicus flore albo & cæruleo, perennis, sed à gelu acriore muniendus. Clus. Hisp. & Hist. post. l. 5. pag. 152. Cnicus alter flore cæruleo. Tabern. Icon. & Hist. Cnicus cæruleus blauer wilder Saffran. Lob. Obs. p. 488. Icon. Plant. Tom. 2. p. 10. Cnicus flore cæruleo, Cnicus alter Clusii.

Circa Cordubam in segetibus inuentus à Clusio & agro Hispalensi, florens Maio & Iunio. In Belgio verò Iulio & Augusto. Habemus & Mœbelgardi in horto Ill. C. VV.

CARLINA SYLVESTRIS QVIBVSDAM, aliis Attractylis.



Caule surgit celerumque singulari, albidâ lanugine obfuso, cistâstigi in rectos aliquot ramos a-beunte, foliis semipalmatis & palmatis, ac etiam maioribus duplâ, aculeatis, laciniosis, crispis, infâ villosis, albidis, suprâ virdantibus, nitidis, ab imo ad summû densè stipato: echini laxa foliolorum spinosorum compage horrent, luglandis ferè magnitudine, è quibus nitor ille radiatorum florum aureo colore fulgentium, dilutior, stramineisve atenus, emicat, exterius ad basin sanguine cruentatus: flamina verò media confertiora & mollicella maturæ messis aristis comparia: *radix* labeft lignosa Petroelinî radici equalis, fibris raris doæata. Do-

Tom. III.

don. acie est *semên*: H. Lugd. verò Cnici, stigmatum & tenue scribit.

Spinofam hanc herbam suspicantur quidâ esse Acatnam Theophrasti, vt H. Lugd. Cæsalp. Lob. Clus. & Dodonæus.

Cæsalp. Acorna dicitur. Lobel. in Adu. Sequenorum Cirsium luteum vocat, ac an sit Acorna & Erythral Theophr. in titulo dubitat, ac rursus in contextu affirmat, sibi inconstans. Figura etiam apud eum transposita est: est enim in Obs. p. 489. sic & in Icon. Plant. p. 20. nomine Cardui vulgarissimi viarum, Onopyxos Guilandini.

Dod. gall. Carlina siluestris, *Carlina sauvage*, Germ. drey distel, *frayendistel*, & *Sewdistel* Belg. drey distel. Item Lat. in fol. p. 716. non inceptè Carlina siluestris dicitur: nam flore Carlina amulatur, nec foliis valdè dissimilis est. Hanc autem esse *A'noyay* tantò est difficilius affirmare, quò breuior de hac Theophr. est: Ait autem hâc Cneco vrbano similè, colore flauescenstem, succo pinguem. D'fert autè Acorna ab Acarna: Acorna siquidè, vt Helychius ait, *d'acorn* est, siue Lauri seft: Sed *A'noyay d'acorn* d'et q'vot, id est, spinosa stirps.

Tragus Attractylidem seu Cartamum siluestrè nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Maria, hoc genus Cardui teneri magno studio quarunt, suisque sagminibus, plena sunt hodie omnia pro dolor! fœda superstitione iadiungunt, maximè verò eos expetunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt prastantissimos cæteris anteponunt, vnde & nomen Germanicum drey distel / quasi dicas Carduū triū surculorum, derivatum fuit. Vocant verò & *fraywendistel*, quòd vna cum cæteris sagminibus herbis die Mariæ Virgini sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce *Sewdistel*, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit *traxovis d'acorn* Dioscor. l. 3. c. 55 quod Rheilius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sensisse solum, seu colum agrestem, & Cartamum siluestrè appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentib. nominibus posita nō placet, *Wilder feld Saffran*, oder drey distel Attractylis, vel Cnicus siluestris, Fusus agrestis, Colus rustica. Gall. *Saffran sauvage, dentix*.

Mith. in Diosc. in commun. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hîc, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit Camerarii, rhilus pro Scelymo siluestris, & *ôh hârle* / *Martholus Scelymus* egregius commentator in suis con. m. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam antevulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adferunt locum.

Cesl. hort. Attractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Attractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Attractyli vulgari, miniori. Hanc propriè Græci Attractylida, Latini vero Fusum agrestem, aut colum rusticam, quòd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum siluestrè appellat: Germanicè itaque vocetur *Wilder feld Saffran* Gall. *Vne espèce de Chardon ayant la semelle safran*, ou *Saffran bastard*, vt hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

L

Acorna Cæsalp.

Carlina silv. Dod.

Acorna ab siquidè, vt Helychius ait, d'acorn est, siue Lauri seft: Sed A'noyay d'acorn d'et q'vot, id est, spinosa stirps.

Tragus Attractylidem seu Cartamum siluestrè nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Maria, hoc genus Cardui teneri magno studio quarunt, suisque sagminibus, plena sunt hodie omnia pro dolor! fœda superstitione iadiungunt, maximè verò eos expetunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt prastantissimos cæteris anteponunt, vnde & nomen Germanicum drey distel / quasi dicas Carduū triū surculorum, derivatum fuit. Vocant verò & fraywendistel, quòd vna cum cæteris sagminibus herbis die Mariæ Virgini sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce Sewdistel, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit traxovis d'acorn Dioscor. l. 3. c. 55 quod Rheilius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sensisse solum, seu colum agrestem, & Cartamum siluestrè appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentib. nominibus posita nō placet, Wilder feld Saffran, oder drey distel Attractylis, vel Cnicus siluestris, Fusus agrestis, Colus rustica. Gall. Saffran sauvage, dentix.

Mith. in Diosc. in commun. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hîc, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit Camerarii, rhilus pro Scelymo siluestris, & ôh hârle / Martholus Scelymus egregius commentator in suis con. m. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam antevulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adferunt locum.

Cesl. hort. Attractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Attractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Attractyli vulgari, miniori. Hanc propriè Græci Attractylida, Latini vero Fusum agrestem, aut colum rusticam, quòd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum siluestrè appellat: Germanicè itaque vocetur Wilder feld Saffran Gall. Vne espèce de Chardon ayant la semelle safran, ou Saffran bastard, vt hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

L

Acorna ab siquidè, vt Helychius ait, d'acorn est, siue Lauri seft: Sed A'noyay d'acorn d'et q'vot, id est, spinosa stirps.

Tragus Attractylidem seu Cartamum siluestrè nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Maria, hoc genus Cardui teneri magno studio quarunt, suisque sagminibus, plena sunt hodie omnia pro dolor! fœda superstitione iadiungunt, maximè verò eos expetunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt prastantissimos cæteris anteponunt, vnde & nomen Germanicum drey distel / quasi dicas Carduū triū surculorum, derivatum fuit. Vocant verò & fraywendistel, quòd vna cum cæteris sagminibus herbis die Mariæ Virgini sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce Sewdistel, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit traxovis d'acorn Dioscor. l. 3. c. 55 quod Rheilius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sensisse solum, seu colum agrestem, & Cartamum siluestrè appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentib. nominibus posita nō placet, Wilder feld Saffran, oder drey distel Attractylis, vel Cnicus siluestris, Fusus agrestis, Colus rustica. Gall. Saffran sauvage, dentix.

Mith. in Diosc. in commun. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hîc, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit Camerarii, rhilus pro Scelymo siluestris, & ôh hârle / Martholus Scelymus egregius commentator in suis con. m. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam antevulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adferunt locum.

Cesl. hort. Attractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Attractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Attractyli vulgari, miniori. Hanc propriè Græci Attractylida, Latini vero Fusum agrestem, aut colum rusticam, quòd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum siluestrè appellat: Germanicè itaque vocetur Wilder feld Saffran Gall. Vne espèce de Chardon ayant la semelle safran, ou Saffran bastard, vt hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

L

Acorna ab siquidè, vt Helychius ait, d'acorn est, siue Lauri seft: Sed A'noyay d'acorn d'et q'vot, id est, spinosa stirps.

Tragus Attractylidem seu Cartamum siluestrè nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Maria, hoc genus Cardui teneri magno studio quarunt, suisque sagminibus, plena sunt hodie omnia pro dolor! fœda superstitione iadiungunt, maximè verò eos expetunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt prastantissimos cæteris anteponunt, vnde & nomen Germanicum drey distel / quasi dicas Carduū triū surculorum, derivatum fuit. Vocant verò & fraywendistel, quòd vna cum cæteris sagminibus herbis die Mariæ Virgini sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce Sewdistel, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit traxovis d'acorn Dioscor. l. 3. c. 55 quod Rheilius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sensisse solum, seu colum agrestem, & Cartamum siluestrè appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentib. nominibus posita nō placet, Wilder feld Saffran, oder drey distel Attractylis, vel Cnicus siluestris, Fusus agrestis, Colus rustica. Gall. Saffran sauvage, dentix.

Mith. in Diosc. in commun. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hîc, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit Camerarii, rhilus pro Scelymo siluestris, & ôh hârle / Martholus Scelymus egregius commentator in suis con. m. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam antevulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adferunt locum.

Cesl. hort. Attractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Attractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Attractyli vulgari, miniori. Hanc propriè Græci Attractylida, Latini vero Fusum agrestem, aut colum rusticam, quòd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum siluestrè appellat: Germanicè itaque vocetur Wilder feld Saffran Gall. Vne espèce de Chardon ayant la semelle safran, ou Saffran bastard, vt hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

L

Acorna ab siquidè, vt Helychius ait, d'acorn est, siue Lauri seft: Sed A'noyay d'acorn d'et q'vot, id est, spinosa stirps.

Tragus Attractylidem seu Cartamum siluestrè nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Maria, hoc genus Cardui teneri magno studio quarunt, suisque sagminibus, plena sunt hodie omnia pro dolor! fœda superstitione iadiungunt, maximè verò eos expetunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt prastantissimos cæteris anteponunt, vnde & nomen Germanicum drey distel / quasi dicas Carduū triū surculorum, derivatum fuit. Vocant verò & fraywendistel, quòd vna cum cæteris sagminibus herbis die Mariæ Virgini sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce Sewdistel, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit traxovis d'acorn Dioscor. l. 3. c. 55 quod Rheilius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sensisse solum, seu colum agrestem, & Cartamum siluestrè appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentib. nominibus posita nō placet, Wilder feld Saffran, oder drey distel Attractylis, vel Cnicus siluestris, Fusus agrestis, Colus rustica. Gall. Saffran sauvage, dentix.

Mith. in Diosc. in commun. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hîc, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit Camerarii, rhilus pro Scelymo siluestris, & ôh hârle / Martholus Scelymus egregius commentator in suis con. m. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam antevulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adferunt locum.

Cesl. hort. Attractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Attractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Attractyli vulgari, miniori. Hanc propriè Græci Attractylida, Latini vero Fusum agrestem, aut colum rusticam, quòd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum siluestrè appellat: Germanicè itaque vocetur Wilder feld Saffran Gall. Vne espèce de Chardon ayant la semelle safran, ou Saffran bastard, vt hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

L

Acorna ab siquidè, vt Helychius ait, d'acorn est, siue Lauri seft: Sed A'noyay d'acorn d'et q'vot, id est, spinosa stirps.

Tragus Attractylidem seu Cartamum siluestrè nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Maria, hoc genus Cardui teneri magno studio quarunt, suisque sagminibus, plena sunt hodie omnia pro dolor! fœda superstitione iadiungunt, maximè verò eos expetunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres surculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt prastantissimos cæteris anteponunt, vnde & nomen Germanicum drey distel / quasi dicas Carduū triū surculorum, derivatum fuit. Vocant verò & fraywendistel, quòd vna cum cæteris sagminibus herbis die Mariæ Virgini sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce Sewdistel, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit traxovis d'acorn Dioscor. l. 3. c. 55 quod Rheilius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sensisse solum, seu colum agrestem, & Cartamum siluestrè appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentib. nominibus posita nō placet, Wilder feld Saffran, oder drey distel Attractylis, vel Cnicus siluestris, Fusus agrestis, Colus rustica. Gall. Saffran sauvage, dentix.

Mith. in Diosc. in commun. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hîc, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit Camerarii, rhilus pro Scelymo siluestris, & ôh hârle / Martholus Scelymus egregius commentator in suis con. m. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam antevulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adferunt locum.

Cesl. hort. Attractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Attractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Attractyli vulgari, miniori. Hanc propriè Græci Attractylida, Latini vero Fusum agrestem, aut colum rusticam, quòd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum siluestrè appellat: Germanicè itaque vocetur Wilder feld Saffran Gall. Vne espèce de Chardon ayant la semelle safran, ou Saffran bastard, vt hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

L

Plinius l. 21. c. 15. de herbis Aegyptiis agens, ita scribit. Cnici siluestris vna species mitior est, simili caule, tamen rigido. Itaque & colu antiquae mulieres utebantur ex illis: Quare quidam Atractylida vocant: Semen eius candidum, grande, amarum. Idem de eadem libro eodem c. 31. Nec de Cnico siue Atractylide verbosius dici par esset, Aegyptiæ herbæ, ni magnum contra venenata animalia præberet auxilium. Item aduersus fungos. Constat à Scorpione percussos, quamdiu teneant eam herbam, non sentire cruciatum.

Atractylis aut Cnicus siluestris, inquit Gale- nus, & ex eo Paulus, planta est ex spinosarum gene- re, habens vim siccandi & moderatè calidam.

Quò Atractylis sit referenda, de qua loquitur Toxites in Onom. Philosoph. Cordus in Diosc. l. 3. c. 107. & lib. 4. c. 190. Rob. Const. in Lexico, Apollo rad. 1. in Diacassia cum foliis Senæ, Fernel. m. lib. 6. cap. 14. Gefn. in cat. plant. Bæchan. in Conf. David Kyb. in Lex. & Helfric. in nomencl. 2. c. 23. vbi aliquot plantas simul confundit, perpendant lectores. Videntur nobis Atractylida Veterum intelligere, quam sibi inco- gnitam fatetur Brunfels in exeg. in Dioscor. lib. 3. Tom. 2. p. 118.

Est Cornario Atractylis ea herba, quam offi- nas ait Cartamum siluestris, Germanos verò wilder feld Saffran appellare. Sed existimo Cornarium necire quid sit Atractylis. Non enim vulgaris est Germaniæ, nec nouimus plantam, quæ dicatur wilder feld Saffran / nisi intelligat Carlinam minorem quorundam, verùm ea non meretur nomen Croci.

Sunt qui Atractylida credunt eam esse plan- tam, quæ Carduus benedictus vulgò dicitur, in qua quidem sententia non permaneret (inquit Marantha lib. 2. c. 10.) si foliorum situm non par- uis fecissent. Habet enim Atractylis folia in sum- mis virgis, cæterò magna ex parte nuda existens. At Carduus ille, per caules sola profert.

Atractylis purpurea Bononiensis tractus A- tractylis Veterum esse non potest, quia non red- dit succum sanguineum.

Atractylis marina cognominata, quam Pena apud Hist. Lugd. lib. 14. cap. 13. Pycnocomon ap- pellat, est Carduus, qui Spina lutea dicitur.

Quam Siler, alii Silum, alii Fusaginem, Theo- phrastus Euoaymum appellasse videtur, fortè melius, vt Cæsalpino videtur, Atractylis dicenda esset, à fuso, quàm spinosa herba in genere Cnici Phonos appellata à Theophrasto.

Acarna Theophrasto videtur genus quoddam Atractylidis. Mirum autem Tragum lib. 2. cap. 166. dicere sium Carduum fullonium tertium posse ad Atractylidis aliquod genus referri. Est nobis Virga pastoris. Anemone Lonicero in Diosc. Gefn. in acrip. Diosc. & Tabern. cognomi- natur Atractylis.

An Tragi lib. 1. cap. 41. ἀνθὺν γαζα aut nigra Dioscoridis, quam Atractylida inibi Tragus co- gnominat, est Chamæmelum eranthemum quo- rundam?

Atractylidem tandem veram existimo, quam flore luteo frequentem Lugdani & quidem spontaneam inueni, de qua nunc dicendum.



soluendi, superantibus.

Matth. in post. comm. Ital. cum mag. fig. 13. c. 101. figuram habet, ni fallor, huius Atractylidis malè exprestam, sine descriptione. Ita vt meritò Lo- belius in Aduersariis capite de Carduo benedi- cto in hæc verbi prorumpat. Senensis suo more mordet, & nihil docet. Nam eius Atractylis nul- lis depicta aut asserta verbis iacet spectanda, non vt nos certiores, sed vt dubios reddat: parū enim Diosc. descriptioni aut receptæ Atractylidi acce- dere videtur: vtrum verò illius silentium, an pi- storis in exprimendo solaciū & cacozelia in- culanda sint, viderit lector. Fortè huc nullo dele- ctu intrusa fuit, quia in penultimis illis commen- tariis absuit, nec dum vlla certa, vt videtur, aucto- ri nota fuit. Idem suo more, ne nihil ibi egisse vi- deretur, velitandi ansam arripuit: ait Atractylidē non esse Carthami syluestris speciem, duntaxat, quòd argumento triuiali sanguineum succum non remittat, &c.

Atractylis (inquit Camer. apud Matth. in Hist. germ. lib. 3. c. 14. & in horto) non est ita reflexis & curuis caulibus, vt Matthiolus pingit.

De præfenti planta H. Lugd. l. 4. in duobus ca- pitibus scripsit. Ac in primo quidem capite, c. 6. p. 1450. eam ita inscripsit. Cnicus siluestris prior, Atractylis Dalechampii. In secundo capite, c. 13. eiusdē plantæ duas rursus exhibet figuras. Priorem videlicet p. 1468. mutato titulo, qui sic habet: Atractylis. Item alteram malam p. 1469. hac in- scriptione: Atractylis quorundam Matthioli.

Ατρακτύλις Græcis, Latinis quoque, cœu De- don. Gall. & Lat. Matth. in post. comm. It. cum mag. fig. lib. 3. cap. 101. Lobel. in Aduers. cui & Cnici siluestris species Dioscoridis, Galeni, Plinii, & Aetii suffragio, Obl. pag. 483. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 13. Lacunæ in Dioscorides (qui figu- ram habet, quæ placet.) Camer. in Hist. germ. & Epit. Matthioli. Bellon. Obl. lib. 1. c. 18. & Hort. Lusit. [qui wild Cardebenedictæ vocat] Atractyl- lis dicitur, quod eā antiquæ mulieres pro fuso utebantur: ἀνθὺν enim fusum significat. Qua- re Gaza Fusum agrestem, alii Colum rusticum ap- pellarunt. Vocatur etiam γαζα ἀνθὺν, Cnicus siluestris. Recentiores quidam siluestris cap- thamum appellant, hoc est, Belgis wilden Car- thamus. Nothæ verò voces ante dictæ sunt, quæ à nonnullis huic adscribuntur, cœu & facul- tates.

Matth. no- tant.

Matth. fig. mala.

H. Lugd. 3. figura. 4.

Synonyma

ATRACYLIS VERA FLORE LUTEO.

EX radice parua, nonnihil obliqua, caulis pro- mittere singularis, striatus, subhirsutus, medullâ Tom. III.

Frequens propè Tridentina mœnia ac in Gori-
licensi agro, quin & compluribus Italię locis. In
omnibus, quas adit Clusius, Prouincijs frequen-
ter obuium fuit. Copiosè prouenit in planitie
inter Arboſians, & Audincourt è regione Be-
champs non longè à Montbelgardo: Geneuz
in *plain palais* incipit erumpere in fine Martij:
Montpelij, Lugduni & Baſileę paſſim, in campe-
ſtribus & aſperis locis.

Vires

Eryngij folia, auctore Dioſcoride, primo ger-
minatu muria condita in cibos oleis vice reci-
piuntur. Id porro vim habet caleſcendi. Potam
ducit viinas & menſes, torminaque ac inflatio-
nes diſſoluit. Hepaticis autem, & à venenatis be-
ſtiis commorſis, & his qui lethale venenum ſum-
pſerunt conuenit cum vino. Bibitur aduerſus
plurima mala, cum ſemine Paſtinacę drachmę
vnius pòdere. Fertur quod alligatum pro amu-
leto, & in cataplaſmate impoſitum, tubercula di-
ſcutit. At radix ipſius cum aqua muſſa pota, opi-
ſthotonicos & comitiales ſanat. Non parum au-
tem ſalluntur qui ſecacul ab Eryngio lecernere
neſcientes, Eryngij radices tum Saccharo tum
melle aſſeruatas Venereis inſelictè commiſcent
auxilijs, vt qui ederint fortiores, ſalaciorèque
reddantur. Quippe hac facultate Eryngium præ-
ſtare nūquam hæcenus apud Dioſc. & Galenum
Matthiolo reperire licuit. Radix, cū viſco querno,
ijs ſubuenit quos vel epileſia, vel paſm⁹ affligit:
Eadē ſaccharo còditur in vſus prædictos. Ex tene-
ris folijs mēſe Maio aqua exſtillatur, quę pota exi-
miè bona eſt contra puſtulas Luis Venereę, mi-
riſicęque ab hac labe ſanguinem emundat: vtilis
eadem in febribus quotidianis & tertianis expe-
rimento certo còprobata: ad quęvis colli vitia,
cum aqua pluuiali etiam prodeſt. Radix contu-
ſa & impoſita, ſpinas & lignorum fragmenta aſ-
ſulſæve extrahit. Eadem cum axungia ſalfa mi-
ſta, carnem ab oſſibus recedentem continet im-
poſita. A veterano quodam Medico Italo, teſte
Camerario, competum eſt, radicem Eryngij probe
contuſam, modicęque in vino rubro còctam,
& impoſita abortu prohibere, quāquā còrā intrò
ſumpta partum acceleret. Foliorum ſuccum cum
vino expreſſum vtiliter propinat Dodonęus ijs,
qui gonorrhœa Venerea vexantur. Aiunt au-
tem Eryngium herbam, ſi capella vna in os ſu-
mat, ipſam primū, mox totum gregem ſubiſ-
ſere, donec accedens paſtor ori eam eximat,
Plutarcho auctore. Affirmabat quidam, inquit
Aëcius, aſſiduo Eryngij vſu, nunquam poſtea
minxiſſe calculos, cū prius eo morbo frequen-
tiſſimè vexaretur.

ERYNGIUM CERVLEVM.

Deſcriptio

Eryngium hoc cæreuleum à vulgari nobiliſſimo
diſtinguunt ſolo ſloris colore Matth. An-
guillara, Caſtor, & Geſnerus de hortis. An ei-
dem in App. pag. 292. Eryngium impropiè voca-
tum, Roſa Hiericuntis?

Lob. in Aduerſ. Eryngium montanum cære-
uleum, non recipiendam pro Dioſcorideo. Obſ.
Eryngium montanum tenuiſſimum ambitu pro-
fundè ſinuatum. Cluſ. Hiſtor. poſt. libro 5. pa-
gina 158. Eryngium 4. ſive montanum ſine
icone.

Cæſalp. lib. 13. cap. 28. Eryngium aliud cacumi-
nibus cæreuleis, quod in monte Auerno Apenni-



ni Spinam S.
Franciſci vo-
cant. Camerar.
hort. Eryngiū
totum cære-
uleum in mon-
tibus Allobro-
gum: Ad Hi-
ſtor. Matthiol.
Germ. lib. 3. ca-
pit. 10. Eryngij
aliud genus
cæreuleo flore:
cuius genus
prouenit tan-
tū in Auer-
no Apennini,
&c.

Per plures
annos habui
Montbelgardi
in Horto Ill.

E.C. ſed incuriā hortulani petiit, qui euulſit im-
prouidè: Vidi Eſſingę in horto Di. Volmarij:
Baſileę in horto Domini Doctōris Fælicis Plate-
ri: Stutgardię in horto Ducis: Argentinę in
horto Friderici Meir.

ERYNGIUM MARINVM.

Deſcriptio



Eryngio tha-
cino radices
ſubſunt longi-
ſſimę circumqua-
que profundè
vagantes, ſapore
aromatico, folijs
plurimū pullula-
tia, quę in Mar-
thioli iconē o-
miſſa ex longis
pediculis, nihil
aut perparum la-
ciniata, ſerè ro-
tunda, latiora ta-
men vtcunque
quàm longiora,
interdum latitu-
dine palmū ex-
cedentia, craſſa
ſive ſpiſſa, albi-

cantia vel glauca, vti tota planta, quę in adole-
ſcente planta tum in lacinias abeunt, non admo-
dum tamen profundas, ſed rigidorum ſpiculo-
rum mordacitate multò inſeſtiores, nec craſſitu-
dinem illam etiam ſiccata amittunt, licet neruo-
ſiora appareant, multò etiam quàm Mediterra-
nei latiora, cauſis cubitalis valdè ramoſus: capita
extremis ramulorum inter pungentia folia ſe-
dent, flores proſperentia albidos. *Semina* duo iun-
cta, lata, quę cū ſpinis vndique ſint obſeſſa, vix
impundè eximi poſſunt.

Hoc Eryngium Geſner. de coll. ſtirp. & in ap-
pend. Anguill. epiſt. 8. (qui cum Matth. Croco-
dilion negat.) Matthiol. in ſuis comm. in Dioſcor.
Hiſt. germ. & Epit. Camerarij (qui poſuit aliam
figuram ex Geſnero factam ad meam plantam illi
miſſam) Camer. hort. Caſtori pag. 173. Apolli-
ni rad. 1. ſupra Dialat. Cluſ. Hiſt. poſt. lib. 5. p. 159.
(cui &

(cui & Eryngium 5.) & C. Bauh. apud Matth. Eryngium maritimum dicitur. Brassiculae Eryngium. Coropio Eryngium maritimum, Eryngium glycyrrhizon. Hist. Lugd. p. 1459. Eryngium maritimum Matth. de quo ait. Eryngium licet satis dilucida sit à Dioscoride tradita delineatur, quodnam tamen Eryngium proprius repraesentet, nondum inter Herbarios constat. Aliis enim Eryngium hoc maritimum indicis omnibus propriis exprimi placet. Hoc Plinius lib. 22. cap. 7. in litoribus maris, folio Apii esse dixit, quod aut falsum est, aut depravati codices, ut pro *exaltat* *est* *legisse* videatur.

Lacuna in Diosc. lib. 3. c. 5. hoc Eryngium pingit nomine Glycyrrhizae spinosae. Dicens Plinium lib. 9. cap. 22. confundere vulgarem Glycyrrhizam cum Eryngio marino quod vocatur etiam à Crateua Glycyrrhiza. Non existimo cum Lacuna confudisse Eryngium cum Glycyrrhiza Plinium, sed malè legisse folia Glycyrrhizae & Echinodea pro Schinodea, id est, Lentiscina.

Dodon. Eryngium maritimum. Lobel. in Advers. p. 375. Eryngium maritimum & vescum Dioscoridis descriptioni magis accedens. Obscrv. p. 489. Eryngium maritimum. Drypis Theophrasti quorundam. Advers. p. 375. videtur Acanos Plinii. Icon. Plant. Tom. 2. p. 21. Eryngium maritimum, Drypis Theophr. quorundam.

An Bellon. Obs. lib. 1. cap. 18. Eryngium Anti-quorum & Eryngium maritimum in Creta proveniens:

Eryngium maritimum mihi provenit Montbel-gardi in Horto E. C. Habebamus Lugduni in horto. Vidimus Stutgardiae in horto Ducis, & Basileae in horto Dj. Dis Foelicis Plateri pulchre virens Octobri. Semen maturum profert in Autumno & provenit Vere. Veneta litora vndique referta spectantur. Non modò in calidiorum regionum, quales sunt Hispania, Italia, Gallia Narbonensis & similes, sed etiam frigidiorum & ad Septentrionem vergentium, ut sunt Anglia, Belgium, Hollandia, atque aliae iis adhuc frigidiores, maritimis frequens spontè nascitur, & radice sub terrâ vagatur.

Matthiolus ait radicem minùs siccare quàm alteram, sed eandem possidere vires. Dodonaeus, qui primum facit, ei tribuit vires quae vulgari Eryngio tribui solent, dicens: vniuseque radix ex-calfactoria, &c. Meminit Clusius Rondeletium, marini Eryngii radices (quas potiss. usurpandas censebat), Saccharo conditas praescribere solere mulieribus frigidioris vteri intemperie laborantibus, ad iuvandum conceptum, priùs tamen purgato ut decet corpore, & necessariis praemissis.

ERYNGIUM PVMLVM.

Descriptio

Palmi est, nonnunquam pedis, altitudine, caule gracili, multis ramis ex aduerso ut plurimum nascentibus, praedito: folia circa radicem in rotas speciem humi sparguntur, maiuscula, latiuscula, & molliora: at, quae in ipso caule sub alis nascuntur, multifida sunt, tenuia, in ambitu serrata & aculeata: ramulorum summmitatibus globosa insident capitula, octo plerumque spinosorum foliorum ambitu stellata iustar circumvallata, ipsa etiam spinosa: flos & tota capitula cum suis foliis ea ambientibus, carulei sunt coloris: succrescente plantâ, folia secundum radicem in orbem nascentia marcescunt, deinde alia caulem




ambientia exsiccatui & decidunt, & ad plantam [cùm defloruit] cum foliis, praesertim inferioribus, repetere liceat ad ex-daraguidem & lignosa sed quae non viua sit, & singulis annis semine maturo pereat, semineque deciduo renascitur.

Clus. Hist. Eryngium pumilum. Hist. plant. lib. 5. p. 159. Eryngium pumilum Hispanicum, Eryngium maritimum.

Lob. Obs. p. 490. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 23. Eryngium pumilum Clusii. Tabern. Icon. & Hist. Dodon. lat. in fol. p. 120. & H. Lugd. p. 1461. Eryngium pumilum Clusii.

Post menses plerumque inuenitur passim agro Tempus. Salmanticensi in collibus, & nusquam alibi tamine quidem inde relato, natum est apud Belgas, sed ferus flores protulit, qui nullum semen dederunt, deinde color ille caruleus longè fuit remissior.

ERYNGIUM PVSILLVM.
planum.

Hvmile e- Descriptio
rat, inquit Clusius, statim à radice in plures ramos dimicatatum, teretes, rotundos, procumbentes: ad quorum singula velut genicula nascebantur inordinata folia, exarum latiuscula, circa pediculum angustiora: & crenata: quae verò circa radicem, formae quidem illis similia, sed ampliora, viciam lata, binas aut amplius longa, ex viridi pallescentis coloris: frequentes ex alis ramuli nascebantur, ad quorum singulos nodos foliola, & echinata videntur capitula exoriebantur: flos observare non licuit, nondum se prodebat cùm sub sequentem Autumnum Viennam euocaret: radix satis crassa, & aliquot fibris donata: quin & procumbentes cauliculi plures, secundum radicis caput, crassiusculas fibras agunt, quibus subinde sese

firmant. Et secundum hoc Eryngij genus, Eryngium sc. pusillum planum; non à me quidem natali loco observatum, sed in exulto horto Ill. viri Ioannis de B. ancon. etc. scens confectum, quod Ioannis Mutoni Tornacensis Pharmacopoei, nec. etc. etc. etc.

Pusillum Eryngium planum Mutoni, inquit L. belius (ita enim inscribit in Obs. p. 490. Icon. Plant. Tom. 2. p. 22. & H. Lugd. pag. 1461.) raro rufi vel in hortis apud B. l. gas visitur, foliis quam Diptacus longè minoribus, angustioribus; coliculis d. d. talibus & pedibus, ac fractuosis & diuacatis, in quibus summis & secund. an longitudinem de seculis notes quam Crapulis Eryngij Radix Corde aut Alparagis, d. minor multo perennat. Nuppiam me vidisse memini, nisi in hortis Ioannis Mutoni.

ERYNGIVM PLANVM, LATIFOLIVM Capitula rotunda pauc.

Descriptio



Cum Clusij deceptio omnibus numeris absoluta sit, eam hietradimus. Bicubitalem, inquit, vel amphorem habet altitudinem, caulem firmum, striatū, medullā albā plenū, ac veluti nodis distinctū, præsertim quā parte cum amplectuntur latā & membranacea sede filia, tres aut plures vncias longa, duras

lata, viridia, venosa, in ambitu serrata, & aspera non nihil, subamaro, acrisculoque gustu: quæ vero circa radicem nascuntur, longiora latioraque sunt, & oblongis pediculis inniuntur: summus caulis in aliquot ramos diuisus, breviora folia habet, eaque in profundas lacinas diuisa, & molli-bus spinis prædita: summæ deinde alæ in aliquot ramulos desinunt, echinata capitula ferentes, spherica ferè rotunditatis, in quibus multi carulei stili albianctus staminibus præditi, sub ipsis autem capitulis nouem aut plura oblonga, angustā, aculeata foliola, stellæ imitæ expansa: ipsa porò capitula cum summis ramulis, supremæque caulis parte, interdum vinctate caruleū proliis colorem adquirunt: radix in nouellis plantis digitū crassitudinem & longitudinem æquat, aliquot fibris donata, foris subsæca, intus alba, carnis, gustu dolescentia, perinde ac Eryngij marini radix: vetustate subinde grandescit, & in lures alias radices extuberat, singulis annis ex latensibus frequentiores caules proferens; aliquando tamen hoc in ista planta observabam, ut producto semine, subsequens hiems illam proliis corrumperet, præsertim cultioribus locis.

Matth. in post. comm. Italicis lib. 3. cap. 22. Eryngium planum: perinde tamen totum meminit. Nec placet Camerac. tam opus Matthiolam pro-

hoc Eryngio plano ponere figuram Eryngij Alpini, ac diuersum facere à Clusij Pannonico Matthioli planum.

Castori Durant. p. 173. Eryngium planum siue latic. Clusio Pann. & post. Hist. l. 5. pag. 158. Eryngium Pannonicum latifolium. H. Lugd. pag. 1460. Eryngium planum Matthioli. Dodon. Lat. fol. p. 720. Eryngium spuriū primum. Tabern. icon. Tab. en. pag. 693. & H. stor. lib. 2. pag. 367. & 369. Eryngium caruleum 1. Blaw meer wortzel. Item Eryngium caruleum 2. Item Eryngium alpinum caruleum, Blawberg/ Brackendistel. Tres figuras vnius plantæ habet, posterior est Matthioli quæ deterior.

C. Bauh. apud Matth. Eryngium alpinum planum capite Diptaci, quem Carduum nobilem Bernenses, in quorum alpihus frequēs, vocitant. Eryngium planum Matthioli (in cuius figura capite Diptaci requiro) Dodon. Cast. Lugd. Eryngium aliud montanum Dalechampi eidem, quod & sub Spina alba, sed figura vitiosa p. clausit videtur. Eryngium alpinum Gesneri, Eryngium magis istique capitulis. Eidem in app. Eryngium montanum tenuifolium, ambitu profundè sinuatum Lob. Obs. Alpinum caruleum Geue. Lobel. Eryngium alpinum caruleum, Tabern. Eryngij capite Diptaci Cam. Herba peregrina foliis Acanthi, & Acanthus sylu. Dioscor. Galap. Non videtur fuisse notam C. Bauh. no Matthioli Eryngium planum, si notum, in eo non requireret capite Diptaci, nec idem fecisset cum Carduo Diptaci capite, qui diuersus, sicuti cum Carduo nobilis Bernensium.

In hortis Vratislaviæ primum istud observauit Loc. 8 Dodonæus: Frequens nascitur in pratis ad Danubium supra & infra Viennam sitis, & in hortos illatum scilicet proment. Floret Iunio & in Silesiacis montibus spontè etiam nascitur. Provenit nobis Montebeldi in Horto E. C. vnde habuerimus semen non recordamur, primo anno non protulit caulem. Floruit autem nobis Augusto & Septembri.

ERYNGIVM ALPINVM LATIS FOLIIS, magno capite oblongo caruleo.



Platum ca- Descriptio

pitum est radix pollicaris, terram verus comosa: folia prima plusquam cubitalibus nixa pediculis, Calthæ palustris, eodem modo propter pediculum falcata, sed mucrone acutiore, per ambitum serrata, alia per caules ad ramorum diuicationem laciniata, & profundè incisa, carulea, potissimum suprema, quemadmodum & caulis ipse cum ramis, echini magni oblongi, densissimo creber-

Creberrimorum cristatorumque foliorum ceruleorum echinum superantem vallo latent medii.

Libel. in Aduers. p. 375. Icon. Plant. Tom. 2. p. 23. Eryngium alpinum caeruleum Geneuense perquam venustum. Gesn. hort. Eryngium alpinum Edler distel. De coll. stirp. fol. 75. Eryngium alpinum caeruleum Edler distel.

Camer. apud Matthiolum Germ. & Epit. Eryngium planum, siue laue, Italis *tringo lisio* & *tringo senza spine*. Figura ex Gesnero, cui aliquando misit Eryngium alpinum pulchra est planta, diuersum tamen facio ab Eryngio plano Matthioli, huic enim magna capita longa.

H. Lugd.
not.
Spina alba
Dalech.

H. Lugd. p. 1460. Eryngium aliud montanum Dalechampi. Eiusdem Eryngii malam figuram exilimo poni pag. 1462. titulo spinæ albæ Dalechampi.

Locus &
tempus

Eryngium alpinum Geneuæ vidi translatum ex vicinis alpihus in hortos mense Martio folia incipere deprimere. Quidam rusticus; ni multum fallor, vocabat Cardon gentil: abundantem reperi in monte Thuita, florere incipientem Iulii principio. Basileæ vidi anno 1595. mensis Augusti sine cum semine maturo in horto Di. Io. Weitzman Pharmacopœi, vnde accepi semen serendum Montbelgardii in Horto E.C.

CARDVVS STELLATVS SIVE Calcitrapa.

Descriptio



Cybitū & Celsiquicū. bitum altus est caulis angulosus, subhirsutus, alis multis concavus: folia fatis mollia, pedem aliquando longa, aliquantum incana, profundè in lacinias inconditas dissecta: capitula extremis harentia ramulis glabra: Cyani capitulis æqualia, singulis squamis in vnciales & lenticulares rigi-

das, mordaces, rectæ fores minantes spinas desinentibus, vtradiatam stellam imitari videantur: florum stamina purpurea, rariùs alba: semen lubricum paruum, oblongum: Radix digitum vel magis crassa, mollis, succosa, neruum habens vt alia radices, duriusculum, colore albescent, longa pedem, Raphano similis, Columnæ.

Ruellius stellatum hunc Carduum intelligit lib. 3. cap. 84. vbi ait, Tribuli terrestres genus quibuldam esse putatur, quod vulgus Chaucetrapam, vel Calcetrapam vocat, quod cacumen veluti muricibus, quas vulgus appellat Calcetrapas, muniatur, & spinarū aculeis insigniter armetur, ramis humi procumbentibus, siliqua spinatum vallo muricata, in qua semen rotundum, nigrum, ruderæ & septa villarum obdicens: sed foli-

Tom. III.

lium mihi nullam referre Portulacæ similitudinem videtur, nisi forsitan id genus esset, cui Cicerulæ folium à Theophrasto redditur. Adhuc lib. 2. cap. 117. dicens. Acanos non multum ab ea quam vulgus Calcetrapam appellat dissidere cognoscitur, cum aculeata sit & brevis, latis & acentibus vallata spinis, caule breui ac toroso, floribus, seu potius pappis in cacumine purpureis, rotundis capitibus, & spinarum septo muricatis, inde nomen in vulgus abiit, quod murices Calcetrapas nominet: radice candida, digitali. Hanc spinam humo erutam rura domorum laquearibus appendunt, ad arcenda vt putant maleficorum veneficia. Nascitur in incultis & asperis vbique. Ea spinæ breuitate, & multitudine capitulorum rigentibus aculeis armatorum Eryngium sectatur, idè Eryngiorum generi nonnullis, vt Aëtius retulit, adscribitur. Echinato capitellorum habitu reliquaque facie album Chamæleonem exprimit, quare ipsum Acanon, vt Theophrastus testatum reliquit, aliqui vocauerunt, inde ab Acano Latinis quæ aculeato sunt conceptu, aut floris sede, fructuque spinoso, felicitè Acanacea dicuntur, laborantibus Græcis vno verbo hos tres affectus includere.

Cordus in Hist. lib. 1. cap. 16. nomine Polyacanthæ describit, cuius icon è Dodonæi libris mutata est, pictorum fortè incuria, non optima.

Trago Eryngium alterum, quod minus ritè describit. Apollinaris lib. 2. pag. 154. malè pingit Calcitrapam pro Brachendistel / Maissirey [Eryngio] nec sine errore hæc nomina germanici vna cum viribus Eryngii adscribit.

Tragus &
Apoll. not.

Apollo rad. 1. in Diast. y. 2. Labuntur, inquit, qui Calcitrapam radicem, vulgò Cacatrepolæ stellaram herbam, de qua Plinius lib. 12. c. 7. pro Eryngii radice, vtrumque confundentes, loco Scacul substituit. Item in elect. de cineribus. Matthiols in Ruellium inuehitur, quod existimat Tribulum aculeatum Theophrasti eam esse stirpem vulgato Cacatrepolæ nomine: secus autem distat Ruellius, cuius verba post descriptionem subiecta sunt. En ergo pigmea phalanx in Herculeum dormientem Ruellium. Quid Apollo velit per authoritatem Plinii nescio, nondum vidi, nisi error Typographi, & fortè legendum 22. lib. cap. 7. quia ibi fit mentio Eryngii, Matthiols non tantopere mihi reprehendendus hoc loco videtur vt sit ab Apolline, non annotans hæc Ruellii verba, nisi forsitan id genus esset cui Cicerulæ folium à Theophrasto redditur: apparet Ruellium dubitasse, ac veluti separasse Tribulū Diosc. à Tribulo Theophrasti.

Dodon. lat. in fol. p. 721. Cardus stellatus. Nonnulli Stellariam vocant: Cordus Polyacanthum, sed tamen *πικράλη* siue *πικράδαλιν* Theophr. (Gaza Aculeosam vocat) fortassis ab hac differt. Falluntur autem qui Eryngium aut aliquam eius speciem esse autumant. Matth. Calcetripam Italis dici ait, Germanis *wallendistel* / *Radendistel*. Belg. *Osterie distel*: Gallis *Chausse trappe*. Gall. 1. 4. c. 60. Cardus stellatus & Stellaria & Calcitrapa. Non est species Eryngii. Figura in Hist. Gallica Dodonæi minùs placet, potissimum quod capita attinet, quæ melius pingi possent. Brunfels. herb. p. 281. satis commodam figuram exhibet sub alieno titulo, nempe Eryngii.

Libel. in Aduers. Cardus stellatus, seu Calcitrapa, & Tribulus Ruellii, Coronopus [adde quod vocabulum errore Typographi in Adv. q. missū est] Plinii. Calcitrapam vulgò nuncupatam

Lobel nota-
tur.

quia non manibus, sed calcibus atteritur, mirus decuit Commentatorem indicatam præterisse. Indistinctus Matthioli non est hic Carduus, ut sibi falsò persuadet in Aduers. Lobelius. Idem in Obseru. p. 483. Carduum stellatum, siue Stellarium & Calcitrapam satis commodè (ut etiam in Icon. Plant. Tom. 2. p. 11. sub iam dictis nominibus) pingit, ac dicit: Perperam Polyacantha Cordo vocatur, an Myacanthus Theophrasti cap. 4. lib. 6. Spina alba vera Rondeletio, an Theophrasti Tribulus folio Cicerculæ Ruellio.

Clus. Hist. post. lib. 4. cap. 2. Carduus muricatus, vulgò Calcitrapa dictus: Iconem sine descriptione ponit.

Tabern. Icon. p. 701. & Hist. lib. 2. p. 376. Stern distell. Spina stella. Itē Icon. p. 702. & Hist. p. 377. vocat Stern distell. Spina stella alba. Frustrà ponit duas figuras.

Caalp. Cacatreppola vulgò quasi Cacotribulus, id est, infestus Tribulus, quidam Stellarium.

Camer. hort. 34. Carduus stellatus, Eryngium Guilandini Calcitrepola. C. Bauh. apud Matth. Carduus stellatus. Schvvenckf. Carduus stellatus, Calcitrepola Italarum Matthioli.

Fab. Colum. de plant. Hist. pag. 107. Hypophyzatum dicitur, ac ab ipso cum Hippophæsto Veterum confunditur.

Locus &
tempus

Nascitur circa vrbes, oppida & pagos, planis & campestribus locis, præsertim in Rhenana regione, autore Cordo. Clusio teste crescit in nonnullis Stiria & Moravia locis, verum non adeò frequens ut in Germania reliqua & Belgica Gallia Provincijs. Exit passim, inquit Dodonæus, in Zelandijs & alijs maritimis, circa Antuerpiam frequens: reperitur & in Germania, Italia, ac alibi secus vias: Iulio & Augusto potissimum cum flore vigens. Carduum stellatum siue Calcitrapam acceperunt Geneuæ, attuli etiam Colmaria, plantavi & seminaui in Horto E. C. verum non diu durat, Monspelij vbi abundat vocatur Calcitrapa. Florentem vidi mense Augusto inter Lannam & Geneuam, & in vrbe ac extra urbem in planis palatis vel alibi mense Octobri & Nouembri. Reperi albo flore inter Geneuam & Coloni: Copiosum obseruavi in Italia ut Brixia & Mediolani in ipsa vrbe mense Maio, Patavij circa muros, Lugduni cum flore albo & purpureo Septembri & Octobri.

Vfus. &
Vires

Augerius ad calculum plurimum prædicat. Facultate autem hic Carduus, Dodonæo teste, ex-calfacientis naturæ est. Semen ad vrinæ difficultatem commendatur: vrinæ ciere & calculos expellere fertur cum vino exhibitum. Baptista Sardus aquam ex hoc Carduo destillatam auxiliari affirmat lue venerea infectis: iecur item huius vsu adiuvati, obstructions eius tolli, sanguinemque à vitiosis humoribus emundari, & aduersus diurnas febres, siue quotidianas, siue tertianas, vtiliter exhiberi. Font. de morb. int. lib. 3. cap. 8. ad diarrhœam in lotionē crurum cum astringentibus præscribit radices Calcitrapæ. Item cap. 10. ad dynteritiam.

LEVACANTHA VETERIBVS.

CAP. XVII.

Descriptio

DE *Aegyptiaca* quam Romani Gniam Cardusi, Thulci Spinam albam vocant, Dioscorides

breuius, quam nobis ad eius cognitionem comparandam necesse fuerat scripsit. Leucacanthæ radix, inquit, similis est Cypero, amara, valida (vel ut alij *anthus* *oxyphylus*, i. e. amara valde) Hæc manducata dentium dolores mitigat. At decoctum eius cyathorum trium mensurâ cum vino potum, auxiliatur pleuriticis diuturnis, ischiadicis, ruptis, & conuulsis. Sed & succus radicis potus eadem facit.

Nec fasius Plinius. Leucacantha, ait, quam alij Phyllis, alij Ischiada alij Polygonaton appellant, radice Cyperi, quæ comanducata dentium dolorem sedat. Item laterum & lumborum, ut Hicetius tradit, semine poto drachmis octo, aut succo. Eademque ruptis conuulsisque medetur.

Galenus Leucacanthæ, quam alij Polygonaton, aliqui Ischiada vocant, radicem amaram esse dicit, & propterea secare ac siccare tertio ordine. Verum in calefaciendo primi ordinis esse.

Ex qua breui mentione, quæ sit hodie Leucacantha, haud facile est decernere. Illud saltem extra dubium est, quod Leucacantha [Alba spina] non solum vocum transpositione & compositione ab *Aegyptiaca* soluta compositione i. e. Spina alba, differt, sed etiam re ipsâ maxime, quod aperte præci autiores monstrant, qui eorundem & diuersa, de vtraque tractant.

Suspiciatur Cornarius eam esse Spinam, quam vulgus Herbariorum Carduum Mariæ, Matthioli lacteum appellat, quam opinionem non approbamus cum Lobelio.

Figura, quæ apud H. Lugd. lib. 14. c. 11. pro Silibos, seu Leucacantha Loniceri ponitur, est Spina alba siluestris Fuchij, siue Acanthij quorundam. Leucacantha non est Carlinia illa, quæ caulē profert, licet Dodonæus eius fuerit opinionis, teste Lobel. Lonicerus pro Leucacantha male ponit lib. 5. cap. 28. nomine *Weyßgarten distell* Carduum, qui Echinosopus cognominatur. Leucacantham Dioscoridis suspiciantur Lob. & Pena esse Carduum bulbosum Monspeliensem. Sed errant, ut patet capite de Acanthio siluestri Dalechapij, siue Carduo bulboso. Leucacantha Mōspelijs Dalechapij in Hist. Lugd. lib. 14. c. 10. gentiana non est, ut periti Herbarij nobis iudicant, sed Carduus Galactites. Spinam Solstitialem, quam Sesteriensis *Auricle* vocant, quidam pro Leucacantha monstrant, quorū opinio nobis multatim ardet. Leucacanthæ loco sumi Carduum Benedictum conqueritur Matthiolus. Sed conqueritur sumi & eius loco Chamæleonem album. Apud Tragum lib. 2. c. 117. contendunt nonnulli, Eryngium vulgare esse Leucacantham Dioscoridis. Rhamnus [Oxyacantha Matthioli] in ascriptis Dioscoridis Leucacantha vocatur, teste Gesnero.

SPINA SOLSTITIALIS.

IN frequentes ramos diraricata est, caule gracili, bicubitali, albo tomento vndique obbito, membranis passim secundum longitudinem aptatis alato: folijs stipato vna cum ramis ad Cyani folia accedentibus, duarum triumve vnciarum longitudine, & longioribus, per superiores ramos vix vnciam longis, albicantibus, hirsutis, quæ in florem eunte caule, ferè decidunt, capitula Cyani capitulis equalia, longis rigidis luteis Cardui stellati spinis & singularum squamarum magnitudine

Acquiescentia


Acanthia
leuca.

Card. Mariæ

Spina alba
siluestris
Fuchij.

Carlinia

Descriptio



mucrone natis infesta, florum stamina lutea, quæ tandem in pappo evanescent: radix satis longa lignosa.

Camer. hort. Carduus Solstitialis, siue spina Solstitialis quam Allobroges nominant *Aureoles*, ob floris colorem aureum. Cæsalp. lib. 13. c. 49. Cacarepola altera. Dodon. Lat. in sol. p. 721. Spina

solstitialis Cardui stellati altera quadam species. Lobel. Aduers. Spina solstitialis, *Aureoles* Provincialium, an Pliniana: Stellata Carduo similis, nec minus nobilis spina, aut Stella solstitialis. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 12. Spina solstitialis. Ponz in Baldo, Spina, seu stella solstitialis Ponz. Gesn. in epist. ad Io. Bauh. Spina solstitialis & Spina citrina.

Spina solstitialis florens adhuc in nostro horto Genevæ mense Nouembri, hiemem non pertulit, D. Fœlicis platero feliciter prouenit Bafilæ, vt & mihi Montbelgardi in horto Ill. C. Monspelii abundat sponte, mense Augusto florens, sicut & Autumnio reliquo & Vere. Eandem ex semine ortam vidi Tiguri in horto D. Funckii mense Septembri.

Spinam solstitialem annotauit Valerandus Dourez efficacissimam in morbo regio ex experientia Fontanoni. Florem atque radicem, id annotante Camerario, mirifice prædicant valere in Cachexia, hydropo, febribus diuturnis, virginum decolore facie, & aliis obstructionibus. Eius decocto vel destillata aqua rustici vtuntur ad coxendicis dolores, punctiões laterum, lienis tumores, & sudorem ciendum.

ACARNA FLORE LVTEO.



Carduus quem à Valerando Dourez habuit radicem demittit: sesquipalmarem, crassiusculâ, albam, fibras raras è lateribus producentem, circa caput grandescit, coliculos emittens plures patulos, per terrâ sparsos, duûm, tûmue aut etiâ quatuor ferè vnciarum: varîe diuaticatos lanugine alba

tectos, membranaceis appendicibus tomentosis spinosisque secundum longitudinem alatos: folia creberrima, extremis potissimum ramulis, vnius aut duarum vnciarum, non totam semunciam lata, incanâ lanugine. vtrinque pubescentia, nonnihil sinuata, non tantùm infesto mucrone luteo, rigido, longo minantia, sed & pari feritate spinas è marginibus iaculantia: capita oblonga occultant densè foliorum phalanges, lanuginosis squammis imbricata, ex pappo candicante pendente semine oblongo, Chico simili, multò minor, minus candido, & stili nigricantibus variegato.

Anguil. epist. 8. dicitur Acarna Theophrasti, quam ait in Illyria in insula Lesena copiosam inueniri, spinis luteolis, in cæteris totam albam, ramis pluribus, floribus luteolis, ex paruis echinis, semine simili Chico, coloris rufescentis [Taneto,] annuam esse plantam.

Lobel. in Adv. p. 373. Picnocomos Cretæ, Salonensis Gallo-provinciæ, pusillus, pulchellus & rarus Carduus, &c. Idem Obs. pag. 484. Icon. Plant. Tom. 2. p. 14. Picnocomos Cretæ Salonensis Galloprovinciæ Aduersariorum, Chamæleontis nigri species, fortè Acarna humilis quorundam. Item Obs. pag. 486. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 16. Acarna Valerandi altera. Figura à Lobelio binæ exhibitæ pro Picnocomo & pro Acarna altera Valerandi valdè sunt similes, sicuti & descriptiones, suspicor eiusdem plantæ.

Tabern. icon. & Hist. Acarna Valerandi altera. Item Icon. & Hist. Chamæleon niger, Groß oder Schwarzer Eberwurz. Ambæ figuræ sunt eadem cum iconibus Lobelii. Hist. Lugd. pag. 1456. Picnocomon Cretæ Salonensis Ponz & Lob. Item p. 1484. Acarna Valerandi altera. Duæ figuræ, duæ descriptiones vnius plantæ.

Reperitur Acarna Anguillare in Schiauponia [Illiria] & copiosè in insula di Leseno. Nos qualem pinximus habuimus à Valerando Dourez.

Locus.

ACARNÆ SIMILIS FLORE

Purpureo Chamæleon Salmanticensis Clusii.



Chamæleon, Descriptio Cinqvies Clusius, Salmanticensibus vocatur, tametsi histona prorsus refragetur: asinitatem tamen habere videtur, cum ea planta quam Anguillara pro Chamæleone nigro Dioscoridis exhibet: Est autem hæc planta ex Acarnaceorum genere: caulem pedalem habet interdum etiâ cubitalem, multis alis siue ramis concauum, striatum & quasi quædam durum tamen & firmum: folia tumerosa, longa, angusta, candicante, spinis horrida: summis ramis

M 2

veluti umbellæ quædam ex quinis aut senis cauliculis siue capitellis spinosis constantes innascuntur, in quibus flos purpureus dilutior, (maturo semine) subinde in pappum euanesceat, reliquorum Acanaceorum more: semen est Cnici feminis forma, sed minus, foris subnigrum aut cinerei coloris, intus candidum, dulce: radix nigra, dura, si gustetur, dulcis. Tota planta ægrydus est, & firmarum spinarum vallo munita.

Dodon. Lat. in fol. pag. 717. Chamæleon niger Salmanticensis. Lobel. Obs. pag. 486. Chamæleon Salmanticensis Clusii [ita etiam inscribitur in Icon. Plant. Tom. 2. pag. 17. & H. Lugd. p. 1456.] ortu, folio, totaque facie Acanæ admodum affinis est, & fortè eadem nigri Chamæleonis hæc species agro Salmanticensi oriunda, & à Clusio literis prodita: flore purpurâ diluto. Tabern. Icon. & Histor. Chamæleon Hispanicus Clusij, Spanisch Eberwurz.

Locus & tempus

Spinis rigentibus acutis similem Acanæ Carduum dedit mihi Heidelbergz Dom. Sprengerus nomine Cardui ferocis, similem itidem Carduum armatum atrocibus spinis, foliis ytrinque etiam candidis, vidi in horto Di. Friderici Meier Argentina, florebat quoque in horto Di. Obrechtii Iuriscofulti mense Augusto flore purpurascens, qui an idem esset vel diuersus à Chamæleonte Clusij asserere non ausim. Agro Salmanticensi frequens: floret Iulio & semen Augusto maturum est.

ACANÆ AFFINIS LEO FEROX flore pallido.

Descriptio



cinctus. Lobelius.

Lobel. Obs. pag. 485. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 15. Phœnix, Leo, Carduus ferox. Ital. Cardo fero, Leone detto. Tabern. Icon. & Histor. Carduus ferox, Phœnix, Löwendistel. Dodon. Lat. in fol. p. 716. Leo, Carduus ferox.

Locus

Planta rara & vix nota, nullius propterea vltus: audit tamen Lobelius quibuldam aridis collibus Italia, ab Apenninis non ita diffusis, magno prouentu ghesce.

* *

POLYACANTHVS CASABONÆ, Acanæ similis.



Descriptio

Pvlcher est Cardus bicubitalis eirciter, per cuius caulem rotundum, album, lauc, ramolq, folia dodrantalia ac etiam longiora, vnciali latitudine, acuminata, superne ex atro virore solendentia, inferne tomento candidante obstita densa, preffo, nec nisi scalpello aut alia eius nodi re ten-

tes radere, cōspicuo, æquabili marginum circumscriptione, mihi prohibeant spinulæ flauescens mordaces, quæ ex interualis binæ, ternæ, aut quaternæ, rariùs singulares, in quas nervi deficiunt qui obliquè à magno secundum longitudinem decuriente nervo in oras exporriguntur. Semen paruum, oblongum, lucidum, nigricans. Folia superiora, interdum lata vnciam, etiam & semis, & capita abundant rigidis spinis.

D. Calabona Herbarius Ducis Florentiæ misit cum hac inscriptione Italica, Leon di cardo maschio.

Lobel. Obs. pag. 486. & Icon. pl. Tom. 2. pag. 16. Acanæ Theophr. Anguillæ. Lobelij descriptionem & figuram exhibet etiam H. Lugd. pag. 1484. hac inscriptione: Acanæ Theophrasti Anguillæ Lobelio.

Tabern. Icon. & Histor. Acanæ Theophr. Anguillæ. wild Carlin.

Ferd. Imper. hist. nat. lib. 28. c. 1. tribuit Acanæ Theophrasti folia longa spinosa, in circuitu extimo candicante, parte internâ viridia. Ipsas quoque spinas albas, ternas, in foliorum ambitu ordine quodam iunctas. Florem azureum: semen nigrum papposum. Icon Imperati multo melius conuenit nostro Carduo, quàm Lobelij, lecteres omnia diligētius examinent, & an Lobelij & Imperati icones diuersarum sint plantarum vel vnius.

Montbelgardi & Stutgardiz in horto Ill. E. C. Locus prouenit, semine à Calabona misso nata. Eundem Lutetiz obseruare memini in horto Robini, frigoris est impatiens. D. Zvingerus in horto aluit cui etiam flores produxit.

CARDVNCELLVS MONTIS Lupi.

Statim à radice simplice complura nascuntur Descriptio
Folia, duas vncias aut palmum longa, rigidula, in lacinias spinosas, femunciales, longiusculè distantes diuisa, Cardui stellati foliis similia: caulibus plurimum nullus, aliquando sesquipalmaris, foliis paucis



Tom. 2. pag. 20. Carduncellus montis Lupi.

In planitie prope montem Lupi versus Meridiem copiosam observavit & collegit gener. H. Cherlerus, & tam aculeis quam sine caule, nec ullibi præterea ipsi videre contigit.

CARDVVS PARVVS.



ticulatos pinnatorum foliorum cancellos congesta, Cyani similia, minora. Carduus hic non multò maior est ipsa icone prout à nobis visus.

LINCOSTIS HERBA ARISTOTELIS.

Meminis Aristoteles herbæ cuiusdam Lincostis dixit, eiusdemque multum spinosæ, quæ aliam procreet plantam, hoc modo. Quia in aqua crescit, & multos aculeos habet, & hinc inter spinas multum liquoris colligit, qui putrescens, successu temporis, mediante Solis calore, aliud [numero] herbæ genus producit: de ea etiam Cardanus lib. 8. Subtil.

ECHINOMELOCACTOS.

Carduum hunc Indicam vidimus apud Chastell. Fratrem C. Bauhinum cui spinæ robustæ, Tom. III.

paucis minoribus vestitus, breui lanugine subhirsutus, caput grande in cacumine gerit vnicum oblongum, rigidis nervosis spinosisque foliis oblitum, quibus squammæ oblongæ & innocentes subsunt, pappum coercentes, quem flus purpureus marcescens relinquit.

Lobel. & Pena Adv. p. 374. & Icon. Plantar.



quædam curvæ, aliz rectæ.

De hoc autem Carduo hæc tradunt Lobel. & Pena in Aduers. pag. 376. vbi iconem proposuerunt: Miræ raritatis & venustatis Carduus, quæ spontè edunt novi orbis Insulæ Occidæ, præsertim ea quæ D. Margaretæ sacra est, vnde reduces Naucleri Anglici

Locus:

oris, Morgano peritissimo Pharmacopæo Londinensi attulerunt. Sit ne cæli Europæ patientis huius semen, nondum scimus: sed primo Vere experiemur. Videtur autem hic quasi quidam naturæ Cinnus ex Peppone, Meloque, & Carduo coaluisse: eoque nos Echinomelocacton, siue Melocarduum Echinatum, signatâ magis quam receptâ nomenclaturâ vocauimus, &c. Plant. Icon. Tom. 2. p. 24. Echinomelocactos, siue Melocarduus echinatus Indæ Occidentalis Teut. 27. Tom. 2.

Clusius qui novam iconem proponit ait in Exot. lib. 4. cap. 24. Anno 1601. plures Echinomelocacti plantas à quibusdam naucleris peregrè redeuntibus in Hollandiam illatas, varias autem fuisse quas conspiciebat, plantæ magnitudines, prægrandes aliquas, mediocres nonnullas, parvas, & nondum plenam maturitatem consequutas alias. Mediocre me fecabam, quæ duodecim uncias longa erat: infimæ partis terræ insedentis ambitus quinque & viginti uncias, à qua in metam asurgebat: sedecim profundis sulcis totidemque elatioribus costis prædita, quarum singulæ novem tomentosa tubercula habebant, è quibus decussatim acutissimæ firmissimæque, & tam quæ cornæ decem spinæ, vnciam, ut plurimum longæ, interdum etiam ampliores, prodibant, inter quas binæ (in maioribus ternæ, in minoribus singulares) surrectæ erant: ea autem sessili parte plantæ, quæ videlicet supra terram incubuerat, & veluti fornix instar curvæ erat, sulcæ & nigricantes, mediâ parte, ex spadiceo candicantes, supernâ cineracei coloris, cuspides verò purpureascentes. Summâ parte plantæ, siue verius fructus [etenim foliorum expertus erat, & radice duntaxat nitebatur] densissimum tomentum emicabat ad vnciæ altitudinem, trium verò latitudinem in diametro, cineracei coloris: exterior fructus pars viridis erat, qualis ferè foliorum Tunzæ, à nonnullis Ficus Indica & Opuntia appellata, parte tamen terræ proximâ ex albo pallidebat interna pars siue pulpa, candida, ipsa, & adeò lenta, ut in tenuissimas etiam laminas secta & digitis extensa vix frangi posset (quapropter concoctû valde difficilem esse, comesturam faciebam.) Cucurbitæ quodammodò saporem referens: pulpæ medullium & ipsum cor minus album erat, nullamque cavitatem habebat, quæ semen contineretur, sed solidum erat: supræmâ autem pulpæ partem, cui tomentum in

hærebat, non nihil purpureo cebat: ipsum verò tomentum tenuissimum instar lapidis amianthi, & candidissimum erat, in quo latebant multæ exiles spinulæ purpureæ, quæ supra tomentum sese exerentes, rigidiusculæ erant: ab extima pulpa rari quidam prodibant in tomento latentes folliculi membranacei, siue vaginulæ, coloris sanguinei elegantissimi & floridi, vnciam longi, supernâ parte crassiusculi, infimâ autem, quâ videlicet pulpæ adhæserant, angusti & tenues, pleni semine exili, nigro & splendente, instat seminis Amaranthi purpurei, vel Symphoniz, alio nomine blitum versicolore folio appellatur, summo horum folliculorum capiti inhærebat oblongum quidpiam, tanquam flosculi rudimentum, quod supra tomentum caput extulisse videbatur, sed prorsus aridum, vt qualis formæ fuisset, coniecturâ assequi nequirem: radices crassiusculas, longas, lentas & fibrosas, insuper alias in ambitu minores adhuc retinebat ex infima sede productas: &c.

H. Lugd. pag. 1442. Melocardus echinatus Penz. Tabern. Icon. & Hist. Melocardus Melonen distel.

CARDVVS PITAHAYA FRVCTVM ferens.

Descriptio

Carduum non minus admirandum quàm Melocardium echinatum descripsit Ouiedus lib. 8. cap. 24. in Hispaniola insula nascentem. Pitahaya, inquit, fructus est pugni mediocris magnitudine. Hunc profert Cardui genus, spinis quidem horridum, sed aspectu iucundum & pulcherrimum: foliis enim caret, sed horum & ramulorum vice brachia quædam habet, sex pedes longa, quadrangula, in medio canaliculata, in quo medio & in angulis spinæ sunt valde pungentes, venenatæ, satis longis spatiis à sese distantes, ternæ simul, aut quaternæ digiti maximi longitudine. Inter hæc brachia fructus medius exoritur, qui Pitahaya illic nominatur, cortice crasso, pifoso, & veluti squamoso contextus, qui tamen facile culro inciditur, etiam si tota interiore parte granulis carni permixtis, sicum nostratum modo, sit refertus, coloris venustissimi, nempe Chermesini saturati. Est & tota hæc pars edulis, manûsque inficit Morti modo. Qui comederit, non statim, sed duabus horis ab eo sumpto, vrinam reddit planè crudam. Est tamen innoxius & spectatu elegantissimus, sed qui cum profert Cardus horrendus, specie valde agrestis & admiranda, viridis, cinerea, candicante.

Huius meminit & Cardan. de rerum varietate lib. 13. cap. 67. dicens. Tunc alij Pitaiam (fructum) adnumerant, cum qua in duobus convenit, in colore rubro splendido, quo manus inficit, quodque aded vrinam tingit, vt sanguis exquistissimus videatur; in granis fructus, quæ intus habet rubra veluti Ficus, & ex aculeatis plantis oritur: sed Pitahia coronatum non habet fructum, vt Tuna, sed Malo Appiano non abfimilem formâ, colore rubro, cortice præduro.

NANA SIVE STROBILVS PERUVIANVS, & Ananas.

DE Ananas Theuetus, cuius figuram primo loco posuimus, ita scribit: Fructus

quo in America plurimum vtuntur, ibi Nana dictus, mediocris Citrij mali magnitudinem æquat, specie est Pinei Coni, vt & figura docet. Maturus flavescit: sapore & dulcedine excellens, & vel saccharo ipso iucundior. Verùm ad nos importari recens nequit, adeo fugax existit. Nulla fert semina: ideoque non nisi surculis transplantatur, eo ferè modo quo apud nos per infusionem. Crudus adhuc esui tam est rudis, atque ingratus, vt etiam fauces excoriet. Folium eius arboris primo ortu lunci latifolij simile est.



Hanc H. Lugdun. pag. 1840.

Nana Brasiliæ norum Theuto: Item pag. 1841. Nana fructum, siue Ya-

Yama nominat.

De hac loquitur Maffeus Ind. lib. 2. In

Brasilia ex omni genere fructuum palma

tribuitur iis quos vulgus Ananazes appella-

lat, planta est humilis, cuius è ramis veluti pinea nucamenta

dependent, præ-

molli, hæc suo tempore in frusta desecta, gratissimul odore ac sapore non recenti duntaxat edulio sunt, verùm etiam in longum tempus adservantur è Saccharo.

Hanc eandem, ni multum fallor, Ouied. Hist. suæ lib. 7. cap. 13. tradit in hunc modum. Nascitur in Hispaniola reliquisque vicinis insulis fructus quidam, quem nostri à Strobili siue Pineæ nudis similitudine Pinas appellant, non quod eiusmodi lignosas squamas habeat, sed quod eius cortex simili modo distinctus, videatur, tamen non squamatus, sed peponis modo cultello integer auferatur. Vt autem luci bonitate & suauitate reliquos fructus hic antecellit: ita color ille pulcherrimus ex luteo virescens, paulatim per maturitatem virore euanescente. Odor iucundissimus qualis ferè è eo Persicorum genere quod à Malis & Cotoneis nomen apud Italos & Hispanos inuenit, magnitudo illi vulgaris Melonis. Nascuntur verò singuli fructus ex Cardui genere aspero & spinoso, oblongis prædito folijs, è quorum medio profilit caulis rotundus vnicum ferens fructum, qui post 10. aut 12. mensem postea maturifcit. Eo sublato nullus præterea in planta nascitur fructus, ideoque ea velut inutilis abiicitur, &c.

Quibusdam locis nascuntur etiam hæc genera spontè in agris abundanter: at quibus cultura accessit, longè sunt illis suauiores, & cultoris beneficium abundè compensant. Huius fructus abundantia auctoritatem eius inquit: Sed tamen & his insularibus cum bonitate, tum magnitudine præstant, qui in continenti nascuntur. Maturus fructus quindecim vel viginti diebus conservari potest.


Mangas fructus Closii reuocat in memoriam, Yaïama Ouiedij, tamen plus similitudinis habere ipsi videatur cum eius Anon de quo H. n. g. lib. 1. cap. 4.

Mangas Anon.

cap. 47. egimus Iayamz Oniedi Theuetus, si Clusio credendum apud Garc. lib. 2. cap. 9. similem describit nomine Hoyuri cap. 33. lib. sing. Americæ de quo paulò infra dicimus. Sed & Monardem l. 3. c. 63. Ananiam Theueti intelligere credimus, dicentem: Nux Pineæ siue Strobilus Peruanus celeberrimus est totius Indiæ fructus cum apud ipsos Indos tum apud Hispanos.

Acosta Ananas historiam nunc adscribamus. Peregrinus fructus. & ex Prouincia S. Crucis in Brasilia primum in Occidentalem Indiam, deinde etiam in Orientalem Indiam delatus, in quibus nunc vberissime prouenit.

ANANAS ACOSTA.




eum multas alias proles, quarum nonnullæ etiam suo fructu præditæ sunt. Quæ itaque fructus maturus colligunt, proles illud terræ mandare solent: de quibus singule deinde stirpes proueniunt suo Malo onusta, vti mater, quæ intra annum spatium colliguntur. Eius radix Cardui edulis perquam similis est, sed & folia non sunt disparia tamen ad Ananas siluestris folia magis accedat. Vulgò *Ananas* vocant: Canarini verò *Ananasa*. Cum primum in Indiam illatus est hic fructus, singuli decem ducatis, aut paulò amplius æstimati sunt: nunc verò propter abundantiam [tamen si neque saporis neque odoris Prunis cedat] vix duobus regalibus Castellanijs veneunt. Hæc *Acosta* ex versione Clusii de suo *Ananas*, cuius historiam iisdem verbis refert H. Lugd. in Appendice p. 12. ac *Acanam Acosta* inscribit: ac de quo etiam similia scribunt *Paludanus* *Quietus* ac *Theuetus*.

His ita traditis, superest vt *Ananas* ex *Linschotti* sententia prosequamur. *Ananas* fructus est, inquit, perelegans & speciosissimus, vt non desint, qui hunc fructum sua forma delectabili reliquos omnes superare putent. Cuius humi incumbens herbæ alperæ & expansæ *Azeuar* seu *Semperuino* Hispanico haud æsimili, quoad folia. Quæ primò viridia, maturatione demum aureum colorem acquirunt, cum modica quadâ rubedine. Intus tamen perpetuò flauus est, sectione facillimè peruius: odore fragrantissimo, sapore qualis Mali Persici benè maturi. Estur ex vino: sed febrim excitare solet esu liberaliore.

Nam stomachum impensè refrigerat, ac proinde minùs salubris censendus. Abundat succo, eoque tam acro, vt cultello quo dissecatus fuit non deterfo, vnica nocte notabilia vestigia exsectione sua imprimat. Conditur cum saccharo. Gerit hic fructus velut vmbellam quandam aliquot folijs constantem, ex qua si testæ mandes aliz proueniunt,

ANANAS LINSCHOTT.



etsi vel per quatuordecim dies iacuerit. Delatus est hic fructus primum à Lusitanis ex Noua Hispan. & Brasilia in Indicas oras, in quibus nunc vndique & magna abundantia prouenit. Maturescunt hi fructus quædragesimali tempore, tum enim gustu pollent gratissimo. Melonis sunt magnitudine, formâ conici, aut Nacis pineæ, facillè tamen funduntur, ac Persicum colore maturum repræsentant, pari item ferè sapore. Verùm delicato gustu supra omnes fructus præstant. Succus multo dulcoris instar vix satietatem implet. Calidi sunt tam si cultum horæ mediæ spacio insertum teneas ferè consumptus erit. Sanè communi vsu hominibus vix nocent, nisi suprà modum fumantur, vique ad gulam. Infirmis haud permittuntur. Vulgò scinduntur orbiculatim vinoque merantur, suauemque omninò cibum præbent. Et hæc ex duplici versione *Linschottani*. De hoc etiam fructu scripsit *Leuinus Hulsius* in navigatione Holland. in Indiam Orientalem: vt & *Leti* cap. 13.

Nux Pineæ, siue Strobilus Peruanus, stomacho utilis esse censetur, item corrobore, languentem appetentiam excitare. Vulgaris est per vniuersam Indiam, & magnæ apud incolas existimationis: editur prima mensa, & in pomeridiano æstu nam frigidus esse perhibetur. Siccus ad merlatus est, & conditus siccus, vt illius formam contemplerer, duntaxat utilis fuit: at conditum grati saporis deprehendi, tamen à speriusculum immaturum dum condiretur fuisse arbitror, inquit *Monardes*. Hactenus in Medicum vltim non est receptus *Ananas*, sed solummodò ob saporis gratiam commendatur. Calidus & humidus est, editurque mæceratus in vino sectur & inuidissimum Regem *Ferdinandum* comedisse vti *Persicum Malo-cotoneum* & facilis est concoctionis: nimius tamen inflammationes parit quemadmodum *Durones Malacenses*. Si medius secetur, & partes denud conungantur, vnius diei aut noctis spatio cultellus relinquantur, inuenietur tota ea pars quæ in vulnere hæsit assumpta. Et hæc *Acosta*, qualia etiam *Paludanus* tradit.

Vires & V. fus.

Descriptio.

AIZOI MAIORIS ORTV PERSIMILIS
exotica planta Lobel.

Lobel. in Teu-
Leon. p. 458. ceu
& in Icon. Plant.
p. 375. hancita in-
scripsit. Aizoi ma-
ioris ortu persi-
milis exotica
planta.

Clusius Iconem
eâdem, quam nos
ex Lobelio al-
sumpsimus ponit,
ac scribit: Qui ex
ex Iaua anno 1599
redibant naucleri
Ananas fructum
saccharo cõditum
reportabant, & e-
ius plantæ germin-
a virgita admix-
ta, quorum iconẽ
hic subiiciendam

curabam. Erat quidem is fructus satis suavis, sed
qui ob nimiam dulcedinẽ, mihi nauscam ferẽ ex-
citaret, cuius pars intima durior, & difficilis (vt
apparebat) concoctionis. Folia porro antè viderã
ex Guineã delata (vbi fructus Pinas à Lusitanis
appellatur, ob aliquam formẽ cum Pineã nucẽ si-
militudinem:) Aizoi aquatici foliis nõ valdè dis-
similia, minùs tamen crassa, & in ambitu ferrata
siue dentata, vt in subiectis germinibus animad-
uertere licet.

ANANAS SILVESTRIS, FOLIO ALOES
fructu Cupressino.

Descriptio



gnam foliorum comam fundunt, maiorum quàm
quæ in arbore sunt, quæque procul inuentibus
Aloẽs foliis simillima videantur, tenuiorum ta-
men, pluribus spinis horndorum, & dilutè viren-
tium: adnatus se propagat, alizque stirpes ex aliis

Altius al-
furgit
qui Ananas
silvestris nun-
cupatur: nam-
que truncum
habet hastæ
magnitudine
læuem admo-
dum, rotundũ,
& Mali aureæ
crassitie, spinis
horridum: fo-
lia spinosis
cuspidib. præ-
dita, & per am-
bitum mollib.
spinis septa:
singulæ arbo-
res secundum
radicem sum-
mã tellure ma-

enascuntur, præsertim in sepibus & hortorum
ambitu, quos egregiè manijunt. Rami foliorum si-
mul glomeratorum capita proferunt, flauentium
admodum, & tenerorum, suauissimi odoris, quæ
nihil aliud sunt quàm flosipsc: ex horum singu-
lis spica prodit Arundinis spicæ non absimilis,
sed crassior, compactior, & elegantior, odore Ce-
dri. E ramis dependent fructus *Ananas bruno*, id
est, Ananas siluestres dicti, quia cum domesticis
nonnullam habeant similitudinem, Melonis ma-
gnitudine, coloris rubri elegantis & oculos oble-
stantis, toti in partes diuisi, quemadmodum Cu-
pressini strobili, seu nuces exsiccatæ, sed tubercu-
lis foris obfusi, vt procul spectantibus magni Pi-
nei strobili appareant.

Arabes, descriptionis autore Acolã teste, ex
versione Clusij, *Queura* vocant, quemadmodum
in Decan: Persæ *Ananasa* & *Angali* florem (qui ca-
put illud foliorum odoratum est) Arabes *Chux-
raid*, Persæ *Pixcoxhuit* dicunt. Turcis est ignota.

Clusio ad Acolã Ananas siluestris habens
aliquot notas non dissimiles Aloẽ Americanæ.
Cur hæc Clusius in post. editione omisit?

H. Lugd. Ananas siluestris Acolæ.

Capitum teneriora folia seu flores crudi edun- Vires
tur, Carduolique sapiunt: sed exiguum alimen- Vius
tum præbent.

Succum commendant Arabes ad iecoris & re-
rum calores, renum vlcera, purulentas vrinas, pe-
nis excoitationem, diabetem & Erysipelas.

CARDVVS EX MADAGASCAR
Indix.

Descriptio

Non fru-
ctus, in-
quit Clusius, sed
elegantissimi
cuiusdam Car-
dii generis ca-
put (decimus
quintus eius
fructus Exot.
lib. 2. cap. 15.) le-
ctum in ma-
gno illo sinu
Insulæ Mada-
gascar, à Lusit-
anis *Baya d'An-
lon-gil* nuncu-
pato, Orienti
exposito, ele-
uatione Poli
antarctici sex-
decim grad. in

quo Hollandi primâ suâ navigatione, & aquam,
& alia ad victum necessaria comparabant. aliquot
diebus isthic hæretes, antequam in lauam perger-
rent. Vnicum porro huius Cardui caput reper-
tum in ligneis illis capsis à Naudleris relatis,
quarum antè memini, cui nullum
nomen additum, sed scheda
duntaxat, indicans in
iam dicto sinu le-
ctum fuisse.

**



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXVI

CORYMBOIDES, VEL CORYMBIFERÆ, ET MINVTIORA
CAPITVLA FERENTES, ALIÆQVE NONNIHIL SIMILES.

Reslant inter Capitulas Corymbos florum gestantes. Quanquam verò Prisci Hedera Baccas seu racemos Corymbos, & Ferularum caules ac racemos Corymbiam dicat Plinius, Corymbosque quos condiebant : tamen apud eundem legimus comantes auri fulgore Corymbos dictos flores, seu, ut ille ait, fructus Chrysocoma, quæ non infima est infra dicendarum stirpium. Estque Κορυμβος quoduis summum. Et pleraque hoc libro enumeranda sorem gerunt densum, & in capitulum aggestum quandam minutissimorum flaminum stipitum; quem Corymbi nomine transierit complecti libuit, dum tu certius ac melius inuenias nomen. Ορειματόπιον lex vetæ nulla. Sed illud cum Philosopho editum volumus, oportere τὰ ὄνυμα τῶν ὄντων εἶναι ὁμοίωμα.

OTHONNA VETERIBVS:

CAP. I.



Thonnam Dioscoridi fuisse incognitam, vel illud conuincere potest, quod nihil ex se de ea certi scribit, sed omnia aliis accepta referat, ex quorum tantum opinione famaue hæc de Othonna memoria prodiderit. Othonnam aiunt nonnulli [his Codices quidam vetusti vsque ad *habet hæc folia* &c. omnino carent] maioris Chelidonii succum esse, quidam Glauii: alii (è) floribus corniculati Papaueris expressum [τῆς κοκκίτης ὀκκίτης τῶν ἀθίων ῥιζῶν, quæ verba sic leguntur in veteri: τῆς κοκκίτης ὀκκίτης ῥιζῶν: sed vulgatam scripturam Goupylus meliorem esse censet.] alii Anagallidis cæruleæ, Hysciami & Papaueris succorum misturam esse contendunt: alii denique Trogodyticæ cuiusdam herbæ succum, quæ Othonna vocetur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Egyptum spectat. Habet hæc folia Erucæ [ἐρῶς] proxima, crebrè perforata, & tanquam à tineis pertusa, squalore obfusa, pauca: quare quidam Anemones speciem esse existimauerunt. Ex ea succus expressus oculorum medicamentis conuenit, vbi expurgare opus est. Mordet enim & quæcunque oculis caliginem offundunt, absterget. Tradunt & humorem quandam ex herba emanare, qui clorus, semotis lapillis, in pastillos ad eadem digeratur. Aliqui tamen affirmant lapidem Egyptium esse, in Thebaide nascentem, æreo colore, exigua magnitudine, gu-

stu cum feruore quodam & astrictione mordaci.

Othonne, inquit Plinius lib. 27. cap. 12. (tradens ea, quæ Dioscorides,) in Syria nascitur, similis Erucæ, perforatis crebrè foliis, flore Croci (Cocci CH.) quare quidam Anemonem vocauerunt. Succus eius oculorum medicamentis conuenit. Mordet enim leuiter (leniter, & calfacit CH.) & excalfacit, astringitque siccando. Purgat cicatrices & nubesulas, & quicquid obstat [oculis obstat vet.] Quidam tradunt lauari: atque ita siccaram digeri in pastillos.

Iam pridem cogitauit Marcellus, & in eam partem inclinauit ei animus, ut crederet sui generis omnino esse Othonnam: quæ verò alia de ea tradantur à vitium & potestatis similitudine ab aliquibus credita, dictaque fuisse: & ex eorum ratione, quæ Græci ἀπὸ βαλλάνου vocant, ad Othonnam translata fuisse.

Matthiolus verò in Othorina suam ignorantiam accusat, quæ quia ei non nota fuit, proci-
Matth. 1071

nus ab omnibus in Italia ignorari falsò definit, autore Guilandino in Theone. Nobis quidem, inquit Satracen. in scholiis, haud secus ac Priscis incerta omnino huius Othonnæ historia fuit in causa, ut è Recentioribus nonnulli varia variè in hoc Dioscoridis capite legerint. Ac inter cæteros quidem Rondeletius, *ἀπὸ τῆς ἐρῶς, ἡδὲ ἐρῶς*, legebat. Doctissimus Dalecāpius, *ἀπὸ τῆς ποδάρης* ut audio, legit *ποδάρης*. Marcellus, *ἀπὸ τῆς χαλκῆς, λευκῆς*. Attamen perbellè respondent; quæ de

Othonna retulit Plinius, cum vulgata Dioscoridis lectione. Mirari subdit Matthiolum Herbam incognitam Italicè vocare Othonnam.

Flos Aphri-
canus

And. Lacuna Florem Africanum Othonnam herbam esse, Dodonæo teste, suspicatus fuit, cum cuius tamen descriptione haud per omnia iste flos conuenit.

Herba Gen-
ti

Othonnæ accommodare voluisse Rondeletium Herbam venti ait Lob. in Adu. dubitatque de hac opinione in Obf.

Idem Rondeletius in pharm. supra Marciatum dicit apud Dioscor. cap. de Othonna, melius legi Mentham pro Eruca, ac eam esse, quam alii Clymenon putant, & quam Arabes Mentham maiorem vocant, nos Scrophulariam maiorem. Cetera æquiuoca vide in ipsa Dioscoridis Othonnæ Historia.

Scrophula-
ria maior

TAGETES INDICVS MINOR SIMPLICI flore siue Caryophyllus Indicus, siue Flos Africanus.

CAP. II.

Descriptio



STriatos
Sprodit
caules, dodra-
tales, aut pau-
lò maiores, in-
tus fungulos,
alis aliquot
concauos: *fi-
lia* Tanaceto
similia, pinna-
ta, ex quinque
aut octo con-
iugationibus,
imparique ex-
tremo com-
missa, odore
virolo grani:
singularia fa-
turatè virent,
tres, aut qua-
tuor vncias
longa, semun-

ciam circiter lata, circumquaque denticulis serrata, in acumen desinentia: flores extremis ramulis hærent singulares, ex calyce turgidulo oblongo, simplice foliorum ordine radiati, colore infra ex flauo, supra ex flauo ferrugineo, holosericeam telam imitante: medium obtinet *stamina* numerosa, flauentia: quibus appenduntur *semina* tenuia, oblonga, nigra: *radix* brevis, fibrosa, ac vbi è terra prodit, bina habens longiuscula folia. *Icon* nostra ex Fuchsianis iam erat parata, quæ Tagetem flore pleno apprime potissimum demonstrare videtur.

Garyophyllos Indicos, referente Trago Germanico, lib. 1. cap. 192. quidam volunt esse Flammæ Violam, quæ Græcis *φλὸξ* & *φλ. βίαν* dicitur. Idem lib. 2. cap. 145. author est vocari *Sammetz blumen* (quali dicas Serici villosi flores) & *3ne dianisch* *Wagelin* [Garyophyllos Indicos.] Sibi videri esse Caltham Plinii. Se non posse satis mirari, cur nonnulli hanc plantam Arthemisiæ adnumerare voluerint, cum non solum formâ, sed etiam odor & sapor manifestè reclamant. A foliis Tanaceti similibus, Tanaceti speciem censeri. Non esse porro Tageten Apulei cum eius historia nulla apud eundem autorem extet. Proin-

de siue Caltha, siue Scopà regia Autumnalis, aut quocunque tandem nomine appelletur, certè sibi esse quàm gratissimam. Hæc ille, qui Garyophyllorum Indicorum tria facit genera, exiguum nimirum, medium, & grande, distinguens ea tantum magnitudine & tempore, nec indicat, an sint simplici, vel multiplici flore. Videtur autem pingere Lagetem minorem flore simplici.

Tria quoque genera hæc Garyophyllorum Indicorum assignat Matthiolum in post. comm. cum mag. fig. Lat. & Italicis. Non desunt, inquit, qui Othonnam esse censèant eam plantam, quam Indicos Caryophyllos vocat vulgus, quib. ego quoque subscriberem, si hæc planta Eruca foliis excreceret, iisque paucis, cribri modo perforatis, & friabilibus. Verùm cum foliosa sit planta, & non paucis foliis referta, quæ Tanacetum potius, quàm Erucam referunt, eaque cribri modo perforata, aut tanquam à vermicibus erosa sint, nec friabilia, non video sanè cur in horum sententiam concedere queam. Nihil enim me mouet ad probandam horum opinionem floris color, & latifolia imago, aliis reclamantibus notis, cum numerosa sint plantarum genera, quæ croceis & latis proueniunt floribus. Ego quidem si mihi decernendi scultas daretur, in Chrysanthemi genere hanc plantam reponerem. Cæterum tria huiusce plantæ obseruari genera, floribus tantum differentia. Matthiolum autem genera hæc nunquā in spexisset, illud nobis manifestò argumento esse potest, quòd non solum floribus differant, sed etiam foliis & caulibus, id quod hortulani norunt, qui facili cognitione antequam flores proferat, majores plantas à minoribus distinguunt. Ait porro, vt omnibus satis faciat, duas se addere Indicæ huius plantæ imagines: Sed has in dictis commentariis nondum videre contigit.

Camerarius in eius Hist. germ. eadem tradit, ac duo genera tantum pingit, licet tria esse referat. Sed in Epit. duo picta duntaxat agnoscit. Videtur autem huius flores simplices pingere secundo loco, hac inscriptione: Caryophyllus Indicus minor: Italis, *Garofano Indico minore*. Est hic Matthioli in commentariis dictis, Tertium & postremum Garyophylli Indici genus, siue minus, floribus simplicibus foliorum coronameto. Camer. hort. Flos Indicus minor flore simplici. Tagetes, siue Africanus Flos.

An Dodonæo ritè perspectæ sint species Floris Aphricani considerent lectores. Ait is in H. Gall. Flos Aphricanus, Flos Indianus, qui Galli vocatur *Oeillet d'Inde*, Belg. *Thunis bloemen* videtur doctis quibusdam Othonna Dioscoridis. In foliis huius floris, si Soli opponantur, obseruari ferè possunt, quæ Diosc. de Othonna dicit, Duplex huius inuenitur species. Maior est altitudinis octo aut nouem pedum: colore Arantiorum saturatiore parte superiore, inferiore pallescente: florer primum Augusto. Minor incipit florere April: & adhuc Maio, deinde tota *Aestate*, maior omnino similis, caulibus, foliis, floribus & semine, nisi omnino minor esset, nam non multum altior pede exurgit: ambæ tum foliis, tum floribus odore sunt ingrato valde. Dodonæus eadem de Florib. & Hist. lat. in fol. habet, ac addit. Inter Calthas numerandus videtur Flos cognomento Aphricanus. Huius duæ species: vna minor, altera maior, erecta, ad tres, vel amplius cubitos assurgens: folia vtrinque cribri modo Soli aut luminis opposita, perforata cernuntur: flores ex octo aut decem foliolis congesti, inferius lutei, superiore verò parte in ful-

uo rubentibus, & obscurè rubens villosum holofericum æmulantibus: Est vtraque species cum foliis, tum floribus grauius odorata: vtriusque etiam flores, sed maioris frequentius subinde multiplicantes: quorum foliola ab vtraque parte lutea vplurimum: Sunt qui velint Plinii Petilium lib. 2. cap. 8. Sed Petilus flos est autumnalis, circa vepres nascens. Andreas Lacuna Othonnam herbam esse suspicatus fuit, cum cuius tamen descriptione haud per omnia iste flos cõuenit: nisi fortè squalidior, & paucioribus foliis, similioribus Erucæ, manifestiusq; perforatis, in Aphrica quàm in Europa nascatur. In hac enim amplius floribus, foliis Tanacetæ, quæ Erucæ similioribus, istisq; non verè perforatis, sed quæ talia luminì opposita tantummodò apparent, gignitur. Et non rarò euenit, vt feruenti, calida siccaque regione: ex sterili aut inculto, & aprico solo, in humidius, cultiusq; vbiq; cælestium elementis, translatæ stirpes luxurient. Nam solij cælique mutatio, ad stirpium mutationem plurimum habet momenti, & maximè accedente culture mangonio. Quæ tamen an tantum potuerit, vt florem hunc totum penè transformauerit, expendèdū relit quinus. An Lycopersium, cuius Gal. lib. 4. de simpl. med. facult. meminit, sit Flos Aphricanus definitè absolute non potest. Videtur tamen illi, si non idem, similis: folia etenim, & præsertim flores graui admodum & ingrato prædita sunt odore, qualitateque venenosâ, Cicuta proxima. Cuiusmodi autem expressus & resiccatu succus, nondum quidem obseruasse, nos confitemur: vero si nile tamen est, ex floribus haud alterius, quàm flauis, aut sublutei coloris, & graueolentem futurum. Et hinc non audiendi sunt ii, qui hanc Tanacetæ, vel Artemisæ speciem, aut innoxiam stirpem fore autumant. Et hæc Dodonæus, qui olim in Hist. gall. proposuit figuram Fuchij, quam proponimus pro minore flore pleno. In postremis exhibet iconem Lobelij, cui titulum fecit, Floris Aphricani, vbi etiam proponitur pro minore.

Cord. in Hist. Tanacerum Peruvianum appellat, ac flores ab aliis Caryophyllos Indianos, ab aliis Indianas Rosas vocari ait: Inibi annotatum est Petilium aliquos suspicari. Videtur autem Tanac. Peruvianum appellatum à similitudine Tanacetæ, & Peru Amer. æ provincia, ex qua primum in Europam allatus hic flos à Germanis creditus est.

Gesf. de coll. stirp. fol. 77. Florem Portugallicum nominat, vel Indicum minorem. Idem de hort. Florem vel Caryophyllum Indicum vulgò dictum ait Punicâ lingua si bene meminert, *Pedua* vocari: esse vnum minorem flore simplici. Videtur autem in Cat. pl. fol. 10. Caryophyllum Portugalliæ appellare Violam, ac tradere esse Scopam regiam Plinii, violentum spirantem odorem, &c. Hoc confirmat p. 13. vbi ita scribit. Violam flammeam eandem esse Scopæ regię existimo: dicitur hodie Flos Indicus, aut Portugallensis, *Fleurs ou Girofles de Portugal*: cuius duo genera, alterum minus, alterum valdè procerum. Illi autem non placet, die *Eden blucmen Portugal* (Portugalliæ flores nobiles dixeris) quosdam Othonnam suspicari.

Et hunc Lobelius, vt hanc censuram non mereretur in Aduers. vocat Othonnam Italarum, & hoc titulo pingitur in Obs. p. 410.) & Florem Aphricanum (& hac inscriptione extat in Ic. Plant. p. 13.) ac querit an sit Lycopersion Galeni Nam

cum sit calidus gustu, inquit, vix opinionem Othonne tueretur.

Florem Indicum alterum minorem vulgò appellatum inter autumnales flores, Cæsalpinus Anemonæ Dioscoridis conuenire tradit, & quidem radice potius, quàm Argemoniæ Plinii.

Tabern. Icon. & Hist. dicitur Flos Aphricanus minor flore simplici: & sic etiam Gerardo.

C. Bauh. phyt. Tanacerum Africanum, seu Flos Africanus minor, quem ait variare magnitudine & flore di tempore: esseque flore simplici, hosque reperiri rubros, croceos, mellicos, & albos.

Tagetes siue Caryophyllus Indicus, siue Flos Aphricanus in genere dicitur Germ. *Indiansch Nâgelen* *Sammertblumen* (quan Flore tholosensium) *Indiansch bloemen* (Portugalliæ) *bloemen*: Brabantis, Flandris & Belg. vulgò *Thunis bloemen*: Flos Tunetanus. Gall. *Ouille d'Inde*: Genue *Flour de R. mer Ital.* *Gar. Jan. Indica*: Boh. *Karassilar* *Indyâstf*.

Tagetem Indicum minorem flore simplici habemus Montbelg. in horto Ill. C. W. Montbelgii florentem obseruauit Iunio in hortiis, Genue & Basileæ: In horto Ill. E. C. Gæppingæ, & in Boll: ac in horto adm. balnei. Apud Belgas, Germanos & alibi, teste Dodonæo, in hortis colitur. In Africa plerisque locis spontè prouenit: vnde primum in has regiones inuectus: quod videret Carolus V. Romanorum Imperator apud Tunetum celebri poritus esset victoria: ex quo illi & Africano & Tunetensi cognomen.

Tagetes Indicus minor multiplicato flore.

Alterum Tagetis minoris genus contractione habitu, facilitè à maiore separatur, cum quo tamen flore multiplice ei conuenit, minore nihilominus, & colore speciosiore picturatur, vt prædictum genus.

Gesf. de hort. dicitur Flos, vel Caryophyllus Indicus minor flore multiplici. Math. in Hist. germ. Caryophyllifecundum genus, *Indiansch Nâgelen*.

Fuch. Tagetes Indicus, Artemisæ genus quartum, floribus luteis, & Croci ferè colorem referentibus, elegantia nulli akercedentibus.

In edit. Lugdunensi anni 1551. huius figura est sub falso titulo pro Artemisâ tenuifolia, quæ eadem pro Tagete Indico ponitur.

Tabern. Icon. & Hist. Flos Aphricanus minor multiflorus, *Enfult Sammet* / oder *klein gesfalt Thunis blucmen*. Icon Tabern. melius placet pro Flore Aphricanæ medio à nobis descripto.

Gerard. Flos Aphricanus minor multiflorus, *The Smalest Double Africane Marigold*.

Habeo in horto E. C. Montb. ex semine à me collecto Stutgardæ, & aliis in locis. Genue vidi florentem in horto Celsi Curionis mense Iulio: Tiguri in ollis mense Septembri, Octobri & Nouembri.

TAGETES INDICVS MEDIVS FLORE
luteo pallido.

Medio se modo habet inter Maiorem Minoremque: *flos* grauius odore cum vtriusque conueniens. Verum huic *flos* denso foliorum agmine stip. tus, pallida flauedine exceptis

extimis foliis intensius coloratis) tinctus est, haud secus ac Maior, quo tamen ut minor, ita & praecocior est, *caule* minus recto praeditus.

Hunc habeo Montbelgardi in horto E.C. collectum Sturgardiae, flores citius quam maior, rosa minor, maior tamen quam in priore minore, colore ab eo etiam diuerso, nempe pallido, simili maiori, caulis non ita rectus nec magnus, ut in maiori.

TAGETES MAXIMVS RECTVS FLORE
simplici ex luteo pallido.



Sper sunt
Sdae maxi-
morum spe-
cies : prior
praeditos om-
nes procerita-
te superat, nō
alia ferens
interim *flor* :
flor simplice
contentus fo-
liorum agmi-
ne multis nu-
meris maior,
ē calyce quo-
que maiore,
ex luteo pal-
lescit, minus
amoenus quā
Minoris sim-
plicis.

Trago for-
tē hist. Germ. Caryophyllus Indicus maximus,
das allerhöchste Indianisch Tagete.

Casalp. Flor. Ind. vulgō, Othonna Dioscori-
dis, Othonne Plinii.

Camer. hort. Flor. Indicus maior flore pleno
& simplici.

Tabern. Icon. & Hist. Flor. Aphricanus maior
simplici flore, groß Chünia bluem einfach. C.
Bauhin. phyt. Tanacetum Africanum 3. siue ma-
ius simplici flore. Gerard. Flor. Aphric. simpl.
florē, the great simple Frank Marigold.

In horto Montbelg. ex semine Sturgardiano,
olim & aliis locis ut Basilea, & Gœppinge.

TAGETES MAXIMVS RECTVS FLORE
maximo multiplicato.

Descriptio

Tandem succedit maximus ille ferotinus,
humanam proceritatem aliquando superās,
caule recto, rigidoque : flores lutei pallidi, innu-
meris stipati foliis tanta amplitudine ut volam
manus contegant.

Gesf. de hort. dicitur Flor., vel Caryophyllus
Indicus flore multiplici.

Matthiol. in post. comm. cum mag. fig. Caryo-
phyllorum genus 1. siue procerius, floribus aureis
magnis, numerosis admodum stipatis foliis. Sed
considerent lectores, an huic conueniat, quod
ait Matthiol. flores lutei holoserici charmetini.

Camer. ad Matthiol. germ. Caryophylli Indici
1. floribus magnis, nullo malo odore. In Epit.
Caryophyllus Indicus, It. *Garofano Indiano*, Ger-
go *Garf dossen* / vel *Indianisch Nâglen* / o-
dore minus graui.

Haec pingit Lobelius in Obs. p. 410. & in I.
con. Plant. pag. 713. hoc titulo : Othonna maior

polyanthos.

Tabern. Icon. & Hist. Flor. Aphricanus maior
aurcus multiflorus, Groß goldgel Chünia
blum. Item: Flor. Aphricanus maior, Groß ge-
fult gel Chünieblumen. Cur duas icones pro-
ponat nescio. Eadem etiam exhibet Gerard. his
inscriptionibus : Flor. Aphricanus maior poly-



anthos, the
great Afric-
cane double
Marigold. I-
tem : Flor. A-
phricanus
maior, mul-
tiflorens : the
finer dou-
ble Africane
Marigold.

C. Bauhin.
Phyt. Tanace-
tum Africanū
2. siue maius
flore pleno.
Icon. Matth.
Caryophyl-
lus Indicus
maior.

Hunc se-
pius in horto
E. C. Montb.

habui & me seminatum, accepto semine ex diuer-
sis locis, ut Sturgardiae ex horto Illi. Ducis, ubi ex-
crescebat ad altitudinem hominis & ultra.
Genevæ vidi florentem mense Octobri, & No-
uembri. Seritur in hortis colitur in fistilibus, &
arcibus spectandi gratia. Tagetem vidi transplā-
tatum Sturgardiae Iunio, quem cum limaces vo-
rarent, calcem in circuitu sparserunt, quo reme-
dio vtuntur in aliis etiam plantis & limacibus
conseruandis.

Odor huius plantæ, auctore Trago, nec non
gustus eius calidē illum qualitatis participem ef-
fle arguunt. Nonnulli male feriat homines pre-
ter omnem rationem & experientiam de eo ini-
quos spargere rumores non sunt veriti, distan-
tes leprolos eos fieri qui herbam eam secum ge-
starent. Excalfacit & siccit, inquit Matthiolus,
quo fit, ut is quoque in medicum vñ trahi pos-
sit, ubi abstergere & aperire sit opus : Minor va-
lentius id præstat quam maior. Venenota autē
& refrigerandi potentia, florem Aphricanum
donatum esse, odor ingratus, caput aggrauans,
Cicutæ similis, qualis Lycoperii succo, ostendit :
deinde & experimentis nonnullis constat. Meminit
etenim Dodonæus in puero, qui flores mandere
inceperat, labia & os inflata se videre : sicuti crebrō iis accidit, qui Cicutæ
fistulis ludentes aut modulantes, intral ab iaceas
aliquandiu continuerunt. Feli etiam flores cum
calycibus, recenti caseo permistos olim dedit :
quæ mox valde inflata, & paulō post mortua
fuit. Mures quoque qui semen arroserant, mor-
tui feruntur reperti. Quæ omnia venenosam &
deleteriam huius herbæ facultatem ostendunt : &
non audiendos esse eos qui hanc Tanacetum vel
Artemisiæ speciem, aut innoxiam stirpem fore
autumant.

CHRYSANthemVM VETERIBVS.
CAP. III.

X *Πουλθιον* aut *χρυσανθον*, nonnullis *βερβερνικον*, te-
nera quædam herba est auctore Dioscori-
de.

de, sed fruticis specie, quæ laues profert *caules*: folia multifida: flores melinos vehementer splendentes velut oculum in orbem circumactum; quare ita nominata est [*ἡ ὀφθαλμοειδὴς* Matth. hæc demenda vult vt translata ex capite Bupththalmi.] Nascitur circa ciuitates. *Caules* iplius oleru. n modo eduntur. Flores triti cum cerato, Steatomata discutere dicuntur [Quæ sequuntur vult etiam Matthiol. demenda, vt translata ex capite Bupththalmi] ipsa herba pota in balneis, post exitum de folio, morbo regio correptis breui bonum colorem inducit.

Plinius Chrysanthemum seorsum non meminit, nec Galenus, nec posteriores Græci Medici. Quæ verò Dioscorides de hoc prodidit, ea omnia de Bupththalmo Plinius tradidit, hic saltem Cornario teste, aliis verbis vsus: quare hoc loco suppositum esse hoc caput videti possit.

Et hinc non desunt, qui credant Bupththalmum & Chrysanthemum vnam & eandem esse plantam, quòd paribus notis inter se certare videntur; tamen si particulares quædam notæ in vtrisque diligenter expendantur, facili inter has plantas discrimen aliquod notari deprehendetur. Quòd cum optimè sciret Dioscorides, diuersis libris, diuersisque capitibus de his speciatione differuit. Quod vtrique minimè fecisset, si comperit habuisset, nullam inter eas intercedere differentiam. Quæ tamen hinc cognosci potest, primum quod Bupththalmo folia insint feniculi similia, quæ planè capillaria constant: Chrysanthemum verò multifida. Deinde Chrysanthemum caules in cibus mandi alioru oleru modo scribit Dioscorides: id quod de Bupththalmo agès silentio præterit. Præterea flores Bupththalmo reddidit Anthemidi similes: Chrysanthemum verò luteos, & vehementer splendentes. Cæterum de horum viribus differens, Bupththalmi flores, cum cerato tritos, tumores, duritiasque discutere tradidit in vniuersum, & affirmatiue locutus. Verum postea de Chrysanthemum scribens, huius flores, inquit, steatomata discutere produntur, particulariter, & dubiè locutus. Hæc sanè harum plantarum manifesta discrimina faciunt, vt credam, inquit Matthiolus, quòd aliquis antiquoru curiosus, nimisque sciulus Bupththalmum & Chrysanthemum vnam tantum referre plantam fortè existimans, omnia in Chrysanthemum adiecit, & confuderit, quæ libro tertio de Bupththalmo memoriæ prodidit Dioscorides.


Chrysanthemum suum habet Matthiolus, quod ait nulla prorsus reclamante nota cum Dioscoridis Chrysanthemum conuenire. Inscribitur hoc à nobis Chrysanthemum segetum.

Chrysanthemum multorum doctorum hominum iudicio Calendula siue Caltha nostra est. Chrysanthemum sunt qui velint eum esse florem quem Germani, inquit Cornarius, *Schmalgblumen* vocant. Plinius Elichryson à quibusdam Chrysanthemum vocari dixit. Chrysanthemum chamomillam postremam Dioscoridi dictam existimat Tragus lib. 4. cap. 86. esse Cotulam non foetidā, seu Chamæmelum inodorum. Chamomillam tertiam inquit Tragus lib. 1. cap. 47. vulgarem Dioscorides Eranthemum & Chrysanthemum vocat. Quod Chamæmelu aureum peregrinum capitulis sine foliis inscripsimus, ait Dod. latinus esse Chamæmelum Dioscoridis, & Galeni præteritum & ignoratum. Arthemisia in ascript. Dioscoridis apud Gesnerum Chrysan-

themum cognominatur. In Aduers. Lobelii Arthemisia marina Noeticorum [Iacobæa marina] Chrysanthemum appellatur. Caryophyllos Indicos posse esse Chrysanthemum genus concedit Matthiolus germ. lib. 4. cap. 61. Chrysanthemum nomen attribuitur à Dioscoride & Plinio Heliochryso, & hinc vocant Lob. & Pena in Adulsum Heliochrysu Chrysanthemum. Chrysanthemum Democriti Dod. de purgantib. lib. 4. cap. 2. Vnguem aut Pedem Leopardi vocat. An Ranunculus rebus non repens? Ranunculum dulcem, seu pratensem (Ranunculum repentem non acrem) Tragus lib. 1. cap. 31. Chrysanthemum Democriti vocat. Non placet pro Chrysanthemum apud Lonicer. lib. 5. cap. 65. *Goldwissen blumen*, *Mosblumen*. Est enim, nostro quidem iudicio, Caltha aquatica. Chrysanthemum apud Gesnerum in ascript. Dioscoridis Chrysocome vocatur. Chrysanthemum apud Dioscoridem dicitur de Chrysocome inter reiectanea, quam nescio quā occasione sibi Tragus persuasit esse Fabam inuersam, seu vt nos vocamus Anacamperes. Chrysanthemum inter spuria Dioscoridis dicitur de Aizoo maiore, hinc fit vt Tragus inter nomina, Sedo maiori attributa habeat.

CALTHA.

Caltha flore simplici.



Caltha flore pleno.



A Vreus
florum Description
splendor, antequam utilitas comperta esset, nobilitauit: qui omni auro saturatus ruffescit, Chrysanthemum segetum forma, non vt illud è squammaro capitulo sed calyce multifido hirsuto prodeuntes, odorati, disco luteo vel fusco, semine relicto incuruo duplici, granulis quodam modo asperato: *caules* tenues, nonnihil angulosi, hirsuti, & tactu nonnihil viscidii: *folia* linguæ formæ, sine pediculis, oblonga; pinguis, hirsuta, incana, gustu herbaceo; mox calidiuulo: *radix* lignosa.

Flos interdū alios parit in ambitu, matre minores, in N 3

Chrysanthemum segetum.
Caltha.

Elichryson.

Chamæmelum inodorum.

Descriptio

Caltha prolifera.

Mollia luteola pingit *Vaccinia Caltha*.
Columella verò in hortis libro decimo his
verbis.

Candida Lencioia & flauentia lumina Calthæ.
Plinius autem l. 21. cap. 6. Caltham etiam gra-
uiter odoratam esse ait, qualis in totum Calen-
dula est, quæ ut diximus, cum grauiter quadam
odorata, & auri colore luteo splendet.

Cæterum plurimum errare rectè videntur
Synonyma Ruellio, qui Solisiam vulgò dictam, aut officinam
Calendulam, aliquibus Solis sponfam, Heliotropi-
on esse censent: namque et si flos ortu Solis
aperiatur, & occasu claudatur, vnde Solle-
quia, vel Solis sponsa, quòd exspargiscatur & oc-
cubet crepusculis sopita, ac desiderio quodam
redeuntis syderis excita perditur, quasi fœdere
quodam amoris, intueatur Sol, ob idque amica So-
lis aliquibus dicatur: nihilominus, flos qui ei
luteus est, prorsus reclamare cognoscitur: nam
Heliotropio candidus tribuitur. Nec de flore
sed folio circumactus ille traditur. Siquidem
lutei flores omnes ferè, splendore Solis illecti,
Solem sequuntur. Folia quàm paucissima vides So-
lis cursum imitari, nisi Malua & perquam pau-
carum, quarum ratio superius nobis est reddita.

Nec folia Solsequiæ Ocimi foliis respondent,
aut aliqua germanitate iunguntur. Repugnant
item floris natales dies, singulis enim ferè men-
sium Calendis florere deprehenditur, inde vulgò
Calendula dici multis putatur: Heliotropium
verò Solstitio tantum florere scripsit Theophras-
tus, cui experimentum suffragatur. Item flores
huius Calendulæ patentem in amplitudinem de-
hiscunt, Heliotropii veri in caudæ Scorpionis
speciem contorti curuantur.

Scorpioides herbula, Scorpiuron & alio no-
mine Tricocon dictum Calendula vel Solsequia
dici non potest.

Scorpioides speciem Calendulam nominatam
haud dubiè esse censeret lib. 4. in Dioscor. c. 187.
Marcbiolus, si folia, sicuti semen, Scorpioidi re-
sponderent. Verum cum Scorpioides foliis pau-
cis, hæc verò multis, longique profiliat, si falli
apertè deprehenduntur, qui in hac opinione ver-
santur. Ipsi porro, ut Ruellio, plurimum errare
videntur, qui censent esse Heliotropium, maius:
namque omnes prorsus illius notæ huic reclama-
mare deprehenduntur. Neque eorum opinio-

pediculis tri-
cute longiorib.
hirsutis, folio-
lis aliquot acu-
minatis. Inter-
dum maximus,
plenus, volam
manus ferè im-
plens sub quo
rudimèta par-
ua aliorum flo-
rum.

Hanc Cal-
tham veteres,
Virgilius &
Columella, o-
stendunt esse
florem luteum
aut flauum co-
lore. Virgilius
quidem in Ge-
orgicis Aeclo-
ga secunda,
sic scribens.

ni illud quicquam addit, quòd huius Calthæ se-
men, quadatenus Scorpionum caudicalem refe-
rat, quoniam Dioscorides Heliotropii florem, nò
semen, Scorpionis caudæ eihgimè repræsentare
scripsit. Recentiorum sententia non audeat sub-
scribere, aut refragari, quia Calendulam vocatâ
Virgili & Plinii Caltham existimant, hoc argu-
mento nixi, quòd flores aureos luteosue prote-
rat. Id quod nobiscum sentit Dodonæus meri-
tò negans cum Marthiolo esse Heliotropium, aut
Scorpioides.

Caltham Theod. Dorsthenius, Ôrtho Brüsels.
& Hier. Tragus Caput Monachi appellare viden-
tur, quòd flore decedente, capitulum, Monachi
caput exprimens, relinquatur.

Hermolabus, ut legitur apud Tragum, scribit
se quondam vidisse in Dioscoride peruerulo de-
pictum Leontopodium, càmque picturam cum
Calendula conuenire, vnde eam Leontopodium
esse affirmat. Manardus putauit illam esse Lys-
machium Dioscor. Iacob. Manlius herbam blâ-
cam vocat. Mattheus Syluaticus, putauit eam
esse herbâ Paralyticos. Alii Heliotropion, Spon-
sâ Solis, Solsequium, seu Verruciam appellant, at-
que hi quidem maiori in errore versantur.

Tragus in re clara & aperta maximè hæsitat.
Calendulam enim à Dioscor. lib. 1. descriptam, &
Catanances alterum genus esse existimat, & no-
menclateras spurias pro Catanance propositas,
more suo recitat.

Manardus porro, quam Lysimachiam esse ali-
quando suspicatus fuit, Omnium mensura florè
vulgò appellari tradit, German. Ringelblumen/
i. e. Circularem florem, à semicirculo, quem se-
men refert, vel quòd ad Solem circulariter nutet.
Et idè Dorsthen. Solarem, aut Solsequium aut He-
liotropium appellari ait à quibusdam, sed adhuc
incertum esse quo nomine apud Græcos & Anti-
quos vocata sit, Anguillara licèt dicat in epist. 12.
Calendulæ meminisse Galeum de Dynamis.

Nondum constat, inquit Turnerus, quo nomi-
ne fuerit Græcis appellata: difficile enim est re-
perire. ex profecto factum de ea aliquam mentio-
nem: tamen si meminisse video eius Dioscoridè
in descriptione, ubi Ruellii versio habet, Chrys-
anthemon aut Caltha nonnullis &c. Quæ si nò
vera esset lectio, certò possemus Græcum voca-
bulum scire. Nam præterquam quòd ipsum ef-
fer Græcum vocabulū, nominaretur etiam Chrys-
anthemon. Sed meus græcus codex à Cornario
editus, legit Chalcas, ut Ruellius vertit Caltha.
Quo fit ut dubitè, vtrum eius meminerint Græ-
ci ac non? Nam Chrysanthemum (Angl. Gold-
floure), itam potest Chalcas ab æneo colore vo-
citari, ac Bupthalmos à bouini oculi similitu-
dine. Cæterum Caltha reiuuè à Latinis describitur.
Virgilius solum Luteolam nominat: Plinius
inter Violas luteas, aliòque flores luteos re-
censet, atque odore esse grauem. Ex quibus locis
concordari tantum licet nostrum Marjgolde ef-
fe Latinarum Caltham.

Caltha Poëtarum, Chrysanthemum oculatum
verius Dioscoridis, Calendula Officinarum, Ka-
lédula nostras, aiunt Aduersaria, quin sit Poëtica
Caltha nullus neget, qui in Georgicis Luteolam
Caltham, & in Plinio grauiter odoratam leger:
Columella autem Bupthalmum hunc innuere
videtur, ubi laudentia laia ina Calthæ, canit, nepe
aureum rutilumque flauorè, & orbem circinnat-
um, vinbonè que in centro extante conspicuo, lu-
minis, siue oculi, in speciem. Vnde Calchan, id
est, hianulam & apertam dixerit: sicque Cal-
tham.

tham putet quis decifam à Calatho, qui Latinis, Seruio teite, poculum & calix est, cuiusmodi ostentant singulis ferme Calendis Calendulae florum pocula hausa: cuius & nos sumus sententiae, &c. Lobelius in Obseru. p. 199. figuram habet ac dicit, Chrysanthemum Dioscoridis, Caltha Poëtarum, forè Gromphæna Plinii. In Icon. plant. p. 522. Chrysanthemum & Caltha inflexis (plenis) floribus.

Gefn. hort. Calendula vulgò dicta, flore simplici, & alia multiplici, Caltha hortensis. Circa Montspeliū suae spontis.

Tabern. Icon. & Hist. par. 2. nouem Calthas pingit: Quas licet in fatiūm & suae spontis, siluestrem suae aruensem, distrahatur, quam nono loco ponit, atramen spontaneam à cultiua folio duntaxat minore, differre scribit. Inter fatiūas autem hoc discriminis tradit, quod alia sit flore simplici, qualem primo loco exhibemus, quae cum eius Calendula 6. siue fatiua conuenit, & alia flore pleno, qualem secundo loco damus, ad quam referimus eius Calendulas quinque priores: Calendulam sc. multifloram maximam 1. Groß gefult Ringelblumen; Calendulam maiorem polyanthon flore aureo 2. Groß golteel gefult Ringelblumen; Calendulam polyanthon flore aureo 3. golteel gefult Ringelblumen; Calendulam fatiūam polyanth. melinam 4. hamgeel Ringelblumen gefult; & Calendulam multifloram orbiculatam 5. Rundgefult Ringelblumen. Quod praeterea alia sit prolifera, qualis est quae vltimum siue tertium locum possidet. Et haec respondet eius Calendulae 7. & 8. siue prolifera 1. & 2. Sufficiens sane tres figurae, vna flore simplici; altera pleno, & tertia prolifera.

Dictarum nouem Calendularum meminit & C. Bauh. phyt. distinguens eas vt Tabernamontanus, eius etiam sequutus logomachiam.

Caltha, à Recentioribus Calendula dicitur, quod ferè singulis mensium Calendis florere conspiciatur. Germanis Ringelblumen/ ab intortio, & in circulum acto femine: Belgis Goutbloemen ab autū amulo floris colore: Gallis Soucis siue Soucie. Angl. Marygold. Valeriol. de pest. Gaues aut Gaucher, Calendula vel Caltha. Ital. Fiorancio, siue Fior d'ogni mese, ob colorem aureum Mali Aurantij. Boh. Mefycef. Hung. Teuz veragy/ h. e. Flos ignis.

Caltha quidem à Matthiolo, Trago, Fuch. Turn. Lonic. Dalechampio in Plinium [à ceruo ipsius flore Cerinthē putat] Chrysanthemum & Bupthalmum Dioscoridis. Caltha Poëtarum, Lugd. Calendula, Brunfels. Dodon. gall. & in fol. Asquill. Camer. Calsp. Clymenum Dioscoridis Fabio Columnæ.

Montpelij Caltha passim sponte prouenit in agris & hortis toto florens anno etiam hyeme, Batilex flore simplici & denso in hortis florer luno, Iulio, Augusto, Septembri. Geneæ flore simplici abundat in hortis florens mense Octobri, Nouembri & Martio ex reliquis hiemis: eandem habent etiam flore multiplici florentem Aprili & Maio. Lugduni abundat in hortis: Bononiæ vidi cum flore Aprili in orto di Saluador alborgo di S. Catharina. Parmæ etiam florentem Aprili: Patuij in hortis. Montbelgard habemus in hortis vt E. C. flore simplici medio lueo, & alteram medio siue floris discoloro: & magno flore pleno: prouenit mihi in Horto Ill. E. C. flore magno pleno reforescens,

id est, ex vno flore alios multos producens: Semina etiam collegi Sturgardiae in orto Ducis Calthæ flore maximo pleno.

CALTHA MINIMA.

Caltha minima, coliculos emittit vnciales aut obteuiōres, tenues: quorum singulis flosculus infidet Calthæ, exiguus, luteus, ex calyce folioso viridi: folia Linariae, angusta, semunciam longa: radix simplex tenuis, coliculo longitudine par.

C. Bauh. in phyt. Caltha 8. siue humilis. C. ruscifolia. Lectus:



inquit, copiosè ad flumina non longè Lutetia vbi vixdum reperias vllam, quæ quatuor trāuersorum digitorum altitudinem adquet. Sic & frequentior est non ramosa.

Aqua ex floribus Calendulae praesentaneum adeoque expertum remedium praestat oculorum rubori & inflammationi.

ni instillata mane vespèrque, vel si linteoala in illa madefacta oculis imponantur: flores in puluerem redacti inque vellere dentibus inditi, dolorem illorum sedant: flos perinde atque ipsa herba secundas educit minifec, si aridus suffribus admotus fuerit. Haec Tragus, cui contrariatur Marth. dicens, Calendulam in Hetruria passim acetariis adhibent, gustu adstringente, cum quadam leuiscula amaritudine: ex quo non video, quomodo hæc; vt quidam scriptis tradiderunt, menses ciere possit, nisi id fortasse fiat ab occulta quadam facultate. In Germanica tamen Camerarii editione, Trago subscribit. Ibidem Camerarius ad angustias thoracis commendat; ad icterum, cordis palpitacionem, praesertim verò iuueniculis quibus menses substerit, appetentiam reuocare tradit: aquam autem stillatitiā ad pestem valere: succi etiam vncias duas, Alexandrum Benedictum exhibere, vehementer enim sudores ciere. Dodonæus florem taxat ad secutundum ferè ordinem calidorum, praesertim si siccatum & aridum; creditque cor corroborare: herbæ autem folia calidiora esse, acrimoniam enim quandam feruidam habere, sed quæ propter humiditatem ei coniunctam non protinus se exferat, ratione cuius in olere sumpta, alium mouere & lenire.

Calendulae aquam Brunsvicensis omnibus oculorum morbis conducere asserit, siue à calore sint siue à frigore. Tollereque dolores capitis omnes. Suffitum ex illius floribus siccis & accensis, per vulvas receptum secundas morantes extrahere. Praescribit Arnold. in quodam med. ad Epileps. radices Calendulae, si Caltha in-

intelligit, non videmus, ad quid inutilis radix præscribarur, & non potius flores aut folia. Sælem fieri ex Calendula ad multos supra dictorum vsus & Oleum videre licet apud Tabernamontanum.

CHRYSANthemVM MAIVS FOLIO
valdè laciniato, flore croceo.

CAP. IV.

Descriptio



accepto: flores è squarrososquammatouè capitulo, Bellidis maioris, colore aureo, vmbone è caucolis planam superficiem efficientibus, croceo. Figura nostra ex Fuchσιο non in omnibus placet.

Errant, vti dictum cap. 3. de Chrysanthemo Veterum, qui credunt Bupthalmum & Chrysanthemum vnam & eandem esse plantã. Chrysanthemum, inquit in prioribus commentariis Matthioli, cui omnes Dioscoridis notæ conueniunt, frequentissimum prouenit in Senensi agro prope Montem nigrum oppidum appellatum, esturque ibi à rusticis veluti Beta & Brasica. Credit Fuchsius in suo plantarum Historia commentario, Chrysanthemum illud esse Ranunculi genus, quod folio Apii, luteis floribus, in pratis plurimum nascitur. Qua in opinione quantum, pæce eius dixerim, hallucinetur, euidentius omnibus esse puro, quam vt à nobis ostendi debeat. Hæc ibi Matthiolus, qui figuram maioris Chrysanthemi folio magis secto exhibet. Eandem etiam habet in post. comm. cum mag. fig. Lat. & It. & Hist. Germ. vbi Chrylathemum, Germ. Goldblum, & Boh. žlatý fiver vocari scribit. Camerarius autem in suo Matthioli germanico mutauit figuram & posuit duas. Vni titulus est Chrysanthemum: alteri Chrysanthemum minus. Idem in Epit. Matthioli. ambo etiam exhibet.

Anguill. epist. 14. p. 265. Chrysanthemum notissimum in Italia, potissimum in Ileruria, & in orto publico Patauino.

Hist. Lugd. p. 873. Chrysanthemum Matthioli. Lonic. lib. 5. cap. 65. Goldwisen blum / Schmalz blum / Noßblum / Matrublum / Oratblum / gel wisenblum / Dotterblum / χρυσάνθεμον: Gall. Marguerite, quod nomen non placet. Lacunæ dicitur Chrysanthemum & Caltha. Tab. Icon. & Hist. Chrysanthemum Matthioli, Chalcitis.

Chrysanthemum, cubitum aut sesquicubitum, duos, tresue equat caulibus teretibus & leuibus: è radice nonnihil obliqua, fibris multis capillata, lignescēte: folia sine pediculis caulis eiusque alis adnascuntur: Matricaria ferè diuisurã, pinguia, tenera, sapore oleraceo, quam non ita

C. Bauhin. Phyt. Bellis 3. siue lutea foliis profundè incisus maior: variat folio, altera enim magis virente & plùs diuiso, altera folio magis creruleo & minùs dissecto. Item Bellis 4. siue lutea foliis profundè incisus minor, Camer. in Epit. minus.

Chrysanthemum vidimus Tiguri apud D. Gesnerum vt & apud Fuchsium Tubingæ, ac etiam mense Februario virens in orto Patauino: Mötbelgardi in orto Ill. E. C. mihi prouenit è semine Stutgardia misso nomine Chrysanthemi Panonici, quotannis se propagat ex semine decido: est enim annua planta.

Locus & Tempus

CHRYSANthemVM CRETICVM
duplex.

CAP. V.



Semine Creticâ misso, & Clusio nata, hæc duo elegantia Chrysanthemi generi, nec ab alio prius descripta: quæ cum annua sint, & decido semine spontè renascuntur, facili suum genus conseruant.

Habet autè primum cubitales aut aplores caules, latis crassos, striatos, intus fuf-

gofos, in multas alas diuisos, & frequentibus foliis breui petiolo inæqualiter nascentibus ornatos, quæ in varias & profundas lacinias diuisa, eas denuò valdè dissectas habent: extremis caulibus & ramis innascuntur ampliores: è squammoso capite prodeuntes, duodenis aut pluribus foliis constantes satis latis, flauis coloris, & latiusculum discum ambientibus: flori utrunque odorato succedunt capita è multis inæqualibus longiusculisque seminibus compacta. Non minùs fruticosum minùsue altum est Alterum genus: minùs tamen crassos habet caules, fungolos & striatos, etiam illos quos ambiunt folia non adè dissecta, sed in minores lacinias & rariùs incisas diuisa, propius ad Chrysanthemum segetum accedentia: sustinent extimus caulis & rami squammati & quali imbricata capita, è quibus nascuntur flauis flores, totidem quot in primo foliis constantes, angustioribus tamen & medium orbem aureum cingentibus: quibus etiam succedit seminum simile, sed aliquantum minùs. Quantum autem differant hæc Chrysanthema Clusii à præcedentibus à nobis traditis Chrysanthemis considerandum.

An Honor. Bello epist. ad Clus. ex Creta Cydonia, Chrysanthemum, uti, id est, quod à rusticis editur, ipsi tamen sapore & odore parum probatur, licet in multis cum legitimo conueniat.

CHRYSAN-

CHRYSANthemVM FOLIO
minùs secto glauco.

Descriptio Plurimum cum Chrysanthemò segetum conuenit, sic vt ex eo annotatis differentis minime difficultis sit futura huius cognitio: nam, vt à flore, qui maximè oculos afficit exordiar, is squamato calyci vix dæti infidet aureus, Chrysanthemum, disco granulato concolori: *radix, caulis*, sapor idem: *folia* verò glauco Ceterinthæ colore aut Glasti, oblonga, pinguis, polita, & magis leuia, minùs laciniata. Idem in hortis altius excrefcens quàm præcedens, denique tota minor & delicatior planta; Figura quam ex Fuchfianis apponimus vt verum fatear non in omnibus placet.



Lobel. in Adu. & Obl. Chrysanthemum segetum folio multifido, Germ. Geyßblum, Belg. Geel gånse bloemen, & Vogelauw. Adu. 237. perperam quorundam Bellis lutea. Icon. plant. & H. Belg. Chrysanthemum segetum: Anglis Golden flower aut wild Marygolde. An Lob. agnouerit discernere

Chrysanthemum vt agnoscimus nescio; figura quæ habet demonstrat nostrum flore glauco, fortè vtrumque intelligit.

Dod. gall. Chrysanthemum dicitur, quod explicat florem aureum. Sic & Lat. de florib. & in fol. vbi ait, quibusdam in locis reperiri foliis magis confectis, aliis minùs: à Germanis S. Joans blum & Geyßblum appellari, à Belg. vulgò Vogelauw, & quandoque geel gånse bloemen, & houtroosen: addit in Hist. gall. esseque inco-
gnitum Officinis. In Hist. Lat. ait Græcos ab aureo florum fulgore χρυσάνθεμον nuncupare: nominare verò plerumque Bupthalamum & Caltha: non deesse quoque qui Bellidis speciem faciant, & luteam Bellidem dicant: sed Bellidem alterius generis herbam esse. Figura Dodonæi in Gallica hist. melius placet cæteris.

Camer. in hist. Marth. Germ. lib. 4. cap. 6. & Epit. pag. 793. figuram habet Chrysanthemum minoris, quæ hoc satis exprimit de quo hic agimus, istamen non distinxit à maiore.

Clus. Hist. post. p. 334. Chrysanthemum segetum, à nonnullis ita cognominatum, quòd inter segetes nascatur, foliis Bellidem maiorem quodammodo æmulantibus, sed mollioribus & dilutius virentibus, flore similiter Bellidis maioris, sed omnino flauo. Eandem habet iconem cum Lobelio.

Locus. & Tempus. Tubingæ vidimus apud D. Fuchsum. In Gallia Campania in agris spontaneum comperimus, ac collegimus semen quod satum Montibelgardi in Tom. III.

horto Ill. E. C. præuenit ac quotannis ex semine deciduo se renouat, est enim annua herba.

Segetes frigidiorum tractuum Gallia, Germania, Belgica & Angliæ hoc scatur, flauam per messes Cererem ornante, regionibus æstiuosis præcæ.

CHRYSANthemVM LATIFOLIUM.



Descriptio Fibrosis nititur radicibus; caulis striatus; glaber, ramis alternis diuisus: foliis sitis idè, selscuncialibus, & duas vncias longis, selscunciam aut paulò minùs vnciæ latis, ad Bellidis maioris folia proximè accedentibus, per extremum latioribus, circumscripta ferratis glabris, sine pediculo cauli ad-

natis. flores extremis ramulorum hærent singulares, minores quàm Bellidis maioris, disco suffulsi que discum coronantibus aureis: florem suffulciunt folia viridantia. Figura ex Fuchfianis non arripit multum.

Attulit mihi frater Casp. Bauhinus ex Parauinis hortis pro Chrysanthemum latifolium Guilandinum & Afella Plinii, Icon à nobis ex Fuchfianis proposita aliquatenus exprimit.

CHRYSANthemVM PARVVM,
siue Bellis lutea parua latifolia.

CAP. VI.



Descriptio P est Bellidis maiori, cuius filia habet vix vnciam longa ferrata, eodem ordine per eandem disposita, qui singularis pedalis, subhittus, summo vertice florum genit vnicum paulò iam dictæ Bellidis minorem, radiatis in orbem foliis saturatè croceis, vmbonè staminum, cuius obuerfa

dem coloris coronantibus, quæ obuerfa



nec etiam in iis iconibus radices crassiores plantam etiam dedit bifidam in qua duo flores. Saporem foliorum in sicca planta nullum manifestum animaduertimus.

Consideranti diligenter icones propositas quas emimus cum Fuchianis apparet vnius esse plantæ tribus tabellis expressæ, quæ cum accedant ad nostram Bellidem luteam, hic ponimus, quia non occurrit adhuc quod referre debeamus.

CRITHMVM MARINVM TERTIVM
Matthiolo flore luteo Bupthalamii.

CAP. VII.

Suffrutex est maritimus, statim ab ipsa radice multos emittens stolones cubito altiores, rectos, robustos, teretes, rubentes, per quos folia densissima, vnciam longiora, angusta, crassa, teretia, glabra, acri, saluginoso, aromaticoque sapore prædita: stolonum scapi in foliolos ramusculos fiuntur, quorum singulis insidet stoloniusculi, luteus, in pappos euascescens.

Tabern. Hist. Crithmus 2. Bacillenfrans quoad figuram. In descriptione enim & inter nomina Crithmi tertium genus est, quod ab Herbariis vocari ait Crithmum, Chrysanthemum, Chry-

parte suffulciunt folia pallide virentia, subhirsuta: radix brevis, gracilis, multirida.

Huiusmodi vnicam plantam gracilem & strigosam dedit nobis D. Georgius Rentzius Medicus delatæ ex Italia nomine Bellidis luteæ.

Eodem nomine collectâ in agro Neapolitano speciosiores dedit D. Agerius Medicus Argentinenfis eiusdem altitudinis & singulari caule hirsuto, folia autem ad radicem multa, sesquiunciam longa, ex angusto principio serrata, parte extrema & superma lata, qualia etiam sunt folia per caulem: Icones nostræ ex Fuchianis in eo displicent,



santhemum littoreum, & Asterem Atticum marinum. In Iconibus huius titulus est p. 101. Crithmum Chrysanthemum, Geel Bacillen / Nicerfiern

Descriptio

frans: Ast figura ponitur p. 100. pro Crithmo latius, Asparago Gallico. Et quâuis nostra nō placeat figura, nobis tamen deterior vide-

tur quæ à Tabernamontano proponitur.

A Matthiolo in prioribus comm. lib. 2. cap. 122. sine descriptione picta est, pro Crithmi marini specie. Sed in post. comm. lat. & Ital. mag. fig. pro Crithmo 3. depingitur. Et rursus est in Hist. germ. & Epit. Camer. pro Crithmo 3. lib. 2. cap. 68. cuius descriptio ponitur cap. 67. eiusdem libri. In Epit. vocatur Vitriaria.

Lob. Aduers. Littoreum Chrysanthemum flore Bupthalamii, aut Conizæ, foliis Kali aut Luzæ muscatæ. Ei autem non placet hanc reponi inter Crithmi genera. Tertia species Crithmi Commentatoris, inquit, quid negotii, aut similitudinis cum Crithmo habet, ad Chrysanthemum referendum. Obs. p. 215. Littoreum Chrysanthemum, est in Icon. Plant. pag. 395. Crithmus Chrysanthemus Dodonæi, Aster Atticus marinus, Crithmum tertium Matthioli.

Hist. Lugd. p. 1379. Crithmi species tertia Matthioli. Item Crithmum Chrysanthemum Dodonæi.

C. Bauh. Phyt. Crithmum 3. siue marinum flore Asteris Attici.

Hoc ex Prouincia mihi misit Iacobus Rainauderus Pharmacopœus nomine Crithmi Matthioli. Florentem vidi Monspelii apud lacus salso & mare, florentem Augusto. Bononiæ in horto S. Saluatoris al Burgo di S. Catharina. Pfortzemix in horto Domini Grieningeri Pharmacopœi: pulchrum autem delatum Monspelio plantauimus in horto Ill. E. C. Montbelgardii.

Iis pollere facultatibus dicitur in Epit. Camer. quibus Crithmum Antiquorum Dioscoridis & Galeni, de quo maxime dubitamus.

Locus & tempus.

Vites

HERBA MAXIMA.

CAP. VIII.

Merito hoc nominis peregrinæ huic plantæ indiderant Recentiorum nonnulli, ut cui in herbaceo genere nulla sit magnitudine comparanda: caule singulari, brachii crassitudine, duodecim aut decem pedum altitudine in nostris hortis, vicentium etiam & quatuor referunt alii solo Hispano: incondita per hunc folia, Cacaliæ formâ, non item magnitudine, quippe spithamâ longa, aut etiam sesquipithamam, haud multo angustiora, acuminata, alpera, hirsuta, in ambitu serrata, pediculis longis hærentia. Summum caulis

Descriptio

caulis fastigium florem sustinet vnicum, nutabundum, orbiculatum, Helenii simile, sed tam am-



quædam minor, sed quæ florum multitudine paruitatem cõ-



penfer. C. Bauh. Phyt. dicitur Helenium tertium siue Indicum maximū quod quidam ad Chrysanthemum, alii ad Bellidem Plinii referunt: Florem Solis, eò quod flos ad Solē se vertat, vocant. Multum, inquit, variat magnitudine foliorum, & florum & caulis altitudine; & florum numero: in Italia nam-

que viginti quatuor flores in vna planta, plures in Hispania, in Germania etiam decem obseruati. Adolefcit in Hispania ad viginti quatuor pedes; aliquando flos tantæ magnitudinis vt 2;62. femina contineat. Florum item folia in aliquibus longiora: sic & plantæ folia in aliquibus asperiora. Albo flore aliqui obseruant.

Ad Chrysanthemi genus referendus videtur Dodonæo, peregrinus hic raræ magnitudinis flos, quem Solem nonnulli Indianum appellant, alii verò Florem Solis: ast Dodonæo Chrysanthemi Peruiiani nomenclatura placuit. Existimari posset, inquit, hic flos Plinii esse Bellio, si credibile foret, illa ætate Romæ vel visum, vel vilo modo agniti: per ambitum siquidem luteus est, & plus quàm quinquaginta foliis medijs eius orbis cingitur. vt Plinius lib. 21. cap. 3. de Bellione. Luteus, inquit, Bellio patulicantis quinquagenis quinque barbulis coronatur. Sed verisimilius Bellionem omnino alium esse florē.

Tom. III.

Idem & aliud minus citat.

Lobel. in Obs. p. 322. figuram Dodonæi habet; quam ita inscribit, Solis flos Peruianus, siue Sol Indicus, Chrysanthemum Peruianum Dodonæi, Lusitanicè *Gigante*, à proceritate stirpis. Idem habet & aliam figuram cui titulus est, Solis flos minor.

Planta *maxima* (inquit Cortusius in epist. ad Matth. quæ est in principio commentariorum Italicorum) primò missa per Clusium, *Corona regale*, *Cappa di Gioue*. Quidam volebant Solsequium & heliotropium, ego Veneratricem Solis existimo, dicitur etiam Bellis Plinii *Tromba d'Amore* & *Rosa di Hiericho*: crescit ad 120. palmos Geometricos. Hæc ille qui pingit & describit.

Casalp. Helenium Indicum vocat, & appellari posse concedit Florem Solis, quia non solum effigiem Solarem præ se ferat, sed & cum eò modò in Orientem, modò in Occasum conuertatur, semper inclinatus ad terram, quasi præ reuerentia capite nutans. Scribit idem eandem incisum lachrimam [Gummi Camer.] perlucidam, flauam [rubram Camer. odoratam, subacrem fundere: apparere etiam in floribus aliquid resinofum, planè Terebinthinam substantiâ & odore referens.

Tabern. Icon. & Hist. quatuor exhibet figuras pro Corona sc. Solis 1. 2. 3. & 4. quam feminam facit, nec aliter eas ab inuicem distinguit, quàm primam & secundam flore maiore, à 3. & 4. flore minore. Vocat autem Germ. *Sonnen Fron* & *groß Indiamisch Sonnenblum*.

Herbam maximam siue Florem Solis maiorem & minorem sæpe in Horto E. C. Montbelgardii habui, raro profert semen maturum, potissimum maius genus: Basilæ vidi aliquando in hospitio Cicconiæ maiorem, quæ ad altitudinem duorum hominum excreuerat eamque excedebat, mense Iulio & Augusto: semen maturuit Octobri, grati saporis: minorem vidi in horto D. D. Felicis Plateri, Genevæ opera D. Valerandi Dourez Pharmacopæi insignis, habui in horto, ac tunc primùm ibi visa, quæ excreuit in satis magnam altitudinem. In oppido l'Isle dicto Burgundiæ prouenientem vidi in horto D. Baronis à Marnaut: D. Robert. Constantinus autem quando mihi dedit semen cum hac inscriptione, Regina herbarum siue maxima: arborefcit, flos aureus, *augustinus* est, clypeique magnitudinē sæpè exuperat; nihil pulchrius. Affertur ex Brasilia. D. Cortusius Patavio mihi misit semen cum his titulis *popugan del Indio* seu *pianta maxima*: *pianta del Sole*, seu *Corona regale*. Rastius autem Chirurgus insignis Lutetia misit nomine Oculi Indici. Ventorum iniuriis exposita, nisi firmo alligetur adminiculo propter radicem summa tellure sparsam, facillè euellitur.

Flos Plantæ maximæ benè repurgatus à foliolis coctus cum oleo, sale & aromatibus, melioris est saporis quàm Fagi, Asparagi, & Cardui & Scolymi, ac ad Venerem insigniter stimulat, vt in se ipso expetrum esse scribit Cortusius. Chrysanthemi Peruianni pediculis foliorum teneros adhuc, pilisque derasis, in craticula decoctos, sale oleoque prius præparatos, esu suaves & perquam gratos esse, euidenti experimento cognouit Cortusius, inquit Dodonæus, & similiter ipsos quibus floris foliola semēque insident calyces: quos & ipsius Cinatæ comis siue capitibus delicatiores suauioresque in cibo esse scribit, & non minus, verum amplius, *meis appositione*, ad quæ plu-

rimum possunt facere. Quā in re industria ac diligentia eius commendari ac laudari satis non potest. Semen purgandi vim habere instar Carterami quidam Camerario retulit, quod tamen in seipso periculum faciens non potuit deprehendere. Caulis fractus facillimè callo obducitur: unde vulnerariam esse coniciunt & ad fracturas conuenientem: sed hoc signum non sufficit: inesse tamen vulnera glutinandi facultatem non negarit Camerarius. Sunt, inquit Cæsalpinus, qui caput in cibis assumant assatum: quas præterea facultates habet, à nemine hæcenus traditum est: conicere tamen licet vim calefaciendi ei inesse, cum tenui substantia: idcirco ad eadē pollere ad quæ Helenium: sed lachrymam longè efficaciorē esse.

HELENIVM SIVE ENULA CAPANA.
CAP. VIII.

Descript.



Synonyma

Insignter grandescit Helenium, ad trium & quatuor vsque cubitorum proceritate, caule recto, canaliculato, villosa, subrubente, aliquot alis concauo: folia nullis interuenientibus pediculis, caulibus adnascuntur, Verbasci latioris, incana, lanuginosa, per ambitū crenata: flores odorati sed

obscuri, Bupthalmi effigie, sed multis numeris maiores, aureo fulgore comantes, quibus squarrosū subest latius capitulum, semen continens gracile & oblongum, quod falsò Petrus de Cretensis negat. Radix notandæ crassitie, foris fusca, intus alba sapore aromatico, acrimoniā cū nonnullo amarore mixtā.

Folia habet, vt describit Dioscorides Verbasci (φλόμω) angustioribus foliis prædito [mendosè legit Lobel. in Adu. παπυρίλλω, pro plantæ enim altitudine & foliorum longitudine angusta satis folia sunt] similia, asperiora tamen & oblonga: caulem quibuscumque in locis [εἰ παρὰ τοῖς νεφελῶν] non emittit. Radicem habet subrusam (σποδιόρην: κίρρον, fuluam alii: addunt & alii, interdum σποδιόρην) (subalbidam) odoratam, subamaram (σποδιόρην: δριμύτην, acrim vet.) magnam, vegetam: ex qua agnatæ propagines [Liliorum, κείρον, quod nondum in aliis exemplaribus legi] velut in ferendis Cinariis (κινάρω, & rectius meo iudicio, quàm Aris, ἀρίων) ad insitionem decerpuntur opimæ & insignes. Et hæ notæ omnes in Inulam vulgatam profusè competunt.

Cæterum sunt qui Helenion, Symphyton, qui Persicam, qui Medicam, qui Orestion, qui Nectation, qui Cleoniam, qui Rubum Idæum, qui Verbascum Idæum appellant: Ægyptii Lenen, Latini Terminalium aut Inulam campanam.

Plinius Inulam vocat, recensens inter ea, quæ feruntur in hortis cibi gratia: breuior Sisere est,

ingr, sed torosior, amariorq: Inula per se stomacho inimicissima, eadē dulcib. mixtis saluberrima: pluribus modis auferitare victa gratiam inuenit: illustrata maximè filiz Augusti quotidiana cibo: superuacaneum eius semen, quoniam oculis ex radice excisis, vt Arundo feritur.

Quod porro Dioscorides Helenium ab Antiquis Symphyton vocatum tradidit, in hoc testes sibi aliquot habent (ait Marcellus) qui Græcorū Lexica conscripserunt: inuenisseque id nomen videtur ex sobole adnatūque illis quæ in radicibus Liliorum modo συμφύτων, id est, connascuntur & hærent. Testantur eadem Græcorum lexica Medicam & Nectariam radicem Inulam dici, facta à regione & à dulcedine nomine: sic Cleoniam dictam conicere licet: Et si in probatissimo mihi codice non simpliciter κλεονίον legitur, sed ἐν κλεονίον κλεονίον, id est, Buglossum cleoneum appellari. Apuleius etiam quod non multum à Cleonio differat, Chironium panacem dicit vocari: vt in alterutro vitium sit: adiectumque hoc à nobis est ne quid obseruatum & inuentum hæcenus relinqueretur. Ab Oreste nomen illi etiam antiquitas fecit, ignoramus nos tamen causam: nisi fortè Orestis & Helenæ propinquitates communem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit. Quæ sequuntur deinde appellationes: Rubus & Verbascus Idæus ex sola similitudine (vt toto hoc opere infinitæ aliz) factæ sunt: quod ex hoc ipso autore in Helenii aut Verbasci historia deprehendere facile erit: Et quemadmodum copiosum in monte Ida nascetur Helenium: idcirco loci & regionis discrimine à propriè Rubus & Verbascus dictis discretum est: unde autem Terminalium Romani (modò integra ea vox sit) Helenium dixerint: nihil pro comperto habemus: quemadmodum contra Inulam dici Antiquiores Latini omnes testantur: nulli tamen ex Campaniæ magis quàm aliunde ab illis laudatur: suspicamurque nos, quod à principio diximus, multas in Scriptore hoc non legitimas esse appellationes, deincepsque per tempora inserta aliena & peregrina, vbique admirantibus cunctis: eoque magis in Romanæ gentis fortuna & imperio hanc Græcis miscere propriis placuisse: & ex propinqua vbi regione eam laudasse: quando vt omnes iam pridem nouimus: quod se fortuna illuc etiam fauor hominum inclinat: & vt nos in doctrinis qualescunque Græcorum voces adhuc admiramur & amamus: eodem modo & illos Romanas admirari & amare solitos fuisse verisimile est.

Nectaria Antidotos videtur Cornario esse appellata ab Helenio, quod recipit: siquidem id Nectarium appelleretur, unde & Dioscoridi Nectarites vinum dictum sit. Nec aliud esse putent quidam, quàm Homeri Nepenthes 4. Odyss. Vnde Plinius etiam lib. 21. cap. 21. de Helenio loquens, easdem vires ei tribui testatur, quas Homerus ad Nepenthes retulit, & Nectarium appellatum dicit.

Diosc. caput de Helenio, mendis scatere scribit Matthioli, idcirco testis est, Auicennam confundere cum Helenio nostrate Helenium Ægyptium: Esse præterea qui dicant (vt etiam testatur Galen. lib. de Ther. ad Pisonem, si modò Galeni liber legitimus sit) quod si Helenii succo tela venatoria inficiantur, venenata effici, idcirco in Dalmatia fieri, vt feras omnino perdant, quod quidem ipsum fabulosum dicit.

Apud Anguillaram quidem epist. 1. dicit Galē. lib. de Antido. compositionem parari ex Helenii radice

radice, quæ venenum sit animalibus hominibus tamen non noceat. Miratur idem Epist. 2. Plinium loquendo de Helenio voluisse Nepenthem Homeri confectum fuisse ex Helenio Crateuz.

Tragus Enulam campanam pingit & describit, dicitque à quibusdam eam putari radicem illam, quam Mercurium Vlyssi aduersus veneficia Circes demōstrasse, Homerus testetur Odyssæa 10. libro : Sic dicent.

dedit Herban Mercurius

Ex terra e tellus, & mihi genus ipsius offēdit.

Radix quidem nigra erat, lacti verò similis flos.

Moly quidem ipsam vident Dii, difficile autem effodere

Viris mortalibus, Dii autem omnia possunt.

Panacis porro & Chironii nominibus appellandam suspicabatur Tragus, quam suspicionem Apuleius ipsi pariebat. Verum si radicem Inulæ, formam eius, odorem, saporisque acrimoniam, colore denique & vires cum Helenio Dioscoridis diligenter & cum iudicio conferas, deprehendes illam verum esse Helenium. Quod Apuleius cap. 96. Panacem centauration & Inulam campanam vocat; Serapio Iasim & Zinziber de Sem: Auerrhoes Aisaran; Laur. Phisius Hebraicè Elina, quod rectius Enula scribi posse Trago videtur. Quam autem nihil certi habeant nomenclaturæ, non solum Apuleius testatur, qui tres plantas Enulæ nomine appellauit, verum etiam Dioscorides, qui dictas voces aliis subinde herbis attribuit: ac apud Cordum in Diosc. annotatum est, Helenium Theophrastum nomine Chironii Panacis describere.

Helenium, inquit Amatus, nostra est Inula Campanica. Quia autem radicem fert amaram, credendum est, vt doctè adnotauit Marcellus, Dioscoridis historiam hanc corruptam & acephalam esse: Nam quod folia angusta Verbasco similia habere tradat, id cæli causæ forsitan tribuendum esset, quum in vno loco procerius herba vna quam in altero creseat: sed quod insignem amaritudinem in Inula repertam, silentio prætermiserit, non possum non testari textum istum corruptum esse. Imò Marcellus Virgilium confirmat se amaritudinem in Antiquissimo Dioscoridis codice legisse. Quamquam eâ quoque à Plinio prætermisam animaduerto, vnde Matthiolus Senensis, hic falsò admodum Plinium adducit libro 19. cap. 5. quia vltra quod in eo capite, nullam penitus de Helenio, siue Enula mentionem faciat, libro tamen 21. cap. 10. vbi Helenij meminit, non de hac loquitur, sed potius de Ægyptia, cui Dioscorides in hoc capite, ex mente Crateuz herbarij, ramulos Serpilli modo, humi sparsos tribuit, folia verò Lentis similia, cui quoque in eo loco nullam tribuit amaritudinem: Imò in describenda herba hac, Plinius à Dioscoride variat, quum Dioscorides folia lentis, & ramulos Serpilli per terram sparsos Ægyptiam Enulam habere tradat: ille verò non Lentis folia sed Serpilli potius possidere dicat. Accedunt ad hæc, quod cap. 21. prædicti libri, vbi medicamenta Helenij pertractat, dulcem esse asserit, & o amaram, vt liquidò constet Plinium de illa tantum dulci Ægyptia Inula memoriam fecisse, non verò de hac amara à nobis tractata: Proinde Matthiolus, si Plinij authoritatem in hac parte subtraxisset, prudentius dubio procul fecisset, ac non ita duplici errore hallucinaretur: primo,

Tom. III.

quum credat Plinium de hac Inula primam mentionem fecisse, quum vt diximus potius de secunda Ægyptia agat: secundo quum dicat Plinium Inulæ amaritudinem tribuere, quum re vera illi dulcedinem condonet, & non amaritudinem, vt cuique legenti notum erit. Verum Enulæ radix adeò lætificat vt in omnium Apothecariorum ore sit, imò hac de causa, à multis creditum est, hanc Nepenthem herbam illam ab Homero tanta laude decantatam esse, quia perpetuam patriæ læticiam, & tristitiam omnem aboleat, omnes abigendo curas, & malorum omnium obliuionem inducendo, præcipue si eius succus vino immixtus bibatur, quæ omnia vera esse crediderim, modò de Ægyptio Helenio Campana dicatur, quum in nostra Enula hæc prolix non reperitur: nec Itali illius radices quotidie coctas, & Saccharo uetmelle & aromatibus paratas licet elicerent, talia experiantur. De illa igitur Enula Ægyptia vera Nepenthe suo loco dicetur. Hæc Amatus, qui quid velit nondum video, ac Matthiolo fortè iniuria fit, nisi in prioribus Commentariis olim aliquid scripserit: præterea nescio cur dicat locum malè citatum à Matthiolo, & Plinium Inulæ amaritudinem non tribuere: vtrumque inuenio apud Plinium.

Apuleius cap. 95. vel Humelbergio teste, duas diuersas miscet plantas. Nam Inulæ nomina & virtutes, seu titulus promittit, traditurus, Chironii Panacis immiscuit nomina & historiam.

Robertus etiam non distinxit duo Helenia, præterea non facit mentionem Nepenthes, quod debebat, dum ait: Helenium, Enula Campana, cuius radicem si quis comederit omnium dolorum obliuiscitur.

Patet itaque ex hæcenus dictis Helenium, simpliciter dictum longè diuersum esse ab Helenio Ægyptio Crateuz dicto, quod multi Panax Chironium falso volunt, & melius alii Helianthe vulgare statuunt, & alii Helianthe flore albo, & alii Herbam colubrorum, nos Heliantherarum, Clusius Medicam marinam, quidam Securidacam siue Hedyfarum clypeo aspero.

Planta à nobis exhibitæ, Helenium dicitur Trago (cui & Enula campana) Fuchsio & Gortaro. Helenium Diosc. Corn. Matth. Anguill. Cordo & Ræll. [quibus duobus & Helenium 1.] Amaro & Germol. Dod. passim; Eluchaf. Tabern. Cast. Lobel. [cui & Panax Anguillæ] Maranthæ, Apollini, Cronemburg. Rob. Steph. Monach. in Mes. Camer. Horr. Lufitanico, & Schvvenckfeldio. Helenium vulgò cognitum Rob. Const. in Lexico. Helenium vulgare Ioh. Agricola, & C. Bauh. cui & Helenium primum in suo phytop. Helenium Matthioli H. Lugdunensi. Inula Plinio. Inula campana Apuleio. Enula Lonic. & Cætalpino. Panax Theophrasti, Helenii prima species Dioscoridis Anguillæ.

Helenium, ἡλίανθον Græcis, hodie non solum officinis, sed etiam vulgò omnibus notum est: Latini Inulam & Enulam appellant: Officinæ Enulam Campanā: Arab. Iasim siue Rasen. Germ. Alant, Alantwurz [quia ferè radicis vsum solum nouerunt:] Belg. Balandworteles: Galli Enule Campanæ, Aulnee, & vulgus L'anne: Itali Zella Enoa & Enola: Hisp. Raiz dell'alta: Angli Elecampane: Poloni Oman: Boh. woman: Hung. öüeny gyöfer / öüeny siu.

Helenium porro ab Helenæ lachrymis dictum esse volunt, ex quibus natum fabulantur Poetæ: Alii quod contra serpentes ex eo primum ab hæ-

Amatus
not.

Apuleius
not.

R. Corp.
not.

Nomina
linguæ

lena remedium intentum sit, & Menclao comit suo in Egyptum nauiganti ostenderit. Alii ab Helena insula ubi longe optimum luxuriat

Helenium siue Enula campana, Geneuæ vidi in hortis, Lugduni habebam & alii in hortis, Frater obseruauit Basileæ in Nischelselden/ego ibi tantum in hortis vidi. Montbelgardi priusquam adoraremus Hortum Ill. E. C. in eo erat copiosum spontaneum, vt nunc cultum habetur, florer Iunio & Iulio, in locis vt Dioscorides ait, montanis vmbrosis & ficcis (*ἀνίσχυρος*) vel rectius [*ἐνιχυρός*] humectis. In pinguibus & latis, teste Dodonæo, nascitur pratis: reperitur quandoque & in montibus, locis vmbrosis, & non omnino aridis: Frequens non modò apud Belgas, verum & alibi, vt in Italia, Gallia, Germania &c. Flores Iunio ac Iulio vigent. Radicis frustum recens terræ mandatū nullo negotio prouenit, id quod Dioscor. & Plinius supra testati sunt. Radix Æstate effoditur & secta siccatur: non rarò etiam Aprili & Maio mensibus legitur: viget Autumno.

Vires

Helenii radicis decoctum, auctore Dioscoride, potum vrinæ mensisque ciet. Ipsa verò radix in eclegmate sumpta cum melle prodest tussi, orthopnææ, ruptis, conuulsis, inflationibus & venenatorum moribus: quippe quæ in vniuersum exalfaciendi vi polleat. Folia ex vino decocta vtiliter Ischiadicis illinuntur. Est & radix stomacho vtilis, dulci multo condita: Siquidem falgamarii paululum exiccatam eam, mox decoctam, aqua frigida demergunt: postea defrutum consiciunt & ad vsum reponunt. Trita potaque ad sanguinis reiectiones est efficax.

Plinius non vno loco Inulæ meminit. A maior, inquit, per se stomacho inimicissima, eadem dulcibus mixtis saluberrima. Et mox illustrata maximè Iulæ Augustæ quotidiano cibo. Et Inula quoque à ieiunis commanducata dentes confirmat, si, vt eruta est, terram non attingat. Cōdita tussim emendat. Radicis verò decoctæ succus tineas pellit: siccata autem in vmbra farina tussis, & conuulsis, & inflationibus, & arteriis medetur. Venenatorum moribus abigit: folia ex vino lumborum dolori illinuntur.

Galenus de eadem ita scripsit, Helenii radix maximè vtilis est, non primò statim opus exalfaciens, ac proinde non dicenda calida & sicca exquirit, ceu Piperitum atrum, tum candido, sed cum recrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quæ faciunt ad educendos ex thorace & pulmone crassos lentosque humores idoneè commiscetur. Rubrificant quoque cā partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt ischiades, & exiguæ assiduæque articulorum procidentia ac luxationes. Hæc Galenus.

Helena, quæ in ore omnium est, postquam Græcis Troianisque pro se pugnantibus infinitos dolores intulisset: Helenium vt poëtæ cecinerunt ex lachrymis suis in Helena insula natum mortalibus dedit: quo tristitia omnis aboleretur: si primo doctrinatum & antiquitatis parenti Homero credimus: qui ad obliuionem poculo iniectum ab ea in cœna dixit: tam præsentia ad eam obliuionem potestare: vt nec defunctis ante se parentibus, filiisue aut fratribus, lachrymis genas rigaturus sit quā die id biberit aliquis, poëta ille testetur: quæ an vera sint in poetis excutienda relinquinus: naturæ enim & corporis: non fortunæ & animi mala in Dioscor. tractamus.

Radice Helenii in mustum coniectam eo qui vt defrutum fiat & sapa, atque inde eximi, ac vinum siue Sapam in vsum reponi, scribit Cornarius: eadem etiam vt vulgus ex aceto trita ad scabiem confricandam. Radix Helenii, vt Tragoplaet, cum recens adhuc est, saccharo conditi potest, quemadmodum Zingiber & Calamus aromaticus. Siquæ illa deficcata & in puluerem redacta, saccharo vel melle misceatur, vt ita fiat eclegma, benedictam præstat mediocinam aduersus suspiria & lentam tussim: hoc namque eclegmate crassi & viscoli thoracis humores inciduntur & excreabiles fiunt. Eodem remedio internæ exulcerationes & abscessus pulmonis, matricis, aliorumque viscerum (sic vsurpato) persanantur. Cataplasma ex Helenii viridis radice confectum tumores & inflammationes locorum muliebrum & genitalium detumescere facit. Nō improbarim cum Trago in tumoribus frigidis & flatuosis, in phlegmone nolim vt: Radix siquidem, teste Dodonæo, huius Inulæ ad multa maximè vtilis sit natura exalfactoria & reliccanis tertio ordine: præsertim arida. Nam recens & adhuc succo plena, excrementitio redundat humore, qui calfaciendi ac rescicandi eius potentiam non nihil obtundit. Prodest aduersus respirandi difficultatē, orthopnæā, veterēque tussim, Vētriculo. a. cō noda & salubris radix cōdita est: à cœna supra non modò concoctionem promouet, sed & aluum faciliorem reddit. Sunt etiam qui ipsi decoctis, tritis ac melli instar vnguenti permixtis, vetera vlcera expurgari atque ad cicatricem perducere affirmant.

Aridæ radicis farina, vt prodit Matthiolus, denarii pondere diebus aliquot ex vino vetere hausta spleniticos iuuat, Helenii radicem succus cum pari hyssopi succi pondere, & aquæ stillatitiæ Tussilaginis triplicato pondere, saccharique quantum sat fuerit, ad mellis spissitudinem decoctus, magnoperè asthmaticos iuuat, si frequenter vtantur. Sicca radix foris vtilis est, si intus sumas humente adhuc atque recenti vtendum, præsertim in pulmonis chronicis affectibus, Helenii radicem, flores & folia tanquam peculiare præseruarium pestis tempore commendat Bokehus. Condit autem radices & flores etiam de quibus manè aduersus prauum aërem & difficultatem spirandi vtiliter assumi scribit, quemadmodum & vinum Helenites: vtilem etiam radicem in aceto forti maceratam & odoratam perhibet.

Inuenitur & Neocarites vinum ex Helenio paratum, sed magnā inter pondus radicis & mensuram multi diuersitate. Plinius enim quadraginta denarios radicis, hoc est vncias quinque, si denarium drachmæ pondere accipiamus, in sextarios sex multi mittit. Dioscor. autem quinque drachmas, in sex congios iniicit qui post tres menses primò diffundit, vt in hoc exilius pondus sit, ad tantam vini mensuram: in illo magnum pondus sit, ad exilem mensuram. Quare si in illo sextarii in congios mutarentur: in Dioscor. contā congii in sextarios, mihi cum Cornatio aprior miscendi modus videretur. Sed hæc tota res experimento constat, & in cuiusque arbitrio sita est, prout quævis mixtura cuiuslibet iucunda est. Facit ad stomachū, & thoracem: ducit & vrinæ. Vinum quod ex Helenii radicibus passim in Germania paratur frequenter in potu sumptum mirifice vsum acuit.

Vinum
denariorum.

BATANICA PLANTA FOLII

Helenii.
CAP. X.

DE hac planta Clus. in Exot. lib. 4. cap. 23. talibus agit verbis. In Doctore Colii, siue Coolmans [portulis, quæ deportatæ sunt Amstelredamum anno 1601. ex India Orientali, in chartacea pagina, hæc latina verba ipsius Doctoris propria manu exarata reperiebam. An Conyza odorata aut Helenium alterum Saluæ odorem spirans? Herba cuius folia Helenii formam referunt, flores parui flavescentes, & in pappos abeuntes Conyzæ minores. Bantamæ comeditur. *Hu ille*. Ego verò ex notis quas in sicca planta obseruabam, quæ sequuntur addebam: Plantæ illius folia palmum erant longa aut maiora, tres ferè vncias lata, per oras crenata, aliquot venis à medio nervo folium per longitudinem medium secante inæqualiter nascentibus, & in latera excurrentibus prædita, pronaque parte incana: foliorum pediculi paruas appendices adnatas habebat vti aures; tenelli rami & recter nata folia albâ lanugine pubescebant, etiam in resiccata, quam duntaxat conspiciebam, & cuius folia degustata aliquid amaritudinis habere deprehendebantur.

HERBA MALVCANA ACOSTÆ.
CAP. XI.

D Vorum aut trium cubitorum longitudinè adquirit hæc planta, nonnunquam etiam locis vberioribus & humidis, quinque cubitos superans, eleganti virore prædita, caule tenui, tenero, nonnihil concavo, imbecillo, & nisi vti Iasminum pergulis sustineatur, humi sese diffundente, quemadmodum Hedera; & multos ramos spargente, qui subinde radices agunt vti Mentha & Melissophyllon; adeoque serpunt, vt planta sola, vel ramus transpositus, breui temporis spatio magnum locum occupet: folia habet tenella & mollia, in ambitu serrata, magnitudine & forma Sambuci foliis respondentia: florem croceum, Chamaemeli flori admodum similem, paulo tamen maiorem. Toto anno virescit & luxuriat.



Acothia, Historiæ huius auctore, teste, ex veris Clusii, vulgò nuncupatur Remedium pauperum & destructio Chirurgorum: Canarini *Brungara* & *asidua* appellant, id est, quæ flore est croceo. Hist. Lugd. Malucana Acothæ. Frequenter videntur cum in Maluca [vnde

primam originem traxisse creditur, quod istuc abundè crescat, & plurima admisceatur Chirurgicis remediis] tum in omnibus Indiæ provinciis, in quibus diligenter colitur, & in pretio habetur, nec iniuria.

Coquantur huius plantæ folia in oleo, & cum cera inspissantur vnguenti modo: mitissime curat id vnguentum omnis generis vlcera recentia & antiqua, etiam si sanguinolenta, sordida, cuniculosa, maligna, & putrida sint: miræ esse efficaciz deprehendi in tibiærum vulneribus inueteratis, & recentibus vulneribus.

Alia est præterea huius stirpis vtendæ ratio. Eius enim caulem & ramos superiore cortice denudant, & sumunt membranam illam tenuem quæ media est inter exteriorem corticem & caulem, quæque faciliè, vti in Cannabi, reuclitur: eam oleo nucis Indiæ madentem, ipsius plantæ foliis involuunt, & sub cineribus calidis recondunt: vbi incaluit & emollescit fuerit, contendant, & recentibus cruentisque vulneribus imponunt, seu grandia sint, seu leuia, & paucis diebus non sine admiratione conglutinant absque vlla inflammatione aut apostemate: lenit enim dolorem sanguinisque fluxum cohibet: breuiter nullo alio medicamento adhibito omnino ad cicatricem perducit: singulare etiam perhibent esse remedium aduersus neruorum punctiones & vulnera.

Eodem præterea modo adhibetur in apostemate aperto ad emundandum, carnem generandum, & ad cicatricem perducendum: item in inueteratis vlcetibus & cuniculosis, in quibus ea solummodò tria interdum apponitur.

Quia porò certissima sunt huius plantæ, quæ enumerantur, remedia: vulgaris illorum vsus est in vniuersis illis provinciis, & magnæ estimationis: multi præterea alii, qui inde nauigant, vnguentum ex hac herba cum oleo & cera confectum, secum efferre solent, tantam fiduciam in eo collocantes, quasi omnia Chirurgica remedia apud se haberent: itaque quacunque occasione, in qua chirurgorum opera requiri possit, subito ad vnguentum ex herba Malucana confectum confugiunt, tanquam indubitatum remedium.

BELLIS MINOR SYLVESTRIS
spontanea.
CAP. XII.

T Orum celsipicè operit spatissimi humi foliis numerosis, pinguisculis, hirtatis, ex longa, ceruice sensim latefcentibus rotundatisque: caulem nullum promittit, sed pediculos frequentes, palmares & altiores, tenues, teretes, hirtulos, quorum singulis floribus vnus, bellidis hortensibus.

minor, singulari foliorum in orbem ambitu, lacteorum aut ex albo sanguineorum, luteo-vin-bilico: radiantur porro fibris multis tenuibus.

Bellis non videtur à Græcis descripta: est apud Plinium Bellum & Bellium vocari plerique fatentur, & ut Cæsalpino videtur, optimâ ratione: inquit enim lib. 26. cap. 5. bellis in pratis nascitur: flore albo, aliquatenus rubente: ad omnes ceruicis dolores, tumoresque quacunque in parte illita cum Artemisia: lib. 21. cap. 8. Luteus, inquit, & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinque barbulis coronatur: pratenfes hi flores, ac sine vfu, idè & plerique sine nomini-bus: quin & his ipsis alii alia nomina imponunt. Quo loco luteum dixit florem, id est internum: neque obstat, quod Bellio luteum esse florem tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum, medicumque floris, quod sanè luteum est, respexit, inquit Fuchsius: & hinc est quod à quibusdam Plinii locus ita legatur. Luteum & Bellio, ut subaudiatur semen. Barbulas autem appellauit circumdantia foliola. Alibi putat Cæsalp. hanc eandem intellexisse sub nomine Anthemi, cum inquit: primum Anthemum quoque calculos eiicit: parui è radice foliis quinque: caulibus longis duobus: flore roseo: radices triæ per se ceu Lauer crudum. Assumpta hæc ex Theophrasto, qui Anthemon quoddam scripsit ab radice tantum foliatum: sed Theodorus inibi vertit Nigellam.

Cæsalp. porro hanc eandem apud Dioscoridè dicit inter genera Anthemidis nominatam, quæ Cranthemon vocat, quasi florem veris: ad id enim alludit & appellatio vulgaris apud nos: hæc dixit flore purpureo constare, efficacissimam ex omnibus generibus ad calculos, in totum maiorem: quæ nota, si de flore intelligatur, conuenit, maior enim est in totum: non si de frutice, vt Plinius interpretatur: breuior enim hæc est.

De Bellide filu. spontanea loquitur Ruell. lib. 2. cap. 125. his verbis. Bellis qui & Bellius dicitur, flos pratenfis, duorum generum est. Maior (de hac postea diceretur,) & minor flore albo, aliquatenus rubet quinquagenis ternis tantum barbulis circumdato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissime serrato: syluestris floris calyculus simplici foliorum constat ambitu, emaculato candore, vnde Galli *Margaritam* vocarunt. Hæc trita cum Artemisia strumas efficacissimè compescit. In officinis minoris Consolidæ titulo demonstratur. Hybernis quoque nascens coronis hyeme tota prouenit, primus etiam Veris flos, in Italiâ ex occidente, ut quidam existimant, conuectus. Laudatur ad podagras, Ischiada, & neruorum resolutionem, vnde nonnulli eâ *Parasytum* vocant. Hallucinatur qui Bellium vulgò Leonis dentem dictum interpretantur, quem non quinquagenæ quinæ, sed plusquam ceteræ coronant barbule, non candidæ sed luteæ, semine pullo in auras euascente: Bellio, albæ luteum verticem circumdant, qui à multis semè intelligitur. Porro qui Antipatrem vulgò dictum rentur esse, liquidò falluntur.

Lonic. Primula veris, Solidago minima (*Flein wundkraut.*) Arthritica (*Gichtkraut.* ab effectu) & Bellis minor. Videtur autem pictura eam exprimere, quæ est pleno flore.

Brunfels. Solidago, Consolidæ species. Eidem in quarto & Cæsalp. Primula veris, quod sc. Veris inchoante mox erumpat. Trago, Primula veris, Arthritica Pandectarii. Fuchsi. & Dod. gall. Bellis minor syluestris. Tabern. Icon. & Hist. Bellis 4. siue minor syluestris. C. Bauhin. Phyr.

Bellis 7. siue filu. minor, varians floris colore discum enim luteum in orbem cingunt folia vel alba, vel ex candido rubra, in ambitu alba: aliquid in viridem colorem degenerant.

Lobel. in Adu. Consolida minor Officinarum. Obs. p. 253. Bellides siue Consolidæ minores, Primulæ Veris Tragi.

Bellis minor in post. comm. quam in prioribus Matthioli lib. 1. cap. 139. bellidis alterum genus facit, in pratis plerumque nascens. Turn. Bellidis genus alterum, siue spontaneum, ubique iuxta semitas & in pratis obuium, quod Septentrionales Angli *Baurwort* vocant. Videtur duas figuras proponere.

Hæc est ille Amellus Guilandini in Theone, quem Asterem Articum esse negat, & vel Chetodonium minus, vel Primulam Veris minorem affirmat, in quarum foliis euidenter admodum Violæ subluceat purpura nigra, ancipiti foliorum intellectu, neu quis mulcet.

Bellidem minorem siluestrem spontaneam, Nomi-vocant Germani *Maßluchben*, *Maßulen*, *Maß* lingua *blumlin*, *Flein zeutlofen* & simpliciter *zeutlof*: Belgæ, *Madelenen*, *Fersjouwen*, *Margaretten*: Galli *Pasquette sauvage*, ou *Consire petite* Fuchsi. & simpliciter *Marguerite* ou *Pasquette* (forte quod ad Pascha ferè florere incipiat), & *petite sauvage* *marguerite*: Itali *Margarite* & *Flori di prima veri gentili*: Angli *Daisy*: Boh. *Matez cuf* / *Sadmitrofa*.

Passim prouenit in pratis & similibus perinde palustribus ac humidis compluribus locis, veris mensibus florens. Et quidem Monspelii & Patauii mense Februarii: Montbelgardi Martio, Octobri, & Nouembri: Geneuæ & Decembri: Basileæ Maio.

Aqua primulæ seu bellidis destillata, iecur refrigerat, calores internos restingit, reprimat choleram, pustulas linguæ ab ardore faucium profectas, orisque exulcerationes sanat potu. Herba ipsa adhuc tenera cum sale oleo & aceto commanducata aluum adstrictam laxat: folia recentia quibuslibet calidioribus vulneribus imposita proliunt. Herba rufa, tumoribusque genitalium imposita, calorem repellit, lenitèrque dolorem sedat. Quiddam & herba & floribus Primulæ quibus Ebulum & Eupatorium adiungit, ad balnea sudatoria vruntur, atque ea membrorum resolutioni, Græci paralytin vocant, mirificè conducere asserunt. Vereor ne Tragus hæc tradēs Primulam, Verbasci speciem confundat.

Bellidis minoris folia, auctore Dodonæo, humectandi, refrigerandi que facultate donata sunt: & humectant quidem ordine secundo intensè, refrigerant verò eodem remisso. Dolores omnes, sed præsertim articulares ac podagricos, ex calido siccoque humore, mitigant: cum butyro recenti & insulso trita, ac locis dolentibus imposita, potissimum additis Maluæ foliis. Eadè oleis addita, facilem aluum faciunt, & in caustionide febri, ac intestinorum inflammationibus, magnè vtilitate enematis admiscetur.

A Dodonæo dissentit Fuchsius, dicens Bellius uterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorum ad diuturnas strumas vsum esse scribit. Acetosus tamen sapor quæ in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in eo portionem esse monstrat. Quicquid tamen sit, exiccare Bellios euidentissimum est. Temperatè frigidas & siccas potius quam humiditas dicitur Lobelius, & non nihil adstringentes. Quotquot hodie viuunt vulnerariam herbam Bellium esse nouerunt.

nouerunt. Vulneribus enim utilis & potissimum in fractura capitis admota: & hinc Consolidæ nomen adepta videtur. Succus etiam herbæ vtiliter à vulneratis bibitur. Folia recipiuntur inter olera.

BELLIS FLORE VIRIDI.



Est & hoc in hoc flore admiratione dignum, quod ubi in valde humido loco diutius inhæret, si non aliò transferatur, in viridè planè colorem degenerat. Talem enim Bellidem primò vidi Sturgardiæ florentem lunio, cuius folia erant minora, quàm in vulgaribus, quæ etiam mihi pallidiora videntur:

flores etiam minores ex flosculis virentibus constantes, capitulum representantes sine folioli in circuitu. Nos curauimus depingendam sua magnitudine.

D. Arnoldus Gillenius in botanicis egregie versatus, ait non genus particulare Bellidis, sed abortu n quod non negauim.

C. Bauh. phyt. Bellis 7. siue filu. minor. in viridem colorem degenerans.

BELLIS HORTENSIS SIVE
flore multiplicato.

Bellis, crebris est in orbem fufis foliis, pilosella, pinguisculis, nonnihil crenatis, aliàs integris, hirsutis, sapore adstringente: inter quæ pediculi oriuntur palmares, tenues subrubres, hirsutis qui res sustinent albos purpurascens, mediolutescos, Anthemidis modo: aliàs verò numero-

sa foliorum luxuries vmbilicam luteum obumbrat, repetita transplantatione, colore vel albo, vel rubro, vel in ambitu rubro in medio albo, vel alternatim, vel viridi, vel quâ denique fors tulit temere versicolore varietate foliorum

Tom. III.

commendabilis: nec radicis fibrosæ reptau contenta se propagasse, quin & è flore ad margines nouam sobolem, haud aliter atque in prolifera Caltha, sufficit, sed matre, vt par est, minorem.

Quid cultus mangonium in primula Veris efficere possit, commemorat Tragus. Hodie,

inquit, versicolores, & multiplici bacularum contextu stipatos puellæ inter coronarios flores, hos quoque plantare solent. Quidam enim ex iis rubri, quidam candore emaculato, postremò nonnulli ex albo & rubeo mixti, alii intus rubri in ambitu albi spectantur.



Quin & candidi flosculi, qui multiplices cultura euadunt, miscitiùs carpantur, ex se alios generant, ita vt sape ex vno capitulo, seu [urita loquar] cerebro primi floris, quatuor aut quinque alii erumpant, quæ in re naturæ felicitas & inira vis nobis commendatur.

Matth. in prior. comm. Bellidis primum genus siue hortense sine icone. In post. cum mag. fig. Lat. & It. Bellis minoris tres species. Turn. p. 78. Bellis siluestris prior, quantum mihi videtur.

Fuchs. Bellis minor hortensis, quam Officinas Consolidam minorem appellare scribit. Germanos Monarblume oder rote blume/ Gallos Marguerites de iardin, ou Consire petite.

Gesn. hort. Bellis minor in hortis.

Dodon. gall. Bellis minor hortensis, petite Marguerite d. mestique. Lat. in fol. Bellis hortensis, multiplici flore. Plant. icon. p. 476. Bellis hortensis multiplici flore, siue Bellides Consolidæ minores & mediæ: Tragi primula veris.

Tabern. Icon. & Hist. tres ponit figuras; Bellis 1. hortensis multiplex flore albo, weisß gefült. 2. hortensis flore rubro, 3. Bellis tertia minor hortensis.

C. Bauh. phyt. p. 506. Bellis 3. siue hortensis flore pleno, albo, rubro, incarnato, vario, id est, candido & rubente, minore item & maiore flore, cuius nomine tres icones apud Tabern. p. 327. & 328. & apud Lobel. duæ. Item p. 507. Bellis 2. siue hortensis prolifera: hanc dixit Tragus lib. 1. cap. 52. albo colore, & talem fieri si non citius carpantur flores, suauem rubentem Luretiâ habemus: viridem obseruauit Lobelius.

Cæsalp. primula veris, in hortis coli solita, hieme tota florens, multiplici foliorum rubentium ordine.

Bellidem flore pleno hortensem habent Mōspeli in hortis: sed non ita frequentem vt Basilæ; cuius ibi diuersi sunt colores, quemamodùm & Geneæ, ubi florentes obseruauit Nouembri & Decembri: albas in horto habui florentes Ianuario: sunt etiam Bellides satius in hortis Pa-

Locus & tempus

raui & Bononia. Montbelgardi habet in hortis: aliquot genera plantarum in Horto E. C. Alba plenam, rubras duas, unam foliolis florum angustioribus & fistulosis ferè, aliam latioribus in quibus cum rubore sunt partes, quas albas cineraceas ferè dicas.

BELLIS SYLVATICA.

Descript.



Radice fœcus fibrosa est quàm minor bellis, sed crassior, etiam aliquando lignosior: folia verò maiora, oblonga, per extremum rotunda, & in ambitu non-nihil serrata, hirsuta, subinde etiam subrubentia, longo pedicello donata: *Caliculi* ex radice nudi aliquot exeunt

dodrantales aut pedales ac maiores, *florem* singuli unicum sustinentes bellidis maioris similè, sed paulò minorem, foliis, radiatis albis, disco luteo.

Matthiolo in prioribus comment. bellis quoad Iconem: In postr. comm. Ital. & Lat. cum mag. fig. & Hist. germ. bellis media, Mittel Maßlieben.

Gesl. hort. Tabern. Icon. & Hist. Lobel. Aduers. pag. 199. bellis media. Obscr. pag. 252. bellis maior. Icon. Plant. pag. 476. bellis maior sylvestris. Teut. 561. *Existimamus* malè dici maiorem. Dodon. Lat. in fol. bellis prima, bellis sylvestris.

Clus. in postr. Histor. bellis media Matthioli, maior Lobelii, à vulgo ex Consolida minoris generibus habita.

C. Bauhin. Phyt. bellis 6. siue silu. media caule carens. An dicenda sit hæc bellis caule carene scio, meo iudicio caules non foliosi dici possunt pediculi flores sustinentes.

Frequentissima est in Alpibus pratis, unde illa sæpius in hortum transfuit Clusius, cum Viennæ ageret. bellidem sylvaticam siue mediam Tiguri observavi, & basilicæ in hortu D. Doctoris Fœlicis Plateri Medici, nec non Genevæ. Menfè Maio copiosam inveni florentem in montibus circa S. Vrsanè inter dumeta: transfuit Montbelgardum in hortum Ill. E. C. ubi diuturna non fuit.

BELLIS MAIOR.

Fibrosa radice reptat, caules emittens plures dodrantales & altiores, quadratos, modo in alas diuisos: folia oblonga, pingua, serrata, subacri sapore: *flores* buphtalmi aut Pyrethri, umbilico luteo, foliis in ambitu albis, odore nullo eccellente: foliola calycum habent fimbriam ni-

gricantem. Figura prior ex Fuchsiis, non malè videtur nobis exprimere bellidem ramosam, quâvis possit etiam poni pro Chrysanthemum.

Frater C. Bauhinus misit nobis bellidem maiorem, caule non ramoso, foliis valde angustis dentatis, serratisque, in acutum desinentibus, Parmicæ Fuchsi aliquando respondentibus, flore alioqui præcedenti similis, cui satis similis Fuchsiæ icon,

si folia tantillum angustiora picta esset: suspicabar fratris secundam, verum quæ de rotunditate acuminata ait, non conveniunt: duæ icones à nobis propositæ iam erant sculptæ.

Brunfelsio Tom. 1. Rhaph. 49. in folio. Parthenii quinta species, seu oculus bouis vel vaccinus: Eadem in quarto pag. 111. euphthalmos.

Matth. in priorib. côm. bellidis tertium genus, cæteris maius, sine iconè: In postr. comm. cum mag. figuris Lat. & Ital. bellis maior.

Fuchsius, bellis maior, Officinis nonnullis Consolida media. Germ. Gänßblum. Verum alia est consolida media.

Gesl. hort.

bellis, Consolida recentioribus maior.

Pro Bellide maiore Trag. Germ. malè figurâ Hyperici sub sequentibus nominibus ponit, G. Gänßblum/Moguntinenses S. Johans blum, hoc est, Florem S. Iohannis: Moguntinis, Treuerensibus ac Spirenibus falsè aug, hoc est, vitulinus oculus, Buphtalmus sed non Dioscoridis. Hermolaus Barbarus Bellium maiorem appellat.

Dodon. gall. Lat. in fol. Bellis maior, Marguerite grande.

Lobel. Adu. pag. 200. Obscr. pag. 253. Ic. Plant. pag. 478. Bellis maior, Consolida media Vulnerariorum. Germ. Gänßblum.

Tabern. Icon. & Hist. Bellium maius Gänßblum.

C. Bauhin. Phyt. Bellis 1. siue sylu. caule folioso maior, rarissimè flore pleno reperitur.

Cæsalpin. Bellis maior, iuxta vias nascens, de qua



qua ait. Canles rectos fert, dodrante altiores, foliosos: folia sunt Oleæ figurâ, serrata: flos in summo candidus, longè amplior Chamæmelo: æstare floreret, vtuntur quidam floribus cum axungia ad capitis vlcera maligna, quam Tineam vocant: non dubito hanc apud Theophrastum inter genera Anthemi censeri, quod foliaceum vocat. Theodorus Nigellam foliosam vertit.

Hort. Lusit. Bellis maior. Bellium maius, Genßblum, S. Johans blum.

cus. & Bellidem maiorem vocant Patauii *Margaritam*, comedunt mense Februario in acetariis. Genevæ viret tota hieme & Ianuario. Basileæ florentem vidi mense Octobri quâ itur Mouters & in pratis inter portam Stein & Eschen & apud fluuium Birsë intra urbem, & mense Iunio passim in pratis. Monspelii mense Maio: Lugduni frequens, Montbelgardi vulgaris in pratis, etiam in Horto E.C. spontanea, florens Iunio & Iulio.

Temperatam in caliditate & siccitate hanc tradit Tabernamontanus. Vtilis admodum vulneribus, & rupturis in potu bibita, vel Emplastri modo applicata. Lobelio si credimus eadem potest quæ bellides, eodem modo vsurpata.



Montis Lupi pedes & circum iacentibus campetribus squalidis & incultis.

minea, unciarum duarum aut fescunciæ longitudine, subinde crenata; magna verò caulis pars nuda est, flos summo insidet cacumini vnicus, maiusculus, Bellide præfissi maior, albus, disco luteo, capitulo squammis nigricantibus compacto.

Goer Cherlerus attulit collectam ad

ANTHEMIDES SIVE CHAMÆMELA Veteribus.

CAP. XIII.

BELLIS ALPINA MAIOR FOLII angustis rigidis.

scripio **E**X radice serpente, lignosa, nigricante, & à vna parte fibras spargente caulem emittit vnicum, cubitalem altitudinem excedentem, rotundum, striatum, ad radicem villosum, circa quem folia pediculis carentia, quinque vel sex digitorum transversorum longa, angusta, rigida, ex rotunditate acuminata, per circumferentiam crenata, nullo ordine disposita, in caulis summo flos vnicus medio luteus, quem plurima folia alba cingunt, totusque flos multo prior maior est: hæc in Baldo monte Veronensi provenit, vt Frater descriptionis autor prodidit. C. Bauh. phyt. Bellis 2. siue alpina maior.

BELLIS ALPINÆ ALIA SPECIES minor foliis non rigidis.

Hæc iam dictâ caule breuiore foliis duplo triploque angustioribus, & breuioribus, leuius crenatis, nec rigidis in exequitum acumen desidentibus, flore quinetiam minore, in montibus Euganeis Patauini provenit.

C. Bauh. Phyt. descriptionis auctori Bellidis secundæ siue Alpina maioris altera specie.

Hæc cum præcedenti nobis Chariff. frater C. Bauh. communicavit, quare nemo ante ipsum mentionem fecit, cuius studio indefesso in re Botanica multum debetur.

BELLIS MONTANA MINOR

scripio **S**esquicubitali est caule, eoque simplice & indiviso: folia terram proximè multa feminalia, per extremum subrotunda, serrata, longis pediculis nixa: alia per caulem alternata, gratum. III.

Genera Anthemon plura dicit Theophrastus. Anthemon, inquit, floreret particulatim, incliciens non ab imo, vt in ceteris, sed à summo: flos candidus circumdat, medium viridis tenet [id est pallidus,] & femini color idem: decidit id vt & spinosorum conceptaculo inani relicto: genera eius plura: quædam ab radice tantum foliata: Quædam in caule solum: sed hanc Theodorus Nigellam vertit, teste Cæsalpino.

At Dioscorides genera tria proponit flore tantum distantia, his verbis. Anthemidem alii Leucanthemon; alii Eranthemon; quoniam Vere floreat, alii Chamæmelum quoniam odorem Mali habeat; nonnulli Melanthemon, alii Chrysocomen [Otib. χρυσόκομης], alii denique Calliam vocant. Huius genera tria flore tantum distantia: rami dodrantes fruticosi, alis multis concaui: foliola parua tenuia numerosa: rotunda item capitula, intus quidem auri colore fulgentia, foris verò orbiculato ambitu floribus circumdata candidis, aut purpureis, magnitudine foliorum Ruræ. Hæc Dioscorides, quæ ferè ad verbum transcribit Plinius, addens eius florem inter coronamenta reponi; ac magnis laudibus celebrari ab Asclepiade.

Anthemidis, inquit Marantha lib. 1. cap. 9. tria genera posuit Dioscorides, tantum flore distantia: atque clariùs explicans seipsum, in colore, non in forma hanc discrepantiam sumplit. Vnde quia nullam aliam habebat differentiam, omnia hæc tria genera vnica descriptione complexus est: sed necesse fuit ea distinguere, vt quæ facultatum gradibus distarent: nam si æque omnia viribus pollerent, nullam fecisset in genera diuersitatem.

Potè in Anthemide hæc ex tam multis appellationibus nulla est, quæ non certam & rei coniunctam significationem habeat. Omittimus quas ipsemet hic declaravit, Eranthemon quòd Vere floreat: & Chamæmelum quòd Pomi odo-

rem habeat, Ceteræ etiam ex floribus colore odoræ consensu aliquarum Gentium factæ videntur: quæ ut interiore exteriorémue floribus colore magis amarent: sic Leucanthemon à colore albo: Chrysanthemum aut Chrysocomé à colore auri flauo eam indicauerunt. Vtroque enim modo in Scriptore hoc legitur. Quemadmodum ab odore Mali quem habet Malanthemon, Mali enim florem ea vox significat. Libet his addere, à Theophrasto lib. de plant. Historia 8. sæpius genere neutro Anthemon dictam fuisse.

Sunt autem Matthiolo, qui putent plantam, quam quidam Virgilii Adonidem esse censent, purpuream Dioscoridis esse Anthemidem, sed reuera hallucinantur, quod huiusce Anthemidis genus, Dioscoride teste, flores proferat in medio aureos, & forinsecus orbiculato ambitu purpureos, ut in Belli (Amello C. Bauh.) quadam videmus, à quibus maximè differunt vulgaris Adonidis flores qui Papauerorum siluestrium flores æmulantur.

Anthemidis siue Chamæmeli nomen maxime latè patet. Est enim Anthemis Leucanthemon propriè dictum Dioscoridi, nobis Chamæmelum vulgare. Est & Chamæmelum odoratissimum siue nobile repens flore simplici, Leucanthemon Græcorum dictum. Ab hoc variat Chamæmelum repens odoratissimum perenne flore multiplici: Est Anthemis Chrysanthemum quoddam Dodonæo, quam Chamæmelum aureum peregrinum capitulo sine foliis inscribimus. Sunt aliqui qui Buphthalmum & Chrysanthemum eadem esse herbam credant quibus non vehementer repugnat Cordus. Est hæc Chamæmelum inodorum, siue Cotula non fœtida. Habemus & alterum Chamæmelum fœtidum, siue Cotulam fœtidam. Meminit Camerarius ad Hist. Matthiol. Germanicam, Chamæmeli cuiusdam fœtidi ex luteo pallentis. Attulit gener Chelidonium Chamæmelum fœtidum marinum, collectum in maritimis Narbonensium, ubi occurrit non ita frequens. Exhibet Lobelius in Iconibus Plantini Parthenium marinum minimum, quod Chamæmelum marinum inscribimus. Buphthalmum veram & Chrysanthemum Dioscoridis eandem esse plantam conatur demonstrare Gesner. horti: nos de hoc agemus titulo hoc Chamæmelum Chrysanthemum quorundam. Est Chamæmelum Eranthemum, Anthemis Eranthemis Dalechampi, nobis Chamæmelum purpureum. De his nobis Chamæmelis cognominatis ordine iamiam dicendum occurrit.

CHAMÆMELVM VVLGARE AMARVM.

Descriptio

Hæc passim obuia est in segetibus, tenui fibrosa que radice, nec altè defixa: caules tenues, dodrantales, recti, foliis vestiuntur. Cotulae tenuioribus, odore exiguo, sed suauiter in ambitu albi, quorum folia vmbonem apicellis luteis constantem radiati circumstant: annua planta.

Anthemis

Diosc.

Camomilla

Sulg.

Camer.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Sulg.

Quam modò descriptum videtur nobis præceteris Chamæmelis, Dioscor. descriptioni respondere. Et hinc merito Anthemida notam esse scribit Corn. & officinis, & vulgo, sed Camomilla nomine ex græco Chamæmelo corrupto. Matthiolus etiam hanc depingens Anthemidis titulo pro Anthemide Leucanthemo Dioscoridis & Galeni recipit. Non placet Camerarium apud Matthiolum in Epit. & Hist. germ.

posuisse pro Chamæmelo vulgari odoratum.

Chamæmelum, inquit Tabernaemontanus, quod in Germania in agris spontè luxuriat, genum est Chamæmelum Veterum, siquidem spirat odorem bene olentis Mali: vires etiam & facultas continentur: vocatur à Græcis χαμαι-μελον, à Dioscoridis χαμαι-μελον, à Theophrasto χαμαι-μελον, à Hippocrate χαμαι-μελον, ab Alex. Tralliano χαμαι-μελον: à Latinis Anthemis, Leucanthemum, Leucanthemis, Melanthemum, Callia, Chamæmelum, Diacolea Apuleio seu Diocallia, Rotula Solis, Discus Solis, & Herba superba: Hippocrati Euanthemum, Theophrasto Anthemum & Anthemium, Tralliano lib. 8. cap. 2. Anthemium: Plinio secundo de re med. lib. 1. cap. 38. Proserpina herba:



ab aliis Oualida, Amolacia, Aulincæ herba, & Malium, à vulgo Medicorum, Herbariorum & Officinarum Chamomilla, Camomilla, & Chamæmilla: Serapioni de temp. simpl. cap. 22. Debonigi: Auerrh. Habonog: Algharauio Hefbe: Hali abbati Besbonig: & Besbonigi: Stephano interprete Arabico Babunegum & Xambunegum: ipsi verò Arabibus auctoribus Bebonici, Babonigi, Beborugi, Bubenegiman, Biben, Bembonig: Glossographo Auicennæ Behonigi: Italis Camamilla, Camomilla, & Mesenello: Hispanis Manzanilla saluage: Gallis Camomille & Camomille des champs: Polonis Komycen: Bohemis Rimen & thermanec: Anglis Camomyle: Vandalis Amalusta: in Africa Asperispe: Aegyptiis Thabaris: Brabantis Camillenbloem: & Camillen: Germanis Chamillen, Camillen, Camomillen, hemlein, Magdalenblum, Nocydenblum, Rangenblum, Altiens Camellen.

Anthemidem vocat Amatus Hispanicè Macella, Manzanilla, Arabicè Babunegi, & in cōtextu Chamomillam vulgarem. Ei Rob. Constantinus addit figuram hoc titulo: Chamomilla satua. Hanc tamen feri hæcenus non obseruauit.

Lobel. Aduers. Anthemis vulgarior, siue Chamæmilla. Ob. p. 445. & Ic. Plant. 770. Anthemis vulgarior.

Dod. gall. Chamæmelum vulgare, author aurè est vocari Chamæmelum album: ac officinas hoc vti pro Leucanthemo vero. Is tamen verum negat, ac idè Chamæmelum siluestre inscribit.

Chamæmelum vel Anthemidem esse verum Chamæmelum, non dubitat Gesn. de hortis, licet hoc Dod. gall. Chamæmelum siluestre vocarit. Gesn. in App. Chamæmelum vulgare Trag. vocat.

Quæ foris in orbem candida folia obtrinet è tribus Anthemidis generibus, ea est, inquit Fuchsius

Chamæmelum

mel Ta

Diacolea

Apuleio

Euanthemum

mum h

Anthemium

um T.

Proserpina

herba:

Babunegum

gum.

Rob. C.

not.

chius, quæ à Dioscōride propriè λευκάνθημον, vt vulgò hodie Camomilla vocatur, gall. *Camomille blanche*. Primum autem hoc Anthemidis seu Chamæmeli genus esse verum & legitimum Chamæmelum, neminem dubitare arbitror, quòd nihil in hoc sit, quod Dioscōridis descriptioni, quàm antè adscripsimus, non respondeat. Inscribitur à Fuchio Chamæmelon leucanthemon.

Tragus hanc, Chamomillam vulgarem inscribit, ac tertiam facit, agrestemque cognominat. Non minùs rectè Anthemidem Dioscōridis, Anthemon Theophrasti, Leucanthemon, seu Melanthemon Plinii lib. 22. cap. 21. esse existimat.

H. Lugd. p. 968. Anthemis leucanthemos Plinii. Item p. 1345. Chamæmelum siluestre Dodonæi (puta Gallici.) Non bene duas figuras vnius plantæ diuersis capitibus proponit, quasi diuersæ essent plantæ, quinimò videtur priori loco confundere Chamæmelum Romanum vocatum cum vulgari.

C. Bauh. phyt. Chamæmelum 3; [i. apud Matth.] siue vulgare, quod Leucanthemon Dioscōridis esse confirmat.

Chamæmelum vulgare obseruauit Lugduni, Basilæ, Montpelii, Genevæ, florens Maio in fegetibus. Montbelgardi abundat etiam in horto E. C. ac incuncte Eitate fegetibus interdum tam frequens & satis, vt non parum incommodum sit.

Vim habet, vt testis est Dioscōrides, radices, flores, & herba Anthemidis, exalci facienti extenuandique: potu & infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque: aduersus inflationes & ilei tormenta bibuntur: bilem suffusam expurgant: iocinorum vitia sanant: decoctio earum vesicæ fouentur: ex omnibus Anthemidis generibus, ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo masculula est hanc propriè Heranthemon vocant. Ea cui Leucanthemon nomen est, item quæ Chrysanthemon dicitur, vehemens urinam cient: angilios illiæ medentur: commanducant vlcera in eruptiones in ore sanant: nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturque in farinam ad abigendos febrium circuitus: flores & folia reconditi debent, & prunatum tusa, in pastillis digeri: radix quoque liccari, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars vna, modò contra, floris partes duæ & herbæ vna permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino multo diluto.

Est Chamæmelum Galeno tenuium partium: quamobrem digerendi, rarefaciendi & laxandi facultatem obtinet: tenuitate Rosæ persimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, quapropter lassitudinibus, vt si quid aliud, confert, doloresque mitigat: præterea tensa remittit & laxat, quæque mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata condensatæque sunt, rarefacit: adhuc febres quæ citra visceris alicuius inflammationis infestant, dissoluit, præsertim quæ ex humoribus biliosis aut cutis densitate consistunt, Quæ de re ab Ægyptiorum sapientissimis Soli consecratum est, febriumque omnium remedium putatur. Verum hac quidem in re à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt: iuuat autem pulchre reliquas etiam omnes, quæ melancholicæ sunt, pituitosæ, aut ex visceris inflammatione prognatæ: nam & harum remedium

Tom. III.

Chamæmelum vel strenuissimum est, vbi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondriis, vt siquid aliud, gratum existit.

Aqua

Tragus memoriæ prodidit, aquam Chamæmeli florum destilatam eadem efficere, quæ Dioscōridis herbæ simpliciter tribuit: puerperis verò primo loco positam in primis utilem esse, per eam enim efficaciter purgari. Qui morbo comitiali continuò vexantur, iis flores Chamæmeli aceto & melle decocti, propinari in potu debent, quo si vsi fuerint, statim conlurgunt, morboque per aliquot tempus liberantur. Chamæmeli odor, aqua eiusdem stillatitia, nec non lixiuium, in quo illa decocta fuerint, debilitati capitis & cerebri conferunt: decoctio eius, in ueteratis malignis vlcibus lauandis utilissima est. Oleum ex Chamæmeli floribus confectum, induratos tumores & collectiones emollit ac detumescere facit, doloresque mitigat.

Morb. comitiali.

Oleum.

De Chamæmeli vitibus hæc Matth. Indubi-

Experimentum contra flatus.

tatæ fidei experimentum contra dolores internos quos flatus peperit, vritur ad albedinem tales suillus, testitur in puluerem, cuius drachma vna ex vino propinatur in quo decoctum fuerit Chamæmelum. Eiusdem decoctum ex iusculo carniui, euphorisum est contra dolores colicos si bibatur. Scribunt quidam, si quis Chamæmeli tritipuluerem melle excipiat, vt fiat electuarium, deque eo quotidie bis horis tribus ante cibum, singulis vicibus cochlearis mensuram sumat, sensimque deglutiat, bronchocelen curare. Magni est Chamæmelum vsus in medicina ad compescendos dolores ventris, matricis, lumborum, renum, vesicæ, atque inter omnes plantas, quotquot in balnea contra calculum recipiuntur, nihil floribus Chamæmeli efficacius: faciunt & ad cruciatum spasmi flatulenti, aliosque conuulsuos: in quem finem vsus duplex commodissimus, vel enim Chamæmeli & Maluæ ex vino aut aqua factam decoctionem, colatam in vesicam infundunt bouinam, aut suillam, donec ad medium sit repleta, quam constricto collo parti dolenti applicant: possit & decocto addi oleum Chamæmelinum: Alter vtendi modus est talis, folia aut flores Chamæmeli cum seminibus Lini in sacculum coniunctum interponendum, qui in aqua calefacta parumper infusus, postea inter orbis duos expressus, quàm potest fieri calidissimus, loco dolenti imponitur, superdato panno quadruplicato calente, vbi refruxerit, denud eodè modo calefit: idque sæpius iteretur, mane ieiuno ventriculo & vespere, quotiescunque virgent dolores: prodest & ante applicatum partem oleo Chamæmelino inungere: præterea Chamæmelum in aqua decoctum cum fursuribus triticis, additâ postea axungia porcina, vt emplastri consistentiam adipiscantur omnia, tumores duos emollit, dolores mitigat, suppurationem promouet. Ad omnes tumores, quantumvis duos probarum est emplastrum calidum impositum, ex ramentis coriorum derasis, & floribus Chamæmeli simul in aqua coctis. Flores Chamæmeli mollicem cuti conciliant lotionem. Oleum Chamæmelinum tumores duos emollit, dissipat, dolores sedat. Clysteribus additur cum aqua florum Chamæmeli ad dolores intestinorum placandos, siue illi etiam sint ab vtero, renibus, vesicæ: inprimis autem ad conuulsiones facit, relaxat enim tensa, emollitque dura: Ad infantum tormina, vix præstantius inuenias, quàm vel omentum veruecinum minutim concisum, in

Dolores ventris.

Tumores

Chamæmelino oleo in fartagine, lento igne sensim frixum, calensque ventri inductum. Cum vini spiritus miscetur oleum chamæmelinum, quod vtiliter spasmis frigido imponitur, superaddito calente panno. Meminit Camerarius olei ex floribus Chamæmeli stillatitii carulei, cuius vsus sit multus in variis affectibus internis, præsertim verò contra tormina, si eius guttæ aliquot ex calido iulculo fumanter. Quæ omnia potissimum de vulgari, & in segetibus spontaneo Chamæmelo intelligi vult Dodonæus: Nobile enim, & illud quod flore pleno est, facultate esse intensiore, quam Chamæmelo à Galeno attribuitur. Caliditate siquidem & siccitate qualitatem illam viuienti familiarem ac temperatam, quæ Chamæmelo à Galeno tribuitur, quamque ipsum habere quotidiana ostendit experientia, multum excedunt, vtpote secundo ordine calida & sicca: cum autem & ipsa substantia tennitatem habeat coniunctam digerendi ac rarefaciendi potentia habeat ampliore: molliendi verò, dolorisque sedandi, aut mitigandi, remissiore: proinde vbi magis, quam vulgaris vsus Chamæmelum potest, incalfacere, aut rarefacere opus est, vtiliter adhiberi possunt, vti in balneis, quæ sudoris euocandi & rarefaciendæ cutis causa parantur, in quibus horum Chamæmelorum vsus haud est negligendus: nam & cutim nimis adstrictam rariorem faciunt, sudorem euocant, bonumque corpori odorem conciliant. Auctor est Tabernamontanus, ex floribus Chamæmeli hoc sæculo etiam Chamæmelites vinum, extractum, conseruam, sacculum, & oleum chymicè arte extractum parari, de quibus lector ipsummet consulere poterit.

CHAMÆMELVM ODORATISSIMVM
repens flore simplici.

Descriptio



Non, vt vulgare, recto assurgit caule, sed in terram proci- duos multos fundit radix coliculos, paullo breui- ores, foliis vestitos habitio- ribus, vegetio- ri amabili o- dore præditis: flores nò mul- tum ablimiles Chamæmeli vulgaris flori- bus, radiatis albis flosculis vimbonem coronantibus.

Figura ex Fuchsianis minùs placet quia proci- dui ramuli radiantes non picti.

Camer. in Epit. Matth. ol. pro Anthemide siue Chamæmilla ponit figuram Chamæmeli odora- tissimi præter sententiam Matthioli, quod Dios- coridis Anthemidem cenfer. Idem facit etiam in Hist. germ. vbi Chamæmelum & Camomillà nominat, Chamillen / hermuget / welsch oder Römisch Chamillen / Chamomillam Italicam vel Romanam.

Turn. part. 1. Primum Chamæmeli genus, 2. d.

Græcis vocatur, Angl. Camomyle / G. Römisch Camillen / Offic. Germaniæ Chamomilla Romana. Rara est in Germania: in Anglia verò tam frequēs, vt nò solum hortensis sit, verum etiam supra Londinum sponte exeat planitie Richemontana & Brantfordiana, omnium verò copiosissimè in Hunflediana.

Lob. in Adu. Anthemis siue Leucanthemum odoratius, Romanorum, Belg. Roomsch Camillebloemen. Anthemis priore suauius multo quiddamque aromaticum Amaraci, aut Abrotani halans, multoque ad aspectum hilarior & copior, & hac denique notione Romana dicta. Obs. p. 445. & Ic. Plant. p. 770. Anthemis seu Leucanthemis odorata, Parthenium Tragi.

Dod. gall. Chamæmelum Leucanthemum, & Chamæmelum album. Lat. de florib. & in fol. Chamæmelum odoratum, Chamæmelum nobile Tragi. Olim in Hist. gall. faciebat Antiquorum Chamæmelum, & præsertim Apulci bene olens, nunc mutat sententiam & figuram, quæ in postremis melior. Et sanè id esse, quod à Dioscoride, Galeno, aut aliis Veteribus in vsu receptum fuit, non omnino videtur asserendum: verissimè est ab ipsis fuisse præteritum & incognitum.

Camer. hort. Chamæmelum odoratum, Italicum, simplici flore. In Hist. Matthiol. germ. quoad figuram Chamæmelum siue Camomilla. In Epit. Anthemis Chamæmilla. Huic præter opinionem Matthioli adscribit vulgaris Anthemi- dis nomina, descriptionem Dioscoridis, itemque vires & facultates etiam ex Galeno, quæ huic nò omnino conueniunt.

Eundem errorem committit H. Lugdunensis, sequuta dubio procul cum Camerario Dodonæum gallicum. Confundit Historia Anthemi- dem Romanam, cum Anthemide Leucanthemo Matthioli, siue Chamæmelo vulgari, cuius iconem videtur pro Anthemide Romanam, quam ex aduersariis Lobelii describit, ponere, miscetque nomina linguarum. Falsò præterea si- bi persuadet Chamomillam Romanam esse Chamæmelum verum Dioscoridis, elque vires Anti- quorum malè adscribit. Gcsn. hort. Chamæmeli Leucanthemum Dodonæi (gallici) Camomilla Romana alba quorundam, Chamæmel. odoratū uel nobile Tragi, Chamæmel. hortense. In appéd. Chamæmel. nobile, Parthenium nobile Tragi.

Trago. Parthenium, nobilis Chamomilla [quæ propriissimè Parthenium, à Serapione Matricaria dicitur, inquit postea lib. 1. cap. 63.] Chamomilla prior, verum ac nobile Parthenion Diosco- ridis, Perdicium & Muralium Celli, aliorum Leucanthæ & Tamnachum, Plinio lib. 21. cap. 31. recte. Parthenium, vt Dioscorides testatur, alii Amatacon, alii Anthemida, alii Leucanthemon, alii Chamæmelon, alii Chrylocatin, alii Melaba- thron, nonnulli Campellrem florem, Romani Solis seculum, aliqui Millefolium, Hetrusci Cau- tam, Aphri Thamath appellant. sed quod ad has appellationes attinet, tribuuntur & ipsæ aliis stirpibus, vt verissime dicas, multa nomina mul- torum errorum sapienterò esse causas.

Tabern. Icon. & Hist. Chamæmelum Romanū inscribit, ægynomiarque Leucanthemum, & Chamæmelum nobile. Huic iconem non pro- bo, quia repente non facit.

C. Bauhin. Phyt. Chamæmelum 1. siue nobile, seu odoratius. Gerard. Anglo Chamæmelum Ro- manum.

Chamæmelum repens odoratissimum, vocant Medici Chamæmelum Romanum, siue nobile, Offic.

Chamæ- mel. Len- cithemum. Dod.

Chamæ- mel. odorat. tunc tra- simplex. Camer. Error. Ca- mer.

Lugd. Lu- sus.

Partheni- um Tragi.

us &
pus.

Offic. Chamomillam Romanam, & G. Römisch
oder Edel Camomilleu. Belg. Romsche Camil-
leu: Galli Camomille Romains ou odorante: Hisp.
Manzanilla, siue Manzanilla i. e. Mancianilla.
Tabern. de odore aromaticorum pimentorum Ma-
cianorum; Angli Lamomylle.

Chamæmelum repens odoratissimum flore
simplici habui Basilicæ in horto, vt & Lugduni.
Tubingæ vidit in horto D. Fuchsi. Montbelgar-
di copiose florebat in horto meo adhuc Nouem-
bris. Audio passim provenire in Nortmannia
spontè. Abundat circa Tyberim non longè à
Roma, & præfertim, vt Camerarius tradit, in vil-
la Adriani Imperatoris. Restitibi fertilitate &
& perenni radice sese instaurat & fundit propa-
gationes proculcationis contemptrices, eoque vo-
luptatis ergo totum vertentem annum in Angli-
cis viretis attondetur: neglecta namque, pro-
trita, & reiecta facilius & vberius vernat & lu-
xuriat. Siquidem teste Lob. in Aduers. Angliæ
vniuersè haud alia ferè nota. Ruri miliari vno,
aut altero ab vrbe Londino plurima, herbicidis,
atidis, vbi spontè orta. Galliæ & Italiæ meri-
dionalibus [tametsi Romana dicta] rarior spon-
tè. In Belgio & Northannia ad Draydum vr-
beculam multa.

Angliæ vniuersè, si Lobelio credimus, haud
alia vlt recepta, quàm hæc. Syrupus ex huius
floribus, succo, & vino albo conhit, ad splenis
& hydropis icterum optimus. Secus puluillus &
thoros & ambulacra infertur. Plura de huius
viribus vide antè, ex Trago & Dodonæo.

CHAMÆMELVM REPENS odoratissimum perenne flore multiplici.

criptio

nomyia
nomina
guarū

neum λευγαθιμων, flore multiplici. Figura non in
torum placet.

Camer. hort. Chamæmelum odoratum Itali-
cum flore pleno. In Epit. Marth. Chamæmelum
flore multiplici, ita densè stipato, vt nonnun-
quam centrum luteum prorsus sit opertum. Ad
Hist. Marth. germ. Chamæmelum flore pleno
Gesult Chamillen.

Dod. lat. in fol. Chamæmelum quoddam odo-
ratum, foliola medium floris ambientia densis-
sime multiplicans.

Tabern. Ic. & Hist. Chamæmelum Romanum
flore multiplici. Hoc in Hist. licet secundo loco
pingat, tamen pro tertio describit, ac insuper a-
liam eius speciem assignat, quam quarto loco
recenset.

H. Lugd. p. 969. Anthemis, Leucanthemis ni-
uea Anglorum flore multiplici. C. Bauh. phyt.
Chamæmelū siue nobile flore multiplici. Ge-
rard. Chamæmelum Anglicum flore multiplici,
double flowered Lamomill.

Abundat nunc in horto Ill. C. W. Montbelgar-
di, vbi hyemem perfert: florens Iunio & Iulio.
Circa Aureliam spontè nasci relatum est Came-
rario: instructioribus tantum hortis familiaris
in Germania, primò delata ex Anglia, vbi multi
flore pleno reperiuntur.

Eadem potest, quæ prior.

CHAMÆMELVM AVREVM peregrinum capitulo hinc foliis.



Cauliculus
profert Descriptio
tenues, inuali-
dos & in terra
prostratos; su-
lia quoque ten-
nua, vt pro-
ris, sed candi-
diora, & pa-
lulum mace-
ra: pro flore,
qui aliis om-
nibus Chamæ-
m h ac Co-
tilarū generi-
bus medius,
luteus est or-
bicularis; nu-
dus & nullis
circumambi-
entibus foliolis
cinctus; radix

similis. Et huius herba odorata quoque est, o-
dore & facultate priori similis.

Chrysanthemos Anthemis dicta, vmbellæ, au-
reæ bullis, folii facie, odore & sapore Roma-
næ Chamomillæ est, aiunt Aduersaria: Sed ma-
gnitudine vincitur, nullisque foliolis radiatim
cingitur eius vmbro prominulus: usus non dispar.

Dod. gall. Chamæmelum Chrysanthemum, à
Græcis χρυσανθεμον appellatū, à Lat. Chamæmelū
luteum, à Germ. Gele Romsche Camille; à
Gall. Camomille saulne cultiue Aliam huius (spe-
ciem) tradit, cui folia tribuit lutea in capitulo-
rum circuitu, primo Chamæmelo Leucanthe-
mo, odorato, albo, similem odore & formā, ex-
ceptis floribus omnino luteis. Imaginaria nobis
videtur secunda hæc Chrysanthemi species Dod.
gallici, quandoquidem Lat. in folio eius nullam
mentionem facit, & silentio præterit.

Lob. Aduers. p. 343. Ic. Plant. p. 446. Anthemis
Chrysanthemos.

Tabern. Icon. (vbi titulus est transpositus) &
Hist. Chamæmelum luteum.

H. Lugd. p. 969. Anthemis Chrysanthemos
Dodonæi. Item: Anthemis Chrysanthemos Pe-
næ & Lobeli. Frustra proponit duas icones v-
nius plantæ.

Gerardo Chamæmelum nudum odoratum, Sweete naked Camomill. C. Bauhin. Phyt. Chamæmelum 6. siue luteum capitula line foliis.

Locus.

Spontè non provenit, sed magna diligentia colitur, non solum in hortis Germaniæ, verum etiam in Brabanticis & Anglicis.

CHAMÆMELO AFFINE, BUPHTHAL-
mum Italicum segetum altissimum.

Descriptio



TAm altè affurgit, ut segetes in Italia etiam superet, uti retulit D. Agorius Medicus Argentinensis, & in studio Botanico versatissimus, à quo ramum habemus superum hirsutum, foliis alterno positum ex vnciali distantia vestitum, minutissimè ac profundè dissectis, quorum se-

mentorum extremitates, velut pilos tenuitate sua representant. Summitas florem sustinet album, singularem, figura & facie Bellidis maioris.


Hanc eandem etiam vidi Pforzheimerii mense Maio & Iulio cum flore.

Simplicibus autem caulibus dumtaxat observari, per quos sola Chamæmeli lutei quorundam, seu Buphtalmi Matthioli, asperiuscula: flos in fastigio vnicus, iam dicti Buphtalmi flori æqualis, radiato in orbem simplice foliorum candidorum agmine constans, umbilico luteo differt à Cotula fætida, ne quis fallatur.

CHAMÆMELVM INODORVM SIVE

Cotula non fætida.

Descriptio



Radice est satis crassa, multis adnatis fibris capillata, haud alia foliorum florumque facie à Cotula fætida, solo narium iudicio discernenda, ut quæ in hac nullum, nedum fætidi odorem, deprehendat.

De hoc Fuchsius in H. cap. 52. loquitur in hunc

modum. *Buphtalmus* Græcè, Buphtalmum Latinè, hodie Oculus bouis aut vaccæ, & Cotula non fætida herbaris vocatur: Germ. *Rinfaug* oder *Rhüang*: Gall. *Oeil de bœuf*, *pisse en liât*: ou *Camomille sauuage*. Buphtalmum autem non alia ratione dixerunt Veteres, quàm quod eius flores oculi imitentur formam, & bouum potissimum oculis similes sint.

Cotulam non fætidam esse verum Buphtalmum rectè contra Fuchsi opinionem negat Dodonæus, tam in Hist. gallica, quàm latina in folio. Tertia species Chamæmeli, Cotula non fætida appellatur (ait in gall.) Camomilla fatua, & Camomilla inodora, Grecis quibusdam *Buphtalmus*, cum tamen verum Buphtalmum non sit, quare melius Cotulam non fætidam inscripsi, & Cotulam albam cognominavi.

Sunt aliqui (inquit Cord. in Dioscor. lib. 3. c. 156.) qui Buphtalmum & Chrysanthemon eandem esse herbam credant, quibus non vehementer repugnabo. Illud tamen nosse oportet, esse plures Buphtalmi species.

Tragus hanc tradit pro Chamomilla quarta, quam, quia odore proflus destituitur, à reliquis quasi degenerans, Chamomillam fatuam, inspidam, non odoratam, & Cotulam non fætida vocari posse concedit. Hæc ipsi ea videtur esse, quam Dioscorides Chrysanthemon appellat, cuius plura alia nomina eodem loco vide.

Lob. in Aduers. Inodora Cotula, minor Parthenii species inter segetes, odore imbecillo, aut nullo. Tabern. Icon. & Hist. Cotula. Iconem Cotulæ non fætide Tabernamontani, cur Gerardus ponat pro fætida nescimus.

H. Lugd. p. 1. c. 348. Cotula non fætida, Buphtalmum Fuchsi. C. Bauh. Phyt. Chamæmelu 4. siue inodorum, quod solo odore à priori (nobili) discerni posse putat.

Lugduni & Monsipeli Chamæmelum inodorum observati, & Basileæ pulcherrimè florens mense Octobri. Montebgardii etiam abundat. Fuchsius cum Tubingæ essem Buphtalmum adhuc assererat: Genevæ florens Maio à me observatum in arvis, sapore amaro est.

Cotulam inodoram moderatè calidà esse, & ad Chamæmeli vulgaris temperamentum quantenus accedere legimus in Hist. Lugdunensi, quod tamen arduum est & difficile admodum credere, iudicent lectores.

CHAMÆMELVM FOETIDVM, SIVE

Cotula fætida.

CAP. XIV.

SI fecundum nacta solum fuerit fætida officinarum Cotula, parum abest quin ad duos cubitos se porrigat, ramis multis à radice digitalit crassitudine alis crebris concauis: in quibus *folia* Chamæmeli, tenuiter incisa, odore abominabili: *flores* Chamæmeli vulgaris, albi, radiati, bullam ambiunt luteam in tuberculum rotundū paulatim surgentem.

Hæc facile Plinii Buphtalmos esse putaretur, inquit Ruellius, quam rustici Bouis oculum, & officinæ Cotulam ab odore fætidam appellant. Siquidem similem bouum oculis florem habet, folia Feniculi, fruticosa: nec aliter florem explicat, quæ faris Cotulæ cognomento fætide congruunt. Hallucinantur, qui Cotulam vulgò dictam, Parthenium esse putant, cum solum ei Feniculi,

Fœniculi, Parthenio Coriandri tribuatur. Cotulam Sueffiones *Caneſonem* vocant, quaſi Canulam, quodd herba in dilutum virore canefcat, apiariis optime cognat.

Tragus lib. i. cap. 47. de Chamomillis ſecundo loco Cotulam fœtidam deſcribit, eamque inter nomina,



Chamomillam alteram, Cotulam, Cautam, vel Chamomillam fœtidum, Cynobotanem, Cynanthem, Germ. *Broutendill*, & *hundres dyll* vocat, ſicque poſſe ait, vt Thaliétrum ſit Dioscoridis: Neque enim eſſe Partheniũ, vt multi putarint.

Cordus in Dioſc. quam Pharmacopole *Cotulã fœ-*

tidam vocant, Bupthalmi ſpeciem minorem eſſe concludit. Sic & Corn. Bupthallum quoque nominat.

Brunſell. Tom. i. Cortulam fœtidam; quartam ſpeciem Parthenii dicit, ſuſpicaturque eam eſſe, quam Leoniceus Cautã, Cortã & Cortã vocauit.

A Dod. gall. reſenſetur inter Camomillas ſilueſtres, & ſit Chamæmeli ſilu. ſpecies ſecunda, vocaturque latinè & officinis *Cotula fœtida*, aliis *Cauta* & *Camomilla fœtida*, græcè *κυνανθη* & *κυνόβοταν*, h. e. Camomilla & herba canis, germ. *bro tendill* / *hundres dyll*, & *milde Chamill*, Brab. *paddebloemen* / & *ſtinde oder mild Camille*. Idem in Hiſt. Flor. & lat. in fol. Cotulam albam inſcribit, ac inter ſilueſtria Chamæmela reſenſet fœtidumque cognominat, galliceque *Eſpargoutte* vocat, additque Fuchſium voluiſſe eſſe Parthenium; quam opinionem improbat.

Quod Matthiolo *Cotula fœtida* incognita fuerit, id probè demonſtrat, quodd eam deſcripſerit, neque depinxerit, dicens tantummodò, Contendunt Braſſauolus & Fuchſius eam omnino plantam verum reſerre Parthenium, quam herbarii vulgò Cotulam fœtidam appellant. Sed quàm iſti magno in errore verſantur, iudicent ii qui probè ſciunt Cotulam fœtidam folio eſſe Fœniculi, aut Anthemidis potiùs, quàm Coriandri: neque ſapore vſque aded amaro, vt in Parthenio requiritur. Et hæc non ſua ſed Ruellii verba ſunt.

Lob. in Adu. p. 35. titulo de Matricaria, ait Cotulam vulgi magis quadrare Parthenio Plinii & Pauli, quam herbariorum Matricariam, quamuis ſi vltim odoremque reſpicias, quibus virginis morbis Matricis opitulatur, vtraque poſſit Parthenium dici. Idem poſtea titulo de Parthenio p. 34. ait. Parthenium, vel virginea, eſt *Cotula fœtida*, non Matricaria: illos præterea reprehendit & potiſſimum Matthiolum, qui hæc Parthenium negarint.

Gefſn. quoque de hortis Parthenium interpretatur. Tom. III.

tatur, quam alii Cotulam fœtidam vocant, & ipli in cat. pl. Thaliétrum videtur.

H. Lugd. 1345. *Cotula fœtida* Dodonæi. C. Bauh. phyt. Chamæmelum 5. ſive fœtidum. Camera. apud Matth. in Hiſt. germ. Chamæmelum à D. Thoma Penzø miſſum, in hortis valdè ſe propagans, paulò tenuius vulgari & odore multò gratius, in vulgare tamen degenerans.

Baſileæ Chamæmelum fœtidum quã itur Moutets vidi adhuc florens menſe Octobri, item intra & extra urbem; intra portam cineream & lapideam ad fluuium *Eiſe* / & quã itur *Brenzach*; Genevæ menſe Maio. Lugduni & Môtbelgardi paſſim abundè provenit, etiam in hortò E. C. Wirtembergici.

Odor huius capiti obeſt, & ſi crebrò vtaris, Virei phreneſum inducere crèdatur, teſte Brunſellio: Sed decoctio eius, authore Trago, non alter, quã p. Caſtoreum, contra præforationem vteri, inſeſſu, fomentationibus, ac odoratu ſaluberrima eſt. *Cotula fœtida* tuſa, & emplaſtri inſtar vulneribus impoſita, illa conglutinat, ac perlinat. Sapore eſt acutiſſimo, inquit Matth. in poſt. commentariis, & exulceranti vi prædico.

Calidam autem ſiccamque eſſe, odor ſaporque demonſtrant. Apiariis, vt prodidit Ruellius, optimè cognita, qui hæc ſuas fricant manus. uel ſecũ habentes geſtant, cum alucaria caſtrãdaſũ, atq; ſequentiũ impetus ſunt cohibèdi, illico furore huius ſenſu edomito miteſcunt. Nã etli flos ſit pulcherrimus ita vt apes amœnitate huius illectæ eminus aduolent, huic tamen non inſident, ſed herbam totam perofæ diffugiunt, vel certè guſtato flore protinus ſatiſdiox tranſuolant. Nam apicule muſcæque, quæ conuenientes ramis huius coheſerunt, emoriuntur, argumento; quodd hunc fruticem demortuis apibus aut muſcis inuenies ſemper onuſtum, ita apibus aduciat.

Locus & tempus

Tempus

CHAMÆMELVM FOETIDVM marinum.



HAVD multum diſimilis habitus à Chamæmelo hortenſi. Verum non modò caules remigque ſtriati, ſubrubentes, lanugine albã ſunt veſtiti; ſed etiam folia, eaque minutius, vt videtur; diſſecta, & propemodum cadiçaria: flores æquales, ſtellaris candidiſque, in ambitu radiatis foliolis umbilicum luteum ambi-

tibus.

Attulit gener Cherlerus in maritimis Narbonenſium collectum, vbi ei occurrit non ita frequens. Figura facta eſt ad plantam ſiccã.

Deſcriptio

CHAMÆMELVM MARINVM.

CAP. XV.

Complures humi spargit *coliculos*, palmares
Caut dodrantales simplices, per quos ordine

Descriptio



multis fibris donatæ.

Lob. in Adu. & Icon. Plant. p. 774. Cotula siue
Parthenium marinum minimum.

Floret Aprili, Augusto, & Septembri.

CHAMÆMELVM CHRYSANTHEMVM
quorundam.

CAP. XVI.

Descriptio



superent, odore Chamæmeli: in singulorum ra-
morum fastigio *stos* vnicus, Chrysanthemi, totus
luteus, siue quæ in ambien sunt folia spectes, si-
ue discum qui rigidulis apicibus asper est: *calyx*
porro cui insidet, incanus, Chrysanthemi instar
quamosus est.

De Chamæmelo Chrysanthemo ita differit
Ruell. lib. 3. cap. 69. Bupthalthmon, quâ Romani
Boatiam appellat, eandem esse Dioscoridi cum

Caulibus
Cubitalib. & maioribus,
tenuibus &
incanâ lan-
guine obduc-
tis, pluribus
propter terram
rubentibus, ex
lignosa radice
obliquè exor-
tis ramosis.
folia adnascu-
tur itidem la-
nuginosa. Mil-
lefoliū, denti-
culata, pinna-
taque, multò
minora, quip-
pe quæ non
temerè vnciâ
longitudine

Chrysanthemo vocata nonnulli putant. Est hæc
dicta ruribus nostris Camomilla crocea, & est
Bupthalthmon Plinii & Dioscoridis, cuius pictu-
ra respondet. Suspicio eundem eodem libro
cap. 102. per Cotulam suam, quam inibi tradit,
maiores, intelligere quoque Chamæmelum hoc
aureum quorundam, quamvis in descriptione
multa habeat, quæ non conveniunt. Verè is
mos Ruellii, vt cōcinnat suas descriptiones an-
tiquorum verbis, & frustra pro suis venditet. Si
eandem nobiscū intelligit plantam, vt eius ver-
ba demonstrare videntur, cur non monuit ea de
plantâ iam suprà dictâ intelligenda esse, & sic se
bis eandem tradere?

Est Bupthalthmon (inquit Trag. qui præsentem
nostram plantam hoc titulo depingit & descri-
bit) tota sua substantia vulgari Chamomillæ cō-
similis, nisi quod radices, caules, folia & flores
habet crassiores, proceriores, latiores. Huius flo-
ribus vtuntur mulierculæ ad linimenta sua, qui-
bus lectos illinunt, ac idè patrâ voce Streich-
oder sterckblum vocare solent. Quam verò in
Dioscoride nomenclaturâ habeat, facillè intelli-
get qui flores, caulem, folia, & radicem pressius
confiderit, cūque Bupthalthmo Dioscor.
contulerit. Est itaque hæc planta non Eranthe-
mon Hippocratis, vt multi putant, sed potiùs
Bupthalthmon verus Dioscoridis, quem ille Bal-
samenam, Hamorrhæam, Mercurii genituram,
Aphthitis semen, aut Mnesitheū, Cappacoraniâ,
& Narat, nec non Cachlan cognominari tradit,
& Serapio cap. 158. Bichar vocat. Chamæmelū
hoc Tragus antea hoc lib. 1. cap. 45. Bellidem ma-
iorem luteam vocauit. Item postea 118. Chamo-
millam luteam.

A Fuchsiæ Chamæmelon aureum inscribitur,
ac alterâ Anthemidis genus statuitur, quod Dio-
scorides à luteis per ambitum florum foliis, qui-
bus constat, haud dubiè Chamæmelon Chrysan-
themum nominari, & Herba S. Mariæ vulgò ni-
cupatū sit, Germ. Goldblumen & geel Camillen/
Gall. Cam. mille jaune.

De Chrysanthemo seu Caltha Cordus in Di-
oscor. lib. 4. c. 58. differit, vbi eam à Germ. Gold-
blum & à Lat. Bupthalthmon appellari tradit.

Camomillam suam siluestrem quartam Do-
don. Gall. Corulam luteam inscribit, quam ait
quosdam Chamæmeli (Dioscoridis) secundam
speciem existimare, ac vocare Chrysanthemum,
verum illos falli. Quinam verò hi sint in Hist.
de florib. & lat. in fol. indicat, dicens. Corulam 3.
siue luteam Fuchsius Anthemidis speciem, &
Chamæmelum Chrysanthemum facit: folio ta-
men parum, odore nullatenus, Anthemidem siue
Chamæmelum Leucanthemum refert. Matthio-
lus pro legitimo Bupthalthmo depinxisse videtur:
desideratur tamen folium Marathroëides, quod
Bupthalthmo esse Dioscorides testatur. Quare
inter Corulas & siluestria Chamæmela potiùs
reponendam duxi, quàm alterutrum temerè as-
serere.

Gesn. de hortis Bupthalthmum veram nomi-
nat, flore Bellidis maioris, sed toto semine per-
amaro. Dodonæum carpit (& merito mea qui-
dem sententia) quod Bupthalthmum faciat herbâ
illam, qua pro Elleboro nigro quidam vtuntur. Is
verò Chrysanthemum Dioscoridis & Bupthalth-
mum eandem esse, meo iudicio non absque er-
rore statuit.

Sed & Matthiol. cum Amato Bupthalthmum
vocat. Figura eius in prior. comm. non placet. In
post. nonnihil eam mutauit. Quam verò Camer.

Bupth.
Trago.Chamæ-
melon
aureum
chris.Camom-
illa.Cordus
Dodon.

Matth.

in Epit. & Hist. germ. eiusdem posuit, Buphtalmum Matthioli non respondet. Videtur Buphtalmum tenuifolium, folio ferè Millefolii. Ait autem is. Variæ exhibentur nomine Buphtalmi vulgares plantæ, vt Cortila à Fuchfio, Helloborine flore luteo à Dodonæo: Buphtalmum vulgare Croata vocant Herbari serpensis, Græci & Latini Buphtalmum, Oculum bouis, Itali *occhio de bue*, Bohemi *ivolowee*, aut *Kivietec*, Galli *œil de bœuf*, Arabes, *Bihar*.

Loeb. in Adu. Buphtalmus, Oculum bouis Millefolii folio, Chrysanthemum Fuchfi, Alter atticus Cordi. In Icon. Plant. p. 772. Buphtalmus, Oculum bouis.

Tabern. Icon. & Hist. Buphtalmum, de quo ait Errant qui Buphtalmum hoc, Chamæmelam Chrysanthemum faciunt. Buphtalmus dicitur Dioscoridi incorruptibilis genitura [*γενος ἀφθαρτου*] Boanthemum, Mercurii genitura [*γενος ἑρμου*] Cappadoriana, Cachilas & Boaria [*Βουαρία*] Herbariis Buphtalmum Chrysanthemum, Oculum vaccæ, Oculum bubulus, Cortula lutea, & Herba crisipula, Nicolao Myrepsio. Crespula & Crespulus, Serapioni Bihar, Aicennæ Bihar, & teste Bellunenfi, Chiaofegem, Peonafar, & Peonafati, Africanis Narrat, Hispanis *Dio de Buey* & Ben Mequeres *Amarillo*, Hung. *őfőzóm* / Belgis *Strickblom* / Germ. etiam *Steinblum*, Viennensibus Rhizotomis *mulierculus gelb fassblumen*.

Gerard. Buphtalmum album. Cur pro Buphtalmo albo proponat iconem Buphtalmi Tabernamontani flore luteo, ignoro, & fortassis ipsemet.

Turn. Chamæmeli alterum genus, Chrysanthemum dictum, Angl. yellow Camomill.

H. Lugd. p. 382. Buphtalmum Matthioli.

Claf. Pann. p. 569. Buphtalmum vulgare: Hist. post. p. 332. Buphtalmum vulgare Chrysanthemum congener.

C. Bauh. phyt. Buphtalmum 5, siue Dioscoridis.

Cæsalp. lib. 12. cap. 27. Chrysanthemum in rudibus nascitur, simili Corulæ tum foliis, tum caulibus, hirsutioribus tamen: flos secundum totum luteus est, ac sine odore: quidam pro Buphtalmo accipiunt.

Chamæmelum hoc Chrysanthemum quorundam primò vidi Tubingæ, postea Basilæ extra portam lapideam mense Iulio & Augusto florentem; Monspelii prope aquas mortuas; vt vocant; Pataui in hortis. Montbelgardi copiosum habeo in orto E. C. florens Iunio, Iulio, Augusto, & adhuc Nouembri, hiemem perferens; diuque durans, ac se disseminans. Apud Belgas hortensis, authore Dodonæo. In Anglia, quod meminit Turnerus, nusquam vidit. Germaniæ & Angliæ hortis, inquit Lobelius, inquilina. Romano autem agro, Hetrusco & Gallo-provincia prope Olbiam ad mare Hieres vocatum, spontè secus vias & margines satorum: flores Æstate, etiamque in vique brumam Londini vegetos vidi in orto Morgani, & Brittoia. Clusius frequentissimum esse prodidit per vniuersam Pannoniâ, etiam illam, quæ ultra Drauum fluuium est, atque tota Austria in agris, & secundum vias passim Moguntiaci agro, in Moravia; Bohemia, & Norimbergensi agro. In aruis inter Auenæ & Triciti fegetes, peculiare earundem viciu nascitur, inquit Tragus. Solent autem mulierculæ illud cum in flore optimo fuerit, Iunio mense colligi.


Tom. III.

gere, siccare, & ad vsus quotidianos recondere.

Vfus est hac herba Tragus in vino decocta aduersus inueneratam felis suffusionem, potu illam decoctionem calidam, hoc morbo laborantibus, tanquam cōcoquens & discutiens remedium exhibuit, certoque deprehendit eam extenuandi, discutendique & educendi citra dolorem & periculum vi præditam. Habent flores omnes facultates odoræ Chamomillæ, possuntque loco florum Absinthii vsurpati. Croatarum mulieres, vt refert Clusius, Buphtalmum vulgare tritum vtiliter vulneribus imponi asserunt. Floribus eius vntur trui ceruicæ ad linimenta sua, quibus lectos illinunt, quâ ratione Croco patitur. Et quantum nobis constat, hodie florum huius nullus est vsus in coronamentis, vt narrat Ruellius, qui ei magno errore Buphtalmi vires adscripsit.

Vires
Vfus,

CHAMÆMELVM PURPUREVM.



Diversum est à dictis Chamæmelum purpureum, Descriptum quod hic depictum est, foliis, ramis, capitulis grandius & amplius reliquis Chamæmeli generibus, sed filium quæ capitula ambiunt orbe purpureo decorum, flos priusquam dehiscat, corticoso compactilique involucrio, propemodum, tam crasso &

evidente quàm in Cyano; coërcetur. In asperis locis provenit.

Rarâ hæc est planta & paucissimis nota. Apud H. Lugd. Anthemis Eranthemum p. 971. inscribitur, ac Chamæmeli Eranthemum nomine describitur. C. Bauh. phyt. Adonidem secundam, siue flore maiore cognominat.

BUPHTALMVM ANTIQVIS.

C A P. XVII.

VT de Buphtalmo Verèitum agamus, hoc loco requiritur. Si quidem ex dictis nonnullæ pro vero Buphtalmo habentur, nec pauca ex posthac dicendis pro eo à quamplurimis creduntur & assumuntur.

Buphtalmus igitur [quam quidam Chachlan vocant, authore Dioscoride] teneros emittit caules, & quodammodo tenues; folia Fœniculi; Flores melinos, maiores, quàm Anthemidis, oculorum similitudine: vnde & herba nomen traxit. In campetribus & circa oppida nascitur. Huius flores triticum cerato ædemata duritiaque discutiunt. Aiunt verò, post exitum à balneo epotâ, regio morbo correptis ad tempus aliquod colorem gratiorem facere.

Q 2

Eadem Plinius lib. 25. cap. 8. habet, nisi quod caulibus fruticolam dicat, ut etiam in quibuldam Dioscoridis exemplaribus legitur, & pro cerato ceram legat.

Nec multum à Dioscoridis historia euariar Galenus. Bupthalamon, inquit, ita nominatum est à floribus, qui, iuxta figuram, bouis oculo similes esse videntur. Nam colore Anthemidis floribus simillimi sunt. Sed multo maiores & acriores, & propterea etiam maiore discutiendi vi præditi, eo viq; ut etiam duritias sanent, ad ceratam ammitti.

Bupthalamon sunt qui Cachlan, qui Balsamin, siue Balsamina, qui Meneiticon, siue Meneiticon vocent. Prophetæ Hæmorrhæ, Magi Mercurii genitura, siue incorruptibilem genitura, aut semen incorruptibile: Romani Cappacoraniam nominant, & Aphri Narat. Bupthalmi quidem nomen sibi à maioris quadrupedis oculo inuenit, bouisque oculus dici voluit. Siquidem particula in græcis augeret. Habetque ea Gens penè infinita, quæ coniuncta sibi ea particula augetur, & in suo genere maiore amplitud. sunt: quæ ratione & Bupthalmos non à bouis oculo simpliciter, ut quidam credunt, sed à magnitudine ambicûs, quo maiorem oculum refert, nominatur.

Nomina
motha.

Æquiouca

Chrysocome

Gauland.
nat.

Chama-
melum in-
odorum.

Chama-
mel foeti-
dum.

Chama-
mel. A cry-
santhemum
quorundam
Bupthalamum
tenuifolium, folio
Millefolii
ferè.
Chrysanthemum
segetum.
Bupthalamum
Dodonæi, qui-
buldam
Elleborus
tenuifolius
Bellis ma-
ior
Caltha.

Sedumma-
ius, siue Aiz-
oon mar-
tius.

De vero Bupthalamo variz sunt recentiorum Herbariorum lententiæ. Et quia formâ videtur & facultatibus conuenire cum Chrysocome, hoc esse putarunt nonnulli. Et hinc factum, quod Guilandinus in Theone scripserit, Dioscoridem non raro in diuersis locis de iisdem tractasse plâtis, ignorantemne, an abundè diligentem, se nescire. Exempla esse Bupthalamon & Chrysanthemum. At nescit ipse Bupthalamon & Chrysanthemum diuersas esse herbas.

Multi hodiè sub Cotula nō fertida, siue Chamælo inodoro Bupthalamum delineant. Sed cur horum sententiam comprobem contra Fuchium cum Matthiolo non habeo.

Cotulam Brunfelsius in suis palinodiis Bupthalamum à quibusdam credi admonuit, etiam si Bupthalmi historia à Chamæmeli foetidi delineatione multum discrepet, ut diligenter conferenti, facile patebit.

Fuchsius, Tragus, Gesn. Matth. & alii nonnulli verum Bupthalamum contendunt, quam Chamæmelum Chrysanthemum quorundam antè inscriptimus.

Pro Bupthalamo vero Tabern. & Gerardus exhibent Bupthalamum tenuifolium, folio Millefolii ferè, de quo mox dicemus.

Ostendimus Chrysanthemū segetum à Bupthalamo differre, licet aliter senserint Gesnerus, & alii.

Bupthalamum verum à Dioscoride descriptū, multi censent herbam illam, quæ Bupthalamus Dodonæo, & quibusdam Elleborus tenuifolius dicitur. Verum errant.

Aliqui teste Matthiolo, putant Bellidem maiorem, esse legitimum Bupthalamum, sed non est.

Columnella per Bupthalamum Calendulam innuere videtur, ubi fauentia lumina Calthæ canit. Lob. in Adu.

Bupthalamum tandem reperitur inter spuria nomina, quæ apud Dioscoridem Aizoon maiori attribuntur.

Ad Bupthalmi genera refert Clusius Chrysanthemum Valentinum, quod quidam Achilleæ speciem esse statuunt.

BYPHTHALMVM TENVIFOLIUM folio Millefolii ferè.

CAP. XVII.



HOc Bupthalmi genus tomentolos habet caules, & frequentibus fatis ramis multifidos, per quos folia nascuntur ad Millefolii tomentosi folia accedentia, hirsuta, pari dispositione & diuisura ferè, verum nonnihil latior: flos singulis ramis in acumine hæret vnicus magnus, radiatis in ambitu foliis longi-

giculis luteis coronatus, disco concolori, calyce folioso, lanuginoso, canescente. Foliorum siccorum sapor nullus notatu dignus.

De hoc apud H. Lugd. p. 862. hæc habentur. Dalechampsius Bupthalamum verum depinxit ad Rhodani ripam prope fossas Marianas proueniens, radice breui, tenui, candida, capillatâ: caule palmum longo, tereti, gracili, subrubro: foliis fœniculi per ramos è caule prodeuntes sparsis: flore Anthemidis, proflus luteo, media sui parte veluti exculpto & cauo, oculi figurâ. Idem videtur esse Chrysanthemum Valentinum Clusii. Lobelius etiam Bupthalamum tenuifolium Narbonense vocat. Pena idem Bupthalamum exhibere videtur, quod ex Dalechampsio pictum damus folio & facie Cotulæ fertidæ, &c. Hæc Hist. Lugdunensis. Ego facillè crediderim Dalechampsii Bupthalamum & Lobelii tenuifolium Narbonense in Obs. & Penæ alterum in Aduers. eandem esse plantam, idem tamen Chrysanthemum Valentinum Clusii dicere non velim, quia non radiati flores: non comperio Compilatorem H. Lugdunensis dicere Matthioli Chrysanthemum idem esse cum Chrysanthemo Valentino Clusii.

Camer. apud Matth. in Hist. germ. lib. 3. cap. 107. Bupthalamum aureo flore, Kindsaug. Item Epit. p. 651. Bupthalamum, & pag. 652. Bupthalamum flore purpurascete.

Tabern. Icon. & Histor. Bupthalamum verum Kindsaug oder Streichblum / Bupthalamum tertium folio quodammodo à Artemisiâ & Fœniculi, sed multo tenuiore, colore ex luteo pallido, odoris non ingrati. In Herbaria spontè prouenit vnde mihi delatum. Item in Hist. Bupthalmi quartum genus, folio Cotulæ non fertidæ, proueniens in provincia Galliz, & Gallia Narbonensi, non longè à mari: Bupthalamum Narbonense aut marinum maius, Groß Meer streichblum. Item: Bupthalmi quintum genus, quod etiam prouenit in Prouincia & Gallia Narbonensi folio Cotulæ fertidæ: Bupthalmū Narbonense aut marinum minus & tenuifolium, Klein Meer streichblum. Forcia comparatio Tabernanontani sui Bupthalmi cum Anthemisa & Fo-

Descrip

Buptha-
mum
vmm.

Camer.
icones de

Tab. 107.

& Fœniculo, foliis multum dissidentibus. Est mihi Bupththalmum delatum ex Herurgia, ac etiam ex Gallia Narbonensi, in quibus discrimen non animaduerto; ipsemet etiam Tabern. non mihi videtur certas demonstrare notas, quibus distinguere possint ab invicem eius tria Bupthalthma, si reuera diuersa. Hoc considerandum Lobelium suum Bupththalmum eo penè modo describere, & ex eo Camerarium in Hist. Matth. germanica, quo Tabern. suum Bupththalmum quintum. Gerard. Angl. vnica figurâ contentus, eam Bupththalmum verum inferbit, ac Anglicè *The right oxe nic* nominat.

C. Bauh. phyt. Bupththalmum 6. siue caule & flore purpurascens. Et: Bupththalmum 8. siue Cotula folio. Meminit Gesnerus de hort. 251. alterius speciei, flore partim candido, partim luteo nulloque alio discrimine: hoc sanè visu elegantissimum. Cur Frater hæc duo Bupthalthma, separaret? mihi vna planta videtur.

Huius meminit Clusius, cum dicit. Chrysanthemum Valentinum plurimum à Bupthalthmo Narbonensis provinciae, mihi sanè non ignoto, differt: nam id obseruare & erueri memini apud oppidum illud Aquæ mortuæ nuncupatum, nonnulli Fossam Marianam (quàm aptè nescio) appellant. Habet autem id Bupththalmum radiatos flores, Anthemidi vulgari similes, maiores, medium orbem luteum cingentibus foliis luteis, plerumque subtus nonnihil purpurascens, aut subrubentibus.

Siccam habeo plantam à Valerando nomine Bupthalthmi. Gener. Cherleus attulit ex Gallia Narbonensi, vnde & D. Rud. Salzmannus collectam referuauit, mihiq; comunicauit. Sed & D. Agerius ea me donauit, quam propè Pisam in Italia ad ripam Arni, vbi abundare ait, collectam assimauit. Secus Arantiorum lucos Olibiæ in in Galloprovincia maritima, à Lobelio reperta, & in Agro Romano.

BUPHTHALMO TENVIFOLIO
simile Chrysanthemum Valentinum Clusii.

CAP. XIX.



saluam crient, & acidula sunt: flos in singulis
Tom. III.

Vnico plerumque assurgit Chrysanthemum Valentinum Clusii, caules pedali, raro ampliore, ramulo: foliis secundum radicem numerosis, deinde remerè & sine ordine per caulem sparsis, multifidis, Millefolii stratiotis foliis penè simili-bus, lanuginosis & incanis, quæ degustata

ramulis vniceus, luteus, vel potius auri splendore fulgens, quique ressecatus, multis annis nat. uum colorem etiam retinet, medio Anthemidis disco siue umbilico maior, & sine radiatis in ambitu nascentibus foliolis, odoris non iniucunda: ramulis vnica, candicans, firma, crassiuscula.

Chrysanthemum vocabant Valentinae urbis peritiores, longè tamen à Dioscoridis *χρυσάνθεμον* diuersum, & ad Bupthalthmi genera, Clusii iudicio, potius referendum, nisi quis *ἀνθεμίδης* speciei esse malit. Matthioli tamen Chrylanthemum esse negò, inquit Clusius, licet id sentiat, qui Historiam Lugduni impressam, concinnauit, sed ipsum valde falli deprehendit, quisquis diligentius vtriusque Historiam contulerit. Ceterum hæc planta, ne quis fallatur, plurimum à Bupthalthmo Narbonensis Prouinciæ differt. Hæc Clusius, qui Compilatori H. Lugdunensis detraxit. Is enim non sentit Chrylanthemum Valentinum idem esse cum Matthioli Chrysanthemum, vt voluit Clusius, sed idem cum Bupthalthmo Dalechampii.

Lob. in Obs. p. 446. Bupththalmum tenuifolium Narbonense, strigosis Galloprovinciæ & Narbonensis Galliæ provenit, floribus radiatis, luteis, Bupthalthmi, & foliis Anthemidis vulgaris siue Cotulæ non fœtidæ, minutis, nonnihil incanis: radix palmum æquat: cauliculi pedales, cuiusmodi etiam memini apud Francicum Peninam & Valerandum Doureum, erutas agro Monspeliaco. Hæc Lobelius de Bupthalthmo tenuifolio Narbonensi, Chrylanthemum [C. Plant. p. 773.] Valentino Clusii, Non docet autè an Bupththalmum suum tenuifolium diuersum sit ab eo quod in Aduersariis Bupththalmum alterum vocauit: si diuersas plantas existimat, qua in re differant, non demonstrat: præterea an suo Bupthalthmo, quod flores habet radiatos, vt ipse testatur, ritè adaptet figuram Clusii, videant alii: dicit enim Clusius sine radiatis in ambitu foliolis esse Chrysanthemum Valentinum. Valerandi Bupththalmum nobis idem cum præcedenti.

Gerardo dicitur Chrylanthemum Valentinum Corue *Marigold of Valencia*. C. Bauh. phyt. Bupththalmum 7. siue foliis Millefolii lanuginosis.


Valentino regno ad aruorum margines, iuxta semitas repetum eruebat Clusius, nusquam alibi ipsi obseruatum, florebat isthic Martio.

FLOS ADONIS VVLGO, ALIIS
Eranthemum.

CAP. XX.

Ex radice, digito minimo tenuiore, alba, recta, sapore herbaceo & nonnihil nauseoso, caules surgunt pluribus alis donati, striati, tubulo angustulo perforati: folia Nigellæ citrinæ, glabra, subacri gustu: flores in extremis ramulis Chamæmeli, ex foliis octo, aut paucioribus, latioribus, coccineis vel pallidis seu luteis, compositi, quibus circumposita folia quina, extrorsum virentia, intus rubentia: apices in medio frequentes atropurpurei capitulum oblongum & acuminatum concolor ambiunt: semina tanquam in racemulum congesta, densè fœcta, acuminata.

Duas icones empritis ponimus, quæ

Oculus Da-
monis.Cord. refu-
ratus.Anemone.
3. Trag.

nem tertia (das dritt vnnd kleinste Klapper Köß-
lin) vocat fuluo flore. Item cap. 40. feld oder

iam sculptæ
non quiddi-
scrimen de-
monstrent, li-
cet discrimina
quædam sint,
quorum ali-
qua tertia fi-
gura demon-
strat.

Rectè, meo
quidem iudi-
cio, apud Cor-
dum in Hist.
anotauit Gef-
nerus, duplicè
eius Anemone-
nem tenuifolia-
m, quam a-
grestem & Pa-
paueri non
dissimilem di-
cit, non esse
Anemonè, sed
Chamæmalū
Eranthemum
Dioscoridis :

cuius semina
ad frangendū
calculum effi-
cacissima sint.
Has Turingos
vocare teuf-
fels auge [O-
culum Demo-
nis quasi di-
cas) propter
colorem florū,
prunæ non ab-
similem, qua-
sique arden-
tem. Acrimonia-
m nullam
habere, quæ
propria sit A-
nemone. Cæ-
terum, quod
Cordus Ane-
monè magnā
habere simili-
tudinem cum
Papauere tra-
dit, hæcenus
non animadu-
uertit. Figu-
ra autem quæ
apposita Cor-
do reiicienda
calumnian-
dæque, pessi-
mè siquidem
picta, diuersos
habens flores,
vt iam dice-
mus aduersus
Tragum.

Tragus igitur,
qui lib. 1.
capite 38.
hanc Anemo-

acter Kößlin/ Anemonem agrestem, huic assignat
flosculos quatuor foliis distinctos, minui
colore tinctos, aliquando candidos, vocans Acu-
leatam Plinii. Quamvis autem dicat suam Ane-
monem flosculum habere è quatuor foliis com-
positum, nihilominus tamen in icone flores du-
os pingit, è pluribus foliis constantes & capi-
tulum quale in Chamæmelo Eranthemum multis
dicto: Flores verò in eadem Icone multum di-
uersi cum quatuor foliis, videntur alterius plā-
tæ, ac accedere ad folia Melanthii in Germania
spontanei.

Malam Tragi figuram exhibet quoque Lonicerus,
sub nomine Aculeatæ Plinii, quam vocat
Germ. feld Kößlin.

Cesalp. lib. 14. cap. 6. Quædam (ex Ranunculis)
in aruis nascens inter segetes, floribus rubican-
dis, quam quidam inter Anemonas pingunt: alii
Chamæmelum Eranthemum putant, ipse Ranu-
culus adscribendum cenfeo, fortè quem Diosco-
rides purpureum vocauit.

Meminat huius primū Math. in post. cōm.
Ital. & Lat. cum magnis fig. dicens. Adonidem
Virgilii quorundam, sunt qui censeant esse pur-
puream Dioscoridis Anthemidem, sed reuera
hallucinantur, quod huiusce Anthemidis genus,
Dioscoride teste, flores proferat in medio aureos
& forinsecus orbiculato ambitu purpureos, à
quibus maxime differunt vulgaris Adonidis flo-
res, qui Papauerorum siluestrium flores emulan-
tur. Eadem in Epit. & Hittor. germ. cum addit:
Camerarii, qui pro Adonidis icone laudabili
Matthioli, ineptam posuit figuram, ac insuper
aliā addit. Priorem quidem inscribit Adonidē,
ac Germ. feld kößlin & Margrethen blümlin
vocans.

Turn. negat esse Anemonem, existimans esse
Papaueris erratici speciem. Idem ait rursus a-
libi. Existimant quidam Eranthemum esse, A-
mariscam rubram Herbariis dictam, quæ nostra-
tibus appellatur Kede math / aut Kede Made-
mede. Quominus autem sit Eranthemum hæc
prohibent: non habet capitulum luteum, foliis
in ambitu purpureis, quemadmodum reliqua duo
capitulis donata luteis, scilicet altero foliis in
ambitu albis, altero flauis: Capitulum verò huius,
nihil habet simile eam illorum capitulis, neque
formā, neque magnitudinem, neque colore: semen
etiam spinachie leuini & quale est, minime tamē
spinosum: in alijs multis notis descriptioni re-
sponder: folia admodum sunt tenuia: Verū
flores phænici sunt, cum deberent esse pur-
purei. Eranthemum porro dicitur quod Vere flo-
reat.

Gesn. hort. dicitur Anemone quædam, aut ve-
rius Chamæmelum rubrum. Item Chamæmelum
Eranthemum Kreichio, & Coldembegio, quod
quosdam non rectè Anemonas generi attribuisse
testatur, aliquosque Adonium vocare.

Dod. gall. Anthemidis siue Chamæmeli 3. spe-
cies [sine icone] Eranthemum & Chamæmelum
purpureum, quod ait esse incognitum, nisi sit plā-
ta quam quidam vocent Florem Adonidis, alii A-
nemom: posse vocari gallicè Cam. mille à fleur
purpurée: Germ. & Belg. Roede Canulle. Hoc
pingit cap. 3. eiusdem lib. 2. hac inscriptione, He-
ranthemum fortè. Hoc loco autem eorum opti-
onem ceu verissimilem admittere videtur, qui
Florem Adonidis existiment. In Hist. de florib.
& Lat. in fol. vbi pulchra figura, Eranthemum ritu-
lo proponit, aitque. Nostri sua lingua Eranthe-
mum vulgare Brunnstoffs appellat: Ger-
manorum

Anemone
agrestis.

Trag.

Icon. Tr.
confusa.Icon. Lo-
mala.Ranuncu-
purpureus
Cesalp.Adonis
Virgilii
Marth.

Cam.

Papau-
Species
Turn.
amaris-
rubra.
Eranth-
mum
est.Chamæ-
melum
Gesn.Adonis
Anthem-
3. Dod.Heran-
themum
eiusdem.

manorum nonnulli *feldtröſſin* : hæc ætate *ἡδύθη-
ρον*. Eſſe tamen tertium Anthemidis genus, quod
propriè Eranthemum dicitur, nemo facile affir-
mauerit. Matthiolus Eranthemum hoc præſens,
Adonidis florem nuncupat, ſed Adonidis ſlos
Anemone eſſe creditur. Adonidis ſiquidem flo-
rem vento excurti Quidius ſcribit, Metamorph.
lib. 10. in fine: venti autem ſlos Anemone eſt. Nā
Anemone *ἀνὸς τὸ ἀνέμους*, id eſt, à vento nomen ha-
bet, vt Plinius auctor eſt lib. 21. cap. 23. Floſ, in-
quit, nunquam ſe aperit, niſi vento ſpirante: vin-
de & nomen accepit. Cum Anemone autem Era-
nthemum hoc non conuenire, manifeſtum eſt.
Hæc ille, ſatis oſtendens non eſſe Amellū Virgilii.

Eranthemum negat & Lobel. in Adu. Anemo-
nemque concludit his verbis. Recentiorum A-
donis, aut Adoniciū Poëtarum, ſpecies Anemo-
nes, non Eranthemi. Certius etiam augura-
rentur, ſi eximæ pulchritudinis florem iſtum
vulgo Adonidis vocatum, vel Adoniciū qui e-
tiam inter ſegetes paſſim in Gallia, Germania,
& Anglia reperitur, & in hortis coronari⁹ ha-
betur, ad Anemonas retuliſſet: etenim Eranthem-
um cur non ſit, ſatis iam dictum: cur autem
Anemone ſit & eadem cum Poëtarum Ado-
nide videatur, faciunt flores puniceæ Gallicæ aut
Germanicæ, intenſo cruore ſaturati, & aliquan-
tū nigricando lucidi. Folia, cauſis, ramuli, &
radices Cotulæ, aut Anemones Monſpelicæ:
femen in puſillis, oblongis, racemofis, Ranuncu-
li longioribus ſaſtigioſis, Aſparagi primum pul-
lulantis, vt ſignantur monuit Dioſcorides in A-
nemone: nota guſtu ſubacti, vnde Monſpelien-
ſes eruditi plerique in Anemone non potiùs, quàm
Eranthemum ducendam voluerunt. Sententiæ
quorum fauent etiam è Nicandri Theriaca con-
ſectata, vt qui hanc Adonidis crude genitam
Anemonem vocent, & Quidius iterum:

— Cum ſlos de ſanguine concolor ortus.

Qualem qua lenio celant ſub cortice granum

Punica ferre ſilent, nimia lenitate cædunt,

Excitantur idem; qui perſtant omnia, venti.

Vbi: vides Anemonem vulgi nomenclaturā,
Herbam venti adumbratam. Obſ. p. 150. Recen-
tiorum Adonis videtur *φωδὴ* Theophrasti, à ſloris
ſtammeo igneoue colore, quam inter vernos flo-
res recenſet. In Icon. Plant. p. 283. Floſ Adoniſ.

Tabern. Icon. p. 20. Chamæmelum purpureum,
Braun oder roſt Camillen. Item. p. 22. Adoniū
luteum, Adoniam mit geelen blumen. In Hiſt.
lib. 1. p. 72. Chamæmelum purpureum ſiue 6. flore
miniato, ſeptem foliolis recuruis conſtante: Græ-
cè *ἡδύθηρον*, *ἡδύθηρον*, & *ἡδύθηρον*: Floſ ſacer; O-
culus Dæmonis: errat Val. Cordus, qui Anemo-
nem minore putauit: hæc enim planta caret
acrimonia. Et p. 102. *feldtröſſin* [Roſulum
campeſtre dixeris] prima ſpecies flore rubro
miniato; capitulis ſpinofis; ſemine ſpinachiæ.
Altera ſpecies diſſert tantum flo: e candido. Qui-
dam ſtirpium ignari confundunt *feldtröſſin*,
cum Chamomilla rubra, licet magnum ſit diſcri-
men: ſiquidem in *feldtröſſin*, nunquam in flore
ſint plura quàm quatuor foliola; in Chamomilla
rubra verò ſeptem. Quoniam autem nomine a-
pud Veteres vocata ſit, me later: *feldtröſſin* di-
ctam, vocant Herbarii noſtri Aculeatam. Et
hinc Tragus Anemonem aculeatam Plinii
credit, cum tamen cum Anemone communis
nihil habeat. Quare cum aliis Aculeatam
vocabo. Et p. 89. Adoniam 1. flore miniato. Ado-
nium 2. primo in omnibus ſimile, excepto ſloris

colore luteo, Adoniam luteum (in Icon. vt di-
ctum p. 22.) Reperitur & tertium flore albo ſed
rariùs. Herbariis Adoniam, Adonidis floſ Poë-
tis. Quamvis multi Anemonen & Adonidis,
florem exiſtiment; attamen non inſicias ibunt
docti, quod *φωδὴ* & *φωδῶνος* Theophrasti à me ap-
pellatur, quam gaza Flammæ & Flammulam
interpretatus eſt: vocatur Germanis Brunet-
röſſin/ & ſewer Köſlein / Adonis Köſlein:
Flandris & Brab. Bruynetteſens / & Adonis
bloem. Item in Icon. p. 790. Adonis ſilueſtris flo-
re citrino. Hiſt. p. 469. lib. 2. Adonis flore citrino,
aut rubro [addit in deſcr.] capitulis ſpinofis:
dicitur aliis Anemone agreſtis, aut Anthemis.
Germ. Kote *feldtröſſin*. Hæc ſparſum Tabern.
apud quem in Iconibus tranſpoſitus eſt titulus
latinus Chamæmeli purpurei, & aſcriptus Cha-
mæmeli lutei, errore & incuria Typographi,
quod quidem veniam meretur, non item quod
Tabernamontanus ſtirpium ignarus ſeparat
Chamæmelum ſuum purpureum ab Adonio, & à
ſua Aculeata, quam ei incognitam fuiſſe vel in-
de colligo, quod dicat flores habere tantum qua-
tuor foliola, cum Tragus, vt dictum, in vno flo-
re plura pingat. Si præterea ei nota fuit Aculea-
ta quadrifolio flore, cur non demonſtrat vbi ob-
ſeruauit, quandoquidem Tragus nullum aſſignat
locum particularem, & eius icon videatur falſa.
Cur, inquam, hanc non depingit? Adhæc in illo
capite nihil tradit, quod ad illuſtrationem Ane-
mones aculeatæ faciat, verba tantum dat. Error
etiam ille nō paruus videtur, quod eandem plantā,
aut ſaltem congenerē ponat l. 2. pro Adonio: ve-
rū ſi forte ignorantiori compilatori tribuend⁹.

Gerardo, Cotula lutea, yelow Maie weede.
Cur autem iconi Tabernamontani Chamæmeli
purpurei, titulum Cotulæ luteæ inſcribat, ignoro.

Hort. Luſ. Adoniam purpureum.

Hiſt. Lug. p. 969. Dodonæi verba de Eran-
themo habet ac pag. 970. Anthemidem Era-
nthemum Dodonæi vocat. Item eadem pa-
gina pro Adonide, ſiue Anthemide Matthioli
quoque pingit. At ruruſ eandem figuram p. 1344.
exhibet hoc titulo: Chamæmelum ſilueſtre Mat-
thioli, ſiue Anthemis. Dicit Compiler Ado-
nidem eſſe Anthemidem Dodonæi, & Matthioli,
quorū ergo duæ figuræ, & tertia, quam ſine vl-
la deſcriptione infra repetit.

C. Bauh. phyt. Adonis tertia, ſiue flore mi-
nore: variat flore pallido, rubro, luteo: albo co-
lore inter ſegetes collectam dedit Cargillus. Et
Adonis 4. ſiue ſilueſtris flore pallido minore, in
purpureum vergens.

Chamæmelum Eranthemum multis dictum
habeo in horto Ill. E. C. Wirt. Montbelgardi, qua-
le traditur à Cordo primo loco. Feliciter proue-
nit ex ſemine deciduo, & etiam ſato: ſemen
marurat Idnio, Iulio & Auguſto, quō tempo-
re adhuc florēt. Recordor quondam circa Baſi-
leam in ſegetibus ſpontè proueniens repetitum
florens Maio. Frater etiam reperit in a-
gris, quā itur Doſnacum. Florens vidi menſe
Aprilis inter Monſpelium & Nemaufum; inter
Auionium & Arelatam in agris. Tiguri
menſe Septembri in horto Dom. D. Funckii.
Geneuæ mihi florebat in horto menſe Nouembri;
ac etiam Ianuario & Februario, quæ proue-
niente frigore perit, ibi nomine communi Melanthio
vocant *Barbue* vt & Lugduni. Monſpelii cum
ſtuderem vocabant Anemonem; D. Cortulū
Patauī & D. Rob. Conſt. nominabant Argemonē;

Flammæ
& Flam-
mula Cæ-
ſa Tab.

Adonis fl.
flore citri-
no Tabern.

Tab. nōi.

Cotula lutea
Gerard.
Adoniam
purpuream

Adoniam
purp. Hort.
Luſ.

Adonis fl.
re minore
C. Bauh.

Locus &
tempus.

HISTORIÆ PLANTARVM:

Sturgardiæ in horto E.C. Wirt. obseruauit florens Maio, flore paruo aureo, vnguibus purpureis ferè. Spontè frequentissima, inquit Clusius, nascitur inter segetes, non modò in Gallia Narbonensi, sed etiam per vniuersam Hispaniam, quæ etiam non minùs frequentem obseruauit inter segetes in Austria & Morauia.

Antè diximus commendari ad calculum, quod etiam annotauit Camer. ex loco, vt existimo, allegato. Adonium calidum & siccum in secundo gradu tradit Tabernamontanus, qui herbam in balneo sudatorio ad humores frigidos prouocandos vtilem esse scribit. Dodonæus tamen ait Eranthemum huius nullum esse in medicina vsum: quantum autem gustabilis qualitas eius ostendat, aliqua caliditate participare, sed tamen non magna. Voluptatis gratia in hortis colitur à virginibus, quarum coronas ornare consuevit.

PARTHENIVM VETERIBVS.

CAP. XXI.

PArthenium auctoritate Dioscoridis, *foliis* est Coriandri (*racis* Ald. marg. χαμαίη) tenuibus, *floribus* per ambitu albis, in medio verò melinis, odore subuiroso & sapore subamaro. Siccatur cum aceto mullò (Lacuna addit ex vet. cod. *z. oino*) aut sale potum, æquè ac epythymum pituitam & bilem atram detrahit, suspensoriosque ac melancholicis prodest. At herba citra florem calculosis & anhelatoribus magna utilitate propinatur. Ipsiùs verò decoctum, ad insidendum valet in vuluarum duritiis & inflammationibus. Sed & ipsa cum floribus, erysipelatis & inflammationibus imponitur. Parthenium, sunt qui Amaracum, qui Anthemida, qui Leucanthemon, qui Chamæmelum, qui Chrysocalida, qui Malobathron, qui Campefrem florem appellant. Tusci Cauram, Aphri Tamacath, Romani Solis oculum aut Millefolium vocant.

Cæterum, alia hæc Parthenion est [hoc attestante Marcello] ab ea quam Clusius lib. 3. Perdicion vocari etiam tradidit: reprimereque simul & refrigerare. Illa Elxine muralis & Perdicion dicta: hæc pluribus ab Anthemide appellationibus similibus congenerèque illi credenda est. Illa à Nicandro Theriacis venenatis mederi prodita, hæc sanandis suspiriis, atræ bili, calculosisque, inflammatis, duratisque muliebribus locis apta. Hæc Chamæmelo similis flore per ambitum candido in medio luteo, illa Mercurialis herbæ foliis descripta: & ne longiores simus, notis omnibus inter se diuersis, solo eodè nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine sed re Parthenion tam similis Chamæmelo: vt pro ea sæpiùs ab imperitis carpatur. Habet enim illi similem paulò minùs quàm in cunctis florem. Differt magnitudine quæ in Parthenio amplior vndique est: differt & figura: quod coloribus in vtriusque flore paribus Chamæmeli flos in medio tumet & in altum erigitur, folia verò ad terram inflexa descendunt. In Parthenio folia medio exæquata per ambitum stant. Nobis ex his quæ diu obseruauimus inclinât animus Chamæmelo congenerem esse: & vt in plerisque aliis sit nota aliqua priuatim ab aliis dispecti: quæ in Parthenio hoc virosus odor est. Quemadmodum in bouis oculo, sola magnitudo, quâ à Parthenio hoc illa distinguitur. Sunt Parthenii huius aliarum appellationes in fine capituli numeratæ: quarum quæ Chamæmelo communes sunt à no-

bis relinquentur, aliarum qualis Amaracus est parum certè dici, & enarrari à nobis possunt: Eri antiquissimi Scriptores Amaracum hanc vocari dixerint: Galenus, Paulus, alique plures: quorum fides & auctoritas non parum difficilem nobis alterius Amaraci, quæ primo volumine dicta est, historiam & commentationem hanc nostram facit: falsòque à Marone dictum fuisse vbi mollis Amaracus illum &c. Cum hæc *de rebus simplicibus*, i. viroso & graui odore sit. Incertum etiam cur Romani Solis seculum dixerint: nisi fortè non Solis seculum sed Solis oculum dicenda ea sit. Hoc enim magis probamus quàm si Solis equum dicatur. Neque enim quod hæcenus legerim Soli sequi Parthenion hæc à quoquam dicta est. At si Solis oculus dicatur aprior rei appellatio erit. Foliis enim per ambitum radiatus eius flos: in medio autem luteus orbis Solis disci figuram ostendit. Millefolium autem foliorum tenuitas facit: quæ vt in bouis oculo sunt capillata, & Fasciculo similia videntur, & infinita penè ex vno ramulo pendunt.

Parthenium alii Leucanthemum, alii Amaracum vocant. Celsus apud nos Perdicium & Muralium. Nascitur in hortorum sæpibus, flore albo, odore mali sapore amaro. Ad insidendum decoctum in duritia vuluarum & inflammationibus. Siccatur cum melle & aceto potum, bilem tradit atram. Ob hoc contra vertigines vtilis, & calculosis. Illinitur & sacro igni. Item strumis cum axungia inueterata. Ita Plinius inquit Cornar. in Dioscor. lib. 21. cap. 30. ex recta veteris codicis lectione. Verum ipse Plinius duas herbas in vnam confundit. Nam muralium & Perdiciu à Celso dicta, est quidem Parthenium à Græcis appellatum, sed non hoc de quo hic Dioscor. agit & Plinius agere voluit. Verum quòd infra l. 4. cap. 74. Dioscor. Helxines nomine describit, itemque Parthenium appellari dicit. Ad hanc itaque pertinent Celsi verba lib. 2. cap. 33. At simul reprimunt & refrigerant, Herba muralis, Parthenium vel Perdicium appellant. Ita Celsus. Cæterum quæ sequuntur in Plinio, ad Parthenium de quo hoc loco Diosc. agit, pertinent: nec multum euariat à Dioscor. Plinius

Galenus, Paulus, Aetius, Parthenium hoc suo nomine non agnoscunt, sed sub Amaraci nomine describunt, quod non ingenerosè calefaciat, sed siccet non valde, verum vt in caliditate ordinis sit tertii, in siccando secundi.

Ex hæcenus dictis clarè patet, Parthenium Helxine dictum, de quo lib. 15. Hist. n. g. egimus, ab hoc Parthenio multum differre. Quæ autem planta hodie hoc Parthenium repræsentet, illi est inter Auctores. Multi namque verum & legitimum Parthenium Matricariam dictam esse contendunt. Non desunt alii, qui Chamæmelum nobile, Parthenium Dioscoridis affirmare non verentur. Reperiuntur non rari [inter hos sit Fuchs. Gesn. Lob. Anton. Mufa, Schvvenck. & alii] qui Parthenium vultum esse Cotulam festidam, sed hoc meritò negant, Matthioli. Dod. & alii. Sunt etiam qui Parthenium mas appellant, & Athanasiam, quam Tanacetum cum quibusdam vocamus, esse censent. Parthenii nomenclatura, Teste Trago lib. 1. cap. 63. competit etiam Arthemifia. Mercurialis etiam, eodem Trago teste lib. 1. cap. 62. dicitur apud Dioscorid. lib. 4. Parthenium. De Mercuriali diximus lib. 23. H. n. g. Plantam Lappariam (Cynoglossam topariam fortè Plinii nostram de qua lib. 33.) à Plinio lib. 22. cap. 17. recenseri Parthenii nomine, a u -

Acquies Helxine

Matricaria. Chamæmelum nobile. Chamæmelum festidum.

Tanacetum. Arthemifia.


Mercurialis

Cynoglossa toparia. forte Plinio.

ne, author est Thalius. Parthenii nomenclatura adscribitur etiam Maioranæ, de qua dicemus lib. 28.

MATRICARIA VULGO, MINVS
Parthenium.

САР. XXII.



Perquam
fibrosa ra-
dice nititur,
caules farrigēs
cubicum vnū,
aut alterum
altos, striatos,
fungosū me-
dullā refertos,
& in plures a-
liū diuisos; *f-*
lia Artemiæ,
multis lacu iis
diuisa, ex vi-
ridi luteola, o-
dore graui, sa-
pore amaro:
flores in medio
melini, foliis
exteriorib⁹ cā-
didis, Chamæ-
meli modum.

Non dubitat Tragus *Matricariam* cum *Tanacetō* sub *Anthyllidis* *Dioscoridis* descriptionem referre: sed meo iudicio absque ratione.

Is porro Matricariam depingit & describit dicens. Matricaria videtur mihi genus esse Tanacetii potius quam Chamomilla, vel Artemisia species, vt multi putarunt. Et quia Parthenii appellatio à doctissimis quibusque illi tribuitur, aliis Partheniū vocabo, neq; multum refert, siue Partheniū siue Artemisiā uocaueris. Dicitur lac. Malo Febrifuga, Auicennæ lib. 2. cap. 723. Vebus, Serap. cap. 243. Achuen, Laur. Phryio in Synonymis Amarella, Hebraicè Molua, Amaratō & Lampetia. Cordus existimat Amaram Galla. Sic itaque Matricaria Parthenium, vel Galla nōmine, tamen formā & temperamento, non Artemisiā tenuissimam (vt quidam sentiunt) fed Tanacetii genus esse deprehendit, qui singula in vtraque stirpe penitiùs considerauit. Et vno verbo, ut dicam, Parthenium Dioscoridis & Plinii, ac præsentem Matricariam, vnam & eandem esse plantam sentio. Idem in Hist. germ. lib. 3. cap. 71. ait. Matricaria dicitur lac. Manlio Crescula, à quibusdam malè Centaurium magnum: Quidam exist. mant esse Auicennæ Emérachit. mirari subit Tragum quod vnam herbam modò Tanacetum, modò Parthenium vocet, & tamen Tanacetum, ceu & Matricariam, quam Parthenium facit, separatim describat & depingat.

Nelcio [inquit Matth. in Diof.] qua ratione ductus Braſſauiolus in ſuo ſimplicium examine pro certo creditur, eam herbam eſſe minorem Artemiſiam, quæ in Hetruria in officiis Matricaria, & vulgo mulieribus Amarella vocatur, dicens. Quam nos Matricariam & Marellam vocamus, Artemiſis ſpecies eſt, illa ſc. quæ male vult. Hæc Braſſauiolus, qui errore notatur, quid aſſerat Matricariam. ſive Marellam, quam legitimum Dioſcoridis Patherium cenſemus, eſſe

Tom. III.

graeuolentem Artemisiā. Quandoquidem minorilla, quae Diofcoridis fecundo loco redditur, grauior olens, non quidem florem proferit in medio luteum, & per ambitum albis foliis cinctum Matricariæ, vel Amarellæ modo, sed candidum, paruum ac reuēni. Sed cum porro scilpsum hac in re deceptum deprehendisset Braslausolus [vt legitur in suo vltimo volumine Venerit's impressum] dum longa oratione contendit, Amarellam seu Matricariam inter Artemisiæ genera respondentem esse, Corulam vero forcidam, Ferrariensis Braslicaulo vulgò vocatam legitimum esse Parthenium, adeo scilpsum [pace eius dixerim] & sua scripta confundi, vt nullo pacto, quid sit tandem decernat, percipi possit. Nam cum Aduerit Amarellæ siue Matricariæ succum vnciarum quatuor pondere haustum vtamque bilēis, & apicitat dicere, apertè quidem fatetur hanc esse Parthenium, cui priuatim ea vis inest. At tamen paulò post eorum fortè oblitus, argutis quibusdam, mea quidem sententiā, tamen leuibus contrā. Aduerit nil aliud esse Parthenium, quam vulgè Braslicaulum. Adhæc non in minori quam Braslausolus versatur errore Monachi, qui in Mesuēni commentarij sunt, quippe qui & hunc sequuti eadem hallucinatione scriptis tradiderunt, Matricariam vulgò vocatam omnino esse minorem Artemisiā. In horum denique opinionē, vel potius errore, ipsæ quoque Fuchius implicatur, adeo vt etiam nemini dubitandum esse censet, quin Matricaria sit alterum Artemisiæ genus.

Matricariam ad Artemisæ speciem non quidem secundam, verum ad primam refertur conatur Turnerus part. i. p. 62. quam tamen suam opinionem retractat; Matricariam Parthenium esse contendens. part. ii. p. 78. contra Antonium Musum & Fuchium qui volunt esse Corulam foetidam, in qua etiam opinione fuit Lobelius in Aduersariis.

Tabern. Icon. *Arthemisia tenuifolia*. Item & Hilt. vbi ait. *Arthemisia* (*Ceyfus*) secunda species, falso à multis æstimata *Parthonium Veterum*: Græcè dicitur, *πας ἀρτης*, à grati odore, λέγεται à flore albo, οὐκ ἔστιν, & οὐκ ἐστὶν. Latine Apuleio, Traganthes, Cnicante, Onantheum et Leucopis. Herbariis, & Botanici Matricaria, Maritoria, Amarella, Amarfica, Tagetes, Oculus Solis, Matronella & Parthenium adulerinum, siue Pseudoparthenium. Italis *Amarvelle*, *Marella*, & *Matricaria*. Hip. *Madricaria*. Gall. *Matricaire*, *Marine* & *Epargoutte*. Boh. *Kuniba*. Hung. vi Carol. Clus. testatur, Benedicta, & Alba Benedicta. Angl. *fennelseed* & *sedderseid*. Belg. *Marve* & *Noederseye*. Germ. *Nietram* ad Metrum & *Dockblum* & *Nitrenen* & *Necer*, *Nietre* / *Matronkraut*, *Meysdraut* / *Meysd-blum*, *Muerckraut* / *Nieterkraut* / *sederkrut* / *Sonnenaug* / *Nietterig* / *Vund* / *Nagelblum*.

C. Balth. Phyt. & apud Matth. & Camer. Mar-
tricitaria 1. f.ue vulgariis. Brunf. Martricitaria,
prima Martriciis species. Cordoin Didacoria &
Hift. Dod.gall. Gefn.hort. Lacunæ. Caffo-
ti, & Galio Parthenium. Eticio Cordo, A-
marcus Thaleio. Toxite in Onon. philof. A-
marifcus. Dod.foliat. Lonic. Cæfalp. & Hift.
Luzel. Martricitaria. Fuchf. in Icon. Artemifia ra-
mofa altera fpecies. Monach. in Mef. dif. tr.
cenf. 34. Segiamariæ feu Arbor Martæ vcl Plan-
ta Martæ, vñ fcribit Ebenbiter et herba Alachue
dicta, & vñ Martricitaria; & apud Italos vulgare

Herba S. Mariæ nominatur.

An Io. de S. Amando, supra Martiatum in Antid. Nicolai, Herba S. Mariæ, quæ alio nomine Buchor marien nuncupatur:

Locus.

Montbelgardi Matricaria vulgò dicta prouenit variis in hortis. Patauii mihi visa, & Basileæ. Nascitur auctore Dodonæo, in sepibus, in hortis, fecus veteres muros: locis gaudet ruderatis: subest sæpenumero radicum fibris aliis, licet exiguis, catbo, quem inter rudera facile contingit reperiri: de quo Cardanus nugas nonnullas in lib. de Subtilitatibus adfert. Æstiuus mensibus in vigore ac flore est.

Vires

Matricaria, vt memoriæ prodidit Tragus, calidæ sicæque naturæ est, potestque in Medicina non aliter, quàm Centauria vel Absinthium, & Tanacetum vsurpari. Ventris tinea expellit in tró sumpta, id quod de herba & de succo expresso intelligendum erit. Quare à prudentibus matronis commendari solet: frigidioribus enim, febricitantibus, & immundis mulieribus purgandis, stillatitiam aquam, succum, aut herbam in puluerem redactam, exhibet. Pecoribus etiam de seccatam cum sale velperi aduersus inflationes, & difficultatem spirandi, vtiliter præbent mulierculæ veterinaræ. Herba recens tusa, sacro igni & collectionibus, & ventris doloribus efficaciter illinitur. Excalfacit autem, ita tradente Dodonæo, tertio ordine, siccatur verò secundo. Abstergit, expurgat, aperit & quæcunque amara possunt, feliciter præstat: ad vterinos affectus non parum confert: menses remorantes cit, secundas, & mortuos educit factus, siue eius decocto epoto, vel in balneo incocto, aut etiam cataplasmatris modo pubi imposita. Facit & ad suffocationes ex vtero hunc in modum, & ad euuldem durities. Matricariæ vitidis parum contusa folia vertici capitis imposita dolorem à frigidis humoribus ortum plurimum mitigant.

MATRICARIA FLORE PLENO.

Descriptio



caules, striatos, in multas alas diuisos, folia vulgari perquam similia, & multis lacinii diuisa, herbacei coloris, & amari saporis: extremitate plurimos flores candidos & multiplici foliorum serie constantes ferunt, nullo, aut perquam exiguo in medullis orbe, quemadmodum Chamemeli pleni flores, quibus sunt per similes, vel etiam pleniore & candidiores: semen Parthenii

Matricariæ vulgari per omnia similia, flore excepto, qui in hac cōfertifsimis foliis multiplex.

Partheniū pleno flore, inquit Clusius, nihil profus à vulgari Matricaria, vel formā, vel magnitudine differt. Cubitales enim aut ampliores interdum habet

vulgaris, sæcundum, licet aliquoties satum mihi non prouenerit: furculis autem certior proutu feritur, Leucotii pleno flore instat. Londini in Anglia mihi primum cōspēcta est hæc plāta, anno salutis humanæ 1579. quam inde Antuerpiam deferabam: eius verò iconem ad femina adquirebam Viennæ, munere C. V. Richardi Garth Cancellarii Londinensis, deinde longè frequentiorē obseruabam biennio post, cum Londinum rediis. Florere incipit Iunio, & totā deinde Æstate flores proferre non desinit, interdum ad ipsam vsq; brumam, nonnunquam squamata capita in multa vitridia foliola transeunt, præsertim Autumno, è quorum medullis emittant nives flores, reliquis maiores. Exterum valde ferax est Anglia huiusmodi florū multiplici foliorum serie constantibus, quos an arte & mangonio adquirent ignoro.

Lob. Icon. Plant. p. 751. Matricaria duplici flore. Non bene meo iudicio dicit Lob. flore duplici, pro pleno.

Tabern. Icon. & Hist. Artemisia tenuifolia flore pleno, Gesfult Mettram: Quarta alterius generis Artemisii species, Matricaria multiflora Herbariorum, aut Matricaria flore pleno, Gesfult Metter, oder Gesfult Magdshum. Camer. hort. & C. Bauhin. Phyt. Matricaria 3, siue flore pleno, à Matricaria odoratiore tantum flore differens.

Matricariam flore pleno, antè nunquam visā, obseruauit in horto D. Michaelis Ioachimi Gruningeri celeb. Pharmacopœi in Pfortzen, cuius furculum decerpit, ac in horto Ill. C. Witt. transplantauit, qui se plurimum multiplicauit, ac postea copiosè floruit adhuc Octobri. Flores, auctore Camerario, aridi terræ mandati, semine intus iam maturo plantas plurimas ferunt. Commodè autem seruntur pluuia imminente, etiam vel mediā Æstate, cum alioquin cum aliis seminibus sati nasci reculent.

MATRICARIA ODORATA.



Huius me Tabernamontanus, apud quem tamen præter figurā, & sequentia nomina, quæ ei adscribit, nihil inuenio. Artemisia, inquit, tenuifolia odorata, vocatur, Germanicè wolle riechēd Mettram, Spanisch Metter, Spanisch Magdshum, Matricaria odorata, & Matricaria

Hispanica, Medicis & Herbariis in Hispania Argentina. Tabern. in nouellis plantis proponendis est admodum somnolentus & negligens.

An Camer. hort. Matricaria altera ex Ilua insula maris Thyreni à Casabona Florentiā transfusa,

missi, odore gratiore prædita. C. Bauh. phyt. Matricaria 2. siue odorator.

PARTHENIVM INODORVM,
siue Achaouan Ægyptiorum.

CAP. XXIII.



Herba est Camæmelo proxima, quæ tamē non adeo alta extollitur, sed parùm suprà latius expanditur, foliis Parthenii, minoribus ac densioribus, floribusque Camomeli æmulis. Herba saporis odorisque expers percipitur, sed flores odorem grauiem, perobscurumque spirant.

Ægyptii, porro, quibus hæc planta patria est, descriptorum Alpino autore, florum, foliorumque decoctum in vñu habent ad tollendas viscetum obstructions, præsertimque ad ictericos.

TANACETVM VVLGARE

flore luteo.

CAP. XXIV.



Tanacetū vulgare in satis magnā adolefcit proceritate, duorum cubitorum & altius: caulibus teretibus, nonnihil striatis & hirsutis, medullā albā fungosā plenā: folia ex viridi in flauum vergentia, pennatā in segmenta per ambitum crenata, costæ mediz adnexa, odore vehementi, sapore

amaro: summos caules occupant corymbi lutei, Chamæcyparissi, minores, è foliis ceu staminulis compositi, quæ in semen tandem abeunt, per maturitatem nigrescens: radix longè, latèque repetit.

Brunfels. Tanacetum, secunda Matricaria species, & Parthenium.

Si temeritatem suam vñiam consequi possit Tom. III.

consideret Tragus, non certè dubitaret vñā cum Matricaria, de qua paulò antè à nobis dictum est, Tanacetum sub Anthyllidis descriptionem referre. Verū sententia eius rationibus & veritate non confirmatur, ideoque non recipitur. Iac. Manlius Tanacetum Danetam cognominari ait, sed à quo non ostendit. Nec desunt qui Artemisiā, quæ Monoclonos dicitur Tanacetum esse statuunt, quæ quidem opinio nobis non probatur. Tragus præterea Tanacetum inter Artemisias recenset, & secundā nominat, ac Tageten, Tanasiam, & Athanasiam cognominari testatur.

Fuchsius quoque Artemisiā facit, ac Artemisiā monoclonos titulo pingit, ac dicit. Tertiā Artemisiā speciem, Tanacetum corrupto nomine pro Tagete hodie nominant, Germani Reinfarn, quod Filicis ferè speciem referat, & in aquarum ripis nascatur, alio nomine murifraus / quoniam lumbricos pellat. Esse verò hanc herbam, aliquā Artemisiā speciem, vel inde etiam constare potest, quod Artemisiā, nonnulli Germanorum Groß Reinfarn vocant. Pulchrè ratiocinatur, si Diis placet, Fuchsius. Betonicam coronariam Germani cum Caryophyllis indicis communī vocabulo Nāgelin vocant: Ergo Betonica coronaria continē Caryophyllus erit. Vides itaque quantum sit argumentum Fuchsi, apud quem in edit. Lugd. anni 1551. figurè Artemisiz monoclonos, transposita est, & pro Artemisiā latifolia posita.

Hallucinantur Ruellius & Fuchsius, ait Matthiæolus, Artemisiā tertii generis esse putantes, quam alii Athanasiam, alii Tanacetum appellant. Eorum sententiam magis probandam censem, qui mas Parthenium volunt. Monachi in Meluem hallucinantur, tradentes Tanacetum esse Artemisiā vnicaulē. Sed & Matthiæolus in errore implicatur faciens Tanacetum mas Parthenium. Hoc nominetis tantū tradit nec quale sit demonstrat. De Parthenio mare apud Autores, quod equidē sciam, nihil occurrit. Tanacetum Artemisiæ Dioscoridis speciem esse, non absque ratione negat Turnerus.

Tanacetum vulgo appellatum, ab altis Danetam, non multū differre à Matricaria, tum specie tū facultate non inconcinne videtur Celsi.

Hippiam interpretatur Albertus in quodam remedio ad vulnera & vlcera canum Tanacetū agreste. Sed meliūs, vt nobis videtur, Gesnerus de Quadr. Hippix nomine Anagallidem intelligit [sic enim vel Arabes, vel Barbaros appellare legitur, seu cum Tanaceto nihil comune est quā quod vermes similiter interimere potest, nimirū acri & nitrosā facultate sua, quæ Betæ similis aut etiam superior est, quod ipse Gesn. se obseruasse testatur. Quamobrem idem ad apophlegmatismos vtriusque vñus.

Tabern. Icon. & Hist. Artemisiā Dioscoridis: Artemisiā; species Dioscoridis & Apuleii. Quibusdam Parthenii species, & Parthenium maculatum, inquit, dicitur. Sed errant, est vera Artemisiā tenuifolia, vt prodiderunt Ruellius & alii multi docti viri, descriptio & vires conueniunt cum Artemisiā tenuifolia: dicitur Græcè ἀρtemίσια λεπτὸφύλλον & ὑποθαλασσίον, id est, Artemisiā tenuifolia & Artemisiā vnicaulis; Herbariis alijs Athanasia & Heibaim mortalis. Tanasia & Tanacetum; Iac. Manlio & Varignanæ Daneta; Syluatico Herba maris, Tagete & Tanasia; Italici Tanaceto, Daneto, Athanasia & Daneda; Gallis Aranesie & Tageten & Tanasee, addit

alius, Hung. *Varadich*: Anglis *Tausy* & *tausie* / Belg. *Remauer* / Neumaven & *noimerozt*: Germ. *Rheinfaren* / & *wurmfor*. Item Icon. & Hist. *Artemisia* flore albo, nec formâ, nec odore, nec sapore differens, sed tantum colore floris, qui in hac albus est, & raro reperitur, & propterea in hortis colitur. *Mirum* si solo colore differat, ut ipsomet hic asserit, cur figuram aliam à Tanaceto vulgari diuersam exhibeat. Locum etiam ubi hanc raram plantam viderit, annotare debebat. Verum illud est quod errent, qui *Parthenium* esse contendunt. Sed nec illud falsum est, ipsum quoque hallucinari, Tanacetum *Artemisiam* statuentem cum doctis, qualis ille est doctus his sentit *Turner*.

Gerardus etiam inale sequitur *Tabernamontanum*, qui præter Tanacetum vulgare, alterum minus flore albo quoque picturâ expressit.

Tanacetum dicitur, *Brunfels*. *Marth. Cord.* in *Hist. Gesn. hort. Lonic. Dodon. lat. in fol. Lob. in Obs. p. 432. Castori. Turn. & Cæsalpino.* Tanacetum *Millefolii* foliis *Lob. in Icon. Plant. p. 719.* & in *Aduersariis.* Tanacetum vulgare luteum *Trago.* Tanacetum maius *Dod. gallico.* Tanacetum citrinum *Thalio: Athanasia H. Lugdunensi: Athanasia vulgaris Lacunæ: Artemisia tenuifolia Fuch. in Iconibus: Artemis. monoclonos eidem in Historia: Artemisia Dioscoridis Tabernamontano, Tanacetum Paracelsi & Filix Adamo à Bodestein in Onomastico: Sanctæ Mariæ herba & Tanacetum Io. Agricola: Tanacetum 3. siue vulgare, flore communiter luteo, rarius albo (vnde *Tabernamontanum* duas iconas habere ait) *C. Bauh. in Phytopinace,* quod apud *Matthioli.* *Parthenium* microphyllon (eodem lapsu quo alii *Artemisia tenuifoliam* *Dioscoridis*) *Hippocratis* esse credit, ac Tanacetum ita distinguit. Tanacetum, inquit, quod fortè à Tanaco, quo nomine *Parthenium* appellatum fuisse testatur *Plinius*, vel odoratum est, vel inodorum: odoratum aut maius, quod foliis est vel planis, florèque aut luteo, aut albo, vel crispis: aut minus, hocque vel campestre, vel alpinum: inodorum, flore minore, vel maiore. Nos de his specialius agemus.*

Locus.

Spontè in variis locis *Montbelgardi* secus vias ad hortos eundo ad *Molédinum.* *Genevæ* habebam in orto. Obseruavi copiosum *Basilicæ* multis in locis. *Lugduni* prouenit. Vidi *Patanii* in orto *Iesuitarum*: Reperi circa riuulos inter *Vicentiam* & *Villam-nouam*: in *Alfaria* abúdat, ubi passim secus agrorum margines, aggeres, & hortorum sepimenta exit.

Vires

Tanacetum cum *Matricaria* eiusdem esse temperamenti nimirum calidi & sicci, eundemque fere in *Medicina* vsum habere scriptum reliquit *Tragus*: Semine verò cum melle & vino potò, ventris lumbricos pellit, eiusque dolores sedari, sudoremque denique elici, vulgo etiam dictitante, manifestius esse, quàm ut pluribus indicari debeat. Facultate porro calidam & siccam esse Tanacetum, attestatur *Dodonæus*: vtpote omnibus suis partibus amarum: non tamen secundum vtriusque ordinem longè egrediens: Ex tenellis herbæ erupentis foliis cum omni placetas vere confecti, orti nec ingratas nec iniucidas, vetriculo verò etiam viles. Nā si qui in eo harent vitioli humores, eos partim ad concoctionem illas perducere, partim abstergendo deorsum deducere: Succum herbæ cum vino potum, aut eiusdem decoctum, vrinam prouocare, dolores ves-

cæ lenire, & vrinæ stillicidio mederi: eundem succum cum oleo rosaceo spinæ ante accessiones illitum, febrium rigores tollere latum esse: cum quouis autem oleo, etiam neruorum contractionibus ac doloribus auxiliarem esse: Dicit & de radice, quod cum melle aut saccharo condita, aduersus podagram plurimum faciat: si ieiunio vetriculo eius aliquantula pars, continuo aliquo tempore sumatur. Tanacetum flatus discutit ventriculi & intestinorum: restè igitur, inquit *Tucnerus*, fuit à Medicis consultum, ut in cibos veniret post Pascha, ad dissipandos flatus per ieiunia quadragesimalia contractos ex esu piscium, pisiorum, fabarum, aliarumque herbarum flatulentarum, quæ tum temporis in acetariis comeduntur. At meo consilio per ipsam quoque *Quadragesimā* vrentur, ut tum calculi, tum colicos cruciatus eo tempore inualescentes præcaueant. Vrinam ciet: referunt recentiores Tanacetum viris, *Matricariâ* foeminiis, vtiliora. Hic addit *Cæsalpinus*, vti recentiores ad omnes cruciatus internos mitigandos tum potâ, tum exterius applicatâ, *Abrotoni* modo: Item contra quasunque febres propinare succum eius pondere drachmarum duarum cum aqua *Plantaginis.* Florem in puluerem contritum cum *Saccharo* grauidis conducere: folia sicca & contrita in vino sumpta muliebres locos expurgare. Expertus sum (inquit *Herc. Saxon. de Lue venerea cap. 31.*) in muliere, quæ octo annos continuos manuum fissuras gesserat, & inutiliter omnium & Venetorum & *Patauinorum* opera vix fuerat, remedium quo breui & facile fuit curata. Est autem succus herbæ, quam alii *Arthemisiâ*, alii *Tanacetum* vocant. Dum administratur hic succus, cauendum est ab omni manuum lotionè, & pena hoc ipso illita, in singulas rimas succus inferitur. Expertus sum hunc ipsum succum in impetigine, in vlcibus crustosis, & successit curatio feliciter. Sic poteritis pedum & manuum rimas curare. Plura qui vult de huius vsu ceu etiam varia præparatione, ut aqua stillatitia, vino, extracto, conserua, syrupo, sale, & oleo, videat *Tabernamontanum* lib. 1. c. 7. circa finem.

TANACETVM CRISPV M FLORE LVTEO



CVi Tanacetum vulgare notum, ci magis obuia crispum Tanacetum cognitio quâ herba: est quippe hoc rariis, reliquâ vulgari descripto simile, sed foliis elegantissimis, crebriore incisurâ diuisis, segmentis frequentius argutius crenatorum marginum flexu reflexisque crispis, cristas castrenses imitatis, odore

gratiore, sapore amaro.

Lob. in Adu. Tanacetum Angliæ. In Obs. p. 432. Tana-

Tanacetum speciosius cristatum Anglicum. In Icon. Plant. 749. speciosum Tanacetum cristatum Anglicum.

Camer. hort. Tanacetum Anglicum siue crispum, odoratum admodum. H. Lugd. p. 956. Tanacetum cristatum Anglicum Lobelij. Tabern. Ic. & Hist. Artemisia sativa Anglica, *Englischet Keynsfahrl* / Artemisia; species, Tanacetum crispum, siue Cristatum, vel Anglicum. Gerard. Tanacetum crispum Anglicum, double *Englisch Tausie*. C. Bauh. phyt. Tanacetum 4. siue foliis crispis.

Tanacetum crispum flore luteo vidi Balmæ in horto insignis Chirurgi Petri Rolot, à quo accipi plantandum in horto E. C. Wirt. & meum Montbelgardii, ubi feliciter se multiplicat. Vidi quondam Cabillonii siue Chaloni in Camania & Lutetia in hortis. Frater attulit collectum folium in horto Bononiensi. Florer Iulio & Augusto.

Tanaceti Anglici vsus est in cibis, præsertim contra vermes puerorum, inquit Camerarius. In Scotia, vt testatur in Therapen. puerperarum Io. de Bon Regius Medicus in Gallia, Heroïna lectum Tanacetum ad prohibendum abortum ad mouere solent partibus inferioribus frequenter & cum felici successu, quod vt grauius oleat, prius manibus atterunt, aut sub cineribus paululum coquant.

TANACETVM ALBUM.



describimus in horto cultam.

Eadem aut similis est, sed ratione loci multò minor, quam reperimus Montpelii in montibus circa tres pontes, quos vocant du Gab, quam sic delineauit: Herba foliis similibus Tanaceto, floribus omni parte & colore similibus Chamamelio, gratissimum spirantibus odorem, quatuor vel quinque, vix ad altitudinem palmi excrescens.

Quum figura nostra ex Fuchsianis, iam sculpta non placeret, iconem Tanaceti inodori Clusij, quod idem cum nostro statuimus, curauimus pingendam, primam scilicet ampliore flore, cui folium & florem ex ipsa planta addidimus, quæ Tanaceto secundo inodoro Clusij bellè responderet. Sic autem Clus. de duplici suo Tanaceto Tom. III.

inodoro scribit.

Tanacetum inodorum nuncupat Clusius. Lob. Adu. Tanacetum non odorum siluestre. Eidem Lob. Obs. p. 432. & Icon. Plant. p. 750. Tanacetum non odorum, perperam Sideritis Italorum. Camer. hort. Tanacetum Leucanthemum, id est, floribus albis, inodorum in montibus altioribus Franconia crescent.

Hist. Ludg. p. 1147. Athanasia Leucanthemos, quam quidam Vchnam albam Auicenna volunt, vel vt legit Bellunenſis Achnam, Tanacetum siluestre non odorum Lobelij.

Tabern. Icon. & Hist. lib. 1. p. 470. Tanacetum Leucanthemum, wunder Regesfahrl. Idè antea in Hist. videntur hoc per Tanaceti quatuor genus intelligere, ac Tanacetum fatuū & Tanacetum inodorum vocasse; Italicè verò Tanaceto senza odore, & Tanaceto balord, quamuis aliqui Sideritium uelint. Vides vnam & eandem sub diuersis nominibus esse tradita. p. 37. & 38. pro Tanaceti 4 genere, sine icon. pag. verò 470. pro Tanaceto Leucanthemo, ubi icon.



C. Bauh. phyt. Tanacetum 1. siue inodorum montanum: hoc aliquid similitudinis habet cum Sideritide montana Marthioli; quoad folia: at si ramos & capitula perpendas conuenit cum Ruta canina: Lob. Tanacetum non odorum. Item. Tanacetum 2. siue inodorum flore Bellidis maioris, Clusio Tanacetum inodorum 1. Hæc duo Tanaceta C. Bauh. non dux, sed vna planta, aut saltem eiusdem speciei, ita vt non separandæ videantur.

Gerardo, Tanacetum non odorum Unſanorie Janſie.

Naralem habet in horto E. C. Montbelgardii, ex Gallia per me allatum. Hoc primo anno catulem non produxit, secundo floruit Iunio, semen maturuit Iulio & Augusto, Basileæ obseruauit in monte Mouters & in horto D. D. Fel. Plateri: Genæ in proximis montibus collegi bicubitalem, inibi verò in hortis flotentē Iunio & Iulio Paruum vti dictum, obseruauit Iunio florentem prope Gab, odore gratissimo; Magnum, si bene redor, in monte Wittembergico *Eichelberg* florentem Septembri. Tanacetum inodorum vtrumque Clusij prouenit ferè in omnibus vtriusque Pannonia & Austria montibus humilioribus, & siluis cædis: ubi florēt Maio & Iunio, & si Autumno seratur, flores interdum producit sequente Augusto.

CHAMÆCYPARISSVS.


CAP. XXV.

Non iniuriā inter suffrutes quis hanc connumeravit: ex radice lignosa virgulta quæ

R. 3

bito altiora emittit, lignosa, tenera lanugine incana: in quibus *falsa* longitudine circiter vnciali, cana, minucim denticulata, ita vt quatuor ferè denticuli in eadem phalange agminatim dispositi conspiciantur, odore mendicantissimo, & cum in quadam suauitate graui, sapore partim acri, partim amaro, singulis ramulis singuli insident flores Tanacetii lutei.

Chamaecyparissus
parifolia
Nemorosissima
flos.



Fragmenta
vra



Santonicum
maius
Cord.

Abinthio cognatus & odoratus frutex est, caudicem habens pollicari crassitudine, numerosas, cubitalesque virgas emittentem, tenera canaque lanugine obductas, vncial longioribus, canis & Ericæ modo in breuissimas carnosasque partes diuisis, & Hieme durantibus foliis vndique vestitis. In summis virgis flores lutei sunt, breuibz taminibus in paruum orbem dispositis facti. Semen habet tenue & furfuraceum. Radice nititur lignosa. Colitur apud nos in hortis, in Narbonensi verò Gallia spontè nasci fertur, si Dioscoridi, & iis qui nostra ætate ibidem gentitam viderunt, credimus. Santonicum minus, quod Plinio Chamaecyparissus dicitur, maiori in cunctis simile est, paulò tamen minoribus virgis & foliis constat, remissiorèque habet tū saporem, tū odorem. Colitur similiter apud nos in hortis Cypressi nomine. Nascitur & hoc

Hæc Chamaecyparissus à nobis plerūque obseruata descriptio est, cui similis, si non eadem, vt nos suspicamur, spontè proueniens, visa circa Nemausum, hirsutior & candidior, cui respondet Matthioli figura. Vulgarè perisimilem aliam Vnguentariam denominatā nouimus, caulibus tenuioribus, candidioribus (qui bicubitales nobis in plurimis hortis conspecti) foliis vestitis minoribus, sed quæ maioribus denticulis incisa sint, odore minus graui & iucundior. Figura apud Lobeliū & Dodonæū huic conuenit, idè eam figuram exhibemus.

Santonicū maius [inquit Cordus in H.]

copiosissimè in Narbonensi Gallia. Hæc Cordus, quibus fortasse intelligit duo genera à nobis descripta. Is in Dioscor. lib. 3. cap. 26. erroris eos arguit, qui Cypressi herbam (quam Germani Cypressen, Græci Chamaecyparissum nomen) Seriphium, id est, Marinum Absinthium esse contendunt.

Chamaecyparissum duplicem quoque statuit Dodgill. his verbis. Inuenitur in hortis Gallie Santolina duplex genus, figurā admodum simile. Primum & vulgatius appellatur à Plinio *Chamaecyparissus*, à Latinis Chamaecyparissus, à modernis quibusdam Santolina, & est officinis incognitū. Alterum simile huic, sed ramulis tenuioribus, flore pallidiorè, & minoribus: odore gratiore: sine dubio species est Cypressi (Cypres.) non Cedri [Cedre] vt quidam vocant.

Locupletat Dodon. lat. Historiam de Floribus & latinam in folio, plura tradens (quinque sc.) Santolinæ genera, dicens. Aurei coloris corymbos Santolina profert, odorata est, & non rarè coronis admiscetur. Eius aliquot sunt genera. *Prima* virgulæ sunt tenues, foliis circumdatae paruis, oblongis, & angustis, denticulatis: frutex cauliculis & foliis albicans, & suauiter cum grauitate quadam odoratus. Huic similis est & altera species, foliis longioribus, virentioribus ac minus candidis, flore pallidiorè. *Tertia* foliis breuissimis & Ericæ proximis: floribus luteis, & aliarum similibus. *Quarta* foliis est minus denticulatis, & Cypresso similibus, perinde vt aliarum. *Quinta* cauliculi non eriguntur, sed procumbentes per terram repunt: folia cissiflora & lanuginosiora magis canescunt: flores aliarum Santolinarum. Omnes hæc vno Santolinæ nomine appellantur. Belgæ verò Cypres nominant. Chamaecyparissum plerique faciunt: sed de Chamaecyparissio sententia nec reici, nec probari potest. Officinæ Semen contra vermes, & Semen sanctum appellant. Quod nonnulli ignorantes ex qua stirpe colligatur, Santonici semen esse existimant: alii Seriphii siue Abinthii marini: vtrique à vero aberrant. Hallucinantur etiam non parum, qui Santolinam Abrotanum fœminam esse volunt. Abrotanum siquidem fœmina, foliis est maris, Seriphii videlicet, similibus, sed procerius & fruticis modo arborefcens. Santolina humilior est, & non Seriphium, sed proximius Ericæ folio exprimit. Plus similitudinis cum Abrotano fœmina Heliochryson quorundam habet, vnde Abrotani folio cognominauimus: odore etiam ei vicinū est, non tamen Abrotanum, sed sui generis herba.

Abrotani fœminæ & Seriphii Dioscoridis icones Lob. in Obs. suis his titulis proponit. p. 443. Abrotanum fœmina Adu. p. 141. Chamaecyparissus Plinii Herbariorum: Santonicum minus Dioscoridis Cordi, Hispanorum *Terna L. mbri-guera*. p. 436. Seriphii Abrotani fœminæ facie differentia, Adu. p. 336. & 337. Santonicum maius Cordi. Santolina Dodonæi, cuius sex varietates alectat Moutonius, quarum pars foliis est Chrysocomes Montpellieræ angustifolia, pars verò foliis cristatis Chamaecyparissus, Sabinæ, vel Ericæ, minutis. Ex Hispaniis & Galloprovincia Belgii inquilina facta sunt. Horum nullum est officinarum Semen sanctum, siue contra vermes, vt credidit Dodonæus. Seriphium Galloprovinciæ Aduers. p. 337. successu temporis degenerat fragrantia, ac tomento, & candore exiit in Belgii & Angliæ viretis. *Mirum* Lobeliū in Obs. locis iam citatis, bis vnam & eandem figuram [cā

Santolina
Chamaecyparissus

varietas
flos.

Non ej
Semen
dum
cinarium
Lob. nu

sc. qua n

sc. quam Dod. pro Santolina habet) sub diuersis titulis proponere, cum in Aduers. pro Seriphio Dioscoridis aliam exhibuerit imaginem. Tres habet in Icon. Plant. figuras. Prima [ex Aduers.] p. 754. hoc titulo: Seriphium Dioscoridis Abrotani fœminæ facie. Secundam iam dictâ paginâ hoc titulo: Seriphii Abrotani fœminæ facie differentia. Et hanc rursus pictam dat p. 768. hac inscriptione: Abrotanum fœmina. Cur autem hanc sub diuersis titulis bis pingat, causam nullam video.

Clusius posuit priorem iconem Lobelii pro Abrotano fœmina Narbonensi, pro qua non videtur Lobelium posuisse. Clusius præterea pro Abrotano fœmina vulgari, exhibet modò dictam Lobelii secundam siue tertiam.

Abrotanum fœminam Salmaticensem diuersum esse ab eo, quod vulgò ab Herbariis Abrotani fœminæ nomine circumfertur, quodque Santolinam appellant, testatur idem Clusius. Illius autem in Historia rariorum stirpium per Hispanias obseruatarum, duo tantum genera tradit, licet in post. Historia sex assignet.

Abrotani fœminæ sexu faciliè crediderit Ruellius intelligi, quod vulgus Gallicum Cupressum appellat, quoniam in arbusculam fruticet, albicans, foliis Seriphii Absinthii modo scissis, ramulos circumdantibus copioso flore, comantibus quibuldam in summo auri fulgore corymbis, odore cum luauitate quadam violento, gustu amaro. Qui Chamæcyparissum existimant esse, quem vulgus ab odore formaque foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris, Cupressum appellat, falluntur, si Ruellio credimus. Nam etsi coactæ sit breuitatis, & velut arboris cuiusdam abortus, non tamen in genere punitionum sedè inuenit, nec in arborum, sed fruticum censu constat haberi. Huc facit quod nihil apud classicium authorem de Chamæcypresso legatur. Ad alterum igitur Abrotani sexu melius fuerit referre, cum nulla videatur delineationis nota repugnante.

Non placet figura Tragi, nec etiam quod Chamæcyparissum statuat. Fuchii icon quam proponimus paulò melius aridet.

Fuchius cap. 2. de Abrotano præsentem nostram plantam Abrotanum fœminam vocat, & Abrotanum montanum Plinii, ac siluestre Cupressum vulgi, eiusque figuram cap. 35: de Chamæcyparisso ponit, ac dicit. Χαμαίπυρος Plinio dicta est, quasi pumilâ Cupressus: apud Græcos, quod sciam, eius fruticis nulla sit mentio: vocatur vulgò Cupressus ab odore & forma foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris, Germ. Cypres / Gallis Cypres.

Anguill. epist. 10. in fine Santolinam vocat, negatque esse Abrotanum fœminam.

Abrotanum quod fœmineo generi adscribitur, non omnibus notum est, inquit Matthiolum: non idèo, quod & ipsum frequentissimum non seratur in hortis; sed quod à paucis pro Abrotano fœmina cognoscatur. Quandoquidem id alii Cupressum, alii Santolinam vulgò appellant, alii verò marinum esse Absinthium existimant. Sed ii profectò falluntur: quippe Santolina vulgò vocata, nil fanè aliud est, quam Abrotanum fœmina. Quod primum (vt Dioscorides inquit) arboris speciem quandam representet, vnde & à quamplurimis Cupressus vulgò dicta est. Deinde

quod candiscentibus constet foliis, citum tamulos minus incisis, floribus aureis, orbicularis, caulem summum æstatis & Autumni tempore, corymborum modo comantibus. Postremò, quod in vniuersum luauiter oleat cum grauitate quadam & amaro gustu. Ex hac equidem delineatione adducitur Matthiolum, vt decernere non dubitet, hanc plantam, quam vulgus Cupressum, siue Santolinam appellat, esse Abrotanum fœminam. Hinc itaque Fuchium errasse credidit, quod pro fœminei generis Abrotano, plantam subiecerit ab eo longè diuersam. Qui etsi Santolinam seorsum postea depinxit; non tamen eam Abrotani fœminæ nomine agnouit, sed herbariorum (vt arbitratu Matth. vulgus securus, eam Chamæcyparissum nuncupauit, eiusque nullam à Græcis factam fuisse mentionem falso credidit.

Abrotanum fœminam Camer. in Hist. Matthi germ. vocat & Epit. vbi præterea ab ipso Chamæcyparissus, germ. garten Cypres / Ital. Abrotano fœmina, Herba camphorata, Santolina, Cypressina & Crespolina cognominatur, eique meo iudicio non absque graui periculo eadem qualitates & vires conceduntur, quæ Abrotano mari debentur. Et licet hoc loco Abrotani fœminæ vnus tantum memoretur, attamen in Horto, duo eius genera reperiri scribit, quorum vnum vulgare & candidius ait esse, alterum foliis magis viridibus, quod etiam admodum cultura fruticescere tradit. Reperiri præterea & alias differentias quoque testatur.

An Turn. par. 1. p. 14. Abrotanum fœmina, Angl. lauander cotten.

Gesh. hort. Chamæcyparissus & Centonia Galorum, si non fallitur. in cat. pl. Abrot. fœmina, d. βροτανος θηλεα, Cypres fraut / Cupressus Ruellio. Item: Chamæcyparissus, Cypres de iardin.

Tabern. Icon. & Hist. Abrotanum fœmina, Α' βροτανος θηλεα, Α' βροτανος σκελετονος, θηλεος θηλεα, & θηλεος θηλεα: Abrotanum Siculum, Thelyphthoriū & Thelythamnium Dioscoridi, Plinio verò Abrotanum campestre, ideo fortè quod in Prouincia & Gallia Narbonensi, & aliis calidis regionibus, spontè in campis crescit: Cordo Santonicum minus, Herbariis Cyparissus hortulana, Cupressus hortulana, Abrotanum minus & Santolina: It. Herba canforata, Santolina, Cupressina & Cypresso: Gall. petit Cypres, Garderobbe, Cypres de iardin & du Cypres: Hisp. Hierua, (yerua aliter) lombriguera: Boh. Cypressen: Polon. Cypres: Angl. Cypres: Brab. & Belg. Cypres & Iecghe cypres: Germ. cypres / cypressfraut / garten cypres, Vind stabmurg weiblin / & quibuldam cypressen Stabmurg; hoc est Abrotanum cupressinum, aut cyparissinum. Item Icon. & Hist. Absinthium marinum (3. in Hist. 2. in Icon.) Absinth. verum marinum, Σελφον, d. ὑψισθα δασσινος, Seriphium & Absinthium marinum, Meerwerdmuth / Edler Meerwerdmuth / Kleiner garten cypres. Item in Hist. Absinthium marinum alterum, Seriphium maius, Absinthium marinum maius, Santolina maior, Meerwerdmuth, großer garten cypres, Santonicum maius Cordo, sed erat. Duas figuras & tres descriptiones habet Tabernamontanus.

C. Bauh. phyt. Abrotanum 1. siue fœmina Dioscoridi, Chamæcyparissus Tragi, verum figura ipsius nimis lata exprimit folia: Abrotanum fœmina Lobelii, cuius figuram bis posuit. Abrotanum 2. siue fœmina flore maiore, Santonicum

Camer. laci
p. 14.

Centonia:

Tabern.

maius Cordi, Seriphium Dioscoridis Abrotoni
feminae facie Lobelii. Abrotonum 3. siue fe-
mina flore maiore alterum maius, Abrotonum
femina Salmaticensis 1. Clusii. Abrotonum 4.
siue femina flore maiore alterum minus, Abro-
toni femina Salmaticensis prima altera species
Clusii. Abrotonum 5. siue femina odore vn-
ctuoso, Santolina 3. Dodonæi, Vnguentariae no-
mine Lutetiae collecta. Abrotonum 6. siue fe-
mina foliis minus denticulatis, Santolina 4. Do-
donæi, qui notat & alteram differentiam Sabing
folio. Abrotonum 7. siue femina repens cane-
scens Santolina 5. Dodonæi. Abrotonum 8. si-
ue femina tota viridis, Abrotonum femina Sal-
manticensis secunda Clusii.

Non placet nobis eorū opinio, vt liberè dica-
mus, qui Abrotonum feminam volunt: hanc o-
pinionem olim oppugnavi, non visā nec Dodo-
næi, nec aliorum sententiā, qui nobis as-
sentiantur. Chamæcyparissus non est *χρυσόφυλλον* ⑤
sed candidior: non est foliis *λεπτοφύλλον* *ἀνισπρε-
πειον*: in Chamæcyparisso folia non diuisa aut se-
cta instar Seriphii: non intelligo Lobelii Seri-
phium, quod nulli Absinthio simile, nec etiam
Abrotono vt voluit Matthiolus: quæ similitudo
obscuro Chamæcyparissi speciebus, cum Absin-
thiis vel Abrotono: placet argumentum Dodo-
næi in Chamæcyparisso non esse *ἀνισπρεπείον* *τὸ
πρὸς αὐτὸν*: sunt enim non plures circa ramulos, sed
singulares in singulis virgulis: mirabilis est o-
pinio D. Leonhardi Kretschneri à Streckenbach
Medici Snidnicii in Silesia, asserentis in epist. ad
fratrem C. Bauhin. contra Matthiolum, non esse
Abrotonum, sed Aristolochiam Clematicum.

Locus &
tempus.

Chamæcyparissum sponte nascentem & sylue-
stem inueni prope Nemausum inter *Eusan* locus
viam copiosam florentem mense Maio & Iunio,
hirsutis foliis & candidioribus quàm exprimit
Matthioli figura. Satiūm vidi Montspeli, Pata-
uii, Ferratie, Bononiæ, Basileæ, Lugduni, Gene-
uæ, vbi Hiemem fert, & alibi in hortis. In horro
Ill. E. C. tātā copiam habebat, vt fimbrias mul-
tas curarem plantandas, quæ aliquot annos du-
rarunt: tandem quadam Hieme omnes plantæ
rum in horro E. C. tum in aliis Montbelgardi, vbi
abundauit, perierunt, ita vt nulla restaret. Anno
1591. ex Allatia allatam plantandam curavi, par-
tim in arcis relictam, partim repositam, quæ de
terius habuit. Quæ Vnguentaria dicitur, mihi
visā Lutetiae, vnde etiam à Fratre mihi missa, &
plantata in hortum Ill. E. C. Montb. Abrotonū
femina Chamæcyparissos Lobelii in hortis fre-
quens colitur & Galliae Narbonensis Nemausen-
sis vinetis & capis parentibus fruticat plurima,
viā præsertim quæ Montpelium ducit, scilicet leu-
ca ab vrbe ad dextram. Seriphium Dioscoridis
Abrotoni feminae facie in Galloprovincia mon-
tis celsi D. Magdalene celebritas accliuibus quā S.
Maximum spectat oppidum: redeunt item Ol-
bia maritima vulgo Galloprovinciæ Hyeres dic-
ta multum obuium istud Absinthium Lobelii.
Santolinæ Dodonæi in Belgio omnes peregrinæ
sunt, neque alibi in hortis reperiuntur: primum
genus familiarissimum: reliqua rariora.

Vires &
Vires
Scabies.

Profluua
alba,

Abrotoni femina decoctum aiebant Sa^l *Λι-
cences* Clusio, vtiliter propinari ad scabiem pro-
fligandam: quod si ita est, proculdubio habenda
est ratio naturæ illorum, quib. datur. Matth.
scribit istius folia sicca, ad sistenda alba femina-
rū profluua conferre, si continuis decem die-
bus aut pluribus sumantur à ieiuniis, & deinde in-
terpolatis diebus. Est autem, authore Dodonæo

Santolinæ semen gustu amarum, potentiā calidū,
siccūque tertio ordine: ventris lumbricos sum-
ptum interimit quotidiano experimento mulier-
cularum, & aduersus eisdem efficax est.

MILLEFOLIUM STRATIOTES pennatum terrestre.

CAP. XXVI.

V Bique viarum obuium est Millefolium, do-
drantalibus cubitalibus, & altioribus ramis
surgens, rigidis licet tenuibus, angulosis, hirsu-
tis, tubrulentibus, qui circa summitem in ali-
quot surculos diuiduntur, atque hi rursum in
plures periolos, qui flores in umbella ferunt o-
doratos, paruos, colore albos, vel subpurpureos,
quinque, septem, paucioribus, aut pluribus foliis
constantes, ex calyculo squammato: folia pinna-
ta ad costam alligantur, tenuibus Chamæmeli
diuisuris, sed compositioribus, rigidiusculis, sua-
uolentibus, gustu acrisculo: radix lignosa
& fibrosa nigricat. Millefolium maius purpu-
reo pulcherrimo flore ex horro nobilis ab Ha-
genbach attulit Hortulanus Ill. E. C. quod ob co-
lorem, qui summē intuenti aridet, plantauit:
Hoc fortē idem cum rubro Clusii, de quo po-
stea, & C. Bauhin. purpureo magno.

Stratiotes millefolius (*στράτιες χιολόφυλλον*)



ita describen-
te Dioscoride,
pusillus est
frutex, palmi
altitudine, aut
etiam ampli-
us allurgens:
habens folia
pulli pennis
similia [*πρό-
σπερον* pro quo
vet. *πρηνίς*, alii
πρηνίς, i. est,
recenti
ac tenellæ Fi-
lici.] Sunt au-
tem foliorum
exortus [*αἱ ἐκ-
είσες*, pro αἱ
vet. legit αἱ]
breues admo-
dum & incisu-
ris diuisi. Fo-

lia maxime Cumini agreste rum breuitate, tum
etiam scabritiā [*χρ. τ. τραχύτητα*, quibus vetus ca-
ret] simulant, sed sunt etiam minus breuiora paul-
lō, densiore pleniorēque umbellā. Surculos in
cacumine getic exiguos, in quibus umbellæ in
modum Anethi, flores parui candidique.

Plinius de hoc Millefolio inquit: Etruria hoc
nomine appellat herbam in pratis tenuem, à la-
teribus cappillamenti modo foliosam: eximi-
vius ad vulnera: Boum neruos abscessos vome-
re solidari eā, rursūque iungi addita axungia,
assumans.

Offenderunt Herbarii pro Millefoliā stratio-
te ætate Marcelli, coliculum breuibus & exiguis
foliis undique vestitum. Responderuntque hi-
storici Dioscoridis omnia, exceptis umbellis, quas
author dicit Anethi modo in lūmo eius esse.
Quos enim Marcellus vidit flores magis longi-
usculis

usculis pediculis pendentes sunt, quos credit esse, quæ Dioscorides *χρυσία* (festucas vocat, & quibus umbellam sustineri ait. Sed singuli potius flores quasi in umbellâ plures congesti sunt. Cætera, ut existimat, egregiè respondent. Nulla est (fallitur Marcell.) quod meminerit, Stratiotes millefolia Plinio: siquidem nullam hoc nomine descriptam in eo inuenierit. Græci hanc Stratiotem millefolium notis ab alia disceuerunt: terrestrem hanc præsentem appellantes, quæ præter humorem & frigus habeat aliquid, quod adstringat; aliam verò, de qua suo loco, aquaticâ nominâtes, quæ frigefaciat & humectet.

Matth. in Diosc. duas ponit figuras maioris & minoris, nec in contextu aliter, quàm magnitudine tantum distinguit.

Hæc. Lob. in Ad. p. 333. sub duobus diuersis titulis, quorum prior est, Militaris terrestris: alter, Militaris siue Millefolium, flore albo, purpureo & luteo. In Obs. p. 430. & in Ic. Plant. p. 747. duas quoque exhibet figuras: priori titulum fecit, Millefolium terrestre vulgare, Stratiotes millefolium Dioscoridis. Alteram inscripsit, Millefolium terrestre purpureis floribus.

Quam Ruellius magno errore Achilleam (*ἀχιλλεύς*) esse credidit, inquit Cord. in Dioscorid. est sine dubio illa herba, quæ à Dioscoride *χρυσόφυλλος ὁ στρατιώτης*, & hodie ubique Millefolium vocatur. Cordus in Hist. describit, & Stratiotem terrestrum maiorem appellat. Gefn. verò alius figurâ addidit, & in titulo posuit Millefolium terrestre maius, Tragum Millefolium nobile videri nuncupare, Et licet Cordus minorem quoque tradat & describat speciem, neutrum tamen Millefolium Cordi, est Millefolium nobile Tragi, quod Cordus Achilleam vocat.

Gefn. in cat. pl. Achillea, *ἀχιλλεύς*; Item Millefolium, seu Millefolia Hercuria, & *μυριόφυλλον* dicitur: quam aptè autem, videant alii. Trago Millefolium vulgare Stratiotes est terrestris apud Dioscoridem.

An Hermol. Coroll. 647. Sideritis 4. siue Achilleos, quam nonnulli Panaces Heracleon appellauere, & Hercuria Millefolium vocat, herbam in pratis tenuem, eximii vsus ad vulnera. Achilleos & Achillion vocatur quarta Sideritis, & à Lat. quibusdam Lumbus veneris: Dioscorides Supercilium Veneris non Lumbum dici voluit, alterutro errore orto, quod Græci *δυσφύλον* Lumbum, *δυσφύλον* supercilium appellant.

Eadem hæc Hermolai verba recitat Ruellius, eum tamen non citat, more suo cuncta pro suis vendicans. Achillion, inquit, Sideritum, alii Heracleon, Romani Supercilium Veneris, aliqui Militarem & Millefolium esse appellant. Hanc nonnulli Panaces Heracleon vocauere, nostri propriè Millefolium. Cætera habet eadem quæ Barbarus.

Lonic. lib. 5. cap. 18. Garben aut Schaafrip/ duplex: maius *feldgarben*/ *großgarben*, *groß Schaafrip*/ Græcis *ἀχιλλεύς*, Lat. Achillea, quibusdam Veneris supercilium, & Veneris lumbus: minus, Garben / *Schaafrip* / *Schaafgarben* / *felschen* / Græcis *στρατιώτης*, *χρυσόφυλλος*, Lat. Militaris herba, quibusdam Millefolium. Hæc duæ plantæ sunt vnius generis: vni flos rubet, alteri albus est: mas excrecit cum summatibus albis, femina manet parua & dicitur *Schaafgarb*: est præterea parua, quæ dicitur *Tausentblatt*, *wasserthannen* & *wasserfendel* / Græcis *μυριόφυλλον*, vulgo Millefolium. *Lonicernus* tres

Tom. III.

proponit vnius plantæ figuras: nec tamen suis descriptionibus bene distinguit: & ut verum fatear confundit suo more omnia: in posteriore descriptione fortè etiam miscet Polygonum forminam.

Theod. Dorsth. p. 190. duas icones habet Millefolii stratiotes, sub his nominibus: *μυριόφυλλον*, *Lonic. m.* Millefolium Veneris.

Casp. Bauh. Phyt. Millefolium 2. siue maximum album, umbella alba ex horto Patauino, foliis duplò latioribus, quàm sint vulgaris, Millefolium 3. siue vulgare album Millefolium, Brunfels. terrestre Lobelio: flore candido & subalbido. Millefolium 4. siue vulgare purpureum minus, Millefol. vulg. flore d. luti raboris Trago, terrestre purpureis floribus Lobelio: Huius speciem proponit, sed sine icone Tabernamontanus. Millefol. 5. siue vulg. purpureum maius, Gœppinge in horto quodam collectum est, hoc vulgari albo simile quidem, sed ad binos ternosue cubitos excrecit, foliis ut in purpureo minore dispositis, umbellâ magnâ, floribus elegantissimi coloris.

Clusius pro Millefolio rubro colore iconem proponit, quæ apud Lob. in Ic. Pl. p. 747. est pro purpureo.

Millefolium etiam nunc vulgò appellatur in Hercuria, Casalpino teste, in cæteris si nilis Achilleæ, sed foliis in longitudinem productis. Dioscorides pulcherrimè foliorum figuram expressit, Cumino siluestri comparans: si per Cuminum siluestre intelligamus Ammi, quod inrer Camini genera recensetur à Dioscoride, cuius descriptio paruo Millefolio cõgruit, non magnò: ut hinc colligere liceat reliqua genera Millefolii ad Achilleam pertinere. In paruo hoc Millefolio reperiuntur flores albi & purpurei, aurcos autem non vidi, ait Casalp. nisi in Tanacetis, quod cum Millefolio maxime conuenit.

Hæc duplex Millefol. vocat Schuuenckf. Millefolium terrestre album & purpureum.

Sed ut ad eum, quem transiimus, reuertamur, Dodonæum. Exhibet iis Lobelii utramque iconem his titulis: Millefolium siue Achillea. Et: Millefol. purpurei floris. Cæteram, vnica descriptione, utrumque delineat, ac ait. A recentioribus appellatur Millefolium. Dioscoridis est *ἀχιλλεύς* & *ἀχιλλεύς σιδιρίτης*, Lat. Achillea, & Achillea Sideritis, quod conferenti hanc cum Dioscoridis descriptione, vel luce clarius est. Inuenit hanc, teste Plinio, Achilles discipulus Chironis, quæ ob id Achilleos vocatur, alii Sideritum, apud nos Millefolium vocant. Sunt tamen & aliæ Sideritides, aliud in Panaces Heracleon, de quibus alibi. Apuleius varias huius appellationes adfert, quarum quædam inter nomenclaturas nothas apud Dioscoridem quoque extant ut, *μυριόφυλλον* [aut *μυριόφυλλον*] *χρυσόφυλλον*, *στρατιώτης*, *χρυσόφυλλον*: Lat. Militaris, Supercilium Veneris, Actum, [aut Acorum] siluaticum: Gallis Bellocandium, Vigentiana: hac ætate Germani Garben appellant / *Scharffgras* / *Scharffrip* / alii *Scharffgarb* / & *Schaafrip*, r. licet omisâ, malè meo iudicio] *Tausentblatt*, & ut Wirsung, in indice Gerwol / & *Schabab* / Belgæ *Gerumet* Galli *Milfueille*: Hisp. *Milhojas yerua*; Itali *Milfoglio* & *stratiote* Millefolio: Angli *yarrowe*, nos *se blede*: Bohemi *Kzebricek*: Hungari *Eggher fark* / h. e. Muris cauda.

Passim Montbelgardi prouenit flore albo & purpurascens, etiam in horto Ill. E. C. sponat

natum: florens adhuc Septēbri obseruauit Mon-
spelii: Genue virentem Februarii principio,
fiorentem Iunio & Iulio: Baileæ adhuc Octo-
bri inter portam cineream & lapideam extra vr-
bem, ad ripam Birsæ: in vrbe florentem Iunio
& Iulio & Augusto: multum serpit: asparagi acres
sunt, vt in Pannica Fuchsi. Album in Silesiæ
pratris & agris plusquam notissimum: à Maio in
multam ætatem floret: dilute rubens passim in-
ter segetes, iuxta aruorum, pratorum, ac hortoru
margines. Stratiotes millefolium Dioscoridis
nascitur in agris subasperis, præcipueque secus
vias.

Viror

Herba est, auctore Dioscoride, eximii vsus
ad profluentem sanguinem, vlceraque tum
vetera, tum recentia, atque etiam fistulas. Strati-
otes terrestres, inquit Galenus, etiam quid adstri-
ctionis habet, vt ob idem etiam vulnera glutina-
re possit, & vlcetibus vtilis esse. Quidam verò
ipso etiam ad sanguinis eruptionem vtuntur &
ad fistulas. Quod porro Millefolio sanguis è
naribus irriteretur, altitudo contingit. Millefo-
lium terrestre album, vt testis est Schvvenckfel-
dius, siccatur, adstringit, & consolidat recentia
vulnera. Herba recens tusa pubique illita men-
sium abundantiam compescit. Umbella candida
ex lacte caprillo, vel propria aqua pota gonor-
rheam in viris, in foeminis alba vteri excremēta
cohibet. Millefolium terr. purpureum valet
potum ad omnes sanguinis reiectiones commo-
deque dysentericis infunditur. Aqua stillaricia
contra pestilentiam vtilis. Scribit Matthiolus

Menses.

Canorrhæ

Dysenteria

Millefolium

Dentium
dolor.

dari vtiliter Millefolii succum ad sanguinis reie-
ctiones. Idem præstare sicci farinam ex symphi-
ti maioris, aut Plantaginis aqua potam. Eandem
naribus indicam sanguinem inde fluentem siste-
re. Mirum in modum conferre eiusdem farinam
ad sanguinis mictum, si vncie pondere cum Ar-
meniacæ terzæ drachma ex vaccino lacte potui de-
cur icuinis, diebus tribus continuis: idque va-
lentius efficere, si cum Corallio, Succino & E-
boris scobe propinetur. Commanducata folia
præsertim recentia dentium dolorem mulcere: i-
dem efficere commanducatam radicem & diu
sub dolente dente retentam. Dari herbæ deco-
ctum cum Labruscæ floribus vtiliter potandum
contra vomitum.

Millefolium Alpinum Clusio, paruum, nonnihil
incanum, carneum.

Descriptio

Elegans est hæc plantula, dodrantalem, siue pal-
marem altitudinem non excedens, multis foliis
circa radicem stratis, tenuissimè incis, & velu-
ti è multis minutissimis alatis foliolis constanti-
bus, nonnihil incanis: candicantes cauliculi, sa-
tis crassi, huiusmodi foliis, iisque minoribus, &
tenuissimè incis obli: umbella stolonum de-
fissima, qualis in vulgari Millefolio, sed dilutio-
re rubro colore siue carneo nitentiam: radix vix
à vulgari differt, fibrosa admodum, & summâ
tellure serpens.

Synonyma

Ab hoc tamen Millefolio Alpino Clusii in Pâ-
non. p. 562. & Hist. post. pag. 331. differre visum est,
quod in hortis alebat, cum in Belgica viueret, si-
milis propemodum flore.

Millefol. illud Alpinum dicitur C. Bauh. Mil-
lesol. Alpinum incanum carneum flore.

Locus.

Spontè provenit in Judenberg & Spital,
Stiriz Alpibus, flores proferens Augusto: nata-
lesne causa sint istius varietatis, an cultura, ne-
scit Clusius.

MILLEFOLIUM ALPINUM INCANUM flore specioso.

Palmaris est plantula, radiculâ simplici, ruffâ,
ac penè nigra: è qua folia prodeunt duas aut
tres vncias longa, rarius pinnata, tomentosa, lon-
giusculis ac ferè vncialibus pediculis hærentia:
Cauliculis tomentosis item prædictis similia quo-
que hærent folia, sed aliquantò minorâ, breuior-
ibusque pediculis donata: Eorum verò summi-

taribus flores
insident quin-
que aut sex,
squammati,
corymbati, v-
ti ex sicca col-
ligimus. Squa-
mæ fuscis ve-
nis insignitæ
florem specio-
sorem reddunt.

Legit Clari-
ss. Platerus in
Valesiæ mon-
tibus, ex cuius
prototypo fi-
guram nostrâ
damus.



MILLEFOLIUM TOMENTOSUM luteum.



Descriptio

Dodran-
talis est
herba, multos
ex radice cras-
sa, durâ, repē-
te, fibris Hel-
lebori æquali-
bus, quibusdâ
minoribus, co-
lore nigrican-
te aut cineri-
ceo foris, in-
tus flauo, sapo-
re dulcibus (in
sicca planta)
præditis do-
nata: caules
plures emittit
rectos, satis
robustos, in
quorum cacu-
mine densæ
micant floribus
umbellæ Millefo-
lii vulgaris terre-
stris, aureo tum foliorum, tum umbilici colore
fulgentes: folia per coliculos tomentosos, Mille-
folii Stratiotis, sed multò minorâ, minutiusq; in-
cisâ, incano villo pubescunt. Tale est Millefo-
lium Narbonense.

Simile si non idem dedit frater C. Bauhin. no-
mine Helichrysi, ex Tyrolensi ditone clari.
Minus prædicto est, foliis non ita tomentosis,
caule tenuiori, umbellâ magis diuisâ, capitulis
minoribus ex longioribus pediculis dependenti-
bus

bus, floribus luteis, qui pulchrè referuarunt colorem pluribus annis: an loci ratione differat à nostro asserere non aui'm: accedit ad figuram Matthioli, quamvis minor sit planta quam siccam habemus.

Dalechampsius Monspeulanum meum Millefolium vocabat Tanacetum lanuginosum. An Clusii in Hisp. & Hist. post. Stratiotes millefolia luteo siue flauo flore?

Dodonæus eandem plantam cum Clusio pro Stratiote Millefolio exhibet, quam ita cognominat. Millefolium minus, siue Stratiotes Cheliophyllon. De hoc autem ait. Rariùs huiusmodi Millefolium reperitur: gignitur autem pingui ac lato solo, & subinde in pratis; Augusto mense flores eius præcipuè conspicui.

Gelverus id eam plantam Monspeulanam adscripsit esse Stratiotes millefolium Dodonæi. Idem de hoc. Millefolium luteis floribus à Dodonæo depictum nuncupat; Matth. in post. com. cum mag. fig. lat. & ital. Helichrysum alterum; Camer. in Epit. & Hist. Matthioli. German. Helichrysum in Italia n. quod plurimum in Italia proueniat; & iisdem sit facultatibus præditum, quibus Helichrysum Dioscoridis; In horto, Helichrysum italicum Matthioli, Millefolium luteum; Lob. in Advers. Militarem, siue Millefolium luteum (& ita quoque in Obs. p. 41. vbi & Achædem huius flore Clusii, & Icon. Plantar. pag. 743.) Hist. L. gd. p. 77. Helichrysum italicum Matthioli; C. Bauh. phyt. Millefolium 7. siue luteum. tomentosum.

Tabern. Ic. p. 31. Millefolium luteum, Geel (Garten) Hist. p. 61. Millefolium 4. luteum; Item Icon. p. 127. Helichrysum altera icon [titulus transpositus, verior est Helichrysum 2. Italiam] Goldbrun [Hist. p. 456 Helichrysum 2. Icon Helichrysum est ex Matthiolo: Tabern. non animaduertit esse Millefolii speciem: eam iungere debebat Millefolio luteo, cum quo eadem, aut eius salt. m. species.


Geraido dicitur Stachas citrina. Is ineptè posuit iconem Tabernamontani Helio. h. y. 2. pro Stachade citrina:

Millefolium tomentosum obseruari mente Iunio inter Nemausum & Valentiam. Nisi me impedirent notæ quædam, parum abesset, quin hanc pro Chrysocome exhiberem. Hoc in Tyrolensi comitatu cum Italianis peteret; collegit frater C. Bauhinus.



prouenerat ex semine misso ex Creta homine Millefolii veri per insignem Botanicum & Medicum Honoratum Bellum.

MILLEFOLIVM ALPINVM.



quantum hirsuta.

Huius similis ac parum differens planta quibusdam sua Moschata, dicta montana, de qua capite sequenti.

Clusius suum Parthenium quod idem existimamus cum Millefolio nostro Alpino; ex quo etiam iconem proponimus, sic describit, tam in Hist. Pannon. quam in postrema. Multis ex fibrosa radice, Chamæmeli modo, fructuat ramulis, pediculis, viridibus, quos ambiunt folia Anthemidi prorsus similia, multiplici incisone diuisa. Cotula aut Matricaria ferè odore, gustu calido, atamen non ingrato: extremis cauliculis multi flores insident umbellatim congesti, Absinthii Alpini, quod post hac describemus, floribus proximè accedentes, hoc est, exigua capitella ex albo & pallido commixta, ambientibus ea fœnis aut octonis latiusculis albis foliis, eiusdem cum ipsa herbâ odoris: rami siue cauliculi humi procumbunt, & ex vna, vt dictum, radice prodeunt.

S. 2

MILLEFOLIVM CRETICVM.

Peregrina elegantia conspicua hæc plantam etiam excitatores Botanologi Chamæcyparissum esse dicerent. Et nos in ea dignoscenda primo decepti obruti. Sæculi quos ficos adseruamus pedales ferè sunt, in cana lanugine toti vndique cum ipsis foliis obstiti; ramulorum ac foliorum, vt dicta Chamæcyparissi diuisura. Folia minutius distincta ad costam hærent. Segmenta rufus in alia; minus tamen profunda diuisa. Vnde nomen illi inditum esse facile est conicere. Folia & segmenta temporis progressu in se retracta, caudæ Scorpionis in modum incuruantur. Florum corymbi in umbella positi, exalbidis, maiores quam in Millefolio vulgari. Sapore est amaricante, aromatico, ad Santonici, seu Seminis contra vermes officii.

Tom. III.

res, subinde fibras agunt, & noua germina procreant. Hanc plantam montani venatores *Vnser Fraws* sive *Warts* *Rauch* nomine donarunt, ad Abinthii Alpini umbelliferi, de quo postea, differentiam, quod *weis Rauch* appellant. Parthenium Alpini Clus. vocat, à Dioscoridei Parthenii odore, ad cuius etiam descriptionem accedere videtur Clusio.

C. Bauh. Phyt. dicitur *Matricaria* s. *sue Alpina Chamemeli foliis*.

Locus & Tempus.

Millefolium Alpini in peregrinatione Rhætica cum Gesnero inueni in monte prope *wesen*. Parthenium Alpini Clusii inuenitur in *Schneberg*, *Schnalpen*, & *Durrenstein* iugis, magna copia: floréque duntaxat Augusto: nam cum in accliuatibus, & circa scrobes nascatur, quas diutius insidere solet nix, serius illud florere necesse est. Saepé illud cicutare voluit Clusius, translati è loco natali plantis cum suo caespite, & in hortum illatis: sed ultra alterum annum non permansit: licet commodo & naturæ eius apto loco reposuisset, & omni sollicitudine curasset.

MILLEFOLIO ALPINO AFFINIS PLANTA, quibusdam sua Moschata.

CAP. XXVII.

Descriptio.

Dvos aut res pollices alta est, paullo etiam amplior, *culiculi* iunco, simplice *foliis* vestito Millefolii Alpini, licet non hirsutis, nec ita ad Millefolium vulgare accedentibus: *flores* plures quam Millefolio Alpino, umbellati, sed minores, rotati agmine foliorum alborum magnorum circumpolito, apicibus in medio numerosis, ex capitulo squamis nigris Alpini Millefolii in modum compacto.

Millefolio affinem plantam voco à me collectam anno 1565, in Rhætiae altissimo monte *Braulio*, florentem mense Iunio, quam tunc sua Moschatam denominaui. Iconem huius adiecimus figuræ antecedenti à Clusio propositæ, eamque notauimus numero II. Rhætis insubrit finitimis, Gesn. de hort. teste, dicitur sua Moschata, & herbulæ montana Tanaceto cognata.

ACHILLEA MILLEFOLIA ODORATA.

CAP. XXVIII.

Descriptio.



Millefolio terrestri cognata est Achillea, sic ut non omnibus obuiū sit discrimen, *virgis* fruticat aliquando triobitalib⁹, nonnunquam palmaribus; striatis: *folia* Millefolii vulgaris, tenet terrestris, sed lactiora, breuiora, multifida, colore non ita viridi prædita, sapore amaro, odore

valido aromatico: umbellæ fert *corymbosum* Millefolii iam dicti, foliolis candidis mediū orbem aureum cingentibus: *radix* lignosa.

Hanc Dioscorides ita tradidit. Achilleam sunt qui etiam Sideritum vocent. Gerit autem scapos dodrantales, aut etiam maiores, furorum etigie, foliis circundatos minutulis, ex obliquo crebras habentibus incisuras, Coriandro proximis, subuluis, lentis (*γλίσπρα*; quæ voce vet. caret) odore multo, non insuauis, sed medicato: umbellam verò in cacumine rotundam, floribus candidis & autum æmulantibus (*χρ. περυσία* addit vet.) Læto solo prouenit. Achillion inter nomenclaturas spurias quidam Myriomorphon, quidam Chilio-phylon, quidam Stratiocion, quidam Sideritum Herculeam, & quidam Achilleam Sideritum vocant: Aphri Asterchilloch: Romani Supercilium Veneris, Siluestrem Acortum, Militarem herbam, & Millefolium.

Achilleos, inquit Plinius, ab Achille dicta est, Chironis discipulo: quia vulneribus mederetur: hac enim sanasse Telephum dicitur. Hanc apud nos Millefolium vocant, tubitali scapo, ramosa, minoribus quam Fœniculi foliis vestitam ab imo. Aliud tamen idem Plinius Millefolium vocari in Hetruria testatur in pratis nascens, de quo antè dictum c. de Millefolio Stratiore penato terrestri. Achillea herba, ut dictum, ab Achille primo eius inuentore, in Thessalia Centauri Chironis discipulo, sic dicta, quæ vulneribus medebatur, ne tantum in cuspidi sua laudem & honoris titulum sibi perpetuum compararet. Nouerat is herbam minoribus quam Fœniculi foliis vestitam, ideoque *Chiliosphili* n. [Millefolii] à multis vocatam: eandemque Stratiocionem (*Militarem*) quod in castris & bellis multus eius vtus esset. Nouisset etiam si tempora passa essent dicta à Romanis *Supercilium Veneris*, propterea quod, ut in ea parte humani vultus crebris pilis vestita veluti linea est, sic in Achillea herba minuta folia capillamenti modo caules eius vestiunt. Dixit hæc Marcus Marcellus, quæ satis ad hanc historiam fore credidit. Ceterum, quæ ad eam complendam facere poterunt, ex alijs adscribemus.

Qui vulgaris vsus Millefolium Achilleam esse existimant, inquit Matthioli, qui Achilleæ nomine eam describit & depingit, haud dubie meam quidem sententia decipiuntur. Siquidem id folia non proferit crebris ex obliquo sectionibus, Coriandri similitudine, sed auicularum pennas æmulantia. Porro tametsi constet, Millefolium umbellæ coronari modò albâ; modò purpureâ: modò aurâ: non tamen propterea colligendam est Millefolium, & Achilleam vnâ & eandem herbam esse. Quandoquidem non purauerim ego fuisse Dioscoridis institutum (ut Ruellio placet) quod hæc Achillea umbellam ferat candidam, illa verò purpuream; alia denique auream: sed quod omnibus in vniuersum Achilleæ plantis eadem insit umbellæ, quæ tantum prædictis coloribus distincta spectetur. Atque in hac persistam sententia, plantam hanc exhibitam esse legitimam Achilleam donec quis certiorum protulerit: quod hæc mihi plantæ omnibus nouis Achilleam Dioscoridis præsentare videatur. Ceterum in hunc fortè errorem, ut crederent Stratiocionem Millefolium esse Achilleam, illos deduxit Plinius, qui l. 25. cap. 5. Achilleam Latinis Millefolium vocari tradit. Verum tamen is, quantum videre est eo in loco, non Achilleam hanc adscribit, sed eam omnino plantam, quam Dioscor.

Achillea
Matth.

Matth.
error.

Ruell.

Est Ad
Diosc.

Dioscorides Myriophyllum appellat. Quare paulo post hæc uerba subiunxit. Sed alij, inquit, fatentur veram Achilleam esse capro caruleo, pedalis, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Ex quibus verbis apparet dubitari Plinium, qualis legitima esset Achillea: & ideo ita indeterminatè locutum fuisse, ut nihil in eo perpetuum statui possit. *Serapio*, autoritate Constantini Achilleam, quod [ut ipse ait, hæc falso] rubrum succum fundat, Sanguinem Draconis appellat. Sed fortasse hoc interpretis lapsu factum est. Siquidem succum rubrum fundere Achilleam non tradidit Dioscorides neque etiam [ut omnes comperit habent] Iacryma, quam officinè Sanguinem Draconis appellant, herbæ succus est, sed Arabicæ cuiusdam magnæ arboris gummi, vel, ut aliqui volunt, Draconis animalis est sanguis ab elephante colligi. Plantæ Græcis Ἀχιλλεύς, Lat. pariter & Ital. Achillea vocatur: Arabib. Sichteris, & Egilos: eius vero succus Demalochorten. Hactenus Matth.

Si in Thessalia Chironem illum laudatissimum Medicum, nec non & Achillem militem fortissimum videre contigisset Trago, non dubito quin ex illis veræ Stratiotis, & Achilleæ nomina & vires ad se reperiisset. Quod quia denegatum illi fuit, inconsideratè sanè dixit, Nobis Millefolium [sic enim Achilleam millefolium odoratam appellat] esse verum *ῥιζοειδὲς*, seu *ῥιζοειδὲς* h. e. Millefolium, cuius in bellis olim sanandis vulneribus magnus fuerit usus, quod, quæ Dioscoridis *ῥιζοειδὲς*, & *ῥιζοειδὲς* h. e. Herba militaris, Millefolium, & Supercilium Veneris dicatur: & Plinius Panacem Heracleon, & Sideritum & Millefolium vocet: & Apuleius Melophyllon Chrysiten, Ambrosiam, Acorum siluaticum, Vigintianam, Bellicocandium, & Diodelam à quibusdam appellatam tradat. Esse quæ Arabicè Reicainmoilo dictam contendat. Si Achillem, inquam, Trago videre contigisset non tot nomina, & facultates diuersarum plantarum misculisset.

Achilleam esse reuera Millefolio terrestri eognatam plantam contendit Cord. in Dioscoridem. Dodonæus gall. hanc Tanacetum minus, *Athanasie blanche*, iudicabit.

Quo citius, inquit L. belius in Aduers. quiuis nosse queat, vel ab intuitu solo (quàm in recentiorum vel intempestiuas, vel salebrosas, vel confusissimas pediculis impingat) quid differ Achillea hæc Sideritis à Militari? rectius quàm à Plinio Millefolium [vocata, sic discernat: Achillea hæc multò procerioribus est scapijs, numerosioribus, pedem & cub tum altis, & foliis tenuioribus, magisque ac profundius incis, Artemisiæ tenuifoliæ similitudine, muscaria congesta gerentibus, pusillis flosculis, densè numerosis, & quam Militaris maioribus, albidis, odorem medicatum spirantibus, Artemisiæ vel Matricariæ, cui etiam similis est, in ætatem duratura: radice fibrosa, lignosa: tota odore & sapore Matricariæ, sed minùs amaro. Prædicta inibi habetur sub titulo hoc, Sideritis Achillea, lutea, odorata, Alba purpurea eadem. In Obsp. 430. Sideritis Achillea Dioscoridis, Stratiotis Millefolia Dodonæi editione vernacula. Videat lectores an Dodonæus [ut Lob. vult, hanc intellexerit, meo iudicio intelligit aliam, nempe Millefolium luteum. In Icon. Pl. p. 750. Tanacetum minus candidis floribus.]

Tabern. Icon. Achillea, Millefolium nobile, Tom. III.

Edelgarb/weißes Reysfahrm. In Hist. Achillea. de qua ait. Non parum aberrant qui existimant Millefolium vulgare, veram esse Achilleam. Nec refert quod binæ hæc plantæ aliquam similitudinem in viribus habeant: ad euitandos plures & grauioribus errores, præstat vniciue herbæ proprium suum nomen, quo à Veteribus appellatæ fuerunt, adscribere. Vocatur hæc Græcè Ἀχιλλεύς, & Ἀχιλλεύς Σιδριτὴ & Μυριόφυλλον; latinè Achilleia, Achillea, & Achillea Sideritis, Myriomorphum, Militaris; à Botan. Millefolium nobile; Arab. Egilos; Ital. Achillea; Africè Alterchilloch; Flammandis Veldgerwe/Germ. Edelgarb/feldgarb / & weißes Reysfahrm.

C. Bauh. phyt. Tanacetum 5, siue minus: Candidis, purpureis, & aurum æmulantibus floribus dicit Matthiolus, cui Achillea, nec malè. An hæc sit Scopa regia Plinii lib. 21. cap. 6. frustra querit Frater.

An Cæsalp. Achillea, quam quosdam Fusum agrestem, sanguineum Succum, & Abrotanum siluestre vocare scribit? Se autem Sanguineum succum in ea plantæ quæ pro Achillea ostenditur nunquam animaduertisse tradit.

H. Lugd. p. 772. Achillea Sideritis Matthioli, Item p. 956. Tanacetum minus candidis floribus Lobelii. Præter plantæ binæ descriptiones & figure diuersis titulo & loco.

Camer. in Epit. Matth. Achillea. In Hist. german. Millefolium maius, Stratiotes millefolia.

Achillea Montbelgardi in orto E. C. fata fecit. *H. Lugdun. not.*

liciter prouenit: eam ego reperi inter Basileam & Hagene; & florentem prope prædium D. Plateri mense Augusto & verius Otmarum mense Septembri: Genevæ toto anno virentem in orto habui ubi primò anno caulem protulit, floruit Iunio & Iulio, semen maturuit Augusto: in Gallia Narbonensi inter Nemausum & Valentiam reperi fecus vias florentem Iunio, paruum, foliis hirsutis & albidis; copiosam etiam reperi Patavii supra muros internos vrbs, & in montibus Euganeis inter Arqua & montem Gemule. Vidi etiam Lutetia. Frater C. Bauh. attulit mihi nomine Camphoratæ Bononiensium. Solum in aruo edito amat pingue & lætum, cuiusmodi in Italia Romano & Tusco agro, & non procul Rioli, Pedemontis: Et passim etiam Gallia Lugdunensis ac Allobrogum.

Coma huius trita, ut tradit Dioscorides, cruenta vulnera glutinat, & inflammationem arceat, sanguinis eruptiones inhibet, & eas quæ ex vtero fluunt apposita in pello. Sed & decoctum ipsius paratur ad infestus mulieribus fluxione laborantibus. Bibitur ad dysenteriam. Quidam, inquit Galenus, vocant Achilleon Sideritum, quæ propositæ quidem viribus non est dissimilibus, cæterum adstrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias & muliebres profluuium congruit. Cæterum viribus est Sideritidis non dissimilibus.

PARTHENIVM *Συμπεριφυλον.*
CAP. XXIX.

H Erba hæc est scsquipalmari altitudine, radice parua, lignosa, candida, parum fibrata, ex qua *cauliculi* aliquot exurgunt rotundi, aliquantum rufescentes, in quibus, imò præsertim & terræ vicinà parte, folia sunt tenuia,

fœniculacea, foliis Abrotoni similia, vt ouū ouo magis simile non sit. In summis cauliculis umbellæ, & in iis f. sculi multi, albi, compacti, quales in vulgari Millefolio cernuntur, vt inspicieret primâ frôte facile deludat, Millefol. esse iudicatu-
 ros.



φύλλον, cuius meminerit Hippocrates (licet non desint qui Cotulam fœtidam id esse velint) his verbis. Herba est paruis foliis prædita, cui nomen est Parthenium *συμμεφύλλον*. Hæc verrucas de pudendo tollit. Quanquam id non asserit Myconus, sed doctis æstimandum relinquit. Quis enim sit eius vsus, & quo nomine ab incolis nuncupetur, nondum scire potuit.

Huius figura extat apud H. Lugd. pag. 954. hac inscriptione: Parthenium *συμμεφύλλον* Myconi, testaturque hoc ex Hispania primò delatum.

C. Bauh. Phyt. dicitur Matricaria 6. lue foliis Abrotoni maris.

AGERATVM VETERIBVS.

CAP. XXX.

Descriptio

Ageratum ita describente Dioscoride, frutescens, humilis, palmi altitudine [*πεννός, σιδαμώδης*] simplex, Organo maximè similis, umbellam gerens, in qua flos aureis quasi bullis emicat, Helichryso minor (*ἐλαττον ἐλαχρόν*, his vet. caret) Agerati nomen illi inditum est, quoniam flos diutissimè in sua coloris specie conseruatur. Vis decocti eius est feruida (*πυρρὴ*): sed Cord. & Ruell. calore fouente: Sarrac. fotibus apta) Et ipsa herba suffusa (Herbæ ipsius vsus nidor, Sarrac.) vrinam ducit, & duritias circa vterum emollit.

Cæterum quamuis Lacuna in vetusto codice legat, pro *σιν ἀμείδης, διαίδαι*, hoc est, duum palmorum altitudine: Et ita quoque legi constet apud Orisbium: & Plinius lib. 27. cap. 4. Ageratum ferulaceum esse scribat, duorum palmorum altitudine. Attamen viderint lectores, quàm rectè vox *διαίδαι*, cum præcedenti voce, *πεννός*, conueniat.

Plinius easdem vires Agerato, quas Dioscorides, tradit.

Galenus verò Ageratum esse scriptit *διὰ τὸν φλοιὸν καὶ τὸν σπόρον*, id est, vim

habere discutiendi, & leuiter inflammationes arcendi (legunt quidam *διὰ τὸν φλοιὸν*, leuiter vrendi, & inflammandi, quod conuenit voci Dioscoridis *πυρρὴ*). Quæ vis contraria videtur ei quam Dioscorides *πυρρὴ* dixit, id est, feruidâ & inflammanem. Quidam legendum censent, vt Sarracenus, *πεννός, πρὸς τὸν φλοιὸν*, ad foras vtilem. Et hæc varietas alicui ambiguitatem parere posset, an Dioscorides & Galenus de eadem planta loquuti fuerint, præsertim cum etiam hodie dubitetur, imò controuertatur, quæ omnino illa existat. Consideratione tamen dignum hoc, an legi possit *πυρρὴ*, calore fouente, quâ lectione fortè tolleretur omnis difficultas.

Agerati nomine, quod sciam, donatæ sunt sequentes plantæ. Herba Iulia à plerisque existimatur Ageratum, de quo Veteres verba fecerint. Non rari etiam inueniuntur, qui pro Agerato Veterum, aliud Agerati genus tradant, minus ac etiam album. Ageratum purpureum Dalechampii, genuinum esse non credimus, sed alterius generis plantam statuimus. Manifesto in errore versantur, qui Stœchadem citrinam Germanicâ, volunt verum Ageratum. Nec minùs à vero aberrant ii, qui per Stœchadem citrinam angustifoliam Ageratum verum intelligi volunt. Occurrit apud Hist. Lugdunensem planta quædam Stœchadi citrinæ affinis, quæ ab ipsa Ageratum aliud quorundam p. 778. cognominatur. Ageratum ferulaceum Dalechampii à superioribus diuersum esse, cognoscet is facile, qui descriptiones contulerit. Ageratum, auctore Trago, sunt nonnulli imperiti, qui Thymbriam vocent. A Marcellò Virgilio, eodem Trago teste, Agerati nomen Saturie tribuitur. Marinelli Ageratum, in mesuem de purgantibus, quod non absque ratione fortè reicitur à Matthiolo, Lectoribus quale sit considerandum proponimus.

AGERATVM PLÆRISQVE, HERBA Iulia quibusdam. CAP. XXXI.



Radice constat lignosa, minimi digiti crassitudine, variè implexa, ex qua complura surgunt virgultæ, cubitalia & altiora, tenuia, colore aliàs subrubente, aliàs ex viridi pallescente, in ramos diuisa: foliis numerosissimis ab imo ad summum stipata, Costi hortensis, vt odore, ita & formâ simili-

bus, sed duplè aut triplè minoribus, profusè seratis: in summis ramulis *orymbi* emicant Millefolii, sed colore luteo. Semen succedit exiguum, oblongum, & paleaceum.

Præsentem plantam Tragus Eupatorii Mefusæ titulo pingit & describit, quod Norimbergâ ad se mis-

Ageratum plerisque

Ageratum minus.

Ageratum purpureum, Stœchadis citrinae generis, sine latifolia, angustifolia, Stœchadis affinis.

Ageratum ferulaceum.

Thymbria.

Saturia, Ageratum, Marinelli.

Descriptio

sed maior Centaurea vulgari, minor tamen Amarantho luteo tenuissimis crenis & serraturis incisio, flore in cacumine capitulato, sublateo, & Amarantho per omnia consimili, odore Absinthium, gustu verò Santonicum representans. Et licet Eupatorii Mefue nomen huic plantæ indat, is tamen Amaranthi genus esse iudicat, nimirum id, quod *ἐλκυσθω* vocavit Dioscorides, aut certe Santonici genus. Vides quàm tenerè & absque ratione Tragus de plantis iudicet.

Nascitur Ageratum passim in vniuersa Hetruria, inquit Matthiolus: foliis Origano proximis: floribus aureis: in umbella emicantibus Helichrysi modo, hoc Mefues Eupatorium existimat, & appellatur *Herba Giulia*. Is autem in prioribus commentariis figuram malam exhibet, quam in posterioribus abiecit, ac primo loco satis bonam substituit: quam autem secundo loco pinxit, eandem cum prima puto, sed paulò infelicius pictam: qualis autem sit tertio loco depicta nullam describit.

Tragus ante Matthiolum pro Eupatorio Mefue descripsit, ac multò meliorem figuram exhibuit, quàm Matthiolus [meliozem etiam, quàm ea, quæ à nobis proponitur ex nostris empticis] licet dicat Gesnerus: Huius qualemcumque ex Tragi libris iconem adiunximus; acuratiorem dedit Matthiolus: iudicare poterunt, qui plantam præ manibus habebunt: fidem etiam facit mutata figura à Matthiolo in meliùs.

Eupatorium Mefue, vt Amati quoque fert opinio, & Robet. Const. ibi testatur, est Ageratum Dioscoridis. *Ἀγέρων*, inquit Amatus, vocatur lat. Ageratum, Eupatorium Mefue, vulgò *Eupatorio di Mefue* Ital. & *Herba Giulia*, German. *Kunigundfraut* // & *Wasserdoß*. Hæc nomina Germanica sunt falsò addita, ac ad aliam herbam à nobis & aliis referuntur.

Plantam nostram describit Cord. hist. lib. 2. cap. 72. Mentha corymbifera minoris titulo, cui ut ante dictum, Gesn. figuram apposuit ex Trago, quam Matthiolus iconem deteriorems falsò statuit. Herbam autem Iuliam, à Iulio mense, quo florere incipit, denominari ait, ac Costo hortensii, siue Mentæ græcæ vulgò dictæ cognatam esse scribit Gesn. de hortis.

Anguillara non vult certò affirmare an Ageratum sit Herba Giulia, h. e. Eupatorium Mefue, nec ne. Duo autem à Dioscoride silentio præterita id efficiunt, vt dubitet de dicta Herba Giulia: vnum est odor, alterum folia: quandoquidem se ignorare ingenuè fateretur an per hæc verba [*ἐλαφρὴς καὶ λεπτὴ ὁ στέφανος*] sit intelligendum ramos & folia similia esse Origano, aut ramos folium & non folia. Si enim quis vellet comprehendere his verbis folia. Ageratum non potest esse Herba Giulia, cum folia non habeat Origano similia.

Quod Græcis Ageratum dicitur, Italis, auctore Fuchio, Gratia Dei nominatur, ac in Dialacca maiore pro Eupatorio Mefue sumitur. Nobis autem nomen Gratia Dei huc pertinere non videtur. Melius lib. 1. de comp. med. cap. 4. fecerat Fuchius, omittendo Ageratum vocari Gratiam Dei.

Lonic. Eupatorium Mefue & Ageratum inscribit, Herbamque S. Kunigundis cognominat german. *Odermenig*.

Castor Durant. p. 177. pro Agerato, quod & Eupatorium Mefue & Herbam Iuliam vocat, iconem habet alicuius Millefolii.

Lobelio in Ada. dicitur *ἀγέρων*, Ageratum, vel non Senescens, Mefue Eupatorium officinis, It. *Herba Giulia*. Hanc verò ait esse Ageratum Dioscoridis, eamque tueretur opinionem. Obs. p. 259. Ageratum Septentrionalium, Costus minor hortensis Gesn. & Dod. Mentha corymbifera minor Cordi. Icon. Plant. p. 439. Ageratum Septentrionalium & Anglicum. Item Obs. & Ic. Plant. Ageratum floribus candidis.

Dod. gall. Balsamita minor, perit C. q. in Languedoc Herba D. Mariæ: in Italia *Herba Giulia*, quorundam *ἀγέρων*, Ageratum Dioscoridis, aliorum Elichrysum, Eupatorium Mefue aliorum: verum iuxta meam opinionem ad nullam harum pertinet. Hæc ille qui depingit & describit, etiam de flor. & Hist. lat. in foliam dicto titulo.

H. Lugd. p. 777. Ageratum Matthioli. p. 778. Ageratum tertium Matthioli. Historia præter bonam ponit ineptam iconem Matthioli, quam olim habebat.

C. Bauh. phyt. Ageratum i. siue foliis serratis, floribus communiter luteis, nonnunquam & candidis: quare duæ apud Lobelium figuræ.

Tabern. Icon. Ageratum, Eupatorium Mefuei. Hist. Ageratum i. Eupatorium verum Mefuei, *ἀγέρων* Dioscoridis & Galeni, Arab. *Giser*, Ital. *Herba Giulia*, *Gulia*, *Gula herba*, *Agerato*, & *Eupatorio di Mefue*, Angl. *Madelin* & *Maudes* luy Belg. *Eleve Balsancruyt*, *Lonningunne Fruyt* & *lewerbalsam* Germ. *Heiner Costenbalsam* & *leberbalsam*. Item: Ageratum 2. candidum, Herba Iulia alba, Ageratum album & Menta costina alba, Germ. *weisser leberbalsam*, & *Heiner weisser Costenbalsam*.

Camer. hort. Ageratum *Hein welsch framen mung*: Hist. germ. *Marth. Ageratum* Græcorum, Eupatorium Mefue: in Epic. Ageratum Eupatorium Mefue, *Hein welsch leber fraut*. Item Hist. & Epic. Ageratum minus, *Hein welsch leber fraut*: de hoc ait. Varietasprehenditur in Agerato. Nam quod spontè nascitur in Hetruria, multò minus est, nec adolefcit tantopere, vt hortense nostrum, quod & surgit altius, & folia habet magis crenata, vt Crista Galli. Obseruatur etiam quedam Agerati species, quæ candidas proflus umbellas gerit, sed rarior est cæteris.

Harc. in Enchir. Aliud Eupatorii genus, folio angusto, tenuibus crenis incisio, flore luteo ostenditur: nam est & Eupatorium Mefue, Italis Herba Iulia dicta, siue Gratiola foliis minoris Centaurii, flore aureo, quæ nonnullis Ageratum Dioscoridis dicitur. Considerent lectores Harchium scribentem de herbis sibi tantum nominetenus cognitis, bis eandem plantam describentem, & præterea Ageratum multis dictum cum Gratiola confundentem.

Apollinem & Celsalpinum quod attinet, illi eorum opinionem oppugnant, qui Herbam Iuliam Mefues Eupatorium esse censent.

Nascitur in montibus: scribitur & à quibusdam in hortis, odoris causa, vt apud Belgas, apud quos floret Iulio & Augusto: in Germania nupquam sua sponte nata, quod sciat Gesnerus, inuenitur: facillè crescit, & fert Hyemem: anno secundo [ni fallitur] caulem & flores fundit. Visitur passim in vniuersa Hetruria. Montebardi in Horto Ill. E. C. semine deciduo se propagauit, ac nonnunquam Hieme valde asperâ pergit. Olim vidi Tiguri in horto D. Gesneri; copiosè proueniens circa Monspelium ac florens adhuc mense Octobri; Patavii in horto publico

B. Hispania minor Denas.

Hist. Lugd. not.

Harc. not.

Locus & tempus.

& D. Cortusi : Ferraria in horto Cenobii S. Dominici à l'Angeli : Sturgardiz in hortis Ducis, unde femina attuli : Genevæ florens adhuc Noembri in hortis, & Ianuario pulchrè virens : Basileæ florens in horto Plateri Iunio, & in horto patris mei Io. Bauhini Medici pie recordationis, Basileæ celebris.

Vires

Vires & vsum Agerati ex Veterib. antè tradidimus : eam autem calidam & siccam esse secundo gradu, id ostendente odore & sapore amaro, tradit Dodonæus : ac eandem vires habere, quas Mentha Græca, siue Mentha corymbifera, de qua paulò pòst.

AGERATVM PURPVREVM DALECH.



lis plurimis per saxi crepidines pendulis, saxumq; auleorum instar ornantibus & contegentibus : flore Violæ, purpureo, copiosissimo, suavisimè o-lente, vt vel eà solà dote mirum in modum placeat, tantà scilicet odoris gratiâ Violis non pò-ponenda : semine minuto, in oblongis vasculis.

Germani quidam Moschatellam cœruleam vocant : C. Bathin. Phyt. Ageratum 3. siue ferrarum Alpinum : Gesnerus, cùm apud illum ef-fem, Moschatellinam Alpinam.

Copiosè obseruauì in montibus Saleuæ & Thuri Genevæ vicinis : in mea peregrinatione Rhætica prope Mæsen Helueticorum, florens Iulio, visu & odoratu gratum. Dalechampia authore in nudis ferè cautibus gignitur, vbi putris saxi pulvisculus subest, vel riuiulus aliquis illabitur, aut scaturientis aquæ guttis, vel aspergine rupes madescit : cauliculis vt dictum per saxi crepidi-nes pendulis, saxumque auleorum instar ornantibus & contegentibus.

Moschatel-
la cœrulea
Ager. fer-
rarum Al-
pin.
Moschatel-
lina Alpi-
na.

HERBA DE LA ROTA.
CAP. XXXII.

FVndit ex radice caules dodrante minores, glabros, per quos folia alternatim posita cer-nuntur, Agerati foliis similia, vnciam longa, angusta, in ambitu serrata, glabra, gustu aromati-co & subamaro, Tanacetii ferè : fastigia coliculorum in umbellas quodammodò abeunt stosculo-rum, Millefolii Alpini minorum, foliis albis a-pices circumstantibus, ex capitulis, quæ squam-æ nigris lineis pictæ, componunt.



Vires

A Valerian-do Dourez accepi plantam iam descriptâ, cui hæc erant annotata : Herba de la rota Alpinorû : lac concretum & sanguinè dissoluit.

De hac loquitur Cortu-sus in epist. ad Matthiolum in limine cõment. post. I-tallicorum, vbi ait. Pulvis os-sium leonis femine curat febres mulie-rum, & leonis

maris, virorum : datur cum stillatitia aqua, vel decoctione illius speciei Eupatorii Mefuci flore albo, planta odorata, quam iam tibi misi & in Pedemontio & alibi dicitur Herba rotta, abundat in Pedemontii valle di Lanzo, & in valle S. Fi-dei Patauinorum.

MENTHA CORYMBIFERA, SIVE
Costus hortensis.
CAP. XXXIII.



Deferi

O Bliguas agit ra-dices, Menthae radicibus pa-res, teretes, à quibus fibræ demittuntur multæ : caules cubitales & sesquicubita-les, striati, hirsuti, ramosi & herbaceo colore pallescen-tes : folia Lepidii, eodem cum caulibus colore, per æ-bitum serrata, rariùs lacinia-ta, odore in-tenso Agerati,

sapore vehementer amaro : summis ramis insi-dent corymbi aurei, Tanacetii.

Cæsalpinus lib. 6. cap. 2. Herbam Sanctæ Ma-riæ vocat, ac legitimum Melilotum putat : quam quosdam tradit appellare Mentham Sarraceni-cam.

Herba
Maria
Casalp.

A pollinaris lib. 2. fol. 114. Costi hortensis figu-ram habet : verum ibi omnes Menthas miscet & confundit : nec eo capite figura ponenda vi-detur.

Apoll.

Faciunt Coste affinem nomine Costum hortè-sem, quem vulgus Coquum (inquit Ruell. lib. 1. cap. 2. & cum eo Gerardus in defin.) alii Mariæ herbam appellant, simplici caule, sesquicubito alto, foliis Betonicæ, nisi quodd castigatiora sunt, tenuiora,

tentiora, ac magis odorata; capitellis fulgore auri flavescentibus. Subscribit eorum iudicio Florentinus agriculturæ author, qui Costum & Balsamum in hortis feri viadracice, Nouembri mense prodit, odoratu perquam suauem: vti Sampiuchum Aprilis & Maio.

Rheginus exerc. quoque Costum hortensem herbam (quam haudquaquam amaram esse ait) magis Piperitum, aut Siliquastrum Plinii & Pseudocostum Ruellii esse scribit.

Costum hanc plantam falso appellari monuerunt Monachi in Mef. his verbis. In partibus Galliarum, & præsertim in monte Pessulanò, pro Costo vtuntur aromatarii, Mentha Romana, quam & Costum falso appellant. Et hi forsitan auctoritate Platearii hoc faciunt, qui capitulo de Mentha dicit. Est & Mentha quæ longiora, acutiora, & latiora habet folia, & hæc Mentha Romana, vel Saracenica dicitur, id est, Costum vulgare. Hæc ille. Sed vt coniectamus, Platearius non dixit illud quasi affirmans ipsam Mentham esse Costum, sed volens declarare Mentham Romanam illam dixit esse, quam vulgares Costum falso appellant, quia in capitulo de Costo nullam fecit de Mentha Romana, quæ vulgo Lasulata dicitur, mentionem.

In Piperitide & Siliquastro iudicando errare Ruellium testatur Cordus in Diosc. lib. 2. cap. 19. Is ait lib. 4. cap. 55. Chrylocome quid sit ignoro: Saracenica Mentha sine dubio est Chrylocome cognata. Idem Hist. 2. cap. 117. describit dicens, Mentha corymbifera maior, quam vulgo Mentham Saracenicam appellant. Ibidem apposita figura Tragi, ac additum: aliqui Costum hortensem, alii Mentham Græcam appellant.

Tragus hanc nomine Alismatis, *framēnfrat* depingit & describit, dicens. Quid in huius plantæ nomenclatura mihi videatur pronunciare non dubito, tametsi in reprehensionem quorundam incidere sententiam meam non ambigam. Habeo itaque præ manibus verum Dioscoridis Alisma, quod ille quoddam Damafonion, alios Alceam, nonnullos Acyron, alios Lyron appellare tradit. Phrysi lingua Arabicâ Cazinbrium nominatur.

Nicolaus Myrepsus Costi herbæ appellatione [Latini codices omnes habent Herba S. Mariz, inquit Fuch. lib. 2. sect. 15. de compos. med.] innuere voluit, quam Dionysius Vitensis lib. 11. de re rust. cap. 28. Costum simpliciter, & alii cum adiectione Costum hortensem nominant. Hanc itaque alii, quod Ruellius quoque significauit, Mariz herbam appellant, hodieque Mentha Saracenica, & Romana vulgo nuncupatur: Drabam Dioscoridis esse verisimile est. Non placet Fuchsum Costum hortensem Drabam Dioscoridis absque ulla probatione statuere.

Herbam S. Mariz (Coldemburgi verba sunt) eam esse, quam Saluiam Romanam & Mentham Græcam, seu Costum hortensem, ac Lasulatum Hetruscis vocant constat, à Mentha Saracenica diuersam. Qua in re falli Fuchsum existimo, Mentham hanc Græcam cum Saracenica confundentem, eandemque facientem, cum diuersæ sint: cum Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit, Itali tamen secus; qui hac in re quoque consulendi atque credendi sunt. Sed cui Coldemburgi cum Germanis tantum Mentham Saracenicam tibi nominari placet, & non item Italici, vt Anguillara, Monachis & Matthiolo: cur quæro, quid ita, quamobrem: Mentha Saracenica (inquit Anguill. epit. 13.) est Costus hor-

Tom. III.

tensis Cassiani Bassi, qui etiam in Græcia nunc Costus dicitur, & in Italia Herba S. Mariz.

Mentha Græca quæ Goritienfibus vulgo vocatur, in Hetruria Saluia Romana dicitur, quod porius foliis Saluiam referat, quam Mentham, ait Matthiolus. Sunt qui Herbam diuæ Mariæ, qui etiam Lasulatum appellant. Valerius Cordus in suo dispensatorio in Vnguento Marciati magno [vbi eam describit] inponendam esse censet. Sed quoniam id nulla comprobatur auctoritate, vel ratione, eius sententiæ non tutum esse arbitror adstipulari: præsertim cum Nicolaus à Fuchsiò latinus factus, nullam huiusce Saracenice Menthe mentionem faciat. Id, quod obiter dicam, facile nobis indicat, Cordi dispensatorium, quam plurimis seate re mendis. Plantam hanc (vt ipse scribit) Germani vocant *Unser frauen mung*, id est, Mentham S. Mariæ. Verum Fuchsius aliam eodem nomine ab hac longe diuersam ostendit. Qui verò horum errauerit, in hoc Germanicæ linguæ peritiores iudices erunt, quamquam si Hetruscis Germanicæ, vel Germanis Hetrusica nomina responderet, Cordo potius (quantum ad vocabulum spectat,) quam Fuchsiò accesserim, quod, vt modò dixi, herbam diuæ Mariæ eam vocent in Hetruria. Hæc ille, qui Menthæ Græcæ titulo eam pingit & describit.

Apollo rad. 2. in fyr. Carioph. ait, Herba paralytis vulgo nostro Sancti Petri, vel S. Ioannis Herba nuncupata, quibusdam Mentha, vel Saluia Romana, non Arabis.

An Siluio de morb. intern. de cur. Epilef. Herba paralytis, quæ Costus, Pipirella, Herba S. Petri, vel Pauli quoque vulgo dicta.

Amatus in Diosc. ait. Pro Costo amaro in officinis caput radicem herbæ, quam Hortulanam Romanam, siue Mentam Romanam aut Saracenicam Sepalsiam vocant: plerique hortulanum Coquum, Herbarium quendam Florentinum imitantes appellant, vt apud Constant. lib. de agricult. legimus, qui Costum & Balsamum in hortis feri viua radice asserit: Castellanis hodie Costum dicitur: Ruellius eam Plinii Siliquastrum, siue Dioscoridis Hydropiper credidit: iudicandum eam Pseudocosti appellationem mereri.

Doden. gall. Balsamitam maiorem [ita namque Costum Hortensem inscribit] magnam habere similitudinem cum Panace Chironio Theophrasti existimat.

Lob. in Adu. p. 136. Hortorum Costus Cassiani Bassi, Menthe folio, aut Lepidii. Hæc quod feruido esset gustu, aut Lepidii, à nonnullis recentiorum Lepidium putatur, quæ Mentha Græca pharmacopæis, & Saracenica quibusdam è libro *ἡπὶ διατακῶν* dicitur, vtriusque non absque plausibili coniecturâ. Vulnerariam cursores Chirurghi, & mulierculæ citissimæ opis experiuntur: eoque *Banme* apud Gallos, id est, Balsamum vocitant. Obs. p. 137. Hortorum Costus. Icon. Plant. p. 322. Costus hortorum.

Et licet herba præsens Menthe Græcæ, vel Romanæ, vel Saracenicæ nomine donata sit, toto tamen genere, auctore Gesnero de hort. à Menthis propriè dictis differt, ideoque ab illis separari cupit. Idem ibidē Costū hortensem recentiorū quorundam, Mentham corymbiferam, *Unser frauen mung*, & *Sam heidnisch mündfraut* vocat. Quatiam tandem appellat, cum ait, Quatiam vernaculâ linguâ [*Unserfraut*] vocari audio herbam mihi incognitam in Saxoniz hortis & Fræcfordiz, quæ dissecta aspergatur ouis fixis pro-

Mentha
Græca
Marb.

Cord. repr.

Fuchf. not.

Herba pa-
ralyis
Herba S.
Petri vel
Ioan.
Non Ara-
bis.
Pipirella:
Costus a-
marus
Hortulanâ
Romanâ.

Balsamita
maior Dod.
Panax
Chironium
Hortorum
Costus Lob.
in Adu.

Lobel. not.

preraporis acrimoniā.

Lonic. Menta Saracenica, *Frauenmünz* / *od Mergenmünz* / *Frauenfraut* / *Pfankuchenfraut*. Tox. in Onom. philosph. p. 378. *Martenmünz* / *Mentha S. Maria*, *Mentha sacerdotalis*.

Camer. hort. *Costus hortensis*, Item *Mentha Saracenica* siue *Græca dicta*.

H. Lugdunensis esse perhibet qui *Costum hortensem* ita enim *Mentham corymbiferam* p. 678. inscribit *Leucadem* Plinii esse velint.

C. Bauhin. Phyt. *Mentha* siue *Græca corymbifera*.

Multi tandem suspicati sunt, teste *Marantha*, veram *Betonicam* esse plantam hanc, quæ quibusdam locis *Menta Romana*, Neapoli *Menta Francesca* vulgò appellari solet: capiti solum ex odoris fragrantia. Sed hi dum odorem quærunt, multas alias notas se amisisse non considerat, ac præsertim, flores & radices, quæ nullo modo descriptioni *Betonicæ* *Dioscoridis* conueniunt.

Mentha corymbifera hortensis est & passim in hortis colitur. Vidi *Montpelii* & *Genevæ* viridem mense Ianuario, Februario & Martio: *Môtblardi* florentem Augusto. Apud *Belgas* æstius mensibus auri coloris umbellas præmit.

Tota *Costi hortensis* planta, auctore *Matthiolo*, exsiccatur, siccatur, aperit, attenuat, roborat, abstergit & pronocat. Auxiliatur vteri affectibus.

Medetur *Hydropicis*, & præsertim *anasarcæ* laborantibus: quia refrigeratum hepar exsiccatur, & vaforum obstructions aperit. Illinitur ex oleo irino lienosis, & ex vino feruifacito vrinam agrè reddentibus. *Lentigines*, *alpos*, & alia cutis vitia abstergit illius noctu succus. Hic epotus alui tinea & lumbricos necat, frigido vtero subuenit: ventriculorum roborat tam haustus, quàm illitus, & vomitiones compescit. Folia adduntur in placentas, quæ à mulieribus vteri affectibus obnoxii eduntur. Sunt qui ea tenui pulcicula illica frugunt patellis in oleo aut butyro, & iis in cibis vtuntur. Tota planta, tum substrata, tum suffitu serpentes fugat, & eorum venenis resistit, quin etiam infarctus expedit, & caput roborat.

Balsamita vtrique, maior scilicet (*Mentha corymbifera*), & minor (*Ageratum*) calida & sicca est, inquit *Dodonæus*, secundo ordine, cum amaritudine & adstringendi haud obscurâ facultate. Auxiliatur foliorum eius, quam *Consetuam* vocant, conditura, diuturnis capitis doloribus matutino tempore sumpta: defluxiones è capite reprimunt ac resiccant: crudos humores ad concoctionem perducit. Prodest item *cachexia* aut *leucophlegmatia* laborantibus præsertim in initio: ac omnibus quibus iecur debile ac refrigeratum est. Semen non secus ac *Santolina* lumbricos & ventris tinea expellit.

MENTHÆ SARRACENICÆ SPECIES flore Anthemidis.

Descriptio

Herba est cubitalis, interdum minor: ramulos è radicibus multos edit, aliqua ex parte per caulis longitudinem, velut stris ornatos, nonnihil lanuginosos, in quibus folia parua, breuia, non admodum lata, viridia, in ambitu serrata, odorata, medio inter *Ageratum* vulgare & *Menthastrum* odore, & tam simili *Mentha Romanæ* vulgò dictæ, vt hæc illi commodè possit succedere: flores in cacumine multi, Anthemidi similes, in medio luteoli, in ambitu candidi, odorati: radices subsunt candicantes.

Hanc *Myconus* *Mentha Romanæ* speciem esse credit, sapore, odore, & simili fermè foliorum figurâ inductus. A *Pyrenæorum montium incolis*, vbi frequens nascitur vocatur *Herba del Moro*, id est, *Herba Saracenica*. *Dalechampsio* apud



H. Lugdunensem p. 1169. videtur hæc *Myconi* *Mentha Saracenica* species eadem cum *Prarmica Fuchsi*, vulgari scilicet folio longo serrato, flore albo, de qua mox agendum. Eiusdem sententiæ est & C. Bauh. *Mentha* (inquit in animaduers. in Hist. Lugd. pag. 33.) *Saracenica* altera species H. Lugdun. p. 672. & eiusdem *Prarmica Fuchsi* p. 1168. vna est planta, vtrique descripta.

Ego tamen in *Prarmica Fuchsi*, lanuginis nihil obseruo, nec odorata folia sunt, nec parua, nec breuia, nec admodum lata, sed longa & angusta, nulla etiam similitudine foliorum comparatur *Prarmica* & *Mentha corymbifera*: *Medici Tholosares* stirpium studiosi, poterunt nos monere an *Herba del Moro* *Pyrenæorum montium* eadem sit cum *Prarmica Fuchsi*, vt volunt *Dalechampsius* & C. Bauhinus.

In *Pyrenæis* montibus locis frigidis maxime provenit, in pratis iuxta fluenta: vix alibi: floret Iulio & Augusto mensibus. Iuribus carniū eam incoquant ad saporis gratiam.

PTARMICA VETERIBVS. CAP. XXXIV.

Ptarmica, ex *Dioscoride*, frutex est paruus, habens surculos paruos (καλαμὸς μικρός, pro quo vet. cod. legit ματὶς, id est, tenues) multos & teretes, Abrotano similes: circa quos folia sunt oblonga, oleaginis proxima, multaque: ac in cacumine capitulum, vt *Anthemidis*, paruū, rotundum, acri odore, sternutamenta ciens, unde etiam nomen accepit. Valent folia cum floribus illita ad delenda sub oculis fugillata: flores autem sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in montosis, saxosisque locis.

Plinius huius non meminit. Galenus, & Paulus Aegineta eadem quæ *Dioscorides* posse eam testari, adiciunt viridem torum fruticem, fugillata & reliquis sanguinis subter cutem effusiones discutere. Esse enim temperamentum ipsius calidum & siccum dum adhuc viridis secundo ordine, siccum verò tertio.

Ex re nomen habet *Ptarmica*: ptarmicon enim Græci sternutamentum vocant, in quo egregiam necesse est habere vim: ex quo tam præsentis salutis augurio & honore dignata eam Græcia est, vt quasi sternutatoria, ab effectu, quem exerit, appellata sit.

Licet autem in nullo quod *Marcellus* sciat herbarum

Descriptio

herbarum censu sub hoc nomine Prarmice sit, hodie tamen multæ plantæ sternutamenta ciunt, Prarmices, id est Sternutatorix, siue Sternutamentaria nomen sibi assumere videntur. Barbarus in Coroll. 395. testatur à quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Sed quam intelligat, me latet.


Sunt qui Luteolam velint Prarmicam Dioscoridis, sed malè, siquidem Oleæ folia suæ Prarmicæ Dioscorides tribuat.

Marthiolus in Diosc. Plantam pro Prarmica pingit, quæ an vera sit figuræ, an herba aliqua malè picta, perpendant alii. In post. comm. flores ei paulo aliter appingit, de qua scribens, multa omittit eorum, quæ antea de ea protulit. An hæc Xeranthemum nostrum aliud vel culum?

Xeranthemum credimus ab Aretio apud Gesn. hort. Prarmicæ Montpelii dictæ veræ titulo tradi. Alypum Monspelienis siue Montis Ceti Lobelio, de quo H. n. g. lib. 34. est Prarmica quorundam. Prarmica vulgaris folio longo serrato albo, de qua mox agemus, Fuchsi & multorum Herbariorum sententia Prarmicæ nomen adepta est. Prarmicæ huius vulgaris est species quadam flore pleno.

Prarmices Plinius & Theophrastus non meminerunt, inquit Dodonæus, quod suspicionem nonnullis adfert, nullam esse Prarmicæ propriè dictam, & eandem cum Struthio hanc esse: Prarmicæ siquidem generalis voce Græcis dicuntur, quæcunque sternutationem excitant: inter quæ & Struthion.

PTARMICA VVGARIS FOLIO LONGO
serrato, flore albo.
CAP. XXXV.



rore splendens, sapore Pyrethri, feruido: summus scapus nonnihil angulosus, & subhirsutus, in furculos aliquot diuiditur, qui umbellatim reserantur Millefolii teretris, candidos, duplo aut triplo maiores, odore non dissimili, sed remissiore.

Descriptam à nobis plantam, Prarnicem Ruellius vocat; Herbarii verò & officinæ in Gallia eodem auctore; quod gustum Pyrethri modo, quamquam mitius, vellicet, siluestre Pyrethrum appellant.

Prarmica hæc quæ sit [apud Veteres] ambigitur. Tom. III.

guum est, nomen tamen ei imposuit Cornarius, & ad græci similitudinem *Wies Fraut* appellauit. Hanc is depictam quidem vidit, sed vitium aut nativam non asperxit, ita ut nihil pronunciaré ausus sit: alioqui si talis fuerit, qualis à Ruellio descripta est, facilè in ipsius sententiam concesserit.

Tragus hanc Tanacetum album, seu acutum, *weisen oder Spitzen Keinsfahn* appellat; eoque errare scribit merito, qui hanc stirpem ad Pyrethrum referunt. Existimat verò illi descriptionem Prarmicæ apud Dioscoridem non ineptè accommodari posse, tamen non desint, qui Tragion secundum Dioscoridis velint. Lubens etiam Millefolii tertium genus faceret, nisi aliis quibus Prarmice esset & Pyrethrum siluestre.

Prarmicen (ita Fuchs. præsentem plantam inscribit) nonnulli pro vero Pyrethro, seducti eius titillante acrimoniâ descripserunt. Germanis secundum Fuchium *wilder Bertram* appellari possit, Gallis *Pyrethre bastard*.

A Matthiolo in priorib. comm. silentio inuoluitur: in post. verò Prarmicæ nomine depingitur. In Hist. germ. cum addit. Camer. Prarmica *wilder Bertram* / *Bon. Persam* vocata: in Epit. Prarmica, siue Sternutamentaria, Græcis *παραμικα*. It. Prarmica, Germ. *Sorant* / vel *weisen Spiziger Keinsfahn*. Vires Camerarius Prarmicæ Veterum adscribit, quas ei adscribendas non putatim.

Docti multi plantam Germ. dictam *wilder bertram* existimant Prarmicam Dioscoridis, quorum diligentia & iudicium laudandum potius quàm improbandum: etsi duo hic desiderem, inquit Turnerus. Nam Germanorum *wilder bertram* non est folio Oleæ, sed multò acutiore, tenuiore; longiorque pro magnitudine sua, circumcirca erecto: adhuc prouenit [quod adhuc obseruari] circa aquas, & pratis humentibus, non autem in rupibus & montibus. Non ausim ergo cum illis pronunciaré veram esse Prarmicam, etsi vixibus parum aut nihil ab ea differat, adeò ut ei rectè possit substitui.

Variis in locis variis appellationibus nominatur à Gesn. hort. ut Prarmicæ; quam quidam sequuti Ruellium Pyrethrum palustre esse putant: Item Pyrethri cognatæ herbæ titulo, & Tarchi aquatici [ubi eos falli dicit, qui Prarmicam putant: quodd. Monspelii Serpentina vocetur.

Dodon. lat. in fol. p. 698. Draconem siluestrem siue Prarmicon vocat. Lobel. in Adu. & Obs. p. 243. & Icon. Plant. p. 455. Prarmica folio Taraconus, vel Sternutamentaria.

H. Lugd. p. 1168. Prarmica Fuchsi, & ita Camer. hort. Prarmica filu. germanica, Thalia. Prarmica vulgaris seu pratensis; Clusio. Prarmica: *Sneefwoort* / Gerardo. Prarmica, & Sternutamentaria Castori: Prarmica, Tanacetum album Tragi. Hort. Lusitano. Draco filu. Prarmica Marth. Prarm. filu. germ. *παραμικα* Diosc. Schvvenckfeldio. Prarmica Rob. Steph. Brunfels. Bæth. Cordo, & Apollini.

C. Bauh. phyt. Dracunculus 2. siue aquaticus serrato folio: Brunfel. in 4. p. 257. Pyrethrum quoad iconem non descriptionem.

Lonic. *wild Bertram* / Prarmice Diosc. vulgò Pyreth. siluestre, Sternutamentaria, Ital. *Oliuel-la*. Miror Lonicerum dicere hanc plantam differre tantum magnitudine à Pyrethro, cum ex ipsiusmet figurâ contrarium appareat: ramosa enim herba, folia non fœniculacea, radiæ

Tanacetum album seu acutum
Trago

Tragium Millefolium

Prarmica Fuchsi
Error multorum

Prarmica Marth.

Camer. non natum

Prarmica Dodoi non est

Pyrethrum palustre

Dracunculus

Lonic. opinio refellitur

repens, & multa alia differentiam facient.

Passim Germaniæ Bohemiæ, Hungariæ, Austriæ & Moraviæ pratis obuia, similiter & Belgicis & Anglicis Clusio auctore. Dodonæo verò in montosis, saxosis & circa margines agrorum, vel pratiorum, locisque umbrosis nascitur: ad hortos verò etiam transfertur, in quibus citò multumque luxuriat. Cum flore Maio, Iunio, ac Iulio mensibus viget. Prouenit in horto Montbelg. Ill. E. C. abundat etiam ad riuulos inter Montbelgardum & Soucheur, aliisque in locis. Videram primò Sturgardiz in horto Ducis Wirtemb. postea in horto Cœlii Secundi Curionis præceptoris mei florentem Iulio: tandem spontè prope Wasserfal ad stagnum florentem Augusto. Reperi aliquando inter Viennam & Lugdunum. In Bohemia, Matthiolo teste, passim in hortis feritur, & montibus, in quibus nascitur, illuc translata.

Vires &
Vilus
Pulsis ster-
nutorum.
Dolor den-
tium


Acetariis
additur.

Aperit Ptarmica, si Matthiolo credimus, discutit, prouocat, attenuat, & incidit. Sicca pulvis naribus inditus sternutamenta mouet. Massa radix dentium dolores mulcet, & pituitam detrahitr. Facultate & viribus, inquit Dodonæus, Draco siluestris hortensis (Dracunculo hortensi) non est inferior: excafcacit & resiccat: gustu acris & feruens. Adduntur verò & Lactucis, aliisque acetariis, huius folia, quorum frigiditatem, veluti Eruca & Draco, corrigunt quoque ac temperant.

DRACUNCVLVS HORTENSIS sive Tarchon.

CAP. XXXVI.

Descriptio



dine grata, Anisum conditum æmulante: corymbi eo ordine per summos ramos quo in Abrotano, apiculis florum vix conspicuis, quos semen excipit acerofum: radix perennis, nouam singulis annis stolonum sobolem emittit.

Draco
Hermol.

Eius gēp-
ratio.

Hermolao Coroll. 400. huius meminit his verbis. Olitores & Dracnem vocatam ferunt, quam mirabili quodam modo nasci prædicant, ex Lini semine incluso Raphanis, aut Scillæ bulbis, atque in terra obruto. Pusilla herba, nigro minuto semine, folio tenui & oblongo, acri & vtramque originem prodente, linguam & folio & radice amburens, & aceti & salis gustu. Pyrethrum

sunt qui à Veteribus appellatum falsò putent hanc inter olera acetaria gratissimam.

Ruellius hæc ad verbum recitat, quâvis Her- Ruell.
molaum non nominet. Quædam tamen ita variat. Dracnem vulgò vocatam inter acetaria olera gratissimam celebrant, quòd nec salern, nec acetum exigit, vtriusque saporem referens, vtriusque parentis dotes retinens. Syponitinus Pyrethrum à Veteribus appellari putat, falsus quædam saporum cognatione. Nam Pyrethrum, siue Daucum caule & folio imitatur: Draco potius foliis Hyssopum, vel Linum. Illud obtendit vmbellam Anethi, citcinatæ rotunditatis: Draco nullam profus offendit.

Cordus hanc lib. 5. cap. 2. Dracnem satium vocat. Amatus verò in Dioscor. lib. 2. enarr. 161. Dracnem herbam, Dracnem, aut Dracontium appellari, ac Dracunculum hortensem in vniuersa Italia competiti, & ex semine Lini in Cepa incluso quoque nasci tradit. Gesnerus contrà negat prouenire ex semine Lini in Cepe lato.

E Lini semine Dracunculum hunc nasci quoque negat Matthiolas. Ab omnibus, inquit, Dracunculis formâ maximè differt hortensis Dracunculus, quo in acetariis vscimus, vtriusque ad intinctus acerrimo gustu, folio oblongo, radicibus humi repentibus, Graminis modo. Sunt qui asserant hanc plantam cultorum mangonio factitiam esse, & non sui natura prouenire: eam siquidem nasci putant Lini semine excavatis Cepis imposito, ac deinde terrâ recondito. Sed hos falli crediderim, quòd factio periculo operam quidam perdidierint. Huius nec Græci, nec etiam Mauritanii, quod sciam, meminere. Hæc ille, qui in suis comm. Dragoncelli nomine figuram dedit: In Hist. Germ. cum addit. Camerarii hoc titulo, Dracuncellus, Dragoncellus, siue Dracunculus esculentus: In Epit. hoc, Dracunculus hortensis, Italici Dragoncello & Dragoncel. Gallis Targem, Germ. Dragun / oder Dragoncel.

Dracnem hortensem Dalechampius in Hist. Lugd. [quæ Matthioli verba recitat, licet paulò aliter ea narret] Chrysocomen esse. Dioscoridis prodidit. Quam opinionem vel ipsa Chrysocomen historia fallam esse ostendit.

Gesnero verò, Matthiolo, & Hist. Lugdunensi, ac Dalechampio (qui vniuersim fabulorum esse aiunt nasci hanc Lini semine Cepa incluso & sic lato) se opponit Lobelius. Non est de nihilo (inquit in Adu.) quòd plerique hostiles hanc ex Lini semine cuiuspiam cepæ, aut tuberosæ radici inserto emergere affirmant: nam tamen nò temerè cuilibet experienti cedit, relique ostendit, & euentus rarior fidem penè abroget, tamen si quis in afflatu maritimo & natalibus, Squilla nò ausse inserat, optato voto non frustrabitur, ut mihi asserbant quidam Lygures & Hetræsi herbarii non pauci. Idem euenire tradunt si in Raphano aut Cepe foraminulo facto adigatur Lini semen: & argumento vtuntur saporis, quem salis & aceti vna mixti quodammodo præfert. Hæc ille, cui Lygures imposuisse & luisse credimus. Vocatur ab ipso in Ada. p. 190. in Obs. p. 243. Draco [ita in Icon. Pl. p. 455.] aut potius Tarchon Symeonis Sethi & Auicenna.

Draco herba, ait Dodonæus, existimatur Auicennæ Tarchon esse, de quo cap. 886. egerit. Sed quia breuis adeò de hoc Auicenna est, idè certi affirmari nihil potest. Fertur & Dracone herba, quæ & amara, & Glauca olim in vitam restitutus: de quo in Erasmi Chiliadibus. Differentem

rem verò hanc à vulgari Dracone verisimillimum est.

Qui cum Dalechampsio ad legitimæ Chryso-
comae historiam convenire putant vulgare Tar-
gum (Dracunculum hortensem) cuius in ace-
tariis usus, quâ ratione ducti sic sentiant, Clusio
non constat.

Tabern. Icon. & hist. Dracunculus hortulanus.
C. Bauh. phyt. & apud Matth. Dracunculus, siue
hortensis integro folio: Tarchon Simeoni Sethi
de alim. facult. reliquis Græcis & Mauritanis in-
dicta.

In hortis colitur ac sæpius ramulis, quàm se-
mine feritur. Torâ æstare in multum Autumnû
viget: Iulio autem flosculos facit Draco herba
Dodonæi. Lugduni ceu & in Italia copiosissimè
colitur, ut Veronæ in horto S. Dominici à l'An-
geli. Montbelgardi ex horto meo transtuli in
hortum III. E. C. Monspelii & Basileæ provenit
in hortis.

Cum insigni acrimonia planta tota sit prædi-
ta, haud verendum est, quin valenter exalta-
ciat atque siccet, incidat, digerat, aperiat & pro-
nocet. Proderit igitur Tarchoniis, scribente
Matthiolo, quibus ventriculus frigidior: appe-
tentiam excitat, flatus dissipat, membris robur
addit, urinam & menses ciet, obstructions expe-
dit, manum pueritiam ducit & saluam inicit
Pyrethri, & hinc dentium dolores mulcet, & hu-
midum cerebrum purgat. Ex Lobelio, acetariis
Erucae vicem supplet: ad pestis contagia maxi-
mè & primæ laudis eius stillatitia apud Anglos,
fudores cit, & crassam pituitam concoquit. Per-
pensâ huius herbe acrimonia, quâ maximè lin-
guam vellicat, eorum esse medicamentorum,
quæ valentissimè exalfaciunt, faciliè conici
potest. Nec alias huius vires aut usum novimus.

HELICHRYSVS, HELICHRYSO & Heliochrysus & Eleiochry- sus veteribus.

CAP. XXXVII.

A Theophrasto inter herbas, quæ ad ani-
mum & mores faciant, refertur. Quinetiam
qui Elichrysi [*ἐλειοχρύσω*] Theodorus Aureliæ
vertit, inepte Rob. Conf. [flore coronatur, vin-
guento ex auro ignis experto (*μύρον βαλάνιον ἐκ χρυ-
σίου ἀπύρον*)] gloriam atque existimationem bonam
consequitur: Habet autem Eleiochrysus florem
auro similem [auri colore,] folium verò album,
fructum tenue, durumque [*ἐύκλον δὲ λευκόν*]
[pro quo legit Plinius *λεπτόν*, tenue: Diof. *συντόν*,
angustum] [*ἐπὶ τῷ καρπῷ λεπτόν*] [legendum *τὸν καρπὸν*,
ut vult Corn. & Rob. Conf. iuxta Plinium &
Diof. quod non animaduertit Theod.] radicē
in superficie terræ, eandemque gracilem.

Helichryson, inquit Dioscorides, quidam
Chrysanthemum; nonnulli & Amaranton vo-
cant, quo etiam Deorum simulachra coronant:
ramulum habet ex candido virentem (caulicu-
lum candidum, virentem, Cæsalp. virgam albam,
viridem Corn. Hermol. autem non *λευκόν*, i.e. candi-
dum legit, sed *λεπτόν*, i.e. tenue: fortè quia
repugnare videtur color candidus cum virente.)
erectum & durum (solidum) *folia* ex intervallis
angusta, Abrotano similia: comam in orbem cir-
cumactam, aureæ lucis fulgore (*χρυσόπαν*) um-
bellam rotundam, veluti corymbis aridis depē-
Tom. III.

dentibus: radicem gracilem. Nascitur in asperis
& salebrosis.

Plinius, qui Heliochryson inter siluestres re-
censet lib. 21. cap. 11. Theophrastum secutus, in-
quit: Heliochrylos florem habet auro similem;
folium tenue: cauliculum quoque gracilem, sed
durum: hoc coronant se Magi, si & vnguentum
sumantur ex auro, quod apyron vocant, ad
gratiam quoque vitæ gloriam pertinere ar-
bitrantur. Et verni quidem flores hi sunt. Ali-
bi iterum eodem libro cap. 21. mentionem facit
ex Dioscoride inquit: Heliochryson quod alii
Chrysanthemum vocant ramulos habet candi-
dos, folia subalbida, Abrotano similia: ad Solis
repercussum aureæ lucis in orbem veluti corym-
bis dependentibus, qui nunquam marcescunt.
Qua de causa deos coronant illo, quod diligentis-
simè obseruanti Prolomæus rex Ægypti: nasci-
tur in frutetis.

Galenus Amarantum vocat; quia sc. non ma-
turefcit: alia tamen est Amarantus apud Plinium
de qua nos alibi diximus.

Paulus Elichryson vocat, plantamque coro-
nariam esse ait, comam habentem auri colorem.

Helichrysum Plinius & Heliochrysum appel-
lat, habetque utriusque vocis, teste Marcello,
certam ex natura causam. [*ἐλειοχρύσω*] quidem &
ἐλειοχρύσω, quòd locis aquosis & palustribus, quæ
Græcis *ἐλη* dicuntur, proveniat. *ἡλιοχρύσω* verò
quòd ad Solis, qui *ἥλιος* Græcis est, repercussum
aureâ luce flores huius plantæ fulgeant, quam ob
causam Aureliam fortè interpretatus est Gaza.
Refert præterea Dioscorides Amarantum ab
aliquibus Helichrysum etiam dici, non quia (pi-
carus flos sit, qualis est qui propriè Amaranthus
dicitur, de quo suo loco dictum est: sed ab ea-
dem longioris sine detrimento vitæ natura. Sum-
ma enim eius natura in nomine est *ἀπὸ μὴ μαρ-
μεύειν*, à non marcescere.

Vtuntur, inquit Theophrastus, eâ contra mor-
sus venenatorum in vino: vtuntur & ad ambu-
sta, cinerem eius melle excipientes. Sed hæc [ut
superius insinuatum est] commenta hominum
esse planè videtur, qui suas artes magnificare, ce-
lebratæque cuperent. Nos reliquorum naturæ
viresque persequemur. Comam è vino potam
contra serpentium ictus, coxendicumque dolo-
res, urinæ stillicidiæ, ruptaque commodè auxi-
liari tradit Dioscorides: ciete autem menses,
grumos sanguinis in ventre aut vesicæ liquare
cum vino mulso potam, cohibere quoque de-
fluxiones è capite trium obolorum pondere, ie-
iunis datam in vino albo diluto: Inferi etiam
vestibus, ut eas ab erodentium iniuriis tueatur.
Plinius eundem usum medicum partim ex Theo-
phrasto, partim ex Dioscoride descripsit.

Galenus Elichrysum non habet, sed Amaran-
tho tribuit, quod Dioscorides Elichryso. Ama-
ranthum, ait, faculratis est incidentis & exte-
nuantis. Coma igitur eius cum vino pota men-
ses educit. Sed & grumos sanguinis liquare ac
soluere creditur, non solum in ventre, sed &
in vesica, sed tunc potius cum vino b. benda. Et
omnes simpliciter fluxiones pota desiccet, sto-
macho infecta.

Quæ Paulus de viribus tradit, ea de verbo ad
verbum ex Dioscoride sunt transcripta, quæ-
nus antè sub Amarantho eadem ex Galeno di-
xerit.

Pro Helichryso hoc à Veteribus traditro, va-
riè circumferuntur. Multi enim existimant

esse Stœchadem citrinam vulgò Germanicam la-
tisfoliam. Quam C. Bauh. Phyt. Elichryson 5.
sive Orientale vocat: est nobis Stœchas citrina
speciosa. Matthiolus in post. comm. eos erra-
re dicit qui Stœchadem citrinam vulgò dictam,
Helichryon Dioscoridis legitimum æstimant.
Pro hoc verò inibi tradit Stœchadem citrinam
tenuifoliam Narbonensem. Helichrysi nomi-
ne delineat Cæsalpinus Stœchadem citrinam te-
nuifoliam alterâ sive Italicam. Sed & Stœchas
citrina tenuifolia tertia, sive Neapolitana Eli-
chrysi nomen sibi apud C. Bauh. assumpsit. Stœ-
chadi citrinæ ætatis capitulis parvis, vocatur à
C. Bauh. Phyt. Elichrysum 8. sive siluestre angu-
stifolium. Stœchadi citrinæ ætatis capitulis
longis idem C. Bauh. Elichrysum 9. sive silu-
estrem oblongo cognominat. Stœchadi citrinæ quo-
que ætatis capitulis brevioribus appellatur ab e-
odem C. Bauh. Elichrysum 10. sive siluestre flore
oblongo similis. Elichryson 7. eiusdem Bauh.
Gnaphalium ad Stœchadem accedens existima-
mus. Quod Gnaphalium Fuchsi, vel Impiam
Plinii inscripsimus, C. Bauh. Gnaphalium 3. vul-
gare, & Heliochrylon siluestre Tragi nuncupat.
Gnaphalium virgatum nostrum, Tragus Helio-
chrylon siluestrem appellat. Heliochrysum quo-
rundam, sive Abrotoni folio, de quo mox dice-
mus, Helichrysum Veterum à plurimis habetur.
Helichrysum vel Heliochrysum Ruellii, est Cha-
mæmelum inodorum, sive Cotula non foetida,
licet hæc opinio non placeat Gesnero in cat. pl.
Elixeyon Suida, Hedera flos est Rob. Constanti-
no. Apud Camer. hort. Helichrysi nomen at-
tribuitur Tulipæ. Heliochrysum Italicum Mat-
thioli, ni fallor, est Millefolium luteum. Eli-
chrysum Dioscoridis est Ageratum quibdam,
quæ opinio nobis non probatur. Linariâ suam
tertiam Tragus lib. 1. cap. 17. Heliochryson Dio-
scoridis appellat. Vide titulum, Heliochrysum
Tragi, sive Linariâ tertia, de qua paulò post.

An Gna-
phalium ad
Stœchadem
accedens.
Gnaphali-
um Fuchsi
vel Impia
Plinii
Gnaphali-
um virga-
tum.
Helichryso
quorundam
fol. Abroti-
ni.
Chamame-
lum inodi-
rum.
Hedera.
Tulipa
Millefol.
luteum.
Ageratum.

HELIOCHRYSON QVORVNDAM foliò Abrotoni.

Caf. XXXVIII.

Descriptio



gie, corymbos Agerati imitantes, vel disco flori
Chamæmeli, lutei, odore valido & pertinaci, ve-
hementiæque nomine ingrato nonnihil & fasti-

dioso: radix, vt ait Clusius, dura, lignosa, im-
nini digiti nonnunquam crassitie, quæ tamen sin-
gulis annis perit.

De hoc Matthiol. in Dioscor. air. Caule con-
stat recto, æquali, ac lignoso, cubitale longi-
tudinem non excedente: foliis per interualla e-
mergentibus, Abrotoni æmulis: comantibus in
cacumine floribus, aureo colore fulgentibus, &
in orbem vimbellæ modo coherentibus, corym-
baceâ facie, veluti Myrrophylli, vel Agerati, qui
exsiccati aureum colorem diutius retinent. Hæc
ille, cuius descriptio videtur potissimum ex Dio-
scoride desumpta: fides sit penes eos, qui sunt in
Italia, an flos exsiccatum sit ita speciosus, vt me-
reatur referuari ad corollas, vt postea inter vires
ex ipso dicitur. Icon quam Helichrysi nomi-
ne proponit, non placet, licet apud Amatû Rob-
ertus Cöst. Matth. verum pingere Heliochrysum
affirmeret. Robertus videtur plantam, quam
Matthiolus pingit, æquè bene nouisse ac ille.
Meljorem figuram exhibet Camerarius in Hist.
Mathiol. Germ. hoc titulo: Helichrylon Diosco-
ridis: in Epit. hoc, Helichrysum Creticum; Ita-
lis Helichrysi, di Candia. In horto vocat Elychry-
sum & heliochrysum Matthioli secundum alios,
quod Hispanis secundum Clusium scuba hedion-
da, id est, Scopam foetidam appellari scrip-
sit.

Lacuna eandem tum Matthiolo nomine Eli-
chrysi habet iconem, quod ait Græcis Ελίουχρυον
vocari, Cast. Manzanilla bastarda, Catal. Guirnal-
da, Portug. Macela galega.

Dod. de flor. & hist. lat. in fol. Elichryson, quod
Diosc. Ελίουχρυον esse ait, ac nonnullos etiam Chry-
santhemum: alios inter quos Galenum refert,
dichryson propter floris diurnitatem, appellare
ait: Plinium verò & Theophrastum Ελίουχρυον,
quod Gaza Aureliam vertat. Hæc ille qui in H.
Gall. Gnaphalium Fuchsi sive Germanicum olim
Elychrysum Dioscoridis credebatur.

Clusius Dodonæi figuram habet, ac eadem cū
illo tradit, eandemque de Elichryso suo opinio-
nem tenet.

Tabern. in Icon. (apud quem transposita sunt
figuræ) Heliochrysum 1. Item: Heliochrysum 1.
altera. icon. Huius icon est pro Heliochryso 2, vt
videre est in Hist. eius l. 1. p. 456.

Gerard. Elichryson sive Aureus flos, Golden
Moth wort. Item: Coma aurea Golden
tuft. Icones sunt Tabern. qui vnam non bonâ
sumpsit ex Matthiolo, càmque possit pro Eli-
chryso 1. Verum Gerardus præter veritatem pon-
nit pro Coma aurea iconem Lobelii, faciens è
duabus iconibus vnius plantæ duas diuersas
plantas.

Lob. Adn. Ελίουχρυον, vel Ελίουχρυον, sive aure-
us flos (falsò hic legitur Sileris flos) Chrysanthemum.
Et hoc patet ex icon. Plant. pag. 746. vbi
corruptam lectionem ita restituit. Elichrysum,
sive aureus flos, Chrysanthemum. Obs. p. 430.
Ελίουχρυον, Gaza vertit Aureliam: Elichrylon,
Amaranthus Galeni.

H. Lugd. p. 776. Elichrysum Matthioli.

C. Bauh. Phyt. Elichrysum 1. sive foliis Abro-
toni: quod Dioscoridis. Item apud Matthiol.
Helichrysum Matthioli Castori, Helichrysum
Creticum Matthioli in compendio, sed figura
transposita est. Gesn. hort. Heliochrysum versus
Italicus Kreichio.

Heliochrysum quorundam prouenit Mont-
belgardi in horto Ill. E. C. vbi floruit adhuc
Oëtobri mens. Heliochryson Matthioli copio-
se proue-

Helichry-
sum Ma-
thioli.

Matthi-
olus.

Matthi-
olus.

Scopa
fida.

Lacuna

Matthioli.

Dodonæi

constans.

Figura
pud T.
transpi-

Tabern.

Gerardi
preh.

Lob-
tustum.

se provenit in Hetruria pratis in gracili solo, incultisque locis, sicciculis collibus, nec non etiam in fluminum aluicis. Norimbergæ crescit & semine in alterum annum propagatur. In Belgii hortis floret Augusto, aut Septembri mense. Læto solo provenit, & copiosè circa Madritium itinere Complutensi, aliisque Hispaniæ locis, in agris, ubi Septembri & Octobri florentem videbat Clofius. Nicææ ad Tyrrenum mare, Genuæ Lygusticæ, & in Galloprovincia asperis, macilentis conuallibus, & desertis incultis, aurore Lobelo, fructuat.

Cùm tota hæc planta sit amata, faciliè eas facultates obtinebit, quas Elichryso suo Veteres tribuunt, inquit Clusius Hispaniæ autem nullo est in usu, nisi quòd Madrutiano agro mundatorias, scopas ad ædes purgandas ex ea faciunt: & quibusdam aliis locis, illà in fasciculos congettà & colligatà, formaceos, vt Pliniano verbo vtat, parietes (quos Hispani *tapias* vocant) integunt aduersus imbrum iniuriam: Quia exsiccati flores, vt vult Matthioli, aureum colorem diutius retinet. Proinde commodè Hyeme quòd eo tempore flores deficiant, puellæ siccum Helichrysum coronamentis suis inferunt, quemadmodum & Amaranthum purpureum. Neglecto usu ad vires nos recipiamus. Pollet multum, si Lobelo credimus ad podagras & vlcera maligna, humorum impetum illuc reuocem reprimendo, lotium deriuando, & saburram vehementius impellendo: & eadem fermè, quæ Millefolium promittit. Multi Recentiorum plantæ, de qua hæcenus verba fecimus, Helichrysi Veterum vires & facultates adscribunt, cui rei testimonium aut rationem non adiungunt, præter Clusium, qui amaritudinem vadem adducit, quæ nostro iudicio, non sufficit.

HELIOCHRYSON TRAGI, SIVE

Linaria tertia.

CAP. XXXIX.



EX duris fistibus nigris, perennantibus, singulis annis nouæ virgæ siue caules exeunt singulares cubitales: teretes, rigidi, fractu contumaces, crebris foliis Linariæ vulgaris, angustioribus, saturatius virētib, sapore subamaro & nonnihil aromatico præditis, ab imo ad

summum dense stipatis: cuius fastigium in complures abit furculos, non minus foliosos, quibus corymbis insident lutei, circumquaque foliolis viridantibus obuallati, odore nullo commendati.

biles: succedunt semina inter pappos, quæ supernè villosa sunt, nigricantia, longiuscula, qualia ferè, inquit Clusius, Hieraciorum generi, pappi instar, quæ leuissimo vento excussa, eius arbitrio feruntur.

Est hæc Linariæ tertium genus Tragi; tertia Linaria vulgari similis, tertia Linariæ species, magnis illis corymbis, seu multiplicibus, & rotundis floribus, Amaranthum luteum imitantibus ornata, quam secundum descriptionem Dioscoridis Heliochryson appellaret, & ad illud ipsum Dioscoridis caput referret; propter folia acuta planè & stricta, non multo aliter quàm in Abrotono videre est: quòd præterea non in siluis nascatur, sed in campis sub dio versetur, arenosis, humectisque incultis & apricis agrorum limitibus. Sed quæcunque tandem habeat apud Dioscoridem, is sanè nullum apud Germanos illius nomen nunquam cognoscere potuit, quapropter à forma lynfraut, hoc est, Linariam; à floribus gross Rhcinblumen, id est, Amaranthum maiorem nuncupauit.

Lonic. lib. 5. cap. 170. Tragi figuram habet; ac quartam Linariam, das Viret lynfraut facit, Heliochrysonque existimat.

Lob. Obl. p. 223. Linofyris nuperorum, an Tripolii species? nun Linariæ tertium genus Tragi? Item p. 224. Linaria aurea Tragi, Hyssopus umbellifera Dioscoridis Guilandino: proflus eadem Linofyridi, quam in Iconib. Plant. omisit, ac p. 411. Linariam auream Tragi solum exhibuit.

Tabern. Icon. & Hist. Linaria [tertia] aurea, Tab. 101. Gulden leinfraut. Item Linaria aurea minor (Osyris Austriaca Clusii) Hein gulden leinfraut. Quandoquidem à Tabern. inter has nullum discrimen indicatur, præterquam magnitudinis, ego non separeo.

Clusius in Pannon. p. 310. & Hist. post. lib. 3. p. 325. Otyridis Austriacæ titulo hanc proponit, quæ refert Viennenses Otyridem appellare. Sed cum Otyride Dioscoridis conueniat, aliis discutendum relinquit. Tragum Linariam tertiam: nonnullos verò Chrylocomen Dioscoridis & Chrysitin Aristotelis arbitrari idem auctor est.

H. Lugd. p. 152. Linofyris recentiorum Lobelio: Item Linaria aurea Tragi, Heliochrysi genus, proflus genere eadem Linofyridi. Histor. duas habet figuras & descriptiones vnius plantæ, vt Lobelius.

Gerard. Otyris purpureocærulea: Item, Linaria aurea, Golbe flaye. Absurdè ponitur à Gerardo pro Otyride purpureocærulea icon Linariæ aureæ minoris Tabernamontani.

C. Bauh. phyt. Linaria 16. siue folioloso capitulo luteo, maior. Item: Linaria 17. siue folioloso capitulo luteo, minor. Propter solam magnitudinem, vt dictum, non separandas iudico.

Linariam tertiam Tragi Tubingæ vidimus mense Septembri florentem: inter Basileam & Colmarium locis siccis. In horto Ill. E. C. plantata feliciter durat, à pluribus annis, florens Augusto & Septembri: hanc attulimus Sturgardiæ ex horto eiusdem Ill. Comitiss. Linofyrim nuperorum in collibus Narbonensis Galliæ non procul à mari erutam meminit Lobelius, quæ ad balnea Frontignianum itur; Linariam verò auream Tragi in vireto D. Petri Brughelii professoris Louanienfis Ætate latè florentem vidi; nec non apud Petrum Coudenbergium & Iaco-

Linaria 3. Trago.

Linaria 4. Lonic.

Linofyris Lob. Tripolii species.

Otyris Austriacæ Clusii.

H. Lugd. 152.

Gerard. viret.

C. B. 16.

*Humilior,
Maior.*

cobum Plateau. Exit Oxyris Austriaca Clusii non procul Phasianorum horto circiter miliare infra Viennam, editiore quodam & sicciore prato, cum Lini siluestris generibus, sed humilior: secundum verò sepes atque inter frutices, maior & vberior. Inuenitur multis item Pannoniæ locis, etiam interamnibus supra Drauum flumē. Floret Augusto: semen maturum est mense Septembris.

Viret

Vires exploratas non habeo: Tragus tamen Helichrysi ei adscribit. An bene, examinent alii. Est acris gustanti, glutinosa & amaricans, Senæ æmulo sapore, ad Thymelæam accedente.

AGERATVM FERVLACEVM DALECH. CAP. XL.

Descriptio



in pediculos frequentes abit, quibus incompositi flores umbellam mentiuntur, Iacobææ floribus similes, minores, luteis foliolis radiati, staminibus concoloribus medium occupantibus, tandem in pappos facili ceteribus: radix longiuscula, medietate crassitudinis, fibrata: sapor huic non nihil aromaticus.

*Ageratum
ferulaceum
H. Lugd.*

In H. Lugd. ita describitur: Ageratum ferulaceum Dalechampii p. 1184. Fruticat radice nigra, rugosa, contorta, lignosa, dimidii pedis longitudine: folio Ferulæ aut Foeniculi itatim ab radice copioso, per caulem impari exortu disposito: flore aureo, inodoro, Senecioni simili in umbellæ rotunditatem formato, licet ramuli stiloculos sustinentes, & in umbellæ orbem coeuntes diuersis caulibus partibus attollantur: pertinaci in floribus aurei coloris fulgore, & gratia, vnde Agerati, id est, non senescentis nomen, gustu subamaris: odor foliorum, dum teruntur, Artemisiæ leptophyllon vulgarem refert. Est Ageratum secundum & ferulaceum Plinii.

*H. Lugd.
error.*

Ceterum, non absque errore hæc eadem planta ab ignaro Hist. Lugdunensis Compilatore pro diuersa pag. 772. ante repetita fuit, nempe Achillea montana Penæ, eiusque duas icones habet. Lobelius autem & Pena proposita iconem tradunt suam umbellis aureis Millefolii lucentem, caulibus pedibus: oblongo semine: vocant Achilleam montanam Artemisiæ tenuifoliæ facie.

*Locus &
Tempus.*

Quum hanc plantam vñ cum descriptione Gesnero misissem, eam curauit depingendam, & denominauit Chrysanthemum alpinum.

Florentem reperi in cacumine montis Esperon mense Octobri dum Monspeffuli medico studio incumberem. Parum frequens fuit Lobelio nisi cellisioribus Calcaris & Horti Dei montium Narbonensium iugis, vbi Iulio & Augusto floret. In Pinetis gigni traditur apud H. Lugdunensem arido macroque solo, florens Iunio mense.

CHRYSOCOME VETERIBVS.

CAP. XLI.

*X*ΡΥΣΟΚΟΜΗ (οἱ ἡγοῦνται καλῶς, vet.) est frutex (Zauvion, pro quo vulg. exempl. παθῶν ramulus) exiguus, palmi altitudine (dodrantalis, Cæsalp.) habens eamam corymbaceam (ἔχον κύμα κορυμβοειδὴς, pro quo κορυμβοειδὴς legit Dalechamp. corymbis onustam) similem hyssopo: radicem densam (δυσκίαν, non hirsutam vt legit Marcell.) instar veratri (Hellebōri) nigri (μυδαίνω, auth. Adu.) tenuem, gustui non iniucundam, non inius quam Cyperi cum dulcedine subastringentē [non bene hic locus à quibusdam vertitur, Cypero æqualem magnitudine: ad gustum enim refertur æqualitas in codice Aldino, nascitur in opacis & petrosis. Radix calfactoriam adstrictioramque (κατὰ πῦρ, πικρὰ vet. amarā) vim habet, hepaticis & peripneumonicis accommodatam. Sed & eadem decocta in aqua multa ad purgandam vuluam assumitur.

Sunt quibus Chrysocome inter spurias appellationes dicitur Chrysitis, quibus Chrysanthemō, quibus Amarantus, quibus Diespogon: Latinis Iouis Barba, Aphris Dubath, siue Burchumath (Buchromat Marcell.) Sunt ibidem qui Chrysospermōn vocent, quasi aureo semine præditam, alii Dapsit, alii Origanon, alii Ariophthalmōn, quasi vtri oculum, Romani Aureliam.

Chrysocome, inquit Plinius, siue Chrysitis non habet Latinam appellationem: palmi altitudine est: comantibus fulgore auri corymbis: radice nigra ex austero dulci: in petrosis, opacisque nascentis: radix calfacit & adstringit: datur potui ad iocinorum vitia: item pulmonum: vulvæ dolores in aqua multa decocta. Ciet mēstrua, & si cruda detur, hydropicorum aquam.

Mirum fanē, à Lobelio scriptum, de Chrysocomes foliis nihil à Dioscoride proditum fuisse, cum is disertè & apertè tradat, huic plantæ eamam esse κορυμβοειδὴς, corymborum bullis insignē, hyssopo similem.

Ceterum plurimis plantis attribuitur Chrysocomes nomen, & potissimum Stœchadi citrinæ tenuifoliæ Narbonensī & Italicæ. Stœchadi citrinæ Germanicæ. Stœchadi citrinæ Orientali flore maximo & specioso. Stœchadi citrinæ affini capitulis longis. Gnaphalio cuidam Stœchadi citrinæ accedenti. Gnaphalio Virgato. Anthemidi, seu Chamæleo vulgari. Guilandinus absque ratione nostro iudicio volebat Chrysocomen esse Linariam auream Tragi. Cordo authore Mentha Sarracenicā Chrysocomem cognata esse. Pulegium montanum ad Chrysocomem accedere vult Ruellius. Dalechampius ex Dracunculo esculento faciebat Chrysocomem Dioscoridis. Linaria quibusdam Chrysocomem existimata fuit, vt videre est, H. n. g. l. 29. Passerina quoque Chrysocomem dicta fuit, de qua iam dicto libro agemus. Helianthemum quibusdam dici Chrysocomem retulimus l. 13. Quosdam ineptè existimasse Anacampterotem esse Chrysoco-

*Disco-
rie di-
strac-*

*Appell-
nes ip-*

*Æquiu-
Stach-
tenuif-
Narbo-
C. Ital-
Stach-
Germ-
Stach-
ent.
Gnaph-
Stach-
affine.
Gnaph-
gatum:
Chama-
mel. G-
Linari-
aurea.
Mentha
Sarrac-
Dracun-
esculent-*

Chrysocomen, patet ex lib. 35. De Orobaché tandem dictam fuisse Chrysocomen demonstrabitur lib. 38.

STOECHAS CITRINA GERMANICA
latiore folio.

CAP. XLII.



Stoechas citrina Germanica virgas habet dodrantales, aut etiā cubitales, canā lanugine vestitas, nunc singulares: nunc plures: per quas flia tomentosa incana, latiora, multo quam Stoechadis citrinae Narbonensis, adeo ut quæ terræ proxima ē radice statim pullulant ad vnciam ferē latitudinem accedant: extremis ramulorum immortalis auri fulgore resplendent conglomerati squamulis compactiles corymbi: radix longa lignosa, fibrata: in foliis ficcis decem annis post degustatis sapor nonnihil aro naticus.

Tragus hanc iconem proponit nomine Amaranthi; describit verò pro Heliochryso primo, ac inter nomenclaturas, quòd in regionibus quæ Rheno adiacenti potissimum gignatur, Rheinhblumen appellari tradit; in Walgoia autem, quòd non senescat, nec marcescat, Jungling dici; aliis tandem Morenblumen, hoc est, Tincauriam & duarady nominari, quòd velles à tinearū erosione vindicaret. Multos in ea esse sententia, eā esse Aureliam Theoph. de qua tamē opinione nihil certi concludit. Duo autem huic non malè quadrare capita apud Dioscoridem, est ipsius sententia, nempe Helichrysi & Agerati. Eius autem Iconem ut ficticiam, præsertim quod pilos attinet, reiicimus.

Fuchsius sub Amaranto luteo eadem ferē tradit. Amarantus luteus, inquit, Dioscoridi ἐλὶχρυσις, Galeno Amarantus, officinis & imperitis Stichas citrina, vel, ut ipsi loquuntur, Sticados citrinum, Gallis *Passelours ianne*. Nomen gallicum non conuenit, nec icon Tragi figurā melior, vel attestante Matthiolo, dicente. Helichrysum depinxit Fuchsius, folio Echii aculeato, & floribus Bupththalmi. Qua in pictura ipsum decipit fulpior, quòd ea Helichryso minimè respondere deprehendatur. Sed nec Matthiolo Heliochrysum Fuchsi cognitum fuisse iudico. Apud Amatum Elichrysi primi titulo est quoque icon Fuchsi addita per Rob. Constantinum, quam non probio.

Dod. gall. malam figuram Fuchsi habet sub his nominibus: Ageratum, Aurelia, Stichas citrina. Is Elichrysum Antiquorum statuit. Sed hanc sententiam retractat Hist. de Flor. & lat. in Tom. III.

fol. ubi meliorem imaginem habet, quam Stoechadem citrinam inscribit. Dicit autem: Fuchsius & Tragus [his adde Amat. Lonic. & Io. Agricola] Elichrysum faciunt. Nil autem aut omnino parum, cum eo conuenire palam est, Ageraton esse etiam sunt (Tragus & Gesn. in cat. pl. ut mox parebit) qui sentiant, propterea quòd flos bullarum instar globosus sit, & non facile aut citò marcescat: ἀγνῆς siquidem flos ποικίλος ὡς ἴσθις, id est, bullæ modo tuberosus est, & diutissime in sua coloris specie conseruatur: sed foliorum Agerati, Origani folio simile est: tale autem nequaquam Stoechadis citrinae, quod oblongum & angustum est, vnde etiam non esse Dioscoridis Ageraton, euident est. Hæc ille cui cum Chrysocome Dioscoridis plurimum similitudinis habere videtur. Is, uti antè dictum, proposuit olim iconem Fuchsi, quæ Tragi figuræ similis, quæ ut verum fatear non bene exprimit Stoechadem Rhenanam, siue Germanicam, in qua tomentum per pilos malè voluerunt exprimere pictores. Quam potè in postremis suis operibus proponit Dodonæus, ea Germanicam in latitudine foliorum superiora. n. quodammodo exprimit: an verò Germanica reperitur ramosa, ut pingitur à Dodonæo, nondum mihi compertum: Germanica quod ad folia attinet latiora per caules, multa habet communia cum Cretica: Dodonæo non fuit meo iudicio cognita Narbonensis angustifolia, ac quæ scripit ex relatione aut libris potius, quæ ex autopsia habuit: mirorque, eū in gallica Historia scribere in Belgicis hortis seminari, in latinis nullam ampliùs facere mentionem.

Quidam, ait Turnerus, huius sæculi viri docti, Stoechadem citrinam officinarum, & Germanorum Rheinhblumen / esse Elichryson censent. Verum non habet folia Abrotono aut Hyssopo similia. Quare Stoechas citrina non est Elichryson Dioscoridis.

Gesn. in cat. Ageratum, vulgò stichas citrina. Item, Stoechas, vel Stichas, vulgò Sticados citrinum. Et, ἐλὶχρυσις, vel ἐλὶχρυσις quibusdam, mihi potius Ageratum. Vtrumque falsum: nec enim Helichrysum est, nec Ageratum.

Camer. in Hist. Matth. germ. & Epit. Stoechas citrina.

C Bauh. phyt. Elichryson 6. siue Stoechas citrina latifolia vel Germanica. Non idem cum Stoechade gallica censeri debet: hæc enim triplo, quadruplò latioribus & etiam longioribus est foliis, nec ut illa exerceat.

Stoechas citrina hodie dicta, malè auctore Euricio Cordo, à quibusdam inter Abluthii genera refertur.

Stoechadem Germanicam latiore folio reperi ultra Rhenum, non longè à Ratstat Marchionum Badensium, locis arenosis: curaram plantandā in horto Ill. E. C. Montbelgardi, verò non diu durauit. In regionibus, quæ Rheno adiacent, potissimum verò quæ intra Spiram & Wormatiam sunt, prouenit in locis alpetis, sabulosis, siccis & conuallibus: florens Iunio & Iulio mensibus.

Amaranthi flores, auctore Trago, calidæ sunt naturæ, id quod & sapor & odor arguunt, ideoque commodè possunt vtrunque usurpari. Vinò quidem decocti & poti, lumbricos ventris expellunt, quod Tragus experientiā certum esse didicit. Eodem modo sumpti sudores eliciunt, quare hanc herbam obstructionibus hepatis, li-

Elichrysi non est.

Ageratum non est.

Dod. nescit.

Stoechas citrina Na Turb.

Gesn. error.


Locus & tempus

enis, renum & vesicæ conferre existimat. In lixiuio decocti, si cum illo caput abluatur, furfures capitis & porriginem expellit, pediculôq; enecat. Vestibus appositi à tineis illas tuentur. Aqua decocti, vaporantibus & fomentis indurata ac tumentem matricem emollit.

STOECHAS CITRINA; FLORIS ET MAGNITUDE, & colore speciosa.

CAP. XLIII.

Descriptio



Tomenta penitus oblita & incana, vt & folia quæ crassa, & latiora multò quàm in Narbonensi, vnciam vel duas lata: caulum non ramosorū, cubitaliū, summum fastigium tenet corymbi multi, hilariter micantes, lerei, aurum prouocantes, maiores multò quàm Stoechadis citrinæ Germanicæ

vel Narbonensis, Ciceris penè magnitudine.

Camer. in Hist. Matth. Germ. & eiusdem Epit. huius florem pingit, quem stellâ consignauit, in tabella Stoechadis citrinæ, vocauitque priuatim in Historia, Stoechadem ex Creta missam, comas grandiores habentem, breuiusculam plantam.

Elychryson Orient. An Chrysosme.

C. Bauhin. Phyt. Elychryson, siue Orientale, An *Xyosmæ* Dioscoridis, & Chrysocome siue Chrysis Plinio? Eidem apud Matthioli. Helychryson, Orientale, flore flauo, splendentique, corymbis auri fulgore splendentibus.

Locus.

Basilææ frater C. Bauhin. Stoechadis citrinæ pulchram speciem dedit. Eandem dedit Iacob. Zuyving. missam ex Creta ab Honorio Bello, qui Ageratum in Creta vocari tradit.

STOECHAS CITRINA TENUIFOLIA Narbonensis.

CAP. XLIV.

Descriptio

Fruticosa est planta Stoechas citrina, radice mediocriter crassâ, lignosâ, simplice, perenni, nigra, ex qua lignosi *stolones* pronascuntur, qui in virgulas creberrimas, pedales & cubitales, albidâ lanugine obfusas desinunt, quarum summum cacumen flores corymbaceos, luteos pallentescue, dense glomeratos sustinet, singulos crassiusculos, glomeratos & squammulis imbricatos, sicciissimos, colore aureo fulgentes, non marcescentes per multos annos (si bene exsiccati & loco sicco reuerati fuerint) odore vehementes cum iucunditate: folia per ramos ordine frequentia conscendunt, incana, villosa, magis tamen subtribus, quàm supra, admodum angusta, nec planè culmum dimidiatū lata: versus superiora minùs frequen-



ter disposita: Lobelio auctore in mollicello vellere, pusillum *semen* Maioranz, sed exilius, ruffū, acre, odoratū: radix gracilis, gumi Elemy, vel Cypriacū, totundū Syriacum redolens. vti flores & tota planta: gustu etiam aromatico, medicato, acuto & feruente, non tamen nimio feruore, subastringente.

Hanc, inquit Ruellius, vocant imperiti Sticados citrinū: namque frutex ostenditur furculosus, odoratus, ramulis exilibus, folio Hyslopi, gustu amaro, semine minuto, capitulis luteolis, ex concoloribus flosculis compactis, quare citrinum vocarunt.

De hac Siluius in Pharmacop. lib. 1. Stoechas verò citra vel flaua, Dioscoridis Helychrysum, & Galeni Amaranthus, comâ floris aureâ, densâ, in Gallia Narbonensi & Aquitania, agro Bardagalensi plurima & præstantissima gignitur, odore Abrotoni maris, & etiam sapore, sed minùs amaro.

Hallucinatur (ait Matth. in comm. cum fig.) qui Plantam, quam quidam Stoechas citrinum vocant, legitimum Dioscoridis helichrysum esse censent. Siquidem folia illi tenuia Abrotoni modo non sunt, sed longa, albicantia & hirsuta. Hist. Germ. Rheinblum / Stichas citrinum, Amaranthus citrinus, quem volunt Dioscoridis helichrysum, & Galeni Amaranthum, quam opinionem nunc non oppugno, sed cum Pharmacopæis Stoechas citrinum voco, Germ. Rheinblum / quia abundat circa Rhenum, quibusdam Mottenblumen, quia resistit blattis aliis *Züngling*, quia flores non marcescunt. In hist. Germ. Matthioli, non videtur distingui Stoechas citrina latifolia ab angustifolia: doctus hæreo an bene cognita fuerit Matthioli Stoechas citrina, & quam intellexerit: fortè Matth. Stoechas citrina potius eadem fuerit cum ea, quam Neapolitanam vocamus, siue tertiam tenuifoliam, de qua pōt.

Amat. in Dioscor. lib. 4. enarr. 60. helichrysum vocat: quem in eo oppugnat Rob. Const. dicens Stoechadem citrinam helichryson esse non posse, quòd folia non habeat Abrotoni. Is verò Amato apposuit iconem helichrysi Fuchsi, cui sanè folia nihil habent cōmunis cum Abrotoni.

Lob. Adu. pag. 203. Chrysocome Dioscoridis, Stoechas citrina nostras, siue luteus Amaranthus, Angl. Gold flower / Germanicè Mottenblum / Rheinblum / Belgis Neijnbloemen / Motten cruyt. Obs. pag. 256. Chrysocome, aureæ coma, Amaranthus luteus Fuchsi & Tragi, & perperam helichrysos, Linaria aurea, Tinearia. Hæc ille. Ego Amaranthum luteum Fuchsi & Tragi seiparo, non tantum loci ratione, vt facit Lobelius, à Stoechade hac citrina, sed etiam propter figuram, quâ multam

Stoechas citrinum Helyosme

multum differt: folia huic Stœchadis citrina angustissima, Fuchsianæ Amarantho latissima: sunt & aliæ differentiz. Figura apud Lobelium qualis Dodonæi, non placet in omnibus pro Germanicæ nec etiam pro Narbonensî, cui tenuissima folia, in eius autem iconè lata sunt: hoc etiam Monspelienfibus & Lugdunensibus examinandum relinquimus quod antè in descriptione ex Lobelio dixi de tenuitate radicis & eius odore.

Clus. Hist. p. 367. Chrylocome, vulgo Stœchas citrina, Murcianis Manzanilla, & nomine communi Chamæmelo vocata, sine iconè. Hist. post. Chrylocome i. vulgaris, vulgò Stœchas citrina, appellata, multis provinciis communis.

Camer. hort. Elichrysum Creticum [Matthioli:] Stœchas citrina altera Lobelii odorata. Fratri autem C. Bauh. Elichrysum Creticum Matthioli diuersum est à Stœchade citrina odorata Lobelii, quod ego non negarim.

Tabern. icon. & Hist. Stœchas citrina, siue Chrylocome Mompeliaca, Reimblum Vom Mompelier. Compiler nonnullam proponit distinctam descriptionem: figura præterea non in omnibus conuenit.

C. Bauh. phyt. Elichryson 4. siue Stœchas citrina, angustifolia uel gallica, Stœchas citrina Matth. Chrylocome Lobelio. Apud Matth. Gefn. Dod. Lac. Cast. H. Lugd. Stœchas citrina: Trago Heliochryson, & Tinearia lutea: Amaranthus luteus, Fuchsi. Lacun. Lonicero: Amaranthus citrinus, Turnero: Helichrysum, Cordo in Diosc. & Cæsalpino: Ageratum Dod. gallico: Chrylocome Lob. & Tabernamontano, Coma aurea Icon. Plantini. Icon. postea C. Bauh. apud Matthiolum pro Stœchade citrina non placet: est enim angustioribus foliis: ac miror cum non distinguere hoc loco Stœchadem citrinam angustifoliam, à Tragi, Fuchsi, & aliorum Stœchade citrina germanica latifolia, quamuis ipse in phyt. moneat, Tragi Amaranthum luteum multum differre à Stœchade gallica.

Gerard. Chrylocome siue Amaranthus luteus, Goldbloeser Wothweed. H. Lugd. Stœchas citrina altera.

Copiosè prouenit circa Monspelium, ubi florentem annotauit, Aprili, Maio, nec non Septembri. Eadem ni multum fallor à me obseruata est florens Aprili, in monte Apennino inter Bononiam & Florentiam. Præstantior hæc autore Lobelio, & speciosior Norbonensî Gallo-provinciæ & Hispaniæ aridis & petrosis, ubi odoratissima & plurima Æstate, radice perenni. In Germania ad Rhenum, reliquaque Gallia paucior & inefficacior.

Hoc genus Stœchadis dedit mihi chariss. Frater anno 1595. nomine Heliochrysi Camerarii. Similem plantam virentem vidimus Scutgardia apud honestum Virum D. Seck anno 1608. florentem Iulio.

Locus & Tempus



Camer. in Epit. Matth. Helichrysum vocat; in Hist. germ. Stœchadem citrinam præstantiorem, de qua ait. Idem de Hort. Elichrysum Creticum (Matthioli videlicet) appellat, & Stœchadem citrinam alteram odoratam Lobelii, cuius iconem uirtutiorem se dedisse ait in Matthioli editione. An autem Matthiolum in Epitome per Elichrysum intel-

lexerit, quod proponit Camerarius, iudicent lectores: si id intellexerit magna hoc loco inconstantia & incertitudo Matthioli: Hanc etiam quæ Camerarius pingit, non ausim dicere eandem cū Stœchade odorata Lobelii, siue Narbonensî, quæ describit in Aduersariis. In Narbonensî flores non sunt minores, quàm in Germanica: nec eâ formâ sunt, quâ suam Stœchadem citrinam præstantiorem pingit Camerarius.

C. Bauh. phyt. Helichrysum 2. siue foliis longis copiosis. Dod. fol. lat. p. 263. Stœchadi citrinæ similis, sine iconè: in Epit. secundum edit. Cam. Helichrysum quoad figuram, non etiam descriptionem. Hoc ait se Frater ex Apennino habere. Quod verò ego descripsi, & cuius portionem suâ magnitudine apposui depictam, dono habui & nomine Helichrysi à D. Agerio. qui in Apennino collegit. An verò hæc respondeat Stœchadi citrinæ simili Dodonæi adhuc dubito.

An Cæsalp. lib. 12. cap. 13. Helichryson, quam recentiores Medici Stœchadem citrinam vocant, passim inculcis, arido Solo nascens?

STOECHAS CITRINA TENVIFOLIA tertia, siue Neapolitana.

Helichrysum Creticum (vt videre est apud Matth. lib. 4. cap. 52. in edit. fratris C. Bauh.) planta est exilis, foliis longis, angustis, hirsutis, striatisque: caulibus angulosis, umbella in summitate aurea, diuulsaque: radice tenui ac superuacua. Nascitur in creta.

Ab. H. Lugd. p. 777. appellatur Elichrysum Creticum Matthioli: sine vlla descriptione. Item p. 779. Stœchas citrina Matthioli. Nescio quâ in re differant Elichrysum & Stœchas Matthioli.

C. Bauh. phyt. Elichryson: siue foliis oblongis paucis Stœchadi citrinæ angustioribus: Helichrysum Creticum Matthioli fol. lat. & Helichrysum eidem icon, quoad iconem non descriptionem: hoc in Italia prouenit inter Neapolim & Puteolos, ne quis cum prædicta [videlicet tenuifolia altera, de qua præcedenti capite] ean-

Helichrysum Creticum.

STOECHAS CITRINA TENVIFOLIA altera siue Italica.

Virga ramosa, quarum superiores partes albicant, lignosa, in quibus folia similia foliis Stœchadis citrinæ Narbonensî, quæ tenuiora sunt, inferiora breuiora, vt in illa, alia quædam longiora vncit: in singularum virgarum summitate, umbella parua corymbifera: corymbi parui minores quàm in Narbonensî, longiusculis veluti paruis squammis constantes, qui se explicantes, discum faciunt, in quo st. foliis multis apicibus constantes: color qualis sit me late: exterius in sicca ad straminis colorè accedere videtur.

Tom. III.

V 2

dem censeat, illa enim numerosis angustissimis foliis: hæc paucioribus, longioribus, & illa latioribus est prædita. Apud Matthioli Elichryson 3. foliis Stæchadis citrinæ angustioribus: Elichrysum Creticum Matthioli & Lugdunensis.

Viras &
Vilus

Flores de-
catis
Obstruc-
tiones.
Vermes.
Morbi co-
rebra frigi-
di

Furfures
pediculis.
Vrina sup-
pressio.

Stæchadis citrinæ, si Matthiolo credimus, radix exsiccatur & liccat, aperit & abstergit, ut amarulus indicat sapor: quin etiam nec adstringendi facultate vacat. Decocti flores, aut ex vino macerati, iocinoris obstructions aperiunt: proinde datur vtiliter eorum decoctum, aut dilutū regio morbo, aut malo habitu affectis. Idem potum interaneorum vermes necat. Medetur tota planta omnibus cerebri morbis à frigido prouenientibus, nempe pituitosis fluxionibus, diuturnis doloribus, comitialibus, resolutis, & id genus aliis, siue eius decoctum sumatur in potu, siue herba ipsa in puluerem trita ex rhodomelle bibatur, aut oxymelite: In lixiuio addita non solum præscriptis morbis auxiliatur, ubi eo caput abluatur, sed furfures quoque abstergit: & pediculis necat. Datur cum herba ipsa, tum eius decoctum ad vrinæ suppressiones, siquidem renes expurgat, & vrinam pellit. Adduntur flores in fomentis, quæ ad vteri morbos frigidos, & obstructions parantur. Stæchas citrina, inquit Lobelius, gustu est aromatico, medicato, acuto, & feriente, non nimio seriore subalstringente: cuius doctiorum quorundam imitatione experta est admodum insignis vis, ad iecoris ex glutinosis succis ac vaporibus crassis intra tunicas discursantibus, diuturnos affectus. Pulmonibus verò inflammatis non inuane dari meminisse par est, sed affluxu pituitæ acidæ, serosæ, vel falsæ calefactis aut erolis: eoque tutius vertissent interpretes Dioscoridis, pulmonariis, vel peripneumonicis, quàm inflammationibus pulmonum.

STOECHADI CITRINÆ AFFINIS, CAPITULIS parvis, raris, squammosis, in pappis euanescentibus.
CAP. XLV.

Descriptio



lorum extremis imposita, aut singularia, aut bina, ac etiam terna, semuncia breuiora, squammata: flores coloris fardi & obsoleti non aurei, quorum apices medii in pappos degenerant. huius plantæ idem ferè odor, qui dicitur Stæchadi. Monspelii hæc à me obseruata mense Septembri,

& incipiente Vere in muris: item in colle circa Castelleuff. Suspicebar hanc meam plantam eandem esse cum Lobelii Stæchade citrina altera: Verum dubium mouit mihi Clusius, qui has separare videtur.

H. Lugd. p. 778. dicitur planta nostra, Ageratū aliud quorundam, cui adscribit radicem candidā, tenuem, breuem, capillatā: corymbos aureos. An eadem p. 780. Stæchas citrina altera Penæ?

C. Bauh. Phyc. Elichryson 3. siue siluestre angustifolium, quibuldam Chrylocome Dioscoridis & Plinii. Ageratum (inquit C. Bauh. in Animad. in Hist. Lugd.) aliud quorundam H. Lugdunensis sub Stæchade citrina altera Penæ denuò describitur, sed sine figura.

An Camer. apud Matthioli. in Hist. Germ. l. 4. cap. 58. Stæchadis citrinæ species inodora, ex femine facile proueniens: nam quotannis se eo propagat: quidam Chryfocomen vocant. Pura Camerarium nostram intelligere: sed non placet inodoram & annuum dicitare.

An Cæsalp. lib. 12 cap. 14. Chryfocome in petris tantum nascens, copiosa in montis Pisanis: Fruticulus candicans, tenuis, ramulosus: folioli Helichrysi, rarioribus: in cacuminibus ramulorum singula capitula oblonga, squammosa, sine flore, sed squamis ad Solis repercussum aureis: semine abeunte in lanuginem.

An Tabern. Icon. & Hist. Amaranthus luteus Tab. 2. gel. Rheinblum. Sufpior Compil. Tabern. iconem esse malam ex mutatione Stæchadis citrinæ alterius Lobelii: Compilator nullam proponit descriptionem.

Gerard. Amaranthus Galeni, Galeni Morbo-woort. Mala figura Tabernamontani malè ponitur à Gerardo pro Amarantho Galeni, quem non nouit.

STOECHADI CITRINÆ AFFINIS
capitulis longioribus.
CAP. LXVI.



gultorum ramulorum fastigio insidet modò vnū, modò bina, modò terna capitula, vnciam longa, teretia, squammosa pulchrè scandulata, nonnihil rufescentia, papposum tomentum ipsis longius complexa.

Hanc Lobelius in Aduers. Stæchadem citrinā alteram inodoram (& sic etiam in Icon. Plant. pag. 486. ubi eadem figura) appellat.

Clusius

Chrysosme flor. (vbi p. 327. Chrysocomen alteram inscribit) pag. 326. pro Chrysocomen tertia, siue peregrina secunda hoc modo describit, Pedalibus, interdum etiam cubitalibus, affurgit ramis, candicantibus & lanuginosis, quos Oleæ similia folia, longa, mollia, canā lanugine tecta, per intervalla ambiunt: flores autem extremis ramulis pallentes, squammosi, vt Agerati ferè, insident: radices sunt nigricantes. Hanc alteram Chrysocomen Murciani *Mancanilla* nomine Chamæmelo communi appellabant, Hispalenses *R. mero marino*, h.e. Libanotidem coronariam maritimam, Mauritani vrbis Granatenfis incolæ *Miscain*. Botici referebant huius decoctum mitificè colli doloribus prodesse: qua facultate & præcedentem esse prædixim verisimile est.

Inscribitur ab H. Lugd. p. 779. Stœchas citrina altera, ac p. 780. pro Stœchade citrina altera inodora Penæ describitur. Item p. 1387. pro Gnaphalio marino Dalechampii, vbi queritur num hæc Impia Plinii lib. 24. cap. 19. potius fuerit. In figura Gnaphalii folia nimis angusta mihi videntur, nec etiam capitula omnia singularia, vt ab Hist. pinguntur, sed etiam bina & terna.

C. Bauh. phyt. Elichryson 9. siue siluestre flore oblongo.

An Tabern. Icon. & Histor. Amaranthus luteus 3. Geel Rhein blum. *Supplicor* Compilatore Tabern. malè suā iconem imitatum Stœchadem alteram inodoram Lobelii, cui us non tradit descriptionem.

Gerardo dicitur Helichryson silvestris, wild goldbloes. Malè mala figura Tabernamontani à Gerardo ponitur sub falso titulo.

STOECHADI CITRINÆ ALTERI inodoræ Lobelii affinis, capitulis brevioribus.

CAP. XLVII.



nuatis, nisi corrugatio in sicca id videatur demonstrare: reliqua ramulorum pars palmo minor, foliis nuda, tenuis, in summo cacumine vnicum gestat capitulum dimidio brevius, quam iam dictæ inodoræ Stœchadis, crassius tamen, squamulis nigrioribus, angustioribus, & brevioribus.

Tom. III.

uoribus compactum, pappo breui nec extra prominente plenum.

C. Bauh. phyt. Elichryson 10. siue siluestre, flore oblongo, Elichryso [præcedenti] simile.

Ex Italia allatum: in montibus enim prope Terracinum, teste C. Bauh. prouenit.


STOECHADI CITRINÆ ACCEDENS

Jaloux Paludano.

CAP. XLVIII.

Hoc nomine herbæ cuiusdam summitates & Descriptio flosculorum capitula nobis missa, ad Stœchadis citrinæ, vel potius Gnaphalii recti squamata capitula accedentia, quæ tamen non citrina, sed cineritia sunt, vt Gnaphalii dicti, breuiora tamen, pilisque albis constata. E quibus flosculorum foliola candidissima emicant. His etiam foliola quædam hærent, Serpilli minora, subrotundaque, auersâ parte incanâ lanugine obfusa, oppositâ obscurè virentia. D. Bernh. Paludanus misit cum hac inscriptione: Jaloux incognitum mihi.

GNAPHALIUM MARITIMUM MULTIS.



Radice firmatur crassa, longâ, lignosa, paucis admodum fibris donata, nigra: quæ caules emittit copiosos, dodrantes, crassiusculos, pilosos, candidos, in quibus denso ordine stipata folia, oblonga, semuncialia, per extremum nonnihil rotunda, quæ concepta in floscos xylina læna penitus abeunt, olei in lucernis bibula: ramulorum fastigiis capitula in umbellâ ferè formam digesta, crassiuscula, candida, villola, in medio lutea, in quibus semen longiusculum, album, in arcus formam incuruum: nullam ego in hac planta saporem animaduerto, quamvis de sapore & odore dicat Lobelius. Astringit magnopere & desiccatur tota planta, nonnihil falsa, nec tamen ingrata, aut amara, aliquid aromaticum odore, quadantenus citrinæ Stœchadis vel gummi Elemi.

Plantam à me descriptam, asserui quondam Montepelio reuerfus esse Gnaphalium Dioscoridis, ob descriptionem scilicet, quæ tunc mihi conuenire videbatur. Anno autem 1600. monitus per industriam virum D. Siluestrium Tedeschinum Pharmacopœum in Canna Crætæ, aliam plantam melius hæc cum Dioscoridis Gnaphalio conuenire, libens mutauit sententiam, vt qui simi veritatis studiosus, & qui nolim ambitione &

adversariam cam oppugnare, vbi meliora mihi demon-

Sapor & odor. Gnaphalii Dioscoridis non est.

strantur. Ceterum plantam cum descriptione, & priori assertione (quam hic retracto) inili olim Clariss. & gratiss. D. Præceptorii Gesnero, à quo Camerarius figuram factam mutuo accepit, eamque, ut multas alias, apposuit Matthioli, nusquam facta mei, aut Gesneri mentione.

De hac Lob. in Aduers. ait: Gnaphalium marinum: Cotonaria vulgi. Trid. en dicunt Græci vel lere carperene lanas aut pannum, unde Gnaphalium quod Romani Centunculum nuncuparunt & Tomentariam, ac Plinius Chamæxilon (sic enim emendo, quod omnes etiam recentiores legunt Chamæzelon) apposuit dixit. Figuram exhibet, & in margine Bombacem humilem, Gall. petit Coton nominat. Obs. p. 254. Gnaphalium. Icon. Plant. Gnaphalium marinum, & Cotonaria vulgi, siue Bombax humilis. Non placet Lobelium in Obs. ei vires adscribere, quas suo Gnaphalio Veteres attribuere.

Bombax
humile.

Tomentum

Camer. hort. Gnaphalium marinum, planta tota albicans, exceptis floribus subulreis. In. H. Matth. germ. itemque Epit. Gnaphalium: quod in Hist. ait latine Tomentum appellari. Tab. icon. & Hist. Gnaphalium marinum, See Gnaphalium. Clus. Pannon. p. 496. Gnaphalium legitimum in mediterranei maris littoribus nascens. Item Hist. post. Gnaphalium legitimum Dioscoridis. Hist. Lugd. pag. 115. Gnaphalium Matthioli.

Gnaphal.
marinum.

C. Bauh. Phyt. & apud Matthioli. Gnaphalium i. siue maritimum. In Animad. in H. Lugd. Gnaphalium Matthioli, pag. 115. figura posita absque descriptione. Gnaphalium marinum tomentosum p. 1387. figura cum descriptione.

Gesn. hort. Gnaphalium marinum, vel potius maritimum. Videtur ipsi autem, ut propria manu ad plantam meam adscripsit, Stæbe Galeni.

Marina littora Gnaphalio candicant inquit Bellon. Obs. lib. 1. cap. 18. Nam quod ab Herbariis depingitur (de hoc mox dicemus) adulterinum est.

Locus &
tempus

Gnaphalium marinum voco propter summam totius plantæ albedinem. Monspelii apud mare prouenit. Lugduni habui in horro. Vniuerso littore & sabulosis à Mariani aquis ad Geti moris radices & lacum plurima, alibi haud temerè occurrit Norbonæ. In Adriaticis littoribus non vidit Lobelius. In Adriaticis littoribus non vidit Lobelius. In Adriaticis littoribus non vidit Lobelius. In Adriaticis littoribus non vidit Lobelius.

Sæpius vsus est Lobelius furculis cum elichnisis, qui viuide alunt flammam. Olei quippe, cæterique pinguis liquoris potrix est.

GNAPHALIVM GERMANICVM.

CAP. L.

Gnaphalium hoc palmæ & sesquipedalis altitudinem vix ferè superat, caulibus pluribus donatum, partim rectis, partim in terram repandis, ramosis, cana lanugine oblitis: quæ etiam pubescent folia, Lauendulæ foliis paria, sapore citra mortuum siccante: flores tum in extremis ramulis, tum in ipsis angulis, quæ ramorum diuaticationes deformant, sessiles ex luteo pallescunt, conferti: radix lignosa, alba, fibrosa.

Plantam à nobis descriptam, Herbam Impiam Plinii esse plurimorum consensu statuitur. Et imprimis quidem Matthioli testimonio confirmatur, dicentis. Fuchsius herbam quandam



nemo, quantum equidem legerim, præter ipsum meminere. De qua is differens loco modo citato, eam his notis descripsit. Herba Impia vocatur incana, Roris marini aspectu, thyrsi modo velut, atque capitata. Inde alii ramuli assurgunt, sua capitella gerentes. Ob id Impiam appellauere, quoniam liberi super parentem excellent. Alii potius ita appellatam, quod nulum animal eam attingat, exitimauere. Hactenus de Impia Plinii Matthioli, qui in prioribus com. Gnaphalium Fuchsi nec depingit, nec describit, sed ite dum in post. comm. delineat, sed picturam tantum exprimit, ac Gnaphalium vulgare vocat, ita ut vel hinc appareat, eum id non nouisse.

Camer. apud Matthioli. Germ. dicitur Impia Plinii, vel Centuncularis, Gnaphalium verum quorundam. In Epit. Matthioli. Gnaphalium vulgare, Impia Plinii, Herba tomentalis.

H. Lugd. p. 115. Gnaphalium vulgare Fuchsi. Gnaphalium Fuchsi. Gesn. hort. Gnaphalium, Impia: Impia Plinii, & Gnaphalium quorundam. Cordo in Dioscor. Tomentum siue Centunculus, Gnaphalium. Anguill. epist. 12. Impia Plinii, Caraphilago, quam quidam putant esse Gnaphalium. Eur. Cordo Gnaphalium, latine Centunculus. Albinus etiam dicit. Lob. in Adq. pag. 201. [ubi ad Stæchadem citrinam potius hanc referenda censet,] & Icon. Plant. p. 480. Gnaphalium vulgare, Filago, Centunculus. Obs. pag. 285. Gnaphalium vulgare, Centunculus, Impia Plinii.

Tabern. Icon. & Hist. & C. Bauh. apud Matthioli. & Phyt. (ubi tertium facit) Gnaphalium vulgare.

Dod. gall. lib. 1. c. 60. Filago, Herba à cotton, Pilosella species quibusdam, yagda. Græcorum, Centunculus, Centuncularis & Tomentitia: Herba Impia Plinii. Dod. lat. in fol. Filago, siue Impia. Quam primo loco describit, ac nonnullos Pilosellam quoque appellare ait.

Tragus in Hist. lat. lib. 1. cap. 109. hanc secundo loco pro sylvestri Heliochryso describit & depingit: in Hist. germ. autem primo loco sub nomine Xhurtraut pingit, & pro genere sylvestri Rheinblumen describit, atque a quibusdam Feglin/ seu feldtragen à colore & mollitie dici: ab aliis Xhurtraut (hoc est Dysenterialem, gall. Herbe de la dysenterie) & hunschtraut / à facultatibus quas obtinet, appellari. Is inter vires alteram Amarantii speciem in H. Lat. constituit. Cæsalp.

Descriptio

Synonyma
Herbarum
mineralium

Tomentum
Cordo
Caraphilago

Albinus
Stæch.
Filago

Pilosella
Centunculus
Lar.
Tomentum

Heliochryso
Feglin
Trago

Cæfalp. Herba Impia, de qua Plinius.

An Rucellio Gnaphalium?

Bellon. lib. 1. Ool. cap. 18. forte hanc intelligit cum ait. Gnaphalium depictum apud plantarum Historicorum spurium est.

Brunfelsius quoque Tom. 3. in Obs. ex Scrib. Largo forte de hac ait: *γρᾱφᾱλῶς* Herba, Centunculus, vel Sorba, vel Siliqua Syriaca.

Turn. part. 1. p. 119. Centunculus, Græcè Gnaphalion, Germanicè *Rhurfrant*, Anglicè alibi Cartaphilago, cæsi alia sit vera Cartaphilago ab hac planta diuersissima. In Eboracensi agro dicitur *Endmeed*, vel *Endmurte*. In Northumbria *Chafweede* / quoniam ad intertrigines valet. Idem par. 2. fol. 11. Gnaphalium, Gnaphalium Diofcoridis, lat. Centuncularis, Anglis *donweweede* / vel *Cotsweweede*. Bis de eadem planta agit Turnerus.

Gnaphalium Fuchii siue Germanicum puto me vidisse Monspehi verno tempore, & autumnali; Basilæ etiam ubi frater C. Bauh. duas esse species obseruauit: vnam flore albo, valde tomentosa; alteram flore luteo. Patavi vidi & Genue virentem Octobri. Lugduni frequens est. Montbelgardi abundat in agris. Camerario auctore nascitur in locis sabulosis apricisque aggregibus.

Impia Plinii inter duos lapides trita feruet, præcipuo aduersus anginæ succo, lacte & vino admisto. Mirumque traditur, nunquam ab eo morbo tentari, qui gustauerint. Itaque & suis dari, quæ id medicamentum noluerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui & in anum nidis inferi aliquid ex ea putent, atque ita non strangulari pullos auidius deorantes: hætenus de Impia Plinius. Altera Amaranthi species [Gnaphalium Germanicum] auctore Trago, eadem cum Amarantho Tragi (Stæchade citrina germ.) obtinet facultates, & præsertim pecorum ac armentorum affectionibus, quas Germani die *hinsch* appellant, succurrit. Resiccantem, ac nonnihil adstringentem facultatem Filago Dodonæi habet. Aqua ab hac destillata ad cancerum, præcipue mammillarum, magni est usus: continetur enim occultos cancros ne exulceretur, cum linteolis semel in die imposita. Sunt verò & qui Asari foliis, huius aqua m defactis, non infelicitè ad cancros reprimendos vtantur. Qualitates & vires easdem huic adscribi, quas Gnaphalio veteres tribuerunt, testis est Camerarius. Heba contusa, inquit Lobelius, oleo macerata & cocta, occidit Angliæ plebs, ad liuores, concussiones, cæsa, & verbera vitur feliciter, menses etiam supprimit.

GNAPHALIO VVLGARI SIMILIS. CAP. LI.

Plutimos ex radice breuiusculâ, denso capillitio comatâ profert *cauliculus*, palmares, ramiferos, teretes, villo incano pubescentes, & in his similiter lanuginosa *filia*, nullo ordine posita, vnciam longa aut breuiora, dimidium culmum vix lata, nervo secundum longitudinē decurrente, sapore citra morsum siccante, inter quæ summis ramulis resident *filiculi* perquam pusilli, conferti, staminulis viridi flauescensibus compositi, in *pappo* facientes.

Lob. Icon. Plant. p. 481. Filago minor. Dod. galic. & lat. in fol. Gnaphalii seu Filaginis tertia

species, lanuginosis coliculis, foliis, floribusque in cacumine priori similis [Gnaphalio virgato,] sed humilior ac multò minor: Filago minor: figura eadem cum Lobelii. C. Bauh. phyt. Gnaphalium 4. siue medium.

An Tabern. Icon. & Hist. Gnaphalium medium.

An Cæsalp. lib. 12. cap. 15. Herba Impia alia in montibus tenuior ac ramiflor, tenuioribus corymbis?

Montbelgardi passim mense Iulio & Augusto ^{Locus & tempus} floret. Filago Dodonæi minor cum aliis locis sterilibus, arenosis, subinde circa aridos scrobes, in siluis & in neglectis agris: à Maio in Augustum vsque cum flore viger, atque his mensibus opportunum cum priore colligere.

GNAPHALIVM MINIMUM.

Lobelius in Obs. Belg. p. 566. hoc Gnaphalii sequentibus verbis tradidit. Gnaphalium minimum (ita etiam inscripsit in Icon. Plantar. p. 481.) aller minste *Kuer cruyde*, palmi alrodine, flosculi



Abrotoni maris, foliis albicantibus & tomentosis.

C. Bauhin. phyt. dicitur Gnaphalium 5. siue minus. Nos quale hoc sit, vt veritatem fateamur adhuc ignoramus, quia oculis nostris nunquam inveni sumus. Si Lobelius naturales in quibus collegit, annotasset, cultiores rei herbariæ stu-

diosi melius hanc inuestigare potuissent.

GNAPHALIVM VVLGARE. tenuifolium.

Lignescit radix multis fibris capillata; haud ^{Descriptio} secus ac Gnaphalio Germanico: caules multi, dodrantes, ramosi: *folia* vnciam longa, filii penè tenuitate, incondita, mollia, tomentosa, incana: *filiculi* & capitula per caules disposita, vt in prædicto Gnaphalio; sed pauciora, minoraque.

An Lob. in Aduers. p. 201. varietas germanici [Gnaphalii] maioris & secundum *folia* floridi, de qua ait. Interdum & aliam vidi in Germania Filaginem, etiam foliis & caule Stæchadis citrinæ & inodoram, alibi etiam flosculis non summo, sed inter foliorum intervalia passim secundum longitudinē, ortis. In Belg. p. 567. *Zander Kuerfruyt*, Filago Germanica altera secundum *folia* florida.

An etiâ Pl. icon. p. 481. Filago Germanica altera secundum *folia* florida? An C. Bauh. phyt. Gnaphalium 6. siue secundum *cauliculus* flourens.

Locus &
Tempus.

Gnaphalio Germanico siue Fuchii affinem, dico plantam in segetibus à me Basileæ inuentâ, & mihi à Petro Turnero aliatam, à se Heidelbergæ collectam. Montbelgardii abundat in agris etiam Octobri.

bus Cæalp. credit, quod asserere pro certo nondū queo.

Gnaphalium virgatum in montibus inter Beffordiam & Mafmunster abundat, & in monte Rofsberg. Propè Montbelgardum eundo ad pontem Vauiaucourt. In monte Balon Augusto florens. In Alpium Pannonicarum variis locis, Clusio teste, prouenit. Tertio à Londino miliari opacæ siluæ clius multam alit, cis Tamefium.

GNAPHALIVM RECTVM.

Descriptio



Hvic Gnaphalio caulis, rectus & rigidus, dorâtem altus, teres, canâq; lanugine pubescens, nihilôque seciâs folia, magis tamen auersâ quàm aduersa parte, quæ in caule crebra, ordine nullo, nascuntur, vncias duas aut quatuor circiter longa, vix culmum lata vtpurimum, c

rinata, sapore præter siccitatem nullo euidente, ex quorû alis secundum caulem, ab eius medio, ad summum vsque capitula oblonga, squamata, plura simul iuncta, ex viridi nigricantia, & nitida, in pusilla stamina ex herbaceo flauescencia dehiscunt: radix subest parua, nigra.

A Trago germ. hæc exhibetur sine descriptione sub titulo *Rhurfraut*. A lat. autem hoc nomine non tantum pingitur, sed etiam pro Heliochryso siluestri describitur, vt ego quidem existimo. An verò hanc, vel Gnaphalium Fuchii, quod secundo loco pingit, Polium alterû Dioscorides appellet inter nomenclaturas, difficile est iudicare: videtur enim veramque sub nomine Heliochrysi siluestris describere.

Matth. in post. comm. cum mag. fig. iconem huius apponit sub descriptione Leontopodii falsi.

Leontopodium falsum Matth.
Gnaphalium Anglicum folio longiore.
Lob.

Lob. in Aduers. dicitur Gnaphalium tertium Anglicum folio longiore, perperam Leontopodium alterum Matthiolo: astringit, nonnihil amari cat, multum exsiccatur. Obl. p. 256. Chrysocome germanica, Pseudoleontopodium Matthioli, & Heliochryso silu. Tragi. Icon. Plant. p. 482. Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio longiore. In Hist. Belg. pag. 567. *Engelsch Ruere cruydt*. Dod. gall. Filiginis (*herbe à cotton*) secunda species.

Filago.

Hist. Lugd. p. 1125. Chrysocome lanuginosa Dalechampii, quam quosdam Impiæ à Plinio memoratæ genus esse putare refert, quod doctis herbariis iudicandum relinquit. Item p. 1344. Pseudoleontopodium Matthioli. Eadem planta bis describitur: prior descriptio seruanda.

Clus. Pannon. pag. 494. & Hist. post. Gnaphalii genus pedali aut ampliore caule, floribus à medio ad summum vsque fastigium inter longiuscula, mollia, incanâque folia nascentibus.

C. Bauhin. Phyt. Gnaphalium 7. siue maximum virgatum. Frater Herbam Impiam in monti-

GNAPHALIVM AD STOECHADEM

citrinam accedens.

CAP. LIII.



Radix huius spectatur parum fibrosa, & nonnihil lignosa: folia gnaphalii, quædam tres vncias longa, alia breuiora, culmum, vnum, vel duos lata, tomentosa, incana, mollia: caules villosi, albi, recti, interdum ramulosi, dorâtales & cubitales: quorum fastigius duntaxat flores herent, & capitula ad Stoechadem citrinam accedentia, vel ad Gnaphalium montanum, ex squamis lucentibus constantia.

An Chrysocome altera Clusio? An Lob. Ic. Plant. p. 485. Chrysocome & heliochryso siluestris? An Tabern. Icon. p. 386. Chrysocome, Amaranthus galeni, Stoechas citrina officinarum, Rheinblum / Mattenblum: Hist. lib. 2. pag. 103. Stoechas citrina: Hæc etsi forte non sit nostra planta, malè tamen Tabern. accomm. odar multa nomina figuræ Plantino desumptæ, quæ minime conuenit cum Stoechade citrina officinarum.

Gerard. Chrysocome galeni, Galens Goldia locæ.

C. Bauh. Phyt. Elichryson 7. siue siluestre latifolium capitulis conglobatis.

Montepelii Autumno à me fuit obseruata, ceu & in montibus circa Esperon. Eandem nimulrum fallor Lutetiæ vidi in horro Monachi. Vfonti inter plantas siccas celebris Medici Cafenat pulchram plantam reperi ad quam partim facta mea icon.

GNAPHALIVM VNICO CAVLICVLO.

Vnico affurgit gnaphalium aliud Plateau [3. in Hist. post. Clusii] caudiculo, aliquot ramulis in diuersa se contorquentibus prædito, quos hinc inde sepiunt latiuscula, mollia & incana folia: ad ramulorum internodia nascuntur, inter foliorum congeriem, quina, sena, aut plura capitella simul congesta, ex flauo canescentia, multâ lanugine plena: radix inuicilis, sed deciduo semine, nouæ

Descrip

Tab. m

criptio



in noua plan-
ta singulis an-
nis renascitur
In ficciori-
bus (quantum
memoria Clu-
sio succurrit) a-
gris, præsertim
densis segeti-
bus, occurrat.

Sam iconem à Matthioli figura posuit, quamvis
aduers. Leontopodium referat: in Belgicis ait
tantum siccam sibi visâ & prius à Clusio obseruatâ.

Gnaphalium alpinum [inquit Clus. in Pand.
& hist. post.] videtur ea planta, quam Matthiolus
pro vero Dioscoridis Leontopodio exhibet. Sed
sine dubio Gnaphalii duntaxat genus est.

Tab. Icon. & Hist. Leontopodium 10. siue al-
pinum magnum magno flore: Leontopodium
verum Matthioli, differens à Lobelii radice ma-
iore quasi squammosa, & foliis longioribus. Ea-
dem apud Matthiolum habet. Gesnerus ad her-
bam siccam propria manu scripsit: Gnaphalium
montanum vel petraeum dixeris.

Gnaphalium hoc Alpinum abundat in mon-
tibus circa Geneuam. In horto Ducis Florentie
collegit I.H. Cherlerus. Prouenit, in scopulis Pâ-
noniæ, Sneberg, Dürrenstein, & Eschberg iu-
gum: floretque Iulio & Augusto.

Gnaph.
Alpin. Clus.
Gnaph.
Matthioli.
est. Leonis.
podium.

GNAPHALIUM ALPINUM PVLCHRYM. CAP. LIV.

criptio



Gnaphaliū
Alpinum
caulis est pal-
maribus, do-
drantalibus, al-
tioribus etiam;
tomentosis, quos
flosa vestiunt lō-
ga, angusta; vil-
losa, trium, qua-
tuorue vnciarū
longitudine,
culmo latiora:
summu fasti-
gium flores gerit
etis magnos,
orymbatos,
ppositos ex
taminibus lu-
reis atque splen-
dentibus con-
tates, sessiles,

molli lanugine intertextos, in medio foliorum
xili carptam lanam imitantium radiatorum: folia
propter terram multa, superioribus non multum
abstusilia, statim è radicem satis crassarum, ni-
grarum multis fibris pullis capillatarum capiti-
bus oriuntur.

De hoc Iosias Simler, de Alpib: wälsblumen
flos odoratus, est folio Pilosellæ, circa supremū
caulicalem folia multa, imparia, candicantia,
lanuginosa, medio orbe quinque vel sex flores,
inter quos medius plerumque aridus, & singulis
lutei apices: radix arida, parua, summo cespite
hærens: Tomentis speciem arbitror.

Non dubitat Matthiolus in post. com. in. It. &
Lat. cum magnis fig. quā planta, cuius hīc ima-
ginem damus legitimum sit Dioscoridis leonto-
podium, ideoque Leontopodium verū inscribit.

Lobel in Ad. p. 202. Leontopodium, siue Pes
leoninus dicitur propter villosam foliorū & flo-
rum effigiem crus pedi annexum aliquantūm re-
ferentem. Iā autem herbulam hanc montanam
iam inde à Brunfelsii, Germanorū aliorum Scri-
ptorū temporibus inuentam & descriptam, ait,
quæ non parum, foliis Rotam, seu Rorellam i-
mitetur. Ego autem eam non inuenio apud Brū-
feliū aut alios Germanos: in Obs. p. 255, diuer-

Tom. III.

GNAPHALII ALPINI PVLCHRI aliud genus.



Pingit hoc
Lobelius in
Icon. Plant. p.
484. hac inscrip-
tione. Leonto-
podium siue Pes
leoninus; In
Belg. p. 569. hoc
titulo. Löweni
Dort. Cartero,
Leontopodium
quod in Aduers.
Lobel. refert ad
Matthioli ab
hoc diuersū est,
quod crassam &
quasi ex squam-
mis compactam
habet radicem
ut rectius à Clu-
sio pingitur: cum
illi tenuius sit: ut

recte in Phytopineæ annotat C. Bauhinus.
Tabern. Icon. & Hist. Leontopodium; species
Gnaphalii, Löweni sū.

GNAPHALIO ALPINO AFFINE Leontopodium patuum Lobelii. CAP. LV.



Dioscoridi
& Neote-
ricis præterita
hæc huic [ico-
ni] effigie ha-
bituque toto
conuenit, sin-
gulari dodran-
tali cauliculo &
folio Gnaphalii
montani densā
lanugine inca-
nis: flosculis sū-
mo caule luteo
pallentibus
Gnaphalii mō-
tani, exili li-
gneaque radice.
Et hæc Lob. in
Obs. p. 256. de
suo Leontopo-
X

dio paruo, cuius iconem eodem titulo in Icon. Plant. p. 484. in H. Belg. p. 569. habet, vt & Tabern. in Icon. & Historia, vbi Geria. *Fleimen löwen* suis vocat. C. Bauh. Phyt. dicitur Gnaphalium nunc Alpinum minus.

Gnaphalio Alpino affinem hanc plantam vidit apud fratrem C. Bauhin. inter eius plantas siccas, nomine Leontopodii parui.

GNAPHALIVM VMBELLATVM
minimum.
CAP. LVI.

Descriptio




eorum negligentia, vtinam non impostura) perperam fecit. Sed nec ocellum alperiusculum reddere ad pictoris manum imitatus est. Radix ex meris fibris constat, lignea duritiei, nigris, contritis, ipsa plantula longioribus. An sit hoc idem cum Leontopodio Lobelii Obs. p. 255. quod iconem attinet, asserere nec negare possumus.

In montis Ceri arenosis & maritimis sabuletis Maio florentem collegit I. H. Cherlerus, ea minimam parte, qua lacum traiciendo ad dextram recta versus tenditur.

GNAPHALIVM AMERICANVM.
CAP. LVII.

Locus.
Descriptio



ta, in acutum mucronem desinentia, supina parte

Plantula hec vix vnicale magnitudinem superat. Ea aliis unica & simplex, alias in plures veluti ocellos diuisa, ex foliis constantes candicantibus, hirsutis, inter quae oculus conspicitur minimi digiti vnguem ferè latus, asperiusculus ex flauo virelscens. Soliculos etiam foliola vestiunt, praedictis minoribus, quae sculpro (quae esse solet

virentia, triplicique neruo secundum longitudinem decurrente donata, inferius vero villosa & incana: corymbi summis ramis insident, multi, conferti, tomento obiti, quorum singulares flores ex argenteis retortidis foliis compactiles, papposa in medio filamenta, coloris rufi, aut melini, vel subflauo Clusio, qualis ferè in Gnaphalio vulgari, comprehendunt, quae tandem in pappum aut semine mutata abeunt: radix subest lignosa, exsucca, serpentes de se propagines & fibras promittens, minimi digiti crassitudinem ferè aequat, nigra, ex lateribus nouos singulis annis caules proferens qui primum emergentes nihil nisi tomentum esse videtur: tota Aestate flores producentes.

C. Bauh. Phyt. Gnaphalium Americanum Clusio. Item apud Matth. Gnaphalium latifolium peregrinum in horto Ill. D. Wirt.

Hanc primum vidi Pfortzheimia in cultiss. horto, quem excolebat Hochstetterus anno 1593. cum copioso flore Nouembri. Mihi floruit Iulio & Augusto mensibus. Montbelgardii missa ab eodem Hochstettero.

PILOSELLA MAIOR ET MINOR QVI-
busdam, aliis Gnaphalii genus.
CAP. LVIII.

Pilosella minor.



Pilosella maior.



Huiusmodi circuncirca oppressa ferè terrea folia oblonga, per extremum rotunda, incana lanugine obrita, inferna parte, inter quae surgunt caules palmares, aut dorantales, etiam cubitales, tomentosis, candicantes, foliis vestiti longis, angustis: e quorum cacumine glomerati pendet flores multi, iam maiores foliolis exsuccis, squammulis latoribus & brevioribus contextis, speciosiores, iam minores, è minus pulchris squammulis angustioribus & longiusculis constantes, nunc candidi, nunc magis minusque purpurantes, in medio apicibus multis, quibus succrescunt longi pappi: radices fibrosae

Descriptio

res fibrosæ repant Pilosella vulgaris in modum,
Pilosellam minorem pingit Trag. lib. i. c. 109.
Lagopi titulo, quem *Bäsenpföstin* nominat.
Fuchsius licet Pilosellæ alterum genus faciat
minoremque inscribat, quod tamen *muße* sit
non concedit. Ex descriptione, inquit, Sole cla-
rius sit, eam herbam, quæ à Græcis *Myosotis*, à
Lat. autem *Auricula muris* dicitur, non esse Pilo-
sellam: nam ut reliqua taceam, neque maior
neque minor hæc Pilosella cæruleum flosculum
velut *Anagallis* obtrinet, ut non parum errent
herbarii, qui Pilosellam alio nomine *Muris* au-
riculam appellari tradunt.

Lacuna Pilosellam aliam floribus purpureis
appellat; negarque esse legitimum *Holoistum*
merito.

osell. min.
Dodon.
aphel.
Dod. gall. Pilosella minor, Auricula muris
non tamen vera. Lat. in fol. Pilosella minor,
prior: sunt qui ad Gnaphalii genus referant, &
Gnaphalium montanum appellent, à quo non
admodum differens: refertur etiam ad Leon-
topodium Dioscoridis cuius descriptioni non
omnino responder. Dodonæus Lobelii postero-
res duas icones proponit, non tamen Iconum
Plantinarum priorem.

Lob. in Adv. Gnaphalium montanum, purpu-
pureum & albū. Pilosella minor Fuchsii. In Obs.
p. 255. Gnaphalium montanum Aducr. p. 202. La-
gopus & Pilosella Tragi. In Icon. Plant. p. 482.
Gnaphalium montanum album. Item p. 483.
Gnaphalium montanum purpureum. Et Gna-
phalium montanum suave rubens. Nulla figura
placet: in priore flores non tite exprimuntur: a-
liæ duæ pilos habent nimis magnos.

aphel.
st. rrii
Tab.
Tabern. Icon. & Hist. Gnaphalium monta-
num album, *meiß Engelblum*. Et Gnaphalium
mont. suave rubens, *Ror Engelblum*. Figure
hæ tres Tabernamontani nullum discrimen
demonstrant: nostra ex Fuchsianis eam in me-
thoriam reuocat speciem, quæ flore minore est:
altera autem nostras est eius, quæ speciosiore flo-
re cernitur.

Thal. Pilosella minor Dod. floribus candidis
& purpureis Clus. Pilosella minor. Is non des-
cribit, quamvis flore aut omnino albo, aut pur-
pureo, aut ex albo purpureo, sive carneo ef-
fic scribat.

us &
apus
C. Bauh. phyt. Gnaphalium 3. sive montanum
rotundiore folio: Lagopus 2. Trag. lib. i. cap. 88.
Et Lagopus 3. cap. 109. Item: Gnaphalium
3. sive montanum longiore folio & flore. In
foliis cum fratre non agnosco differentiam: in
floribus potissimum discrimen obseruo.

H. Lugd. p. 116. Gnaphalium montanum Dale-
champii.

Plantaueram in hortulo meo Montbel-
gardi Pilosellam minorem Fuchsii, quam col-
legi prope *S. Germain* cundo. Malmunster:
Circa *Geneuam* in montibus obseruau; Ba-
sileæ in colle iuxta vetus Castellum men-
se Maio. Copiosam vidi in valle *Griesbachiana*
florentem Maii principio, flore maiore & mino-
re; albo & purpureo. Appellati autem Gnapha-
lium montanum multis annis priusquam Ad-
uersarij auctores scripserint. Pilosellæ mi-
noris Clusii mitioribus Hungariæ, Stiriz, Mora-
uiæ & Bohemizque montanis & collibus herbo-
sis duo aut tria genera inneniuntur. Quæ verò
carneo dicitur flore, omnibus caduis & aper-
tis per Germaniam siluis atque arenosis tumulis
ferè est obuia:

Gnaphalium hoc montanum, tamen vsum in
medicina nullum habet, est tamen naturà valde
resiccans & adstringens. Facultas.

BACCHARIS DIOSCORIDIS

Rauuolfio.



Peregrina & hac quoque
planta ad Liba-
nium à Rau-
uolfio obserua-
ta, cubitalis, fo-
liis lanuginosis
donata, verbas-
ci foliis, simili-
bus tamen, &
caulem ut in Ta-
baco, aut Hyos-
ciano Peruia-
no Dod. ample-
xantibus. Sum-
ma occupant
flosculi albidis
purpureo cen-
tes, dense stipa-
ti; ut in Ama-
rantho luteo;
aut Auricula

Locis:

Descriptio

muris Fuchsii. Radicula odorata Ellebori ni-
gris similis. Rauuolfius sanè citra hæc
titubare deprehenditur. Nunc enim (in Iti-
ner. lib. 2. cap. 12. Dioscoridis Baccharim absolute
pronunciat: nunc (parte sc. 4. in Icon. No. 285.)
an Baccharis Dioscoridis sit, quæ à quibusdam
Unser frauen händschuch (nostra *Dama chiro-
thecam* dixeris) nominetur, dubitat. Attamen
planta hæc, quam se obsetuasse in descensu
montis Libani scribit Rauuolfius, quæque plu-
rimùm ad Dioscoridis Baccharin accedere ipsi
visa est, ex notis quas illi tribuit, teste Clusio;
potius ad ea Gnaphalii montani genera referen-
da videtur, quæ à Fuchsio & aliis plerisque Pi-
losellæ minores appellantur.

H. Lugdun.
nos.

In Hist. Lugd. in append. p. 33. Baccharis Diof-
coridis titulo depingitur & depingitur. Hist. licet
ex Rauuolfio suâ desumat, eum tamen non citat:

PILOSELLA PHLOMODIS

exotica.



Hæc pri-
mum
nobis visa a-
pud Cl. Felice
Platerum Ar-
chiatrum Ba-
siliensem. Pe-
dalis autem
est; nec dum
flos ferebat,
sed florum cæ-
tùm præma rû-
dimenta. Folia
ab imo statim
lægis & cras-
sis pediculis
annexa denso
stipatu oriun-
tur, quædam
ouata, quædã
rotundiora,
crassa, carno-

Descriptio

X 2

sa: ipso exortu holoserico vellere donata, reliqua parte tota incana lanugine pubescentia, veluti Dictamnus falsus, aut Stachis, lætissimo aspectu. *Caulem* etiam, qui vnicus est *folia* stipant alternatim harentia, prædictis minora, longis interim crassisque pediculis donata.

Picta erat ex Löbelio antequam nobis innotuerat planta. Quæ Lobelii figura in hoc à Platærianâ nobis iam descripta planta differt, quod ea nec rotundiora exprimat folia, pluribusque caulibus donatam scribat, nempe ternis, quaternis, quadrangulis, geniculatis. Radix durior, eodem teste, lignosa, hbris donata.

Synonyma

Lob. autem Obs. p. 254. & Icon. Plant. pag. 479. suam plantam pingit hoc titulo. Pilosella maxima Syriaca. Tabern. Icon. & Hist. ita inscribit: Pilosella maior Syriaca, Pilosella 4. Groß Syrisch Waußhörlin. C. Bauh. Phyt. vocat Pilosellam 4. siue Syriacam nondum visam.

ABSINTHIA VETERIBVS

CAP. LIX.

Absolutionem Absinthii tractationem tradituris, Veterum de eo placita primò inspicere conueniat.

Passim autem à Theophrasto in historia plantarum his & similibus describitur. Quædam amara plantæ, aut mali odoris, viles tamen: eodem modo & folia & caules, vt Absinthii & Cætaurii, hoc omnes in nostro tractu non pascere quidam dicunt. Quæ autem in Ponto pascunt & fiunt pinguiore & pulchriore, & vt quidam aiunt, non habent fel (vna amaritudine, alteram pellem, inquit Tragus): sed hoc non ad præsens institutum. Cur verò pecora maxime pinguescant hoc pabulo, id euenire videtur, quia effarctus liberet hepatis, vnde facilius distributio alimenti. Est enim insignis hepatica Absinthium, quippe in hydropicis remediis ferè soleans. Absinthium, pergit Theophrastus, mutatur ratione cultus: loca argentia querit.

Bathypicr.

Dioscorides Absinthium Bathypicron cognominat, id est, intensæ amaritudinis, sed tanquam notam herbam non describit: præstantiorem ex ipsa esse tradit, quæ in Ponto & Cappadocia in monte Tauro appellato nascitur. Absinthium inter spuria ab Aegyptiis Somi vocatur, à Romanis Absinthium rusticum.

Genera
Plinio.
Santon.
Ponticum.
Ponticum.
Italico A.
Martius.

Absinthii genera sunt plura, inquit Plinius: Santonicum appellatur à Gallæ ciuitate (regione Diof.) Ponticum à Ponto, vbi pecora pinguescunt illo, & ob id sine felle reperiuntur, neque aliud præstantius multòque (multumque M.) Italico (Italico, Cæsalp. legendum putat) amariùs, sed medulla Pontici dulcis. Est & Absinthium marinum, quod quidam Seriphium vocant probatissimum in Taphosiri (hanc Stephanus sic dictam vult, quod Oliridis sepulchrum ibi esset, quasi Oliridos *sepulchrum*) Aegypti. De usu Absinthii dicemus postea.

Absinthii probabilis genus esse Ponticum, affirmat quoque Apuleius, virtutis scæceritima, feruentis & amara: nasci locis incultis. Et hinc Ouidius:

*Turpia deforme gignunt Absinthia campi:
Terræque de fructu quàm sit amara docet.*

Pulchra similitudo
D. Gregorij

Absinthium amarum esse pulchra similitudine ostendit D. Gregor. Nazian. in Orat. Apolog. dum ait. Citiùs quis parua malitia abundare incipit,

quàm in virtutis cumulo vel parum proficiat. Quandoquidem & modicum Absinthium citò mellis amaritudinem tribuit, mellis verò nec diu plura Absinthii suam confert dulcedinem. Et conuerterunt, inquit D. Hieron. in Amos cap. 5. dulcedinem iudicii in Absinthii amaritudinem: affluentes iniquitatem & iusticiam derelinquentes. Item in Iob. cap. 5. Nouissima autem illius amara quasi absinthium: vide plura ibidem. Simile quid tradit etiam Lucretius.

*Ac veluti pueris Absinthia retramedentes
Cum dare conantur, prius oras pocula circum*

Aspergunt mellis dulci flauoque liquore.

Verebatur & Fab. Quintilianus neliber suus parum mellis & Absinthii multum habere videtur, etsèque salubrior studiis, quàm dulcior.

Fuit apud Veteres Absinthium herba funebris (autore Pierio in Hieroglyph.) ac ideo eum in cæmeteriis plantabant.

Ad Galenū noster dirigatur gressus. Aliud est, inquit, ab Abrotano Absinthium, cuius tres statuendæ sunt species, quarum vnâ eodem, cum genere ipso, nomine appellitant: cuiusmodi potissimum est Ponticum: alterum Santonicum: tertium Seriphium. Si verò aliud placet appellare Absinthium, aliud verò Seriphium, aliud autè Santonicum nihil interest. Quoniam hæc tum specie seu formâ, tum gustu, tum facultatibus inter se diuersa sunt, non obscure vno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes: verum exactè vires earum edoceas. Ac nos sanè sufficienter ipsas formas à Dioscoride explicatas esse, alii que non paucis, iam diximus. His addit lib. 11. m. m. c. 16. Pontico adstringendi facultas non parua est: in reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quam saltem gustu agnoscas) aut plane obscura, aut proorsus nulla sentitur. Ponticum est tunc folio, tum flore longè quàm cætera minore. Odor quoque huic non modo non insuauis, verum etiam aromatum quid præferens, reliquis autem omnibus est fortis. Libro tandem de Antidotis l. c. 4. ait. Pater meus mel quoddam habuit ita amarum, ac si in Ponto natum foret, eo in tractu, vbi ex Absinthio apes mel colligunt.

Serapio trium tantum meminit, quorum primum Absinthium vocat. Alterum Cretense. Tertium verò est Santonicum: sed de his paulò post.

Præter Absinthium [ita namque Monachi de eius generibus] Romanum (vulgare,) nascitur etiam in maritimis & montibus aliud, quod à Dioscoride & aliis pluribus principaliter vocatur Absinthium marinum, & ab aliis Seriphium, siue Seriphium & Absinthium Ponticum. Est quoque & tertium apud Dioscoridem Absinthium, quod antonomastice vocatur Santonicum, seu Sardonicum, quia hoc vocabulum est etiam commune ad omnes Absinthii species, secundum ipsum Dioscoridem, & Plinium, & cæteros. Sicut Scæha apud Serapionem. Qui Serapio omnibus Absinthii speciebus Scæha nomen tribuit. Et hæc duæ vltimæ species ab antiquioribus & recentioribus ita confunduntur, vt nemo impræceterarum audeat dicere absolute, quale sit illud. Diosc. nempe & Serapio, & alii plures tres tantum Absinthii species scribunt. Aucenna autem sex, dicens: species eius quinque sunt. Tarsensis, & Suli, & Nabati, & Coraceni, & Romani. Et infra ait: Et est etiam ex speciebus Scæha. Et propter hoc vocauerunt ipsum quidam sapientes Scæha Romanorum.

Vel

Vel saltem ponit quinque species. Quia hoc vltimum forsitan non intendit absolute esse diuersam Absinthii speciem: sed quod dicitur Absinthium Romanum, à sapientibus vocatum esse Secha. Verba etenim ipsius ad vtrumque sensum possunt deduci. Platæcius quidem duas tantum scribit Absinthium habere species. Sed Simon Ianuensis autoritate Galeni, & ex libro antiquo de simplici medicina, enumerat quatuor. Pandectarius autem præter supra dicta, habet etiam unum Absinthium dulce, quod declarat esse Anothum. Et Scitædas citrinum, dicit esse Absinthium marinum. Item apud Hali filium Abbatem legitur Absinthium Græcum, quod si differat à Romano, nescimus. Et alii alia de Absinthio tradunt genera. Nos autem dimissis omnibus aliis tanquam dubiis & incognitis, solummodò primo genere, quod est verum, notissimum & præstantius cæteris, & pro Romano, & pro Pontico, & pro Santonico vtimur. Hactenus Monachi. Absinthium secundum Mesuem Luminare maius ait esse multiplex. Ponticum quidem, vel commune, quod satis notum: melius esse illud, quod remotum sit ab odore Maris, & oriatur in terris liberis, & habeat folia alba, plana & læuia.

Tria Absinthii genera posuit Dioscorides: quoniam et si tertium genus cum primo conueniret: discrepabat tamen quoad facultates. Secundum etiam genus licet virtutibus cum tertio conueniat: in forma tamen minimè consentit. Primum verò à secundo & facultate & formâ dissentit. Et alibi. Nemo non cum Marcello consentit adscititium esse id, quod de Absinthio marino legitur apud Dioscoridem copiosissimum in Teuero monte iuxta Cappadociam gi-gni: quando clarum sit locum hunc longâ spatii intercapedine à mari distare.

Eandem hanc Marcelli opinionem, & veriorè meâ quidem sententia, ex Cornario tuetur H. Lugdunensis. Absinthii, inquit, tria sunt genera Dioscoridi. Vulgare, Marinum, quod & Seriphium nominant, tertium Santonicum in Gallia ad Alpes proveniens. Et totidem sunt Galeno, licet plura Plinius statuat genera. *Geographia* peritus nunquam Gallicas Alpes in Santonum agro, vulgò *Saint ange*, existere credit, ubi crescat eiusdem nominis Absinthium. Adhæc in Aldino non *auritum*, siue *auritum*, sed *capitatum* legitur. Tertium hoc Pena vult ad Alpes Asiaticæ Galatiæ nasci, quas Sardonidas vocant.

Tanta est Seriphii, inquit Rocardus, & Santonici in qualitatibus similitudo, vt nisi forma discernerentur, vix qualitatibus ipsis fieri possent, nisi ab expertissimis, arbitrer. Quemadmodum & in forma cum Absinthio tanta est Santonici affinitas, quæ multis etiam eruditis imposuit, nisi qualitatibus ipsis iudicarentur. Quare non mirum videri debet, si in Absinthiorum examine, multi errores, multæ confusiones & hæreses occurrant. Est autem Absinthium [quod aliqui Bathypicon ex Dioscoride vocant, Arabes Seha ac etiam Sihe] fruticosa planta, cuius tres species statuendæ sunt Galeno, quarum vnâ eodè, cum genere ipso, nomine appellat: cuiusmodi potissimum est Ponticum Græcis & Latinis omnibus, ab Arabibus interpretibus Romanum, Cretense & Græcum ab Hali-abbate cognominatum. Alterum Santonicum, tertium Marinum, quod aliqui Seriphium cum Galeno (Sericam & Erisen Serapio) vocant. Non desuere

Tom. III.

qui triplicem in species partitionem in dualitatem redigere conati sunt, similitudines illis multiplices tribuentes, quod cum præstare nituntur, in seipsis postea non constant. Quidam specierum numerum augent, forè Auicennæ illius Arabis exemplo ducti, quem in simplicium doctrina confusum & præcipuè in Seha & Absinthii consideratione, nullus est, qui non facile percipiat. Sic nouas cum species in medium protrudere conatur, genuinarum penitus ignari semper remanent. Quamuis potè Absinthio proprium conueniensque nomen inditum sit, Neotericorum tamen Commentatorum præcipua pars improprium esse arbitrata est, illique per Antiphrasim inditum, quod verò vt improprium à solo Dioscoride memoratur ex aliquorum ignorantia impositum Bathypicon proprium ac illi conueniens esse asserunt. Quamuis à nullo alio Priscorum receptum sit aut memoratum. In hoc errore versantur, qui Absinthium vulgare Gallicum à Pontico nullo modo diuersum comprobare nituntur. Nec minore erroris sui causam nacti sunt in Absinthii Romani Arabum interpretum denominatione, qui à Romanis ruinis, quæ à

Varia sententia circa numerum specierum Absinthii.

Error quoniam à rudem.

Romano solo & sacris Romanorum ritibus deductum asserunt: quemadmodum & alii, qui ab austero & adstringente sicco sapore, quem quidam Ponticum vocant, Ponticum dici putant. Sunt & qui vi nulla, in Dioscoridis contextu particulâ illâ, quâ vulgaris notitiæ herbam dicit, vulgare Absinthium, idem esse cum eo, quod in Ponto incolis vulgare existit, persuadent. Quibusdam etiam vulgare à Pontico differre placet, vt minutum Absinthium pro Pontico officinis receptum Ponticum esse probent, vulgari nostro, nullum aliud nomen tribuentes, quam, vulgare Absinthium. Nonne & in marini appellatione sese tacite opponere videtur, qui in Tauro môte (à mari enim tanta itineris latitudine distat, vt quod in eo producit Absinthium marini denominatione indignum dici possit) & Cappadocia provenire Seriphium putant, loci in Dioscoridis contextu permutationem non aduertentes? Nonne apertius se opponunt Antiquorum placitis qui Santonicum à Gallie Santonia ciuitate deductum esse negant, Sardoniumque Absinthii vocari affirmant? Qui Santonicum nostrum vulgare à Pontico nihil specie differre, solùmque accidentibus quibusdam, odore sc. & sapore quodammodò & foliorum magnitudine [quæ Santonici à Pontico differentiam constituunt] quod soli natura & cœli eueniat, arbitrantur. Sic enim authorum placita contorquent. Quidam vulgare nostrum Absinthium non audent Absinthii denominatione priuare, sed Dioscoridem insimulant de eo locutum, dum herbam vulgaris notitiæ esse dicit, & de Bulgarico minuto, quam de Pontico mentionem facit. Alii Galeni textum in contrarium sensum auertere conantur, methathesimque proponunt, vt vulgare Gallicum nostrum Pontico idem esse asserant, sed *inversas* obiciunt contra expressam Galeni mentem. Qui manifestam Absinthiorum differentiam deprehendunt optimo iure, in triplicem, nec multiplicem distribui oportere arbitrati sunt. Nec est quod nobis Auicennam proponant, in quinque species Absinthium Antiquorum auctoritate, distinguantem. Abrotonum a. cū Absinthio confundere videtur. Eum non secutus est Serapio, nec Mesues qui Pontico, quem Romanum vocat, contentus. In contrarium sensum dictum Bathypicon iudi-

cabimus. A quibusdam verò vnquam, sic vocatū fuisse nullus est qui memoriæ prodiderit, præter vnum Diosc. qui potius vt aliorum placita (vt sunt ferè Poëtarum, quidlibet audentium) se non ignorasse proderet, ab aliquibus Bathypictō dici restatur. Cognomen hoc vt ascititium, nimique Absinthii naturam exprimens reiciendum putamus. Optima verò ratione Absinthii proprium & naturæ suæ conueniens ipsi nomen inditum fuisse aut tū antiquior quod est tangere & manibus tractare, non autem per antiphrasim. Porro nihil à nostra nos submoëbit sententia Bathypicti interpretatio, profundè amarum. Ponticum dicitur, non vt quidam Mesuæo impropere videntur, à Pontico illi aut potius interpreti appellato sapore. Mesuæ enim ratione Arabis, qui nunquam Absinthium Ponticum aut Romanum appellauit &c. Fortassis eorum excusanda potius venit opinio, qui Romanum ob id dictum fuisse credunt: quod antiquis Romæ tuinis Absinthium topiosissimū proueniat, quàm eorum qui ex Romanorum sacris obseruationibus. Soli barbari interpretes, qui Arabum scripta Latine barbarè verterunt huius denominationis verba fecerunt, quod ipsi Rumi dixerant sua lingua & Rom pronuntiant, hi Romanum perperam verterunt. Hali abbatis interpres multò præstantius aliis Arabum interpretibus Rumi per Græcum vertit, quod alii per Romanum perperam exponunt. Est igitur Absinthium Rumi seu Romanum nihil aliud quàm Ponticum aut Græcum, quod alio nomine Auicennæ interpres Nabathi vocat, sed malè, & Serapio quod deferunt à Gallicia, crassa illarum regionum ignoratione. Dioscoridi Græco Absinthium Ponticum vulgare fuit, Græcisque vulgarem herbam esse dixit. At nostris Gallis Santonicum familiare, vulgare Absinthium dicitur: Italis etiam vulgare Absinthium est. Plinius herbam ob id facillimam vocat, quæ inuentu & vsu facilis existeret. Differunt tamen inter se species hæ, quantum à Santonico Absinthium. Illis subscribere non possum qui Centronicum, non Santonicum legere rectius putant. Et hæc Claudius Rocardus, qui longè plura habet.

Absinthium, vt ex Nonio Marcello de proprietate sermonum refert Thesaur. ling. Latine, neutri generis est Lucret. lib. 4. Absinthia terra medentes cum dare conantur. Absinthius generis masculino Varr. Quinquatrib. Quid medico mihi est opus, nempe tuo, Absinthium vt bibam grauem.

Vires & Vius. Ex Absinthio præstantius est secundum Dioscoridem, vt antè quoque dictum, quod in Ponto & Cappadocia in monte Tauro appellato nascitur. Vim habet calefacientem, adstringentem, & biliosa quæ stomacho & aluo in hærent, depurgandi. Ciet etiam vrinam & præpotum crapulam arceat. Sed & ad inflationes commodum est, & alui ac stomachi dolores, cum Sefeli aut Nardo Celtica potum. Quin & ciborum fastigia, & morbum regium sanat cremor aut decoctum eius, quotidie trium cyathorum mensura potum. Ducit & menses tum potum, tum appositum cum melle. Commodum est & ad strangulationes à fungis cum aceto potum: cum vino verò aduersus Ixiā & Cicutam, & mutis aranei morsum, & draconem marinum. Illinitur autem anginis cum melle & nitro: pustulis nocturnis cum aqua: fugillatis cum melle: similiter etiam ad hebetes oculos, & sanie manantes aures. At decocti ipsius vapor ad aurium & dentium dolorem confert.

Decoctum verò cum passo dolentibus oculis præcataplasinate imponitur. Est & præcordiorum hepatisque ac stomachi cataplasma, in dolore & diutina affectione, tritum cum cerato cypriño: ad stomachum tamen cum cerato rosaceo. Conuenit & hydropicis & splenicis, ammixtis ad ipsum Ficubus, Nitro & Lolli farina. Paratur & vinum ex ipso, quod Absinthites appellatur, maximè circa Propontidem & Thracen, quo ad relata vtuntur, vbi febris abest: alioquin in æstate propinant, sanitatem efficere id putantes. Videtur etiam Absinthium in arcas inspersum, vestes incorrosas seruare, illitumque cum oleo, culices à corporis contactu abigere. Atramentum quo scribimus cremore Absinthii dilutum literas (quod quædam Lac. bibula) tuetur, ne à muribus (& muscis aliis) corrodamur. Existimatur & succus eius eadem opera efficere: Verum in potionibus ipsum improbumus, vt qui stomacho incommodus est, & capitis dolore inducit. At quidam a murcā coctā ac ammixtā succum adulterant.

Facillimam herbam dicit Plinius, vtilissimam, ac sacris Populi Romani peculiariter celebratā. Siquidem, inquit, Latinarum feris quadrigæ certant in Capitolio, victorūque Absinthium bibit: credo sanitatem præmio dari honorificè arbitris maioribus. Stomachum corroborat, & ob hoc sapor eius in vina transferitur: Bibitur & decoctum aqua. Vetusissimè in vsu est: Bibitur & madefacti dilutum: Tritum raro in vsu sicut & succus expressi: inutilis enim stomacho, capiti que est, cum sit vltus decocti saluberrimus. Namque adstringit stomachum, bilemque detrahit, vrinam ciet, aluum emollit, & in dolore sanatur: ventris animalia pellit, malaciam stomachi & inflationes discutit cum Sefeli & Nardo Gallico; aceto exiguo addito. Fastidia absterget, concoctiones adiuuat. Cruditates detrahit cum Ruta & Piperi & sale. Antiqui purgationis causa dabant &c. alii dabant contra Paralytū: alii pueris folia in Fico: Sic vt amaritudinem fallerent. Thoracem purgat cum Iride sumptum. In regio morbo crudum bibitur cum Opio (Apio Dalechamp.) aut a diantho. Aduersus inflationes calidam paulatim forbetur ex aqua: iocinoris causa cum Gallico Nardo: lenis cum aceto, aut pulte, aut Fico sumitur. Aduersatur fungis ex aceto: item visco, Cicutæ ex vino & mutis aranei moribus, draconi marino, scorpionibus. Oculorum claritati multum confert. Epiphoris cum passo imponitur: fugillatis cum melle. Aures decoctum eius vaporis sufficit sanatur, aut si manat sanies, cum melle tritum. Vrinam ac menses ciet tres quatuorue ramuli, cum Gallici Nardi radice vna, cyathis aque sex. Menses priuatim cum melle sumptum, & in vellere appositum. Anginis subuenit cum melle & nitro. Epiphyctidas ex aqua sanat: vulnera recentia priusquam aqua tangantur, impositum: præterea capitis vlcera. Peculiariter ilibus imponitur cum Cypria cera (lege cerato cypriño) aut cum Fico. Sanatur & pruritus. Non est dādum in Febri. Nau-seas maris arceat in nauigationibus potum: inguinum tumorem in ventrali habitum. Somnos allicit offactum, aut inscio sub capite positum. Vestibus insectum tineas arceat. Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo si vreatur. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à musculis tuetur: capillum denigrat Absinthii cinis, vnguento rosaceo permixtus. Et alibi: Si nate sint eruce, remedium est Absinthii succus, decocti

Hepar.
Stomach.
Hydrog.Succi
ammoniaciRobora
Stomach.

Purga

Thora

Hepar

Fungus
noma.
Oculi

Aures

Vrina

Menses

Angina

Epin

cocti inperfus. Item: Ex cæteris herbis fit Absinthites, in XL sextarios multæ Absinthii Pontici libra decocta ad tertias partes, vel scopis Absinthii vinum additis.

Absinthium inquit Galenus adstrictoriam & amarā, & ærem simul qualitates possidet, ex-calfaciens pariter & extergens & roborans & desiccans: proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autem quod in venis & biliosum per vrinas expurgat. Calidum primò excessu, siccam tertio: succus autem eius longè quàm herba calidior est: Nos, ait lib. xi. in. m. c. 15. Si vel minima suspicio sit iecur ventriculūque laborare, absinthium protinus oleo incoquimus, ac eas particulas perfundimus. Cùm autem duplex in omni Alynthio sit facultas & qualitas, vtique in Pontico adstringendi facultas non parua est: in reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quam saltem gustu agnoscas) aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde Ponticum ad iecinoris & ventris phlegmonas eligi præstat. Odor huic non insuauis, verum etiam aromaticum quid præferens: reliquis autem omnibus est fœdus: quare hæc fugienda, illo autem semper vtendum.

Herbæ Absinthii, inquit Apuleius, & Marubii, & Lupinorum paria pondera in aqua multa cocta, vel in vino austero, bis aut ter in vinibilo imposita, necant lumbricos. Commendatque idem Absynthii succum contra fungorum venenum: & furculi Absynthii & Marrubii gestationem contra intertignes.

Absinthii vires & vsum perspicuè declarat Mælius. Absinthium, inquit, cùm sit multiplex, Romanum eligimus, foliis albis, leuibus & planis, non asperis, odore iucundo, Absinthium marinum nihil imitante, lectum in terra libera, calidū ordine primo, siccū secundo, in quo etiam caler flos. Constat substantia duplici, vna calida, amara, nitrosa, purgante, obstructa liberante; altera terrea, styptica, partes cogendo roborante, largiore, præsertim siccatur. Cùm autem substantia eius calida sit superficialis, vbi sumptum est Absinthium, ab ea prior sit actio: à terrea styptica posterior, per quam comprimendo soluere nonnulli malè sunt opinati. Bilem enim flauam & aquas, à ventriculo, intestinis, hepate. & venis vacuat, etiam interdum per vrinas. Piritam enim non vacuat, aut maximè paucam, licet phlegmagogum quoque esse Auenzoar censuerit. Absinthium à putredine vindicat, præcipuè potu quotidiano viciæ vnius, vel duarum vini, aut aquæ cui infusum aut incoctum fuerit, vel aquæ ex eo sublimata. Siccum idem pannis interpositum à tinea vindicat & turos reddit. Partibus attritis aut contulis præcipuè cum melle aut vino & paucò Cymino calfactum, & appositum mirè confert. Si vino, aut aqua, aut oleo, cui Absinthium & radix Cucumeris agreltis incocta fuerint, spongia mersa & exprella temporibus alligatur, hemicraniam sanat. Auris quoque suffusa vino aut aqua, cui incoctum fuerit Absinthium, dolore, tinnitu, surditate liberatur. Acetum autem aut vinum cui incoctum sit Absinthium cum cortice Citri, oris fœtorem à gingiuarum & dentium, vel materiarum in ventriculo putredine emendat. Idem præstat aqua eius distillata. Succus Absinthii cum nucleis Persicorum, vermes aurium & aliarum partium enecat, & educit. Absinthium ventriculū & he-

par roborat, appetentiā excitat, obstructions tollit, & inde natos affectus, vt Icterus, Hydro-pem: febribus putridis etiam diuturnis confert. Absinthium innocenter sumitur, succo tamen lædit ventriculū, ob nitrosū saporem. Quia autem imbecilliter soluit, Rosæ, Fumariæ, Serum lactis, Spica, Vua passæ purgat illi miscetur, vt melius & tutius purget. *Ex hac Mælius*, qui contrarius in quibusdam esse videtur Galeno, ac cum propterea ita conciliare studet Siluius. Diuersus Mælius Galeno tantum est, quod siccum tertio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ controuersia in aliis simplicibus multis est inter Medicos etiam doctissimos, quorum vnus in fine (verbi gratia) primi vel secundi, alter in principio secundi vel tertii intelligit, quæ ambiguitas etiam Galeno ipsi est in Aethro, Prasio, Ruta agrestis & aliis permixtis. Nam quod succum eius dicit Mælius ob nitrosam qualitatem nocere stomacho ipsi Galeno id non aduersatur scribenti, succum longè ipsa herbà esse calidiorē.

ABSINTHIUM MARINUM. VETERIBVS. CAP. LX.

Absinthium marinum, inquit Dioscorides, quidam etiam Seriphium vocant. Nascitur plurimum in Taphosiri Ægypti, quo pro Oleæ ramo liliaci vtitur. Est autem *herba exigua farneti*, Abrotono patuo similis, paucis *seminibus* referta, submara, stomacho incommoda, odore graui, adstringens cu quadā caliditate. Inter spuria Dioscoridis marinū Absinthium alii Santonicum vocant, alii Seriphion, Romani Santonicum. In Tauro circa Cappadociam monte, dicuntur pinguescere eius pabulo maximè pecora.

Quod autem huius capitis initio habetur in Grecis codicibus, *in tauri montis Cappadocia* non alienum est ab hoc loco, & ex superiore Absinthio huc translatum ac suppositum. Ostendit id etiam Plinius, qui eā particula relicta, probatissimum in Taphosiri Ægypti esse ait. Sicut autem hæc particula ad initium, ita alia ad finem accreuit. *nonnulli autem à melle & melle* *quædam*. Aut enim in totum hæc redundant: aut ad superius Ponticum Absinthium referenda sunt, quo pecora pinguescere ex Theophrasto ac Plinio ostensum.

Seriphium aliud à Santonico non solum voluit Paulus, sed & Galenus lib. 6. simpl. medic. & Plin. lib. 27. Nec te mouere debet Dioscorides, si Manardo credis, Absinthium marinum à nonnullis Seriphion, ab aliis Santonicum vocari scribens: scis enim quàm inconstantes sint huiusmodi nomenclaturæ, vt pro libito ab vnoquoque cōfictæ: alioqui si vbique has sequemur Abrotonū idem dicemus quod Absinthium Ponticum, cū eodem Dioscoride autore, Romani sic Abrotonum vocent, atque idem quoque cum Santonico: quoniam, vt refert Galenus, Abrotonū à Romanis vocari Santonicum scripsit Pamphilus. Vocet igitur vnusquisque prout vult, vt ait Galenus, modo sciat res esse diuersas. Tutius tamen est sequi Antiquorum, præsertim Galeni, nomina, ne in rebus quoque ipsis labi contingat. Verum & Dioscorides ipse, si emaculatus sit codex, Santonicum rem diuersam à Seriphio facit.

Hanc coctā per se, aut cum Oryza & cum melle acceptā, ascaridas & lūbricos rotundos necare, &

Vires &
Vius.

uiter aluum subducere, autor est Dioscorides. Possè & eum sapa, aut lenticula cocta eadem prestare. Hæc verò [Oues eâ pastæ plurimum pinguescunt] in hoc Dioscoridis textu redundant, & ad Absinthium Ponticum referenda sunt, ut habet Theophrastus & Plinius. Authore porrò Galeno simpl. lib. 6. ipsum Seriphium Abrotono minus est calidum: verum calidius Absinthio, stomacho impendio inimicum, nempe cum amaritate falsedinem quandam præ se ferens: Sed & quandam, licet minimam, adstrictionem obtrinet. Sic & Abrotonū, & Santonicum admodū infesta sunt stomacho. Solum autem inter ea Absinthiū, & maximè Ponticum, gratum est stomacho, quia plurimam adstrictionem continet. Idem lib. 8. Est Seriphium Absinthio tum specie, tum gustu simili: attamen discrepat, gustu quidem, quandoquidem non æquè, ut illud adstringat, plūsque excalfaciat, amaritatēque quandam cum falsedine respiciat: tum quod stomacho infestum sit, magisque Absinthio lumbricos necet, siue fortis impostum, siue intrò in corpus assumptum. Et sanè excalfacere ipsum in secundo ordine intenso recensendum est, exsiccare in tertio. Stomacho autem esse inimicum, prodidit quoque Plinius: aluum præterea mollire, pellerēque animalia interaneorum. Bibi cum oleo & sale, aut in farinæ trimestris forbitione dilutum. Cœqui quantum manus capiat, in aquæ sextario ad dimidias.

DE ABSINTHIO SANTONICO

Veterebus.

CAP. LXI.

*Varietas
lectionis
Dioscori-
dica*

Est & tertium Absinthii genus, inquit Dioscorides, in Gallia ad Alpes (ἐν τῇ κρῖ τῶν ἀλπεῖν γαλιτικῇ, legit cod. Basil.) plurimum proveniens, quod vernaculâ voce Santonicum (σάντονικον exempl. basil.) appellant cognomine ducto à Santonide (σάντονιδος) regione ipsū producente: Simile est Absinthio, non tamen ita semine referum, sed amarum & eadem facultate cum Seriphio præditum.

*Santonica
herba Co-
lumella.*

Galenus Santonicum a Santonia regione, in qua nascitur, appellationem habere dicit. Quæ de Santonico ex Plinio dicuntur, suprà recitauimus. Santonicum à Columella Santonica herba dicitur.

Illud autem notatu dignum arbitratur Hermolaus, Santonicum Absinthio similis describi, quàm Seriphium, aut, quod idem sit, marinum: quoniam marinum Abrotoni potius, quàm Absinthii figura demonstratur, à Dioscoride & Plinio. Recentiores contrarium decernunt: & sanè videntur haud falsa dicere: marinum siue Seriphium docentes Absinthio quàm Abrotono similis: Santonicum Abrotono quàm Absinthio. Marinum certè id quod passim in littoribus & secus mare nascitur sapore salso, & folio albicante, notum omnibus, nihil ferè commune cum Abrotono habet.

*Santonica
herba à Se-
riphio
differt.*

Dioscorides ipse, si emaculatus sit codex, teste Manardo, Santonicum rem diuersam à Seriphio facit. Pro verbo enim Sardonium, legendum Santonicum. Quod nedum ex Galeni, Plinii, Serapionisque concordia sententia patere potest, sed etiam ex hoc quod nulla est in Gallia Sardonis regio, sed Santonis: estque Sardonion alia herba, de qua Dioscorides inter Battachii species,

& l. 6. inter venena mentionem facit, à qua Sardonius risus Græcorum prouerbiū non bonæ famæ in vita, sicut Dioscorides, Paulūsque testantur. Et lib. 4. Auicenna sub nomine *sebardis*, licet ignorauerit, de qua rescriberet, nec intelligi valeat quid scripserit, nisi ab iis qui ea quæ ille scripsit, alibi prius didicerint. Obscurius quoque idem Auicenna scripsit de Seriphio & Santonico, libro 2. sub *shee* nomine, in capituli principio, aded ut ne diuinando quidem possis assequi quid voluerit: & ne in nostra tantum editione putes difficultatem, consule etiam Hebræam, atque maiorem, non modò æquam, inuenies obsecratur.

Absinthium Sardonium licet multi vocent Santonicum, inquit Anguillara, non inuenitur propterea vllum Absinthium in ea Galliz regione, quod vel figura, vel qualitate huic sit simile: ac quod de Galliæ alpihus legitur apud Dioscoride, de Galatiz Alpihus intelligendum censet.

Eadem facultate cum Seriphio præditum esse tradit Dioscorides. Ad cæterorum, inquit Gal. simpl. 6. Santonicum à Santonia regione in qua nascitur, nomen sortitur proximam habet facultatem. Seriphio paulò imbecillius in extenuando, & calfaciendo, desiccandōque. Peccant Recentiores, cum in Pontici Absinthii penuria Santonicum substituunt, ut docet Aug. Ferr. Castig. cap. 3.

ABSINTHIUM VVLGARE MAIVS.

CAP. LXII.



Vulgatissimo Absinthio caules plures, lignosi, incani, multis ramis fruticosi, cubitales & triticubitales, interdum & altiores: folia Artemisiæ foliis paria, minutius dissecta, mollicella, tota incana; magis tamen pronâ, quàm supinâ parte, odore aromatico, gustu itè, sed cum plucula amaritudine,

coniuncta adstrictione aliqua: corymbi longâ serie vbertim in ramis vndique suluo colore emicant, semine succedente minuto: radix crassiuscula, lignosa, abundè calfacit, aromaticâ gratiâ, sine omni amarore, totum os perfundens.

Icon nostra est ex Fuchsiis, quæ ita empta: Icon; perplacet ea, quam habet Camer. in lib. 1c. Matthioli & in eiusdem hist. germanica.

Ex pluribus Absinthii generibus, Ruellius hoc lib. 3. cap. 20. vulgare vocat, gallicè *alume*, Ponticumque cognominari ait, quod à Ponto veniēs, cæteris multo sit præstantius.

Eadem hæc pro suis recitat Tagault. l. 2. purg. simpl. cap. 10.

Cordus in Dispens. vocat Absinthium rusticū, calidiūque

calidiusque Pontico statuit, & nihil ferè adstringens. In H. Absinthium vulgare, & vbiq; nascens.

De hoc ita Syll. de comp. medic. l. i. ait. Nostrum vulgare Absinthium, sarmentosum, folio & flore multo maiore quam cetera tria Absinthia Veterum, inter quæ comprehensum non videtur, nisi esse vels Absinthii primum Dioscoridis, quod vulgò notum dicit, & *Βαθύμαρον*, vel potius *Ευθύμαρον* vocatur: vulgò Aloina & Forte. Id autem si primum in Dioscoride recipias, quamnam alia in eo statues?

Absinthium hoc, vulgare quoque esse ait Cornarius, & à Germanis *wermut* vocari, quasi impediens concitationem ad Venerem, vt quidam exponant. Hoc certè etiam nomine apud honestas feminas, damnum esse eius vsum, & maxime Vini & Zythi ex eo parati: nec facile hos potus maritis eas permittere. Idem *alibi*, Absinthium Ponticum à Galeno descriptum, à vulgari hoc nostro diuersum esse genere negat, sed specie saltem, & natali solo differre exultinat.

Absinthium, quod Germani *wermut* appellant, propter insignes quas obinet facultates, rectius *werommut*, inquit Tragus, quasi dicas pellens tristitiam [nobis melius, prohibens alacritatem: *weren* enim, Germanis est impedire; *mut* verò alacris animus] appellari possit. Sic enim Ouidius, de Ponto.

Tristia deformes pariunt Absinthia campi.

Idem s. Trist.

Cana prius gelidis desint Absinthia Ponto.

Manruan.

Et quoniam tecum vixisti Absinthia potant.

Lucr. lib. i.

Sed veluti pueris Absinthia terra medentes.

Non tamen negandum est Germanis quoque dici posse *werommut* duabus dictionibus, vt videtur Tragus nomen indetrasisse. Sed is auctoritatem pro se non habet. Cæterum lib. i. cap. iii. vulgare Romanum, seu Ponticum Absinthium nominat, eoque Apicii cōdimēta facitare solitū fuisse tradit. De hoc tandem loquitur cap. ii. Absinthium quod Dioscorides in Ponto provenire scribit, hoc nobis in Germania quoque provenit.

Quod absolute dicitur Absinthium, notissimū est. Sed quia dicit Mesues in syrupo de Mentha: Recipe Absinthii Romani. Sciendum quòd ferè omnes pharmacopolæ Romæ decipiuntur, sumentes pro Absinthio Romano, illud quod in muris vrbis Romanæ [de quo post] oritur, de quo minime author intellexit quodque à peritis diuersa Absinthii species iudicatur: Et in veritate est. Negligentes illud, de quo intellexit autor, quod in partibus Romæ propinquis oritur. Largo enim modo per Absinthii Romanū intelligitur omne illud Absinthium, quod spontè intra Italicum nascitur solum. Quia vt plurimum & Dioscorides & Galenus & ceteri autores, cūm dicunt aliquid Romanum, intelligunt illud esse Italicum. Vt exempli gratia: Apud Dioscoridem cūm citantur Romani, intelliguntur Latini, scilicet Itali, qui sunt veri Latini. Aliud efficacius exemplum: Scribitur à pluribus autoribus & præsertim Auicenna, Gentiana Romana, Paxonia Romana, Spica Romana, & alia plura, quæ non tantū Romæ non sunt, sed nec prope Romam ad multa miliaria nascuntur. Quæ de re talibus in locis, necessariò pro Roma, Italia, & pro Romano, Italicum intelligendum est. Quod clariùs ostendit ipse Mesues, dicens Absinthium multiplex est, sed illud quod intendimus nunc,

Tom. III.

est Absinthium Romanum, melius, remotum ab odore maris, & quod oritur in terris liberis. Si igitur intellexisset pro Absinthio Romano, illud quod nascitur in ruinis vrbis, non dixisset: Melius est, quod est remotum ab odore maris, scilicet Romam non esse in maritimis positam. Vnde necessarium est dicere omne Absinthium Italicum, etiam & quod oritur circa mare [non obstante quod sit non bonum] esse Absinthium Romanum. Et ex hoc sciendum est, quod murale iudicio plurimorum est malum: vnde pro Absinthio Romano accipiendum est illud, quod [vt dicit autor] nascitur in terris liberis, habens folia latiora lenia & plana. Quodque non est ita aridum, & pluribus Italiæ locis copiosè habetur, & hoc etiam nūm à Romanis [teste Dioscoride] vocatur Absinthium rusticum, & Absinthium absolute vbiq; à Latinis, siue Absinthium Italicum, vt in Plinio legitur. Quod enim Plinius dixit Italicum, id Mesues, Auicenna & ceteri Romanum dixerunt. Nos dimissis omnibus aliis Absinthiis, tanquam dubiis & incognitis, solummodo prius genere, quod est præstantius cæteris, & pro Romano & pro Santonico vtimus: sed illud quod oritur in terris mari non vicinis, & montanis, melius est. Amaritudo in Absinthio solummodo in superficie consistit, intrinseca est optimi saporis cum aliqua dulcedine, quod apparet in cauliculis mundatis à cortice. Hinc enim est quod aqua ipsius sublimata est dulcis. Hæcenus Monachi.

Fuchsius ex Dioscoride & Galeno tria Absinthii genera statuit. Horum primum esse ait, quod Romanum, vulgare, seu commune vocant; id quod passim in Germania nascatur, quod Allobroges recenti nomine vocant, *la R. manie*. Officinis etiam Absinthium Romanum dicitur Huius generis esse quod à Ponto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominetur. Is errare scribit Monachos, quando in syr. de Absinth. vulgare & rusticum esse accipiendum Absinthium censent.

Absinthium Ponticum vocat Bellon. Obs. lib. 2. cap. ii. ac nulla in re differre ait à nostro hortorum, nisi quod albidius proveniat inter Heracleam & Iconium. Idem lib. i. cap. 76. ait. Authores laudant Absinthium Ponticum, quod vidi venale & in usu in officinis Constantinopolitanis, quod respondet in omnibus Absinthio, quod in nostris hortis provenit, eo excepto quod Ponticum spontè proveniens reperitur. Admirandi nobis occasio, plurimos nostræ Europæ dubitantes de hoc Absinthio nolle pro vero vti: sed pro eo assumere malam herbulam, speciem Abrototoni, nullius efficaciz, derelicto nostro culto, quod verum Ponticum, quo abundant montes inter Ror & montem Sinai.

Prodidit Galenus m. m. lib. i. c. 16. *2. Absinth. Ponticum* tam folio, tum flore esse longè quàm cetera minore. Equidem nullo alio discrimine alterū ab altero distidere crediderim [inquit Math. in Dios. lib. 3. cap. 13.] quàm climatis temperie & foliis & floribus noitate minoribus, & adstrictiore facultate & odore. Mesues, vt Sylius doctissime adnotavit, nescio tamen qua ratione ductus, Ponticum Romanum appellat. Monachi verò qui in eum Commentarios scripserunt, putant, magno quidem errore, id Mesue Romanum Absinthiū esse, quod non modò in agro Romano, sed etiā in vniuersa Italia provenit. Plinius lib. 27. cap. 7. Ponticum scribit multò

Y.

Italico amarius esse: in quo sanè Galeni sententiæ & refragatur, & errat. Volunt Patres qui Medicum commentati, tantum superficie tenus Absinthium vulgare amarescere, imis verò partibus dulcescere, ob idque gustui gratum esse. Vnde etiam aquam, quæ ab eo ignium vi distillat, dulcem potius quam amaram sentiri contendunt. Quia in reii parum rem naturalem callere deprehenduntur: nam quod absinthii stillatitia aqua sit dulcis, non ex eo fit (quantum equidem sentio) quod Absinthium ipsum sit extrema parte amarum, medullitis verò dulce: sed quoniam cum exteriores illæ partes, quibus amaror ille inest, admodum sint tenues, ac in vaporē facile resolubiles, ignis calore tenuiores factæ, non magno quidem labore resoluuntur: euenitque ab hoc, ut stillatitia, quæ inde fluit, aqua omnis sit amaritudinis experta. Præterea dulcedo, quæ in ipsa inuenitur, non ab intimis Absinthii partibus emanat, sed eam tantum à plumbeis instrumētis, quibus conficitur (ut diurna docet experientia) prouenire comperimus. Nam ipsius dulcedinis qualitas non modò Absinthii stillatitia aqua sentitur, sed etiā in quavis alia, quæ ex herbis temperamento calidis extrahatur &c. Miratur autem subit Matthiolum quod dicit Absinthium Ponticum non differre à vulgari, & nihilominus diuersæ plantæ figuram ponat pro Pontico in Hist. germ. & post. comm. cum mag. figuris. Matthioli etiam censura in Monachos & ratiocinatio non mihi satisfacit: cum Absinthium non in vasis plumbeis destilletur, sed cupreis, cum quibus extrahuntur olea ex seminibus & herbis siccis aqua addita.

Monachi
contra
Matthiol.
defendunt
suis.

Absinthium vulgare, idem cum Pontico & Romano Absinthio esse, testatur quoque Amatus: in nihilo enim inter se quàm natali tantum differre scribit, & quod in Ponto tantum procedit crescat. Quod vltimum in Amato reprehendit Apollo rad. in Dialacca magna.

Absinthium tertium, Santonicum vocatum à Santonibus. Gallia populis, apud quos magno prouentui gignitur, quemadmodum etiam hodie locis quàm pluribus nostris (inquit Cronenburg. de compo. med.) opinor Absinthium vulgare, quamuis id Syluio inter tria Absinthii genera Veteribus enumerata, non fuisse comprehensum videatur. Auicenna lib. 2. cap. 2. quinque species recenset, sed obscurat magis, quàm illustrat.

Vulgare hoc Absinthium, inquit Turnerus part. 1. pag. secunda non esse Ponticum, docere potest [et] Dioscorides non describat, tanquam passim notum] comparatio aliarum herbarum cum Absinthio, ut Abrotani & Santonici. Idem probari potest ex Galeno lib. 11. Meth. med. & lib. 6. de simpl. facult. &c. Cum vulgare Absinthium, maius sit & magis foetidum reliquis, longissimè absit necesse est à Pontico, oportetque esse potius Marini aut Santonici Absinthii speciem, potissimum Santonici, quod Santonia propior sit Italiae, Germaniae & Angliae, quàm Pötus, in quibus regionibus, propter vicinitatem, & coeli cōsimilem temperiem, verisimilius est maiorem esse debere Santonici, quàm Pontici Absinthii copiam. Errorem Matthioli secutus est eius simia Amatus Lusitanus, atque in eodem luto hærent Monachi. Idem pag. 12. Si locus sit coniecturæ, nisi folia essent tam magna & foetida, ego magnum hoc Absinthium [vulgare] censerem esse Santonicum, aut spuriam quandam eius speciem.

Vulgare
Absinth. nō
est Ponticum

Gesner. hort. Absinthium commune [quod ad remedia vtilius est] sponte nascitur locis aliquot Heluetiæ arenosis, ut circa Rhenum superiorem, & saxosis montium, ut supra Riuarium lacum Wallestadii, alibi: item in altis quibusdam montibus Bernensium, sed multò minus, frigore, aut alimenti inopia: ita ut species diuersa videri possit: sicuti & aliæ multæ herbæ in montibus altis nasci, iis quæ humilioribus nascuntur, minores, solidioresque, & crassiusculis foliis sunt, ut Viola nigra, Bechium, &c. Coudenburg, in epist. ad ipsum scribit, se Absinthium Ponticum Veterum, ægrotis tam saluarem herbam hæcenus desiderare. Ille qui pro eo vulgare nostrum horridæ amaritudinis, & adstrictionis manifestè nullius, accipiant: alios verò Romanum.

Absinth. hoc vulgare, non esse aliud à Romano & Pontico, sequentibus docet in Aduers. Lobelius. Noscitur Absinthium & Ponticum, quia id pecus non pascitur, neque vlli bibitur, vnde βαρυπικρον (non βαρυπικρον, ut falso, errore typographi, hoc in loco legitur) dictū. Cultus veri non nisi duæ videntur differentia, tamen multæ sunt similitudines: quod namque vulgari & amariū est, sponte natum, vel culum, Ponticum est, tum antiquis à præstantia & regione cognominatum, tum recentioribus barbaris ab adstrictione, quam illi Ponticum saporem, suam, non latinā voce appellant, quem laudabant in Absinthio Pontico, cuiusmodi est vulgatissimum, vbi que peruium nostrum: sed naturalibus commendatiū. Et inter Arabes Mesius interpres idem Ponticum atque Romanum esse verissimè literis mandauit. Vnde pharmacopœorum tam sedula Romani conquisitio & exploratio etiamnum durat. Romanum enim, i. e. optimum, ut Camomillam Romanam, cæteris præstantiorem & gentinam expectunt. Quin ne Barbaros istud nomen Romani commentos se ignorare conqueratur noster Vercellenis Apollo, sciat Romanum istud commendatissimum inter paucas herbas & sacrum plebi Romanæ fuisse, quod quidem victori sanitatis præmio & quasi omine fausto propinabant, ut Plinius author. Et quod nostro æuo in Romano agro, antiquisque rudibus passim visitur, non aliud à nostro est, & verumque Pontico idem est, &c.

Bauder. eorum opinionioni adhaerere, qui Absinthium nostrum vulgare, scribunt esse Absinthium verum Ponticum Dioscoridis, & Romanum Mesue, & quorundam, qui existimarunt Antiquis fuisse incognitum rusticum: Nostrum rusticum, inquit, verum est Ponticum Dioscoridis & Galeni: pro Pontico aut Romano semper ponendum: poterit dici Ponticum magnum.

Absinthium Ponticum cum Absinthio vulgari contra Galeni sententiam cōfundit Matthiolum, inquit Guilandinus in Theone. Insignem, in eucule, nouitium istum herbariorum ducem, qui tæto temporis intervallo nodum didici, binas Absinthii Pontici nomine plantas auctoribus venire. Ex iis altera cum Absinthio absolute prolute conuenit, quod, Dioscoride teste, optimum in Ponto oritur. De hoc intelligit Galenus, quando Absinthii, libro simplicis medicinae sexto, tria tantum genera statuit, neque Ponticum ab absolute prolute distinguit. Altera, Absinthium propriè Ponticum appellatur, non quod laudatissimum Ponto proueniat, sed quod copiosissimum: quamquam & apud alias gentes nasci, nihil prohibet. Hoc Absinthium auctore Galeno, magis adstringit, quàm cætera, & amarum minus est. Adhuc aroma olet, reliquis foetentibus. Postremo, foliis

Absinth.
Pont.
sue.

Absinth.
vulgare
est
cūm.

md, foliis & floribus longè, quàm alia Absinthia minoribus constat. Nec in Ponto tantum, sed in Pannonia quoque; Romæ item & variis in Latio locis copiosè exit. Et hæc ex aliorum sententia reutilisè sufficiat.

Reliquum est, ut nostram de Absinthio hoc vulgari maiore proferamus sententiam. Quin igitur nostri absinthii vulgaris meminerint veteres; vix dubitamus, his Argumentis nixi. Primum cum Theophrastus Absinthium recenset inter herbas mali odoris & amaras, ac sui tractus oues eam non pascere scribat. Quæ huic omnino competunt. Nec odor omnibus æquus: gratus vni, ingratus alteri. Itè quòd Dioscorides vocet *καρύμνη*, vel, ut habet Apuleius, *καρύμνη*. Est enim tum multum amarum, tum etiam cum grauitate amarum. Si præterea cui Absinthio folia Artemisiæ similia, huic certè sunt, sed paulò maiora. Competunt etiam quæ in Abrotono de Absinthio dicuntur. Sed conuenit & illud nomen additum ab Apuleio, Absinthium rusticum. Nec illud quoque reuit nomen à Plinio adiectum, Italicum: passim enim in Italia prouenit.

Absinthium dicitur Brunfelsi, Trago, Matth. Cord. in Diosc. & Hist. Lonic. (cuius pictura non placet, & melius aridet quam posuit pro Abrotono,) & cæsalpino. Absinthium vulgare Fuchs. Gesn. app. Lacunæ, H. Lugd. Cast. & Tabernamontano. Absinthium commune Gesn. hort. (cui & Romanum) & Camerario. Absinthium Santonicum, Dod gallico: Absinth. Ponticum Ruell. & Trincauella. Absinthium vulg. Ponticum Ruellii Lobelio Obs. p. 433. Icon. Plant. 752. Absinthium latifolium Dod. lat. in folio. Absinthium nostrum rusticum Thalis. Absinth. rusticum Apuleio. Absinth. maius & vulgare Clusio. Absinth. commune rusticum Hort. Lul.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Absinthium i. sive Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis. Item phyt. Absinthium lo. sive pumilum multifido incano folio: Gesn. Alpinum humile: Pumilum Camerarii Clusio. Varietas est dependens solum à loco quare non separo hæc duò Absinthia: Gesnerus etiam non separauit. Gesneri quoque commune minus, ab eiusdem Alpino humili distinguere nolo, id quod Frater fecit, ut sub Absinthio vulgari montano monebo. Absinthium tandem pumilum Camerarii Clusio, non separo ab Absinthio Vallesiano Gesneri, cuius meminit Camerarius.

Αψινθιον Græcis, *καρύμνη*, Comiciis *καρύμνη*, seu *καρύμνη*, & *καρύμνη*, nonnullis. *Laanah* Hebr. *Amos* 5, *Miser* & *Meritura* Chald. Arab. Serapioni Absinthium, Stephano interprete *Almacum*, aliis Medicis Arab. *Asensu*, *Sesum*, *Ahanlais*, *Barnis*, *Bilengi*, *Bulengi* & *Liembah*: ab aliquib⁹ Zuriderat, quo nomine alii Violas maritimas, alii Cydonia mala vocant. Quare videant, qui Arabes exponunt, ne quid pro quo interpretentur. Absinthium Lat. *Aloina* & *Absinthium*, ac *Herba fortis*. *Ægypt. somi*. Germ. *werminut*, *Wegwurz*, *Wegwurz*. Unde feld *werminut* oder *gemicin* *werminut* magis propriè: *werminut* quidem quòd hominibus sua amaritudine omnem alacritatem adimat, aut Venerem inhibeat. Alii tenent nomen hoc à vi & facultate calefaciente adeptum esse, & hinc Saxones *wermpert* vocant. Nonnulli tamen *wer-unmuth* appellant, abigens tristitiam, propter excellentes & multi-varias virtutes & operationes, quibus eam depellat. Belg. *Alfene*. *Biabant*. *Alsem* & *Alsem*. Gallis *Aluysne*. Tom. III.

de l' *alvine*, *Absinthe* & *Forte*. It. *Affenzo* & *Affenzio*: Romæ *Nascientio*, Venetiis *Bon Maestro*, & aliis Italix locis *Mediciv*, *Tabern. Hils. Affenios*, *Alfena*, & *Alfina*. Angl. *Common wormwood*. Bohem. *Pelyuick*. Polon. *Pielum* oder *Piolin*. Hung. *Tróm* quib⁹ etiam appellationibus reliqua Absinthii genera plerumque donantur.

Absinthii verò nomen Græci ab *ἀπὸ τοῦ* [ἀπὸ τοῦ] *ἀπὸ τοῦ* id est, contrahendo per antiphrasim deflexerunt, quòd nullum animal ob eximiam amaritudinem hanc herbam attingat: quam ob causam etiam *Bathypicron*, seu *Barypicron* nominata est. Veteres Græci *Comici* *καρύμνη*, quasi impotabilem dixerunt, quòd hanc nemo propter insignem amarorem bibere possit.

Prouenit ferè vbique, & feritur, & per se quoque in hortis nascitur, autore Matthiolo; Clusio verò passim per Hungariam, Austriam & reliquas vicinas provincias, Absinthium illud maius, quod reliquæ etiam Europæ familiare est. Saxonia tamen amat, montosa, & inculta, teste Dodonæo: non rarò prouenit circa aggres. Vbique & omnibus regionibus vulgare. Clauallus locus in territorio Lingonensi, non longè à fluuio Alba, antiquitus dicebatur vallis absinthialis, propter abundantiam tunc ibi Absinthii copiam, ut legere memini in vita S. Bernardi. l. i. cap. 5. Absinthium vulgare passim habetur in hortis & muris Castri, vnde transit in Hortum Ill. E. C. Montbelgardi, ubi copiosè colitur: optimum prouenit spontè in monte *Rached*, ditionis Episcopi Porentrutensis non longè à Blaumontio. Monspelii in hortis, & spontè inter Monspelium & Lugdunum: in ditione Basiliensium inter *Liechtstâl* & *Wasserfall*: Basileæ quoque spontè in Sabaudia inter Lugdunum & Genueum copiosè non longè à *Cormou*. Lugduni & Geneu, ubi vocant *du gros fort*, abundat in hortis, virens mense Nouembri, & adhuc Ianuario. Fallitur Turnerus, dum ait non prouenire in montibus. Absinthium, inquit, vulgare non in montibus, sed circa vrbes, tollas, vialque publicas, & locis cultis nascitur.

Lectores videant vires attributas Absinthio à Vires Veteribus ut Diosc. Galeno, & aliis, antè recitatas, quas existimamus respondere viribus nostri Absinthii latifolii. Cæterum, ut autor est Tragus, flores Absinthii vino decocti & potis aut in Autumno vinum ex Absinthio confectum, quod Absinthites vocant, continuò vsurpatum, appetitum edendi facit & fastidia discutit, quod non ignorant vinoli, qui ut appetentiam cibi concilient, vinum eiusmodi potare consueverunt. Absinthium cum Romano Cymino in vino decoctum & calidum haustum ad tormina & stomachi dolores facit. Commemoratas facillates atque distillatæ adscribunt, quanquam non perinde validatum sit virum, quippe quæ infirmioribus & pueris [qui omnes fortes medicinas ferre nequeunt] exhiberi debeat, mensurâ quatuor aut quinque cochlearium. Absinthium contrarias habet vires, nam alium durum emollit, laxam verò coarctet. Opiliones flores Absinthii resciccatos, & cum sale tritos pecoribus & ouibus deuorandos obiciunt; nam ex longa observatione perceperunt, Absinthium omnibus internis affectionibus mederi, neque tantum dolores mitigare, sed & quævis noxia expellere quib⁹ nunquam pecora non minus quàm homines inter-

Locus & tempus

Turner
laxus

Vires

Appetitus

Tormina
Aggillat
na

Dos
Vires com
paria

*Dolor capiti
Oculi. Au-
res*

*Mures.
Cimices.*

Febres

*Sanguinis
Gomices.*

*Obstructiones
viscerum*

Succus

Aqua.

Syrupus.

Vinum.

stantur. Aqua Absinthii lineis linteolis temporibus illita, dolores sedat ca pitis, qui ex frigida oriuntur intemperie: eadem vespere instillata oculis & auribus, claritatem illorum adiuvat, & dolores harum tollit: dentium, auriumque dolores decoctum, vaporis sufficui compescit. Quidam succum Absinthii linimentis leuisticiorum, aduersus mures tuendi gratia imponunt. Absinthii aqua decoctum, cimices abigit, si illo inferiores leuisticæ partes illinantur, quod alia quoque amaræ herbæ præstant. Aduersus diuturnas & protergas febres, præsertim tertianas magno sepe numero præsidio fuisse testatur Dodonæus: neque enim ventriculum tantummodò confirmat, aut cibi appetentiam excitat, sed & iocinori robur conciliat, ac ipsum ab obstructionibus expedit, vitiosos humores per urinam expurgans. Conferre præterea Absinthium plurimum etiam his, qui ex liene sanguinem profusum vomunt. Pellit præterea & interaneorum vermes, non modo intro assumptum, sed & foris admotum, aduersatur omnibus: Vestes etiam à tinea conservantur: cum oleo corpori illitum culices abigit.

Solenander dixit se obseruasse, quibus in pagis circa sepes frequens Absinthium luxuriat, in iisdem habitatores obstructionibus naturalium viscerum, ventriculi infirmitate, suffusione bilis plurimum ita affectos, ut facile, nisi prædictæ herbæ vlu, viscerum meatus referentur, externaque bile eadè roborantur, firmenturque, in icterum primùm, post in aquam intercutè exoritur.

Gabr. Fallop. ad purganda corpora non fuit solitus vti Absinthio. tum quia leuicè admodum habere facultatem purgatoriam æstimabat, tum quia ingratum nimis iudicabat. Sed contrarium nos hodie experientia docet. Plura de Absinthio, qui desiderat, legat Aug. Ferrer. Castig. præct. med. cap. 3.

Absinthii succus fit in Vere, vel Autumno, foliis tritis atque expressis, deinde parua coctione & residua purgatus ante reposicionem in vase angustioris, superfuso oleo digiti crassitudine, vel in vesica inspissatus, seruatur per annum. Succus differt ab herba: hæc enim adstringit, ille verò magis aquosus detergit. Succum calidum ait Weckerus in primo gradu. Herba circa finem Maii colligitur, contunditur, atque in vini pauca quantitate maceratur per duos, vel tres dies: deinde in aquæ feruentis vapore destillatur: vel per se absq; vino distillatur. Ad eadè prædicatur ad quæ herba, ceu iam supra dictum. Aqua verò ex Absinthio vitreis organis & repente balneo elicita, stomachi & iecinoris infarctus mediocriter expedit, & quod in venis biliosus est, per urinas expurgat: iuuat arthros, menses morantes ciet: stomacho negotium non facit, capiti non nocet, auctore Ru-beo. Syrupus de Absinthio recipit Absinthii Romani lib. f. Rosarum rub. Vnc. ii. Spicæ Indicæ Drach. iii. Vini clari veteris, Succu citoniorum, singulorum lib. ii. semis. Macerantur in vase marmoreo, aut fictili, denso per noctem vnam: deinde decoquuntur. Colaturæ adduntur Sacchari l. ii. Ita conficit s. a. Mesues. Ventriculum roborat & iecur, aliaque instrumenta nutritionis, appetentiamque excitat: contra reum morbum prædest, flatu discutit, humorèque per urinam pellit.

Multiplicem atque adeò quotidianum, non modò ad voluptatem, ad honorem, ad luxum, ad ebrietatem, iam olim fuisse factitiorum vinorum apparatus, atque vsum Veteribus, sed ad conseruandam insuper & restituendam salutem, in pri-

mis necessarium, cum ex Dioscoride, Galeno, cæterisque Græcis, tum ex Columella, Constantino, Plinio, & aliis Latinis Scriptoribus, euidenter demonstrari potest. Qui etiam aliquot retrò annis, quorundam negligentia obliteratus sit, non propterea in vniuersum esse mittendus, quandoquidem haud penitenda auxilia, ex eo absque corporum labefactione, & fastidio consequi possint: ut meritò quispiam iuuandi proximi artem eximiam, in vino demitteretur. Hoc itaque nos cognoscentes, eiusmodi vinorum genera suis simplicibus passim inferimus, quorum præcipua in parvis affectibus, consuerudo, familiari culinariòque vsu & remedio, nobis esse queat. Proinde meritò de Absinthio, fama nunc plerisque omnibus celeberrimo, post hac agemus. Id variè paratur Dioscoridi, sex diuersis scilicet modis. Cæsar Constant. lib. 8. cap. 20. Absinthii Pontici tusi drachmas octo, linteolo non valde denso, ligatas in amphoram (quæ libras octoginta Romanas continet) vini conuincit. Plin. l. 14. c. 16. Absinthii similis libram, quadraginta musti sextantis, ad tertias coquit. Ita multiplices apud antiquos, huius condituræ vsus fuerunt, quæmadmodum etiam ætate nostra: nam quidam vindemiarum tempore, Absinthium vulgare nostrum recens, quidem atidum indeterminate potèdere in dolium mundum coniciences, mustum [quod omnino esse debet album, maturum, bene expressum] affundunt, & ita simul ad Solem feruendo, fermentandòque, per hyemem, seponunt. Interea si inde quippiam depromitur, rursus musto implentes, appetente tempore verno, colant. Alii initio multum lento igne coquant, cum Absinthio, ad tertias diligenter despumando, deinde torculari potenter exprimunt, & herbam in eodem musto renouant, postea donec defuerit, hiatu supernè relicto, sinunt: postremò studiosè occludunt, ne transpiret. Alii herbam sacculo comprehendentes, in feruidum mustum deponunt, simulque per fermentationem, Absinthium conuincunt. Qui sanè modi ut sunt efficacissimi in omni factitiorum vinorum genere, ita in primis retinendi ac conseruandi. Etenim quemvis odorem, colorem, ac saporem vinum simplex purum facile attrahit, quia calorem in se continet, quo alliciendi potentiam, naturamque obtinet. Sunt qui quouis anni statu, siccati Absinthii, linteolo deligati partem, vino defecato, pro suo quisque arbitrio, madefaciant, aut in eo ipso, occasione, siue necessitate sic ferente, ad horas aliquot, in vase occluso, suspendant, mox in vsum vertant. Nonnulli aromata admiscunt, velut necessarium arbitratu Cronenburgius, Veteres secutus. Breuiter, tot sunt hodie condiendi eius ritus, quot reperiuntur cenoplia, & hominum ingenia: nam vix paucos hodie inuenias, quos eadem parandi norma iuuet. Et notum est alioqui illud Horatianum lib. epist. 2.

Tres mihi conuiuia propè dissentire videntur
Poscentes vario, multum diuersa, palato.

Arnoldus Villanouanus Philosophus ac Medicus suo seculo doctissimus ad extremum libelli de vinis, hoc ipsum copioso elogio illustrauit. Aëtius quoque Amidenus triplici scriptura Absinthiaci præparationem, ad flatu & sterora euacuanda, ad bilem flauam, atque pituitam seorsum educendam, nobis scriptam reliquit, lib. 3. cap. 69. & sequentibus. A quo accepit Actuarius & Marcellus lib. de med. cap. 30. ponderibus rebûque subinde tamen mutatis. Sed admiratioque

Amph.

Abfin-

negra-

porit.

Vinu

plex

207/4p

quom

pram

scrip.

Abfin-

diue-

sione dignum in Aetii confectionibus, nullam fieri mentionem Absinthii, quod paucissimā quoque dosi intermiscuit Marcellus. Imperator Carolus, eius nominis quintus, quotannis vinum ex Absinthio parari iubens, libras xii. Absinthii, ad Amas binas multi apponit: huncque Absinthitis vini conficiendi modum Dioscorideis affinem tradit Cronenburgus. *Debent* autem in factitis vinis, semper vasa ad summum impleri, alioqui vina in acorem corrumpuntur.

Oleum Absinthium sic parabis. ꝥ Comarum Absinthii Vnc. iij. Olei omphacini lib. j. Insolata in vase vitreo, Absinthiumque murato ter, veluti de Mentha in oleo Menthae dicitur. Calefacit ac roborat ea, quae sunt refrigerata, potissimum verò ventriculū, excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbicisque enecat.

Sal Absinthii ita fit. Recipe Absinthii recentis quantum vis, tere, distilla aquam per alembicum, calcina faeces vase clauso, igne mediocri, quousque in cinerem siccum vertantur. Sitque ignis cautio, ne materia priuetur propria & radicali humiditate, quae non posset amplius nisi vinificatoriam dare fusionem. Redde aquam suae terrae, in humam in fimo, vel balneo aliquot dies, effunde cautē, ne faeces turbentur, deinde filtra, postremò euapora filtrationem. Omnibus ferè morbis exhibetur vtiliter, praesertim in peste: aquam intercutem educit: vrinam mouet, ventriculū corroborat: Gesnerus scriptum reliquit, Theophrastum tria salis Absinthiaci grana cum vino ægris exhibuisse. Mathaeus verò interdum drachmam dimidiam cum aqua Cardui Benedicti, interdum cum extracto Angelicae, vel syrupo Berberorum, non sine magna vrilitate, exhibuit. An verò sal Absinthii, theriacae, aliisque probatis antidotis praefertur debeat, quod nonnulli statuere videntur, id non facile dixerit. Hoc equidem affirmauerit, salem Absinthii putredinem potenter inhibere: à Theriaca verò mouendis sudoribus longè superari. Restat adhuc vnum, quod aliorum iudicio relinquit Mathaeus, an sal Absinthii fauces & palatum insipidum reddat. Habuit enim ægros de eo conquærentes. Certum equidem est, lixiuium, ex quo sal paratur, quemadmodum & alia vulgaria, manus ita afficere, vt sensum tactus ferè amittant, adeoque suspicari licet sal ipsum ingrato lauore fauces oblinire, vt de saporibus exactum iudicium ferre nequeant.


ABSINTHIUM VULGARE montanum.

Vulgari Absinthio tam radice, quam caulis, nec non foliis, floribusque prorsus est simile, sed exilius, ad summum duorum dodrantum altitudinem attingens, amaritudo illi, quae priori, sed gratior, & minus tetro abominabilique odore commendatur. Nascitur in montibus pluribus in locis.

Camer. descriptionis autor in Epit. & Hist. Matthioli vocat Absinthium montanum, Germ. *Bergwermut*, It. *Assenzo montano*, Hisp. *Alfena montesina*, Gall. *Aluigne de montagne*.

De hoc Dodon. in fol. lat. Absinthium latifolium reperitur in quibusdam frigidis Helueticorum montibus, quod præ calis rigore non attollitur, sed per terram serpit, vnde Supinum à nonnullis dicitur.

Tom. III.



ABSINTHIUM ARBORESCENS

Lobel. i.

Cap. LXIII.



Absinthium inspidum.

Meminit huius Cordus in Hist. sua de plant. lib. 2. cap. 82. his verbis. Absinthium dulce Artemisiā sapore æmulatur, figurā verò Absinthium: radice nititur similiter vt Absinthium perenni.

Tabern. in hist. part. 1. p. 26. de hoc ait: *Gaudy wermut*, Veteribus incognitum, potest dici *Græcè ὁ ἁλίσκος ὁ γαυρὸς*: Herb. triis Absinthium inspidum, saporis expers & fatuum. Italis *Assenzo*, *bas lurdo*: vulgari Absinthio in omnibus simile, ex-

C. Bauh. phyt. Absinthium 3. siue Ponticum montanum, siue vulgare, nisi quod exiliora omnia, & amaritudo gratior: Absinthium montanum Camer. in Epit. Matthioli. p. 453. Absinthium commune minus Gesnero.

Vulgari non ita folio & flore dissimile, sed fruticis arborci habitu, Abrotoni modo hominis proceritatem adipiscitur: candidiore & minore paullo folio, semper virente. In Belgio aliquando emoritur, ob Hyemis & calis inclementiam. Gustu amaro, aromatico, odore non ingrato.

Descriptio

Lobelio descripti dicitur in Obs. p. 435. & in Icon. Plant. p. 753. Absinthium arborescens, *Absinthium del Comasco* Anguillarae. Dod. lat. in fol. Abrotonum forma arborescens. Camer. apud Matth. Absinthium arborescens, inodorum, dulce. Tabern. Icon. & Hist. *Baum wermuth*, Absinthium arborescens, Ital. *Assenzo* de Comasco. C. Bauh. phyt. Abrotonum 12. siue latifolium arborescens, Anguillarae Absinthium del Camasso, Lobelio Absinthium arborescens.

Absinth.
spruce
Dod.

cepto quòd destituatur omni odore & sapore: colitur in Belgicis hortis.

Dodon. lat. in fol. Absinthium spurium exter-
num secundum, foliis, caulis, & floræ vulgare
latifolium refert, fed odore & sapore delituitur,
vnde infipidū appellatur, inodorum, & fatuum.
Quibus locis aut quā regione huiusmodi nāscat-
ur, nondum cognoui: in studioforum tantum
hortis à me reperitur. Si differat tantum odore
& sapore à vulgarī, ut Dodonæus & alii dicunt,
quid opus erat figurā, ac cæ, quæ ab aliis pro alia
planta ponitur nempe à Lobelio pro Artemisiā
specie.

Vidi (inquit apud Gesn. hort. Coudenbergius) Absinthium in alieno horto, vulgato tota facie, ac colore aded simile vndiquaque vt ouum ouo, planè tamen insipidum.

C. Banting,
Esq.

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 4. siue inſipidum
primum Geſnero, & Lobelio inſipidum, Pontico
ſupino ſimile, ſed guſtu exſpers. *ſed cur dicitur*
ſupino ſimile non video, quandoquidem præ-
cedentibus, vt apud Geſnerum, vulgato ſimile di-
citur.

Vires

Vt sapore & odore destituitur, ita vix vllius
qualitatis calidæ, multò minùs expurgatricis fa-
cultatis aliquid possidet. Summopere cauendū
esse monet Dodonæus, ne tale aliquod (si licubi
occurrit) pro legitimo colligatur. Odor perpe-
tuo consulendus, atque vnà sapor.

Canto.

ABSINTHIVM MARITIMVM LATIFOLI-
um, siue Matthioli.



nec ingrato sapore: *corymbi* lutei, minores, quàm
Absinthii vulgaris, *femine* minuto: *radix* ligne-
ficat.

An Hermolao Coroll. 452. Absinthium mari-
num, siue Seriphium, Absinthio quàm Abrotono
similius?

Marthiols
Absinthe
marina de-
scriptio.

Abrotanum Sandaracae, *Abfinthium maritimum*, cum
 primum e terra erumpit, inquit Matthioli, foli-
 ois eſt Abfinthio ſimili, caſſiore tamen. Sed
 poſtquam adoleuerit, & caules eiderit, mutatis
 in longum folioſiſque præſertim, quos vbiq[ue]
 caulem ambiunt, *Abrotonum* emulatur, non ta-
 men folioſiſ eſt aded parui. Semen proſext exi-
 guum, copioſumque, *Abrotoni* modo inter folia
 erumpens, atque in ſummitate caulis fere rac-
 moſum, amari & adſtringentis guſtus. Eadem

in post. comm. cum mag. fig. In Ital. vocat Affen-
marino. In Hift. vocat germ. ait. Meer-
mur proenit apud mare, minorâ habet folia cõ-
muni Abſinthio, præcipue in caulibus. Hæc folia
magnas habent diuifuras, cinericio ſunt colo-
re, & laporis amarib; vna radice multos emit-
tit caules, tenues, rotundos, albicantes, qui in ex-
tremitatibus ferunt femina denſa, lutea, & ama-
ra, multo minorâ quàm in alijs generibus. Mul-
tas habet tenues radices, non profundas : tota
planta grauis odoris, nonnihil adſtringit. Eadem
habet Matthioli in Epit.

Nullibi Absinthium maritimum vidi (inquit Turn. part. 1. p. n.) tam lato folio, ut exhibet Icon Matthioli. Existimo cum loco Absinthii maritimi proponere legitimam Artemisiam, quam in Italia in littoribus vidi.

Lobel. in *Aduersf. Artemisia maritimam* (ita quoque in *Icon. Plant.* p. 765.) vocat, cuiusque seminem similis *Abinthio* communi quam *Artemisia* tradit. In *Obf.* p. 436. *Scirpium* vulgare, *Dioscoridis* perperam putatum : *Artemisia marina tenuifolia*. P. 441. picturam habet pro *Artemisia marina Aduersf.* p. 441. et duabus picturis foliorum varietatem demonstrat.

Hist. Lugdun. pag. 943. a. *abinthium* Seriphium, seu marinum Matthioli. Pag. 946. a. *abinthium angustifolium* Dodonæi, quod plerique *abinthium* Santonicum esse volunt: alii a *remisiam* marinam. Pag. 951. a. *remisiam* marina Lobelii, quam pictam dedi nomine *Abinthii angustifolii* Dodonæi. Hæc bone vir, si pictam dedisti, cur eam repetis: tres figuras, tresque descriptiones, vnus plantæ habes.

An Clusio in Pannon. & H. post. Absinthium
marinum Patavinum.

C. Bauhin. Phyt. Absinthium n. siue maritimum
Lauendulæ folio, ludens foliis, in hortos trans-
latum, Patauî collectum.

Tabern.Icon.& H. *Artemisia marina*, Meer
 Beyfus. Item: *Artemisia marina* maior, folio
Artemisia angustiore & minore: *Artemisia marina*
 minor, folio *Laucudula*. *Tabernamontanus*
 habet figurā tantū vnam ex *Matthiolinis*, *Ab-*
sinthii eius marini folio non vifo: an bene autem
 diffinxit iudicent Lectores.


Abfinthium maritimum vidi *Eflinge* apud in-
fignem pharmacopoeae Volmarium, ex cuius
ramo effe pictura per Camerarium polita in Hift.
germ. & *Epit. Marthioli*, vti iam dictum, in qua
parte folia erant fimplicia & non diuifa: *Abfinthium*
hoc *Seriphii* folia fuperiora habet *Efleré*
fimilia, candida, hirtula. Vidi *Parauii*
in horto *D. Cortufii* in quo mirabiliter variant
folia: quædam enim inferiorum non funt diuifa,
quædam verò funt diuifa. Eadem varias in fu-
perioribus quoque cernitur. Idem, ni fallor, co-
fpexi in horto *D. Robin hortulanii* regii *Lutetiæ*,
& poftea apud *Generof. D. à Schvende* in *Bour-*
cade ad *Rhenum*, à quo habui plantandū in hortum
Ill. E. C. Witt. Montbelgardi: vidi etiam *Efl-*
linge. Si Matthiolo credimus, *Seriphium* pro-
uenit in quâ plurimis tam *Tyrrheni*, quàm *A-*
driatici Pelagi littoribus, præfertimque *Aquile-*
nſibus & *Tergentiſis*.

Calidum siccum esse scribit Dodonæus, sed tamen haud intense, multò certè minùs, quàm vel Absinthium, vel Lauendulam.

Absinthium Seriphium Turneri.
Absinthium vulgare, inquit Turn. part. 1. pag. 7.
 maius est, grauioris odoris, minusque adstringens

gens, quàm Seriphium. Cùm igitur Seriphium maius sit, minùs habeat adstrictionis, grauiori- que sit odore quàm Ponticum, vulgareque in omnibus hisce superet Seriphium, necessariò sequitur Ponticum differe à vulgari, non tantùm natalibus, sed etiam magnitudine, odore, adstrictione ac illud docetur falsum esse, quod ait A-matus, nempe Ponticum maius & procerius esse vulgari bus Abfinthiis, cùm apertè Galenus cõ-trarium doceat. Idem p. 9. Alterum Abfinthii genus, dicitur *Abfinthion maritimum*, Latinis Abfinthium marinum, aut Seriphium, etiam in quibusdam codicibus inueniam Seriphium. Verùm cùm Seriphus ipsa insula sit, videtur Seriphium potiùs nominandum esse Abfinthium; veluti tanam dicimus Seriphiam, hoc est, mutam, &c.

ABSINTHIUM PONTICVM vulgare, foliis inferius albo.



melini, foliis vehementiorem spirant odorem.

Abfinthii Pontici duplex genus tradit Clusius tam in Pannon. quàm Hist. postrema. Vnum enim planè incanum est, quo potissimùm Vienne-ses officinæ vtuntur, tanquam nobiliore, ita

enim tibi, persuadent. Alterum purpurascens habet cauliculos, folia non aded incana, sed interna parte viridiora: id à nonnullis superiori præferretur: existimo tamen naturales istam varietatem duntaxat parere.

An S. Iulio in Mef. lib. 1. cap. 12. Abfinthium Ponticum seu Cappadocicum Dioscoridis & Galeni dicitur, Melue Romanum? An eidem de compof. med. Ponticum, quod Romanum Mesuem vocare scribit, quodque hodie passim videri testatur?

Cordo in Hist. nominatur Abrotonum candidum, seu fœmina, & hoc titulo ab eo etiam describitur. Gesnerus addidit figuram, quæ non satisfact.

Abfinthii multa sunt genera, inquit. Fuch. de comp. med. lib. 1. vbi autem apud Veteres Abfinthii mentio incidit, non vulgare & quod omnibus notum est, vsurpandum erit, sed Ponticum: quod non est, nisi id quo hæcenus Seplasiarii pro Abrotono fœmina ad sua medicamenta vsi sunt. Comam tantùm cum floribus ad medicamentorum confectionem adhibemus.

Pro Abrotono minori describitur à Trago in Hist. lat. In Hist. verò germ. vocat *Ein schön Stabwurz*, existimauitque primò (& rectè) esse Abfinthium, nunc verò Abrotonum Theophrasti lib. 6. cap. 7. esse posse sibi (falsò) imaginatur.

Matth. in Icon. Abfinthium Ponticum, Græcis *Abfinthion ponticum*, Ital. *Asenso Pontico*, in Hist. germ. *Pontischer wormurz*. Camer. ad Epit. Matth. ponit nouam iconem, Abfinthii titulo; Ad eiusdè verò Hist. germ. duas icones, quas Matthioli figuræ non præferimus. Ponimus & nos duas, nò vt diuersarum plantarum, sed quia ita sculptas accepimus.

Gesn. de hort. Abrotonum fœmina à Cordo existimata, Abfinthii genus potiùs. An eidem Abfinthium Romanum officinarum Couden-bergio? Eidem Abfinthium Ponticum Fuchsi, non multi amaroris, spontè proueniens Tubingæ, adstrictionis cuiusdam particeps.

Ex Galeni lib. 11. m. m. & 6. simpl. patet, inquit part. 1. p. 7. Turnerus eam plantam, quæ in Anglia Occidentali *Herbe Cypres*, i. e. Cyparissus, vel Cupressus herba dicitur, circa Londinum Abfinthium Romanum; Pharmacopœis Antuerpiensis & Mesuæ Abfinthium Romanum, Coloniensibus *Graue cruyt* esse verum Abfinthium Ponticum, neque magnum illud vulgatum fœtidum Abfinthium, esse Abfinthium illud, quod pro Pontico proponit Galenus. Et pòst, si Matthioli, sicuti debuit, Galeni auctoritatem curasset, debuisset, quodlibet trium (præter vulgare Abfinthium) Abfinthiorum, aut duorum saltem pro Pontico recipere potiùs, quàm vulgare: cùm præsertim vidisset duo hæc genera, vnum quidem Romæ, alterum aut in Italia, aut in Germania, aut saltem apud recentiores Germanos, præcipuè Fuchsi, & Tragum, sub nomine Abrotoni fœminæ descriptum. Item p. 12. Herbâ illâ, quam olim Santonicum Abfinthium credidi, puto fuisse Romanum mihi tum temporis ignotum.

Dod. Gall. Abfinthium Ponticum. Lat. in fol. p. 24. Abfinthium tenuifolium, quod ait vulgò Romanum Abfinthium, & *Roosche Abs* seu appellari, & hoc nomine compluribus medicinarum facientibus ac pharmacopœis innouisse, qui hoc Abfinthio Pontici loco vtantur. Videri verò Ponticum illud esse, quod à Galeno m. m. n. descriptum sit. Differens porrò hoc Ponticum

Abrot. vidi-
didum seu
fœmina
Cordo.

Abfinth. Ge-
nerum 1. m.
chisio.

Abfinth.
Pont. Matth.
chisio.

Ad asens. Pont.

esse, ab eo, quod à Dioscoride cōmendetur. Nam Dioscoridis Ponticum, ex primi generis, siue Latifolii Absinthii esse numero: Quod & Galeni 7. simpl. cap. de Abrotono affirmet.

*Absinth.
Romanum
Cronem-
b. 18. 9*

Cronenburg. Absinthium Romanum, quod alio nomine Ponticum vocari ait, ac multo minus amarum dicit, in compos. med. accipit, simpliciterque Absinthium intelligi tradit.

Lob. in Obs. p. 436. pingit his nominibus, Dioscoridis Galatium Sardonium Absinthium, perperam Santicum vulgi, est Absinthium Romanum falso creditum, Abrotonum candidum Cordi, & femina Fuchsi, foliis & similitudine quadam Achilles, Ponticum Absinthium Dod. & Fuchsi. Santicum Ruellii. In Icon. Plant. pag. 755. hoc titulo. Absinthium Galatium Sardonium Dioscoridis.

Cæsalpino dicitur Absinthium Santicum virens in horto Pisano, allatum ex Gallia, ubi indigenæ Abrotonum vocant.

Tabern. Icon. & Hist. Absinthium Ponticum Galeni, *Pontischer wermuth*: Absinthium minus, Absinth. tenuifolium, Auerthoe Absinthii, *welschen wermuth vnd Grabkraut*.

C. Bauh. Phyt. Absinthium 6. siue Ponticum tenuifolium incanum.

*Locus &
tempus.*

Horto Lusit. Absinth. Ponticum vulgare.

Matthioli.

Absinthium Ponticum, inquit Matth. nascitur plurimum in Ponto: quin etiam in Vngaria & Bohemia. Temere quidem meo iudicio asserit Matthiolus in Ponto provenire, quasi ibi observarit. Idem fortè facit Dodonæus, cum ait. In Mysia, Thracia, Pannonia, aliisque vicinis regionibus frequens: in Belgio & Britannia hortenfe est: Autumno flores, seménque profert, paulò post Hieme aduentante herba marcescit, vegeta interim radice, à qua Vere folia caulēque rufos exeunt. Nonnullis Germaniæ locis frequēs, teste Lobelio, in Fladria & Angliæ hortis copiosa, & vfu multo experta. In Galliis etiam aud o haberi in hortis copiosè. Tubinge spontaneum est, non longè à fluvio Nicaro. Florentiæ in horto Nicolai Ferrariensis: Lugduni in hortis frequens, vt & Genevæ, ubi vocant *du prim ferr*: Montbelgardi *du petit Cypres*. Absinthium tenuifolium quod doctissimis Medicis & Pharmacopœis Romanum dicitur provenit in Germania apud Wormaciam, non longè à pago *baseloch*, item circa Spiram apud locum dictū *heylog graben* / authore Turnero. In Anglia verò, Frisia, & Germania inferiore, quod idem sciat, in hortis duntaxat nascitur. Spontè crefcit non solum multis Pannoniæ, sed etiam Austriæ locis atque Viennensi agro, cum in Saxosis, & tum in salebrosis graminisq; desertis agris, auctore Clusio.

*Vires &
Vilus*

Hydrop.

Ponticum Absinthium efficacem vim obrinet ad aquam intercutem, vt Matthiolus iam sæpius experimento compertum se habere scribit. Equidem quoddam se novisse ait hydropicos quasi depulatos, qui ex longo esu comarum eius, quæ ex saccharo adseruatæ fuerant, sanitati restituti sint. Eius parandi ratio hæc est. Sumito comarum recentium Absinthii Pontici libram vnam: Sacchari albiissimi libras tres. Comas illas tundito in mortario lapideo: deinde iis optimè tustis saccharum in pulverem tritum adiditico. Rursus omnia simul tantisper tundito, donec in vnu corpus redigantur: & deinde pixide vitrea recondita insolentur per mensem. Ex Absinthio ita saccharato, semuncia quotidie assumatur tribus

horis ante cibum. Lobelius ridens Matthiolū ait: No mische Absen conferuam, inofficinis Antuerpianis & Belgicis paratam, mulierculæ multo medicæ & clinicæ libentius emunt, quia non ita amarā, facilius deglutiant: Deceptæ quidē, nam si caret amarore, igitur & facultate amica, & grato colore. Calidum est ac siccum, inquit Dodonæus, amaritudinis quoque, sed multo minoris, quā latifolium (Absinthium), adstringendi autem vis in eo superat. Vino impositam vetriculo vtilem statuit Camerarius.

ABSINTHIUM SPECIES QVIBVS DAM,
Chamaemelum Chrysanthemum Fuchsi.
CAP. LXIV.



*Singulati
Defici*
Simplice & Singulati est caule, ferè cubitali, tereti, glabro, per quem ex interuallis folia nascuntur, Chamaemeli nobilis similia, tenuiter incisa: paulò supra medium caulem summo tenus, alternatim pullulant flores, corymbis Abrotoni similes, inferiores quidē semuncialib.

& longioribus pediculis nixi, superiores verò breuissimis hærent, & veluti cauli apprimuntur: radix lignosa, tortuosa, multistida, fibrata.

Chamaemelum chrysanthemū vocabat descripram iam plantā Fuchsius, cum apud eū esset: Vidi olim & collegi Eslingæ in horto D. Volmarii Pharmacopœi.

Dod. in fol. lat. pag. 32. Reperitur in quibusdā frigidis Helueticorum montibus, quod præ cœli rigore non attollitur, sed per terram serpit, vnde supinum à nonnullis dicitur.

Lob. Obs. p. 434. Absinthium Ponticum supinum Herbatiou n, cathulicis procumbentibus, vnde supinum vocatur, folio & semine Absinthii arborescētis, odore suauissimo, gustu aromatico, amaricante.

Tabern. Icon. & Hist. Absinthium repens, *frieder wermuth* / absinthium arborescenti simile, Absinthium supinum siue minus supinum.

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 2. siue Ponticum supinum, Gesnero supinum, & Lob. Ponticum supinum. Item Absinthium 7. siue Ponticum repens, Absinthium repens Tabern. quod Eslingæ in horto D. Volmarii repentis nomine accepti, inquit C. Bauh. licet sint qui Chrysanthemum vocitent.

ABSINTHIUM PONTICVM ET ROMANVM
quibusdam, aliis Seriphium, & variè de eo sentientia.
CAP. LXV.

Absinthium hoc attulit mihi frater C. Bauhinus, qui Absinthium marinum ex Lio tūc denomi-

denominabat, ac aliquatenus nostrati simile aiebat, foliis minoribus, diuisis longioribus, tenuioribus, & angustioribus multo, candidis.

Dedit hoc idem Metis D.S. Albinus Medicus insignis iā dicto tirulo. Claudius verò Rocardus insignis Pharmacopœus, qui libellum de Absinthii doctissimum conscripsit, Troiæ mihi obtulit pro Pontico vero eandem plantam, & aliam pro Romano valde similem.

Camer. apud Matthiolum in Hist. germ. & Epit. Absinthium Seriphium vulgò dictum, habet folium separatum pictum, quod responderet Absinthii prædictis.

Absinthium murale Monachorum in Mef. dist. 6. cenf. 179.

Turn. part. 1. p. 6. Alterum Pontici Absinthii genus in rudibus Romanis proueniens. Figuram autem habet, cui titulum fecit, Absinthium Ponticum Romanum, ex qua nihil certi colligere possum, quia mala: præterea eandem iterum ponit p. 10. pro Absinthio marino.

Gesn. de hort. Coudenbergius in Epist. ad me. Absinthii Romani [inquit] ramulum, dedi olim Guill. Turnero qui Anglico suo herbario eius imaginem inseruit: sed perit mihi tum plāra absque femine, Hyemis iniuriā, nec id deinceps quauis diligentia licuit recuperare. Forma tota cum vulgato Absinthio conueniebat, foliis tantum paulo minoribus. Romæ semen accepit.

Anguill. epist. 10. de hoc dicit: Absinthium Sardonium, quamuis multi Santonicum vocant. In ea Franciæ parte nullum inuenitur Absinthium, quod descriptioni Dioscoridis respondeat. Galaria est in Asia nunc Natoria dicta, in qua Sardorum regio: Absinthium ibi nascens idem est, cum eo quod inuenitur in Bosnia & in Hungaria, respondens descriptioni Dioscoridis. Hoc non reperitur, nec in Francia, nec in Italia.

Dodon. gall. Absinthium Ponticum quibusdā, in his regionibus [in Gallia] in quorundam hortis.

C. Bauh. phyt. p. 670. Absinthium Ponticum Belli, Absinthium Creticum, de quo hæc Bellus ex Creta scripsit. Absinthium in hac insula frequentissime prouenit, perpetuoque viret, odorem gratum spirat, nihilque amarum est, aut si quam licum amaritudinem habet (in viridi enim nulla percipitur) ea valde obscura est. Absinis & pecoribus, omnibusque brutis valde expetitur. Folia tenuia profere & multum diuisa. Ego legitimum Ponticum esse existimo. Vocatur ἀπθία Aptia, & non ἀσθία, quemadmodum Anguillarus in Græcia vocari aliquando perperam scripsit.

Tab. Icon. & Hist. part. 1. p. 1. Bergwer muth / aut Römischer weimuth / Absinthium montanum, seu Romanum: differt tantum à vulgari paruitate: est enim duos aut tres palmos altum, eadem amaritudo, sed gratio, odor non ita grauis: prouenit passim in multis Germaniæ locis montosis, hoc esset semper à Medicis & pharmacopœis fumendum: eo tamen deficiente accipiendum quod supra muros prouenit, & in ruinis, aut saltem in agris siccis, & soli expositis. Absinthium montanum peritis Medicis, & circa stirpes bene versatis. Dioscoridi, Aërio, & Paulo Æginetæ Absinthium Ponticum, Melue Romanum, Plinio Absinthium Italicum: & quamuis prædictis præferatur Ponticum. III.

cum, Romanum & Italicum, quod vnum & idē Absinthium est, nostrum montanum nihilominus formā & viribus non differt, nec necesse est Ponto, vel Italia accersere. Errant qui discrimen quaerunt. Serapioni cap. 14. simpl. & Mesarugie Arabico Medico apud eum Cuscute Romanum. Hæc Tabernamontanus, qui pro Absinthio montano, Lobelii figuram habet, cui titulus, Absinthium vulgare Ponticum Ruellii & Dodonæi Absinthium latifolium: quod Turnerus posuit pro Pontico & Seriphio, ponit pro Absinthio marino.

An Celsap. lib. 12. cap. 2. Absinthii alterum genus in collibus argillosis, ubi alia nulla viuit planta, frequens in agro Senensi? Hoc breuius, inquit, at multo tenuius vulgari: paucioribus ramis, ac feminibus odoris minus ingrati, ac saporis. Ex Dioscoridis, Galeni & Plinii verbis patet, Absinthium hoc exiguum, quod apud nos incultis nascitur argillosis locis, esse quale Ponticum traditur.

ABSINTHIUM SERIPHIMUM TENNIFOLIUM marinum Narbonense.

CAP LXVI.



Absinthium quod Seriphium Dioscoridis legitimum mihi videtur, multis fruticat virgulis, cubitalibus, lignescentibus, incanis: per quos folia sunt crebra, tenuissima dissecta, latiora tamen quam Alpini Absinthii Gesneriani, cuius foliis alioqui sunt satis similia, minus tamen candi-

da sunt mei Seriphii, sapore salsuginoso cum amaritudine; at primum pullulantia, succulenta sunt & viridia: semine grauidum euadit minuto.

Clus. in Pannon. p. 554. & Hist. post. nominat Absinthium Seriphium Narbonense & hispanicum, ac id se nusquam nisi in mediterranei maris littoribus obseruasse meminit: hoc præterea graucolentia atque sapore Misnense superare ait.

Eadem ferè Dodonæus tradit. Absinthium Seriphium, inquit, circa littora exit maris mediterranei in plerisque Europæ prouincijs, veluti in Narbonensi Gallia, graucolentius est, ac minus candicat, quam Seriphium Belgicum.

An Camer. ad Epit. Matth. p. 457. & ad Hist. germ. tabellam habet hoc titulo: Absinthii Santonici species maiuscula & longiusculis folijs.

Miror à Lobelio tum in aduersariis tum in Observationibus omisam nostram plantam, de qua hoc capite verba facimus, nisi voluerit eam

comprehendere sub *Seriphio* vulgari: ait enim *Abſinthium* Xantonium vulgare in Gallia, non multum differre à *Seriphio* vulgari.

Dodon. *Abſinthium* *Seriphium*, circa littora exiens maris mediterranei in plerisque Europæ prouinciis.

An Cl. Roccardo *Abſinthium* tertium marinum?

C. Bauhin. Phyt. *Abſinthium* 13. siue *Seriphium* Gallicum, vel primum: *Abſinth.* *Seriphium* tenuifolium Io. Bauhino libello de *Abſinthii*.

An Anguill. *Abſinth.* *Seriphium* & marinum? An Bellonio Obs. lib. 2. cap. 66. *Abſinth.* *Seriphium*: cap. 95. & cap. 112. *Abſinth.* marinum & *Seriphium* marinum? An Tabern. Hist. part. 2. pag. 28. Paruum genus *Abſinthii*, pulchrum instar parui arboris, altitudinis tantum digiti, foliis similibus *Abſinthio* montano, sed multo minoribus, quod quibusdam Tiberiadicum & Genezarethicum dicitur.

Ruellius, Cornarius, & Cordus aiunt, semen contra vermes, vel *Barbatnam* esse semen *Seriphii*, quod non impugnamus. Anguillara verò ait Herbam esse *Abrotono* similem quæ semen contra vermes ferat.

Abſinthium *Seriphium* semine prægnans obseruauit mense Augusto circa mare Mœpeli. Vidi præterea Florentiæ in horto Nicolai Ferrarini.

ABSINTHIUM SERIPHIVM GERMANICUM succulento folio siue *Misnicum*.

CAP. LXVII.

Descriptio

Abſinth.
marinum
Mysienſe
Cluſio

Multifida habet folia, succulenta, non minus quam *Abſinthium* marinum Patavinum incana, proximè ad *Seriphii*, in Belgicæ & Angliæ maritimis nascentis, folia accedentia, grauioris tamen paulò, & validioris, vt Cluſio videtur (qui *Abſinth.* marinum *Misnense* vocat) odoris. *Seriphii* Naubonenſis & Hispanici graueolentiam quodammodo referentis, atque etiam saporem.

An apud Cordum Gesn. in annot. lib. 3. cap. 27. in Diosc. hoc intelligit dum ait. *Abſinthium* marinum referunt etiam in Germaniæ ora, vt Seeburgi inueniri? An eadem de hort. *Abſinthium* *Seriphium*?

Abſinth.
Seriph. germanicum
C. B.

Abſinth.
marinum
Bononiæ
Camer.

C. Bauh. Phyt. *Abſinthium* 14. siue *Seriphium* Germanicum vel secundum. Camer. apud Matthioli in Hist. Germ. & Epit. pag. 456. tabellam habet sub titulo *Abſinthii* marini, in qua portio picta notata litera H ac ibidem annotatum, *Abſinthium* aliud Bononiæ marinum dictum, foliis minus candidis, saluginosis cum amaritudine, abundat seminibus paruis: cubitalis est planta, multos ramulos habens: folia primum succulenta sunt & viridia, vt solet marinis stirpibus euenire. Considerandum an sit *Abſinthium* *Misnicum* ex Cluſio modo descriptum, vel Belgicum, de quo nunc dicendum.

ABSINTHIUM SERIPHIVM BELGICVM.

CAP. LXVIII.

Misit hanc plantam nobis siccam ex Angliæ Londino, Medicinæ Doctor & rei Botanice studiosissimus Scotus, Iacob. Gargillus hoc titulo & hac descriptione. *Abſinthium* marinum

Anglorum, admodum lanuginosum & incanum, diuisurâ foliorum *Abſinthii* Pontici seu vulgaris, sed segmentis concinnioribus, angustâ Romanum dictum prouocantibus: sapor minimè ingratus, aromaticus quodammodo, maiorem adstrictionem, quam amarorem respiciens, cuiusmodi ferè est *Abſinthii* Romani vulgò dicti: odorè nullum spirat: colitur in horto Gerardus Chirurgus & Botanicus, cui nunquam florere.

Nos planè simile obseruauimus Lutetiæ in Aluod. cultiff. horto Io. Robini hortulani regii anno 1586. lo. quod nondum florebat, id etiam aliquot annis post misit plantandum Montbelgardi in horto Ill. E. C. id veluti rependo se plurimum multiplicat, hiemem perferens non reconditum, vt pluribus annis durans.

Dodon. gall. lib. 1. cap. 2. *Seriphium*, *Aluine* marine inscribit, vocatque græcè *ἀλυσίνιον* & *αλυσίνιον*, ac dicit. *Abſinthium* marinum incognitum Pharmacopœis, quamuis vendant quotidie semen, quod officinis dicitur Semen sanctum, Semen lumbricorum, & semen contra vermes: *Abſinthium* marinum prouenit copiosè per totam Zelandiam, & in Flandriâ circa mare, & quibusdam Brabantiae locis: albicans est, aut cinereum, multa folia habet, alba, similia *Abſinthio* communi, sed multo minora, tenuiora, candidiora, tenuius incisa, multos flores paruis globulis similes & femina similia vulgari *Abſinthio*: creſcit ad altitudinem pedis & semis, ac etiâ altius: odore est graui, salſi verò saporis, grati & amari, suo natali loco collectum, translatum verò in hortos & terram vbi aquæ dulces, multum variat saporem & naturam. Is in Hist. gall. in descriptione aiebat *Seriphium* suum esse odore forti, sapore salſo, amaro, & ingrato, quæ conueniebant nostro *Abſinthio* Naubonenſi: In Hist. verò Lat. ea omittit [merito sine] nec repetit ex ea colligi semen contra lumbricos officinarum, rectè autem calidum quoque ac siccum naturâ statuit. Omisſa inſuper iconem suâ priore, quam in Gallica exhibebat, ponit aliâ quæ apud Lobelium nomine *Abſinthii* Pontici Tridentini (*Abſinthii* tenuifolii albi) habetur, & etiam est apud Cluſium in Pannonicis pro Austriaco tenuifolio.

Ex his ita dictis patet, meritò Lobelium in *Seriphio* Aduersariis dixisse perperam fuisse agnitum *Seriphium* Dodonæo. Quam verò aptè Artemisiæ speciem constituat, iudicent alii. *Seriphium* vulgare [inquit in Obs. pag. 436.] Dioscoridis perperam putatum, Artemisia marina tenuifolia. Artemisiæ tenuifoliam potius refert, minutissimis incisis foliis albis, semine & floribus: odore Lauendulæ & *Abrotono* proximis, vel Artemisiæ marinæ. Et paulò post. Xantonium vulgare, è Xantonum Gallorum agro, *Saintonge* vernaculè. *Seriphio* vulgari non ita abſimile, longiore & viridiorè folio, ingrati saporis, & grauioris odoris. Belgis hortensè apud Io. Muttonum. Icon. Plant. pag. 755. *Seriphium* vulgare perperam Dioscoridis. Figura hæc Lobelii apud Platanum particularis & diuersa est, ab utraque à Dodonæo posita, ita vt me lateat, an Lobelius eandem intelligat, quam Dodonæus.

Cluſ. Pannon. & Hist. post. *Abſinthium* marinum, siue *Seriphium* in Belgicæ & Angliæ maritimis. H. Lugd. pag. 944. *Seriphium* *Abſinthium* Dodonæi. Tabern. Icon. & Hist. *Abſinthium* marinum, *Alter* wormur. An huc referendum sit hoc Tabernamontani *Abſinthium*, videndum ex eius Historia: figura est ex Turnero, qui bis eandem

eandem posuit, ut dictum, semel pro Absinthio Pontico: secundo pro Absinthio marino.

C. Bauh. phyt. Absinthium 15. siue Seriphium Belgicum, vel tertium, Leuino Lemnio in herbis Biblic. cap. 17. Absinth. marinum apud Belgas in Oceani crepidine passim obuim.

An Cordo in Sylua Obs. Seriphium, i.e. Absinthium marinum ad lacum prope Seburgum? An Camer. in Hist. geron. Matthioli, & eiusdem Epit. Absinthium Seriphium vulgo, illud scilicet quod hoc signo λ notatum est:

Cronenburgum de comp. med. lib. 3. in syr. ex Absinthio hoc intelligere credibile est, dum ait: Seriphium nunc quoque passim nascitur; iuxta maris Hollandici litora, odore foetenti grauissimoque: eo plerique tineas & vermes necant, ob idque semen lumbricorum, ac mortem appellant: quamquam alii peculiariter eam vim Santonico attribuant: unde etiam Semen sanctum dici capit. Fallitur Cronenburgius: semen quod contra vermes appellamus, non ex hac planta colligitur.

ABSINTHIUM VALLESIANVM

tenuifolium candidum siue Herba alba.

CAP. LXIX.



Quo tempore D. Gesnero Tiguri familiariter videbar, Vallesiani nomenclatura Absinthium quoddam eapropter indigitabat, quod in Seduno Vallesiano vicinis collibus frequens oriatur: lignosi ramis tomento denso & albedo pubescentes, mollitie delicata, id quod in foliis quoque non

minus observatur, ad Seriphii Absinthii folia, diuisionum minutis caeluris, accedentibus, utique tamen angustioribus: flores; nisi quod magnitudine cedant, similes quoque: odor aromaticus.

Absinthii genus quod in Vallesia [Heluetiorum regione, inter Rhodani ortum & Lemnolum lacum] in collibus apricis circa Sedunum (Herba alba nomine vulgari notum) nascitur Caphura quodam odore. Id ex semine facile & pulchre mihi provenit, inquit Gesnerus de hortis. Floret eodem anno, quo latum, sed sero: nempe Autumno, si Vere seratur, unde herbam annuam esse suspicatus sum: sed haec dum scriberem in Iunium sine, anni superioris Vere facta planta nondum florebat: ut illas quae primo Autumno floruerunt, praecoces & praepropos flores edidisse existimem. Sata in fine Veris ad florem non peruenit. Absinthium Seriphium feminam hoc appellatim, vel mediterraneum: nam color albus, & vis aliquantulum minor, quam maritimi (alioqui similis odore saporeque.)

Ton. III.

feminam mihi designare videntur. Huius, quod sciam, haecenus nemo mentione fecit, multis autem quidem modis in re medica foeliciter eius vltum esse posse experimento didici. Hiemes in hortis quamvis asperas perfert. Idem in app. Absinthium album e Vallesia appellat, & vix ultra biennium in hortis durare ait. Negat tandem in Epit. ad me esse Absinthium Ponticum, ique minorem, quam ceteris adstrictionem attribuit.

De hoc Dodonaeus loquitur in Hist. lat. p. 26. Absinth. dicens. Ex Spuriis Absinthiis, quae non abs re externa appellari possunt, Herba alba ab Heluetiis appellata, vel prima occurrit: Tota haec mollis, veluti lanuginosa atque albida est, & Seriphio siue Marino Absinthio assimilis, sed candidior, odore & sapore quoque satis refert, sed tamen aliquantulum suauior, ad Caphura odorem accedens. In Vallesia prope Sedunum in collibus nasci scribit Gesnerus, &c.

C. Bauh. phyt. Absinthium 18. siue album foliis Seriphii.

Facultate Herba alba, ut Dodon. refert, caloris & siccitatis cuiusdam exiguae participes est.

ABSINTHIUM AVSTRIACVM

tenuifolium.

CAP. LXX.



Huius pedalem altitudinem plerumque aequat, nonnullam cubilem attingit, firmus, cancellatus, multis foliis, marini Belgarum Absinthii foliorum quodammodo emulans, tenuioribus, proflus incanis, quae confuso ordine eum ambiunt, praeditus, qui superiore parte

in multos ramulos, ex tenuiorum adhuc foliorum alis nascentes, diuiditur, plenos sustentulorum propendentium corymbis: radix fibrillosa est, & singulis annis nouos frequentioresque producit: tota planta impenitus amara est, sed elegans & rara.

Absinthium hoc tenuifolium Austriacum Clusii; descriptionis auctoris, crescit in collibus & apertis quibusdam locis Viennensi urbi vicinis, atque a Rhizotomis promiscue cum eo, quod vulgo Ponticum appellatur, ad Viennensium pharmacopolarum officinas adfertur. Haec ex Clusio, cuius figura in Pannon. male ponitur. p. 556. nomine Absinthii montani umbelliferi, quod pingitur p. 557. Clusii porro figura apud Dodonaeum pro Absinthio Seriphio. Licet autem haec nonnulli dubit nobis pariant, suspicamur tamen Tridentinum & Clusii tenuifolium idem esse:

Z. 2

Tabern. Icon. & Hist. Absinthium Nabatharum Auicennæ, *Alexandrischer weinwurz*: foliis parvis tenuiter diuisis, albicantibus: odore grato, aromatico: sapore amaricante & adstringente: Hoc Medici Tridentini videntur pro Pontico, cuius loco etiam ponendum: quandoquidem Pontico viribus par est: apud nos spontè non prouenit: in Belgio frequens in hortis, priùs vidi Bruxellæ in horto. Hæc Tabernamontanus, qui figuram Lobelii habet.

Absinth Seriphium Dod. l. c. quoad figuram. Mouentur quædam dubia.

Dodonæo Absinthium Seriphium quoad figuram, non autem descriptione, quæ est Absinthii Seriphii Belgici.

Casp. Bauhin. Phyt. Absinthium 17. siue tenuifolium albicans.

Considerandum proponimus, quantum & in quibus differat hoc Absinthium Austriacæ Clusii, ab Absinthio Valesiano Gesneri. An Anguillare Absinthium marinum? An etiam Belionii Obler. lib. 2. variis capitibus Absinthium Seriphium: & Absinthium marinum?

LUMBRICORVM SEMEN.

CAP. LXXI.

Lumbricorum semen vulgare & Matthioli.

Descriptio



Lumbricorum semen Rauwolfii.



Absinth. Santon. Rauwolfii

Quod in officinis prostat Lumbricorum semen vulgè dictum, ex variis, minutissimisque furculis, foliis, & semine ipso coaceruatū est. Semen parvū est, oblongū (maiora tamē inter ea Milio supparia, ex squarosis tunniculis compacta, pullū vel flauescēs. At quæ minutula inter ea sunt foliola, striata sunt. Quædam etiā obleruantur trifida, angustiora, acuminata, videntur etiam adesse portiones tenuissimorum cauliculorum. Omnia facile digitis atteruntur, amara sunt cum acrimonia & odore grauiusculo.

Absinthii Santonicum, inquit Rauwolfius prouenit circa Bethlehem & abundat in

Terra Sancta, foliis parvis, cinereis; nostrati Absinthio mediocriter accedentibus: ramulis multis tenuibus, cum copioso semine paruo, flauescēte, graui odoris, saporis amarissimi; acril cum fallugine.

Cordo in Hist. Pl. lib. 4. cap. 80. ita describente. Absinthium Seriphium, siue marinum Absinthium, ramosa est herba, nostrati Absinthio similis, multò tamen minoribus foliis: semen habet paruum veluti Ammi, acerosum, colore flauum, gustu valde amarum, acre, vehementer tenue, & grauius, veluti si quis Santonicum Absinthio miscet, & cum aromatica qualitate aliqua, odoratum. Eligito magnum, non puluerulentum, & odoratissimum. Nascitur maritimis locis in Aegypto, vnde ad nos afferitur, Alexandrinum semen, aut Zinz semen appellatum, aliud ab hoc est Santonicum. Absinthium verò hoc marinum, aliud esse ab eo, quod Matthioli. pingit, notat hoc in loco Gesnerus, idem Cord. in Dioscor. lib. 3. c. 27. de Lumbricorum semine hæc habet. Marinum Absinth. à Seriphio insula Seriphium dictum. Pharmacopolæ eius semen habent, quod Alexandrinum semen vocant, quidam etiam Sanctum semen, quod nomen à Santonico deductum est. Nam hoc marino Absinthio simile est, semine tantum exiliore. Nascitur hoc in Gallia & germaniæ quibusdam locis, & semen eius ab Italis *Santonigo*, à pharmacopolis Zinz semen, vel Semen sanctum minus appellatur: Germani vtrumque *wurm Samen* & *wurmfraut* vocant. Hoc etiam in loco annotauit Gesnerus huius semen, Semen Zedoriæ quosdam vocare. Cordus verò in Historia Seriphium suū, siue Semen sanctum facit simile Absinthio vulgari, quod nullus vnquam nobis persuadebit, propter foliorū fragmenta admixta, à seminibus longè diuersa. Quale Santonicum tradat, vt ingenitè fatear, hæcenus me latet.

Seriphii semine Medici, id attestante Ruellio, tuncis vermibusque necandis infidias stituunt, & ob id semen contra lumbricos vocant. Gallicum vulgus *Barbotinam* appellat, nonnūquam quoque mortem vermium. Officinæ iis vocant appellationibus. Hæc eadem Tagaultius de simpl. purg. lib. 2. cap. 10. non nominato Ruellio tradit.

Nonnulli, vt Fuchlannotat, Santonici à Santonibus Galliæ populis, dicta semen, corruptè voce Sanctum, cum Santonicum dicendum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignem eius efficaciam, quam in necandis lumbricis obtinet, illi impulerint. Plura vide inter vires, vbi Santonicum & Seriphium diuersa statuere cernitur.

Tragus lib. 1. cap. 11. de hoc ita loquitur. Tertium Absinthium Dioscorides Santonicum à Santonibus Galliæ populis, nuncupat. Estque illud Lumbricorum semen, quod Rhizotomi & Pharmacopolæ ac a gyttæ vendere solent: Multi putarunt à facultatibus illud vocari Santonicum, quare in receptis suis [vt vulgò loquuntur] Semen sanctum nominant, quod Arabibus *Schea* aut *Schea* dicitur. In græcis exemplaribus quibusdā *aus dōm* scribitur, quod quàm absurdum sit, & vitiosum nemo non videt, cuius rei Manardus Ferrariensis lib. 4. Epist. x. meminit.

In Italia cum non solet prouenire Semen sanctum, mirari subit Cornarium, cur Italicum vocet.

Nonnulli (quamvis falsò) opinantur Absinthium Santonicum esse plantam ferentem semen, quod vulgò Semen sanctum, & Sementi-

riā vocatur. Sed hoc nobis [Monachorum in Mel. dist. 6. cenf. 179. verba sunt] videri impossibile: quia Absinthium Sanctonicum nascitur, ut Melies tradit, non longe ab Alpium montibus eiusdem nominis, vnde & nomen Absinthii Sanctonicum, sibi vendicauit. Sementina autem, siue hoc Semen sanctum vulgò dictum, quod aliqui etiā falsò putant Sanctum in Sanctonico dici, quodq; Venetiis non vilè venditur pretio, ut scitur, Alexandria Venetias fertur. Quapropter non potest esse Absinthii Sanctonici semen: Quid autem sit incompertum habemus. Pluries illud seuius, sed nunquam potius natum videre. Præterea Venetiis etiam venundatur aliud semen, grossius eo, pro vermibus puerorum, quod nonnulli asseuerant esse semen Sanctonici Absinthii: sed neque de hoc adhuc potius habere certitudinem, quid propriè sit. Vtrumque enim non potest esse. Vnde necesse est alterum ipsorum esse falsum. Et fortasse [ut coniectamur] quod neutrum eorum est, verum Absinthii Sanctonici semen. Item nonnulli pharmacopolæ Romæ pro Semine sancto vulgò dicto, vendunt semen cuiusdam plantæ similis Alexandrinæ herbæ, quam plantam scimus in partibus Apuliæ vocari vulgariter *Morulam*. Cuius quidem semen nunquam fuit sanctum, neque beatum.

Monachus se opponit Matthioli his verbis. Sunt, qui putent semen illud, quod officinæ sanctum cognominant, quodque saccharo circumdatum necandis interaneorum vermibus præbet, Absinthii marini esse semen. Attamen vt fatentur rei herbariæ periti, qui ex Gargano monte Apuliæ, semen hoc ad nos comportant, à planta quadam profertur, Absinthio nostrati paululum absimili. Ex quo faciliè [ut mea fert opinio] coniecti potest, id potius esse Sanctonici Absinthii semen, quàm Seriphii: præsertim quòd Sanctum illud nomen non aliunde quàm à Sanctonico deductum esse videatur. Hallucinantur qui Canabel Serapionis interpretantur, cum Canabel terra sit, &c. Idem in Epit. excusa 1571. Semen sanctum, Ital. *Semen santo*, & *Semen zina*, planta est admodum fruticosa, caulibus & ramis numerosis ferata, semine minuto oblongoque, ramentum prodeunte, amariſcula gustu, odoreque non insuauis: affertur ex Alexandria Aegypti, ac aliis meridionalibus locis. In Hist. germ. lib. 3. cap. 23. Absinthium Sanctonicum nomine tantum cognitum est, quamuis aliqui semen Sanctum officinarum, Sanctonici semen esse velint. In comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Sunt qui putent semen illud, quod officinæ Sanctum cognominant, Absinthii marini esse semen, sed ij planè decipiuntur. Siquidem legitimam seminis huiusce plantam integrati milit ad me Patavio Jac. Ant. Cortusius, quæ à mariao Absinthio longè distat: Item paulò post: Aegyptium Seriphium primum consequutus sum à Jac. Anton. Cortuso, è quo colligi quod semen Sanctum quidam volunt, etsi quid certi de re hac affirmem, non habeam. Quam porrò inconsideratè & ignoranter de plantis sibi non visis scribat Matthioli, præallegata satis demonstrat. Olim Semen Sanctum accersebat ex Gargano, & potius Absinthii Sanctonici volebat: postea mutata sententiâ afferri dicit ex Alexandria, propositâ iconè nouâ, sine foliis, non indicans vbi videret plantam: tandem & postremo fateatur plantam integrâ à Cortuso missam: verum ei addit folia quæ creuerunt in eius musco, vel potius accreuerunt

Tom. III.

apud pictorem, quòrum non meminit in descriptione. Pro conclusionè præterea dubius hæret, an Semen sanctum sit ex Aegypti Absinthio Seriphio. Profectò magna est differentia foliorum eius Absinthii Seriphii, & eorum quæ mixta reperiuntur cum Semine sancto. Nos figuram assumpsimus Rauuolfii, & portionem ex planta ab eo nobis communicata appinximus. Matthioli figuræ iungimus portiones feminis sancti, siue Lumbricorum officinarum.

De Lumbricorum semine variat Dodonæus, ait enim in Historia gallica. Secunda species Absinthii vocatur Seriphium, pharmacopœis incognitum, licet soleant vendere sub nomine *Mort au vers*, quod in officinis vocatur Semen sanctum, Semen lumbricorum, & Semen contra vermes. In Hist. lat. de Florib. cap. 75. Semen Santolinæ (quæ plerisque Chamæcyparillius, officinæ Semen contra vermes & Semen sanctum appellant, quod nonnulli ignorantes ex qua planta colligatur, Sanctonici semè esse existimant) alii Seriphii. Vtrique abstrant. In Hist. lat. in fol. mutata priori sententiâ hæc ait. Ad Absinthii genus contingit & referri, vulgò Sementinam dictam, inter spuria Absinthia, vel aliò referendam: Caule hæc assurgit mox in multas alas & ramos distributo, circa quos folia minuta, copiosiora verò semina, exigua quidem illa, sed adeò frequentia, ut stirps cum tamis vniuersis semine tota turgida appareat. Peregrina est stirps: semè in calidiorum regionum hortis satum non infelicer provenit: Gallis *Barbantine*; Italis *Semen zina*; vnde & Latinis Sementina: Semen passim Semen sanctum, & Semen contra lumbricos, à quibusdam Semen Zedoariæ. Et hæc Dodonæus, qui in Hist. gall. pro planta, quam Lumbricorum semen ferre ait, Absinthium Seriphium Belicum exhibet magno errore. Descriptionem porro, quam nimiam securus ponit in Hist. lat. in fol. Dodonæus, existimamus factam ad iconem Matthioli postremam, quod displicer nobis. Si vidisset alicubi plantam qualem describit, locum procul dubio in quo obseruauerit, annotasset.

Loebel. in Aduers. p. 337. iuste negat Gallorum Barbotine, vel Belgarum Semen Zedoariæ; Semen sanctum, vel contra vermes officinarum, aut Santolinum dictum, esse aliquod tritum Absinthiorum: nam tamen nonnulla analogia illis & figuræ similitudo illis interfit cunctis: tamen non adeò plene sunt adula horum semina aut horridè amara. In Obs. p. p. 437. figuram Matthioli habet, hac inscriptione, Semen sanctum, Barbotine Gallorum, Ital. *Semen zina*. In Icon. Plant. hoc titulo Semen sanctum.

H. Lugd. in append. p. 36. Absinthii genus, Arabibus *Secheha*: Semen Zina: Mercatoribus Semen contra vermes.

Huius plantæ figuram quam proponit Rauuolfius cæteris ab aliis traditis præfert Carrerius: sed non placet eum in Epit. Matthioli, eius descriptioni subnectere Rauuolfii verba, eo non citato.

Matthioli dicitur in Enchir. Absinthii tria species, Sanctonicum, proferens semen. Illud, quod vendi solet ad occidendos vermes. Carol. Steph. de hort. vt & Gorthio in definit. Absinthium aliud, marinum, Seriphium dictum.

Semen, quo vulgò vtuntur aduersus lumbricos, si credere fas est Lacunæ, est Semen Absinthii & non Seriphii, ut putant aliqui, differtque etiam à Canadel Serapionis.

HISTORIÆ PLANTARVM.

An Hieron. Herbario apud Brūssellum Tom. 2. Absinthium Santonicum, Germanis *wurmfar*/ quod adfertur Geneuā vt plurimū, vbi prouenit, raro aliis locis? Videant lectōres an forte loquatur Hieron. de Chamæcyparisso, quod etiam Santonicum à quibusdam dicitur, vel de Semine contra lumbricos vulgari nescio an Geneuæ proueniat Semen lumbricorum.

Absinthium Santonicum plurimum esse in Gallia testatur Bacchanellus, & est iuxta Matthiolum, cuius semen vulgò dicitur Sementina. Bacchanellus asseclam habet Dorsthenium, qui tertium Absinthii genus facit, & plurimum cum illo in Gallia vltra Alpes nasci, semenque eius aduersus infantium lumbricos vendi tradit. Sed considerandum quale semen venderetur tempore Dorsthenii, si id quod nunc, toto cælo aberrat, qui putet in Gallia prouenire.

Tertium genus Absinthii (Veterum puta) facit & Apollo, eoque Galliam Alpibus finitimam fecisse refert, idque patrio nomine Santonicum vocari, Sardonium vertere Anguillarum, quod in Aldino codice pro Gallia legatur Galatia, quā incolant Sardis, hodie Natolia n, vbi si frequenter vili in Gallia &c.

Mizaldo in Alexikepo campo Garca. 1. Absinthium alterum, Seriphium vocatum, seu maritimum, cuius semen Gallicum vulgus Barbotinam & Vermium mortem nuncupat. Toxites in onom. philosoph. *wurm famen* / *wurm fraut* / Absinthium maritimum, Absinthium Seriphium, Semen lumbricorum &c. *Venedijs sam* / *Babilonis sam*. Disp. Colon. Absinthii marini semen contra lumbricos.

Adolph. Oconii Absinthii Seriphium, i. e. semē contra lumbricos, Barbotina quibusdam, alii Santonicum, & Cinæ semen.

De hoc Claud. Roccardus ait. Sunt qui nominis affinitate seducti Semen sanctum, officinarum semen contra vermes, & vulgò *Barb. time* dictum, Santonici semen putant, quod Seha Coraceni seu Carmeni auicennæ semen esse Bellunenſis testatur &c. Quod ex Coraceno regione Indiæ finitima non ex Gallia ad nos adfertur. Si quoddam Absinthium maritimo quodammodo simile fuerit, in eius serie collocandum esse putamus. Huiusque generis esse, quod semē sanctum profert, ac Seha Auicennæ affirmat Bellunenſis interpres.

Calepinum ignarum Botanicum esse hæc liquidò demonstrant. Absinthium maritimum, inquit, *de l'Isle de Bar. d'Arret*. Gall. *la more aux vers*, *Barbotime*. Hoc est Seriphium à nonnullis appellatum, de quo Plin. lib. 27. cap. 7. Est & Absinthium maritimum, quod hodie Semen lumbricorum vocant.

Quis non nisi cæcus non videat ex sequentibus verbis Eucharium Ræſſin licentiosè scribere quæ non intelligit. Semen lumbricorum, ait, *wurm fraut* / *wurm famen*, paruum est instar feræ arenæ, coloris lutei, Croci modo, habet supra semen siliquam rubram: tunditur herba &c.

Anguill. epist. 10. Abrōtonum mas, cuius semē adfertur pro Semine sancto, quod Arabes Semē lumbricorum, & Auicenna Seha vocant.

An nomina hæc (*welf famen*, *wurm famen* / Absinthium Seriphium, Santonicum) vni plantæ conueniāt, vt sentire videtur Wirsung, iudicent periti.

Tabern. Icon. & Hist. Sementina, Santonicū,

wurm famen fraut. Cur plantæ sibi non vix ap- pingit radices repentes?

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 19. siue Seriphii Alexandrinum, Semen sanctum Matthiolo & Lobelio. Item Absinthium 20. siue peregrinum, vnde semen lumbricorum colligitur, Secha Arabum Rauvolfii: vidimus apud fratrem Io. Bauhinum: an diuersum à superiori dubito.

Habes studiose Lector de Lumbricorum semine diuersas diuersorum authorum opiniones. Alii enim Absinthium alterum, Seriphium & maritimum vocatum proponunt, pro planta Lumbricorum semine. Alii Absinthium Santonicū obtrudunt: alii ipsi Absinthium vt Lacuna. Aliud Absinthium tradit Matthiolum, uti dictum. Pena addit Semen contra vermes officinarum tritum Absinthiorum nullum videri. Et huius sententia maxime nobis arridet.

De loco satis dictum, qui hodie nondum planè cognitus. Aliquoties seu semen lumbricorum Montbelgardi in hortu Ill. F. C. & aliis locis, sed non mihi prouenit, ita vt Lobelium vagum & inanem iactatorem dixerim.

Oblinitur passim saccharo à Pharmacopœis, daturque vtiliter infantibus & pueris ad intestinorum vermes. Sementinæ semen aniarum admodum esse scripsit Dodonæus, calidum & siccū ea de causa facultate. Aduersus lumbricos, & interaneorum vermes quoquo modo sumptum vtile. Vtilius verò futurum, si Rhabarbari vñihil ei addatur: ita enim non modò vermes interfici, sed & per alium mortuos expelli. Nos hoc Dodonæi consilium multum probamus, ac eo modo feliciter soliti sumus exhibere à quadraginta penè annis, non lecto eius consilio. Et sanè fieri hoc omnino expedit.

ABSINTHIUM ÆGYPTIUM QVIBVS DAM.

CAP. LXXII.



Folia ferè palmaria, Defen- quæ sicca (ex sicca describimus) aliquid simile habent cum Trichomanes, vel Scolopendrio & Chamæcyparisso, in quibusdam iuxta longum pediculum sunt veluti foliola mutuo se contingentia, cū fimbriis nonnihil serratis, reflexis. Alia autem folia ex longiori

pediculo in foliola longiora, & à se inuicem magis distita diuiduntur. Tota herba villosa & incana, Chamæcyparissi modo: sapore amaro & Sementinis contra vermes officinarum ferè simili: odore aliquantulum aromatico.

Absinthium Seriphium, inquit Matthiolum in Epitom. Italis *Affenzo Seriphis d'Egitto*: pu- mila

Vermium mori.

Seha Coraceni seu Carmeni Auicenna

Calepin. ignarus

Euch. Ræſſ. repreh.

Abrōtonum mas Anguill. Wirsung nat.

Absinth. Seriph. leuani. Bauhin.

Indici. de plant. semin. lumbricorum.

Locum.

Vires vilius.

Defen.

mila est planta, in Ægypto proueniens, foliis minutis Abrotoni feminae fere similibus: surculis compluribus, gracilibus, breuib; ac foliosis; minuto semine, gustu amaro: non tamen vehementer: aliis omnibus prædium est facultatibus, quibus & Italicum. Hæc Matthioli.

Claud. Roccardo autore Absinthium hoc, quod ex Ægypto translatum esse voluit, Polytrici folio ex Absinthiorum numero reiciendum esse, doctissimorum Herbariorum maior pars censet.

Aliud peregrinum, siue Ægyptium, Polytrici formâ, foliis albis, alterno liru digestis, digitum altis, apud Gesnerum iam diu, & post penes Valerandum Dourez sicum videramus [aiunt Lob. & Pena in Aduers.] infirmâ aut certe nullâ coniectura Ægypti cognomine inscriptum, & à quodam Herbario missum, qui ex hoc Semen sanctum produci coniecit. Pingitur in Obs. p. 43. in Icon. Plant. p. 756. eodem titulo, quo in Aduersariis vsus est Lobelius.

Dodonæus lat. in fol. ponit figuram sine descriptione: dicit tamen Absinthium Ægyptium in Africa & Ægypto odore Seriphio potentius esse. Tabern. Icon. & Hist. v. Dodonæus, vocat Absinthium Ægyptium, Ægyptischen wermut. C. Bauh. phyt. Absinthium duodecimum, siue Capilli Veneris folio. Quomodo autem propriè & absolute, possit dici Capilli Veneris folio, non videmus, quia Capillus veneris vulgò dictus, siue Adianthum verum, multum differt.

H. Lugd. p. 491. Absinthium Seriphium Ægyptium Matthioli. Frustra Matthioli adductus ut credidit [Epist. lib. 5. ad Corusum] Absinthium hoc Seriphium, quod Alexandria Ægypti allatum esse scribitur, esse Seriphium genuinum Dioscoridis. Hanc autem perceptam opinionem, ut facilius sibi eripere non permitteret, Seriphii caput apud Dioscoridem pluribus in locis deprauiatum esse scribit, quod vanum est.

ORIGANI FACIE CORIMBI.

CAP. LXXIII.

TRagorigani nomine misit plantæ cuiusdam cacumina D. Rauuolfius, quæ nonnihil familia Maro Syriaco, siue Origano Onici Matthioli, candida admodum, parua, hirsuta: quorum capitula squamis oblongis, in modum capitulorum Thymi Cretici dispositis, compacta, odore graui, sapore amaro, feruido, ad saporem Seminis contra accedente, aded ut de Seriphio aliquo suspicionem possit incutere. Eius figuram iunximus cum Absinthio Ægyptio quorundam.

ABSINTHIUM VMBELLIFERUM, Mutellina quibusdam.

CAP. LXXIV.

Mutellina nomine inter siccas nostras plantas Absinthii genus inuenimus, radice nixum crassa, perenni, ut videtur, caules emittente plures, palmares, & paulo maiores, per quos ut & in ipsorum fastigiis corymbi conspiciuntur, rariores, satis magni, & ni fallimur, lutei:

folia tenuia, Absinthii Seriphii diuisurâ, candidissima, hirsuta: sapore amaro, ingrato.

Hæc planta nobis communicata est, cum inscriptione horum nominum Gallicorum, *Mutelline blanches, herbe de l'apostume*: videndum an sequentes scriptores huius stirpis meminere, sub sequentibus nominibus.



Lobel. Obs. p. 435. Absinthium umbelliferum alterum Italicum, Ital. Ascenzo ombellifero nondum literis proditum: quippe non frequens obuuium, vel minus notum: ortu colore incano, & habitu ipso non ita di-

uersum ab absinthio, albo, sed omnia exiliora multo, cauliculos plures spithameos emittit, summis flosculos in glomeratis capitalis incanthis gerens. Itali stirpiam exploratores, à quibus studiose altur, umbelliferum Absinthium dixerunt: folia amara Absinthium Ponticum Tridentinum (Absinth. tenuifolium album) non multum magnitudine superant.

Camer. hort. Absinthium paruum & incanum, Gesnero humile [nos hoc ad aliud referimus] In hortum à me translatum ex montibus Tyrolensibus, ubi copiose crescens reperi, sed non diu culturam fert, nisi sæpius transplantetur. Item apud Matthiolum gerit. lib. 1. cap. 23. Absinthium paruum Clusio pumilum dictum, in Tyrolensium montibus, pulchrum, delicatulum, non facile ferens culturam.

Clus. Pannon. p. 554. & Histor. post. Pumilum Absinthii genus, vix palmi altitudinem superans, tenuibus admodum cauliculis, quos circa radicem multa exigua, multifida tamen & incana, ambiunt foliola, non iniucundi odoris. Id in fumis cauliculis quaterna aut quina fert capitula in pallescentes flosculos sese explicantia. Norimbergæ alebat in fictibus C. V. Cameraarius.

C. B. phyt. Absinthii noni, siue montani umbelliferi, alterum Italicum, à montano umbellifero non multum diuersum, sed multo exilius.

ABSINTHIUM ALBIS FLORIBVS capitulis squarrosis.

CAP. LXXV.

Plantula est semuncialis & dodrantalis, & mediæ magnitudinis: caule incano, albo, per quem, folia vncialia aut fescuncialia & ampliora, lariuscula, incano tomento obducta, in lacinias Absinthii vulgaris in morem diuisa, profundè laciniata, minora tamen multo, semunciam lata, unciam vnam aut tres longa sapore amaricante; ex radice statim oriuntur alia per cauliculum.

Absinth.
paruum
Camer.

Descriptio

in culis summo flores in umbellæ formam digesti, pulchri, magni, septem, vel octo, pediculis mediocribus hærentes, radiatis albis foliis constantes, Herba de la rotra aut Millefolii Alpini, vel etiam Tanacetii albi similibus, discum occupantibus multis apicibus, subnixa autem sunt capitulis squarrosis, lineis nigris variantibus: radix crassa, perennis esse videtur, cui radiculae longæ, tenues, ac etiam capillares adnatae.



Dilseo Viennâ Austriæ transmissum: folio Chrysanthemi diuoluta, Arthemisiæ marinæ concolori, in cauliculo dodrantali: flos albus, Parthenii, in umbellis semis foliis: subaltit ingit, non nihil amaricat.

*Absinth.
Pannon.
flore albo
Camer.*

Agnouit hoc & Camer. de hort. dicens. Absinthium Pannonicum flore albo. Elegans planta quasi median naturam obtinens, inter Absinthium & Matricariam. Non lubenter hortum mansuecit, sicut nec aliæ alpinæ: quare collocandæ in loco umbroso, attamen aëri exposito, cum Solem minimè ferant. Astutus (vel potius ingratus) Camerarius est: In Epitomen, Clusii verba redigit, immutat, ac pro suis venditat.

*Absinth. al.
bum Tab.*

Tabern. Ic. & Hist. Absinthium album meyseser wormut: Absinthium umbelliferum, Eronen wormut: Helueticæ vocant Herbam albam, Gesnero teste, ea abundat in Valesia ab urbem Sedunum locis cliuosis, soli expositis. Sed quidquid statuatur Tabern. Herba alba Gesneri multum differt ab hoc Absinthio albis floribus, squarrosis capitulis, quod iconæ sua exprimit Tabern. Herbam albam Gesneri exhibemus pro Absinthio Valesiano inter præcedentia.

*Absinth.
mont. umbelliferum
C. Bauh.*

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 9. sive montanum umbelliferum.

Hist. Lugd. pag. 946. Absinth. album capitulis scabris Lobelii.

Locus.

A plurimus annis habemus inter nostras plantas siccas: præterea frater C. Bauh. attulit nobis à D. Bechio sibi datas plures stirpes, qui eas collegerat in monte Baldo.

ABSINTHIUM MONTANUM FLORE

Chamaemeli.
CAP. LXXVI.

Eradice lignosâ, parvâ, nigâ, fibrosâ, incana, lanuginosâ, tenuia emittit folia, incisuris pro-



fundis diuisâ, media inter matrum Absinthium & Abrotonum marem in orbem disposita: Vere caules edit plures, supinos, paucis in imo foliis hærentibus, æstate flores singulos, singulis caulibus in summo hærentes, Abrotoni femine modo, sed similes Chamæmelo potius, foliolis quidè albis lutei vinctos circumdantur. Sapore & gustu, atque odore Absinthium vulgare Ponticum refert hæc planta, ac idcirco potius Absinthii nomen indidit Columella quàm Abrotoni femine, cui similior videtur, præsertim flore, qui longè ab Absinthii floribus abest.

C. B. Phyt. Absinth. 8. sive montanum Chamæmeli flore, atque mediæ esse nature inter Absinthium & Abrotonum marem.

In excelso monte D. M. Virginis appellato noua & elegans, rarâque Absinthii huius species oritur, atque non nisi rimis saxorum sterilibus, ex quibus fructicat, exit.

ARTEMISIA.

CAP. LXXVII.

Artemisia vulgaris.



Perennis fruticosa Del.

herba ex radice digitalis, serpente, plurimis fibris capillata, lignosâ, sapore subdulci & aromatico: caules surgunt duos, aut tres cubitos alti, fractu contumaces, canaliculati, subhirti, colore rubesciente plurimum, rarijs cano aut viridibus, alis multis, concaui: folia sua uolentia, sapore dulciculo & sub-

acri, alternatim caulibus & ramis adhaerent, inferius incana, superius viridantia, in acutiora segmenta, quàm Absinthii vulgaris, diuisa, ita ut summa sint veluti digitata: corymbi odorati, ad spicem vel Lauendulæ odorem quadantenus accedentes,

tes incani, villosi, fibrillas luteas ostentant. Et hæc descriptio est Artemisæ vulgaris.

Tabern. Icon. & Hist. Artemisia rubra, *Rotter*

Beyfus. Item, Artemisia alba, *weisser Beyfus*:

differt tantum colore caulium, vni albo, alteri

purpureo [*Braun*]. Artemisiae volunt dictam ab

Artemisia regina, vxore Mausoli, quæ multos hac

herbâ curauit: alii ab Artemide venatrice, aliâs

Diana. Appellatur aliâs à Græcis Ἀρτεμίδα πα-

νιδόλος, i. est Artemisia latifolia, ad distinctio-

nem cæterarum; Dioscoride & Apuleio παλὴ α-

νοί ποτὶνός, ἑρπύρας, σόζονα (quasi salutaris), λέια,

λυκορρύς, Ἀίμα ἀνδ' ὀπίθ' βασιλικὸν λαχάρον, χμερὸν

χά, ποτὶνός, ἄσπερ, ἄσπερ (ἀσπιδόσπερος, ῥόος ποτὶνός,

ποτὶνός, ἄσπερ, ἄσπερ, ἄσπερ, ἄσπερ, ἄσπερ, ἄσπερ,

Plinius lib. 25. cap. 7. Dicitur à Latinis Canaparia

à caulibus lignosis, cannabinis similibus, & Olus

regium, & Herba regia, à regina Artemisia. Simi-

liter Rapium, ab Apuleio Sirium, à Pythagora

Pexasis, Dioscoride & Apuleio Valentina

& Valentina, à virtutibus & facultatibus

quibus valet. Marcellus Empyricus scribit suo

tempore à Gallis fuisse Bricium appellatam: à

Mattheo Syluatico, Pandectarū auctore Ierania

& Ierania, potissimum autē radix eius. Vocatur

aliâs etiâ eodē referente, Bemastrum, Amaran-

tium, Amanina, & vulgò ab Herbariis Armofia,

Valachis Zuofte / Ziuofte & Zyred: Arabibus

Belengelit, Molular & Molufan: Haliabate Be-

renialtum, Berenialeton & Berinemase cum He-

beris teste Aruchi Monasteri Chalgalugoth. Italis

Artemisia, Venetianis Herba della madonna: Hisp.

Artemisia & Alramisa, Gallis de l'Armoise, l'Herbe

de Saint Jehan, & Armase: Nuncupatur aliâs quo-

que ab Herbariis Mater herbarum, à Vegetio

Dianaria, dubio procul à Diana: Polonis Bileza /

Bohemis Ezerobyl / Zernobyl: Hungaris Fesze

te Tróm [h. e. nigrum absinthium] Aegyptiis A-

nefise & Neisfar: Belgis Byron & Sint Jans

cruyt. Anglis Muggwort. Germani nominant

Beyfus, Buden / Budelen / S. Johans gürtel

[Cingulum D. Iohannis] Sonnenwend gürtel &

himelfher. Hætenus de nominibus & Synonymis

linguarum ex Tabernomontano, qui frustra pon-

nit duas figuras Artemisæ vulgaris, cum colore

caulium duntaxat, vt ipse refert, differant. Solo

autem colore differre approbat Fuch. & antè

eum Cordus, & Gænerus.

Gerardus icones habet Tabernamontani (qui

eas non tanquam figurâs differentes, sed suo more

propter colorem diuersum proposuit (ac ratione

iconum ita distinguit. Artemisia (latifolia) Ma-

ter herbarum, Common Muggwort. Item: Ar-

temisia tenuifolia, Thnue Leofed Mugg-

wort.

Lonicerus Artemisiam cum absinthio & a-

brotono comparat, eamque caulium coloris gra-

tia in descriptione in rubram & albam distrahit,

licet hanc pro tenuifolia, illam pro latifolia pin-

gere videatur. Duas habet figuras malas, nō mul-

tum discrepantes: vna bona sufficeret.

C. Bauh. phyt. Artemisia 1. siue vulgaris maior.

Item Artemisia 2. siue vulgaris minor. Non pla-

cet, Fratrem separare plantas sola quantitate dif-

ferentes. Apud Matth. non fecit. Eam etiam,

quam Artemisiam tertiam, siue montanam, facit,

nempe Leptophyllum montanam Lugdunensis

Hist. nondum sciungimus

H. Lugd. p. 950 Artemisia prima, vulgaris. Item

Artemisia Leptophyllum montana. Cuius nec fi-

gura placet, nec descriptio.

Tome III.

Tragus qui vnicâ figura contentus [quam Ar-
temisiam absolute inscribit] ait. Apud nos Germa-
nos nulla ferè Artemisiam omnis differentia con-
stituitur, nisi quod alia purpureo [Rothbüchen
scriptum habetur in margine] alia verò viridi ac
subpalescente (weissbüchen) caule sit. In reliquis,
forma sc. odore & sapore similes videntur. Reli-
qua [à Tabern. omnia intelligi hic nos volumus]
Artemisia apud Dioscoridem nomina, hæc sunt.

Anactarios, Chrysanthemum, Scpillum, Teita-

na, & Gallis Pona. Artemisia nomen primum, ab

Artemide, h. e. Diana impositum quidam credi-

dere reclamantibus ac affirmantibus hanc no-

menclationem ab Artemisia Halicarnassi regina

ortâ esse, cum prius Parthenis hoc est Virginalis

Metdfrant Germanis vocaretur. Sed parum re-

fert vnde nomen traxerit Artemisia, modò illa

nobis cognita sit. Sunt qui illam Matricariam, li-

e. Germ. Mutterkraut / appellatam velint, a-

struentes apud Hispanos Altiliam seu Altimili-

am nuncupari. De Altilia Neoterici varias ha-

bent opiniones, alii Rob, seu Sapam eam inter-

pretantibus, alii Abrotonum siluestre esse dicti-

tantibus. Verùm a rabs a uicenna, Can. sin Ther.

Esdræ licet dirimit, dum scribit, succum Altiliæ

esse albelengelisi, & Abrotonum siluestre vocari.

Atque hæc est quorundam Mater herbarum, seu

Artemisia. Neoterici tres ponunt Artemisias,

Monoclonon sc. quam Matrem herbarum nomi-

nant, deinde Tanacetum secundo loco collocant,

tertiò quæ dicitur Artemisia nepetoides. Huic sen-

tentiæ subicit apuleius quoque. Hæc ille qui

Dioscoridis caput de Artemisia tenuifolia super-

fluum esse ait.

Prima duo Artemisiam genera [Dioscoridis]

Hetruscis frequentissima sunt, neque in alio in-

ter se distant, quàm quod in maiori omnes partes

maiores spectentur, in minori verò minores: a-

liâs facie, & formâ similia constant, quin etiam

idem sapor, & odor, eademque facultas vtrique

inest. Quare equidem nescio (inquit Matth.) qua

ratione ductus Brasauolus pro certò crediderit,

eam herbam minorem esse Artemisiam, quæ in

Hetruria officinis Matricaria & vulgò mulieri-

bus a marella vocatur. Sed eò magis virum hunc

alioqui celebrem admirari subit, quod tradi-

derit duas alias esse Ferrariæ Artemisiam species

nullis prorsus notis distinctas, præterquam quod

alteri vnus tantum sit ramus, alteri verò plures.

Vide plura antè, vbi Ruellium, Monachos, &

Fuchium notat.

Veram Artemisiam parum hodie esse notam,

author est Turn. part. 1. p. 61. ac vulgarem quæ ha-

betur nec Galeni, nec Dioscoridis, nec Plinii ef-

se Artemisiam. Addens: Matthiolum, qui multos &

quidem nominatim, acerbè taxat [quosdam au-

tem meritò] erroris de Artemisia, errat ipse, cum

vulgarem pro vera exhibet, quæ nec natalibus,

nec gradu coloris, nec formâ cum Dioscoridæa

conuenit. Ait primas Artemisiam species ambas

inueniri in Hetruria, easque nihil differre neque

formâ, sapore, odore, neque facultatibus, exceptâ

solâ magnitudine. Quod si verum est, altera spe-

cies, non erit illa, quam Dioscorides describit:

differt enim minor species à maiore flore faciedo.

Vterum hic erret ille nec ne, iudicent alii. Ait

primas duas species in Hetruria nasci, tanquam

sibi notas: sed nec eas describit, nec vulgaria no-

mina recenset, nec denique natales, quod in aliis

facit plantis. Quam ob rem & propterea, quod

A a

Artemisia
nomen vbi
de

Parthenis
Virginalis

Matricaria

Altilia
Hisp.

Artemisia
triplex dif-
ferentia
quorundam

Brasauol.
not.

Math. ve.
darguist.

verum Ponticum Absinthium non nouit grauiusque in eo errat : verisimile est, illum neutram primum Artemisiæ speciem nouisse, ac æque in Artemisiis errare, ac Plinius, Musa, Fuchsius, Monachusque in his & aliis. Quod si vel Musa ita nos docuisset, probè mihi nota est hæc planta, Ferrariæ nascitur : vel Fuchsius, hanc noui, ac in Germania vidi : neque nomina Italica, Germanica, Herbariorum & Officinarum docuissent, multas potuissent effugere reprehensiones, quas nuper tulerunt, & quidem à Matthiolo, qui in postrema acie cunctans, in multis describendis plantis, quemadmodum & hic, effugium quaerit, tacitis & præteritis nominibus vulgaribus, natalibus, descriptione, & facultatibus, ne si in aliquo eorum errasset, conuictus deprehenderetur, quo ipse modo alios excipit. Ex Turnero plura possi vbi de Amato opinione.

Cæterum, Artemisiæ nomine, quam colore Synonyma caulis & floris variare constat, aliqui inutiliter duas figuras proponunt, vti satis dictum. Nominatur Artemisia Gesnero (is diuidit in hort. in cædidam & rubicundam : in cat. in Monoclonon & Polyclonon) Kybero, Cordo, Apollini, Rob. Stephano, Brunfels. Rastlino, Golio in Onō. Ruell. Fuchs. [cui de comp. med. Artemisia fruticosa, Artemisia in offic.] Manlio in Lum. maiori, Goropio, Gualt. Ryfio, Had. Iunio, Wincklero (qui in chronica in Augusto de herb. albam & rubram vocat, ac in Augusto de florib. tres facit : quid autem velit, ipse videro :) Brasauolo, Fauardo, Virfungio, Camer. hort. Anguill. Trago, Lob. in Aduers. (vbi in quibusdā locis inaspicata telluris, adeò strigosam fieri tradit, vt alia prorsus putetur,) in Obs. p. 44. in Icon. Plant. pag. 764. [vbi & Mater herbarum,] Goræo (qui duo genera facit Monoclonon & Polyclonon) Car. Stephano, Corn. Lacunæ, Bapt. Fieræ, Monach. in Mel. (qui dicunt secundum rei veritatem esse triplicem, videlicet vulgò Canapariam, Matricariam, & Tanacetum.) Hier. Herbario, Agricola, Mizaldo, Reform. Vorm. Toxite [apud quem legitur etiam Arthemisia menodos : item Artimilia,] De Vigo, Pandect. Narchio [qui maiorem & minorem facit : Castori (cui & Mater herbarum) Marth. & Tabernomontano. Dod. gall. Artemisia communis, ἀρτεμισία κοινή, quam quartam speciem ait Dioscoridis & tertiam Apulei. Lat. in fol. Artemisia latioris folii. Artemisia vulgaris Turn. Cæsalp. Thallio & Clusio. Amato Artemisia maior, Artemisia latifolia hortensis, apud quem male ponitur eius loco Matricaria. Schvvenckf. Artemisia candida, ἀρτεμισία λευκή, ἀρτεμισία πολύφυλλος Dioscor. Artemisia femina, Artemisia latioris folii Dodonæo. Item Artemisia vulgaris rubra, Artemisia mas. Nemo quod ego equidem sciam, ita distinguit, vt Schvvenckf. dius. Rhegino Artemisia ἀρτεμισία, Artemisia, vulgò Cermisia.

Locus

Qualcunque regiones pergrauerim [vt cum Clusio loquar] nulla fuit in qua Artemisiam hæc vulgarem cum candidiorem, cum subpurpurentem, & vniuersè, vt puto, Europæ familiarem, crescentem non viderim.

ARTEMISIA VETERIBVS IN GENERE. CAP. LXXVIII.

Genera
dist.

Genera tria Artemisiæ Dioscoridis proponere videretur, nisi concludendo, utraq; calfa-

cere diceret : verum in quibusdā codicibus Græcis, vt Goupili, Afisiani, Cornarii (qui tamen in Latino omisit, sequitur & aliud caput de Artemisia, quod spurium videtur, quare Ruellius in sua interpretatione omisit : Marcell. Virgilius, vt ascititium damnavit : Cornarius vt supposititium, ex textu latino amouit : nec immerito [vt placet C. Bauhino] cum nec apud Galenum, Orbasium, Paulum, Aetium : nec apud Serapionem de tertia specie quicquam legatur, cum tamen hi omnes ex Dioscoride simplicia enumerare soleant. Verba eorum adscribamus.

Artemisia (infir. Diosc.) in maritimis plerumque nascitur, herba fruticosa, Absinthii similitudine, nisi quod est maioribus, pinguioribusque foliis : quanquam est quedam lætior, habiorque, foliis virgulisque latioribus, altera verò tenuioribus. Flores sunt parui, tenues, candidi, & graueolentes. Aestate autem floret. Sunt qui in Mediterraneis Artemisiam monoclonon appellant, herbulam gracili furculo, simplici caule donatam, valde pusillam, attamen floribus referentem tenuibus, & ad fuluum colorem accedentibus. hæc quàm præcedens iucundior afflat odorem. Vtraque exalfacit & attenuat. Feruenter insidentibus sceminis profunt ad extrahendos menses, partus, secundaque, itémque ad vulnæ præclusionem & inflammationem. Valent etiamnum ad comminuendos calculos, æmora tamque vrinam eliciendam. Quin etiam herba ipsa copiosior imo ventri impolita menses ciet. Succus ex eadem expressus : cum myrrha subactus, vulnæque subditus, eadem quæ infusus ex utero trahit. Sed & coma corundem educendorum gratia ternis drachmis propinatur. habetur & Artemisia tenuifolia, quæ circa riuiolos ac sepes & in agris frumentariis nascitur. Huius flores & folia, si contriueris, Sampsuchi odore exspirant. Si quis igitur herbam eam tulam & cum oleo amygdalino bene subactam, more malignatis, dolenti stomacho imposuerit, sanabitur. Quod si quis etiam neruorum dolore teneatur, eius contrita succo expresso & mixto cum oleo rosaceo, si cum perunxeris, curabitur. Et hoc Dioscoridis caput de Artemisia tenuifolia in aliquibus codicibus delideratur, & propterea à quibusdā ad notham transferitur, vbi hæc omnia leguntur. Artemisia seu Polyclonon, à multiplicibus ramulis sic dictam, seu Monoclonon, à singulari ramulo, quidam Toxotin, alii Ephesian, alii Anethorion, alii Sozusan, quasi salutarem, alii Leuon, alii Leucopin, à floribus in Leuon ambitu colore, vel Lycophryn, quasi Lupi supercilium, Prophete Hominis sanguinem, alii Chrysanthemon vocant, Romani Valentinam ab efficiacia, alii Serpillum maius, vel Herbam regiam, alii Rapium, alii Traganthem, alii Artemisiam, Galli Ponem, Daci Zuften. Pro Toxoti (τοξότης) αία] πικρὴν, seu πικρὴν, à iuuando partu, legendum suspicatur Sarracenus.

Plinius vbi de herbarum inuentoribus agit, inquit. mulieres quoque hanc gloriam affectauere in quibus Artemisia vxor Mausoli, à doptatâ herbâ, quæ antea Parthenis vocabatur. Sunt qui ab Arthemide Ilithya cognominatam putent, quoniam priuatim medeatur sceminarum malis. Est autem Absinthii modo fruticosa, maioribus foliis pinguiusque. Ipsius duo genera. Altera [Altior CH.] latioribus foliis, altera tenera tenuioribus, & non nisi in maritimis nascens. Sunt qui in Mediterraneis eodem nomine appellant, simplici caule, minimis foliis, floris copiosi

piofi, erumpentis, cum vna maturefcit, odore nō inuicundo, quā quidā Botryn[Botryon] CH. alii Ambrosiam vocant. Talis in Cappadocia nascitur. In his autem Plinius cum Dioscoride confentit, nisi quod Artemisiam monoclonon Dioscoridi dictam cum Ambrosia confundit. Idem vltim eius medicum sparsim sic tradit. Artemisiam quoque secum habentibus negant nocere mala medicamenta bestiamue vllam, ne Solem quidem. Bibitur & hæc ex vino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur, potius aduersus ranas. Strumis Artemisia operitur folio suo imposita. Eadem sinistra manu circumfossa adalligatur, custodienda sanatis, ne rursus sata diro herbariorum scelere rebellet. Bellin cum hac illiam, efficaciorē esse produnt.

Datur quoque contra calculos ex vino dulci, & ad stranguriam. Artemisiam & Elecliphacum alligatas qui habeat viator, negatur lassitudine sentire. Artemisia vuluæ medetur trita, ex oleo irino, aut cum Fico, aut cum myrrha apposita. Eiusdem radix pota in tantum purgat, vt partus enectos extrahat. Menfes & secundas ciet ramorum decoctum infidentibus: item folia pota. Ad eadem omnia prosunt etiā imposita ventri imo cum farina hordeacea.

Artemisia vtrique, inquit Galenus, & modicē deficcit, & est, quod ad calfactionē attinet, excessus secundi, quod verō ad reficcationē, aut primi intenti, aut secundi remissi. Est autem & modicē tenuium partium. Itaque ad renum calculos medicoriter commoda, & ad foras vteri. Si secundæ statim à partu non exierint, omnibus præstare nouit Hippocrates herbam Artemisiam. Idem præterea quod Mercurialis præstare (videlicet tenuem biliosam purgationem educere in pello suppositam) & efficacius purgare.

Ad declarationem iam dictorum non parum iuuat, quæ Marcellus Virgilius olim præclare scripsit. Certant, ait, pro Artemisia quondam tota Græcia & Asia, Gentes aliquor: nec aliter minorē studio, quā pro Athenis felici quondam, ingeniorum & doctrinarum genitricis, ciuitate, Pelagi arborer Neptunus & mille operum Dea Pallas fecerant, in vulgaris herbæ nomine gloriam affectauerunt: Contententibus Caribus Halicarnassoque præsertim reginæ suæ adoptione notam gentibus Artemisiam esse. Quæ non contentā Mausoli coniugis sui fortunā & regno, quod anteq̃ reges aliqui fecerant, glorioso adoptionis genere, in nomen & gloriam suam olus hoc traxerit, vt esset in Medicæ materiæ historia, etiam post diruta in vacuo aëre pendenti Mausolea: & quæ victrix Rhodi trophæa mulier exerax, diuturnius & naturæ æqueuum nominis sui in æterno oleris monumentum. Contra verō nitentibus totā Græciā gentibus. Quæ aut mulieris gloriæ, inuidentes: aut, quod vero similis est, piā religione salutis suæ numini gratias habentes: Non à regina Halicarnassi Artemisia: sed à Diana, quæ Græcis Artemis dicebatur, factum herbæ nomen testabantur. Salutaris parturientibus Dea illa esse credebatur, ideoque quotidianis precibus & multo religionis ritu prægnantes & puerperæ numen eius colebant, vt sine interiorum locorum noxa liceret, illis quem in vtero gererent, fetum excludere: & quemadmodum idem eius Deæ beneficio præstaret hoc olus, æquā numinis potestate parem illi nominis honorem etiam fecerunt: Quod enim Artemis Dea votis & precibus vocata tunc poterat. Idem

adhuc herba Artemisia potest: menses, secundas, fetusque trahens, & præter hæc eiusdem partis præclusionibus, inflammationibusque utilis. Ob quas vires in multo nominum ambitu & honore fuit. *Partenis*, i. e. Virginalis primò dicta, quod virgo, Dea sc. nomen illi dederit. Mox *Regium olus*, regium olus. Tum ex eadem causa Anactiorum. Anactas enim reges Græci vocant. Ephesia à regione dicta eadem est. Quæmadmodum à præsentī remedio & ope Sozulā salutatis. Romani regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit à similitudine Scerpillum maius dixerunt. Et hæc antiquioribus artemisiæ nomenclatura fuit. Ex posterioribus alii in Cannabis genere Artemisiam numerarunt. Congenere illi facientes & eodem illi nomine eam indicantes. Alii Matricariam notum omnibus olus esse Artemisiam testati sunt. Quod non aliunde, vt credimus, quā ex duplici eius genere factum est. Quæ enim à Dioscoride Monoclonos, à Plinio autem simplicis caulis nominatur: non dissimili penitus figura: præsertimque ob singularem quem proferit caulem, à Cannabe describitur. Quæ contra Absinthii modo fruticosa ab hoc & ab aliis traditur, facili ob quas habet vires ad nostri orbis & nostræ ætatis Matricariam transferri potuit: quod etiam Græcorum de Artemisia historiæ omnino non respondeat, nec ce rto aliquo auctore confirmari possit, nec reiiciendū tamen penitus est. Egregia enim in Muliebribus (dico autem nunc muliebria, quæ Græci *muliebria* vocant) Artemisiæ vis est: credendumque non aliunde quā à matricibus posteriori Matricariæ nomē fecisse posteriores: per matricem enim nunc passum Medicina vuluas & muliebres locos inteligit.

Idem de Artemisia tenuifolia addit. Desideratur, sed sine iactura aliqua, in vetustis Græcorum Latinorumque codicibus hoc caput, accretuillesque Dioscoridi inutiliter multa indicant: Phrasis primū sermonisque forma, quæ in Græcis à Scriptoris huius indole longē absunt: mox nullā eorum, quæ in eo iubentur necessitate. Satis enim ad constituendum vtrumque Artemisiæ genus fuerant, quæ de priori longius dixerat, præsertim cum moneret esse alteram Artemisiam speciosiorē, latioribusque foliis, & alteram tenuioribus: mox in Medicina vtrique calefacere, extenuare &c. Quibus tam apertē à se decretis non oportebat addere: quæ certi, & vt quotidie solent Medici, remediū institutionem potius quā historiæ & vniuersarum virium rationem haberent. Nec si quis Plinium de iisdem docentem contempletur, aliter censēbit. Nobis tanti est antiquissimorum codicum fides, præsertim accedentibus coniecturis aliis, vt non vereamur liberē totum de Artemisia tenuifolia caput damnare, & ex aliorum ordine in ordinem reducere.

Tria, inquit Matthiolus, à Dioscoride recensentur genera. Vtū priora nullis inter se notis certant, nisi quod in vniuersum altera maior est, altera minor. Id quod etiā confirmat Plinius l. 25. cap. 7. Qui tamē in prioribus Artemisiæ generibus, nihil à Dioscoride dissentiat, dissidet tamen, & errat in tertio, quod in eius locum Ambrosiam sequenti capite ab ipso Dioscoride descriptam subiecerit, credideritque deceptus hic Ambrosiam, & tertium Artemisiæ genus, vnam & eandem esse plantam. Cæterum prima duo Ar-

Quantum
potest Dea
tanti valeat
herba.

Regium
olus.
Anactiorum.

Scissa.
Scerpillum
maius.

Cannabis
Matricar.

Artemisia
duplex ge-
neris.

Artemisia
tenuifolia
caput Dios-
coridi ad-
creuit.

Plinius la-
tus.

temilia genera Hetrusculis frequentissima sunt. Quare equidem nescio, qua ratione ductus Brasauolus pro certo crediderit, eam herbam minorem esse Artemisiam quæ in Hetruria officinis Matricaria, & vulgò mulieribus Amarella vocatur. Sed eò magis virum hunc aliqui celebrem admirari subit, quòd scriptis tradiderit duas alias esse Ferratiae Artemisiae species, nullis prorsus notis distinctas, præterquam quòd alteri vnus tantum sit ramus, alteri verò plures &c. de quibus autè ex Turnero. Ceterum (addit idem Matthioli.) credere nonnulli tertium Artemisiae genus in Dioscoride ascriptionem esse: Quòd in huius capitis initio non tria, sed duo tantum esse Artemisiae genera scribat Dioscorides: Quòd præterea reperiantur huius auctoris codices antiquissimi, in quibus illa de tertio Artemisiae genere non leguntur. Sed nihil mirum videri debet, si in eius historia cecidit Plinius. Neque item mirandum est, si eius non meminerunt Galenus & Paulus. Non desunt insuper, qui Artemisiam tenuifolia caput Dioscoridi accreuisse, atque adulterinum esse censeant, hoc ducti argumento, quòd cum priore capite de omni Artemisiae genere duxisset Dioscorides, absurdum quippe esset, quòd seorsum Artemisiae genus aliud subiungeret. Addunt etiam quòd huius Artemisiae inter simplicia nusquam meminerint Paulus, Oribasius & Serapio, qui tamen illa ex Dioscoride transferunt. Horum sententiam etiam planè probandam existimem: cum tamen vulgari Graeci codices hoc loco Artemisiam tenuifolia caput habeant, illudque à quibusdam redatur, nobis quoque adiciendum, eiusque aliquà saltem mentionem faciendam, duxi: præsertim quòd non desint, qui id Artemisiae genus inueniri tradunt. Si quidem Ruellius est autor, ipsa in Gallia nasci circa riuiulos, aggeresque, item in frumentaceis agris, atque inibi vulgò D. Ioannis nominari. Verum cum difficillimum esse putem, ut hæc planta ab aliquo cognoscatur, & legitime demonstraretur, quòd nullis prorsus notis depingatur, nescio equidem quomodo Ruellio, viro aliquin digio fide, in hoc quis rectè adimplacari debeat, aut merito possit.

Amatus
not.

Amatus Luitanus, inquit Turnerus, cum Dioscorides tria faciat Artemisiae genera, duo duntaxat facit. 1. Artemisiam hortensem, 2. vulgarem Matricariam: vnde planè discedit à textu quem interpretandum suscepit. Diosc. enim vnū habet Artemisiae genus, quòd in maritimis proueniat, foliis & ramis magnis: alterum minus, paruo albo foetido flore: deinde meminit alterius cuiusdam speciei, nascentis in mediterraneis, paruo singulari caule: præter has omnes, de alia agit, quæ Leptophyllos dicitur: cuius sit mentio in omnibus vulgatis Graecis exemplaribus & versionibus Dioscoridis, quæ nunc extant: Vetus etiam interpres meminit trium, ut minimum, specierum, etiam Galenus duarum duntaxat meminit. Vbi autem primam suam Artemisiam hortensem facit, Dioscoride in maritimis nasci scribente, Plinio in litoreos natales duntaxat assignat: rursum ab auctore suo discedit, quem interpretandum suscepit. Ceterum, ut probet contra Matthiolum Matricariam esse Artemisiam vnicaualem, varios citat auctores recentiores, suppresso tamen nomine, quos ipse interim variis in locis operis sui damnat, auctoritatemque pro arbitrio reiicit. Nullam aliam hoc loco rationem adducit, quàm quòd foetida quedam herba, Chamæmelo simili-

lis, sit Parthenium non Matricaria, Ergo Matricariam esse Artemisiam monoclonon. Quam misera sit argumentatio, quilibet potest conspiciere. Repono, plantam tribus quatuorue donata caulibus, non potest esse Artemisiam monoclonos: at Matricaria tres quatuorue aut plures aliquando ramos habet, Ergo &c. Ego vnicam duntaxat verè & legitimam Artemisiam speciem noui, quam in insula quadam prope Venetias inueni, foliis multò maioribus quàm Ponticum Abinthium, calidum in secundo gradu completo, floribus multum absimilibus Pontico, odore tamen nonnihil, non penitus, simili. Testari id potest D. Wēdæus Medicus Regius, qui mecum plantam examinavit. Posset Angli appellari See Mugwort/ i. e. Artemisia marina. Qui igitur verè Artemisiam videndam desiderant, teneant, conferant se Venetias, indeque paullam in insulam Chertellā, vbi Carthusianorum monasterium: ibi eam videbunt per omnia descriptiōni Dioscoridis conuenientem. Hec Turnerus, qui non solum verè negat Matricariam esse Artemisiam veram, verum etiam Artemisiam nostram vulgarem esse legitimam meritò improbat, & aliam adstruit, de qua iudicent illi, qui Artemisiam suam vel viderunt, vel nouerunt.

Antequam verò ad æquiuoca Artemisiae deueniamus, notandum nullam reperiri stirpem, vnicò quæ sit ramo: ac propterea nonnullos Græcos Artemisiam ramola in uersis, uerè ut memoriam producit Adrian. Spiegelus, in nō nominasse, at quo Recentiores quidam, hos fortassis imitantes idem epitheton quibusdam herbis lapsu eodem apposuisse. Sed Græci illi rami appellationem in caulum transulisse videntur.

Ceterum, Artemisiam hodie plures nominantur, ut mox apparebit. Est siquidem Artemisia vulgaris rubra & alba: iterumque latifolia & tenuifolia. Artemisia marina Lobelio, nobis Abinthium & aritimum Matth. latifolium. Artemisia tertia Dioscoridis leptophyllos Lobelio, nobis Artemisia leptophyllos. Artemisia tenuifolia prima Clusii, quæ eodem autore ad Dioscoridis tenuifoliam referenda. Artemisia tenuifolia secunda eiusdem. Artemisia tenuifolia tertia eiusdem Clusii. Quæ quibusdam Ambrosia dicitur, ab aliis Artemisia nuncupatur. Artemisiam dici de Abrotono apparet apud Tragum lib. 1. cap. 1. Botris à quibusdam Artemisia dicitur. Iuanilla aruenis, quam Gesneus Artemisiam heptaphyllon esse putat, Botris altera à nobis appellatur. De Artemisia marina Neoteri-
corum dicemus sub Iacobæa marina siue cineraria. Artemisia siue latius Anglica Taberna-
montani est Tanacetum crispum. Artemisia tertiæ genis flore albo vocamus Tanacetum album. Artemisiam tertiæ quartum genus, Tanacetum satuum & Tanacetum inodorum. Matricaria creditur à multis, esse Artemisiam leptophyllos Dioscoridis. Senecio foetidus Dalechampi, à quibusdam Artemisia foetida appellatur. Camphorata Galapini, Ageratum nostrum, à quibusdam Artemisia monoclonos cognominatur. Artemisiam speciem qui autumant Florem Aphricanum (Tagetem Indicum) non sunt audiendi. Scorodotin Artemisiam speciem constituunt Eustach. Roeflin & Lonicerus, qui Ambrosiam vocant. Eupatorium siue Agrimonia aliqui falsò Artemisiam esse putarunt. Artemisiam monoclonon non desunt qui Tanacetum vocatum stauant. Artemisiam tenuifoliam odoratam

doratam Tabernamontani Matricariam odoratam appellamus. Artemisia tenuifolia eiusdem flore pleno, est nobis Matricaria flore pleno. Artemisia *παλιχαγρος* Dodonæi, seu Flos Iacobæus Thaliò, à nobis Iacobæa vocatur.

Artemisia rubra, vino decocta, adiectione Mice multà, aut exiguà prout volueris, per diè bis vel ter supra locos muliebres excalfacti, autore Trago, mentes suppressos ciet & educit, nec non seculinas, ac quacunque id genus in internis hærent vitia: aqua destillata paribus facultatibus est prædica. Decocto Artemisiæ, si id cum Saccharo vel nelle temperetur, tussis mitigatur, leniti humores circum præcordia extenuantur, calculi comminuuntur, pulmo mundatur, nec non renes & vesica, idque tam in mulieribus, quam viris, si decoctum istud per diem bis vel ter bibatur, ita tamen ut à potu sumpto postea ieiunes. Flosculi Artemisiæ siccati omnium præstantissimi sunt, nec tantum in Medicinâ, sed & culinâ maxime idonei. Sunt, qui in Autumno vium ex Artemisia deferuere si nunt, illudque vinum postea ad dictas mulierum affectiones usurpant: & ut paucis absoluiam, Artemisia viribus ad Pulegium ferè accedit, & quantum iudico, in omni cibo gratior. Artemisiæ flores cum Chamomilla & Eupatorio in vino decocti ad nervorum & articularum perfrictiones & dolores faciunt, si decocto illorum foueantur & cum illo conficiuntur partes affectæ: præterea si quis longo itinere, plus æquo defatigatus fuerit, is aqua in qua Artemisia decocta fuerit, pedes abluit, reuersionem facit: herba Artemisiæ vino rubro decocta viuntur aduersus exitum ani, ut in locum suum reponatur, vino autem decocto calidissimo insidendum erit, ita tamen ut prius cum Myrrha & Colophonia suffumigetur anus. Artemisia, si Platæario fides habenda, calida est & sicca in quarto gradu, folia eius magis competunt vsui medicinæ quàm radices, & viridia magis quàm sicca. Valet contra sterilitatem factam ex humiditate: nã si ex siccitate esset, obesse possunt autè hæc facis perpendi ex complexionem mulierum, sc. an sit corpulenta, vel macilentia. Datur autem cum pulvere Bistortæ, & Nucis muschatæ & Saccharo, per modum Electuarii. Aqua Artemisiæ secundum Hier. Herbarium, somnum inducit. Facit procrecere barbam illita. Tineas capitis exterit, ichteritiam expellit. Et hydropili incipienti medetur. Venenorum quoque vnica antidotus est. In dolore capitis à frigidityte Wirtembergic. Empiricus coquit Artemisiam in bono vino, abluit caput, & calidè applicando superligat, intra horam mitigare dolore. nec tunc promittens. Hoc antè docuit, & clariùs quidem Arnold. lib. 1. de cur. morb. cap. 8. ubi ad hemicaniam flo. es Artemisiæ in aqua coctos appositos, abluto prius capite cã decoctione, multum valere prodidit. Inueniuntur carbonēs [inquit idem Wirtenb.] sub Artemisia rubra, quos dabis epileptico, & collo appendes: D. mater mea experta est in vxore mea & puero, qui cura ti fuerunt, ut propria manu scribit Guillelmus Landgravius Hildæ. Commendantur etiam ad paralyum cum vino aut aqua lauendulæ. Hæm! quibus ceremoniis, quâ superstitione homines non infini irretiti tenentur: contaminantur! Sunt qui Artemisiam c. rtis hortis & diebus effodere, ac sub ea carbonēs, seu (quod ferè di-

xeram) stultorum lapides, aduersus febres inquirere soleant. Alii eò stultitiæ ac dementiæ progrediuntur, ut Artemisiam se cingant, ac ex ea sarta conficiant, quæ postea in ignem Diuo Ioanni facrum, vna cum omni infortunio [ut sibi temerè imaginantur,] coniiciant. Nec desunt qui Plinio seductore impio, Artemisiam cum Saluia secum deferant, credentes se nequam ex itinere defatigandos. Sed quis veræ religionis sincerus cultor, his & similibus superstitionibus fidem haberet, quibus seductor ille spiritus, Cacodæmon, nobiles Dei creaturas confutatas decipere, deceptas tandem in ignem æternum abducere solet. Iacobus Vallick lib. de sagis & lamiis, Artemisiam commendat aduersus Satanam, & sagitarum [vasorum eius] fascinationes. An verò herbas reformidet Satan, Theologis disceptandum relinquimus. Mittamus nos imposturas has. Ambrosi. Paræus multum commendat sua & aliorum experientia, Artemisiam sale aduersus pestem: ut & Antonius Royet, nec non alii. Veteres plurimum laudant Artemisiam contra serpentum morsus: idèò probabiliter aduersus pestem.

AMBROSIA VETERIBVS.

CAP. LXXIX.

Ambrosiam, ut Dioscoridis palam fecit, alii Boetium, alii Bauim Artemisiam appellant. Est autem frutex exiguus, trium palmorum altitudine, ramulos: folia circa numerum caulem habet exigua, ceu Rutæ, cauliculis [pachya ald.] verd minutis seminibus, quasi racemulis, qui nunquam florent, refertos: est is odore vinoso, ac suauis. radix tenuis & duum palmorum longitudine. Nectitur in coronas apud Cappadoces. Vis eius reprimere, repellere, & illuc adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt. Romani Caprum siluaticum, aut Apium rusticum vocant: Egypti Merisco.

Ambrosia, inquit Plinius, vagi nominis est, & circa alias herbas fluctuans &c. quæ cum Dioscorides habeat omittimus. Is tantum inquit Cornarius, vim reprimendi, αὐπορεστικὴ Dioscoridi dictam, in discutiendi vim διαφορετικὴν appellatam commutauit. Nam & Galenus Ambrosiam in cataplasmatis vinu adstringentem & repulsoriam habere testatur. Sed Plinius uti dicimus Ambrosiam cum Artemisia confundit. Nò inter herbas aliquas fluctuans, & vagum nomen tantum quondam Ambrosiæ fuit: sed quodcunque odoris aut cibi suauitate placeret, in Poëtiis, Scriptorisque aliis eodem hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem vtenibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequens & notum ubique nomen, ignota tamen res, & inter herbas non facilis inuentu: aliis salter eam ostendentibus & cum Artemisia miscentibus ferè cunctis. Quo fit ut in peregrina Italiz herba nihil pro comperto constituere audeam. Plinius lib. 27. cap. 4. integrum Dioscoridis caput commentationibus suis inseruit, cum tamen non multò antè lib. 25. cap. 7. de Artemisia agens dixisset. Sunt qui in mediterraneis eodem Artemisiæ nomine &c. Ambrosiam vocent. Ex quo manifestè deprehenditur, quod paulò ante diximus vagum per multa Ambrosiæ nomen esse,

Ambrosia.
196 Bo-
etis Ar-
misa.

Plinius lap.
Sut.

plantas, cibos, & pocula, eousque vt Athenienses hoc nomine omnigenas fruges oleum, vinum, lacticeque alios, quos diis in ara afferrent, Ambrosiam nominarent. Nobis inclinât animus vt peregrinam nostro orbi peculiarémque Cappadociæ herbam existimemus, inquit Marcell. Virgilius ex Ruellio, iuxta quem tamen, ambrosia notissima est in Gallia nascens inter segetes: Verum eam in Gallia se nunquam vidisse nec scire quid sit refert Bacchanellus, nisi sit species Artemisiæ de qua Dioscorides & Galenus verba fecerint.

Italiæ nunc inquilinam refert Hier. Cardanus lib. 8. de rer. variet. c. 44. dicens: Ambrosiam producere vitam in longissimum ævum plerique asserunt. Italia quoque hanc herbam, licet rarâ, fert: sed si seratur, non reiciet: facile dignoscitur quod sola suo semine quemadmod. copiosum fert vinum, suauiter redolet: racemosa est, Rutæ folio, radice valde longa exilique, nunquam floret. Vltus igitur herbæ huius vitam producere creditur: nec ratione caret, quod ex proprietate sit. Qualis sit Cardani Ambrosia perquirant poster. Itémque qualis Bellonii Obs. lib. 2. cap. 53. 56. & 112. vbi valde aromaticam esse tradit, his verbis. Dum ex Heraclea in Iconium, vulgò Cagne dictum iter facerem, nullam herbam inueni Ambrosia frequentior, adeo odoratam, vt capitis grauedinem non minùs induceret, quàm si in cella vinò multo pleno versatus fuissém. Incolæ lignis carentes, eam legunt ad ignem strudum. In pago nomine Sarameli vidi Scopas ex Ambrosia confectas, cuius manipulum in Galliâ retuli, pro re singulari: nam in Europâ, quod sciam, sponte non prouenit.

Hortus porro Sanitatis cap. 21. nomine Ambrosiæ habet figuram alicuius plantæ umbelliferæ, quid autem velit me later.

Artemisia
tenuifolia
Ambrosia
quibuldam

Botry.
Botry. al.
tera

Nastur-
terruco-
sum.
Salvia.

Tanacet-
um.

Achillea.
Myriophyl-
lum Mat-
thioli.
Apium
vulgare.
Centu-
grana.

Pyrola al-
tera
Lilium
croceum
minus.
Lilium
Sedum
maius.
Sedum ar-
boreum.

Scorodisc.

Ambrosiæ nomine sequentes plantæ passim apud autores inueniuntur. Artemisia tenuifolia, quam Matthiolus in prior. com. pto vera Ambrosia expresse. Ambrosia quibuldam dicta aliis est Artemisiæ species, aliquibus Conyza Hippocratis. Quam lib. H. n. g. 28. Botryn inscribit, Ambrosia à pluribus cognominatur. Per Ambrosiam Rheginum existimo intelligere nostram Botrym alteram. Coronopus Ruellii vel Nasturtium verrucosum Ambrosiæ nomen apud multos adeptum est. Toxites in Onom. philosoph. Saluiam, Ambrosiam Deorum appellat. Ambrosiam quidam Tanacetum esse volunt, quibus reclamât ipsamet Ambrosiæ & Tanacetii historia. Ambrosia Apulei cap. 88. Millefolium nobile Tragi, vocatur à nobis Achillea. Myriophyllum quod alii teste Apuleio, Ambrosiam dixerunt, Millefolium siue Myriophyllum Matthioli inscribimus. Sunt qui Apium vulgare Ambrosiam vocent, sed magno cum errore. Stipis ramusculum, quidam Ambrosiam esse censent, Matthiolus verò Polygoni esse genus credidit: cum officinis eam Centumgrana vocamus. Amato dicitur etiâ Pyrola altera. Ambrosia Corinthiis autore Nicandro ex Athenæo lib. 15. cap. 11. est Lilium croceum minus. In Co Insula ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiam, quæ nihil aliud sit quàm Lilium, Carystius, teste Ruellio, memoriam prodidit. Nec desunt, authore Dioscoride, qui Sedum maius Ambrosiam appellent, secundum nonnullos. Existimo ego Apuleium ac Dioscoridem vocasse Aizoum maius, arbore-

ces potius quàm vulgare. Ambrosiam multi vocant eam herbam, quàm nos Scorodiscin nuncupamus. Toxites in Onom. philosoph. Millefolium Ambrosiam cognominat. Ambrosia quoque de Ageraro dici, liquidò constat. Ambrosiam quidam hirsuturæ putant, sed fallum est, inquit Cordus in Dioscor. lib. 3. cap. 129. Hanc nos credimus esse Libanotum secundam Dodonæ. An Ambrosia Ruellii, quam Bacchanellus se ignorare facetur, est Herba vinosa?

AMBROSIA QVIBVS DAM. CAP. LXXX.



Complu-
ribus fru-
ticat statim è
radice ortis
virgultis, tri-
atis, rubenti-
bus, subhirsu-
tis, in ramos
multos didu-
ctis: folia sua-
ueolentia, Ab-
sinthii com-
munis magni-
tudine & di-
uisurâ, albica-
tia, lanugino-
sa, sapore aro-
matico, ama-
ricante, non
ingrato: ce-
rymbis proximè
ramulis an-
nexi longam

spicam faciunt, quos excipiunt echini parui, mu-
reati, quorum singulis grauium melle vnicuique, ni-
gram, gigartio vitigineo simile & ferè par. Ta-
dis lignosa, simplex, sinibus aliquot capillata.

Lobelio dicitur in Aduers. Ambrosia: in Obs. Syno-
p. 442. Ambrosia fatiua hortensis procerior: In
Icon. Plant. p. 766. Ambrosia fatiua hortensis.

Dodlar. Ambrosia: Rauwolfii in Itin. A. m-
brosia vera apud Tac. Renaudum visa: Cæsalp.
Ambrosia, & Ambrosiana vulgò, (Videtur autè
Cæsalpino esse Ambrosiam Dioscoridis, quæ o-
pinio minùs placet.) Camer. hort. Conyza Hipp.
secundum Anguill. Item: Ambrosia picta à Lo-
belio: Gerardo Ambrosia, Obs. of Cappadocia.

H. Lugdunensis mihi videtur quatuor figuras
unius plantæ pingere, & tres descriptiones dare,
quæ non placent, ceu nec in omnibus figurâ.
1. est p. 950. hoc titulo: Artemisia monoclonos a-
lia. 2. hoc: Artemisia monoclonos quorundam,
aliis Ambrosia. An 3. figura p. 950. hoc titulo?
Artemisia leptophyllos montana: 4. hac inscri-
ptione p. 1148. Ambrosia hortensis procerior Lob.

Casp. Bauhin. Phyt. Ambrosia siue fatiua, a-
liquando ramosa, aliquando vncialis, hinc duæ
icones apud Lugdunensem, p. 1148. & p. 951. Itè
Ambrosia siue polypermos, Lugd. monoclonos
quibuldam. Dubis sumus n. s. vt etiam dictis pat-
ter, an H. Lugdunensis monoclonos figura non
sit mala, ac etiam descriptio, & fortè eadem cum
Ambrosia fatiua: si quis extat, qui plantam vi-
derit, moncat.

Tabern. Ambrosien: oder klein traubenfrauz/
Græcè Αμβροσία, & Βότρυς ἀμυρσία, Ambrosia,
Botrys, Artemisia Borroides, Gelsino Herba vi-
nosa,

nosa, Ital. Ambrosia; Gall. Minones, Ægypt. Merseo, Boh. Storzuycto/Flammandis & Braban. hos Ambrosie/h.e. Ambrosia fatiua seu hortulana, & Cleyu Truyencruyt. Videtur Tabern. diuersas plantas confundere. Nomen, Herbari nosa, & Minones sunt apud Ruellium, quem de hac Ambrosia vix puto esse locutum. Tabern. si nouit, plantam quam describit, cur eam non quoque pinxit?

Ambrosia quibusdam dicta à nobis visa est Tiguri in horro D. Gesleri. Geneuæ in horro nostro florebat mense Nouembri & semine turgebat, de- cidoque proveniebat Majio. Montbelgardi in Horro Ill. E. C. apius creuit: sed semen ad maturitatem non provenit.

ABROTONVM VETERIBVS.
CAP. LXXXI.

AΒΡΟΤΟΝ, vt Nicandri testatur interpret, inde nomen sibi usurpauit, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat: *ἄβροτον* ἄβροτον ἔστιν ἡ ἀβροτον. Aut quod grauem acremque & difficilem halitum prospiceret: *ἀβροτον* ἔστιν ἡ ἀβροτον.

Veterum verò omnium sententiā Abrotonum duorum esse generum. Theophrasto quippe 6. Hist. 1. Vrbano & [6. de caul. 24. sic C. Bauhino in phyt. scribente, quod nondum in illo capite legimus,] Agreste. Dioscoridi fœmina & mas: Sic quoque Plinio lib. 21. cap. 7. cui mas, Abrotonum campestre: fœmina verò montanum. Verum quam Dioscorides fœminam fecit, eam Plinius Chamæcyparissi nomine lib. 24. cap. 15. donasse videtur, inquit Casp. Bauhinus.

Abrotonum, inquit Theophr. radice aut avulsione potius quàm femine germinat: femine enim difficulter exit. Seritur Æstate: friger enim vehementissimè: atque in totum morbo obnoxium est, etiam vbi Sol vegementer illucet. Sed cum consualuerit, creueritque magnum, robustum atque arboraceum constat, quemadmodum Ruta, nisi quod hoc lignosius, & fœcius & squallidius est. Abrotonum quoque femine abidat, nec sine odore est, sed id radices rectas, altasque agit: est veluti vniuersis, crassa scilla radice: reliquis verò de ea exeuntibus spargitur. Abrotonum mirandum profecto apparet: cum enim calidum sit, loca aprica persequitur. Ratio in infirmitate est: vires enim tam contra frigus, quàm contra æstus huic deficiunt. In totum verò calor inditus ad facile beneque germinandū haudquam præcipuus intelligitur: siquidem calida sunt quæ actia.

Abrotonum duorum traditur generum, inquit Dioscorides: ac fœmina quidem frutex est arboris specie, candicans, foliis circa ramulos Seriphii modo minutim incisus, floribus refertos habens in summo quasi corymbos auri fulgore, Æstate provenientes, iucundi odoris cum grauitate quadam, at gustu amaro. Hoc genus Siculum esse creditur. Alterum mas uocatur, farmentosum, gracilibus ramulis velut Absinthium fruticosum. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriæ Hierapoli. Vtriusque semen seu feruifacium, seu crudum, tritum & ex aqua potum, orthopnææ, ruptis, conuulsis, ischiadicis doloribus, vrinæ angustis & mensibus commorantibus auxiliatur. Est & in vino potum exitialium venenorum

exitialium venenorum antidotum. Rigore prehenfis ex oleo vtiliter illinitur. Serpentes quoque tum substrato, tum etiam nidore fugat. Sed & contra morsus eorum cum vino bibicum prodest, priuatim verò pollet contra phalangiorum & scorpionum ictus. Subuenit & oculorum inflammationibus, cum Coroneo cocto aut pane impositum. Discutit quoque panos, cum farina hordeacea cruda tritum decoctumque. Miscetur denique & Olei irini compositioni. Oleum Abrotonium hunc in modum conficit Dioscorides. In olei ad Cyprinum conficiendum aromatibus imbuti libras nouem & quincuncem, Abrotoni foliorum libras octo immittit, ac posteaquam diem noctemque vnam maceravit, excolat. Quod si perennius & magis durabile conficere vult, abiectis prioribus foliis, alia apponit, & macerata exprimit. Vim porro habet calfacto-riam, ad vuluæ præclusiones & duritias efficacem, menstrua secundasque pellit.

De Abrotono passim agit Plinius. Nam lib. 21. cap. 10. huius primò meminit. Abrotonum, inquit, odore iucundè graui florer Æstate. Flos aurei coloris. Vacuum [vacuis, i.e. incultis, neglectisque locis legit Dalech. & hoc loquendi modo prædia vacuat, scripsit ac dixit Cicero] spontè provenit. Cæcumine suo se propagat, quoniam summis flos furculis exit, quo percunte semen succedit, & è vertice plantæ delapsam, teraque exceptam plantam suam propagat: Seritur autem semine melius, quàm radice aut furculo: semine quoque non sine negotio: plantaria transferuntur. Sic & Adonium. Vtrumque Æstate. Altiola enim admodum sunt: & Sole tamen nimio læduntur: sed vbi consualuere, ritu Vitis fruticant. Eodem libro 21. cap. 21. Abrotonum duorum traditur generum, campestre ac montanum: hoc fœminam, illud marem intelligi volumus. Amaritudo [Diosc. hoc de Helenio secundo, Dalech.] Absinthii in vtroque. Siculum laudatissimum, dein Galaticum. Vnus est & foliis, sed maior semini ad exalfaciendum: ideo neruis vtile, tussi, orthopnoicis, conuulsis, ruptis, lumbis, vrinæ angustis. Datur bibendum manualibus fasciulis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tritum in aqua drachmæ pondere. Prodest & vuluæ. Concoquit panos cum farina hordeacea & oculorum inflammationibus illinitur, Coroneo malo concocto. Serpentes fugat. Contra ictus earum bibitur cum vino illiniturque. Efficacissimum contra ea, quorum veneno tremores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum: & contra venena alia, pota prodest, & quoquo modo algentibus, & ad extrahenda ea, quæ inhaerent corporibus: Pellit & interaneorum mala. Ramo eius, si subiiciatur puluino, venerem stimulari aiunt: efficacissimamque esse herbam contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeatur. Hac Plinius, apud quem nonnunquam falsò legitur, *Coquitur panis cum farina hordeacea*: legendum enim est, concoquit panos. Est enim id quod Dioscorides *ἄβροτον* ἔστιν ἡ ἀβροτον dixit. Si quoque recta est Gazæ lectio & interpretatio, Plinii locum corruptissimum quidam merito sic restituit. Seritur autem viuiradice, ac sureulo melius quàm semine quoque non sine negotio plantaria transferuntur: in Adonidis hortos, Æstate. Vtrumque altiolum admodum est, & Sole tamen nimio læditur: sed vbi consualuere, ita ut Ruta fruticant. Sic agitur

Plinius
corruptum

HISTORIAE PLANTARVM.

ex Theophrasto legendum, ex qua sua partim mutatus est Plinius. Illa etiam verba, *ἡ ἀβρίνη* ad *ἀβρίνη* & *ἡ ἀβρίνη* aliter legisse videtur, qui Adoniū latinē reddiderit, perinde ac si herba cuiusdam peculiare nomen esset. Vocantur autem Adonidis horti, *οἱ περὶ τὴν ἀβρίνην* & *οἱ περὶ τὴν ἀβρίνην*, quales sunt qui testis ac fictilibus, ē fenestris ad Solem exponi solent.

Galenus tertio abicessu calfacere atque siccare Abrotonum dicit, habereque vim discutiendi ac siccandi, ut quod minimum acerbis habet.

Quam porro in duobus Abrotoni generibus differentiā ex sexu Dioscorides indicauit, ex locorum, in quibus nascuntur, diuersitate Nicāder tradidit. Siquidem in Theriacis de eo ait. Et Abrotoni quod siluestre in montibus fronderet. Hæc enim manifestō argumento sunt, montano oppositi campestre & satiuum. Ita Plinius, & hunc & illum autorem secutus, utiq; dū rīmine distinxit Abrotonum, duorum generum triadi dicens. Campestre ac montanum: intelligique hoc marem, illud fœminam.

Abrotonō sunt qui Abutonō, qui Absinthium (ab amaritudine quam cum eo habet, qui Heraclium (ab Heraclea Ponti ciuitate, ad quam, totūque eius agro plurimum nasceretur, & probatissimum vocatum fuit:) qui Choloptron, qui Procampylon (quod in terram se flectat, & cacumine suo se propaget, *ποκαμπύλον* enim in plātis Græci dicunt, quæ cū se exerxerint in terrā rursus se incuruant:) qui Cynanchitem, qui Thelithamnon, qui Dulcem Ancona (eadem ratione qua Procampylon: *δύσμων* enim cubitos dicunt, quorum similitudine se flectit Abrotonum) appellent. Magi Neura phanicos, Romani Absinthium Ponticum dicunt.



Ceterum cū voces hę duę *ἀβρίνη* & *ἀβρίνη* (quarum hæc quod tenue fœmen habet, altera quod tennes ramulos & fruticosus est, significat,) in Abrotono hoc variē in Græcis legatur, & Dioscorides Absinthii modo *ἀβρίνη* esse dixerit, fruticosum vertere cum Marcello legere maluimus. Fides penes Græcorum codices sit. Cur autem Aetate nasci Abrotonum Dioscor. dixerit, non multo antē ex Theophrasto, reddita à nobis causa est, quod alioq; herba sit, frigoriūque facillimē pereat. Obseruandum præterea, à Paulo Aegineta, Galeno, Serapione & plerisque aliis Dioscoridem in Abrotoni decretis legentibus, plerūque alias vires à cunctis & ab aliquibus eorum Abrotono decerni [ut ex Galeno patet,] quæ in Diosc. desiderari fortē possunt, temporum iniuriis & librariorum incuria omisse.

Pamphilus, auctore Galeno, à quo etiam reprehensus, ut Hermolaus coroll. 453. testatur, Abrotonum à Romanis Santonicum appellari credit. Abrotonum (ut vult. Rhegin. in exerc.) cū Absinthio marino vel Seriphio videtur Galenus facultatibus inter se confundere. Abrotonum nigrum Cordi, est nobis Abrotonū mas siue vulgare, Matthiolo hortense. Abrotonum siluestre, si Fuchsi credimus, est Barbaris Abrotonū, quo hodie passim pro mare vtuntur officinæ. Pro Abrotono fœmina Dodon. pictam dedit plantam, quam H. Lugd. Abrotonū siluestre, Fuchf. Abrotonum marem, nos Abrotonum secundum nominamus. Abrotonum odoratum humile, densē fruticosum Lobelii inscribitur Abrotonum cū pulchris corymbis. Lumbricorum semen dicitur Abrotonum mas Diosc. Anguillare. Antemissiam tenuifoliam quam vocamus, alii Abrotonum

campestre & siluestre vocant. Absinthii vulgare Pontici, Abrotoni minoris nomine Tragus, Abrotoni siluestris siue albi Cordus, fœminæ Gesnerus & Fuchsius, intelligunt ac depingūt. Abrotoni fœminæ nomine (dicit auctor annot. in Cordi Hist.) aliqui depingunt Chamæcyparissum de quo antē diximus, eiusque plures species constitimus. Numeratur, teste Cæsalpino, à Syluatico Tanacetum inter species Abrotoni. Abrotonum siluestre, sunt ut existimamus, qui Achilleam constituent, auctore Cæsalpino. Abrotonum peregrinum Cupressi foliis, Sabinam Aegyptiam vocatum à Lobelio, pertinere nos quidē crediderimus ad Arborem vitæ, de qua lib. 9. Abrotonum mas quidam volunt esse Absinthium Seriphium Aegyptium. Weissamen (Seriphium Germanicum, siue Sophia) siue species Absinthii, siue Abrotoni sit, parum intēesse putat Tragus.

Abrotono deficiente, Syluius in Antibalomenis substituit Absinthium: idem Auicenna, Placotomus & Fauardus. Pro Abrotono Galenus in subst. accipit Organum, Abrotoni loco Polium quoque sumit Auicenna. Pro Abrotono immiscet Borganuccus, ut apparet in eius Antibalomenis, Thus.

ABROTONVM VVLGARE. CAP. EXXXII.



CRebris radice lignosa frutescit *sarmentis*, tres quatuorue cubitos altis, duris, fragilibus, medulla alba plenis, subrubentibus, striatis, ramosis: *folia* per alas multas, tenuiter dissecta, feniculaeis paulo latiora, canescentia, odore vehementi, sapore amaro & acri, atque infestiora quidem multis. *Clas* mæmeli modo, superiora, vno atque altero segmento diuiduntur, non ratō nihil quā vnicum tenue amentum sunt: *flores* secundū ramulos conferti corymbos Absinthii æmulantur, colore luteo lo præditi. Hoc Abrotonum videtur mihi cultura & pro anni

Santonium.
Absinth. maximum
Abroton. mas siue vulgare.
Abroton. siluestre.
Abrotonum secundum

Abrot. cum pulchris corymbis.
Lumbricorum semen



anni tempore multum variare, ita ut videatur plurius esse specierum. Qui curarunt pingendas tres icones à nobis propositas, an per singulas Abrotonum intellexerint asserere non audeamus: ita sculptas emimus, omnes vix placuit pro Abrotono.

Quod nobis Abrotonum

vulgare dicitur, id Abrotonum appellat Corn. in Dioc. Wirtung. Kyber. Brunfels. Riss. Euch. Roelin, Wincklerus, Brassauola, Rob. Stephanus, Harchius, Gesn. in cat. pl. Casalp. & Apollinaris. Abrotonum vulgare Cronemb. de comp. med. & Cordus in diss. supra Martiatum ubi & Camphoratam Nicolai vocat. Abrotonum nigritum, seu masculum Cordus in Hist. (ubi figura appposita parum placet) & in Dioscorid. Abrotonum marem Milzald. in Alexikepo campo 2. area 2. & de sect. hort. lib. 2. cap. 24. Toxites in onom. phil. (cui etiam Abrotonum agreste,) Lacuna, Lonic. H. Lugd. Had. Iunius in Nomocl. Amat. Wormianenses, Car. Stephanus, & Matth. qui tradit esse vulgaris notitiae, hortense & per se in campetribus nascens tenuioribus & minoribus seminibus.

Abrotonum mas [inquit Apollo rad.] notissimum est ex Matthiolo in hortis. Ego tamen Anguillarii opinionio potius adhaereo, quod visitatum sit femina.

Figuram, quam nomine Abrotoni ponit Tragus, non bene exprimit Abrotonum, sed potius Absinthium vulgare Ponticum foliis aliquo modo imitari videtur. Is Abrotonum duorum esse generum tradit. Minus foliis, magis quam maius, cineraceis & incanis vestitum, adeoque Seriphio germanico planè similibus. Maius virgis vulgari. Chamomillae quam proximis, odore grauiori, simulque gratiori quam minus.

Figura quam habet Fuchsius minus placet, nec etiam placent nostrae olim per Fuchium sculptae: ut iam supra dictum.

Abrotonum duplex tradit Dodonaus: Maius, quod femina: & Minus, quod Mas. Miror autem eum pro Abrotono mare assumere figuram Absinthii arborescentis Lobelii, & pro Abrotono femina figuram quam habet Lobelius pro Abrotono mare, quae nostri vulgaris Abrotoni: ac suspicor eum ignorasse verum discrimen inter Abrotona quae tradit, & per maius intellexisse id quod cultura in arborem erigitur: per minus verò quod cultura non erigitur, quo ad hortum septa minora consilia videntur.

Abrotonum feminam Dioscoridis, nihil aliud esse scribit Anguillata, quam commune & vulgare.

Carier. hort. Abrotonum mas, ubique notum aulis ramulis facile propagatur, femine verò Tom. III.

difficiliter prouenit.

Et paulò post: Abrotonum magnum, camphoratam, quibusdam Incensaria, admodum fruticet, & facile se ex furculis propagat, odoris gratius, attamen omnibus iucundi: Tragus appellat *Groß Stabwurtz*. *Ecce* Camerarius separat suum magnum Abrotonum, à suo mare Abrotono, interposita *Chamæcyparissio*: præterea *Groß Stabwurtz* Tragi non differt ab Abrotono vulgari, quod proponit Camerarius pro mare. Is etiam ad Hist. Matthioli getm. hoc separat ab Abrotono Matthioli. In Epit. Matth. Abrotonum mas. Idem ibidem pro Abrotono femina *Chamæcyparissium* pingit.

C. Bauh. phyt. Abrotonum 9. siue mas angustifolium maius: maius Brunfelsio, mas Lobelio: Item: Abrotonum 11. siue latifolium: maius & secundum Trago, latifolium Tabernamontano. Cur separet frater C. Bauh. Abrotonum Tragi maius à vulgari & angustifolio non video: vel dicendum vulgare Trago non cognitum.

Tab. ait Legitimum Abrotonum in hunc usque diem nomen seruat: vocatur autem Abrotonum, vel ut subtiliores quidam Grammatici volunt Habrotonum, Colopæon, Procampylon; Cynanchites & Auronum, à verbo Gallico *Aurone*. Arabi Serapioni de temp. simpl. cap. 306. *Carum*: Auerth. *Halsia*: Ebenbitari *Afula*: Haliabbati; *Beniaseton* & *Quisumum sehum*. Dicitur aliàs in libris Arabum *Aluise*, *Sagualata*; *Sanguasora*; *Sanamen*, *Sarion*, *Sekebinegi* & *Sehebingi*; potissimum Almanfori Tract. 2. Aliis tandem *Seisegurab*, *Sgufera*, *Alfelisil*, *Cufar*. Dalegensiter, *Hallia*, *Hanudab*, *Hebum*, *Kaisum*, *Kalum*, *Kisum*, *Kesimi*, *Kakilem*, *Kelilech*, *Nacul*, *Nanasar*, *Rutinas*, *Sachinabiam*, *Safara*, & *Sagaron*, Italianis *Abrotono*, *Abrotano*, *Brotono*; *Herba canfrata*. Plebi Ferrariensi *Aurodono*. Hisp. *Abroton*, *Hierua*, aut *yeruat* *lumbriquera*. Galis *Auron*, *Aurone*, *Auronne*, *Auroesne*, *Aueronne* & *Bois de S. Jean*. [item aliquibus *Garderobe*, quod Taberni non monuit,] Anglis *Sothernwood*. Bohem: *Brotran* / *Bozedrzemfo*: Hung. *Obruta*, *Seprûruta*, h. e. vt Car. Clusius interpretatur, *Scoparia Ruta*, & *Isten faya*, h. e. *Lignum Dei*. Belgis & Brabantis *Auerone* & *Aueracruz*. Germ. *Stabwurtz* / *Bertwurtz*, *Gerthagen* / *Afrusch* / *Ebrich* / *Gartban* / *Gerel* / *Gereltraut* / *Gerelwurtz* / *Kurteltraut* / *Gansertraut* / *Gansfertraut* / ab odore, quo Camphoram æmulatur: *Abroten* / *Geremurtz*, & *Schofwurtz* / quod sagittas, spinas & id genus extrahat, si emplastri modo applicatur. Et hæc nomina Abrotoni sunt communia. Abrotonum etiam mas vocatur græcè *ἀβρότον* & *ἀβρότον* Lat. abrotonum masculum, Plinio abrotonum montanum: Dioscoridi abrotonum Cappadocum, Abrotonum Galaticum, & Abrotonum Asiaticum, quod copiosè crescat in Cappadocia, in Asia & Galatia, Italianis ad differentiam feminae (*Chamæcyparissii*) *Abrotono mischio*. Germ. *Stabwurtz* / vel *Stabwurtz* *Mäntlin* / quibus nominibus utrumque Abrotonum intelligitur, masculum sc. maius & masculum minus: ad evitandum errorem, in quem incidunt, qui Abrotonum minus, Abrotonum feminam esse credunt. Theophrastus & Plinius non conueniant in plantatione Abrotoni: vnus vult feliciter prouenire ex furculis, alter ex semine. Experientia docet ex furculis potius crescere. Et quamvis Theoph. lib. 6. cap. 7. & alii scribant, frigus ferre non posse, nihilominus Hie-

Camer. hist.

C. B. hist.

mem perfert. Abrotoni maris species minor, quæ etiã in hortis nostris vulgaris, vt maior, huic in omnibus similis nisi folia essent cinerea, & planta minor. Horum figuras ponit in Hist. & Ic. his inscriptionibus. Abrotonum mas Stabwurz Mânlin: Item: Abrotonũ humile, Klein Stabwurz. Sed Tab. frustra duas figuras ponit, cum color, qui demonstrari non potest, & magnitudo, quam non ostendit, solum differentiam non constituent.

Locus &
Tempus.

Abrotonum passim in hortis & in campestribus nascitur: floret Augusto: colligitur in Autumno, potissimum Septembri mense, hoc enim tempore, Fuchsio auctore, semen profert. Ego tamẽ multum ambigo an Germania aliofolium huc fruticem in campestribus proferat. In hortis quidẽ Montbelgardi, Patavii, Genevæ, Tiguri, Heidelbergæ, in Gallia Narbonensi & alibi obseruauit.

Vires

Vires ex Vereribus vide antè. Summæ propagines Abrotoni cum folculis suis, vino, vel aqua decoctæ, adiecto melle, aut saccharo, pèrque diẽ ter aut quatuor potæ, non nisi rectè ceruicæ spirantibus & asthmaticis apprimè conducunt, si Trago credimus: nam vitia pectoris expurgant, cardiacæ medentur & tussi, lentosque humores pulmonis, renum, matricis & vesicæ incidunt, stillicidio vrinæ succurrunt, & quosuis internos dolores sedant: aqua destillata, non est inferiorum virium, quæ etiam scorpionum & araneorũ ictibus auxiliatur, loca muliebria mundificat, si illa colluantur, vel linteolis in illa madefactis curentur. Qui plura desiderat, Tabernamontanum consulere velit, qui plurima de vsu interno & externo, de aqua eius, vino, & conferua: itẽmque oleo stillatitio & vnguento tradidit, quæ merito nos omittimus, ne in immensum opus excreseat. Abrotonum, vt apud Camerarium inquit Horatius, ægro non audet, nisi qui didicit, dare. Sed nostro seculo audaci quilibet non solum minime periculosa hæc medicamenta, sed etiam quæuis validissima aliis obtudere non erubescit. Vfus eius præcipuus in lumbricis, quod & Aelianus notauit. Aqua destillata cum momento pulueris nucis moscatæ optima in stranguria & dysuria. Exteriùs imposita extrahit ferrum, & alia corpori infixæ. Ceterum, Abrotonum calidum & siccum ordine tertio satis intenso assignat Dodon. digerendi quoque ac rarefaciendi, & vt vim.

ABROTONVM CVM PVLCHRIS
corymbis.

Describe

PRædictis humilior est, folia habet maioris Abrotoni similitudine dissecta, sed minus candida, & odoratiora, quo Santolinam referunt: corymbis è ramulis copiosi ad summum vsque luteo splendent colore: semen admodum fecundũ est: radix vt aliorum.

Hoc Dodon. gall. Abrotonum tertium nominat, ac extra dubium Dioscoridis *ἀβροτόνον* *αὐκλάνθηον*, Abrotonum Siculum pronuntiat, testaturque Germanos *wollrichender Stabwurz*, Abrotonum odoratum, vocare. Lat. Dod. Abrotonum odoratum humile inscribit.

Lob. Obs. p. 444. Icon. Plant. p. 769. pingit hoc ritulo. Abrotonum odoratum humile densè fruticosum.

C. Bauh. Phyt. vocat Abrotonum 10. siue mas angustifolium minus.

À Fuchsio quum Tubingæ apud illum esset, mihi in horto eius demonstratum, à vulgari di-



ARTEMISIA TENUIFOLIA, SIVE LEP-
tophyllus, aliis Abrotonum siluestre.

CAP. LXXXIII.



ARtemisia tenuifolia longa pollicaris crassitudinis radice firmatur, eaq; multitudine, lignosa, perenni: caules cubitorum aliquot altitudine emittit, qui vetustate in lignum solidum, durumque degenerant crassitudine digitali, alioqui tenues Artemisias latifoliae similes, rigidi, ru-

bentes, striati, medullâ albâ facti, aliis multis cõcaui: folia pilosa, albicantia, Seriphii Absinthii tenui diuisurâ, ad Abrotoni folia accedentia, colore viridi, vbi adoleuerint non multum dissentanea, odore autem multum ad Abrotonum accedente, corymbis rubentes, spicatum in ramulis crebri, Abrotoni formâ & colore. Solet non raro ad ramulorum diuicationes muscosum squammatum excrementum ferre.

Tres Artemisias tenuifolias statuit Clusius. An autem commodè ad *Ἀρtemisia tenuifolia*, Artemisiam tenuifoliam Dioscoridi hæc stirpes referri queât, peritiõibus dispiciendum relinquo. Prior quodammodò ad eius historiam accommodari posset, quia odorata est. Aliæ, odore carent, aut, si quem habent, is valdè tenuis est. Tertie etiam ingratus, quem admodum & sapor.

An Ruell. lib. 3. cap. 62. Artemisiam quartam mentionem faciens, hanc intelligit, dicens. Artemisiam genus aliud, quæ minutis foliis: vulgus Diui Ioannis herbam nominat?

Credide-

Crediderimus nos cum Doctiss. Dalechamptio hanc herbam dici apud Matth. in prior. comm. Ambrosiam : in post. verò ubi retinet priorem picturam, Ambrosiam alteram ibidemque depingit. Etsi in suis illis commentariis, quos primum Italica lingua confectos ediderat, ingenue confessus esset, se nunquam vidisse Ambrosiam in Italia.

Gesl. de hort. Artemisia leptophyllos quædam circa Basileam sponte nascens. Gerard. Abrotonum campestre wilde Sothernwood. C. Bauh. phyt. Abrotonum 13. siue campestre tenuifolium.

Tabern. Hist. part. 1. p. 62. Abrotonum campestre, Abrotonum 13. in descriptione & inter nomina, ubi ait ad Herbariis vocari germ. feld Strabourz / wild Scabourz, & Esenfraut / à copia virgularum, è quibus scopæ fiant. Latinos quosdam appellare Herbam camphoratum. Idem p. 37. vocat Artemisiam minorem, Heinen Beyssus / Artemisiam peregrinam p. 38. inter nomina, Artemisiam quartum genus è Gallia provincia oriundum, Artemisiam minorem, & Artemisiam tenuifoliam minorem : Germ. welscher Beyssus. Tandem p. 60. nominat Ambrosiam tertiam, daß drit Ambrosien fraut. p. 61. Ambrosia tertium genus & Ambrosiam tenuifoliam. Artemisiam igitur minorem Tabernamontani, eiusdemque Ambrosiam tenuifoliam non separo, ab Abrotono eius campestri, quia ex aliorum sententia de iis scribere videtur, nec earum picturas proponit particulares nisi Abrotoni campestri, quam etiam in Icon. p. 16. pictam exhibet.

H. Lugd. p. 950. Artemisia 13. leptophyllos Pennæ. Item p. 1148. Ambrosia altera Matthioli, quæ multis esse videtur Artemisia tenuifolia. Existimamus nos H. Lugdunensem ponere duas figuras vnius plantæ : ac eam quoque indistinctè scribere lib. 10. cap. 32. de Ambrosia.

Artemisia tenuifolia Basileæ ad Rhenum quædum in Krentzack, provenit. Montpelii passim in sepibus & agrorum marginibus, ubi totam Hiemem fert, & Autumno floret. Mense etiam Septembri florentem observavi Lugduni : inter Mülhausen & Otmarsen in vitibus ad vias : in itinere Argentina versus Sturgardiam multis in locis : Bononiæ in Italia ad montes Apenninos. Reperi quoque in muris Castellum Sponeck Ill. E. C. ad Rhenum, plantam Montbelgardi in Horto eiusdem E. C. ubi Hiemem pertulit, foliis cineritiis, hirsutis, quibus mense Junio depositis, induit longiora & tenuiora, viridia, ut quis diceret aliam esse plantam. Brissaci abundat, florens adhuc Octobri & Nouembri, in collibus arenosis & secus vias profundas : & iuxta agrorum margines radiis Solis illustratas.

ARTEMISIAE TENUIFOLIAE SIMILE,
si non idem, Abrotonum inodorum Lobelii.

CAP. LXXXIV.

Abrotonum inodorum & insipidum, vultu, folio, flore, & semine Artemisiam tenuifoliae collibus Gallo-Belgii alunt Muronus, Coudenbergius & Iacobus Plateau, harum studiosissimi & cultissimi, inquit Lob. Obs. p. 444. ubi figura cum hac inscriptione. Abrotonum inodorum. Eadem Icon. Plant. p. 769.

Dodon. lat. in fol. p. 26. iconem eandem habet cum Lobelio pro Abúnthio inodoro & insipido. Tom. III.

do. Verum descriptio est alterius plantæ, de qua egimus post Absinthium.

Clusius quoque in post. Hist. eandem iconem exhibuit pro Artemisia secunda tenuifolia, cuius descriptionem antè posuimus ex ipso Clusio.

Tabern. Icon. & Hist. Breit Strabourz / Abrotonum latifolium, Abrotonum quartum, Abrotonum fatuum, Abrotonum inodorum. Meritò nominat Tabern. Abrotonum fatuum. Est enim fatua figura ex Lobeliana nonnihil mutata : & cum latioribus foliis : fatua etiam descriptio & amplificata ex paucis verbis Lobelii. C. Bauh. phyt. Abrotonum n. siue latifolium, maius & secundum Trago, latifolium Tabernamontano. Ego Tragi Abrotonum aliud non puto à vulgari, si hoc ei cognitum fuit. Et hinc diversam Tragi statuo, à Tabernamontani latifolio.

Gerardus, qui Abrotonum inodorum vocat, Angl. Ensaerie Sothernwood / imitatur Tabernamontanum. Ponæ in Baldo, Abrotonum inodorum Penz.

RUTA SIVE MISTANON VETERIBVS.

CAP. LXXXV.

Theophrastus de causis lib. 5. vult Rutam plantari, ut quæ sub vmbra Fici arboris libentius acquiescit, velut Palladius ait in Martio. Hoc mense Ruta fertur locis apricis : folius cineris insperione contenta. Loca desiderat altiora, unde humor elabitur. Si ponas semina eius adhuc clausa folliculis, singulatum manu debitis attingere. Si iam minuta sunt, sparsa iactabis, & rastris obducta cooperies. Caules eius, qui inclusis feminibus nati fuerint, fortiores erunt, sed serò nascentur. Ramuli eius cum aliqua corticis parte conuulsi verno tempore pro plantis tenebunt : tota verò translata morietur. Nonnulli ramulos eius pertulæ Fabæ inserunt vel Bulbo, atque ita obruant alieno vigore seruandos. Prosequuntur etiam male dictis, & maxime in terra soluti lateris ponunt, quod prodelle certissimum est. Sed ut asserunt, melius furtiva proveniet. Sub Fici arboris vmbra libentius acquiescit. Non effodi herba, sed optat a nelli. Immundæ mulieris formidat attactum. Et hoc est, quod ante ipsum Plutarchus quoque scripsit. Cur autem dicatur *μήραν* declarat idem his verbis. *φανεί δὲ ἔστι τήραν ἀπὸ τῆς διουμένης ἀνομήτου : τήραν γὰρ ἐπὶ τῇ ἀπὸ διουμένης τὸ σπέρμα, ἢ ἔλαος πολέμων ἐστὶ τὰς νύκτας.* Aiunt facultate sua *μήραν* dictum, quod siccitate & calore coagulet & condenser semen. Hinc verum gerentibus inimicum est.

Rutam duplicem agnouisse videtur Hippocrates. Et quidem lib. 38. m. m. dicens. Acris subditium ad menses efficies, si Brassicæ & Rutæ utriusque [*μήραν ἐστίον*] &c. Quales autem sint, non ostendit, id quod Dioscorides fecit.

Ruta inquit, montana & siluestris, fatiua & hortensi genere aptior elui, quæ iuxta Ficos provenit. Vtrumque porro genus vrendi vim habet, calfacit, exulcerat, vrinam ciet, menses ducit, at cum cibo, tum etiam potu alium sistit. Semen acetabuli mensura è vino bibitum contra lethalia medicamenta est pro antidoto. Quin & folia per se præsumpta aut cum nucibus iuglandibus aridius Ficus, venæ irrita & inefficacia reddunt. Sed & simili sumpta modo contra serpentes.

Bb 2

rium ictus valent: genitorum seu escitara, seu bita Ruta exinguit: decocta verò cum Anetho sicco tormina potu sedat. Facit & ad pectoris laterumque dolores, spirandi difficultatem, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumque cruciatus, & rigores febrium circuitu repetentes, pota velut ante dictum est. Idem ad inflammationes coli, vulvae, rectique intestini, cum oleo decocta & infusa. Vulvae etiamnum strangulataui medetur, si trita cum melle genitali sede tenus imponatur. Feruifecta ex oleo & pota lumbicos expellit. Sed & articulariis doloribus, ex melle: & aqua subter cutem fusa morbo cum ficubus adhibetur. His iisdem in potu auxiliatur itémque decocta in vino ad dimidias partes & afficta. Cruda quoque conditaque in cibo acie oculorum excitat: quin & oculorum dolores, imposita cum polenta lenit. Caput dolentibus cum Rosaceo & aceto succurrit, ac profluentem naribus sanguinem sistit trita & indita. Testium inflammationibus cum Laureis foliis imposita, & papularum eruptionibus cum Myrteo cerato prodest. Cum vino autem, Piperac niro afficta, vitilagini albæ medetur, & cum iisdem illita thymos ac myrmecias tollit. Contra impetigines cum melle & alumine vtiliter imponitur. Succus verò in Mali punici corio (calyce, Sarrac.) calfactus aurium doloribus efficaciter infunditur. Opitulatur & acie oculorum hebetiori, si additis Fœniculi succo ac melle, oculi ipsi eo inungantur. Erysipelata, herpes, & vlcera in capite manantia cum aceto, Cerussa & Rosaceo, inunctione sanant. Ipsa verò Ruta Alliorum, Cæparumque grauem halitum emendat, si postea commanducetur. At montana si copiosius estur, interficit. Atque si sub id tempus quo florere incipit, ad muric condituram colligatur, cutem rubefacit, ac infat, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Eam itaque vinctis antea manibus & facie colligere oportet. Tradunt & succum gallinaceis pullis inspersum feles arcere. Adiciunt verò, eā quæ iuxta flumen Haliacmonem in Macedonia gignitur, comedentes interimere. Montosus autem is locus est, ac viperis abundat. At illius semen epotum contra interaneorum vitia est efficac: idèoque antidotis vtiliter immiscetur. Contra incontinentiam vrine, tostum, septenis diebus potui dato, & cessabit. Ceterum (his caret vet. vsque ad finem) radix huius montanum Moly vocitur. Sylvestris itaque Ruta satiuæ quodammodo similis est. Ac pota prodest comitialibus & ischiadicis: menstrua quoque mouet: ac parus enecat. Actior verò est quàm satiuæ & maioris efficaciz. Attamen siluestrem cibus abdicate oportet, quippe quæ veneni noxam obtineat.

Plinius lib. 20. cap. 13. vim & vsum Rutæ medicum his verbis declarat. Quæcunque Ruta & per se, pro antidoto valet, foliis tritis, & ex vino sumptis, contra aconitum maxime, & viscum: item fungos siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo contra serpentium ictus, vipore cum mustela dimicaturæ cum his, Rutam prius edendo se muniat. Valent & contra scorpionum ictus, & ranearum, apum, crabronum, vespærum aculeos, & cantharides, ac salamandras, canisque rabiosi morsus, acetabuli mensura succus ex vino bibitur, & folia trita, vel commanducata imponuntur cum melle & sale, vel cum aceto & pice decocta. Succo verò perunctos aut eam habentes, negant feriri ab his maleficiis. Serpentesque si vratur Ruta, nidorem fugare. Efficacissima tamen est silvestris radix cum vino sumpta,

Pythagoras oculis nexiam putauit falsò, quoniā sculptores & pictores hoc cibo vruntur oculorū causā. Cum pane quoque, vel Nasurtio satiuæ atque siluestris propter visum: Vt aiunt, multi succo eius cum melle Attico inuncti discusserunt caligines, vel cum lacte mulieris puerum enixæ, vel pauco succo angulis oculorum tactis, epiphoras cum polenta imposito. Lenit autem capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si verò sit cephalæa, cum farina hordeacea & aceto. Eadem cruditates discutit, mox inflammationes, dolores stomachi veteres. Vuluas aperit, corrigitque conuersas, illito cum melle toto ventre & pectore. Hydropicis cum Ficu, & decocta ad dimidias partes, potaque ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores, laterumque, & lumborum tussis, suppuria pulmonum, iocinorum, renum vitia, horrores frigidos. Ad crapulæ grauedines concoquantur folia poturis, & in cibo vel cruda, vel decocta, conditaque prodest: item torminibus cum Hyssopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinem sistit trita & naribus indita, sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoque in dolore succus infunditur, custodito, vt diximus, modo. E siluestri verò contra tarditatem & sonitum cum rosaceo, vel cum Laureo oleo, aut Cumino aut melle. Succus & phreneticis ex aceto tritæ infillatur in tempora & cerebrum. Adiecerunt aliqui & Serpillum, & Laurum, illinentes capita & colla, dederunt & lethargicis exolsaciendam: dederunt & comitialibus bibendum decoctæ succum in cyathis quatuor: ante accessiones, quarum frigus intolerabile est, aliosisq; cruda datur in cibo. Vrinam quoque vel cruentam pellit, sciminarum etiam purgationes, secundaque, etiam emortuos partus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro pota. Itaque illini & vuluarum causa etiam suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordacea. Valet contra ileum decocta farina in oleo, & velleribus collecta. Multi verò & contra purulentas excretaiones sicæ drachmas duas, sulphuris vnam & dimidiam sumi censent: & contra cruentas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum casco in vino contrita. Dederunt & cum bitumine infriatam potionem propter anhelitum. Ex alto lapsis feminis tres uncias illinunt ex olei libra, vinque sextario. Illinitur & cum oleo coctis foliis, partibus quas frigus aduulserit. Si vrinam mouet, vt Hippocrati videtur, mirum est quædam dare, velut inhibetempotui, contra incontinentiam vrinæ. Pforas & lepras, cum melle & alumine emendat. Item vitilignes, verrucas, strumas, & similia, cum strychno hircino & adipe sullo, ac taurino seuo. Item ignem sacrum ex aceto & oleo, vel Psymmithio: carbunculum ex aceto. Nonnulli Lasericum vnâ illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas curant. Imponunt & mammisurgentibus decoctam, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testium verò epiphoris cum ramis Lauri teneris, ad eod peculiari in visceribus his effectu, vt siluestri Ruta cum axungia veteri illitis ramices sanari prodant, fracta quoque membra femine trito cum cera imposito. Radix Rutæ sanguinem oculis suffusum, & in toto corpore cicatrice aut maculas illita sanat. Ex reliquis quæ traduntur, mirum est, cum feruentem Rutæ naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosaceo decoctum addita vnciâ Aloës, perunctis sudorem reprimere. Itémque generationes impediri, hoc cibo, idè profluuium genitali datur, & Venere crebro per somnia imaginantibus. Precauendum

caendum est grauidis, abstineant hoc cibo, necari enim parvus inuenio. Adem ex omnibus satis quadrupedum quoque morbis in maximo usu est, siue difficile spirantibus, siue contra maleficorum animalium ictus, infusa per nares ex vino, aut si sanguisugam exhauerint, ex aceto, & quocunque in simili morborum genere, vt in homine temperato.

Galenus breuius vtriusque vires sic tradit. Ruta agrestis ex quarto est ordine exalfacientium & siccantium, domeltica vero ex tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ea digerere atque incidere crassos lentosque humores potest. Ob eadem vim & vias mouet. Quia & tenuium est partium, statumque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac Veneris appetitum inhibet, digeritque atque exsiccat sanè strenuè. Est enim ex eorum numero medicamentorum, quæ valenter desiccant.


Sunt porò qui Rutam Rhytem, Aegyptii Epnubus, Syri Armala aut Befala, Aphri Curma dicant, teste Dioscoride inter notha. Meminerimus autem cum Dioscorides dicit Rhytem ab aliquibus vocari Rutam, Nicandrum Poetam & Peloponnesi incolas indicari. Si quidem Iolaus antiquissimus Græcorum scriptor, & cuius nomen vel olim tantum audiebatur, in Peloponnesiacis retulit suis, quam tota Græcia Peganon vocabat, Peloponnesum Rhytem appellare. Nicander certe in Theriacis suis de Trifolio suo quod Menyanthes Græci vocant, agens, id habere ait comam quidem Loto, odorem verò Rutæ similem. Ex his manifestum est, inquit Marcell. Virgilius, Rutam ab aliquibus Græcis *ῥήτυν* dictam fuisse. Nec dubitandum alicui à Peloponnesiorum Rhyte, Latinos Rutham suam fecisse. Frequens enim græcæ γ. litteræ in latinam v. mutatio est, quoties seruatis cæteris transferendum à Græcis ad Latinos aliquid est.

Cæterum Rutæ cognominatæ plantæ sequentes nominantur. Ruta maior horrensis Aduers. Ruta sativa nostra. Ruta siluestris & agrestis Aduers. Ruta siluestris maior nostra, Ruta Gesneri. Rutula, Rute minima, angustifolia, Aduers. Ruta silu. minor nostra, capitulo quadripartito. Ruta siluestris alia Dioscoridi, in Capadocia & Galatia Asia Moly dicta, nobis Ruta quæ Hamala. Quam Rutam pratensem Luteriæ, aliqui verò circa Sabaudiam, non rectè Rutam caprariam vocant, nominamus nos Thaliætrum Gesneri maius folliculis angulosis. Ruta pratenfis Lobelii Obs. p. 509. appellatur Thaliætrum maximum, semine striato, folio ex cæruleo virente. Quæ Ruta foetida siue lutea ab Aduers. titulo de Sophia p. 328. nominatur, Thaliætrum semine striato folio saturatius virente à nobis inscribitur. Ruta pratenfis minor quorundam, est nobis Thaliætrum minus. Ruta palustris, Filipendula palustris Tabernamontani, dicitur Oenanthe. Rutam pediculari Tabern. Fistulariam purpuream Schuvenckf. simpliciter Pediculari appellamus. Rutam caninam Recentiorum, Scrophulariam tertiam Dodonæi cognominamus. Rutam caprariam vocari Galegam pater H. n. g. lib. 17. Rutam siluestem multi statuunt herbam quæ dicitur Hypericum. Ruta siluestris Dioscoridis, quam à Ruellio inter notha reiectam esse Placa dicebat, est Clusio Hypericum supinum, nobis tomentosum. Ruta capraria Gallorum Monspelii vulgò sic dicta, traditur H. n. g. lib. 17. pro fruticantis.

Tom. III.

te, siue Polemonio Monspellano. Ruta vinacea quorundam Ruellio lib. 3. cap. 62. est nobis Borrys altera. Rutam lunariam, Rutam iecorariam Tabern. vocamus Lunariam minorem. Ruta parietum vulgi Gesnero de hort. vocatur à nobis Ruta muraria. In nothis Dioscoridis Romani Isatim satiuam appellant Rutam. Isatim verò siluestem, Rutam minorem. Rutæ tandè appellatio, quo pacto ad Tussilaginem peruenit, merito sane miratur Tragus. Vide Dioscoridem lib. 3.

RVTA SATIVA, VEL HORTENSIS.



Ire inter frutices Rutam reponunt lignosi densè fruticantes ramis, cubitos duos alti, maioreseque, quos ala diuidunt frequentes: folia virolo odore, perindeque ingrato sapore, subcartula, terna sæpè, vel plura, Trifolii fruticatis, flores stellati ex extremis ramulis breuib⁹ quinque cari-

Descriptio

natis foliis, in quorū singulis singula stamina rotidem intercedentibus, colore herbaceo ex luteo præditis, umbone pyramidato ex atro virente, medium occupante: calyce quadripartito, acetiam quinque partito, in quo semina nigra.

Cordi diligentis Botanici descriptionem omnibus numeris absolutam merito subscribimus. Ruta sativa maior siue latifolia, inquit, frutex est caudice cubitali, aut altiore, crassitudine digitali, colore cinereo, in multos ramos diuisus: ex his Veris initio plures emittit, longos, teretes, egregie virides & flexiles furculos, in quorum summitate Veris exitu, & Aestate inæquali ordine flores sunt Leucoio similes, minores tamen, quatuor aut interdū quinque, luteis & cochlearis modo concavis foliis constantes, sursum spectante eorum concauitate, in medio flore quadripartitum, aut nonnunquam quinquepartitum est capitulum, colore viride, exiguum quandam apicem habens, stamina ab ima eius parte exeunt lutea, octona aut dena in laticudinem resupinata: ex his medius numerus supra foliorum concauitatem extenditur; reliqua autem quatuor foliorum spaciis interposita sunt, semen in mediis florum capitulis fert paruum, in rotundo modice oblongum, colore nigrum, folia omnibus ramulis adnascuntur, in longis pediculis incerto ordine disposita, parua, in plures & inæquales partes scissa, viridia, mollia, & pinguiora: ex his maxima pars semunciam longitudine non excedit, latitudine multo minore. Radice nritur ex vno principio multifida, numerosa, capillamentis fibrata, colore flaua: viret tota Hieme, non flaccescentibus foliis, antequam nouo Vere alia enascantur, quo tempore etiam furculi qui

Bb 3

semen protulerunt, in summitate exarescunt: coma eius acrem, aromaticum, interimque graue spirat odorem, eadem sapore amaro, feruido & tenui palatum excalescit, maxime viridia adhuc florum capitula. Colitur in hortis.

Ceterum, est & altera Ruta sativa, tenuifolia scilicet, quam ita Cordus ita describit. Ruta tenuifolia latifoliae per omnia responderet, praeterquam quod multo minoribus constet omnibus partibus: folia siquidem Fumariae modo in exiles partes diuisa habet, non tamen in tantam latitudinem diffunditur: floribus & capitulis latifoliae similiter responderet: semen habet oblongum, nigrumque gustu vehementer acre: reliquarum partium qualitas & sapor latifoliam aemulatur. Scriturque similiter ut illa in hortis, parce apud nos, sed frequentius Italis quibusdam locis, ubi hanc tantum Rutam nouerunt.

Rutam satiuam in latifoliam & tenuifoliam diuidit quoque C. Bauhinus. Tenuifoliam quidem vocat Rutam hortensem alteram, Rutam hortensem minorem Tragi, Rutam Matthiol. Anguill. Lacunae, Cast. Rutam satiuam tenuifoliam Cordi: Hortensem nobilitate praestantem Gesn. hort. Tenuifoliam Tabernamontani.

Cornarius autem appellat hanc Rutam minoribus & herbaceis coloris foliis. Latifolia dicitur Cordo in Dioscor. Ruta & Ruta sativa. In Histor. Ruta sativa maior, siue latifolia, quemadmodum & Tabern. Trago Ruta domestica, Ruta vulgaris. Lobelio in Advers. Ruta maior hortensis. Ruta hortensis in Obs. p. 506. In Icon. Plant. Tom. 2. pag. 22. Camer. hort. & Hort. Lusit. Ac Fuchsio. Ruta hortensis vulgaris Turnero. Ruta domestica Hier. Braunschweig. Aliis ut Corn. simpliciter Ruta. Cesalp. Ruta sativa latioribus foliis. Dod. Ruta graecolens hortensis.

Nomina
linguarum

Ῥῦταν Gr. Ruta Lat. G. Rauten / & weinrauten / zam Rauten. Belgis Ruyte / & weynruyten. Gallis Rue, Rue de jardin. Itali Latinam seruant nomenclaturam. Hisp. Ruda, Aruda. Anglis Rue. Boh. Rauta. Hung. Zeges, RUTHA, h. e. angulosa Ruta. Maurit. Rute, sic Sedab. Philius Hebraea lingua Rutam Schafes vocat, Chaldae & Thalmudice Mechul & Pigam. Quidam semen Rutae Bizere Salgagel dicunt.

Locus &
tempus

Rutam ferculo nasci aliquoties compertum habemus. Haec culta (ut se vidisse testatur Camer.) ita in altum crescit, ut etiam tres cubitos superasse visa sit, ac admodum est longeva, cuius radix tandem plane lignescit, quae si accenditur suauem & tempore pestis vtilem emittit odorem. Ruta sub falso alimento redditur melior, ut Erucica. Meminit Iosephus in Machco Rutam fuisse regiam mirabilis magnitudinis, quae a nulla Ficu, vel celsitudine, vel magnitudine vinceretur. Eam autem ex Herodis temporibus perseverasse. In Germania nostra moris est Rutam Salviae adiungere, cuius hanc afferunt rationem: Buffones amare loca Salviae constra, qui ut abigantur, Salviae Ruta muniri oportere. Rutam satiuam vidi Monspelii, Lugduni & Bononiae in hortis, ut in orto di S. Saluator al Burgo di S. Catharina. Geneue florentem adhuc Octobri, Montbelgardii Iunio, ubi gelu nonnunquam abfumebatur, verum rursus facile ex semine proueniebat.

Ruta, ut experientia testis est, ferculis abdicatur, nec culinae seruit propter iniucundum, quae habet odorem, & saporem quem obtinet feruentem, quo homines grauitur afficit. Quia autem

omni penè veneno resistit, idè peculiaris fit pauperum Theriaca. Est enim tantarum virium, ut eas neminè satis describere posse arbitretur Tragus. Attenuat, ut prodidit Matthiolus, incidit, digerit, resoluit, prouocat, & status potenter pellit. Rutæ vires in longum prosequitur Tabernamontanus, quas in gratiam germanicæ linguae ignarorum ita reddere studimus. Ruta facultatis est calidæ & siccae, resoluens, penetrans, & digerens. Est calida & sicca in tertio gradu, singularis & approbata Theriaca contra omnia venena, idèoque magna cum vitilite intrinsecus assumitur: extrinsecusque admouetur. Herba vna cum floribus colligitur, & in vmbra siccatur: Semen verò in Autumno, bene maturum. Nemo satis vires & facultates Rutæ inuestigare potest. Hoc siquidem impossibile ferè est. Elicet multa à veteribus de huius operatione & usu sine prodita, attamen præterire nolui, quæ ipsemet expertus sum adscribere. Ruta igitur in subtilem puluerem redacta, drachmæ pondere calidè ex vino haulta, fugat dolorem capitis à causa frigida ortum. Recentis in mortario lapideo contritæ succus vnciarum quatuor, in eoque drachma semis Asæ foetidae dissoluta, calidè bibita, salutaris est medicina morbis caduci: sanat etiam clauum, diuturnum capitis dolorem. Soliti fuere veteres Rutam sale condire, annum seruare, eamque comedere, ut claros sibi compararent oculos: Quidam, quia quolibet anni tempore recens haberi potest, viginti diebus, quolibet die viginti foliola cruda, purgato tamen prius corpore, sumunt: unde magnum iuuamen sentiunt. Alii siccam redigunt in puluerem subtilissimum, de quo drachmam in vino hauriunt. Quocunque verò modo vsurpata dolorem oculorum à frigidityte & humiditate prouenientem corrigit. Cum anetho exsiccatò cocta, iusque colatum bibitum, mitigat dolorem thoracis, laterum, & tormina. Item difficultati spirandi succurrit, tussi & inflammationis pulmonibus. In quibus & similibus affectibus par est accipere ficus & Hyssopum. Hæc simul in vino cocta valent aduersus iecoris & renum vitia: item Ichthiadicis affectibus: mensent mouent: horrores febrium abigunt. Alii accipiunt Rutæ manipulum vnum, coquant in mensura vini ad consumptionem tertiæ partis, colant, in colatura dissoluant Sacchari Vnc. 4. De hac bibunt mane & vespere calidè Vnc. 4. Valet aduersus dolorem thoracis à frigidityte ortum. Folia Rutæ aut sola separatim, aut etiam cum semine in generoso vino albo ad tertiæ partis consumptionem incoquantur, fit colatura, quæ calidè bibitur. Pellit hæc à corde vapores, aperit, thoracem & pulmonem à frigidis crassisque humoribus obstructum, faciliat respirationem, urinam ciet, menses prouocat, secundinas & fetus mortuos educit. Salutare est remedium contra hydropem. Rutæ & Salviae equalēs partes, contusæ & cum sale commanæ, subueniunt dolenti stomacho, repleto cibis crudis & incoctis. Pulueris Rutæ drachma semis cum vino calido pota confortat stomachum puerorum frequentiori vomitu debilitatum. Aut accipe Rutæ sicce scrupulum vnum, Thuris albi grana octo, pulueriza, da infanti sepius cuometi cum syrupo rosarum rubrarum. Rutæ cum veteri vino coctæ iusculum colatum & ebibitum, medetur singultui à flatibus oborto. Idem potest semen drachmæ vnius pondere dicto modo haultum. In oleo coctæ colatura bibita enecat vermes & lumbricos. Pulueris Rutæ & drachmæ pondere pota, idem

idem potest. Sed & herba in vino aut aqua cocta pota idem præstat. Vel coquantur Rutæ manipuli duo, Absinthii montani manipuli. in aqua ad consumptionem medietatis, colaturæ mane & vespere propinetur cyathus vnus, calidæ. In samina quoque modo sumpta Ruta non sine commodo administratur. Hæc & alia quàm plurima habet Tabernamontanus, ex æmilio Macro in longum translata, & passim inserta.

Ruta tandem quomodocunque vsurpata, interne & externe oculos reddit acutos & claros, lacrymasque exsiccat. Idem hoc monet Schola Salern. libro de consensu valetudinis, his Verbis:

*Nobilis est Ruta, quia lumina reddit acuta
Auxilio Ruta, viri lippe videbis acuti.*

Conuenientissimum tempus destillandi Rutam est in medio Maii. Destillantur autem folia cum comis minutim prius incisa in Balneo Mariæ. Pro qualibet porro mensura aquæ, requiruntur Vnc. 4. Rutæ recenter exsiccatæ in puluerem crassiusculum contritæ. Digeruntur hæc 24. horis in Balneo Mariæ, destillantur secunda vice, re-distillanturque Sole. De hac aqua singulo mane & vespere, duæ aut tres vnciæ potæ medentur vertigini frigidæ, morbo caduco, singultui, & denique omnibus capitis affectibus frigidis: eucant vermes; calefaciunt refrigeratum thoracem & pulmonem; item stomachum, hepar & lienem: sedant tussim à decidentibus humoribus obortam. Obstructos pulmones aperiunt: difficultatem spirandi tollunt: flatus dissipant, tormina sedant, & mutinura: menses promouent & secundinas: Vistum acuiunt supra omne aliud medicamen, ita quidem vt nonnulli testentur, vt qui dicto modo hac aqua vtatur, stellas in celo de die æquè clarè visuras sit, ac nocte. Huc spectare videntur versus hi:

Famulum, v'erbena, Rosa, Chelidonia, Ruta:

Ex his confice aquam, qua lumina reddit acuta.

Resistunt porro venenis præsertim pesti mane ieiunè Vnc. 2. aut 3. bibitæ. Medentur febribus item canis rabidi morsui quadraginta diebus potæ. Eos, qui caliditatem deuouerunt & iurarunt, multum iuar quotidie Vnc. 1. semis hausta. Os aqua Rutæ, & gingiue, sæpius collutæ, vlcera earum sanat. Manus tremitu hæc lotæ, nec absterge, à tremore liberatæ non raro obseruatæ fuere. Polypum naribus indita curat, & cerebrum purgat.

Vinum & Rutæ aliquibus quondam in vsu fuisse, facile est colligere ex his, quæ sequuntur, Schol. Salern.

Salvia cum Ruta faciunt tibi pocula ruta. h.e.

Salbey vnd Rauthen vermengt mit wein

Lassen dir den trunck nit schädlich seyn.

Cæsar Constantinus lib. 8. de Agricult. ait vinum Rutaceum, siue Peganites calidæ naturæ esse, venena sumpta expellere, & morsibus venenatorum animalium resistere. Marcell. Empiricus commendat vinum hoc contra dolorem infimi ventris & colicam. Sed proficeret quoque iis, qui castitati student. Quare si quis hoc expeteret, hoc vt alia vina, Absinthites nimirum, Salutarium &c. præparabit.


Rutæ confusa fit hoc modo. Recipitur comarum Rutæ recentis & foliorum Vnc. 1. Sacchari albiissimi Vnc. 3. Comæ cum foliis in lapideo mortario triduntur cum pistillo ligneo: deinde iis optimè tulsis saccharum in puluerem tritum adicitur: rursus omnia simul tantisper tuntuntur, donec in vinum corpus redigantur, &

deinde pixide vitrea insolentur per mensem. De hac fume ieiunus contra pestem Vnciam semis.

Acerum ita conficias. Accipe comas cum foliis, pone super linteam 24. horis vt aliquomodo flaccescant, postmodum conscinde, phiolam imple, superaffunde vini acetum optimum, obtura, & infola: post duos menses cola, & serua ad usum. Præstat tempore pestis in cibo vsurpatum. Item labiis, naribus & temporibus illitum. Sic & spongiâ susceptum odoratum. Meminit etiam Tabern. Rutæ succi inspissati ex ipsa herba sicca parati, vt eiusdem quoque extractum paratur. Rutæ sal fit vt Artemisiæ. Eius vsus est aut per se, aut cum aliis medicamentis permixtus.

Vt oleum conficias. & Rutæ recentis incisæ & contusæ ℥iij. Olei veteris lib. 1. Macera ad Solem aut in loco in calido aliquo, diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta priori recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & abiecta Ruta priori recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentem Rutam iniicito; macerato coquito & colato. Est calidum aperitiuum, resolutiuium, & mitigatiuum dolorum: calfacit renes, vesicam, matricem: & sedat dolores eorum, & maxime colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo oleo clyster: præterea opitulatur neruis, confert spasmo, & expellit frigidos humores.

RUTA SILVESTRIS MAIOR.



Ruta silvestris maior, vt minor multo tenuioraque habet folia, quàm hortensis, ita maiora quàm altera silvestris, quamuis vtraque acerrimo ac viroso est odore, quamque impune tenellis partibus nequaquam admoueris: flores exipientia capitula multo sunt, quàm

in siluestri altera maiora, nec vt illius quadrangula. Hæc prouenit Monspelij cum sequenti.

Matth. in Dioscor. vocat Rutam siluestrem, quam ait in Goritichli agro inueniri copiosam. Is in post. comm. pingit nomine Rutæ silu. reprehendens eos, qui Rutam hanc eandem putant cum Hyperico. Vtrum autem Matthiolus hanc siluestrem intelligat, vel minorem asserere non ausim. Figura demonstrare videtur maiorem. Qui fuerunt in Goritensi agro, aut adhuc sunt, nos moneant.

Anguill. Ruta proueniens in montibus Apulizæ venenata. Item: Ruta silu. nota in Apulia

nomine Harmel, & Ruta saluatica; de qua satis Dioscorides: potest videri in horto Patauino.

An Turn. part. 2. pag. 121. Ruta siluestris ex semine, à D. Gesnero?

Dicitur Gesnero de hort. Ruta silu. maioribus foliis. Trago Ruta siluestris, quam ait in Germania non sepe vilam: Eius semen primum ad semitile Gesnerum, quod ubi seruisset, plantulam ipsi exiguum natam, quæ tertio primum anno flouerit. Quod ad formam pertineat, ad vulgare penè hanc accedere, foliis tamen, & nodosis floribus, ac semine multò illà exiliorem, teneriorem, molliorem, & magis incanam. Caule præterea præditam frequentiore & altiore, deinde & odore grauiore, ita quidem vt etiam capitis dolores prouocet. Saporem obtinere ingratum & ad amaritudinem quandam vergentem. Augusto mense florere, Autumno verò maturescere. Græco sermone dicitur *ῥιγανὴ ἀγρία*, non tamen eam esse, quam Dioscorides ab initio capitis Androsemon, Hypericon, Chamæpytin, Hederalem, Corio Cétonale, & Churma semmaced appellat. Fieri autem posse, vt ea sit quam dicant Harmalâ & Besafam, & quam Galenus Moly vocitet, quæ opinio nobis non placet, licet eius figuram non improbeamus.

Synon. &
Nomina
linguarum

Lob. in Aduers. Ruta siluestris siue ærestis. In Obs. p. 506. Ruta silu. montana. In Icon. Plant. p. 53. Tom. 2. Peganon, Ruta silu. montana. Cator, Brunfels, Cordo, Carol. Steph. Bacchanello, Apollini, Dodon. gall. & passim Gesnero, Ruta siluestris. Lacunæ Ruta silu. prima. C. Bauhin. apud Matthioli. Ruta silu. latifolia. Tab. Icon. & Hist. Ruta montana, Germ. wild rautē, Belg. welde ruyte / Gallis Rue sauvage. It. Ruta siluatica Hisp. Ruta saluage. Harmel Officinis secundum Lobelium in Obs.

RUTA SILVESTRIS MINOR.

Descriptio



siluestris maioris Rutæ.

Gesnerus de hort. vocat Rutam siluestem minoribus foliis. Tabern. Icon. & Hist. Rutam siluestem minorem. Rutam siluestem tenuifoliam C. Bauhin. apud Matthioli. Camer. & H. Lugdunensis. Rutam siluestem minimam Dodon. lat. in folio. Lobelius in Aduers. Peganiū Narbonensium, siue Rutulam: In Obs. pag. 307. Rutam siluestem: In Icon. pag. 54. Tom. 2. Ru-

C. Bauh.
not.

tam siluestem, Peganon Narbonensium, siue Rutulam.

Lugduni habebam in horto. Multis in locis provenit Mōselii, sed maximè propè Castelnœuf inter saxa: floret circa Aetatem, semina profert Septembri. Geneuz habui in horto florentem Iunio, pulchrè virentem Nouembri & Ianuario.

Ambæ Rutæ siluestris acerrimæ sunt & grauissimi odoris, quæ tactu cutem multum vitiât, maximè faciei, si attingatur etiam solum manibus eâ infectis. Narrabat præceptor Rondeletius peregrinum quendam Monspelium petentē, hanc nactum in itinere collegisse (quia audiuisset pestem Monspelii) naribus appoluisse, diūque manibus retinuisse, vnde oborta sit maxima inflammatio.

RUTA QUÆ DICI SOLET HARMALA.

CAP. LXXXVI.



Fruticosa hæc est planta, multos ab vna radice emittens cauliculos, pluribus ramis donatos, pedales, ex viridi nigricantes: in quibus folia oblonga, densa, siue pinguis & carnosa, saturè virentia, multifida, Napelli tenuifolii (quem quidam Anticorā vocant) foliis non valde dissimilia, gustu

lento, gummoso, amaro, aliquantulum tamen mordaci: flores in summis ramis candidi, quinque foliolis constantes, multis in medio fibris luteis præditi: deinde capitula hortensis Rutæ capitibus maiora, molliora tamen quàm illa, & triangula, semine resecta inæquali, anguloso, ex rufo nigrescente: radix dura est, minimi interdū digiti crassitudinem æquans, fibrosa, colore ex luceo pallidescere. Tota autem planta graueolentis atque adeo ingrati odoris est: sic describit Clusius.

De ea autem hæc tradit Dioscorides. Vocant, ait, etiam nūm siluestem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiatica Moly dicitur. Frutex est ab vna radice complures virgas proferens: foliis multo quàm alterius Rutæ longioribus ac tenuioribus, iisque graueolentibus, flore candido, capitulis in cacumine paulò quàm satiuæ Rutæ maioribus: quæ quidem tribus maximè partibus constant: in quibus triquetrum semen subfuluū gustūque perquam amarum recluditur, cuius etiam est vñs. Id Autumno maturescit, tūmq̃ conuenit ad retulam oculorum aciem, si cū melle, vino, gallinaceo felle, Croco, ac Feniculi succo teratur. Sunt qui Rutam hanc Harmala vocent, Syri Besafa, Cappadoces Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem: siquidem radice nigra est, florē verò candido. In collibus

collibus ac læto sæcundoque solo prouenit.

Non esse autem verum illud Homericum Moly, hanc siluestrem Rutam, inquit Cornarius, Dioscorides aptè docet, dum ait Cappadoces ipsam Moly vocare ob similitudinem. Indicatur & ex eo, quod mox consequenter de vero Moly Dioscorides agit. Moly tamen, vt auctor est Galenus, quidam Rutam siluestrem nominant, alii Harmala, Syri Befala, sicut Cappadoces Moly, eò quod radice nigrum est, florem autem lactosum habet. Et rursus de Ruta agens Galenus ait. Quod in superioribus Moly, & Befala nominari diximus, fuerit etiam ipsum sylvestris Ruta. Hæc à Galeno ex Dioscoride transcripta, videntur partim indicare, Rutam illam siluestrem Moly vocari, ob similitudinem radicis & floris ad verum Moly: partim non aliud esse Moly, quàm hanc ipsam Rutam siluestrem. Et hoc magis adhuc inde colligi potest, quod Moly non habet, sed Mylem vocat, quam Dioscorides pro vero Moly proponit.

Plinius Rutam Galaticam vocat, sed eam Moly, aut aliis nominibus appellari non tradit: Moly tamen verum clarissime describit.

Officina hodie Harmala appellationem agnoscunt, ipsamque ad Rutam siluestrem referunt. Multa porro hoc Dioscoridis capite leguntur, quæ ad Hypericum pertinent, de quibus alibi dicemus.

Nominat hanc Bellon. Obs. lib. 3. cap. 50. Rutam speciem, Harmalam. Qualecbe Rutam siluestrem, quam ait Arabes Harmel, vt priores de ea scripserunt, appellare. Rutam hanc siluestrem Qualebeni legitimam esse Harmalam rectè quoque probat Matthioli, quum omnibus illi respondeat notis, eam pingens & describens in post. com. Lat. & Ital.

Gesl. de hort. Harmel, Harmala. Item Ruta silvestris, Rutæ tertium genus apud Dioscoridem.

Hanc græcè *παραπονύριον* appellari testis est Dioscorides, inquit Clusius: Cappadocibus autem *μωλὺς*, alii *ἡρμολα*, Syris Befala dici: Latini Rutam siluestrem & Harmalam vocant. Castellani *Gamaras*, & *Cog. mirrillos amargos*, id est, exiles Cucumeres amarus nuncupant.

Lobel. in Aduers. & Obs. p. 508. quærit an Harmala Syriaca [ita enim hanc nostram præsentem plantam vocat] sit Sefamoides magnum Dioscoridis? Existimat autem non inficere Sefamoidem maiorem vocari posse. In Icon. Pl. nt. p. 55. vocat Harmalam Syriacam. Castor Rutam siluestrem alteram vt Camer. hort. In Epit. & H. st. Matth. gerin. Rutam siluestrem Harmolam. Hist. Lugd. Rutam Harmolam Matthioli. Cæsalp. Harmel Constantinopolitanum. Harmalam, Dod. lat. in fol. Clus. Hisp. & Hist. post. Tabern. qui & Moly Galeni vocat. C. Bauh. apud Matth. Rutam siluestrem magno flore.

Bellonius Obs. lib. 2. cap. 21. ait arenosis circa Alexandriam locis Ægypti nasci. Plurimam in Castella noua circa Madritium & Guadalaiara, collibus & læto solo prouenire prodidit Clusius florere Iulio & Augusto, semen septembri maturescere. Sed & florere & semine prægnantem esse etiam Octobri. In Belgica satam aliquot nonnunquam annos perdurare, sed vix aut raro admodum ad florem peruenire, vt pote quæ non fecus ac Ruta montana, frigoris sit valde impatiens. Viennæ autem aliquot etiam annos semine natam se aluisse idem testatur, sæpissime.

Tom. III.

simè egregiè florentem, asiquando etiam deceduo flore trigona capita proferentem, quorum tamen inane esset semen. Ruta, quæ Harmala à Dioscoride dicitur, ex semine copiose nobis prouenit Lugduni, eius radix perennis est. Prouenit etiam Geneæ semine ex Italia à Cortuso misso. Montbelgardi in hort. E. C. W. semine quod receptum erat ab hortulano Ducis Florentiæ, quod floruit quidem, sed non maturuit semen, frigoreque hyberno perijt.

Auctor est loco citato Bellonius, apud Arabes, Ægyptios & Turcas vario in vñ esse: præsertim vero hanc apud eos inualu se consuetudinem, vt eius summo singulis diebus manè suffiantur, sibi persuadentes, noxios spiritus hac ratione abigi. Quæ res illi herbæ, & eius semini, tantam celebritatem peperit, vt nullæ sint adeò viles Institutorum officinæ, quæ eam non habeant, tanquam pretiosum aliquod medicamentum. Rutæ hulus semen datur ad purgandum bilem atram magno auxilio, si Matthiolo credimus, paraturque potandum hoc modo. Coniiciuntur in mortarium seminis grana xv. prius clarissima aqua abluta, & deinde ligno pistillo teruntur, affundunturque aquæ vi. ciæ iv. eodemque pistillo aliquantisper miscentur. Demum in tæculo percolatur cremor, cui addantur mellis optimi vnciæ tres, & olei Sefamini, aut Amygdalini vnciæ duæ: & id omne propinatur melancholicis: facit enim copiosas vomitiones. Nec est hoc medicamento aliud valentius ad comitiales. Scribunt Arabes huius Rutæ semine inebriari homines, adeò vt subinde diutius dormiant. Id quod maxime confert in eo melancholiæ genere, quod ii *heros* appellant. Recipitur etiam hæc ruta silvestris nec leuis est momenti in Pictularum faciditum dictarum compositione.

FVMARIA VVLGARIS.

CAP. LXXXVII.



Fumaria vulgaris Descriptio
gusta tota amaro radice est mediocriter crassa, albâ fibrosâ modicè: caules multi, brachiati, quadratique glabri, colore partim purpurante, partim in albo virentes: *ha* ex longis pediculis latiusculis & angulosis, tenuissimè incisa, glauca: flores quasi in spicâ congesti, ternues, oblongi, labellis duobus, vt plurimum purpureis aut violaceis, virore tantillo variegatis: inter quæ folia bina, alba inferius, apicibus atro purpureis coeuntia, in medio staminula quædam tenuissima, crocatis apicibus donata: alias flos

C.

torus albus, aliàs purpureo-violaceus : semen succedit minutum, rotundum, ex diffusâ & longa spica.

Fumaria
Diosc.

Fumaria Dioscoridi fruticosa est herbula (herba Ald.) Coriandri similitudine (in Hordeo nascentes, addit Lac. non necessariò cum ex alibi reperitur : præterea, foliis candidioribus, & cineracei coloris, vndique numerosis, flore purpureo. Hanc aliqui inter nothas appellationes Corydalion, à foliorum Coriandri diuisura, aut Corion, id est Coriandrum, vocant : alii Corydalion silvestre, alii verò Capnon in fegetibus hordaceis nascentem. Plinius tamen adiecit & hortis, nec malè, quoniam frequentior in hortis [in vineis & circa vias etiam non raro] quam in fegetibus reperitur: alii Capniten seu Capnion, alii marmariten, alii Capnogorgon, alii Chelidonium paruum, alii Peristerton, alii Cantharida, alii Calochrum, Romani Apium seu Fumariam, Aegyptii Cnixarii Tucin.

Synonyma

Quia porro hæc passim sica, & ob id non longius tractanda: Fumaria dicitur Matthioli. Trago, Fuchsi. Lacunæ, Cordo in Diosc. Gesn. horti. (cui Capnium etiam & Capnus vti Galenio) Lonic. Dodon. lat. in fol. Hist. Lugd. pag. 1292. Camer. Epit. & Hist. Matthioli germ. Catalp. & Tabern. Fumaria maior Calori. Fumus terre, Brunfelsi. Camer. horti. (cui & Fumaria vulgaris, & Thallio. Fumaria herbariorum, & Cretosolum felinum Schvvenckfeldio. Capnos Turn. Dod. gall. Anguill. Lobel. Oberp. p. 457. Icon Plant. pag. 757. Aduers. p. 338. [cui & Fumaria] & Clusio, cui & Fumus terre vulgaris. Capnos alia Plinii Corn. in Dioscor. lib. 4. Embl. 94. & Capnion herba. Fumaria sive officinarum & Dioscoridis C. Bauh. Phyt. qui eam floris colore variare scribit, violaceo, pallescente & albo.

Fumariam inquit Marantha, flore purpureo depingit Dioscorides, sed candido etiam inuenitur, quâ tanquam meliore Neapoli (licet magno errore, si Meluco credendum sit) videntur. Fortè & hanc nouit Dioscorides, sed quia putabat eandem esse non luit distinguere. Arabes valentiorum esse existimant eam, quæ purpureo flore constat, ac cum experientia comprobassent, eam distinxerunt, & aliis prætulcrunt.

Apollinarem sub nomine *Erdtrauch* loqui de Fumaria colligere licet ex nominib. & facultatibus, non item ex figura, quæ quoniam sit referenda, nos latet.

Nomina
linguar.

Herba quæ Græcis *ῥαῖς* ῥαῖς, & *ῥαῖς* ῥαῖς dicitur, Latinis quoque Capnos & Fumaria nominatur, sed potest & Fumus & Fumida dici. Hebræis *Nisibathimen*, Friso in synonymis, Arabibus *Schehsterig* sive *Saberetegi*, *Schisterum* Trago, Officinis Medicorum Fumus terre, Germ. *Erdtrauch* / *Daubentropf* / *Stunnenkraut* / Cordo in Dioscor. *Razentörffel* Trago, & Dod. *Razentforuel* Lob. & *Äckerfeld*: oder *wilde Rauent* quibusdam Cordo in Dioscor. sed malè. Belg. *Grysecorn* / *Duyckerietel*, & *Erdropf*. Gallis *Fumeterre*. Hisp. *Palomilha*. Ital. *Fumaria* & *Fumoterra*, iteque *Fumoterno*. Angl. *Fumoterry*. Bohem. *Poluiturka*. Hung. *Sód epeye*, h. e. Fel terra.

Fumaria
cur dicta

Fumariæ autem herbæ notissima res fumus nomen quondam fecit: haud sanè quia trichiniorum parietibus eorumque cameris inducâ nigredine noceat: Sed quoniam vis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in fumo est.

Locus &
Tempus

Fumaria multis in locis in hortis ac fecus vias spontè prouenit. Montbelgardi in horto ac vi-

neis etiam ill. E. C. florens Aprilis & Septembri flore albo & purpureo. Lugduni Maio, Basileæ Iunio, Genevæ Nouembri ac etiam Ianuario.

Fumariæ succus, auctore *Dioscoride*, acris est, visum acuit, lachrymas prolicit, vnde & nomen traxit. Illius cum gummi duplicatos palpebrarum pilos euulsos nasci prohibet. Cæterum herba in cibo sumpta, copiosam bilem per vias trahit. Eadem planè de posteriore sua Fumaria *Plinius* habet lib. 25. cap. 13. Claritatem facit in oculis, de lachrymationemque eui fumus, vnde nomen accepit. Eadem euulsas palpebras nasci prohibet. Et lib. 26. cap. 7. Capnon herbam qui edere, bilem per viam reddunt. *Galenus* 7. simpl. non alias ei qualitates, virtutes assignat his verbis. Acris simul & amara qualitas est particeps, neque tamen planè expertus est acerbæ: quamobrem vinam multam, biliosamque prouocat, sanaturque iocinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non parum trahens lacrymarum, velut ipse fumus: nâ hinc ei appellatio indita. Arabes verò multò plures eâque insignes dotes ei tribuerunt. Fumaria inquit *Mefues* lib. 2. simpl. cap. 14. in superficie calida est, in profundo frigidior non absolute frigida cum quibdam, sicca ordine secundo. Ab illa autem substantia calida [quæ semini maior inest] & amara & subacris, purgatoria, attenuans, obstructa aperiens. A frigida autem styptica constringendo ventriculum, hepar & cætera viscera laxiora & molliora roborat. Quapropter ad actionē nullo externo eget auxilio, cum per se purget ac roboret. Purgat verò bilem & vitos humores etiam ex venis: clarum ob id & purum efficit sanguinem. Quare mirè prodest morbis omnibus hos humores sequentibus, lepre, scabiei, pruritu, impetigini, serpigni, & similibus cutis vitis. Quia autem obstructa liberat, morbos omnes inde natos sanat, ut febres biliosas, putridas. Herba est innocens, quia tamen magna ubique copia luxuriat, vilescit. Flore nunc est subalbo, nunc cinereo, nunc pallido violaceo. Optima est viridis, tenera, foliis tenetis, planis, non crispis, flore subviolaceo. Herba & succus eius Veris initio sit efficacissima: semen Veris exitu. Quoniam verò imbecillius purgat, fortior euadet cum Myrobolanis, Senna, Sero lachis, Vitis passis exacinaris, & illarum melle. Succus datur ab vncia dimidia ad vncias duas: puluis à Drachmis tribus ad Drachmas quinque: decoctum ab Vnciis decem ad vncias quindecim. *Auicenna* frigidam esse primo gradu, siccam secundo statuit & reliqua quæ Melius attribuit. Fumaria, sic *Tragus* addit, scabiei & morbo Neapolitano, quem Gallicum vulgò vocant, sanando accommodatissima est: quicunque enim huiusmodi morbos curare instituant, si aliquot diebus antequam ad curationem accedant, agrotis Fumariæ aquam destillatam Theriacâ admixtâ bibendam propinant, & à portione sudare iubent, quo remedio sanguinem corrigi & mundari credunt. Eodem modo usurpata aqua Fumariæ contra pestem præseruatio est optima, nec non aduerfus venenosos & immodicos sudores prophylacticum est: haud penitendum: multi antequam balnea sudatoria intrent, prædictam aquam paratione vsurpant non infelici successu. Succus Fumariæ & radix Esulæ in pluluerem redacta, & preparata, equis portionibus, hoc est, pondere drachmæ ex calida aqua hypopis, & quibus vomitiones ciere volumus, vtiliter exhibentur: aqua Fumariæ aphthis & oris ulcerationibus medetur.

medetur, collutu, decoctio Fumariz adhibito Funiculo, obstructions hepatis aperit, perque vrinam icterum ducit. Sepalsarii ex ea Syrupum conficere solent, qui medetur scabiei & malis pustulis. Suecus, vel aqua destillata, Fumariz oculis indicis caliginem illorum, scabiem & tubedinem discutit emendatque: succus Fumariz cum succo Leparthi acuti, admixto modico aceti & mellis temperatus, ita vt vnguentum fiat, omnis generis scabiem per sanat illitu. Conferuuntur flores saccharo, melancholicis affectibus salutares & Cachecticis.

FVMARIA MINOR, SIVE tenuifolia surrecta.

EX tenuibus radicibus surrectos producit caules palmares vel dodrantes ac minores: folia minima ac tenuia dissecta quam in ceteris Fumariis à nobis visis: Clusio mollicella, capillacea, vulgaris foliis cadidiora, summos cauliculos exornant: flores in spicam breuem densamque compacti, vili pulcherrimi, colorum varietate: flosculi singulares [qui non omnes pariter aper-



Tabern. Icon. & Hist. Fumaria tenuifolia, Fumaria tertia. Lob. in Adu. Fumaria minor in Narbonensi agro. Eidem. Obl. p. 438: Capnos tenuifolia cauliculis surrectis. Icon. Plant. p. 757. Capnos tenuifolia: Figura eadem quæ Clusii Hist. & Hist. post.

Prodidit autem Clusius Capnon tenuifoliam quosdam in Hispania Sideritum tertiam facere voluisse, nescit quidem quibus indicis ductos: vulgò à nonnullis Pallomilla & Palomina dici, nomine cum Fumaria vulgari communi.

C. Bauh. phyt. vocat Fumariam secundam, siue minorem tenuifoliam, cauliculis modò surrectis, modò procumbentibus & caducis.

Camer. horz. nominat Fumum terræ siue Fumariam tenuifoliam, Hispanicam, elegantissimè variegato ex rubro, albo, viridi, & luteo coloribus flosculo, ex semine plurimum propagandam, minus amaram quam reliquas Fumarias, pictam à Clusio & Lobelio.

Inuenitur autem plerisque Hispaniæ regionibus in aruorum marginibus & iuxta vias ac se-

Tom. III.

mitas: nonnullis etiam Narbonensis Galliæ locis obseruare se meminit Clusius, præsertim supra Arelatam dum Massiliâ Monspelim rediret. Ego Monspeli florentem reperi mense Aprilis non longe à monte Seti prope lacum; Bafilæ in horto Plateri mense Martio:

FVMARIA QVÆ SPLIT DICITVR.

Numerosos teneros & delicatos profert caules dodrantes; per quos folia spectantur Radicis caux, vel Adianthi, sed minora multò, mollicella, glauca, potissimum parte inferiore, sapore insigniter acri, & fauces vellicante, pauco adiuncto amarore: Flores lutei, vel albi, cornicula relinquunt Fumariz bulbosæ, minora, semine plena nigro, nitido: Radix crassifcula nigricat.

Descriptio



Match. in post. comm. & Camer. in eiusdem Epit. & Hist. germ. Fumaria corydalis.

Gein. hort. de hac loquitur cum ait: Est & Fumaria quædam montana, quæ ab Illyriis Split, vel Split appellari audit. Incole montis Baldi ad Veronam nominant Chelidonium, videtur autem

Capnus, vel Chelidonia phragmites Aetii esse.

Lobel. in Aduers. Fumaria lutea, montana & alba, siue Split Illyrica; an sit Aetii Phragmitis & Corydalis Galeni, non absque ratione dubitat, scitèque coniectare quemlibet ait, esse Capnum siue Chelidonium phragmitin Aetii; eos autem qui Galeni Corydalin esse asseuerent, nimis anticipi vti argumento. Obl. p. 438. vocat Corydalin, Fumariam luteam montanam siue Split, Chelidonium Capnites Aetii, Corydalin Anguillare. Icon. Plant. p. 758. Fumariam luteam montanam.

Clusius Capnon tertiam vocat; Split Italici dictam.

C. Bauh. phyt. Fumariam s. siue luteam. An Anguill. epist. 12. Corydala Galeni, Fumariz, vel Fumitetræ species, in Græcia capnites, vti dicta?

Fumaria, inquit Marantha luteo etiam flore reperitur: Sed non nisi montibus, radice crassiore chordeque instar contorta, quæ montana Capnos dicitur, vulgò split, Et Diosc. & Arabibus ignota.

Tossanus Carolus misit ex Burgundia semeni hoc titulo. Split flore albo & luteo: seu hoc Montbelgardæ in horto E. C. vbi Martio mense dodrantis erat altitudinis. Obseruauit etiam Ferrariæ in horto cenobii S. Dominici à l'Angeli: prouenit in collibus cultis & agris, præsertim in Illyria.

Præstat, si Matthiolo fidendum, vniuersa plan-

Cc 2

ta ad colicos dolores, siue rebus manducetur, siue sicca in puluerem sumatur, ex viuo pluribus diebus. Vires, inquit Gesnerus in Epist. ad Craton. ei attributas cerebrum corroborandi exhiberandique misicē, in me experiendo, nullas deprehendi. Sed sic noua pleraque remedia *Водикъ* extolli videmus.

FVMARIA CVM CAPREOLIS.

Descriptio



Tenui est radice, sed satis longa, ramuli tenelli, clauiculatum beneficio proximis circumuoluti eriguntur, foliis vestiti glaucis tenetis, integris, tenuissimis pediculis harentibus: flores albicantes.

Hanc Dod. gall. inscribit Capnon Plinii, Capnon Phragmitem, Pied de geline. Describit autē pro Fumaria

secunda, atque vocatam à Plinio Capnon & Pedem gallinaceum, ab Hermolao Capnon phragmitin, Lat. in fol. vocat Fumariam alteram: inibique Fumariam Splith dictam cum Fumaria hac confundit.

Gesn. hort. hanc intelligit, per Capnum Plinii, quam à Dodonæo pictam & sibi incognitam ait. Item per aliam Capnon Plinii, vel Phragmitem capreolis nitentem. Et per Fumariam alteram speciem, quæ Capnus vel Pedes gallinacei Plinii sit.

A Lobel. pingitur Obs. pag. 438. hoc titulo: Capnos alba latifolia (& hoc etiam in Ic. Plant. pag. 758.) Split album quorundam. Clusio dicitur Capnos altera Belgica albo flore, viticulis seu capreolis sepibus vicinis se implicans.

C. Bauhin. Phyt. Fumaria 4. siue clauiculis donata, varians foliis latioribus & angustioribus, floribus albis & dilute rubentibus.

Tabernaemontanus utramque iconē expressit his titulis: Fumaria latifolia minor siue quarta. Item: Fumaria latifolia maior, siue quinta.

In horto E.C. per me facta florens Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri, proximo Vere ex semine deciduo iterum quotannis prouenit. Fumaria altera Dod. lat. in fol. circa sepes, senticeta, agrorum margines, quandocūque & prope veteres muros exit. Prouenit, floret, vigetque eodē quo prior, anni tempore.

Locus & Tempus.

FVMARIA EVLBOSA, RADICE CAVA flore purpureascente & albo.

Fumaria bulbosa, quam hic exhibemus, radice est bulbosa, caua, lata & sessili, fibris aliquot donata, colore intus forisque buxea, sapore amaro, interdum non maior nucē Iuglandē, a-



liās pugno maximo maior, quā ex omnibus bulbis compacta, continuis tamen, eā formā, quā brutorum renes nonnunquam conspiciuntur: hinc exurgit caulis vnus aut plures, teneri, & magna sui parte sub terra latentes, angulosis, compressi, & altiores, foris obsoletā purpurā colorati, intus

pallidi, neruorum agmine rubentium, in circulo stipati, succū remittētes, qui primo statim occurssu linguam cum amore & acrimonia vellicat: folia in caule bina ortu inequali, pediculis crassiss, cauli concoloribus & longis, colore glauco prædita, quæ trifariam rursū cum peculiaribus pediculis subdiniduntur: singularia folia diuisurā Aquilegiæ minoris: à caulis medio ad summam partem vsque in thyrū modū digesti flores, pulcherrimi, ex breuibus pedicellis, veluti Confolidæ regalis, calcaris extremo recuruo, & veluti nucleato, obtusobue, vt in Aquilegia, purpurei, vel albi, labris utrinque diuisis rictum ostēdentes, lingua tanquam in ore latente, binis foliolis ad capita coeuntibus, canculatis, foris albis, intus puncto coccineo, laturo in summitate, notatis: id quod commune est, tam ei quæ flore albo est, quā ei quæ purpureo, sicut & crocati apices: quin etiam utriusque inter flores, quā eorum pediculi oriuntur, pro singulis pediculis singula folia oblonga striata, mucronata, integra & modicè concava. Siliqua maturo ortu sequuntur oblongæ, in quib. semen paruum, nigrum. Plantula ex semine deciduo folium vnicum producant oblongum, subrotundum, simile Auriculæ leporis primū prouenienti.

Fumariam bulbosam radice cauā magno errore credunt esse Aristolochiam rotundam Brunfels. Apollinaris, Corn. & Georgius Pictor.

Merito verò negant plantam hanc esse Aristolochiam Cord. in Diosc. Trag. Fuchs. Matthioli. Turn. Lonic. Lob. Guiland. Tab. & C. Bauh.

Deformē habet figurā Lonicæ. Dod. verò gall. dicitur Radix caua, quam ait diu in officinis Belgicis existimaram Aristolochiam rotundam, & hoc nomine ab ignaris pharmacopæis adhuc vsurpari: doctos quosdam putare Pistolochiam Plinii, quosdā Fumicetæ speciem facere, Capnon phragmitē vocatam: nonnullos ad Hyacinthos referre: alios *Belge* & plantā Veris existimare, cū qua maiore habere similitudē credit. Eadem Lat. in fol. tradit, vbi Radicem cauam simpliciter inscribit, ac maiorem in descriptione cognominat. Germani inquit, *holsturz*: Belgæ *hoolwortele*: Galli *racine creuse*, id est, Radicem cauam appellant. Officinas perperam hac pro Aristolochia rotunda vsas notius est, quā referri, aut refelli debeat: & similiter eorū manifestus error, qui temerē Pistolochiam iudicant. Quo autem nomine

mine dici debeat (si modò Veretibus cognita fuerit) non parum ambigendum videtur. Sunt qui Leontopetalii speciem faciant: alii Eriphion: nonnulli Thesium: perique Capnon chelidonium.

De fumaria bulbosa hæc prodidit Tabernamontanus. Ignari, inquit, & inexpecti Calendarii & Mufomedici Radicem cauam [die holwurz] pro vera Aristolochia in officinas falsò introduxerunt, qui error, quamuis aliàs sæpius, à pluribus sic animaduertus, tamen adhuc hodierno die non euertitur in pluribus Officinis, quamuis Radix hæc cum Aristolochia penitus nihil commune habeat; Ita pro dolor! sic, firmamentum cæli contemplamur, & terrena non agnoscimus, quæ pedibus conculcamus, & seire ex officio deberemus. Est verò caua hæc radix, Fumariæ species, quam Aëtius & Plinius describunt. Vocatur autem græcè *καπνὸν χελιδονίαν*, *καπνὸν χελιδονίαν*, à Theophrasto *χελιδόνιον*: Latine Capnus Chelidonia, Capnium Chelidonium, Capnium Phragmites, Capnus sepiaia, ab Alexand. Bened. Pes gallinaceus, à Plinio Pedes gallinacei, ab Herbariis Fumaria bulbosa, Fumaria tuberosa Aristolochia concaua, Aristolochia adulterina, Radix caua & Tonitruifuga, quod quamprimùm tonitrua oriuntur, marcescat. Italicè *Capno Chelidonio*, Gallicè *racine creuse*, Belg. *Woolwortel*. Germ. *Holwurz*, *hanenspor* & *donnerflug*. Dictis porò his nominibus appellantur sequentes octo species. Ceterùm nullam ego video distinctionis eius in octo species rationem, quippe quæ nullas notas diagnosticas ponat, præter eam, quam à colore sumit: ac Octo figurarum vicem abundè suppleuisset, ynica, fidei manu facta.

C. Bauh. phyt. Fumaria 6. siue bulbosa maior (radice caua, varians colore floribus purpureo (quod si flos minor sit saturatius ruber & pro maculo habetur) pallido, sublauescente, albo. Schvvenckf. Fumaria bulbosa maior albo flore, *herz-sourz*. Item Fumaria bulbosa maior flore rubente, *hanenspor*.

Fumaria radice bulbosa & caua flore purpurascens ac albo abundat circa Montbelgardum & orto Ille. C. florens Februario, Martio, & Aprili mensibus. Olim obseruauit flore albo & purpureo Basilea versus Præstelen; Montpelii in montibus circa Gangem florentem Martio; Patavii in montibus Euganeis inter balneum Aponeuse & Arquam florentem Februario.

FVMARIA BVLBOSA, RADIX CAVA viridi flore dicta Lobelio.

Radicem huic adscribit Tabernamontanus integram, rotundam, præcedenti minorem; & multis donatam fibris: folia item iam dictæ similia: caulium summitatibus foliola parua; dissecta, inter quæ flores prodeunt colore virides.

Dicitur descriptionis auctori Tabernamontana in Hist. Fumaria bulbosa 9. siue flore viridi, Capnos chelidonia siue Fumaria bulbosa, viridis. Germ. *Brun holwurz* & *grün hanenspor*.

Fumariam bulbosam viridi flore obseruauit Lobelius, cuius figuram in Icon. Plant. p. 760. Tom. III.



FVMARIA BVLBOSA; RADICE
solidâ, calcaris, & folio cristato.



proponit, hoc titulo: Radix caua viridi flore. Eadem verò hæc auctore C. Bauhin. in phyt. vel maior, vel minor, ratione loci natalitii est: huic folia angustiora; illi paulò latiora.

Fumaria bulbosa alia, radice est bulbosa, non caua, rotunda, Auellane magnitudine, interdum maiore, non tam altè defixa, vt ea, quæ radice caua, membrana quæ facillè trahenti cedit inuestita, foris buxæ, intus subalba, à mara, cui fibræ capilli: res aliquot adnatæ; planta sæpè palmaris & minor, inter-

dum dodrantalis & pedalis, nec multò minor Radice caua, caule lœui, subrubro, binis filijs prædito, ex oblongis pediculis cauli concoloribus, non aduersis, in tria alia subdiuisis, quæ tenuius deinde subdiuiduntur: iuxta radicem aut paulò altius folliculus vnicus carinatus, calcaris gallinacei instar, membraneus, in quo aliorum foliorum rudimenta: externo cauli insident flores Radicis cauæ, purpurantes, quæ pediculo mediocriter longo tenuique adhærescunt albi, tres, quatuor, nouem, duodecim & plures conferti in spicæ formam, inter quos ad singulorum pedicellorum exortum, folium vnum dissectum variè, fimbriatum, & cristatum; succedunt siliquæ, vt in præcedenti. In hoc genere albos flores nondum obseruauit.

Cordo in Diosc. dicitur Capni Plinii & Aëtii species minor. In Hist. [vbi pulchrè describitur] Chelidonia phragmitis, quam ait Aëtium Capnium, Plinium verò Capnium phragmitem, & Pedes gallinaceos, appellare, propter folliculum gallinaceum calcaribus similem. Nomen verò

verò suum inuenisse, quòd primo Vere circa hircundinura aduentum germinet ac floreat, Capium & Capnium phragmiten dici, quoniam herba priuatim Capnus dicta floribus & foliis similis sit, quòdque circa sepes & dumos nascatur.

Gesni. de hort. Aristolochia vulgaris speciem solidam vocat. Tragus Aristolochia rotunda vulgarem radice solida. Dodon. gall. Radicis cauae dicta speciem plenam, firmam, & solidam. Lat. in fol. Radicis cauae minorem. Lob. in Adu. Fabricae radice Capnon, Belg. Boonfens holwortele. In Obsp. 439. in Ic. Plp. 759. Fabricae radice Capnon alteram. Clus. in Pannon. & H. post. Radicem cauae minorem, germanicis & belgicis Officinis apprimè notam. Tab. Fumariam bulbosam minorem decimam (ita enim inscribit, ac postea etiam tuberosam cognominat.) Casp. Bauh. Phyt. Fumariam 7. siue bulbosam maiorem radice non caua. Non separabimus nos vnuquam has duas Fumarias radice solida non caua, liquidem magnitudine tantum variant.

C. Bauhin;
not.

Locus &
Tempus

In finibus comitatûs Montbelgarde: sis ad pagum Mandente, non longè ab oppido Lisle iuxta viam ex Monteno, Fumaria minor obseruata non profundâ radice: in silua rarior inter fruteta, ubi Fumariae bulbosae nulla alia species inuenitur. In hortu Ill. E. C. maior plantata, citius siliquas producit quàm caua, florens Martio & Aprili. In Belgio, Germania & Sabaudia (etiam prope Ebrodunum) vti Geneuæ, aruorum quorundam sepes & margines hac fecatent. Meminit etiam Lobelius in Veganiis hortis Dei se eruisse. In Germania passim, tum in Belgica inter vepres & frutes nusquam in Pannonia videre meminit Cluius.

Vires

Vulgaris Aristolochia rotunda ad internas quàm plurimas affectiones adhibetur. Sunt enim qui radicem eius in puluerem redactam aduersus venenum & pestem à vino bibendam exhibeant. Cum vino calfacto pota, si postea in lectu te componas, probè contectum, sudores potenter elicit. Eadem urinam trahit, & ad morbum facit regium è vino pota. Semen tufum ac sumptum quotidianis alui profluuiis auxiliatur, autore Trago. Vt verò Lobel. scribit, facit ad vermes & maligna vlcera. Radix amara, excessu secundo calida & sicca. Digerendo, abitergendo, & defluxionem inhibendo, anginis & laryngum tumoribus gargarizata prodest, pituitamque exterget. Eadem ferè Dodonæus tradit. Radix caua inquit, anginas curat, tumoreque inueteratos amygdalarum, si ex eo aqua sola, aut aceto facta decoctio gargarizetur: humores crassos incidit, dissipat. Prodest & tumoribus palati & gingivarum, inspersus pulvis eius. Cum vnguento populeo consumit hemorrhoidas, earumque dolores sedat. Aristolochia rotunda vulgaris, cum habeat & in foliis & in radice acrimoniam, eamque leuicam quidem: si genuina Aristolochia rotunda deest, sine omni discrimine illâ vtiur Fuchsius ad omnia ea, ad quæ vera vsurpatur. Maiore commendatione est minor apud Chirurgos & mulomedicatrices mulierculas, quæ istius puluerem efficaciorè & delicatiorè ad lumbricos interrimendos prædicant. Radices cauae omnes, ex sententia Tabernamontani, calidae sunt in secundo gradu. sicca in tertio, abstergunt cum nonnulla adstrictione. Radix herba & flores quomodocunque vsurpata, in cibo etiam & in potu hepatis obstructionibus efficaciter medetur. Succus ex herba, radice, & floribus expressus, duarû

Vnciarum pondere potus, expellit vermes. Idè præstat radix in vino sumpta: minor quidem iunioribus natu propinanda. Succus dicto modo manè & vespere adhibitus, cancro, fistulis, ceterisque putridis vlceribus medetur. Vulneratis etiam vtiliter propinatur. Cæterum planta hæc, ceu Fumaria sanguinem purificat. Nec tantum prædictis affectibus vtilis est, sed & vlceribus obsecnarum partium occurrit, etiam brutorum. Radicis enim herba & florum decocto (dicto modo facto) hæc si sapius lauentur, breui sanantur. Radix puluerizata, aceto in vnguenti consistentiam redacta, scabiem illitu, vlceraque capitis manantia sanat. Succus è floribus & herba expressus, si parum sacchari candi in eo dissoluatur, aliquoties de die in oculum infillatus, maculas eorum tollit, & visum acuit. Vlcerà obsecnarum partium dicto decocto lota, pulvis inspersus curat. Radix puluerizata & melle in emplastrum redacta, confusionibus vtiliter imponitur. Radix cum herba in vino decocta, emplastri modo applicata lenit dolores podagricos, arthriticosque. Aqua stillantia Fumariae huius bulbosae in eodem vsu adhibetur, in quos Aqua Fumariae vulgaris. Accommodatissimum autem tempus distillandi hanc, est finis Aprilis, cum floret. Distillatur integra planta in Balneo, rectificatur in Sole. Fit ex Capno bulbosa Capnites vinum, vt Enula campanæ. Admodum salutare tempore pestis. In cura vlcerum, cancerum, apostematum, morbi veneri, scabiei, & omnium cutis vitiorum, potius vice bibitu multum prodest. Conferua commendatur ad obstructions vlcerum, & sanguinis purificationem. Item pestem, manè ieiunè sumpta Castane dimidiae magnitudine. Melancholicis etiam affectibus vtilis est & cachecticis. Porro, si quis velit, salem, syrupum, olea, extractum, & cætera id genus, in prædictos vsus, conficere poterit.

MOSCHATELLINA FOLIIS FUMARIAE bulbosæ, de qua Cordus.



Moschatellina Defol.
radicem habet
semunciale
& vnciale
câdidam, plu-
ribus squamulis,
caninorum dentium
instar habentibus,
quarum inferioris ca-
uum, superioris mucronem
solidum excipit, fibris do-
natam circa
superiora genicula, satis
pro plantulae
proportionem
longis, subduli-
cem, pediculi

duo, tres, molles & delicati, in viridi pallecentes, tenues & palmares, filia sustinent in viridi glauca, Fumariae bulbosae diuisura: cauliculus vt foliorum pediculus haud discolor, ita non

non multo altior, singularis, flosculos quinos sustinet, colore herbaceo, quinque foliis constantes, in quorum medio *stamina* exigua ex herbaceo virore in luteolum dilutum faciliencia, stylo viridanti: omnes flores simul sumpti cubum referunt: paulo sub flore, breuibus pedicellis appensa sunt folia bina, reliquis supradictis, excepta sola quæ superantur magnitudine, similia: & flores & folia moschum spirant.

Cordo dicitur *Bisemfrat* / à Moscho, non *Besemfrat* à scopis, vt perperam asseruisse Cordum falso scribit Cronenburgius. H. Lugd. p. 1296. Denticulata, à radice velut à dentibus paruis coagmentata. Sunt qui Alabastricem vocent, ob radicis fere pellucidæ ac nitentis splendorem alabastrum similem.

A Lob. in Aduers. vocatur minius Ranunculus Septentrionalium herbedo muscoso flore: Item Icon. Plant. p. 674. & Muscatella Cordi. A Tabern. Fumaria bulbosa minima in Icon. & Hist. ubi quoque Fumaria vndecima bulbosa. C. Bauh. Ranunculus 5. seu Ranunculo similis Moschatellina dicta, varians magnitudine.

Moschatellina Cordi folio Fumariæ bulbosæ Genesæ copiosè in sepiibus nascitur, in colle *la Bastie*, & alibi, in sepi Martio florens, luno principio *six* dum apparet. Copiosè quoque Montbelgardii iuxta *la Croze*. Basileæ à se repertam scribit Gesn. & C. Bauh. In Anglia prouenire & circa Coloniæ asserbat nobis coram Turnero. Ad fontium scaturigines, riualoque prata rigantes, & in vmbrosis sepiibus nasci primo Vere, statimque perire testis est Dalechampius.

ac calefacere opus est; vtilissimum medicamentum existit: in destillationibus & gradationibus. Id nomen etiam Hippocrates, & ad veterinos affectus frequenter præscribit. Apud Theophrastum non reperiri Melanthium testatur Celsus nusquam Theodorus Nigellà dicat; quod Theophrastus Antheion vocat. Melanthium tandem dictum putat Andreas Baccius de venen. & Antidotis, relictibus Arabibus à proprietate sanandi morsus canis rabidi, quæ tamen Erymologia potius conuenit Alyssis, hæcenus non satis cognito.

Quæ porro planta ex dicendis Veterum Melanthium hodie representet, multi dubitant. Nominatur siquidem Melanthium capite & flore maiore, Nigella Damascena Cordi, Hesperium Gulandini. Melanthium Hispanicum elegans flore simplici magno, Nigella Hispanica venusto flore Robini. Melanthium capite vel calyce & flore maiori pleno, Melanthium Damascenum Clusii. Melanthium calyce & flore minore, semine nigro & larco, Nigella citrina Herbariorum. Melanthium capite minore, flore multiplicato, Nigella citrina, flore multiplice Lobelii, Melanthium citrinum multiflorum Tabernamontani. Melanthium silvestre siue aruense, Melanthium silvestre capitulis reflexis Tabernamontani. Pseudomelanthium multis, sed perperam, nominatur Melanthium. Pro Melanthio Cyprio apud Hippocratem, legendum censet Cornarius Atramantum seu Spodium Cyprium, quam lectionem non probamus.

Aequiuoca


Melanth. capite & flore maiore
Melanth. Hesp. elegans flore simplici magno
Melanth. capite & calyce & flore maiori pleno
Melanth. calyce & flore minore
Melanth. capite minore flore multiplicato
Melanth. silu. siue aruense
Pseudomelanthium
Daphnoides
Spodium
Cyprium

MELANTHIUM VETERIBUS.

CAP. LXXXVIII.

Melanthium, vt memorie prodidit Dioscorides, *farculis* tenuibus, in binum dodrantum altitudinem, aut etiam amplius, assurgens, foliis veluti Senerionis, at multo tenuioribus, capitulo in cacumine paruo seu Papaueris, oblongo, intrinsecus dissepimentis quibusdam prædito: intra quæ semen latet nigrum, acre & odoratum, quod panibus inspergitur. Caput dolentibus illitum fronti subuenit, itemque incipientibus oculorum suffusionibus tritum cum irino & infusum naribus. Tollit & lentigines, lepras, veteresque tumores ac duritias, ex aceto illitum: circumscissos clauos excutit, cum vrina veteri impositum. Dentium quoque dolori cum aceto & tæda coctum collatione prodest. Teretes itidem lumbricos expellit illito ex aqua vmbilico. Tritum verò linteolo illigatum & olfactum destillatione laborantes adiuvat. Pluribus autem diebus continuis sumptum mensis vrinasque ciēt & lac auget. Leuat & spirandi difficultatem addito nitro potum; auxiliaturque phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere bibitum. Incensum quoque serpentes fugat. Sed & ipsum tradunt largius eporum enecare. Cæterum, sunt qui Melanthion, Nigellam, Gith, & silvestre, & nigrum papauer dicant.

Melanthium etiam Melaspermon Græcis vocari Plinius, Latinis autem Gith, & de ipso plantæ eadem quæ Dioscorides prodit lib. 20. cap. 17. Galeno Melanthium calefacit ac siccit tertio ordine: & ubi secare, extergere, siccare

MELANTHIUM CAPITÆ ET
Flore maiore.

AD cubiti altitudinem exrescit, rigidis, striatis caulibus, quos folia ambiunt Melanthii cui flos minor, perquam tenuiter dissectus, sapore nihil acri & nauleoso: flores longè maiores, nonnihil odorati, quinque constant foliis ex caruleo albicanibus, quæ totidem intercedunt

folia, qualia in caule conspiciuntur: in medium occupant multa *stamina* apicibus viridantibus cum pericarpii rudimento quæ omnia cingit corolla ex bulgulis operculatis melleum liquorem continentibus: semen in pericarpis ventriosis, membranis dissepimentis distinctum, nigrum, odoratum. Radix lignosa, colore buxo.

Cordus plantam à nobis hic depictam, describit in Hist. nomine, Nigellæ Damascenæ, ubi etiam figura à Gesnero posita ex Trago nomine Nigellæ. Fuchsius Melanthium hortense alterum inscribit, ac Nigellam alteram vocat, ger-

manicè Schwarz Coriander, quod folia eius Coriandri foliis non dissimilia sunt.

Ilopyri & Melanthii siluestris nomine pingit Matthiolus. Geshort. dicitur Nigella [alias Melanthium, Gith] Damascena. Hort. Lusit. Melanthium Damascenum, frembder Schwarzger Bümmel. Camer. hort. Melanthium Damascenum Cordi, flore cæruleo, nigrum, insipidum, & inodorum, quamuis vegetum semen gerens. In Epit. Matthiol. Melanthium siluestre. In Hist. eiusdem Germ. Melanthium siluestre primum. Dodon. Gall. & Latin. Melanthium Damascenum (hoc est Nielle de Damas.) Ionic. Melanthium secundum satium matius. Tabern. Icon. & H. Melanthium agreste, Nigella arvensis, wild Wardenkraut. Lob. in Aduers. pagin. 319. Obs. p. 428. & Icon. Plant. p. 740. Melanthium siluestre. C. Bauhin. Phyt. Nigella 3, siue flore maiore simplici.

H. Lugd. nov.

H. Lugd. plantæ a nobis descriptæ tres proponit icones. Duas p. 313. his titulis: Melanthii siluestre prius Matthioli. Et: Melanthium siluestre prius Matthioli secunda editione. Tertiam pag. 1020. hac Inscriptione: Ilopyrum Matthioli. Inter priores duas nullam ostendit differentiam. Quale verò sit Ilopyrum Matthioli satis dictum.

Matth. & Tab. nov.

Lapsi sunt etiam Matthiolus & Tabernamontanus (quod recte etiam obseruauit Lob. in Aduers. & C. Bauhin.) Melanthii speciem quandam pro Ilopyro pingentes.

Melanthium flore & capite maiori spôtè prouenit Montbelgardi, ubi fleret Maio: Geneuæ in hortis Octobri & Nouembri mense, virens autem adhuc Ianuario. Basileæ florens Octobri & Junio in orto patris mei, & aliorum: Patruini in orto nob. di Musati Martio.

MELANTHIVM CAPITUM VEL CALYCE & flore maiore pleno.

Hoc alterum Melanthii flore maiore genus ramis striatis tenuibus, foliis tenuibus multipliciter dissectis, cum præcedente conuenit: verum huic flores non tantum multiplici foliorum fœtura luxuriant, colore vel herbaceo, vel albo, vel cæruleo, vel ex his mixtis vario: verum etiam singula floris folia profundis crebrisque cæsuris fimbriata sunt.


Est hoc Melanthium Damascenum pleno flore Clusio. Prosp. Alpino de plant. Egyptii cap. 42. Melanthium. Item Nigella. Casparo Bauhino Phytopinace Nigella 4, siue flore maiore pleno, solo flore à primo differens, qui penè circumscripta rotunditatis est.

Montbelgardi in pluribus hortis, ut Ill. E. C. fleret Augusto & Septembri.

Nigellæ floribus maioribus ac numerosioribus foliis præditis semen in Aegypto in usu est frequentissimo, inquit Alpinus, ad puerorum vermes necandos: contusisque seminibus cum acco emplatri modo ad plures cutis infectiones videntur mulieres. Quæ verò non purgantur, eo si suffiantur, maxime iuuantur, vocantque hanc plantam Suneg.

MELANTHIVM CALYCE ET FLORE minore, semine nigro & luteo.

Folia latiusculâ diuisurâ, licet singula interim segmenta culmum latitudine non æquent,



medium percurrente semper nervo, striatis pedalis caulibus hærent: flores ramorum extremis hærent singulares ex albo pallêtes, minores quàm cærulei, quinque foliis cõpositi, multis apicibus medium occupantibus, capitulumque cingentibus, quod delapso floræ minus quoque apparet, quam in Damasce-

no quibusdam dicto, quinque aut sex corniculis præditum, semine referum anguloso luteo, vel nigro odorato.

Hanc describit Cordus in Hist. sub titulo Nigellæ, quam duplicem agnoscit. Vnam semine nigro: alteram candido seu flauescente. Tragus vocat Melanthion satium, Salusandriam Dioscoridis, agreste vel nigrum Papauer & Nigellam, Germ. Schwarz Coriander, h. e. nigrum Coriandrum, Xaniam Serapionis, & Scaunicem Auerrhois. A Fuchso Melanthii hortensis primi titulo pingitur, eiusque duæ species assignantur. Nigellam Romanam officinis dici testis est Cornarius. Melanthium satium appellat Matthiolus passim in suis comm.

Lacuna Matthioli signam & titulum retinet, atque vocari præcè Men de Sira, Gith & Melanthii latine, barb. Nigella, Castil. Niguella aut Axeniz, Catal. Niella, Portug. Aliprine, Ital. Githone, Gall. Barbue, aut Nielle, Germ. Schabab. Recipit & ipse duas species. Vnam semine nigro, & alteram citrino, dictam Herbariis Nigellam citrinam.

Cæterum, Camer. hort. dicitur, Melanthium, siue Nigella, Gith [quamuis desint secundum Dioscoridem folia Senecionis] flore simplici, semine nigro. Item Melanthium Damascenum semine pallido, quod ait Bononienfes in suo Antidotario substituere pro Cardamomo maiore Arabum. In Epit. Matth. Melanthium satium, semine nigro, quandoque subflauo. In Hist. eiusdem German. Nigella sativa.

Dodon. Gall. Melanthium satium, Nielle domestique Gall. hoc est, Nigella domestica, & Salusandria, Belg. Wardus: semine nigro & subluteo, quod Wardus facit dicitur. Lat. in fol. Melanthium.

Wirsung. Nigella, Schwarz Coriander, & Nigella alba, Weiß Coriander. Geshort. Nigella vulgaris semine nigro, & altera species semine subflauo.

Lob. in Aduers. (ubi florem purpureum ei tribuit, quod miror, cum porius ex albo ad luteum tendat) p. 329. In Obs. p. 427. 10 Pl. p. 740. Melanthium siue Nigella Romana odora.

Tabern. Icon. & Hist. Melanthium satium ut & Castori. Hist. Lugd. p. 812. Melanthium satium Matthioli. Hort. Lusit. Melanthium vulgare satium.

Casp.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Nigella r. siue flore minore simplici, semine aliquando nigro, aliquando pallide flauente: luteo etiam in horto nostro Basileæ; rarius candido.

Schvvenckfeldio tandem Nigella Romana; Μελαγχθισ Dioscoridis, ἀπὸ τοῦ μελανθισ ὀφθαλμοῦ. Melanthium hortense. Item: Nigella citrina simplex, Melanthium citrinum flore simplici.

Melanthium flore & calyce minore, semine nigro in hortis facile prouenit, florens Augusto & Septembri. E semine luteo à fratre misso Geneuæ mihi creuit in horto, & Montbelgardi in horto Ill. E. C.

MELANTHIUM CAPITIS MINORE flore multiplicato.



Ex radice exilis simplice, caulis surgit singularis, cubitalis & sesquicubitalis, teres, striatus, hirsutus, inanis, in alas diuisus; alternatim folia oriuntur, longis carinatis pediculis appenda, colore ex viridi in luteum vergente, diuisura multo latiore, quam in vulgari Me-

lanthio, hirsuta: flores ex albo herbacei coloris, multiplici foliorum stipatu pleni, apicibus multo herbidis.

Hoc ita traditur, à Clusio. Melanthium odoratum pleno flore, virgis foliisque à fatuo, cuius semen odoratum, hosque è viridi candicat, nihil, vel quam minimum differt: flores tamen qui in fatuo triplices sunt, in hoc, triplici, aut quadruplici nouem aut decem foliorum serie constant; exurgentibus in medio staminibus, & pentagono hexagono capite in rotidem cornicula inflexa superne diuiso, quod, intercurrentibus internè membranjs, plenum est semine rotundo, nigro, odorato, vt vulgaris.

Lobel. in Obs. Aduers. in fine, & Icon. Plant. p. 741. Nigella citrina vulgò vocata, flore albo multiplici. C. Asalp. Nigella flore candido ex numerosis folijs constante, semine multum odorato. Schvvenckf. Nigella citrina plena, Melanthium luteum multiflorum, Melanthium flore pleno pallide luteo; doppel geel Nömischer Coriander. H. Lugd. p. 312. Nigella citrina, flore albo multiplici.

Casp. Bauhin. phyt. Nigella 2. siue flore minore pleno: Cardamomi species Lacunæ, Nigella citrina solo colore à nigro differens sine icone. Si solo colore differat à nigro, non video quomodo huc referri debeat, aut queat: Melanthium calyce & flore minore semine luteo, potius nominandum existimo.

Tabern. Icon. & Hist. Melanthium citrinum Tom. III.

multiflorum, doppel geel Warden fräut. Variat hac figura à Lobelio.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. florebat Iulio & Augusto Melanthium hoc calyce & flore minore pleno. Melanthium odorum pleno flore, in hortis cultum obseruabat Clusius, florens Iulio & Iulio: semen verò maturans Augusto.

Locus. & tempus.

MELANTHIUM SILVESTRE siue aruense.



Hic cum Melanthio Damasceno magis quam cum ullo alio conuenit, sed longè strigosius natalis suos testatur, ad altitatem aut dodrantalem magnitudinem pertinens, calibus modò simplicibus, modò à radice statim; quæ lignosa, ramosis, striatis: filia Anethina, vel potius

Descriptio

Damascenæ Nigellæ, sed non ita læta, rara, in tenuissima fila difsecantur: flores stellati quinque folijs constant, colore caruleo, vel pallente; luteæ Nigellæ floribus non maiores, nullis foliorum tenuium barbulis, vt Damascenum, suffultis hisce succedunt caputula Aquilegiæ, quinque corniculis in diuersa quidem superius abeuntibus, sed à medio ad inum vsque connatis: semen nigrum, exigui odoris.

Huius plantæ pictura exhibetur Nigellæ cornutæ titulo lib. 2. Hist. cap. 22. apud Cordum. Dicitur Nigella siluestris Trago & Lonic lib. 5. cap. 49. Non placet autem hanc cum rursus dicto lib. cap. 78. sub falsa figura; quam S. Catharinæ blumen (Florem S. Catharinæ) inscribit, inter Linariæ reponere, cumque eis miscere & confundere.

Gesl. hort. in append Nigella agrestis & spontè proueniens. Camer. hort. Nigella siluestre, in Tritico multum crescens. Melanthium siluestre Fuchsi (enigella 4. & Cuminum silu. 2.) Castori, Dod. gall. & lat in fol. dicenti. Siluestre Melanthium spurium est, ac à similitudine nomen inuenit. Germani quandoque S. Catharinæ blumen, id est, Diuæ Catharinæ florem nuncupant. Placet nonnullis illud esse Cuminum siluestre. Erpote non temerè pro siluestri Cuminum altero haberi: Verum breuitas sæpe in causa est vt certi definiti nihil queat.

Melanthium siluestre alterum Matth. in post. comm. cum mag. figuris lat. & italicis. Camer. in eiusdem Epit. & Hist. germanica. Melanthium siluestre alterum Marthioli H. Lugdunensi p. 83. Lobel. in Adu. p. 329. in Obs. p. 428. in Icon. Plant. p. 742. Melanthium siluestre alterum, capitulis reflexis Aquilegiæ. Tabern. Icon. & Hist. Med. Dd

lanthium agreste alterum. Cordo in Dioscor. & Fuchf. in Icon. Cuminum nigrum, & Cuminum silvestre alterum. Clus. Melanthiū Cretico [quod describit, ac quod C. Bauhinus Phyt. Nigellā sextam siue Creticam vocat,] valde simile vocat. Hort. Lusit. Melanthium silvestre, Nigellam aruensem. C. Bauhin. Melanthium silvestre siue aruense, Nigella aruensis.

Locus &
Tempus.

Melanthium silvestre obseruavi in agris Môtbelgardenſibus, florens mense Septemb. In agris Basileenſibus mense Octobri. Melanthium Cretico valde simile Clusii inuenitur in aruis post demissa fegetes, totā Pannoniā, Austriā, reliquāque Hungaria.

DELPHINIUM VETERIBVS.

CAP. LXXXIX.

Descriptio Delphinium (vt Dioscorides prodidiſſe fertur) *ramos ab vna radice duorum dodrantum longitudine, & aliquando maiores proſert: circa quos folia ſunt tenuia, candida (carent hoc vocabulo quadam exemplaria,) prelonga, incisuris diuiſa, Delphiniſſima figura, vnde & nomē inuenit. Florem fert Viola [albæ addunt quidam] ſimilem, purpureo colore. Semen in ſiliis habet Milio æquale. Potum cum vino ſcorpionum iſtibus, vt quoduis aliud medetur. Ferunt præterea ad morā herbæ contactos ſcorpiones languere, torpidosque, & ad nocendum inefficaces fieri: amorā verò ſtatim in antiquam redire naturam. Naſcitur Delphinium hoc aſperis locis. Eſt & alterum Delphinium, quod Hyacinthum aliqui, Romanī verò Buccinum pariter vocant, iam dicto ſimile, foliis tamen ramuliſque multo gracilioribus: Vim etiam eandem cum prædicto habet, ſed non ita efficax eſt.*

Cum autem Delphinium nec à Galeno, nec ab Oribaſio, nec à Paulo, nec à Plinio, nec ab aliis tum Græcis tum Latinis deſcribatur vſquam: multis, præſertim verò Cordo & Matthiolo, eius caput quod apud Dioscoridem habetur ſpurium & aſcritium exiſtimatur: Lobelius tamen aliud ſentit, perquirendum ſuadens, num autores illi claſſici alio fortè nomine de eo ſcripſerint necne: nec parum placet nobis eius ſententia, cum in tanta rerum obſcuritate & opinionum diuerſitate vix quicquam certi ſtatueri liceat.

Senam autē Mauritanis vocatā non deſuere qui ſiliquarum conuexitate fieri & decepti [inter quos Marcellus] Delphinium eſſe crediderint: quorum grauis error ita euident eſt, vt iam ab omnibus explodatur: Idque non iniuriā, quod in Delphinio, folia non ſiliquæ, quæ Delphiniſſima formam repræſentent, requirantur: tota denique Delphini facies ea depingatur, quæ cum Sena quàm maximè pugnet.

Exiſtimate, inquit Lobelius, Herbarii Delphinium eam eſſe plantam, quæ à vulgō ipſorum Filiius ante Patrem appellatur. Examinandum etiam in Aduerſ. proponit, An Antora nobis Antiora dicta [de qua dicemus l. 34.] ſit Delphinium, cuius delineationem explere poſſe reſtat.

Alii cum Lychnide, alii cum Lunaria conſerunt: Crato verò cum ea planta quæ à nonnullis *Noli me tangere* appellatur.

DE CONSOLIDA REGALI, EIVSQVE ſpeciebus. CAP. XC.

Consolidam regalem videntur Veteres inter flores coronarios habuiſſe, & quidem ſub Hyacinthi nomine, ſiquidem Plinius lib. 21. c. 11.

ita diſcurrentes notas ineſſe dicat, vt Græcarum literarum figura A. I. legatur inſcripta: quod ſane in Conſolida Regali hortenſi obſeruare licet, quippe quod in floribus ſit folium quoddam implicatum, quod in albo characteres habet occultatos, ex virgulis cæruleis duas literas A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Cuius Hyacinthi meminiffe videtur Dioscorides lib. 3. in Delphinio altero, quod & Hyacinthum appellari monet. Ita videtur Conſolida regalis hortenſis *delphinium* eſſe Dioscoridi, ſi modò vox *delphinium*, non ad folia, ſed ad flores referatur. Altero verò Delphinio ſeu Romanorum Buccino, Conſolidam regalem ſequitur notare. *hes C. Bauh.*

Consolidam regalem eſſe Delphinium meritò negat Tabernamontanus, ſed idem falſò Cuminum ſilvestre alteram Dioscoridis eſſe pronuntiat. A Medicis & Herbariis Conſolidam regalem ſiue regiam vocari tradit, à cōſolidandis vulneribus, Herbam diuæ Otiliæ, & Florem diuæ Otiliæ, Florem regium, Equitis calcar, & Calcar equeſtre, Florem equeſtre, Pedem alaudæ, Corydalopodium, à Ruellio Cornuetam & Cornuetam à Germ. Ritterſporn / S. Orlienhauſ / os Blum / Ritterblum / & Lerchenflame. Belg. *Kids derspoorn*. Gall. *Pied d'alouette*, *Cornuette*, & *los regalle*. It. *Sperone di caualiero*, *Sproni di caualiero*, *Sprone di caualieri*, & *Conſolida regale*. Angl. *Larkes clame* / *Larkes ſpurve*. Boh. *Swaluyſ fratloſſy*. Hung. *Sarkas ſiu*.

Non multum tamen culpandi ſunt, qui Delphinium plantam illam eſſe volunt, quæ Conſolida regalis vulgò dicitur, queque à Fuchſio pro Eranthemone depingitur. Hi enim contextum tanquam deprauatum ita emendat vt ſimilitudinem Delphini ad flores referant, non ad folia. Verum illi (qui Senam Delphinium eſſe contendunt) nullo pacto contextum immutantes, quod foliis tribuendum eſt, folliculis tribuunt. Qui præterea Eranthemon putant eam plantam, quæ Conſolida regalis appellari ſolet, quoniam pacto excuſari ab errore poſſint, non videmus cum Marantha. Hæc enim in figura floris multum diſtat atque alias fortè habet differentias.

Consolidam regalem Cornarius falſò Cuminum ſilvestris Dioscoridis primum genus eſſe credit. Cæterum de Conſolidæ ſpeciebus nunc ordine dicendum.

CONSOLIDA REGALI FLORE minore.



Gnerc non eſt diuerſa, ab ea quæ maiore eſt flore, poſt deſcribenda, verum ſpontanea cum ſit, nulloque magonio lætior exculta, tota ſtrigioſior euadit, nec temerè dodrantalem magnitudinem vnquā, quoad ſuæ ſpētis eſt, vt diximus, *uacadeo ſilium* vel numero, vel lari-

latitudine luxuriat : magis etiam squallidus flos, & minor neglectiorem testatur, coloris cærulei: semen in corniculis non dissimile, vti nec radix nisi quòd ea hortensi habitior est.

Cordus in Histor. vocat Calcatrippam candidam, cui dicit florem in candido esse rubentem. Et Gesnerus apposuit figuram nomine Consolida regalis, & sic etiam vocat Apollinaris, qui vires tradit. Tragus Consolidam regiam inscribit, Violamque purpuream, simulque elegantissimā, Martiam æmulantem cognominat, testaturque Germanos Calcar equitis [Kittersporn] quòd formā calcar referre videatur, vocasse. Esse præterea, qui Hyacinthum, qui Vaccinium [quod libens non sine errore admittit] appellant: Orthonem Brunfelsium suspicatum esse hanc Ægyptopa esse Dioscoridis &c.

Fuchsius inter Anthemides seu Chamæmela hanc reponit, speciemque tertiam Chamæmeli constituit: Reprehenditur autem à Dodonæo, qui eam pingit in Histor. gall. hoc titulo: Buccinum, Consolida royale sauuage. In Hist. de florib. & in fol. hac inscriptione: Flos regius siluestris: Postea verò nominat Delphinium alterum. Lobel. in Obs. p. 426. & Icon. Plant. p. 739. figuram habet hoc titulo: Segetū Consolida regia strigosior tota. Gesn. hort. Consolida regalis silvestre genus in aruis nascens flore cæruleo. Consolida regalis Brunfels. Camer. in Epit. & Histor. germ. Matthioli. Bidem in hort. Consolida regalis, siue flos cæruleo minore. Consolida regalis aruensis Tabern. Icon. & Hist. Consolida regalis 3, siue aruensis flore cæruleo minore C.B. phyt. Cæsalp. Floris vulgò dicti in Etruria Capucio alterum genus: Delphinium minus Dioscoridis. Clus. Delphinium siue Consolida regalis vulgaris in ramos latè sparsa, passim inter legetes spontè nascens, cærulei coloris elegantis flore.

CONSOLIDA REGALIS ERECTIOR, purpureo, siue violaceo flore maiore.



Hæc Consolida differt à vulgari cærulea flore maiore, non enim ita ramosa, sed erectior multò. Color omnino differens: est enim purpureus, siue violaceus.

Huius, ni fallimur, meminit Cæsalpinus his verbis. Flos quidam vulgò in Etruria Fior Capucio ob coloris gratiā quæ etiam arc-

factis seruatur: expetitur in coronas: *caulis* est cubitalis, rectus, paucis ramis rectis: *foliis* numerosis, in angusta, & oblonga folia diuisis, Fœniculò proximis: *flores* circa summas virgulas ini-

tiò antequam dehiscant, effigie Delphino-
ridis: procedente tempore explicati, colorem purpureum elegantem contrahunt, tendentem ad cæruleum, à tergo caudari: *foliorum* in his est quoddam implicatum, quod in albo characteres habet occultatos [de eo iam antè C. Bauhinus ex Plinii lib. 21. cap. 11] ex virgulis cæruleis duas lateras exprimentes, A. I. aut tres, A. I. A. Siliquam fert oblongam, nigram, *seminibus* nigris, vt Melanthii, sapore ingrato, amaro: colitur in hortis inter coronarias, quamuis & spontè proueniat in aruis. Recensetur à quibusdam non sine probabili ratione inter genera Cumini siluestris: ipse non dubito hunc florem inter coronarios habitum apud Antiquos sub nomine Hyacinthi, quem Poetæ fabulantur ex Aiæis cruore ortum.

Consolida regalis, siue Flos regius maior flore purpureo (vt testantur Camer. hort. & C. Bauh.) hoc habet peculiare, quod folium corniculò annexum si pandatur A. I. A. I. A. literas inscriptas ostendat, vnde Cæsalpino Hyacinthus poetarum habetur, de quo Ouidius in Metamorphosi:

Ipse suus generis solus inscribit & A. I. A. I.
Flos habet inscriptū f. ne sitaque litera ducta est.

Itemque Theocritus Idyll. 19.

Nunc Hyacinthe sonet tua litera, scilicet A. I. A. I.
Nec tamen hoc satis est, A. I. A. I. plus ergo loquatur:
Literulaeque velis foliis inscribere plures.

CONSOLIDA REGALIS ERECTIOR, flore purpureo siue violaceo pleno.



Sesquicubitalibus caulis adolefcit, erectis, tantillum hirsutis, *foliis* circumscriptio tota, paulo duabus vinciis maior, segnentis fissi crebris, breuib, angustis: *flores* ordine sesquipalmari digesti, pediculis hærent femuncialibus, hirsutis, Buccinum, antequam aperiantur, effigiantes, qui explicati, multiplici conspiciuntur foliorum fœturâ pleni, colore pur-

pureo violaceo hilariori, apicibus luteis medium obsidentibus luteis, calcar longum: sequitur corniculum hirsutum, plerumque sine femine.

CONSOLIDA REGALIS MAXIMA villosa.

Caule est longo, crasso, cōtortio, admodum villosa: *folia* ferè palmū longa, pilosa, multifida, segmentis latis, non multò Peucedani foliorum segmentis angustioribus, pediculi per totum ferè caulem ramoque, sursum reflexi, palmares, & minores, altioribus semper brevioribus, villosis, non sine oblongis quibusdam vehut



CONSOLIDA REGALIS PEREGRINA
paruo flore.

Descriptio



ut sculis laciniatis, alia verò per ramos aut par-
cibus secta, aut omnino integra: flores strigosa
illius aruenfis pates, corniculati, caerulei, alter-
natim surgentes spicam efformant, quibus exeu-
sis, singulis terna succedunt erecta simulque iun-
cta cornicula semine facta.

Consolida regalis quam peregrinam voco
missa fuit fratri C. Bauhino (qui eam describit,
vocatque Consolidam regalem 5. in phyt. 2. apud
Marth. flore paruo,) Neapoli cum hac inscriptio-
ne à Ferd. Imperato. Delphinium Dioscoridis
mea opinione. Hæc Consolida flores habet cæ-
ruleos, similes minori Consolidæ. Et hanc a-
luit etiam hortus D. Iacobi Zvvingeri Basileæ,
qui mihi, pro singulari in me beneuolentia, eam
quoque communicauit.

foliorum ligulis:
flor. vnique pe-
diculo insidet v-
nicus, magnus,
candidus, quorū
calcar & folia ex-
tima foris, tomē-
tosa sunt, & viro-
re quodam varie-
gata: cornicula,
quæ succedunt,
densissimo villo
sunt obrita: Vnde
hanc nacti sumus
non recordamur.

CONSOLIDÆ REGALIS SPECIES ALIÆ.

Præter recensitas Consolidæ Regalis species
habemus Montbelgardi in horto Ill. E.C.W.
& alias: vt pote: Consolidam regalem mino-
rem, flore bicolore, caeruleo & albo. Consoli-
dam regalem minorem flore pleno, albo & cæ-
ruleo: cuius hic iconem damus. Consolidam



regalem flore
maiore dilute
purpureo, la-
bello striato.
Consolidam re-
galem ramosi-
orem, flore ma-
iore, caeruleo &
albo. Atque Co-
solidam regalē
erectiorem flo-
re incarnato
pleno: quarum
Consolidæ re-
galis varietatū
descriptiones,
breuitati studē-
tes, exhibendas
non ducimus.

Traditis Co-
solidæ regie
speciebus, reli-
quum est, vt vi-
res breuiter
perstringamus.

Flores itaque sicut & aqua eius destillata ad cali-
liginem oculorum ferè adhibentur: tradunt e-
tiam aquam quasuis inflammationes internas &
externas iuuare potu & impositu: Auctor Tra-
gus. Chirugi, teste Marthiolo, in porionibus
vulnerariis vtuntur, consolidat enim & glutinat,
vnde & Consolidæ nomen est adepta: herba in-
puluerem redacta, cum eiusdem aqua stillatitia,
pota confert cardiacæ, quam Germani Sode
vocant, calorem præter naturam extinguit, bi-
lem exæstuantem reprimat, nec non tussim &
stillecidium, aduersatur venenis: succus ex in-
tegra planta expressus, recentia vulnera sanat:
flores continuo intuitu visum corroborant, vnde
quidam fasciculos in conclauibus suspendunt in
eum vsu. Idem contusi ex aqua rosacea, illitu
oculorum calores & rubores tollunt. Semen,
scribit Camerarius, aut succus plantæ expressus
vermiculos putridorum vlcum profligat: quæ
ille ex Lobelio Observationibus videtur mutua-
tus, à Lobelio, vt apparet, Sophiæ Chirurgorū
attributa, non Consolidæ regali proximè eam
sequenti. In coronas hodie ab amasiis pluri-
bus in locis expetitur. Conseruam & è floribus
parari tradit Tabernamontanus, quam commen-
dat ad tormina infantium, Auellanz nucis ma-
gnitudine sumptam: Castaneæ verò ad cardiac-
giam. Cæterum, miscet Tabernamontanus non
absque graui, meâ quidem sententiâ, errore, vi-
res Consolidæ regalis & Cumini siue stris secūdi
Dioscoridis, quod idem simplex sibi falsè imagi-
natur.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXVII



VMBELLIFERAE.



VTINAM benigna rerum parens natura quamque stirpium classem tam claro & insigni donasset
cecu communis generis societasque signo atque vexillo, quali umbelliferas deinceps producendas di-
latavit; non profecto tantopere in classibus instruendis & heris secundis laboraremus. quamquam mi-
nima eriam similitudo non raro in hoc genere exercitatur; istum quemque fallere queat. Umbellam
dicimus in plantis, floris seminisve veluti pedamentum, in plures diversum longiores pediculos: qui
simil ex fastigio eodem orti, in latius continuè radiantur: singuli que florem vel semen sustinent
in orbem circumactum, quâ floris figurâ Fœniculum, Anisum, Seseli, Daucus, & cetera pleraque id
genus sunt: quod quoniam umbella, quâ solem à vultu mulieres arcere, formâ est, ob latitudinem circumscriptionemque
suam ideo umbella, hâcque decorata planta, umbellifera dicuntur.

FOENICVLVM SIVE MARATHRVN VETERIBVS.

CAPUT I.



THEOPHRASTVS inter olera
recenset, & suffrutices feru-
laceos Fœniculum, eique
caulem nervosum, ac semen
nudum & suaveolens [Dios-
cor.] attribuit. Dioscorides
Fœniculum [Μαράθριν] tan-
quam notissimum non de-
scribit. Herba huius, inquit,

si edatur, mammas lacte replet, idem verò potest
semen epotum, aut cum ptisana decoctum. Cômæ
autem decoctum bibitum [Cœt. in vulg. exempl.
impositum legitur, sed legendum modo, Corn.] renum ac
vesicæ vitis [nois vespermois] est utile, quippe quòd
utinam excieat. Convenit & à serpente demorsis,
in vino bibitum, ac menses quoque ciet. In febril-
bus nauleam & stomachi ardorem [additur in vetus-
to Lacuna codice &, ad d. rem] sedat, ex aqua frigida po-
tum. Contrita verò radices, & cum melle imposi-
ta canum moribus medentur. Succus è caulibus
& foliis expressus, & in Sole siccatus, oculorum
medicamentis utiliter additur, quæ ad aciem visus
excitandam reficiendamve præparantur. Extrahit-
ur & ad eadem valens è recenti femine succus unâ
cum foliis atque ramulis. Radicibus præterea pri-
mâ germinatione succus eodem modo exprimitur.
Porro in Iberia quæ ad Occidentem spectat, liquo-
rem vetiam reddit Fœniculum, gummi similem. Cau-
lem verò medium dum floret herba demetunt in-
digene, ignique admovent, quòd facilius vi caloris
Tom. III.

velut exudans gummi remittat. Id autem est succo
ipso efficacius ad oculorum medicamenta.

Si secundis fœmina liberari nequeat, Fœniculum secundum
ex vino & oleo, & melle fervefactum potui exhibe-
re jubet Hippocrates. Idem etiam, si lac extinctum
fuerit, Fœniculi semen & radices decorticas, si-
mulque butyrum decoquit, cum verò decocta fue-
rint, refrigerata bibenda propinat. Cum autem e-
moti & facile solubiles uteri fuerint, radices Fœni-
culi probè lavat, contundit, in ollam ad usum para-
tam immittit, & aquâ affusâ fomentum parat, &
admovent. Ex dictis itaque patet, nullo modo to-
lerandum esse errorem Bald. Ronsei, qui pro Fœni-
culi vino, oleo, ac melle fervefacti decocto, oleum
sublimationis Fœniculi siliqui aut drachmæ ponde-
re bibendum præbet. Ego tam calidi olei vix scru-
pulum propinandum suaderem.

Fœniculum, inquit Plinius, ferulacei generis est; ^{Plin. angu-}
anguibus gratissimum [hic fortè deest syllaba, &] ad ^{buss. gram.}
plurima condienda cum inaruit. Ei perquam simi-
lis Thapsia. Item, Fœniculum nobilitare serpen-
tes, gustatu ut diximus, senectam exeundo, oculo-
rumque aciem succo ejus reficiendo. Vnde intel-
lectum est hominum quoque caliginem præcipuè re-
levare. Colligitur hic caule turgescente. In Sole sic-
catur. Inungitur ex melle. Vbi que hoc est. Lauda-
tissimum tamen in Iberia è lacrymis fit, & ex femine
recenti. Fit etiam è radicibus primâ germinatione
incisis. Dixerat autem de serpentibus l. 8. c. 27. An-
guis hyberno tempore membranâ corpori obdu-
A

HISTORIAE PLANTARVM

Atq; Fœniculi succo impedimentum illud exiit, nitidusque vernat. Et paulò post: Idem hyberna latera visu obfcurato, Marathro herbæ fese affricans, oculos in ungit ac refouet.

Nicanor. Sed hæc, quæ de Fœniculo Plinius habet, Nicanro debet. Sic enim apud Poëtam legimus.

Τὴν ὅτι ἀνάλεινον κολλῶν ἀπεδύσατο τῶν ὀφθ. αὐτῶν
Μόλις ἐπιτερεῖται ὅτε φάλαγγ' ἐπ' αὐτῶν.
Ὅν μαρτυροῦν ἀνὰ φάλαγγ' αὐτῶν ὅτι ἐν τῇ
Βασανίτις ἀνάλειται ὅτι ἀνάλειται τῇ πύλῃ.

Cordus:

Dum tepido sub vere suum modo liquerit antrum,
Et caligante suo male cernit lumine, sed cui
Arrosus mox Fœniculi sua robora caulis
Atque novum reddit, qualis fuit ante, vigorem.

Quorum sensus hic est. Quo tempore relicta arefcentium squamarum senectute torpidus & fœgnis ingrediens, vernaque tempestate cavum suum fugiens, hebetibus oculis cæcutit: veram depastus Fœniculi comosus ramus celerem & claræ lucis eum efficit.

Medicinz in sativo [*sic. Fœniculo*] pergit Plinius, ad scorpionum ictus, & serpentium, semine in vino poto. Succus & auribus infillatur, vermiculofque in his necat. Ipsum condimentis prope omnibus inferitur: oxyporis etiam aptissimè quin & panis crustis subditur. Semen stomachum dissolutum adstringit, vel in febris sumptum, nauseam ex aqua tritum sedat, pulmonibus & jecinoribus aptissimum. Ventrem sistit cum modicè sumitur, urinam exciet, & tormina mitigat decoctum, in lactisque defectu potum, maramas replet, radice cum ptisana

*Antrum
Germis.*

Oxyporum

Tormina.

*Obstru-
tio-
nes.*

Tumores.

Calculus.

Galenus.

*Temper-
amentum.*

*Sativus
tempus.*

sumpta. Renes purgat, sive decocto, sive semine sumpto. Prodest & hydropicis radix ex vino cocta: item convulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus ex aceto. Calculos vesicæ pellunt, genituræ abundantiam quoquo modo haustum facit. Verendum amississimum, sive ad fovendum radice cum vino cocta, sive contrita in oleo, illitum. Multi tumoribus & fugillatis cum cera illinunt. Radicis succo, vel eum melle contra canis morsum untuntur & contra multipedem ex vino.

Galenus Fœniculi facultates distinctis explicat, à Dioscoride tamen non dissentiit. Fœniculum, inquit, tam valenter exalfacit, ut ex tertio ordine exalfacientium censeri possit, desiccatur verò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit, quare lac procreat, quod si admodum desiccaret, non sanè efficeret, suffusus eadem ratione auxiliatur, urinas, mensèque ciet. Hæc Galenus.

Fœniculum nobilitavere & homines toto anno quondam viridi, sicco, servatq; sale, totaque mensa non ut nostra ætate sit in secunda & ad augendam situm tantum, nec semine solum, sed comâ & caulibus utentes.

Mense Februarii Fœniculum ferere præcipit Paladius, loco aprico & modicè saxoso.

FOENICVLVM SILVESTRE, SIVE

Hippomarathrum, duplex, semine cachry simili, & rotundo, veteribus.

Disc.

Vires.

Πενταδάκτυλον, quod Μαρίαννον est ἄρσεν, inquit Dioscorides (apud quem inter notha aliqui Marathim vocant, Ægyptijs ἀμύμον, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculum erraticum, seu equin: m. aliqui Menm, Galli Systrameor.) fert semen Cachry simile, radix subest odorata, quæ pota urinæ stillicidium sanat. Eadem apposita menses ducit. Semen autem aut radix alvum sistunt potu. Auxiliantur etiam commotis à bestis venenatis, & calculos atterunt & mor-

bum regium depurgant. Ac foliorum decoctum potum lac attrahit, & mulieres à partu purgat. Vocatur & alterum Hippomarathrum, quod folia habet angusta, parva, oblonga: semen autem rotundum, ad Coriandri semen accedens, acre, odoratum, calfaciendi vi præditum. Facultas huius Hippomarathri superiori respondet, sed efficacità debiliore.

Porrò est & alterum Fœniculum Galeno, quod præ magnitudine Hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domesticum, desiccandi vim obtinet: quocirca ventrem quoque eo nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius non radix modo, sed & semen cachry affimile est, potèstque & calculos frangere, & auriginosos sanare, mensesque & urinas movere, non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est Hippomarathrum, cuius semen rotundum est & acre, simile semini Coriandri, facultate quidem Hippomarathro simile, sed debilius. Hæc Galenus, qui dubitare videatur, quomodo ventrem sistat Hippomarathrum, cum manifesta ei adstrictio inesse non videatur, & causam attribuire desiccandi vi: ego autem alvum sistere existimo propter vim diureticam: dixit enim ante Dioscorides, radicem potam urinæ stillicidium [*σπυρροειδῶν*] sanare. Copiosas autem urinas alvum sistere docet, Hipp. aph. 83, sect. 4. ubi ait. ὁρῶντες νύκτας πολλὰν ποιεῖν οὐκ ἐστὶν πλὴν ὁρῶντες οὐκ ἐστὶν. Vnde etiam Galenus dicit in comm. In quibus enim supra modum humida alvus deprehenditur, iis potum minorem exhibemus, ac præterea illi viam ad vesicam parabimus.

De hoc Fœniculo silvestri hæc Plinius tradit. Est in hoc genere [*Fœniculum*] silvestre, quod alij Hippomarathrum, alij Myrsineum vocant foliis majoribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. Nasctur in calidis, sed saxosis. Diocles & alij Hippomarathri genus tradit, longo & angusto folio, semine Coriandri. Hippomarathrum ad omnia vehementius [*quàm Fœniculum*] calculos præcipuè pellit. Prodest vesicæ cum vino leni, & sceminarum menstruis hærentibus. Efficacius in eo semen quàm radix. Petridius, qui ophiaca scripsit, & Michon (alij Micon legunt) qui Rhizotomumena, adversus serpentes nihil Hippomarathro efficacius putavere. Sanè & Nicanor non in novissimis posuit.

Silvestre Fœniculum semen ferens ut Cachry (inquit l. 3, c. 48. Ruell.) est tantæ amplitudinis in Mauritania ut caulis duodecim cubitis assurgat, crassitudine palmarum quatuor. Officinæ nominant agreste Fœniculum, sativo procerius, brachiali crassamento, foliis etiamnum majoribus, semine miliaceo, radice albâ, odoratâ.


Cæterum, non amplius esse notum, quàm nomine Fœniculi silvestris, tum officinis, tum nostris, utrumque Hippomarathrum testatur Cornarius.

FOENICVLVM VVLGARE MINVS,

acriore & nigriori semine.

INTER Fœniculi genera, quod vulgatius est, ex radice digitali, aut majore si ramosior fuerit, rectâ, albâ, sapore cum quadam dulcedine aromatico, caulibus surgit tres aut quatuor cubitos altus, rectus, striatus, geniculatus, atroviens, fungosâ albâ medullâ farctus, crebris alis concavus: pediculi ceu vaginâ caulem & ramos complectuntur, quibus folia insident in longa tenuissima filamenta dissecta, atrovirentia, sapore dulci,

LIBER XXVII



dulci, odore suavi:
umbellæ florum late-
tæ, luteæ, odoratæ.
femen oblongum,
Anisi, nigricans,
gracilius, sapore ac-
riori, minus dul-
ci.

Ruellius de quo
Foeniculo loquitur
l. 4. c. 48. minus pa-
tet. Nec inibi de-
monstrat, an de
vulgari, vel dulci
scribat. Vulgare
hoc, Foeniculi no-
men apud plerosq;
herbarios retinuit;
apud Angul. ep. 7.
Foeniculi fortis sive
acris; apud Gesn.
hor. Foeniculi com-
munis; apud Ta-
bern. in hist. (ubi pro Foeniculo hoc vulgari ponit
figuram, quæ in Icon. polita nomine Foeniculi Ro-
mani sive dulcis) Ger. & Lugdun. p. 699. Foeniculi
vulgaris; apud Lob. in Adv. & Icon. Foeniculi sive
Marathi vulgarioris; apud Casalp. Foeniculi sil-
vestris semine exiliori & acriori; apud Bauh. phyt.
Foeniculi 2. sive vulgaris; apud eundem apud Matth.
Foeniculi fativi minoris vulgati, quibusdam Hippo-
marathi dicti. In pin. Foeniculum vulgare duplex
facit, scilicet Germanicum & Italicum. I. est Foe-
niculum, Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. Turn. Cord. in
Diosc. & Tab. commune, Gesn. h. vulgare, Ger.
quibusdam Hippomarathrum putatum, Camer. h.
Huic accedit Mediolanense, quamvis vulgato ger-
manico gratius sit. Variat foliorum colore: nam
commune foliis est virentioribus; alterum subni-
gricantibus, rubentibus, aliis non differens: quare
Foeniculum 1. & 2. facit Dodonæus. Foenicu-
lum 2. sive vulgare Italicum semine oblongo, gustu
acuto: Foeniculum, Matth. Lac. Cast. vulgare semi-
ne pallido sive luteo oblongo, Lugd. Foeniculum
acris, Aug. Eid. B. in pin. Foeniculum 5. sylvestre:
Foenic. erraticum, Matth. Lac. sponte virens in agris
Narbonensium. Est hoc Foeniculum Lobelio &
nobis à vulgari non diversum. Præterea Matthio-
lus suo more quæ non vixit dicit omnibus nota, ut
notum in omnibus Hetruria Foeniculum erraticum:
interea non demonstrat an per id intelligat
nostrum vulgare, semine amaricante, spontaneum:
nec an sit Dioscoridis sylvestre.

Græcis Μαράθῃ dicitur, Actuatio Μαράθῃ &
Μαράθῃσιμον; Latin. Marathrum & Foeniculum
& officinis sine diphthongo Feniculum; Serapio-
ni Raienegi; Averrh. Halcaleg; Avicenn. Baralme;
Alfaharavie, Rafinagi & Razynog; aliis Arabibus Ra-
cinigi & Rafcenegi: cortex radicis, Cocior Atala Ra-
scenegi. Semen Bizeri Atafgenti. Basara, Affigenti,
& Deser Rafina. Germanis Fencel: Belg. Vencel:
Gall. Fenoiel & Fenouil: Ital. Finocchio & Fenocchio: Hi-
span. Hinoio & Imoio: Lusit. Fincho & Finchio: Per-
sis Berafme: Angl. fenel & fenel: Bohem. Vla-
stkyopr & Ropr vlafy: Polon. Wlostrifopr: Hun-
gar. Kómeny: Cretensib. Marathra. Μαράθῃ au-
tem Græcis, ἀπὸ τοῦ μαράθῃσιμον, à marcescendo di-
ctum putatur, quod ejus cum inaruerit, multus
sit usus ad condienda plurima. Foeniculum autem
à Latinis, quod satum magno cum sœnore semen
reddat; vel potius Græcorum imitatione Fœnicu-
lum dictum, quod quasi sœnum in hyemes arefa-
ctum & marcidum reponatur.

Tom. III.

Foeniculum vulgare semine minori, acriori &
nigriori Monspelij & Lugduni sponte passim pro-
venire observavi; Geneva in hortis folia Hiemem
perferre; Basileæ adhuc Octobri florere; Mont-
belgardi in horto E. C. ubi à me satum primo an-
no non fert caulem, altero verò floret Julio.
Ex semine deciduo multum se propagat. Nasci-
tur locis calidis & saxosis, qualis est Monspe-
lium & Lugdunum, juxta muros meridianos.
Radix vivax est & in plures annos durat. Vere
erumpunt folia, deinde caulis assurgit, sequuntur
cum floribus muscaria. semen sub finem Augusti
ac Autumno perficitur.

Foeniculi semen per se mansum aut saccharo con-
ditum, & continuo sumptum, lentam pituitam
incidit, inquit Tragus, & excreabilem facit. Ad
caliginosos oculos nihil efficacius hoc semine. At
qua fœniculi distillata manè & vesperi oculis in-
dita, caligines eorum discutit, auribus instillata
vermes enecat. Easdem facultates obtinet luci-
cus expressus, & lachryma, seu, ut vocant, gum-
mi Foeniculi. Cæterum, ut refert Dodonæus, Gummi.
Foeniculi vulgaris semen quidem calidum est se-
cundo, siccum verò primo ordine. Ventricu-
lum assumptum roborat, nauseam sedat, tormi-
na mitigat, flatus discutit: In vino potum ad
serpentem & scorpionum ictus ac morsus valet.
cum saccharo pulvis hujus jejuno ventriculo
assumptus, aciem oculorum conservat: lac quo-
que nutritibus auget. quod & ipsius herbæ suc-
cus efficaciter præstat, tum & ipsa comesta ac in
olere sumpta, quæ minus calida ipso semine. Vi-
tilis verò renibus ac vesicæ, urinam cit & calcu-
los expellit. Radices ad eadem valent, & po-
tentiores, utpotè calidiores: proinde non mo-
dò urinam provocant, sed & hepatis ac quoque
lienis infarctus expediunt, & viscera ab obstru-
ctione liberant: menses quoque promonent. Fo-
sardum.

runtur eadem cum melle contritæ canum morbi-
bus mederi imposita. Ipse Fœniculus (inquit
Americ. Vesp. in præfat. suar. navig.) prius sum-
ptus, esculentis odorem dare & meliorem dige-
stionem facere assuevit. Fœniculi saccharo conditi
semine, vel Zircibere cocto, vel aliquo alio simili
dissipantur flatu. Quod si semen Fœniculi ace-
to insandas, exsiccet, & Cinnamomi tantundem
addas addito saccharo parti semi unius, sumen-
do de hoc fit mirabile in præservando visum & de-
bilitatem reformando & in oculis octuagenarii
jam obtenebrato visu, ut incredibile visum sit
Arnoldo de Villa nova. Galenus, Paulus & alij Antiqui.
Fœniculum statuant calidum in tertio gradu & sic-
cum in primo. Verum si rempenitus examina-
mus, comperimus (inquit Tabern.) esse calidum in
secundo & siccum in primo ordine cum nonnulla
adstrictione. quare aperit, discutit, & resolvit. Ho-
die non solum in Medicina expetitur, verum etiam
in culina. Coqui & diligentiores matres familias
variè ad usum præparant. Nonnullæ tenellis surculis
vescuntur surculis cum sale ad carnes & assatu-
ras. Nonnullæ miscet cum saccharo: aliæ a-
cetariis imponunt. Quædam hos cum non be-
ne maturo sumine, sale & aceto condiant, & post
annum usurpant. Pices assandi non temerè Fœni-
culo replentur & eo involvuntur. sic namque non assando
solum is gratus sapor conciliatur sed & superflua
humiditas corrigitur, & sic salubriores redduntur.
Quare ij quoque consultum faciunt, qui pices cum
Fœniculo in jure decoquunt. Hoc siquidem non
tantum eorum humiditatem consumit, verum etiam
ad concoctionem facit. Roborat enim Fœni-
culum caput, ventriculum, hepar, lienem, renes, ves-
sicam & matricem, viscosos quæ humores digerit. In

HISTORIAE PLANTARVM

Pani semen additur.

Flatus disscutit.

Nephresis.

Macer.

Venenis obstat.

Oculorum morbi.

Hydrops.

Nephresis morbi.

Nausea Feror stomachi.

Oleum.

Tenerem stimulat.

Feniculum saccharatum.

Vertigo.

Halitus ferrent.

Compositio- nes e Feniculo.

eundem usum tam comæ Feniculi, quàm etiam radix in cibos additur, & semen in panem. Hoc pulverisatum, è vino potum, flatus discutit ventriculi & intestinorum. unde verticulus rhythmicus, Semen Feniculi referat spiracula cult.

Succus è radice recenter expressus, unciam trium pondere potus cum vini generosi uncia una, nephriticis mirè subvenit. De Feniculo huac in modum cecinit Macer Æmilus:

Feniculum Medici calidum siccumque secundo Dicunt esse gradu, Marathrum Græci vocat illud: Cum vino unctus obstat hac herba venenis, Hæc mansâ serpens oculis caligine purgat, Indèque comperit unum esse humanis posse mederi Illam luminibus, atque experiendo probatur. Radici succus mixtus cum melle recenti,

Pulsâ reddit eos omni caligine claros Expressus Marathri viridi de semine succus Solèque siccatus, magnam medicamen habetur, A quævisque velis oculorum pellere morbos.

Auribus infusus vermes succus necat eius: Renibus in prîsana radice decocta medetur, Cum vino fugat hydropicus potata tumores, Stique venenatis obstat morbis illa,

Sic quoque pulmonis obstat, sicorisque querelis, Et sic nutriti sumpti a sit copia lactis. Cum vinum, vel aqua radice coctio sumpta Nephreticis, & vesica morbis medicatur,

Vrinæ purgat, & menstrua sumpta a resolvit: Vel si trita a super pectus hac herba ligetur, Nausea cum vino sumpta sedabitur illa:

Fervorem stomachi cum vino hæc mitigat hausta. Radix illius vino decocta dolores Fomento curat: patitur quos virga virilis Hoc quoque, si singas oleo, facit, bœque perungas Ictus, vel sacros subito quosunque tumores, Apponas tritam unctio sedabit aceto.

Semen cum vino bibitur, teneri movet actus, Hoc modo lateris diris sedare dolores Dicunt, aut herba si sit decoctio sumpta Tradunt autores, eius iuvensescere gustu Serpentes, & ob hæc semibus prodesse putatur. Idem hoc testatur Serenus, dicens:

Si tenebras oculis obducit pigra senectus, Expressæ Marathro gutta cum melle liquenti Detergere malum poterunt.

Et hæc sunt & plura alia, quæ in longum recenset

Tabernomontanus, qui præterea Feniculi saccharati, seu Feniculi saccharo obducti meminit, quod commendat ad jam dictos affectus, (cilicet caliginem oculorum, dolores capitis; ad memoriam

juvandam, vertiginem abigendam, lac & sermen augendum, ad obstructions referandas, tussim sedandam, & dolores nephriticos curandos, corrigendumque ærem malignum, & ad halitus ferrentem, nauseam, & similes morbos. Sed & vi-

num feniculatum, Mullam, sive Aquam mullam Feniculi: Item Feniculi decoctionis aquam, Feniculi succum exsiccatum, Feniculi extractum, radices syrupum, & Syrupum extractionis Feniculi, radicem conditam, Feniculi falem, & oleum stillatium chymicâ arte extractum, ad omnes prædictos morbos.

FOENICVLVM VVLGARI simile, dulce.

THOMAS Platerus egregius Medicinæ candidatus misticanno 1595. semen cum hac inscriptione. Feniculum dulce instar sacchari, cujus semen non differt à vulgari, nisi sapore dulci & grato; multò tamen minus & nigrus quàm id, quod

Florentinum dulce cognominatur. Satum Aprili multoties provenit & floruit in horto E.C. Montbelgardii.

FOENICVLVM DVLCE, MAIORE & albo semine.



FOENICVLVM dulce. Fœce, eodem anno, quo satum est, semen proferens maturum, à vulgato radicibus, foliis, caulibus, & flore vix differe videtur, nisi fortè caule minus procerò & graciliore ac foliis minoribus. semina quidem multò sunt maiora, striata, albidâ, dulciâ, minus acriâ: cæterùm, si quando Hiemem apud nos perfert, & aliquot annis durat, videtur amittere dulcedi-

dem, & de albedine ac magnitudine minui. Icon præsens exhibet huius Feniculi semen dulce majus, & vulgare minus: utemque rotundius.

Rationes porò quæ me movent, ut potius hoc Dioscoridis sentiam Marathrum, quàm vulgatiùs, sunt hæc. Primò quod lætatur & non nisi cultum proveniat, ut etiam ostendit colendum Palladius, & sativum vocat Plinius. Secundo quòd semen huius multò dulcius & minus acre sit, quàm illius. Tertiò quòd minus procerum, & folia minora conspiciantur. His adde locum, unde deferri dicitur.

Geln. h. dicitur Feniculum dulce, vel Florentinum æstivum. Math. Feniculum sativum, sive domesticum in Hetruria notum. In epit. cum addit. Camer. Feniculi quoddam genus dulciori & crassiori semine. Cam. apud Math. german. de hoc ait: Feniculum Italicum, Welcher Fenchel / Feniculum dulce, fortassis hortense veterum: in nostris hortis cultum, non diu reservat naturam suam, verùm uti sæpiùs expertus sum, solet postremò, nostro iterum simile evadere.

Casalp. sanè à nostra opinione alienus non est. Feniculum hortense, inquit, caule cubitali: constat, & paulò altiori, refo: umbellas fert latas; semen crassum, in rotunditate oblongum, candidum, sapore subacri, aromatico: feritur in hortis pro condimentis & obolus: sed anno secundo transit in silvestre. Feniculum hortense Dioscorides Marathron vocat, Theophrastus Feniculum inter olera, Plinius Feniculum à serpentibus nobilitatur.

Lugd. p. 689. Feniculum dulce vocat (ut & An. Tab. guill. epist. 7.) describit, sed non pingit. Tab. quàm posuit figuram in hist. pro Feniculo vulgari, in Iconit pro dulci, quod Feniculum Romanum, & Feniculum Florentinum, Ital. Fin. ichu dulce, German. Süßen Fenchel / Römischen Fenchel & Florentinischen Fenchel / propter dulcedinem quam habet ex cultura Romæ & Florentiæ, cognominari ait.

Bauh. phyt. Feniculum l. sive dulce, caule vulgari breviori, semine maiore albidò, foliis & semine dulcoribus. Apud Math. Feniculum sativum semine maiore albidum, verum Feniculum credi-

LIBER XXVII

creditum, magis dulcescens, sæpius hortense, secundo anno in silvestre transeunt, quod in incultis montosis femine exiliori, radice crassiore nascitur: Eid. pin. Fœniculum 3. dulce, ut & Matth. Lac. Ang. Gesn. h. Lob. adv. Cast. Ger. desc. Fœniculum 3. Dod. solo sapore à primo distinctum. Fœniculum sive Marathrum vulgatus dulce, Lob. Fœnic. hortense femine crasso in rotunditate oblongo, Cæs. quod anno secundo in silvestre transit. Fœnic. dulci femine majore, gustu anisi, Lugd. Fœnic. Romanum femine pallide luteo, Tabern. quod tertio anno in commune transit. Fœnic. majus, Cam. h. Hoc femine est vel rotundior, quod Romanum & Florentinum dicitur: vel in rotunditate oblongo, quod omnium dulcissimum & gratissimum, & Bononia additur. Hæc frater. Mihi Fœniculum dulce, quod veterum existimo, non videtur simpliciter apud Herbarios Fœniculum vocari.

Fœniculum dulce Montbelgardi in horto E.C. ex facione provenit, quod Lugduno allatum erat. eodem anno caulem fert & semen: interdum etiam perfert Hiemem non perinde tamen ut vulgatus, nec perinde frequens feritur, utpote femine è Græcia aut Syria allato, teste Lobelio. Basileæ in horto patris habui femine maturo Augusto.

Quia porro Fœniculum hoc à veteribus descriptum esse credimus, idè ei quoque vires ab ipsis Fœniculo attributas convenire dicimus. Illas etiam huic adscribimus, quæ recentiores vulgari proprias faciunt.

FOENICVLVM ROTVNDIORI

femine, quibusdam Hippomarathrum.

Hippomarathi ab antiquis prodiit silvestris, femine præsertim à vulgari sponte virente diverso, plantam, quæ aptè respondeat, similem equidem habemus (inquiunt auctores Adversariorum) nullam, qualem Guiliel. Drelich probus & peritus Pharmacopæus aluit superioribus annis Antuerpiæ, procerum, prægrandeq; Fœniculum, communi simile: caule ternum, quaternumve cubitorum, foliis brevioribus, aliquanto rigidioribus, albicantibus Corridæ. Semen par, aut paulò minus altero [dulci] rotundius, & Aniso propius. Isti Hippomarathi nomen fecerunt.

An B. pin. Fœniculum 3. dulce, femine rotundior: de hoc vide in tituli præcedentis synonymis.



Tom. III.

FOENICVLVM
rotundum flo-
re albo.

Radice nititur fibrosa, exili: caule minori & breviori: foliis latioribus ac etiam brevioribus, quam vulgari Fœniculi: umbella alba, rotunda, primo anno flores & semē ferens, minus quam vulgare Fœniculum, sublongum, & rotundum. Plantæ gustus & odor vulgari similis. Si semen hujus stir-

pis in Autumno terræ mandas, evadet tota plantâ procerior & efficacior, quandoquidem Hiemem facile perfert.

Tabern. descriptionis auctor; inscribit Fœniculum rotundum, propter semen oblongum & rotundum, quo à vulgari differt scribit. Mirari eum subit, cur locum, in quo hoc viderit, vel unde habuerit, non indicet.

B. pin. Fœniculum 4. femine rotundo minore: *Synon.* Fœnic. rotundum vulgare, Ger. ic.

A vulgato sapore & odore non differt, sed humilior est, umbella candida; semenque vulgari minus & Carui formâ.

FOENICVLVM MAGNVVM,

sive Hippomarathrum.

ACCIPIMUS
à Casabona
anno 1594. Hip-
pomarathi ex Cæ-
dia titulo, pulchrū
semen album; du-
plex, cōpressum,
latum, oblongum
in quo tres costæ.
differt à nostra Li-
banoide cachry:
ophora dicta, q̃
illi femina crassa,
turgidæ & non
lata.

Consideradum
an de hac planta
hæc scribat Bellus
in epit. ad Clu-
sium. Hippoma-
rathrum folia te-
nuia, Fœniculo

quodammodo similia, profert, caulem lævem, duos aut tres cubitos longum, minimi digiti crassitudine, geniculatum: florem luteum in umbellis, ut Anethum, femina magna, Cachry similia: radice nititur firmâ, magnâ, odoratâ. Vocatur *μαρμαρινον*, quod latum Cuminum sonat. Hujus semen vulgariter à mulieribus coquitur in lixivio ad capillos aureo colore tingendos.

*Platycmi-
num
latum & tū-
mescens.*

C.B. in prod. Hippomarathi Cretici nomine ex horto Nicolai Contareni Senatoris Veneti, habet ramos cubitales, rotundos, læves, striatos, pallide virentes, in alios brachiatos: folia Fœniculi modo, in tenuissima, sed longè brevissima segmenta divisa: caulium summitatibus, umbellæ parvæ insident: gustanti plantæ sicca folia & caulem, de sapore nihil certè pronunciare licuit. In pin. vocat Fœniculum 6. Hippomarathrum Creticum.

CHAA, HERBA IAPONIA.

AD Fœniculum reducit C. Bauh. in pin. Chaa, herbam in Iaponia, ex cujus pulvere decoctum preciosum parant, & hospitibus dignioribus propinant: & olla in qua hujus herba decoctio facta, in eo apud ipsos precio habetur, in quo apud nos adamantes sunt: Lin-
scot. part. 2. Ind. or.
cap. 28.

HISTORIAE PLANTARVM

ANETHVM. CAP. II.

Defor.

FOENICULO persimile est, caule fistuloso striato, foliis tenuissimè in capillaria filamenta dissectis, odoratis, sed minùs, quàm Foeniculum, gratis flores in umbella lutei, quibus semina succedunt fœniculacea, latiora, sapore acri, minùs grato etiam, quàm Fœniculi.



Synon.

Anethum Theophrastus inter olea recenset. Hoc nec Dioscorides, nec Plinius describunt, sed ex aliis platis Anetho comparatis faciliè colligitur, eà esse, quæ id nomen in hunc herbarios retinet.

B. pin. Anethū
1. vulgare: Anethū,
Brunf. Matth.

Fuchf. Turn. Dod. Cord. in Diosc. Gefn. h. Ang. Lac. Lob. Cast. Lon. Caf. Lugd. Tab. Cam. & Ger.

Nomina
linguar.

Anethum sunt qui Polgidon sive Polgida, qui Anicetum vel Anicethum vocent: Magi Cynocephali aut Mercurij genituram & Cynocephali capillum, alij Mercurij semen: Aphri Scyriani [Sicilian Tragus] Aegyptij Arachu [Arach. Tab.] Daci Polpum aut Pulpum: Aegineta Enemion: Serapio Xerib: Avert. Scenat. Bellunenſis Alſebat: vetus Avicennæ glossator Namlin vebet, Sebatum, Ieber, Seebet, Sebet, Sebez, Seet, Aneide, Alſebere, Sohar, Serh & Rau Ioan. Bruyerinus Elcarlata & Herba Tolofana: Germani Tillen, Dyllen, Dillenfraut, & Hode: Fraut: Belgæ Dille: Galli Anet & Anere: Itali Aneto: Hispani Eneldo, Aneldo, & Heneldo: Portug. Endros & Endres: Angli Dill: Bohemi Kopzabradnj: Hungari Kapoz: VVal. Poltum & Polpum: Poloni Swoyſz: ftopr [& Anys Tahern. sed quàm bene iudicent alij] Cretenses Agnicho. Nicol. Myreſo caules dicuntur avnðððra: Fuchſius autem per avnðððra intelligit ligulas radices Anethi. Semina dicuntur Arabibus Beſara ſebexi. Avnðay quidem Græcis dictum scribitur avnðððay, quod citò crescat. Alij tamen avnðay, quasi avnðay dictum volunt, quia appetentiam cibi excitet, sed etiam avnðay & congreſſus, & coitio Venerea est, ad quàm lacessit Anethi esus, ut antiqui proderunt: tamen si plurimo usu tandem genituram exhauriat, Dioscoride teste.

Etymon.

Locus &
Tempus.

Anethum in hortis copiosum Geneva, Basileæ, Lugduni, & Montbelgardi, semel satum quotannis semine deciduo se propagat, restibili fecunditate. Sponte interdum nascitur in Anglia & Northmannia. Anethum, ut legimus apud Crescentium, desiderat communem hortorum terram, & ferit mense Februario & Martio, Septembri & Octobri & in locis clementibus etiam mense Decembri per se & cum aliis herbis, omnem cœli statum patitur. Sed in tepidiori lætatur, rariùs feratur, & irrigetur si non pluat. Aliqui semen ejus obruant, opinantes quod ab ave nulla tangatur.

Vires &
V. p.

Aridi Anethi comæ, seminisque decoctum, inquit Dioscorides, potu lac evocat, inflationes ac tormina sedat, alvum vomitioneque lavas sistit, urinas ciet, singultus lenit, oculorum aciem habet & genituram retinquit assidue potum. famini

vulvæ malo opportunis ad defecationes utile. condylomata illius ejus cinis tollit. Oleum sic conficitur. In olei libris octo & dodrante, floris Anethi libras undecim & bessem per diem macerato, deinde manibus exprimito acrecondito. Quod si bis macerare voles, rursus recentem Anethi florem eodem modo inmittito. Potest molliore & aperire uterum. Convenit etiam ad rigores per circuitum repetentes, calefaciens & lassitudines solvens. Est etiam cōmodum ad articulorum dolores. Eadem serè quæ Dioscorides tradit, Plinius etiam habet. Anethum, inquit, ructus movet, & tormina sedat, alvum sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet semen fervens olfactum. Sumptum ex aqua sedat cruditates. Cinis ejus uvam in faucibus levat, oculos & genituram habet. Anethum, auctore Galeno, addo exalfacit, ut habendum sit aut secundi ordinis incipientis, aut primi finientis itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat & crudos & incoctos humores concoquit. fit enim ex eo oleum, cujus propinqua sit temperies pus moventibus & concoquentibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, ac proinde digerere de facultate prædium. Vltimum autem tertij ordinis tum exalfacientium, tum Anethi deficcantium fit, & propterea ulceribus nimis humidis, mollibusque prodest, poussimum iis, quæ in putendis consistunt. at quæ in præputio sunt inveterata, ea probè cicatrice concludit. Cæterum, viride humidius est & minùs calidum: itaque magis quàm siccum concoquit, & somnum conciliat, sed Somno minùs digerit idcirco mihi videntur veteres in conviviis ubi esse coronis ex eo concinnatis. Ad crassorum humorum inflationes prodesse Anethum testatur Simeon Sethi. Prodidit idem quosdam sanè ipsum stomacho bonum esse, alios verò minime, dixisse. Illos quidem ad ejus caliditatem, & facultatem, quæ humiditatem concoquit, & flatu, qui sunt in ventriculo, discutit, respexisse: eos verò ad substantiam ejus, quæ crassum est partium, concocto difficili & nauseosa. Oleo incoctum potè discutere ait, & somnum conciliare. In unctum tumores crudos concoquere. Inflationes quoque, quæ in ventriculo generentur, digerere. Corpus ex immundo labore defatigatum curare. Renes verò lædere secundum quosdam. Anethum sequentibus quondam celebravit Mace.

A Medicis calidum siccumque refertur Anethum.

Et dicunt quòd sit gradus huius in utroque secundæ.

Lac dat abundantem eius decoctio sumpta.

Nutrici, stomachique solet depellere morbos:

Tres ejus hos eius tepida si miſerit ager,

Indicio ructus sit, qui demonstrat apertum

Os stomachi, ventrumque per hoc exisse nocivum,

Atque gravis tali sedatur nausea potu.

Provocat urinas, obſtantiæ quoque repellens.

Matricem in uras, bene si foveatur eodem.

Cum tepido tritum parvens si poterit, aceto,

Intestinorum curat, ventrisque dolorem.

Hoc etiam potu digestio t arda in uratur,

Vnde minor fieri vis egestia videtur.

Asidue bibitum visui nocet, & genit ale

Claudat iter, sicans humorem seminis intus,

Vnde ne si nimio turgens humore gravetur

Si spendit pulvis combuſus feminis eius,

Appetit digiris aut intus clyſtere ſuſus:

Acritur esse unius radicem dicitur eius,

Rurſus crescentes cinis hic in vulnere carnes.

Vulnera que ſerpunt, & ſordida vulnera curat,

Vlcera præcipue membri curare virili

Dicitur iſte cinis inſuſus ſepius illis,

Olſactu reprimat ſingultum ſemen Anethi,

Aſſat um

Astutum & fervens si sepius olfacit ager.
Dicunt fervores oculorum tollere posse
Eius radices tritas prius, appositaeque.
Apponas haemorrhoidis si semen Anethi
Vinum, curat eas, & condylomata solvit.
Elos oleo si decoquitur medicabile reddit.
Ilud praecipue natu de frigore canis
Prodest & capitis compescit saepe dolorem
Nervorum laxat tensuras, frigora pellit.

Anethum, ut testatur Tragus, condimentum est optimum, nam olim cum Serpyllo & Allio contundeatur, felsisque messoribus proponebatur, quemadmodum in Alexi Virgilius notat. Tradunt praeterea sicut Foeniculum caliginosis oculis confectis, ita Anethum caliginem illorum promovere ac creare. Verumenimvero caliginem oculis inducere Anethum dixerit Tragus, sed citra noxam. Nam capiti conducit & somnum conciliat, maximè Anethinum oleum: quomobrem quòd dicitur visum hebetare, aut caliginem oculis inducere, is de somno & quiete intelligendum potius censet. Nobis tamen non placet Tragi sinistra explicatio. siquidem alia est natura ipsius seminis devorati, & olci ejus. Itemque diversa applicatio. Eadem praestare aqua distillata dicitur, quae Dioscorides toti plantae adscribit. De hac aqua haec leguntur apud Tabernomontanum. Conveniens tempus hanc aquam distillandi, in fine Maij, aut in principio Junij, cum maximè floret, abjecta radice, in Balneo Mariae. Si verò efficaciorē desideres, accipe ℥iij. seminis ejus, quod pulverizabis grosso modo, & Cucurbitae impones superaffundendo lb. iij. aquae distillatae, Cucurbitam alembico caeco occludes, permittesque viginti quatuor horis in balneo Mariae macerari, quo peracto alembicum mutabis, & lento igne distillabis: Anethites vinum ex Caesars Constantini mente fita. Anethi semen colligabis in linteolum, deinde in vinum demittes. Valet ad eisdem affectus. Plura vide apud Tabernomontanum, qui suo more & Anethinam nullam, & aquam decoctionis seminis Anethi, & Oleū chymicā arte extractum, in sepe dictos usus sine dubio refert. Ceterum, seminis Anethi & urticae partes aequales pulveratae, cum melle in emplastrum formam redactae, condylomata impositu confestim sanant, si Matthiolo credimus. Folia recentia ad condimenta incoquantur, praecipue cum recentibus piseolis, suaveolentiam simul & coctionis facultatem in ventriculo praestantia, Caesalpinus. Tenerae comae in jusculis esistantur à quibusdam calculosis, quibus non parum prodesse certum est, sed cibo parum grato sapore, Lobelius. Radix recens (nam sicca nullius est utilitatis, Cresc.) habet virtutem diureticam, calculi fractivam, & viarum utinalium aperitivam. Semen per triennium potest servari, melius tamen est si singulis annis innovetur. decoctio herbae & seminis valet ad stranguariam, & dysenteriam & lac augmentat. Vulgus tandem Anethum vaccarum pabulo commiscet, ad augendam lactis copiam.

ANETHVM SILVESTRE, SEMINE exiguo, Ameos.

Anethum silvestre in Sicilia nascitur, grandius lativo: caule crasso: foliis amplis, ut Foeniculi, sed odore Anethi, quanquam in firmo: umbellis amplioribus: flore luteo, semine exiguo, semine ut Ameos, subacti: radix parva & lignosa est annua. hac herba equos purgant: nam miro modo ejus usu (inquit l. 7. c. 1. Caes.) vegetiores redduntur. Idem Foeniculum hoc Mèum ignobilius nominare videtur, ita enim quatit eodem l. c. 13. An quod Anethum sil-

vestre appellavi ad Men ignobilius reduci potest, grandius scilicet sed infirmius.

Bauh. phyt. & pin. vocat Anethum 2. silvestre, grandius lativo, foliis Foeniculi, Caesalpin. Eid. pin. Anethum 3. silv. minus, quod in prodr. sic describit: radice est albicante, uncias tres longā, tenui, quemadmodum & caulis, qui pedalis, albus, rotundus: foliis est uncias quatuor longis, tenuissimè, ut in vulgari divisi: rumbella parva, ex festuciā octo vel novem uncialibus composita, foliis luteis, semine parvo oblongo. In hortulo meo crevit, ex semine à doctiss. Columna, nomine Anethi sylvestris ex Sicilia, misso: quod minus appellare lubuit, cum Caesalpinus, Anethi sylvestris in Sicilia, quod lativo grandius sit, meminerit.

ANETHO SIMILIS PLANTA, semine lato laciniato. C A P. III.



Plantula Ginz. Deser. gido nostri perquam similis, radice parvā albicante, foliis fœniculaceis, tenuioribus quàm in Pastinaca erraticā, gustūque amarioribus: umbellae in medio capitulum caeruleum habenti subsunt folia tenuia ut Melanthio: semina rotunda, confestim coacta in unum quasi capitulum. Et sic descripsit plantam Rauvvolfius.

Meo judicio binā esse solent femina qua parte

coherent mutuo, aspera, rugosa, oblonga, extrinsecus striata, in ambitu foliacea, fimbriata, ut in Ferulaceis quibusdam, ab iis in eo differens quòd pulchrè in decem partes dividantur, totum semen paulò minus parvi digiti ungue vel denariolo.

Rauvvolfius appellat, Gingidium Dioscori. Synon. dis verum: Item postea inter Icones, Gingidium Dioscoridis; Camer. hort. Gingidium Rauvvolfij, Siliacam plantam; inter icones Gingidium, ubi ait ejus iconem etiam extare apud Rauvvolfium sed apud eum elegantissima femina, nimis confusa & obscurata esse picta. Lugd. in append. p. 34. Gingidium Dioscoridis. Bauh. phyt. & pin. Gingidium 1. folio Foeniculi.

In monte Libano Syriæ, locis præruptis provenire scribit Rauvvolfius, qui nobis semen communicavit, ex quo Montbelgardi in horto E.C. planta excrevit.

MYRIOPHYLLON SIVE MILLE-folium vatenbus. C A P. IV.

Myriophyllum [*εὐκαρπύλλον*, Ald.] ita describit Diose. bente Dioscoride, cauliculus est singularis, tener, unicæque nixus radice [*ῥίζα*] quæ voce veteri carer] folia habens circa caulem multa [*πολλὰ*] laviā Fœniculo [*ῥίζα*] perperam Ald. dicitur. access. vrum quoque Mijsid] similia, unde & nomen accepit. Est verò caulis quodantenus cavus [*καὶ*]

HISTORIAE PLANTARVM

pro quo vult. exempl. *subfulvus*] coloribus variis distinctus, & quasi studio & artificio limatus & expolitus. Nasctur in palustribus. Vulnera recentia ab inflammatione vindicat. seu viride, seu etiam sicum ex aceto oblinatur. præcipitatis quoque ex alto cum aqua & sale potui datur. Millefolium nonnulli (inter quos est Apuleius) Melophyllon vocant, alij Stratiotem, quasi Militarem; alij Achilleam, Romani Millefolium aut Supercilium veneris appellant, Galli Bellicocandum.

Myriophyllon, inquit Plinius, quod nostri Millefolium vocant, caulis est tener, similis Fœniculo, plurimis foliis, unde & nomen accepit. Nasctur in palustribus, magnifici usus ad vulnera. Cum aceto bibitur ad difficultates urinæ, & vesicæ, & suspiria, præcipitatisque ex alto. Efficacissima eadem ad dentium dolores.

Millefolium Plinius Myriophyllon vocat, haud sanè quia in græca voce certa ejus numeri vis & significatio sit, sed quod aptius non poterat in latinis nomen fingi: nec referebat, inquit Marc. Virgilius, in re incerta mille potius, quàm decem milia, infinitæ folia illi tribuisse. Quod mutato tantum accentu in græcis *μύρια* significat: quemadmodum nec male penitus dixerit aliquis mille, pluribusve, aut infinitis pilis constare hominis supercilium, ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam vocata à plerisque fuit: quoniam scilicet quemadmodum minuti densique pili eam horæinis partem vestiunt: sic Millefolij hujus coliculos, minuta densaque vestiunt folia, quæ licet hîc Dioscorides Fœniculo comparaverit, non tamen eadem longitudine sunt. Hujus enim brevia admodum, Fœniculi verò longiora & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioten & Achilleam vocari fecit. Brevibus enim & numerosis illæ etiam foliis describuntur & sunt, ut videre est H.n.g. lib. 25.

Relinquit verò Marcellus constituendum in hoc Dioscoridis capite peritioribus, quod ultimum in eo legitur *bibi ex alto præcipitatis utiliter Millefolium*: præcipitatis legi ne, an aliter oporteat. Is *μύρια* in cunctis ferè græcis se invenisse ait, quam vocem nihil aliud quàm ex alto casus & lapsus quidem significare concedit. Inclinat ei tamen animus *μύρια*, i.e. inflationes legi posse, vidisseque in quo *μύρια*, quod est inflationibus laborantes legere.

Stratioten aquaticum hodie ignotum esse placet Cornario: aut cum saltè esse, qui in Ægypto solum nascatur juxta Plinium. Sed cum hic Aizo similis, Stratiotes aquaticus, meo judicio, esse nequit.

Myriophyllon esse voluit Braslavola Millefolium vulgare sive Stratioten (de quo dictum H.n.g. l. 25.) sed hoc ei non concedimus.

Lob. in adv. titulo de Millefolio aquatico altero Coriandi folio p. 334. habet nomen Myriophylli, ac ibi intelligere videtur Millefolium aquaticum, à Matthiolo in post. comm. cum mag. fig. sine descriptione exhibitum. Quale autem hoc sit, nescio. videntur igitur lectores, perpendantque an repenitur planta, omninò similis figuræ Matthioli, & an non sit composita ex umbella Myriophylli Matthioli, de quo paulò post, & nostro Millefolio aquatico penato.

Millefolium aquaticum Fœniculi facie, umbelliferum, multus est Myriophyllon.

Millefolium pennatum Lobelio & Clusio est Myriophyllum aut Marathrophyllum palustre.

Eit & Millefolium cognominatum Myriophyllon palustre alterum Lobelio.

Habet Myriophyllum aliud Lucas Ghinus, de quo agimus sub Millefolio dicto Viola aquatica

lib. 33. descripta sub capite Polyanthem tenuifolij. Fit & Myriophyllum; Millefolium marathrophyllum flore Ranunculi albo.

MILLEFOLIUM AQUATICUM, Fœniculo simile, umbelliferum.



Folia sparsa, setè *Desj.* virentia, fœniculaceis perquam similia, cæsurâ non ita dissimili; prima & inferiora differunt nonnihil; segmenta sunt paulò latiora, in icone nostra non expressa, incurvâ pictoris; odore grato, sapore nullo insigni: flores gerit in scapo umbellatos, radices ad Hellebori albi radices quodammodo accedunt, fibrosæ, albæ, crebræ ex capite uno dependentes, palmo longiores,

cavæ; in quorum tamen medio reperitur interdum radix quædam primaria, minimi digiti crassitudine, furgosâ, & veluti concavâ.

Hanc pingere videtur Matthiolus nomine Myriophylli, quod legitimum Dioscoridis constituit, ac se invenisse & sæpè vidisse refert in vallis Ananiz palustribus, unico tantum caule, innumeris foliis referto, capillaceis, Fœniculi modo, odore non ingrato. Figura Matthioli non undique placet, minùs etiam ea, quæ ad epit. & hist. germ. à Camerario addita est, eodem Myriophylli titulo, quod græcè *Μυριάδων*, italicè *Miriophyllo*, germ. *Sendelgarb* vocat. Emendavi ego Matthioli figuram per vetustam plantam ante 40. annos Patavij collectam.

Lob. in adv. p. 333. vocat Millefolium aquaticum alterum Coriandi folium, ac de eo dicit. Quandoquidem hæc mutila aut depravata visa fuit lædio nobis, post multam perpensionem, animum advertimus hanc repetitam foliorum Millefolij cum Cumyno silvestri collationem, aptius nulli quadrare posse, quàm illi Millefolio in aquis nascenti, ejusdem cum isto speciei & faciei, cuius folia quàm plurima à media ad imum scitè exprimunt Cuminum silvestre aut Coriandrum: superiora verò sunt Fœniculi, sed tenuiora, delicatiora, molliora, uti aptè etiam quædam habet lædio: non Amaraci (ut falsò legunt) sed Marathri: reliqua minorâ, sed similia superne floribus Millefolij: unde perspicua supina commentatoris [Matthioli] somnolentia, dum usque & usque carpit hunc & illum, ipse carpendus & ridendus magis, qui non videat hanc neutiquam foliis esse Sempervivo majoribus, magisque refrigerantibus, sed potiùs Cumini silv. Coriandi, & Marathri, qualem ipse Senensis bellè pinxit. Umbella etiam hujus est Millefolij, aut silv. Cumini, cui hîc Dioscorides confert, post lativum fuit Matthiolo expendenda. Hæc Lobelius, qui, dum Matthiolum reprehendit, sibi met valdè doctus videtur, licet obscuro multò loquatur, quàm ut à quoquam intelligi posse queat. Sed quid mirum si volare cupientes absque pennis ipsi prius labant & titubent. Idem postea p. 354. Myriophyllum, aut Marathrophyllum palustre nominatè videtur, Fœniculi folio thurcan-

fluitantibus aquis, luteâ umbellâ emicans. In Obf. p. 460. & Icon. p. 799. Myriophyllum aut Maratryphyllum palustre, Adv. p. 333. & 354. Ceterum, videtur mihi Lobelius non nosse discrimen inter Millefolium aquaticum & Millefolium pennatum fluitans: quod describit secundo loco in Adv. Ei meo iudicio malè assignat umbellam, ut dicemus alio loco. In Obf. ponit figuram Matthioli, sed fluitantem facit, præter ejus mentem. Verum Millefolium Matthioli nunquam observavi fluitare, nec puto ipsum vidisse: confutatur ejus descriptio quam nos ponemus sub Millefolio pennato fluitante, videbitis id non respondere figuræ; ita ut non dubitem asserere, ab eo duæ plantæ confundi: si bene notas ambas habuisset, aut ipsi ad manum fuissent, non accepisset figuram Matthioli, cui tantopere insulat.

Dod. lat. in fol. Millefolium aquaticum inscribit, ac à Mill. folio stratiote differe re cèdè tradit. Expendant peritiores an Apollo rad. i. supra Martiatum, qui Myriophyllo huic videtur tribuere flores candidos, an ritè ab aliis Millefoliis distinguat.

Taber. appellat Millefolium, Fœniculum aquaticum, Wasser Fenchel / Fenchelgras. Bauh. phyt. Millefolium 10. aquaticum umbellatum, is Myriophyllum aut Maratryphyllum palustre Lobelij necdum vidit cum umbella. Idem apud Matth. vocat Millefolium 1. aquaticum umbellatum, Millefolium Cordi in Diosc. Mirari autem subit fratrem cur Millefolium umbellatum cognominet, cum is umbellam necdum videt. Millefolium quoque Cordi in Diosc. l. 4. c. 115. plurimum differt à Millefolio hoc Matthioli. Cordi namque est Polygonum fœmina, id quod indicant ejus verba, cum ait: tota herba nuper natam Abietem figurâ imitatur. B. in pin. meliora docet. Millefolium aquaticum 2. umbellatum, capillaceo brevique folio, est Myrioph. Matth. Lac. Cast. prius Matthioli, Lugd. Millefolium aquaticum, Dod. Myriophyllum aut Maratryphyllum palustre, Adv. Lob. Myriophyllum aquaticum, Cast. Millefolium, Lon. Ger. Tab. cui & Fœniculum aquaticum.

Lugd. p. 770. Myriophyllum prius Matthioli. Schvvenckfeld. Millefolium palustre 1. *spatiolifolium* Myriophyllum, Matth. Cam. Myriophyllum aut *Myriophyllum palustre*, Lob. Fœniculum aquaticum 1. Tabernomontani. An appellandum cum Schvvenckfeldio stratiotes Millefolium, considerandum: quia Dioscor. descriptioni non convenit.

An Cast. dicitur Myriophyllum in palustribus Pisanis nascens: frequenter foliis, mollibus tenuissimè scissis, instar latæ avium plumæ: radice juncea, albâ, fibrosâ: caulem supra aquas tollens, nudum, tenerum, ac molliissimum supra dodrantem: flores circa summum per intervalla congestos, multò latiores Anagallide, colore ex albo modicè purpurascens: fructus quoque Anagallide majores, floreat Vere.

Millefolium Matthioli apud paludes circa fossas Paduæ reperi. Mense Aprili vidi apud portam Livianam. Palustris est in Silesia & aquis non fluitantibus familiaris.

MILLEFOLIUM AQUATICUM foliis Coriandri Matthioli.

Matthiolo quorundam dicebatur in epit. Millefolium aquaticum, It. *Millefolio aquatico*. Eid. in Dioscor. Planta quædam Pisis missa à Luca Ghino, ovam aquaticum Mill. folium appellabat Ghinus, Matthioli verò aquaticæ stratiotes genus aliquod esse putat. Lugd. p. 770. Stratiotes Millefolium aquaticum Matthioli. Bauh. phyt. Millefolium 9. seu aquaticum Coriandri folio, nondum visum.

Bid. apud Matth. Millefolium aquaticum à Matthiolo propositum & à Lugdunensis herbarij auctore sub Stratiote Millefolio aquatico Matthioli enarratum, hætenus non visum. Veretur Bauh. ne duæ diversæ unâ figurâ junctæ ad commentatorem sint missæ. Siquidem caules optimè respondeant, si umbellæ adimas Equifeto olido. Idem ait in animadv. in H. Lugdunensem p. 38. Stratiotes Millefolium aquaticum Matthioli, an duæ diversæ plantæ unâ figurâ proponantur, considerent Botanici: caules conveniunt optimè Equifeto nostro olido, cujus etiam fit mentio in H. Lugdunensi p. 1070. sub Equifeto olido.

Ante multos annos annotavimus, nos suspicari iconem Matthioli compositam ex diversis plantis. *Autorum iudicium.* Cam. in ep. ejusdem omisit & descriptionem & iconem. Ipsemet etiam Matthioli solam ponit iconem in post. comm. cum mag. fig. nullâ factâ Ghini mentione: fortè composita icon ex umbella Millefolij aquatici folio Fœniculi, & Millefolio pennato, ac aliâ aliquâ plantâ: non autem existimo ex olido compositam Millefolio, quod frater Equifetum fœtidum sub aquis vocat, de quo sanè meo iudicio Lugd. p. 1070. Nulla igitur animadversio in Lugdunensem hic cadere videtur, sed potius in Matthiolum, qui non descripsit & fortè confudit suâ iconem duas diversissimas plantas. Quare meritò censuram in Lugd. omisit idem Bauh. pin. vocans Millefolium aquaticum 1. umbellatum, Coriandri folio: Millefolium aquaticum alterum Coriandri folium, Adv. Hoc foliis Coriandri, & umbellâ subpurpurascens, necdum videre licuit.

DAUCUS PRATENSIS DALE- champi, folio Millefolij.



Donavit mihi aliquando D. Dalechapius Daucum, quem pratensem vocavit ac sic descripsit. Nascitur radicibus multis, candidis, rotundis, ab ima caulis parte in diversâ sparsis, brevibus, dulcibus, odoratis, foliis proximè radicem sex aut septem, totidem digitos longis, foliolis per ordinem multis, orbiculatim caulem totos ambientibus, Myriophyllo similibus, mollibus, latè virentibus.

bus, caule medio Fœniculi, cubitali, in ramos duos, vel tres divaricato, foliis paucis vestito, interdum rudo, umbellâ per initium non nihil rubescente, postea albâ amarâ, subactâ, odoratâ.

Lugd. p. 718. dicitur Daucus pratensis Dalechampi. Bauh. phyt. l. 9. c. 13. in. pratensis. Millefolij palustris folio. huc ait frater me ipsi committisse. Mihi autem videtur potius esse folio Millefolij Stratiotes quàm aquatici. Hic (inquit Bauh. pin.) foliis & umbellâ, quæ tamen albâ est, cum Millefolio aquatico Matthioli convenit, foliis tamen inferioribus, Coriandro similibus exceptis.

In montosis pratis nascitur, ut refert auctor, flores mense Maio.

HISTORIAE PLANTARVM

DE PANACE ASCLEPIO veterum.

Diof. Panaces Asclepium, ut memoriz prodidit Dioscorides, caulem de terra emittit, tenuem, cubitalem, geniculis distinctum, circum quem folia sunt similia fœniculo, sed majora, & hirsutiora, odorata [malè olentia, domâdâ, Oriz.] & in summo umbella, in qua flores aurum referentes, acres, odorati. Radix est parva & tenuis. Vim flores & semina habent aduersus ulcera, tubercula & phagedænas, si trita cum melle imponantur: contra serpentes cum vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Quidam etiam sil-
Origanum
sub. Cnula vestre Origanum, aut Cnulam, Panaces vocant, velut de Origano dictum est.

Plin. De hoc Panace Plinius ait, Asclepium cognominatur, quoniam is filium Panaceam appellavit: & ipsi succum attribuit, quem Dioscorides Heraclio adscripsit. Theophrasti descriptio non omnino consentit, cum Dioscoridis descriptione. Asclepium, inquit, radicem habet longitudine palmi, albam ac valdè crassam: & corticem crassum ac falsum: caulem undique geniculatum: folium simile Thapsiæ, sed crassius: Commodum autem esse aiunt aduersus serpentes, si derafum bibatur: & ad splenem, quum sanguis circa ipsum fuerit, ex aqua mulsâ: & ad caput, si tritum cum oleo illinatur: & si quis aliâ quadam obscurâ parte doleat: & ad ventris dolorem vinum derafum. Item, ut quis longas ægritudines evitet. Postea verò etiam ad ulcera, ita ut humidis sicum inspergatur, vino calido præelotis. siccis vino subactû imponatur. Galenus minus calidum quàm præscriptum esse dicit. Vnde ipso & floribus & semine, ad ulcera & tubercula & phagedænas utuntur melle mixto.

Asclepij folia, quæ Dioscorides Fœniculo similia dixit, Theophr. lib. 9. plant. hist. Thapsiæ nullâ diversitate comparavit. Siquidem Thapsia Fœniculi folio est, teste Marcello Virgilio. Idem Theophr. radicem Panacis hujus candidam esse dixit & crassam valdè [μεγέλειον σφοδρὴν] & non tenuem, ut multi verterunt, & Dioscorides legisse videtur. Idem quoque radicem [σπιθαμῶν] [dodranta]lem, aut longitudine spithame tradit: Dioscorides [μικρὰν], i.e. parvam, et si in melioribus codicibus [μακρὰν] [longam] legatur. Cogitandum itaque in radicis longitudine est, brevissime autem longa dicenda sit, quæ dodrantalisis fuerit. Est autem Spithame Græcis & Latinis, auctore Plinio l. 7. c. 3. dodrans: longitudo & quod capit spatium humana manus à summo pollice usque ad summum minimum digitum extensa: quæ mensura quoniam in tres quartas humani pedis partes incurrit, dodrans dicta est. Sic enim veteres Romani novem in libra uncias appellaverunt. Variant Plinius & Plinium sequuti in hac mensura, nunc pedalem, nunc semipedalem, & aliquando palmarem vocantes: quæ etsi videatur descripto à nobis [Marcello] dodranti & spithamæ congruere, nihilominus utendum ea non est, ne concurret cum antiquo palmo, quæ quatuor digitorum in hominis manu, ut sunt conjunctorum sine pollice, mensura est, quæ sexies repetita cubitum Romanum constituit, qui ex 24. hujusmodi digitis conficiebatur. Nobis in radice herbæ, qualis Panaces est, dodrantis mensura, longior potius, quàm brevior videtur, & nihilominus mutare aliquid ausus non fuit: quoniam non sit facile certi aliquid constituere.

Acquisita. De reliquo, Anguillara & Matthioli pro Panace Asclepio Dioscoridis plantam exhibent foliis Ferulæ, flore luteo [Panaces sil. mystrum Matthioli flore luteo, de quæ max.] quam in Candia Sefeli, in Sicilia verò Peucedanum appellari aiunt.

Panacem Asclepiadem Lobelij Ferulæ facie diversam esse ab Asclepio Panace Matthioli asserere non dubito, ita ut eandem, Libanotidem quorundam flore luteo, appellare non vercar.

PANACES ASCLEPIVM MAT- thioli, flore luteo.

Patavio ad me misit frater plantam, quam Panacis Asclepij nomine pictam, nec descriptam, exhibet Matthiolus. folium dodrantaie, palmum ferè latum, pinnatim ferè divisum, incisuris Millefolij militaris: segmenta extrema angustissima, brevissima, quæ ad Mei segmenta accedunt: flores umbellati, parvi, lutei, acri sapore linguam ferunt.

C Bauh. plant. Meus tam hac dedit matthei nomine Mei Athamantici Guilandini, Patavio delatam. Dedit & aliam portionem cum hac inscriptione Delambers. Verum quum non sit mihi integra planta, accipij figuram Matthioli, & ad latus folium ex mea planta, & semen ex Camerarij figura apud hist. germ. Matthioli, nescio tamen an hujus plantæ sit.

Præfens porrò Panacea dicitur Matthioli Panaces Asclepium, græcè [sclepi] [panax] arabicè Panax Aschilibet, italicè Panace asclepio. Eidem in post. comm. cum mag. fig. Panax Asclepium. Is in post. mutavit nonnihil figuram, non tamen redditâ causâ, mihi melius aridet prior. non descript, & in hist. germ. omittit. Et hoc etiam Cam. ad ejus hist. germ. annot. Panax Asclepium, inquit, pictum à Matthiolo sine descriptione, cui addit semen sibi missum pro Panace Asclepio.

An Gesn. h. Panaces Asclepium, quod Patavij ferere scribit, quamvis ignoret quo provenit.

An Cxalp. l. 7. c. 4. Dioscoridis Asclepium ex Sicilia allatum, foliis circa radicem stratis, densis: foliorum capitulis brevibus, subhirsutis, cauliculo tenui: umbellis luteis: seminibus compressis, magnitudine Fœniculi: radice digiti crassitudine, nigra.

Lugd. p. 739. Panaces Asclepium Matthioli inscribit, & ejusdem cum Ferula generis esse cum Pena tradit, nec item figuram dissimilem.

Tabern. Panaces Asclepium, & Cyltours Asclepium. Ad aliam plantam, quàm hæcenus nominati hanc referat frater C. Bauh. Apud Matth. enim & in phyt. vocat Libanotidem, sive Libanotidi secundâ similem, seu Panax Asclepium primum. & ita etiam in Animadv. Lugdunensem appellat, dicitque inibi falsum esse quod diversi generis non sit à Ferula, id quod cum Pena statuat Lugdunensem: se enim Panaces Asclepium Lugdunensem & Panaces Asclepium Lobelij in horto Patavino legisse, diversas à Ferula plantas: quod idem in notis in Matth. etiam monet. Debebat porrò is addere Lugdunensem figuram ex Lobelio Panacis Asclepij Ferulæ facie recepit. Non video tandem Lugdunensem in verbis Penæ quicquam falsi dixisse, quæ sic habent. Panaces Asclepium, quod diversi generis non est, inquit Pena,

Pena, nec item figurâ dissimile, præsertim istud doctioribus verum putatum, fortè quale in Matthiolo pictum videtur. Sed id tantùm me vidisse ait Matthiolus effigiemque ejus pinxit, omisiss notis omnibus. Hæc verba sunt Lugdunensis. Considerent Lectores an falsitas non sit in animadvertore: cur non reprehendit Matthiolus, qui suam non describit, & Lobelium ex quo desumpta verba, posita ab Lugdunensi. Eid. B. pin. Libanotis Ferulæ folio 4. sive Libanotidi secundæ similis: Panaces Alclepium, Matth. Lac. Cast. & Lugd.

MEVM VETERIBVS. CAP. VI.

Meu m, quod Athamanticum vocatur in Macedonia & Hispania [non legit Oribasius, Matth.] nascitur, authore Dioscoride, plurimum, caule & foliis Anetho simile, crassius tamen Anetho, ad cubitos duos [sic tūc mōl. Oribasius, inquit Matth.] insurgens, sparsis radicibus tenuibus, obliquis & rectis, longis, odoratis, linguam calefacientibus. Quæ cum aqua coctæ, aut etiam citra cocturam, trita potæ, arctas circa vesicam & renes affectiones mitigant, & urinæ difficultati commodant, stomachique inflationibus & torminibus, & uteri affectionibus ac articulorum doloribus. Thoracis fluxionibus cum melle trita, vice eccegmatis auxiliantur. Sanguinem etiam ducunt per menses ad inessum decoctæ. Ad pubem verò puerorum impostæ urinas ducunt. Si verò plus quam oportet bibantur capitis dolorem inducunt.

Mei radices, ut ait Galenus, peritiles sunt, calidæ tertio ordine, siccæ secundo: proinde urinam, mensesque ciere volentes, hoc utuntur pharmaco. Sed si pluculcum fumatur capiti dolorem movet, utpote cum pluculcum sit calidum quàm siccum, quippe cum humiditate crudiusculam etiamnum & flatuosam caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat, lædâtque.

Meu, scriptore Plinio, in Italia non nisi à Medicis scribitur, & iis admodum paucis. Duo ejus genera. Nobilius Athamanticum vocant, illi tantquam ab Athamante inventum: hi quoniam laudatissimum in Athamante reperiatur, foliis Aniso [Anetho volunt legendum, Corn. Lacuna & alij] simile, & caule aliquando bicubitali, radicibus multis & obnigris [obliquis puto legendum, ut Diosc. habet] quibusdam altissimis. Minus rufum quàm illud alterum. Ciet urinam in aqua potum, radice trita ac [vel] decoctæ. Inflationes stomachi mirè discutit. Item tormina & vesicæ vitia, vulvarumque: & dolentibus articulis prodest. Thoracis item fluxionibus cum melle, infantibus cū Apio illitum, imo ventri urinas movet.

Ceterùm, cur Dioscoridi Athamanticum dicere, Plinius modò exposuit: nisi fortè Athamanticum subtrahat & litera legendum sit, inquit Marcell. Virgilius, docueritque Dioscorides in Athamania nasci: cujus regionis gentem, auctore Bizantio Stephano, aliqui Thessalix, aliqui Illyrico assignant. Nec refert in Macedonia nasci Meon dixisse Dioscoridem, cum non longè distent inter se Thessalia & Macedonia, mutatque à regibus sæpenumero earum terminis, altera in alterius appellationem aliquando trāsierit. Peregrinum autem semper quondamque rarum, nunc verò quod sciam nullum Italix Meon est: non quia quibus locis antiquà ætate nascebatur: æterna enim plantarum genera voluit natura esse. Sed mutatæ cum temporibus artium & doctrinarum rationes, multa quæ in nova medicina diu neglecta sunt, ignota penitus nobis tandem evascent. Ex quo fit, nequid possit in eo dici, præ-

ter ea, quæ à Dioscoride, Galeno & Plinio jam tradita sunt.

Meum, nomen herbæ cujusdam à veteribus de Radix nro scriptæ, pluribus attribuitur plantis. Et imptimis Meo vulgari, seu Radici urinx nominatæ.

Meo altero Italico quorundam.

Meo, Dauci Cretici facie.

Libanotidi quorundam, sive Ferulagini, foliis Libanotis. Fœniculi, floribus luteis.

Quod Anethum silvestre appellatur, ad Meu re. Anethum silv.

Fœniculum tortuosum nonnulli verum Dioscoridis adtribuunt Meum. Verùm non sine errore. Fœnic. tortuosum.

Cicutaria latifolia à Cam. h. & C. Bauh. phyt. Meu Cicutaria. folio Cicutæ cognominatur.

Meum in quibusdam Belgicis officinis, teste Do. Apium silv. donzo, de Apio silvestri dicitur.

Invenitur Imperatorium [Meisterwurz] esse à Imperatoria.

Mei & Meu nomine, id attestante Cordo, Ange. Angelica. lica à nonnullis exhibetur.

Mutellina, Gesnero Caros, vel Daucus Alpinus Mutellina. quidam visus, Meum, à C. Bauh. quoque nuncupatur.

Meum quibusdam de Bunio Dodonzi dicitur, Bulboca. quod nos Bulbocastanen inscribimus. flane.

Traditis ita Æquivocis reliquum est, ut Succedanea adscribamus. Meu itaque vero nos carere attestat.

stat Cordus, qui Sifonis semen (quod Sifarum, vel Sifon. Sifer, & Amomum dici ait) pro Meu sumendum præcipit.

Pharmacopola, si Meu caruerit, Galeni & Eg. Glans unguentæ consilio in suis antibalomenis, Myrobolano, Guent. v. a. i. e. Glante unguentaria uti debet.

Meu deficiente, Tractatus qui pro quo, Pphyllum Pphyllum. substituit.

Petrus Paduanus, Luminare majus, & alij plures Mu Avic. volunt quod Mu Avicennæ sit Meu Dioscoridis: nec nos aliud esse (aiunt Monachi in Mefdistinct. cens. 45.) putamus, adhuc tamen nobis incomperitum. Quid sit Mu Avicennæ investigent posteri.

Quæ tandem sit radix ista grossa, quam Monachi in Mefdist. cens. 45. communiter à multis annis usque in hodiernum diem omnes Pharmacopolas falsò pro Meo usos esse scribit, ignoramus, nec ipsi id ostendunt. Radix quada grossa.

MEV VVLGARE SIVE Radix urfina.



Herba hæc, cujus folia cubito ferè longiora, longos habentia pediculos striatos, supremæ partes admodum sunt similes foliis Fœniculi, capillacæ, molliores tamen, nec capilli usque adeò longi, caulem edit similem Fœniculo, minorem tamen multò, striatum, inanem, ramosum, umbellam florum alborum, Anethinis familiis, è quinq; foliis compositorum, odoratorum, semina magna,

gna, longa. Radix interdum una, interdum plures, dodrante longiores, modò tenuiores, modò crassiores, à quarum lateribus, ut plurimum oriuntur oblique radices, satis longæ, quæ sursum interdum tendere deprehenduntur, nec passim in aliis radicibus sic adnatæ provenire solent. Cortice vestitur primò nigricante, vel potiùs cineritio, tenui: dein altero crasso, albo, gummoso: in ejus medio est matrix. Odore est suavis jucundo, Paktinacz ferè, magis tamen aromatico: sapore non ingrato, nisi quòd acris & non nihil amara. Quum verò radix hæc ex iis sit, quæ Hiemem perferunt, & alpina, magnas habet comas, capillatas, ex foliis arefcentibus.

An Ruell. lib. 2. cap. 3. per Meu (quod officinis Anethum silvestre, quibusdam verò Herbariis Anethum tortuosum, appellari scribit) hanc plantam intelligat, judicatu admodum difficile est, cum nullas addat notas, præter eas, quas habet Dioscorides & Plinius, licet id eum voluisse scribat apud Matth. C. Bauhinus.

De hac Monachi in Mes. dist. 1. cen. 45. Meum si-
ve Meu paucis ante annis invenimus ipsam in no-
stra Italia, videlicet in montibus Nurfæ, & ab inco-
lis illius loci, Spicula vulgo dicitur. Et sine dubio est
ipsum Meum à Dioscoride descriptum. Nam ad un-
guem omnes notæ de Meo à veteribus positæ, con-
veniunt isti plantæ. Reperitur etiam in Calabria
& alibi, quam nonnulli Imperatricem, & Impera-
triam, siue Herbam Imperatoris nominant. Etiam
in Hispaniis, circa montes Asturiæ degentes, à quo-
dam fratre nostri ordinis habuimus de radicibus
plantæ veri Mei Hispanici: tamen ipse frater non
vocabat ipsam plantam Meum, sed Sistræ. Sistræ
autem secundum Pandectarium, Simonem Ianuen-
sem, & plures alios, est ipsum Meum. Dicitur autem
radices, Hispanià Romam nobiscum detulimus, &
comparavimus ipsas radicibus dictæ Spiculæ, & am-
be ejusdem speciei esse, ab omnibus qui viderunt,
judicatæ sunt. Quapropter non est necesse amplius
ab Hispaniis & Macedonibus ipsas perquirere. Et
quamvis Dioscorides, Plinius, & cæteri laudent
Athamanticum, forsitan quia (ut putamus) non viderunt
Meum Italicum: quoniam si vidissent, judica-
sent ipsum optimum, quoniam certissimum est,
terram regionis Italiæ non esse inferiorem, aliis
Europæ partibus, in procreandis herbis, & cæte-
ris rebus à summo omnium bonorum datore us-
ibus hominum concessis. Et specialiter Plinius
non vidit Meum in Italia sponte natum, quo-
niam ipse testatur, quòd tenore suo non nisi à
Medicis ferebatur in Italia. Nec Dioscorides cum
dicit, quod in Macedonia & in Hispania pluri-
mum gignatur, negat in aliis Mundi partibus posse
gigni. Dicit autem plurimum in Hispania & Macedo-
nia: quasi dicat, in aliis regionibus non ita copio-
se habetur. Ista autem radix qua communiter à
multis annis pharmacopolæ pro Meu usi sunt, at-
que in hodiernum usque diem utuntur, minimè est
Meu. Non enim Meu habet radicem grossam, ut est
ista, quam ipsi vendunt. Non obstante quod in Se-
rapione legatur: Et habet radicem non subtilem. Est
ibi menda in codice: quia librariorum incurià, vel
quomodocumque sit, illud non, ad textum authoris
additum est. Debet enim dici: & habet radicem
subtilem. Probat, quoniam Serapio non à se: sed
authoritate Dioscoridis illud dicit. In Dioscoride
autem patet contrarium, cum dicit Meon habere ra-
dices longas, tenues, &c. Præterea nonnulli hallu-
cinati sunt in Sistræ: ut sunt Petrus Paduanensis, po-
stillator antiquæ Dioscoridis translationis, & Lumen
Apothecariorum, & Thesaurus aromatatariorum, &
cæteri qui volunt ipsam Sistræm esse Phu, Valeria-
nam. quod falsum est. Etenim in propinquitate vo-

cabuli erraverunt. Siquidem pro Sistræ, intellex-
erunt Sistræ: quoniam Sistræ est Phu, i.e. Valeriana;
Sistræ autem est Meu. Meon igitur siue Meum, Meu, ^{Anethum}
Sistræ & Spicula, idem est, quod etiam nonnullis ^{sive Phu}
Anethum silvestre nuncupari non displicet. Hæte-
nus Monachi, quorum opinio verissimilior videtur:
quàm Cordi, qui verum Meum solo tantum nomi-
ne cognoscit, & in calida Italia sponte vix nasci, ac
propterea olim in Italia Medicos hanc herbam stu-
diosè in hortis ferere, testante Plinio, fuisse solitos
ait. Et nedum in frigidiori Germania suæ sponte el-
se concedit. Sed argumentum Cordi ex Plinio de-
sumptum non satisfacit. Nec Plinius asserit, non
provenire in frigidis locis.

Tragus Meum vulgare inter Danci genera repo-
nit, Daucumque, Berwurz, inscribit, ac pro Dau-
co Cretico, & Dauco primo describit, & post his
nomenclaturis appellat. Primum genus [Danci]
Daucus ille est Creticus, quem magni etiam viri Pa-
stinacis, sed non sine gravissimo errore annu-
merare non dubitarunt. Nicander in Theriac. ^{S. d. d. d. d.}
vocat, ex quo loco Marcellus Virgilius id emendat,
quod malè in quibusdam græcis exemplaribus ^{dis-}
scribitur legebatur. Hieron. Braunschweig Fœniculum
porcinum (germ. Seifendel) & Peucedanum vo-
cat, alij Creticum Sefeli, quod alias Tordylon, vel
ut habet Ægineta Gordylon nuncupatur, esse vol-
unt. Nostri Rizoophori Berwurz, germanicè Berz-
voce, vel, quòd capillata sit [qualem descripsimus] ^{iwurz}
aut, quia matricis suo loco mota dolor, à mulieri-
bus retentà in ore hæc radice, quem patriâ voce
Berwûter nominant, sedari credatur. Hæc Tragus
l. c. 14. 8. Idem l. 2. c. 120. Tordylon siue Gordylon
non esse Daucum, quem Germani Berwurz nomi-
nant, affirmat. Sed is, quam Germani Berwurz vo-
cant, ineptè Daucum appellat.

Daucum porò esse, & non esse (sui fortè oblitus) ^{Daucus}
his prodidit Fuchius. Mei radix officinarum (ait l. 1. ^{est} ^{Fuchius}
compol. med. cap. 8.) non est nisi ejus herbæ, quam
Germani Berwurz / Græci & Latini Tordylon &
Sefeli. Creticum nominant, radix, ac possunt offi-
cinæ illa pro vero Meo sine omni errore uti, donec
verum ad nos advehatur. Siquidem Tordylon ead-
em quas Meum facultates habeat. Idem l. 2. supra
auream Alexand. præter jam dicta ait, quòdam Li-
banotidem primam putare. Non est (addit in hist.
c. 33.) cur ^{ἡ τοῦ δαυκοῦ ἡ τοῦ σελίου ἡ τοῦ κρητικῶν}, Daucum
credamus. Cap. autem 85. ait: Daucus Creticus Dio-
scoridis, vocatur à Germ. Berwurz, licet hujus se-
men hirsutum non sit, quale Dioscorides in Dauco
Cretico desiderat. Sed quum alia omnia ad eam
facultates respondeant, non est, cur una nota nos
impediat, cur minùs Creticum Daucum credamus,
aut saltè Germanicum, qui Cretico per omnia re-
pondeat. Vel si prorsus alicui non satisfaciunt, quæ
diximus, dicat planè hanc herbam esse Sefeli Creti-
cum [seu etiam in non vocat.] Tandem in Apol. con-
cludit, dicens. Ryff. in Diosc. nostrâ usûs est picturâ.
Falsò autem eam herbam, quam Meum esse affir-
mat, germ. Berwurz vocat [Cornubiæ labor etiam.]
Quamquam typographi erratum suspicor, legendis
pro Berwurz / facili transpositionis errore. Non
esse Meum ut Brunfels. Gefh. & post hos Ryffius
censet, satis monstrat, quòd scil. ejus caules, ac po-
tissimum folia, non sicut Anethi foliis crassiora, sed
magis tenuia. Erit itaque potiùs Creticum Sefeli.
Fuchius malè, nostro quidem judicio, & Daucum
& Sefeli Creticum, vel Tordylon, præsentem plan-
tam pronunciat. Discrepant enim jam nemina-
te plantæ plurimum, ut conferenti eas facili pate-
bit. Rationes quibus Meum esse negat, debiles iunt
& infirmæ, quæ non refutantur.

Spicula.

Imperatrix

Petrum
Meum.Meum tra-
dictum opti-
mum.Daucum offi-
cinarum
falsum.

Serap. err.

Error quo-
rundam
circa Se-
stræ.

Credidimus superioribus annis, inquit Matthi-
 olos, legitimum Meon non esse in Italia, nec eo
 aliunde advehi: primum quod Mei vice uterentur
 septuaginta quibusdam albicantibus radicibus, sa-
 pore Pasticæ simili: deinde quod etiam Plinij
 tempore rarum esset in Italia, quippe qui scripserit
 non ferri in Italia Meon, nisi à Medicis, isque ad-
 modum paucis. Quod procul dubio indicare vide-
 tur, usque ad Plinij ævum peregrinum in Italia fuisse
 Meon. Sed cum herbariorum quorundam dili-
 gentiâ, quædam nuper reperta sit planta, quam
 legitimum esse Meum, omnes ferè rei herbariæ pe-
 riti unanimes affirmant, ne videar mordicus tene-
 re opinionem, facere equidem non possum, quin
 in eorum sententiam deveniam: tamen in contra-
 rium aliqua sese offerat ratio, quod scilicet hujus plan-
 tæ radices odorem non usque adeo gratum spirant,
 sed quadantenus graviter oleant, nec tenues cer-
 nantur, ut Dioscorides inquit. Plinius Meo, folia
 Aniso similia reddidit, vocum fortasse similitudine
 deceptus, siquidem Dioscorides Anethi folijs
 Meum ferri tradidit. Eadem in post. comm. cum
 magn. fig. habet Lat. & Ital. ubi pulchriorem figu-
 ram ponit, & addit folia Asparago magis similia,
 quam Anetho; Imperatricem vocari in Apulea:
 Plinium dicere Meum folia Anisi producere, uti
 etiam reperiatur in quibusdam Dioscoridis exem-
 plaribus, quod dubitandi ansam præbeat. Idem
 in Apol. adversus Amatam hæc tradit. Non cla-
 mo in Italia Meum non reperi, sed plura sanè
 esse scribo, quæ me accipiem reddiderunt, an
 Meum quod nunc pro genuino sumitur, legiti-
 mum fuerit. A Lusitano jam pridem non didici
 in Italia quoddam circumferri Meum, cum ante
 ipsum hoc sciverim. In hanc tamen inclinari me
 dixi opinionem, illud à genuino ac vero Meo
 mihi videri longè dissimile. Hoc etsi simplici-
 ter à me esset dictum, ut meam hæc in parte
 solùm exponerem sententiam, nescio tamen cur
 accusandus magis illi videar, quam admonen-
 dus. At quod in hanc venerim opinionem, il-
 lud in causa fuit, quod plures hujus rei mihi con-
 starent rationes. Etenim est in primis quod vide-
 rim nostratis Mei radices longè crassiores, vege-
 toriæque, quam genuini expetat historia: quippe
 longas & tenues radices Meo reddidit Dio-
 scorides. Est deinde quod eadem graviter poti-
 us, quam suaviter oleant, quam tamen Diosco-
 rides in Meo radices requirat odoratas, non gra-
 veolentes. Est præterea quod mansæ parùm o-
 mnino acrimoniæ respiciant. Atquæ Galeno au-
 ctore, Meum tertio excessu exaltescat, cur non
 illud genuinum acriori vi pollere existimaverim,
 quam quod nuper in usum Medicum conce-
 ssit? Est etiam quod extent manuscripti Dio-
 scoridis codices, qui Meum non Anethi, sed A-
 nisi folijs, conferant. Quod & idem refert Pli-
 nius, quem licet rejiciat Amatus, non tamen
 sine ratione est adductus, ut scriberet non nasci
 in Italia Meum. Nam cum non nisi à Medicis,
 isque admodum paucis ipsum feratur, magnum
 & evidens est argumentum, non ibidem sua
 sponte progigni. Quorum velut peregrini-
 um à Medicis excolebatur, si ubique in Italia
 nunc illud crescere videmus? His itaque pa-
 lam est, ut non abs re in censendo Meo mihi
 plurimum fuerit ambigendum, &c. Verumta-
 men nolui id prætermittere, quin hujusce Mei
 imaginem appingerem, non tamen, ut hoc tan-
 tum argumento fateri viderer, illam genuinum
 referre Meum, sed ut illud nobis ante non igno-
 ratum (ut opinari videtur Lusitanus) ostende-
 rem.

His Matthioli argumentis, si nulla sint vali-
 diora, facile est respondere. Primum, quod ve-
 getiores sint radices, cum tamen tenues Dio-
 scorides dicat, fieri potest, ut locis calidioribus,
 ut in Macedonia tales sint: Præterea Meo no-
 stro non semper crassæ sunt, quod evenit ra-
 tione loci & ætatis. Secundò dixit Dioscorides
 esse, quod vocabulum pro odorato sim-
 pliciter ut plurimum ab ipso sumitur, quin ad-
 diderim habere nostras radices suavem odorem,
 quamvis aliquid gravis habeat. Tertio, quod
 temperamentum attinet, acrimoniæ sanè cum
 amaritudine manifestam habet, ita ut si non ter-
 tio gradu exaltescat, parùm absit à sine secun-
 di, id quod alijs dijudicandum relinquo: ad-
 diderim loci naturam ad id plurimum conser-
 vare. Quarto, de folijs facilis est lapsus, ut ait
 Lacuna. legit fortè Plinius pro *anethi*, *anethi*, facili
 errore. Quintò, ex Plinio majoris momenti
 est argumentum, quod ita infingendum esse
 cenleo. Difficile esse illi pronunciare, non
 provenire plantam sponte in aliqua regione,
 nisi quis diligentissimè omnia loca & mirimos
 ejus regionis (ut ita dicam) angulos perlustra-
 rit, quod an Plinius in Italia præstiterit me la-
 tet. Plinij tempore fortè sponte nata propter
 Medicorum ignaviam nondum conspecta fue-
 rat. Latitabant sanè plures, quæ nostris tem-
 poribus indices manifestantur. Sed unde quæso
 in hortos translata? Quod autem à Medicis cul-
 ta fuerit, factum dixerim, quod digna fuerit,
 quæ hortos exornaret, & non passim prove-
 niret, quales hodie, exempli gratia, Alarum,
 Pyrola, & similes plures coluntur. Non hæc
 propterea dixerim, quod Vrsinam radicem, ve-
 rum Meum asseruerim. Nam crassitudinem
 caulium & altitudinem Meo à Dioscoride attri-
 butam, hæcenus in Meo vulgari non observavi,
 quamvis Matthioli ei tribuat cubitalem, an vi-
 sam, ignoro. Color etiam totius plantæ non con-
 venit cum Anethi colore.

Verum Meum in Italia nasci contendit Ama-
 tus his verbis. Mei herba, in Hispania fami-
 geratissima, tamen hæcenus à multis ignorata,
 caule & folijs Anetho similis est, verum cras-
 sior, radicibus comosis, obnigris, in obliquum
 rectumque sparsis & frequentibus, qua de cau-
 sa hodie multi Fœniculum tortuosum, sive tor-
 tuosum Anethum appellaverunt. Cæterum, hæc *Anethi*
 radices, in medico usu à multis desiderantur,
 quæ facili ex Hispania, & montibus Bononi-
 ensibus in multas orbis partes vehi possunt. Nam
 olim mihi, quosdam agitas convenienti, qui in
 Antverpiam, tanquam celebre emporium inter
 alias quasdam radices adferre & ostendere solent,
 suo nomine *Ertburg* appellatas: quas tamen Mei
 esse herbas, summo opere contendebant: & quæ ex
 herba folia caulæque non dissimilia Anetho ha-
 bente se collegisse affirmabant, eaque de causa,
 ab officinis Germaniæ pro vero Meo habebantur:
 cæterum, minimè ita se rem habere, illud mihi in-
 dicabat, quod præter discrepantem figuram, non
 erant odore [*commendabiles*] quem aromaticum
 Meon Hispanum habet. Nam multi quoque Itali
 pharmacopoliæ pro vero Meo quædam indicant al-
 bas radices, Daucum odore referentes, quæ non
 multum ab illis, quibus Germani utuntur, absunt.
 Atre vera, verum Meum in Italia nascitur, in mon-
 tibus præcipue Bononiensibus, ex quibus Her-
 barij quidam diligentissimè ad nos attulerunt, illi
 non nisi à nobis in Hispania conspecto, simile,
 quod Dioscoridis historiz in universum respondeat.

Matthioli
 argumenta
 refutantur

Fœniculum
 tortuosum

Meu Ge-
 rum in Ita-
 liam nascitur

nam radices exterius nigrae, intus vero albæ sunt, quorum odor similis illi est, quem Fœniculum siccum ex se spirat, suavior tamen: earum quoque sapor non admodum acutus erat, aromaticum quid præ se ferens: quæ in infima parte capillatæ, comæve ad eò reperiantur, ut Spicam Nardi quicunque has radices viderit, primo intuitu esse dicat. A quibus argumentum non mediocriter desumimus, quòd Spica Nardi passim officinis obvia, radix potius, quàm plantæ summitas sit, ut suo dicetur loco. Curabunt igitur deinceps pharmacopola, verum Meum non solum ab Hispania, sed etiam montibus Bononiensibus habere, quum ibidem verum & Athamanticum reperitur. Nec enim veritas ipsa occultanda est hac de causa, quia Plinius scriptum reliquerit, suo tempore Meum in Italia non nisi à paucis Medicis fieri, quem sequutus postea Marcell. Virgilius dixit: Nunc quod sciam, nullum Italæ Meon est: Ob quæ verba Matthiolus in Italia quoque Meum non reperiri clamat. Imò contra Monachos acriter agit, qui in Calabria & Nursiæ montibus Meum nasci, & inde eradicasse se affirmant, quod ita esse crediderim, quum apud Bononiam quoque nascatur: ut testes sunt Nicol. Nicolucius pharmacopola Ferrariensis, & Gaspar de Gabrielis, qui publicè rem herbariam apud Ferrarienses profectur. Accusandus igitur Matthiolus potius est, quum negligens in hac herba inquirenda fuerit, quàm diligentissimi patres, qui desudantes, Nursiæ montes, ut eam inde eradicarent ascenderunt. Interdum tamen avarus Pharmacopola si hac caruerit radice, Galeni & Aeginetæ consilio, Myrobolano, i.e. Glan-de unguentaria uti debet. Hæc Amatus, qui Meum vulgare pingit, & falsò in Germania provenire negare deprehenditur.

Meum verum Dioscoridis reperiri in Italia repetit Anguillara; in Calabria in monte Poline vocari Imperatrice; in Norici montibus ad Castellum S. Angeli Spicura; in montibus Fimochiella. Modenæ ad Castellum dictum Fimralbo, Fimochiella.

De Meo ita discit Cronenburgius. Mei genus unum, quod Athamanticum vocant, à Diosc. lib. 3. refertur. Duo autem à Plinio lib. 20. cap. 23. Hæcenus illo vero caremus: quo passim utimur, Pastinacæ odorem habet, & quibdam Anethum silvestre vocatur, vulgo Germanico Bertwurz. Sunt qui Siler montanum, sunt qui Amomum nostrum hic substituant. In Hispania nunc passim cognoscitur, ac quamquam Plinij ævo Italici fuerit peregrinum, utpote non nisi à paucis Medicis fieri solitum, attamen nunc herbariorum diligentia repertum frequens in montibus Bononiensibus, è quibus commodè ad nostrum usum transferri queat. Cæterum, cur negat Cronenburg. Germanorum Bertwurz esse verum Meum? traditque hoc in Hispania & Italia reperiri. Meum Hispanicum & Italum non videtur diversum, à Meo vulgari Germanorum, dicto Bertwurz. Demonstrant hoc plurimorum autorum propriæ figuræ, quæ in omnibus sunt appellandum, appellandum quoque erit verum Germanicum. Cronenburgius talia scribit, non qualia observavit, sed qualia ex Amato & aliis collegit.

Seseli Creticum Cordo vocatur, quod Bertwurz Germani, Fœniculum porcorum Belgæ appellant, esse ipsissimum Meum, ita Meum Dioscoridis, Coldenberg. apud Cord. in Disp. supra Lithontribon, omnino sibi persuasum habet. Nec radicem ejus tantam, tamve crassam esse (natalibus præsertim locis natam) neque tam

graviter olere ait, veluti Matthiolus voluit. Quæ de Meo Alistuzæ ac Sistra Monachi observarunt, & scribunt, approbat. Et si quispiam adhuc refragetur, pro Meo vero tantisper uretur, dum ipse Dioscoridis genius aliud proferat. Fuchsiū imprudenter Matthiolum carpere idem perhibet, quod ille cum Monachis, hanc herbam Apulis Imperatoriam nominari inquit, quam Anglicam esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur Fuchsius: cum Imperatoris nomine ab isthac Meo admodum diversæ à Germanis demonstrantur herbæ.

Meum tandem verum Radicem ursinam esse contendit in adv. Lob. Mei veri plurimas passim vidi, inquit, plantas, in Germaniæ, Italici, Gallici, Hispanicique locis Alpini: Radix est odore suavi, Spicæ, vel Anglicæ, caule & foliis Anethi, umbellæ candidæ, Junio & Julio florens. Semen Hippomarathri, odoratum. Eadem in celsissimis montium jugis sterili Sevenz, præsertim loco cui nomen gallice l'Esperon, i. e. calcar, monticulis Cestre nuncupatur vernaculo nomine, uti Platearij & Pandectarij ævo, cui nulla doctiorum omnium suffragio deest nota veri Mei Dioscoridis. Cujus etiam sententiæ est Turnerus, qui in ora Septentrionalis Alpibus Cheveotici Scotici finitimis, magnâ ubertate scaturiens hanc stirpem nos monuit. Vix enim ante annum 1560. primùm hac planta Venetis pharmacopœis innouit: nam tamen si radices ad Theriacæ confectioem ex Syria & Apulia advectas norant, & in singulis libras singulum aureum ducatum infistori pendebant; tamen exoticâ putabant, nec ullo loco Italici oriundam, ut qui neque caulem foliave vidissent, & Herbariorum Senensi dictatoris summi placitis acquiescissent. Hic enim Massiliensium & Monspelienfium Anethum Fœniculūve tortuosum, tortuoso errore, verum Dioscoridis Meum astruxerat, ansamque illis errandi præbuerat. Quin ne nunc quidem, ut errorem aut tegat, aut foveat in postremis commentationum recoctionibus atque recantationibus, nisi invitum hanc genuinum esse fateatur: Et fatali suâ modestiâ argutur, odorem quadantenus virosū, folia non Anethi, sed Asparagi, radicibus non adeò tenuibus; tum paulò mox subdit, Appuli Imperatricem vocant: quo quidem vocabulo, ubique fere locorum ignara herbarum plebs solita est alicujus incognitæ plantæ eximium & gratum odorem & vires insignes signare: Sic enim vulgò etiam Anglicam Imperatricem vocant: alioquin Anglicæ, aut Imperatoricæ cum Meo nihil est affinitatis, nisi odoris, qui in Meo perinde jucundus est. Et petitis indicio est eum neque multas radices hujus eruisse, neque folia planè perspecta habuisse; sunt enim sita & similitudine Anethi, non Asparagi, ut asserit: cui etiam si essent similes, tamen ambitionem sic suam magis proderet: Asparagum namque meipse Fœniculo assimilat, & Anethum adeò simile Fœniculo asserit, ut plerumque colligentes fallat. Ne porò in multò reconditionibus plantis, deinceps fallamur à Matthiolo, cauto ura & summa erit, non temerè ejus argutis inductionibus, pidiūve credere.

Dodon. gall. Meum vulgare inter Libanotides reponit, & perperam Libanotidis primum genus ficit, vocatque ait à Dioscoride Zea & Campanema; semen à Grecis Canchrys aut Cachrys. Sed hæc eam erronem opinionem, retractat in foliis lat. & merito.

An de hac quatuor Cæsalpinus, ut vult C. Bauhin dubito. Si enim hoc vulgare Meum intelligit, miror eum

Spica Nardi radices emulantur

Matth. reprobat.

Monachi exen/amur

Imperatrice.

Fimochiella.

Negat Meum, Cronenburg.

Anethum silv.

Substituta.

In Hispania notum Germani.

In montibus Bononiensibus.

Cronenburg.

reprobat.

Meum Dioscoridis.

Coldenberg.

Fuchsi reprobat.

Cestre

Mal. Fam. sorta.

Impe

Aug.

Meu par.

carri thiod.

An alp. Cæsalp.

eum ipsi adscribere flores luteos. Meum, inquit, in Alpibus nascitur, foliis Anetho angustioribus, longioribusque & tenuioribus, crebrioribusque capillamentis: caule cubitali & altiore, flore luteo, semine Fœniculi oblongiore: radice nigra extenuis, in longas fibras divisa: odore valido, sapore amaro: Quidam Imperatoriam vocant. Apud Plinium depravatè legitur pro Anetho Aniso.

Trago, ut hoc breviter repetamus, Ear. Cordo (qui tamen dubitare videtur) Fuchsin fol. & in 8. in hist. dicitur Daucus Creticus. Lob. Ic. p. 777. Daucus Creticus Fuchsin Ic. & Lonic. Sefeli Creticu n. Cord. hist. Tordylion. Dodon. gall. Libanotidis i. genus, & Fœniculus porcinus. Cordo in Diosc. Meum. Gesn. hort. Anguill. Lob. adv. & obs. Dodon. lat. Matth. Castr. Turn. Lugd. p. 753. Camer. h. Lac. & Tabern. Meum. Sylvio Meum Dioscoridis descriptionem explens. Ben. Aretio Meum quorundam. Clusio Meum vulgare tenuifolio. Bauh. phyt. & apud Matth. Meum i. foliis Anethi, Meum Dioscoridis & Plinij, Hordylon Nicandri, & Tordylon Aginetæ. Nimum securè. Eid. pin. Daucus alpinus, Gesn. col. Lob. ic. Meum, Lac. (cui & Anethum silv.) & Ger. Daucus Lac. ic.

Græcis *ὑμνὸν* vel *ὑμνόν*. Lat. Meum. Ger. *Bergwurz*. [*Radix ursina vel urfi*] *Schwendel* [*Fœniculum porcinum*, *Hier. Braunschew*] & nonnullis ut Matth. in hist. germ. *Bergwurz* & *Bürdilen*. Ital. *Meo* & *Finocchiella*, Lobel. Hispanorum quibusdam *Sistra*, aliis *Pinello* & *Pinillo oloroso*. Ang. *New*. Bohem. *Borpenst*.

Ex dictis constat meum vulgare provenire in Hispania: montibus Bononiensibus in Calabria ad montem vocatum Polino: in montibus Nulsiæ, ad Castellum S. Angeli: in montibus Modenæ, ad Castellum S. Angeli: in montibus Modenæ, ad Castellum dictum Fum'alboria Gurgano Apulie monte: & monte Fractio ad lit Gesnerus. Fuchsin Germania nusquam copiosius, quam in Martianæ silvæ quibusdam pratis. Pannonicarum Alpium jugalere, sed nullibi gentium frequentius observare, quam in *Sürtenstein* meminit Clusius. Nisi refert Dodonæus (ut & Lob.) in pluribus Italiæ, Germaniæ, Hispaniæ, ac Galliæ locis, montanis quidem, sed campestribus ac apricis; descendere verò & ad plana. Belgiorum, sed tamen haud peregrinum. Laudari Athamanticum & in Hispania natum. Radicem resistibilem novo Vere nova proferre folia: cauliculos postea erumpere cum umbellis: Iulio flores, seminaque perfici. Ego in Germania variis in locis observavi, ut in valle Sebenthal propè *Massmünzster*, ultra fodinas stadionum circa *Plumbarias* thermas; item in monte *Rosberg*: *Tubingæ* in horto *Fuchsin*: *Basileæ* in horto *Zvingeri*. *Monspelij* verò observavi in *Sevenum* monte *Esperon* Autumno, virentem.

Qui existimant Radicem ursinam, verum esse Meum antiquorum, videant vires ex antiquis ante. Apuli hanc ad venenosorum serpentium morsus præferunt, autore Matthiolo; Gesnerio Mei pabulo in Apulia vaccæ plurimum & optimum lac reddunt. & inde Caseum caballinum dictum confici, se audivisse refert.

MEVM ALTERVM ITALICVM quibusdam.

an al. *M. 111.* Vnt qui plantam, quam secundo loco appinximus (inquit Matth. in Diosc. in comm. cum mag. fig. anni 1583.) pro meo usurpent, quod magis Anethum, quam alterum referat, quorum sententia non mihi omninò improbanda videtur: siquidem priori

Tom. III.

positus Asparagi, quam Anethi folia insunt. Hæc ille qui, omisit figuram, licet se tam secundo loco appinxit se subat.

De hoc Meo hæc Lobel. in Obs. p. 450. Sputium Meum ad Meum alterum Italicum, Meum secundum Matthioli, superiori Meo [vulgari] non ab simile: sed folia, caules cubitales, umbellæ, crassioræ & habitioræ, subviroli odoris. Radix item major, foris pulla, Peucedani facie & concretionem, rēri & in jucundi, cum odoris, tum saporis. Et Hujus Metalterius sputij Italici Lobelij, cujus pictura in omnibus Matthioli editionibus omissa fuit, ex Lobelij ic. p. 778. exhibet Lugdunum p. 59.



Bauh. apud Matthioli. Meum 2. adulterinum & Talduterinum: Sputium Meum alterum Italicum Lobelij. Caterum, Lobelius non tradit colorem floris Mei Italici. icon ejus videtur exprimere Apium silv. Dodonæi. Eid. B pin. Meum 4. latifolium adulterinum.

Ponæ in Baldo Sefeli Massiliense genuinum frequētissimum: forte Meum Italicum Lobelij.

MEVM, DAUCI CRETICI facie.



Vnt qui Meum *Lacini* hic depictum pro genuino habeant, quod in Allobrogum & Sequanorum montibus frigidissimis & altissimis nascitur, radice dimidio pedale longiore, foris nigra, Dauci Cretici modo, intus candida, brachiata, odorata: cauliculis multis, nervosis instar Fœniculi, tres aut summum quatuor digitos altis: foliis brevibus, capillaceis Fœniculo similibus, flore candido, umbellis de-

gs: semine minutissimo, amaro, & suaviter olente.

Et ita describit Lugd. p. 759. sub titulo Mei alterius. *Synon.*

Bauh. phyt. nominat Meum alterum umbellatib. Eid. pin. Meum 2. Dauci Cretici facie: Meum apud Lugd. An hec ante legit Gesn. in d. scr. Morris fracti lib. de Lunaribus, ubi ait reperiri in eo montem Daucum montem brevissimis & minutissimis foliis, quem quosdam nulla ratione *Wolffgang* [*in ipi radicem*] vocare refert, nascique in summo loco, *U. iderfeld* appellato, tradit radice Mutellinae simili calcoli.

FOENICVLVM TORTVOSVM.
CAP. VII.

Defr.



FŌENICVLVM tortuosum vocant Mōspelij herbam cubitalem interdum maiorem, caule striato, medulla alba pleno Clusio unico, interdum Cubitali, sed sapissimè minore: mox à radice in varios contortos ramos firmos diviso, crassiusculo, brevibus internodiis intercepto. folia fœniculacea, nō ita tenuia, breviora, videlicet palmata, rariora, duriora, colore ferè Anethi: Clusio Anethi

ferè exilia, & minutim incisa, Rutæ propemodum colore: umbellæ parvæ exiguis floribus, quinque foliolis albis: aut etiam Clusio purpurascens, constant: semina alba striata, Dauci mei glaucifolij feminibus ornanō, uti & tota planta, similia, semen Apij Clusio: radix longa, alba, crassiuscula, digitalis etiam interdum crassitudinis Clusio, comata, aromatica: tota planta odorata est.

Seseli M. af. Camerarius, qui figuram habet ex plantis nostris, communicatis D. Gesnero, in epit. & hist. vocat
Seseli M. af. Seseli Massiliense nonnullorum, Gallorum herbariorum Fœniculum tortuosum: De hoc Lob. in ad-
mor. & Lob. versat. aut. Seseli Massiliense, folio Fœniculi crassiore hoc titulo est in Icon. p. 785. planta est valde nota, Fœniculi tortuosi nomenclatura, quæ ad Theriacæ exquisitam confectiōem, Mompeliensium Doctōrum instituto, Rondeletij præsertim, additur, cuius sententiam nō raro sequor. Neque quantum illic locorum est Massiliæ circum lustranti, ullam plantam videre est, quæ magis quadret Seseli, proindeque hallucinantis commentatoris [*Marbolsi*] Tridentinum Seseli neutiquam genuinum essequit: quid verò sit, cum ille describere non ausus sit, mihi ignorandum. Illud tamen ignorandum, me in Tridentinis Alpibus hanc plantam uspiam vidisse, ac ne in Baldo quidem monte longe illis feracior. Idem de Meo dicit. Senensis Massiliensium & Mompeliensium Anethum, Fœniculumve tortuosum, tortuoso errore verum Dioscoridis Meum astruxerat, ansamque errandi Pharmacopœis Venetis præbuerat.

Memorat hoc Clusius hisp. & hist. cap. de Selino peregrino, his verbis. Selino non possum non adungere umbelliferam quandam plantam, quæ mihi plurimum accedere visa est ad Seseli Massiliensis historiam à Dioscoride traditam, quam Mompelianni Fœniculum tortuosum appellabant: Castellani verò *Enxalmus*.
Hujus Lugd. p. 749. duas figuras exhibet, quarum neutra placet. Primam ita inscribit: Fœniculus tortuosus Dalechampi; Alteram sic: Seseli Massiliense Penæ.

Fœnic tortuosum, Clus.

Eupd. icon. nes dua.

Fœn maritimum, M. af.

Cæs. pro Seseli Massiliensi describit, ac Fœniculum marinum appellari tradit, describitque hoc nomine à Dioscoride: sed apud Theophrastum & Plinium mentionem quidem repertam, non autem descriptionem: Aristotelem tradere cervas à partu Seseli herbam petere &c. Recentiores Medicos Se-

feli corrupto vocabulo Siseleos vocare, & Siler *Silerca* quoddam campestre. *pestra.*

Bauh. phyt. Seseli 7. five Massiliense Fœniculi folio: Seseli Dioscoridis habitum. Apud Matth. Seseli Massiliense nonnullorum, umbellis albis, rariis subpurpurascens: semine Apij formâ, acri, calido. In animadv. in Lugdunensem testatur Fœniculum tortuosum Dalechampi Lugdunensis, & Seseli Massiliense Penæ esse figuras unius plantæ, quarum neutra sit perfectâ: ac idcirco se novam in Matthiolo proposuisse: cum priori figura multum convenire Meum aliud Lugdunensis p. 759. positum. Quam diximus ante à Camerario exhibitam ex nostris plantis, eandem assumpsit C. Bauhinus. Descriptio præterea Mei alterius non convenit huic: est Mei Dauci Cretici facie. Eid. B. pin. Seseli 9. Massiliense. Fœniculi folio, Seseli Dioscoridis creditum: Seseli Massiliense, Ang. Dod. Lugd. & Cæs. Fœniculum petrarum [*exsistimamus nos hoc Fœniculum esse referendum, ad Daucum glauco folio.*] Tab. Variat in foliorum crassitie, tenuitate, longitudine, brevitate & divisurâ: in omnibus tamen glauca sunt.

Fœniculum tortuosum Mompelij passim copiosè provenit: florens vidi in superficie trium illorum admirabilem Pontium du Gab in rimis saxorum mense Maio & Septembri. Sunt qui propè colles oppidi Montisfalco inter Senam & Romanam observant. Copiosum in maritimis Pisanis Salmanticensi agro observabat Clusius in vinetorum marginibus juxta vias & semitas, etiam agro Mompeliano, & toto illo tractu Massiliam usque.

Semen subamarum, calidum manifestè, non ineptè pro Seseli Massiliensi usurpandum esse censet Camerarius.

DAVCVS GLAVCO FOLIO, SIMILIS FœNICULO TORTUOSO: CAP. VIII.



Saxorum inter-
Svenius pertinacissimè inhaerent
radices albae, minimi ferè digiti crassitudine, rugosæ, acriusculæ, cum levi amatore aromaticæ, ex pluribus coëuntibus constatæ, moxque in alias rursus post coitum divisæ, quæ caulibus committuntur Daucorum more capillatæ: caules verò plures bicubitales sunt & altiores, graciles, striati, sububerantes, medullâ albâ facti, ramosi: in

quibus ad articulos folia Anethi, aut Fœniculi tortuosi, pediculis longis: particulae latiores, crassiores, rigidiore, quam in Fœniculo, & veluti pungentes, colore glauco, sapore acri umbellæ parvæ flosculorum perpusillorum primùm perpurascunt, explicate albecunt magis, apiculis purpurantibus inter folia interjectis. Semina propiusquam maturescar t quiddam purpurascens habent ea parte qua decedit flos, ubi maturuerunt, alba sunt, striata, & Fœniculi tortuosi feminibus similia, saporis aromatici cum quadam acrimonia. Tota herba omnibus partibus similis Fœniculo tortuoso mirè variat pro locorum ratione & anni tempore.

An Gesh. coll. Peucedanum in horto meo, caule est dodrans, foliis crassifolius, per terram sparsis, umbellis albis. floret Maio.

Clusius videtur nostram plantam describere pro Peucedano Pannonico, quod non multum differre putat à Saxifragia secunda Matthioli, idque frater C. Bauh. idem planè esse pronunciat. Quia autem planta, quam à fratre pro Saxifragia Matthioli accepimus, non parum à Dauco nostro glaucifolio differt, ut lectores rem possint diligentius perpendere, integram Clusij descriptionem hic adscribimus. Peucedanum quod in Pannonia observabam, inquit ille, radicem habet, ut plurimum pollicaris crassitudinis, interdum minorem, nonnunquam etiam majorem, longam, crasso cortice, modò candicante, modò fusco & nigricante testam, gustu initio Pastinacæ, deinde nonnihil æcri, transversis & obliquis aliquot crassioribus fibris donatam, supremò capite hirsutam: ex qua quinque vel plura exeunt folia, Peucedanò vulgari & legitimo ferè similia, sed minora & breviora, colore ex viridi cæruleo, non, ut illa, nigricante, subamaro sapore, & odore ferè ignavo, nihilque singulare referente: caulis inter illa assurgit cubitalis, rotundus, gracilis, in multos ramos divisus, in quibus umbellæ candidorum florum: semen Selini ferè, breve & crassiusculum, geminum ut in omnibus penè umbelliferis, cineracei coloris, saporis verò aliquantulum amari & acris. Provenit multis Vngariæ & Austriæ inferioris locis, montium acclivitatibus petroso, & salebroso Solo, ubi Junio floret: at in illarum regionum Alpibus (ubi etiam nascitur) Julio & Augusto, & subinde semen ferè non definit. Non multum differre videtur à Saxifragia secunda Matthioli.

Tabern. Fœniculum petræum, Streinschkel & Bergschkel / Fœniculum saxatile & montanum. Lugdunenl. p. 766. Libanotis minima. Quia Dalechampius vocat Libanotin, ideo occasio suspicandi nobis offertur, eandem fortè tradi à Lobelio in adverb. p. 357. pro Herbariorum Septentrionalium notiore Libanotide. quædam tamen nos dehortantur, ita ut cogamur separatim ejus historiam tradere, donec aliquid certius, de ea cognoscamus: Posset videri ab hac diversâ Libanotis minima Lugdunenlis: verum eam differentiam à loco pendere suspicamur.

An Bauh. apud Matth. phyt. & pin. Peucedanum; minus: Peucedanum Pannonicum Clusij: Saxifragia; Matth. Lugd. Cast. Saxifragum, Lac. Peucedani facie pusilla planta, Lobel. ic. Peucedanum pannonicum, Clus. hisp. & hist. Matthioli Saxifragia; huc non referenda. Est enim diversâ à Peucedano ejus tertio, sive minore. An Eid. phyt. Libanoti sive minor umbellâ candidâ: Libanotis minima Lug. p. 766. quara multum cū Saxifragia Anglicana Lob. Icon. p. 784. convenire tradit. An Eid. pin. Libanotis Ferulæ foliè 7. sive Libanotis minorum bellâ candidâ: Liban. Septentrionalium herbariorum, Adv. Libanotis minima, Lug. Nos de Libanotide Septentrionalium herbariorum, mox dicemus.

An Lob. ic. p. 357. & adv. Peucedani facie pusilla planta, an Pseudobunion Dioscoridis? Palmatis, Peucedani facie, foliisque, sed brevioribus, & ad Fœniculum tortuosum Selch Massiliense accendentibus, ramulis intortis latus, in alas sparsis, concoloribus: umbellâ exiguâ, candidâ, Anethi semine, Anisi breviorè, exiliore, gustu grato, aliquantulum æcri: radice crassiore, comosâ supernè, gustu Oroscelini, non longâ, parvi Napi, crassiore, quàm pro sui parvitate, cibo idoneâ: qualem Bristolæ in Angliâ, ad rupem Vincentij, ipse primum magna copia reperit, & icone dat.

Tom. III.

Daucus glauco folio florens Junio & Augusto, semen maturans Septembri, provenit inter dumetosa loco herbido circa patibulum Montbelgardense in colle. Item prope hortum E. C. parva admodum & palmatis, & magis glauca: locis enim siccis & Soli expositis delectari videtur: in hortos, ob magnitudinem quam in eis acquirit, translata, multum de forma mutat, ut quis diversam putet. Nascitur Fœniculum petræum Tabernomontani locis saxosis, in montibus altis & rupibus, in Burgundia apud Mufacon inter Dolam & Bizantium ad cautes sub Buxis, locis à Solle illustratis.

Fœniculum petræum, inquit idem, vim habet calefaciendi, ceu Fœniculum. calidum autem est in secundo gradu; siccum in primo. Calculum pellit & urinam movet.

DAUCO GLAUCO FOLIO FOR- tè similis, Libanotis Septentrionalium, flore candido, semine ferè Ammi.

Hanc Lobelius in Adv. Herbariorum Septentrionalium notioerem Libanotidem vocat, & hæc de ea scribit. Non petinde Libanotidi congruit hæc Ferulacea, quàm multi Herbarij hortis, in Gallia, Germania, & Angliâ fovent: tametsi caule gracili, recto, Mei, aut Anethi, striato, atrovirente, bicubitali sit, paucis alis & geniculis donato: in quibus, imis præsertim, Peucedani prolixiora folia, Fœniculi tortuosi, angustiora. Saxifragiæ Anglicæ, medio & superiore caule pauciora, umbellis & floribus pusillis & candidis, Mei: sed exiguum semen, sub Hyemem maturans, minus Carvi rotundi, ferè Ammi officinarum par, quod neutiquam potest convenire Rosmarini fertilis Dioscoridis semini, Cachryn, aut Caneryn vocati, quia grano hordeago esset simile, aut potius quod urentis facultatis cum esset, similem escaram inurebat cuti, atque pilula Cæcri propterea ab antiquis vocata.

Descriptio hæc Lobelij habet multa, quæ conveniunt cum Dauco nostro glauco. quid autem velit per Carvi rotundum, nos latet: hoc epitheton nondum alibi legisse recordamur.

SELINVM MONTANVM PVML- lum Clusij, foliis Fœniculi aut Peucedani, flore albo, semine Selini.

CAP. IX.

Aliquot à radice spargit folia, Fœniculi aut Desfer. Peucedani foliis formâ quidem similia, sed longè minora, & rarè pluribus, quàm quindenis foliolis constantia, è quorum medio dodrantalem, crassumque fert caulem, in multos tamen ramulos divisum, sub quibus alia foliorum alæ minores nascuntur, novenisque duntaxat foliis constantes, latâ basi caulem amplectuntur. Pastinacæ sive Staphilini gustu & odore: singuli rami exiguum florum quinque candidis foliolis prædorum cum totidem staminibus, & odoris expertum umbellulis sunt onusti: quibus succedit semen Selini semini non dispar: radix supremâ parte in crassum caput extuberat, multique villis (qui foliorum superioris anni fibræ sunt) hirsuta, brevis, quasi in orbem convoluta est, intus fungosa & alba, exterius fusca & rugosa, infernâ parte bifida plerumque & in raras fibras desinens.

Synon.


Clusius descriptionis autor vocat in pan. & hist. Selinum montanum pumilum. Tab. Oreoselinum, Apium montanum, *Bergpeterlin / Bergeppich*. Bauh. phyt. Peucedanum 4. sive Peucedano similis, Selini semine, Peucedani facie pusilla planta Lobelij. An Selinum montanum pumilum Clusij? plurimum convenit cum superiore [*Peucedano minore, sive Pannonicum Clusij*] si non idem. Vix adduci possumus à C. Bauh. ut credamus, hoc

C. Bauh.

Locus et
Tempus.

tio. Biennalis esse arbitrat, uti pleræque sunt umbelliferæ, quæ proloato semine perire solent.

SAXIFRAGA MATTHIOLI TENUIFOLIA & umbellifera.
CAP. X.



contra Dioscoridis morem proferatur: tamen id mihi dissimulandum non putavi, Saxifragæ plantam habere, nosceréque Italiam, ejusque usum præcipuè expeti ad renem & vesicæ calculos comminuendos, & ad urinam remoratam ciendam: Eam autem in Hetruria pluribus locis è durissimis erumpere saxis, foliis capillaribus, Epithymo non dissimilibus, præsertim Argentario promontorio in maritimis. Inveniunt quædam in agro Goritienfi, quibusdam saxis enascentem, juxta Sontij fluminis ripam, quæ Salicano rure itur Canalum. Sed aliquis fortasse objiciet, hanc plantam non esse legitimum

Saxiphragon à Dioscoride descriptum, quoddam ea nullis ferè notis Epithymum repræsentet. Neque id quidem temerè objicietur: etenim non video ego, quomodo Saxifragon rectè Epithymo assimilari possit. quod illud frutex sit, hoc autem tantum abest à frutice furculoso, ut videatur potius esse quoddam capillamentum. Idcirco facile adductus sum, ut suspicer codicem Dioscoridis depravatum esse: aut Saxiphragon frutex erit, qui foliis duntaxat Epithymum æmuletur, ut illa folia satis ostendunt, quæ in hac planta, cujus imaginem hic expressimus, capillorum instar tenuissima conspiciuntur.

Quam porro Matthiolus in priorib. coram. pro Saxifraga Dioscoridis habuit, eam in postremis rejecit. Præter Saxifragam Dioscoridis sive Vetonicapæ Pauli, tria alia Saxifragæ genera novimus (inquit in post. coram. cum magn. fig. ubi præsentem plantam Saxifragæ secundæ titulo pingit) quæ frangendis eductæque renem calculis plurimam præstare videntur. Primum illud est, quod antea Dioscoridis Saxifragam esse suspicabamur. Nascitur hæc in magnis ac durissimis lapidibus, aut sicco, & admodum extenuato solo, foliis capillaceis, Fœniculi modo, sed longioribus, tenuioribus & rariocibus. Caule pariter prodit fœniculaceo, sed tenui ac pumilo; umbella in summitate emergente, Semine vulgaris Petroselinæ æmulo, sed longiusculo, & odorato. Radice albicante, Pastinacæ sapore. Totâ plantâ subacta est, & subdilis. Eadem in Ital. comm. habet, ac pro Saxifragâ, pingit; ceu & in epit. cum add. Cam. ubi hæc adduntur vires. Radix urinam ciet & menses quovis modo sumpta: visum acuit, & obstructions referat. In Hist. germ. cum eisdem Cam. addit, vocat Welschen Steinbrech / Saxifragam alteram, aitque esse foliis Fœniculi, aut Anethi, & talem etiam caulem, nisi minorem & laxiorem, umbellas parvas, & in suis semen. Hanc herbam utilem adversus icterum, incipientem hydropem, suppressa menstrua, diuturnum capitis dolorem, à pituita & frigidityte ortum: Succum foliorum in oculos instillatum albugines tollere & principium suffusionis, ac efficacius quàm Fœniculum.

Matthiolus olim pingebat suam Saxifragam sine descriptione, quàm postea mirum evariet. in post. etiam comm. omittit loca, in quibus viderit, quasi olim non ibi observasset. in epit. vires alias addit, alias item in hist. german. denique in tanta varietate versatur, ut quis jure merito dicere posset, eum non cognita, aut non experta, aut non ritè considerata scripsisse. Frater C. Bauhinus attulit mihi plantam foliis amplis, Anethi tenuissimè divisis cum hac inscriptione: Petrasindula Italarum Guilandino, Saxifragia Bononiæ, Daucus primus Dioscoridis: hanc asserit collectam in horto Patavino; Similis mihi planta crevit Genevæ, quam tunc oblitus sum describere aut saltè miconè exprimere.

De Saxifragia ferulacea Italarum (quam eandem cum Matthioli jam dicta suspicor) Lob. in advers. ferul. p. 352. talia scribit. Quidam horti Italici, ut Urbini & Florentiæ, alebant Saxifragiam bicubitalem, foliis ferulaceis, aut Fœniculi, minutis, aut minimè geniculatis, tenuioribus foliis, obscure virentibus: floribus umbellatis, albidis, Mei, cujus videtur species. Radices albicant, Pastinacæ sapore.

Bauh. apud Matth. & in pin. Saxifragiam tertiam nominat, Peucedanum minus, & Saxifragam; Matthioli, Lugd. Cast. Saxifragum Lacunæ, & Peucedanum Pannonicum Clusij. An verò Peucedanum Pannonicum Clusij, idem sit cum Saxifragia Matthioli, est quod dubitem. Peucedano Pannonico folia sunt minora & breviora, quàm Peucedano vulgari: sapor amarus: Saxifragiæ Matthioli folia Fœniculo longiora & tenuiora, sapor toti plantæ sub-

subdulcis. Planta etiam quæ mihi data longa habet folia. Et hæc cause sunt cur separatim Peucedanum Pannonicum à Saxifraga Matthioli, & junxerim illud Dauco glauco folio, donec aliquid certius addiscam.

An Cæll. 7. c. 15. de hac loquitur, cum ait. Est quedam pusilla, quæ in apicis alperis nascitur inter saxa: paucis foliolis, rarioribus capillis, subcandidis: cauliculo exili non ultra duos dodrantes: ramis tenuissimis instar filamenti, quibus flosculi candidi cæu florescentes in sparsis umbellis: semen in Autumno figura Apij, exilius, nigrum, & aromaticum; acre: radix subrotunda, in tres aut quatuor ramulos divisa: sapore aceti & amaro. Quidam Saxifragam vocant: arbitror Cuminum Ethiopicum dici. Hanc Cæsalpini plantam non audemus asserere eandem esse cum Saxifraga Matthioli: quedam enim notæ repugnare videntur.

SAXIFRAGIA MULTIFL.

do folio, Pannonica.

C. A. P. XI.



ni radici non multum absumilis, sed brevior, acrior, salivamque ciens, multa hirsuta capita superna parte producens, è quibus folia & caules emergunt.

Clusio pann. p. 694. Saxifraga Pannonica. Bau. phyt. & pin. Daucus 3. montanus multifido brevisq. folio.

Inventa à Clusio descriptionis auctore multis Hungariæ & Austriæ inferioris locis, montium acclivitatibus petroso & salebroso Solo, præsertim verò in aperto & glabro illo monte, qui medium, quasi spacium, inter Hamburgum & Altenburgum Vagariæ urbes, occupat, etiam è mediis faxis plerumque erumpens. Sed & colliculo juxta Zimmerin, itinere ad phasianorum, juxta Lachn, & plerisque aliis circa Viennam locis crescit. floret Julio.

SAXIFRAGIÆ TENVIFOLIÆ

affinis, quibusdam Cauclis.

C. A. P. XII.

Hanc Anguillara epist. 7. Cauclin vocat, ac nãci in Peloponneso & multis aliis locis in faxis prociit, foliis Fœniculi, caule cubitali, umbella alba, semine Ammi: comedi: odorem habere Petroselinii,

vocari ab eis ἀγγύλαριον. i. e. Apium silvestre: verba quæ legantur in Dioscoridis quibusdam exemplaribus (*Silva Apij similibus*) superflua esse, ut appareat



ex textu græco & Plinio: Chrysipum vocasse Oulus saluginosam: Videri se intellexisse in Apulia provenire plantam, quæ dicatur Pietra hindula, quæ multum respondeat descriptioni hujus Caulicidis.

Plantam, quam Caulicidem Anguillara autumat, Lobelius jam dudum collectam in præruptis S. Specus vocati, ad sanum Magdalencin Provincia Narbonensi pingendam curavit: est verò caule Fœniculi & foliis & divisurâ cubitum alta: umbella albet & odorata est: radix unica, recta, humi pacta, candida, sapore Pastinacæ. Verum hoc magis placent vulgares Caulicides.

Lobelio in hist. Belg. p. 389. & Icon. p. 717. Cauca. Synon. lis dicitur. Lugd. p. 715. Caulalis Penz. Tab. Caulalis Anglica, Klerren Körffel. An verò nomenclatura hæc germanica conveniat, judicet vel medicoriter doctus. Bauh. phyt. Peucedanum 5. sive Peucedano similis: Caulalis 3. Tab. in fol. Eid. B. pin. Caulalis 12. folio Peucedani.

APIUM, QVOD PETROSELINUM

Dalechampi folio tenui, Apij hortensis semine, subrubro, amaro, radice nigra.

C. A. P. XIII



Radix longiuscula & crassa, foris nigricat, intus albet, capite comato, eandem more quæ plures annos perdurant, sapore amaro. caules inde pronascentes plures, fungosi, striati, pedales, interdum palmares dütaxat, foliis amicti, Dauco glauco folio similib. caulii scapus tripartitus primùm: laterales firculi umbellas gerūt flosculorum albicantium, parvas per florendi tempus, magis patulas euntibus in semen floribus: medius firculus rursus trifanum subdividitur, umbellis similibus ornatus. semen Petroselini vulgaris.

Petroselinum hoc Dalechampi putatum, in fasc. Locm. xosis tumulis propè Gracianopolim nascitur, ut testatur p. 702. Lugdunensis.

Synon.

B. pin. Apium 5. montanum folio tenuiore, Petroseleum Dalechampi, Lugd. an Petroselini succedaneum, quod in Apulia Anethum silv. dicitur, Colum.

PYRETHRVM VETERIBVS.
CAP. XIV.

Diosc.

EST Pyrethrum, auctore Dioscoride, herba quæ caulem & folia velut Daucus silvestris & Foeniculum producit, umbellam velut Anethum rotæ similem [respondeat cod. Bas. forte legendum respondeat]. Radix est digiti magni crassitudine, gustanti fervidissima, quæ pituitam attrahit. Quare etiam dentium doloribus opitulatur, si cum aceto colluatur. Dicit etiam pituitam commansâ. Quod si cum oleo illinatur, sudores movet, faciens ad rigores diurnos. Sed & ad corporis partes perfrigeratas, aut resolutas summè conducit.

Aldrov.

Pyrethrum Plinius non descripsit, sed semel tantum l. 28. c. 9. simpliciter nominavit. Galenus Pyrethri, inquit, radice maximè utimur, urendi vim habente, per quam & perfrigatorum dentium dolores mitigat, & ante rigores per circuitum repetentes, cum oleo affricatur. Torpidis etiam ac resolutis utile est.

Acquisic.

Ceterum, notum esse vulgò omnibus Pyrethrum, & maximè radice in dentium dolore usum contendit Cornarius. Sed longè aberrat, meo quidem iudicio. Plures enim hodie hoc nomine plantæ passim inveniuntur.

Pyrethrum flore Buphthalmi.

Et primò Pyrethrum vulgare flore Buphthalmi de quo H. n. g. lib. præcedenti.

Dehinc, Pyrethrum umbelliferum Matthioli, de quo mox dicemus.

Cassia gen.

Item, Pyrethrum Gesneri. In Cotula genere in Gallia tradi radicem serventis gustus, idèoque Pyrethrum vocari, auctor est Casalpini. Quænam hæc sit, nos hætenus latuit. Si locum adnotasset, posteri indagare possent, qualisnam esset, & supplere brevitatem, propter quam Casalpini merito reprehendendus est.

Saxifragia.

Quam Saxifragiam hircinam majorem, aut saltem mediam putamus, eam alij ex rei herbariæ prudentibus pro Pyrethro quodam ostendunt.

Parnassica.

Pyrethrum nominant Parnassicam, quod Pyrethri modo, quamquam mitius vellicet. Atque hinc est, inquit Fuchsius, quod nonnulli pro vero Pyrethro, seducti ejus utillante acumoniâ, describunt.

Dracunculus hori.

Radix penè nulla Draconi [Dracunculi hortensis] eorum arguit temeritatem, qui Pyrethrum fecere.

Tanacetum.

Apud Eucharium Roesslin Pyrethri vocabulo, icon Tanaceti posita est.

Valeriana silv.

Pyrethrum de Valeriana silvestri dici, vide sub Pyrethro vulgari.

Staphysagria.

Pyrethro substituere videtur Platocomus uvam Taminæam, i. e. Staphysagriam.

PYRETHRVM VMBELLIFERVM Matthioli.

Pyrethri veri (ut Matthiolus ait) hæc est planta, cujus imaginem in post. comm. cum mag. fig. lat. l. 3. c. 71. Ital. cap. 80. expi. sit, quamque se non sine labore confectionem esse scribit. Sed unde, non ostendit, nec figuram eam describit. In epit. cum addit. Cam. Pyrethrum verum inscribitur, ac res. Græcè, arab. Machararacha, seu Hachararacha, italicè Pyrethrum, german. Bertram, l. sup. l. 1. & gall. Pyrethre cognominatur, ibidèque ei Pyrethri

Dioscoridis descriptio, ac vires adduntur, non sine gravi lapsu, ut ego quidem existimo. In hist. germ. ejusdem, Pyrethrum alterum vocatur, ac præter dicta Bohemicè Beltram appellatur.



De Pyrethro altero, in enim Lob. in Adv. præsentem hanc plantam vocat, hæc scribit. Pyrethri veri nomine donabat plantam Guilandinus, & alebat in Patavino horto, cui radices & folia Cotulae fide. Umbellæ ab uno quasi centro multis pedicellis innixæ, Venerei penis ritu, aut Anethi, candidis flocculis, fervido & amariante gustu. Sed illud lectori Senilis, qui hæc non nisi labore arduo si-


bi comparatam, neque omnibus cognitam afferens, quasi invideret nobis cognitionem, aut metueret criticorum reprehensionem, tacendo docet, nisi quænam illa esset, non perspicuum planè fuerit illi. Et sane minimè habet hæc alterius illius, [vulgaris, flore Bellidis] vires mirificas: ut neque nonnullæ alia, quæ quia gustu fervido sunt, & nonnullam foliorum similitudinem fortitè, illic ab intempestivis herbariis Pyrethri nomen accipiunt, quasi id præstaret Pyrethrum fervore tantum, ac non potius aliâ comite facultate. Quid velit Lobelius, assignans huic radicem & folia Cotulae, nos latet, non videntur respondere picturæ, quam ex Matthiolo assumpti. Cast. dicitur Pyrethrum alterum. Lug. p. 170. Pyrethrum verum Matthioli. Taber. Pyrethrum, Bertram / Epichelwurt / Zanwurt.

De Pyrethro hoc Cast. l. 7. c. 30. sequentibus egit. Pyrethrum apud nos, inquit, in palustribus nascitur radice nigra, brevi, divisa in fibras, specie Meu, odorata, amara, linguam non statim exurente, sed cum plusculum mania fuerit: folia fert Staphylis silvestris, tenuiora: caulem cubitalem, rectum, lavem, umbellas tres aut quatuor, in acuminem: flore subrubente: semina compressa, & rotunda, figura Lentis, nigra & ferventia. Chinæ Incolæ Imperatoriam vocant: exhibent radicem in vino malvatico drachmæ unius pondere ad dolores colicos magna efficacia; nam vehementer digerit flatu, & urinam promovet.

Et hæc Casalpini, quæ omnia Cam. apud Matthiolum germ. lib. 3. cap. 61. eo tamen non nominato transeunt. Quidam, inquit, describunt Pyrethrum in palustribus nascentem, &c. quæ conveniunt cum figura Matthioli, quam posuit in lat. comm. nomine Pyrethri veri, sed ipse rem dubiam reddit, cum ait, se non sine labore eam iconem consecutum, & paulo post cum subdit, rei herbariæ indagatores novum quoddam Pyrethrum ostendere, foliis hortensis Pastinacæ &c. Ita Matthiolus, quamobrem posuimus ejus figuram hoc capite & appinximus semen nobis misum pro vero Pyrethro, nigricans cum margine candido, rei veritatem rei diligentius investigent rei herbariæ studiosi. Hæc Camerarius, qui, uti dictum, omnia ea, quæ ex Casalpino ponimus, transcribit, eo innominato. Ceterum, videtur, sive vellet notare Matthiolum contrarietatis, quam ne n animadvertito: quia olim puerum, qui puerum ex-

beret Pyrethri umbelliferi, scripserat de novo quodam Pyrethro, quod dicebat foliis hortensi Pastinacæ proximis, i.e. Germanicæ latifoliz, & non 3a. men Morben oder gelben Rüben/ ut vertit Camerarius, quæ sunt Pastinacæ tenuifolia, sive Carotæ. Bauh. phyt. vocat Pyrethrum, sive umbellâ candidâ, quod ait se in horto Patavino collegisse, verum umbellâ luteâ, longioribusque foliis, quam vulgò pingatur. Sed hanc suam assertionem omisit apud Matthiolum, ubi frustra quærit, an fortè sit Pyrethrum Cæsalpini. Eid. B. pin. Pyrethrum 2. umbelliferum: Fœniculum montanum, Trag. Pyrethron verum, Matth. Lugd. Pyrethrum Italicum, Gesn. Itap. Pyrethrum alterum, Lob. Cast. & Tab. sylvestre, Ger. Saxifragiz species, Dodon. 3. Pyrethrum Diosc. 1. Cam. umbellâ albâ & luteâ.

PYRETHRUM GESNERI.



Radice nititur longâ, simplici, modicè fibratâ, pallente, digiti crassitudine, fervidi & urentis gustus: folia Anetho similia prodeunt, caulibus fœniculaceis, flos in umbellâ circinate rotunditatis, ut in Dioscoridis exemplaribus legendum sit, addit v. r. p. p. i. e. capillaceâ umbellâ. Quare nullam prorsus notam deesse ad veram Pyrethri delineationem putat Gesnerus, qui plantam appictam Pyrethri veri nomine ad Dalechampium ex horto suo Tigurensi transmisit.

Lugd. p. 170. vocat Pyrethrum Gesneri. B. phyt. Pyrethrum 2. (3. pin.) sive foliis Anethi. Nostro iudicio frustra quærit an Pyrethrum Dioscoridis.

CYMINUM, SIVE CYMINUM
fativum veteribus.
CAP. XV.

Dioscorides de sativo Cumino inquit: stomacho [εὐστωχόν, n. mori, ut quidam codices habent] utile est: sed multò magis Æthiopicum, quod Hippocrates regium appellavit. Secundum locum tenet Ægyptium: mox reliqua sequuntur. Provenit in Galatia Asiæ, Cilicia, & Tarentina regione, aliisque locis compluribus. Excalfaciendi, adstringendi & exsiccandi vi prædicitur esse: ad tormina inflationeque convenit, seu coctum & cum oleo insutum, seu etiam cum hordeacea farina impositum. Datur & orthopnoicis, in poscâ: demoris à venenatis belluis, in vino. Testium inflammationibus auxiliatur, cum uva passâ & Fabarum [vulg. ex. empl. a. l. va] lomento, aut cerato impositum. Cohibet & fluxum muliebrem, sanguinisque è naribus profluvia, in aceto contritum & admotum. Cæterum cutis colorem bibulum illitumve mutat in pallorem.

Cuminum Theophrastus inter olera recenset. Semine, inquit, est nudo, angusto, instar lituræ (sic enim interpretandum verbum γλαυκῶδες, quod Gaza

canaliculatum vertit, nescit qua ratione Cæsalp.) inter semina fecundissimum omnium Cuminum [κυμίνον, Corn. legendum censet dixerit, ut Plin. habet.] Peculiare etiam quod de hoc dicunt: imprecatum namque & maledicere serendo oportere affirmant, quò lætius, copiosiusque proveniat. Difficile, ut ita loquar, omnia exsiccantur, Cumino excepto: quæ cortice continentur, difficilius exsiccantur, & inter ea maximè Ocymum. Pluribus constat generibus Cuminum (ait idem Theophr. hoc lib. 7. seq. cap. 4. Sed hoc loco legendum *οὐκ ὅσον*, ut post legitur.) Idem Hist. lib. dicto cap. 8. ait. Quod statim ab radice Cumino subnascitur & Hæmodorum vocatur, uniuersale constat, nec ab simili caule surgit: verum longè breviori & modo capitis superiore quiddam gerente: radice autem sabrotundâ nititur. Tandem c. 10. Nonnulla scabie atque salugine pereunt, ut Cuminum.

De Cumino pluribus in locis plura scriptum reliquit Plinius. Ita namque l. 19. c. 8. scribit. Condimentorum omnium fastidiis Cuminum amicissimum. Nascitur in summa tellure vix hærens, & in sublime tendens. In putridis & calidis maximè locis, medio serendum Verè. Alterum ejus genus sylvestre, quod rusticum vocant, alij Thebaicum: si tritum ex aqua potetur, in dolore stomachi prodest. In Carpetania nostri orbis maximè laudatur, aliqui Æthiopico, Africòque palma est. quidam huic Ægyptium præferunt. Idem antea eodem hoc libro c. 7. dixerat. Quibusdam [supple: sunt semina] angusta & canaliculata ut Cumino, & nuda. Nihil Ocymum [Cumino Theophr.] fecundius: cum maledictis ac probis serendum præcipiunt, ut lætiùs proveniat: sato pavitur terra. Et Cuminum, [Et Cuminum, inquit Corn. est suppositum] qui ferunt precantur ne exeat. Eodem l. c. 10. Necatur Cuminum ab imo dorso, nisi repurgetur. Est autem unicaule, radice bullo simili, non nisi in Solo gracili nascens. alias privatim Cumini morbus scabies. Lib. 20. c. 14. Sed & sativi [Cumini] magnus usus, in stomachi præcipuè remediis. Dissecat pituitas & inflationes, tritum & cum pane sumptum. Verumtamen omne pallorem bibentibus gignit. Ita certè ferunt Porcij Latronis clari inter magistros dicendi adlectatores similitudinem coloris [palloris] studiis contracti imitatos: & paulò ante Iulium vindicem adfertorem illum à Nerone libertatis captatione testamenti sic lenocinatum. Narium sanguinem pastillis inditum, vel ex aceto recens sistit. Et oculorum epiphoris per se impositum, tumentibus [testiculus herniâ præsertim aquosâ, vel statuosâ] cum melle prodest. Infantibus impone in ventre [ventrali Dal.] satis est. Morbo regio in vino albo à balineis datur. Et c. 15. Æthiopicum [Cuminum] maximè in poscâ, & in eclegmate cum melle. Africano privatum urinæ incontinentiam [ἀσπαρτίαν, de hac facilitate Dioscorides nihil prædidit, nihil quoque de Cumino Africano, Dalech.] cohiberi putant. Sativum datur ad jocinoris vitæ tostam, tritum in aceto. Item ad veruginem. His verò, quos acriore vi urina [acriorum urina CH.] mordeat, in dulci [τὸ γλυκύ, vino passò, Dalech.] tritum vino. Ad vulvarum vitia [re sumptum, Dal.] in vino præterque impositis vellere foliis: testium tumoribus [collectivum, Diosc.] tostum, tritumque cum melle, aut cum rosaceo & cera. Sylvestre ad omnia eadem efficacius.

Præterea ad serpentes cum oleo, ad scorpiones, ad scelopendras. Sistit & vomitionem, naucae quoque ex vino, quantum apprehenderint tres digiti. Propter colum quoque bibitur, illiniturque, vel penicillis fervens adprimitur [adstringitur M.] fasciis ad strangulationes vulvæ: potum in vino aperit, tribus drachmis in tubus cyathis vini. Auribus instillatus ad sonitus atque tinnitus cum sevo [sebo CH.] vitulino, vel

Ocymum
pro Cumino.

Selinum
pro Cumino.
Hæmodorum.

Cuminum
corticiferum.

Plinius.

Cuminum
morbum.

Vires.

Pallorem
inducit.

Urina incontinentia.

Cuminum
sic.

Pallens Cuminum vocat & Perſius Satyra 5. Item
Horatius lib. 1. epilt. 3.

- quod si

fatiyum.



Ruell. l. 3. c. 44. Cuminum nominat, & tamen non agnoscit. Cuminum, inquit, Latini juxta & Galli, rura nostra Comin appellant. Vnicuale, frequenter ramulis brachiatum, folio penè Foeniculi, semine copioso & caliculato, radice fibratunda, quasi bulbosa. Supior Ruellium nescivisse de qua planta scriberet. Rura Gallie non ferunt Cuminum, sed Carvi, quod multis dicitur Comin, si novisset discerni inter Carvi & Cuminum, annotasset capite de Carvi dicit Comin, & id in Gallia vulgare: praterea ait radicem Cumini fibratundam, quasi bulbosam, qui morbus est Cymini Plinio & Theophrasto, quod ipse poterat observare ex verbis Plinii & Theophrasti, quæ adducit.

Russ. Cu.
1711-1712
1713-1714
1715-1716

Negatur
esse Cuius-
modi sal-
tem aut
quorum.

Est Causa
num. 116.

Common 2-
genera,
a rich
common
forest
common
decid.

1

Plura quoque genera Cumini fativi agnovisse Lobelium ex sequentibus ejus verbis colligere licet. Cuminum haud sponte apud nos oritur, quod quidem aliquantum diversum à diversis è locis Syriae, Ciliciae, et Graeciae illarum observatur. Quod enim albicat, hirsutumque est semen, praestantius habetur, acidem cum eo quod neququam hirsutum est, apud nos ferè et viresco solitum. Necitem putandum discrimen aliud fuisse Aethiopici, Gallative, quam loci aeternogative, viris quoque est Hippocraticis fativum sive albianis, hirsutumque, Basilicum, seu Aethiopicum fecisse. Nec enim argumenti ullam umbram habent Paavini quidam herbarij, cum aliis generis semen pro Aethiopico Cumini offendant, pusillum enim valde est, acerolum, evanidum, viribus multum et odore à communi deficientis.

Gener
Label

Cumini tandem plura genera tradidit Theophrastum scribit C. Bauhin. Sed hoc erroneum est. C. Bauhin. Theophrastus non dicit Cumini plura genera, sed ^{1707.} Apij. eo loco depravate legitur *χυμιν* pro *σελίαν*. id patebit legenti totum caput.

Diversas figuras habet Matthiolus. Rejeda enim
falsa (ea sc. quam in priorib. comm. exhibebat) meri-
to in post. comm. aliam meliorem pinxit. Sed eam
cum addè probamus, quæ est in epit. ejus & hist. ger-
man. addit. Camer. sub titulo Cumini lativi: nostram
sculptor minis feliciter expressit.

Mac

Dicitur Cuminum fativum, Brunf. Trag. Matth. Cord. hift. (ubi Gefn. addit ex Tragi l. c. 119. figuram, quæ an boni fit, videant aliq.) Cam. apud Matth. Dod. in fol. lat. Lac. & Caftori. Cuminum fativum, March. Lugd. p. 697. Cuminum Diofcoridis Lob. qui in Obfp. 428. & Icon. p. 742. figuram habet fimilem figuræ Matthioli in poft. comm. poftita. Cuminum Ruell. (ut videtur) Corn. in Diofc. Dalech. apud Plinium, Turn. Lon. & Cæfalpino, cui & Cuminum officinarum, & Cumini filv. genus Diofcoridis. Cuminum, Ang. Cord. in Diofc. (cui & Cyminum Romanum) Tab. fativum, Cam. Cuminum æthiopicum, Carnabadium Caffi Baffi & Myrepfus, Guill. Cuminum 1. five Fœniculi folio Bauh. phyt. Eid. B. pin. Cuminum 1. femine longiore. Et, Cuminum 2. femine rotundiore & minore: Cuminum dulce Melitenfium. Hujus plantam non vidimus: at cum Dalechampij in Plin. l. 20. c. 15. notas legiffemus, ex Melita duplex Cuminum, ut pote acre & dulce adferri: & apud Megiferum in Melitæ descriptione, idem inveniffemus, ejus nomine ut haberemus laborativum: quare, utriufque femen è Melita infula tranfmiffum fuit: alterum longum, acuminatum, coloris fœrdi, graveolens & fapore acri, cui Cimonagero, i. e. Cuminum filv. infcriptum erat: quod cum Cymino Æthiopico officinarum convenit. Alterum verò multò minus, Anifo fimile, candicans, guffus lenior & fubdulce, quod nômne Cimonagero dulce, miffum. Apud Melitenfes copiofè feritur, ad panem condiciendum, & ad mercaturam cum eo exercendam.

Græci *Kumey* vocant, & ad differentiam filve- Nomen
strium *Kôlayon* nuntent. Sic & Latini Cuminum, & Cu- lingua
minum fativum: Offic. Cymnum. Germani *Bym-*
mel; quidam etiam *Bymmel*; Gærent; aut *Némis*
(sæd *Bümel* / Cuminum hortense, aut Romanum)
zamen garten *Bümel*. / *Frankenlûmmel*, & *Pfeffer*
Bümmel Belg. & Angl. Cuminum. Gall. *Comin*. Mont-
belg. *Spicel*. Ital. *Cumino*. Hip. *cumab*. s. *Bobem*. Bine-
yu. Arab. *Cami* m seu *Kemem*. Cuminum verò quasi
pregnans à verbo *xip* manasse putatur.

$$1 - \text{Lys}$$

Melitam intulam gigneré Cuminum, notam her-
bam medicinis & condimentis, author est. fr. Io.
Quint. Hedeus, quod ait Solo gracili gaudere. Duo

er- *La*

414 S

eius genera esse: unum magnâ gustûs acrimonîâ, aromatum modo odoratum, Cuminum agrion vulgò vocatum: alterum per omnia referre Anethum & Anisum: sativum utrumque. Cumino Aphrico, quale hoc sit, palmam semper datam. In Chieinan, quæ regio est Persiæ optimum Cuminum crescere testatur Linschottapus. Malayveniens Indiæ Orientalis *Tentanyerân* vocare. Importari ex Ormusin Dachem, & inde in Bantam, ubi satis charè dividetur. Cæterum, Cuminum sativum eligitur plenum, magnûm, flavum, aut pallidum, purum, intus pingue, veluti liquore aut oleo madefactum. minimèque acerosum. Invehitur ex Vhsibona & Venetiis Antuerpiam, aen reliquas urbes atque emporia. Cuminum satum in horto E. C. mihi provenit.

Meminit Tragus Cuminum sativum in cibo veluti & Piper usurpari. sunt & qui cum cicere arietino seu pisce concoquant, nec sine præcipuâ utilitate, si quidem inflationes quasvis & flatus ventris disscutit, phlegmata, lentosque incidit humores, stomachique nauseam tollit: sunt qui aserant hoc Cuminum cum vino albo à balneo potum, regium expellere morbum, nec non vertigini prodesse. Cuminum sativum ex vino dulci sumptum difficultati & ardori urinae auxiliatur. In oleo coctum ait Matthiolus, & clystere infusum, prodest terminibus & flatibus corporis. contusum & ex passio potum, auxiliatur stranguriæ. cum sicibus in vino coctum & bibitum, tussim sedat, thoracem expurgat. in eundem usum, cum aceto in aqua coctum assumitur. utiliter pani incoquitur, & caseis inditur, ita concoctionem juvat, & flatus dissipat. si masticeetur, halitusque in oculis insuffletur, iis claritatem conciliat. ad rubores oculorum discutiendos coquitur in pane contusum Cuminum, panis clybano extractus & dissecus, calidus ob oculos detinetur, tandem humor qui oculis sese affixit, molli linteo abstergetur. ad ventriculi debilitatem, & nauseam continuam, recipe crustam panis, quam asperso pulvere Cymini, calidam ventriculo applica. posset & panis tostus sumi, qui aceto forti imbutus aspergendus pulvere Cymini, & Garyophyllorum, ventriculoque imponendus calidus. ad suggillata ex quacunque causa, valet Cuminum in pulverem tritum, & cetera ad ignem commistum. ardori urinae, aliisque velicæ vitis auxiliatur Cuminum in vino coctum, & umbilico calide inductum. Cum farina Fabarum, teste Camerario, utiliter collectionibus testium imponitur: & tumetibus, dolentibusque eorum cruribus frequenter inducitur. non pauci Cuminum in columbaris suspendunt, odorem enim ejus sequuntur columbæ.

CVMINVM SILVESTRE VETERIBUS DUPLEX.

Cymini silvestris duo genera describit Dioscorides. Plurimum, inquit, & efficacius nascitur in Lycia & Galatia Asiæ, & in Carthagine Hispaniæ. Frutex est caule palmum alto, tenui, in quo foliola sunt quatuor, aut quinque, tenuia, veluti tetra incisa, ad Gingidij modum: capita verò in summo habet quinque aut sex, rotunda, mollia: in quibus semen acerosum, gustanti acrius quàm sativum. Nascitur in locis edioribus. Bitur semen ad tormina & inflationes cum aqua: cum aceto verò singultus sedat, ad bestias venenum ejaculantes, & stomachi humiditatem cum vino. Tollit & suggillata commansum, & cum melle, aut uva passa inpositum. Inflammationes etiam testium sanat cum uide in inpositum. Est & alterum genus silvestris Cymini, si-

mile sativo, quod ex singulis floribus sublimia cornicula producit, in quibus est semen simile Nigellæ. Hoc potum ad serpentium morbus optimum auxilium est. Opitulatur & urinæ stillicidio, & calculosis, & his qui sanguinis grumos mingunt. Sed his Apij semen servefactum in super bibendum est.

Cuminum silvestre est præteritus, quaternis aut *Plin.* quinis foliis veluti serratis, inquit Plinius. Et paulò post. Silvestre ad omnia eadem efficacius. Præterea ad serpentes cum oleo, &c. Vide plura loco superioris titulo citato, de Cumino sativo veterum. Galenus silvestre Cuminum præterit, & etiam Aëcius & Paulus.

Primum silvestre Dioscoridis Cuminum Turnerus se videre non meminit, posterius putat se vidisse. Itali quidam censent Nigellam citrinam esse Cuminum silvestre. Alij putant Nigellastrum esse Cuminum silvestre alterum. Sed nec Nigella citrina, nec Nigellastrum esse potest. Cuminum silvestre, nisi Nigella Romana hortensis sit etiam Cuminum silvestre. Per similes enim sunt formæ foliorum, seminis & odore. Cuminum alterum silvestre cornicula fert, in quibus semen, Nigellæ simile. Nigellæ genera habent quidem Cornicula, nullum tamen in iis semen: semen enim in medio capituli continetur, tenuibus membranis distinctum. Neque igitur sive Nigellastrum, sive Nigella citrina esse Cuminum silvestre alterum. Assentitur Turnetius Gesnero, qui Consolidam regalem esse Cuminum silvestre alterum arbitrat, quæ opinio displicet. De regala. Cumino silvestri primo odorato, globuloso nunc dicendum.

CVMINVM SILVESTRE PRIMVM valde odoratum, globulosum.



Variè divari- *Desf.* catos ramos dodrantales, teretes habet, medullâ candidâ plenos: folia palmum longa, pinnata, Pimpinellæ sanguifloræ foliis similia, foliola singularia, profundè serrata. extremis ramulis hærent glomerata capitula, è villosis candidis penicillis, quibus femina adhærent, congesta, quibus subiecta sunt radiata foliola, profundius incisa & veluti spiræosa.

Matth. in Diosc. in post. contin. cum mag. fig. item *Synon.* epit. cum addit. Cam. figuram habet sive descriptione, in qua flores non bene exprimentur. Is verò cum Dodondat. in fol. nominat Cuminum silvestre. Lugd. p. 677. Cuminum silv. Mattholi. Tab. Cuminum silvestre. Castor. Cuminum silv. primum. Lob. in Adv. p. 330. Cuminum silvestre Dioscoridis, & etiam in Leon. p. 743. Pona, Cuminum silvestre primum Dioscoridis. Ang. Cuminum silvestre.

Et sanè Cuminum de quo agimus, melius placet pro Dioscoridis Cymino silv. primo, quàm Cuminum vulgare, quod silv. n. se suspicatus est Cæl.

An Cordo in Diosc. l. 2. c. 69. Cuminum silvestre, quod Haberhammel à Germanis vocari ait, quo-

Leporis cu- biam Avenæ modo glutinosum sit. B. pin. Cumi-
bile. num 3. silvestre capitulis globosis: Lago chymeni,
i.e. leporis cubile in insula Lemno, Bellon.

Zocum. Cyminum silvestre primum Dioscoridis, odora-
tum valde provenit mihi Lugduni in horto. Stede-
gardia mihi missum semen quondam per hortula-
num Ducis Florentini, qui Cuminum silvestre Can-
dia inscripsit, Montbelgardi fatum in horto E. C. ex-
crevit.

Vires. Calefacit, authore Matthiolo, exsiccatur, aperit, di-
gerit, incidit, resolvit, & provocat. Vires ex veteri-
bus præcedenti titulo adjecimus.

AMMI ANTIQVIS, ET IN genere. CAP. XVI.

Diosc. ex- **A**MMI nonnulli Æthiopicum, aliqui regium
plaria non Cuminum appellant [i. e. $\chi\epsilon\iota\mu\iota\sigma\tau\epsilon\sigma$ $\alpha\iota\delta\iota\sigma\kappa\omicron\rho\iota\delta\iota\varsigma$, i. e. $\chi\epsilon\iota\mu\iota\sigma\tau\epsilon\sigma$
conveniant. $\delta\epsilon\sigma\iota\mu\epsilon\tau\epsilon\sigma$ $\chi\epsilon\iota\mu\iota\sigma\tau\epsilon\sigma$ $\chi\epsilon\iota\mu\iota\sigma\tau\epsilon\sigma$. *desunt hac in Ald. cod. & ad no-*
ra relegantur. Alij etiam nonnulli codices huic carent, us-
que ad $\gamma\alpha\lambda\epsilon\iota\sigma\tau\epsilon\sigma$, i. e. vulgo notum.] Alij alterius naturæ

Deleat. Æthiopicum Cuminum: & alterius Ammi esse pro-
diderunt. Vulgo notum est semen exile, multo mi-
nus Cumino, & Origani sapore. Eligo purum, mi-
nimèque fursurosium. Vim habet hoc quoque ex-

Via. calidioriam, urentem & exsiccantem: valet ad tor-
Vim. mina, urinx difficultatem, ac venenatorum morsus,
ex vino potum. Menstrua quoque ciet. Miscetur

& cutim erodentibus medicamentis & cantharide
paratis, quo resistat urinx difficultatibus, quæ alio-
qui id genus medicamentis supervenire solent. Sug-
illata cum melle impostum tollit. Sed & potu ac
illitu colorem pallidiorem efficit. Suffitum aut cum
uva passa, aut resina, vulvam purgat: Diosc.

Ammi Pla- Est Cumino similimum, quod Græci vocant Am-
nio. mi, inquit L. 20. c. 15. Plinius. Quidam verò Æthiopi-
Cuminum Cuminum id esse existimant. Hippocrates re-
æthiopi- gium appellat, videlicet quia efficacius in Ægypto
æst regium judicavit. Plerique alterius naturæ in totum put-
Hippocrati. tant, quoniam sit exilius & candidius. Similis au-
tem & huic ulius. Namque & panibus Alexandrinis

Vim. subditur, & condimentis interponitur. Inflationes
& tormina discutit. Vrinam & menstrua ciet. Sugil-
lata & oculorum epiphoras mitigat. Cum lini semi-
ne scorpionum ictus in vino potum drachmis dua-
bus: privatimque cetastarum, cum pari portione
Myrrhæ. Colorem quoque bibentium similiter mu-
tat in pallorem. Suffitum cum uva passa aut resina,
vulvas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ
odorentur id per coitum.

Gal. temp- Hujus meminit quoque Galenus dicens, Herbæ,
eramentum. quam vocant Ammi, semen maximè est utile: facul-
tatis est exsiccatoris, & desiccatoris, tenuiumque
partium. Sed & gustu subamarum est, & acre: &
clarum est quod & digeratur, & urinam moveat. Fue-
rit autem in calfaciendo, resiccandoque ex ordine
tertio intenso.

Marcell. Ammi peregrinum semper Græciæ & Italiæ fuisse
scribit Virgilius Marcellus: siue sui generis herba &
semen: siue Cymino congener sit, meliusque & ef-
ficacius in Ægypto nascatur. Eamque ob causam u-
sam eo antiquam medicinam esse aliunde invento.
Fuisse præterea in Ægypto quondam domesticum
Ammeos hujus & quotidianum usum: panibus e-
nim compitum & alimentis mixtum solitum fuisse
comprobare Plinium. Adhæc majore in extenuan-
do vi, quam Cyminum esse. Quæ porro à principio
hujus capitis leguntur, vocare quosdam hoc Æ-
thiopicum & regium Cyminum, ex aliorum opi-
nionem, non Dioscoridis decreto intelligenda esse.
Neque enim ipsum id probare: sed à quibuldam sic

vocari, tantum testari. Siquidem Æthiopi & regij
voces bonitatis à gente in Cymino notæ sunt, non
generum diversitates.

Nos si nomen proprietates atque etymon ve-
stigaverimus, inquit Marantha; non dubium est, *Maran-*
quin multa nobis simplicia innotescent: quæ alio-
qui non innotescerent. Nominis namque proprie-
tas denotabit nunc medicamenti formam, nunc fa-
cultatem, nunc odorem, vel aliquid ejusmodi: ita ut
aliqua nota effatu digna medicamento addatur,
quæ faciliorem ejus cognitionem reddat, ut in ea
planta, quæ Ammi à Dioscoride appellatur, claris-
simè appareat. ex descriptione enim seminis (nam-
que id tantum describit) forma nullo pacto sumi
potest, sed solummodo sapor, siue odor Origano
proximus, & quod exile sit semen: quam ob rem
diutius omnibus ferè incomperta fuit. Quam nam- *Ammi-*
que pro Ammi Fuchsius depingit, proculdubio ipsa *chris reg-*
non est; nullum enim Origani saporem repræsen-
tat. quare alij aliud semen receperunt minutissi-
mum; cujus plantam in Apulia sapissimè legi: & est
quam Senensis [Matthiolus] depingit, quanquam
verum Ammi esse non consentit. redolet hæc mi-
rum in modum Origanum, & apud omnes ferè ma-
terix medicæ peritos (scio enim Fuchsius mutasse
sententiam, & cum cæteris consentire) pro vero
Ammio habetur. Verum si rectius intueamur, ex
alio nomine, quo illam appellatam Dioscoridis as-
serit, clarissimè colligemus, longè aliam plantam ef-
se Ammi: inquit enim à quibuldam appellari Æ-
thiopicum Cuminum. ex quo non obscurè colligitur,
Ammi semen, cum Cumini semine multam ha-
bere similitudinem; non enim ab odore esse potest
hæc similitudo, quia odor Origano proximus est,
non autem Cumino, sed à forme; quod & ostendit,
id quod subdit, semen est exile multo minus Cumi-
no; quasi vellet nullam aliam esse (quantum ad fi-
guram attinet) discrepantiam, nisi magnitudinis;
quod clariùs ex Plinio colligitur lib. & cap. citato,
ubi habet. Est Cumino similimum, quod Græci vo-
cant Ammi, quidam verò Æthiopicum Cuminum
esse existimant, & c. plerique alterius naturæ, in to-
tum putant, quoniam sit exilius, & candidius. quæ
verba longè clariùs ostendunt, id semen, quo pas-
sim pro vero Ammi utuntur, quoddam à Senensi
depingitur, non esse genuinum Ammi: est enim ni-
gri coloris, nedum Cumino candidius. At verò ve-
rum Ammi semen ad me misit Chinus, Dioscoridis
& Plinij descriptionibus penitus consentiens. erat
enim Cumino simile, exilius tamen, & candidius,
odore & sapore Origani. Hæc Marantha.

Ammi, ut Tabern. memoriæ prodidit, vocat Gal. 6. *Appellat-*
simpl. $\alpha\mu\mu\iota$ & $\alpha\mu\iota$. Lat. Ammi, Ami, A-
mum & Ammum. Herbarij Ammum Alexandri-
num, Ammum Syriacum, Caminella, Cuminella,
Cyminella & Muriola. Medici & pharmacopœi A-
meos, Amios, Ammeos & Ammios, in genitivo ca-
su indeclinabiliter. Serapio simpl. c. 287. *Nanochach,*
& *Anazue*; Averrhoes *Navoca*. Glossographus anti-
quus Avicennæ *Alvenic*, & *Neraberri*. Avicenna *Ma-*
nachne. alij verò Arabes *Anemo* siue *Aneme*, *Ecindebel*,
Leligan, & *Leligan*; *Nachna*, *Nemicha*, *Nemichie*, *Ne-*
nucha & *Nenucha*, addit. Matth. *Nanachua* siue *Nana-*
chue. Ital. *Ammio*, *Ammi* & *Ammeos*. Hisp. *Ammi* & *Za-*
nagria. Gall. *Ann*. Boh. *Ammi* Pol. *Pellestima*. Angli
Zimmy ut & Belg. Ger. *Zimney*, *Zimny* & *Zim-*
mevtraut, & *Alexanderiuscher Ammeey*.

Ammeos porro nomen sequentes assumpserunt *Acquis-*
sibi plantæ.

Ammi odore Origani.
Ad m. semine tenuissimo & odoratissimo.

Ammi vulgare majus latioribus foliis, semine
minus odorato.

AMMI ODORE ORIGANI.



AMMI Creticum mihi ad cubiti altitudinem excrevit, caulibus pluribus, ramosis, nitidis, sinuatis, & geniculis nodosis: folia infima quidam latiuscula, multifida, ad Carinon nonnihil accedentia, superiora vero multo tenuius dissecta, non minus ferè, quam Chamæmeli; odore, si teratur, admodum aromatico, Origani, sapore non dissimili: umbellæ frequentes flosculorum minutissimorum, albicantium, nec verò folis umbellis sunt obiecta terma folia, ut in Vlnaga, sed & umbellarum particulis singularibus: semen succedit Anisi faciem, ut ait, insigniter aromaticum: radix crassifolia, h. oct.

morum, albicantium, nec verò folis umbellis sunt obiecta terma folia, ut in Vlnaga, sed & umbellarum particulis singularibus: semen succedit Anisi faciem, ut ait, insigniter aromaticum: radix crassifolia, h. oct.

Crediderim loqui de hujus plantæ semine, Anagalliam epist. dicentem. Anno 1549. Maius quidam appulit ex Alexandria Venetias secum habens duos saccos seminis, quod pro Amomo vendere volebat, quod mihi exhibitum fuit, ut judicaret an Amomum n. esset, necne. Ego gustato eo, & ejus odore perspecto, dixi non esse Amomum, sed Ammi. Quæ opinio cum ipso semine parsa fuit in Italia variis partibus. Vnde omnes reliquerunt Ammi M. Lucæ Ghini, & hoc omnes semper receperunt pro vero Ammi. Id autem mali est, quod non existimem, amplius adferri, quod non multum lucratus est mercator, qui emit, necis qui vendit. Hoc autem semen ex Alexandria allatum sapore & odore in omnibus respondet verbis Dioscoridis, excepta figura: non enim admodum simile est Cumino. Sed Dioscorides capite de Petrofiliño dicit, semen ejus simile esse Ammi, cui respondet semen nostrum, & figura h. simile est Petrofiliño, quod in montibus nascitur, quod multò minus eo est, quod colitur. Planta, quæ verum nostrum Ammi fert, folia prima similia habet, foliis vulgaris Nigellæ, sed crassiora, deinde alia subtiliora & minora. Caulem fert cubitum altum, cui insidet umbella similis Dauco Cretico, cum flore pallido. Vbi decidere flores, relinquit semen supra dictum odoratum & saporis Origani. Non provenit in Italia. nascitur quidem aliud simile sapore & odore: sed multò minus, quod etiam pro Ammi usurpari potest: quod aliud finito hoc Ægyptio habere non poterimus, nisi alij fortè adferant.

Non displicet figura à Cam. ad h. hist. Matthioli germanicam & ad ep. p. 522. positam, pro Ammi vero, non item pro Matthioli Ammi, quod à Cretico, seu vero diversum. Matth. in comm. post. cum mag. fig. plantam nostram Ammi Alexandrinam legitimi & veri titulo pingit. In edit. C. Bauh. vocatur Ammi peregrinum ex Alexandria apportatum, Arabicum, Ammi i. ponitur; fig. Ammi Cretici Lob. verum hoc Ammi miscetur meo judicio cum vulgari, & cum Matthioli Ammi, quæ pingebat, quodq; tenuissimum est semine.

Cumini laevi nomine describitur semen hoc à Gesl. Cumini lativum, inquit, existimo semen quoddam exiguum, quod ex Orientalibus adfertur, Ammeos nuncupati in officinis; acre & jucundum: sed Tom. III.

plantam videre ei non licuit: & ex hoc genere illam esse putat, quæ fertur in Hispania, Vlnagā vocatam.

Ammi A nomine habetum fuit, sed Lisdò, Amatus quoq; novit. Ait enim in Diosc. enar. 68. Ammijus signandi casus, Ammeos est, semen album & exiguum est, quod Origani saporè & odorem habet, & nunc ex Alexandria adfertur, quod Amomum appellant, sed tamen & corruptè, quum pro Ammi Ammomum pronunciant. nā Amomum, uti L. 15. H. n. g. dictum, botriosum, tanquam uva minuta est. Est enim semen Ammeos simile semini Anisi, quod ex Alexandria adfertur, sub nomine Amomi.

Turn. hoc intelligit per alterū illud genus, Ammeos sc. quod verum esse ait, & nuper in Italia inventum, foliis multò minoribus, quàm ullum aliud, cuius semen adferre batur tunc Francofurtum venale sub nomine Amomi: quidam tamè verū Ammi appellant, potissimū materialiste, ut vocant, Norimbergenses.

Gesh. vocat Ammi, Venetiis habitum ex Alexandria, Synon. dria, nomine Amomi, Aniso simile, Amati Lusitani. Lob. adv. p. 323. Ammi ex Syria aut Creta. In observ. p. 414. & Icon. p. 725. Ammi Creticum Aromaticum. Lugd. Ammi Creticum aromaticum Lob. Tab. hist. Ammum; Creticum, seu Candiacum. Bauh. apud Matth. Ammi i. semine Apij: Ammi, Lac. Cast. Cam. Eid. B. pin. Ammi 2. semine apij: Ammi majoribus & serratis foliis semine apij, Gesl. in h.

Ammi plantam primò vidit allatam à fratre ex hort. Bononiensi. Ex semine ab eo Neapoli misso provenit Montbelg. in horto E. Cubi cubitalis facta, copiam pluviarū penit. annua est: semen validi erat odoris & Origani. Hujus Ammi semen habui etiā à Valer. Dourez, cū præflem Lugd. & Genevæ examini Theriacis & Mithridatij, quod etiam in ea Theriaca impositum. Ammi semē, quod plusculis ab hinc annis coepit fuit devehit ex Syria aut Creta Venetias, hortellū Apio par, sed flavū, gustu aromaticum servidum, Organum præferens, saporis satū non victum, aut marcidum, delusi nos, inquit Lob. & in eam suspitione coëcit, quā quidā nos monuerat, fieri posse ad Theriaca Venetia mysteria, ut hebraeus mago, Cretensiu & Syriacoru portuū telonarius, decoctione diluente semina macerata merlerit: sicq; copēdij causa cū pharmacop. Venetis nō parū gratia inierit.

Ammi legitimi semē quod ex Alexandria affertur, videri. misticè præstat ad mulierū sterilitatē. Nā coëptum esse scribit Matthiolus in edit. C. Bauh. seminis auxilio, plures prolificas effectas. Siquidem si propinetur manè diachimæ pōdere ex vino meraco, aut carnū jure in tenuē pulverē contritū, alternis diebus, tribus horis ante cibū, futura pollicetur prole, sed oportet maritū cū uxore rē habere iis tantū diebus, in quibus illa semē nō biberit. Quod tamè diutius sumi nō debet, q̄ quatuor, aut quinq; diebus, est enim ad sterilitatē præstantissimū auxiliū, & pluries expertū.

AMMI SEMINE TENUISSIMO & odoratissimo.

Herba est pedalis, interdum bipedalis, caule te. Descri. hui, fragili, fœniculaceo, medullā albā pleno: folia prima longa, profundè undiq; incisa: superiora fœniculaceis aut anethinis similia, paulò tamen tenuiora. extremis ramulorū hærent umbellæ parvæ, inæquales, flosculis albis cōtextæ: semen minimum odoratissimum, calido & acri gustu: radix parva, gracilis, lignosa, per ætatem in fibras diducta. sapore ferè Paltinacæ.

De Ammi hoc videntur hæc tradere Monachi in Ammeos cert. Mes. dist. l. cen. 27. Non est hodie quod sciamus in Italia, qui Ammeos certi veram agnoscat plantam. Vnde varij pharmacopolæ variis pro eo utuntur plantarum seminibus. Certè verum Ammum non est cognitū in Italia, neq; est, q̄ multò pejus est, qu



Ammi Monachorum
descriptio.

versis herbarum seminibus, non solum nobis, sed etiam Medicis peritoribus incognitis. Planta autem seminis, quo utimur, est exilibus foliis, teneriorum ac minimo Foeniculo similibus. Hasta recta, duobus palmis ferè extollitur, gracilibus ramulis plena, in quorum summitatibus umbellulæ sunt breves. Dauco similes, multò tamen minutiores, in quibus flosculi albi, & semina minutissima insunt. Quorum odor Cumino sativo non absimilis est: sapor autem non (ut ait Dioscorides) Origani (si tamen hoc quo utimur verum Origanum est) sed dicti Cumini sativi, acutior tamen, & quasi ad Piperis gustum trahens. Sed plus de Cumino, quam de Pipere sapit. Dictam autem plantam cum semine, foliis & parva radice (quæ alba est & lignosa) ostendimus pluribus probatis Medicis, ac eruditioribus viris, à quibus omnibus valdè laudatum est tale semen, pro Ammi in confectionibus admittendum. Quod quidem semen plurimi credunt esse verum Ammi, quodq; quibusq; quotidie possumus ostendere: quoniam circa Româ, & pluribus aliis in locis provenit in inculto Solo, & juxta viarum semitas.

An Ammi perpusillum, Lob.

An Ammi hoc intelligit Lobel. in Adv. p. 323. per Ammi illud, quod in Patavinis hortis coli, etiamq; non procul Ageno & Garumna in Aquitania se legisse refert, foliis & umbellis Dauco Cretenensis, semine & radice hortensis Apij, neququam illis in Ammi semine viribus expetitis præditi. Lob. fig. in Obs. p. 414. & Icon. p. 724. nomine Ammi perpusilli, non multum placet: sed nec ea quam nos habemus ex Fuchianis quæ emendanda erat ad plantam; & flos & semè separatim ex Cam. ep. p. 522. pingendum.

Icon.

Anguill. epist. 7. vocat Ammi aliud proveniens in Italia, cujus usum admittit pro vero Ammi.

Ammi Matth.

Non negarit Matthiolus Ammi in Italia nasci, etsi in officinis hætenus verum non reperit. Siquidem Anguillarius ex Patavio ad ipsum misit legitimum Ammi. Verum enimverò huic sanè illud non adstipulari tradit, quo Monachi usi sunt, utpote qui suum Ammi (hoc sc. nostrum) nullo Origani sapore commendari fateantur. At præterea Matthiolus in com. cum mag. fig. Non propterea dicam, non nasci Ammi in Italia, quum verum in officinis non repariatur, nuper mihi missum, in quo aliquæ notæ à Dioscoride descriptæ, quamvis sapor Origani non ita manifestus, ut in eo quod nunc adfertur ex Alexandria legitimum & verum, cum quo non conferendum Italicum, quod adfertur ex Apulia minimum pauci vigoris si saltem vocadum Ammi. In editione C. Bauh. addit. Quod misit Anguillarius, caulè mittit feniculaceum, foliis agrestis Pastinacæ, semine ic

Legitimum ex Alexandria adfertur.

umbellis exli & Cumino minutior, Origanum requirat agnoscere. Omnes enim accipiunt, quod primum ad manum venit. Emunt & vendunt, sed quid emant, quidve vendant, ignorant. Pro Ammi autem confitemur, nos ambigere, an verum sit quo utimur. Attamè valde approximatur Dioscoridis & aliorum descriptionibus. Vnde malumus (usque dum habeatur cognitio veri Ammeos) uti eo, quàm tot diversis herbarum seminibus, non solum nobis, sed etiam Medicis peritoribus incognitis. Planta autem seminis, quo utimur, est exilibus foliis, teneriorum ac minimo Foeniculo similibus. Hasta recta, duobus palmis ferè extollitur, gracilibus ramulis plena, in quorum summitatibus umbellulæ sunt breves. Dauco similes, multò tamen minutiores, in quibus flosculi albi, & semina minutissima insunt. Quorum odor Cumino sativo non absimilis est: sapor autem non (ut ait Dioscorides) Origani (si tamen hoc quo utimur verum Origanum est) sed dicti Cumini sativi, acutior tamen, & quasi ad Piperis gustum trahens. Sed plus de Cumino, quam de Pipere sapit. Dictam autem plantam cum semine, foliis & parva radice (quæ alba est & lignosa) ostendimus pluribus probatis Medicis, ac eruditioribus viris, à quibus omnibus valdè laudatum est tale semen, pro Ammi in confectionibus admittendum. Quod quidem semen plurimi credunt esse verum Ammi, quodq; quibusq; quotidie possumus ostendere: quoniam circa Româ, & pluribus aliis in locis provenit in inculto Solo, & juxta viarum semitas.

quarat agnoscere.

Omnes enim accipiunt, quod primum ad manum venit. Emunt & vendunt, sed quid emant, quidve vendant, ignorant.

Pro Ammi autem confitemur, nos ambigere, an verum sit quo utimur. Attamè valde approximatur Dioscoridis & aliorum descriptionibus. Vnde malumus (usque dum habeatur cognitio veri Ammeos) uti eo, quàm tot di-

spiente, odoratū & acutum. Nascitur in monte Gargano, quod Italum est: quod verò peregrinum ex Alexandria apportatur Arabicum est. Eadem ferè in huius ger. & ep. cum add. Cam. leguntur. Caterum, ut ex dictis colligere licet, diversa de Ammi scribit Matthiolus, figuram tamen eandem exhibet. Olim non descripsit, sed ab Anguillara missum ait, ac legitimum putat. In comm. It. cum mag. fig. non meminit Anguillare, & Apulum vocat in ep. descriptio, quam frater recepit, nescio cui competat in hist. germ. alia descriptio diversa. Figura tamen est Ammi: non placet pro ea figura addita à Camerario, tum ad ep. tum ad hist. ger. Melius aridet figura Matthioli, potissimum inter minores figuras. Præterea planè nobis persuademus Ammi Monachorum non diversum à Matthioli, quamvis dicat non habere saporem Origani: videtur quoq; nobis tenuissimum illud semen habere saporem Origani, cetera gustum Monachorum.

Bauh. apud Matth. malè separat Ammi parvum foliis Foeniculi, ab Ammi Matthioli, quod idem cum jam dicto. Non absque titubatione quoque indigenam herbam Italicè dicit, delatam ex Alexandria. id enim cõpetit Ammi Cretico, quibusdâ dicto: quamvis idem ante ipsum scripserit Dodonæus, nò agnoscentes Creticum vel Alexandrinum. Verba fratris hæc sunt. Ammi 2. sive parvum foliis Foeniculi, herba effexigua, ex radice parva aliquot cauliculos tenuius, brevè que emittens: circa quos folia Nigellæ oblonga, tenuissima, capillorum instar dissecta, & sensim magis attenuata, umbellas habet parvas, candidas, exiguis flosculis quadrifoliis, quibus succedit semè minutissimum, acre & suave: ex Alexandria Egypti in Italiam allatum, nunc in hortis & Italicè (apud quos & in Ilva provenit) & Germaniæ facile provenit, quod pro Sifone aliqui habent. Eum autem separare Ammi suum parvum foliis Foeniculi, ab Ammi Matthioli, ita patet. Vocat Ammi Matthioli, Ammi 1. quod nos appellamus Ammi odore Origani & Creticum quorundam, de quo ante egimus. Hoc verò Ammi, vocat Ammi parvum, Dod. gall. Ammi verum Gesl. Ammi perpusillum Lob. & Lugd. Ammi alterum parvum, vel tenuissimum minus Dod. in foliat. Ammi primum Alexandrinum Tab. Ammi, Cæf. Ammi simile, Anguill. Nobis autem dictorum autorū Ammi ab Ammi Matthioli, quod B. malè Ammi Creticum facit, in nulla penitus re differt. Ammi Matthioli & Creticū vocat Cam. h. sed nescimus an unâ vel duas species existimet. Sed ipse Bauh. in pin. certiora docet. Ammi 3. parvum foliis fœniculi, inquit, est Ammi, Matth. Ang. Lac. Cæf. Cæf. Lug. & Cam. Ammi verum, Gesl. Ammi parvum. Dod. gall. alterum parvum, Eid. fol. Ammi perpusillum, Lob. Ammi 1. Alexandrinum, Taber. Lugd. vocat Ammi Matth. p. 695. & videtur secundà vice tradere p. c. seq. 696. pro Ammi perpusillo Lob.

Videtur Tab. in hist. p. 666. per Ammi 1. Alexandrinum describere Ammi tenuissimo semine: sed nò placet dicere Alexandrinum, & ex Alexandria Egypti delatū: quandoquidè in Italia provenit: nescimus præterea quid intelligat per Ammiū Italicū, Apulū & Rom. sive Ammiū 2. nisi hoc idè, quavis pro diverso ponat. Estimamus Schvencckeldium non distinguere verum Ammi Dioscoridis & Alexandrinum ab hoc loco, quod minimo semine est: considerent lectores an quæ sentit de sapore, ipse suo gustu observavit. Ammi inquit, Dioscoridis, Ammi perpusillum Lobelij, Ammi Alexandrinū, Ethiopicum Cuminum, semine est gustu amarum, subacre & tenuium partium. Ammi semine tenuissimo & odoratissimo, Cretico est multò minus: odor quoque paulò inferior: differunt etiam folia: sativè in horto nem. Genevæ florebat adhuc Nov. ebri, & ex semine deciduo virebat parvæ platur. Lugduni copiosè habebat in horto, ut & Basil. Mont-

Monthalgardi in horto E.C. & meofatum florebat Augusto, femine quotannis se renovans: narravit mihi quidam Ruzotomus, qui feminis magnam habebat copiam, abundare in Apulia. Solum requirit bene iter coratam, Soli expofitum.

AMMI VVLGARE MAIVS, LATIORIBUS FOLII, femine minus odorato.



Ammi Cretico, & Ammi femine tenuissimo majus est, caule crassiore, striato, foliis latiusculis, oblongis, crenatis, multitudine, ad Podagrariae folia quadratenus accedentibus, quibus tamen multo minor sunt superiora, in plures lacinias divisa. umbellae inaequalibus contextae sunt muscariis flosculorum alborum amplissimae, longis pediculis, ad quorum coitum

folia circumjecta sunt longa, in tenues, lori instar lacinias dissecta: semen majus, ignavius, quam in Cretico & tenuifolio: radix gracilis, inutilis.

Cesalpini Caulicidem (de qua l. 7. c. 19. sequentibus egit) diceremus esse eandem, cum Ammi hoc: quia autem notae quaedam repugnare videntur, illud asserere non audemus. Caulicis, inquit, ubique in arvis nascitur, similis Dauco campestris, sed foliis variè divisis, ut in Coriandro: nam prope radicem sectiones longae sunt, ac subrotundae. laxiter in ambitu serratae, ac leves: procedente tempore cum caulescit, folia tenuius & inaequaliter scinduntur, & tandem redduntur Dauco campestris similia, subcandida & subhirsuta, rariora quam Dauci: caulis candidus, ab imo ramulosus, cubitalis & amplior: umbellae fert capillaceae, tactu aspero, quae nequaquam clauduntur, ut in Dauco: flosculi candidi: femina parva ferè, ut Ammi iudicio pro Ameos hodie plurimis accipitur, sed pauca inest acredo, cum aliqua amaritudine, non insuavi: radix candida est, ramosa & parva, gustui non ingrata, coquitur in cibis ut Pastinaca silvestris. Dioscorides de Caulici inquit, ab aliis silvestrem Dauco vocari; Plinius edii & Caulicem Foeniculo simile. Theophr. Dauco recenset inter olera: Pes gallinaceus vertitur à Theodoro.

An de hoc loquitur Matthiolus, cum ait. Quamquam varia, ac diversa semina viderim, quae legitimum Ammi mentiuntur, nullum tamen ex iis haecenus sese mihi obtulit, quod animi ad credendum alliceret, verum Ammi ex Alexandria Egypti ad nos deferri. Quod Ameos nomine in officinis passim habetur, cum probatissimè Plin. teste, Cumino sit candidius, id nigricat, adeoque vulgaris Petroselinii semen amulatur, ut vili ab eo dignosci minimè possit, sed in hoc gustu consulere oportet. Nam cum haud leviter sit acie, facultatis discrimine gustu facile deprehenditur. Praeterea cum hoc nullum Origani saporis gustui repraesentet, quae tamen referri verum Ammi Dioscorides est auctor, adhuc clarius sit, id non esse legitimum. Veruntamen contrarium sensisse videtur Ruellius: quippe qui minis fortasse accuratè ea exanginaverit, quae de Ammi Hippocratis testimonio, scriptis tradidit Plinius, de quibus ante.

Tom. III.

Videtur nobis Ruellius confundere cum vulgari Ammi, Sisonis semen, quod à quibusdam Ammi existimatur. Notum, inquit, officinis semen, Ameos fundi cum nomine, quod Romanis Cuminum Alexandrinum dicitur. Quidam Aethiopicum Cuminum id esse putant, alij Regium Cuminum appellant. plerique in totum alterius naturae existimant Aethiopicum Cuminum ab eo, quod vocatur Ammi, exilius multò quam Cuminum, gustuque Origani.

De Ammi (ita namque inscribit praesentem nostram plantam) haec habet l. 2. c. 18. Tragus. Saepenumero equidem in hortis meis semen Ammios exiguum ferevi, sed nunquam in his flores protulit, nisi an. 1536, quo haec scribo. Ac animadverti semen Ammios in fine Aprilis mensis terrae mandandum, quam requirit Soli expositam & apricam. Erumpit autem primo exortu binis exiguis & acutis foliolis, veluti Petroselinum vulgare, post quae alia subsequuntur, sabinde auctiora & latiora, quorum nonnulla Foeniculi equini, aut Levistici aquatici foliis similia apparent, quamprimum in rotundos, concavos, geniculatos, & furculosos caules assurgit, in fastigiis magnas & perelegantes, candidoque flore refertas umbellas, Aniso ferè aut Coriandro similes, Iulio mense gerentes. Semen exiguum albicansque: Autumno appetente cum Foeniculo maturatur, gustu fervidum & acre. Planta est alba, seu aetiva, ut quae quotannis semine feri necesse habeat, nam postquam defloruit, semenque maturavit, tota sua substantia, caulis, radix & folia pereunt. Proceritatem viri nonnunquam adipiscitur, multis ramulis & adnascentis brachiatur; radicem habet rectam, candidam & lignosam. Hippocrates Ammi Cuminum regium appellavit, quod germanè Seren [*seren melio Bömg.*] Hummel interpretari licet. Egypto olim familiare fuit, panem enim compinsebatur, sicut apud nos Caros. Hoc pasto usurpatum tormina & inflationes ventris sedandi vi pollere traditur. Dioscoridi *zout*, Ammum Alexandrinum, Cuminum Aethiopicum, ger. *Urosentissimel* nominatur. Recentiores & officinae Ammum & Ameos vocant, Germani *Zimney*. Ammi Serapioni c. 287. Nanchach, Anazuc & Pomum ancheninon. De Ammi vide Gal. simpl. 6. Avic. l. c. 6.

Ammi peregrinum nobis semen est (inquit Cord. in Diosc.) & interdum ejus loco Petroselinii semen Materialista pharmacopolis vendunt. Sevi aliquoties mihi missum recens Ameos semen, & nostrum coelum minimè respuit, habetque mediam inter Apium, & sativum Petroselinum figuram. In hist. Ammi describit, eique Gesnerus figuram Tragi addit.

Ameos officinarum, juxta Dodonaei opinionem, verum Ammi Dioscoridis est. is verò id describit & depingit in hist. gall. nomine Ammi communis; In fol. lat. Ammi vulgaris, latioris folij, quod majus ait.

Turnerus quidem Ammi veterum esse negat, sed ejus loco hoc nos uti posse admittit. Ammi, inquit, Graecis & Latinis, quo nomine & Angl. potest appellari. Officinae Ameos nominant in pignèdi casu. Herba Ammi in omnibus hodie officinis usitata, caule est longo, viridi, circa summitatem ramoso: foliis longis, tenuibus, crenatis: flore albo in umbellis Anethi, femine parvo, amaro, calido. Est pro Ammi possit substitui, sitque ejus species quaedam, provenit tamè in Italia genus quoddam nobilius, quod vidi: Cuius si copia esset, ejus usum, relicto hoc vulgari, cōsulerè. Nō enim invenio in vulgari calore illud & siccitatem in tertio excessu, quae requirit Galenus. Quamquam interitū nō est contemnendum vulgare hoc Ammi.

Ammi vulgare (ut pulchrè notat Cam. h.) à Trago & plerisque depidum, interdum longè alia folia profere conspicitur, pluribus nimirum incisuris praedita, & nonnihil crispata, ut penitus diversa planta videri queat. Ammi enim vulgatum, si in aspectis ac

Ruell forte
Sison con-
Ammeo fundi cum
Ammi.

Ammi
Trag.

Semen in
fine Apr. us-
ter a man-
dandum.

Cuminum
regium,
Hipp.

Ammi Dio-
scor.

Ammi Cor-
do peregrini-
um.

Ammi com-
munis, Dod.

Negat Am-
mi Veterum,
Turn.

Ammi spe-
cies quaedam
melior an
Sison?

Ammi Vul-
gare, Cam.

aridis locis, quales ut plurimum in Apulia conspiciuntur, inveniatur, dodrantali longitudine videtur, ut testatur Marantha: in pinguiori verò Solo, si squicubitu æquat, exceditque.

Licet autem reperiantur, qui vulgari hoc Ammi, veri loco utantur, non desunt tamen, ut Monachi in Medist. i. cens. 27. qui non recipiunt vulgare Ammi. Et sanè expendendum est pharmacopolis an usuale hoc veri notas exhibeat. Cronenburgius de comp. med. l. i. ait se hæc usque ejusmodi notas non deprehendisse, ideòque genuinum esse inficiatur, & merito.

Synon. Fuchsius porro descriptam à nobis plantam vocat Ammi, quo titulo eà etiam pingit. sic vocat & Lon. & Gesn. col. Dod gall. Ammi commune; lat. in fol. Ammi vulgare. Lob. adv. p. 32. in obs. p. 45. (hic querit, An Bubonium Hippocratis in morb. muliebr. Guiland. in sc. p. 720. Ammi vulgatus. Lug. p. 695. Ammi Fuchsj. Ger. Ammi vulgare. Bifchofs weede. H. Lul. Ammi Fuchsj & Tragi, Ammi vulgare. Tab. Ammi felinum; Bubonium Hippocratis, Amm. meypeterlin: Ammum adulterinum. Bauh. apud Matth. confund. t. Ammi vulgare cum Cretico. Ammi, inquit, triplex habetur, majus, alterum semine Apij, & tertium foliis Fœniculi. L. Ammi semine Apij, Ammi Matthioli Ang. Lac. Cast. Lug. Ammi majoribus & serratis foliis, Gesn. h. Ammi Creticum aromaticum. Lob. Ammum 3. Creticum Tab. Cuminum sativum Cæsalpini fortè. Confundit inquam C. B. Ammi vulgare cum Cretico. Matthioli non loquitur de Ammi majoribus foliis, nisi intelligat id, sub officinarum Ammi: Anguillara non loquitur de hoc Ammi, nisi id intelligat per Ammi Ghini. Ammi Creticum Lob. Tab. & Cuminum sativum Cæsalpini est alia planta. Alia iterum Lacunæ & Castoris. Et hæc monemus, ut si post hæc de plâs scribat, confusionem suam agnoscat & emendat. Qui verò possibile est tantum virum tam graviter lapsum.

C. B. excus. Num bonus aliquando dormitat Homerus? An huc errore ex inanimadvertione, aut aliorum potius culpa irrepsisse, vel ex eo cõjectari licet, quod monitus in pin. Iubens sententiã mutavit Ammi i. majus (inquit) est Ammi Brunf. Trag. Turn. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. h. Lon. & Lugd. Ammi commune sive vulgare, Dod. Cam. Ger. Ammi vulgatus, Lob. Ammi felinum, Taber. Bubonium Hipp. quorundum; Bupleuron Plinij, aliorum. Variat folus plurimum incisus & non nihil crispis.

Ammi vulgatus, amarum est semen, & gustu ferret, ut tradit Schvv. Sed falsitur, si gustus ejus non depravatus sit, aut eum penitus amiserit. Iudicent, hoc qui semine habet, an tali sit sapore.

An Corn. in Diosc. notum vulgò semen Ammi, officinis Ameos corruptè vocatum, Germ. Ammey famen, i. e. semen Ameos.

Ammi vulgare, foliis, caulibus & umbellulis maius Ammi Cretico, & Ammi cum minore semine, nec eo ita odorato, habebat Fuchius Tubingæ in horto, cum ipse conviverem, vocabatque Ammi majus, cuius faciebat & alteram speciem, quam vocabat Ammi medium tenuioribus foliis. Sed hæc fortassis à cultura varietas. Basilæ vidi in hortis flores mensibus Septembri & Octobri. Lugduni sponte, proveniens in horto meo, flores Iunio. Montbelgardi in horto E. C. florens etiam Iulio ac aliis mensibus, semine deciduo se propagans.

urde annua est planta. Tragus, Fuch. & Dodonæus hanc in Germania tantum satam in hortis provenire ferunt, facillè tamen & magnà copîa, licet ut deinceps vix extirpari queat. Augusto mensis florèt, ac deinceps ubi desloruit,

semen abinde producit.

BVNIVM VETERIBVS. CAP. XVII.

Bvniõ [Bvniõ] caulem producit quadrangula. Diosc. i. Rem, prolixum, crassitudine digitali: folia verò stratis. [scilicet τὰ πικρὰ, & adici proxima, Dod.] similia Apio [scilicet τὰ πικρὰ, & adici proxima, Dod.] sed multò tenuiora, ad Coriandri folia accedentia [scilicet τὰ πικρὰ, & adici proxima, Dod.] vel. Lat. τὰ ἀπαρ.] florem Anethi: semen odoratum, Hyosciamini semine minus. Ciet id urinas, excalfacit, & secundas evocat. Spleni, renibus & vesicæ utile. Cæterum feminis tam humidi, quàm siccis; itémque succi ab eo unà cum radicibus, caulibus ac foliis expressi usus est ex aqua mulla. Bunion inter rejectanea Dioscoridis, alij Aton, alij Actinen, alij Anemomphoron, Prophetæ Paradacry, Egyptij Erioxen, Romani Scopam regiam vocant; Aphri Zigar, alij Themplo. Vinum Bunites fieri, si Buni contusi drachmæ duæ in quatuor musti heminas mittantur, auctor est Dioscorides. Commodum esse stomachicis & fatigatis ex armorum pugna, aut equitatione multaque prodidit.

Meminit hujus Plinius l. 20. c. 4. Naporum, inquit, Naporum duos differencias & in Medicina Græci servant. Angulosi foliorum caulibus florentis, quod Bunion vocant, purgationibus seminarum, & vesicæ & urinae utile decoctum, potum ex aqua mulla, vel succi drachma. Semen dyentericis costum, tritumque in aqua calida, è cyathis quatuor. Sed urinam inhibet, si non Lini semen unà bibatur. Alterum genus Buniada appellant, &c.

Bunion, quod aliquos Arction vocare scribit Galenus, ex calfacientibus esse ait in tantum, ut & urinam ciat, & menses ducat.

Bunion sunt qui Aron dicant, ut videre est apud Marcellum, fumentem qui Arction, &c. Alterum & primum in divisione Naporum genus Bunion hoc facit Dioscorides, at idem Marcellus: describiturque à cunctis iisdem notis & viribus. Non tamen in sanitatis usu receptum, ut alterum illud est. Quod feminino genere Buniada Græci vocant, secundo volumine à Rapis statim, quasi ejusdem cù illis generis à Diosc. tractatum. Vtriq; radix crassior: sed cõtra quam in Rapis acuminatæ longitudinis: hinc etiam exilior, quàm Buniadi & minor. Nomen ambobus factum alqui tradiderunt ἀνὸ τῆς βυνίας. Vocant autem Græci inter alia Bunos, tumentia & quæ in amplitudinem creverunt, quæ Naporum radicis forma est. Cur autem in Dioscoride legatur Scopam regiam Bunion à Romariis dici, ignotum nobis est. Nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non furculosam structuram, non ulum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum ratione indicet aliquam.

Ignote aliz appellationes etiam. Sola Arction ex si. multitudine facta est: quam nos Æginetæ auctoritate ir stauravimus. Nor legitur in Barbari editione hoc caput: nec nos scimus, relictumne à librantis imprudenter in exscribendo fugit: an potius quia de Napis à Diosc. secundo libro actum fuerat, ratus abundare, volens isple & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Buniõ ab eodem est. Veruntamen auctoribus Græcis omnibus recipiendum, & cù cæteris vertendum fuerat. Qui enim de Pseudo-Buniõ, i. e. falsâ & mētiēte Buniõ, agi mox poterat, nisi de vero Buniõ actū prius fuisset? Verè enim alijus oportet falsâ & mētiēte in plâs esse.

Cur autem in Dioscoride legatur Scopam regiam Bunion à Romariis dici, ignotum nobis est. Nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non furculosam structuram, non ulum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum ratione indicet aliquam.

Ignote aliz appellationes etiam. Sola Arction ex si. multitudine facta est: quam nos Æginetæ auctoritate ir stauravimus. Nor legitur in Barbari editione hoc caput: nec nos scimus, relictumne à librantis imprudenter in exscribendo fugit: an potius quia de Napis à Diosc. secundo libro actum fuerat, ratus abundare, volens isple & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Buniõ ab eodem est. Veruntamen auctoribus Græcis omnibus recipiendum, & cù cæteris vertendum fuerat. Qui enim de Pseudo-Buniõ, i. e. falsâ & mētiēte Buniõ, agi mox poterat, nisi de vero Buniõ actū prius fuisset? Verè enim alijus oportet falsâ & mētiēte in plâs esse.

Cur autem in Dioscoride legatur Scopam regiam Bunion à Romariis dici, ignotum nobis est. Nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non furculosam structuram, non ulum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum ratione indicet aliquam.

Ignote aliz appellationes etiam. Sola Arction ex si. multitudine facta est: quam nos Æginetæ auctoritate ir stauravimus. Nor legitur in Barbari editione hoc caput: nec nos scimus, relictumne à librantis imprudenter in exscribendo fugit: an potius quia de Napis à Diosc. secundo libro actum fuerat, ratus abundare, volens isple & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Buniõ ab eodem est. Veruntamen auctoribus Græcis omnibus recipiendum, & cù cæteris vertendum fuerat. Qui enim de Pseudo-Buniõ, i. e. falsâ & mētiēte Buniõ, agi mox poterat, nisi de vero Buniõ actū prius fuisset? Verè enim alijus oportet falsâ & mētiēte in plâs esse.

PSEUDO-BVNION VETERIBVS. CAP. XVIII.

Pseudo-Bunion parvus frutex [Sausion] est palmi altitudine in Creta, folia, ramulòsq; habes Bunion similia

familia [Apio, ver. cod.] acris gustu. Quaterni ejus ramuli ex aqua bibiti, tormina, stranguariam, laterisq; dolorem sanant: discutiunt & strumas, si cum sale & vino tepentes imponantur. Romani pariter & Græci Pseudobunion vocant.

Pseudobunion, ut refert Plin. l. 24. c. 16. Napi folia habet, fruticans palmi altitudine, laudatissimâ in Creta. contra tormina atque stranguariam, laterum, præcordiorumque dolores bibuntur tami ejus qui nescio. Pseudobunion, auctore Galeno, similiter ut ipsum Bunium, calidum est.

Quale Pseudobunion sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosque alios, qui omnes Napo similem tradiderunt, nomen ipsum etiam indicat. Neque enim mentiri verum Bunion, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset. Ea, similitudine fallens, fallum, & mendax Bunion à Græcis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim Italia herba est, & ex Creta repetenda, inquit Marcellus.

BVNION ET PSEUDOVNION in genere.

[Gnotum hodie utrumq; Bunion, tum verum, tum fallum ait Cornarius. Vulnerariam præterea herbam esse negat: siquidem iis viribus non sit prædita, quas Gal. Bunio attribuat, velut quidam opinati sunt. Idem Pliniû Bunion cû Buniade cõfundere scribit.

Monet auctor Lugdunensis, in quibusdam etiam veteribus græcis Dioscoridis exemplaribus l. c. de Lampsanâ; caput de Bunio non rectè subditum fuisse à descriptore, nomen & Buniad. G., i. e. Napi, & Buniad. G. similitudine decepto, cum re ipsa diversissimæ sint plantæ. Nam præterquam quod absurdum fuerit ejusdem plantæ historiam diversis libris à Dioscoride conscribi, certè Raporum, Raphani, Naporum, & cæterorum id genus olerum descriptio, & natura à Bunio & Pseudobunio herbis insigniter medicatis omnino dissidet, nec rectè conjungi potest. Quare ex vetustiorum etiam codicum fide, rectè Bunij & Pseudobunij historia in librum quartum rejecta est. Eadem nomen affinitas multis etiam doctis herbariis, erroris causa fuit: primum Plinio, qui Bunium Napi genus fecit. Deinde Ruellio, qui capite de Pseudobunio folia Bunio dicunt, folia Napi convertit: item Onbasij interpreti, qui Bunium Napum interpretatus est. Huc etiam impiegit Matthioli, Bunium Napum silvestrem vocans, cum Napus silvestris Buniad sit, non Bunion. At Gervius, neque Buniad est, neque eadem figurâ, neque iisdem viribus, aut classe cum Buniade. Est præterea observandum, nec in exemplaribus græcis, nec in Oribasio in Bunij caule ramulos minutis foliis ac filibus scætere: itè folia Apio quidem similia legi, sed non proximè radicem. Quare necesse est, aut verba hæc reducere, aut Ruellium alio exemplari, quam vulgato usum.

Bunium non aliud agnoscit nomen, quod sciam, nec apud Græcos, Latinos, Germanos, aut Anglos: nusquam enim mihi (Turneri verba sunt) in Anglia, aut Germania conspectum, tantumque in Italia Bononiæ vidi. Vocetur tamen, ne anonymos sit, vilbe Parsely aut Square Parsely / à similitudine cum Apio. Matthioli aut Bunium in Hetruria vocari Napum silvestrem, nusquam tamen describit, nec pingit, quod tamen factum eum fuisse puto, si ei notum fuisset. Mirum est rusticis in Hetruria tam bene notam plantam, vocarique ab iis Napum silvestrem, cum Napus sativus (unde illi nomen mutuantur) nihil penitus habeat simile cum Apij aut Coriandri foliis, nec flores habeat Anethi, nec semen Hyosciami. Præceptor meus Bononiæ Lucas Tom. III.

Ghinius hæc plantam me docuit, portionemq; communicavit, quam etiamnum possum demonstrare. Cû Bunium Dioscoridi dicatur Bunion, eidemq; Napis vocetur Buniad, de quæ iis agat duobus diversis capitibus, differentesq; faciat plantas, alteriq; tribuat folia Apij, aut Coriandri; alteri longè alia: si melior auctor sit Dioscorides quam Plinius, illum potius Buniadem à Bunio distinguendum, quam hunc sequendum censeo, aut Matthiolum etiam, qui unâ cum Plinio utramque confundit plantam, ex duobus unam faciens, quæ tā longè descriptione, figurâ & formâ inter se differunt. Nominum fortè similitudo Plinio imposuit, ut has conjungeret, aliâ formâ & viribus longè diversissimas.

BVNIVM DALECHAMPII.



Locus saxosus, a. Dister. L. speris, & à Sole illustratus Bunium Dalechampi provenit, radice candidâ, furculosâ, odoratâ, festucis in summo villosâ, foliis proximè radicem tam facie similibus Apio hortensi, ut spectantes fallant, tenuioribus ad Coriandri folia accedentibus, caule quadrato, procero, minimi digiti crassitudine, flore umbellato. Anethi, scilicet odorato, quam in Hyosciamo minore.

Pingit hoc Bunium Dalechampi Lug. p. 774. ve. Bunium rûmque Bunium Dioscoridis, Plinij, & Galeni facit. Sed descriptio Dalechampi nimis jejuna, & potius mûm ex Dioscoride transcripta: regio ubi observata, erat annotanda. Stirpium periti investigent quam plantâ intellexerit Dalech. in Icone non est radix in summo villosa, ut in descriptione traditur.

Bauh. phyt. vocat Daucum 8. (in pin.) & Daucum Petroselinij, vel Coriandri folio, Bunium Dalechampi, quem multum convenire ait cum Dauco 7. five campestri Apij folio [bunc nos Saxifragiam bircinam mediam credimus.] Verum in illo semen dicit, ut Anethi oblongum; in hoc Hyosciamo minus, ut in Bunio Dioscorides requirat. Ego non invenio Dalechampi dicere semen ut Anethi, sed semine minuto: Icon parum habet similitudinis.

BVLBOCASTANVM TRALLIANO. CAP. XIX.

ALEXANDER Trallianus empyematicis viâs rationem præscribens, inter alia meminit Bulbos Castaneæ, quam sic dictam retur, quod figurâ radicis bulbos sapore gustiq; Castaneæ scitè exprimat. Verum Goupylus vocem hanc depravatam fuisse à descriptioribus annotavit, quod Castaneæ neque ex Bulborum genere sint, neque Bulbis simile quicquam habeant, ex Glandium enim genere sunt, ex quo conjicit veterem scripturam fuisse Bulbos Castaneæ. Sed cum natura plantas proferat habitu & figurâ radicis bulbos, sapore gustiq; Castaneæ scitè exprimentes, adhuc non video, cur Tralliani lectio sit immutanda.

Sexu. Et hinc Dalechampius proponit Bulbocastana, sive dicretum, nam mas, quod alij Bunium Dioscoridis faciunt, & nos Bulbocastanum inscribimus. Alterum femina, quod Oenanthen aquaticam cognominamus.

Habet & Camer. de hort. Bulbocastanum comophyllum, quod Cicutariam bulbosam odorisam vocamus.

Ornithogalum Ruell. Dod. de florib. c. 57. ait Ornithogalum Ruellij descriptum l. 2. c. 77. Bulbocastanum quoddam esse videri, & non Ornithogalon.

Bulbina. Bulbina quibusdam neotericis, teste Dodonæo, de suo Bunio dicitur, quod est Bulbocastanon. De Bulbina dictum H. n. g. l. 19.

Guilandinus non probat Andernacum & ante ipsum Goupylum (quos sequitur Matthiolus, ut prolixius videre est l. 7. H. n. g.) pro Bulbocastanon, Balanocastanon (Castanearum glandes) substituentes, quod empyematicis nullam utilitatem afferre possint.

Trasi. Bulbocastanum dici de Trasi, patet H. n. g. l. 18. c. de Trasi.

Cyclaminum non sine errore. Errant Angli multi, qui Cyclamini loco, Bulbocastanum sumunt, quod neque viribus, neque facie respondet Cyclamini descriptioni.

BULBOCASTANVM.

Descriptio.



Radix bulbosa, primo ortu Ervi magnitudine & rotunditate, interdum pyriformis, fibras tum ab imo, tum à lateribus promens capillares, albas, solida gustu subdulci, grato, folia profert bina, virore splendentia, sessile quinciam longa, vix dimidium culmum lata, sapore ferè Petroselinii, sed multum ignaviores, quæ postea variè dissecantur, ad eò Apii hortensis folia, mentientia, ut difficile ab exercitatis etiam, nisi deesset saporis fervor, inter nosce possint.

At adultiori radix in insignem augetur molem Iuglandis magnæ, inæqualiter tuberosa, membranâ nigrâ contecta: folia verò ex pediculis palmaribus & sesquipalmaribus purpurascensibus etiamnum tenuius dissecantur, ut Rutæ ferè prætensis tenuifolia, pinguis, crassa, caulis, in ramos aliquot divisus: umbellæ satis magnæ: flores albi: semen tenue, longiusculum, nigrum, sapore aromatico, & acro.

Synonyma. Guilandinus vocabat eum Patavij esse Bulbocastanum. D. Cortusius speciem Oenanthæ faciebat. Insignis Medicus Petrus Turnerus, cum apud nos esset, dicebat patrem vocale Apion. Is verò partim appellat Apion, vel Chamabalanon, quod à Theophrasto Ichas, Lat. Gazâ interpretate Caryca, Anglis Eördnut, vel Eärthnut dici ait.

Chamabalanon. De hoc porro loquitur Guill. in epist. ad Gesn. inter epist. Matth. l. 2. c. 6. x. s. v. Tralliani l. 7. & Eärthnut herbam interpretor, cuius semina ad te misi. In Græciâ Chia ἀγχιόκος αὐτὸς αἶ, Bizantini ἀγχιόκος αὐτὸς, Rhodij βελόκος αὐτὸς αὐτὸς appellant. Adhupulatur meæ sententiæ, aut ego potius suæ, Fallopius.

Guilandinum, quod novam improbat Trallianum, nilectionem, hallucinari scribit Matthiolus, nec ullo pacto censendum putat loquutum Alexandrum, de Bulbocastaneo Guilandini, cum nullus habeatur inter antiquos, nec inter recentiores Græcos, qui usquam Bulbocastanei meminerit. Miratur Gesnerum concessisse Guilandino radicem illam misisse esse Tralliani Bulbocastanon. In hist. germ. præfens planta ab ipso Oenanthæ inscribitur, quod figuram, quam ponit melius cum Oenanthæ, quam Filipendula convenire tradit, ac propterea Oenanthem constanter, sed pertinaciter existimat. In post. com. cum mag. fig. Oenanthem primam fecit, quam Cortusium sibi misisse fatetur, quàmque pluribus notis genuinum Dioscoridis Oenanthem referre etiam adhuc alletit. In Compend. p. 545. ait. Si Oenanthæ huic caules inessent crassi, assererem proculdubio legumam esse Oenanthem. Matthiolo autem non bene notam plantam esse, cuius figuram ponit, satis constat ex eo, quod non describit: si quis etiam consideret quibus rationibus motus Matthiolus, neget Filipendulam esse Oenanthem, iidem & hanc rejiciet: ubi enim folia Pastinacæ & semina Atriplicis.

De Bulbocastano (ita namque in append. horti, & de hort. ubi & Bunium Dodonæi nominat) Gesnerus Guilandino planè subscribit. In eo enim quod dubitavit an Mamiras Pauli fortè esset, planè ipsi satisfactum est, & plantas diversas esse agnoscit, & asserunt à Guilandino veram lectionem Tralliani, & rem ipsam quoque demonstratam assentitur: sed quæ de facultatibus scribit Guill. non satis assequitur: siquidem Trallianus non quibusvis purulentis usum commendat.

Dod. gall. Bulbino dicitur, latine è Bunium. perhibet autem quibusdam Aton, Actine, Anemophiloron, Galenocetum Arctium, in Zelanda è leyn Eördnotæ dici, & Neotericis, non sine tamen ingenti errore Apion, aliis Bulbinam, quibusdam etiam Meum. Idem de Florib. c. 55. Bulbocastanum aliud (scilicet Ornithogalum Ruellij), quod Bulbocastanum quoddam esse credit quod Tralliani Bulbocastano, sive ἀγχιόκος similem scribit, nuncupat. Lat. in fol. pingit Bulbocastani nomine, dicens: βελόκος αὐτὸς αὐτὸς meminit Alex. Trallianus l. 7. inter ea, quæ purulentis utilis sunt, cibaria ipsum referens, &c. Bulbocastanum autem à formâ bulbi, & sapore Castaneæ nomen invenit suum. Nostrâ ætate plerique ἀγχιόκος αὐτὸς αὐτὸς nuncupant. Zelandi è leyn Eördnotæ / Germ. Klein Eördnut / Sabaudi Faverrottes, Angli Zippernutz.

Lob. in Adv. p. 325. de Bulbocastano inquit. Versio Pliniana imitatione oppido tuberosâ illusit fortè Commentatori [Matth.] aut ejus Theseo Tridantino, adegitque ut Aristolochia rotunda & adultæ perquam similem facie radicem adstruxerit: quæ ab Oenanthæ tantum distat, quàm Bunium vel Bulbocastanum Tralliani à Filipendula, quod plebecula Gallica, Germanica, & Anglicana eum monuisset. Illam enim Angli. Zippernutz vocant, quod opilione Nucleum sonat, quia illis cibo cedit. In Observ. p. 429. inscribitur ab ipso Nucula terrestris, Apios Turner Angliam Bunium Dioscoridis & Bulbocastanon Tralliani: perperam Oenanthem Matthiolo. In Icon. p. 745. Nucula terrestris Septentrionalium.

Lugd. tres historias & figuras unius plantæ habet. Prima figura est p. 773. hoc titulo: Bulbocastanon mas Dalechampij. Altera p. 774. hoc. Bulbocastanon grandis, Bunium Dodonæi. Tertia p. 782. pro Oenanthæ i. Matthioli. Nox ex tribus Dalechampij descriptionibus, adscribemus eam, quæ est. Bulbocastani maris Dalechampij, quod frater Bauhin. separat à Bunio Dodonæi, malè nostro iudicio. Ea sic habet. In pratis udis & riguis nascitur, radice Bulbo-

bulbosâ, nodis extuberant, extrinsecus in nigro rufescente, intrinsecus candidâ, gustu Castaneâ. Prælongum quoddam & gracile veluti filum ex se mittit, sæpius intortum, paulatim crassescens in caulis originem: caulis cubito major est, rotundus, in quo folia pauca, Fœniculo similia, veluti & caulis ex articulis prodeuntia. umbella in summo candida. semen oblongum, capite gemino conspicuum, subacre. Dodonæo est Bunium Dioscoridis lib. purg. Bulbocastanum. Lob. Nucula terrestris, perperam Oenanthe Matthioli: Bulbocastanum mas Tralliani. Lon. vocat Klein Erdnuß / facitque speciem Ornithogali. Camer. h. nominat Bulbocastanum Tralliani, Oenanthe Matthioli, Erdtriefen / Schaffneruß / Geranium 1. Dioscoridis Calalpinii. Traditis & alterum Bulbocastanum maioribus foliis & bulbis, in tractu Rhenano frequens, quod quidam cum precedenti Bunium Dioscoridis esse putarunt. Apud Matth. in hist. ger. Oenanthe Matthioli, vulgo Bunium & Bulbocastanum Tralliani. In epit. Oenanthe, Bulbocastanum Tralliani.

Tab. Bulbocastanum, Erdt Castanien / Seto Castanien. Bulbocastani altera icon, quam Turnerus communicavit nomine Apios, quamq. depingendam curaverat ex veteri libro, & postea mutata sententiâ vocavit Bulbocastanum, cum quo convenit, si folia non essent ita crassa. Herbarii vocant Castaneam terræ & Castaneam porcinaam.

Bauh. phyt. Bulbocastanum majus folio Apij: Bunion Dod. Nucula terrestris Septentrionalium Lob. Item Bulbocastanum alterum folio Fœniculi, Bulbocastanum mas Tralliani, Lugd. Idem apud Matth. Bulbocastanum folio Apij, Oenanthe 1. Matthioli, Panascæ folio Calalpinii. Quomodo autem Bulbocastanum possit esse Panascæ folio Calalpinii non videmus: huic enim folia Geranij, aut Anemones: flores purpurei, quæ non competunt Bulbocastano: præterea non diversum, sed idem planè credimus Bulbocastanum mas Tralliani & Bunium Dodonæi. Ipse adhuc notat in animadv. in Lug. Bulbocastanum mas Tralliani Lugd. & Oenanthe Matthioli eadem esse plantas, sed illius figuram meliorem. Dissipatis tenebris veritas tandem illuxit C. Bauh. in pin. Bulbocastanum 1. majus folio apij (inquit) est Oenanthe 1. Matth. Cast. Lugd. Bunium, Dod. gall. Lac. G. f. h. Apios, Turr. Bulbocastanum, G. f. h. Dod. Cast. Tab. Ger. grandius, Lugd. Bulbocast. mas Tralliani, Eid. Lugd. Nucula terrestris Septentrionalium, Lob. Panascæ folio vulgo, 2. Cast. Eid. B. Bulbocastanum 2. minus; Ornithogali species, Lon. Bulbocast. alterum, Cam. Hoc ratione loci, solum in cirsuris variat, quod ex Anglia, ex Pyrenæis, & monte Calcaris habemus.

Bulbocastani Dodonæi nomine accepi semina & bulbos missos ex Champagnole Burgundia ab insigni pharmacopœo Toffano Carolo, qui plantati in horto E. C. optimè proveniunt, & semine deciduo se multiplicavere, mense Martio producentes folia, ac flores lunio; semen maturans Iulio. Arva & pingua umbrosa amat, in Holandia & Anglia, teste Lobelio, plurima, præsertim ad pagum Clefson prope Briscoiam Multis in locis Angliæ provenit, copiosissimè verò in Northumbria, Turnero id perhibente. Camerario copiosè crescit in monte S. Petri dicto prope Salinas Saxonicas. In editis Arvernorum montibus copiosissimè. Plurimum provenit ex semine per maturitatem sponte deciduo, quo tempore commodè seminat. Vere in eunte terre mandatum aggerimè pronascitur, & interdum integro anni spatio delitescit, nec nisi altero demum prodit: radix diu vivit, nec semine maturascente cassi redditur. Tabern. in multis Germaniæ locis provenit in agris frumentaceis, & vixis potissimum in Palati-

natu prope urbem Odenheim & locis vicinis: delectatur terrâ firmâ, præterea pingui.

Bulbocastani radix, referente Dodonæo ex Tralliano, moderatè calida est & sicca; simul & aditrigens: semen veid calidius & siccus. editur illa cruda, sed suavis cocta, sanguinem spuentibus & misingentibus utilis. semen aperiendi vi præditum & diureticum esse videtur. Radices Lonicerus tradit dulces & gratas esse, ac propterea eas effodere pueros, coquere cum aqua & sale, & comedere, quosdam etiam crudas. Dioscoridis verba (de purgatione sursum & deorsum) scrupulum Turnero in jecerunt, ut dubitaret, utrum suum Earthfruit (i.e. Bulbocastanum) esset Apios, an non: cum multi totam (Bulbocastani) radicem comedant, imò interdum quinque aut sex radices, nullo vel vomitu, vel alvi solutione subsequente. Vtrum autem Earthfruit (i.e. Apios) eas habeat facultates in Græciâ; hic in Angliâ autem minimè, certò non affirmat. Id tamen concluditur commodi consequi posse ait, ut minore labore Apion verum cognoscatur, si in id fortè incidatur. Hortatur tandem studiosos ut periculum faciant, an suum Earthfruit Bulbocastanum, ubi fortè in Angliâ, quàm ubi ipse fuerit, facultates eas habeat, quas illi tribuerit Dioscorides. Quòd si non inveniant, discant ex hoc Earthfruit in indagandis plantis, non temerè de plantis pronuntiare ex forma sola externa, verum etiam ex viribus & facultatibus. Et hæc est de Bulbocastani viribus opinio & mens Turneri, cui si nota fuisset Apios vera Dioscoridis, non quæreret vim purgatricem in Nucula terrestris. Radix Bulbocastanei (inquit Tab.) excoctata cum modico pipere in jure carniū cocta, suavis admodum cibus est, multum nutritiæ & Venerem stimulat.

VISNAGA. CAP. XX.

ICON I.



Sesquicubitalis Desf.

Scirciter est planta, radice raris annatis fissa hærens, caule Anethi, striato, g'abro, geniculato: folio Pastinacæ erraticæ, laviportionibus divisionis majoribus; umbellæ florum candent, tandemque in se contrahuntur, veluti caverna, mediam pationum sepimeto effingente: pediculi autem umbellæ, potissimum externi, palmo longiores, rigidi, durique sunt; singulique tam hi quàm interni novam pedicellorum frequentium umbellam in novam gerunt. porò tam umbellæ singulares, quàm coma tota, subiecta habent adbasim foliola: semen parvum, Apij officinarum, acre.

Nostræ icones sunt ex Guatinianis, quarum secundæ est apud Fuchium pro Sefeli Massiliensi.

Gingidium
negamum
corra, Dod.
et Ang.

Nec est pa-
stinaca silv.

Seseli Mas-
siliensis mch.

Erd et
Dauci ter-
rium genu

Gingidium
Ang.

Non desunt autem qui velint Vifnagam, vel ipsum legitimum esse Gingidium, in qua sententia sunt Dod. & Anguillara. velle jus alterum genus. Sed nobis & Castori cum Matthiolo, non ardet eorum opinio. Sed nec ipsi Matthiolo & Castori subscribere possumus, potius esse existimantibus majorem Pastinacam silvestrem. Sunt præterea qui Gingidium Matthioli Scandicem esse putant. Sed erronea est eorum opinio.

ICON II.



Seseli Massiliensis titulo secundam hanc nostram iconem pingit Fuchs in hist. cap. 303. Verum descriptio non convenit figuræ, & multa nomina, quæ alterius sunt plantæ. Merito propterea mutavit sententiam in Iconibus, ubi Daucoi tertium genus facit, das drut ges schlech deß Vögelneisse.

Gingidium adhuc notum in Syria est, inquit Anguill. epist. 7. ubi eo vescuntur. Huic vires à Dioscoride ascriptæ conveniunt, vocatur Vifnaga & Busnaga: pingitur

Fuchs. conf. à Fuchso, modò pro Seseli Massiliensi, modò pro Dauco: sed neutri descriptioni convenit. Dioscorides ex Crateva corrigendus: amari est saporis, ut vult Gingidium esse Galenus.

Lepidion
Syria, Dod. Gingidij & Vifnagæ titulo plantam nostram pingit Dodonæus gallicus, vocatque ait in Syria Lepidion: ab aliis etiam teste Dioscoride, præsertim à Romanis Bifacutum: in Hispania verò Vifnagam: incognitam officinis tam Germaniæ, quàm Galliæ.

Bifacutum
Syria, Dod. Lat. in fol. vocat Gingidium alterum. Castor p. 477. Vifnagam, & Pastinacam silvestrem majorē. Matth. in post. comm. cum mag. fig. lat. l. 2. c. 131. Ital. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Bifnaga
Syria, Dod. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam Bifnagam & Bifnaginem. Tab. Gingidium 3. & Bifnagam, Syrisch Körffelfraut / Zanscherfraut. Idem apud VVirg. Gall. c. 126. Vifnagam, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Satis ostendunt Tragus & Lonic. Vifnagam non Tragus sibi notam fuisse. Tragus siquidem eam pro Seseli, Lonic. verò pro Seseli Massiliensi pingit, ac cum Silere montano præterea uterque confundit.

Vifnaga annua planta Montbelgardi in horto E. C. lata facile ex piliis provenit, florens Augusto: in Tempore alios semen misit nomine Vifnagæ Tossanus Carolus. Lugduni & Genevæ copiosam habebam in hortis, turgentem semine in Autumno, quo tempore perire solebat. Frater misit pro Gingidio Dioscoridis; Bernh. Paludanus verò nomine Scandicis, & Gingidij Ægyptij, cujus umbella & pediculi firmiores erant & majores, quàm in hortis nostris proveniunt.

Pastinacam viribus referre contendit Matthiolum, cujus rei, qui volet, periculum facere poterit. Pediculi pro dentaliis multis in usum veniunt, præsertim verò Hispanis, ob suaveolentiam. Cæterum, vires Gingidij huic tam verè conveniunt, quàm verè Gingidium esse diximus.

DAUCVS CAMPESTRIS FOLIIS Fœniculi, clausà umbellâ.

Herba lato Solo & in agrorum limitibus ubique hæcquens in Æstate: caule cubitali, crasso: frequentibus foliis, capillaribus, ut Fœniculi, crassioribus: umbellas fert latas, tres aut quatuor, initio convexas, capitulum modo herbaceas, quibus postea flosculi insunt candidi: accedente autem ad perfectionem semine, concavæ redduntur, reflexis ad medium corymbis, ut in Staphylino, & tandem clausæ vasculum efformant, in quo multa semina continentur parva, in rotunditate oblonga, sapore acri & amaro: radix alba est, acris & odorata, sed lignosa.

Cæf. 7. cap. 18. vocat Daucum campestre, herbam quam modò descripsit, facitque Dioscoridis tertium Daucoi genus, & Daucum foliis Coriandri Plinij. Is nifi Vifnagam tradidisset, eodem lib. cap. 14. existimarem ab eo hoc loco per Daucum campestre Vifnagam deseri.

DE SESELI MASSILIENSI, ÆTHIO-PICO, & Peloponnesiaco, veterum sententia.

CAP. XXI.

Seseli Massiliensi Dioscorides assignat folia Fœniculi similia, sed crassiora: caulem etiam luculentum, & umbellam Anetho similem, in qua semen oblongum, angulosum, & statim ut editur acre esse dicit. Radicem longâ & odoratam. Vim habere semen Virens & radicem calefaciendi. In potu urinæ stillicidium & erectæ cervicis spirationem sanare. Prodesse etiam ad uteri stragulationes, & ad morbum comitalem. Ducere quoque menses & fortis, & ad omnes internas affectiones facere, & tusses veteres sanare. Semen cum vino potum concoctionem adjuvare, & tormina solvere. Et epialis febribus commodum esse. Et ad frigoratinerum cum Piperis & vino bibi. Dari etiam capris & reliquis pecoribus in potu, ad partus facilitatem. At quod Æthiopico Seseli appellatur, folia habere Hederae similia, sed minora & cæm. oblonga, ad Perilymeni foliorum modum. Fruticem esse magnum, sarmenta ad duos cubitos extendentem, in quibus rami sunt duorum palmorum & capitula velut Anethi. Semen autem nigrum, densum, velut Triticum, acris & odoratus, quàm Massiliense, vehementer jucundum. Quod verò in Peloponneso nascitur, folia habere Cicuta similia, sed latiora.

Jatiora & crassiora: caulem majorem quam Massiliense, Ferulæ figurâ. Et in hujus summo umbellam, in qua semen est latius & odoratum & carnosius. Vim habere eandem. Nati in locis asperis & humidis, ac editoribus. Item in Ida.

Tria hæc Sefelis genera à Dioscoride propofita; Plinius, ut etiam testatus est Cornarius, non habet, sed L20. c.22. inquit. Adjicitur Tordylon. Est autem id semen ex Sefeli. Aliàs Sili vocare solet ac dicere se. pro Sefeli, ut L24. c.19. Tordylon alij semen Silis esse dixerunt, alij herbam perse, quam & Syreon vocaverunt. Neque aliud de ea proditum invenio, quam in montibus nasci. Et L22. c.22. Elaphoboscum ferulaceum est,geniculatum, digiti crassitudine, femine in corymbis dependentibus Silis effigie. Et L13. c.26. de Spondyllo. Semen eodem nomine Silis speciem habet. Et L27. c.7. de Absinthio agens, cum Sili inquit, & Nardo gallico, aceti exiguo addito, fastidia absterget, concoctiones adjuvat. Sefelim tamen appellat lib.8. c.32. de cervis loquens, feminæ ante partum purgantur herbâ quadam, quæ Sefelis dicitur, faciliore ita utentes utero. A partu duas habent herbas, quæ Aros & Sefelis appellantur. Et L25. c.8. simplicius cervæ monstrare Elaphoboscum, de qua diximus. Idem Sefeli enixæ à partu. Hoc autem apud Aristotelem hist. animal. L9. in hunc modum legitur. Ferarum quadrupedum, cervæ maxime prudentiâ præstare videtur, quia cum peperit circa semitas, involucrium primum exedit, mox Sefelim herbam petit, quam cum ediderit, redit ad prolem.

Galenus Sefelis radicem & semen ex calefactionibus esse ait, in tantum ut medicamentum sit, quod multam urinam cieat. Esse item parium tenuium, ut & ad morbum comitalem, & erectæ cervicis spirationem conveniat.

Sefeli Massiliense, sunt qui Spagnon, qui Platycymmon, i.e. latum Cyminum vocent Æthiopicum verò Ægyptij Cyonophricea appellant, ut inter nothas Dioscoridis appellationes videre licet. Sefeli autem in genere, ut Gesn. in ascript. Dioscoridis perhibet, Ægyptij Caucaulin vocant. Novisse Sefeli officinas, sed corrupto ex Sili nomine, Siler appellare, & montanum in superdicere, ut sit ab aquatico differentia, quod molle Virgilius dixerit, tradit Cornarius. Sed non demonstrat quam plantam intelligat. Nec est generum aliqua ipsi distinctio. Cum tamen Sefeleos nomine plures & diversæ proponantur plantæ, ut ex sequentibus fiet manifestum.

Pro Sefeli Massiliensi legitimo exhibet Matthiolum plantam, quam Sefeli Massiliense folio aliquatenus Vifnagæ, mox in scriptum lumus.

Fuchsius Sefeleos Massiliensis picturâ Vifnagam in hist. c.93. expressit.

Sefeli montanum angustifolium; Clusio, Massiliensis Sefeli picturam apud Matthiolum (inquit ille) aliquantulum refert.

Quidam Sefeli Massiliense statuerunt (& sanè facultates respondere ait Lob. in Obs.) Libanotum cachryophoron.

Sefeli Massiliensis descriptionem à Dioscoride traditam Clusio plurimum accedere videtur ad Fœniculum tortuosum.

Panax Aſclepias in Candia & vulgo in Creta Sefeli cognominatur.

Sefeli loco, quasi eadem esset planta Peucedanum, Peucedani semen substituit Dispens. Florenæ.

Ad Sefeli posse referri Cyminum equinum (quod Carvi-folium magnam credimus) existimat Tragus.

Meum vulgare, Sefeli, & quidem Creticum, à quam plurimis cognominatur.

Siler montanum, Sefeleos Massiliensis cognomen sibi quoque vendicat.

Sefeli pratenfe Monspelium, quod quidam Monspelienſium olim Sefeli Massiliense Dioscoridis putabant (teste Lob. in Adv.) an est Silium?

Habet Sefeli quoddam, quod palustre appellat. Sefeli palustre Cam.

Cognovimus autem hodie Sefeli Æthiopicum verum fruticosum, Peridymeni folio.

Et hinc fallitur Rauwolfius, qui pro Sefeli Æthiopico obtrudit Ligusticum folio Aquilegiæ.

Inquit C. Bauh. an Sefeli montanum i. Clusij, non sitidem cum Ligustico altero Belgarum Lobelij in Obs. p.457. Sed dubium hoc tollit feminis descriptio, quæ plurimum ab ejus delineatione differt.

Pro Sefeli Æthiopico Fuchsius in Icon. exhibet Libanotum Theoph. Dodonzi, Sefeli Æthiopicum Matthioli radice albâ.

Libanotis altera quorundam, sive Cervaria nigra, pingitur à quibusdam pro Sefeli Peloponensiaco.

Libanotidi 2. quorundam sive Cervariæ nigre, affinis, Valde bona flore pallido, est Sefeli montanum Clusio secundum sive latifolium.

Sefeleos Peloponensis picturam ponit Matthiolum suo more sine descriptione, non convenit tamen multorum judicio cum descriptione Dioscoridi.

Quod Turnerus par. 2. Sefeli Peloponensis, quidam verò Petrofelinum seu Apium montanum opinati sunt, nos Oreoselinum suspicamus.

Thapsia quorundam à nobis appellata, est multis Sefeli Peloponense.

Clusium mirari subit esse qui suæ Thapsiæ [latif. Thapsia la.] iconem ad Sefeli Peloponensis historiam, ac commodare non sunt veriti, cum tamen facultates planè sint dissimiles.

Myrrhidem Anguillara, nullis, aut paucis adspiciantibus notis Sefeli Peloponense existimat.

Cicutaria, seu Cicutaria Myrrhis, quam Cordus olim Myrrhidem silvestrem nuncupavit, à multis credebatur esse Sefeli Peloponensiaco.

Camerarius horti nominat Daucum quendam, Daucus vulgari congenerem, quem Sefeleos Peloponensis nomine ex Italia sibi missum ait, semine perquam aromatico, foliis pulchre virentibus nitidissimis. Hæc quænam sit adhuc nobis non constat.

Sefeleos sed Cretici cognomen tribuitur Cauliculi majori femine hirsuto.

Sefeli Cretici loco Dodonæus Caulicidem Belionij, seu Caulicidem nostram minorem pulchro semine exhibet, quod non probat Gesnerus.

Sefeli Massiliense ait Ruell. lib.3. c.42. esse Saxifragiam majorem officinarum & herbariorum, qui Saxifragiam majorem non descripsit eam ex autopsia: sed repetit Sefeleos descriptionem aliis verbis.

Quod Hippocrates scribit libro de fistulis, Sefeli radicem fistulis impostam earum oculos eximere, id Paulus Spondilij radici tribuit.

Sefeli Creticum Dioscoridis verum dicitur Trag. Pimpinella lib.1. c.156. de sua Pimpinella tertia, quam L2. c.120. rursus pro Sefeli tertio commemorat.

Sefeli Æthiopicum Dioscoridis dicitur quibus Perfoliata, dam, teste C. Bauhino, de Perfoliata.

Filipendula (inquit Dorst.) est Sefeli Græcorum Laur. Phrisio, cum vinibus bene convenit, quamvis forma discrepet.

Sefeli tandem Cyprion in ascript. Diosc. (notante Ricino, hoc Gesnero) legitur de Ricino.

SESELI MASSILIENSE NVPERORUM folio aliquatenus simili Vifnagæ.

EX Italix orto Patavino attulit frater Casparus Deser. plantam folio dodrantali circiter longitudine & latitudine, tenuiter dissecto, celsus Vifnagæ utcumque latior.

CAP. XXII.

Euch. Roësslin capiti de Peucedano ineptè jungit *Car. linn.*
 Eberwurtz [quæ vox fuit Chamaecrista alba, m.] & pro *Andr. l.*
 co iconem ponit Cardui acaulis. *n. al.*

HISTORIAE PLANTARVM

Radices
cucumilla.
Cucumis
1.46.

Peucedani loco sumi obscuras radices conquiritur Machiolus in proæ mio in Diosc.

Peucedanum vocatur Cucumis silvestris (de qua diximus 1.46.) in accept. Di. scilicet auctori Gesnerio.

PEUCEDANVM.

PEUCEDANUM MINUS
germanicum.



PEUCEDANUM MAIUS
Italicum.



Peucedano radix ex deciduis foliis composita, crassa, altè depacta, cortice nigro obducta, substantiâ virecente, succum, si vulnereur, remittens fulvum, odore piceo, viroso. caulis cubitum unum, aut alterum etiam altus, in aliquot ramos brachiatus, striatus; umbellæ insigniter latæ, citâ luxurie, ut interdum minutiores earum partes sobolem pariant, Anethi umbellæ parem: in quibus hosculi reflexis foliolis flavescen-
tibus constât, staminibus longiusculis apices flori concolores sustinentibus. semen foliaceum Angelicæ. folia ampla trifariam dividuntur, singulâq; eorum segmenta trifariam deinceps dissecantur, divisionum partibus linearis folio latitudine & longitudine ferè patibus. semen gemellum, foliaceum Angelicæ, longius, quam latius, itris exteriùs quaternis ferè, interiùs binis donatum, sapore acri & subamaro.

Tragus 1.2. c.221. Peucedani duo assignat genera. Primum tradit radice prælongâ, & altè in terram de-
Trago 1. misâ, succosâ & amarâ, supra terram barbam, seu comam canam letis porci simil. in obtinente: caule terete, foliis feniculaceis, aut pineis potius (cum Pino enim plus similitudinis, quam cum Feniculo habent, vel Tragi iudicio) velutis: flore in muscariis luteo. Alterum illius genus, quod ad Rhenum in arena tenuissima reperit, foliis angust. simis, veluti Cuminum equinum. Existimat autem Tragus 1.1. c.147. Peucedanum à Theophr. 1.9. c.15. tradi pro Pastinaca in Achaja sive Parenâ agro, radice nigra. Ast

Non est Pa- quandoquidem Theophr. 1.9. c.15. & 22. ubi Pastinaca nigra meminit, Peucedanum etiam ibi tradit, non existimo ego cum eandem plantam uideam le-
grat Theophr. uenire modo nominale.

Apollinarem lib.2. fol.146. facillè credidèrem per **Silvæ** **Carstirang** intelligere Peucedanum: verum quid ineptâ figurâ indicet, planè ignoro.

Lugd. p.746. tres proponit icones: Peucedanum **Lugd.** **Matthioli.** Item Peucedanum Dodonæi. Et Peucedanum majus Italicum Lobelij. Ast Peucedanum Matthioli & Italicum Lobelij idem sunt, teste C. Bauhino, at hujus **[italici]** figura melior.

Peucedanum nostrum prius, est Peucedanum **Tragi**, **Fuchij**, **Corn.** & **Tab.** qui & Caudam porcinam vocat. Peucedanum Argentinæ, radice ad duos aut tres cubitos longâ (ut se audivisse narrat) succi seu potius liquoris plenâ, sulphur olente, foliis oblongis, ternis ferè, Gesneri h. quod vulgò Fœniculum agreste **[wilden fenchel]** vocat tradit. Eid. coll. **Fen.** **Peucedanum Fuchij.** Peucedanum Lob. in **Obf.** p.453. quod in **adv.** p.350. & **Icon.** p.30. Fœniculum porcinum præterea nominat. **Bauh. phyt. & pin.** Peucedanum 2. Germanicum: Peucedanum, **Trag.** **Fuchl.** **Dod.** **Cord.** in **Diosc.** & **hist. Gesl. Turn.** **Lob.** **Lon.** **def.** **Lugd.** **Ger.** & **Tab.** Is in figura Lobelij & Dodonæi in fol. radicein comosam requiri scripsit. Eid. apud **Matth.** Peucedanum Germanicum angustioribus foliis.

Posterior, Peucedanum **Matth.** in **Diosc.** **hist.** 1. germ. & **epit.** cum addit. **Cam.** Item **Ang.** **epist.** 12. qui recordatur hoc usos fuisse olim **Patavi**, pro **Silvæ** **lære montano** & pro **Seseli.** Peucedanum majus Italicum **Lob.** **Icon.** p.782. **Obf.** p.454. ubi **Narbonensi** quadruplo majus omni sui parte esse tradit. Peucedanum Italicum, **Gresser** **Schwefel** **Tab.** Peucedanum 1. five majus Italicum, **Bauh. phyt. & pin.** Peucedanum, **Matth.** **Ang.** **Lac.** **Lugd.** **Cæf.** & **Cast.** Peucedanum Italicum, **Tab.** Peucedanum majus Italicum, **Lob.** & **Lugd.** majus **Ger.** Peucedanum foliis longioribus, **Dod.** **Eid.** **B.** apud **Matth.** **Peuced.** **Ital.** majus, latioribus foliis. **Libanotis nigra**, **Cæf.** **Liban.** **pin.** 1.7. c.8. **Libanotidem** nigram, **Cæf.** (quæ nobis **nigra** **Peucedanum** est) **Bauhinus** eandem facit in **pin.** cum sua **Libanotide** 3. feniculi folio, semine foliaceo, quod idem statuit esse cum **Rosmarino** altero **ferulaceo** **Lob.** **observ.** p.455. & **Panace** **asclepio**, **Ang.** & **Cam.** itemque **Libanotide** 1. **Dod.** & **Tab.** quam nos **Libanotidem** quorundam flore luteo, semine ferule inter bi. nus.

Indicis **avari**, & **Indicis** **avari** dicitur **Grecis**, & ut apud **Dioscoridem** **Tragus** legi testatur) **Tragus**, & **Tragus** **avari** dicitur **Arab.** **Harbatum.** Germani Peucedano varias tribuunt appellationes. Alij namque à coma, quæ supra radicem cernitur, **Carstirang**/quâ appellatione pilorum restis significatur, alij à foliis & facultatibus **Schwefel** **h.e.** Fœniculum porcinum, vel luarium, alij à croceo illo succo, vel à sulphureo radice odore (quod tamen Gesnerus improbat) **Schwefel** **h.e.** quâsi sulphuream radicem vocat. **Belgæ** **Leckens** **Vendel.** Galli **Peucedane.** **Ital.** **Peucedano.** **Hisp.** **tervadum** & **Fenicho** de porco. **Angl.** **Carstirang.** **Bohem.** **Gelen;** **Foren.**

Neminatus verò, cui ante quoque dictum, **Peucedanus** est à **muç**, quæ **Grecis** **Pinus** est, quòd folio sit **Pinus**: quare **Apuleius** **Pina**stellum appellavit. Vel à piceo tectore: nam amarorem horrendum & fetorem, **Tragus** **avari** vix apud **Pedias** signat. Quod tandem, **Filius** **Peucedanum** **Fœniculum** **Agreste**, **Algul**, **Culaunon**, **Porcinum**, & **Herbaturum** vocat, **oltr.** **truple** (inquit **Trag.** **hist.** **germ.**) se non multum vidisse, sed didicisse à **Petrò** de **Crescentiis**, qui ita **Peucedanum** nominat.

Peucedanum **Tragus** in altis, umbrosis & opacis **Lacini** silvis, ut est **Hercynia**, & ea, quam Germani **den** **Espe**stat & quam **den** **Ydar** nominant, nec non in **VV.** **Algoia** & monte **Toritur**, provenire tradit: item in horti suis magnâ copîâ. Is radicem efflu diffi-

cilem ait, ac præterea dum effoditur, gravissimum spirare odorem, ita quidem ut nisi munitus quis illam aggrediatur, odore suo deliquium animi inducere valeat, quia de causa veteres priusquam illam colligerent, caput & nares rosæque perfundere solitos fuisse, ne capitis dolor illos premeret & vertiginem sentirent. Autumno mense efficacissimam credi, tum enim temporis non raro radici succum concretum quasi & Thuri penè constrictum adherere deprehendi, quod inde fieri credendum sit, quando pex vermes, aut aliud quodvis incommodum radix vulnerata fuerit. Cæterum, liquorem hunc concretum in medicina præstantissimum esse. Quosdam radicem in particulis cultro concindere; alij integram illam in umbra siccare, quam rationem magis probat. Eandem, postquam effossa fuerit, nigram evadere, aliam albicantem existere, gustu acrem & amaram, instar penè Gentianæ. Nasci porro Peucedanum, prope urbem Argentinæ in pratis juxta Carthusiam, intellexit Gesnerus, ibidemque florere Augusto. Multum crescere in Italij Hetrusce æstuosis atque Narbone glareosis collibus, præsertim in luci Garamontij aditu, & circum fentes, lunas & dumeta, author est Lobelius; in Ananien-sibus montibus Matthioli. Clusius proposita iconem Peucedani in hist. l. 6. c. 17. ait in omnibus, quæ adiecit, locis sibi conspectum, nusquam tamen frequentius, quam in pratis ad Danubium sitis, infra Ratibonam & Straubingam anno 1588. cum adverso flumine veheret Ratiboram. Observavit Turnerus non tantum in umbrosis montibus, ut Erenfelsij in Germania, sed etiam in pratis humidis juxta Vormaciam, quidamque, sed quæ Rhenus inundat aliquando. audit in Anglia quoque reperiri. Et certe non longe Britolio in Rupe S. Vincentij radicem ejus invenit, squalidiore germanicâ. Accepit ego Peucedanum à D. Schyvarz, qui me monente collegit Tubingæ, ubi observaveram 27. annos ante, quod plantavi Montbelgardis in orto E. C. Stutgardiz sponte provenit, flores ibi Julio & Augusto. Briscæ radices maximas, nec ante tales visas, cubito longiores, crassitudinis carpi communicavit Rhizotomus, qui affirmabat se collegisse in Marchionatu Badensi in prato sicco, non longe à Baden versus Rhodum. supernæ autem appendices quædam palmaris crassitudinis erant, ex quibus folia & caules.

Vires Peucedani veterum quasdam ante recitavimus, quasdam verò nunc adscribemus. Peucedani radices, inquit Galenus, quidem maximæ, sed tamen etiam succo & liquore utuntur. Sunt autem omnia hæc ejusdem speciei facultates: sed valentior succus, admodum exsiccans, discutis & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos consistentibus convenire creditur, tum morbis in pulmone, thoracique ex crassitudine atque viscositate humorum factis. Et intro quidem in corpus sumpta, sed tamen etiam olfactu profunt. Porro quod incidat atque extenuet, sæpè etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedavit, quia videlicet est tenuium partium & exsiccatorius. Quinetiam lienes induratos juvat, nempe incidendo, digerendo, & extenuando crassos humores. Sed & radice adhuc uti licebit, quæ & squamas ab ossibus celesterrimè detrahit, quia videlicet valide desiccet (radix, dicebat alibi, calefacit secundo ordine completo, siccatur tertij initio) minus tamen, quam succus exsiccans. Et ulceribus malignis arida illa optimum est remedium: ipsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit. Ex Plinio superioribus sequentia debentur. Idem [succus amarus Amygdaliæ aut Ricæ resolutus] peccatis doloribus subvenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta leni & renibus prodest, Perungunt & Tom. 411.

radicem sudoris causâ eliciendi, quoniam causâ sudorem vis ei est. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis elicitur, ut lanien ossibus extrahat. Cum semine Cupressi si bibitur, si sanguis per os redditus est, fluitque ab infernis. Strangulatus vulvæ nidore usui recreat. Jætantibusque suffocationibus eo: sed quidam ad adolescentino vino semen Cupressi contritum. Potum cum coagulo vituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantum ramici, & umbilicis eminentibus inungitur. Stranguriæ cum melle medetur. Item semine lethargici excitantur, & ut perhibent ex Ephorbio nanibus tactis Peucedani succo. Ex quibus ita dictis Galeni, Plinij & Dioscoridis patet Peucedani radicem herbamve vi purgadi donatam fuisse, sed propter fœtorem utriusque minus in usum deducta. Peucedani radicem viscosos & lentos humores, nec non bilem educendi facultate pollere veteres prodidere, inquit Tragus. Quamobrem radix quidem Peucedani, vel vino decoqui, & bibi, vel in pulverem redigi & assumi potest, hoc enim pacto thoracis racis vitia purgat, lentos & frigidos extrahit à pulmone humores. Eadem succus in pulverem quoque redactus & usurpatus efficit, imptius verò cussi in veterata, à frigore ortum trahenti utilissimus est. Succus melli mixtus, ac intro sumptus, stranguriæ prodest, serpentium quoque eâ ratione veneno adversari dicitur. Quisquis ergo ab his sibi timet, oleo cui succus Peucedani mixtus fuerit, corpus perfricat, quod si fecerit ab injuria serpentium procul dubio tutus erit, nihil enim minus ferre possunt peripetes, quam Peucedanon. Radix in pulverem redacta & ex oleo & aceto illita, nervorum vitis unice prodest dicitur. Ischiadicis potenter auxiliatur. Qui spasmo continuo vexantur, succo ejus se perungant, & sanabuntur. Succus cum aceto temperatus, auribus que instillatus, dolores illorum mitigat. Succo nari-dolus bus obiecto, aut pulvere indito, non tantum lethargici, sed & vulvæ strangulatus respirant. Radix & lachryma ejus recentibus vulneribus sanandis experimèto singulari conducunt, ita quidem ut vel ex ossibus putulenta extrahant. Radicis pulvis inspersus sordida ulcera purgat, & vetera cicatrice obducit. Hæc juvamenta à Trago ascripta, à veterum facultatibus, non nisi utendi modo aliquantulum variare deprehenduntur.

PEUCEDANVM SICILIÆ, FOLIIS hirsutis, floribus luteis.

Peucedanum in Sicilia nascitur, unde translatus ad nos, inquit Cat. semen, quod plantam produxit aspectu similem Panaci Asclepio, & supra dictæ Ferulaginis [Libanotidis quorundam, sive Ferulaginis, foliis Faniuli, floribus luteis] longioribus tamen foliis, erectis, hirsutis, pediculis densis, ac brevibus eorum capillamentis: caulem tenuem ac lævem fert, cubitalem: flores luteos: semina oblonga, striata, in foliaceam latitudinem desinentia, sapore resinaceo: radix Pastinacæ figurâ, sed cortice atro: madet succo multo, qui conserescit in lachrymam, Thuri similem, non solum colore, sed & odore: at sapor acris & amarus est. in tota videretur Panax Asclepium Dioscoridis, nisi constaret grandioribus foliis, erectisque: caulem gignit cum folia dimiserit, prope finem ætatis: perhinc adventante Hieme. Et hæc Celsipinus, qui tandem concludit esse Peucedanum veterum.

LIBANOTIDES VETERIBVS. CAP. XXIII.

A Vthore Theophr. l. 9. c. 12. Libanotides [Rosmarini Gazæ, sed male] altera insignifera est, altera Theophr.

fructifera. Et altera etiam semine, & folio utilis est: altera solidam radicem. Vocatur autem semen Canchrys [canchrys]. Habet fructifera folium simile Apio palu. in [arboris] sed multo majus: caulem cubiti magnitudine, aut majorem: radicem magnam & crassam, albam, velut Thus olentem: semen album, asperum, oblongum. Nascitur maxime ubi squalidi ac petrosi sunt loci. Utiles est radix ad ulcera, & ad menses ducendos pota in vino aucto nigro. Semen ad urinæ stillicidia, & ad aures, & argema, & lippitudines facit, & ut lac mulieribus inducat. At infrugifera folium habet simile Lactuce amaræ [epithymus nigræ] sed asperius & candidius: radicem autem brevem. Nascitur ubi Erica [legendum enim est Erica, & non Egeria, ut prædicto loco Gaza vertit, Corn.] plurima. Potest purgare radicem sursum & deorsum. Quod enim ad germen est, sursum purgat: quod ad terram, deorsum. Prohibet etiam vermes velsibus imposita. Colligitur circa Tritici messem.

Canchrys
Apio palu.
flos simile
folium.

Lactuca
Vitis

Libanotis
infrugifera
folia Libanotis

Diof.

Zea, Camp-
panema
Foeniculi
folio.

Spondyli
semine.

Libanotis
albura.

Libanotis
infrugifera

Vitis in
genere.
Hamor-
thoides

Diof. no.

Libanotis
odoro
Thuris
reddidit
inquit Plin. l. 19.

Duplicem quoque Libanotidem tradit Dioscorides his verbis. Libanotis duplex est. Altera fructifera, ab aliquibus Zea, aut Campfanema vocata, cujus fructus Canchrys nominatur: folia habet Foeniculi similia, sed crassiora, & latiora ad rotæ formam, per terram strata, odorata: caulem cubitalem, & majorem, multas alas habentem, & in summo umbellam, in qua semen multum, album, Spondyli simile, rotundum, angulosum, acre, resinam redolens, dum manditur gustum adurens. Radix est alba, admodum magna, Thus redolens. Est & altera hujus species, prædictæ per omnia similis, quæ semen fert latum, nigrum, Spondyli simile, odoratum, non fervidum: radicem foris nigram, diffractam albam. Quæ verò infrugifera dicitur, per omnia prædictis similis, neque caulem profert, neque florem, neque semen. Nascitur autem in petrosis & asperis locis. Omnium in communi herba trita imposita, hæmorrhoidas sistit, & inflammationes sedis lenit, & condylomata ac strumas & abscessus egrè ad maturationem pervenientes, maturos efficit. At radices aridæ cum melle ulcera repurgant, & tormina sanant, & commotis à bestis venenatis commoedant, cum vino potæ. Menses item ducunt & urinæ. Discutiunt & tumores veteres impositæ in cataplasmate. Succus autem tum radices, tum herbæ, visum acuit, si melle ammixto illinatur. Semen potum eadem facit. Auxiliatur & comitialibus, & antiquis in thorace affectionibus. Regio item morbo, si cum pipere & vino detur. Provocat etiam sudores, si cum oleo illinatur. Confert & ruptis, convulsis, podagricisque, tritum impositum cum liliacea farina & aceto. Vitiigines quoque deterit ammixtum acerrimo aceto. Semine in potionibus utendum est ejus Libanotidis, quæ non fert canchrys. Acre enim illud est, & arteriam exasperat. Theophrastus tradit cum Euca nasci Libanotidem, Lactucæ filii estri amaræ similia folia habentem, candidiora tamen ac asperiora: radicem autem brevem. Et potam hanc sursum ac deorsum purgare.

At verò canchrys vim habet calefacientem & valde resiccantem. Vnde in sinigmatate commodè miscetur. Et ad fluxione laborantes oculos capiti inspergitur, & post triduum deficiatur. Hæterus Dioscorides. Eum autem non intelligimus, quid veluti eam ait, hæmorrhoidas sistere Libanotidem, si intelligit fluorem sanguinis, quandoquidem Libanotides insigniter calidæ: in inflammationes sedis leniter per accidens concedimus, si junctus fuerit œdematosus, vel statulentus tumor.

Libanotis odorem Thuris reddit, inquit Plin. l. 19. c. 12. Et inde ei nomen ductum esse, evidens est. Vnde enim græcè Thus est. Et subdit mox. Libanotis

locis putridis, & macris ac roscidis seritur semine. Radicem habet Olusatæ, nihil à thure differenter. Vfus ejus post animum stomacho saluberrimus. Quidam eam nomine alio Rosmarinum appellant. Et Rosmarinus l. 24. c. 11. Est & Rosmarinum, duo ejus genera. Alterum sterile. Alterum, cui caulis & semen resinae, quod canchrys vocatur, foliis odor Thuris. Et mox. Canchrys multa genera habet, ut diximus. Sed hæc quæ ex rore supradictæ nascitur, si fricetur, resinosa est. Atque ita reddit vocem *πρωϊν* apud Dioscoridem. Sed Cornarius de odore accipiendam putat. Dalechampsius in hunc locum hæc sequentia annotavit. Libanotis Dioscoridi quadruplex: prima folio Foeniculi, semine, quod Canchryn vocant, & radice candidis: secunda folio similis, semine & radice nigris: tertia folio similis sed absque caule, flore, semine, & coronas est utilis, quam Rosmarini folio Lactucæ. Præter has Libanotis est coronaria, sive Rosmarinus [de quo H. n. g. l. 13.] quam Plinius confudit cum superioribus. Theophrastus duo tantum genera statuit, fructiferam, folio Heleiolesini, semine & radice candidis: & sterilem folio Lactucæ.

Gall. 7. simpl. Libanotides tres sunt, una sterilis, duæ fructum ferentes: omnes verò ejusdem facultatis, emollientis & digerentis. Succus tū radices, tum herbæ, melli mistus obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine curat. Porro ejus Libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quam Romani Rosmarinum nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adjuvat. Omnes enim Libanotides abstergentis & incidentis facultatis participes sunt.

Commentarium Marcelli ad faciorem hujus capituli intelligentiam, autorūque collationem, multum proderit, quod propterea dignum judicavimus, ut subscribamus. Libanotida, inquit, Romani Libanotida etiam dicunt. Duum generum Libanotis est: Fœcunda, fructumque ferens alia: Quæ secundæ divisione duo item genera facit. Eam sc. quæ Zea aut Campfanema vocatur, cujus fructus Canchrys dicitur, & c. Alteram dicunt similem, semine lato, nigro, odorato, & c. Quæ autem ex prima divisione sterilis & sine fructu Libanotis dicitur, est antedictis tota similis. Plures autem quondam non Dioscoridi tantum: sed ceteris Græcorum Herbariis & Medicis omnibus Libanotides fuerunt. ut eodem Thuris cognomine omnes: sic non eodem ejus odore insignes. Vna enim quæ Canchrys fert, primò & per se, quod radix ejus Thus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ autem congeneres, aut aliquâ parte illi similes, in consuetum & nomen ejus venerunt. Satisque earum certâ divisione hiculus posteriores Græcorum Medicos & Herbarios alios subscribentes sibi habuit. Siquidem omnes, exceptâ Coronariâ, quæ alibi ab ipsis describitur, tria ejus genera fecerunt, secundam, fructumque ferentem, & hanc duplicem: tum sterilem numerantes. Peregrinas ut ego credo Italici plantas, & quarum omnis miscetur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figurâ, quæ palustri Apio in primo genere; in sterili verò amaræ Lactucæ similia ille facit. Cùm Dioscorides Foeniculo comparet, & crassiora tantum latioraque esse dicat. Quæ una foliorum forma coronariam Libanotidem cognomen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa. Cur quondam Libanotis & nunc totâ Græciâ Dendrobibanon, Coronaria Libanotis diceretur: nihil enim simile commune è illi aliud habet. Quod facile ex historia earum intelligat aliquis, tota & undique diversa. Siquidem coronaria Libanotis, sive Rosmarinus, frutex magis quam herba ramos habet: hæc caulem, & quæ fructum inter has, ferunt umbellam etiam. Illa à terra erigitur: hæc per terram folia spargunt. Et ne longior sim, plu-

plures habent hæ notas, quibus ab illa (coronaria) separantur. Quia etiam in foliis prius hoc genus suas habet eadem differentias. Quo autem maxime differunt, Canchry est, quod in secundo utroque hoc genere in summo caule simile arborum canchry surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quæ una notæ coronaria Libanotide reliquum omne hoc genus præcipue separat. Nec Nicander alicuiusmodi signat in Theriac. *ῥαχὶς καὶ ὁ σῆμα τῆς ἐλπίδος*, q.e. Summo & calidam radicem, canchry hoc ferentem: Libanotidis secundum illud genus significans. Rursusque *ἀμύρα καὶ χυμὸς τῆς ἐλπίδος*, q.e. Simul cum Libanotide canchry ferente. Vnā autem hæc notæ præcipue discernebatur Libanotis, quod in medicina cacheris huius, i.e. seminis, tantum usus esset. Eamque ob causam seorsum reliqua planta Agineta de eo egit, fructum seu semen Libanotidis vocans: virisque illi extendi, discutendi, & calefaciendi tribuens. Vfus illo etiam est ex oleo contra febrium perfictiones, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex canchry hoc dictum est. Tertium enim, quia eo caret, ideo *ἀγινέτι*, sterile & sine fructu à Græcis nominatur, prioribus, præterquam in hoc, simile. Quatuor Libanotidum genera his verbis Agineta itidem numeravit. Libanotides tres: steriles una: ferentes fructum duas. dico autem ego fructum, quem græci *καρπὸς*, communi ad fructum & semen significatione. extergendi, discutendi, incidendi, molliendique vires habent. Succus earum hebetibus ex humore crassitudine oculis ex melle medetur. Coronariæ vero Libanotidis decoctum, &c. Quæ porro de Cacheri, Libanotidis fructu, dicta ab Agineta sunt, his etiam addere non piget. Ea huiusmodi sunt. Fructus Libanotidis Cacheri est. Habetis repurgandi, discutendi, & calefaciendi vim, ideoque comitialibus subvenit, & suffusus felle cum Pipere, & vino potum. Illinitur idem ruptis, convulsis & podagricis utiliter, & ut ait Dioscorides, vitilgines ex aceto extertit. Et hæc longius ideo repetita sunt, ut legentes pluribus in unum collatis, veterum eandem rem dictis, facilius & aptius de omni Libanotide censere possint. Licet autem testati omnes hæcenus Græci & Latini sint: quia Thus oleat Libanotis, quod Græci Libanon dicunt, sic dictam ab eis fuisse: Apulejus tamen tradit ideo sic vocatam, quod ante cognitum nostro orbi Thus, suffutu & vapore huius herbe pro Thure gentes usi sint: quod tamen parum verisimile est, nisi prius Libanotidis nomen fuisse dicamus, & quia Thus illi successerit, Libanon id homines appellaverint. Plinius multis locis de omnibus his egit, sed tam incerto intellectu, ut non facile sit peregrinas Libanotides has à Coronaria & à Cunila in eo separare, eamque ob causam Marcellus (cujus verba hæcenus recitavimus) cum non allegat. Plinius, inquit C. Bauhinus, l. 19. c. 12. confusè agit de Libanotide, sicut & l. 20. cap. 16. eam cum conyzis miscens.

Pæscribit ad venas hæmorrhoidales apertas occludendas, stringendasque Libanotidem Fel. Platerus. Sed quam stirpem intelligat, se non explicat. Novimus nos sane ultra 27. plantas, Libanotides dici. Ex quibus quæ eligenda sit juveni practico, ab ipso scire optaremus. Nos quod attinet nullam stirpem ex his, quas Libanotides denominari posthac ostendimus, novimus, quæ emplastum naturam, aut adstringentem habeat, quæ utilis esse queat, nimum fluentibus hæmorrhoidibus: licet Dioscorides quoque eam tribuat Libanotidi facultatem.

Quamnam igitur ex dicendis, quæ diversi admodum generis sunt, plantis, quæ Libanotidis appel-

lationem sortita sunt, Dioscoridis & Theophrasti Libanotides sint, scitu perdifficile est.

Pana dicenda: nec enim Libanotis Matthioli & ejus sequacium flore albo.

Libanotidis secundæ similis, sive Panax Alcide Panax Asclepium Matthioli.

Libanotidis nomine mihi sæpius missum semen longum & latum; foliaceum, Thapsiæ, quam glaucam voco, vel Ferulæ simile, cujus plantam, quæ in horto E.C. nobis provenit, Libanotidem quorundam flore luteo vocamus.

Quæ à Cæsalpino ad Ferulaginem refertur, & à Libanotis quibuldam pro Meu falso accipitur, ab aliis vero inter Libanotides reponitur, à nobis Libanotis quibuldam, sive Ferulago solis Fœniculi, floribus luteis nuncupatur.

Libanotis nigra, Libanotidis fertilis alterum genus, vulgè accipitur pro Peucedano.

Cachryn veriorum, Libanotim Galeni Lobelij, Libanotis appellamus Libanotidem cacheriophoron semine anguloso.

Seseli montanum angustifolium Clusij, flore albo, nonnulli alteram Libanotidem Dioscoridis fructu angustifolium, asserunt esse contendunt, à qua non multum differre existimat Clusius.

Siler Creticum quibusdam à nobis dictum, Libanotidem Theophrasti appellat Bellus.

Libanotidis nomen à quibusdam Thapsiæ glaucæ adscribitur.

Quam Herbarij Libanotidem minorem vocant, an Daucum nos Daucum glauco folio conjectamus.

Libanotidis Dioscoridis primum genus Dodonæo, est nobis Meum vulgare.

Libanotis Theophrasti Dodonæi, sive Seseli Æthiopici cum Matthioli.

Libanotis 4. sive latifolia, Aquilegiæ formæ C. Ligusticum Bauhini, inscribitur à nobis Ligusticum Rauwolfij, folio Aquilegiæ.

Libanotis alba Dodonæi, sive Daucus secundus Matthioli, & Thap.

Libanotis alba minor, seu amara Thalij, an Apium pium notum nobis.

Libanotidis Theophrasti species minor nobis & Lobelio.

Libanotis in Mithridatio Cleopatri non significat Rosmarinum, sed, teste Cordo, Angelicam hylæstem minorem.

Libanotidi Theophrasti majori, sive Ligustico 2. Ligustico folio Matthioli hunc titulum secimus: Ligusticum quorundam foliis Angelicæ.

Ligusticum vulgare Gaillard. in Theone Theophrasti Libanotim esse retur.

Rosmarinus est. Libanotis coronaria Dioscoridis, de qua H. n. g. lib. 13.

Libanotim primam Dioscoridis, Tragus existimat suam Spicam, quam quidam Spicam Nardi vocant, nos Pseudonardum appellamus.

Libanotidis species Rondeletio, est Tragoriganum nothum Dalechampio.

Libanotis dicitur Coniza minor Dioscoridi, ut legimus apud Tragus l. c. 54. Sed Plinius quoque Libanotidem cum Conyzis miscet.

An Conyzam majorem Matthioli intelligit Cæsalp. l. 12. c. 42. dum ait. Quæ vulgo Incensaria vocatur, hanc pro Bacchari quidam ostendunt: alij Libanotidem sterilem apud Theophr. esse censent. nec abhorret radice odor.

Herbariorum Septentrionalium notior Libanotis Lobelij, an Daucus glauco folio fortè similis Libanotis Septentrionalium.

Plantam quandam Ligustico majorem, quam quidam pro Libanotide Theophrasti ostendunt; Cæsalp. autem inter ejusdem Theophrasti Panax.

recensendam æstimat, Ligusticum majus, sive Imperatorium majorem flore luteo pronunciamus.

Vt ingenue dicamus, nescimus quam plantam intelligat Cæf. l. iii. c. 45. dicens. Theophrastus sterilem Libanotem describit folio Lactucæ amaræ eandem ex Theophrasto tradit Dioscorides. Puto Rosmarinum silvestrem intelligi. Comparatio cum foliis Lactucæ amaræ quadrare possit cum silv. Rosmarino, tum coronario, si per Lactucam amaram intelligamus Tithymalum.

*Libanotis
ferulis
Theophr.
Cæf. quæ*

LIBANOTIS MATTHIOLI, ET ejus sequacium flore albo.

*Libanotis
ma.*

*Figura
Matth. me-
tamorpho-
sis.*

Primum ac sum nunc Libanotis sive Rosmarini genus, quod nas ipp. lit. sub duplici diff. rentia representatum à Dioscoride, aliquoties se videri Venetiis scribit Matthiolus in horto Maphei Medici, nullis sanè differentibus notis. Eandem nasci refert quoque in monte Gargano & agro Goritienfi. Figura autem, quæ est apud Matthiolum in communis impressis Venetiis apud Valgnium anno 1559. ejusmodi est, ut mihi videatur vix posse dici, cujus plantæ sit, præsertim quia non describit. In post. comm. Ital. & lat. cum mag. fig. itémq; hist. germ. figuræ appinxit semina, sed ea non manifestè demonstrat, ita ut qualia sint, non constet. Cam. in hist. germ. & ep. figuram mutavit, & semina Libanotidis Cachryophore appinxit, quem si sequamur, ut & C. Bauhinum, erit Libanotis Matthioli, Cachrys verior Lobelij, seu Libanotis cachryophoros. Verum & hinc dubium est. flos enim Libanotidis cachryophoros est luteus: Matthiolus verd in hist. germ. tribuit ei florem album. In epit. est Dioscoridis descriptio, nullam siquæ mentione umbellæ, cum flore albo. Lectores hæc diligentius examinent.

Primum hanc Dioscoridis fertilem Libanotidem (si Diis placet) ex Matthiolo pictam dat Lug. p. 764. eamque Libanotidem sive Rosmarinum Matthioli inscribit.

Tab. dicitur Libanotis, Rosmarinum herbaceum, Rosmarinum autem Verrandium; Libanotis prima. Proponit aut Tab. descriptionem ex Dioscoride, additque umbellas pulchras & albas esse. Icon facta est ad figuram Matthioli. subdit se Libanotidem primam observasse in Ducatu Burgundie copiose, non longe à Baurbon, in silva quæ dicitur Ighurtilles. item in monte propè Vesuntium & aliis locis. Non facile nunc est divinare, quam Tab. intelligat plantam: vix credimus Matthioli Gargani Libanotidem in Burgundia ab eo fuisse observatam.

*Liban. sive
Rosmarinum
Matth.
Lugd.*

*Rosm. her-
baceum,
Tab.*

LIBANOTIS CACHRYOPHOROS quibusdam, floribus luteis.

Deser.

Cvbitorum aliquot est altitudine caulis, lævis, cramosus: folia Peucedani foliis similia, strigosa, tenaciora; in longa, tenuia, segmenta divisa. umbellæ magnæ florum luteorum: quibus semina succedunt semper gemella, magna, ventricosa una parte, oblonga, canaliculata, & per extremum coronata, stilo ex utriusque commissurâ prominente, alba, aromatica, acris, amaricantia.

Deser. Cæf.

Lubet subicere descriptionem ex Cæfalpino. Semen est, inquit, crallum, & rotundum, ac striatum, osseo cortice candido, quo factio nucleus intus apparet albicans, multò amplior, quam in Erithmo, ferventi gustu & resinoso: radix unica est, profunda, & candida, acris: folia ab radice non in longitudinem extensa, lateralibus tantum ramis, ut in Peucedano, & Ferulis, sed in orbem tripartita, affluè,

scissorem in tenuitatem Fœniculo crassior, erecta, & prædura, ut integrum folium turbinis figuram referat, in his lachryma concrevit propè pediculum, rufa, odoratæque: caulem ipsi videre non licuit, quævis permixtis annis vixerit in horto Pisano ex semine ex Sicilia allato orta.



Nos Lobelijico-Cachrynem assumplimus rior, ei; semen ex sicca nota Cæf. Lob. plâta appinximus. Ei dicitur in Obs. p. 455. Cachrys verior (& hoc titulo est etiam in Icon. p. 783.) Libanotis Galeni, semine tereti, oblongo, strobilo, sive nucleo Pini subpari, gustu aromatico, acris, resinaceo, caule cubitum & sesquicubitum æquante: foliis Fœniculo crassioribus, pallidè virentibus. Quidam Seseleli Massiliense statuerunt. Et sanè facul

cultates respondent, uti & Rosmarino secundo, cujus semen Cachrys dicitur, & appositè substitui possunt. Belgis hortense.

Cæf. l. 7. c. 7. Libanotis candida, cujus semen Cachrys vocatur. In descriptione Libanotidis ferulis Dioscoridis dissonat Spondylii similitudo, nam depressum ejus semen in foliaceam tenuitatem, huic rotundum & plenum, ut Cithmi, & Hippomarathi, quæ Dioscorides Cachryi comparat. An satis est magnitudine Spondylium æmulari? In hac planta dicere possum sterile quoddam reperiri, quod neque caulem, neque florem, neque semen ferat, in cæteris illi simile, quod fertile est, ut tradit Dioscorides, quod & multis aliis contingit, non propter speciei diversitatem, sed affectionem quandam. Sed apud Theophrastum tum sterile, tum fertile aliter describuntur.

An Ang. epist. 12. Rosmarini prima species in Apulia, Peucedano & Oppopanaco vocata, foliis in quibusdam paribus Peucedano similibus, sed rotundis. Optaremus hanc ab Anguilli. descriptam, & colorem floris expressum.

Cam. ad hist. Math. germ. Libanotis. In epit. Rosmarinum. Figura alia à Matthioli. Nam semina particulatim appicta respondent plantæ, de qua hoc capite agimus. non describit plantam, sed tantum peregrinam dicit, quæ in hortis Germaniæ sata, secundo aut tertio florebat anno, & rarè maturum semen producat. Item hort. Libanotis prior, vel Cachryfera, rotundis foliis orta è semine, cum plerque alia umbelliferæ oblongis oriuntur.

Bauh. pin. Libanotis 1. sive Ferulæ folio, semine anguloso, (crasso in phyt.) Libanotis seu Rosmarinum Matth. l. c. 4. p. 486. Lac. & Lug. Rosmarinum 1. Ang. & Cæf. Libanotis 1. Dod. vel cachryfera, Cam. Rosmarinum ferulaceum, fertile, Diof. cujus semen Cachrys dicitur, Adve. f. Cachrys verior, Libanotis Gileno, Lob. Eid. B. apud Matth. Libanotis Ferulæ folio, semine crasso: Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Rosmarinum 1. Cæf. Figuram Lobelij frater Matthiolo appingit, ejus omnia icones, separatim quoque semina addit, quæ minis placent, quàm Camerarii. Ante diximus nos non posse asserere Cachrym Lobelij eandem plantam cum Matthioli Libanotide, quia icon non respondet, nec

*An Ro-
pini 1.
cies, Ab-*

Syn. Cæf.

prior, Cæf.

Syn. Cæf.

nec etiam floris color. Frater præterea putat Libanotum alterum Cameracij, semine lato, nigricante, odorato, esse eandem cum hac præsentem verum ego dubius hæreo, quia Cameracius præsentem alio nomine tradit, ut jam dictum. Lugd. p. 764. dicitur Cachrys vcrior, Libanotis Galeni.

Libanotum caryophoron frater C. Bauh. Patavio attulit, ejusque semen mihi communicavit, quod plantavi in horto E.C. Misit etiam sub hoc titulo: Rosmarinus caryophorus legitimus Imperati. Simile accepi à Calabona missum cum hac inscriptione. An Rosmarinus Theophrasti Cindie? D. Cortus aliquando obtulit, hoc titulo: Basilisco costi chiamato in Paglia. Gener Cherlerus attulit ex Italia nomine Cachrydis. Hanc Libanotidem, ni multum fallimur, ait D.D. Fel. Platerus Basileæ in horto suo à plurimis annis, & erat adhuc anno 1606. menle Junio. sed eam nondum florentem vidit. Hanc aliqui sibi persuadent Peucedanum, cum tamen non adlit, nec odor, nec sapor ferodius.

VMBELLIFERA MAXIMO SEMINE, quibusdam Cachrys Hispanica.

NON recordamur, unde acceperimus Cachrys Hispanica inter umbelliferas & ferulaceas plantas maximum semen quod hactenus viderim. Est enim ungue longius, crassum, duplex, tribus costis foliaceis constans, & duabus juxta commissuram, album, ad Crithmum non nihil formâ accedente, sed plurimum magnitudine differente, aromatici & grati saporis cum acrimonia & levi amaritudine. Hoc idem, ni fallor, semen est, quod frater Bauh. misit cum hac inscriptione: Fœniculi 2. species Dioscoridis, præcedenti semine simile, nisi paulo latius, & paulo brevius esset. Nos de Fœniculo, ejusque speciebus egimus hoc libro c.1.

LIBANOTIS QVIBVSDAM, FLORE luteo, semine Ferulæ.



Sæpius mihi in Shorto montbel gardensi E.C. pulchre provenit Libanotidis nomine missa planta, folio Ferulæ ferè pari, minutius diviso, rigidior, odoris non ingrati, pediculis solidis, minimèque fungosis nixo, caule procerò, ramoso, striato: flore umbellato, luteo, parvo: semine raro per sparsam umbellam foliaceæ Ferulæ, longo, duplici, albicante, possimum quod foliaceum in illis est, striato inf-

gnitei amaro, & veluti resinoso.

Panacis Asclepiadis nomine hanc sibi missam ait Camer. h. folio Ferulæ tenuiore & Fœniculi crassiore. Nasci in Creta, ubi Sesele vulgò, & in Sicilia, in qua Peucedanum vocari testatur, quamvis hæ appellationes propriè aliis plantis convenient. Ad hunc Matth. ger. & epit. hujus semen exhibet no-

Tom. III.

tatum litera. C. pro semine Panacis Asclepij, videturque ipsi Panax Asclepium Ferulæ facie Penæ, cui a Valerando ex Itra deservit. ibi.

Bauh. phyt. Libanotis 2. Ferulæ folio, semine lato: Panax Asclepias Theophr. & Plini. Eid. apud Matth. Panaces 3. Asclepium alterum: Libanotis Ferulæ folio, semine plano. Panax Asclepium: Lob. Cæf. Panaces Asclepium, Camer. in suo Matthiolo, Cast. Tab. Panaces Asclepium ut existimatur Dod. in fol. Libanotis altera semine lato, Cam. Ego Panax Asclepium Tabern. huc non refero, sed ad Matthioli Panaces Asclepium: Vix etiam puto Libanotidem Camer. p. 88. cui semen nigricans: quia p. 116. Panacem Asclepiadem vocat, ni fallor, de qua hîc agimus. Eid. B. pin. Libanotis 2. ferulæ folio & semine: Panax Asclepium ferulæ facie, Lob. Panaces, sententiam. Asclepium, Dod. Cæf. & Tab. Eid. B. pin. Libanotis 3. fœniculi folio semine foliaceo: Rosmarinum alterum ferulaceum Diosc. Lob. obsl. Panax asclepium, Ang. Cam. Libanotis 2. Dod. Tab. Libanotis nigra, Cæf. Est hac n. his Peucedanum.

Anguill. epist. 12. de hac ait. In Candia & Sicilia Panax Asclepium foliis ferulæ minoribus, crebrioribus, durioribus: caule quatuor cubitorum, flore luteo, semine compresso, anguloso simili Ferulæ, albo. apud Dioscoridem male legitur pro Panax: pro Pseudis, Orbasius legit Souda. vocatur in Candia Sesele, & in Sicilia Peucedanodie et aliud sit Peucedanum.

Lobel. in Adv. & Ic. p. 78. Panax Asclepium Ferulæ facie nominat, ac dicit. Nec diversi generis est Asclepium Panax à Ferulæ, nec item figurâ ab simile præsertim istud doctioribus verum putatum, fortè quale in Matthiolo pictum vidimus, qui in paucis commentatoris officio functus. Ex Illyrico tractu, cui Histria nomen, asportavit Valerandus Insulanus pharmacopœus plantas, quibus multa cum Panacæ affinitas, quas in horto Iouberii sevimus. Et inter has Ferulæ similis erat effigie, sed multò minor magnitudine: semine ut Ferulæ lato: foliis & floribus haud dissimilibus, caule & radice magnitudine atque similitudine Anethi odorato. Obsl. p. 455. Panax Asclepium.

Habeo ego à Valerando Pourcey plantam nomine Panacis Asclepij, respondentem picturæ Lobelij. Et talem etiam attulit mihi frater C. Bauh. nomine Libanotidis prima. A Rastio olim eadem missa, ni fallor, Lutetia, pro Libanotide Dioscoridis tertia. Præterea frater attulit plantam ex Italia, quæ multò melius exprimit Panacem Asclepium Matthioli, quàm hæc. diversa etiam erat à Matthioli planta, quam ostendebat Valerandus. diversam quoque figuram ab illa Matthioli ponit Lobelius.

An Gess. h. Libanotis quibusdam existimata, Argentina in horto ultra annum 14. vivax. Hæc Ferulæ sit, aut Libanotis, aut ejus species inquirendum proponit. Is Libanotidem potiùs, quàm Ferulam esse putat. Item hort. Libanotis prima Dioscoridis, quam Ferulaceam cognominat, quàmque eruditos quosdam in Italia Ferulam credere audit. In appen. hort. Libanotis Volmario. De coll. stirp. Libanotidis species ex Italia floribus luteis, Libanotidis ferulaceæ genus.

An Cæf. l. 7. c. 4. Panax Asclepium foliis subcandidis, floribus luteis: feminibus raris in umbella, Thapsiæ albæ similibus, candidis & strictis, radice albâ, crassa admodum, sed brevi. Theophrastus de hoc genere Panacis tradit, folio esse simili Thapsiæ, sed crassiore. Plinius eadem ferè refert, radicem scil. multi succi & salis, ex qua succus extrahatur Opopanax. hanc sententiam sequuntur videri in Mefues. Dioscorides tamen ex alio genere Panacis scil. Heculeo, haberi Opopanaxem testatur.

*Panaces A.
sclepium,
Did.*

Dod. gall. & in follat. Panaces Asclepium ut existimatur, Dioscoridis, cui folia assignat minora, quam Fœniculi, hirsutiora, & odorata, flores auricolores, odoratos, alijs *similis*: Theophrastus folio Thapiz esse dicit, sed crassiore: incognitum istud est: Matthiolus iconem exhibet, sed descriptionem nullam addit: proponit & haud dissimilem, si non eadem est, Lobelius, quæ in adv. lacteo succo multo turgere scribitur, veluti Ferulæ, sed minus quam hæc sapore sit acris. Ego contra Dodonæum Matthioli figuram differentem facio à Lobeliana. Idem mecum facit & frater C. Bauhinus.

*Dod. spinis
reprobatur.*

Tabern. hist. p. 385. dicitur Libanotis 2. Rosmar. reinfrat: Libanotis herbacea altera, Rosmarinum umbelliferum alterum.

Libanotis nomine scriptis missa planta, quæ mihi provenit in horto Montbelgardensi, flore luteo. Valerandus reposuerat nomine Panacis Asclepij Dioscoridis. verum differt ab Asclepij Panace Matthioli, cui folia aliter divisa & molliora. quam obrem dissentio à Lobelio qui in adv. p. 351. ait, Panax Asclepium Ferulæ facie, quale in Matthiolo pictum vidimus, & Valerandus ex Illyrio attulit. Bene Lob. scit, qui in obs. p. 455. plantæ, de qua agimus, figuram posuerit, quæ est Panacis Valerandi, & non Matthioli, quæ alia planta, ut suo dicemus loco.

LIBANOTIS QVIBVS DAM SIVE Ferulago, folijs Fœniculi, floribus luteis.

IN montibus nascitur radice non brevi, ut Dioscoridis Panax Asclepium [*Libanotis idem quorundam, flore luteo, semine Ferula, intelligimus*] quod ostendo, inquit, Casl. 7. c. 5. sed profundâ, cubitali, crassâ, candidâ, medullâ intus flavescente: caulibus ab eadem radice pluribus, rectis, striatis, bicubitalibus, ex viridi pallascentibus: folijs capillaribus, figurâ Fœniculi, ut supra dicta: floribus luteis: seminibus nigricantibus, depressis & oblongis, ut Ferulæ seminæ.

Hanc quidam pro Meu falsò accipiunt: nonnulli verò inter Libanoides reponunt: ego potius ad Ferulagine refero: huic enim magis convenit conditio tradita à Theophrasto & Plinio: nam Ferulæ comparata, cui similis est, parva dici potest, & humilis, ait Casalpini. Nos verò latet quoniam hæc planta adhuc sit reducenda: an porro aliquis alius ejus nomen erit, considerent lectores.

Non falsò.

Ferulago.

FERULA ET FERVLAGO VERUM. CAP. XXIV.

Theophr.

Magnitudine tantum differt.

SE primùm de eo, quod cômune omnium consistat, dicendum est, auctore Theophr. l. 6. c. 2. de Ferula scilicet atque Ferulagine [*vasis utroque res, vasculis*] seu idem genus differens magnitudine tantum, seu etiam alterum sit, ut nonnulli. Ergo natura earum, quæ conspici possit, & consimilis certè sentitur, præterquam ratione magnitudinis: Ferula enim grandis admodum surgit, Ferulago autem humilis. Sed uni caules ambæ geniculatæ sunt. Folia & cauliculi quidam geniculis erumpunt, ac alternatim exeunt: folia alternatim, inquam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed permutatim caulem magna ex parte amplexa, sicut harundinea proveniunt, nisi quoddam flexa hæc magis molliciei, magnitudinisq; causa: solum enim grande, molle, multifidum, ut capillamenti modo ferè inspicitur, maximaque tertæ proxima, & reliqua subinde ad portionem: flos melissæ, semen obscurum [*ajuda de ginepro*] Anetho simi-

le, sed majus, finditur cacumine, inq; stipites quoddam haud magnos dispergitur, quibus flos, semēque insidit: nec flore fructive laterales caules carent, sed modo Anethi ferunt, annuo caule constat. Et germinatio in Vere primùm foliorum, tum caulium, ut etiam in cæteris fieri solet: radice altè descendit, eademque singulari innititur. Talis Ferula est. Hæc loco citato Theophrastus, qui a. 7. ejusdem libri 6. Lasepitio caulem ascribit quantum Ferulæ, & crassitudine ferè proximam.

Plinius hæc brevius l. 13. c. 22. sed nihilo clariùs. Et Ferulam, inquit, inter externas dixisse conveniet, arborumque generi adscripsisse, quoniam quarundam naturæ, sicut distinguemus, lignum omne corticis loco habent, hoc est foris secus, ligni autem loco fungulam intus medullam, ut Sambuci: quædam verò inanitate, ut Harundines. Ferula calidis nascitur locis, atque trans maria, geniculatis nodata scapis. Duo ejus genera: Nartheca Græci vocant assurgentem in altitudine. Nartheciam verò semper humilem. A genibus exeuntia folia maxima, ut quæque terræ proxima. Cætero, natura eadem quæ Anetho, & fructui similis. Nulli fructuum levitas major: ob id gestata facilius, baculorum usum sene ætati præbet. Plinius repetit de eadem l. 19. c. 9. Ferulæ duo genera in fruticibus diximus. Semen ejus in Italia cibus est. Conditur quippe duratque in urceis, vel anni spacio. Duo ea genera, caules & racemi. Corymbium hanc vocant, corymbosque quos condiunt. Et rursus l. 20. c. 23. Ferula semen simile Anetho habet. Quæ ab uno caule dividitur in cacumine, scemina putatur. Caules eduntur decocti, commendanturque multo & melle, stomacho utiles. Sed plures sumpti, capitis dolores faciunt. Et subdit his usum medicum, ferè ut Dioscorides habet. Radix [*me. Vasculi*]

dulla Diosc. denarij pondere in vini cyathis duobus, bibitur adversus serpentes. Et ipsa radix imponitur. [*semen potum Diosc.*] Sic & tominibus medetur. Ex oleo autem & aceto contra sudores immodicos [*sudores siet, cum oleo perunt, capere, Diosc.*] vel in febribus proficit. Succus Ferulæ alvum solvit [*sistit, ver.*]

Fabæ magnitudine devoratus. Et viridi Ferula ramusculus, utilis est ad omnia ea vitia [*Et viridi medulla pota confert: naribus indit a sanguinem erumpentem sistit, Diosc.*] Sicut qui comitialibus morbis [*bus*] dandum putent Luna quarta, sexta, septima, ligulæ [*lingula, CH.*] mer sura. Natura Ferularum murenis infestissima est: tactæ siquidem ea moriuntur. Castor radicis succum [*Sagapenum, de quo suo loco*] & oculorum claritati conferre multum putavit. Idem l. 21. c. 9. de honore coronarum, ait. Utuntur è Ferulis & corymbis. Tandem l. 24. c. 1. Ferulæ asinis gratissimæ sunt in pabulo, cæteris verò jumentis præstant eo veneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur, cui & Ferula. Lib. 25. c. 13. Ferule cineri tantam vim tribuit, ac etiam carboni, ut quamvis recentem gladiatoris vulnere illigata [*illitu, CH.*] sanguinem claudat: fungum verò, quem secundum radicem ejus nasci perhibet, id efficacius prestare scribit.

Ferulæ racemos, ut testatur Dalechampius, umbellæ adhuc compressas & nondum explicatas vocat Plinius. Corymbium verò Ferulam, quam in caulem surgere permittent, ut corymbos, sive umbellæ nascentes ad condituram colligerent. Nam alioqui caulem gliscerent, tenellum, & adhuc convolutum demetebant, ut vel recentem comederent, vel in condimento fervarent.

De Ferula inquit Dioscorides. Hujus, dum adhuc viridis est, medulla pota, sanguinem spuentibus & coctis prodest: & commoritis à vipera datur cum vino

Laosui

Nartheca

Nartheca

Ferula

minis

Vasculi

Ferula

cymbis

nas

ta

Bacchi

era.

Ferula

temm

Diosc.

vino: & sanguinis è naribus eruptiones sistit. Semen potum torminibus auxiliatur. Movet & sudores, si cum oleo illinatur. Caules in cibo accepti, capitis dolorem inducunt. Idem etiam muria conduntur. Caulum autem profert Ferula sæpe trium cubitorum, folia habet Fœniculo similia, sed multo crassiora & majora.

Galenus Ferulæ semen calefacere & attenuare dicit. Internam autem partem adhuc viridem, quæ medulla dicitur, adstringentem quandam qualitatem habere, ob quam sanguinem spuentibus & coëliacis prodest. Ex his itaque aliquam Ferulæ notionem accipimus, & nostris penitus ignotam esse, cognoscimus.

Ferula, quæ species fruticis est, lignum pro cortice, & medullam pro ligno habens, calamumq; fungosum, Græcis *Nap̄d̄n̄g* dicitur, inquit Olivarius. Et hinc factum adagium est. Tanquam de Narthecio, pro eo quod est ex parato & ad manum. Narthecium autem Ferulæ calamum significat. vel, ut opinatur Roterodamus, pyxidem, quæ olim pharmacopolæ medicamenta servabant, unde tanquam ex promptuario quodam post ea de promebant. Inde Cicero de finib. bonor. l. 2. ait. Iam doloris medicamenta illa Epicurea, tanquam de Narthecio promant, si gravis, brevis: si longus, levis. Fabulantur etiam hoc calamo ignem fuisse servatum, & hinc fabula est, Prometheum è ferula fuisse ignem. De Narthecio Corn. in lib. 6. Galeni de compos. pharmac. dissensit his verbis: Sorani *nap̄d̄n̄g* citat Aëtius l. 3. c. 44. Arbitror autem receptum fuisse morem Græcis Medicis, ut libros suos medicamentarios *nap̄d̄n̄g* & *nap̄d̄n̄g* inscriberent. atque sic etiam illud Ciceronis 2. de fin. accipio. Iam doloris &c. Et certè consentit etiam Martialis Poëta in Apophor. qui ejusmodi Narthecia capsulis eborcis inclusa fuisse dicit. Hæcille, qui quæ ratione ducatur, haud scimus. Narthecium [*nap̄d̄n̄g*] pro repositoio medicamentorum positum, etiam si ex alia materia factum fuerit, placet Thesauri lingua latinæ: quod id genus ligni accommodatum sit ad servanda medicamenta. Idem Ferulam Narthecem penult. produci vocat, à nominato Narthex, quem masculini generis statuit.

Extat & aliud proverbium, Marum Ferulæ subducere. Ferulam non minus à servendo quam feriendo dictam, vult quoque Doriliherus, qui eam Hippocratem Plesinga vocasse scribit. Et nos manum Ferulæ subduximus, inquit Roterodamus, est dicere, & nos literas didicimus & præceptorum operâ usi sumus. Nam antiquitus literatos discipulorum manus Ferulâ cedebant. Est autem Ferula fruticis genus, quo non aliud levius, ut indicatum ex Plinio. Græcis *nap̄d̄n̄g* dicitur, utilis ad fulcres dos vacillantes ætate senes. Vnde & Baccho Silenôque sacer, ut vino titubantes fulciat, nec oneret tamen. Est enim ligno durissimo foris, licet intus lignum non habeat. Hæc exceptum ignem calefactum præ singunt Prometheus deportasse in terras. Hinc quoque facta sceptræ pædagogorum, quod terreant magis, quam lædant, appellat Martialis. Notavit id eleganter Columellam in carmine,

Nec manibus mites Ferulas. Et ibid.

— Ferulaque minores Plantantur.

Vnde manum Ferulæ subduxisse dicuntur, qui desierunt in ludo literano versari, neque jam pueri docendi, sed utrunque docti sunt. Juvenalis in 1. Satyra,

Et nos ergo manum Ferulæ subduximus, & nos Consiliū dedimus Silla.

Hieronymus. Subduximus accipere videtur pro eo, quod est subjecimus, suppositimus. Sic enim scribit ad Domitianem: Et nos didicimus literas, &

nos sæpe manum Ferulæ subduximus. Nisi forte manum Ferulæ subducere pueri dicuntur, quum metu plagæ subtrahunt manum. Est similis apud Græcos sermons color. citatur apud Athenæum lib. 13. Timocles,

— Opus esse adhuc

Trepidare & alapi cedi. & in teneras manus

Recipere plagas, res profectò suavis est.

Ferulæ portò nomine duas plantas à veteribus Ferula, esse insignitas, Ferulam & Ferulaginem, ex hætenus dictis manifestò colligere licet.

In ascriptiis Dioscoridis utramque rursus cum Thapsia. Thapsia confundi clarè patet.

Ferula præterea titulo sequentes cognominantur planta. Ferula folio Fœniculi semine latiore & rotundiore.

Ferula folio glauco, semine lato, oblongo, quibusdam Thapsia ferulacea.

Galbanifera Ferula, quam cum Galbano paulo post tradituri sumus.

Quam Ferulam Coli nonnulli vocant, nos Thapsiam sive Turbit montis Gargani opinamur.

Thapsia Carotæ effigie, Ferula sagapenifera à multis vocatur.

Ferula Hammoniæ, ex qua Ammoniacum liquor habetur.

Ferulæ cujusdam succum esse Assam scetidam [de Assa scetida hac H. n. g. lib. 9.] innuere videntur Adversaria p. 349.

Isdem Adversarius p. 350. è Ferulæ cognatis est Peucedanum.

Spondylia affinis Panax de Ferula dici, suo ostendimus loco.

Ferula, quæ à nonnullis vulgo existimatur Libanotis prima Dioscoridis, ab eruditissimis quibusdam in Italia creditur, id referente Gesnero.

Euphorbij plantam, ferulaceam arborem non desine, qui statuunt.

Timetorium florem (Gälsferberblumen) Traugottus l. 2. c. 8. Ferulam nominat, dicens videri eam significasse Columellam l. 10.

Tormentilla à plerisque etiam Ferula dicitur.

Quò plantam referre debeam, quam Gortopius in Hisp. lib. 2. Ferulam nominat, nondum mihi conspicitur. De hac autem agit, ubi de monte Baldo locutus est. In montis, inquit, Fœnicularij jugis Ferulæ genus inveni, quod si Laserpitum non est Cyrenalium, certè Laser Alpinum dici potest: tanto succo Laserpitum optimi odoris in radicibus maximis & crassissimis abundat, ut alterius locum supplere possit.

FERULA FOLIO FOENICVLLI

semine latiore & rotundiore.



Ad quinq; aut sex cubitos excrefcit, caule crasso, fungosa, in dultu pleno, ramoso: folia amplissima divifura fœniculacea, fed lig. nentis lationibus, Ferula glauca fimilia, fed magis etiam virentia: umbellæ late florum luteorum, quibus delapis semen intervenit magnū, filiaceum, femur: ciam latum, paulū longius, per extremū latefcens,

geminum semper, exteriorē parte triplici lineā elatiore striatum, quā gemina femina conjunguntur, fibrā unicā longā donata sunt. radix vulnerata lachrymam fundit laetam. odor plantæ nonnihil gravior videtur quā Ferulæ glaucae: sapor acris.

De ferula hac à nobis hñc descripta hæc habet in adv. Lobelius. Quemadmodum *Napthæ* virgultum, thyrsum, aut bacillum Græcis signat, sic Ferula latine à ferendo, quod illius scapi pedamenta fruticibus, & senibus pedum ac scipiones essent. Quintum cubitorum caulis, radix magna, recta, & altè in faxorum commissuras hiantes rimas descendens, evulsu difficilis, candida, lacteo, pinguique succo turgida, odorem vehementem vibrans. folia Fœniculo majora, pinguiora, crassiora ut & caulis: umbellæ prægrandes Anethi, Junio & Iulio flosculis luteis defluentibus. Semen foliaceum, compressum, oblongum, rotundum Angelicæ fermè, duplè majus. Idem postea ait. Dioscorides videtur agnoscere Ferulam eandem esse atque Sagapenum: nam è radice Ferulæ fauciata manare Sagapenum primum dixerat: deinde inferiis, quasi superius nihil dixisset, alteram plantam ferulaceam docet, ex qua alius generis Sagapenum effluat: quæ arguunt potius succos ipsos agnitos illi quā plantas. Quippe Plinius etiam Sagapenum in Ferula oriri tradit, forte quia eandem plantam cum Ferula vulgariputavit. In adv. huic utulum fecit, *Napthæ*, Ferula & Ferulago, Hisp. *Cananheia*. In Obsp. 450. Ferula, It. *Ferula*, Gall. *Ferula*. In Icon. p. 778. Ferula. Fallitur Lob. Dioscorides non tradit ex hac Ferula Sagapenum excipi. Neque etiam alibi hoc docet. Verum ex Ferulacea herba in Media Sagapenum fieri prodit, ut suo loco certius patebit. Si Lobelius etiam in Obs. non posuisset figuram Ferulæ, dubius hærerem an in adv. per Ferulam eandem nobiscum traderet, quia descriptio feminis pro ea non placet. particulare etiam semen in Obs. & Icon. appictum, non videtur hujus Ferulæ esse.

Con. err. Errat plurimum & Lonicerus, tradendo ex Narthece, five Ferula, ut vocat, Sagapenum colligi. Eam se curasse affinnat depingendam flore luteo, semine Anetho pauldè majore. Sed si semen vidit, miror eum dicere pauldè majus. oportebat scribere multò majus.

*Tormentil-
la Euchar.
Roßl.* Euchar. Roßl. Ferulam *Birdswurz* vocat, verum non descript. At quantum ex viribus colligere possum, existimo eum intelligere Tormentillam, de qua alibi agit, cui etiam potuisset hæc jungi, si non eadem.

*Ferula mas
Caf.* Calsalp. l. 7. c. 3. nomine Ferulæ maris aptè descriptit plantam, de qua hic agimus. per feminam autem fortè intelligit nostram Ferulam folio glauco. Ejus verba hæc sunt. Ferula altitudine caulis, & crassitie formæ, specie arboreæ constat; nam ad quina & sena cubita adolescit, crassitudine brachij, foliis latissimis, tenuiter incisiss, serè capillamenti modo, ut Fœniculi, pediculo caulem vestiente, ut in Harundine: umbellæ fert latas, convexæ superficie, ut Anethi: flosculos pallidos: semen latum & depressum, subnigrum, unguis magnitudine, acre: radicem crassam, ramosamque, lacteo succo manantem. Ejus duo genera. Mas [Ferula hac] crassior, & brevioribus internodiis latiore semine: radice candida; foliis tenuissimis: caulis, ut & femina [brevius descriptum] poterit lecti perire, sub titulo Ferula glaucofolia. qm exaruerit, levissimus est, quia fungosus, addèd tamen robustus, ut sufficiat pro baculo ad sustentandam sine stipe ne exaret autem profectio semine in Æstate. Theophrastus genus ferulaceum inter suffiuices recenset. hanc [Marem] quidem Ferulam, alteram verò [Feminam] Ferulaginem vocans, ut Theodorus vertit: græcè enim hæc Narthex, illa

Narthecia vocatur. Ex ejus verbis conjicere licet, Ferulam illum intellexisse, quam ego marcm appello. Ferulaginem autem, aut feminam, quamquam in læto Solo, non solum non est humilior mare, sed & alior, gracilior tamen, aut aliud quoddam humilior genus ex dicendis. Plinius in delineanda Ferula Theophrastum sequitur. Dioscorides Ferulam tantum describit. Hæc Calsalp. qui Lobelij errorem se-
Calsalp.

Lugdun. p. 754. Lugd. NARTHECIUM, THEOPHR. Ferula titulo mancam Matthioli figuram exhibet, additque aliam pro Narthecio Theophrasti, Ferulagine Gazæ. Hanc licet nesciamus cuius plantæ sit, ac imperfecta videatur, eam tamen hoc loco pictam damus; ne quid temerè omitamus. Eam autem sic describit. *Napthæ* Theophrasti, Ferulago Gazæ, in idem locis nascitur, in quibus & Ferula. Ad hominis altitudinem crescit, radice doctantali, pro magnitudine plantæ totius exigua & gracilior, candida, parum fibrata, gustu subacri,



nonnihil odorata cum manditur: caule Fœniculi, striato, ramoso, inani intus; folio quoque Fœniculi, ampliore, minore quā in Ferula, ad ramorum exortus prodeunte, alternis nunc ex hac, nunc ex illa parte, gustu subdulci & suavi: flore luteo in umbellis, amaro, & subacri, odorato: semine oblongo. Liquet itaque duo Ferulæ genera esse, unum *Napthæ*, alterum *Napthæ*, quā Ferulaginem vertit Gaza. Sunt etiamnum hodie, inquit ex autoritate Penæ, duæ in Herbariorum hortis hujus classis, naturæ & similitudinis plantæ, quas idcirco Ferulagines vocant. Eæ videntur tantum distare cultura, statura, elegantia, & succi copia, ut nascæ fuerint radices arum aridum, magisque excoctum, sub cælo sudo & fervidiore, ut in Africa, Media, Cyrene, & alibi.

Matth. in suis comm. Ferulam nominat, ut & in epitubi ita delineat. Ferula, grandis admodum surgit, unio tantum caule ac geniculato: folia grandia, mollia, multida aded, ut capillamenti modo serè spectentur, præsertim quæ teræ proxima sunt. flos melinus: semen obicorum, Anetho simile, sed majus. In hist. germ. vocatur Ferula quoque five Narthex, semine Anethi aut Fœniculi, sed pauldè majus. Is in comm. figuram habet non bonam, nihil particulare & certi demonstrans, sine descriptione: si eandem plantam nobiscum sentit, non convenit dicere semen Anethi & pauldè majus. Cam. ad epit. & hist. Matthioli germ. posuit figuram, quam probamus semine lato & rotundiore.

Bauh. phyt. apud Matth. & pin. Ferula i. femina. Plinij: Ferula. Math. Ang. Turn. Lac. Cord. in Diosc. Gesh. h. Lon. Lob. Dod. in fol. Calt. Lugd. Tab. (cui & Ferula major & Canna Ferula, Carica Serapionis, Capata Glossographi Avicennæ, & aliorum Arabum & Persarum. Ferulæ & Ferulæ & Ferulæ & Ferulæ. Ferula mas. Calt. Libanus i. Dioscoridis ferulacea Gesh. h. Eid. phyt. & pin. Ferula, five Ferulago

Tenuiore folio: Natthecium Theophr. Ferulago Ga-
za, Lugd. Ferulago, Tab. Si per figuram Lobelia-
nam appositam Matthiolo intelligitur eadem Fe-
rula nobiscum, non quadrant semina appicta; quæ
mihi videntur sequentis Ferulæ folio glauco. Gesne-
ro non negarim esse posse de hort. Libanotidem
primam Dioscoridis. verum ea quæ scribit eo loci,
possunt etiam convenire Libanotidi tenuifoliæ, se-
mine Ferulæ. Vidi aliquando Gesnerum annotasse
plantam hanc Libanotidem dici. Quod Cæsalp. citatur
facit pro nobis, qui semen dixit latum unguis ma-
gnitudine: cur potius Ferulam Plinius vocet, conside-
ratione dignum videatur. Narthesium Lugdunensis
non separo à Ferula Matthioli, quia imperfecta fi-
gura, nullam plantam demonstrans.

Anguill. epist. 12. Ferula nota in Apulia, Calabria
& Sicilia, ibidemque nomen retinens.

Ferula, quæ depingitur à Matthiolo Monspelij
in hortis habetur, ut in horto Castellani Monspel.
pharmacopolæ ad altitudinem quatuor, vel sex cu-
l. totum, mense Aprilis flores. Patavij apud Cottu-
sum vidi gummi, quod ex Ferulæ anno sæ vulneratâ
radice effluerat. Lugduni magnas habui plantas
in horto. & magnam quoque observavi in orto
Trivelfani Patavij; Basileæ in horto F. Pla-
terij parvas. Item Ferratiz in horto Principis; Flo-
rentiz in horto Nicol. Ferraricis, & Montbel-
gardi in horto E.C. & nostro. Ferula plurima & pro-
cera in Galloprovincia & Narbonensi Gallia, præ-
sertim illis rupibus, præruptisque faxis prope sub-
terraneas Cryptas, via quæ Monspelio Frontignanum
itur ad dextram: iidem in celsis squalidisque
saxorum sinibus, qui Soles æstivos & fervidos to-
tum semè foveant diem, prope oppidulum Rochæ-
ve Castrum vocatum quæ Austrum vergit umbella
Iunio & Iulio florent, Lobelio. Ferula, inquit
Matthiolo, æstuosus nascitur locus: idè quæ nil mi-
rum, quod apud Apuliam Ferulorum sit maximè ferax.
Quin etiam si frequens provenit in Romano agro
Tyrrheni maris contermino, præsertim apud Cen-
tuncellas, & in Hetruriz maritimis. Evalefcit, au-
thore Cæsalpino, perfectò semine in Æstate. vivit
radix diutius: Autumno & per totam Hyemem fo-
lia à radice emittit: ineunte Vere caulescit: paulò
ante Equinoctium veluti ovum producit: gaudet
regione calidâ & lato Solo: frequenter in Sicilia, &
apud nos in Italia in monte Argentario.

Viribus à veteribus Ferulæ assignatis, has in super
addit Matthiolo. E Ferulis prima tantum determinatio-
ne corculum quoddam pastores eximunt, ovilu-
teum induratum referens, quod sub cineribus assa-
tum, prius tamen chartâ, aut linteo madefactis con-
volutum, mox pipere & sale conspersum, non mo-
dò gustui gratissimus est cibis; sed etiam ad excitan-
dam venerem valentissimus. In insula quadam ex
fortunatis nomine Morion, Ferulas in arborum am-
plitudinem grandescere, scripsere quidam. Apuliji
gnorum vice, quibus maximè carent, Ferulis ad
ignem utuntur.

FERULÆ FACIE THAPSIA, sive Turbit Gallorum.

DE Thapsia, sive Turbit gallico, Turbit cineritio
Officinarum ut vocat Lob in adv. hæc tra-
dit. Potuit dici Thapsia non solum ut placuit Dio-
scoridi, à Thapso insula cognomine, quæ una è Spo-
radibus est: sed etiam propter flammæ calorem,
quem corpori admota inureret, adeoque emittit,
præsertim ad verso statu spectanti. Valdè quàm simi-
lis Thapsia habitu toto & viribus, tamen usi mul-
tò præstantiore atque purgatrici vi. In Aquitaniz ma-
cilentioribus montosisque squalidis avenam no-

bis dedit præceptor Rondellæti, propè vadum
qua trajicitur in Hispaniam, tum ad radices Pyre-
neorū, non procul



ceatur præcipuis visceribus, & tormina dira inter-
dum excitentur. Verum si quidem miscentur levio-
ribus, & naturæ amioribus, proderit Sarcocollæ,
Hammoniæ, Turpetive succi modo. Nec Ferulæ,
Peucedanique succis gummeis desunt vires purga-
trices: verum tum quia planta, tum succus sævius
cerebro adversatur, idè non correctâ plus disci-
minis inferret. Et hæc tradit p. 350. ubi paulò post
Thapsiam Aquitaniz nominat, cujus radice uti al. Thapsia
ferit plerisque opines officinas Septentrionales. Aquitaniz.
p. verò 322. vocat Thapsiam vernantem multum in
Aquitaniz Valconum. In ic. p. 79. Thapsiam Dio-
scoridis. Lug. p. 756. Thapsiam Penz veram.
Bauh. phyt. Thapsia 1. sive Fœniculi folio: Thapsia
Diosc. Adversariorum. Eid. in pin. Thapsia 4. fœni-
culi folio: Thapsia Diosc. Lob. & Lugd. Thapsia 2.
vel tenuifolia, Cisth. sp. 8. hist. Thapsia angustifo-
lia, Tab. tenuifolia, Ger. Nos quo debeamus referre
Thapsiam hanc Lobelij, incerti sumus. multa
quidem habet communia cum Ferula glauco folio,
jam dicenda: verum Rosmarinum Ferulaceum Lo-
belij, melius adhuc cum ea convenit.

FERULA FOLIO GLAUCO, semine lato, oblongo: quibusdam Thapsia Ferulacea.



MIURUM quàm Deser.
Mgradescat hu-
jus radix: caulis hu-
manam procerita-
tem multum exce-
dit: folia magna, fe-
rulacea, minus ad
Fœniculum acce-
dentia, quàm præ-
cedens Ferula, co-
loris glauci, potissi-
mum subtus, quo-
rū singula segmer-
ta laciota breviora
que sunt, quàm fœ-
niculacea aut feru-
lacea, succum la-
teum manantia, o-
dore gravi, sapore
acri. flore umbellæ
colore subluteo: se-
men

men magnum, compressum, striatum, nigrum, angustius quam Ferula.

Ferula foeminae.

Cesalpinus, si nostrum nos non fallit iudicium, Ferulam foeminam vocat, eique radicem tribuit exterius nigram. Ego hanc saepius habui, verum in radicis colorem non observavi. Is autem de Ferula foemina (quam C. Bauh. ad galbaniferam Ferulam refert) sic dixerit. Foemina Ferula, mare [Ferula folio Foeniculi, semine latiore & rotundiore] est erectior, geniculis magis distantibus; foliorum segmentis angustis quidem, non tamen capillaribus, ut maris: radice nigra exterius: caulis huius, ut maris, cum exaruerit, levissimus est, quia, ut maris, fungosus, adeo tamen etiam robustus, ut sufficiat quoque pro baculo ad sustentandam senectutem. exarescit autem perfecto semine in Aestate. ejus substantia igni familiaris, nam instar funiculi lignem conceptum tam diu servat, donec totus contabescat. Vivit radice diutius: Autumno & per totam Hyemem folia ab radice emittit: ineunte Vere caulescit, sed paulo tardius mare: gaudet regione calida & lato solo: frequens in Sicilia, & apud nos in Italia in monte Argentario.

Lacus.

Ferulago Gaza. Narthecia Theophr.

Theophrastus hanc Ferulaginem vocat, ut Gaza vertit: graece verò Narthecia vocatur. Ex Theophrasti verbis (quae ante recitavimus) conicere licet, aut Ferulaginem intellexisse, quam nos Foeminam appellamus, quanquam in lato Solo, non solum non est humilior mare, sed & altior, gracilior tamen, aut aliud quoddam humilior genus ex dicendis. Plinius

Narthecia Plin.

Theophrastum sequutus inquit. Narthecia semper humilis, &c. quae ab uno caule dividitur in cacumine foemina putatur.

An Rosmarinum ferulaceum, fertile Dioscor. Lob.

An Lob. in adv. p. 357. hanc titulo Rosmarini ferulacei, ferulis Dioscoridis, cujus semen Cactris dicitur, intelligit, de quo ait. Diversi admodum generis plantae Libanotidis appellationem asseverunt, ob odorem quem spirarent, quidam sui parte Thuris quadantenus simul, cuiusmodi primae Libanotidis radicem olere Dioscorides auctor est: qui idem à Theophrasto quandam Libanotidem memoratam, cujus folia agrestis Lactucae amaræ candidiora, asperiora, radice brevi narrat. Nobis autem nulla hodie plantae innotuit Libanotis: est tot ferulaceis, quae vulgo Libanotides putantur, perinde descriptioni consona, ut haec, quam Patavinus olim habebat hortus, quae etiamnum ineunte Hyeme lœta virebat Londini in horto Io. Riccij, pharmacopœi.

Dioscor. Lob.

Surgit ea caulem quindam, aut senum interdum cubitorum, foeniculaceum, aut Ferulæ nitidum, obscurè viridantem, alis multis & ramulis diffusum, è nodosis geniculis exeuntibus, foliisque gerentibus crebra, foeniculo crassiora, Cotulæ majora, averfa, virore caesio & glauco, umbellas per Aestatem latiores Ferulæ, aut Thapsiæ, floribus luteolis refertas, & semina Fraxini, foliacea, oblongiora quàm Ferulæ, & Cucumerino semini majora, compressiora, striata, acerosa, resinaceum, aut thureum halitum dum hinc, aut hinc. Sileris mortarij, aut Polypogoni, Selsch dantia, mansueque os resinaceo & thureo sapore complementa, acriora: reliqua planta tenera, calidiuscula, sed non ingrato holeraeco & Smirnijs gustu, quo quidem facile dignoscitur à Ferula: nam alicuius lacte multo turgit tota, uti Ferula, sed albidior & minus fervido, aut gravi odore, quin potius odore. In hac quidem Lobelij descriptione nihil invenio, quod non conveniat cum Thapsia nostra glauca. Videtur etiam cum hac non male convenire Thapsiam, Turbit glicum, Turbit cineritum officinarum, sive Thapsiam Aquaticam (his enim nominibus uram eardemque stirpem appellat) Lob. in Adv. p. 350. Verum quia dubius sum, eam separatim praeferre volui.

Semine Fraxini.

Ant. inf.

An C. Bauh. h. h. d. 4. 6. 7. p. 1. m. c. 1. 1.

lœsa & ferulacea herba: radice grandi, longa, crassitudine manum complente; foris nigra, aut fusca, intus autem candida, crassa, carnosaque cortice, & lignosa, simulque fungosa medulla constante: guttu acerrimâ, linguam exurentem, plurimam salivam provocante, ingratiâ, nausiosâ, & fauces veluti strangulationis comminatione afficiente: odore virosâ, stantida, & vetulissimâ cupuldam, rancidâque pinguedinis qualitates referente. Natalis in Italiae calidioribus regionibus, unde in Germaniam pro Costo ab impudentissimis impostoribus quondam missitari cepta est, execrabilis, periculosissimo, ac capitali poena digno dolo ac impostura. Gesnerus appositum figuram Matthioli. Cordus verò Thapsiam majorem advehi pro Costo albo, seu Arabico, monet etiam c. 66. ejusdem libri, & in dispensatorio. Est eadem Cordo in Diosc. l. 4. c. 157. Ferula nostra glauca, di. la Thapsia ferulacea & Foeniculo humilis plantâ. Hoc loco annotatum est à Gesnero, Thapsiam esse duplicem, unam minorem: alteram majorem, quæ pro Costo interdum afferatur, & hac foris quidem Costi loco uti licere, intus non item. Thapsiam autem pro Turbit, licet Turbit durius sit, interdum advehi notat. Thapsiam verò suam minorem Cordus in hist. l. 4. c. 74. ita describit. Thapsia minor, æquè ut major, ex umbelliferarum & ferulacearum herbarum genere est: radicem habet longam, satis magnam, crassitudine digitalem aut pollicarem, non nunquam etiam crassiorem, vel gracilior, foris nigra, intus candida, carnosâ, crassâq; cortice constantem, qui exempta interiori, nervosaeque medullâ affertur, substantiâ tener, in farinam friabilis, levis & liquorem ruffum, exiccatum, guttatim dispersum continens. Saporem habet, cum exsiccatum ad nos pervenerit, primum ferè insipidum, aut farinâ Tribuli aquatici similem, mox tenuem aliquid tantulum, postremò mediocriter acrem & fermentem, ob excrementitij humoris copiam, non è vestigio, sed tardus acrimonia suam linguæ ac palato imprimentem. Thapsiae cortex ejus magnitudine mediocris, crassus, liccati liquoris guttarum plenus, & à vermibus nondum corrosus, quod facile fit ob crassâ humiditatis copiam. Hucusque Cordus. Sunt autem qui aliò referant hanc Cordi Thapsiam minorem, mihi tamen consiliis videtur huc referre, neque consilium mutare, donec rationibus convincar, alio loco locandam. Scimus etiam C. Bauhinum Thapsiam majorem Cordi ad Turbit gargarizantem, de quo post, reducere.

An de hac nostra Ferula glauca loquitur Matthioli in Diosc. l. 4. c. 151. quando ait. Thapsia plurima nascitur in Apulia, praesertim Gargano monte, inter complures ferulacei generis plantas. Provenit & in nostris maritimis locis ad Ferulæ ad similes, ut non facile possit a Ferula bene potius, una ab altera distinguatur. Visitur etiam hodie in hortis ad speculaculum plantata, quæ ratione jam sermè omnibus innotuit in Italia. Ceterum, non desunt impostores, qui Thapsiæ radicem cortices pro Turpeto vendunt: quæ quidem à peritis seplasiariis in ea medicamentâ jure optimo addi possunt, quæ Thapsiam exposcunt: sed in Turpeto locum non sunt, meo iudicio, recipiendæ. Quapropter maximè in hoc, à Fuchio dissentimus, qui Turpetum à Mesue descriptum nil aliud esse, ceterâ, quàm Thapsiam, docet. Ille etiam ille, qui suam Thapsiam non describit. Ea porro figura Thapsiæ titulo passim insignita, nullam ferulaceam plantam rectè exprimit. Patroni idè ejus, Lob. Cam. & C. Bauhinus alias figuras pro Thapsia Matthioli proponunt, quæ tamen & ipsæ aliarum sunt plantarum, & ab illa valdè diversa, ut suis dicemus locis. Figuram Matthioli assumptam sit Lœcuna, qui notat, pharmaceu. & ospitali errore in diamag. calido parâ.

Cæsar claritatem ei dedit initio imperij, nocturnis grassationibus converberatam faciem illinens sibi cum Thure cerâque, & sequuto die contra famam cutem sinceram circumferens. Ignem Ferulis optimè servari certum est, easque in Ægypto præcellere. Libro 19. c. 9. Thapsiam inter ferulacei generis plantas quoque nominat, eamque perquam similem Fœniculo dicit.

Galen temp. Thapsia, autore Galeno, acrem habet ac valenter excalefacientem facultatem cum humiditate conjunctam. Quamobrem ex alto violenter extrahere, & ipsum quod extraxit, digerere scribit. Verum pluscum ad ea efficienda tempus postulari, ut quæ larga humiditate impleta sit, ob quam celeriter corrumpatur.

Alia appellationes Thapsiam porro sunt qui Hypopion, qui Panchanon, qui Scammonion, qui Thelypterida appellant. Aphri Bœden, Romani Ferulaginem, sive silvestrem Ferulam dicunt.

Cognominis diversis locis Thapsi urbes, insulæ, cherlonesique aliquot, Thapsiæ huc ab earum aliqua primò quondam sic appellatæ diversos natales & diversas bonitatis laudes fecisse videntur. Nicander in Theriacis ex Sicilia Thapsiam in primis contra venena laudavit. Nunc age, composita te malorum remedia docebo: Trinacriam [*de vellellus*] sumito, Thapsiæ radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra Thapsiam in Aphrica vehementissimam esse dixit. Hic quem plures alij sequuti sunt in Thapso insulam primò inventam fuisse ait, nec bonitatis, majorique in ea efficaciz discrimina aliqua numeravit. Ex eo fit, ut credam, (inquit Marcellus) primam Thapsiæ inventionem Thapso, quæ una ex

Trinacria Sporadibus insulis est, deberi. Hanc veteres Hypopion vocant, anticipi, nisi vitium in Theophrasto sit, & rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare Græcis Hypopion, cui in ultima syllaba i, non y sit, languinis exictu, sudore, aut injuriâ aliqua aliâ, in quampiam corporis partem concursum, integrâque cute in eo loco cessante, & quod extra venas sit quasi mortuum. Audita itaque Hypopij hujus voce, nihil aliud Græci intelligunt, quàm cellonice sanguine nigrescentem cutem. Nec dubium est, his mederi Thapsiam, & ab eo remedio, nomen hoc factum illi esse. Siquidem hic ait. [*ἡ ὑπόπια ἡ ἀπὸ τοῦ πυλίου*], h. e. hypopia & livores delet. Et Plinius rem augens ait. Nero Cæsar claritatem ei dedit, initio imperij nocturnis grassationibus verberatam faciem illinens sibi cum Thure cerâque & sequenti die contra famam, cutem sinceram circumferens. Solus Theophrastus aliter Hypopia, quibus ea medetur, intellexisse creditur. Verba ejus sunt. Thapsiæ autem vomitoria vis est, quod si quis eam retinuerit, per inferna pariter & superna purgat. facit & Hypopia, veruntamen candida [*ὑπόπια ὅταν πῶς ἀπὸ τοῦ πυλίου*]. Ex his ni vitium in hoc scriptore sit, maculas, quæ in cute albicant, hypopia intellexisse oportet. Et si recipiendum in Theophrasto hoc est, ad aliam Thapsiæ naturam referenda res erit, ad pallorem scilicet quo Thapsinus color in Phodione à Plutarcho dictus est, & à Theocrito in pharmaceutria. [*ἡ ὁ χροὸς τοῦ πυλίου ἐν τῷ πυλίου*], h. e. Et corpus meum Thapso simile factum est: nullâ aliâ quàm coloris significatione, qui color Thapsiæ fiebat. Consueverant enim veteres ad excusculdam valetudinem, corporisq; morbos non aliter, nec alio eventu quàm Cymiro, Thapsia se iungere, potuitque Theophrastus hypopia candida, palloris Thapsiæ factum dicare. Quod legentibus significalle satis sit. Et si sciamus Theocritum interpretes & alios Græcorum ut ipsos Thapso Chyloxylon, i. e. aurei coloris lignum, non herbam hanc interpretari solitos. Scammoniam vocari ab

aliquibus Thapsiam in Dioscoride legitur. Veruntamen non potuit ad Thapsiam Scammonium, nisi ex parti purgando vi, trahi. Romani ex totius plantæ similitudine (quoniam ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est) Ferulaginem, & silvestrem Ferulam vocaverunt.

Barbarus in colligendo Thapsiæ liquore, quorundam codicum (quos & se vidisse Marcellus testatur) fidem secutus, quod in Dioscoride passim, & verius legitur. [*ἀπὸ τοῦ πυλίου*], sive i. e. verit succidunt eam [*ἀπὸ τοῦ*] & tollunt scilicet radicem. Marcello autem communis lectio venior & aptior videtur, nec absque ratione. cum nulla sit ad colligendum liquorem succidenda & auferenda radicis necessitas. Præterea non semel tantum, sed sæpius verisimile est colligi posse liquorem eum: & si colligendus est ex vivente, adhuc in radice sua, plantâ colligendum esse. Idem Barbarus quod erat *venior* & sicum verit, à quo & Filicella dicta est. Nec malè quidem: nisi filici vox ad alterius rei æstimationem translata penitus jam pridem esset.

Thapson verò insulam, si non Siciliæ, at certè à Sicilia non ita longè distitam, innuit Dioscorides. Nam & idè Nicander in Theriac. radicem Thapsiæ Trinacriam cognominavit. Siciliam verò etiam Trinacriam olim dictam fuisse constat, deductâ appellatione à tribus jugis, seu promontoriis, quæ in ea insula præcipua sunt.

Thapsiam, inquit Cæsalpinus, Theophrastus simili modo radicem Thapsiæ, quo ego, candidam scribit, caulem ferulaceum, folium Fœniculo latius. Dioscorides verò Thapsiam paulò aliter delineat, ut videatur non hanc [*Thapsiam lva*], semine candido, [*crass*] intelligere, sed Ferulaginem, quam Ferulam feminam appello. Mesues procul dubio utrumque genus Thapsiæ Turbith appellat: inquit enim, Turbith est radix herbæ, cujus folia sunt, sicut folia Ferulæ, minora tamen, & est ex habentibus lac. reputur silvestre, & domesticum: & ex eo etiam est magnū & parvum: & adhuc aliud album, aliud citrinum, aliud nigrum. Quod in locis siccioribus nascitur, sit gummosius propter spissitudinem lactis ejus; in humidioribus econtra, quod deficit à sepre condictionibus, quæ bonitatem ejus ostendunt, ut scilicet sit album, & concavum, harundinosum & gummosum, & sit cortex ejus cineritius & planus, & sit recens, & friabile: citrinum verò malum est, & nigrum pejus; crassum est non bonum, & similiter quod tenue est, nam imbecille: & rugoso cortice, & quod interius, dum frangitur, nervos habet, silvestre est & malum: quod non est gummosum, imbecille est & ventris conturbativum. adulterant super illinentes gummi dissolutum: deprehenditur fracturis; nam caret gummi. quod est nimis recens, est conturbativum, & subversionem facit viscerum: vetustum imbecille est, idè eligitur id, quod in mediocritate consistit: evacuat humores tenues: quod si addatur Zingiber, educit humores crassos, & viscosos à partibus longioribus, & articulis, & locis profundis. pondus ejus contriti exhibetur à drachma una ad duas: decoctionis autem à drachmis duabus ad quatuor.

Ex his patet indicari à Mesue nomine Turbith nigri, Thapsiam Dioscoridis, quod genus improbatum; Turbith autem album Thapsiam esse Theophrasti. Tam Dioscorides quàm Mesues, corticem radicis assumi testantur, conveniunt & in facultate, nam & superius & inferius purgant, ut Græci asserunt: quod Mesues inquit purgat cum subversione & rausea. illi hilem ducere: Mesues humores terues scribit. de pondere exhibendo non conveniunt Dioscorides & Mesues, quia hic nigrum, ille album assumit: Dioscorides radicis obolos tres, Mesues

laetis obolum unum, si amplius periculosum esse: Mesues radicis drachmam unam usque ad duas exhibet, succum solum non exhibet. Galenus maximam differentiam esse recentis ad vetustioris testatur: vis enim huius pharmaci post annum multum exfolvitur, atque amplius adhuc post duos annos, ad triennium penitus inutilem esse audent proferre. Mesues recentem abdicat ob vehementiam, veterem, ob ignaviam. Testantur qui Turbith ex Apulia ferunt, radices esse Thapsia, ut ex his fateri liceat idem esse Turbith, & Thapsia. Alia tamen est sententia apud Aetnarium inter Graecos recentiores, nam Turpetum (sic enim appellat) Titimalis ascribit album quidem esse Alypia radicem; nigrum verò Pythyusa. Ac longe diversa est Serapionis opinio: putat enim Turbith esse apud Dioscoridē Tripolium: sed radix, quae in hunc usque diem pro Turbith venditur, nec Tripolio convenit, nec Alypia, nec Pythyusa, de quibus suis locis erit manifestum. Thapsia succus, aut lachryma, quod Celsapinus monet, non adfertur hodie, neque etiam in Italia, quamvis radix succosa, & sincera habeatur, etiam ex Orientalibus, sed ob vetustatem infirma, ut eum usum praestare nequeat ad extrahendum ex alto, quem sinapismi, & cataplasmata ex succo Thapsiae praestabant apud antiquos. Hac Celsapini argumenta & rationes, quibus Turbith Thapsiam esse contendit, de hoc iudicio pensitanda relinquimus. De Turbit plura ex professo H. n. g. lib. 14. dicemus. Iouberiti stat sententia Thapsiam a multis loco Turbith perperam usurpant.

Thapsia alia (inquit Fallop. de purg. simpl. c. 49.) deferitur ex Siria, quae vocatur Turbith gummosum, eod quod concresecat circa oculos radicis Thapsiae, & est gummi acre: solet tamen & gummi quoddam apponi a nebulonibus, ut decipiant homines: sed detegitur fraus, quia gummi quod addunt, non est acre. Et hoc deferitur ex monte Gargano, qui mons nunc vocatur, mons S. Angeli, & dicitur Turbith ex monte S. Angeli. Quamvis autem utrumque bonum sit, semper tamen accipiendum ex Siria delatum, quod validius est & minus cariosum, ut ortum in loco calidiori. alud verò ex Gargano monte allatum, ut plurimum est cariosum, & est debilius, quoniam oritur in loco frigidiori: & idem etiam in conficiendo oleo pro defluvio pilorum, hoc non, nisi in defectu illius, utendum erit.

Accimonia tandem si quaerieris in Thapsia, nihil est quod statim degustata, te invenire posse credas: sed si commanducetur. Illud silentio hic non praetereundum, si Thapsia loco superposita fuerit, ac vesicae & oedemata excitata fuerint, eadem illi theriacā solvi, aut etiam Cumino, aut aceto superposito, ut l. 8. cap. 44. ret. var. scriptum reliquit Cardanus.

Thapsiam apud Tragum l. 2. c. 8. Arabes Theffific cognominant, ut Avicenna l. 2. c. 10. Iacobus Manlius autem Piperiam nuncupavit.

Quam plantam intelligat per Thapsiam Euchar. Roëlin divinari non possumus, nec eum etiam agnovisse credimus plantam, quam sequentibus tradidit. Thapsia, Wilder (silvestre) Turbith folio est Foeniculi, flore albo, semine lato, Levistico simili: radix alba, crassa, cortex crassus, acuti odoris.

Lacuna in annot. in praefat. Diosc. ait per totum midum preparari diamargaritum calidum Avicennae cum Thapsia, quod diamargaritum perimat multos. Historiam recitat mulieris, quae eo assumpto in convulsiones & gravia symptomata incidit: se vidisse Avicennae exemplar manu scriptum apud Vincentium pharimacopaeum Romanum in quo legabatur Capsia pro Thapsia, & in margine annotatum fuisse, Capsiam esse Cassiam ligneam sive Catom. III.

nellam. Idem rursus l. 4. c. 159. in Diosc. repetit se in praefatione summum errorem, qui a pharina opacis committatur, ostendisse, dum in diamarg. calido Avicennae Thapsiam loco Cassiae, quam Canellam dixit, ponant. Thapsia adferri magnam copiam ex Apulia Romam nomine Turbith. Errorem hunc attiget VVeckerus Cordum secutus, addendo in diamarg. dicto radicis Thapsiae, quum alij simpliciter habeant Thapsiae pro Capsiae, sive Cassiae, ut ritè monet Lacuna. Quare merito Fuchsius in hac proumpit verba. Id errore non caret & quidem maximo, quod Cordus in diamarg. calido Thapsiae radicem subiecit, quae intra corpus exhiberi non debet, est igitur ex contextu rejicienda.

Apollo rad. n. redarguere conatur Fuchsiū dicens: Fuchsius Cordum taxans, non leviter errandus est, quod p. se, non Cordus, ab Avicennae praescripto, longe recessit, dicens Thapsiam a contextu ejiciendam, nec intra corpus exhibendam, contra Dioscoridis, aliorumque sententiam. Sed non video cur Apollo ita culpet Fuchsiū & excuset Cordum: qui sanè neglexerit monere errorem in interpretatione Avicennae periculosissimum. Quod autem dixerit intra corpus non exhibendam, non malè fecisse videtur & potissimum in cardiaco medicamento. Ille Apollo dehortari debebat ejus usum, quando quidem in p. se testatur pessima symptomata assumptam adferre.

Thapsia sit qualiscunque herba velit (inquit A. Acquitica) quae hodie sic appellant, constat non esse veram Thapsiam, de qua veteres loquuti fuere. Thapsiae verò nomine sequentes circumferuntur plantae.

Herbariorum Thapsia vulgaris, Thapsia Carotae Thapsia Ca sola a nobis scripta.

Thapsia latifolia Clusij, Thapsia quorundam si Thapsia latifolia Clusij.

Considerandum an nostra Ferula folio glauco, An Ferula de qua antè egimus, sit Thapsia Matthioli quam Glauca, non describit.

Thapsia, Turbith gallicum & Turbit cternitum, Ferula facie Turbith officinarum Lobelij, est Ferulae facie Thapsia nostra, sive Turbit Gallorum.

Thapsia tenuifolia, Thapsia 2. Clusij, forte Thapsia angustifolia Cam. hort.

Thapsia 3. Thapsia Salmanticensis Clusij, an Cicutaria maxima Brancionis, an num potius Cicutaria nostra maxima, ferida.

Thapsia quarta Clusij in agro Salmanticensi Tue. ro vocata.

Thapsia, sive Turbit Gargani mōtis, de qua mox Thapsia Asclepiadis est Rubia sativa. Traditur hac H. n. g. lib. 36.

Vesalius in paraph. in Rhaze lib. 9. c. 7. nominat Lepidium, Thapsiam Indam, quae interpretatur Lepidium. Vide H. n. g. lib. 22.

Thapsia succo Sylvius in Antiball. substituit Nasturtium. lib. 22.

Thapsiae succo Nasturtij & Erucae seminis pondus aequale, licet illa sint multo inferiora Thapsia, subornat Galenus lib. 1. cap. ph.

Pro Thapsia imponit Nasturtij semen Fuchsin antiballomenis. lib. 22.

Pro Thapsia foris adhiberi semen Erucae, testatur in ant. phar. Sylvius: itemque Fuchsin antiball. lib. 22.

Thapsiam Indam Simonis Ianuensis vocant Nasturtium aquaticum, Trag. l. 1. c. 26.

Thapsiae succi loco Sylvius in antiball. itemque Tractatus qui pro quo. succum Chamaeleontis (nigri Sylv.) substituit. lib. 26.

Thapsiae loco accipit Tract. qui pro quo, succum Glycyrrhizae lib. 27.

Error phar. maceae. rursus.

Cord not.

Apollo reid. gussur, Fuchsiū p. rucina. inf.

Acquitica.

Thapsia Ca sola a nobis scripta.

Thapsia latifolia Clusij.

Ferula facie Turbith Gallorum.

Thapsia 2. Clusij.

Thapsia 3. Clusij.

Thapsia 4. Clusij.

Thapsia Garg. mōtis.

Rubia sativa.

Lepidium.

Nasturtium.

Erucae cum Nasturtio.

Nasturtij semen.

Erucae semen.

Chamaeleontis succum.

Glycyrrhizae succum.

Hippocratem sapē usurpatum, quā hoc Metopium unguentum, etiam si alijs ipsum Galbanum eā voce accipiendum censeant. Illud verbo digendum, Dioscoridem *σπιλάς* emplastra erodentia appellasse. Præter *αλβανιφάρα* videtur legisse Serapio *ἡ ἀμμομακίς ἐμφορής*, utriusque enim & Thuris & Hammoniāci meminuit. Sed & Plinius quoque Galbanum vult esse ad similitudinem Hammoniāci. Fortasse autem in dictione hac (*πὸ ἀμμομακίς* & *πὸ ῥαβδίου*) rejecto *ἡ* legendum *ἀμμομακίς* *ῥαβδίου*. Nam & Aëtius in electione simplicium, probatissimum censet Galbanum, quod feminis aliquid admixtum retinet, neque *πὸ ῥαβδίου* mentionem facit. Ac ut verē dicam, ait Sarracenus, pugnantiā scribere videtur Dioscorides, dum probat id Galbanum cui aliquid Ferulę sit admixtum, cū antea probasset *ἄλβανον*, h. e. minimē lignosum, seu, ut Celsi verbis utar, quod est sine furculis: *ἄλβον* dici velimus, quod minimum habeat lignorum seu furculorum. Galbanum ab odore gravi (*ὀσμή βαρύν*) quo præditum est, Nicander in theriac. *βαρύνουσαν* cognominat. Lectionem *διωκείας*, pro *διωκεῖσθαι ποιείν*, se Lacuna quoque in veteri codice legisse annotat, neque hanc lectionem ratione carere subdit: quandoquidem quæ vehementer diuretica sunt, uti etiam Cantharides, interdum lotium supprimunt ratione exulcerationis, quam vesicę ipsiūque collo imprimunt. Equidem quamvis præterea Serapionem, eodem quo illi modo legisse animadvertenter, de immutanda vulgata lectione malui liberum esse suum cuique iudicium. Marcellus denique & Lacuna ex antiquioribus codicibus pro *ῥαβδίου* restituendum existimant maxime cū pinguiā, tanquam ærea, ferē supernatant. Sordes verō, cū terrenę substantię magis participes, gravitatē suā subidere soleant. Sed quoniam in Galbani, quantumvis legitimi, sordibus exiguum lignorum, furculorum, cæterorumq; id genus suā naturā levium, nō minimam portionē conspicimus: non est dubium, quin si Galbanum aquę ferventi demergatur, ejusmodi levia unā cum pinguitudine quadam fluitent: id quod ex *αλβανιφάρα* facile est unicuique animadvertere. Quamobrem nihil immutatum. Legit ultimō Lacuna veteris cuiusdam codicis autoritate fretus *ἡ ἐκ ὀδόντων καὶ δακτύλων ἀλβανόν*, &c. quippe Dioscoridē existimat præter illam priorem alteram hoc loco purgandi Galbani rationem tradere, quam ceteri cum superiore cōfundant. Verū equidem unicam in toto Galbani cōtextu purgandi rationē à Dioscoride describi existimaverim. Scilicet, ut primum in aquam ferventem conjiciatur Galbanum, quod quicquid est stipularum aut lignosorum furculorum aquę innatet, cōchąque aut alio id genus instrumento facili detrahi possit: deinde verō reliquum quod subsidet in imo, rejecitā scāquā, ad separandam denuō terram, arenam, lignum dēsius, aliudve ejusmodi crassamentum, in vas aliquod per linteum rarum excoletur, juvante in id aquę calore, quæ in vase duplici effervescat. Tū enim purius Galbanum per linteum in vas subditū excolabitur: crassior verō sordities intra linteum remanebit. Neque verō sit venisimile, quod verba Dioscoridis innuere videntur, id tantū quod innatet exolari debere, ut pinguitudo fluitās à sordibus ipsis seceratur, quippe cū in eo quod subsidet, sordium etiam ac crassamentorum non minima portio residet. Cæterum, pharmacopœi, minus laboriosē ac forsā aptius, Galbanum purgabunt: dum aceto albōve accommodato liquore ipsū dissolvunt, dissolutum cōlo transfundunt, transfusumq; tandem igni lento decoquūt ad justam spissitudinem. Metopium unguentum modō quod attinet, id totidē verbis ab Aëtio 1. Tetrab. serm. 1. describitur, itēmq; à Nicol. Myrepso sect. 16. quot à Dioscoride. At Ægineta lib. de 1. med. singu-

Diosc. sibi
conferimus.

Purgandi
Galbani
ratio 1.

lorum, ingredientium pondera & mensuras adjicit. Dubium autem est, utrum ad hujus confectiōis affumantur ipsę Amygdalę amarę, an verō oleum ex iis expressum. Hoc enim posteriori mihi magis venisimile videtur, ac Nicolai quoque Myrepso interpretis hoc modo intelligendum existimavit. Quod si ita est legendum hīc velut habetur apud Aëtium, *ἡ δὲ ἰατρικὴ συνταγὴ οὕτως εἶναι πρέπειν*, &c.

Cæterum, non possum non illis assentiri (inquit continuando suum sermone Sarrac.) qui hoc unguentū illud ipsum esse asserunt, quod ab Hipp. tum lib. morb. mul. tum etiam sexcentis locis aliis *νερόν*, seu *νερόν* nomine tantopere celebratur: quippe q̄ in uteri affectibus ad induratas vulvę cotyledonas emolliendas & obstruēdas aperiendas, itēmq; ad secundas pellendas plurimū ab illo commendetur. Hefychius in suo Lexico sic quoque habet. *Νέρον, νερόν, ἵερὸν οὐκ ἔστιν ὅτι πολλὰ μὲν αἰσθάνεται, ὡς μὲν ποτὶ Erotianus autē in vocib. Hipp. νερόν (sic enim lego, nō νερόν) exponit, ὅτι ἐκ καρπῶν τρυγῶν ἐλασιν.* Galenus in vocib. Hipp. quod ē spinę *Ægyptiæ* flore parabat oleum *νερόν* dictum existimavit, idēque *ἀρβύλον μέσον* Hippocrati dictū. Sed præter Hefychij auctoritatem, vires quas *νερόν* tribuit Dioscorides, ac eę quas *νερόν* suo itidem ascripsit Hippocrates, cū eodem planē spectare videantur, *μετῶπιον* seu *μετῶπιον* Dioscoridis, ac *νερόν* seu *νερόν* Hippocratis unum & idē fuisse unguentum evidētissimē testantur. Diosc. cap. de Galbano, non ipsā arborem, lignosamve plantam, ē quā Galbanum emanat, sed Galbanum ipsum, h. e. liquorem Ferulę cuiusdam in Syria nascentis, Metopium nonnullis dici refert. Capite verō de Metopio unguento, lignum ipsum ē quod emanat Galbanum, ab *Ægyptiis* Metopion appellari admonet. Cæterum *ἕλα* nomine significare videtur lignosum corticem, qui in ferulaceis cernitur, ipso- rum teneritudine processu temporis in lignum abeunte. Quamvis & pro arbore hoc loco, ut alias plerumque, *ἕλα* vocabulum accipi potuit: nam propter lignosum illum corticem, arborum etiam generi ascribitur Ferula: ac propterea Clearchus inter ænigmata aliam Ferulam dixit esse, *ἕλαν* & *ἕλαν*.

Et hæc de Galbano monuisse sufficiant. hoc tamen hīc obiter monendum, ut canes uno loco mingant, locum conficiendum esse Galbano, si lac. Fauloux de venat. cap. 8. verum dicat.

Quænam porro sit Lobelij Ferula galbanifera, nihil certi habemus. De hac verō mox agemus. Galbani deniq; nomine plura denotari pro confesso habetur. Tacamahaca siquidem à quibusdam Galbanum dicitur & idē existimatur. De Tacamahaca diximus in H. n. g. lib. 9. circa finem libri.

Galbanum quoque vocatur genus vestimenti delicatorum, à colore albo ac sub lucido, quod nullos habet pilos: Vnde Juvenal. Satyr. 2.

Carulea indutus scurulata, aut Galbana raso. Et hinc Galbanatus nomen simile participio formavit Martialis, i. e. Galbano indutus, accipiturque pro homine molli & effeminato lib. 3. 40.

Iacet occupat. Galbanatus in lecto. Tractioni de Galbano finem imposituris, ejus substituta annotasse quoque conveniat.

Sylvius in antibal. Traēt. qui pro quo, & Placotomus in pharm. inter alios loco Galbani Sagapenum, de quo hoc libro dicturi sumus, accipit.

Holerius in inst. Chir. l. r. c. 2. scribit, Galbani loco veteres Propoli usos fuisse.

GALBANVM ET GALBANIFERA Ferula.

Galbanum colore est flavescens. intus forisq; Gunguibis subinde ex albo viridantibus, seu corni



cornei coloris as-
persis, substantia
molli & ceræ in-
star ductilis, sapo-
re amaricante cum
acrimonia, odore
vehementi & cum
gravitate quadam
viroso.

Galbaniferâ Ferulam sic describit Lobelius. Oritur in hortis nostris hæc pervenusta plânta femine copioso lato, foliaceo, aromatico, reperto Antuerpiæ in Galbani lachryma. Totâ facie Ferulam ferat: folia exilia: flosculi item

in umbellis hilarioribus; radix crassa, succo prægnans.

Hanc in Obs. p. 451. item in Ic. p. 779. Galbaniferam Ferulam vocat. Quenam autem sit hæc Lobelij planta, nondum perfectum habeo. Frater C.B. refert, ni fallor, ad eam, quam vocamus Ferulam glauco folio, quod ego asserere non ausifim.

Apud Lugd. pingitur p. 755. hac inscriptione: Galbanifera Ferula Lobelij. Pona tradit hanc Galbaniferā Ferulam Lobelij in mont's Baldi horto reperiri.

De Galbano autem à nobis descripto loquitur Cord. in Diofcl. l. 2. c. 97. Galbanum verum, inquit, eodem nomine à pharmacopolis cognoscitur, etq; Ferulaceæ cujusdam plantæ, Metopium appellatæ, liquor. Corn. in Diofcl. l. 3. c. 85. Officinis & notum & in usu est Galbanum veteri sua appellatione conservatum. C. Bauh. phy. & pin. inter succos in spissatō secundò loco vocat Galbanum, ut & Cluf. in fine Dod. gallici.

Cassia. 7. c. 51. ait Galbanum succum esse pinguem, non tamen oleo solubilem, sed aquâ : mediâ quodammodo naturâ constantem inter gummi & resinam: accendi enim igne, ut resina: humore aqueo solvi ut gummi: tactu mollescere ut ceram: colore esse ex rufo sublivido, odore valido, medicato. Adferri autem ex Orientalibus. Dioscoridem succum Ferulæ vocare.

dere haustum, & ab articularum contediciūq; doloribus liberat. Auxilio quoque est anhelatoribus, orthopnoicis & comitialibus: item quibus humor intra pectus hæret, si ex melle delingatur, aut cum pituitæ succo forbeatur. Cruentæ etiā urinas pellit; nec non & oculorum albugines abstergit, & genarum scabrities absumit. Tritum autem ex aceto & impositum [*καὶ ἀπὸ οἴνου*]. In quibusdam codicibus legi annotat Marcellus *μυρρίνης*, i. jonicisq; durities emollit. Sed & topus seu nodos dissolvit, qui circum articulos occurrunt, cum mello adhibuit, aut etiā pici admixtum. Facit & ad lassitudines, & schiadas si additis aceto, niro & cyprino oleo, acopi vice, perungantur.

Æthiopia subiecta Africa Ammoniaci lachrymam
stillat (inquit Plin. l. 12. c. 23. inde & nomine etiam ab

Amoris oraculo, juxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant resinæ modo aut gummi. Genera eius duo, Thrauston, masculi Thuris similitudine, quod maxime probatur. Alterum pingue & resinofum, quod Phryama appellant. Adulteratur

harenis velut nascendo apprehensis. Igitur quam
minimis glebas probatur, & quam purissimis. Idem
Plin. l. 24. c. 6. de eodem repetit, ut quod medicum
his verbis recenset. Similis Ammoniaci natura, atque
lachrymæ probato ut diximus. Mollit, calefacit,
disscutit, dissolvit. Claritas visûs in collisuris convenit.
Pruritus, cicatrices, albiginis oculorum tollit.
Dentium dolores fedat efficacius acenium. Prodest
dyspnoicis, pleuritibus, pulmonibus, vesicis,
cruentæ urinæ, lieni, schiadicis potum. Sic & alvum
solvit. Articulis & podagra, cum pari pondere picis,
aut ceræ, & rosaceo coctum. Maturat panos, extra-
hit clava cum melle. Sic & durities emollit. Lien
cum aceto & cera cypria, vel rosaceo efficacissimè
imponitur. Lassitudines perungi cum aceto & oleo,
exiguo quæ nitro utile.

Ammoniacum succus est Ferulæ cujusdā, inquit Galenus. Habet hoc molliendi vim intentam, ut & Galenus articulum topus dissolvat, & lienes induratos sanat, & fluxus discutiat.

Ammoniacū sunt qui Agasilū, qui Criotheū, qui
Eliustū appellant, teste Marcello. Romani Guttam
hammoniacā dicunt. Habet vero salem, habet & li-
quorem medicinā Ammoniacū. utrumq; ab harenis
sed diversā ratione dictum. Illum quidem quod fuit
harenis concrevit & inveniatur. Hunc quod in ha-
renosa Libyā ad Ammonis Iovis templum ex Fe-
rula in harenas desillit, & utin Thure fit, concre-
vit.

grumis inter eas invenitur. Græci ab harenis, quas *arenæ* dicunt, utrumq; indicaverunt, sed illum falem, hunc liquorem Ammoniacum, quasi arenosum vocantes: gravi periculo miscendi simul diversa, nisi eorum exemplo discrimen aliquod ex re subsistantia addatur. Quod times Marcellus, ut illum falem suo loco: sic hunc Guttam Ammoniacam vocat: quasi & hic quemadmodum Thus stagnans aliquando dictus fuerit, quæ vox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Ammoniaci lachrymam eisdem rei significatione appellat; Græci Ammoniacon simpliciter, ut tunc et eius vocis ælimatio, vocant: fugiensq; æquivocæ appellationis periculum Marcell. Guttâ Ammoniacâ dixit lachrymâ, liquoremq; significat: Ferulâ, quæ privatim in Libya ad Ammonis Iovis templum tunc nasci ferebatur. Quæ sive ab harenis, sive ab Ammonis Iovis templo vocatur, eandem rationem habet. Quoniâ & Deus, qui inter eas arenas colebatur, mortibusq; respôdebatur, ab iisdè arenis nomē à Græcis invenimus; idēq; Criotheo: a forma eius, qui Arietino capite pingebatur, eadē hæc Ferula, liquorq; eius

Gutta ammoniacâ, Marcellus.
Criotheo.

pariter dict⁹ est. Ceterę eius appellationes barbarę

DE AMMONIACO VETERVM.
CAP. XXVII.

Esr & Hammoniaccum, Dioscoride ita referente,
Ferulæ liquor, quæ in capignitur Africæ parte,
quæ est juxta Cyrenem. Totus cum radice fructus A-
gassily appellatur. Maximè probatur, quod bene
coloratum est, ligni & calculorum expertus *ἡ δὲ αἴματις
ἔστιν ὁκρὸς, ἡνὲν ἔστιν ὁκρὸς ὁκρὸς ὁκρὸς*. Thuis gleba-
rum granorumve similitudine, fincerum ac dentium,
nulla forde spurcatu, Castoreum odore imitans *vet.
ἡ τοῦ μίλιον τῶ ὁκρὸς σφόδρα* & gustu amarum. Hoc ge-
nus thraufina, quasi fragmentum, seu fissuratum di-
cas, appellatur: alterum, quod terræ calculorumve
est particeps, pythama, id est, mixtura seu miscella.
Gignitur verò succus is in Libya, juxta Hammonis
templum, è ferulacea stillas arbore. Vim habet mol-
liendi, attrahendi, calcificandi, atque duritias & pa-
nos dissolvendi. *ἡνὲν ἔστιν ὁκρὸς ὁκρὸς, ὁκρὸς ὁκρὸς ὁκρὸς*. Potum alvum subducit [*Lacu-
nalligit ex vet. cod. ἡνὲν ἔστιν ὁκρὸς ὁκρὸς*] partuque extra-
hit: lienem verò consumit cum aceto drachmæ pon-

inter odoramenta, & quæ ad odorem vaporarentur, numerantes *Thymiam* vocabant. Quod in antiquis variat in Anoniaco, hoc odor est, quem castoreum sentire Dioscorides ait; Galenus verò *καστωρεον*, i.e. Coriandrum, nisi ex vicinitate vocis in alterutro vitium sit. Vtebatur hoc remedij genere multum antiquitas contra durities, panos, furunculos, & inguina. Patetque hoc ex eo, quod Dioscorides non procul à fine dixit. *κατωρεον* ἢ *πικρον* ἢ *δριστην*, &c. q.e. ut Marcell. & nos vertimus, finire tritum ex aceto impostum, &c. nisi antiquiores græci codices non *δριστην*, sed *ποτανδον* [potandum] haberent. Nos contra communem aliorum lectionem nihil mutavimus, reliquimusque Medicis de diverso remedij ejus usu etiam post hac ascendendum.

Metopion
arbor, Plin.

Notandum tamen hoc quoque, Metopion arbori Plinio dici, ex qua Anoniaci lachryma distillat: quum Dioscorides Ferulam, ex qua Galbani succus est, Metopium appellari dixerit. Deinde vocem *δριστην* in Plinio, & *δριστην* in Dioscoride, nihil nisi fractum, fragmentumque ac fracturam significare: sicut *κύναια* mixturam, à qua nihil decessit, teste Cornario.

Ammoniacum
Pauli
et Galeni
averois
Discor.

Miratur Brasavolus in exam. simpl. Paulum Aeginetam, qui inter odoramenta Ammoniacum numeraverit, quod odor ejus gravis sit. Nescire se quod fatetur, cur Galenus odorem Coriandi dixerit, curque Paulus ad odorem Ammoniacum accendat. Diversum tandem putat Ammoniacum Pauli & Galeni, à Dioscoridis, quod gravem odorem ut Castoreum habeat. Et sanè quod de re diversa loquantur, hoc signum est: quia in simpl. med. facult. ea dicunt, quæ à Dioscoride in Ammoniaci tractantur. Ammoniacum apud Averroim calidum est in prima parte tertij ordinis, & siccum in primo. Avicenna autem calidum in fine tertij. sed Averrois potius favere statuit Brasavolus, qui verum Ammoniacum nobis non deesse scribit, quamvis antiquum fortè esse & adulteratum non neget. Quod verò officinarum Ammoniacum adulteratum esse quis suspicari possit, frustra illa faciunt, quæ in modum massæ cujuscumque composita à pharmacopolis ostenduntur, non ad Thuris similitudinem in grumos concretæ, & in minutas glebas (ut Diosc. scribit) coactæ. nisi fortasse Dioscoridis verba ita intelligenda sint, quod particulæ illæ ex quibus Ammoniacum, quale in officinis habetur, diversitate quadam, quæ in eo est, Thuri comparatum, illius similitudinem repræsentet. Sed argumenti hujus solutio (ut ipse Mundella fatetur) ingenium magis quam veritatem ostendit.

Ammoniacum
plura
significat.

Nunc quod ad Armoniam pertinet, barbarè quidem Armoniacum dicitur. Rectius autem dicendum est Ammoniacum, ab Ammone, juxta cujus oraculum &c. Sed notandum quod hoc nomen, scilicet Ammoniacum, est commune ad plura. Vnde etiam quoddam sal Ammoniacum dicitur, de quo nobis sermo non est. Et hæc Ammoniæ succus à Romanis Gutta dicitur: tamen pro Gutta simpliciter scripta à doctis secundum Monachos, non Ammoniacum quod male olet: sed factæ sive styra liquidæ intelligitur. Et non per hoc, quia ipse Dioscorides dicit, quod ex Ammoniaci fit Thymiam, intelligatur, quod Ammoniacum suavè oleat: quoniam antiqui in Thymiamatis compositionibus, multa olfactu sua præstare solent. Inquit Dioscorides declaravit malum odorem, dâns Castorei similitudinem. Erres ipsa olfactibus maximum veritatis rei præbet testimonium: ex quo igitur non dubitant Monachi ipsum esse verum, quod utebantur, adulteratum tamen supplerendum voluit.

Ammoniacum
aliquando
lucet.

Ceterum, quando absolutè scribitur Ammoniacum, Gummi non sal accipiendum.

Ammoniaci thymiamate deficiente, substituit Propolis. Fuchsius l. de compos. med. in succed. Propolim.

Pro Ammoniaci thymiamate quodam intelligunt Anime in Castella dictum, Lacan Diosc. l. 3. c. 92. De Anime H. n. g. lib. 9.

Ammoniacum misceri à quibusdam cum Benzoino, palum fecit Levin. Lemm. de herb. bibl. cap. 21. his verbis. Gutta, thymiam Ammoniacum, Cyrenaiscus, vel Syriacus succus, quem Benzoi vocant, &c.

AMMONIACVM.

Ammoniacum in magnas glebas coactum advehitur, ex grumis magnis congestum, unguibus laetæ coloris nitentibus, aut rufis, permixtis per substantiam coloris obsoleti & ferè fuscis, ut Bennoini mitioni & unguibus non ineptè possit comparari, sapore amaricante, odore Galbani viosiore, sub dentibus facillè diducitur sibi coherens, magisque albescit: carbonibus injectum in flammam exardet. purè adferuntur massæ, nunquam aut rarè quicquam sordium admixtum habentes, rarerent enim invenitur semen foliaceum Anethino majus, & plantæ fragmenta nervosa, sed mollia.

Ammoniacum hic à nobis descriptum, quidam genuinum esse negant, quidam verò probant, quorum sententiam ut veriore & nos cum Aloisio Mundella, Corn. Cæf. & Cordo amplectimur. Mundellæ verba ante adscripsimus, Cordi verò sic habent in hist. l. 4. cap. 105. Hammoniacum, seu gutta Hammoniacæ, à veteribus etiam Hammoniacum Thymiam appellatum, nunc verò corrupto nomine Armoniacum, ferulaceæ plantæ Agasyllus nominatæ, & in Lybiæ harenis, atque circa Hamonis lovis delubrium nascens densatus liquor est, densis solidisque grumis, in massas compactis, Thuri non dissimilibus, foris flavis, rufis, aut in fusco flavis, intus autem candidis, aut subcandidis, nitidis & splendentibus. Odore ferè Galbanum paucò Castoreo mixtum referens, gustu amarum. Eligito sincerum, minimè harenosum, omninò purum, majoribus grumis, foris flavis aut croceis, intus verò candidioribus congestum, cum accenditur, claram flammam alens, & repentino ictu propter densitatem ardiorem in plures splendidas, nitentisque micæ diffiliens, & cum manibus tractatur, cum lentore mollescens, quod hujusmodi fuerit Thrauma à Dioscoride vocatur, quæ verò minoribus micis est, & arenis plena, ab eodem Phyrma dicitur. Affertur ad nos sincerum & valde purum, omnibusque bonitatis notis commendabile: nonnunquam tamen semine suo permixtum, quod latum, duplexque est, veluti Anethi semen, sed majus. Resolvitur ad medicamenta quemadmodum Lascerpitum. Hæc Cordus loco citato. Is in Diosc. l. 3. c. 98. interpretes illos erroris arguit, qui apud Galenum duas has distinctiones, *Ammoniacæ* & *Phyrma*, virgulâ distinguunt, diversas res falsò intelligentes.

Ammoniacum (inquit Cæf. l. 7. c. 52.) inter succos pingues est, aqua solubiles, consistentiâ aridioris ceræ, externis flavum, intus candidum, crassis guttis constans. Apertus est primo gustui suavis, postea subamarus, odor incensibilior Galbano. hujusmodi affertur inter merces orientales. Dioscorides tradidit succum esse Ferulæ aut Ferulæ arboris.

Paulus, Aëtius & reliqui Medici Græci, attestante hoc Cornario, Ammoniacum Thymiam vocant, Latini Gutta dicunt: In officinis nomen reuinet, etiam si quidam barbarè Ammoniacum pronunciant. Arab. appellatur *Roxach*, aut *Ach. It. Ammoniac* & *Armoniac*. Hisp. *Aguaxaque*, & *Ammoniac*.

Ammoniacum.

Ammoniacum hoc illegitimum censet Matthi-
lus, dicens: Ammoniaci lachrymam officinā, muta-
tā unā literā Armoniacum vocant. Cujus tamen
sincerissimā partem ad nos [Senenſes] convehunt,
qui ex Alexandria Aegypti cum mercimoniis Vene-
tias redeunt. Quandoquidem rarissimum Ammo-
niacum vident, quod suis minutis glebis Thus refe-
rat. Nam omne ferē quo officinā utuntur, picæ re-
finā modo in massā compactum cernitur, impu-
rum, ac quā plurimis impostorum adulteris vi-
tium. Ut hinc faciliē dici posse putaverim, hoc vel
illegitimum, vel saltē deterius esse, idque fortasse,
quod Dioscoridi Phryama nuncupatur.

Bauh. pin. Succus inſpillatus i. Ammoniacum ut
Cæſ. Ammoniaci lachryma, Matth. Ammonia-
cum officinis & Gummi ammoniacum.

DE DAVCO VETERVM. CAP. XXVIII.

DAUCUS, ut refert Dioscorides, ab aliis Dircaum
vocatur [δῆνυς αὖ δὲ δῆρκαυ καλοῦνται. Marcell.
Trag. Corn. legunt δ αἰκαυ, Dancium.] At Creticum
quidem folius est Fœniculi similitudine, at minori-
bus atque tenuioribus [πυρρὰ. Plin. legit δ αἰκαυ]
caule dodrantali, umbellā Coriandri, floribus can-
didis; atque inter hos semine acti, albo, hirsuto, ac luo-
vis in mandendo odoris [ἐν τῇ δόματι δόμα καὶ δὲ δὲ
cod. Bas. & Matth. verim cat. legit δαυκ ἐν τῷ σπυρ-
ρῷ δαυκ δὲ δὲ δὲ]. Radix est digitali crassitudine, &
dodrantis [palmi Corn.] altitudine. In faxosis aprici-
que locis provenit. Alterum verò genus est Apio
silvestris simile, aroma olens, acre, odoratum, serven-
tisque gustus. Probatissimum est Creticum. Terti-
um præterea genus est, floribus Coriandri, albis,
capite & semine Anethi [μεγαλὴν δὲ ἔχει καὶ καρπὸν ὡς
ἀνῆθον. Matth. σπέρμα δὲ μεγαλὴν ὡς ἀνῆθον] umbellā
verò in capite seu Pastinacæ [παρλίνω] semine re-
fertā oblongo [δανέλιον. hoc contra venit semine An-
ethi] seu Cuminis acti. Omnia semen exciliendi
vim habet. Potum mensēs, partus [μεγίστον πρὸς
quod Plinius videtur legisse δ δανέον, quasi secundas Corn.] &
urinas pellit, torminibus liberat, veterēque tussim
mitigat. Subvenit & a phalango demoris in vino
potum, & impositum ædemata discutit. Seminis
duntaxat ex aliis usus est: at ex Cretico & radicis,
quippe quæ maximē contra venenatorum injuriam
in vino bibatur.

Dauci genera ita distinguit Plinius l. 25. c. 9. Dauci
genera quatuor fecit Petronius Diodorus, quæ per-
sequi nihil attinet, quum sint differentiz duæ. Pro-
batissima in Creta, mox in Achia, & in ficcis ubicun-
que nata, Fœniculi similitudine, candidioribus foli-
is, & minoribus, hirsutisque: caule pedali recto,
radice stravissimi gustus & odoris. Hoc genus in fa-
xosis nascitur meridians. Reliqua genera ubique
nascuntur terrenis collibus, lumbibusque, nec nisi
pingui solo, foliis Coriandri, caule cubitali, capiti-
bus rotundis, sæpē pluribus quā ternis: radice li-
gnosā, & quum inaruerit super vacuā: semen ejus
Cymino simile, prioris Milio, album, acre, odora-
tum omnibus & fervens. Secundum priore vehe-
mentius est, ideoque parçē suā debet. Si jam ma-
ximē tertium genus facere libeat, est simile staphy-
lino, quod Pastinacam erraticam appellant, semine
oblongo, radice dulci. Omnia hæc & Hyeme & æ-
state sunt intacta quadrupedi, nisi post abortus. Ex
aliis usus leminis, ex Cretico & radicis, & magis ad
serpentes. Bibitur è vino drachmā unā. Datur &
quadrupedibus percussis. Idem l. 26. c. 5. Daucum &
menſes & secundas potum facillimē pellit. Et ante
l. 19. c. 5. Est & quartum genus [Pastinacæ] in eadem
similitudine Pastinacæ, quā nostri Gallicam vo-

cant. Græci verò Daucon: cuius genera etiam qua-
tuor fecerunt.

Et Galenus 2. de alimen. Daucum quosdam silve-
stre Pastinacam dicere testatur. In simpl. verò cen-
su ait. Daucus quem aliqui Staphylinum vocant,
silvestris estui mints aptus est, quā sativus, sed in
omnibus vehementior. Sativus autem edi quidem
potest, sed debilior est. Habent acrem & calidam
vim, & propterea attenuantem. Hippocrates min-
si in partu, aut ex partu uteri humores contingant,
Dauci Aethiopici radicem ex vino albo, grati odoris,
sejunx præcipuē præscribit. & paulò post semen, ac
mox etiam Daucum.

Dircaon apud Dioscoridem inter appellationes
malè legi vult Marcellus, ideoque ex Nicandro in
Theriac. Daucion emendandum. Fuisse præterea
tradit etiam ex antiquis, qui Daucum scriberent,
duoque ejus tantum genera facerent, Creticum &
Asiaticum: Dioscoridem tamen tria: Plutarchum ve-
rò plura. Masculino genere & neutro Daucum dici.
Quia porro non semper, quod Flaccus ait decies
repetita placebunt. Sunt enim quæ iterum tantum
dicta fastidium afferunt, & si quam habuerunt gra-
tiam amittant. Siquidem sumus hoc ingenio om-
nes, ut nihil unquam tam gratum, aut novum sit, ut
non statim placere desinat, & exolevisse credatur.
Et ob hanc causam plura hic de Dauco non dice-
mus, siquidem non multò post in agresti Pastinaca
tam longè tractetur ex Marcelli sententia, omnis e-
jus historia & ratio. Ex qua poterunt volentes, quæ
in Dauco exigi hinc poterant, novisse omnia. Neque
enim congener, sed idem illi est, & nomine tantum
diversus, si Galeno credendum est. Cordus tamen à
Dauco Pastinacam distinguit.

Nunc verò quod dicendum n. restat, Dauci nomen
plures sibi vendicant plantæ. Quales sunt: Pastina-
ca silvestris, Daucus vulgò dictus.
Carota secundum aliquos est Daucus Theophr.
l. 9. c. 15. & Daucus Staphylinus Gal. lib. simpl. 6.
Antriscus Dalechampi semine longo Cicutariz,
est Daucus sepiarius Geln. de coll. stirp.
Daucoides majus Cordi in hist. l. 2. c. 14. sive Dau-
ci genus asperiusculum Geln. de coll. stirp. putamus
esse eam plantam, cui titulum fecimus, An Antrisco
affinis, semine aspero & hispido.
Caucalidem, teste Dioscoride, aliqui Daucum sil-
vestrem vocant.

Daucus silvestris quorundam Dodonæi gall. l. 5. Lappula
c. 49. ab ipso met Caucalis dicitur, à nobis Lappula canaria.
canaria flore magno.

Daucus ἐχινόκαρπος αὐτὸν ἐχινόκαρπος major Cordi
& Thalij, an Lappula canaria flore minore.
can. fl. mi-
nore.

Daucus similis Pastinacæ silvestris quis sit Mat-
thiolo, videant lectores.

Dauco vulgari congener Sefelios Peloponnen-
sis nomine ex Italia Camerario hort. missa, perquam
aromatico semine, foliis pulchrè virentibus, niti-
dissimus an est Sefeli?

Daucus δανέλιον, cui Dauci angulosi Cordi Qualis
notas plures congruere scribit Thalius, quis sit col-
ligere nondum potuimus.

Dauci genus tertium Fuchij in iconibus (qui
eandem figuram habet cum Sefeli Tragi) Vissagam
existimo.

Daucus tenuifolius Cordo in hist. l. 2. c. 75. (ubi
annotatum, quærere dum esse, an hæc sit Caucalis
Matthioli, de quo dubito) qualis sit, ignoro.

Quem Dauci Cretici titulo insignire cum aliis
visum fuit, Daucum Cretensem verum Dioscoridis
esse, plures conjiciunt.

Est nobis Daucus quidam Tiburtinus, de quo se-
orfim dicturi sumus, & ejus folium ad Dauci Cretici
radicem separatim pingimus.

Men Gul.
gare.

Mutellina.

Quid?

An Saxif.
mediar?An Saxif.
minor?

Quid?

Quid?

Quid?

An Pass.
nata silv.An Cicuta.
ria simileAn Cicut.
parifolia.

Cic fatua.

An Apium
petraeum

Levisticum.

Libanotis
Theophr.

Dod.

Libanotis
altera Dod.Silaum
quercu-
daum.Apium silv.
Dod.An Carvi.
folia ma-
gna.

Hippuris.

Cimminum.

Cum Meo vulgari semen sit hirsutum, non est cur Daucum esse credamus.

Mutellinam esse Dauci aut Cari montani genus credidit Gesnerus.

Per Daucum montanum, quem quosdam nulli ratione Wolffewurz (Lupi radicem) vocare refert quid intelligat Gesnerus in descr. mont. Fracti lib. de Lunariis, nos lateat.

Daucus Selinoides Cordi; an est Saxifragia media nec est Saxifraga minor, ut voluit Gesnerus.

Daucus coriophyllus ejusdem Cordi, an est Sa-

xifragia minor?

Daucum Cyanopum Cordi, existimat Gesn. esse Pimpinellæ Tragi tertiam & minimam speciem. Sed ejus opinio non approbata videtur, imò res diligentius perpendenda proponitur. Nostra siquidem est opinio non esse Saxifragam hircinam minimam.

Optaremus ut aliquis Apollo nobis diceret, quænam sit planta Daucus coniophyllus Cordi in hist. l. 2. c. 124.

Tradit Gesn. de hort. in append. Dauci silvestris genus, quod quale sit, nobis non constat.

Daucus silvestris Galeni Anguillaræ, an Pastinaca silvestris germanica?

Daucoides Cordi minus Thelio, an Cicutariæ similis!

Daucoides minor Cordi Lobelio, an Cicutaria latifolia?

Dauci inutilis genus in arvis foliis Coriandri Gesn. hort. est Cicutaria fatua.

Daucus angulosi caulis Cord. hist. l. 1. c. 53. an Apium petraeum quoddam?

Dauci secunda species fortassis est Levisticus vulgaris secundum Manardum, & Fuchsum.

Dauci Dioscoridis alterum genus Fuchsi in hist. inscribimus Libanotidem Theophr. Bod.

Dauci Dioscoridis tertium genus Fuchsi, est Libanotis altera Dodonæi.

Dauci speciem, Daucum asininum quibusdam Cordi, vocamus Silaum quorundam.

Daucus quidam palustris Gesneri, videtur respondere Apio silvestri Dodonæi, sive Thysselinu quorundam cum lacteo succo.

Dauci tertia species Tragi (quam sibi nondum cognitar. ait) an Carvisolia magna?

Apud Plinium l. 26. c. 7. Caucon de Anabasi legitur, quam Hermol. coroll. 657. in aliquot codicibus Daucum vocari scribit, ac Hippurin significari.

Dauci femine deficiente, Tract. qui pro quo, Cimminum accipit.

DAUCVS CRETICVS SE- mine hirsuto.

Deser.

DODRANTALI aut altiore est caule, tereti, striato, hirsuto: umbella mediocris magnitudinis summo caule ramisque extremis inhidet florum exiguorum, candidorum, pedicellis canescentibus, hirsutisque hærentium. semen longum, incanum, villosum, acre, aromaticum: folia lanuginosa, cinerea, minutissime dissecta, sæpè mihi etiam penitus glabra visa, atrovirentia: radix longa, digitali crassitudine, terram versus comata, sapore Pastinacæ germanicæ. Fuchsiانا figura, quia minus bona erat, idèò aliam ex ep. Camerarij parandam curavimus, cui nos folium in inferiore parte adjecimus Dauci Tyburtini.

Icones.

Daucus
Maurib.

Daucum vocat Matthiolus in prior. com. legitimumque facit, tùmque ex Creta tantùm adferri existimavit, ac ait *Saxif. Græcis*, ut etiam Daucum Latinis appellari: Mauritanis *Ducus*, *Gezar* seu *Ciezar*:



It. *Daucus*: Ger. *Beere-
wurz*: Hisp. *Dauco*
Cretico: Gall. *Carote*
saunage. In post.
com. cum mag. fig.
lat. c. 79. *Ital.* c. 78. ea.
dem nomina habet,
sed Daucum pri-
mum inscribit. In
hist. ger. cam addit.
Camer. Daucum in-
scribit (& sic etiam
in epit.) ac silvestris
Pastinacæ genus
(ein *Gesfleder der*
wilden Pastinaden)
constituit, vocatq;
Bohem. *Dayworel*
aut *Olesing* & *Ca-
pshungado*. Cate-
rum, is olim non
descendebat. In hist.
germ. & epit. de-
scriptio concinna-
ta potissimum ex
Dioscoridis delin-
eatione. Figuram
in post. comm. mu-
tavit nonnihil. No-
men germanicum
Beerewurz, & gal-
licum *Carote saunage*
non assumen-
dum pro Dauco.
Suspicio autè Dau-
cum Matthiolo nò
bene perspectum
fuisse & cognitum,
quicquid ejus pa-
trocinatoris statu-
re Matthioli Dau-
co, quasi sit pictura
exotici Dauci, & di-
versi à Dauco Cre-
tico nostrarum Al-
pium.

Sic namque ait ad hist. Matthioli Camerarius. Ha-
bent officinæ Dauci Cretici nomine semen, cuius fig-
uram exhibeo, ut discrimen appareat, inter Mat-
thioli figuram & hanc, quæ provenit in Sabaudicis
montibus, non tamen differt à Cretico, nisi quòd
minus acre semen sit, nec ita efficax. In epit. p. 536.
dicit. Ad Daucum hunc facultates refer, quas Mat-
thiolus suo adscribit, nam figurà non differt à Cre-
tico, qui ad nos afferri solet, vinibus tantùm eo paul-
lò infusior. In hort. nominat Daucum Cretensem
vulgarem.

Porro, Matthiolus etsi de tribus loquatur gene-
ribus Dauci, unius tamen solummodo figuram pro-
ponit, quæ an primi, an secundi an tertij Dauci sit,
non indicat. Non differt tamen à primi descriptio-
ne, inquit Turnerus, si odorem, saporem aliàsque
Dauci vires habeat. Quòd si Italicum sui Dauci no-
men posuisset, facilius in ejus cognitionem licuisset
pervenire, verisimè an falsus esset Daucus ju-
dicare. Ego quidem Daucum primum non memini
me videre.

De Dauco Cretensi vero Dioscoridis (ut vocat *Daucus*
in adv. p. 32; & Icon. p. 22.) hæc prodidit Lobelius. *Creticus*
Vt naturæ sic appellationis cum Caulalide videtur *Lob.*
particeps Daucus, quem etiam *Thyrsis* vocatum, *Thyrsis*
à feminis in umbella quasi suffureas verruculas &
aspergines ostentantis effigie, à qua & viribus com-

munis nomenclatura fuit, diverso aliqui folio à Daucus est: nam quod primum designat Creticum vocatum Dioscoridi, à Selineo non parum differt, nec tamen id sola Creta fert, quippe germanicæ Alpes non modò, sed etiam Genuensium colles, & Genevensium circa Iuram rupes, hoc Cretico abundant, unde Lugdunum atque alia ad emporia hodie venum deferitur eòq; pluris emittit etiam Venetiis, quia ad Theriacam & similia antidota efficacius est, quovis alio congenerè Daucò, cuius folia exilia, inter Fœniculum & Carottam media sunt, umbellis candidis, paribus Anethi: copiosum semen, oblongum, ut Cumini, sed lanugine albidum, gustu acre, odoratum, & cuius usus pot. ssi. nùm est: usui etiam radix, quæ Pastinacæ minor, gustu fervidiore & odoratior. Huic, quò minus sit Creticum, si quid deest, Solum, Cœlumve erit. Sanè effigie nihil, viribus autem perparum abest. Quo tempore Senensis commentabatur in Dioscoridem in Patavino vireto unam aut alteram plantam alebat, unde ille habuit, quod opinione illi faciebat, non nisi in Creta eriri. Hæc Lobel. qui in Obs. p. 416. Daucum Creticum vocat, ut & Pona in Baldo, Calzolar. Gesl. & ap.

Sed & Cæf. l. 7. c. 16. Daucum Creticum nominat. Semen est, inquit, ex Creta nuper allatum, longius & angustius Fœniculo, candidius, lanuginosum, acres odoratum: sed ejus plantam adhuc videre non licuit. Describit autem Dioscorides in hunc modum. Daucum aliqui Daucium vocant. Ac Creticum quidem est foliis Fœniculi, &c. Plinius de eodem inquit, probatissimum in Creta, &c. Hoc genus apud nos in collibus saxosis nascitur, herba Fœniculo simillima, brevior, candida: ramis in latera tendentibus: flore candido: semine farctio, brevi, vulgo Fendelaxum vocant: utuntur pro Saxifraga. Hæc Casalp. quem non intelligimus. Si Plinius cum Dioscoride de eodem Cretico intelligendus, de quo ipse, cur novam posuit descriptionem, quæ vulgare Fendelaxum describitur: nec demonstrat quæ in re differat ejus semen à Cretico, vel an sit planè simile. considerandum an per Fendelaxum intelligat Daucum Creticum cognominatum licet apud nos proveniat semine non minùs lanuginoso vel hirsuto, quàm ejus quod in Creta crevit.

Lugd. p. 716. Daucus primus Matthioli. Clus. pan. p. 700. Daucus Creticus, cinerei coloris folio, & viribus cum eo, qui in Creta infusa provenit, proculdubio conferendus. Cast. s. auctor, Daucum, & Berberis germ. Carotes sauvages gall. Figura Castoris non placet quamvis fortè verum Daucum intelligat, nomen gallicum & germanicum non convenit.

Ignarus homo Euch. Roëssin nescit quid scribat, confundens diversas plantas, wild Mörten / Daucum silvestrem & Daucum Creticum. Icon repræsentat Carotam, quæ ante pro Baucia domestica exhibebatur.

Tab. Daucus Creticus, Candisfch Mörenfümel / s. auctor, Arab. Cefis, Glossographo Avicennæ Algofarel, cæteris Gezer. Lat. Daucus, Daucum, & Daucium. (cujus semen Arab. Beser Alg-farel) Ital. Daucò & Hisp. Galis verò Panee sauvage, Boheem. Saywore & Czapy hnyfdo / Belg. Croonkens cruyt / Germ. Mörenfümel. Daucus Creticus dicitur Scrap. l. b. de temp. simp. c. 254. art. n.

Bauh. phyt. & pin. Daucus 1. live foliis Fœniculi tenuissimis: Daucum 1. Matth. Lugd. Daucum Creticum vocatum. Daucus, Lac. Creticus, Cast. descr. Gesl. & Tab. Daucus Cretensis versus Diosc. Adv. Lob. ic. & Gen. Eid. Bauh. phyt. Daucus 2. montanus [mutis] s. d. longæque foliis. addit in pin. Umbellâ candidâ & hortic. Daucus Cret. Gesl. h. Cam. apud Matth. & hort. Clus. pan. non solum in Baldo, sed & alpinis Helvetiorum collectus. Daucum montanum, Cæf. Eidia-

pud Matth. Daucus 1. five folio Fœniculi: Daucum 1. Matthioli, Lugd. Dauc. Creticus, Cast. Tab. Cæf. Daucus Cretensis versus Dioscoridis, Lob. Item; Daucus 2. live Dioscoridis, quem Lobel. id Adv. non solum ex Creta legitimum adferri, sed & Alpes Germaniæ eo abundare statuit, idèq; placuit Dauci hujus figuram à Camerario proposuit adijcere, quam Daucum montanum umbellâ candidâ nominò, & Daucum secundum Dioscoridis censéo. Estq; Daucus Creticus Gesl. & Clusij, Daucus montanus Casalpini. Cur Daucum Creticum Matthioli j. & Lobelij, frater Bauh. separet à Gesneri & Clusij Daucò Cretico, rationem non habet, siquidem discrimen non ostendit. Fecit sanè hoc contra mentem Lobelij, id quod ex ejus verbis ante recitatis constat. Variant quidem aliquantulum: nam qui in Baldo, folijs est brevioribus compactionibus: qui verò in Helvetiorum alpinis & monte Wasserfall / longioribus & rarioribus: & hujus Gesl. in ap. meminit, quem cum eo in Baldo eundem, aut certè similem, & eandem virum scribit.

Daucus Creticus Montbelgardi in horto E. C. à Locm. cum me plantatus semen maturum produxit, quod decidens prodit, sequenti anno: satis etiam sequenti anno provenit. Copiosè in monte Salene, & aliis Genevæ vicinis, ubi in horto virebat Februario & Martio, florebat Majo, semen habebat Junio. Inbizarotomus quidâ vocabat Re à l'our & Patenalle sauvages, quod interpretor Radicem urli & Pastinacam silvestrem. In præruptis item montium altissimorum rupibus ad Meridiem vergentibus propter S. Vrsinum semine maturo Julio, & in vicinis montis rupibus Sain & Bre vulgò vocant, evulsumus tam glabro, quàm hirsuto folio, Majo florènt & jam tum semina satis magna ferentem. Reperi in monte Wasserfall in descensu versus Balfat / & prius in monte Rhætiæ Brailio florentem Junio, ubi degustatâ radice, videbatur mihi odor & sapor Pastinacæ germanicæ. In montibus Vicentinis hic Daucus plurimus provenit. In Baldo plures legunt. In Durenstain frequens, auctore Clusio, & Etcheiro ubi inter saxa, tenui Solo aspersa, nascitur, ut difficulter ejus integra radix erui possit. Si Tabernomontano credimus, in Italia abundat in monte S. Angeli, Gargano & aliis pluribus. Quæ Lobelius de loco prodidit, vide ante. In montis lutei altissimis illis rupibus occurrit, quibus in monte Ducatu Neocomenii Falcones nomen imposuerunt, & illis, qui Bernatum ditioni subjacent, & suchet cognominantur.

DAUCVS TIBURTINVS quibusdam.

STUTGARDIÆ in horto Ducis VVirtembergici S. D. Schvartz demonstravit herbam umbelliferam parvam nomine Dauci Tiburtini, tenuibus folijs, ut Daucus Creticus. Tossanus Carolus pharm. Burgundus misit semen dicti Dauci, quod hirsutum erat, ut Dauci Cretici, sed tenuius mihi vid. batur. Hoc satum Montbelgardi in horto E. C. non provenit.

Figuram folij Dauci hujus Tiburtini exhibemus cum Daucò Cretico, quod separatim pingi curavimus in inferiore iconis parte.

DAUCVS TERTIVS FOLIO Coriandri flore luteo.

Daucus tertius, folia Coriandri, sed minora & Desfer. Crass. aliquantulum profert, caulem sesquibitalis longitudinis, flores luteos in umbellis ut Anc.

Synon.



Anethum, semēq;
Cumini. Vere man-
dantur radices &
folia, quæ aromati-
ci gustūs sunt. Vul-
gò appellant *κυνό-
μοι*, quod Cornicis
pedem significat, ut
Bellus ex Creta ad
Clusium in epist.
scripsit.

Dauci hujus ter-
tij Belli iconem ex-
hibemus ex Ponz
Baldo. B. pin. Dau-
cus 12. sive Creticus
nodosus umbella
lutea: Daucus 3. Cre-
ticus Belli, Ponz &
epist. ad Clusium.

DAUCVS PETRÆVS GLAV- cifolius.

Descri.

Radix capillata ex defluxis recentibus foliis sa-
pore accedit ad Staphylinum sive Carotam,
cum aliqua acrimonia: folia profert tenuiter divisa,
sed rarius glabra, colore glauco, è mediocriter bre-
vibus pediculis pendentia: caulis unicus ut pluri-
mum, pedalis ac etiam cubitalis, tēnus per quem
plerumque tria parva folia, pediculo caulem am-
plexentia, ramulos interdum (præsertim si planta
sit minus novella) in tres ramulos divisus, in quo-
rum extremitatibus umbellæ parvæ flocculorum al-
borum, quos subsequitur semen parvum, per matu-
ritatem rubrum, ad Annui vulgare accedens, aro-
maticum, cum aliqua acrimonia.

Provenit locis siccis & petrosis, ut in comitatu
Montbelgardensi la Roche Bavam ad Dubim qua
itur Isle, abundans semine maturo Septembris &
Octobri.

DAUCVS ΛΑΣΙΟΚΑΤΑΦΥ Thalij.

Descri.

Radice nititur candida, palmari, quandoque
pedali, unica deorsum descendente, nonnun-
quam in duas tresve partes equaliter crassas oblique
divisa, minus crassa parvo digito, odore Apij sati-
vi, ac sapore etiam, sed fervidore, diuinus linguz in-
hærente. Caulem depromit cubitalem & maiorem,
quandoque bicubitalem, infimâ parte teretē digiti
crassitie, geniculatum, nonnihil teretem, sed pluri-
mis striis evidentioribus angulosum, pilosum valde.
Folia ad singula genicula latâ alâ caulem ambiunt,
quæ deinde in pediculum carinatum, oblongum,
pedalem in inferioribus foliis diducitur, asperum &
pilosum: cui in anteriore sui parte ad latera bini
semper ex æquo sibi correspondentes, alij brevio-
res pediculi in brachiorum modum & ipsi canalicu-
lati appenduntur, folia continentes, sicut & reliqua
principalis pediculi pars, flavescentia ut plurimum
ex viridi, in ambitu profundè incisa, simili modo
quo folia Carotæ nostræ lativè dividuntur, sed in
latiores tamen aliquanto particulas: suntque hæc
attactu quidem mollia, hispida tamen leniter, præ-
sertim in dorso ac ambitu. Porro intra singulas fo-
liorum alas adnata nova emergunt, hispida, & ipsa
geniculis intercepta, juxta quæ genicula latiori alâ
brachiolum amplexante pediculi canaliculati, prio-

ribus similes, sed breviores prodeunt, foliis consi-
milibus præditi, sed quæ subinde etiam breviora
sunt, quo magis in plantæ cacumen devergunt.
Præterea etiam ex qualibet alâ semè foliorum. tam
caulis, quàm brachiorum, folliculus protuberans e-
mergit involucri obtectus oblongo, ex quo de-
mum sicut & in caulis summo eodem modo pro-
rumpit cauliculus, sex oblongis ac imbricatis folio-
lis constans, quibus diductis filiculus exeritur plu-
rimorum petiolorum. Leniter striatorum ac piloso-
rum, agminatim caliculo inhærentium, quorum sin-
guli expandunt parvam, & convexam umbellam,
candidam aut flaventem quandoque leviter odora-
tam: sequuntur quælibet flocculus bina semina,
sibi invicem coherentia, subrotundiora in ambitu,
aliâ verò alterâ parte lata, echinata, fulva, similâ
Carotarum seminibus.

Dauci angulosi Cordi [*An Apium petræum quod An-
dam?*] notæ plures huic congruunt, sed non omnes.
Folia profundius usque ad pediculum dissecantur
in ambitu tamen serraturam nullam habent, nisi
dentatas paucas impressiones. Deinde Cordus pro-
cul dubio non præterisset, ejus evidentissimum pi-
lositatem caulis, cum aliâ singula diligenti indu-
striâ prosequatur. Præterea caulis licet sit striatus,
tamen non circa radicem triquetram figuram o-
stendit. Denum nihil villorum circa radicis caput
ex amissis foliis obtinet. Sed hæc omnia potius (ut
& aliæ Dauci angulosi attributæ notæ) in Libano
tude amara reperiuntur, quam tamen seorsim Cor-
dus alibi descripsit, in libello cui titulus fuit, *Li-
ber VI.* quem ipsius Cordi *αὐτογράφον* olim apud Æ-
milium vidi, qui nondum editus est, licet quædam
capita inde desumpta quatuor stirpium libris sint
inserta. Tamen non dubito nostram Daucum (in-
quit Thalys) Cordo fuisse cognitissimam.

Nascitur maxima ex parte in ericetis, locis apricis, *Loco-
præsertim in montibus circa Gerenrodam: imò et-
iam Stolbergæ in monte urbi proximo ad dextram
ante portam Septentrionalem summi Kallenthal-
item in loco præfati Hærcyniæ dicto auff der
Langen.*

Quis Daucus hic Thalij sit, hætenus divinari *Daucus
nondum possumus, idèoque natalium ejus incolas, libani
aut saltem ejus cognitionem habent, rogatos Cordi
volumus, ut de eo nos moneant.*

Quia Daucum suum Thalys cognitum affirmat
Cordo, non autem pronunciat quo nomine, idè si
Ioanni Edwab credunt lectores, Daucum hunc
Thalij, Daucum selinoidem Cordi judicabunt, de
quo mox.

B. pin. Pastinacæ 3. sylv. hirsuta echinato fructu: *C. B.
Daucus hæc b. pin. 3. i. e. hirsuto caule, Thal. an
Daucus angulosus, Cordi hist.*

DAUCVS TENNIFOLIUS Cordi.

DAUCUS tenuifolius primo anno, quo è semine *Descri-
prodit, folia tantum profert, silvestri Pastina-
cæ similia, multò tamen minora, glabra & per ter-
ram strata. Sequenti postea anno caulem erigit pe-
de prociorem, teretem & foliis circa genicula præ-
cinctum singulis, iis quæ circa terram sunt minori-
bus, umbellam in summo caule æstate unam atque
alteram fert, minimis, candidisque flocculis plenam:
quibus singula succedunt duplicia semina ante ma-
tuitatem superius rubentia, sativo Petroscelino æ-
qualia. Radice nititur annuâ, admodum gracili &
sub flavâ, quæ gustu aliquantulum acris est. folia sil-
vestri Pastinacæ similem saporem habent. semen
verò fervore cæteras partes vincit.*

Nasci-

Nascitur asperis, apricis & editis locis, plurimumque quā ex Hildesheimia Hanoveram itur, unius milliarii germanici spacio Hildesheimia.

Gesneri opinione Causalis Matthioli fuerit, Daucus hic tenuifolius Cordi. Nobis verò inclinatur animus esse Daucum nostrum petrum glaucifolium, iudicium tamen esto penes alios.

DAUCVS SELINOIDES Cordi.

Folia à radice capite emittit utrinque à pediculis exeuntia, Apio similia, paulò tamen oblongiora, necita splendida & glabra, sed aliquantulum rugosa, ambitu incisa, & per terram sparsa: è quorum medio caulis assurgit cubitalis, gracilis, striatus & geniculatus, singulis foliis geniculatim vestitus, prioribus multò tenuius incisus. habet adnata & ramulos aliquot caulis, in quorum summitate parvæ sunt umbellæ, æstate candidis flosculis plenæ: quibus succedunt exigua, oblonga & in fusco rubentia semina, singulisque flosculis bina, & sibi invicem conjuncta. Radice nititur duorum plerumque dodrantum longitudine, minimo digito paulò graciliore, terete, colore candida, & perenni.

Nascitur campestribus lutosisque locis, ac pratis. Radix gustu acris & fervida est, quæ si diutius (cū recens adhuc est) attrahatur, manūque ad os & nares feratur, eas partes quibus admota sunt manus, leniter exulcerat, idem efficit decoctæ vapor & halitus, in super etiam capitis gravedinem, attractoriā vi, quam efficacem habet, facit, odorem spirat similiter acrem. semen utraque facultate radici respondet.

Daucum hunc Selinoidem Cordi putat Gesnerus esse Saxifragam minorem, Pimpinellæ similem [*Saxifragiam hircinam, Pimpinellam minorem*] cujus iconem dedit ex Trago. Nos contra Saxifragiam median corjctamur. Ioannes Schrab tamen asserit esse Daucum *lancinatum* Thali, quem autores incognitum sibi fatentur. Et certè descriptio respondere deprehenditur, licet Thalius de gustu & facultate radice sui Dauci talia non prodiderit.

DAUCVS CORIOPHYLLVS Cordi.

Folia circa radice caput profert, partim Cōriandro, partimque Pastinacæ similia, per terram strata, à quorum medio caulis exit pedalis, aut nonnunquam cubitalis, gracilis, teres, solidus, geniculatus, subtilibus striis sulcatus, & in purpura (cum in consistentia est) rubens umbellis, flosculis, eorumque colore & semine, Dauco Cyanopo [*de hoc mox dicendum*] similis existit. Radicem habet pedis, aut nonnunquam duorum dodrantum longitudine, Selinoide graciliorem, teretem, candidam, & perennem. Sapore * odore exulcerante. acrimonia tota herba Selinoidi Dauco respondet.

Nascitur ubique in cultis campis, & secus vias. Solo qualicunque.

Si conjectura nostra non fallat, erit Daucus hic coriophyllus Cordi, Saxifragia minor.

DAUCVS CYANOPVS CORDI.

Folius, caulibus, umbellis earumque colore, semibusque Selinoidi similis est, præterquam quòd caulis brevior & magis teres sit, & vix evidentibus striis sulcetur: lanugine etiam tam caulis, quam fo-

lia tenui brevique vestiuntur. Radice nititur perenni, paulò minore, quàm Selinoides Daucus, foris nigra & aliquantulum tuberosa, intus autem candida, quæ præcisa, aut abrupta omnino carculum liquorem remittit. Sapore & odore Daucum Selinoidem æmulatur, sed paulò imbecillior existit.

Nascitur asperis, arenosis, sabulosis & aliquantulum editis locis, congestisque arenâ tumulis, & aggeribus, plurimūque VVirtembergæ.

Daucum hunc Cyanopum Cordi, existimat Gesnerus esse Pimpinellæ (melius, si vis, Saxifragæ) tertiam & minimam speciem. Nos autem hanc opinionem non recipimus. nec descriptiones respondere videntur. Daucum verò Cyanopum cognominat à cæruleo radice liquore prædicto (Dauco Selinoide) similem, sed minorem.

DAUCVS CONIOPHYLLOS foliis Cicutæ, Cordi.

Daucus Coniophyllus caulem habet Daucoselinoidei similem, folia verò in brachiatis utrinque pediculis producit in latitudinem explicita, & Cicutæ modo in tenues partes incisa. adnata caulis à geniculis emittit longa, in eadem thelaciūsculas umbellas candidis flosculis ferentia: quibus semina succedunt Selinoidi similia. Radice nititur candida, Coriophyllo Dauco æquali, aut nonnunquam majori & perenni. facultatibus Selinoidi respondet.

Nascitur umbrosis, herbosis atque editis locis, descriptore Cordo authore, Solo pingui.

Optaremus, ceu ante quoque diximus, ut nobis aliquis Apollo diceret, quænam sit hæc Daucus Coniophyllus Cordi.

DE PASTINACA, SIVE STAPHYLINO VETERUM, SILVESTRI & FATIVA, QUÆ ETIAM DAUCUS QUIBUSDAM GRÆCIS DICITUR.

CAP. XXIX.

Pastinaca silvestris [*pastinaca silvestris*] folia habet Disco. Com. Gingidio similia, ac latiora & subamara [*Disco. Com. Illustrat.*].

caulem rectum, scabrum, umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, ac in medio exiguum quiddam, colore purpureo & ferè ad croceum inclinante. Radix est digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, & si decoquatur, esculenta. Hujus semen potum, subditumve [*si decoquatur, vel carer*] menses dicit. Conuenit & ægrè morientibus, hydropicis, atque pleuriticis, in potionē: nec non & venenatarum bestiarum moribus ichthibusque prodest. Sed & aiunt, qui illud præsumpserint ab illis minimè ladi. Conceptum quoque adjuvat. Radix autem quæ & ipsa urinas pellit, venerem præterea stimulat, & partus apposta ejicit. Folia vero tuta & cum melle imposita phagedænica ulcera repurgant. Horti sis verò Pastinaca [*ἡ ἁγία τῆς σαπύνης*] cibo aptior ad eadem pollet, attamen viribus inefficacior. Cæterum, Pastinacam silvestrem inter nothas appellationes, sunt qui Ceras, qui Comen [*νεφροκόμην, Cerascomen legit Sarrac.*] vocent. Romani Carotam, vel Pastinacam rusticam [*erraticam, Marcell.*] Ægypti Babibylon, Aphri Sicham.

Theophrastus (juxta opinionem Cæsalpini) Pastinacam fativam Daucum vocavit, quam Theodorus simpliciter Pastinacam vertit: inquit enim in Arcadia nasci colore croci [*κροκοῦν*] specie Lauri [*δενδροκροῦν*] Ita namque Cæsalpinus quoque legendum monet.

monet. Et sanè verbum *staphylis*, postponendum erat, ut herbam propriam significaret, nec conditio foret *Pastinacæ*, quæ enim Lauri similitudo esse potest in ullo genere Dauci aut *Pastinacæ*? nisi *Pastinacæ* germanicam intelligat; latifolia enim est, ut particulæ quandam Lauri speciem habeant. Scribit præterea Theophr. in agro Prateni præstantiorem cæteris nasci; huic vim calfactoriam esse; radicem nigram. Et alibi l. 9. c. 22. *Pastinacæ* in agro Spartensi Achajæ laudatissimam referri, naturæ calfactoriam, radicem nigram. Quibus verbis insinuat illud genus, quod sanguinei coloris est, inquit Cæsalpinus. niger enim appellari solet huiusmodi color, ut uva nigra & vinum nigrum.

Athenam.

Phylitron.

Astaphylinum.
Carot.
Carot.

Plinius.

Pastinaca.
agrestis.
staphylinos.
Satio.

Hibiscus.

Quartum.
genus.
Pastin. gallica.

Pastin. major.

Diphilus apud Athenam l. 19. *Pastinacæ* esse tradit acrem, satis alere, mediocriter juvare stomachum, alvum pelleret, inflare, ægrè coqui, ciere lotium, satis ad venerem stimulare, idè quæ à nonnullis *Phylitron* vocari. Numenius etiam in *Piscatorio* silvestrem *Pastinacæ* nominat. Sed & Nicander in *Georgicis* *Pastinacæ* in arido solo radicem figentis meminit, *Staphylini* sc. agrestis, in alperis locis frequentius. Phanas lib. 5. de plant. de *Staphylino* ita scribit: Ejus plantæ quam *Pastinacæ* vocant, seminum autem [hunc locum Dalechampi ait valde corruptum, sed in q. ubi non ostendit] contra sepal esse utile. Primo verò libro: seminis ex ortum Petalo similem, & instar umbellæ Anisi. *Staphylinum* Diocles lib. 1. de tuenda valetud. etiam *Astaphylinum* nominat, eum nimirum, quem Caroton [ali] Cod. legunt *Carot. n.* ali] *Caron. n.* inquit Dalechampus, adhuc *Carotem* vocant [magna est ea, procera, sativæque *Pastinacæ* succi melioris, quàm silvestris, quæ magis calfacit, & pellit urinas: stomacho sativa grata est, ac faciliè digeritur] [Dalech. ait. Dalech.] ut Diphilus asserit. Et hæc apud Athen. de *Pastinacæ* leguntur.

Exiis [quæ lignosa sunt reliqui in hortis nascentibus in cartilagineis, n. a. & nobis, ait l. 19. c. 5. Plinius] positis quibusque, quod mirum, vehementia saporis inest] *Pastinacæ* unum genus agreste spontè provenit, *Staphylinos* græcè dicitur. Alterum sentit radice, vel semine, primo Vere, vel Autumno, ut Hygino placet Febuario, Augusto, Septembri, Octobri, solo quàm altissimè resosso. Annicula utilis esse incipit, bima utilis, gravior Autumno, patinisque maximè. & sic quoque virus [ovis, M.] illi intra stabile est. Hibiscum u. *Pastinacæ* gracilius distat, damnatum in cibis: sed medicinz utile. Est & quartum genus, in eadem similitudine *Pastinacæ* quam nostri *Gallica* vocant. Græci verò *Daucon*, cujus genera etiam quatuor fecere. Sentit autem & *Pastinaca* utroque tempore, Vere & Autumno magnis seminum intervallis, non minùs quàm ternorum pedum, quoniam spatiosè fruticat. Nervus autem *Pastinacæ* majori, at duntaxat anniculæ, idem [cum *Silene*] longitudine inest, qui de coctis extrahitur, amaritudinis tamen magnà parte relicta: quæ multo in cibis temperata, etiam in gratiam vertitur. Idem l. 20. c. 4. *Pastinacæ* simile Hibiscum [*Pastinacæ* pratensem vocat, l. 21. c. 15. verius oblectamentum q. *Anticibum*] quod *Molochen* agraria vocant, & aliqui *Pistolochiam*, hulembus cartilaginis, & ossibus fractis medetur. Folia ejus ex aqua potu alvum solvunt, serpentes abigunt. Apum, vesparum, crabronumque cibibus illita medentur. Radicem ejus ante solis ortum erutam involvunt lana coloris, quem nativum [id est aut niger est, ait susus, q. d. Dalech.] vocant, præterea ovis, quæ fecinam peperit, trunisque vel suppuratus alligant. Quidam ad hunc usum auro effodidam censent, cavendumque ne terra attingat. Celsus & podagris, quæ sine tumore sunt, radicem ejus ex vino decoctam imponi jubet. Huius ad l. c. 5. dicti libri. Alterum genus est *Staphylinos*, quod *Pastinacæ*

erraticam vocant. Ejus semen contritum, & in vino potum, tumentem alvum, & suffocationes mulierum, doloresque lenit, in tantum ut vulvas corrigat, illuc quoque è pello ventri earum proficit: vitis verò prodest, cum panis portione aqua tritum, ex vino potum contra ventris dolores. Pellit & urinam, & phagedænas ulcerum sistit, recens cum melle impositum, vel aridum farinâ inpersum. Radicem ejus *Dieuches* contra jecinoris ac lenis, ilium, lumborum & renum viua, ex aqua multa dari jubet. *Cleophrantus* & *dynteritis* [*dynteritis* ver] veteribus. *Philistio* in laetæ coquit, & ad stranguriam dat radicis uncias quatuor: ex aqua hydropicis similiter & opisthotonicis, & pleuritibus, & comitialibus. Habentes eam, ferinâ serpentibus negatur, aut qui ante gutta venerit, non ledi. Perussis imponitur cum arundine. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorum inesse *Staphylino* dixit, fortassis quoniam venerem stimulari hoc cibo certum est: idè conceptus juvare aliqui prodiderunt. Ad reliqua & sativa pollet. Efficacior tamen silvestris, magisque in petrosis nata. Semen sativæ quoque contra scorpionum ictus ex vino, aut posca, salutare est. Radice ejus contritus calpi dentes, dolore liberantur. Et hæc Plinius.

Galenus simpl. 6. inquit. *Dauco*, quem quidam *Staphylinum* nuncupant, agrestis quidem domesticum minùs est elui idoneus ceterum, in omnibus vehementior: at domesticus elui aptior, sed imbecillior: acrem & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certe radix præter jam comprehensa, statuosum quiddam habet, ac venerem. Semen autem domesticum quiddam & ipsum quandam ad venerem ciendi potentiam possidet. Agrestis verò planè statu caret, quod à quorundam vocant, ac proinde urinam mensesque diet. Idem 8. simpl. *Staphylinus* sativus imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas mensesque; pro vocat cum herba quidem tota, tum maximè semen ac radix. Habet porò etiam absterforium in te quippiam: quamobrem ulcera phag: dæmonia quidam folijs ejus viridibus cum melle, quo pura reddant, illunt.

Plinius à *Columella* nonnulla mutasse, ex *Columellæ* verbis patet. Potest, inquit, duobus feri temporibus *Pastinaca*, Autumno nimirum & Vere. Autumno circa calendas Septembris, vel melius Vere ante calendas Martias, Febuario. Locis verò siccis, aut tepidis, qualia sunt Calabria, & Apuliz maritima, potest circa Idus Januarij terræ committi. Convalescit altè *pastinato* & stercoreato loco, sed quàm sanissimè ponenda, ut majora capiat incrementa.

Si liceret in plantis, quod in Republica fit aliquando, mutato nomine legentes fallere, exiguus in *Pastinacæ* labor modò nobis esset, inquit *Macellus*, nec præteritum à peritioribus *Pastinacæ* à *Dauco* fecerneremus: siquidem *Pastinacæ* eodem cum *Dauco* nomine gaudet. Sed cogunt diversæ gentium in plantis appellationes, ob diversas quidem vires, neque eadem penitus notas, earum discrimina, quæ alioquin unum idemque sunt nominibus, tradere, dubitareque quid *Dauco* cum *Pastinacæ* idem nomen apud antiquos fecerit, & an sit *Staphylinon* (quam Romani *Pastinacæ* dicunt, *Staphylinum* duplex genus. sativum scilicet & agreste: rusticusque agrestis multiplex potius divisio quàm genus) agreste, eadem cum *Dauco*, an alterius generis herba? Sciendum igitur illud est, *Staphylinum* à Græcis simpliciter *Pastinacæ* dici olus, & oleis notissimam, & quotidiani usus radicem, nullaque adjectâ notâ aliâ sativam semper intelligi: sic *Columella* canit:

Læretur, mollemque sinem Staphylinum intubret:
Seren-

Serenda enim in hortis tunc numerabat. Idem l. i. c. 4. Tunc agrestis Pastinaca & ejusdem nominis edomita, quam Græci Staphylinum vocant: edomitam fativam intelligens: silvestrem verò addito silvestris discrimine, appellat *σταφυλινόν* dicitur, Pastinacam silvestrem, intelliguntque eam, quæ locis incultis nascitur, ac fativæ pariter frondeat & floreat, sed minore radice & magis fibratâ. Agrestem Staphylinum Galenus vocari tradit. Testisque est Paulus 6. simpl. Sed manifestius l. cap. de his, quæ edendo radices habent, in quo cum plures alias numerasset radices, *σταφυλινόν* dicitur, ait: q. e. Staphylini autem & Dauci, fativam & silvestrem Pastinacam intelligens. Plinius præterea & ipse congenerum duarum radicum discrimina aperte indicavit. Nec dubitandum cuiusnam sit, quin Staphylinus Græcis & Pastinaca Latinis simpliciter dicta, in hortis consistam non significet, longiore, crassiore, nec fibris capillamentisve tot quot silvestris in terra hærentem: Daucus verò illis, nobis agrestis Pastinaca, silvestrem illam significet in arvis, pratis, & incultis locis per se nascentem, cuius radix per Hiemem satis grata in cibis etiam sit. Estur enim cruda in acetariis, sed cocta suavis respondet & sapit. Superest modò ut dicamus (si fativa tantum & agrestis Pastinaca sit: illaque simpliciter Pastinaca; hæc Daucus quondam, aut silvestris Pastinaca dicta fuerit) cur duobus capitibus diversis locis, primò nque (sub titulo agrestis Pastinacæ; mox sub Dauci voce de eadem planta Dioscorides egerit: sed quòd variante in diversis gentibus earum herbarum natales & vires natura testari in medicina seorsum id oportebat. Plura enim Daucorum genera numeravit antiquitas, non genere, sed natali solo diversa, indicavitque id Plinius. Ex cuius verbis conicere facile est, quòd in Græcis non omnem silvestrem Pastinacam, Daucum vocatum fuisse, id quod & Theophrastus indicavit. Ex quo absurdum fuerit bis de eadem planta diversis nominibus actum fuisse. Primò n ut quas habet in Medicina vires agrestis omnis Pastinaca, ubique nascentis indicaretur: mox Dauci appellatione Creticâ, ut ille in Dauco ait, & certis locis doceretur: cuius propriæ vires propriam sibi etiam historiam exigenter. Potuit & illud in causâ esse, quòd quo tempore hic medicinam suam commentabatur Dauci appellatio non omnibus silvestribus Pastinacis respondebat, sed Creticæ tantum. Quos enim nos testes citavimus Galenum & Paulum, cum ostenderem paulò ante, eundem illis esse Daucum & silvestrem Staphylinum, Dioscoridi posteriores fuerunt, & quod certæ rei ante eos ætimationem habuerat, mutata, ut cæteris humanis rebus sit, vocum fortunâ aliud significare potuit. Quotidie enim fieri videmus, quòd Flaccus ait, perire multas, renasci multas subinde voces, si velit v. us;

Quem penes arbitrium ius est & norma loquendi.

Nobis, ut tam multa colligamus, pro comperto est, agrestem Staphylinum & Daucum Græcis eandem radicem ex multo tempore esse, & à Latinis erraticam Pastinacam vocari: & in Dioscoride non damnandam ejusdem plantæ duplicem historiam. Factum enim id est, vel ob diversas vires & notas quas Cretensis, & in Achaia nascentis Daucus haberet, ob quas à communi Staphylyno hac voce separavit: vel in quam partem nos propensiores trahimur, quum Dauci vox antiquiore illâ ætate privatim inter silvestres Staphylinos aliquam indicans à posterioribus ob similitudinem ad totum eorum genus translata fuerit, pertinētis: eo quod Plinius ait, Est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ nascentis, quam nostri Gallicam vocant.

Tom. III.

cant, Græci verò Daucon. Ex his enim ratiocinari licet Daucum si nomen Pastinacæ errataque. ille non eundem, & à Romanis nomine gentis distingui quem admodum in Græcis à Staphylyno agrestis alio nomine distinguebatur. Hunc sive silvestrem Staphylinum, siue Daucon appellet aliquis hic *κρημ*, cornu vocari ait, quod & Græcorum Lexica testantur, in quibus legitur: *καρὸν κρημὸς ὅτι κρημὸς κρημὸς*. *Cer. v.* credimusque nos quod paulò antè dictū est, à cornu formâ & longitudine sic dictum à Græcis fuisse, potuit tamen, & aliâ ratione sic vocari à fibratâ & capillatâ radice, quam habet. *κρημ* enim ut testatur Plutarchus in libello, cui titulus est, *Ve orbi in terrestribus*, sc. an aquatilibus maior prudentia sit, antiquis Græcis *κρημ*, sc. capillum significabat. Cuius significationis indicium est *κρημ* verbum, quod tōdere est, & *κρημ* nomen, i. e. cornu: sic ut apud Archilochum *κρημ* dicitur legebatur. *ὁ κρημὸς κρημὸς*, i. e. qui in ornanda coma occupatur. Quæ sententia melior & probanda magis videtur Marcello (cuius verba hæcenus recitavimus) ob id quod strium sequitur. Sunt qui & comam Staphylinum agrestem, ob eandem causam vocent. A tran. Turnebus potest Pastinaca herba videtur nomen ex eo invenisse, quod pastinum referat, & tanquam habeat. Est autem antiquis, ut Columella refert, Pastinum ferramentum biturum, plantandis malleolis aptum, unde repastinatæ vineæ veteres dictæ, quæ refodiebantur.

Pastinacæ nomine sequentes gaudent plantæ, quantum quidem hæcenus intelligere potuimus.

Pastinaca silvestris, siue Staphylinos Græcorum, *Pastin silv.* de quo jamjam dicemus.

Pastinacæ fativæ & Staphylini fativi, dicuntur *Cap. Past. naca* rotæ albæ, luteæ, rubræ & nigræ.

Pastinaca Syriaca, siue Escacul Arabum quibusdam *Escacul* genus Rapunculorum.

Pastinaca fativa Germanica, quibusdam Staphylinus, Pastinaca, quam quidam Sifarum fativum *Sifarum* censent.

Pastinaca & Staphylinos quibusdam, quam nos *Pastin syl.* Pastinacæ Germanicam silvestrem dicimus, quibusdam Elaphobosum.

Fallitur Oliveus de Serres in Theat. agric. concludens Betam rapaceam esse speciem Pastinacæ *Beta sp.* siue Carotæ. Est potius Betæ species.

Tragus l. i. c. 152. loquens de Carvi, ait *Ægi-Carvi*. netam l. i. & Athenæum, Pastinacam majorem vocasse.

Pastinacæ silvestris genus dici potest Dacus. Et *Daucus*, licet Galenus clarissime ostendat Daucum non esse Pastinacam sibi, tamen se declarat aliis Pastinacam agrestem appellari.

Pastinaca nigra silvestris Cordi & Ligustum *Silaum*. Matthioli, Gesn. hort. Silaum à nobis vocatur.

Pastinacæ genus radice nigrâ in Pratenfi agro Theophrasti Trago, inscribitur à nobis *Picu-Pescudat*. cedanum.

Matthiolo in epist. ad Cortusum Vitisnaga nihil aliud representare videtur, quam domesticæ Pastinacæ speciem.

Pastinacæ marina vulgo vocatur, quæ Matthiolo *Pastinaca* Crithmum secundum spinosum.

Plinius, auctore Cæsalpino, Pastinacæ nomen *Alibada* tribuit Hibiscis, in genere Malvæ.

Sifarum, à Trago lib. 2. c. 146. nominatur Pastinaca exigua. Item lib. 2. c. 60. Pastinaca minor.

Laver quam Pastinacam aquaticam fecit Lobel. *Sion odor* in Advers. Sion odoratum dicimus.

Considerent & flores an Cordus in Diosc. lib. 3. c. 85. item lib. 4. c. 83. per Pastinacam Gallicam Plinius *Gallicam* vocat.

intelligat Saxifragiam majorem, ut nobis sit verisimile.

Brancam ursinam, quam Pastinacæ genus credit Tragus, Spondylum inscribimus.

PASTINACA SYLVESTRIS, sive Staphylinus
Giacorum.



IN promptu est Sylvestris Pastinacæ ex sativa dicenda faciem novisse: radix minor, acrior: caules altitudine pares, sesquicubitalis, striati, hirsuti, in alas divisi: folia minutim dissecta, similiter, atro-virentia, hirsuta: flores in umbella confimiles, candidi: strobili umbellæ medius purpuræ rubet: delapsis floribus succedunt semina breviter, striata, hirsuta: tum verò convoluta umbella, cavitatem ceu aviculæ nidulum in medio deformat.

Baucia sylvestris
Monachorum

Carvi
græci

Pastinacæ sylvestris in pluribus locis meminerunt Monachi in Mesuem. Et primò quidem dist. cens. in his verbis. Baucia licet nonnullis variè exponatur, secundùm tamen Dioscoridem, Serapionem & quamplurimos autores, imò secundùm veritatem, est Pastinaca sylvestris. Est etiam Carvi agreste, sive sylvestre: quoniam tria hæc sc. Baucia, Pastinaca sylvestris, & Carvi agreste, sunt unum & idem. Et cens. 41. Non desunt, & præcipuè recentiorum, qui Bauciam & Daucum, unum & idem esse affirmant. Etenim Serapio de eis separatim capitula facit, & Bauciam inter plantas calidas in secundo, Daucum verò inter calidas & siccas in tertio scribit: ergo non sunt idem. Dioscorides quidem sub nomine Bauciz caput non habet, sed sub nomine Staphylini, sive Pastinacæ erraticæ. quod idem est. Ut patet concordando caput Serapionis de Baucia, cum capitulo præfato Dioscoridis de Staphylino. Et infra ipse Dioscorides habet cap. de Dauco, quod concordat cum capitulo de Dauco Serapionis. Marcellus autem super capitulum Dioscoridis de Pastinaca erraticâ multa dixit: ultimè conclusit idem esse Daucum & Pastinacam erraticam: & quod Dioscorides non à diversitate rerum, sed à varietate locorum & virium varia de eis scripsit capitula. Nos autem salvâ semper veritate, sicut de eis Dioscorides, Plinius, Serapio, & alii fide digni autores diversa faciunt capitula: ita credimus & absque dubio tenemus res esse differentes. Præterea nonnulli dicunt, quod Daucus sit semen Bauciz, quod non ita esse, facile probatur per Avicennam in 5. canone, videlicet in descriptione, quæ intitulatur, Ars Scoriz decoctæ: & est prima descriptio, in qua habet semen Bauciz, & semen Dauci: immediatè unum post alterum. Si autem Daucus est semen Bauciz, ad quid iterum posuit semen Dauci? Nunquid reperitur semen de semine? Ut possit stare Daucus pro semine Bauciz: & semen Dauci pro semine seminis Bauciz?

Daucum
est semen
Bauciz.

Non obstante, quod ipse Avicenna in descriptionibus suis de Dauco, & Baucia seipsum confundat. Sed nota, quod Avicenna scribit caput Bauciz, in licera g. sub nomine Gezar, quod quidem Luminare majus minime animadvertit: quia in Diacurc. magna, declarans Daucum, asserit capitulum Bauciz, Avicennæ non reperiit. Insuper autem multa fuissent tanquam necessaria interferenda, pro tot diversitatibus opinionum doctorum de Dauco, & Baucia declarandis: sed ut ne lectionis prolixitate legentis animus fastidiretur, curiosis lectoribus omnia perscrutanda relinquimus. Hoc tamen non prætereundum existimamus. Quia cum sint plures Dauci & Bauciz species, & inter se Daucus & Baucia sive Pastinaca parum differant: non pro multo inconuenienti tenemus, administrari alterum pro altero. Sed quia Daucus Creticus est cæteris laudabilior, si potest haberi, apponatur tam pro Dauco, quam pro Baucia. Apud nos quidem tres tantum species Bauciz, seu Pastinacæ, id est, Staphylini reperiuntur: duæ sylvestres & una domestica Carota nuncupata: sylvestrium autem una elevatur in cubitalem altitudinem, & aliquando plus vel minus, secundùm loca, quæ in medio umbellæ floridæ & alba habet aliquid parum cærulei, seu violacei coloris. Quam equidem speciem, pro Baucia, sive Pastinaca erraticâ, sive Carvi agreste, recipimus: quia Dioscoridis descriptio & aliorum de Pastinaca erraticâ, & descriptio Serapionis, & cæterorum de Baucia, magis conveniunt huic, quam alteri, Dauco scilicet Cretico. Hucusque Monachi, qui Bauciam, Pastinacam sylvestrem & Carvi agreste unum & idem esse statuunt. Ab iis quoque reprehenditur Marcellus, quod Daucum & Pastinacam erraticam esse concludat, idque firmis ostendunt argumentis, ea scilicet inter se differre. Notant præterea Avicennam quod ea confundat. Sed etiam ab iis taxatur Luminare Majus, quod caput Bauciz apud Avicennam non reperiit dixerit, cum tamen id ab eo nomine Gezar describitur. Plura tamen satis obscura hæc ab iis scripta sunt, quæ diligentius consideranda. Si quis caput Serapionis de lezar, sive Baucia conferat cum Pastinacæ sylvestris capite Dioscoridis, inveniet unam eandemque esse plantam, ut etiam meritò asserunt Monachi, qui antedist. 1. cens. 8. in hæc verba prorumpunt. Secundùm Haliabattam, qui (si non est additio interpretis) asserit absolutè Been esse Pastinacam sylvestrem, potest poni ipsa Pastinaca sylvestris. Ait enim in 2. Practicæ, 43. Been quoque duæ sunt species, est enim rubeum & album & est Pastinaca sylvestris, &c.

An Corn. in Diosc. hanc Pastinacam sylvestrem, per Siser sylvestre, quod Germanos wilde siser Mören appellare ait, intelligit. Item alibi, per Dauci semen, officinis matum, quod Germanis Veld Mören & Vogelnefte Avium nidos, vocare refert.

De Pastinaca erraticâ, sive Pastinaca sylvestri (ut vocat) hæc scribit Matthiolus. Falluntur qui Dauci loco, agrestis Pastinacæ semen accipiunt, illius scilicet, in cujus florentis umbellæ medio exiguum quid purpurei emicat. Aliud enim est, à Pastinaca erraticâ Daucus. Nam licet tam ex Dioscoridis, quam Galeni sententia, Daucus à sylvestri Pastinaca parum, vel potius nihil viribus differat, ob idque alterum alterius vice in medicinz usu capi possit non tamen rectè dici potest, Daucum erraticam esse Pastinacam. Eadem ferè repetit Matth. dicto lib. 3. in Diosc. cap. 69. his verbis. Tametsi nonnulli inveniantur, qui Daucum ab erraticâ Pastinaca

Pastinaca, nihil prorsus differre contendant, affirmantes, hoc idem sensisse Galenum, & post ipsum Paulum; ij tamen manifestè falli deprehenduntur. Nam etsi rectè dici possit, Daucum esse sylvestris *Pastinacæ* genus; non ob id tamen illa fuerit unquam sylvestris *Pastinaca*, cujus meminit Dioscorides. Quandoquidem si unam & eandem plantam esse Daucum, & agrestem *Pastinacam* credidisset Dioscorides, de iis sanè seorsum non discriuisset, neque alterum ab altera propriis capitibus disjuxisset. Ceterum, cum non desint, quibus videatur Galenus inter has plantas nullam facere differentiationem, videndum est, an ita se res habeat. Mihi quidem inter eas discrimen fieri voluisse Galenum, illud maximum argumentum est, quòd Dioscoridem secutus, & ipse varias utrique tribuerit vires, easque diversis locis descripserit. Dauci siquidem lib. 6. *Pastinacæ* verò lib. 8. simpl. mentionem fecit. Hinc itaque fit ut aperte conjiciam, Galenum inter illa discrimen novisse: atque eos decipi, qui in hoc Marcellum & Ruellium secuti, contrarium asserunt. Quorum præterea sententiam, ipsius Galeni testimonio, facile explodi posse putaverim, nec solum quòd diversis capitibus utriusque vires speciatim tractaverit; sed quia lib. 6. simpl. Daucum non esse *Pastinacam* clariùs ostendit, cum inquit. Daucus, quem quidam Staphylinum nominant, agrestis quidem domesticò minus est esui idoneus. In quibus sanè verbis Galenus perspicuè satis declarare videtur, Daucum non sibi, sed aliis *Pastinacam* agrestem appellari.

Lon. l. 5. c. 103. hujus meminit nomine Staphylini & *Pastinacæ* sylvestris & erraticæ: verùm illam confundit cum *Pastinaca* Germanica sylvestri, sive *Elaphobolus* Matthioli.

Dodonæus gall. hanc describit & depingit, pro Dauci tertio genere (sc. Dioscoridis) *Carote sauvage*, quam ait officinis Daucum appellari, aliis etiam Daucum Creticum. Lat. in fol. vocat *Pastinacam* sylvestrem tenuifoliam, atque officinas pro Dauco habere, ejusque loco nec malè, nec ineluctari uti. Nam & Galenum suo tempore pro Dauco habitum fuisse testari; & Dauci à Theophrasto dicti sylvestre genus esse. Sed mirari subit, Dodonæum hanc in hist. gall. secundà vice describere & depingere sub titulo Staphylini sylvestris, ubi vocari ait præter dicta, & *Pastinacam* rusticam, Carotam, Babylon & Sicham.

Trag. l. i. c. 147. pro Staphylino 2. sive sylvestri describit: cap. autem præcedenti 146. hujus figuram nomine *Pastinacæ* exhibet. De Staphylino autem sylvestri ait. Galenus & Aegineta, necnon Averrhoes Daucum erraticum seu sylvestre *Pastinacæ* genus esse dixerunt. Dioscorides sentit *Pastinacam* erraticam & Daucum unius & ejusdem esse generis. Sylvestre verò Staphylini genus Cerascomen, Latinis Rusticam *Pastinacam*, aliquibus Carotam, Egyptiis Babylon, Aphris Sicham vocitari tradit. Theophrasto Brassica sylvestris, Apuleio verò Ceras, & Vdonaution, aut ut aliis legendum videtur, Daucion dicitur; Averrhoi Halgazar, quibuldam Bancia, & cum condita fuerit, Aisingibel appellatur.

Fuch. hist. *Pastinacam* erraticam appellat, quam Staphylinum Græcis propriè nominari ait. In Icon. *Pastinacam* erraticam magnam.

Lob. adv. p. 17. *Pastinaca* sylvestris tota similis est Carotis, seu Dauci, cui Galeni *Pastinacam* sylvestrem succedaneam faciunt, etiamnum Pharmacopœi. Idem rursus de Baucia vocat Dioscoridis *Pastinacam* sylvestrem Pharmacopœorum, quam pro Dauco substituant ex Galeno. Item p. 223. Vitae Daucum officinarum inter Caryotam & Pa-

stinacam sylvestrem [officinarum sc.] radice lignosiore & minore quàm Carota; cui multum similis, caule cubitali, foliis latioribus, hirsutis, Coriandrinis, ad Bauciam accedentibus: umbellis albidis & semine. Miramur dicere Lobelium hoc loco solia habere Coriandrina, ad Bauciam accedentia, cum ei Baucia sit *Pastinaca* Germanica sylvestris sive *Elaphobolus*. In Obs. p. 416. vocat *Pastinacam* Dioscoridis, Carotam sylvestrem vulgi, Daucum officinarum & Sifer Lacunæ. p. 417. num Carota sylvestris, sive Daucus officinarum, sit Dioscoridis *Pastinaca* sylvestris, quærit. In Icon. p. 722. genus nam sylvestrem *Pastinacam* Dioscoridis esse affirmare deprehenditur.

Staphylini sylvestris, quem vulgo *Pastiricium* *Pastiricum* vocari scribit, plures extitit differentias, ait Cæss. l. 7. c. 21. sed magnitudinis tantum & parvitas: id autem quod maximum est, Daucum marinum vocari; hujus seminibus officinas pro Dauco uti: Dioscoridem huic folia assignare Gingidij: Plumum *Pastinacam* erraticam vocare: Galenum verò de aliment. Daucum.

Theod. Dorst. pro Dauco sylvestri habet iconem *Dorst. l. 103* Carotæ sativæ, quod non placet. Taberni nom. *plur.* nat *Pastinacam* erraticam. Clus. pan. & hist. Daucum vulgarem, quem ait in Pannonia in officinarum usu esse. Castor. & Cam. epit. & hist. *Pastinacam* sylvestrem. Lugd. p. 717. Vitae Daucum officinarum Galliarum, Germaniarum, & Italiæ: *Pastinacam* sylvestrem Dioscoridis, sive Carotam sylvestrem vulgi. Item p. 720. *Pastinacam* sylvestrem Matthioli. una eademque planta.

Bauh. phyt. & pin. dicitur *Pastinaca* 1. (2. apud *Synon. & R.* Matth.) tenuifolia sylvestris Dioscoridis vel Daucus officinarum: Daucus agrestis Gal. de alim. Dauci tertium genus, Dod. gal. Thal. *Pastinaca* erraticæ, Plin. Fuch. Cord. in Diosc. Tab. Staphylinus sylv. Trag. Dod. gall. Cæss. *Pastinaca* sylv. Matth. Lac. Lon. Calt. & Lugd. sylv. tenuifolia, Dodon. Ger. *Pastinaca* 2. Turn. 4. Plinij, Cam. Differt magnitudine & parvitate: sic & ratione umbellæ in cujus medio aliquando macula purpurea, subnigra, aliquando crocea: foliis etiam, aliquantum latioribus, in altera multò tenuioribus: quare Thalius illam Daucum 3. Dodonæi, hanc verò Daucum 3. tenuifolium nominat.

Σταφύλινος ἄγρος, *Pastinaca* sylvestris, sive *Staphylinus* *Nomina* *phylinos* Græcorum, Germ. Wild *Pastenei* / *Vos lingua* *gelnisi* / Belg. *Vogelsnest* / Croontens cruyt wilde *Pastenei* aut Carote. Gall. *Pasténade sauvage*. Ital. *Pastinaca salatica*. Hispan. *Canahoria salvaje*. Angl. Wild Carot. Boh. Plane *Pastinat*.

Pastinacæ in Pannonia. Frequens etiam in Italiæ arvis etiam in gracili solo & saxoso. *Pastinacam* sive Staphylinum sylvestrem observavi Buxler florentem Junio & adhuc Octobri, qua itur Moutes, & ad montem prope Krenzach, & ad ripam Birsæ inter urbem. Montpelij, Genævæ & Montbelgardis, etiam in hortis E.C. sponte.

Pastinaca sive Staphylinus sylvestris in media sua umbella profert rubentem flosculum, qui si maturuerit, & scrupuli unius pondere pueris morbo comitiali laborantibus exhibeatur, nullum magis præsentaneum adversus epilepsiam remedium esse dicit egregius Botanicus Arnoldus Gillenius ex auctoritate Medici Germani, qui Staphylinon sylvestre distinguebat in marem & feminam, quam aiebat esse, quæ flore rubente careat. Ut porro vinum citius & fortius inebriet, *Pastinacæ* sylvestris femina quidam in potum addunt. Ra. lices diutius elixare more Carotarum in patinis humali tan: dñ. cibo parate

tut.

PASTINACÆ SATIVÆ, SIVE CAROTÆ, RUBRÆ, LUTEÆ & ALBÆ.

Defr.

PASTINACA SATIVA
r. Fuchij.PASTINACA SATIVA
altera Fuchij.PASTINACÆ SATIVÆ
meliorisfiges.Daucum
Theophr.Daucum
triplex
Diosc.

SMittitur Pastinaca, Carota dicta, caulem erigit duorum aut trium cubitorum, hirsutum, striatum, concavum, ramosum, ad cuius divaricationes folia dodrantalia, in alas veluti divisa, singulas quadam Apij catura dissectas, hirsutas, odore & sapore suavi satis. Flores in umbellis latiusculis, pusilli, subrubentes. Radicis possimum cura, quæ pedem longa, crassa, friabilis, lutea, aut rubra, succulenta, sapore dulci, aromatico.

Fuchijhist. c. 264. Staphylinon sive Pastinacæ sativam duorum generum dicit. Vnum quod vulgò Carotam, Germ. sam Pasteney & Rot Rüben vocat; alterum vero Geel Rüben; quod quoddam inter Rapas cōnumerare refert. Duas figuras habet, quas & nos eadem quæ ipse in descriptione exhibemus, quamvis posterior nostra sufficere vultit.

Corn. in Diosc. geset Mören & Caroten gallicā, non latinā voce cum Germanis appellat, eamq; Pastinacam gallicam Plinium hūisse scribit.

Theophrasti Daucum esse Pastinacam nostram sativam ita concludit Turnerus. Daucus apud Dioscoridem trium est generum, apud Plinium quatuor. Galenus, Paulus & Aëlius duo tantum faciunt. Theophrastus ex vestigio Gazæ tria videtur facere, quæ radicis tantum colore diluitur. Si-

meon Sethi duo facit genera, colore radicis, duntaxat differentia. Videntur Theophr. & Sethus per Daucum intelligere Carotam. palam enim est, duo Carotæ genera, pro Daucis accipi, videlicet nigrum & flavum. Gregorius GiralduS Simeonis Sethi interpretes, Daucion verum Pastinacam, i.e. Carotam. Gaza quoque Theophrasti Daucium transferri Pastinacam. Galenus, quem sequitur Paulus, ait Daucum vocari quibusdā Staphylinum. Aëlius non solum ait Daucum dici Staphylinum; verum etiam de Staphylinoscribens, inquit vocari Daucum. Licet autem omnes hi tres duobus distinctis capitibus de Daucō & Staphylinos agant, easdem tamen utrique facultates tribuunt. Eti ergo diversæ essent plantæ Daucus & Staphylinus (quod non nego quin sint) tamen cum viribus conveniant, non potest illorum error esse magnus, qui alterum pro altero sumunt, præsertim cum scribat Aëlius Daucum dici Staphylinum & e contra. Extra dubium est autem, Theophrasti & Sethi Daucum esse nostram Carotam, utcumque Dioscorides Daucum & Staphylinum distinguat.

Matth. in Diosc. l. 2. c. 107. Siferis (primi scil.) titulo figuram habet Carotæ. Verum ut dicitur cap. de Pastinaca germanica. confundit cum ea Carotas, quod ex post. comm. apparet, cum ait. Ego superiori tempore (in prior. comm.) scripseram Sifer in Italia non feri; tamen in Germania, Rhæni præsertim fluminis accolæ suis in hortis Siferæ frequentissima habeant, quæ & ferant & colant. Ideoque Moguntiarum venalia abundè reperi, à Tincæ agro illic allatam: Sifer folio esse Oluferæ, &c. Verum mea scripta post comperi falsa, ac Sifer quod faciebam, esse Germanorum geel Rüben & Mören intellexi. Monachos etiam in Mesum redarguendos duco, qui Carum semen esse rubentis illius radicis, quæ vulgò Carota vocatur. Hæcille, qui lib. 2. cap. 52. picturam exhibet Carotæ, ac dicit: Ruellius manifesto errore putavit Carotas nobis vulgò dictas, sativas esse Pastinacas. Meminit autem Matthioli tantum ruffarum, licet in post. commen. describat utramque sanguineam sive ruffam & luteam, ubi (licet ante reprehendat Ruellium) nihilominus ait: quantum possum iudicare Carotæ sunt species Pastinacæ. Quidam novi simplicitate volunt Carotas rubras esse rubrum Been Arabum, albas album. verum iis assentiri non possum, cum non respondeant descriptiones Avicennæ & Serapionis. Hist. german. lib. 2. cap. 33. Mören aut Geel Rüben / Sifer r. quo, autore Plinio, Tiberius delectabatur. Græcis δαυκον, Arab. Culcas, Ital. Sifaro, Hispan. Chirivias, Gall. Cheruy, Bohem. Mirkew. Item cap. 34. Carota. In epit. p. 227. Sifer alterum; Ital. Carota bianca; German. Gierlin / sive Giergellin; Hispan. Chirivias; Gall. Cheruy, sive Giroules, aut Carottes blanches: radice napi effigiem præsentante, colore albicante, aut subhavescente. Tamen autem sub Siferis alterius nomine posita sit hæc planta, nihil tamen (secundum appendicem inibi positam) cum legitimo Sifere habet cognationis. Item p. 509. Carota, Ital. Carota & Carotola, German. Roth & weyß Möhren / radice rubra & alba. Mirè omnia miscet Matthioli. nomina confusa inter cætera monstrant Matthiolum vix scivisse quid scriberet de Sifere.

Lacuna lib. 2. cap. 105. figuram habet Matthioli pro Sifere, quem primum facit, ac Plinij existimat, quo Tiberius utebatur, cui tribuit radices amaranthicas cum nervo. Is ad imitationem Matthioli con-

Bauhin. phyt. Palumaca 2. five tenuifolia (a-syn C B.

tivaradice lutea. Item: Pastinaca 3. five tenuifol. fat. radice albâ. Et: Pastin. 4. five tenuifol. fat. radice atro rub. nre. Eid. pin. Pastinaca 5. tenuifolia fativa radice lutea, vel alba. Staphylin. fativus & Daucus domesticus, Galeno. Staphylinus 1. & 2. Tragiluteus; Dod. gal. Sifer, Lacalterum, Matth. Tab. Carota crocea malè Sifer, Guil. Pastinaca fativa 1. Fuchsi fativa flava, Lon. Pastinaca fativa 1. & 2. Tab. Pastinaca radicibus luteis, vel albis, Gels. hort. Pastinaca fativa Diosc. Lob. Cord. in Diosc. Pastinaca tenuifolia fativa, Dod. Ger. Carotta vulgaris radice flava, Adv. Carota radice buxei coloris, Cæs. ex albo flavescens, Cast. nostra lutea, Cam. Pastinaca 6. Daucus Staphylinus altus & hortensis, vulgo Carotta, Cam. h. Variat solum radicis colore, quæ vel alba, vel pallidè lutea, vel lutea est. Itè: Pastinac. 6. tenuifolia fativa, radice atrorubète. Staphylinus fativus Dioscoridi. Daucus radice nigra, Theophrasti. Pastinaca fativa, Plinij. Staphylinus 3. Trag. niger, Dod. gall. Carota, Matth. altera, Lugd. radice sanguinei coloris, Cæs. radice rubra, Cast. Pastin. fat. altera, Fuchsi prima, Turn. fativa rubens, Dod. Tab. atrorubens, Lob. Daucus niger Theophr. Carotta vulgaris, Ad. Pastinaca radicibus purpureis, Gels. h. Been rubrum & album, an Daucus fativus & sylv. Galeni, Ang. Carota Italica radice rubra & alba, Been rubri & albi *an Carota, quæ esse volunt aliqui, non malè, Cam.*

Seritur Carota passim inter olera. Monspelij quidem rubra & lutea radice, copiosè. ibidem rubra in tantam magnitudinem excrescit, ut vix duabus manibus comprehendi possit. Patavij abundant, Lugduni, Basileæ, Genevæ (ubi vocant *Patenalles rouges* & *Crantines*) & Montbelgardij.

Vires
et jure.

In cultis Carotæ ad altitudinem & humiditatem inclinat. Ventrem emollunt, angustiam pectoris adimunt, tussique medentur, melle aut vino dulci cocta & comestæ. Vrinam provocant & menses, idque non fortiter. Semen in caliditate radici præstat, inquit Matth. in hist. germ. cum addit. Cam. In ejusdem verò epitæit: semen & radices, pares cum domestica Pastinaca facultates habent. In cibis sumpta radix inflat, & concoctu non adèd facilis est. Rursum inquit, & in acetariis cum Pipere estur. Alba verò Rapi, aut Napi modo in carniū jure coquitur.

PASTINACA SYRIACA, SIVE Secacul Arabum quibusdam.

Deser.



Eduis est plantâ, & proin hortensis jure dicenda, licet in silvestribus proveniat. Radice nititur extensè cinerea, intus candidâ, levi, tenerâ, digitum crassâ, sesquidigitum longâ: ex qua fibrarum loco noduli ceu verrucæ prominent: sapore dulci, Carotæ simili; quibus caule, foliis, ac umbellæ. Radicis excerptus, qui penitus flavi sunt, haud minus sunt, autem Rauvolfi.

Hic in Itin. parte 1. c. 4. Secacul vocat. Parte verò 2. inter Icon. num. 74. inscribitur genus peregrinum Rapuncolorum Rieblin dictorum Germanis *Gerelen* / Arabibus & Mauris Secacul. Bauh. phyt. Pastinaca 3. five Syriaca: Lugd. in app. p. 23. Secacul Arabum, Pastinaca Syriaca (hoc titulo pingitur pag. seq. 24.) Germanis *Gerelen* / five Sileris species. Eid. Bauh. pin. Silarum 2. Syriacum: Secacul Arabum & Maurozum, five Pastinaca Syriaca, Rauvolf. Lugd. ap.

Iuxta sepès & hortos urbis Halepi, locis præferim apricis, ut sub arboribus observavit Rauvolf. fuis. item inter segetes.

Sapori grata est, ideòque Rhizotomi illius regionis hujus radices in taleolas secas filo trajiciunt, & magnâ abundantia passim venundant.

MUTELLINA.



Staphylini silve *Deser.* Staphylini silve, minor tamen, minutæque incistrium circiter digitorum longitudine totâ, glabra: caulibus brevis uncias aliquot altus, umbellam gerit parvam. radix propter terram cæ illi ita, satis longa, & crassa, extus nigrescens, odoris & saporis Mei vulgaris.

Hanc plantam à nobis in iurere Rhæticæ a quâlinginta ferè annis delineatam ita describit frater, apud

Matth. Meum 3. Alpinum umbella purpurea (purpurascens, in pin. ubi quærit an sit Daucus montanus, Cluspan. & hist. At florib. purpureis in phyt.) ex radice simplici, oblonga, nigra, parum fibrosa, aliquando minimum digitum crassitie æquante, circa caput barbata, Mei ferè figurâ, sed infirmiore, odorata & acris, folia prodeunt Mei foliis latiora: caulibus item unus vel alter, lævis, striatus, umbellam sustinens florum purpureorum, vel etiam ex alba purpurascens: quibus succedunt femina, oblonga, satisque magna.

Bened. Aret. in descr. Stochornij & Nessi mont. Bern. lib. de hort. Germ. vocat Mutrinam radice minimâ, digiti crassitiam, quandoque æquante, ut plurimum tamen minore: umbella Pimpinellæ rubescente.

Mutellina dicitur vulgo in Alpihus, nomine sc. à Mutri vel Mutri in deliuto, Galeo h. ut teste, cui Caros Alpinus videtur: radicibus ferè Mei figurâ & sapore, sed infirmioribus. Idem in descr. montis Fracti lib. de Lunar. Dauci aut Cari montani genus esse confirmat, radice simplici, nigra, oblongâ, & circa caput fetosâ.

Ex his perspicue licet cognoscere C. Bauhinum descriptionem suam ex Aretij & Gesneri verbis concinnasse, quamvis eos silentio præterat, nec fortè unquam suâ manu plantam ipsam collegisse.

Camer. hist. germ. Mutellinam similem ait Meo Muti vulgaris, sed folia latiora & flores magis rubicundos: Gesnerum exilimare posse assumi pro Dauco Creatico. In epit. vocat Mutellinam, Meum Alpinum, vel

LIBER XXVII.

vel Carum Alpinum, & Sefeli Creticum quorundam. Descriptionem quam ponit, ex aliis mutuo accepit, ut & figuram, licet eorundem non meminerit.

Ponæ in Baldo dicitur Mutelina Gefn. & Camer. Meum Alpinum quorundam.

Mutelina mihi denominata est hæc planta in monte Rhetio prope Burmum lunio collecta.

Facile autem, conjectu fuerit, hujus plantæ radicem, cum aromatica sit, exsiccacere posse, proindeque Dauci Cretici loco usui valere, Gesnerum rectè collegisse in itinere nostro, utpote quo efficaciorē censuit. Coniunt hæc lactarij colostræ & recoctam suam Glaronenses & Valesij. Ejus pabulo (ut etiam C. Bauh. intellexit ex pastoribus Bernensibus) in montibus vaccæ plurimum & optimum lacreddunt, sicut & Mei pabulo in Apulia.

DAUCVS MONTANVS CLVSII

flore carneo, semine Selino hortensis æquali.

HVC ex radice prodeunt, quinæ aut senæ tenuiorum foliorum alæ, Sefeli pratensis (quod abundè in totius inferioris Austriæ pratis nascitur) alatis foliis penè similes, sed longè minores, neque palmi amplitudinem excedentes, sed proximè ad Acus pastoris vulgaris folia accedentes, admodum virides inter quas caulis prodit pedalis, nudus, striatus, satis gracilis, qui summo fastigio binas aut ternas sustinet parvas, & bene confertas umbellas flosculorum è rubro dilutè purpurantium, sive carnei, ut vulgò loquuntur, coloris, quinque foliolis constantium, quos excipiunt Selini hortensis æqualia femina: radix digitalis est longitudinis, cortice foris nigricante, rugoso, & multis tenuibus fibris prædita.

Tota planta Daucum vulgarem quodammodo redolet, & illius gustum etiam refert.

Elegans hoc Dauci genus in Alpium Austriæ, & Stiriz sublimibus pratis nascitur. floret lunio, in hortis etiam Majo, de scriptore autore Clusio.

DAUCVS MONTANVS, SEMINE

Cretico simili, non lanuginoso, valdè odorato, specie Staphylini, umbellula clausa.


DAUCUM montanum apud nos, inquit Czfalpinus, in Alpiis nascitur; semine alioqui Cretico simile, sed nequaquam lanuginosum, acre, & valdè odoratum: ejus planta foliis constat non capillaribus, ut Fœniculi, sed specie Staphylini longo pediculo in adnexu folioso, prædura hæc & odorata: caulis striatus, cubitalis, reperitur brevior, non ultra dodrantem: umbellæ clauduntur, ut Staphylini: radix singularis, in altum descendens, ut Pastinacæ.

Daucum hunc montanum Dioscorides inter genera Dauci, secundo loco describit; Plinius verò tertio recenset.

PANACES ASCLEPIVM GVIL-

landino flore albo folio aliquatenus Carotæ, sed tenuiori.

Folia habet divisurâ ferè Carotæ vulgaris, quorundam tamen segmenta tenuiora, delicatioraque sunt & rariora, nequaquam, ut illa, hirsuta. caulis canaliculati, tenuis: umbellæ Ammeos vulgaris pares, in quibus flosculi minuti, albi: semen foliaceum, geminum, oblongum, Thapizæ quorundam tenui-



fimile, minus, ardidius, aromaticum, amarum, tres quatuorve costas exterius, interioribus quoque lineas, set pauiores, nigricantesque habens.

Frater C. Bauh. attulit plantam ex horto Patavino nomine Panacis Asclepiadis Guilandini.

Possit pro hac summi figura Lobelij in Obsp. 452. titulo Thapizæ Carotæ effigie, licet descriptione aliam intelligat plantam.

PANACES ASCLEPIVM AL-

terum Dalechampi.



PANACES Asclepium alterum Dalechampi in asperis locis & tumulis propè Monspelium provenit, ut legimus apud Lugdunensem p. 740. radice Apij, candida, tenui, acris, odorata, folio tamen Apij aut Coriandri potius, quam Fœniculi, casto; flore luteo in umbellis cincinnatè rotundatis.

Bauh. phyt. inter Libanoides (Ferulæ folio scilicet) patet ex pin. ubi

quinto loco ponit, eique umbellam luteam tribuit quarto loco refert, & Panax Asclepium alterum, Lugd. facit.

PANACES CHIRONIVM VENTURIS. CAP. XXX.

PANACES Chironium [mariæ quodam Cat. 170. Disf. ei de quodam] in Pelio monte maxime provenit scripti Dioscorides: foliis esse Amaraco [vet quidam Origan. Theophrastus etiam Lapath. Sarrac.] similibus, floribus aureis: radicem tenuem [x. p. 170. Theophr. parvè longam. Plin. parvam] & non altam [pr. fundam Cor.] gustu acrem. Vim habere radicem perennem, serpentium veneno resist. item acrim. quod tam quoque comâ contra illud ipsum efficacem esse.

Tertium Panaces Chironium cognominatur, inquit Plinius, ab inventore. Folium ejus Lapath. simile, majus tamen & hirsutius: flos aureus, radix parva. Nascitur pinguibus locis. Hujus flos efficacissimus, eoque amplius quàm supra dicta prodest. Ita Plinius ex Theophrasto, ut apparet teste Cor. Theophrastio, cujus verba hæc sunt. ἐξ ἧς τοῦ χείματος ὁ ἀντίδοτος ἐστίν.

ro locis copiosum & frequens. Exiis tandem, quæ de Caro Paulus dixit, ratiocinatur & colligit vulgarem & quotidiani usus radicem fuisse, Pastinacis congenerem, aut illis non dissimilem.

Guajacum, quod Lignum sanctum vocatur, ab Avicenna l. 2. sui Canonis Caron vocari ait Amatus.

Redarguendi Monachi qui in Mesium commentati, credidit Carum esse semen rubentis illius radices, quæ vulgò Carota vocatur, de qua ante dictum.

Pastinacam majorem sive germanicam, Gesnerus in Cat. pl. Caron cognominat.

Mutellina, vulgo in Alpibus Nutri vocata, Caros Alpinus à quibusdam habetur.

Gingidium, quibusdam teste Cordo in Diosc. Carui de Syria nuncupatur.

Cacalia Plinio, officinis Carvi agreste dicitur, auctore Ruellio.

Carviloco, Anisum ponunt Collegium Florent. Borgaricus, & Monachi in Meluem.

Carviloco Daucus à Colleg. Florent. & Borgarico substituitur.

Carviloco Cuminum Tractatus qui pro quo sumendum præcipit.

Carvus, Carvi & Carvia non est Nigella quod Pandectarius prodit.

Carviloco Piper à Tractu qui pro quo præferti bitur.

Nonnulli Iuniorum, ut Simon Ianuensis, Pandectarius, Luminare majus & cæteri confundunt Cardanum, quod Carvi agreste falsò interpretatum legitur.

Caros loco Baccas Lauri Tractatus qui pro quo quondam admittit.

giore, anguloso, subnigricante. Radice longâ, sapore amariuscule simul & acri. Sed maxime, meo quidem ^{Monacho.} judicio, redarguendi sunt Monachi illi, qui in Me- suem commentarios ediderunt: quippe qui non sine magno errore & aperto crediderint, Carum semen esse rubentis illius radices, quæ vulgò Carota vocatur. Quandoquidem Carotarum semini nulla Cari qualitas inest: id enim adeò acre non est, ut tertio calciscentium ac exsiccantium ordini adscribi possit, quod tamen de Caro testatur Galenus.

Cuminum pratenſe vocat Bauh. apud Matthio- ^{C. Bauh.} lum, seu Carum, à Caria regione, ubi laudatissimum nasci scribit. Hujus verò inter Staphylinos Athenæum meminisse putat: sed multum aberrat. Athenæus, ut aliàs quoque monimus, Pastinacam Carotam dictam intelligit, quæ culturâ & foliis & semine vegetior redditur.

Cæterum cuius nomen græcum est *καριον* & *καριον* ^{Synon enim nominibus linguar.} & apud Aëtium *καριον*, apud Simeonem Sethi *καριον* & *καριον*, hoc Latinis (ut Ruell.

Brunf. Trago, Dod. gall. Gesn. h.) Caros dicitur, & Carus (ut Lac. Cord. in Diosc. & hist. Dod. lat. Lob.

Cast. Lugd. Tab. & Cam.) itemque Careum (ut Fuchſio, qui secutus est Plinium) & Carum (ut Turn.

Cord. in Diosc. Matth. Lac. Ang. Lob. Dod. Cast. Lug. Tab. & Ger. inquit C. Bauh. in pin. ubi vocat Carui.

& Cuminum pratenſe.) officinis & herbariis (Lon. Adv. Cæs. & Thal.) paterno ut plurimum casu cognitum Carvi vocatur, quo tamen nomine semen omnes uno ore vocitant, licet non desint qui Car-

reo semen appellent. Sed & Carium & Caroum, Carnabum ac Carnabadium Simeonis Sethi seu A-

ëtarij, ad differentiam Carnabadium Nicolai Myrephi, quod Cuminum est. Arab. Serapioni *Carvia* &

Carvium. Avertioi *Naucua*, [*Nauca* Tragus] & aliàs *Karavia*, *Karvi*, *Carguet*, *Karma*, *Altorsili*. Harunij,

Zanarbi & *Carunacari*, videturque quod Græci recentiores nomen Carnabi & Carnabadij ab Arabi-

bis desumpserint. Hebræis *Kammon*; Chaldæis *Kammon*. Sed dubitat Tragus an ad hoc Cuminum, an

verò ad Cuminum Romanis hæc appellationes pertineant. Is sibi falsò persuadet hanc plantam Athenæum Pastinacam majorem vocasse. Germ. *Seldra*

kümmel / *Wiskümmel* / & *Martenkümmel* / (Cuminum pratenſe hæc verba sonant) item *Bim* &

Kümmel / quæ tamen nomina de Cumino propriè dicuntur. *Wegkümmel* / quoniam non nun-

quam ad itinera & vias reperitur: Iuliacensibus & Colonienſibus *Fischkümmel* / & *Speiskümmel* /

quòd eo in cibis & præsertim in piscibus coquendis id adhibeant. Belg. *Carue* / *Suyſſerpen* / *Eucra-*

pen : Frisii *Hoffſuym* : Gall. *Cari*, *Cumin* & *Sise* : Ital. *Caro* : Milanensibus *Carolo* : Vicentinis *Carvin* :

Venetis *Carui*. Hiſp. *Caravea* & addito articulo *Al-*

kravea. Angl. *Carawayes*. Boh. *Bmyn* laucny.

In pinguibus ac latis campis herbosis & pratis, ^{Loem en} quæ subinde rigantur, apud Germanos Bohemof. ^{tempore.}

quæ frequens nascitur, à Maio merſe usque ad Augustum & flores & semen proferens. Sicciora Hun-

garix prata hoc abundant, & magnam copiam in quodiæum usum singulis annis suppeditant. Co-

proſe crescit in Frisix pratis inter *Marien-Hoff* & *Werden* proximè litus. Basileæ, Tiguri, Montbel-

gard: Ebroduni passim in pratis provenit florens Maio: Geneva in principio mensis Aprilis. In orto

E. C. latum eo anno nec caulem, nec florem pro-

ducit.

Hodierno die, auctore Trago, semen Cari pan-

adjecum apprimè conduct, calesque quoque ap-

positum jucundo illos commendat odore, sicut & omnes alios cibos. In sacculo lineo semen calidum

impositum ventri, flatus discuit, à purgatione in colica passione. Passim semen hoc in Germania usu

fre-

CAROS.



Carum ex radice singulari, longa, crassitudine pollicari, & majore, rugosa, adnatis quibusdam & fibris aucta, alba, sapore aromatico & acriusculo ut Pastinacæ, caules proferunt multos, cubitum & sesquicubitum altos, striatos, geniculatos, in ramos subinde divisos: folia longocaulino pediculo, sed a gulto, partim à radice, partim ex ramulorum alis enata, Staphylifolia similia, sed per

longiora intervalla alas proferentia: in ramulorum extremis umbellæ non ingrato odore: flores singulares albi, aut rubescentes, ex quinque foliolis cordatis, non nihilque ad fissuram crispis compositi: ex quorum umbilico virenti flamma tenuissima exeunt albicantia apicibus virentibus semen succedat oblongum, striatum, sapore acuti & aromatico.

Carum officinis vulgo Carvi dicitur, inquit Matthiolus, semen omnibus rotum. Planta nascitur in pratis & collibus, præsertim in montibus & convallibus, Pastinacæ silvestris non ab similibus, caulibus ab una radice pluribus, quadrangulis, cubitalibus: umbellæ floribus candidis reſerta, semine Aniso lon-

frequentissimum, non tantum panibus compistum & calceis adjectum, sed etiam eo iuscula carniū & piscium in culina conduntur. officinae denique saccharo semen istud obducunt. Quod etiam non conditum, scribente Camerario, cum Erucæ semine saepe usurpatum, cerebrum corroborat, pravosq; humores ejus dissipat, quo nomine ad apoplexiam præcavendam utile est. Semen crassiusculè tritum, sacculo exceptum, calentēque vino confersum, exterius impositum, non tantum aurium doloribus ex de fluxu frigido oris confert, verum etiam dentium cruciatus lenit. Asparagi primum erumpentes, crudi suavissimi in acetariis comeduntur. Multum olei reddit distillatum semen, quod ipse expertus sum. Quum in principio paroxysmi tertiaræ flatibus & pituita in ventriculo vexaret cum æsophagi convulsione, ut videret suffocari, ac vix possem loqui, iussi mihi dari olei Carvi guttas tres aut quatuor cum iusculo. Nescio autem quo errore multo plures daret, subito sensi tantum ardorem oris ventriculi, ut penè enecarer, nisi copulata aqua frigida, deinde evanuisse. Hoc tanè oleum multo acrius est, quàm Anisi.

ANTHRISCVS PLINII QVIBVS-
dam semine longo Cicutariz vel
Chæri phylli.

CAP. XXXII.

Refol



Lignosa, simplex & alba est radix, sapore Pastinacæ, aromatico, caulibus cubitum unum, aut alterum altus, multis alis concavus, striatus, ex virore atro rubens, abundè hirsutus, copiosè medulla factus: folia Pastinacæ sive Staphylini tenuifolia, minore tamen divisa, ad Cerefolium etiam accedente, nervo hirsuto annexa, ipsa quoque non minus pilosa, sapore nullo manifestò:

flores in umbellis candidi ex quinque foliis cordatis, & quodammodo crispis, concoloribus apicibus, compositi: semen oblongum, tenue, compressum, sulcatum; duas fibras è humo proferens, guttu aromatico, simile Cerefolij semini, minus, nigrum, quod in Icon. Guarinianis non exprimitur.

Anthriscus
plinius

An plantam à nobis descriptam intelligit Lugd. 1. c. 48. dum ait. Anthriscum Plinius tradit 1. 2. c. 15. & 1. 2. c. 22. Anthriscum plantam esse hanc præsumunt Herbarij quidam, quorum sententia nec refragor, nec suffragor: gignitur in pratorum marginibus, præsertim si gelidis aquis rigatur, & ad rivolum præterfluentem alveos, radice Fœniculi, intus albâ, odoratâ, acri: solus Apij per oras obliquè dissectus, in singulis pediculis ferè semper quinis: caule cubitali & interdum proceriore, anguloso: flore in umbellâ candido: semine oblongo, gemino, apicibus duobus præfixis exilibus, acri & odorato. Hæc Lugdunensis. Audivi ego qui plantam hanc Anthriscum Plinius Dalechampi nomen

nant: alij Causalidem: et autem non refragatur descriptio & figura in Lugdunensi posita. verum quod dicitur de loco natali, nostræ plantæ non convenit.

ICON ALTA.



Tabern. Cerefolium silvestre, Onocleion: Wilder Terebinth: bel. Gescoll. Dausier: Bauh. phyt. Canealis: latifolia hirsuta, semine Chæri h. De hac etiam in Annad. an Lugdunensem loquitur his verbis: Anthriscus Plinij Lugdunensis p. 791. cujus folia latiora erant pingenda, & etiam hirsuta una cū caule. Eid. B. pin. Chærophyllo a. silvestre; Dausi sylv. genus, Geln. ap. Apium syl. Gericon.

Herba quæ quibusdam dicitur Anthriscus, passim juxta scpes provenit Basileæ & Montbelgardi florens Junio & Augusto. Lugduni florentem in sepibus Majo observavi & Genæ passim in sepibus videntem mensis Februarij principio.

SCANDIX VETERVM.
CAP. XXXIII.

Dioscorides de Scardice, inquit, silvestre olus est [ver. silvestre] (ver. similem dicit) subacre, amarum, atque esculentum. Siquidem crudum consumitur, alvo stomachoque utile. Ejus verò decoctum potum, vesicæ, renibus, & jecinori prodest.

Tantum reperitur apud Theophrastum Scandice mentione inter eas plantas, quarum caules humi procumbunt, ut Malvæ, Cucumeris silvestris: quo in loco (ver. ex. a. i. e. annicaula legendum putat Cæf. sed (ver. ex. a. i. e. humicaula, ut opponatur eis, quæ dicitur Scandice, & pericaula.

Plinius Scardicem inter olera silvestria recenset & villia, dicens 1. 22. c. 22. Scandix quoque in olera silvestri à Grecis ponitur, ut Opion & Erasistratus tradunt. Item decocta alvum sistit. Semine singulis corlestum ex aceto sedat. Illini urambustis, urinæ ciet. Decoctæ succus prodest stomacho, jecinori, renibus, vesicæ. Hæc est quam Aristophanes Euripidi Poëtæ objicit joculariter, matrem ejus ne olus quidem legitimum vendidisse olim, sed Scandicem.

Galerus 8. simpl. de Scandice (quam 2. de alim. Gingidio similem facit) ait. Ex sylvestribus oleribus est, subacre & amarum ut in sicardo & calefaciendo securi ordinis intenti sit. Multum autem urinam ciet, & ut ex relatis qualitatibus compositum, viscera ab obstruione liberat.

Hæc itaque est Scardix illa quæ toties Athenis usum exortavit, cum in contumacia posita per se Mar-Dicæ folis ex agro in urbem profectus rudis homo ab Euripide eam humiliter Poëtæ supplicans peteret, dicens:

Non erat enim omnes vulgare & vile oryx, meminerantque Poëtæ illius matrem quondam in urbem

venientem vendito eo olere filium in summa paupertate educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad virtutem in angusta re studium admittentes toris subfelliis auditio vericulo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, vulgare & sponte sua nascens, locis plerumque incultis olus, plebis cibis & quotidianum pulmentum, & acetarium quo ad sanitatem magis, quàm quæsitis toto mari & orbe obsoniis proficerent. Sed quod utilissimum in ea est, urinam cit & renes egregie laxat, id quod veteres Græci testati sunt, utiturque ad eas difficultates sæpissimè Agineta, jubetque in primo si non iuste quotidie purgetur aliquis Scandice, Apio, Asparago, similibusque aliis sollicitandam esse urinam. Plin. l. 22. cap. ejusdem numeri, inquit Marcellus, multis Scandicem profequitur, peculiariemque illi laudem tribuit, quod venere fatigato corpori succurrit, marcescentisque senio jam coctis excitat. Quo magis mirum in tanta morum ruina & labe in nullo honore esse herbam, neque ab herbariis nostris penitus cognosci. Græci nunc etiam Scandicem appellant, nihilque in eorum gente notius, sed non congruentem antiquorum notis ostendunt. Quam enim illi Scandicem modò appellant, latiori & quasi Betæ folio est. Antiquiores autem, ut in re nota, nullas ejus certas notas traderunt. Veruntamen ut ex multis conicere licet, tenui & quasi capillato folio Plinius esse prodidit. Conjunxit enim, ut verisimile est, congeneres plantas (Scandicem, Caulium & Tragopogon) in foliorum figura, quæ tenui folio, & capillaceo sunt. Et hanc ob causam non abs re penitus fuerit similem in foliorum figura illis credere.

De Scandice hæc posteritati reliquit scripta Hermol. coroll. 371. Scandix olus est sylvestre Plauto quoque dictum. Eademque erat, ut Theophrastus ait, Enthussicon: sive ut A. henzus & Plinius Anthriscum, si tenuiora folia odoratorique haberet. Differt Scandix à Sandice, quod Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliter non describitur, quàm quod olus est sylvestre, gustu acri subamaroque, foliis Anthrisci, sed majoribus & minus odoratis. In exemplari græco Dioscoridis apicetam vidi Scandicem Fœniculi folio ferè cum corniculis, in summo floribus luteis sive albis. Hæc ipsa specie in silvis quoque visitur, frutice odorato, flore candido. Paulus, Aëtius, & si rectè memini, inquit Barbarus, Galenus, similem Gingidio fecere Scandicem.

Sin autem inter Scandicem & Gingidium similitudo est, velut Galenus dixit, & Gingidium Pastinacæ sylvestris simile est, velut Dioscorides affirmavit: sequitur etiam Scandicem Pastinacæ similem esse, & nostrum olus Bersel dictum, inquit Cornarius, referre: atque sic tres herbas inter se similes esse, nec Galenum à Dioscoride dissentire.

Quænam hodie Scandix sit, lis est inter autores. Est enim Scandix quibusdam, herba ex quàm plurimis apicibus coagmentata.

Scandix multis est, quod Pecten veneris cum quàm plurimis inscripsimus.

Alia est Scandix semine rostrato, quod Pecten veneris paucioribus rostris appellamus.

Scandix Creuca C. Bauhino, Pecten veneris Creticum cognominatur.

Scandicem Creuicæ similem ejusdem C. Bauhini dicimus Pecten Veneris tenuissimis foliis, Anthriscum Plinij.

Scandix Turnero, est Lappula canaria dicta, flore majore.

Scandix dicitur quibusdam de Gingidio Matthioli, quàm Vitisnagm credimus.

An Percheper Anglorum sit Scandix quærit Lobelin Obf. p. 419.

Pandectarius (authore Cronemburg. de comp. med. in diafetyrio) insigni errore Raphanum à Galeno 8. simpl. Scandicem appellari ait.

Hermannus Comes à Nevenare Ifatidem Scandice, licet falsò vocari prodit.

Tragopogon etiam Scandix à Plinio vocatur, nisi, quod suspicatur Hermol. coroll. 376. depravata existat apud Plinium lectio.

Differt tandem Scandix à Sandice, quod Scandix herba est, Sandix metallica.

SCANDIX QVIBVS DAM, VMBELLÀ ex quàm plurimis apicibus coagmentata.



Radice est Pastinacæ sylvestris similis, amarâ & subacri, eodem ferè sapore, qui & in radice Smyrni, sive Pastroschini Macedonici deprehenditur: foliis Pastinacæ sylvestris latioribus, ad Apii folium magis accedentibus, cascadiis, minime hirtis, è caule per intervalla sic prodeuntibus, ut in corticosam membranam delatatum prope caulem folium alterum intra se coarctat, & foras protrudat: caule striato, cubitali: flore in umbella candido, non Fœniculi modo & aliarum id genus plantarum, quæ umbellam gerunt, pediculis rotatim constructa, sed quàm plurimis apicibus ex candido herbaceis velut coagmentata, peculiari quadam compositione, in nullis aliis perspecta. Hæcenus Lugdunensis, qui herbam hæc depictam & descriptam Scandicem vocat p. 712. Bauh. phyt. & pin. Scandix umbella ex apicibus coagmentata.

PECTEN VENERIS.



Pecten veneris vulgaris ex radice exigua, interdum culta ferè minimi digiti crassitudine, dulci sapore prædita, caules producit ternos, dodrantaes, hirsutos, iuxta terram rubentes, superius virentes striisque ut plurimum rubris, distinctos, in ramos divisos; folia longis ferè pediculis appensa, Coriandri divisa tenui, sapore subdulci, subacri & nonnihil nausæoto; Dodonzo folia tenuiora, quàm luteæ

radicis Pastinacæ, latiora verò crebriusque dissecta, nigriora item, minusque odorata quam Chærefolii; flores umbellatim positi colore albo, ad Myrthidis flores quàm proximè accedentes, nisi quòd incisimimè sunt, ut illi, pediculisque longioribus ceu corniculis, quod siliquæ est rudimentum, insident; ad parvæ umbellæ basim quina folia caulem latissimis pediculis amplectuntur, quæ postea minutim, reliquorum instar, dividuntur; semen longum in mucronem extenuatum rostellis, aut citius, ut inquit Dodonæus, crassis magnisque acubus similibus nostra matura semine dissiliunt in duas partes, manente in medio membranâ tenui, albâ, simili quodammodo acui Tritici aut Hordei.

Ang. negat Scandicem esse.

Scandix est Dodon.

Non desunt, inquit Anguill. epist. 7. qui velint plantam, quæ dicitur Pecten veneris esse Scandicem: sed deficientibus facultatibus, nescio quomodo possit defendi illorum opinio.

Scandix quidem creditur à Dodon. tam gall. quàm lat. in folio. Inscriptum autem in hist. gall. Scandix, appellaturque & Herba scanaria, Acus pastoris, aut Acula, à semine acum referente, idè quæ gall. cè *Aiguille de berger* appellatur, belg. *Vlaelde Berpel* His additur in fol. lat. Scandicem Latini appellant à Græcis mutato nomine. Inter nothas autem voces reperitur Romanos Scanariam herbam & Aculam; ob rationem d. tam, aptè vocare. Ruellius hanc sub Pectinis Veneris nomine describit: apud Hispanos alicubi in forum venalis infertur, ac editur: *Quixones* vocant: Angli *Pintfe nelde* & *Etorfees* byll appellant. Hæc est, inquit Plin. l. 22. c. 22. quam Aristophanes Euripidi Poëtæ objicit joculariter: matrem ejus ne olus quidem legitimum vendidisse olim. sed Scandicem. Hec ille qui iconem habet, hoc titulo: Scandix, Pecten Veneris.

Pecten Veneris, Lob.

De Pectine Veneris hæc scribit Lobel. adv. p. 324. Si quid con-jedetur capari potest, cujusmodi planta fuerit Scandix, id sanè ex capitum consequentione [apud Dioscoridem] stirpiumque cognatione accipiendum videtur. Descriptio enim non tam ambigua, quàm nulla est. Hæc tria [*Gingidium*, *Cereseolum*, & *Scandix*] serie recensita olera sylvestria; vix dum innotuere ulli, propterea quia incertis & paucis, partim etiam nullis verbis designata sunt. Nam

Fumaris.

Pecten veneris, Fumariam gustu, foliis & usu representat: vulgus Pharmacopæorum etiam Veneris putat & viurpat. Acrimoniæ verò & amaroris ejusdem momenti sunt argumenta, qualia sunt Galeni de Fumariæ acrimonia: quam sententiam mentò docti viri vellicant, & ipsa re clamat res. Hæc ille, qui Scandicem vocat, & rursus titulo de Myrthide, Scandicem vulgarem oleraceam, ac Myrthidem Plinianam suspicari aliquem merito posse dicit. In Obs. p. 419. (ubi dubitatur an sit Scandix) itèrque in Icon. p. 726. appellat Veneris pecten Plinij.

Myrthide forte Pliniana.

Scandix Hermolaus, Bæth.

Matthiolum existimat Hermolaus per suam Scandicem Pecten veneris intelligere, quod admodum difficile est credere. Nos equidem Scandicem Hermolai ignoramus, ejusque descriptionem arte posuimus. Matthioli autem verba hæc sunt. Quamquam Scandix antiquis fuerit stirps notissima: cum tamen hæcenus eorum repertum neminem, cui fides sit adhibenda, qui Scandicem notis aliquibus, vel lineamentis descripsit, nesciverim perfectò quoniam pacto, quæve ratione affirmare possit & in Italia Scandicem nasci, & pariter dignosci à compluribus. Ceterum scribit Hermolaus se v. disse Scandicem in exemplari graeco Dioscoridis appictam foliis Fœniculo proximis &c. Hanc ipsi ego quoque sæpè vidi, mihi tamen magis Fumariam & quadantenus An-

Antem.

themidem referre videtur, quàm Fœniculum. Flores gerit Chærefolio proximis, albicantesque, è quibus tandem prod. unt cornicula tenuia, longiuscula, recta, acuminata, acubus, quæ in Geranio emicant, non dissimilia, quemadmodum & in Chærefolio videntur, licet huic longè tenuiora, & fragiliora innascentur. Quo fit ut rectè intuentibus specie tantùm, non autem genere differre hæc plantæ haud dubiè appareant: id quod etiam indicat eorum sapor. Quapropter in eorum sanè item sententiam, si hæc, quam Scandicem putant, tantum acrimoniæ & amaroris gustantibus relinquere, quantum in Scandice veteres inveniunt prodiderunt. Verùm cum eas non obscuras quidem qualitates, quæ veteres veræ Scandici assignant, in hac, ut ita dicam, nova Scandice nunquam ego repererim, cogor omninò eorum sententiæ refragari, & ab ipsis dissentire. Quapropter nisi regionis & climatis ratione, & locorum mutatione eveniat, ut hæc stirps omnem tum acrimoniam, tum amarorem exuerit, non facile quidem adduci potero, ut credam hanc esse Scandicem. Neque ab hac mea me deterret opinione Hermolaus, quòd viderit is Scandicem hanc in græco Dioscoridis codice appictam: quippe quum inter omnes rei herbariæ scriptores nullus, quod equidem sciam, reperitur, qui per notas aliquas Scandicem descripserit, nesciverim ego quamam historiâ, & ratione factus aliquis unquam illam picturâ expresserit: nisi fortasse Dioscorides ipse manu propriâ eo in libro ipsam appixerit. Plinius Scandicem Anthiscio similem reddidit. Sed cum ignotum per ignotius descripsit, nihil nobis luminis his in tenebris affert. Sed ex Galeni verbis de Scandice, etiam manifestè colligere licet, plantam quam pro Scandice accepit Hermolaus, quàmque pro eadem plerique recentium hodie assentiant, r. ill. pacto legitimum esse Scandicem. Quandoquidem ea non tantam acrimoniam, nec amaritudinem gustui representat, ut dici possit primum calidè tatis & siccitatis gradum excidere, id quod Galenus de Scandice prodidit. Ceterum, si nulla est planta, cui hæc comparari possit, eam ad amissum mihi quidem referre videtur, quum (apud Plin. l. 24. c. 19. à p. 319. um similitudine) Veneris pecten appellant, cujus radix cum Malva tusa, omnia corpori infixa extrahit. Siquidem hæc radice nititur candida, cauliculis semipede majoribus: foliis sylvestris Pastinacæ, vel fortè Anthewidis, exilibus: floribus albis, tenuibus, emicantibus, summum ab eodem capitello compluribus, acum natis rostellis, inter se disjunctis, quæ pectines planè refrunt, quibus linum mulieres continent. Quæ certè omnia reperiuntur in hac vulgari Scandice. Hæc Matthiol. qui Pecten veneris inscribit, ac in epit. germ. wild Mören: in hist. verò *Reichelsam* appellat. Testatur Camer. ad hist. Matthioli germ. Pecten veneris Italos vocare adhuc Aciculam hodierno die, quo nomine veteres Scandicem vocarint, ita ut non planè cum Matthiolo sit negandum esse Scandicem. In hort. Scandicem vocat & Pecten veneris, quo nomine & Cast. appellat. Læd. Pecten veneris, Scandicem quorundam. Gal. l. 1. Pecten veneris five Scandicem: l. 1. c. 1. Scandix elus sylvestre, quod imprudenter inter Dauci genera officinas referre prudenter notat. vocat germ. wild *Börle frau*, gall. *Cerfenile sauvage*. Læd. Scandicem, Scanariam & Aculam quorundam. Clus hist. Pecten veneris vulgi, si ve Scandicem sylvestrem. Tab. Scandicem, Her-

ban

ham Scandiam; Videlſorff / Venus Strell.
Bell. in epist. ad Clusium ait Pectini veneris vul-
gari non convenire vires à Plinio tributas Antrisco.
Nam Pecten veneris neque odoratum esse, neque
ab ullo comedi: vocari autem *ἀνθρίσκου*. Scandice-
m verò legitimam dici *κατὰ φύσιν* & *οὐκ ἀνθρίσκου*, quæ
comedatur quidem, sed ipsa neque venerem exci-
tet, neque fatigato venere corpori succurrat. unde
appareat error Andreæ Tiracelli comm. in legem
con nubialem, qui Scandici hoc tribuit, quod Pli-
nius Antrisci peculiare esse scripserat. Hæc Bel-
lus, qui Scandicem à Dodonæo affabrè pingi testa-
tur. Eum autem non intelligimus dum scribit Pe-
cten veneris à nemine comedi: contrarium affe-
rente Dodonæo: nec scio quam plantam intelligat
Bellus per Scandicem legitimam, & per Scandicem
à Dodonæo, affabrè pictam: is enim pro Scandice
nihil aliud pingit, quam Pecten veneris.

Scandicem vulgò Aciculam ab Italis dici refert
Cæsalpinus; frequentem in agris inter segetes, fru-
ticolam foliis minutissimè scissis, ut Chamæmeli: in
acuminibus esse flosculos candidos, longis veluti
filis insidentes, similitudine acutis: in his detracto
putamine semen contineri nigrum, & oblongum,
gustu non insuave, ut neque folia. Dioscoridem
de Scandice dicere esse olas silvestre, &c. Galenum
eadem consummare, conjungentem cum Gingidio,
sed plantam neminem describere. tantum reperiri
apud Theophrastum Scandicis mentionem inter
eas plantas, quarum caules humi procumbunt:
quo in loco non *ἐπὶ τοῖς καυλαῖς*, i.e. anni caulia legen-
dum putat; sed *ἐπὶ τῶν καυλῶν*, i.e. humicaulia, ut op-
ponatur eis, quæ dixerit recticaulia & nervicaulia.
Plinium Scandicem inter olera silvestria recensere
& vilia. Aristophanem objicere Euripidi matrem
Scandicem vendidisse non olus legitimum, Anthri-
sco similem esse. Hermolam apiccam vidisse
Scandicem in vetusto codice Dioscoridis, folio ferè
Feniculi, &c. hæc ipsa species in silvis reperiri: fru-
tice odorato: flore candido. Ex his significari plan-
tam Scandicem [Pecten veneris] nam & inter anti-
qua nomina apud Dioscoridem Aciculam appel-
latam esse à similitudine acutis. Hæc Cæsalpinus,
qui Pecten veneris Scandicem antiquorum esse re-
tur, sed non absque errore.

Bauh. pin. Scandix 2. semine rostrato vulgaris:
(an Pecten veneris Plinij inquit in phyt.) Pecten
veneris, Matth. Ang. Geln. h. Adv. Lob. Cast. Lugd.
Cam. & Ger. Scandix, Dodon. Lac. Cord. in Diosc.
Geln. h. Cæf. & Tab. Pecten veneris, *ἀνθρίσκου*
vulgò dicta, Hon. Belli ep. ad Clus. Apud Matth.
Scandix 1. semine rostrato vulgaris: 1. Pecten vene-
ris. Scribitur in fine verborum Matthioli C. Bauhi-
ni Scandicem appellari It. Scandice: Pecten veneris.
Ital. *Pectine de venere*, Germ. *wild Möhren*. Sed po-
strema hæc nomina non invenio in meis exempla-
ribus Matthioli.

Pecten veneris, quod Plinij non negarim, pro-
venit circa Monspelium passim in segetibus, florens
menſe Martio, & Aprilis filiquas ferens, quotannis
ex semine deciuo sese propagans. Observavi hoc
Montbelgardi in agris prope vineas la Chau, in
horto E. C. Patavij, Veronæ in Cænobio di S. Io-
anne del monte, passim circa Tigurum in vineis,
Tubingæ, Elſingæ, & Genevæ in agris Februarij
menſis principio, menſe Maio cum siliquis. Basileæ
in segetibus prope S. Jacobum collegit C. Bauhinus.
Pona in monte Baldo; Dodonæus in arvis pingui-
latiſque Solo, & non raro inter ipsas segetes, non
modo in Italia, verum & in Belgio, Maio & Junio
menſibus præcipue vigens.

Pectinis veneris radix cum Malva tusa omnia
corporis infixa extrahit, id quod ipsa natura ostendit.

Tom. III.

disse creditur in acubus seminum. Eadem cum her-
ba & floribus in patella calefacta ex vino albo me-
raco & butyro una cum hortensis Petroselinii foliis,
pubique adhibita, remorantem urinam, pueris præ-
sertim provocat, auctore Matthiolo. Quidam an-
tequâ floreat, & tenera est, cum butyro & oleo, &c.

PECTEN VENERIS TENVISSIME
dissectis foliis, Antriscus Ca-
labona.



EX radice tenui, Desf.
parum fibrosa,
caulis unus, vel
plures, tenuis exit:
folia ad radicem ex
longiusculo pedi-
culo tenuissima,
Mei ferè divisura,
quæ per caules pe-
diculi sui vagina
eos complectun-
tur: indidemque a-
pici seorsum pediculi
prodeunt dudum,
triūmve usciarum,
quorum extremis
hærent in minima
umbella flosculi,
qui post se radiata
relinquunt corni-
cula, Pectinis vene-
ris, uncia circi-

terlonga, at breviora & tenuiora quam in illa, qui-
na plerumque ubi parvæ plantæ, ubi majores, plu-
ra. Hæc, ni multum fallor, Montbelgardi plu-
rimū degeneravit, & excrevit in caules cubitales,
crassos, ramosos, in quibus rostra sive cornicula
plura non minora, imò majora, quam in Pectine
veneris vulgari, se in latera incurvantia, menſe Au-
gusto pene matura. Primum autem semina acce-
pimus ex Stutgardiano horto E. C. V. Virtemb. quo
missa fuerunt per insignem hortulanum Magni Du-
cis Calabonam, titulo Antrisci Plinij Candix. An-
no sequenti 1595. cum essemus Heidelbergæ siccam
plantam dedit D. Sprengerus valde parvam, uncia-
rum circiter sex, eodem quo Calabona, titulo. An-
no verò 1598. pro Scandice Cretica pulchram plan-
tam multò majorem, pedalem ferè accepi Basileæ à
D. Richnero: similem nobis dedit anno 1599. frater
C. Bauhin. sed minorem nomine Antrisci ex Creta
transmissi.

De hoc Pectine veneris, sive Antrisco Calabonæ
agit Honor. Bellus in epist. ad Clusium, his verbis. *Anthriscus*
Anthriscus herba similima Scandici legitimæ [Pecti-
ni veneris] est, folia ferens tenuiora, circiter divisa,
odoratiora multò; cauliculi ejus dodrantales, flo-
res in umbellis albi, semina longa, sed minora quam
Scandicis: tota planta suavissimi gustus est: prove-
nit lætis collibus, locis siccis, & inter saxa: mandi-
tur in acetariis Vere, & maximè appetitur. Vene-
rem mirum in modum excitat & adjuvat, ideo *πτε-
ρηνισθῆναι* nomine obsceno vulgò vocatur, quod
vulvæ purgamentum significat. Meminit Antri-
sci Plinius l. 22. cap. 22. his verbis. Eadem erat An-
triscus, si tenuiora folia & odoratiora haberet, &c.
quæ quidem verba corrupta sunt & hoc modo le-
genda: Eadem erat Anthriscus, nisi tenuiora folia
& odoratiora haberet. Nam si legatur *si*, & non *Plinium cor-
ruptum*, Anthriscus esset Pecten veneris vulgaris, cui
non conveniunt vires à Plinio tribuæ Anthri-
sco.

Anthriscus Clusius etiam hanc intelligit, cum ait. A nullo recentiorum haecenus descriptam arbitror Anthriscum Plinij historiam, quae nata Lugduni Batavorum in Academico horto anno 1595. femine è Cretæ Cydonia ad me misso à docto viro Honor. Bello, ejus urbis Medico. Dodrantalis est planta, statum à radice tenui, longâ, albâ, paucis fibris donatâ, multa folia in multitudine, tenuisque alas divisa proferens, parè instar foliorum Scandicis, non in jucundi, si terantur, odoris, neque, si gustentur, saporis, qualis ferè Chæresolij vulgaris, inter quæ breves prodeunt cauliculi, quadam tenui lanugine præditi, qui in breves, vinctes, gracilesque ramulos dividuntur, sustinentes umbellulas, quatuor, quinque, aut sex flosculorum, quinque foliolis albis præditarum, in quorum medio exile quidpiam ex purpura nigricans: flosculis succedunt, seu veriùs flosculi sustinentur, à stilibus quibusdam gracilibus, qui paulatim in uncialem longitudinem succrescentes, formam referunt thecarum feminis Pectinis Veneris vulgò vocatæ plantæ, sive Scandicis silvestris. Flores & semen, sed immaturum protulit Junio.

Syn. C. B.

Bauh. phyt. Scandix 5. sive Creticæ similis: Ex radice gracili, oblonga, candida, caulem palmarem, tenuem, angulosum, hirsutum potissimum parte infernâ emittens, foliis Scandicis vulgaris, sed tenuioribus, flore pusillo albo in exiguis umbellis, cui succedit semen oblongum ut in Cretico Pectine veneris, sed brevius & paucius etiam in apice bipartitum, subhirsutum. Hanc Casabona Antiscum Plinij vocat. Huic figura Apij silvestris Dalechampi apud Lugd. p. 700. per omnia conveniret, si semen responderet, & caules hirsuti mentionem faceret. Eid. B. pin. Scandix 4. Cretica minor: quæ 3. & 5. in phyt. at. 2. in prodr. Anthriscus Plinij, Clus. hist. Anthriscus vulgò *scandix*, quod vulgè purgamentum significat, cum venerem excitet, Belliep. 1. ad Clus. an Scandix legitima quæ *scandix* & *scandix*, quæ comeditur, Eid. lib. 1. Anisomarathrum Apulum, Colum. & Clus. hist. ap. alt. an Apium silv. Dalech. Lugd. Duplex est odora & inodora.

PECTEN VENERIS FOLIO TENUIORI, paucioribus rostris.

Def.

Hæc palmaris est, radice parvâ, albâ, fibrosâ, hex qua cauliculi terni, quaternique procumbentes prodeunt, circa quos folia Scandicis vulgaris similia, sed tenuiora: umbellæ minores, floribus succedunt semina oblonga acubus similia, non tot ut in Pectine veneris vulgaris, ubi communiter octo observantur, sed bina, terna, quaternave, & illa hæc longitudine media superant.

Hanc vocat Bauh. phyt. descriptionis auctor Scandicem 3. sive femine rostrato Italicam. Apud Matthioli. Scandicem 2. Italicam. Miror ego tantam hirsutiam à fratre appingi siliquis & nullam ejus fieri mentionem in descriptione. Eam missam ait per Doldum Norimbergæ, cujus semen Neapoli



Synon.

missum fuerit. Hanc C. Bauh. eandem facit in pin. cum præcedenti: an bene considerent alij.

PECTEN VENERIS CRETICUM.



Folia hujus inferiora subrotunda, per oras sunt oblique dissecta, Saxifragæ minoris Lobelii similia, sed nigriora leviter hirsuta, superiora verò formâ Scandicis vulgaris dissecta. Caulis cubitalis, angulosus, striatus, subhirsutus: umbellâ parvâ sparsâ floribus albis, at latioribus, quàm in vulgari foliis, quibus succedit semen rostratum, decem, duodecim & pluribus rostris simul junctis: cuilibet rostro apices duo quasi aculei rigidi præfiguntur, quod & in Chæresolio observare est.

Parav. à Doctore Zvingero accepta.

Bauh. description est in phyt. Scandix 4. sive Cretica. apud Matth. Scandix 3. Cretica. Minor autem cum pilorum in siliquis non meminisse in descriptione. Eid. B. pin. Scandix 3. Cretica major: quæ 4. in phyt. 2. in prodr.

PERCHEPIER ANGLORVM quibusdam.



Plantula est plurimum biuncialis aut triuncialis, paucis culmulis. Est, quod numerosa colicorum palmarum luxuriat, quos ex geniculis crebris ad summum usque foliola stipant subrotunda, tripartita ferè, profundè laciniosa, ad Geranei columbini folia quadantenus accedentia, licet minora, hirsutaque, inferiora quidem pediculis donata, superiora perbrevis aut

nullo. Inter quæ flosculi delitescunt exigui, herbidi, ac nisi rectius intuearis, vix conspicui. Radicula nigra, cava, flexilis, tenax atque dura, in fibras oblongas terminatur.

Tabern. vocat Scandicem minorem / Klein nadel Bœffel / Klein nadel Möhren / quæ nomina germanica non conveniunt. nulla enim in hac herba acus observatur. C. Bauhin. in append. phyt. Scandix 6. sive minor Saxifragæ (quia

(quia vehementer & repēte urinas movet) dicitur. Eid. pin. Chærophyllos s. five Chærophyllo nonnihil similis: Percepier (i.e. Saxifraga) Anglorum; Scandix minor, Tab. Alchimilla montana minima, Col. Lob. adv. p. 324. Percepier Anglorum, quo nomine inscribitur etiam in Icon. p. 727. & Obs. p. 419. ubi dubitatur an sit Scandix. De hac autē adv. Qui Percepier Anglicum probè perspectum habent, harum duarum stirpium utrius [Cerefolio & Scandici] simile esse sciunt, & neutquam isdem viribus secundum; amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causā olere manditur: Figura ei Cerefolij nuper nati proxima; sed herbula semper est, nusquam spithamæo adুক্তior, toto anno suapte sponte erumpit, arido & trito Solo luxuriat, sine caule, stolis herbaceis. Hanc plantam propono magis, quā afferto: quia herbariis non valde notam, neque quod sciam descriptam. Figura proposita à Lobelio vix demonstrat similitudinem cum Cerefolio: appicū etiam caulis, quem ei negat. Considerandum an intellexerit fortè plantam diversā à sua figura & nostra.

Lugd. p. 793. intitulat Percepier Anglorum quibusdam. Pona in Baldo Percepier Anglorum Penz.

Arvis agrisque suapte sponte primo Vere prorumpit, ut etiam in agris Montbelgardi. Circa Patavium inter fegetes observavit quoque H. Cherlerus.

Neutquam Cerefolio viribus est secundum. Amaro etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causā olere manditur. Vehementer & repente urinas ciet. mutiā conditum servatur: & ex ea aqua stillatitia magno usu elicitur. Angliæ Britoia frequentissimo apud mulierculas usu recepta est.

CHÆREPHYLLON.

CAP. XXXIV.

Vidè appellat Chæresoli herbam, radice nitentem albā, minimi digiti crassitudine, sapore ferè Pastinacæ: cujus folia Apij hortensis foliis similia, non ita longa, argutiùs divisa, aversā parte hirsuta, nonnihil subinde rubentia, sapore aromatico, pediculis sæpè rubentibus, nonnihil hirsutis: caules plures ab eadem radice exsurgunt, ramosi, concavi, striati: in

quorum extremis, ut & ramulorum, flores in umbella rara, parvi, albi, quinque foliolis cordatis toudēmque staminibus albidis constantes: semine oblongum, tenue, sapore dulci & aromatico.

Tom. III.

Quæ vulgò Chærophyllos vocatur, Ruellius Gingidium appellat. Hunc sequitur Fuchs. Gest. *Gingidiū*. in catal. pl. & C. Bauh. quin phyt. *Gingidium* s. vocat, & Chærophyllos Columellæ. An autem Plinij Cerefolium sit, propter brevitatē asserere non vult. Ipsi potius videtur Anthriscus ejusdem, *Anthriscus*. & fortè *epithymus*, quod Enthuscum vertit Gaza, *Enthuscum*. Theophrasti.

Quum juxta Dioscoridem & Plinium, *Scha-Gingidiū*, phyllo sive Pastinacæ silvestri simile sit *Gingidiū*: & nullum apud nos olus Pastinacæ similis sit, quā quod vulgò *Kerfel* & *Kerfelkraut* vocant: mihi quidem verisimile sit, inquit Cornarius, hoc ipsum olus *Gingidium* esse. Quanquam ipsa appellatio Chærophyllos referre, & ex ipso corruptum esse videatur. Recenset autem & Chærophyllos inter folia Plinius l. 19. c. 8. his verbis. Rufus alio comitatu, *Aequinoctio* Autumni feritur Chærophyllos, quod *Pæderota* Græci vocant. Nam verba quæ sequuntur ad Sinapi pertinent. Meminit & Chærophyllos in carmine Columella l. 10. Iam breve Chærophyllos inquit, circa Calendas Octobris obrui oportet non frigidissimo loco. Habet & Palladius l. 3. c. 24. Nunc (in *Februario*) Cerefolium locis frigidis post Idus seratur. desiderat agrum lætum, humidum, stercoreatum. Fieri igitur potuit, ut hi Chærophyllos appellarent, id quod Dioscorides & Galenus & Medici Græci *Gingidium* dixerunt, ita ut hi Syrorum voce usi sint, illi Græca: & quamquam Palladius ex græca & latina particula compositam vocem usurpet. Sed hæc quidem ex conjectura dico. Quodd verò nostrum olus *Kerfel* dicitur, referat appellatione Chærophyllos, negari non potest. Quodd autem *Gingidio* illud simile sit, aspectus indicat Pastinacæ penitus referens. Obstat tamen Plinius, qui diversis locis, tanquam de diversis, de *Gingidio* & Chærophyllo tradidit. Attamen nec hoc infrequens apud ipsum est, ut de eadem re, diversis locis & nominibus agat. Ceterum, quod Galenus & Paulus Scandici simile *Gingidium* dicunt, id ita accipiendum videtur, velut *Gingidium* proprium Syrorum fuerit, cujus similitudinem in Asia ac Græcia Scandix habuerit. Hoc enim verba ipsa Galeni declarant: *πλεῖστον ἐν οὐρίᾳ τῷ γινγιδίῳ εὐδαίμων καὶ ἰσθμὸς ἀνακατα, παραλλήλῳ τῷ παρῳρίῳ scandici*.

Possit itaque etiam ipsa Scandix, nostrum Chærophyllos esse, ut id quod Syris est *Gingidium*, Asianis & Græcis Scandix, Latinis Chærophyllos & Chæresolium, Germani Latinos æmulat *Kerfel* dixerint. Profectò Dioscorides etiam Scandicem, velut simile olus, mox post *Gingidium* posuit, non tamen velut Galenus, similitudinem expressè dixit, sed eundem usum ipsi attribuit. Hæc Cornarius, qui Chærophyllos *Gingidium* aut etiam Scandicem esse frustra conjectatur.

Hujusce sententiæ esse comperiuntur Ruellius & Fuchsius (licet non planè ad stipuletur) *Gingidium* nec non etiam recentiorum alij in hoc consentiunt, quodd *Gingidium* ea sit planta, quam nos (Itali, inquit Marth.) vulgò *Cerefolio*, illi verò Chæresolium. Veruntamen cum hæc radice nitatur, quæ nihil amara sentitur, sed potius acris & odorata, quemadmodum & folia; idcirco eorum opinionem non equidem (ut dicam quod sentio) probandam putaverim. Sed ex Galeni verbis de *Gingidio* facile comprobari potest, Chæresolium non esse *Gingidium*, quod in ipso Chæresolium ex amaroris & adstrictionis qualitates,

quas Gingidio Galenus adscribit gustu haud manifesteprehendantur. Idem in post. comm. addit. Non potui unquam eorum subscribere opinionibus qui plantam *Cerefolio* vulgò vocatam Gingidium esse censent. Plinii Chærephyllon, quod Pederota Græci vocant, acerinum sapore, ignei effectus, saluberrimum corpori, nostrum esse non potest, quòd tam vehementi acredine non sit præditum. In epit. cum addit. Camer. non deesse scribit, qui vulgare *Cerefolium* Myrrhidem faciant. Verum, cum caulis Cicuta non sit, nec radices usus: sed foliorum: iis profectò subscribendum non esse. Hæc Matthiolus qui sua ex Hermolao accepit, licet ejus non recordetur. Myrrhidem (inquit Coroll 730:) sunt qui per Chærephyllon modo nominatum, in hortis passim nascens, intelligant. Plinius (cujus verba postrema de Sinapi dicta videri possunt, de quo statim idem loquitur) Chærefolium aliud videtur accepisse. Et certè quæ à Plinio dicuntur de saporis acrimonia, non debent quæquam in eam pertrahere opinionem, ut ipsis fidem habeat. Plinii Chærefolium diversum esse, Plinii verba legenti apparebit.

Myrrhis
non est.

Myrrhis
Herm.

Oreoselinum,
Anguil.

Negat esse
Gingidium
et Oreoselinum
Ded.

Pro Myrrhida
admitti posse
videretur
Trago.

Sifon.

Plinii
Apulei Chærefolium
nuncupatum.

Anguill. Oreoselinon, statuit epit. 7. his verbis: Oreoselinum. e. Apium montanum, nihil aliud est, quàm commune *Cerfolio*, quod quidam Gingidium putant, quod non verum. Theophrastus & Plinius dicunt habere folia Cicuta. Nunc adhuc in Græcia Apii species existimatur, & in quibusdam locis dicitur *epithasuron*, i.e. Apium montanum.

Dodon. gall. & lat. in fol. figuram habet Fuchsi, quæ est in Iconibus. Negat esse Gingidium, ut plerique visum fuit. haud amarum siquidem sit, sed grato jucundoque sapore commendetur. Negat quoque & merito Oreoselinon esse; hortense siquidem sit, non montanum; semen etiam non acre, aut Cumino gustu simile, veluti Oreoselini esse scribatur. Plinii locum de Chærefolio admodum corruptum esse ex Cornario monet, qui & Macro imponere potuerit.

De Chærefolio hæc scribit Tragus. In initiis Petroselinoprope simile est, sed tenuius, pluribusque incisus dissectum, ut eo nomine cum Cicuta majorem affinitatem contraxisse videatur. Sin autem Chærefolium Apii genus fuerit, quemadmodum Constantinus & alii multi opinantur, jure equidem post Apia proximum locum occupavit. Quod in Dioscoride habeat nomen, non satis constat, ut sunt varie de eare autorum sententia. Ego certè propemodum mihi persuaseram Chærefolium esse Oreoselinon, seu montanum Apium, sed non prorsus cum herba ipsa cõvenit historia. Extant autem duo alia apud Dioscoridem capita, quæ satis Chærefolio quadrare videntur, nimirum caput de Silone, seu ut vocavit Hippocrates, Sinnone. Et alterum de Myrrhida, quod Brunfels ad Chærefolium retulit, quòd mihi nequaquam improbat. Nam Chærefolium hoc sativum odoratum est. foliis: per omnia excepto odore & sapore Cicuta similitum. De hoc autem non faciliè contenderim, tamen enim, quod ad odorem, formamque attinet herbæ, descriptio Myrrhidis satis respondeat, tamen radice, quam habet breviusculam Chærefolium ab eadem Myrrhida discrepat. Sed uti aliàs semper inculco, sentiat quisque quod vult, nemini enim erroris causam præbere volo, meam duntaxat indicans sententiam. Columella Chærephyllon appellavit.

Plinius & Apulejus longè aliud describunt Chærefolium. Apulejus namque Chærefolium suum Bootes, Bootis, Arcetophyllon, & Pederon nuncupat. Sed & Plinius Pederota nominari scribit. Gesf. in cat. Gingidium Dioscoridis esse statuit, quæ sententia utique probanda videtur assentiente

Ruellio. Hæc Tragus, apud quem in margine notatum à quopiam, Chærefolium Apulei esse Acatham Dioscoridis, quæ Pederotis dicatur, Plinium l. 17. c. 6. & 9. Pederotas dicere gemmas esse, sed nihil Chærefolium cum gemmis esse commune.

Toxites in Onom. philosoph. Harchius in Enchir. Hadrian. & Helisticus in Nomencl. itémque C. Bauh. alique nonnulli, Anthriscum eandem herbam putant, cum ea quam Chærephyllum Columella dixit. Quidam, inquit Lugd. l. 6. c. 48. pertinentiis contendunt Anthriscum Plinii esse Chærephyllum nostrum. Idem Lugdunensis Chærephyllum Plinii à Cerefolio nostro planè diversum dicit, sed cur, rationem non assignat.

Hoc & Plinii Cerefolium idem esse conjicit Cæsalpinus, quâ ratione non docet. Cerefolium, inquit, vulgò appellatur à recentioribus inter Apia cõnumeratam: peregrinum est apud nos: scribitur in Gallia pro oleris: Plinius cum nullas Chærephyllonatas tradat, non licet nisi ex nomine conjectari hæc esse, quæ in hunc usque diem Cerefolium vocatur, puto apud Dioscoridem Oreoselinon esse. itémque Theophrasti (apud quem Theod. Montapium vocat) ac Plinii, qui eadem recenset ex Theophrasto, & Galeni.

Ceterum, Chærefolium dicitur Brunfels. Dod. lat. in fol. Chærefolium Trago, quod sativum cognominat, ut patet. Cerefolium, Matth. Lud. p. 771. Cerefolium, Dod. gall. Lob. Adv. p. 324. Icon. p. 280. Lonic. Tabern. Camer. & Cæsalp. Cerefolium, Gesf. hort. Gingidium, Ruell. Fuchf. Lacunæ & Gesf. in cat. pl. Gingidium 3. & Chærephyllum Columellæ, C. Bauh. Eid. pin. Chærephyllum 1. sativum. Gingidium 5. in phyt. Gingidii species Lob. Obs. p. 419. Oreoselinum Anguillare.

Cærefolium itaque Latinis dicitur, & ut nonnullis placet, Cerefolium per o secundam syllabam. itémque Chærefolium & Chærepholium, Chærephyllum & Chærephyllon (*χαιρεφυλλον*) Nominari autem sic putatur, quòd multum foliis gaudeat: vel potius quòd gaudium ac hilaritatem excitet. Germani Bõrfel-fraut, aut Bõrbelfraut: Belg. Beruel: Galli du Cerefol: Itali Cerefolio: Hisp. segun algunos. Angli Cheruel: Boh. Trebule a nebo Berblif: Hung. Olaz salata, hoc est, Italicum Lactucam vocant.

Passim in hortis colitur: terrâ stercoreatæ & aliquantulum humente lætatur. Vere satum celeriter in caulem effurgit, effusque citò parum idoneum redditur. Sed quod Augusto scribitur per totam insequentem Hiemem ac etiam Ianuario virens, florens mense Aprili & Majo, utile est.

Succus foliorum Chærefolii sicuti & aqua destillata sanguinem ex casu, contusione, aut plagis concretum dissolvit: possit fortassis non sine utilitate ad calculum renum mensisque muliebres ciendos in cibo & potu usurpari. Si quis in discutiendis concretis sanguinis grumis efficaciorē desideret medicinam, is oculis cancerorum & carbones Tiliæ in pulverem redactos in succo aut aqua Chærefolii destillata imbibat, potidè & ad plenitum seu pucturam laterum hocce remedium facit. herba Chærefolii adhuc teneri inter olera mansa stomacho & capiti conducit, ob odorem quem habet gratissimum, Chærefolium tulum ac emplatri modo foris impositum omnes tumores & intra cætē carnemque, casu, contusione, aut quacunque tandem ratione concretos sanguinis grumos discutit, non aliter atque Sigillum, ut vocant, Salomonium: Auctor Tragus: Quibus addit Matthiolus? Calidum primo gradu, medio se habet modo inter humidum & siccū. Cõmentum urinam promovet, & obstructionem solvit. Idem facit decoctum. herba conducit stomacho. vinum in quo coxerit Chærefolium, haustum, utilissimum

utilissimum est vesicæ, menses ciet. ad ichterum, accipe succi Chærefoli cochlearia octo, quibus infund. drachmam triti Myrrubii, & calidè propina diebus aliquot continuis. Cum melle remissus succus & bibitus confortatissimè utque siticus ex decocto hordei cum saccharo sumptus, pleuritidi benefacit. pulvis herbarum cum melle mistus cancerum incrementa capere prohibet. planta integrain aqua decocta, cui admixtum sit acetum, si abluatur eo caput melicerides & lentes curat. Et hæc leguntur in historia germanica. Inlat. inquit. Tota planta dulcis est & odorata, acrisculum quodam accedente sapore, vix ferè sensibili: quò fit, ut aliis oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Estur cruda in acetariis unà cum aliis plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum Beta, aliisque oleribus. Camerario apud Matth. germ. succus est Chærefolii expressus ex iusculo gallinæ aut carniū sumptus torminibus ventris succurrit. in primis verò si in butyro frigatur herba & abdomini superponatur, certum est contra tormina remediū. Chærefolium, inquit inter alia Dodonæus, temperatè excoquit, modicèque desiccatur, multoque minus quàm Apii genera. Flatulentum verò etiam aliquid obtinet, quamobrem & venerem promovet.

MYRRHIS VETERIBVS ET
in genero.

CAP. XXXV.

MYRRHIDEM, quam alii Myrrham, nonnulli Conilam, Romani verò pariter cum Græcis Myrthida appellant, Dioscorides similem esse tradit Cicutæ caulē foliisque radicem verò habere oblongam, teneram, rotundam, odoratam, cibo non insuavem. Hanc potam in vino, phalangiorū morbis auxiliari. Ciere verò menstrua & sceminarum purgationes à puerperio trahere. Eandem decoctam & in sorbitione datā, phthisicis subvenire. Tradere & nonnullos eandem bis in die recte potam & in vino in pestilentia constitutione ita salutarem esse, ut taceat morbi contagia.

Myrrhis (inquit Plinius l. 24. c. 16.) quam alii Smyrrhizam [*alijs Smyrniæ, sam, Dalech.*] alii Myrrham vocant, simillima est Cicutæ, caulē, foliisque & flore, minor tantum & exilior, cibo non insuavis. Ciet menstrua & partus cum vino. Aiunt quoque eandem potam in pestilentia salutarem esse. Subvenit & phthisicis in sorbitione. Aviditatem cibi facit. Phalangiorum morbus restringit. Hucera quoque in facie aut capite succus ejus in aqua triduo maceratur sanat. Hæcille, qui l. 26. c. n. Geranium Myrrhin appellari ait.

Myrrhidi 7. simpl. Galenus has reddit vires. Radicem, inquit, habet odoris jucundi, & dulcem, quæ menses movet, & ea quæ in thorace ac pulmone sunt, expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit excoficientium, ad junctā quadam partium tenuitate. Verissimile autem est à Myrrhæ odore Myrrhida & Myrrham dictam fuisse, inquit Marcellus. Nullus tamen quod invenit; apertè id testatus est in Græcis aut Latinis. Odorata siquidem radice à cunctis describitur, potuitque illi ab ea nota nomen hoc factum fuisse.

Cæterum, quia Cicutæ similem scriptores tradiderunt, idè aliqui Cicutariam eam dici crediderunt.

Myrrhidem dici de Geranio patet ex Plinio, ut copiosius indicabimus H. n. g. lib. 30.

Chærefolium quibudam censetur Myrrhis, verum nota non respondent.

Sunt qui pro Myrrhide Angelicam accipiant, Angelicæ quæ opinio suo loco refutatur.
Ea nobis Myrrhis sive Myrrha vera videtur, quæ semine est magno, longo, sulcato & dulci, de qua jam dicemus.

MYRRHIS MAGNO SEMINE,
longo, sulcato.

MYRRHIS radicem habet insigniter crassam, adnatis plurimis & crassis donatam, album, sapore dulci, subacris, grato, aromatico, qualis est seminis Anisi sapor: caules surrigit aliquot proceros bicubitales, & tricubitales, brachiatos, hirsutos, fistulosos: folia magna, pinnata, Cicutæ foliorum facie, magis albicantia, & albis maculis subinde respersa, tactu mollia, nervis aversâ parte pilosis, sapore

Anisi, pediculis fistulosis: flores in umbella gerit candidos, leviter odoratos, quorum singuli foliis quinque constant bifidis, seu cordatis, eximo intimis duobus oppositis simul utrisque maiore, lateralibus binis medio modo se habentibus bifurcato stilo albo cum staminibus albis medium occupante particularium umbellarum basim sustinet sensu radiorum stella: succo ditè semen notatu dignum, magnum, longum, angulosum, sulcatum, sapore Anisi dulci & jucundo.

Si Myrrhis hæc nota fuit Matthiolo cur nihil de Mattheo tradit præter Dioscoridis descriptionem factam per Ruellium ex Plinio. Gignitur, inquit, in quâ plurimis Italia locis planta quadam Cicutæ faciem repræsentans, minor tamen, minimèque graveolens, Cicutaria vocata, quam quidam legitimam Myrrhin esse censent. Sunt deinde qui pro Myrrhide Angelicam vulgò appellatam accipiant. Alii verò, ut Mattheus, Chærefolium. Cæterum, si Myrrhis in Italia provenit, nulla sanè mihi (Matthiolo) sese obtulit planta, quæ magis Myrrhidi Dioscoridis respondeat, quàm cuiusvis Myrrhidis titulo pinxi. Hæcille, qui imperfectam iconem proponit, quemadmodum & Patrocinator ejus C. Bauhinus. A Camerario in ep. & hist. Myrrhis inscribitur. Lugd. p. 760. dicitur Myrrhis Matthioli.

De hac Myrrhide ait Lobel. adv. p. 327. Odoratam hanc, sive salubrem & esculentam possit quis vocare Cicutam, quam Myrrhidem sive Myrrham propter suaveolentiam, quidam Myrrhæ respicientem dixerunt. Cerefolii nomen apud Germanos ascribit: vocant enim wild Kerul, i. e. silvestre Cerefolium, quod odore, saporisque jucunditate imitatur, etiamque facultatibus diureticis: facie verò est Cicutæ: tenellâ hirsutie Pastinacæ refert: Ferula: ut Pastinacæ esculenta sapore & odorem, sed magis medicatum & ad Smyrnum accedentem repræsentat. Hæc etiam Myrrhis Pliniana videtur, Pliniana.

quam ortâ confusione à Geranio odore, Myrrhideni Romani perperam faciebant: unde quipiam Scandicem vulgarem oleraceam mentò suspicetur, aut illius aliquam speciem. Hæcille, qui in Obs. p. 423. vocat Myrrhidem adverb. p. 327. & Sefeli Peloponenſe Anguillaræ. In Icon. p. 734. Myrrhidem. An verò sit Sefeli Peloponenſe Anguillaræ dubitamus.

Gefn. h. Myrrhis quam aliqui Italicam cognominant; Alii verò Cerifolium hispanicum. Cz. Cicutaria tertia, odore & sapore Fœniculi, indèque Alpinis *Finocchiella* vocata, à Dioſcoride & Plinio Myrrhis. Bauh. phyt. Myrrhis, five maior, vel (addit in pin.) Cicutaria odorata: Myrrhis, Matth. Cord. in Dioſc. Gefn. h. Lac. Ad. Lob. Dod. Caſt. & Lugd. ſauva, Cam. Sefeli Peloponenſe, Ang. Cerifolium hispanicum, Tab. Cerifolium magnum & Cicutaria tenuifolia, Ger.

Linguum. Græcis *Μύρρις*, welscher Föbel/wilder Föbel/ Matth. Belg. wilde Feuel. Gall. *Cumaire* quibusdam & *Perſil d'asie* (que tamen nomina vulgaria Lobelii mihi non placent.) Ital. *Murrade* & *Finocchiella*.

Locum etiam tempore. Myrrhis nobis provenit in horto Genevæ ſecundo anno à ſaione, ubi Hiemen pertulit. Patavii menſe Januario & Februario vidi in horto D. Cortuſii. Montbelgar di ſi ſemina quàm primùm maturæ ſunt in terram recondantur, prodiæ Veræ, ſed ante ſecundum annum caulem non proſert. In Ober-Engingen prope *Nürtingen* Dacutus V. in tembergia in horto D. Jacobi Paſſeder p. 17. vidi, us mente Octobris. Is vocabat *Chæcyphion* maximum, folium autem ſta variabat, ut aliam penè exiſtimarem plantam, niſi ſemina miſiſſet. In Haſſia circa Caſſel-ſas ſponte provenire Myrrhidem referebat Gil-ſenius. Hæc, ut ait Lobelius, non adeò frequens aut proceræ occurrit, ſed rarior & in pratis, vel germinofis marginibus etiam olitoribus ad veſcendum in Belgio multa colitur & eſcitavi in juſculis Cerifolij vice. Fertur autem apud Germanos in pratis alicubi naſci, Dodonæo perhibente, cum apud Belgas horteniſis tantummodo ſit. Majo menſe flores proſert: Junio ac Julio ſemen matureſcit. radix ſingulis anniſ primo Veræ regerminat, poſt ſemnis perfectionem reſtans.

Viſus & uſus. Myrrhidis porò ſolia non minùs quàm Chæreſolij edulia ſunt, in eorundemque locum quandoque aſſumuntur. Myrrhis (ut apud Mart. germ. cum addit. Camer. legitur) calida eſt ſecundo ordine, & partium ſubtilium. Radix cum vino pota, medetur morſui araneæ. A partu purgat mulieres, & mèſtrua promovet. Cum melle cocta & ſumpta tabidis conducit. peſtus & vaſa reſpirationi dicata à viſcoſis humoribus purgat. Cum vino cocta, & bis aut

Peſſis. ter in die de hac pota à peſte præſervat. Herbam & radicem decoquant ad urinam provocandam. Fit quoque extractum ex herba & radice, contra peſtem & puerorum epileſiam. Radix tribus diebus in aqua macerata, ſac iè que hæc lota ulcera ejuldem curat. Plura qui volet, legat quæ ante è veterum ſententia protulimus. Plantam ſiquidem à nobis traditam eorum Myrrhim eſſe ſtatuiſmus.

MYRRHIS BROCCENBERGENSIS

foliis Myrrhidis Italiz, flore albo, radice crallâ, nigrâ.

Deſcr. RADIX crallâ, profundâ, nigrâ: caule ſeſquicubitali, cavo, hiriuto, quem folia nigriora, palmanſerè pediculo, eoque ſimbricato amplexantur membrancâ veluti vaginâ, ſimilia Myrrhidis Italiz, ſeu Aph. alicuius multum incuſi: è membrancæ

autem vaginarum medio, exoritur ſubinde alius eodem modo folioſus pediculus, qui tandem ubi folia ei eſſe incipiunt, aliam peculiarem vaginulam protrudit, ex qua deinceps prorumpit denſa, orbiculatâque umbella, duas uncias non multum excedens, conſerta exiguis ſoſculis candidis, mulcoſiſque. Loco uliginolo fruitur.

Thalio deſcriptionis authori dicitur Myrrhis *Syræ* Broccenbergenſis. Bauh. phyt. Myrrhis 3. (5. pin.) Quænam autem ſit Myrrhis hæc Thalio nos cum fratre C. Bauhino adhuc latet.

GINGIDIUM VETERIBVS, & in genere.

CAP. XXXVI.

GINGIDIUM ait Dioſcorides alios Lepidium *Dioscoridis* vocare, naſci autem plurimum in Cilicia & Syria; herbulam eſſe Paſtinacæ [*ραφάνιον*] ſilveſtri ſimilem, ſed tenuiorem & amariorem [*πικρότερον*, cod. *Βαſίλιον* *πικρότερον*, *αντίον*] radicem habere parvam, ſubalbidam, amaram [*γλυκύ*, *πικρόν*, cod. *Βαſίλιον* *γλυκύ*, *αντίον* Matth. Trag.] edi crudum & coctum & ſale aſſervatum. Eſſe autem ſtomacho commodum, ciere urinam. Et decoſtum iplius potum cum vino, veſicæ utile eſſe. Idem poſtea Staphylini ſilveſtris folia Gingidio ſimilia eſſe tradit.

Plinius l. 20. c. 5. Gingidium hoc modo depingit. *Plinius* Syria in hortis operoſiſſima, (unde quoque eſt proverbium Græcis, Multa Syrorum olera,) ſimillimum Staphylino herbam ſerit, quàm alii Gingidion vocant. Tenuius tamen & amarius, ejuldemque effectus eſt, coctum crudumque ſtomachi magnâ utilitate. Siccat enim ex alto omnes humores ejus. Et hæc Plinii dicta cum Dioſcoridis deſcriptione conveniunt.

Plerimum, inquit Gal. 2. aliment. in Syria Gingidium naſcitur & editur, ſimile apud nos Scandici. Eſt autem ſtomacho valde commodum, ſive crudum, ſive ſerveſcâtum edere iplum velis: longiorem autem cocturam non ſuſtinet. Quidam edunt iplum cum oleo & garo: quidam etiam vinum aut ætæum addunt: & multo magis commodum eſt, & averſantibus cibum appetentiam ſcit, ſi cum aceto edatur. Et ſatis clarum eſt hanc herbulam medicamentum potius eſſe, quàm alimentum. Nam & adſtringendi vi, & amaritudine manifeſtâ nō modicâ participat. De hoc itaque ut medicamento ruſus agit 6. ſimpl. ubi ait: Gingidium quemadmodum guſtu, amaritudine & adſtrictione participat: ita temperamento, caliditate & frigiditate. Iuxta ambas autem qualitates ſiccit. Caliditatem equidem non ita manifeſtam poſſidet, ſiccit autem ordine ſecundo. Atque hoc modo etiam Paulus l. 7. c. 74. Gingidium Scandici ſimile eſſe dicit, adſtringentemque & amarum non parvam habere qualitatem, ſtomacho accommodatum eſſe, jedique in ſume & à jejuniis utiliter ex acceto, non tamen magnopere nutrire.

Dicta autem hæc ſunt, ut fortè aliquis ſagaci ex Pauli hiſtoria conjecturâ quale Gingidium hoc ſit, invenire poſſit, quod tamen difficile admodum videtur. Si quidem Plinius ac etiam Dioſcoridis tempore Græciæ & Ital. æ poregitum fuſſe conſicimus. In Syria enim Galenus, Plinius & Dioſcorides naſci & ſeri dixerunt; & hic quoque in Cilicia. Quid porò Dioſcorides & Plinius Paſtinacæ [*ραφάνιον*] ſimile dixerunt: Paulus verò Scandici, ad ſaciliorem herbæ propoſitæ cognitionem parum conſert, cum hæc duo ſimplicia nihil commune habeant.

Dioſcorides quoque Lepidium ait à quibuſdam ob ſimilitudinem dici, ita ut minùs miretur aliquis, ſi ignorari noſtrâ ætate, quodnam olus Gingidium ſit. *Galienus*

Gefnerus siquidem in catalogo suo plantarum, referente etiam Trago; Chærefolium Gingidium Diofcoridis esse statuit, quæ sententia probatur etiam à Ruellio.

Gingidium Diofcoridis verum Rauwolfii, inscribitur à nobis Anetho similis planta, semine lato, pulchre laciniato.

Quam Caucaledem Syriacam maximo semine intitulauimus, Lobelius Gingidium foliis Baucæ Syriacum cognominat.

Vishagam quidam volunt legitimum Gingidium, quorum opinio non placet.

Gingidii nomenclatura à Diofcoride tribuitur Lepidio.

Hippuris vocatur Gingidium à Gefnero in ascriptus Diofcoridis.

Gingidium allatum ex Syria nullus certò pro Diofcoridis Gingidio ausit asserere. Ego Gingidium Matthioli voco quidem, sed Lappulam canariam flore majore esse potius judico.

Caterum, refertur in nothis Gingidium Dorifastru Egyptios vocare: Syrios Adorin: Aphros Turicam: Romanos Viscutum. Sed & hæc appellationes incertæ, quod barbaræ; & ex nullo auctore alio audita sunt.

GINGIDIUM MATTHIOLI.



LEGITIMI Gingidii plantam è Syria allatam sibi missam à Cortuso scripsit Matthiolus, Pastinacæ sylvestri haud ablimilem, amariorem tamen, caule ramoso, rotundo, sesquipedali, striato, subnigricante, geniculatòque umbellà in cacumine alba, minoribus circumquaque emanantibus foliolis: è floribus semen prodire, quo maturefcente umbellæ in se contrahantur (ut in Pastinacæ) & tactu glutinosè sentiantur: radicem habere candicantem palmari longitudine, subamaro sapore. In hist. germ. cum addit. Camerarii ita describitur. Gingidium herba est habens folia ut Pastinacæ sylvestris, sed minora, amarioraque. Ab una radice procedunt caules multi, parui, rotundi, concavi, sesquipedales, adnatis & albis umbellis, quæ circum circa exilibus, & viridibus foliolis donantur, profundi in cistis, cauli adherentibus. Umbellæ semen proferunt Ammi, quod si maturum est, clauduntur, tractatæque digitis adhærescunt: radix est subalbida, spithamea, amaritula. Nascitur ut plurimum in Syria & Cilicia, unde semen in Italiam infertur, ac in hortis feritur. Et ita verum Gingidii innotuit, quo nomine Cerefolium falsò intellexerunt nonnulli. Hæc Matthiolus, qui Gingidii vocat, eique Gingidii facultates adscribit.

Quale autem hoc sit Gingidium iudicent qui viderunt: figura habet multa communia cum Lappula canaria flore majore. Interea quoque considerandum utraque descriptio non sit partim ex Diofcoride, partim ex dicta Lappula canaria & Vishaga composita: quid de figura Camerarii, quam & nos

Tom. III.

hic proponimus) in hist. & ep. Matthioli dicendum sit non habeo. nautavit is unam umbellam, fortè ad descriptionem. Tabernomontanus cur maiorem

mutationem in iconè sua expresserit, me læcet. Hoc ei tamen commune non ignoro, quod quidem laudabile foret, si è plantis ipsas mutationes sumeret. vocat Gingidii Diofcoridis, Syriacè Bœsseltraut.

Lobelius videtur existimare Lappam agrestem Tragi esse pro Gingidio Syriaco exhibitam.

Cast. & Cam. dicitur Gingidium. Lugd. p. 710. Gingidium Matthioli. Bauh. phyt. & pin. Gingidium 3. foliis Chærefolii: Gingidium Math. Lugd. & Cast. primum Tab. & hinc apponit ad Matthiolum figuram illam Tabern. nomine Gingidii primi, non parùm mutatam fortè in deterius.

LAPPULA CANARIA FLORE pulchro magno albo.



Radix tenuis, alba, subdulcis cauliculi pedalem aut maiorem interdum emittit, in ramos diffusum aliquot, partim rectos, partim procumbentes, striatos, hispido, purpurascens, geniculatos, multisque alis concavos: folia Pastinacæ tenuifolia, vel Carotæ, hirsuta, Clusio Apii ferè umbella florum alborum, quorum folia externa aliis duplo maiora.

speciosa, quibus succedunt lappulæ oblongæ, sulcata, hispida.

Tab. plantam à nobis traditam vocat Caucaledem, Apium sylvestre, Kletten Bœssel/ Aker Peterken/ Aker Kletten. Dod. Caucaledem, quem Daucum sylvestrem à nonnullis vocari refert; à rure verò Hetruræ Petrosello saluatico, & Ipturiis vocabulis, xav-xon, vocat à Democrito Boen: Latinis Pedem gallinaceum, Pedem pulli: Egyptiis Seseftin.

Lugd. p. 715. Caucaledem Dodonzi (& ita etiam vocat Gefn. h.) Item p. 761. Myrrhidem lappam Dale champii: ponit duas figuras unius plantæ, quarum posterior multò deterior, quàm ea quam hic ponimus, quæ minùs tamen placet.

Trag. Germ. l. i. c. 158. Myrrhidem Sylvii. Item l. 2. Myrrhidem c. 104. Lappulam campestem, & ruralem, Aker Kletten/ feld Kletten. Retur hanc esse agrorum Tribulum Virgilij l. i. Georg. aitque Sylvium Myrrhidem Galeni existimare. Sed qui Tribulum verum noverunt & veram Myrrhidem, hanc negant vel Nan Tribulum vel Myrrhidem. picturam malam habet Tragum, quæ non exprimit pulchros flores magnos, nec folia. Si non descripsisset, existimarem eum pingere Lappulam canariam cum flore minore.

Lonic. figuram habet malam ex Trago, quam inscribit Aker Kletten/ Tribulum terreum & Lappam campestem. Anguill. vocat epist. 12. Lappulam canariam Plinii, & Italorum Ped. chi di cani.

De hac aut Lob. adv. p. 324. Multi iam sunt anni cum pharmacopæus Martellus nobis Gingidii

Gingidium
Mart. Mel.
li, Lob.

ex Syria allatum asserere ausus est, sed contra nos esse indigenam plantam memineramus, & biennio post magnâ copîâ in vinetis & segetibus inter Pîsâ silvestria & Caucaïdes crescentem vidimus: quæ est facie & viribus ad *Gingidium* alludat, tamen ex Dioscoride nullus ausit pro *Gingidio* asserere: Planta enim est Caucaïdi natalibus & facie eadem, folio tamen longiore & angustiore: illi umbella candida, semen hirsutum, odore Pastinacæ silvestris. Item p. 325. Caucaïdis duæ sunt in nostris vinetis & segetibus, differentia, altera enim candida, foliis minoribus, sed caule procerrime. Et hæc Matthioli Caucaïdis. In Obs. p. 420. ut & in Icon. p. 728, pingitur hoc titulo: Caucaïdis albis floribus, vulgaris: Lappa agrestis Tragi. Lobelius suâ iconè proponit nostram Lappulam canariam magno flore albo, quæ non potest esse Matthioli Caucaïdis, ut dicitur capite de Caucaïde Matthioli: videtur Lobelium velle dicere *Gingidium* Syriacum Matthioli idem esse cum Lappa agrestis Tragi, de qua nos proprio capite.

Caucaïdis
candida.

Regat
esse Caucaïdis
Matthioli.

Gingidio
congener,
Esf.

Caucaïdis
albo fl. Clus.

Syn. G. B.

Locus cum
tempore.

Cæs. l. 7. c. 23. dicitur quædam in collibus asperis nascens semine grandi, prope nuclei Olivarum magnitudine, striato & valde hispido, colore candido, medullâ intus non injucundâ: ejus planta brevis est, dodrantalis: foliis Staphylino minutioribus, & tenuius scissis, ferè ut Fœniculi: umbellis parvis *Gingidio* similibus floribus candidis, latifoliis. hanc congenerem *Gingidio* statuit, quamvis particularem *Gingidii* mentionem apud autores non reperiri scribat.

Clus. hist. iconem exhibet, ac *Caucaïdis* albo flore titulo donat & describit, videturque illi hæc proximi ad Dioscoridis *Caucaïdem* accedere.

Bauh. phyt. & pin. *Caucaïdis* 4. sive arvensis echinata magno flore: Lappa agrestis, Trag. Lappula canaria Plinij, Ang. *Caucaïdis*, Dod. (& *Daucus* syl.) Gesn. h. Tab. Eyll. *Caucaïdis* alia vulgaris, Lugd. *Caucaïdis* albis floribus vulgaris, Lob. Ger. *Caucaïdis* coronatâ umbellâ, Cam. Myrrhis lappa Dalechampij, Lugd. *Dauci* genus arvense, Gesn. cat. *Daucus* a *rabbar* nos seu *herbar* nos sive *herbar* nos minor, Thal. *Echinophora* non *herbar* nos, an *Gingidium* Diosc. Col. Testatur frater in animadvers. in Lugdunensem *Caucaïdem* Dodonæi & Myrrhidem Lappam Dalechampij, utrinque describi, illius tamen figuram esse longè maiorem.

Pona in Baldo vocat Lappam agrestem Tragi, & *Caucaïdem* albam Penz. D. Zvinckerus misit Basilea pro Myrrhide Monspeliensi.

Lappulam canariam flore majore reperi inter Esincourt & Adincourt pagos Montbelgardenses florentes, & semine maturo Augusto. Abundat etiam in planitie versus Matta florens copiosè Septembri & circa Columbiæ Sauvoureux Junio & Julio; In Gallia Narbonensi circa Nemausum; Genevæ in segetibus. Sata Montbelgardi florebat & echinata semina producebat Majo & Junio. Basileæ frater observavit prope S. Iacobum in segetibus. Tiguri multam vidi, ut & in agris inter Rauppen & Beffordiam eundo in Malmünster, in arvorum marginibus atque inter segetes, vinetâque, Clusio etiam teste. Cæterum flos in umbellis habet aliquid simile cum flore Sambuci aquaticæ in medio flosculi minimi albi, in circuitu sunt magni succedunt lappæ longæ magnæ echinata & duplעי semine similes Lappulæ canariæ flore parvo, de qua jamjam dicendum.

LAPPVLA CANARIA FLORE minore, sive tenuifolia.

Deser. SIMILICEM parvamq. habet radicem, à qua statim pullulant caules plures, sesquipediales ferè,

brevi mollique lanugine leviter hirsuti, nonnihil angulosi: foliis minutim dissectis Caucaïdis alba pilosis, seu Lappulæ canariæ flore specioso, magis tamen mihi videntur concinna & ferè tenuius dissecta: flores umbellati, parvi, ex albo purpurascèntes: lappæ seminales canaliculata, spinis rigidulis, atropurpureis per costas dispositis, mucicata, in binas partes finduntur, totidem semina continentes.



Lappula Cretica. Bauh. phyt. tam vocat, sive arvensem echinatum parvo flore.

Hanc florentem vidi & semina habentem mense Majo inter Monspelum & Lunel, & prope Castelnou, si bene recordor. Item in pago Leura ut non miliari germanico à Basilea mense Junio, & in colle prope Castellum Hermes florentem Majo. Montbelgardi in agris ad Dubim ultra Adincourt non longè à domo D. Dancuttii. Vidi insuper in orto Gricningeri Pfortzheimæ: provenit mihi in h. orto E. C. ex semine misso pro Cretico, quæ multum excrevit cum multis brachiis. folia hujus propter culturam minus tenuia evadunt.

LAPPVLA CANARIA LATI- folia, siue Caucaïdis.



MIUS obvia nostro solo est hæc Canariæ Lappulæ species, cuius radix simplex, alba, lignescens: caulis cubitalis, ramosus, striatus, tactu asper: folia pulchra, palmi circiter longa, perquam hirta, quatuor aut quinque foliorum conjugationibus, extremoque impari constant, singularia folia profundè serrata. Pentaphylli & di foliis singularibus similia, utunque tamen minora, umbella divisa furculo insidet peculiari, palmo longiori: lappulæ magnæ, oblongæ, horridæ, nigricantes.

Exhibetur apud Lugd. p. 762. pro Lappa bona Plinij. Lobelius in advers. p. 325. vocat *Caucaïdem* alteram purpurascèntem foliis latioribus & crassioribus [*Caucaïde candidâ*, sive *Matthioli*] semine etiam majore. In Obs. p. 422. ubi figura, *Caucaïdem* flore rubro,

rubro, folio latiore. Descriptio Lobelii non male convenit nostræ Lappulæ canariæ latifoliae, non item figura, quæ mihi videtur composita ex Matthioli fortè non bona, & aliis feminibus: præterea minus distinctè de his plantis videtur scripsisse Lobelius.

Observata hæc aliquando erat à me in agris inter Sturgardiam & Pfortzen. Copiosam quoque I. H. Cherlerus observavit in agro Narbonensi, circa Monspelium præsertim & Nemaufum, & inter segetes; sed perpetuo purpurascens flore. D. Renzius medicus admirabilis balnei dedit collectam prope montem Flaconem, quæ erat flore rubro.

LAPPULA CANARIA, SIVE Caucalis maritima.

RADIX Caulidis utriusvis segetum, gracilis, longa, alba: caules vix palmares molli canescunt lanugine, internodiis gravissimis distincti, è quibus exeunt rami caule longiores, nudi, lappas in umbella gestantes luteas, Caulidis albae arvensis: folia mollia, villosa, luteola, Pectinis venerei dissectionibus.



In arenoso quodam maritimi tractus Narbonensis & finitimis fabuletis pererram observavit Cherlerus, unde vix unam, aut alteram ad nos invexit plantulam,

CAUCALIS VETERIBVS ET in genere.

CAP. XXXVII.

CAUCALIDEM, quam aliqui Daucum sylvestrem vocant, ac etiam in nothis Mytida, Democritus verò Brion quasi Muscum, Aegyptij Seselem, Romani Pedem gallinaceum, sive Pedem pulli, cauliculum esse dodrantalem aut etiam majorem tradit Dioscorides, subhirsutum, folia habentem Fœniculi similia cum multis incisuris [ἐλάλα ἔχει μακρὰ ὅμοια τοῦ σκεδῆς]. Scita Basil. cod. ita Cat. teste Matth. ut vult Lacuna, cui Ruellij lectio non placet, quæ sic habet: ἐλάλα ἔχει στενὰ ὅμοια, ἐπὶ ἀκρῇ δὲ μακρὰ ὅμοια, Apio similia, in summo verò Fœniculum referentia.] hirsuta: & in summo umbellam albam, odoratam. Et hunc olerum modo crudum ac coctum edi. Ciere autem urinam.

Estr & Caulalis, inquit L. 2. c. 22. Plinius, Fœniculo similis, brevi caule, flore candido, cordi utilis [quæ sequuntur apud Dioscoridem cum non legantur, ea ex Petrico Plinium sumpsisse conjectatur Dalech.] Succus quoque eius bibitur, stomacho perquam commodatus & urinae, calculique & arenis pellendis & vesicæ pruritibus. Extenuat & lienis, jecinis, renūque pituitas [obstructiones à pituita factas, Dalech.] Semen menses femininarum adjuvat, bilēque à partu secat [biliosam purgationem provocato locheio, Dalech.] Datur &

contra profluvia geniturae viris. Chrysippus & conceptionibus eam putat conferre multum: bibitur in vino jejunis. Illinitur & contra venena marinorum, sicut Petricus in carmine suo significat. Eandem recensuit L. 2. c. 19. inter herbas sponte nascentes, quibus pleræque gentium utantur in cibis, maximèque Aegyptus, frugum fertilissima.

Theophrastus similiter Caulalidem [Pedem gallinaceum vertit Gaza] inter olera recenset hist. l. 7. c. 7. Sed nec his appellationibus perspicuum fit, quæ herba, aut olus, aut, ut Dioscorides ait, qui cauliculus sit Caulalis.

Caulalidem verò aliquos Daucum agrestem vocant. Galenus, qui ei (Daucus, sc. sylv.) hanc & sapore & facultate similem esse scribit: calefaciat siquidem utile, & sicet & urinam cieat, & muriâ condita reponatur.

Genus herbarum l. 7. c. 7. de plant. hist. facit Theophrastus, quod ἀγρίον vocat. i. e. in arvis sponte nascens, inquit Marcellus, statimque in eo Caulalidem [Pedem gallinaceum Gaza] numerat, nullis aliis adiectis notis. Nec parum, si quis rem justè æstimet fuerit tam certè à tam gravi auctore Caulalidis natale Solum, & ubi quærenda sit, audisse. Id enim additum his, quæ Dioscorides, Plinius, & Galenus tradiderunt, facillimam ejus inventionem nobis efficiet. Nota enim, tam Apij, quàm Fœniculi folia, quibus similia Caulalis sua habere fertur à nonnullis. Alitudo enim deinde, hirsutitas lanuginem, & candidi floris umbellam oculis deprehendet, invenietque tam Daucum similem herbam, ut aut silvestris Daucus sit, aut rudimentum naturam Dauci facere condiscere. Qualis autem uterque Daucus sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non Caulalis nascitur, præsertimque in novalibus antequam novâ atatione renouentur. Galenus Daucum Caulalidem sapore & viribus similem ait. Dioscorides tamen ex similitudine figuræ ab aliquibus agrestem Daucum potius appellari insinuat. Habet enim & hæc & Daucus folia incisuris divisa. Habet ambo & candidi floris umbellam.

Potuit tandem dici Caulalis, Lobelio auctore, à Caulalis segetum effigie, quæ vascula oblonga & semispheerica imitantur, aut cum præarida strepitum edunt hæc femina ventis concussa, vindemias exactis. Et sanè luxata videtur lectio Dioscoridis, aut quisquam non imperitus videtur oræ codicis hæc verba, *luxata foliis Apij similibus*, adiecit, quæ postea in contextum latinum irreperint: nam nostris [Lobelij & Penæ] græcis exemplaribus desiderantur, & etiam supervacanea videntur, ut vir magnæ sedulitatis & exercitatus cognitionis Anguillara annotavit.

Cæterum, audacius herbarij aliquot Caulalides AquisGronæ exhibent. Habet suas Caulalides Matthioli, de quibus mox agemus.

Antrifcus quorundam à nobis inscriptus, semine asperfo hispido, à quibusdam Caulalis cognominatur.

Caulalis nodoso echinato semine, Antrifco hispido affinis est, si non ejus varietas.

Caulalis Hispanica semine rugoso depingitur ac describitur à Camerario.

Caulalis minor pulchro semine, sive Bellonij, dicitur à nonnullis Sesele Creticum.

Caulalis major semine minus pulchro, hirsuto, est Sesele majus Creticum Lobelio.

Caulalis major Clusij, quæ sit, cogitandum.

Caulalis Syriaca cum maximo semine, est Gingipium primum Dodonæi in fol. lat.

Caulalis omnium minima. De hac, ceu & aliis hic nominatis, ordine dicemus.

Lappulam canariam flore pulchro, magno, albo, vocat Caulalidem Dodonæus & Lobelius.

Lapp. canaria Lappula canaria flore minore, siue tenuifolia, est Caulalis quinta C. Bauh. in phytopinace.

Lapp. can. Lappulam canariam lactefoliam appellat Caucalidem alteram Lobelius.

Lapp. canar. maritima Lappula canaria, siue Caulalis maritima. De hac Lappula ceu & alis Lappulæ speciebus paulo ante egimus.

Saxifragia Merito rejicienda eorum opinio, qui Saxifragiam hircinam majorem, siue Pimpinellam, de qua infra tractabimus, Caucalidem esse affirmant.

An Saxifragia Caucalidem Lobelij an audemus appellare Saxifragiam Matthioli tenuifoliam & umbelliferam?

Matthiola Caulalis depicta à Matthiolo videtur, quod ad figuram attinet, Vifnaga.


Solanum Caulalis pro Cuculo, vel Vva lupina apud Sylviū dicitur de Solano. l. 34.

Myrrha Caulalis est Myrrhæ genus Dioscoridi.

CAUCALIDES MATTHIOLINÆ.

Locus

VISTUR (inquit Matthiol. in Diosc. l. 2. c. 133. in edit. anni 1554. & 1559.) Caulalis in Hetruriæ ca-



pestibus, inculto præsertim Solo, ut & Ananienſi tractu in Tridentino agro, nullis reclamantibus notis: Rura nostra hanc *Petroſello ſalvatico* vulgò appellant. Quippe quodd folia quæ per ima properadicem exeunt, Aptum quadrantenus effigie referat, quod vulgò *Petroſello* dicunt. Eius quæ ſuperiore parte prodeunt per ambitum ſint Fœniculi modo capillamentis diſiſa. Caulem mittit Paſtinacæ: in cuius cacumine umbellam gerit floribus candicantem, odoratam, Dauco non aſimilem. Idem in epit. lat. impreſſa anno 1571. ait. Caulalis, Italis *Petroſello ſalvatico*: caule exit dodrantali & ſæpè majori, Dauci, aut Paſtinacæ ſimili, ſubhiſſuto, foliis Apio ſimilibus, ſed quæ in caule ac ramis ſunt, Fœniculi modo per extrema multiſidis hiſpidiſque: candidà umbellâ: ſemine odorato. Cæterum, Matthiolus iconem habet, cui folia teruia, quam autem intelligat, judicent Hetrurienſes Medici & Pharmacopæi, & conſiderent, quæ planta ſit *Petroſello ſalvatico*. Matth. enim in commun. cum mag. fig. Ital. c. 128. Lat. cap. 133. pro Caucalide aliam longè diuerſam habet iconem, ab ea quam in epit. exhibet, quamvis eandem deſcriptionem retineat, quæ etiam extat in hiſt. germ. l. 2. c. 68. ubi ait, *wilder Peterſilg*; *Caucalis*, *Caucalis* Dioſc. in Hetruria inter fluvium Tiberim & Macra, Italis *Petroſello ſalvatico*, i. e. *wild Peterſilg*; aut *Peterlin*; ut Geimani circa Tridentum vocant, quidam *wild Vogelneſt* dicunt. Caulis Paſtinacæ, palmaris, vel etiam major: folia juxta radicem ſimilia *Petroſelino*, unde huic nomen. ſuperiora Fœniculo ſimiliora, ita multiſariam diſſectâ; præterea aſpera & hiſſuta: umbellæ florum alborum, grati odoris. Hæc ille, quem exiſtimamus neſciſſile, quid traderet iconem & deſcriptionem, quarum priorem ſuſpicamur factam fuiſſe ad deſcriptionem Dioscoridis, quales ſæpius plu-

Icones Matth.

Petroſello ſalvatico

Matth. l. 2. c. 128.

res olim habuit & habet adhuc. ſi ei nota planta ſuit, cur non reddit rationem mutationis iconum; cur ſemen non deſcribit? Conſiderandum porro an icon poſtrema non habeat aliquid commune cum Antriſco quorūdam ſemine aſpero. Cam. ep. Matth. poſuit poſtremam (ut & nos) iconem, eandemque etiam in hiſt. vocant *wilden Peterſilg*; *Caucalidem*, *Pedem gallinaceum*, & *Petroſello ſalvatico*.

Caucalidum Matthioli talibus meminere *Adverſaria* Lobelij & Penæ p. 325. Caucalide Anguillaræ magis placent vulgares Caucalides, quia ſunt caule, foliis, umbellâ, & ſemine hiſpidis, eo que magis congruunt verbis Dioscoridis. Dux namque ſunt in noſtris vinetis & ſegetibus differentiæ: altera enim candida, foliis minoribus, ſed caule prociore, & hæc Matthioli. Altera purpurea, ſcens umbellis, ſeu floribus, folia habet latiora & craſſiora: ſemen majus. Eſt iſtud ſemen argutum & elegans: nam triquetrum, oblongum, & ſpinulis horridum glumam, *Glycerthizæ* quadrantenus ſimilem, veſtibus *Hordeis* hærentem, eâ exutâ granum oblongum, *Avenæ* exantheratæ modo cernitur, haud guſtu inſuave: quæ quidem ſatis expreſſâ notâ inſignivit Caucalides Dioscorides & ſimilibus diſcrevit. Haſ Caucalides imagine expreſſit Lobel. in Obſ. p. 420. his titulis: *Caucalis albis floribus*, vulgariſ *Adverſ.* p. 324. & 325. *Lappa agreſtis* Tragi; Item *Caucalis flore rubro latiore*. In icon. p. 728. his nominibus: *Caucalis albis floribus*; Item, *Caucalis flore rubro*, folio latiore. Cæterum, Lobelium intelligere non poſſum per *Lob.* *Caucalidem* Matthioli, quam dicit flore albo, ſemine hiſpido, pro qua in Obſ. & Icon. exhibet *Caucalidem* Dodonæi & *Lappulam agreſtem* Tragi: ubi nam Matthiolus eam plantam tradidit pro *Caucalide*? Præterea iconem quam Matth. in poſt. commun. cum mag. figuris exhibuit pro *Caucalide*, Lobel. exhibet pro *Caucalide flore rubeo*: mutans non nihil ſemina, quæ paulo majora pinguntur cum pauca hiſpiditate.

Cluſius habet iconem Lobelij cum inſcriptione *Caucalidis rubello flore*, ac dicit: *Caucalidem ſaturè rubente flore*, ſimilem *Caucalidi albo flore ex rubra* hiſtiz à Dodonæo, majoribus alatiſque foliis atque ad *Pimpinellæ* Germanicæ folia magis accedentibus, agro Francofurtenſi abundanter naſcentem obſervabam, florem variantem, qui major erat & æqualis magnitudinis, folia obtinebat, ſaturè rubente colore.


Lugd. p. 714. poſtremam iconem Matthioli habet, inſcriptione *Caucalidis* Matthioli, ſub quibus verbis ejus etiam meminit Pona in Baldo.

Bauh. phyt. *Caucalis* 1. *Apij folio*, *Caucalis* Matthioli. Item *Caucalis* 2. *latifolia altera ſemine aſpero*: *Daucoides* majus *Cordi*: *Caucalis flore rubeo*, folio latiore Lobelij. Eid. pin. *Caucalis* 2. *lato apij folio*: *Caucalis*, Matth. Lac. Caſt. & Lugd. an *Caucalis*, *Cordi* in Dioſc. *Daucoides* majus, *Cordi* hiſt. & Thal. *Caucalis* vulgatiore, Ad. *Caucalis flore rubro folio latiore*, Lob. *Caucalis rubello flore*, Cluſ. hiſt. *Gingidium*, Cæſ. Idem apud Matthiolum ait: *Caucalidis* diverſas proponit Matthiolus figuras. Aliam ſimilem ei, quam pro *Vifnaga* dedit: aliam in majoribus iconibus, quam *Caucalidem* latifoliam alteram nominamus, eſtque *Caucalis flore rubro*, folio latiore Lobelij, fortè *Daucoides* majus *Cordi* & Thalij. Hæc frater. Nos uti nolumus negare *Caucalidem* Matthioli & Lobelij eandem eſſe cum *Daucoide*, ita etiam adhuc aſſere non poſſumus eandem cum noſtro Antriſco ſemine aſpero, quod videtur idem cum *Daucoide* *Cordi*, uti dicitur ſuo capite, ubi proponimus conſiderandum an *Gingidium* *Cæſalpini*, Matthioli *Caucalis* eſſe poſſit.

Antriſcus

ANTHRISCVS QVORVNDAM

femine aspero, hispido.



PERSIMILIS est Antrisco Dalechampi, caule sesquicubitali, hirsuto, aspero, geniculato: folia Antrisco parè eadem, hirsuta: umbellæ parvæ, albicant, vel ex albo rubescunt: semen Coriandro par, minutis rotundum & Lappulæ canariæ instar echinatum, asperum, striatum, duplex, interdum nigricans, nonnihil amurum. Radix alba, odorata & aromatica, Pastinacæ silvestris modo.

An planta à nobis tradita, est Daucoides majus Cordi, de quo ait in hist. plant. lib. 2. cap. 41. Daucoides majus folia habet per terram strata, Apio, aut Selinoidi Dauco (i.e. lausolio) similia, hirsuta & per terram strata: è quorum medio caulis exit sesquicubitalis, aut aliquando major, aliquantulum asper & geniculatim foliis vestitus, iis, quæ inferius sunt, minoribus, in summo caule umbellæ sustinentur. Æstate in candido rubentibus flosculis plenæ: quibus singulis binæ, subrotunda, crassiuscula & Lapparum modo aspera, & prætercuntium vestibus adherentia semina succedunt. Radice nititur oblongâ, candidâ, tenuique, antequam caulem proferat, carnosâ, gustuque cum acrimonia subamarâ, quæ maturo semine perit. Semen tritum odore cimices & buprestides imitatur, gustuque admodum ingrato est. Nascitur declivibus, camp. lstribus locis inter fruteta. Hæcille.

Gingidium, si non aberro, vocatur à Cæsalp. l. 7. c. 22. quod hîc ab ipso traditur. Gingidium apud nos est sylvestre quoddam olus, quod passim oritur in rudibus & vineis, lappas ferens, quæ vestibus pertinaciter hærent. herbula est parva, foliis Staphylini, longè minoribus, ac minutis hirsutis, odoratis, quæ pro Apio aliquando venduntur: cauliculus habet tenuem, cubito brevior, hirsutum: parvas umbellas, flore candido: semina Fœniculo proxima, in rotunditate oblonga, hærentia vestibus. extat & hujus differentia quædam magnitudinis & parvitat, inter quas una est, quæ fructus inhaerentes ramis fert nullo pediculo, quam aliqui Cicuriam vocant: nam foliola magis ad Cicuræ incisuras accedunt. Et hæc de suo Gingidio Cæsalpinus, qui Gingidium antiquorum retur. Nobis non bene constat, quam plantam velit: videtur tamen accedere ad nostrum Antriscum quorundam femine aspero. Considerandum etiam an possit esse Caulalis: animadvertendum etiam an aliquid commune habeat cum Caulalide hispanica femine rugoso Camerarij.

Gein. h. vocat Dauci genus parvum asperiusculum, circa sepes & muros nascent, inutile. Thal. p. 8. Daucoides majus Cordi, quod Daucum asperum Gesneri existimat, ut p. 35. declarat.

An Baeh. phyt. Caulalis 3. latifolia altera femine aspero: Daucoides majus Cordi; Caulalis flore rubro, folio latiore Lobelii. Item Caulalis 7. femine

ad caulium nodos echinato. Apud Matth. Caulalis Matthioli in com. cum major. iconibus: Daucoides majus Cordi & Thalij. Sunt quadraginta anni ex quo misi omnes meas plantas cum descriptionibus, clariss. diligentissimò que Botanico, præceptorì fidelissimo, D. Gesnero: huic autem plantæ cum ascriptissem, Caulalidem esse quorundam, ille Daucoides Cordi in sepibus fore putavit. An frater intelligat plantam, de qua hic agimus, nondum planè nobis constat. Suspiciamus etiam ejus Caulalidem 7. esse hujus variationem, non asserimus tamen, donec viderimus ejus plantas: Matthioli quoque Caulalidem non possumus adhuc dicere, nolumus tamen inficiari, ut ante hortati sumus cap. de Caulalidibus Matthioli.

Antriscæ affinem hanc vidi Geneva. Abundat ea Montbelgardi in sepibus, ut alia Antrisci species, florens & semina producens Augusto. Copesè conspicitur extra urbem juxta la Crote.

Locus enim tempore.

CAVCALIS NODOSO ECHINATO

femine, Antrisco hispido affinis, si non ejus varietas.



EX radice oblonga, tenui, alba,

binis ternisve caules, qui dein in alios dividuntur, rotundi, striati, asperi, quorum alij semipalmates incurvi, alij bipalmates erecti prodeunt, quos folia Pastinacæ similia, breviora tamen & pauciora, multoque tenuius divisa, aspera ex virore nigricantia ad caulis iungula penè internodia. flosculi exigui brevissimo pediculo insidentes, quibus succedunt semina plurima, par-

va, echinata, conglobata. Ita quidem describente C. Bauhino, qui in phyt. sibi hanc missam ait nominem. Lappulæ canariæ Cortusi. Is verò loco citato facit Caulalidem 7. cognominatq; Caulalidem femine ad caulium nodos echinato. Apud Matth. verò Caulalidem 2. (In pin. facit Caulalidem 8. at 1. in prod. Scandicem Colum.) nodoso echinato femine quam à nemine descriptam gloriatur. Suspico ego hanc esse varietatem nostri Antrisci femine hispido. videnda tamen fratris planta & conferenda.

Hanc ipse in horto Patavino anno 1578. se collegisse scribit.

CAVCALIS HISPANICA

femine rugoso.

Semen habemus rugosum nigrum Caulalidis nomine missum, non recordamur unde. ejus plantam depinxit Camerarius, ac sic descripsit.

Superioribus (Caulalidi flore minuto & alteri coronatâ umbellâ. est hæc nobis Lappula canariâ flore majore & minore) ferè similis, non tamen spinoso semine, sed rugoso nonnihil, eoque elegantissimo, sed pusillo flore in umbellâ incondita. Tota planta lac habet dulce in modum Cherefolij, sed copiosius, & etiam ex hujus semine confectio emanat.

Radix

Caucalis
hispanica.Caucalis
hispanica,
Clus.

an Gingidium Czafalpini l. 7. c. 22. aliquid commune habeat cum hac Camerarij Caulicide: & an sit Antriscus quorundam semine aspero. Historiam Czafalpini posuimus sub Antrisco quorundam semine hispido.

De hac loquitur Clavius hist. l. 6. c. 24. A prima [Caulicide maiore] inquit, non valde differt ea, quæ semine ex Hispaniis allato nata mihi est aliquando, cum apud Belgas, tunc Viennæ Austriæ: cauliculos enim habebat striatos & asperos, umbellas verò cardiorum flosculorum minores, & quasi in orbiculare caput coactas: semen etiam crassiusculum, valde striatum, non hispidum. Annua etiam est planta: nam maturo semine perire solet.

SESELI CRETICVM, TORDYLIVM veteribus. CAP. XXXVIII

Tordylon.

Tordylum
Seseli creticum.

Plinius.

NON habet certum in antiqua etiam Medicina Tordylon hoc nomen, nec certam penitus historiam: aliter aliis id appellantibus & de eo tradentibus. Sunt enim qui cum Dioscoride Tordylon; sunt alii qui Tordylum; & qui Creticum Seseli vocant: Romani pariter cum Græcis Tordylon dicunt. Dioscorides hoc in Amano Cilicis monte nasci scripsit. Idque herbam fumentosam [breuem & fruticosam Marcell.] habentem semen totandum [paruum addit Marcell.] duplex, scutis, sive clypeolis simile, subacte, & aromaticum. Bibi ad urinæ difficultatem, & ad menses ducendos. At succum caulis, & seminis adhuc viridis, trium obolorum pondere potum, cum passo per dies decem, nephriticos sanare. Radicem etiam efficacem esse, educentem quæ in thorace hæreant, si cum melle delingatur.

Plinius non satis cognovisse rem videtur diversas ante se scriptorum sententias tantum referens. Adicitur Tordylum, inquit l. 20. c. 22. Est autem id semen ex Seseli [Tordylum quidam Creticum Seseli vocant, Diosc.] Et si vehementior somnus lethargicos premat, crucibus aut etiam capiti illinitur cum Fico ex aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendicium, humerorum, & in quacunque corporis [parte, C.H.] ex alto vitia extrahenda sunt, illitum caustica vi emendat, pustulas faciendo. At in magna duritia sine Fico impostum: vel si vehementior urigo teneatur per dorsum, pinnos [inter duplicatum pannum, Dalech.] Utuntur ad alopecias cum rubrica, pforas, lepras, phthiriales, lithanicos [rerant, alius,] opisthotonicos. Inungunt quoque scabreas genas, aut caligantes oculos cum melle. Suc-

cusque tribus modis exprimitur in fistili, calefactusque in eo in Sole modice. Exit de cauliculo succus lacteus [salum hoc. n. enim planta hac lacteum succum fundit, Dalech.] qui ita, cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix, cum immaduerit musto, conteruntur, manūque plenè mensurā forbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusque omnes: mulierum etiam lassitudines, saluberrimo genere medicinz. Calculos quoque discutit potum ex aceto. Minuitur & livoribus, sugillatisque cum melle & adipe asserino, aut cerâ Cypria. Fit & oleum ex semine madefacto in oleo, expressoque, quo utuntur ad nervorum rigores, lumborumque & coxendicium perfusiones. Idem l. 24. c. 19. Tordylon alij semen Silis [Seseli ver.] esse dixerunt: alij herbam per so, quam & Syreon vocaverunt. Neque aliud de ea proditum invenio, quàm in montibus nasci. combustam potu cedere menses, & pectoris excretaiones, efficere viore etiam num radice: succo ejus ternis obolis hausto renes sanari: addi radicem ejus & in malegmata.

Paul. Aegina Tordylon non Tordylon vocat, facili tamen & lubrico in una tantum litera ad vitium lapsu. Ceterum eadem hanc cum Dioscoride vires adscribit.

Alii feminino genere Tordylè vocaverunt: alij Tordylis semen Tordylis nomine censeret voluerunt: alij sui generis herbam Græciæ & Italiæ peregrinam, idèque parum notam. Nec Marcellus quod pro ea dicat, aliud habet, quàm Seselis genus esse; ex eo quod Dioscorides eam statim ab omni Seseli delcripserit, propriumque & privatim ab illis aliud, à genere in qua nasceretur, nomen sibi invenisse. Galenus in simplicium censu Tordylum præterit, velut de quo in Seseli mentione egerit. Cornarius officinis suisque sculi scriptoribus ignotam esse scribit.

Loh. Cam. C.B.uth. & S. hvencck. Caulicidem majorem semine hirsuto, Seseli majus Creticum vulgè cognominant.

Seseli Cretici loco Dodonæus Caulicidem Bellonij, seu, ut nos vocamus, Caulicidem minorem pulchro semine, exhibet, quod non probat Gefn. h.

Seseli Creticum Dioscoridis verum dicitur Trago de sua Pimpinella tertia.

CAVCALIS MINOR PVLCHRO semine, sive Bellonij.



benet simile: flores in umbellam digesti similes, candidi, quorum etiam flosculi exteriores majores habent

bent bipartita folia peltata semina pulchriora, non ita hirsuta, simbrâ candidâ crispâ vel granulatâ ambiente. sapor plantæ ferè qui *Staphylii*. C. Bauhino flores & semina odorata, ac non nihil actia Myrrhidis gustu.

Caucalis, quæ in Hellesponto hodie vulgò Græcis *Cafalistrâ* dicitur, quasi *Caucalida*, ut Bellon. scribit, qui & herbam quoque pingit, Itali quidam corrupto nomine *Cazalepram* vocant, ut Gesl. hort. monet, qui eos falli putat, qui *Seseli Creticum* aut *Tordylium* cum *Dodonæo*, *Caucalidem* hanc esse pronuntiant. *Dodonæus* (inquit Gesl. h.) *Caucalidem* Bellonij pro *Seseli Cretico* exhibet, quod non proba. Item post: *Tordylium Dodonæi* est *Caucalis* Bellonij.

Dodonæus itaque tam gal. quam lat. *Caucalidem* quam Bell. Obsl. l. 3. c. 49. in Græcia *Cafalistrâ* appellari refert, sub *Seseli Cretico* sive *Tordyllo* depingit & describit, hocq; Græcos similiter *καυκαλίστρα* & *καυκαλίς* appellare, ac officinis incognitum esse tradit. *Pimpinella* Romanam vulgò appellari auctor est Cæsl. 7. c. 58. ubi hæc de ea leguntur. Herbula est cubito brevior: paucis foliis in simplici pediculo, rotundis, paulò latioribus *Pimpinella*, candidantibus, hirsutis: quæ umbellæ fert candidas: & semina lata ac rotunda, ut *Pastinacæ*, circulo candido, ac denticulato, ornata, instar clypeoli; unde quidam *Tordylium* esse putarunt, at infirmi odoris, saporisque non ingrati: radix est tenuis & inutilis.

An *Cordo* in Sylva Obsl. Herba umbellifera, foliis inter *Anis*, *Apij* & *Coriandri* foliorum figuram mediis, semine acti, odoratòque.

An Lob. adv. p. 328. dicitur *Seseli Creticum*, *Tordylium* (hanc siquidem hoc titulo in Obsev. p. 425. in Ic. p. 736. pictam dat) de quo ait. *Passim* in segetibus *Norbonæ* secusq; vias occurrit furculosa, hirsuta. rigida, aspera planta, folio rotundiora, hirsuta. umbellis albidis purpureis; parvis: quibus succedunt semina copiosa, citrinata, quasi torcularis elaborata, unde fortè nomen peculiare fuit ademptum, orbiculata compressa, atque geminis valvulis, ut *Ferulæ* semen, conflata, clypeoli speciem referentia, gustu Myrrhidis. Nunnam hæc fit illa, qua fe deceptum Commentator [*Matthioli*] conqueritur, cum ille scribere aut nolit, aut non ausus sit, ambigo: volui tamen hanc studiois notam esse, ut horum judicia excitarem: ne deinceps fastui commentatoris, qui innumeras propemodum, aut non novit, aut perperam prodidit, aut silentio abdidit, assuescere discant; luculento enim detrimento ejus ignavia, aut ambitio Tyronibus fore certum est, quemadmodum & mihi multos annos per initia nimium credulo, fuisset memini & doleo: non tamen illi insulto, quin potius veniam do, si docere non potuit quod nescierat: liberèque profiteor, me dehinc non modò non liberius quicquam animadversurum in meis pannosis centonibus & commentationum adversariis, sed potius si mîs de re herbaria bene meruit, & melius voluit, gratiam habiturum, & melius in posterum bonas horas collocaturum potius, ut certa prodam, quàm ut incerta, ambigua, ambitiosè emendicata munera, furta, versuras, censuras, jurgia, similitates, obsecrationes, conquestiones, apologias, apomaxes, & recantationes, retegam. Hæc *Loebelius*, qui umbellarum albidarum & purpurearum meminit. Nos verò in nostra album tantum florem observavimus.

Ang. epist. 5. ut testatur Lob. vocat *Ordilion* *Nicandri* & *Tordylion* *Dioscoridis*, idem enim utrumque esse asserere non dubitat. An idem ep. 7. appellat speciem *Seseli Cretici*, visam in horto Patavino? *Castori* & *Tab.* dicitur *Seseli Creticum*, *Cretischer Sesel*. Lugd. p. 751. duas figuras habet. unam pro Tom. II.

Tordyllo *Dodonæi*; alteram verò pro *Tordyllo*, *Seseli Cretico* *Loebij*, quas diversarum plantarum putat, contra nostram quidem opinionem. Sufficiat autem, C. Bauh. teste, descriptio una & posterior figura. Est ei apud *Matth. Seseli* 7. (6. phyt. at 4. pin.) *Creticum* minus: *Seseli Cretici* species *Elaphobolus* similis, Ang. & *Ordilion* *Nicandri*, Eid. *Caucalis*, Bellon. Gesl. h. Bull. ep. 1. ad Clus. *Tordilion* & *Gordilion*, *Dod. gal.* Gesl. h. Lugd. *Seseli Creticum*, Lac. Lob. *Dod. Cat. Tab. Ger.* minus, Cam. *Tordylium Creticum*, Eyst.

Caucalis minor pulchro semine, sive *Tordylium* minus primo anno Genevæ in horto folia protulit, & caules, nec non flores Junio, & semina matura Julio. *Basilæ* pulchrè virebat Septembri in horto D. Zvinkert, ibidem florens Junio. *Mohspelij* provenientem spontè vidi, ubi vocabant *Caucalidem*; in Italia *Tordylium* conspexi in horto publico mense Martio. Habui semen *Stutgardia* missum per hortulanum *Ducis Florentini* nomine *Cafcalidæ Creticæ*: id satum in horto E. C. *Montbelgardi* copiosè nascebatur, ut & in suburbis *Romæ* præcipuè in Vaticano, auctore *Cæsalpino*, qui herbam ejus erudam inter olera assumi testatur.

CAUCALIS MAIOR SEMINE minus pulchro hirsuto.



*D*Vorum cubi-
torum ferè altitudinem caulis assequitur, hirsutus, striatus; inanis, in ramos divissus. folia prima subrotunda, ut in sequenti, similia quodammodo *Elaphoboli* *Matthioli*, sive *Pastinacæ* g. manicæ silvestris, sed minora, serrata, hirsuta, alia longiora, breviora alia: umbellæ parvæ, flores parvi quoque, albi, quorum strobili externi quædam habent foliola majora, tripartita. semina peltata *Caucalidis* *Syriacæ*, sed multò minora, hirsuta, umbone rubente, simbrâ albâ, sapore aromatico. C. Bauh. umbellæ candidæ, sub purpureæ.

Lob. Obsl. p. 425. pingit ac describit vocans *Tordylion* sive *Seseli Creticum majus*; in Ic. p. 737. *Seseli Creticum* sive *Tordylium majus*. Lugd. p. 752. *Tordylium* sive *Seseli Creticum majus* Lob. Tab. *Seseli Creticum secundum*. Bauh. apud *Matth.* (ubi commentatori hujus *Tordylj* descriptionem cum iconæ adjicit) *Seseli* 6. (3. phyt. & pin.) *Creticum majus*. Cæsl. *Pimpinellæ* Romanæ alterum genus, sive silvestre insuavius. Cam. *Seseli Creticum majus*.

In horto meo Genevæ primo anno caulem non protulit, flores mense Junio & semen producens Julio sequentis anni. Inveni spontè nascens & florens mense Maio in *Sabaudia* propè *Cormou* non longè à *S. Maurizio* itinere Genevâ *Lugdunum*.

CAUCALIS MAIOR CLVSIO.

*C*Aucalis hæc omnium maxima *Clusij*, multos gradice producit stiones, rectos, bicubitales, & tricubitales, interdum etiam quatuor cubitorum altitudinem attingentes, striatos, intus cavos,



geniculis interceptos, & in plures ramis divisos: sub quibus lata sede adnascuntur magna, alataque folia, in ambitu incisa & serrata, instar foliorum Anglicae, ex atrovirentia; summis ramis adnascuntur umbellae candicantium florum subtus nonnihil purpurascens, & ad carneum colorem accedentium: quibus succedunt lata semina, ferè ut in Spondilio vulgari, subhirsuta, & summo mucrone bifida, aculeataque instar spinarum: radicem habet albam, duram, lignosam, raris fibris praeditam.

Synon.

Hanc descriptionis auctor Clusius detrominabat *Caucalidem* majorem, qui verò eam ad ipsum mittebat *Iacobus Plateau*, dubitabat, an propter semen gemellum, ad *Tordylj* genus aliquod potius referret. *Bauh.* pin. est *Caucalis* maxima, *Spondilij* aculeato semine.

Latius cum tempore.

Scribebat porro *Iac. Plateau*, mense Septembri esse ferendam: nam illicò emergere, viridèmq; deinde permanere totà Hieme, quam per commodè ferre potest: subsequens anni lunio flores producere, deinde maturum semen, sub exitum Julij & Augusto: tandem perfectò & ad maturitatem perducto semine totam perire.

CAUCALIS SYRIACA CVM maximo semine.

Deser.



Plantula est bipalmaris, radice simplice, tenui, alba: caulibus hirsutis, triquetris, atrovirens: tortuosus: folia *Bauciae*, sive *Pastinacae* germanicae, alata, rotundiora, & foliis singularibus confata, plerumque terna, ciliatula, crenata, hirsuta, subaspera: strobili albicantes, apiculis saturata purpurea unctis, umbellatim quidem, & d. sparium dispositi: longis foliis unte leguminis protentis oblatantur, odore nullo eccellente: quibus etiam nondum delapsis, praecoci ortu succedunt semina simul juncta, multa, incana, villosa, lata, compressa, per maturitatem pulchrè peltata, duplicata, multò majora, etiam triplo, vel quadriple, quam praecedentium duorum, quibus similia, crispà albâque simbrâ, umbonem cinericeum circumdante. In his lineae duae, nonnihil nigricantes, quales ferè *Spondilio* vulgari: saporis aromatici.

Plantula est bipalmaris, radice simplice, tenui, alba: caulibus hirsutis, triquetris, atrovirens: tortuosus: folia *Bauciae*, sive *Pastinacae* germanicae, alata, rotundiora, & foliis singularibus confata, plerumque terna, ciliatula, crenata, hirsuta, subaspera: strobili albicantes, apiculis saturata purpurea unctis, umbellatim quidem, & d. sparium dispositi: longis foliis unte leguminis protentis oblatantur, odore nullo eccellente: quibus etiam nondum delapsis, praecoci ortu succedunt semina simul juncta, multa, incana, villosa, lata, compressa, per maturitatem pulchrè peltata, duplicata, multò majora, etiam triplo, vel quadriple, quam praecedentium duorum, quibus similia, crispà albâque simbrâ, umbonem cinericeum circumdante. In his lineae duae, nonnihil nigricantes, quales ferè *Spondilio* vulgari: saporis aromatici.

Cæterum, si viva planta ex horto vel siccâ piciori exhibita fuisset nobis absentibus per amanuensem, melius picta fuisset: inter alia enim semen multò majus erat pingendum.

Hæc autem est illa, quam *Dod.* in foliat. p. 696. *Syn.* *Gingidium* primum inscribit; *Lobel.* verò in *Obf.* p. 419. & *Icon.* p. 723. *Gingidium* foliis *Bauciae* *Syriacum*. *Lugd.* p. 710. *Gingidium* foliis *Bauciae* *Lobelij*, quod ait *Venetias Alepo* *Syriae* missum *Sequini Martini* operâ. *Tab.* 10. *Gingidium* *Lat.* *dom.* 2. *Syriacis* *Ka* *Solani* *breiten* *bloten* 1. *Bauh.* *phet.* & *pin.* *Gingidium* 4. foliis *Pastinacae* latifoliae. *Gingidium* 1. *Tab.*

Caucalidis *Syriacae* maximum semen mihi misit insignis Medicus *D. Doctor Leonh. Rauvvolf*, hoc titulo: *An Spondylum ex Syria*. *Frater C. Bauh.* misit simile omnino semen nomine *Tordylj* majoris, ex quo planta mihi provenit in horto *E. Principis Montbelgardis*, maturans semen *Julio* eodem anno, quo lata, quæ deinde perit.

CAUCALIS OMNIUM MINIMA.

Tota plantula cum radice & caule unciam non superat, tantumque ejus ferè in terram descendit, quantum supra eam extat. est autem radícula simplex, alba; colliculus tenuis, hirsutus, infimâ parte rubens, in cacumine nescio quid minussimâ capitelli exalbi gerens, quod solum contigit videre. folia statim à radice pluscula emergunt, pari cum colliculo altitudine surgentia, aspera, hirsuta, incana, pediculo propter terram rubente; ex foliorum serratorum binis conjugationibus, imparique extremo segmento composita, ad *Caucalidis* latifoliae (si parva licet componere magnis) foliorum figuram accedentia.

Prope *Nemausum* in hiulcis saxorum rimis collegit gener. *I. H. Cherlerus*.

CORIANDRVM VETERIBVS & in genere.

Meminit Theophrastus sparsim *Coriandri*, hæc *l. 7. hist. suæ c. 1.* scribens. *Coriannum* provenit contumax est, quippe quòd si novum sit, nasci recuset, nisi convolvatur. Et *c. 3.* *Lignosæ* radices in summa omnibus multi-caulibus datæ sunt: habet enim & *Coriannum*, quæ uni stirps est radicem lignosam, & non prolixi, neque fibris multis subnixam: multis caulibus, multiq; ramis conficit; quapropter ejus pars superior, pro ratione inferioris non extat. Et post. cap. 5. *Coriannum* sub canis ortum falsescit. Libro tandem *caus. 4. c. 3.* ait: *Coriannum* in ortu ab aliis olenibus discrepat: difficilè siquidem provenit: haud enim germen emittit, nisi aqua pramaceratum. *Causam* durities habet. Cæterum, *7. hist. 4.* *Coriannum* inter ea recenset, quibus minimè plura genera sunt, quibûsq; diversitatem generis omnino deesse voluit.

Sic & *Dioscorides* (ceu & alij veteres) *Corianni* uni duntaxat meminit ejus multas plantas commutat, tanquam plantæ novissimæ: ipsam tamen non describit: ei vim refrigeratorem tribuens, ut inter venena reponatur. Quare illium cum pane aut potu lentu ei; peltata & hirsuta sanare onctor est: cum melle verò & uva passa pustulas nocturnas (epinyctidas) testium inflammationes, carbunculôsq; cum *Faba* trefa strumas & tubercula discutere. *Sic Lumbros* semen cum passio [paucum prepnis *Coriann.*] potum pellere & genituram augere, largus

gius autem sumptum, mentem periculosè movere, quapropter uberiorem & assiduum ejus usum vitare oportere. At succum cum Cerussa & Lithargyro [aut spuma argenti, *Cor.*] necnon aceto & rosaceo illitum ferventes in summa cute inflammationes sedare. Et hæc de Coriandri viribus Dioscorides perhibuit. De quibus deinceps ad digentius disserendum, quod major est de iis inter probatissimos auctores controversia.

De Coriandri namque facultate refrigeratoria dubitat Galenus. quoniam & effectus caliditatis in eo videtur, ut 7. simpl. scribit. Vetusiores, inquit, Graeci Coriannum nominant, recentiores omnes Medici Corion, sicut & Dioscorides [*in meo hoc in Diosc. codicibus non legi, nec Corion ab eo vocari, refert Maranthia*] refrigeratorem esse herbam dictitans, sed perperam. Si quidem ex contrariis constat facultatibus, plurimum habens amaræ essentiae, quam ostendimus esse tenuium partium & terrenarum, nec modicum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ est facultatis tepidæ. Habet autem & adstrictionis paucillimum. Ex quibus omnibus variè quidem agit ea, quæ scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Ceterum, ego cujusque particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi, meam unius duntaxat hoc in libro sententiam expromere, sed fortè nihil obstat, imò, si verum fatendum est, proderit non nihil superiores methodos, quæ ad hunc modum in paucis medicamentis sunt dictæ, hinc repetere. primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures Medicorum indeterminatè de morbis pronunciant, sicut sanè hæc quoque tempestate non paucos invenias Medicos vel insignes, præter alia, hæc in re turpissimè hallucinantes. interdum enim atrâ, lividâ, frigidâque redditâ parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia polente pharmaca, ceterum ea erysipelas sanare dicunt. Quamquam scribunt, incipientibus etiam tumores atque glicentibus crescentibusve erysipelatibus alia esse medicamenta, alia verò jam declinantibus ac flaccescentibus. sed rari non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet, posteaquam inflammatio ejus, & fervor, ac biliosum illud abierit; neque facultate frigidâ, quæ ejusmodi affectus sanant, existimandum est esse: sed veluti si vel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quavis tumor in parte quapiam aut lividus, aut niger extiterit eum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant, excalfaciuntque medicamenta poscere: ad eundem, opinor, modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine; aut si displicet nominis mutatio, saltè sicut quidam alij scribunt principij, alta declinationis remedia, haud amplius frigida esse autumantes declinationis remedia: concedendum sanè est, si cui ita placeat, ut talis affectio etiam erysipelas vocetur: sed eam etiam calidè dicere ubi jam refrigerata est, id verò neutiquam concedendum: itaq; ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicuti Dioscorides Coriandrum, qui cum pane aut polenta, inquit erysipelas curare illitum. Nam quod ad unguem est erysipelas, quod utiq; in flammatum est & flavum, haud unquam sanare queat cum pane Coriandrum, sed illud quod jam refrigeratum est. Et mox: Ex actum erysipelas haud unquam ab antedicto cataplasmate curari potest. voco autem ex actum, cum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. porro quod longè à refrigeratione absit Coriandrum, vel ex iis quæ ipse scripsit Dioscorides, discere liceat. Nam char-

radas sive strumas, cum eragmo; sive lomento; inquit, dissolvit: porro quod nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit dissolvendis charadibus, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta charadas sanare potentia, quæ omnia tum temperie calida, tum actionibus digerentia esse in confesso est. Hæc in Dioscoridem Galenus; Pro Dioscoride tamen pugnat Avicenna lib. 2. Canon. cap. 144. Scripsit Galenus Coriandrum esse compositum ex diversis facultatibus, etsi terreæ facultas in eo cæteris excellat, simul cum aquea quadam tepida, & adstrictoria pauca: verum, ut ego, conjicio, aqueitas, quæ in ipso reperitur, absque dubio frigida, non quidem tepida existit: nisi ei forsitan admisceatur aliquid excalfaciens substantiæ, quæ sui tenuitate velociter in auram evanescat. quapropter dixit Hunaym, removel Galenus frigiditatem à Coriandro & Dioscoridi repugnat. at ego quidem aliter sentio, cum frigidæ ejus substantiæ meminerint Archigenes, Rufus & aliorum posteriorum nonnulli. fug dum igitur est Coriandrum natum in fine primi, & usque ad principium secundi, & siccum in secundo: quanquam sententia mea, & siccum est, & ad caliditatem aliquo modo vergit. Sed Galenus ipse sentit, Coriandrum esse ex omni parte calidum. id quod fortasse evenisse putandum ex ea caliditatis particula, quæ dum bibitur, aut comeditur, ab ipso disperditur. aliter nec necessarium foret, si homines suâ frigiditate interficeret, ut in multa exhiberetur quantitate. Illud præterea subdidit Galenus, si Coriandrum strumas dissolvit, quoniam igitur pacto frigidum erit? Cui facile responderi potest, id agere Coriandrum suâ quadam occultâ facultate, ac formâ; aut quod reperitur in eo aliquatenus facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigidâ substantiâ exterius relicta. sed cum bibitur caliditas illa resolvitur. quo fit, ut sola frigida remaneat & in corporibus agat. Hæc tenus Avicenna, qui non sine ratione retragatur Galeno.

Dioscoridi consentanea ferè scribit Plinius l. 20. Coriandrum inter silvestria non sentit Dioscorides. Præcipuum tamen esse constat. Valet contra serpentinum genus unum, quod amphisbænas vocant, potum impositumque. Sanat & alia vulnera. Epinyctidas, pustulas tritum. Sic & omnes tumores, collectionesque curat. Colicis melle, aut uva passa. Panos verò ex strumâ, ad-nai. tertianis devorari jubent aliqui ante accessionem: vel plura illi fronti. Sunt qui & ante Solis ortum cervicalibus subijci efficaciter putent. Vis magna ad refrigerandos ardores viridi. Ulcera quoque quæ serpunt [herpetas & ignes sacros sanat cum pane & polenta: item testes inflammatos, Di. sc.] sanat cum melle vel uva passa: item testes, ambusta [ignis Ambusta. summa cum inflammationes, Di. sc.] carbunculos, ulres: cum lacte mulieris epiphoras oculorum: ventris & intestinorum fluxiones semen ex aqua potum. Bibitur & in cholericis cum Ruta. Pellit animalia interaneorum, cum Mali Punici succo & oleo semen potum. Xenocrates tradit rem, si ventris est: mensura contineri uno die, si unum granum biberint semina: biduo, si duo: & totidem diebus, quot grana sumperint. Marcus Varro, Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam æstate servari putat. Medinit idem Plinius Coriandri l. 9. c. 7. ubi ejus semen nudum esse ait. Eodem hoc libro c. 8. dicit in aliquo comitatu Equinoctio Autumni feri Coriandrum. Tandem citat Coriandro in semini permutatione majorem similitudinem esse testatur.

Plus Valerianum. Ejusdem etiam sententia est cum Galeno Plinius Valerianus: Non dubitanter Coriandro refrigeratrix potestas datur, non tamen simplex, ut prudentissimè Galeno videtur, sed cui quædam portio austeritatis inmixta sit, inde quòd quædam ex eo vitia curantur, quæ nunquam omninò curaret, si solà virtute frigida niteretur. Cum melle & uva passa tritum & impositum, omnes tumores collectione & que compescit, præcipuè tamen isto genere medicaminis doloribus testium subvenit. Succo Mali Granati & oleo in potionem permixtum, animalia interaneis innata persequitur. Semen ex aqua potum solutionem ventris stringit. scriptum à multis legitur, tria Coriandri grana tertianas excludere, ante accessionem si fuerint devorata.

Simpos Sethi. Stomacho bonum est, auctore Simeone Sethi, & eundem corroborat. cibos in ventriculo, donec probè concoquantur, retinet. totum igne ventrem sistit, prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. sanguinis profluvium potum, & si imponatur, compescit. cum vino potum lumbricos educit: immodicus tamen ejus usus delirium facit. hujus etiam succus potus venenum est & occidit. qui enim hunc bibunt, muti fiunt & delipiunt.

Macer. De viribus à veteribus Coriandro attributis, extat non inelegans Macri poësis, quæ sic habet:

*Frigida vis herba Coriandri dicitur esse
Austeraque simul q. idam virtutu habere:
Hancque Galenus ait, perquam depellere ventre
Lumbricos, tinea & que s. let. si tria bibatur.*

Tinea. Cum vino, vel si mixta sumatur aceto,
Vnà cum passa Coriandrum melque iugatum
Sedabunt varios: superaddita tritatum res:
Præcipuè testes tumidos iuvat hoc medicamen.
Illud semen ventrem stipare solutum
Fertur, aqua iunctum fuerit si sepius haustum.
Argentum spumam Ceri ista contere mixtam
Hu tritis succum Coriandri iunge & acetum
Quatuor his roseum miscendo iugabis olivum,
Ista terendo simul pretiosè in confuso unguen,
Quo sacros ignes pellas, calidosque tumores.
Si tibi difficultu confessio tanti a videtur,
Succus cum solo pr. deff commixtus aceto:
Et si fragmenti panis mundissima mica
Iungitur huic si co, sedat quemcunque dolorem.
Huic succo si innicta Faba sis. La farina,
Et superaddatur scrophus medicabit illis,
Et ceder servens emplastro pustula tali.

Scroph. A multis scriptum legitur, febris ante tremorem
Si tria grana voret Coriandri seminis ager,
Evadet si febre, cui dat lux tertia nomen
Præstat idem lectum Coriandrum manè, priusquam
Sol surgat, cervicali si subditur egri.

Febris testiana. Xenocrates scripsit totidem cessare diebus
Menstrua, quæ mulier Coriandri grana vorabit.
Afiduum quidam condemnat illius usum,
Nempe putant mortem quemvisque parare dolorem.

Menstrua. Traditis ita Coriandri facultatibus, superest ut
noxas ejus, atque alexipharmaca subscrībamus,
quæ Dioscorides hunc in modum lib. 6. cap. 9. prosequitur.

Uremia cum sang. Coriandrum propter odorem latere non potest: epotum vocis raucitatem facit, atque infaniam, qualis ex vinolentia proficitur, ita ut qui fumpere varia dicta pudenda blaterent: toto verò corpore Coriandri odor sese prodit. His post vomitionem oleo irino concitatum, uti relatum, iterum aut per se, aut ex absinthio potum auxiliatur: item oleum ovæque in eo extinguita [in id à suo putamine effusa, Lac.] si tepescita cum muria forbeantur. Sic & epota muria, & jus salsum gallinæ & anseris: passum quoque cum luxivo sumptum. Variat ab hac Dioscoridis lectione, versio Marcelli, maximè autem in his.

Bibuntur contra Coriandrum etiam ovorum putamina in seipsa confecta tritaque & cum muria diluta. Et hanc lectionem in qua cum aliis non convenit, ex Nicandro & Aegineta ita stabilire conatur, ut quæ Dioscorides ova xypodicta dicat, Paulus ova omni intrinseco humore vacua appeller, & non cum aliis intelligat, ova depleri oportere, & quod ex eis depletum sit, subigendum esse, & cum salugine sorbendum. Sed contra illi videatur, non quod in ovo claudatur, quærendum esse: sed depletis omni suo humore ovis eorum putamina cum salugine subigenda. Vtuturque ad hanc suam sententiam confirmandam his rationibus. Quod in constituendo ovorum usu Dioscoridi & aliis satis fuerit ovis uti præcepisse. Quod autem in illis usum plerumque habeat, anteriorem liquorem esse: & si hac magis, quàm illa parte uti voluerint, tunc vitellum, aut albumen seorsum impetasse. Hoc autem loco cum Dioscorides jubet depletis, i. e. vacuis ovis contra Coriandrum uti, putamina eorum succunda tantum imperet. In hancque sententiam etiam primùm traxit Aegineta, qui ova xypodicta dicit, id est, evacuata ova, & in se ipsa trita & inhaesta dixerit. Traxit & Nicander, qui in Alexipharmacis suis inquit: sepiusque gallinam mollem partem evacuant, spumam superinfundens, &c. Quibus cum manifestè jubere credit, gallinarum ova deplenda esse, depletisque his nihil lupercle, quod intelligi possit, quàm putamina. Accedere his ait communem quoque sensum, in quo auditis depletis ovis, nihil quàm putamen intelligi relinquatur.

Coriandrum in hunc usque diem etiam apud vulgares Medicos & Pharmacopœos vulgatum & antiquum nomen sibi servat. A Græcis quidem vocatur, *κόριανδρον*, & *κορίανδρον*: Lat. Conium, Coriannum, Coriannum, & Coliandrum: Arabib. ut Serapioni de temp. simpl. cap. 34. *Kusbar*: Avenho & Avicenna Glossographo *Kulbar*: Glossographo Hahabbatis Stephano, *Quesbar*, abis etiam *Cassbar* & *Kasbar*, *Alkabar* & *Kasbar*, & *Kasbar*: Laurentio Phyllo lingua Hebraicâ *Daybra* & *Dyabra*: Semen arabicè *Befar Culbar*: Aegyptiis *O. b. o. i. Aphes* & *Si Gad*. Germ. *Coriander*, *Coliander* & *Dangentis*: hoc est, Anethum cimum, vel Caricatum, ob foetorem herbæ, quæ contrita contritos cimices olet. Belgæ Germanorum appellationes retinent. Galli *Coriandre* appellant: Itali *Coriandolo*, *Coriandro*, & *Pisartima* Romæ, Tabern. Hup. *Culantra*, *Culatro*, *Culandre*, & *Culandr*: Portug. *Coeiro*: in Candia *Coriandro*: Angl. *Coriander* sive *Coliander* & *Colander*: Bohem. *Coryandr*: Poloni *Polskiepiers* & *Coriander*. Crediderunt aliqui, inquit Marcellus, è Græcis cimices nomen fecisse Coriandro, quod eos folia ejus oleant & caules. Et quoniam insectum hoc Græci *Corion* vocent, idèd olentem eos plantam *Corion* nominaverint. Sunt contra qui quod Coriannon Græci frequentius, quàm *Corion* Coriandrum vocent, non à cimicibus: sed quasi *Coriambion*, i. e. hebetantem oculorum pupulas, dictum fuisse velint. *Xiplo* enim oculi pupulam, & *epixiplo* hebetare iidem Græci dicunt. Quod quàm verum sit, peritiores intelligent. Ab antiquis enim scriptoribus nihil quod ad oculos privatim pertineat, in Coriandro decernitur. *Corion* appellatio omnium frequentior est in Dioscoride & aliis Medicis scriptoribus. *Coriannon* verò in communiori sermonis usu fuisse indicat in equibus suis Aristophanes.

Annotasse hic conveniat Coriandrum triplex esse, Coriandrum nobis absolutè dictum, quod C.B. majus vulgatum cognominat: Secundum Coriandrum minus, odorum; C. Bauh. testiculatum appellatum:

latum: Vltimum silvestre, in Hispania nuper repertum, licet Plinius l. 20. c. 20. & Theophr. 7. hist. c. 4. inter silvestria non inuenit scribant, & Dioscorides (ceu & alij veteres) unius duntaxat meminerit: attamen Nicandri scholiales sativum & silvestre proponit. De his igitur nunc dicendum.

CORIANDRVM.



RECTA & simplex tenuisq; est radícula, omnino paucis fibris donata, candida: caulibus bicubitalis & maior, gracilis, striatus, solidus: folia primùm Anisi, aut potiùs Petroseolini, progressu temporis tenuiter discantur, ut ad Chamamelina accedant, sapore sordido intolerabili cimum: umbellæ florum Petroselinipares, sed colore propemodum carneo, magis tamen ad album vergente,

quorum media foliorum pars quintuplo aut sextuplo reliquâ amplior est: semen exactè rotundum striatum, discipimentis intrinsecus distinctum, alioqui vacuum, odore & sapore gratissimo, aromatico.

Coriandrum, planta à nobis descripta, ab omnibus herbariis appellatur, excepto C. Bauhino, qui Coriandrum i. majus vocat, cui in calidioribus regionibus semina majora esse, & in viridianis Alexandriae ubique provenire, & Cusbarâ nominari tradit. Tragus l. i. c. 36. notat aniculas agri Metensis & Trevirensis hujus semen Anis / h. e. Anisum appellare: esse hoc Coriandrum antiquorum.

Coriandrum à cimum putore, aut potiùs Cicutæ fœtore viroso, & consimili facie nominatum testatur Lobelius, qui & Cicutæ similibus, ut Dioscoridem innuisse ait, viribus cognatum dicit.

Matthiolus cum Cornario Coriandrum omnibus notissimum scribit. Brassavolus præterea in hoc errasse, quod, cum nesciverit Coriandrum in Hetruria passim in pratis & campestribus suâ sponte nasci, asseruerit in suo simplicium volumine, sativum tantùm reperiri Coriandrum. Casalpino quoque incompertum fuit Coriandrum silvestre passim in Hetruria oriri, ut quidam testantur, nisi per Coriandrum intellexerit eam plantam, quæ vulgò Verdemarcum [Thalicttrum] appellatur.

Lug. p. 735. dicitur Coriandrum sativum Matthioli. Guil. Coriandrum, quod recens frigidum, exsiccatum verò calidum. Turn. Coriander.

Coriandrum ubique vidi in hortis florens mensibus Maio, Junio ac Iulio, quo etiam tempore semen maturabat. Lugduni & Genevæ in horto meo Novembri ex semine deciduo pulchrè virebat, ac etiam Ianuario, & florens Maio & Iunio.

Ex veteribus, Dioscoride, Plinio, Galeno, Avicenna & Simeone Sethi, vires ante scriptissimas, recentiores sequentia tradunt de iis. Matth. In Coriandri facultate indaganda Galenus produ-

Tom. III.

ctus est, ut longum sermonem faceret contra Dioscoridis sententiam 7. simplicium. Qua in re ei maximè refragatur Avicenna, qui in ipsum aperte invehitur lib. 2. c. 144. cujus verba etsi aliquid in se rationis ac veritatis habere videantur; tamen cum omnibus compertum putem, Galeno neminem adhuc parem extitisse, qui diligentius stirpium cum naturas, tum facultates investigarit, partim saporis gustu, partim odoris olfactu, partim substantiâ, & coloribus, partim denique ex longa experientia profundissimæ Philosophiæ conjunctâ, operæ pretium est ejus potiùs acquiescere sententiæ, quàm reliquorum omnium. Veruntamen Brassavolus in hoc maleit fortasse cum A. vicenna errare, quàm cum Galeno rectè sentire. Cæterum, quod Dioscorides auctor sit, Coriandrum sumptum mentem non sine periculo commovere, quodque alij tum ex eo, tum ex Mauritanis memoriæ prodiderint, ejusdem succum potum interimere; idè factum est, ut multi, quorum ego sententiam antehac secutus sum, Coriandri usum prorsus damnaverint. Sed id nunc certè mihi videtur injustè factum. siquidem Coriandrum mentem non commovet, nisi largiùs & immoderatè sumatur. Quid quæso mirum erit de Coriandro copiosius sumpto, si vinum etiam, cujus tamen est usus quotidianus, liberaliùs epotum, dolores, morbos graves, strangulatus & mortem denique inferat? quod si moderatè bibatur, præter alias utilitates, quas humano corpori præbet, ventriculum roborat, concoctiones adjuvat, excrementosa pellit, cor exhilarat, intell. ctum acuit, spiritus claros reddit & vivificat. Quare non equidem video, quid obftet, quo minis simili ratione credamus, tantum abesse, ut Coriandri semen noceat, ut etiam maximè prosit, si tamen parcè & medicè sumatur. Quippe ab ejus usu moderato non abhoruisse Galenum puto: nam lib. 8. cap. 4. de comp. med. sec. locos ex Archigene refert, rûlu acido al-

fectis Coriandrum cochlearis mensurâ exhibendum esse. Galeno autem apertissimè adtipulatur è recentioribus Græcis Symeon Sethi, utpote qui in Coriandri mentione scribat, id stomacho bonum esse, & eundem corroborare: ctum in ventriculo retinere, donec probè concoquatur. Quæ auctorem hunc de temperato Coriandri usu tradidisse, nulli dubium est. Ex his igitur facile colligamus licet, quod non sit admittenda, sed potiùs explodenda illorum recentiorum opinio, qui Coriandri usum omnino fugiendum esse censent: nos enim jam non omnem ejus usum, sed immoderatum tantùm vitandum esse existimamus. Semen tritum & recentibus carni-

bus aspersum prohibet ne putrescant tam citò, quàm solent, ætatis tempore. Ex aqua autem potum cæliacos juvat, & alvi fluxiones cohibet. Attamen semen in ciborum, aut medicamentorum usum admitti nunquam debet, nisi priùs tri-

duò aceto fuerit maceratum. Matthiolus præterea certum inquit experimentum esse ad immodicas vulnerum hamorrhagias, Coriandrum in tegula tostum & vulneri aspersum, desertorè Dioscoride, Galeno adhæret calidum statuente, quam controversiam componunt auctores adversarii in hunc modum sentientes. Coriandrum similibus, ut videtur innuisse Dioscorides, Cicutæ viribus cognatum. Cujus sententiam si accuratius subduxisset Senensis, non quidem jam commentator, sed Dioscoridis immetentis defensor, neutiquam tam multas satragines in suas paginas convulsisset. Quin potiùs quod solertis interpretis & candidi est, à veritate, Dioscoridèq; stetisset, neq; nostrâ

HISTORIAE PLANTARVM

delusa spectatione sic nihil docendo, elapsus abiit. Decur enim Medicum doctum hunc ad modum. Quia dixerat: Coriandri aut herbam totam, aut semen in usum ut plurimum venire: & ejus quidem aut aridi, aut virentis: neque tam multis rixis, sed multiplici experimento, & antiquorum certissima observatione, ejus expressum succum herbamve contusam, illitu tumorum fervores compescere; semen verò stomacho multis de causis proficuum, concoctionem juvare, vaporum sursum eruptionem, flatuumque impetum sistere, temperatæque qualitatibus alimentum esse, unde sanguinis, feminisque incrementum, ac ne quidem correctum prodesset, ne tantoperè averterentur illud meticolosi isti declamatores: cum quisque pharmacopœorum, aut etiam è plebecula quotidianis epulis aut medicamentis correctum misceret, nullo inde percepto no-
Tumores.

Tumores.

cumento. Plerumque etiam illud saccharatum officinarum, neutiquam correctum est: nisi putes saccharo, igneque: igitur non aceti frigidityte, sed potius feminis siccitate & tenuitate, virus, scitidumque spiritum abstergi putandum. Rationis subdudtio igitur hæc est: Coriandri herbam præsertim succo frigidam esse, adeoque nonnullis in locis, Arabum testimonio, ejus succum epotum exitio esse, quod de Hiulca recentiores etiam exploratum habent: Herba nempe velca & boni alimenti, cujus succus hominem necat. Quapropter & sacris ignibus illitus reprimet succus inflammationem, exceptus medullâ panis polentâ, quam Galenus haud rejicit, ut qui libello de paratu facilibus, ex antiquis doceat hordei farinam polentam panemve & similia addi solita, non tam quò agant, quam ut agendorum succorum vires excipiant. Tametsi videntur eam juvare digerendo, & siccando, ut hordæacea, aut etiam demulcendo, ut medulla. Atque hinc responso eruenda objectioni de strumis: multa namque sunt non calida, quæ strumas incipientes discutere valent: eoque hic farinam fæcæ Fabz addi vult Dioscorides, tum excipiendo medicinam, tum etiam juvando actionem: Digerit namque Fabz, cumque Coriandri succo mixta moderatè repellit exsiccano: quâ etiam vi testium phlegmonibus opitulatur: sicca enim optimè id præstare, modò modicè refrigerent & discutiant, præsertim initio, methodus Galenica docet: sic Plantago etiam Dioscoridi, sic capilli veneris strumas discutiant. Et hæc Adversaria. Galenus igitur acerbissus in Dioscoridem invehit, cumque vehementius agit, atque inlestat, quòd Coriandrum cum pane, aut polenta erysipelas curare illitu tradiderit: neque quodnam erysipelas curet, manifestaverit. siquidem plures hic tumor habet differentias: quarum ratione variam curationem fieri necesse est. debuisset enim
Ignis sacer.

Ignis sacer.

ad dicere Galenus, authorè Maranthâ, illud erysipelas sanitati restituere non posse, quòd jam planè refrigeratum est. quia ei, quòd verè est erysipelas, nempe inflammatum, & flavum, ut in principio esse solet, non solum non curaret, sed potius intensius redderet. Hic igitur morbi tempus declarari à Dioscoride desiderat: quia nimirum pro temporis varietate, causa etiam morbum procreans varia fit. Innosium esse Coriandrum Lobelio contra Sethi certum se habere asseruit D. Dionysius Thomas Lusitanus apud Antuerpienses Medicus, qui eam virentem Cerefolij & Selini ritu iusculis suis & suorum inseruerit, nullo percepto incommodo. Tragò, semen Coriandri per noctem vino, vel aceto maceratum, rursusque desiccatum, stomacho in primis confert, venenatas enim ejus exhalationes, ne caput tentent, reprimat: quare ex Coriandro pro stomacho præstantissimus pulvis confici potest, qui tamen pro voluntate cuiusque communicetur,
Dissepatrocinum.

Dissepatrocinum.

& vel saccharo conditur, vel non conditur. admonendi sunt hoc loco Sepalsarij, ne semen cuiquam, nisi prius eo, quò diximus, modo præparatum (ut isti loquuntur) fuerit, vel cum saccharo vendant, nisi venenum loco remedij exhibere velint. Coriandri semine subtrito cum aceto, caro salis non solum à tarmis [ferre timeo] sed & fastore vindicatur, & longo tempore odorata conservatur. Hæc Tragus, cui eadem stat de Coriandri venenatâ facultate, quæ Matthiolo sententia, proindeque ei eadem quæ huic debetur ex Lobelio responso. Empir. V. Virtembergicus capitis defluxione laboranti, post cibum accipienda præcipit 20. aut 30. Coriandri grana pulverizata & cum saccharo permixta. Ego tamen hoc medicamentum propter malignam vim, quæ Coriandro à multis, dubio procul non absque experientia tribuitur, potissimum non præparato, non temerè utendum discerno. Coriandri folia odore ingrato ac pertinaci miratur Casalspinus in Hispania expeti in cibis, tum cruda, tum cocta, quæ in Italia vehementer sentent. Dixit gentes hoc cibo quidem somnum conciliant, sed capitis gravitatem & vertiginem sibi excitant. Scribit Camerarius ex Coriandro oleum destillari, ex quo fiant tabellæ cum saccharo, ad podagraz præcautionem: catharrus enim siccatur.

De Coriandri facultate venenata, si placet, audi Alpinum de plant. Egypti. c. 4. itemque Guilandinum sic conferentes. Alpin. Vbi que in viridariis Coriandrum provenit copiosissimum, quod omnes Cusbari appellant. Herbæque virentis usus in cibo est apud omnes Egyptios familiarissimus. Etenim ferculum non parant sine folijs Coriandri, quamquam ingratis oleat. Guill. Quid audio? nonne ipsi sum mandentes maximè leduntur, & ab ejus usu in phrenesim labuntur? quod Dioscorides, Avicenna, tum multi alij tradiderunt. Alpin. Ridiculum. quis unquam vidit aliquem, Coriandrorum causa (quæ in usu apud quosque tum sanos, tum ægros familiarissimo existunt) læsum fuisse, aut ei aliquos sensus turbatos, nisi immoderatè eis fuerit usus? quid miraris? quasi ejusdem cum Galeno non sis sententia, qui Coriandrum calidum, resolvers ac modicè adstringens statuit. nonne demonstrat Dioscorides vel hanc ejus facultatem fateri, cum dixerit, charadæ Coriandro cum lomento sanari? Quod nunquam à frigidis frigidi tumores discutiantur, ac curentur, cum medicamenta aliàs à Dioscoride ad sanandos viros tumores charadæque præsertim memorie prodita, calidâ facultate fuerint. Neque videtur planè hoc siluisse Avicenna, cum dixerit, charadæ Coriandro sanari, vel ex proprietate, quam ad illum sanandum tumorem habet, vel ex partium substantiæ tenuitate, quâ permeat profundè tumidam partem. Sed quis ignorat nihil à frigido resolvi, etsi multa fiat permeatio partis tumefactæ, sed omnia res solventia calida esse? Guill. Veram sententiam rectè defendisti, quam quis modo negabit, sciens ex te Egyptios virentem Coriandri herbam in cibo sequi citi aliquam noxam? multò minùs feminum siccatorum virus erit exinde timendum. Hincque er-
Flat.

roisse non parum Arabes liquidò constabit, qui Coriandro frigidam facultatem narcoticam, stuporem inducentem, atque sensusurbationem concitantem, ac exitum tribuerint. Herbam in aqua elixatam illi escant. Sed eâ multò plus femina ad roborandum stomachum valere ij affirmant, debiles enim ventriculos, usu feminum assiduo maximè roborant, ejusque calor ipsâ fovet, argente, flatuque resolvunt, ac discutunt, proindeque in colico dolore, atque aliis à flatulento spiritu concitatis usum feminum sequuntur ipsi: ipsi sc. vel in pulverem reductis, vel ex ipsis parato decocto, utentes.

Quo

Quo utri quoque frigiditatibus & humiditatibus occurrunt: præsertimque ad menses immodicè fluentes, & ad gonorrhœam firmandam, quod instilli quoque facultas adstringendi, ex quo puto apud eos plantam quoque emplastri modo, ad podagricos & alios articularum dolores in maximo ibi esse usum, quod eas partes adstringere, ne humorem partes recipient, roboret, atque etiam contentos resolvat, discutiat, vel exprimat. Confectum Coriandri vocatur Coriandrum saccharatum, vel saccharo obductum, quod parabis hoc modo. Recipe Coriandri, à sordibus, pulveribus, festucis, lapillis, & pediculis, cribrando; ventilando & seligendo repurgati & ab omni humiditate exsiccati lb. ij. Ponantur in zneum vas pensile duabus ansis suspensum, & super carbones hinc inde, antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum agitentur: nunc in orbem volvuntur, nunc instar Avenæ, in vannis moventur, donec calefiant. Calefactis infundatur parum sacchari, ad debitam, & quodammodo perfectam consistentiam, i.e. propemodum ut ad morulos & orbiculos cocti cochleari ferro non procul ab extremitate perforato, & continuo agitentur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affundatur, ut prius, idque tantisper fit dum iustum acquirat magnitudinem, quæ in duplici differentia consistit. Nunc enim tam crasse saccharo obducitur semen hoc, ut Pisi hortensis magnitudinem vel etiam maiorem acquirat. Nunc quam parvisimè saccharo circumdatur, & in officinis Coriandrum primâ tunicâ nuncupatur. Superficies plerumque lavis est, nisi singulari artificio superior, seu (ut vulgo loquuntur) crispa sit, videlicet ex alto saccharum fundendo. Si materia conglabatur, vel saccharo confertim infuso, vel negligenter moto, manu affricatâ dissolvuntur nodi. In fine conficitur exactè siccetur: deinde in locum calidum & siccum cribro imposita reponantur. Coriandro primâ tunicâ præcipue utitur in medicina ad trageas grossiusculas conficiendas. Per se & absque aliis rebus usurpatur utiliter ad confortationem capitis, cerebri & memorie. Medetur vertigini post cibum sumptum dimidio cochleari. Paralyti jejuno stomacho comestum, & post prandium & cenam devoratum. A cibo usurpatum corroborat ventriculum, officium ejus superius claudendo, quare scdat vomitum, fastidiumque ciborum, præcipue autem post febres, concoctionem adjuvando. Corrigit anhelitum fatentem, præcavet ebrietatem, inducit somnum, dolorem ventriculi à flatibus concitatum curat: venerem extinguit: humiditates absorbit, ubi os aquâ & sputo abundat. Admodum vulgare est Coriandrum saccharo largius obductum in conviviis, commellationibus, & comotationibus nocturnis. Multum commendatur à Marcello Empyrico & Nicolao Myrepsolo Mulla coriandrata in apostematibus & pleuritide: sed neuter eorum confectio nem ejus docet. Cui itaque animus est parandi hanc, is præparaturum Coriandrum, ut monet Tabern. prius in aqua coquet, ac octo partibus aquæ colatâ partem unam mellis immiscebit, post igne lento ad consumptionem dimidiæ partis ea simul decoctur, de spumaturus, ac cocta colaturus ad usum. Coriandri decoctionis aqua laudatur in quolibet alvi profusio, etiam vomitione assidua conjuncta, Cholera morbus dicta. Conducit in calidis capitis affectionibus sicut & in aliis, in quibus vinum haud cœceditur. Hæc, Cinnamon aqua loco pauperibus concedatur, quibus fortuna Cinnamonum perfolvere denegavit. Paratur autem hoc modo: Accipitur Coriandri præparati unc. semis: Aquæ fontanæ lb. viij. Coquantur hæc in vase stanneo bene obturato, alteri vali aqua pleno imposito, ad quatuor

horas. Ab igne verò remota & frigidificata colatur, & frigido loco reponitur ad usum. Quidam saccharum addunt, alij verò uvas passas, utrumque pro cuiusque libitu. Herba Coriandri aquæ stillatrici val. *Ag. Alikan. raderba.* lius ferè est usus, nisi in extrinsecis quibusdam affectionibus, seu dolore oculorum pullatorio, guttatim nonnunquam instillare. Quod medicamen efficacius redditur, si lac muliebre immisceatur. Linteolum quoque in hac madefit, & tepidè superponitur. Fit autem hac ratione. Herbam ac unâ caules collige cum maximè floret: inciduntur omnia simul minutim, & in Balneo Maris distillantur. Coriandri feminis aqua stillatitia maximè salubris est in hepatis apostematibus, uncia pro dosi cum alia conveniente permixta & epota. Potest etiam aliàs ejus usus esse ad prædictos affectus. Epithematibus cum aliis inservire potest. Hanc ita parabis. *Semenis.* Coriandri præparati $\frac{3}{4}$ viij. Contunde crasso modo, affunde lb. v. aquæ limpide: macera in Balneo Maris alembico cæco cocto, horis octo: dein igne lento per cineres alembico vitreo distilla & reperies aquam saporem & odorem Coriandri repræsentantem, si in sole, ut moris est rectificetur, seu memorie prodidit Tabern.

CORIANDRUM MINUS
odorum.IM A folia habet *Desf.*

Immutius incisa, & semen habitus, copiosius in pluribus spiritibus percumbentibus cauliculis: aliter in horto Iacobi Plateau exoticarum stirpium avidissimi, teste Lobelio, cujus iconem hîc pictam datus, iuxta quam tamen posuimus parvam plantam, florem & semina Coriandri nostri communis.

Huic Dod. in fol. *Synon.* lat. titulum fecit Coriandri altera icon. Lob. in Obs.

p. 404. in Icon. p. 706. Coriandrum alterum minus odorum; Lobelij, Lugd. p. 735. Bath. phyt. Coriandrum 2. Apud Matth. & pin. Coriandrum 2. minus testiculatum: Coriandrum 2. in odorum, Tab.

CORIANDRUM SILVE-
stre.

Silvestri Coriandro radix est singularis, tenuis, nō *Desf.* Saltius demissa, cui radicez aliquot tenues adnascuntur. Hæc caules multos edit, quinque angulis constantes, solidos, geniculatos, ramuli in certo ordine similiter solidi è singulis geniculis prodeunt, folia ferentes summis prioris Coriandri foliis similia, sed minora, in quorum cacuminibus umbellæ veluti in altero Coriandro, floribus ex purpureo candidantibus, refert. quibus discussis semen oritur rotundum, id peculiare habens, quod in singulis pediculis duplex sit, atque unum alteri junctum. Odor totius plantæ gravior, quam lativi Coriandri, & caput magis tentans.

Symon.



Nicandri scho-
liastes in Alexi-
pharmac. silvestre
hoc Coriandrum
fativo simile de-
pinxit, sed latiori-
bus foliis, & multo
longius, multa ha-
bens adnata, mul-
tisque flores. Cu-
jus cum latiora fo-
lia esse dicat, foli
naturæ id tribuen-
dum censet Myco-
nus, qui minora
hujus folia depin-
xit referente Dale-
champio.

Lugd. hanc pi-
ctam dat p. 736. ti-
tulo Coriandri sil-
vestris Myconij,

ceu & Ponain Baldo. Bauhin phyt. & pin. Corian-
dum 3, silvestre vocat; apud Matth. Coriandrum
silvestre nuper in Hispania repertum.

Clarum itaque jam est dari Coriandrum silvestre,
licet Plinius inter silvestria inveni neget. Nos non
vidimus, habemus tamen munere Doct. Jac. Zving-
geri Coriandrum silvestre.

Locum.

Nascitur locis quadantenus siccis, marginibus &
limitibus terrenis. Vberius tamen pullulat & altius
adolefcit Solo humidiora.

ANISVM VETERIBVS ET IN
genere. CAP. XL

Descri.



ANisi folia pri-
ma longis hæ-
rent pediculis, sim-
plicia, aut trifida,
circūscriptioe ro-
tunda, profundè
ferrata, uncia ma-
jora, albicantia, o-
dorata, superiora
Petroselinii foliis si-
milia & tenuiter in-
cisa. caulis rotun-
dus, concavus, apic-
cauli similis, hirsu-
tus, non nihil stri-
atus, è cuius genicu-
lis rami enascun-
tur multi, Corian-
dri modo, quorum
extremis hærent
umbellæ latæ, mi-
nutis candidisque

floribus constantes, ad Pimpinellæ Saxifragiæ flo-
res accedentibus: semen parvum, minus quàm Ci-
cutæ, colore ferè cinericeo, odore ac sapore gracissi-
mo, dulci, cum jucunda quadam acrimonia: radix
gracilis, inutilis, modò simplex, modò multifida.

Anisum semen est Cæsalpino Fœniculo minus,
veteribus indelcriptum, sed nihil leciùs vulgo no-
tum. Quam ob rem ejus historiam longiori sermo-
ne prosequi, non est operæ pretium. B. pin. Ani-
sum herbatorum, majore semine & minore, quod
& apud Bohemos habetur.

No. na
linguat.

Græce vocatur *Ἀνίσον*, *Ἀνίσον*, & *Ἀνίσον*: Latine
Anisum & Anesum omnibus authoribus, solo ex-
cepto Eustachio Roësin, cui Absinthium dulce &

Hier. Braun schveig, cui Fœniculum Romanum, &
innominato quodam, cui Cuminum dulce (q. e.
Germ. Süßer Bummel) & Fœniculum dulce (q. e.
Süßer Fenchel) dicitur. Plinio tamen Anicetum
pro quo fortè Brunfell. in herb. germ. malè legit A-
nacetum. Arab. apud Serap. lib. simpl. c. 242. *Anesum*,
Anesim & *Anesum*, quæ appellationes dubio procul
à Græcis mutuatae sunt. Hilabbaui Dr. *fatim* & *Abie-
zarum* ejus verò Glossographo Stephano *Nizatum*,
Orezatum & *Anesissum*: Ger. *Anis* & *Enis*: Belg. *An-
nyse*: Gall. *Anis*: Ital. *Aniso*, & semen ejus *semenze d'An-
isi*: Hisp. *Mataholva*, *Metaholva*, *Marhalva*, *Mar-
lahuga* *Terva dolce*, *Terva buona*, & *Anise*: Angl. *Anise*
& *Anyse*: Boh. *Anis*: Poln. *Anys*: Hung. *Anis*.

Ceterum, ut nostrum sequamur institutum, non
est à nobis silentio prætereundum, malè quoddam
apud Dioscoridem capitis principium de Aniso,
quod inter nothas appellationes aliqui Sion vo-
cant, cum sine prioris capitis de Sione commixtum *Sion*
esse, quod ad historiam attinet. Nam si eadem est
herba Sion & Anisum frustra diversæ vires eis affi-
gnantur.

Anisum vulgare, quod quidam in Candia Glyca-
nison vocant, diversum inter alios ab Aniso Græco-
rum Silviu esse statuit.

Sunt, ut refert Levin. Lemnius de herb. Bibl. c. 47.
qui Anethum, quod Christ. Matth. 23. concioni ad-
hibet, malè Anisum credant, quum sui generis her-
ba sit.

Anisum vocant Coriandrum dictum aniculæ A-
gri Metensis & Trevirensis.

Ex Orbe Atlantico inter alia apportatur lignum
quod Anisi odorem ita spirat, ut Anisi lignum, teste
Goropio, *menio* nuncupetur.

Anisi saporem, nostro judicio, refert Sassafras.
Zingri fructus stellatus Anisi sapore, dicitur Ani-
sum Philippinarum Insularum Clusio. De his tribus
proximè nominatis, consule lib. 4.

Sed ne quid intactum, relinquamus, substituta
annotemus. Avicenna quidem pro Aniso & Dau-
cum, & Sampsucum substituit.

Sed & Anisloco secundum Avicennam à Mona-
chis diit. c. 255. Carvi ponitur.

Nunc si natales quasas, in Creta, Syria, Egypto,
aliique Orientis regionibus feliciter gignitur: Scri-
tur quandoque in Angliæ, Silesiæ & Germaniæ hor-
tis, ubi Julio ac Augusto floret, ac semine prægnans.
Montpelj floret Maio. Genevæ habuit sapius in
horto suo Moletus pharmacopæus, sed femine te-
ruiore, quale fuit, quod nobis Montbelgardi in
horto E. C. provenit sapius difficilè maturelcens. ad-
fertur enim ex Germania Anisum minus plenum,
quod magis acerosum & minus aptum ad extrahen-
dum oleum.

Superest, ut deinceps de Anisi viribus disera-
mus. Anisum igitur, ut præcepit Dioscorides, in uni-
versum vim habet exaltaciet, de, exsiccandi [*Exaltaciet
ver. mittit.*] odoris halitum [*Exaltaciet græcè legi-
tur, quam vocem sic Plin. reddit & ei insecutus Ruell. &
Sarrac. At Corn. ex eum secutus Dalech. facilem spirac-
tionem vertit. Et sanè utriusque intelligi posse videtur.
Nam & asperam arteriam repergendo, spiritum facilem
reddat: & odore suo e. ndem in iudis m. efficit. Corn.*] ju-
cundior faciet di, dolores manguandi [*sedandi Da-
lech.*] digerendi [*discutiendi idem ex Corn.*] urinam
ciendi, ac denique discutiendi, dissipandique [*dis-
fundendi Corn.*] Hydropticis potum hum arect. Pro-
sistit ad venenata animalia, & ad ir. fationes. Al-
vum & album mulierum profluvium sistit. Lac ad Lac-
mammas elicit, & venerem stimulat. Suffitum nar-
bus dolorum capitis sedat: tritum & cum rosaceo in-
stillatum aurium medetur ruptuiis. Præstat autem Del-
quod recens est, & plenum & non fursurosum,
odore

odore validum. Principatum obtinet Crecum. Secundum locum tenet *Ægyptium*. Hæc Diocorides, quæ particulatim & pluribus videri desiderat. *Plinius*. Anisum adversus scorpiones in vino bibitur, Pythagora inter paucalaudatum, five cratum, five decoctum. Item viride, aridumque omnibus quæ conduntur, quæque intinguntur desideratum: panis etiam crustis inferioribus subditum. Saccis quoque additur. Cum amaris nucibus vina commendat, quæ ipsum oris halitum jucundiorum facit, faetorem quoque tollit manducatum maturitum cum Smyrno, & melle exiguo, ore mox vino colluto: vultum juniorem præstat. Infornia levat (supersumum in putino, ut dormientes olfaciant. Appetentiam ciborum præstat, ob has causas quidam Anicetum id vocare. Dolores capitis levat fufumum naribus. Epiphoris oculorum & vino radicem ejus tufum imponit. Tollas. Ipsum cum Croco pari modo, & vino, & per se tritum cum polenta ad magnas fluxiones, extrahendique, si qua in oculos inciderint. Narium quoque carcinodes consumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle & Hyssopo & aceto gargarizatum. Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat tostum cum melle sumptum melius. Cum acetabulo Anisi fuces amaras L. purgatas terre in melle ad tussim. Facillimè verò Anisi drachmæ tres, Papaveris duo miscebuntur melle ad Fæbe magnitudinem, & ternis digitis fumuntur. Præcipitum autem est ad ructus, ideo inflationibus stomachi & intestinorum torminibus, & cæliacis mædetur. Singulas & olfactum, decoctum, potumque inhibet. Folis decoctis digerit cruditates. Succus decocti cum Apio olfactus sternutamenta inhibet. Potum somnum concitat. Calculos pellic. Vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum vitium, nervis quoque, quibus succinctum est corpus utilissimum. Prodest ejus & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud utilius ventri & intestinis putant debet dysentericis, & in tenebris datur tostum. Aliqui addunt & Opium pilulis in die ternis Lupini magnitudine in vini cyatho dilutis. Diebus & ad lumborum dolores succo usus est. Semen hydropicis & cæliacis dedit tritum cum Menta è vino, radicem ad ternes. Daliom herbarius parturitibus ex eo cataplasma imposuit cum Apio: item vulvarum dolori. Deditque bibendum cum Anetho parturitibus. Phreneticis quoque illiunt, vel recens cum polenta. Sic & infantibus comitale vitium aut contractions sentientibus. Pythagoras quidem negat corripit vitio comitali in manu habentes. Ideoque quamplurimum domi ferendum. Parere quoque facilius olfactantes. Est statim a partu dandum potui polenta aspersa. Somenes contra omnes duntias ex aceto misit est eo: & contra lasitudines in oleo decoquens addit nitro. Semine ejus poto, lasitudinis auxilium viatoribus foppor dicit. Heracles ad inflationes stomachi semen tribus digitis cum castorei obolis duobus ex mullo dedit. Similiter ad ventris aut intestinorum inflationes. Et orthopnoicis, quod ternis digitis apprehenderit feminis, tantundem Hyosciami cum lacte asinino: multi vomituris acetabula ejus & folia Lauri decem trita in aqua, bibenda inter cenam suadent. Strangulationes vulvæ, si manducetur, & linatur calidum, vel si bibatur cum Castoreo, in aceto & melle. Verugines a partu cum semine Cucumeris & Lini pari mensura tertium digitorum, vini albi tribus cyathis discuit. Teopolemus ad quartanas ternis digitis feminis Anisi & Feniculi usus est, in aceto & mellis cyatho vino. Lenit articulares morbos, cum amaris Nucibus illitum. Sunt qui & aspidum venenis adversari naturam ejus putent. Vrina autem ciet. Situm cohibet.

Venerem stimulat. Cum vino sudorem leniter praestat. Vestes quoque à tinea defendit. Efficacius *Dele. Sme.* semper recens & quo nigrius. Stomacho tamen inutile est præterquam inflato. Hæc Plin. l. 20. cap. 41. Qui libro præcedenti 19. cap. 8. Anisum eum & Anthemum culinis & medicinis nasci dixerat. Licet autem Dalion apud Plinium præscripserit radicem parturientibus, nos tamen nihili facimus, esse enim tenuis radix, & nostro judicio inutilis. Quid si Dalion aliquam aliam radicem intellexerit? Nos id facile credimus, Solomenis remedium orthopnoicis, Anisum sc. cum Hyoscyamo fore proficuum. Si mulier nolle velitar cœceptura sit, Anisum ex aqua quam tenuissimè tritum, Hippocrate præceptore, bibat & dormiat. quod si quidem pruritus circa umbilicum eam corripiat, concipiet: sin minus misimè. Prodest, referente Simeone Sethi ad verustas ex frigore jecoris affectiones, & ad spirandi difficultatem, quæ ex pituita proficiscitur. Flatus, qui in ventriculo sunt, digerit. Obstructiones tollit, & lactis copiam facit. Galeno l. 6. de simpl. m. d. facult. autore, Anisi semen maxime utile est, ac re & subamarum, ut prope ad uterum accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo. Proinde & urinam ciet, & digerit, & flatus ventris reprimat. Hæc Galenus, cui consentit Paul. Ægineta l. 7. Nos Anisum quod in Gallia & Germania provenit minus calidum existimamus, quam Galenus tradat, & potissimum germanicum. * Alio non inficias imus temperamenti hujus varietatem ex natali Solo dependere. Cum & Dioscorides & Plinius Creticum ratione loci principatum obtinere dicant. Galeno Anisum calidum & siccum esse in tertio. Verim id, quod in Anglia utimur, inquit Turnerus, non ita calet: Quare suspicor esse melius quoddam genus, quàm quod venale communiter ad nos affertur, etiam si interim utendum nobis est hoc vulgari, quod mihi videtur vix calidum in initio secundi gradus. Galenum, ut contendit Lugdunensis, de Aniso in Syria aut spontè alibi in regionibus calidis nato loquuntur esse æstimandum esse. Magni fuit olim Anisum antiquis, inquit Lob. in Adv. præsertim Pythagoreis: non modò quia cibi appetentiam revocaret, unde Anisum & Anicetum dictum putant, sed ut verissimilis sit animæ præparatio, unde, remittit & laxat tensiones flatulentas internas & externas. Et facit nullum è cæteris flatum emittentibus oleaceis feminibus gratius esse ventriculo, minus habet acrimonia, aut plus suavitatis, quàm illud semen, quod neutiquam, ut ex Dioscoride Galenus arbitrat, tertio gradu hodie gustanti apparet calidum: nisi quia ruri ardè, aut nulpiam apud nos vultur, in hortis verò ubique gentium etiam Septentrionalium, ut Germaniæ & Angliæ provenit, cultu & Solo non nihil deponat caloris. Anisi fœnem recens melius esse, plenum non furfurum, odore præstant, inter prima verò laudatum esse Creticum, proximo loco Ægyptium, ad triennium usque non infècac restat Apollon, dicens: In siccando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo flatur ex Galeno. At Avicenna duplici errore, in secundo siccum dicit ex utroque, etsi qualitatem radio relidit, hoc pacto scribat Dioscorides. Anisum v. summa calfacit, exsiccat, & id amarum fecit Galenus, propterea nostrum esse *ανισον*, i. e. dulce Adnarij, crediderunt non ulli, quum nostrum furfurum nunquam fit. Attractionem vaporem Anisum bullitum per nares, sedare sodam [frigida videlicet, i. e. dolorè capitis frigida] perhibet Bayrus. Semen Anisi vim soddam obtinere scribit Tabern. calfacientem, siccantem, & diffusivèntem, tam intrinsecus, quàm extrinsecus: nec tam præterea rare in usum venire, radicem, tanquam nullam, nunquam. De femine hæc tradit.

Vfur-

HISTORIAE PLANTARVM

...folium in medicina, verum etiam in culina a quibusdam Germanis ut olim apud priores. Multeque nostrae pinifunt herba in panem, ex quo discoctum parant. hoc enim non solum saporem gratum communicat, sed ob id etiam panitiliter concoeditur: quippe in inflatione ventriculi, henis, & intestinorum: similiter in dolore laterum & renum; itemque ventris torminibus, colica, hydropse, omnibusque frigidis jecinoris affectibus, & obstructionibus, in lapide renum, in sterilitate seu infecunditate mulierum. Cibi Aniso concocti non absque commodo propinquantur vertiginosis, & catarrhis frigidis laborantibus, ex cachexia, ictero, hydropse & aliis supra enarratis affectibus. Confectum Anisi, Anisum scilicet saccharatum, vel saccharo incrassatum urinam movet, digerit, flatibusque ventris discutit, oris halitum commendat, aliaque plurima praestat. Maxime autem hujus usus intempestivus est, in conviviis & comotationibus luxuriosis; & voluptuosis, tam apud pauperes, quam apud divites. Fit autem hoc modo. Semen Anisorum optime mundatorum lbij. Inde in vas aeneum pensile, ut in Confecto Coriandri, & super ea infunde saccharum lavis coctionis in principio, & bene manibus duc per vas aeneum, ulque fere sint cooperta, beneque exsiccata ad omnem mantum sacchari: & hoc continua ulque in finem, si solidos, seu laeves Anisos facere velis. Si vero asperos & crispas, postquam cooperta erunt, affunde saccharum cum cochleari ferreo, abalto, in & sit fortis coctura: deinde vas hinc inde agita, ut in Coriandris est dictum. Anisi quantum minores, tanto pulchriores: & quantum duriore, tanto laudabiliore. Duri enim sunt & non solum Anisi, sed & cetera alia confecta, si bene siccantur ad omnem sacchari affusionem. Aqua stillatitia florum Anisi conducit in omnibus iis morbis, ad quos semen per se commendatur. Facies hac mediocriter lora, & per se resiccata, clara redditur: immoderate vero adhibita sublavum & morbosum inducit colorem. Ejus etiam in epicheaibus usus esse potest. Aquam est florculis ita parabis. Anisum florens collige utrumque cum foliis & caulibus. Incide omnia minutum, distilla in Balneo Mariae, rectificaque in sole. Si fortius desideras, contunde seminum uncias 3, affundendo aquae hujus libras tres aut quatuor, progredere ut in aqua Coriandri componenda te docuimus. Anistites, vel Anisatum vinum, ut Feniculatum faciendum. Laudatur in omnibus affectibus, quibus semen ipsum medetur. Constantinus l. 8. c. 5. de Agric. si semen Anisi vino inditum sit, id succurrere urinae difficultati, omnibus intestinis conducere narrat. Anisata multa dupliciter fit. Vel enim semen crassulculè contundatur, & una cum mulla fermentari sinitur. Vel semen prius in aqua, & qua mulla paranda coquitur. Admodum utilis est longo tempore tussentibus, difficulter spirantibus, itaque raucitati. Calfacit pedus & pulmones, medeturque earundem partium frigidis affectibus. vires quoque easdem obtinet, quas vinum. Pro iis, quibus vinum morbus denegat, aut pro abstinentiis, aut etiam pro iis, qui vinum per se bibere non consueverunt, paratur Anisi decoctionis aqua, eo modo, quo Feniculi, accipiendo tamen pro uncia seminis libras octo aquae, quae coquantur in vase duplici. Dianisum recipit sem. Anisi 3. ij. s. Glycyrrhizae, Mastice, singul. 3. l. sem. Carvi, sem. Feniculi, Macis, Galangae, Zingiberis, Cinnamonis, singul. 3. v. Piperis nigri, albi, longi, Cassiae lignae, verx, Pyrethri, Calaminthae, singul. 3. ij. Cardamomi majoris, Caryophyllor. Cubebar. Croci, Spicae Indicae, singul. 3. j. semis. Sacchari albi 3. j. Mellis despumati quantum sufficit. fiat Electuarius. Intemperiem frigidam ventriculi a pituita cruda, vel etiam flatibus la-

nat, & tussim diuturnam a frigida causa genitam, Melus. Trochisci de Aniso sicut et ol. stutibones Trichheparis, & alios ejus morbos, & inde natus febres antiquas. Eorum compositio haec est, Anisi, succi Eupatorii, singul. 3. ij. sem. Anethi, Nardi Indicae, Malliches, Folij, fol. Absinthij, Alur, Apij, Amygdalarum amararum, singul. 3. semis. Aloës, 3. ij. Syr. Absinthij, quantum sufficit, formentum trochisci, siccandi in umbra. Anisi feminis extractum potest dare unius scrupuli, cum vino, aqua Anisi, aut aliquo alio convenienti liquore propinatur in iis morbis, quibus semen. De Anisi decocto, sale & oleo, vide Querc. defens. Herm. c. 21. Nos in doloribus ventriculi a flatibus & pituitosis humoribus ortis, Oleum Anisi magni facimus, exhibitum cum juleculo, modo pauca dentur guttulae, tres scilicet, aut quatuor, quod tum in nobis sipsis, tum in aliis sumus experti.

Decoctum quoque multum aestimamus, & pluris facimus, si febrile quid morbo conjunctum sit. Aquam etiam, quae parando oleum extrahitur, multum probamus. Colicos cruciatus quos non potuit sanare, oleo chymico Anisi perlanavit Heurnius. De sale Anisi haec scribit Tab. Herbarum semen & radicem exsicco, comburo, & ex cinere la. salem elicio. Vultus adhibetur in hydropse, opilatione renum & vesicae, per se, aut cum aliis medicamentis permixtus.

VISNAGA MINOR QVORVNDAM, Selinum peregrinum Clusio, femine hirsuto.

CAP. XLI.



Caule surgit cubitali, striato, tenui, meduloso & ramoso. folia cujusmodi Pastinacae Germanicae silvestris primò provenientis, vel Sanguisorbæ, aut Saxifragiae hircinae minoris, vel Cauliculis majoris & minoris, vel ut ait Clusius, Coriandri, ex duabus, tribus, quatuorve foliorum conjugationibus, unòque impari ad costam hirsutam alligatis componitur: singularia vero folia, subrotunda, aspera, subhirsuta, potissimum infera parte, profundè circumquaque serrata, pollicis unius, aut duorum latitudine, per terram strata: folia vero per caules accedunt ad Ammi folia vulgaris majoris. Folij sapor non nihil aromaticus cum acrimonia. umbellae parvae ex muscularis iraequalibus contextae, florculis minimis, quae coeant quinquè foliis bipartitis singulis, & apicibus albis, vel ut dicit Clusius, candidantibus: semen exiguum, sublongum, hirsutum duplex, Apij vulgaris officinarum semini fere par, majus quam Ammi minoris, vel Clusio autore, Petroselinum vulgaris simile, gustu acti, odorato, Clusio aromatico: Radix illi alba, oblonga Pastinacae Germanicae, vel Apij hortenlis, cum nervo in medio, sapore valde ingrato, acii, Clusio odorata, Selini sapore.

Clus.

Clusipp. & hist. Selinum peregrinum i. Czfl. 7. c. 57. Saxifragia 3. quam exilitate fortè dici posse Cumminum silvestre primum Dioscoridis. At enim ante cap. 13. ejusdem libri posse pro Cumino Dioscoridis silvestri semen hirsutum ostendi, quod verius acerosum dici possit, ut ejus quæ inter Saxifragias numeretur, exili semine, ut Amœus, valdè hirsuto, & vehementis acrodis. An idem loco priori jamjam citato hujus Vlsnagæ varietatem intelligit, per Saxifragiam quartam, quam in totum tertiam similem ait, & solo semine discrepare, quod paulo crassius sit, nequaquam languinosum & infirmum.

Bau. phyt. Apium 7. (9. pin. cui & Dancus 3. Diosc. 2. Plinij, Col.) sive peregrinum foliis subrotundis appellat, atque Guilandinum, cum illi in horto medico Patavino ostenderit, Daucum secundum nominasse.

Vlsnaga minor quorundam mihi provenit in horto E.C. Montbelgardi. Lugdunum mihi semen mittebat nomine Vlsnagæ minoris. Idem hoc inibi Rizotomus quidam anno 1666. exhibuit nomine feminis Petroselinii Macedonici, quamvis fateretur non verum Petroselinum Macedonicum. Frater attulit ex horto Patavino pro Saxifragia Bononica. Semen accepi à Tossiano Carolo ex Burgundia nomine Dauci veri. Hortulanus misit Ducis Florentini nomine Dauci fervidi Candia. Provenit satum in horto D. Frd. Meier Argentinz, qui vocabat Panacem. Habuit tandem siccam plantam à Sprengero, qui Panacem Alepiadem cognominabat.

In Salmanticensi agro sponte nasci Selinum peregrinum in vinetorum marginibus, juxta vias & semitas, auctor est Clusius. Florere autem mense Julio: semen Augusto maturum esse.

APIVM, SELINVMVE VETERIBUS. CAP. XLII.

NE Apij nomenclatura ignaris imponat, statim in limite hos admonendos necessarium esse duximus, eam equivocam esse, & duas diversissimas plantas denotare. Apium scilicet hias, &c. cognominatum, de quo Diosc. 4. scripsit, & nos suo loco dicturi sumus. Alterum verò Selinum dictum, de quo hic nobis sermo est, & Dioscorides hæc memorie prodidit. Apium hortense [*παρακρητικόν*] ad eadem ad quæ & Coriandrum convenit: prætereaque ad oculorum inflammationes, cum pane aut polente polline imposita. Astuantem quoque stomachum demulcet, & mammae glutinose lacte turgentes reprimat: ciet & urinas, sive coctæ, sive crudæ edatur. Decoctum ejus radicumque potum, venenorum noxæ resistit, dum vomitiones excitat, alvum quoque cohibet. At semen potentiùs urinas pellit, & à venenata bestia demoris, iisque qui argenti spumam hauserunt, opitulatur, ac denique flatu discutit. Sed & utiliter admiscetur medicamentis, quæ dolorum levamenta præstant, itemque theriacis ac tussiculis. Hæc ille.

Apium sub nomine Selini videtur passim intellecti Theophrastus. Et quidem 7. hist. c. 4. inter ejus genera ex foliis & capibus differentiam fecisse, his verbis: Pluribus constant generibus, ut Radix, &c. Cumminum [*κύννη*: legendum *κύννη*, Apij ut exsequentiis apparet] Apiorum verò [*παρακρητικόν*] cum in foliis, tum in caulibus discrimen utique cor stat: aliud enim folio spisso, crispo, densoque: aliud rariori, latiori, cauleque majori. Horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut vesicolaris: verum ad summam ejusmodi omne silvestri proximum est. Idem cauls. c. 6. ait, figuram & speciem [*μορφή*] suam mutare, si satum conculectur, cylindricumque superinvoluto coërcetur. Fieri etenim cespitem, quoniam incrementum transire facili nequeat, & vasis quoque, in quo positum fuerit, speciem imitari: & hoc propterea evenit, quia nutrimentum, cum prohibetur arceretur, à vase circumveniente, feratur ad id quod avocet, libertatemque permeandi concedat: fieri enim velut rivuli cuiusdam deductionem. Itaque speciem vasis ambientis capessere. Evenit hoc idem quodammodo & generi animalium in magnitudine, parvitate, brevitate & longitudine. Quippe illa formata jam esse: hæc verò cum generentur, formam recipere. Quapropter cum Apium hoc transferre oporteat, palum designandum tantum præcipere aliquos, quantum Apium efficere libeat. Radicem enim totum locum impletè facili posse. Et hist. 2. c. 5. Fit & in oleribus culturae causâ mutatio, ut Apium, si satum conculectur, cylindricumque spilletur, coarcteturque, cultum inquit provenire. Mutantur item regione, tellurique mutata, ut etiam cetera. Hist. 1. c. 9. Olerum autem majorem ferè pars radice toharet singulari, ut Apium, quod tamen propagines magnas suggerit, quæ quidem pro corporis sui ratione altius, quam arborum sanè radicanter. Hist. 7. c. 3. Inter radices Apio cinnamomum est: illa namque ne sicca quidem emminò durefcit. Caul. 6. c. 22. Ex dulcibus nullum ferè bene olet, & eò minus quò dulciora sunt. Ratio, quòd succus dulcis crassior, atque terrestris est, præsertim cum mistus fuerit in fructu. Odor autem humoris tenuioris, siccioris aptique dissilari potius est. Verum odor & foliorum, & ramorum, & in totum arborum atque plantarum in eisdem generibus est. in quibus aliquid acrodis aut pinguedinis fr. est: quemadmodum certè in genere herbarum, quas coticharias appellamus, & oleribus quoque, ceu Apio. Siccitas enim, & acritas, vel acerbitas his innolescit non in fructibus, neque in cæteris, quæ humoris ejusmodi sunt. In omnibus verò odoratis redditum illud per definitionem omnino inest, ut demistum sicco, quod sapidum est, vim aliquam patriat odoris. Porro odoratiora, suavioraque, tam tota, quam particulatim locis placidi spiritus, ac siccis proveniunt: sicut ex haulto humore aquoso, excoctoque reliquo melius. Siccitas enim odori convenientior est, & omnia odorata eò potius vergunt. Argumento etiam illud est, quòd tractibus æstivis plura, melioraque odoratorum genera prodeunt. Melius enim ibi concoquitur, & quædam siccata olescit. Hist. 7. c. 1. Omnium difficillimè Apium nascitur: quadragesimo enim die affirmant, qui celerimum ejus proventum tradidè: sed sunt qui quinquagesimo velint, quod etiam omnibus sementibus feri potest: quidam enim omnibus id adiungunt. Ad summam quæ locis pluribus feri patiuntur, hæc nihilo celerius ex majore parte æstate proveniunt: quod mirum, si tempus, ærve, nihil cor ferat ad celeritatem. At si improbo, frigido cœloque tristi circumdata sunt, ferius prodeunt: nam & tempestas, si et nivalis seminis succedens, facit ut aliis feriis, aliis maturis germinetur. Discrimen illud quoque in se menibus singulis, quòd locis apricis, temperatisque, maturissimè proventus fieri solet: causas enim eorum in pluribus constare credendum est: exen pl. gratia, in feminibus ipsis, in cœlo, in tempore, quo singula fieri pl. currit: adde tempestates, serenitatesque. Sed hoc amplius inspicendum, in quibus tempora differant, atque in quibus converiant: radicem enim tertio die tantum æstate, quàm Hyemæ quidam provenire affirmant. Ad hæc temporum diversitate plurimum addidit. Ergo tempora germinandi hæc sunt, & singulis addicuntur. Refert ad celeriores, ferioresque proventus, & seminum ætas: quædam enim maturius

ex recentiore semine exeunt, ut Porrum, &c. Contra quædam ex vetere celenis, ut Apium: haud enim omnia oriri melius è recentiori possunt. Apium verò non anno tantum fructificat, verum etiam bimatu, quod quidem vel plus temporis edurate potest. Nec annum dici debet: maior enim ejus pars simulatque semen perfectum est, exarscit. Semen-tes porro hortensium, quibus feri singula solent, tres certè notantur, una hyberna, alia æstiva, tertia quæ inter eas cadit, post hybernum solstitium: quas ita appellant: non ratione factis, sed ortis, usqueque ejusque. Satus enim in contrariis ferme consistit temporibus. Quippe hyberni principium post æstivum solstitium est, mense Julio, quo Brassicam, Radiculam, Rapam, & quæ seminis postera vocant, ceu Betam, Lactucam, &c. ferere assolent: primamque sementem istam appellant: secunda post brumam Ianuario incipit mense, qua seminant, defiguntque Porrum, Apium, Gethyum & Atriplicem. Tertia quam æstivam appellant, mense Martio agitur, qua Cucumis, Cucurbita, Blitum, Ocimum, Portulaca, & Saturia feruntur. Hist. cap. 15. Virent ex suffrutibus herbisque perpetuo, Ruta, &c. Apium. Sed hoc acumine perdat, amissis reliquis. Hucusque Theophrastus. Quem sequutus Plinius, hæc l. 19. c. 16. scribit. Et sativi autem differentia in folio denso, crispo, aut rariore, & leviori [latiore Theophr. Item caule tenuiore aut crassiore. & caulis aliorum candidus est, aliorum purpureus, aliorum varius. Idem l. 20. c. 11. Apio gratia vulgo est. Namque rami largis portionibus per jura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Præterea oculis illitum [inflammari, Diosc.] cum melle ita ut subinde foveantur ferventi succo decocti, aliisque membrorum epiphoris, per se tritum, aut cum pane, vel polenta impostum, mirè auxiliatur. Pisces quoque si ægrotent in piscinis, Apio viridi recreantur. Verum apud eruditos non aliud erutum terra in majore sententiarum [noxiū sit, an innoxium Dalech.] varietate est. Distinguntur sex. Chrylippus sceminam esse dicit, crispioribus foliis & duris, crasso caule, sapore acri & fervido. Dionysius nigriorem, brevioris radicis, vermiculos gignentem. Ambo neutrum ad cibos admittendum, imò omnino nefas: nam id defunctorum epulis feralibus dicatum esse, visus quoque claritas inimicum. Caule feminæ vermiculos gigni. Ideoque eos qui ederint sterilem, mares feminæque. In puerperis [puerperis M. & CH.] verò ab eo cibo comitiales fieri [Galenus in consilio pro epileptica, Apium in comitialibus & laudas & imperat. Dalech.] qui ubera hauriunt. Innocentior tamen esse marem. Eaque causa est, ne inter nefastos fructus damnetur. Manmarum duritiā [lacte concreto surgidarum, & c. Diosc.] impositis foliis emollit. Suaviores aquas potui incoctum præstat. Succo maxime radicis eum vino lumborum dolores mitigat. Eodem jure in stillato gravitatem aurium. Semine urinam ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foveantur semine decocto, fugillata reddit color. Cum ovi albo illitum, aut ex aqua coctum potumque renibus medetur. In frigida tritum oris huccebus. Semen cum vino, vel radix cum veteri vino vesicæ calculos frangunt. Semen datur & arquat is ex vino albo. Et ita Plinius de Apio diseruit.

Arnobius.

Arnobius l. 5. advers. gentes, ubi oblivioni sacra Corybantia donanda monet, mysterium hoc sanctum credi refert. Fratrem trucidatum à fratribus, è cuius interempti sanguine Apium natum sit, ideoque prohibitum mensis olus hoc apponi, ne à manibus mortui inexpressibilis contraheretur offensio.

Apud Plutarchum Timoleontis milites ad pugnam castris educti, multis Apium ferentibus obviis insensum augurium putavere, quoniam Apij co-

ronæ sepulchris imponentur, unde proverbij specie Apio egere dicitur, qui periculosius ægrotat, & cui vitæ peticulum imminet. Subest autem adagio jocus, alludens ad coronas victorum, quæ ex Apio fiebant, præsertim in ludis Isthmiis, teste Diphilo apud Athenæum lib. 6.

Super Apio certamus, ut soler Isthmii.

Silentio hic non involvendum & illud Adagium, Ne inter Apia quidem sunt, pro eo quod est, ne ingressum quidem, aut initium rei attingerunt. Sumptâ metaphorâ ab iis, qui hortos ingreditur. Nam antiquitus extremus ille hortorum ambitus, Apio conferebatur: quem qui nondum præterissent, velut in horti limite adhuc esse videbantur. Aristophanes in vespis:

In Apis nondum est vel ipso: sed nec in Ruti adhuc.

Hoc est, ne initium habet eorum quæ sunt futura. Interpretes & aliam quandam hoc loco refert sententiam, volens adagium ad gymnicum agnomen pertinere, ad quod qui præpararent infantes, statim ut essent nati, in Apio collocare consueverunt. Itaque perinde dictum videtur, Ne in Apio quidem: quasi dicas ne in primis quidem rudimentis.

Porro morem Apio coronandi putant jam olim ab Hercule indutum, post interfectū Nemeæ leonem: quod & Pindarus indicare videtur alicubi: nam in Nemeis hymno quarto dicit, ἦ καὶ ἀπὸν βαρυκάρην Νεμῆϊον ἄνθρωπον ἐκράνη, i. e. Vbi in certamine tumultuosi, floruit Corinthiacis Apis. Significat quandam in certamine Neptuni Isthmico coronatum fuisse à Corinthiis. Virg. in Bucol.

Floribus atque Apio crines ornatus amaro.

Honorem in Achaia fuisse, Apio coronare victores sacri certaminis Nemeæ demonstrat etiam Iuvenal.

Gratiaque Apium meruisse corona. Horat.

Quis udo deproperare Apio coronas, curât ve Myrto.

Apium tandem Galeno 8. simp. usque adeo calidum est, ut urinas & menses ciere tradatur: status quoque discutere, & magis semen, quam herbam ipsam. Idem 2. de alim. familiarissimum, jucundum & stomacho gratum esse scribit. Apium, inquit 2. de dieta Hippocrates, magis urinam ciet, quam alvum movet & radices magis, quam ipsum alvum movent. In libro de intern. affectionibus, ubi à pituita in aquam intercutem transit fit, ex oleibus Raphanorum & Apij usum præscribit. Item morbum muliebem si ex partu uteri in inflammationem conceperit, Apij [ovum, quo loco tamen xiv. malum legere, quod videtur melius contra inflammationem convenire, quam Apium] succum intra pudenda immittit.

Vrinam cit, etiam Simeone Sethi auctore, obstructions tollit, non in flat, magis verò status discutit, & menses ducit. Difficulus autem concoquitur, atque ob eam causam oportet ipsum in medio ciborum sumi. Paululum quid ventrem sistit. Proprietate verò quadam comitiales ladic, & oportet hos omnino abstinere. Sæpè enim quidam qui ferè ex hoc morbo convalescere, parati autem in eum incidere, ex ejus usu iterum comitiales facti sunt. Offendit etiam testes. Semen autem quam folia validius & efficacius, & eo radix. Prodest ad singulas à crassis excrementis profectos. Abstergit renes & vesicam. Obstructions in venis & arteriis factas aperit. Semen præsumptum, ebrietatem arceat. Conferat etiam ad bonum corporis [oris, aliis.] odorem, multique crebriore hujus usu gravem corporis [oris] odorem abegunt. Mulieres ad rem venerem promptiores faciunt. Si in hujus decocto calculoli desistant, ut ferunt, & difficultatem urinæ sanat & renes curat. Lactantes mulieres oportet ab ejus usu abstinere, minuit enim lac.


Etymo-

Etymologiam Apij docet Macer sequenti Poëmate.

APIVM HORTENSE
FUCHI.



PETROSELINVM VULGO,
planum et crispum.



restituerent, nil aliud apud antiquos fuisse sativum Apium, quam vulgare hoc nostrum Petroselinum, hodie hortis omnibus frequissimum. Et hanc quidem sententiam unanimi fere consensu comprobant, præsertim quod omnibus notis nostra hæc planta sit prædita, quibus constare Apium veteres tradidere: quippe quod nobis omnium olerum familiarissimum in ciborum condimentis perpetuo habeatur, & recentiores quoque Apium comitiis interdicant. Quæ sanè de Apio veteres memoriam prædiderunt. Cum igitur his rationibus, tum auctoritatibus, notis præterea suffragantibus constet vulgare Petroselinum legittimum esse Apium, mirari subit Anguillaram epit. 7. in Ang. notatur hæc verba temerè prorumpentem. Qui existimant vulgare nostrum Persimolo, vel Petrosello esse Apium & Selinum antiquorum, errant. Persimolo nihil aliud est, quam verum Petroselinum antiquorum, sed cultum, hodie adhuc nomen servans, sed nonnihil corruptum. In Sio [Chio fortè] nunc vocant Condimentum, ut fecit Cratevas, qui ait Persimolo re videretur. In insula Zante & Morea vocatur Petroselinum Candia Alaudum.

Inter omnia Apiorum genera, vix aliud est utilitatis eo, quod officinæ vulgo, sed non sine errore, Apium Petroselinum vocant. Nam nullam in Germania

Finem huic de Selino tractationi imponeremus, nisi ex Columellæ lib. 12. foliorum discrimina, quæ a Theophrasto nativa superius numerabantur, cultura & artificio humano fieri quoque posse, docendum foret. Apium etiam possis plantis ferere, nec minus semine. Aqua præcipuè lætatur, & idem secundum fontes commodissimè ponitur. Quod si quis id velit latifolium facere, quantum possint tres digiti feminis comprehendere, raro linteolo illiget, & ita in areolas dispositum religer: Vel si crispæ frondis id fieri malueris, semen ejus inditum pilæ & saligneo palo pinxitum expoliaturque, similiter in linteolis ligatum obruas. Potest etiam circa hanc operam fieri crispum qualitercunque satum, si cum est natum, incrementum ejus supervoluto cylindro coercitas. Et hæc omnia de sativo hoc Apio intelligenda sunt, ideo quæ longius à nobis repetita, ut sciant, meminere intque legentes, sperandum homini, ut labore & diligentia sua naturam in ruris disciplina, non imitari tantum, sed etiam æquare possit.

Coronidis loco lector monendus erat aliud esse Ἀπιον pyrum, fructum Pyri arboris, quæ Græcis ἄπιον dicitur. Item aliud ἄπιον herbam. Et hanc rursus duplicem. Vnam quidem ἀπορροφῶν & ἰσχυρὸν cognominatam, de qua agemus H. n. g. lib. 34. sub titulo Apios, quo in loco etiam adscribemus Apij æquivoca. Alteram Apium sativum Græcis ἀπιον σακχάριον dictum, quod quidam Meliophyllon, Magi verò Sanguinem ori appellant.

APIVM. HORTENSE MULTIS,
quod vulgo Petroselinum, palato gratum, planum & crispum.

RADIX aducior magnitudinem interdum assequitur Paltinacæ Germanicæ, alba, acriscula, Tom. III.

nōn sagrata. catulis cubitalis & major, in fastigio & ramulorum extremis flores fert in umbella parvos albos: semen oblongum, strigosius quàm Faniculi, multò majus nam Apij officinis dicti, sapore grato, folia duarum aut trium unciarum in alas divisa, segmentis latiusculis, laciniatis, minus latis, quàm Apij palustris, ori grati.

Folia hujus interdum crispata, rotundiora, pulchre crenata, frequentiora, sapor & odor idem cura vulgari jam dicto.

Icon prioris emblematis, in præfatione pro Apio hortensi vulgari. Altera deumpta tum ex viva platea, tum ex epione Cameracii, exhibet Petroselinum vulgò dictum, planum & crispum.

Putarunt autem dubio procul omnes fere prioris ætatis Medici, inque præsertim, quidam verlati fuerunt in simplicium medicamentum inquisitione, quique multum laboris ac studiumpenderunt, ut hæc Medicinæ partem penè abolitam,

Apium an-
tiquorum.

Ang. notatur

Condimentum

Apium

Tri-ago

4

nostra, inquit lib. i. cap. 34. Tragus) culinam reperi-
as, in qua herba & radix hujus Apij hortensis,
suum locum inter præcipua olera non occupet, ita
ut non solum divitiis, sed & pauperibus variis
cibis condiendis magnopere quærat. Sed quid de
Germanis dico, an non & ipse Apicius ac Platina
summo loco Petroselinum semper habuerit? Proinde
neminem esse existimo, cui usitatissima planta
non sit cognita, qui non etiam vites ejus perspectas
habeat. Quanquam quod mirari satis non possum,
quod notior aliqua herba vulgo fuerit, eod plerum-
que forma, & nomen illius ignota existunt. Quot
enim putas in numero illorum esse, qui Petroselinum,
Chærefolium, Cicutamque differentias proprias cogni-
tas habeant, aut nomina sciant. Quemadmodum
enim, quod ego vidi, Cicutam Chærefolium, rursus
verò herbam Germanis Gleiß [hanc Tragus vitium
Petroselinum esse, aut certe aliquà ratione ad Cicutam
pertinere arbitrat.] dictam. Petroselinum dicere
quidam ex his audent, ita fieri facile possit, ut iidem
Petroselinum Cicutam, rursus autem Cicutam Pe-
troselinum appellare non vereantur, Petroselinum
enim & vitium ejus Gleiß dictum [Cicutaria quæ
Apij vitium] cum adoleverunt (nam conjunctum,
hisdem locis natalibus gaudentes proveniunt) tan-
tâ affinitate copulantur, ut discerni vix possint, nisi
coloris differentiam probe animadvertis. Petroseli-
num namque dilutè & gratè viriditate præditum
est, alterum verò vitium nigricat magis. Caulem
etiam rotundum utraq; planta habet, sed in eo rur-
sus differunt, quòd altero demùm anno Petroseli-
num excaulescat & floreat: illud verò primo statim
anno caulem & florem in umbellis album, & semen
Cumino simile proferat. Iam & in umbellis, quas
habet in flore subluteas, & semine magis exiguo,
odorato, gustuque aliquantulum acri, à vitio illi dis-
sident Petroselinum, ut interim de radice nihil di-
cam, quæ vitio illo non ultra dodrantem longa, ac
ingrati planè & foetidi odoris est, huic verò odora-
tissima ac proluxa ceu Fœniculi. Iliodorus porro &
Platina in ea sunt sententia, ut existiment Petroseli-
num nostrum vulgare esse Petrapium, seu Apium

Petroselinum
autem Chære-
folium & Ci-
cutam affinis
est.

Apium saxatile, non
descendens.

Est Apium
hortense.

Monachi
negant esse
Petroselinum
antiquorum.

saxatile, h. e. (si germ. exprimere velimus) Stein
Eppich aut Stein Peterlin. Atqui manifestum est
nostrum vulgare Petroselinum; non in saxis, sed
hortis plantatum provenire, licet quandoque illud
viride in muris reperiat, id quod vento tribuen-
dum est, qui plantarum semina hinc inde non raro
dispergit, dissicitque. Quòd si verò eam ob causam
Petrapium esset dicendum, quòd inter petras inter-
dum inveniatur, multa sanè haberemus Petrapia,
quando luce clariùs est multas plantas saxis & pe-
trois delectari. Sed ut tandem postquam de hac
planta proferamus sententiam, eam præcipue
Apium hortense, h. e. Germ. Garten Epff / Garten
Peterling / & Zam Peterlin / Dioscoridi voca-
tam omnino judicamus. Quòd autem vulgare no-
strum Petroselinum, nihil aliud sit, quàm Apium
hortense, non solum experientia, herbæque ipsius
apud Dioscoridem historia, verum etiam Constanti-
nus & Manardus Ferrariensis 6. Epist. med. epist.
& testatur. Ex his itaque, quæ adduximus, satis li-
quet, nos quoque hodie veterum habere A-
pium, quod quocunque modo alij vocent, pa-
rum sumus solliciti, modò sciamus illud hortense
esse Apium.

Apium hoc hortense, sive Petroselinum vulgare,
non esse Petroselinum Dioscoridis & Galeni (ut
Anguillara, non sine tamen errore, sensisse videtur)
docetur à Monachis dist. i. cens. 25. his verbis: Se-
cundum Dioscoridem & ferè omnes Doctores, Pe-
troselinum [in Diacalamentis] non est istud quod pro-

manibus habemus, & in hortis ubique feritur,
quòdque vulgi corruptela Petroselinum falsò ap-
pellat. Cum separatum omnes faciant capitula de
Petroselino, & cæteris generibus, sive speciebus
Apij: quod quidem Selinum est, est verò nostrum
vocatum Petroselinum. Et nota quòd in hac de-
scriptione [Diacalamenti] etiam habetur Apium,
quod est propriè ipsum Selinum. Apium itaque
simpliciter scriptum, ut in descriptione Diacalamenti
Galenii, semper (testantibus pluribus fide dignis
authoribus) de Selino est intelligendum, scilicet
de nostro vulgò nuncupato Petroselino. Quæ qui-
dem species, Selinum vocata, à Dioscoride antepo-
nitur omnibus aliis descriptionibus specierum sui
generis. Et etiam scribatur Apium hortense, sive
fativum, illud idem intelligitur Selinum, s. u. Græcè
Selinon. Vnde in Diacalamenti descriptione duas
Apij species posuit Galenus, Apium petrum sc.
& Apium fativum: quod propriè est nostrum vulgò
Petroselinum nuncupatum.

Cæterum, planta à nobis tradita Apium dicitur à
Monach. & Turnero. Apium hortense, Matth.
Dod. gall. & Lat. Lob. adv. p. 314. & Icon. p. 706.
Lugd. p. 700. & Castore. Apium fativum, Sylvio
de compos. med. & Tab. hist. Eid. Ic. Apium, Selin-
um, fativum, domesticum. Apium domesticum,
Czf. Apium verum, Schvv. Apium commune
vel mas Plinij, Gefn. h. Apium montanum, Fuchf.
Icon. & hist. eidemque in fol. Oreoselinum. A-
pium hortulanum, Brunsf. Apium sive hortense,
seu Petroselinum vulgi, Bauh. apud Matth. & pin.
ubi & Petroselinum, Cord. in Diosc. & Ang. Pe-
trocel. vulgare seu fativum, Lon. Petrocel. syl.
Fvchf. vulgo Apium veterum, Gefn. h. Apium
hort. Ger. Apium commune, non rectè Petroseli-
num, Gefn. h. Petroselinon vulgi, Petroselinum
verum priscorum, Guil. Apium fativum vulgare,
sive Petroselinum, Col. Eidem phyt. Apium r.
Selinon seu Apium Theoph. & Diosc. & Apium
mas Plinij: Selinum; Turn. Selinum hortense,
Lob. Obs. p. 405. Petroselinum officinis, Trag. &
Brunf. Petroselinum vulgare, Ang. & Guilandini,
qui cum Petroselino antiquorum non absque erro-
re idem esse statuunt. Petroselinum silvestre,
Fuchf. Ic. & hist. Et hi omnes Petroselinum planum
intelligunt.

An autem Petroselinum crispum Trago fuerit
notum, asserere non aulam, existimarim potius in-
cognitum. Huic enim non sunt folia Fœniculi, qua-
le ait esse crispum. Hoc vocat Lob. adv. Apium
crispum, ut & Lugd. p. 700. Bauh. apud Matth.
phyt. & pin. Apium 2. vel Petroselinum crispum, ut
& Cam. Apium hortense crispum, Adv. Lugd.
Apium fativum Sardum, Col. Apium crispum &
Apium multifolium, Brauser Peterlin / & Gesulter
Peterlin / Tab. & Ger. Apii crispum, & Gesulter Peter-
lin / & Petroselinum crispum, & Gesulter Peter-
lin / Schvv. Matthioli in comm. post. ex Co-
lumella meminit Apij crispi, ostendens dein arte
fieri ab hortulanis. Apij verò crispi nomine her-
bam fativam veteres intellexisse tradit Gesne-
rus. Plinium quidem lib. 20. cap. 11. per Apium
seminam, quod mare nigrius, acrius, & cris-
pius facit, hoc intellexisse, ita ut generis unius
duas species proximas statuerit. Theophrastum
autem hæc duo Apia non aliter quàm cultu differre,
ostendere. Quæ de re consule veteres.

Apium hoc hortense, Petroselinum vulgò di-
ctum, Græcis propriè dicitur σελίνον & σελίνιον. Germ.
Peterle / Peterlin / Peterfil / & Garten
Eppich. Belg. & Flammendis Petercelle / Petercelle
& Petercelle. Gall. Persil, du Persil, Persil de Jardin,
& Persil.

de Persil domestique. Ital. *Petrosello*, *Petroselino*, *Petroselino domestico*, & *Apio domestico*, & *Petrosemolo*. Hisp. *Perexil*, *Iuliner*, & *Salsa*. Angl. *Perseley*, *Persely* & *Garden Parsely*. Boh. *Petrusel*. Hung. *Selinum hortense*, *Petruslyom*. Slavon. *Petrezylia*. Offic. & vulgo *Medicorum Petroselinum*, *Petrosilium* & *Persilium*. Serap. de temp. si npl. cap. 120. arabicè *Karphi* & *Karphi*. Avertioi *Alcaraphas*, *Avicenna* *Glossographo Alcarafa*, & aliàs etiam *Charfi*, *Charfi*, *Chares*, *Carphi*, *Alcarafe*, *Car i/z*, *Alcarafe*, *Karfi*, *Carafcu*, *Harps*, *Naru*, *Querassim*, *Querassim*, *Querferum*, *Kerph* & *Sasneck*.

Licet autem plurimæ nationes nomina sua à Petroselino declinent, non est tamen verum aut legitimum Petroselinum, quod in petrosi gignitur: unde nomen accepit; & in Macedonia præstantissimum est. parum rectè idcirco sentiunt, qui hortense Apium hoc, à Petroselino genuino solà culturâ differre existant: & nihil aliud interesse, quam quòd hortense imbecillius sit, silvestre verò potentius: solent enim silvestria facultatibus, sativis superiora esse.

Minimè igitur audiendus est Guilandi Theon, Dens ille caninus, qui in explicatione Petroselini, & Selini, h.e. Apij huius sativi Mathiolum frustra hallucinatum esse falsò scribit, dum plantam, quam vulgus Petroselinum vocat, verum præcorum Petroselinon non absque gravi errore autumat, tum quòd à descriptione nihil abhorreat, tum quòd nomen suum non in Græcia solum & Italia, sed in tota etiam Europa fervet, tum quoque quòd Cyprij geminas vulgò plantas agnoscat quarum unam Selinon appellant: quam is pro antiquorum Apio interpretatur, alteram Macedonium, quod nostrum Petroselinon esse ait. Hic autem cum affectum neminem, præter comitem invidiam habeat, merito dente suo canino ab omnibus roditur, dilaniatur, dilaceraturque.

In hortorum arcis feritur, calida ac frigida sustinens loca, modò vel humidum naturâ Solum sit, vel sæpius rigetur. Loca siquidem amet humentia, aquâ lætetur, atque idcirco circa fontes commodè proveniat. Fuchsius in palustribus nonnullis Germaniz sponte reperti scriptum reliquit. Temperativè feri potest, sed tardè erumpit: Æstate sæpius tonderi ac demeti potest: caulem altero anno profert: semina verò Iulio, vel Augusto ad maturitatem proveniunt. Hortulani nostri primum Aprilis mense, aut potius appetente Majo, secundum doctrinam Palladij: deinde verò, quò sequenti anno in Majo tenerum Petroselinum, quod maxime cibis expetitur, habere possint, circa festum D. Laurentij & Bartholomæi terræ mandare solent.

Petroselinum vulgò dicitur herbam & radicem, non solum coqui, sed & Sepalsarij hostis usurpant, magis verò semen, quod calidius est, & ad cindam utinam efficacius. Porro possunt utiliter omnes partes Petroselini, utrinque corpori adhiberi, id quod ex veteribus antè pluribus ostensum est. Radix & herba verò potissimum ad culinas spectant, utriusque sunt, in omni cibo, naminationes stomachi depriment, unam & menses cient, jecut & lien ab obstructione liberant, hydropicis & ictericis conducunt. Radix & semen omnibus medicamentis adversus venena, tussim & aquam intercutem facientibus misceri possunt. Sunt qui decoctionem contra aquam intercutem, morbum regium, & calculum renum, hoc pacto conficiant. Accipiunt seminis Petroselini, Fœniculi, Anisi, Cari, singul. Vnc. j. Radicis Petroselini, Pimpinellæ & Cari, singul. Vnciam unam, aut Vnciam & semis. Hæc omnia in mensura vini albi per

noctem macerant, alterò que die ultra tertias decoquant, vesperique ac in indè agris propinant, ita tamen ut à potu jejune æger tres horas. Hæc decoctione obstructiones jecoris ac lienis tolluntur, aqua inter cutem atque icterus per urinam expellitur. Eadem juvamenta aquæ stillatitiæ à Trago ascribuntur. Hortensis Apij calida quidem accescens est facultas, sed magis exalfaciens accescens semen, quod ad secundum caliditatis & tertium ferè siccitatis ordinem attingit, radix moderatam etiam caliditatem obtinet. Folia in condimentis singularem gratiam habent, per jura, ut Plinius l. 20. c. 11. largis potionibus innatant, in quibus præter quòd grato sapore ipsa condunt, ad aperiendum obstructa, urinæque promovendas, etiam non exiguum conferunt: Quod & radices juri similiter incoctæ haud s. g. ter præstant: deinde & ori ventriculòque gratæ sunt. Semina medico usui utiliora, extenuant, aperiunt, urinas cient, calculos coherentes dissolvunt, flatus discutiunt, conveniunt hydropicis, menses promovent, secundas & foetus mortuos expellunt: commendantur & contra veterem tussim elegantiè permixta, aut incoctæ: venenis etiam adversantur, atque idcirco Theriacis miscentur. Dodonæus. Contra ætus & calores febriles maxime commendatur Apij sativi succus, oleo olivarum commixtus, si eo membra totius corporis illinantur, id quod non latuit Serenum, qui usum hunc sequentibus versibus est testatus.

Sin autem calida depascent corpora febres,

Tunc Apij succus levi solvatur olivo:

Membra line, forique ferus mulcebitur igni.

Majori tandem experimento, quam quod de Amygdalis amaris vulgò fertur, Apij sive Petroselini vulgaris semen ante potum comestum ebrietatem remorari & arcere testatur Bernh. Deseñ. in Athanasia magna. Christoph. Mylius l. 1. de scribenda universitatis rerum historia, hirundines à nidis suis blattas & alia animalia asperso prudenter Apio prohibere scripsit. Vinum selenites cibi appetentiam facit, atque stomachicis atque urinæ difficultate laborantibus auxiliatur, halitum quoque commedat, auctore Dioscoride, qui sic faciendum tibi præcipit, ut demittas seminis Apij maturi, recentis & cribrati, ac in linteolo colligati, in musti amphoram Vncias novem.

APIUM HORTENSE MAGNUM

vulgari hortensi sive Petroselino vocato, sapore idem, sive Anglicanum quibudam.



Anglicanum Apium quibusdam dicitur, folio Apij vulgaris, majore, denotat, quibus gratioris, ejusdè penè cū Apio hortensi, quo etiam majus & spissius: caules in laterales ramos eodè modo dispositi, quo in Eleosino: Rotes umbellati, albisemè multum differēs ab Apio vulg. sive Eleoselino, longius & majus quam in Apio hortensi, sive Petroselino vulgari, uti & tota planta multò major.

Sabinus Cy-
prorum,
culi.

Hoc est Guilandini illud, Cypriorum Selinon, quod perperam adversus Matthiolum pro antiquiorum Apio est interpretatus. Ang. ep. 7. verum & legitimum Apium, quo aliud per totam Græciam & potissimum in Chio, Creta; & Cypro haberi negat. Camer. Apium verum Anguillara. Bauh. apud Matth. Apium 3. sive hortense maximum: itemque phyt. ubi præterea Apium Anglicanum vocat, dubitatque an fortè sit Anguilla Selinum Græciæ? Apium hortense maximum à C. Bauh. ita describitur. Ex radice oblonga, albida, & pro magnitudine plantæ, tenui, folia prædeunt pediculis palmaribus, & sesquipalmaribus, striatis, pallide viridibus; tripartito primùm divisa, quorum quodlibet rursus tripartitur, ipsæque particule triplo, quadruplòve quàm in Petroselinò vulgo dicto majores, per ambitum incisæ, pallide virentes: inter hæc caulis exsurgit cubitalis, & sesquicubitalis tenuis, striatus; in cuius summitate folia oblonga, angusta, minimè incisa. Umbellam habet parvam, albam, exiguis flosculis repletam, quibus succedunt semina Petroselini formâ, sed duplo, triplòve majora, gustu nonnihil aromatico odorata. Nominè Apij Anglicani primùm apud nos factum. In pin. Apium 4. hortense, laetifolium: an Apium verum, Ang. an Apium sativum Anglicanum Col.

An Matthiolo epist. lib. 3. ad Cortusum, Apium Orientale? An Casalp. Apij domesticum, vulgò Petroselini vocati alterum genus, peregrinum, odoratius, latiore folio, tum ab radice, tum in caulibus, ac brevioribus pediculis: semine paulò emphorè, multò acriore, & subamaro: caule breviori, candidiore; radice crassiore, diutius vivida? Putat autem hoc Theophrastum sub nomine Selini, cum Apio sativo intellexisse, & apud Galenum & Dioscoridem genus hoc Apij laetifolij, quod peregrinum ait in Italia, Petroselinon appellari. Sed difficile est ex solo semine, quod solum ab iis describitur, conjectari; judicanda enim est planta aliqua à tota facie.

Sabinus.

D. Christophorus Schvvarz ostendit mihi plantam in horto Ducis VVirtembergici pro Apio Anglicano. Hujus plantæ semina accepi Basileâ missa per elegantem Medicum Thomam Platerum, cum hac inscriptione: Apium maximum nondum descriptum. Hoc satum Montbelgardii provenit in horto. E.C.

APIVM PALVSTRE, sive Helioselinum vegetibus.

CAP. XLIII.

Disj.

HELIOSINON (ἡλιόσινον) quod in nothi Dioscoridis, alij Pedinon, alij Hydroselinum [silvestre add. Corn.] Romani rusticum Apium & palustre dicunt, in aquis locis nascitur, & sativo Apio grandius est: sed ad eadem, ad quæ & illud efficax est.

Sabinus.

Apium palustre itaque ἡλιόσινον Græcis est, & ita quoque à Plinio appellatur, qui Helioselinon vim privatam contra araneas esse dicit: & à reliquis generibus ita distinguit. Id, inquit, quod sponte in humidis nascitur, Helioselinum vocatur, uno folio, nec hirsutum. Hæc Plinius de Theophrasto transcripsit, apud quem 7. hirs.

cap. 6. ita legitur. Equapium, Paludapitum; Montapium, tam inter se distant, quàm ab urbane plurimùm differunt. Paludapium enim quod apud aquæ ductus & in paludibus provenit, folio raro, nec hirsuto consistit, sed simile quodammodo Apio est, odore, sapore, figuræque. Ex his autem Theophrasti verbis clarè patet Plinium per hoc verbum ἡλιόσινον deceptum esse, & p. m. non absque errore ἡλιόσινον legisse, ac malè pro raro folio, uno folio convertisse. De Apio palustri Palladius in Aprili sic ait. Eleoselinon molli folio & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

Nos Apium palustre inscribimus Apium vulgare, ingratius. Et de hoc mox tractandum.

Fuchsius pro Apio palustri pictum dedit Sion odoratum, de quo suo loco dicendum.

Ruellius plantam ab Italis Macerone vocatam, Paludapium esse contendit, sed præter rationem.

APIVM VVLGARE ingratius.



NON dispartiri aded vultu ab hortensi, Apium vulgare, pedali & altiore caule, striato, crassiore: foliis latioribus, gustu servidore, ingratiore: flosculi in umbellâ candidi, quinquepartiti: quibus semen succedit dimidio minus, ingrato, acri sapore. radix subest hortensi similis.

Hoc quidem est Paludapium illud, quod vulgus prædicant, Mulomedici, & ut cum

Tabern. loquar, Calendariorum fabri, pro Apio veterum, quod Petroselinum nostrum est, receperunt, & multis annis pro eo compositionibus falsò immiscuerunt. Et hæc eorum sinistra mens, aded profundas apud eos egit radices, ut obsecratam, pertinacem, imò phantasticam eorum opinionem nemo erueret, erutamque extirpare possit. Sic, sic est in eorum capitibus ob calendaria concinnanda, mola pneumatica eversa, ut cum vagis & oberantibus planetis & stellis, in tantum quoque aberrent, ut Majoranam ab Vrtica, Roremmarinum à Junipero vix discernere queant. Quare quando invenitur scriptum in Diacalamento descriptione Galeni Apium palustre, sive Apium aquaticum, accipienda est, id vel Monachis in Mel. annotandibus, species ista, quæ simpliciter, tum à jamdictis Mulomedicis, tum vulgaribus seplasiaribus vocatur Apium.

Quod porrò precedenti capite, tum rationibus, tum auctoritatibus, notisq; præterea suffragantibus confect,

constet, vulgare Petroselinum legitimū esse Apium, putandum quidem hic fuerit, quin potius asserendum, teste Matthiolo, id quod officinis omnibus sativi Apij vicem explet, nil aliud esse quā Paludapium, sive Apium palustre, Eleoselinum Dioscoridi vocatum, de quo Theophr. l. 7. cap. 6. differit. Hinc itaque fit, ut Matthioli Ruellio minimè ad stipulandum censeat, qui plantam Italis *Macerone* vulgò appellatam, Paludapium esse putat. Quippe (ut dicitur) non parva sanè inter vocatum *Maceronem*, & Eleoselinum intercedit differentia. Ceterum, hac in re Fuchsius etiam apertè errasseprehenditur. Nam etsi in hist. rectè scribat, illud, quo officinæ hodie pro Apio hortensi utuntur, non esse nisi Eleoselinum, i. e. Apium palustre; tamen postea de compos. med. perperam scriptis tradidit, Petroselinum semen Sepalsis, Apij semen vocari, atque in ejus locum usurpari. Etenim Eleoselini femine, non Petroselini, quod haftenus, dūce Matthiolo, desiderari existimo, Apij feminis loco utuntur omnes ferè Pharmacopœi, idque etiam Apij semen nuncupant.

Czasp. de Apio nostro vulgari ingratiore hæc l. 7. c. 38. annotat. Aliud, inquit, genus Apij spontè nascitur in Italia locis humectis & umbrosis, quod in officinis vulgò Apium vocatur, eoque pro Apio sativo utuntur, quamvis à plerisque Eleoselinon, i. e. Paludapium censeatur, quod minimè negaverim: paucæ enim notæ, quæ Eleoselino traduntur, huic non desunt: tamen ab eadem non video nequaquam abhorre Hipposelini descriptionem apud Dioscoridem & Galenum, non autem apud Theophr. & Plinium.

Græcis vocatur *Ἐλεοσέλινον*, *Ἐλεοσέλιον* sine & cum aspirationis nota. item *ὑπόσέλινον*, & Homer. *Ἰλιάδ. Β. ἑλῆος*. Lat. Eleoselinum, Eleoselinum & Eleoselinon, ut Ang. Turn. Fuchl. icon. & hist. Ger. (ubi tamen Sion odoratum umbelliferum exhibet) Lon. Dod. gall. & lat. itémque Lob. in Obs. p. 405. Icon. p. 707. (quibus etiam Paludapium) & Nomenclatori Pannonico. Apium rusticum, Apium aquaticum, Apium palustre: & sic Corn. & Cordo in Dioscor. (secundum tamen annotantorem, Apium sativum latifolium. Eid. hist. secundum Gesnerum, qui ex Trago Apij vulgò dicti figuram addidit, Apium sativum; juxta C. Bauh. verò & melius, Apium agreste) Monach. in Mef. dist. 1. cens. 25. Ang. Matth. Lac. Cast. Gesn. h. Lon. & Schvvenckf. Apium vulgare Sylvio & Trago, & simpliciter Apium officinis, Brunf. Lon. & Fuchl. in fol. Paludapium Gazz. Lob. adv. p. 315. & Tab. Apij alterum genus, Czsp.

Apium 9. (4. apud Matth.) sive palustre, Hipposelinon Dioscoridis, & Apium latiore folio, caule versicolore Theophrasti, Bauh. in phyt. Eid. pin. Apium 11. palustre, & Apium officinarum: Apium palustre, Fuchl. ic. Apium sativum & palustre, solà culturâ differens, Cord. in Diosc. & hist. Eleoselinum spontaneum, Col. Apium palustre Matthioli, Lugd. p. 701.

Apud Amilium à Georgio Pictore pro Apio ineptè ponitur figura Rubi. Videndum etiam an Apium aquaticum intellexerit Amilius, ut ibidem Pictor innuit. Vocatur tandem etiam aliquibus Apium aquæ & Pupilla oculi. Arabibus, ut Serapioni (ex relatione Tabern.) lib. simpl. cap. 280. *Asalus*; Bellunenſi, *Chare Alhajn*, & ab aliis *Asarus*, & *Asilus*, & *Asabs*, Lacunæ. Germ. *Epff* / *Epffich* / *Eppe* / *Eppeich* / *Bawren Eppeich* / *Wilder Eppeich* / *Eppe* / *Wasser Epff* / *Merck* / & *Wassermereck* ac *Eppe*. Belg. *Eppe* & *Tonffronmmerck*. Gall. *Asche*, *Ache*, *Perfil de l'eau* & *Perfil de l'alpe*. Ital. *Apio*, *Apio palustre*, *Apio aquatico*, *Petrosello aquatico*, & *Petrosello*. Tom. III.

moto del aqua. Hisp. *Apio* & *Perezil d'agua*, Catal. *ap*. Angl. *Smalage* aut *Marche*. Bohem. *Wodm Petruzsel*. Nomencl. Pannonico *Apion*.

Humentibus locis Apij hoc genus nasci gaudet, *Locum cultu tempore*. transferitur verò & ad hortos. Cum hortensi Apio viget ac viret: altero quoque à satione anno caulis ejus affurgit, ac semina fert, quæ post Solstitium matura sunt, autore Dodonæo. Ego quidem Apium officinis vulgò dictum, immeritò tamen, vidi Patavij in hortis, Lugduni, Montpelij, & Basileæ, ubi florebat Novembri. Geneva mihi virebat tota Hieme. Montbelgardii in orto meo & E. C. semine deciduo quotannis se renovabat. Satis copiosum observavi juxta thesuras in Canſtat urbe, quæ non longè à Sturgardia est in Ducatu VVitembergico. Turnerus saepenumero vidit ad rivulos, nec non in insula Frisæ Orientalis, Nordenia appellata, ad litus. In Italia sponte nasci locis humectis & umbrosis, alicubique feri in hortis, sed infirmo odore & sapore refert Cæsalpinus.

Etsi porò Dioscorides easdem habere facultates Paludapium dicat & Selinon: Selini tamen potius.

titus quā Paludapii usum consuluerit Turnerus, quia epilepticis suspectum, cujus rei testes habemus Leonellum, & Scholia Holeriana. Licet autem multorum sententiâ hujus vires cum Apio domestico conveniant, ingrati tamen est tum odoris, tum saporis, acutioris & gravioris, quo caput ferit, unde etiam à cibis abdicatur, neque ad condimenta utile habetur. Facultate autem & temperamento & calidius, sicciusque est, & ad pleraque efficacius. Hinc succus ejus ad multa confert: exeret enim, aperit, crassa attenuat, obstructions tollit, & urinas movet, Dodonæo & Schvvenckfeldio testibus; atque idcirco Scapia dicta, quæ hunc permixtum habet, veluti Byzantinum, jocionoris, lienisque obstructions aperit, & diuturnis, sive tertianis, sive quartanis febribus, omnibusque ex causa frigida, tum & obstructions, enatis, auxiliantur, ac regio morbo succurunt. Idem succus oris tonsillarumque etiam *Oris ulcera* magna ulcera cum Hordei decocto, addito melle rosacco, gargarizatu ad sanitatem perducit. prodest verò & omnibus externis ulceribus & sordidis vulneribus cum melle: cancris etiam exulceratis *Vulnera*.

confert: nam tametsi hos curare nequeat, putredini tamen resistit, ac fœtorem eorum reprimat. Semen Medicinæ etiam haud inutile habetur, sed ad eadem, ad quæ sativi Apij commendatur; minus tamen tutus ulus ejus est: nam comitiali morbo obnoxij, uti dictum, ab hoc offenduntur, ut evidentibus experimentis compertum legitur & observatur. Ut cognoscat utrum masculum an fœmina *Priscians* minam prægnans in utero habeat, Apium cum *tafigmentum* dice capiti ejus Priscianus, apud Ham. Gynæc. de *gerenti* *bus utero* part. 1. cap. 4. apponit, & si prius masculum nominaverit, dum loquitur, masculum; si verò fœminam, fœminam utero gerere, concludit: quod nobis sanè fabulæ, aut Græciæ mendacij specimini propius esse videtur, quā vel rationi consentaneum, aut etiam experientiâ comprobatum. Aquæ destillatæ peculiaris vis contra hydropem à vulgo ascribitur. *Hydrops*.

SELINVM TUBERO- sum.

Nominabat Selinum tuberosum, sive Pulegi speciem Honor. Bellus, sicut nunc nō usum sapore aromatico, & Apij hortensis, vulgo Petroselli.

lini vocati; quod & Creta Cydonia dicta in scriptio-
ne transmissit. Hoc commissum terræ Montbelgardi
in horto E.C. non provenit.

DE APIO SIVE SELINO, QVOD

Petroselinum antiquis dicitur.

CAP. XLIIII.

Disce.

Virei

Plinius:

Galenus:

Estreati-
cum.

A Pium, quod Petroselinum dicitur, provenit in Macedonia præruptis in locis, semine Ammeos, at odoratiore, acti [de quib. Lac. legit in ver. cod. acriori] & aroma olente. Virinas id, menstruaque pellit: contra stomachi & coli inflationes, ac tormina prodest. Succurrit & lateris, renum, ac vesicæ doloribus, in potione sumptum. Admiscetur & antidotis urinas cientibus.

Plinius ubi de Apij generibus egit, alio genere, inquit, Petroselinum quidam appellant in laxis natum, præcipuum ad vomicas, cochlearibus binis succi additis in cyathum Marrubij succi, atque ita aquæ calidæ tribus cyathis. Et subdit mox: prævalet contra serpentes, potum, & litum.

Petroselini semen, ex autoritate Galeni, maximè in usu est, quum tota herba unà cum radicibus similis quidem, sed debiliore sit facultas. Est autem sicut in sapore acre, cum amaritudine, ita etiam in operibus calidum, simulque siccandi vi præditum. Et ob id menses & urinas largè propellit. Flatus item discutit. Fueritque itaque tertij ordinis calefacientium ac siccantium. Cæterum, quod sit verum Petroselinum, lib. de Antid. docet similibus verbis. Petroselinum ab omnibus laudatum est Macedonicum, quod etiam quidam Estreaticum vocant, nomine à loco, in quo nascitur, imposito. Est autem omninò modicum, quod in illo nascitur, qui præruptus est, & non magnus. Estreaticum itaque Macedonicum, quod ex Macedonia ad omnes gentes deferretur, paucum & ipsum in Macedonia gignitur. Quare quod circa mel Atticum & vinum Falernum contingit, id etiam circa Petroselinum hoc accidit. Nam quemadmodum illa duo, Mel Atticum & vinum Falernum, per universæ ferè orbis terrarum oppida à mercatoribus deferuntur, velut ea ipsa sint, quæ propriè ita vocentur, quæque à gentibus requirantur, licet interim in parvo natali modica nascantur, ut vix isthic sufficiant, ac propterea à calidis hominibus ad illius similitudinem efficta duntaxat dividendur apud exteros. Ita etiam Macedonicum Petroselinum, quod in Epiro plurimum nascitur ac inde in Macedoniam prius deferretur, & plurimum ac ferè totum in Thessalonicam, atque illinc velut Macedonicum exportatur, quamvis isthic [in Macedonia] non tantum nascatur, ut omnibus gentibus sufficere possit. Quod si tamen Estreatico Petroselino carueris, nihilò deterius fore putes Theriaces medicamentum, si alterum in jeceris. Non enim velut quod adversus venena, aut bestiarum venenum ejaculantium plagas commodum sit, in jicitur, sed ut stomacho debili, & hydropicis, & aliis hujusmodi affectibus utile, non juxta principalem Theriaces promissionem. Facit autem amarissimam antidotum Petroselinum Estreaticum. & maximè si recens fuerit. Præstat enim sicut acerrimum præ alijs Petroselinis, ita etiam amarissimum. Et hunc in modum de Petroselino disseruit Galenus, quem non intelligimus, nec videmus cur propter parvam quantitatem Petroselini amarior reddatur Theriaca, quæ tot alia valde amara recipit.

Aequiva-
cium.

Petroselinum antiquorum non est Apium sativum, seu Petroselinum vulgo vocatum, licet Marcellus hæc non alià quàm natalium ratione inter se differre, cum Anguillara & Guilandino credat.

Apj, sive Petroselini Macedonici planta multis, Apj nobis mox tradetur.

Saxifragiam majorem quidam Neoterici Petro- selinum Macedonicum Dioscoridis volunt.

Apium montanum nigrum Lob. Obs. & Ic. Pe- troselinum appellavit.

Apium sive Petroselinum suum habet Dalecham- pius, quod tenuissimum cognominamus.

Herbam Gleys [Cicutariam sativam dictam] Pe- troselinum dicere quidam audent.

Adversaria cur suum Oreoselinum [Apium mon- tanum] Petroselinum dicant, videant lectores.

Petroselinum Macedonicum non est Olusatrum, vel ut corruptè pronuntiant Olixatrum, aut Alexandrum, ut dicimus capite de Macerone.

Pro Petroselino Dioscoridis & Galeni pinxit Fuchs Sifon, ut postea demonstratur.

Petroselinum quidam putant Ostrutium esse, referente Lacunà, qui hoc separat ab Imperatoria, quod considerandum, quam privatim etiam aliquos Petroselinum esse censere narrat.

Cæterum, Petroselino deficiente sumendum præcipit Traët. qui pro quo semen Apj.

Petroselinum si desit, Cuminum substituit Col- legium Florentinum.

APIVM SIVE PETROSELINVM
Macedonicum multis.

QUOD hodie Macedonicum petreum Apium putatur, folijs est quàm Apj hortensis majoribus, firmioribus, nitidis, atrovirentibus, quorum fapor ignavior, quàm hortensis nostri videtur: caules striati incanè pubescunt lanugine: umbellæ candidæ semè striatum hortensis & sativi Apj ferè par, tomento obductum est albicante.

Inscribitur hoc apud Matt. in com. cum mag. fig. hist.

germ. & epit. cum add. Cam. Cast. Ger. Lob. adv. p. 315. Obs. p. 406. Icon. p. 708. Tab. (hoc titulo in Ic. p. 87. est non conveniens figura: ea enim transposita est sub titulo Hippofselini in eadem tabella.) Petroselinum Macedonicum. A B. phyt. (ubi plures plantas confundit) Apium sive Sium 13. & Petroselinum Macedonicum Dioscoridis. Eid. apud Matthiol. Apium 5. sive Petrof. Macedonicum. * In pin. Apium 12. Macedonicum: Apj alterum genus peregrinum, Cz. alp. Daucus 2. Dioscoridis, Col. A Schvvenckf. Apium Macedonicum. A Lug. p. 703. Petroselinum Macedonicum Matth. A Dod. lat. Petroselinum Mac. d. e. Lobelo.

Germ. vocatur Stein-Eppich / Apium Petraum, aut Stein Pet. in Belg. Etten Teppe. Gell. the. ou Persil des rochers. It. Petrosello Macedonico, Petruscis Petrosello Macedonico, Hesp. Apio que crece en las piedras. Angl. Etten Petrelin.

Ex semine per fratum C. Bauhinum allato ex horto Patavino provenit Montbelgardi in horto E.C. sed sine caule primo anno, & vix Hiemem fe-

rens. Argentinae femine maturo conspiciebam Octobii in horto D. Meieri. In Silesia referente Schwenckfeldio, fignoris impatiens ex semine hortis Medicorum familiare.

APIVM MONTANVM, SIVE Oreofelinum veteribus.

CAP. XLV.

Oreofelinon, autore Dioscoride, caule est dorantem alto, qui quidem singularis ex graci-
li radice affurgit: ambiunt verò ipsum ramuli & in
summo capitula [*καυανειαι, & καυανειαι*. Lacuna tamen
legit *καυανειαι* & hæc lectio Theophrasti & Plini-
ij quidem autoritate comprobatur.] Papaveri [*καυανειαι*]
similia, at multò tamen tenuiora, in quibus semen
oblongum, acre, tenue, odoratum, Cumino simile.
In petiosis montosisque locis nascitur. Et semen
& radix urinam ciendi vim habent, si in vino
bibantur, ac menses etiam trahunt. Antidotis quoque
& urinam cientibus atque excaleariis medicamentis
inferuntur. Neque verò nos oportet in eo errore versari,
ut id Oreofelinon existimemus, quod in faxis pro venetia
enim est Petroselinon.

Montapium ab urbano maioribus differentiis, quam
vel Equapium, aut etiam Paludapium, distat: referente
namque Theophrasto, folio Cicutæ simili constat:
radice tenui, caule Anethi, minutorum tamen,
datur in vino austeri menstruum gratia.

De Oreofelini folio, radice & caule eadem habet
Plinius l. 19. c. 8. ubi Apium tertium constituit. Is
rursus l. 20. c. 11. ait. Quartum genus ex Apio faciunt
aliqui Oreofelinon, palmum alto frutice ac recto,
semine Cumino simili, urinæ & mensuris efficacæ.
Sed & semina eo purgantur ex vino.

Ex his itaque palam fit, à Theophrasto & Plinio
folio Cicutæ hoc Apium describi: A Dioscoride autem
nihil de foliis agit: sed à tertii radice singularem
prodire caulem, circa quem ramuli sunt & capitula;
ut in quibusdam Græcis legitur, *καυανειαι* (& non
καυανειαι, Opio) *παρμακισσιν*, Papaveri æqualia,
multo ad hanc rem sensu. Quandoquidem comparanda
inter se plantarum capitula, non liquorum similes vires.
Quam ob causam cum Hermolani Theophrasto
legisset *καυανειαι* *καυανειαι* *καυανειαι*, folio namque Cicutæ
simili constat, veritè *καυανειαι* *καυανειαι* *παρμακισσιν*, capitulis
Cicutæ similibus, ratis corruptum locum esse, & pro
καυανειαι, quæ Cicutæ est, malè *καυανειαι*, qui Papaver
est, legi, in utilibus absurdæ conjecturæ: siquidem
καυανειαι legendum est, & de Papaveris ramulis ac
capitellis accipi debet, & non de foliis. Immeritò igitur
legendum arbitror cum Theophr. & Plinio *καυανειαι*:
facilius fieri potuit, ut *καυανειαι* à voce *καυανειαι*
depressa & *καυανειαι* vocabulo ad finem *ω* additum sit.
καυανειαι autem nullo modo legi potest, dum nulla sit
ramulorum & capitellorum ad Papaveris succum
similitudo. Videtur itaque non posse, quod Theophrasto
de foliis docet, ad capitula Dioscoridis referri:
nec Cicutæ semen in capitulis, sed Feniculi modo
in umbella habere describitur. Si tandem cum Corn.
& Lacuna pro voce *καυανειαι* legendum foret
καυανειαι, lectio illa manca foret & imperfecta,
persuadeturque id quod mox sequitur, capitula illa
papaveraceis multò tenuiora esse, & in illis contineri
semen, quod foliis à natura negatum est.

Galenus porrò Oreofelini similem Apio vim esse
ait, sed robustiorem. Ceterum, vox ipsa montanum
Apium indicat, & Dioscorides à Petroselino aperte
distinguit. Sunt tamen qui hoc, agreste Petroseli-
non vovent, Egypti verò Anionum.

Lacuna tandem Apium montanum incognitum
esse ait. Sed nec Cornarius reperit aliquem, qui vel

ipse viderit, aut ex alio naturale; aut pictum monstravit.

Oreofelinum tamen Græcis, auctore Anguillara, *Charephyl-
lum*, est Charephyllum, de quo ante egimus.

Habet Apium suum montanum Dalechampsius.

Est & Apium montanum, Oreofelinum Sequanorum,
foliis Cicutæ femine oblongo, nigro, Cymini.

Oreofelinum nigrum, sive Apium montanum nigrum.

Oreofelinum album, Apium petrzum, sive montanum album.

Oreofelinum quoque dicitur de Saxifragia hircina.
Sed nobis nulla harum plantarum descriptioni Dioscoridis
respondere compertum est, proindeque aliquam ex præ-
nominatis Oreofelinum antiquorum esse non possumus
asserere.

APIVM MONTANVM DA- lechampi.



Radice crassâ, Desir. longâ; extrinsecus nigra, intus candidâ, acri, odoratâ, aromaticâ, foliorum densâ comâ circa radicem humi jacentium, Apio hortensi similitum, sed latiorum, jucundè olentium in pediculis inferne ramentibus: caule cubito altiore, è medio foliorum ambitu proficiente, ferulaceo: flore in umbella candido, semine Apij, acri, odorato & amaro.

Cum Apium hoc montanum Dale-

champi in quibusdam Dioscoridis historiæ reput-
gnet, patet Oreofelinum Dioscoridis hæc esse
nuncupandum (ut quidam vocant, aut etiam Oreofelinum
majus appellant) ac propterea depravatos esse
Dioscoridis codices asserendum. Hanc verò
eamdem numeto esse cum Apio montano nigro
concludere non audemus, licet id asserat C. Bauhinus.

Provenit in asperis saxosis, lapidosis, apricis; non
nunquam etiam ex saxorum rimis emicat. Floret
Julio mense.

APIVM QVOD OREOSELI- num Sequanorum, foliis Cicutæ, femine oblongo, nigro, Cymini.

PROPRONUNT alij aliud præter jam dictum
Oreofelinum, in Sequanorum montibus, ad
pratorum saxosos margines nascens, caule & fo-
liis Cicutæ, nunc humile, nunc procerum pro loci
natura: radice tenui, candidâ. Flore in umbella
albo, semine oblongo nigro, acri, odorato, Cymino
simili, referente id Lugdunensi p. 702. Quails
hæc stirps sit indagandum relinquimus iis, qui
plantam natali loco collectam, imagine exprimentam curabunt.

APIVM MONTANVM
nigrum.

post se relinquunt longè folijs aciora, compressa, lata, & ferè orbiculata, colore ante maturitatem plenam modò rubente, idque intensius, remissiusve, modò viridi. radix insigniter crassa, mollis, superemà parte capillata, intus forisq; albida, sapore acri, amaricante, ingrato nonnihil, succum è vulnere remittens, lactescens, viscidum, resinofum.

Polychrestum Cord.

Plantam à nobis delineatam Cord. hist. l. 2. c. 125. vocat Polychrestum, ac sic describit. Foliosam à radicis capite emittit comam, undiq; per terram sparsam. ipsa autem folia non simplicia atque individua, sed multifida, omnium ferè umbelliferarum modo: siquidem pediculi tenues à radice exeunt, crebrò articulis intercepti, qui in singulis articulis in ternos furculos sapios & multis vicibus subdividuntur. ultimis extremis, minimisq; pediculis folia insident exigua, in multas tenues partes secta, & crebris incisuris, partim Coriandro, partim sativo Petroselinò similia, cum fructificare inceperit, arefcentia. Caulem è media foliorum coma erigit unum atque alterum, aut nonnunquam plures secundum radicis ætatem, cubito plerumq; procerum, teretem, modicè striatum, longo intervalle geniculatum, intus fungosum, acque per omnia Anetho similem, paulò tamen tenuiorem, folia è geniculis proferentem, inferioribus similia, sed multò pauciora minorq; in cuius summitate umbella expanditur lata, quinque aut sex unciarum latitudine, quadrantalibus plerumq; furculis confians, candicantibus flosculis plena. siquidem singuli umbellæ furculi, in plures tenuiores furculos subdividuntur, minoris umbellæ speciem referentes. semina singulis floribus succedunt bina, conjunctaq; tanquam unum sint, Anetho latiora, crassioraq; colore subfusca, sub ipsa umbella, tenuia, oblongaq; exeruntur cœu folia. Radice nititur tricubitali, aut nonnunquam pro ætate, longiore [Mirum hoc, cum caulem dixerit uno cubito durare, plerumq; proceriorem esse. Geln.] brevior ève, superius crassitudine digitali, candida, carnosa & perenni, quæ præcisà lactem remittit liquorem. saporem radix habet Pastinacæ sativæ similem, si mulque amarum & subacrem. semen gustu radici respondet. Lacteus verò liquor cæteris paribus efficacior est: folia imbecilliora sunt: flores postremo mediam tenent inter folia & radicem temperem. Nasctur asperis, sabulosis, arenosis campis,

tumulis & arvis, plurimùmque in VVitenbergen: si Electoratu. Hæc Cordus, apud quem Gesnerus, vel alius hæc annotat: Nomen unde incident Cordus, ex descriptione non video: si nomen fingendum sit à foliorum crebris incisuris, aut furculorum, qui umbellam constituunt, divisionibus, Polymetum fuerit dicendum, non Polychrestum. Fortè Vielgutha, i.e. Valde Bona: etsi alia videtur Valde Bona Italarum: & Tourte bone, i.e. Tota Bona Galorum.

An Monach. in Mef. dist. 7. cens. 25. Petroselinum & Apium petræ, in montibus Rhetianis & supra Palumbatiam inventum? De hoc Apio petræ Monachorum hæc Matth. in Diosc. l. 3. c. 64. An legitimum Petroselinum Macedonicum vocatum in Italia proveniat, non equidem asserere ausim, etsi Monachi se in Romanis quibusdam montibus invenisse testentur, quod tamen (si vera referunt) Romanum quidem, non Macedonicum appellandum fuerit: An rursus c. 65. vocat Apium montanum & Oreoselinum?

Geln. h. dicitur Apium montanum, i.e. Oreoselinum, persimile specie saporeq; Petroselino vulgari, nascens in colle primo juxta Rhenum, bore ferè supra Basileam itinere ad sinistram, superficie simillimum illi, quam Cervicariam radicem nigrum Germani vocant, lacteo liquore manans, ob quem Enopium [hæc vox in usu non sit] Oreoselinum nuncuparetur: sicut & Thymum. An eidem stirp. app. Apij crispi nomine herba ex Italia missa, silvestris, ut apparet, nec Apij seu Petroselini vulgaris odore æmula? An præterea de Apio petræ loquitur Geln. in epist. ad Io. Fabricium, epist. lib. 3. cum ait: Ex tribus illis herbis, quas misisti, Altera Apio sativo similis est, & nulla apud nos: memini sem tamen circa lacum à schibus dictum, invenisse: Seseleos speciem neque ipse putarim. Nam omne Sesele radices vegetas & satis validas habet, & caput radicis setosum, quod & aliis quibusdam umbelliferis, sed paucis contingit. Sed neque Petroselinum Macedonicum, hoc enim in petris quidem montium præsertim Macedoniæ nasci scribit: sed adeò medicatum & vehemens, ut nullum Apij genus, acrius, amariusq; reperitur, quibus etiam qualitatibus, ut verum Thymum inficiat. Ego Astrantium ejus vicem suppono. Oreoselinum appellemus licet, quod & montosa sit herba, & Selino perquam similia. Semen ejus maturum ad me mitti cupio, ut certius judicem. Tribuit enim & Dioscorides semen Cumini, oblongum, acre, odoratum, tenue. Novi & alias duas Oreoselini species. Existimandum est autem nullas propemodum herbas esse, quæ non genus aliquod constituent, in duas aut plures species diversas dividendum.

Oreoselinum Parisiense ad hoc caput refero, donec mihi constet quantum differat, ab Apio, quod montanum nigrum voco. Parisienses (inquit Lugd. p. 702.) pro Oreoselino plantam monstrant raram & nobilem in sabuloso Surenæi montis vertice, nec usquam alibi nascentem, radice longâ, crassâ, acri, odoratâ, sapore & odore Empetro nostro similimo, comâ Apij, humi pro cumbente, densâ flore in umbella candido, semine acri, & odoris suavis.

An Cassalp. l. 7. c. 33. hoc intelligit per Sesele Creticum, de quo ait. Apud nos in silvis nascitur, tractu maritimo, & collibus arenosis: pauca fert folia, inflexa ad terram, Apij modo divisa, parvis & raris segmentis, crassis & præduris, quæ ex prælongis, & patulis pendent pediculis: caule singulari constat, rotundo ac subnigro, cubitali: in cacumine duas, aut tres umbellas gerit: flore ex albo subrubente: semina fert in rotunditate compressa, magnitudine Lenticulæ, circulo quodam foliaceo circumdante, sub.

subfulva, acris, & odorata: radice constat singulari, in altum demissa & odorata, & albâ. Altera est in montibus similis prædictæ, sed pluribus ab eadem radice caulibus, triatis: foliis longioribus, tenuius incis, subjectis: radice constat in multos ramos distributa, & subnigra: semina in totum similia: idcirco & hanc Tordylio congenerem statuo. Hæc ille de suo Selsi Cretico, quod videtur in multis convenire cum nostro Apio montano nigro, non audemus tamen idem asserere. Alterum quale possit esse nobis non constat. Scitipium periti confiderent, aliquis præter illum ejus meminert.

An Thulio Libanotis alba minor seu amara, foliis latioribus, & profundius dentatis, radice resistens nosso succo surgente, thus spirante, flavescensque, ac amarâ, candidâ, multissimâ sæpè, & crassâ?

Clus. pannon. p. 695. & hist. Oreofelinum, ut & Ger. primum, Tab. Lob. adv. p. 315. Obl. p. 406. Icon. p. 707. Oreofelinum, sive Petroselinum. Dod. lat. Oreofelinum sive Veeltgutta, ubi describit ac ait: Oreofelinon quale quidem à veteribus describitur, innotitiam hæc ætate pervenisse non constat. A montibus autem apud Græcos *O'porelinon* nomen est, quod Latini idcirco Apium montanum & Montapium appellant. Dicitur verò & idem, ut inter rejectaneas voces reperitur, *παρασέλινον* & *ἀπύριον*, & Latini Apium: Sed Dioscorides Petroselinum ab Oreofelino diversum statuit. Veeltguttam verò Latine Multibonam quis dixerit, hoc enim nomen accepit, quod ad multa utilis & commoda habeatur. Non omnino verò improprè & hæc Oreofelinon nuncupatur, nam in montibus gignitur, & Apio non dissimilis est. Desideratur semen Cumino simile: tale si haberet, Oreofelinon legitimum esse, quis negaverit?

Bauh. phyt. Daucus 6. montanus Apii folio minor: Apium montanum & Oreofelinum nigrum. Gesn. h. Dauci 2. Selinoidis varietas, sive Selinoides Cordi Lobelio Obl. p. 414. sine icon. an Daucus (addit in pin.) selinoides latifolius, Cordan Apium sylvaticum, Thal. Eid. B. Apium 5. (6. pin. ubi & Apium montanum, Cast. Lugd. Variatatione loci, nam foliis tenuius divis, in pratis udus Michelfeldæ reperitur.) montanum folio ampliore: [Apio, Petroselino Dalechampii tenuifolio.] Apium crispum, Thyfelinum Plinii & Agriofelinon [falsè enim legitur ubi Agriofolum.] Galeni Guilandino: Oreofelinum sive Petroselinum Lobelij. Miramur C. Bauhinum diversum tradi Oreofelinum Gesneri ab Oreofelino Lobelij, quum manifestum sit eandem esse plantam consideranti descriptiones & iconem: præterea Oreofelinum Gesneri non convenit cum Dauco Selinoides Cordi. Eid. pin. Apium 8. montanum nigrum: Oreofelinum Parisiensium, Lug.

Schvvencckf. Apium montanum: *O'porelinon* Dioscoridis, Clusio: *Ορεσέλινον* ἔγγλον, seu ἔνταρον, Gesn. Polychrestum Cordi: Polymetum Gesn. Montapium. Vielgürt / Augenwurz / & Berg Peterlin / Silesis: radice longissima. Nos latet ubi Clusius asserat esse Oreofelinum Dioscoridis: vellemus locum annotatum.

Apium nostrum nigrum, denominavi Oreofelinum, non quòd descriptioni Dioscoridis respondeat, sed propter natalem locum. Basilæ locis montosis ad meridiem sitis provenit: in Alsatia copiosè prope S. Thamarin in pratis siccis & arenosis, non longè à Bessordia florens Junio & Julio secus viam: in Rhetia Junio prope Cuniam in pratis: Geneva in monte Thuri: Lugduni frequens: Montbelgardi in atrida planitie. Veeltgutta Dodonzi in iis montibus provenit, qui Silesiam à Moravia, olim Marcoman-

norum provincia, dicuntur; tam & in aliis montibus ac collibus. Meminit verò Dod. olim hanc ad se missam à Martino Tulemanno, qui in montosis apud Eburones ac Tongros, nunc Leodios, hanc repertam in horto suo Trajecti ad Mosam studiosè alebat. In monte, qui Badensibus thermis imminet & in aliis vicinis collibus, atque urbi Viennæ Austriæ proximis vulgare esse Oreofelinum refert Clusius. Rarius occurrit Lobelio nisi in montosis Lugduni, prope sequanum & in valle Ostensi Pedemontana. Amat in summa montosis arenosisque tractus. Abundat in Silesia propè Gryphbergum in pratis ad Quissum fluvium. Julio & Augusto flores in umbella, cum semine Anchi nigricante, ostendit. Schvvencckf.

Radix, inquit idem, calida & sicca est tertio recessu [secundo ordine intensio, Dod.] Externuat, aperit, incidit, utinas movet. Calculos dissolvit, menses provocat, jecinoris & lienis obstructions solvit, regio morbo auxiliatur. Manducata dentium dolores mitigat, ac salivam ciet, torminibus ventris succurrit, visum exacuit, & alios multos usus præstat.

APIUM PETRÆVM, SIVE montanum, album.

APium hoc petræum folia habet dodrantalia, *Deser.* pulchrè in alas oppositas divisa, atque hæc rursum in opposita segmenta, Apij nigri montani segmentis similia quodammodo, quæ mirè variant pro locorum diversitate: quædam enim valde tenuia quasi crispula:



caulis fœniculaceus, cubitalis, modicè plenus. umbellæ parvæ, floribus albis contræ: semina Apij hortensis, longiuscula, hirsuta, striata, cum amarore, aromatica, eodèmq; sapore, ferè ad Apium vulgare accedente prædicta. est radix perennis, crassiuscula, alba, comata.

An Cord. hist. l. An Cordo i. c. 42. vocat Dau-
cum angulosi cau-
lis, quem sic describit: Daucus angu-

losus dum è semine nascitur, primo anno caulem non fert, sed folia undique circa radice caput per terram strata, eà ratione, ut multa folia singula constituent, pedibus enim & canaliculatis pediculis utrinque apposita sunt duarum unciarum longitudine, folia ab utroque latere profundius usque ad suum quoque pediculum in partes per ambitum serratas dissecta: ex his maxima sunt quæ posteriori pediculorum parte exeunt: minima verò, quæ anteriore. Caulem altero & nonnunquam tertio anno erigit tripedalem, minimo digito graciliorem, angulosum & juxta terram ferè triquetrum, nisi plures intercederent minores anguli, solidum & geniculis præcinctum. folia è geniculis se proferunt inferioribus similia, breviori tamen pediculo: & ex horum alis pedales, ac plerumque individui ramuli, angulis striati: in quorum cacumine æstare singulæ sunt umbellæ, formæ convexæ, den-

sz & candida, minimisque floribus fardz, melleo liquore veluti conspersa, quibus odor est lixivii aut saponis, sive mellis calce mixti. Semen

Radice nititur diuturna, pedali, pollicis aut digiti crassitudine, candida, circa caput propter amissorum foliorum vestigia & nervos pilosa & villosa in crassiores fibras distracta, per quam lignosus descendit nervus. ea gustu acris est, salivam provocat, diuque fervorem in gustantis palato relinquit: folia acrimonia mixta quoque amaritudinem habent. Semen verò

Nascitur alperis & editis locis: copiosissimamque Ienæ, in vinearum incultis calciosisque partibus: & VVirtemberge in tumulis quibusdam sibilosis, qua ex urbe vetulus Septentrionem itur. Et hæc de suo Dauco anguloso caulis scribit Cordus, apud quem in annotatione quaerit G. Snerus, numquid cum Oreoselinis, h. e. Apio mōtano, commune quid habeat hæc herba. Nos quidem diversam existimamus, ac fortè non malè sequi posse credimus hoc Apium, Pimpinellam tertiam Tragi, sive Pimpinellam crispam Tabernomontani, cujus descriptionem ponimus cap. de Saxif. ag. minore.

Apium mōt.
r. nam a
marum.
Gijn h.

Gula verò de hort. vocat Apij montani genus aliud amarum, Legatij montis ad Badam Helvetiorum, radice multis annis durante. Hoc Oreoselinum anopum, quoddam liquore resinoso caret, si libet, cum G. Snero nuncupamus: sicut & ἀχυνος græcè est si dicitur in usu non lit.

San Thalis
Libanotis
alba mō.
par.

An Thalis Libanotis alba minor, seu amara, foliis contractionibus, & frequentius, succinctiusque incis: Cum hac plerique notis congruere descriptionem Dauci angulosi apud Cordum testatur Thalius quidem, sed tamen Dauci angulosi radices saporem acrem esse, huius verò amarum.

Recht cum
sappure.

In petrarum nimis ante quinquaginta annos Basileæ provenire observavi in Michionardi monte prope pagum Kierzach, & Badz in Helvetiorum monte, seu Basileensium prope Wasserfall / florensis mens Augusti: in monte Malsün inter supra Seenthal pagum, ultra stagnum magnum: reperiuntur propè S. Hippolitum in monte attuli Montbelgardum plantandam in horto E. C. ubi primo anno caulem non proferebat. Frater attulit ex Italia pro Apio Guilandini, Petroselino Cortusi. Eandem rursus dedit pro Dauco tertio Dioscoridis, & Pyrethro vulgari Paravinorum Cortusi. Sed duæ sunt plantæ distinctæ. Vereor ne hactenus diversæ confundantur plantæ, quas distinctas habeo. Apium enim Gula dicitur Oreoselinum, vel Pyrethrum alterum Planisii p. 775. Daucus verò tertius Dioscoridis Guilandini, multo n. differt, folia habens multò latiora, non ita copiosa, nec in tot ramos divisa. Pyrethrum etiam habeo, quod ab his duabus plantis diversissimum & à Guilandino Pyrethrum i. Mat. holi vocabatur, & à Cortusi Pyrethrum Burfelij. Qualis autem sit illa, quam scribit me Dornaci observasse, nescio, nullam enim ex his tribus Dornaci observavi, quod recorder, nisi plantam videam. Si frater volet tunc has diversas plantas Deo dante, ex meo herbario illi mittam.

APIVM SILVESTRE DA- lechampij folio perquam tenui.

APIVM silvestre [αἰθρῶν ἀγρῶν, cujus meminere Theophrastus & Dioscorides] hic ex Dalechampij opinione olim depictum, descriptionemque, radice est gracili, longâ, candida, odo-



ratâ: foliis Apij hortensis, perquam tenui: caule palmum alto: flore pusillo, albo, in exiguis umbellis, quas herbacei cortices glumis spicarum non dissimiles sustinent, & subtus ambiunt, semine minutulo. In alperis collibus provenit.

Apium verò silvestre quod Dioscorides exhibuit, longè altius est ab Apio silvestri Dalechampij, ut inscribis demonstratur sumus.

UMBELLIFERA ALSA- tica magna, umbellâ parvâ subul- tea.



INDICTA, quod sciam, herbaris est hæc planta, proceritate hominem æquans, aut major, caule rubente, striato, geniculato, inani, firmo satis, & in ramos diviso: ad cuius singulos nodos pediculi caulem euvagina amplectentes, oriuntur, longi cubitum unum, ex cuius lateribus alij breviores prodeunt folia sustinentes Sileris aut Apij petrei modo dissecta, sapore amaricante & aromatico prædita: umbellæ pro plantæ ratione parvæ, Apij umbellis pares, ex floribus conflantur luteolis, quorum singulos componunt foliola quinque cum apice longiusculo in medio: semen gemellum, Anethino simile, foliaceum, latum striatum, sapore aromatico, subacri & subamaro, radia lignosa, rugis arata, vegetiore sapore prædita est quæ semen.

Anno 1592. in fine Novembris inter Colmariam & Sultz inter dumeta reperit, hominis altitudinem excederem, radice perenni, ut puto. Eodem anno Basileæ ejus nomen à me inquirebat frater C. Baubinus, qui collegerat in Alsatia. Cum flore & semine maturo observavi 1597. Octobris 5. inter Ruffack & Colmar.

SISON VETERVM. CAP. XLVI.

SISON exiguum semen esse, & in Syria nasci, Apio simile, oblongum, nigrum, & ferventis gustus, constat ex relatione Dioscoridis. Bibi verò contra lienis vitia, & urinæ difficultatem, itemque ad commorantes

morantes mentes evocandos. Eo ipso indigenas cum Cucurbita in acetosella condimenti vice uti. In cacuminibus ceugranula multa gerere, *ἡ χυρὴ δὲ ὅς τις κακία πολλὰ καὶ διὰ τὸν*. Sed his vetus caret. Cate- rum, sunt à quibus *σίνων* & Sinnon, sive Sinon in notis vocetur. Romanis pariter cum Græcis Sifona & Sinnona dicitur.

Cognovit & Hippocrates Sinnon. Sic enim eum appellat: cognovit & Paulus Ægineta & ante eum Galenus, qui Sifonem calidum & subamarum gustantibus esse testatus est ideoque & urinam ciere, & concoctiones adjuvare mentesque provocare, & omnes circa viscera obturationes [*σπλ. χυρ.* Græci dicunt] referre. Sed novit & Cornarij vetus Phnians codex l. 27. c. 13. qui Sinon habet, ubi in vulgatis simul legitur, & quod sequitur ad Sifon pertinens, Smyrnio attribuitur. Locus is est. Sinon concoctiones facit, sapore similis Piperis. Eadem in dolore stomachi efficax. Quod verò sapore Piperis esse ait, respondet voci *σινων*, quam Dioscorides usurpat, servidū esse scribēs. Porro Dioscorides exigū semen in Syria nasci dicens, importūne relicta herbā historiam & caput hoc à semine ejus inceptit. Oportebat enim (quod etiam Marcellum remoratur & suspendit) à planta descriptionem incipere: nisi forte in re tunc nota, satis fore credidit ex eo quoddam in usu erat, totam indicasse plantam.

Fuerunt tandem ex posterioribus aliqui, quoniam Apio simile Dioscorides esse dicat, silvestre Petroselinon esse affirmare non dubitarint: quod parum verisimile est, cum hoc Dioscorides in Syria tantum nasci testetur.

Tragus Chærefolium satis quadrare credit Dioscoridis capiti de Sifone.

Recentiores Medici, qui barbaro adhuc seculo vixerunt, Olusatrum, quod Macerone inscribimus & Sinon, idem esse putarunt, sed male.

Ammi minus quod vocamus, à Coldenbergio Sinon appellari, testatur Gesnerus hort.

Ait Dodon. gall. doctos quosdam Saxifragiam minorem, Sifonem Dioscoridis nuncupare.

Corn. in Diosc. l. 3. c. 54. semen quod vulgò Sine appellatur, & ab officinis semen Zedoarie dicitur, ab aliis autem, ut & nobis semen lumbricorum, verum Sinon esse arbitraretur, ex appellatione inductus, nisi usus vulgatus repugnaret.

Nos contra Amomum officinarum Sifon esse tenemus, de quo mox agemus.

Collegium Florent. in antiball. Daucum pro Sifone substituit, ceu & Antid. Romanum.

Ait Ætius Tetrabibl. 3. Sermon. 2. cap. 21. pro Sifonis semine, Ligustici semen admittit.

Baud. pharm. l. 1. sect. 4. in pulvere Diaprasii Nic. confundit Sinon cum Apio montano, quod Oreoselinum Græcorum esse ait, ac diversum facit à Petroselino Macedonico contra Pandætarium & Platearium, ejusque sequaces.



res vocarunt hanc herbam Sinon, Senon & Silon. Idem in hist. lat. ait: Amomum germanicum, Petroselinum peregrinum appellatur, nos illud Sifon hortenſe dicimus. Minus germanicum, mum quoddam Apiorum genus esse videtur: venditari solet semen contra veritatem pro Amomo. Hæcille qui sibi contrarius est, Apium quoddam esse modò negando, modò concedendo.

Fuchf. in Icon. vocat Petroselinum Macedonicū, Welsch Petersilgen. In hist. c. 254. Petroselinum & Apium saxatile. Germ. Fremdb Petersil/ Gall. Macedon. verd Persil de Roches & l'aux pierreux, aut Macherons cum, Fuchf. nominari commodè posse ad Oreoselini differentiam putat, ac ait: Officinæ hujus herbæ semine pro Amomo utuntur, non tamen sine magno errore, quum constet omnibus Amomum ab hac herba esse diversissimum. Ego ut tandem scirem è qua stirpe semen hoc decerpatur, terræ illud mandavi, & hæc cujus pictura formam ostendit, herba erupit, quam ego verum esse Petroselinum credo, cujus brevis delineatio est apud Dioscoridem atque imperfecta, ut nihil mirum sit, me hæcenus quod verum esset Petroselinum non potuisse cognoscere. Merito itaque hoc loco, ut compluribus etiam aliis, Dioscorides negligentia insimulari potest, ut qui mancas ac mutilas plerasque posteritatis relinquere stirpium historias voluerit. Si verò quipiam paucas etiam has notas expendat haud dubie herbam hanc Petroselinum esse comperiet. Semen enim ejus Ammi tam simile est, ut ab eo vix discerni queat: odoratus etiam existit & acre, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi non respondeat, ut hoc nomine verum Petroselinum esse credam. Quin etiam tota hujus herbæ forma, quæ non multum à Germanico Petroselino abest, atque odor, Selini speciem esse docent, ut pro Petroselino usurpare hanc ipsam officinæ tunc possint: semen enim quo hodie utuntur, non Macedonicum Petroselinum, sed Hypposelinum existit. Sunt porro qui hanc herbam Sifona pro Petroselino esse putent: quorum sententia cur non magnopere repugnem, facit imprimis Dioscorides, qui Sifona petinde atque Petroselinum suis notis haud descripsit. Dein quod viribus non discrepent, atque adeo in usu hujus aut illius nullum sit periculum. Ego tamen meam sententiam propter jam adductas rationes deferere, nisi evidentibus convictus argumentis, non possum. Hæcenus Fuchsius qui herbam quidem depingit, sed non describit, ita ut merito de eo dici possit, quod ipse de Dioscoride protulit. Eum sc. hoc loco non sine occasione negligentia insi-

Amomum officinarum.

Amomum germanicum.

Tragus sibi contrarius.

Petrosel.

Macedon.

germanicum.

Tragus sibi contrarius.

Officinæ error.

Petroselinum.

Dioscorides.

Fuchf.

Dissecta.

Sur.

Selini spec.

etc.

Fuchf. & darguiss.

SISON, SIVE OFFICINARUM AMOMUM.

SISON caulem producit gracilem, teretem, moduloso, cubitale & altiore: cujus folia longa, pinnata in Pasticæ Germanicæ morem; singularia tamen folia, Sifon foliis similia, tenera, oblonga, circumcirca crenata, aliquando & laciniata. Flores in umbellis parvis candidi: semine subsequente perpusillo, fusco, striato, gustu acriusculo, aromatico. radix gracilis, fibrosa.

Marthiolus licet Sifon semen esse in Syria providens ex Dioscoride testatum reliquerit, nobisque propterea incognitum dixerit: qui plantam, quæ

mulari posse, ut qui mancas ac mutilas plerasque posteritati stupam historias relinquere voluerit, easque turpius confuderit.

Petroselin.
Macedoni
cum Dod
gall.
Dodon. us gall. Petroselini Macedonici titulo pinxit, eique Petroselini nomine delineavit ac dixit Petroselinum hoc exoticum appellatum esse, quod Petroselinum, & quia abunde crevit in Macedonia.

Petrapium
Apium
nati
etrofel po
regnum.
etrofel
Macedon
obij. Dod.
lar.
Fuch.
Dodon.
lapsum.
Petrapium, Apium laxatile, & Petroselinum: Gall. *Perfil de roches*: Germ. *Stein Eppisch* aut *Stein Peterlin*. Belg. *Stein Eppe*. Vocatum est etiam ab ignaris pharmacopolis Amomum: Brabant. *Vremde Perselic*, h. e. Petroselinum peregrinum: quod tamen dubio procul est Petroselinum verum, nominatum à loco, in quo abundat, Petroselinum Macedonicum. In foliis appellat Petroselinum Macedonicum Fuchij, ubi eos hallucinari scribit non parum qui plantam hanc Amomum esse velint. Is verò eam pro Petroselino amplectitur, eodem sanè etroselo, quo Fuchius, ac etiam ij, qui Amomum esse pronunciant.

Lonic. nota.
var.
Simon.
Lonic. vocat eodem lapsu Petroselinum Macedonicum Dioscoridis, quod ait officinas assumere pro Amomo, & vocare Amomum Germanicum. Debat is ad hanc plantam referre caput Sinonis, sive Sifonis, quod malè Cicutæ Gleffy adscribit.

Ap. No.
Geln. in app. hort. dicitur Amomum officinarum falsum. Volcanij. Cordo de artif. extract. Ammi Amomum appellatum. Matth. in Diosc. l. i. c. 14. pumilum semen, colore nigro, odore Melanthij, quod quosdam stirpium impostores, ex Gargano Apuliz monte profectos, Amomi vice supponere notat.

Ang. Sifon.
De hoc loquitur Apollo rad. i. supra Diatrion-piperinon. Semen quoddam exiguum, nigrum, & inodorum, à pharmacopolis publicè vendi, pro Amomo scribit Brassavolus: hoc idem Matthiolus, sed aroma olere, acreque esse, secus quàm dicit Brassavolus, ut alterum aberrare necesse sit: quod tamen apud illustres aromatopæos, sæpè, ac sæpius explorare potui, acre quidem conspicuè apparuit, ut Piperis leviculam præ se ferret acrimoniā, nullo tamen aromatis odore.

Locus et
ampm.
Ang. ep. 12. nominat Sifon, ac à quibusdam, potissimum verò ab herbariis Bononiensibus, *Simulo* vocari scribit. Cord. in Diosc. & hist. Sifon & Sinon. Lugd. p. 709. Sifon & Petroselinum Macedonicum Dodonæi. Cæf. & Bauh. tam apud Matth. quàm in phyt. & pin. Sifon Dioscoridis: Sifon, quod Amomum officinis nostris: Amomum germ. Trag. Amomum offic. falsò dictum, Geln. h. Sifon, Ang. Geln. h. Lugd. Tab. & Cam. Ammi parvum, Geln. h. Sed & Sifonis (quod Plinio & Græcis multis, tam veteribus, quàm recentioribus Sinon vocari ait) descriptioni nihil accommodatius Turnerus invenit Amomo vulgò dicto: quod & nonnullis Apium nigrum (Anglis *Black Perselic*). Circa sepes nascitur, foliis Pastinacæ Germanicæ; radice eleganti, longâ, dulci, gustu non nihil calida, semine nigro, calido certè, sed non fervido. Quid sit verum Sifon non auit pronunciare, sed solum fieri posse dicat, ut ejus sit species aliqua.

Sim.
Sifon Montbelgardii in orto E. C. per plures annos colui, ubi facile hiemem ferebat, & semine deciduo se propagabat, florens, & semina maturans Iunio, Julio, & Augusto, virens sequenti anno mense Februario. Habuit idem Lugduni & Genevæ virens Januario. In locis humectis nascitur, non tamen in aquis: semen affertur ex Orientalibus, quamvis passim apud nos (inquit Cæf.) oriatur in foveis.

De Sifonis viribus & usu diximus ante ex veteribus, quos lector consulere velit.

PIMPINELLA IN GENE-

red. ita.

CAP. XLVII.

PIMPINELLÆ nomen non solum Sanguisorbæ, Pimpinellæ & Saxifragæ attribui, ut sit Dodonæus, sed aliis nominibus quibusdam plantis adhiberi, jamjam est demonstrandum. Exat autem vetus versiculus, qui Pimpinellam Saxifragam à Sanguisorba Pimpinella differre ostendit, qui talis est:

Pimpinella pilos: Saxifraga non habet ullis.
Nos quidem relicti aliorum Saxifragæ differentis, eam quadruplicem agnoscimus.

Harum prima est Saxifraga hircina major, quæ quibusdam Pimpinella major Germanica dicitur.

Alteræ Saxifragæ hircinæ mediæ, quæ videtur Daulis selinoides Cordi.

Postrema Saxifragæ hircinæ minor, foliis Sanguisorbæ, sive Pimpinellæ minor Germ. acris, aliis hircinæ.

Ultima Saxifragæ hircinæ minima, Pimpinella crispa Tragi.

Pimpinellæ sanguisorbæ sunt duo genera; una minor, Pimpinella Italica vulgò dicta, nec non Gallis.

Alteræ Sanguisorbæ major flore spadiceo, Pimpinella major multis. Et de his quidem mox ordine patratibus.

Aliæ plantæ, quæ Pimpinellæ nomine donantur, sunt hæc.

Caulis minor Bellonij pulchro semine, quam Camerarius Cæsalpinus Pimpinellam Romanam vulgi vocat.

Caulis major est Pimpinellæ alteram genus silvestre Cæsalpino.

Poterium quorundam, ut dictum lib. II. nuncupatur Pimpinella spinosa.

Anagallis, ut videtur lib. 29. est Pimpinella Anglicæ plebeculæ.

Pimpinella crispa, sive Petrea Tabernomontani, An Apium petrum quoddam?

Pimpinella major Brunschweig, An Pastinaca silvestris Germanica.

Sunt, teste Matthiolo, qui aberrantes Pimpinellam, Elatinen putant.

Chij. Rodij. Peloponenses, Corcyrenses & cæteri Græci, aut idem, Pimpinellam hodie Sideritidem vocant.

Sideritidem alteram, Pimpinellam in Italia dicta, tota Græcia dicitur, inquit Guilandi Theon.

Pimpinellam apud Dioscoridem Tragium dicitur Cæsalpinus. Sed is videtur duas plantas confundere.

Pimpinellæ vetus nomen se quidem ignorare fateatur Gesnerus, sed tamen ad Oreoselinum referendum putat, ut legimus, epist. 3. ep. ad Bened. Aretium.

Illud tandem silentio non involvendum, quod Pimpinellæ à Germanis passim quidem & vulgò Pimpinellæ vocatur, relictis alias gentes, Saxifragam seu Saxifragam (à scutellato calculorum à renibus expellendorum) cognomine hircinam, appellare. Contra verò quam Galli, Itali, & Hispani Pimpinellam dicunt, propriè Pimpinellam vocari, & à nobis Sanguisorbam vel Sorbaltrellam (quod sanguineos fluxus sistat) appellari.

Cæterum, Pimpinellæ, & Pipinellæ, à foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim digestis, nominata, veteribus indicta existimantur: quæ etiam Bipinnulæ & Pampinellæ vocantur.

CAP. XLVIII.



Tom. III.

Esse siquidem Sanguisorbam, quam Pimpinellam vocet, non aihil hirsutam. Saxifragam vero hanc nequaquam.

Siculos porro alios modernos velle reducere Saxifragiam ad aliquot capita Dioscoridis, appellantes Sifon parvam Saxifragiam, magnam vero Petroselinum Macedonicum, & tertium [hircinam minimam.] speciem Dauci. Et hæc in hist. gall. quorum non meminit in lat. ubi hæc Saxifragiam magnam appellat.

Saxifraga, Pimpinella Germanorum majoris, ut vocat Clusius varias inveniri differentias prodidit, tametsi magna ex parte foliorum formâ non variet, (omnia enim in ambitu serrata esse, & per alas ordine disposita tradit) unum tamen genus ex atrovirentia ea obtinere & splendentia, alia minimè: genusque aliud inveniri, cujus folia in lacinias sint divisa: præterea Escherum montem alere, cujus flores eleganter ex purpura rubescant, cum reliquorum sint candidi. Pimpinellam vero hæc germanicam ubique nascentem, & Italiam Pimpinellam hircinam dictam, Tragium alterum Dioscoridis esse suspicari testatur Fabium Columellam.

Bipinellam saxifragam majorem à minori, Lob. adv. sic distinguit. Major in silvis & umbrosis pratis, minus acris, fervidave, & folio longo propius exprimit Apium, quam Pimpinellam [Sanguisorbiam intelligit] proindeque nulla magis Pliniani Phellandri opinionem tueretur. Illæc autem neutiquam à viroso hircumque olente odore Hircina dicitur (Dauci namque, Pastinacæ, vel Ligustri quiddam, nec insuave redolet) sed quia illi adulti hirci, eo quo docent Prædicti modo, sanguis & carnes eximium sint calculosis præsidium, etiamque ictericis & hydropicis. Petrifindula vero vocatur etiam eadem prærogativâ. Icon Lobelii placet, quæ in Obs. p. 43. Pimpinella major Fuchii (ita etiam in Icon. p. 720.) & Saxifraga magna vocatur. Quod autem Petrifindulam ob prærogativam frangendi lapides vocari ait, minus prudenter judicat. Ob eandem siquidem facultatem etiam Saxifragam appellari sequeretur. Sed calculos, quos lapides vocamus, quis petras unquam, ut fixa remanebit?

Nominatur à Camer. h. Pimpinella saxifraga major, quam ait Marantham in suo lib. de Theriaca conjicere non malè pro Oreoselino Dioscoridis posse accipi. Eid. apud Matth. Pimpinella major: In epit. Pimpinella saxifraga: item Pimpinella, sive Saxifraga hircina, Ital. *Saxifragia di Decco*. Si Cæf. Saxifraga vulgè ab odore radicis, hircina cognominata. Thal. Pimpinella nostras communis major, circa Ilfeldam & VVernegerodam, sed rarius, vulgari in omnibus similis, eademque nisi quoddam majora, latioraque aliquantulum folia contineat. Lugd. p. 786. Pimpinella saxifraga major Matthioli. Videtur asserere esse Thaliætrum Rondeletij, & Natricem Plinij Guilandini & Anguillæræ. Esse præterea herbariorum quosdam, qui velint Pseudobunium Dioscoridis, sed alios botiis credere esse Phellandrium Plinij.

Tab. in ic. & hist. hujus imaginem dat, titulo Tragoselini majoris, quam etiam Pimpinellam majorem vocat, Ital. verò *Pimpinella maggiore* & *Petrosello salvatico maggiore*, Gall. *Pimpinella grande*, Angl. *Great Saxifrage*, Belg. *Groot Beuernel* & *Beuernaert*, Germ. *Groß Bibernell* & *Großsen Bock Peterlin*. In genere autem de omni Saxifraga hircina ait: Pimpinella à veteribus non aliter, quam Petroselinum appellatur: est enim verum Petroselinum. Vocatur hoc à Nicolao Myrepto Penpinella; à Ruellio Pampinaria; Hermolao Bibinella; ab aliis Pimpinella, Pampinula, Bipennula, Bippinula, Pampinella, Pimpinella & Bimpinella; Sim. Iauenfe Petrafrindula & Saxifraga; Ab Herbatis & Botanicis Tragoseli-

num, Apium hircinum, Petroselinum hircinum Pimpinella hircina, propter gravem odorem & ad differentiam Sanguisorbæ, quæ etiam Pimpinella cognominatur. Item Saxifraga hircina, Pimpinella alba, & Pimpinella saxifraga. Ab Arabibus, ut Matthæus Sylvaticus perhibet, *Halmach*, *Kexai*, *Kexair*, & *Neseblach*, quæ nomina apud nullum unquam Arabum legi. Italiam Pimpinella & Petrosello salvatico: in Candia sive Creta Pimpinella: Gall. Pimpinelle: Bohem. *Podruyck*, Polonis *Biedrzennicz*: Hung. *Chabaire*: Angl. *Saxifrage*: Belg. *Beuernel*: Germ. *Bibernell* / *Bibenell* / *Stein Peterlin* & *Bock Peterlein* / q. e. Tragoselinum. Hæcille. Ait nol. is Bibinella Hermolai alia est planta, nempe Sanguisorba.

C. Bauh. phyt. facit Pimpinellam i. majorem umbellâ candidâ: is varietatem adverte tradit in foliis, ex Clusio, quem tamen non nominat. Folia (inquit in pin. ubi ipsi est Pimpinella i. Saxifraga major umbellâ candidâ: Pimpinella, Brunf. Cord. in Diosc. Lon. Trag. Fuch. Turn. Gesn. h. Lob. & Cast. Pimpinella saxifraga, Matth. & Ger.) in una atrovirentia, splendentia: in altera minimè: inveniantur & in lacinias divisa. Ait præterea ad hujus radicem quibusdam in locis, grana reperi, quorum medullam in colorem rubeum mutetur, cujus ad tincturam Carmesini usus fit, Lacunâ momente, in quibus vermiculi, Costæ autore, nascantur, ideoque Coccum radicem dici posse. Ego quidem ita denominavi ad meum Lacunam grana illa, provenireque in Pimpinella hæc dixi, non autem Lacuna. Quam porro Clusius vulgaris hujus Saxifragiæ varietatem duntaxat asserit, is tanquam diversam speciem separat, vocatque Pimpinellam i. saxifragam majorem umbellâ rubente: Saxifragam majorem in albis fl. rubente, Gesn. h. Pimpinellam majorem umbellis purpureis, Gesn. fract. Idem inter Saxifragiam & Sanguisorbam non bene distinguit. Est præter alias notas Saxifragia hircina, sive Pimpinella Germanorum, planta umbellifera; Sanguisorba autem, sive Pimpinella Gallorum, Italorum ac Hispanorum præsertim. capitata, corymbiferaque.

Frugosus l. 3. c. 15. videtur Cocheneilla existimasse: Cocheneilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in certis plantis parvis, Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine uvarum silvestrium: quidam putarunt falsò, esse Coccognidium verum: alij esse Chermes Arabum, à Cocco Baphico Græcorum differens, quod manifestè falsum est: hæcille. At Oviedus, ex arbore colligi vult.

Schvvenckf. dicit Pimpinellam majorem, gross Bibernell / Ross Bibernell & Stein Peterlein: item Pimpinellam majorem splendentem, gliscifende Bibernell; rariorem vulgari, ac ejusdem usûs.

Saxifragiam hircinam majorem Basileæ observavi prope Montes florentem & femina ferentem Octobri; Tiguri & Genevæ in horto meo ex vicinis montibus allatam; Majo; Montebardi passim in pratis, Junio & Augusto. Hortis est molesta ob radicem, quæ se multum propagat. Vulgaris porro admodum est per Hungariam, Austriam, Stiriam, vicinasque provincias, Clusio in pratis apricis, & arenosis agrorum limitibus, mense Majo caules profertens, Trago.

Saxifragia

num, Apium hircinum, Petroselinum hircinum Pimpinella hircina, propter gravem odorem & ad differentiam Sanguisorbæ, quæ etiam Pimpinella cognominatur. Item Saxifraga hircina, Pimpinella alba, & Pimpinella saxifraga. Ab Arabibus, ut Matthæus Sylvaticus perhibet, *Halmach*, *Kexai*, *Kexair*, & *Neseblach*, quæ nomina apud nullum unquam Arabum legi. Italiam Pimpinella & Petrosello salvatico: in Candia sive Creta Pimpinella: Gall. Pimpinelle: Bohem. *Podruyck*, Polonis *Biedrzennicz*: Hung. *Chabaire*: Angl. *Saxifrage*: Belg. *Beuernel*: Germ. *Bibernell* / *Bibenell* / *Stein Peterlin* & *Bock Peterlein* / q. e. Tragoselinum. Hæcille. Ait nol. is Bibinella Hermolai alia est planta, nempe Sanguisorba.

C. Bauh. phyt. facit Pimpinellam i. majorem umbellâ candidâ: is varietatem adverte tradit in foliis, ex Clusio, quem tamen non nominat. Folia (inquit in pin. ubi ipsi est Pimpinella i. Saxifraga major umbellâ candidâ: Pimpinella, Brunf. Cord. in Diosc. Lon. Trag. Fuch. Turn. Gesn. h. Lob. & Cast. Pimpinella saxifraga, Matth. & Ger.) in una atrovirentia, splendentia: in altera minimè: inveniantur & in lacinias divisa. Ait præterea ad hujus radicem quibusdam in locis, grana reperi, quorum medullam in colorem rubeum mutetur, cujus ad tincturam Carmesini usus fit, Lacunâ momente, in quibus vermiculi, Costæ autore, nascantur, ideoque Coccum radicem dici posse. Ego quidem ita denominavi ad meum Lacunam grana illa, provenireque in Pimpinella hæc dixi, non autem Lacuna. Quam porro Clusius vulgaris hujus Saxifragiæ varietatem duntaxat asserit, is tanquam diversam speciem separat, vocatque Pimpinellam i. saxifragam majorem umbellâ rubente: Saxifragam majorem in albis fl. rubente, Gesn. h. Pimpinellam majorem umbellis purpureis, Gesn. fract. Idem inter Saxifragiam & Sanguisorbam non bene distinguit. Est præter alias notas Saxifragia hircina, sive Pimpinella Germanorum, planta umbellifera; Sanguisorba autem, sive Pimpinella Gallorum, Italorum ac Hispanorum præsertim. capitata, corymbiferaque.

Frugosus l. 3. c. 15. videtur Cocheneilla existimasse: Cocheneilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in certis plantis parvis, Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine uvarum silvestrium: quidam putarunt falsò, esse Coccognidium verum: alij esse Chermes Arabum, à Cocco Baphico Græcorum differens, quod manifestè falsum est: hæcille. At Oviedus, ex arbore colligi vult.

Schvvenckf. dicit Pimpinellam majorem, gross Bibernell / Ross Bibernell & Stein Peterlein: item Pimpinellam majorem splendentem, gliscifende Bibernell; rariorem vulgari, ac ejusdem usûs.

Saxifragiam hircinam majorem Basileæ observavi prope Montes florentem & femina ferentem Octobri; Tiguri & Genevæ in horto meo ex vicinis montibus allatam; Majo; Montebardi passim in pratis, Junio & Augusto. Hortis est molesta ob radicem, quæ se multum propagat. Vulgaris porro admodum est per Hungariam, Austriam, Stiriam, vicinasque provincias, Clusio in pratis apricis, & arenosis agrorum limitibus, mense Majo caules profertens, Trago.

K 2

In fol. lat. Saxifragam parvam vocat, & pro secunda describit acat. Minorem saxifragam hircinam quidam appellant, alij Pimpinellam saxifragam minorem: Brabantii Beuernelle. Qui autem Saxifragam hanc, Pyrethrum esse existimant, non parum à verò recedunt. Quod si autem ad aliam quam Dioscoridis referenda videatur, cum nullo citius, quam cum Bunio convenire poterit. Caulis siquidem angulosus est, & majoris Digitalis ferè crassitudinis: folia inferiora Apio comparari possunt, superiora longè tenuiora: flores in umbellis Anetho similibus: semen odoratum, minus quam Hyoscyami, acre ac exaltans, quale Bunio esse Dioscorides ostendit, de quo suo dicemus loco.

Geln. coll. dicitur Saxifraga hircina, Pimpinella similis, minor. In cat. Napi species altera. Item, Daucus selinoides Cordi [Nos Cordi Selinoidem Daucum aliam suspicamus plantam, congenerem tamen.] Tandem h. Saxifragi hircina minor, sicca asperis & laxis locis, in collibus & circa muros Tiguri abundans.

Cordo in Diosc. l. 2. c. 169. est Pimpinella Germanis vulgo dicta, quam Daucum veterum autumat. Idem lib. 3. cap. 53. meminit hujus plantæ nomine Dauci, & Pimpinellæ in Germania. An Eidem hist. Daucus coriophyllus, quem ex eo ante descripsimus.

Lab. adv. p. 321. de hac potissimum loquitur, cum quærit, Bipinella saxifraga utraque, an Phellandrium Plinij? Quia, inquit, Saxifragæ nomenclatura plarè diversa genera notat herbarum & perquam dissita, vulgoque indita, nolui ita nominis aurà forôve abripi, ut naturæ vel cognatas classes, vel cognitioni mutæ accommodas, facillè divellerem. Harum autem notissima hircina, nonnullis Bipinella [quæ ipsi est Sanguisorba minor] cujus folio adeò similis est, ut eadem planè putetur: nec eas semper pilis discernere est, ut putat verificator: nam eodem proximè loci tractu videre memini Saxifragam foliorum internâ superficie pilosâ: nullos tamen in Pimpinellâ, Sanguisorba, vel hortensii videas. Anne non foliis innatos: sed inter frangendum tractos villos, tenuissimâve & fermè Arachnea stamina innuit, quæ in Scabiosa animadvertas?

Cz. alp. vocat Saxifragam alteram minorem, cauliculo constantem dodrantali: foliis ab radice Pimpinellæ, sc. subrotundis & circumscissatis, in simplici pediculo dispositis: ramis autem tenuibus divisis, ut Silonis: semine odoratiore & acriore priore [Saxifr. majore] nigriore & tenuiore: adeò ut cum Petroselino Macedonico congruere omni ex parte ipsi videatur, & magis quam vulgare Petroselinum latifolium, de quo egimus.

Lugd. p. 786. Pimpinella Saxifragia minor Dodonæi & Lobelij. Habet figuram Fuchsiæ similem. Dodonæi etiam & Lobelij cum Saxifragiam hirc. minimam potius exprimit, meo judicio, quam minorem hanc. An præterea eandem intelligit p. 717. per Dauci tertium genus Dalechampi in saxoso colle Gratianopoli imminente nascens, radice ex flavo candicante brevè & exili, festucis in summo villosâ: foliis prope radicem Coriandri similibus, in plantæ vertice ad tenuitatem fœniculaceorum gracilestentibus, caule Apij, flore candido: semine oblongo, Anethi æmulo, saporis acris, qualis in Cumino gustanti percipitur? Figura videtur respondere Saxifragiæ minori, verum semina non sunt Anethi: Anetho simile & oblongum mihi contraria penè videntur. verum ea contrarietas ex descriptione Dauci tertij Dioscoridis desumpta est.

Tab. Tragofelinum minus, Pimpinella minor, Klein Bibernell/Klein Stein Peterlinâ Medicis & pharmacopœis simpliciter Pimpinella vocata.

C. Bauh. phyt. Pimpinella 2. major altera, Pimpinella secunda species Trago, sine icone. Nos nondum percipimus cur dicatur sine icone, nec cur major icon Tragi nobis videatur demonstrare minorem Saxifragiam. Eadem etiam fuit opinio Gesneri. Apud Matth. Pimpinella minor; Daucus selinoides Cordi. In animadv. in Lug. l. p. 36. Dauci 3. genus p. 717. Eadem est cum ea quam Pimpinellæ hircinæ nomine describit p. 787. Figura autem eo loci posita removenda frustra duæ descriptiones unius plantæ. Item in animadv. p. 39. Pimpinella saxifraga minor Dodonæi & Lobelij p. 787 [Lugdunensis] Longè alia est figura Lobelij, quam Dodonæus postremâ editione habet. quare Lobelij assumenda tanquam melior, vel servanda Lugdunensis p. 717. quæ nomine Dauci 3. Dalechampi pingitur & describitur. Diximus nos ante Daucum selinoidem Cordi ab hac diversam nobis videri plantam. Pimpinellam etiam saxifragam minorem tam Lobelij, quam Dodonæi lat. quoad figuram huc non referimus, sed ad minimam. Quare rectius in pin. Pimpinella saxifraga minor, Ger. Cauliculi & foliorum venæ, interdum purpurascunt: hæc fervore & acrimoniâ primum genus superat.

Columna pro Tragio pingit, de quo hæc scribit. Tragij nomen adepta est planta hæc, eò quod, ut Dioscorides ait, folia Autumnu hirci odorem emittunt. Dissert autem à primo Tragio, nam illud non hirci virus olet. Tragij alterius descriptioni plantam à me propositam respondere demonstrabo: quæ radicem habet Raphano silvestri similem, vel Pastinacæ erraticæ, pede longam, minimum digitem crassitiæ æquantem, albam, raris fibris divisam: folia emittit petiolis ex adverso hærentia, quaternâ, & in extremo unicum, Sideritidis secundæ Dioscoridis modo, Pimpinellæ vulgæ nobis dictæ (ob cuius similitudinem, & hanc Pimpinellam hircinam vocant) rotundiora, atque magis & profundè divisa: sed si semine seras primùm bina emittit folia singulis petiolis hærentia, rotunda Coriandinis similia, deinde bina singulis petiolis, & postremo quaternâ, sibi ipsis adversantia, in quorum extremo unicum ir est. Caulis emittit tenues admodum, pedem & sesquipedem altos, binis ternisve geniculis interceptos, ex quibus folia admodum tenuia exeunt: in summo verò eorum umbellæ insunt floribus refertæ albis, quibus succedunt semina oblonga similia Aniso, sed minora multo, colore ad viridem tendentia, atque hirsuta. Floret æstate, Autumni initio semina perfecta inveniuntur. Oritur in montib. fixis, & locis terrenis: in monte D. Mariæ Virginis appellato excelso & frigido frequens. Folia confusata virus olent hirci, sicut tota plantæ. Gustu acri atque tragoforti, non solum Autumni tempore, sed semper. Quare fieri potuit, ut Dioscorides, vel is à quo transcripsit, plantam hanc Octebri mense viderit, tunc enim hic [Neapoli] sine umbellis, & caule corrupto invenitur, nova proferens folia, quo tempore magnam habere cum Scolopendrij foliis similitudinem conspicitur caule existens vidua: atque ita eo tempore tantum folia naribus admovet, atque ignorans, an toto anno eundem remitteret odorem, tempus Autumni tantum, quo ipse invenit, atque consideravit (ut in aliis multis, quæ sine caule, & sine flore descripsit) posteris tradidit. Eo enim tempore propter humoris abundantiam folia magis virus olent, sicut in planta Androsamo vicius putata, Siciliâ dicta simili & congeneri.

hære [in Siciliana, & Siciliana aliam notet fecunda] observatur, cujus folia quæ jam siccat incipiunt, non hirci virus, sed vini odorem remittere videntur. Obstat plantæ huic aliquorum sententia forma foliorum, quæ videtur non esse Scolopendrij foliis similem: quæ sententia nua rejicienda non duxi. Asplenium folio constat Polypodij divisurâ, quod est Filici simile Dioscoridis sententia: sed axiomata est, quod ea quæ uni data sunt similia, ad invicem similia esse dicuntur: ergo non sine ratione & similitudine necessaria, plantæ hujus folia sunt Asplenij foliis similia, cum Filici Polypodium sit simile, atque idem Dioscorides Filici Sideritidem secundam, & Trichomanes comparat quod utrinque folia ex adverso posita Lentis si altitudine habere ait. In Sideritide ait *ἡ ὁμοία τοῖς τριφύλλοις*, quia sola divisura similia sunt: in Trichomane, *τρεῖς ἡλικίαι*, & *ἡ δὲ μοῖον ἡλικίαι*, quia & foliorum substantiâ & divisurâ Filici est simile: ut & *ἡ ὁμοία τοῖς τριφύλλοις*, non *ἡ ὁμοία τῇ μοῖον*, *συνολογισθέντι*, ut hic quod tantum de foliorum divisura est intelligendum, ut de Sideritide secunda dicitur, quibus foliorum Filicis figuram repræsentat utrinque digestorum: longaque differentia est inter habere folia similia Scolopendrio, Scolopendrij sc. foliis, & similem esse Scolopendrio: quod ultimum de substantia & de forma totius plantæ intelligitur, ut dicitur de Doryopteride & Trichomane. Obstat dicunt aliqui, quod de Filice fœmina Dioscorides scripsit, *ἡ ὁμοία τριφύλλοις ἡ μοῖον*, & tamen substantia & foliorum divisura similis est Filici mari: ad quod respondere pro me Dioscoridem dico, & sic. Filix fœmina quamvis mari similis sit substantiâ & divisurâ foliorum, positum tamen foliorum valde dissimilem habet, nam fœmina est ramosa, & non uno petiolo constat, ut Filix mas, sed pluribus alis: ideoque cum plantæ maximè similitudine foliorum & divisurâ dignoscantur, majori notâ, quâ facilius dignosci poterat, descripsit: atque folia similia Filici habere ait, cum plantæ habitu differret: ramorum sc. multitudine. Præterea Raphano similem radice, nullam ex Filiceorum genere plantam habere adhuc compertum est, sed obliquam, ut Polypodium; reliquis verò capillares. Nec de floribus est dubitandum, ut aliqui dicunt, quia Dioscoride tacentur, nam hoc fuit, quia eo tempore caule & floribus viduam plantam conspexit, quod multis plantis evenit, quorum flores non descripsit, & tamen illos habere certò scimus: aliquibus penè abstulit: illaque flore carere dixit atque hinc etiam oportebat, ut flores negarentur, sit bere, & hanc flore carere, si flores non emitteret. At potius credendum est plantam hanc à notiore nota describere voluisse, ut facilius cognosci posset, à formâ & divisurâ foliorum, & ab hirci olentia. Quibus sic cognitis, jam videtur plantâ à me propositâ [Saxifragia hircina minor] dubiis soluta Tragi nomen assequi debere, cujus Dioscorides meminit. Hæc Columna, qui plantâ à nobis in præsentî delineatam, Tragium Dioscoridis credidit, cujus opinio non placet.

Schwyer k. Pimpinella minor, Pimpinella simpliciter officinarum Lobelius: Petroselinula, Saxifragia hircina, Tragoselinum minus, Bleene Babinell, Boeck Petterlin.

Saxifragiam minorem hircinam folio Sanguisorbæ observavi Genevæ florentem mense Maio; Basileæ Octobri, idque copiosè qua iur ad S. Iacobum, & inter portam americanæ & lapideam dictam. item itinere versùs Crenzach. Iuxta Castellum Blumberg, live Florimont copiosè, florens & semen maturans Octobri. Ventum in Theatro si rectè recordor. Montebelgardis.

Tom. III.

frequentem circa urbem in colle versùs patibulum. Schvvasperis & saxosis montium delectatur locis.

Sapor manifestè arguit ætiorum & validiorum vires & majore Pimpinellâ habere efficaciam. Calsicæ rursus, & siccat, ordine. Vius ejus frequens ad sudores elicendos, tormina ventris, calculum & menstruum retentionem. Ictericis, hydropicis, & ijs qui angustiam præcordiorum ex scabie repressa sentiunt, eximium præsidium: Schvvenkf.

SAXIFRAGIA HIRCINA

minima, Pimpinella crispata

Tragi.

AN SAXIFRAGIÆ
species minima.



R Abicæ, caule, D. fr. flore, semine, odore, & sapore planè similis est iam dictæ, uno hoc nomine ab eadem diff. rens, quod foliola habet minutissime dissecta ac ferrata, ita quidè ut à Caro discerni ac Pimpinella esse vix credi possit, nisi gustatâ radice.

Est hæc Pimpinella 3. itémque Pimpinellæ crispata Tragi. pum genus Tragopogon. l. c. 156. Vocat hoc idem l. 2. c. 127. Sc. feli 3. inter descriptos; 4. t. 1. nomenclaturas, accetiam Sefeli: Cretici

cum verum, quod aliis testè Dioscoride de Tragi videri, Tragi videri, vel ut habet Ægineta Gordyion vocari refert.

Gefnerus apud Cordum in hist. l. 2. c. 122. quærit an hæc Pimpinellæ (m. hirs Saxifragiæ) Tragi tertia & minima species, sit Daucus Cyanopus Cordi, quæ à caruleo radicis! quore sic cognominare ait. Nos Cyanopus. Daucus cyanopus Cordi (quia quis sitis, nobis Cerdæ nondum constat, licet Gefnerus suspicatus sit, esse Pimpinellam 3. Tragi) suo capite descripsimus, donec quid melius nobis innotescat.

A Dod. gall. appellatur Saxifragia parva altera, Saxifragia Saxifragia 3. quibuldam Dauci species existimata. parva Dod. In sollat. Saxifragia parva, quoad iconem. Miramur Dodonæum olim scripsisse duas minores valde vulgares in Belgio conspici, nunc autem minus meminisse, quasi de incognitis sententiam tulerit. Scirpium peritis considerandum relinquimus an duæ sint minores Saxifragiæ specie differentes, vel an sit variatio quædam ratione loci & temporis.

Iconem eandem habet Lobelius, cui in Obs. Bipinella saxifragia hircina minor Adv. p. 321. Thaletum Rondeletij: Natix Plinij Guilandini & Arguillæ: Item: Minor Saxifragia foliis rotundioribus Pimpinellæ proximis in agro Britanno & Belgio. Icon quidem hæc Lobelij respondet descriptioni Pimpinellæ minimæ Tragi, sed non Lobelij in Adversariis. Et quæ dicit de foliis rotundioribus conveniunt descriptioni Saxifragiæ minoris in Adv. & cum Tragi Pimpinella altera, quæ est minor noster.

K,

Serif

Pimphella Cl

germ. minor pi

Clusis.

Defining dip

Dijete
Galea

in pann.) qui ait eam interdum folia singula lacinia-
ta habere, aut angustioribus & oblongis incisuris
divisaj quando folia Petrocelini.

Pinnell

cr / p a f i e

petraa Tab 3

Tragojel

post alotti. ha

& sapore cum Trago secundæ si nilem ait, si d hanc
actiorem & inter omnes Pimpinellas acerrimam
pronunciat: foliis interim tenuissimè sectis & pul-
chre crispis, ut ferè Petroselinæ crispæ.

Saxif. par. Schvenckf. Pimpinella minor trispa. Pimpinella
9a D. 6. petraea seu saxatilis : Saxifragia parva Dioscordis;
Pimp. mi Brausepfe Bihinel / Stein Bihinel. B. phyt. Pim-
nor C. 8. pinella 4. minor. Ed. pin. Pimpinella 4. saxifra-
 gia minor: Pimpinella minor, Fuchf. Turn. Cam. ep.
 Pimpinella saxifraga minor, Lugd. Cam. Pim-
 pinella nostras cum nupis minor, Thal. Bipinella,
 Saxifraga hircina, Adv. Saxifragia 2. Cæ. Saxi-
 fraga hircina minor, Geln. h. & Cam. Daucus seli-
 noides, Cord. hist. Tragium Dioscordis Cyl.

Log me.

Provenit plerumque iis locis, quibus minor, in faxosis videlicet montibus, præcipue in rupium filluris, in veteribus muris & rudibus, quibus radix ita inheret, ut nunquam integrè evelli possit. Sic evulsiſſe eam longitudinis cubiti & seminis, nec tam integram, testatus est Tabernemontanus. Schvv. petrosis & arenosis delectatur.

*Indem cum priore pollet viribus, eodem Schvv.
autore.*

PIMPINELLA SAXIFRAGA
tenuifolia.

EX radice oblonga, caulis viridis, lævis, striatus, geniculatus, statim ad radicem in ramos, & hi in tenues alas divifus, exurgit: folia habet in tenues primū 6, d. in per 6 capillaceas partes divifa: flosculi exigui, pauci albicantes, in parva umbella: femina non videtur auctor C. Bauhinus, qui copiose ad lacum Genevenfem provenire fcribit. Vocat in pin. Pimpinellam 5. Saxifragam tenuifoliam.

VIRES ET USUS IN GENERE.

Tempera-
mentum
Pempinella
saxif. sicca
et radix Pe-
peris loco co-
codunt.

Traditisia Saxifragæ d. ferentis, reliquum est,
ut vires & usum adscribamus. Principella, inque
Tragus, calculo comminueno & expellendo ac-
commodatissima est, temperamento calidior omni-
bus Apij generibus. Radix ficcata loco Pipetis in
cibo usurpari posset, nam gustu & viuisus ita Piperi
respondet, ut Piper germanicum non ineptè dici
possit. Et meo certè iudicio utilior ac salubrior est
omni Piperi, quod ego experientia longè didici.
Herba Pipinella radix & semine Borraginis fici.

Аподитумт.
Castell.

Radix ad-
versum Ve-
nena utilis
Calculus
venum.

Семен /а.-
сбаранит
Дума.

facultates obtinet, diebus aliquot continuis mensu-
rà trahit, aut quætor cochlearium pota. Calorem
in aqua Pimpinellæ decoctum, ac potum, spas-
m laborantibus auxiliatur. Tridant nonnulli [hæc de Tra-
Sanguifera potius dixerim] vulnerariis esse her-
bam Pimpinellam, capitūque maxime vulneta
quæ prius in glutinare, si succus herbæ exprellus
infiltratur vulneri. Id verò Pimpinellam præstare
gallinaceum vides primò in docuerunt. Nam
ernio illorum subulā perf. r. ita tamen ne cere-
bru nā foretur succum herbæ instillabit, ac her-
bam ipsā tufum foris imponebant, quò factò intra
paucos dies sanatum est vulnus, unde conjec-
tū fuit, capitis vulneribus ea herbam morbis co-
ducere credidit esse. Aquā Pimpinellæ si perali-
quos dies facies abluatur, et maculas ejus detergit
ea nō clarior fiet. Atque hæc à Trago de Pim-
pinellæ sixifragiæ facultatibus perhibetur. Quum
autem in acrimonia non exiguum in gustu præ se fer-
rat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca
erit: imò secundum calefaciendi ordinem excede-
re credit Fuchsius, & ad tertium ferè accedere.
Pimpinellæ succus bibitur contra serpentum ius-
tus. E vino pota calculos terit. Stranguriam etiam de-
coctū levat. Succus ejus potus omne venenum di-
cutit. E hæc sunt facultates, quæ illi antiquis her-
bariis, teste Fuchsi, tribuit. Alij tradunt succum
ejusdem speciei maculas detergere possi. Est autem
i. dicit Pimpinellæ tum ulus præcipuus, qui nā-
vicius populatū pest lentæ contagia accere co-
namur: unice enim veniens ad veratrum, & corpora
ab hac lue vindicat, ut asfirmat, si tantum in ore
teneatur. Quod certe non potest ea, quam hodie
Sanguisorbam vocant, herba. Quare mirum in mo-
dum errant, qui hanc cum ea co. fundunt. Mitho-
lus ait radicem, ceu in qua vis tota consistit, ex-
calcare, siccareque ordine secundo completo, ut
tertio incipiente, aperire, provocare, attenuare, di-
gere, atque incidere: Guttinaria & Pandectarius
commendant contra phlegmā quæ sensu experi. men-
tu. Recipe Pimpinellam in nutissè tritam, ex
qua & saccharo Rosato fac Electuarium, de quo
singulis diebus ægroto propinabis, ac insuper
Vnc. octo aquæ ejusdem Pimpinellæ, quæ tamen
annum non excedit. Mulieres quibus menstrua
retardantur bis quotidie, manè & vespere in in-
gressu lecti bibant medicum haustum de hujus
aquā, in quem Croci modicum sicut & sacchari im-
ponent, & menstrua movebuntur. Fracastorius l.
de morb. contag. extollit syrupum Pimpinellæ in
febris malignis, ut sunt in quibus petechie appa-
rent. Radix pulverizata utiliter propinatur cum vi-
no, cerevisia, aut aqua contra quovis casus & con-
tusiones. Dodonæus Saxifragi semen ad radicem
vehementer & tertio ordine excafcians ac refici-
ens ait, & partium unum tenuium. Vtramque urinas
movere, stranguriam ac ichthuriæ medicis, calculos co-
herentes dissolvere ac expellere, præsertim si in
balneo horum pulvis aut decoctum propinetur:
movere eadem menses, ac secundas pellere: joci-
norum lenisque obstructions aperire: ventriculi se-
cunditas emendare: tormina colique dolores se-
dare: status discutere. Radicem commendatam
dentium dolores ledare, & multam ex ore priuatim
eliceri. Non secus potèd ac Etingij rad. cem condiri
refert Lobelius, ad juvandam concoctionem ven-
triculi & viscerum. Colicis aff. Aibus, diuturnæ fe-
bris, convulsis, comitialibus, & à serpente demorsis
auxilium, fetusque mortuos pellere. Potam ex ac-
to magnæ commendationis ad pestiferos morbos
esse: nomis & ulcensibus sordidus succum & solia co.
modè illiniri. Palmerius tandem de morfu canis
rabidi affirmat Pimpinellam ad præcavendam hy-
drophobiam

drophobiam tantam vim obtinere, ut quicunque eam aliquot diluculis vel in acetariis, vel alio quovis modo apparitam comederit, nihil inde incommodi sentire possit. Io. Bokelius lib. de pest. c. 17. parium virum cum Angelica & Zedoaria radicem Pimpinellæ esse concludit. Sed ego mihi vix persuasum esse possum hircini odoris & acerrimi saporis Pimpinellam virum esse virum cum grati & aromatici odoris Angelica & Zedoaria: nunquam vidi inponi ejus folia in vinum, ut gratum odorem & saporem acquirat, ut idem censet, sed ut utile tempore infecti aeris efficiatur. Et in hunc finem etiam saccharo conditur, ut gratiam adipiscatur, ac manè j. juno ventriculo facilius masticetur & assumatur, non solum pesti efficaciter resistens, sed & asthmaticis & calculosis utilissima. Curetiam Saxoniae plica cap. 59. in sua aqua ad pestifera, quæ potissimum constat frigidis & temperatis assumat Pimpinellam germanicam, fervidam & fecundam, nescio: melius placeret Pimpinella gallica sive italica, quæ dicitur Sanguisorba, cujus folia grati viri odoris & saporis. Pimpinellam germanicam v. Saxifragiam dictam, non solum formâ (umbellâ scilicet) verum etiam facultatibus, à Pimpinella italica seu gallica Sanguisorba cognominata, his differre ostendit Gesnerus. Quæ à Germanis vulgo Pimpinella dicitur, ab Italis rectè Saxifraga hircina vocatur. Pimpinella autem vera alia est, Sanguisorba nimirum Fuchsij, cui à Peponis seu Cucumeris odore nomen inditum puto (inquit ille, epist. ad Cor. Holz.) M autem literam ante P. recentiores indocti sæpè ponunt, & Græci hodie præsertim: quare pro Peponella, Pimpinella ab indoctis vocata est. Vtraque autem vires adversus pestilentiam habere videtur non vulgares. Posterior enim Tormentilla & Pentaphylli facultatibus insignis est, siccata, adstringit, roborat & refrigerat modicè. Prior autem (h. e. Saxifraga hircina) calida est in tertio gradu, sicca in secundo, meo quidem judicio, minimè astictoria, tenuium partium, incidens & aperiens, diuretica ad nodum, & calculos vel arenas potius propellens. In receptis latinè scriptis pro Pimpinella, eam quæ propriè sic vocatur, ponerem. In germanicis verò, vel è germanico sermone translatis, Saxifragam hircinam (i. e. Pimpinellam à Germ. falsò sic dictam) ponerem, ut in Electuarij etiam de ovo compositione, si fortè in descriptione vestra ingreditur. Audivisti fortè rhytmum illud è colo, scilicet de lapsu:

Nemuncnd Bibernell/
So gnâsênd Ir schnell.

Vbi omninè Saxifraga hircina intelligitur. Verba verò germanica sic sonant. Accipite Pimpinellam & confectum sanabimini. Vulneribus maximè utilem esse prodidit Chaba rex, Attilæ regis minor filius ex Honorij Cæsaris filia, qui post parentis mortem (cùm universum regnum Hungariæ intestino bello concuteretur, atque acce prælium commissum esset, quoddam inter se dissentirent, cui nam filiorum Attilæ regnum cedere deberet, eoque prælio omnes Hungari occubissent) solus superstes remansisse fertur cum 15000. virorum, & illis quidem omnibus vulneratis, quos hac herbâ curasse dicitur, unde factum est, ut postea Pimpinella germanica, Saxifraga dicta, ab eo apud Hungaros, *Chaba ire*, h. e. Chabæ emplastrum appellationem sumpserit. Superfluit paucis referenda, quæ particulatim de usu & viribus scriptis mandavit Tabernormartanus. Amarus & acriter calidus sapor Pimpinellæ satis indicat, eam calidâ & siccâ naturæ esse; prætereaque vim habere attenuandi, detergendi, & aperienti. Est autem Tragoselinum majus calidum & siccum in principio tertij gradûs; minus verò, ac etiam peccatum [Saxifraga major, minor, ac minima] calidum

Tom. III.

& siccum in tertio gradu. Herbaradix & semen loco Petrofeleni Macedonici in compositiones medicamentorum admitti possunt, præsertim autem minora duo, quorum petra n[on] Saxifragi minima] præstantius est, ideoque præ aliis eligi debet. Pimpinella viridis & tenera in acetaria venit, quæ stomacho appetitum pristinum restituit, & qualvis ejus viscosas humiditates consumit. Radix pulverizata, & drachmæ ponderis potam in vino, excoacta tharacem, tussim frigidam levat, ac excretaiones juvat. Pimpinella unâ cum radicibus & herba menf. Majo colligenda est, contundenda atque in balneo Mariæ distillanda, & conservanda per annum. Calculos expellit, renes mundificat: merles ciet: pestilentia medetur, &c. De vino è Pimpinella, multa & succo exsiccat. itemque extracto, extractionis syrupo, radicibus & seminibus saccharo incrassatis, tabulis, seminis oleo expresso, ceu & stillatio, atque file, plura ex eo adscribere superledimus, tum quia ingratiora nobis credâur, tum quia & rariora sunt, nec in officinis communiter parari solent. De Saxifragiæ viribus, Tragij nomine hæc prodidit Columna. Recentiores negant Tragium nostrum dysentericis opulari; tantumque agnoscunt, ad calculos frangendos aptum esse, & urinas eliciendas, atque ob id contrarium potius dysentericis judicant, ad quos tamen Dioscorides Tragium commendat. Sed si consideretur plantæ substantia & qualitas, gustu percipietur acrimoniam quandam habere cum quadam odoris gravitate, & adstrictione non carere, qua dysenteriam prohibere poterit, præsertim si viscerum imbecillitate proveniat (multæ namque sunt causæ) corroborans jecur, & infirmas partes, per urinam evacuas, & siccans, divertensque humorem, adstringere fluxionem. Quam facultatem etsi recentiores non sint experti: Galenus non denegat, atque propter adstrictionem, quam habere Tragium ait, posse dysenteriam, & similes fluxiones sistere. Et sic calidæ facultatis poterit incidere, & abstergere, calculos minuire, & urinas movere; siccantis & adstringentis, dysenteriam & alias fluxiones à contraria causa effectas emendare. Quorum exempla non pauca apud Dioscoridem & Galenum extant, ut eadem calculos frangant, & menses moveant, eademque dysenteriam & diarrhæam sistant propter adstringentem facultatem, calidæ vi mixtam. Sed hæc Medicis sunt relin-quenda. De Danco filinoide (quem ad Saxifragiam mediam referimus, vel etiam ad majorem) hæc scribit Cordus. Radix, inquit, gustu acris & servida est, quæ si diutius, cùm recens adhuc est, attrahatur, manûsque ad os & nares feratur, eas partes, quibus admotæ sunt manus, leviter exulcerat: idem efficit decoctæ sapor & halitus: insuper etiam capitis gravedinem attrahit, quam efficacem habet, facit: odorem spirat similiter acrem: semen utraque facultate radici respondet.

SANGVISORBA MINOR.

CAP. XLIX.

RADIX longâ, fuscâ [Matth. lignosâ, subrescente, & adstringentis gustûs] cum amaro aliquo adstringente, tenui, ex pluribus in unam coëuntibus composita nititur, ex qua caules attollunt pedales & cubitales, pediceis angulosis, in quibus capitula glomerata, pluribus flosculis cõsertim congestis, quorum singuli, ubi quaternâ foliola, extra purpurâscentia, intus virefcentia explicaverint, stamina numerosa ostendant, nunc lutea, nunc purpurantia, breviora aliâs, aliâs nufculo barbato, vnciali

K 4



circiter dependit [Matth. capitula squamula, sub-puniceo colore] in his deinde semen.

Folia [Matth. ab una radice nuda, complura ab uno tenui pediculo utrinque prodeuntia, humi jacentia] Melonis odore, saporeque cum adstrictione, pinnatim disposita in pediculo tenui, rubescente, hirsuto, exigua, subrotunda, circūquaque profunde serrata, supina parte atro-virentia, pronā glauca.

Ent. Saxifraga minor.

Nos hanc Sanguisorbam, sicuti & sequentem non umbelliferam, hic reponimus post Saxifragiam hircinam, quia uti illa à Germanis Pimpinella vocatur, ita hæc Galis & Italis, ceu jam aliquoties monuimus, etiam Pimpinella nominatur, maximi æquivocatione, unde insignes errores oboriuntur.

*Affinitas e-
xigua cum
Sanguisor-
ba.*

Quamquam autem forma radices, foliorum, & caulium in herba, quam modò describendam sumptimus, Pimpinellæ quadatenus respondeat, tamē si & odorem & gustum spectes, plus illa cum recenti glande, quam Pimpinella affinitatis habere certò cognoscitur. His addit Tragus quoddam folia hujus ad caelum quodammodo inclinant colorem, ac molliora, tenerioraque sunt quam Pimpinellæ. Quoddam caules habet purpureoscentes, læves ac tenuis, veluti culmus, modicæque lanugine hirsutos, qui non umbellis, uti in aliis Apiorum generibus videre est, conspicui sunt, sed potiùs gerunt in fastigio capitella rotunda, foraminulenta, ut ea ratione rudimentum savi satis expriment.

Sanguisorba minor.

Fuch. Sanguisorbam minorem foliis minoribus, cauliculis autem majoribus esse tradit, quam majorem. An autem hæc à Fuchsiò ritè observata sint, judicent Botanici. Is enim jejunè has duas plantas describit & distinguit.

*Antiqui
quædam
Pimpinella
nomen non
deceperat.*

Antiquis porro, referente Lobelio, mutantur inditæ omnes Bipinellæ differentie, idque recens nominis adeptæ à foliorum binis ordinibus pinnatim, plumatim, tarsive effigie digestis: cuiusmodi Filipendulæ. Harum autem minima, frequentissima ruri & domi notissima est pedem aut cubitum alta, exili radice, exiguis Pentaphyllis, sed numerosis & teneris tartarionibus, oleraceis multis foliolis, æquis spatiosis Chamedri vel Eufrasie similibus, ambitu crenatis, & binis ex adverso positis: summis in caulibus rotundi flosculorum glomeruli muscosi, interdum puniceis ex candido, interdum subfulvis sunt, qui floribus clapsis Adonidis, vel Mori fructum expriment.

*Saxifraga
Quirini,
Marcellus,
Pimpinella.*

Cæterum, hujus videtur meminisse Hermol. coroll. 625. his verbis. Quinti Saxifraga eadem est, aut proxima ei quæ Pampinula, Pimpinella, & Bipennula, & Sanguisorba ruri dicitur: quoniam vulneribus injecta ferrum & spicula facili ac citra sensum doloris exigit. folio parvo, orbiculato, & extremitatibus serrato: quod & mandi solet parata oleo, sale, aceto, surculibus cum radice, ut ferunt. quibudam locis vermiculus eruitur, sericis tingendis idoneus, &c. Vide H.n.g. lib. 7. de Cocco radicem.

Videtur autem Hermolaus non novisse discrimen inter Saxifragam & Sanguisorbam: nos intell. gere ratur. non possumus, quomodo herba insigniter addit- gens spicula extrahere possit: ea etiam opinio displicuit Fuchsiò.

Dum Ruellius aliorum scripta, ut Hermolai, pro suis vendicat, sibi contradicit, confunditque plantas, ut ex modò allegandis locis patebit. Elatine pampinaria (inquit l. 2. c. 336.) si alia est ab ea, quam nostrates Galli Pimpinellam, aut potiùs Pampinulam dicunt, germanum certè genus illi fuerit. Enimvero Pampinulæ folia latè crenantur, thyrsuli quodque flosculis micant, ex cæso candicantibus, in quæ rascuntur capitella rufescentibus punctis maculata. Nonnullis Bipennula & tum Sanguisorba dicitur, &c. Idem l. 3. c. 94. Non sunt audiendi, qui Pimpinellam vulgò dictam esse existimant Elatinem, cum etiam natalis situs advenitur: nam in pratis incultis, nec vquam sub æro Solo nascitur, imò potiùs horret & lativa, nec ramulis exit à radice foliosis. Est autem folio piloso, latè crenato, exili in rotundum oblongo. thyrsuli foliis emicant ex cæso candicantibus, &c.

Brassavol. in exam. simpl. Teucrium Dioscorides facit, negans, & meritò, esse Thryallidem. Ejus verba hæc sunt. Pimpinellam apud antiquos nunquam inveni. Hermol. lib. 4. sui coroll. cap. de Saxifraga eam mirè describit, quæ hydropicis multum valeat. est valde similis Saxifragæ, unde carmen:

Pimpinella pilos Saxifraga non habet ullas. Gaza Theophrasti interpretis per Thryallidem, Bipinellam interpretatur, si autem per Bibinellam hanc intelligit, quam Pimpinellam Ferrazius dicimus, in acerbis gratam, longè errat. Nam constat Thryallidem herbam, Pimpinellam non esse: semina in morem Mori rubi facit, dicitur etiam Pampinula, Bipennula, & à rusticis Patavinis Sanguisorba, à Ger. Bibernell. Si Thryallidem conferamus, ut Dioscorides pigrit in Phlomide, nullam habere Pimpinellam cum similitudinem statim corroboret. Verum si Theodorus hoc nomen Bibinella Thryallidi tribuerit, ut linguam latinam ampliare, encomio dignus est. At ex altera parte arguendus, quinepta nomina sequatur, cum apud nos id nomen Thryallis in usu sit, ut apud Plinium constat virum Latium, idè non est opus in herbis ita temerè nomina immutare. Idem: Pimpinellam suspicor Dioscoridis Teucrium esse, & figurallè satis affinis est, imò vires quoniam lenos & venenatis succurrit. Hæcille. Nos Thryallidem Theophrasti, quam Gaza Bibinellam interpretatur, diversam existimamus à Dioscoridis Thryallide, sive Phlomide, aut Verbasco, cui non spica Plantaginis, qualem requirit Theophrastus. Nolimus etiam dicere Pimpinellam, sive Sanguisorbam esse Thryallidem Theophrasti: Teucrium, quod à Neotericis, ut Fuchsiò, Cordo in Diosc. Matthiolo, Dod. gall. Lac. Lon. Lob. Cæf. & Castore, itè quæ aliis, proponitur, meliùs convenit cum Dioscoride, quam nostra Sanguisorba.

Pimpinellam Germanorum sive Saxifragam, cum Italorum Pimpinella hac, sive Sanguisorba nobis videtur confundere Agricola: dicens: Brassavolo Thryallis non est Pimpinella, sicut Gaza in Theop. vertit: Pimpinellam quidam Pampinulam, Bipennulam & Sanguisorbam vocat. Idem alio loco. Teucrium Pimpinella est. Idem rursus, Pimpinellæ nomenclaturam vide in dictione Teucrii: Manardus Saxifragis connumerat, calculos enim comminuit, urinam suppressam ciet, stranguriam solvit, & venena peste insectorum arceat à corde.

Quodnam genuinum Pimpinellæ hujus Italice (quod Pimpinellæ Italice primum genus vocat) & Italice sequentis,

sequentis, nomen sit, scire nondum potui, inquit Tragus. In agro Vormatiensi & Spirensi, Bergora Bärlein/h.e. Babulum dicitur, illas vulgò nūcupant, fortassis à spadiceo colore. Ego in ea aliquando eam sententia, cum Pimpinella similis sit, ad Apia referri posse, verum multa sunt, quæ repugnant. Nec defunt, qui dicant eam esse veram Italicam, seu hortensem Pimpinellam, qui mihi certè neūtiqum satisfaciunt, neque enim illorum sententiam probare possum. Hæc Tragus. Cur autem illorum improbet sententiam, qui Pimpinellam hanc Italarum esse censent, rationem non habet. Quandoquidem planta, de qua hic agimus, à multis in Italia & Gallia excolitur nomine Pimpinellæ.

Quum porro ignoraret Fuchsius, quo nomine stirpem hanc veteres Græci & Latini (si modò iis cognita fuit) appellarint, maluit quidem vulgari uti nomenclaturâ, donec aliud certius nomen inveniretur. Interea tamen Elatinen esse iudicaret, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nunc quæ neque pusilla, neque pilosa, neque rotunda, sed mucronata esse videantur, certi statuere nihil potest. Sanguisorbam verò dictam esse ait hanc herbam, non quòd veteribus injecta ferrum & spicula facili & citra sensum doloris (ut habet Hermol. & ex eo Ruell.) exigat, ut nonnulli arbitrentur id ipsum enim non posse, mirificam, quæ illi inest, adstringendi facultatem abundè ostendere: sed potius quòd ei in sistendo sanguine, undecunque emanarit, mira admodum insit efficacia, adeò ut hunc ipsum quasi absorbere videatur. Erroris autem huius nullam aliam causam esse, nisi quòd hanc stirpem multi cum ea, quæ hodie Pimpinella Germanis vocatur, confundant: quæ certè propter caliditatem, quam obinet haud exigua, quandam etiam trahendi facultatem habere videtur, adeò ut infixa corpori extrahere facili queat. Quòd verò cum Pimpinella confuderint non alio factum esse nomine, quam quòd huius folia proximè ad Pimpinellæ folia (quæ iidem ut hæc serrata sunt) accedere videntur. Sed hæc confusio non caret errore. Germanis hæc herba *Kolbles fraut* à capitellis, quæ rufescentibus punctis maculata sunt, dicitur: Quibusdam etiam à sistendo sanguine, *Blutz fraut*. Bona pars Gallorum Pimpinellæ eam vocat.

Si Corn. in Diosc. l. 4. c. 123. per *kleine Bibernell*/Pimpinellam minorem, quam quòdam herbaram peritos hodie Polygonon esse velle scribit, Sanguisorbam intelligit, nobis erronea eorum opinio videtur.

Sideritidem alteram, Pimpinellam in Italia dici, totam Græciam didicere prodit Guiland. in Theone. Chios, Rhodios, Peloponenses, Corycenses, cæteros Pimpinellam, hodie Sideritidem nominare. Sed se nescire fatetur quod monstrum, magnus ille Amati peccatorum expiator, pro Sideritide asserat.

Cordus apud Diosc. Pimpinellam hanc Italarum, quam germ. *Bluttröpflein*/h.e. Guttulam sanguinis appellat, rectè à Pimpinellis Germaniæ diversam ait. Huius etiam duas esse species tradit, unam purpureo, alteram pallido, cum floret, capitulo. Idem in Dispen. ad unguent. Mart. mag. Nicol. Alex. notat eo loci Pimpinellam non significare germanicam, h.e. Saxifragiam, sed Italarum, Sanguisorbam dictam, cui radicem tribuit rubram, Tormentalia sapore. Nasci in pratis unam ejus speciem, alteram in montibus: Italos acetiarii miscere, habereq; Cucumeris odorem. A Cordo circa Pimpinellam in dicto Unguento dissentit Fuchsius, qui Nic. Myrepsum non Italicam, sed Germanicam intelligere contendit, quòd huius facultas in præsentis unguento accis potius, quam alterius adstrictoria requiratur.

Fuchsius autem oppugnat Coldembergius his verbis: Fuchsius per Pimpinellam in Vng. martiato non Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo hic intelligendam esse vult: id quæ ea propter, quòd adstrictoria sui facultate huic medicamento malè convenire existimet, quasi verò nihil unguentum hoc præterea recipiat, quod adstringat atque etiam refrigeret. Cum Italia multò prius quam Germaniæ unguentum istud innoverit, Pimpinellam Italarum hic intelligendam esse censo. Adolph. Occo contra utramque admittit, non sine errore, nihil certi concludens, nec differentiam inter has fortassis agnoscens.

Quomodo apud Græcos, aut Latinos sit appellata Pimpinella, inter autores non convenit, id quod partim ex dictis constat & partim ex mox dicendis patebit. Ruellius enim loco supra citato Elatinen pampinaræ, Cronemburgo etiam referente; germanum genus constituit: Brassavolus Dioscoridis Teucrium suspicatur: Sunt qui Tragium contendunt, quàm autem verè, iudicent, quibus est exacta rerum notitia: Fallantur qui cum Sanguisorba, Ochnochelon vel Alcibiadion conjungunt. Tragus inter Apij genera Dioscoridis, jurè maximo numerat, peculiariterque Petroselinum in Macedonia nascens, sive Apium saxatile, sive Petrapium iudicat, cui Cronemburgius (cujus verbâ hic recitamus) acquiescit.

Meminit huius Apollo Rad. in Elect. ad pestem, nomine Pimpinellæ, quam testatur corruptè Pimpinellam, quibusdam Solbastrellam, aliis autem Sanguisorbam dici: perbellè pingi ab Hermol. 4. sui Coroll. cap. de Saxifrago, ejus speciem aliqui conjecerint, hanc tamen depilem esse, illam verò nequam: quumque Dioscoridis Teucrio aliquantulum alludat, idem esse suspicari, alios Elatinem, quamvis reverà vel antiquioribus incomperita exiterit, vel Syderitis altera Dioscoridis sit, de qua etiam Matthioli à Luca Ghino, obrepticam plantam sibi transmissam, latino volumini appingit: Bipinellæ tamen meminisse Theophrastum 7. hist. c. 10. in jugis Crepætorianis.

De hac loquuti sunt Monachi in Mes. dist. n. c. 82. de mistura ad vulnera sananda. Pimpinella, sive Pampinulla, aiunt, herba est ita ferè cunctis viventibus notissima, sicut & præcis fuit incognita. Abundè recentiores de ipsa tractant: tamen nullus ipsorum valuit apud quempiam præcorum invenire. Vnde quasi omnes tenent hanc cum aliis pluribus veteribus fuisse incognitam. Quod quidem valdè mirandum est. Neque nos etiam hucusque potuimus ipsam apud aliquem antiquorum capitulare. Sed omisso aliorum omnium iudicio, nos putamus vel ipsam propriè Saxifragiam, vel speciem ejus esse. Nam & in saxosis libenter crescit, & ad calculos in vesica frangendos valdè efficax est, ut pluries experti sumus. etenim cum plures sint Saxifragiæ species, inter eas non est absolum & Pimpinellam connumerare. A nonnullis etiam Sanguisorba appellatur. Et à Pandectario in litera F, Fillum Indicum, Pimpinella interpretatur. Fuchsius inter Sanguisorbam & Pimpinellam fecit differentiam, & utramque duplicem pinxit. Hæc illi viri reverendi, qui si discrimen inter Pimpinellas Italicas & Germanicas noverunt, cur non demonstrarunt, quam Pimpinellam intellexerint. Pimpinellam Italicam nunquam crediderim dici posse Saxifragiam, multò minis calculos frangere in vesica, quicquid jactent salacem suam experientiam, & quod majus est, tantum abest ut adstringentem Sanguisorbam frangere calculos vesicæ credam, quia firmiter mihi persuadeo nullo medicamento posse frangi quod hæcenus observare potuerim.

nofo, quodammodo Melonis: nec minus in acetariis expetitur: ex oleo namque fale & aceto à Belgis, Anglis, Gallis & Italis non infuauiter editur minor, quibus ad hilaritatem facere creditur. Peranica porro visceribus, hepati, cordi, & præsertim spiritibus perhibetur: magnæ commendationis etiam ad perulentes morbos, ut ejus succo etiam abigantur febres exitiales. Astrictoria vi & exsiccante pollet, citra ruordacem vellicationem: eoque internis & externis sanguinis eruptionibus opitulatur. Ferncl.

*Amica Sif-
cum.*

*Ambeffia
vum Sif-
cum.*

Tabes.

*Calculus
Stranguria.*

*Sanguinem
fistis.*

*Fernclius
non novit
discrimen
inter Pimp-
inellam &
Calicem.*

*Febris he-
ctica.*

*Platina
reproh.*

*Prima im-
continentia.*

*Secretum ad
quartanã.*

*Ad præ-
uentum hy-
drophobici.*

4. m. m. 5. Pimpinellam ad virulentarum bestiarum ictus commendat. Lib. autem 5. cap. 20. calidam siccamque ordine secundo, absterisionis, adstrictionisq; patulipem ait, ac tabidis apuissimam: cruentas excreationes sistere, sordidas ac purulentas expurgare, ulcra detergere, misce siccare, & agglutinare. His addit cap. 25. ex vino potam calculos terere, & Stranguriam decoctam iuvare. Libro 6. cap. 13. hæc habet. Pimpinellæ folia tusa aut etiam cocta, si aperam venam attingant, protinus sanguinem sistunt, quod & radix luculentis efficit: eadem quoque modo sumpta sanguinis vomitiones excreationesque supprimunt: subdita verò mulierum purgationes, hæmorrhoidalesque cohibent. Ex his Fernclij verbis apparet ipsi non fuisse notam differentiam inter Pimpinellam hanc Italarum seu Gallorum, quæ Sanguisorba dicitur, & Germanorum, quæ Saxifragia hircina vocatur, de qua ante. Idibus virulentarum bestiarum nolim applicare Sanguisorbam: ea non abstergit, nec expurgat sordidas & purulentas excreationes, calculos non terit. hæc omnia referenda ad Germanicam Pimpinellam: cætera verò quæ de Pimpinella scribit, conveniunt Gallicæ. Apud Fel. Platerum sunt qui Pimpinellæ succum in febre hæctica commendant. Quo loco ego Sanguisorbam intelligo, quamvis ipse Pimpinellam in alia significatione sumat, ubi ad pestem utramque præscribit: in hæctica enim usque adeo calida & sicca radix, ut Saxifragia, non convenit. Platina quoque confundens duas Pimpinellas, Italicam & Germanicam, malè Italicæ caliditatem tribuit, ac lapides comminuerè dicit lib. 4. de honesta voluptate & valetudine, vel de obsoniis, & arte coquinaria cap. 10. de conditura Pimpinellæ. Pimpinellæ, inquit, quæ & Bibinella græcè dicitur, vis calida & sicca inest. Ob hanc rem tardè concoquitur, voluptatem edentibus affert. Collecta ac lota in patinam, ac suomet caule, si tenera est, reponi debet, fale, oleo & aceto condiri, si prædura fuerit, folia tantum sumantur. Aperit hic cibibus jecinoris fibras, urinam provocat, ac lapides, ut Saxifragia, non tamen adeo comminuit. Sequens remedium jactatur tanquam certum ad urinæ incontinentiam, quod recipit Manipul. quateor Pimpinellæ, qui coquantur ad tertias in viniboniphyalis quatuor, & datur bibendum 2. gro. Idem secretum hoc ait ad quartanam expetitionem. Astate sumit Manipulum Pimpinellæ, verò tempore radices cum foliis præsentibus, tenuiter incidit, coquit in aquæ mensura ad tertias, dat per triduum manè haustum tepidum, & affirmat, non sensurum agrum paroxysmum, expertumque esse in multis personis. Palmerius de morfu canis rabidi, Henrici 2. Galliarum regis venator bona fide asseveravit Pimpinellam ad præuendam hydrophobiam tantam vim obtinere, ut quicumque eam aliquot diluculis, vel in acetariis, vel alio quovis modo apparatam comederit, nihil inde incommodi sentire possit. Purpuram incomparabilem ex vermiculo ad radicem Pimpinellæ & Sanguisorbæ, quidam carmesinum appellat colorem, fieri perhibet Gesn. Aquat. lib. 4. De aqua hujus stillantia, syrupo & conserva consule Tabernomontanum.

SANGVISORBA MAIOR
Hæc spadicæ.

Toto vultu cū Pimpinella sanguisorba minore convenit: verum folia, quæ novena, aut undena ad unam costam alligantur, plusquam duplo sunt majora, Betonicæ foliorum æmula, profundè serrata, glabra, odore & sapore eodem cum minore: caules verò ex radicibus fibrosis bicutales & altiores assurgunt, læves, striati, capitulum oblongum: flosculis favagineis spadicis quadrifoliis, apici-

bus concoloribus contextura.

Planta à nobis hic exhibitæ & descriptæ, est Pimpinella Italicæ genus alterum Trag. præcedenti per omnia simile, sed elegantius planè atque grandius, floribus spadicæ coloris.

An bene hæc tradatur à Fuchio, qui Sanguisorbam vocat majoribus foliis ac longioribus, coliculis tamen tenuioribus, aliis dicendum relinquimus.

A Cordo vocatur Pimpinella Italarum capitulo purpureo. Matth. in comm. cum mag. fig. Pimpinella major. In comm. apud Bauh. Pimpinella, sive Sanguisorba major. In hist. germ. cum addit. Cam. Pimpinella Sanguisorba major (ita etiam vocat Cast. & Cam. h.) In epit. c. j. usdem, Sanguisorba, seu Pimpinella major. Lugd. p. 787. Pimpinella sive Sanguisorba major Matthioli. Dod. gall. Pimpinella major lat. in fol. Pimpinella silvestris, Sanguisorba major, capitulis obscurè purpurascens, odoris gratiæ destituta. Gesn. h. Pimpinella major. Clus. Pimpinella Italarum & Gallorum major, Sanguisorba Germanorum. Bauh. phyt. Pimpinella 5. sive Sanguisorba 1. Eid. B. pin. Pimpinella 6. sanguisorba major: Pimpinella Italica major, Thal. Sanguisorba major, Cord. hist. Pimpinella syl. Ger. Sideritis 2. Diosc. major, Col. Schvencck. Sanguisorba major, ut & Tab. apud quem hæc reperiuntur nomina. Sanguisorba, vel major vocatur à Botanici & Medicis Solbastrella major, Sorbastrella major, Sorbaria major, Sorbus pumila major, Barbula Christi major, Solbastrella pratenfis, Sanguisorba pratenfis, & Pimpinella sanguinaria major. Pimpinella verò nominatur, quoniam Itali pro Pimpinella, hac utuntur. cætera nomina accepit ferè omnia, ab Anz. Theophrasti foliis, quæ hujus foliis similia sunt. Germ. vocatur groß Spertbenkraut / groß blut kraut / groß welsch Pimpernel / groß Rölblutkraut / groß blut röpflin / & wurm wurz quod ulceribus vermiculosis equorum medeatur: reliquis appellationes à similitudine foliorum Pimpinellæ Saxifragiæ sortitur, & à sanguine sistendo: sed appellatur etiam & Rachenblut / h. e. Sanguis Draconis. Belg. groete Pimpinelle / Ital. Pimpinella, Solbastrella, & in Hetruria Alex. Benedi. teste, Srella. Gall. Sanguisorbe grande & Pimpinelle grande Angl. great Burnet / Bohemicè Brvane Loveny.

Lobekus

Lobelius Sanguisorbā alterā majorem sive Pimpinellā, pictā dat in Obs. p. 412. in Icon. p. 719. De ea autem hæc ejus est opinio in Advers. Hæc tamen natalibus differt, & plus quā culta, contra quā nonnulli arbitrantur, tamen quanta est major multo, sic similia est. Folium interdum Betonica par: in alis & caule duūm, triūve pedum alto: capitulis item iisdem, sed longioribus rufescentibus, semine anguloso, triangulari.

Fuchsius, uti ante retulimus, scribit Sanguisorbā majorem nasci locis incultis, & aridioribus, & soli expositis. Sed quā bene facile eritis, qui eā sepius collegerunt, indicare. Pinguis & lutoſa prætā palustria magis amare, & non modò apud Mediomatices, sed & in Germania, Bohemia, Hungaria, & aliis locis potius crediderim, quamvis & Tragus quoque & Clusius in aridioribus etiam locis provenire tradiderint. Observavi Burmij in Rhætia & Tiguri florentem Junio & Julio, itemque Augusto.

Hujus vires licet videre in præcedentis Sanguisorbæ historia. Eadem enim, ut vult Matthiolus, utrique facultas, sed hortenſi, juxta Lobelium, gratior & potior. Is tamen suāvem & majorem vino merſam meminit in Angliæ Northamptoniæ. Schvvenckf. particulatim florem hujus sic compulverizatū ex vino dysentericis opem ferre prodidit.

PIMPINELLA SANGVISOR- bo inodora.

Hæc eſt Sanguisorba minore vulgata, differt foliis & odore: nam in hac folia longiora sunt, quæ in illa magis rotunda; sunt in hac inodora, in illa odora. Hanc Pimpinellā minoris hispanicæ nomine Gillenius miſit C. Bauhino, cui eſt in pin. Pimpinella, 9. sanguisorba inodora.

APIUM MAGNUM, SIVE HIP- poſelinum, ex veterum ſententia.

CAP. I.

HIPOſELINUM, ut reſert Dioſcorides, alij Greci [ἵπποσέλιον] alij Apium agreſte [ἁγροσέλιον] alij Smyrniūm vocant, quā tamen aliud ſit, quod propriè Smyrniūm dicitur, velut ſuo loco dictū ſumus. Eſt autem grande Apium, eodem autore, majus & candidius, quā Apium hortenſe, cujus caulis cavus, altus, tener, velut lineas habens: folia verò latiora, ſubpūnicea: in quibus eſt coma, velut Roſmarini [ὁ ῥοσμάρinus] vet. non habet] flore plena, in corymbis prius quā effloreſcit, compacta. Semen eſt nigrum, oblongum [ἐπιμήκες, vet. ἐπιμήκης] ſolidum, acre, aroma olens. Radix odorata, alba [λευκή, vet. λευκή] ori grata [εὐοσμή]. Cat. ἐνδύμαχος, ſic & Lac. [ἵπποσέλιον] παχύνει, vet. non legit.] Naſcitur in locis umbroſis & juxta paludes. Oleris modo editur, velut Apium. Sed & radix tum cruda, tum cocta editur. Et folia cum caulibus cocta eduntur: & tum per ſe, tum cum piſcibus præparantur. Sed & cruda muria condita ſervantur. Vim ducendi meſes ſemen habet in vino muſſo potum. Calefacit etiam rigore prehenſos, tum potum, tum illitum. Vrinæ quoque ſtillicidio opitulatur. Et radix eadem facit. Hippoſelinum Latinis vocari Olus atrum ait Plin. l. 20. c. 11. his verbis. Olus atrum, quod Hippoſelinum vocat adverſatur ſcorpionibus. Poto ſemine terminibus intercanis medetur, itemque diſcultatibus urinæ ſemen ujus decoctum ex muſſo potum. Radix ejus in vino cocta calculos pellit, & lumborū ac lateris dolores. Canis

TOM. III.

rabioſi moribus potum & illitum medetur. Sicut & Olus ejus argentes calefacit potus. Caterim, hoc in loco Plinius argentes dixit, quos Dioſcorides [ὑπερμαχέ] frigore, aut rigore prehenſos. Nam de utriſque intelligi poſſe videtur, tū his qui ab externi frigidi aëris converſatione frigoris contraxerunt, tum iis qui rigorem, febres maxime tertianas, præcedentem, & cum iſtis irruentem habent. Eſt autem hic rigor majus quiddam horrore: ſicut horrore majus quiddam frigidityte.

Pinus Buſelinō tanquā ab Hippoſelino diverſum habet. Idem l. 19. c. 8. ex Theoph. Olus atrum miræ naturæ eſſe ait Hippoſelinum Græcos vocare, alios Smyrniūm. E lachryma caudicis ſui naſci. Seri & radice. Succum ejus qui colligant, Myrrhæ laporem habere dicere: autoremque eſſe Theophraſtū Myrrhæ ſatā natum.

Galenus 2. de aliment. nō Hippoſelinū, ſed Smyr-
nium Romæ Olus atrum vocari dicit. Idem Hippoſelini & Oroſelini ſimilem Apio vim eſſe ait, ſed debilius Hippoſelinū, robuſtius Oroſelinū eſſe. Verū amplius addit idem lib. 1. τὸν κατὰ τόπον bullas in alopecia excitatas noctu, inanē compunctas Buſelini foliis integendas eſſe, ex Archigenis traditione.

Theophraſtus paſſim de Hippoſelino hæc prodit. Perpetuò viret in ſuffruticū genere Equapiūm, cacumine perdurans amiſſis reliquis, radice carno-
ſa. Equapiūm [ἵπποσέλιον] à Paludapio & Montapio Theoph. tam diſtat, quā ab urbano plurimū differt. Folis quidem vicinū Paludapio eſt, ſed hyſſurum [ἵπποσέλιον] etiam diſtat vertit Ceſalp. alij tamen vertere denſum] & grandi-caule conſtat, & radicem craſſam modo Raphani agit, nigram: fructū quoque nigrum producit, magnitudine Ervo [ἑρβόνα] ampliorem;ambo uſilia referunt ad urinæ diſcultates ex vino dulciſimo, & ad pellendos calculos. Naſcitur omnibus locis, & lachryma ex eo ſimilis Myrrhæ deſluit. Lachryma autem ejus in radice conſiſtit, ut & Scammonia, & aliorum multorum, vim medicā gerentium. Equapij ergo lachryma Myrrhæ ſimilis conſtat quā nobrem cum quidam hinc naſci Myrrham audiviſſent, Equapiūm apud ſe provenire putarunt. Seritur Equapiūm etiam ſua lachryma [ἀπὸ δ' αὐτοῦ] Non intelligimus quid velit Theophraſtus per ſeritur
verū, conſiderandum an hic aliquis error.

Crediderunt autem, ut Marcello videbatur, non-
nulli Equapiūm Hippoſelinum vocantes ſieri in
plantis à natura poſſe, quod fabuloſè à Poëtis aliquādo ad delectationem fictum eſt, ut, quemadmodum illi in Theſſalia hippocentauros, equis inſitos homines, duplici natura, ut Lucretius ait, & corpore bino, ex alienigenis membris compactos ſinxerunt, ſic nos non diſſimili ratione in hortis etiam naſcentes aliquot plantas, equis inſectas, audientes ſaltem admiraremur, crederemusque Hippoſelinon hoc ab equis aliquid habere, unde portentoso, & ut in hippocentauris, admirabili nomine, etiam noſtrā ætate judicarentur, eſſetque quaſi eques planta, Equapiūm hoc. Quò ſi verò humilior fuerit hæc planta, nec ſupra congenereſ ſibi, aliū à terra ſe erexit: non malè forſitan (ſi joci aliquidando liceat) ex tractata aptius venere, cam ſi
nominis notam, licet ex turj re, inveniriſſe aliquis dixerit. Siquidem Martialis non ſemper pius vates, nec ubiq; Phœbo digna locutus in Epigramate ſuo inſiſſit parvas & brevi corpore amicas ad venerē vehi equo ſubjectū; ita ſum longiſſimam nunquam Chæbaidem hec oreo nuptam reſeſſiſſe equo: ſed quoniam congenitibus ſuis omnes, grandiores ſunt, nullamque more hominum venerem exercent: nec poſſunt diverſi generis duo ſimul in natura coaleſcere: cogitandum conſtituendūque, quia

L.

Laserpitium Dioscoridis Guilandini, dubitatque an Laserpitium Theophrasti Anguillare.

Tab. olim etiam existimavit esse Hippocelinum Dioscoridis, Nos tēppich. sed postea conclusit verum Laserpitium, si non Dioscoridis, saltem speciem: nam convenire ait cum descriptione Theophrasti l. 6. hist. Facultate etiam non cedere vero Laserpitio: esse itaque Theophrasti *ελαγιον*, Hippocratis *Αλαγον Τακτινον*, Laserpitium Gallicum Ruellij, Herb. Laserpitium Europæum, Laser Gallicum, Silphium Europæum, Laserpitium Germanicum, Levisticum seu Lybisticum adulterinum.

Levisticum vulgò appellatur, quia pro Ligustico aliquando accepta est, inquit Cæsalpinus. Censet hic apud Theophrastum Libanoidem fertilem esse [Rosmarinum fertile vertit Theod.] & Rosmarinum alterum Plinij, cui & caulis, & semen resinaceum, quod Cachrys vocatur.

Ruell. dicitur Levisticum officinarum: Brunf. Levisticus: Matth. Dod. in fol. lat. Lac. Gefn. & Cam. h. itemque epit. Matth. (ubi & Hippocelinum) Cæf. & Bauh. phyt. & apud Matth. (Apium sextum facienti) Levisticum vulgare: Fusch. Libisticum vulgare. Eid. B. pin. Libanotis 7. Ligusticum vulgare: Dod. gall. Gefn. & Camer. h. ut etiam Guill. Ligusticum vulgare: Cordo hist. & Trag. Ligusticum sativum. Lob. adv. p. 33. Obs. p. 40. Icon. p. 703. Levisticum, Germanicum Laserpitium: Tab. ic. Ligusticum Laserpitium adulterinum: hist. Ligusticum adulterinum: Cam. apud Matth. germ. Hippocelinum vulgò Levisticum: Lugd. p. 703. Hippocelinum Matthioli, sive Levisticum vulgare: Smyrnum, Fusch. in fol. & Lac. Levistici loco habita herba, Ang. Ger. Laserpitium, qui conem ex Tab. habet.

Auctor porro est Tabern. vocari Germ. *Liebsstöckel* / & *Badkraut* / quòd in balneis hoc usurpari plurimum soleant: Belg. *Lauesche* / & in Hollandia *Laus*: Gall. *Livesche*: Angl. *Rouage*: Hung. *Levesticon*.

Ligusticum vulgare haecenus tantum in hortis observavimus, utpote loca pinguis & humentia nonnihil amans. Æstate floret; Augusto magna ex parte semen ad maturitatem pervenit: primo Vere germina erumpunt. Pona in monte Baldo ait peritri Smyrnum Lacuna. Semen quod accepit a fratre C. Bauh. sub inscriptione Sileris montani Bononie, satum Montbelgardii in orto E. C. produxit Levisticum.

VIRIS ET USUS.

Ligusticum ex ordine exsiccantium & exsiccantium esse prodidit Tragus, & ad venena propulsanda utilissimum, non minus atque Angelicam. Ejus porro radicem siccata ac in pulverem redactam, condimentum esse optimum, quo cibi codiuntur, non minus atque Piper. Vtile esse Stomacho frigido, concoctionem adjuvare, omnēque superfluas humiditates consumere: internos sedare dolores in vino potam pondere dimidiz[integræ, Tabern.] drachmæ: venenum educere, urinam & menses trahere, & ad omnia, ad quæ Angelica facit, usurpari posse: Aceto & sale condita conservari posse, uti Helenij, aliarumque herbarum radices. Tusam ac impositam (ceu & semen) iis moribus serpentum, viperarum, araneorum, scorpionum, & canis rabiosi mederi, dolorem namque mitigare & venenum educere. Ligusticum adhuc in inflammationibus & balneis adhiberi vult, ad ciendam urinam, calculos ac menses, nec non ad exsiccanda omnia interna membra. Puerperas hujus herbe radices, folia, & semina in cibo & potu suo usurpare

Tom. III.

debere, & balneis sudatoris suis adjectis, sit à partu rectè purgentur. Aquam distillatam discentere, & tanare anginam, & pleuriticum morbum, gargatissam & potam: impositam tementi capiti utilem esse, & gutturi vulnerato apprimè conducere gargatissam: claram reddi & puram faciem, & vitia cutis deformis ac nigrae maculas & fugillata, cicatrices etiam à scabie & abscessibus relictas exteri & emendari, si ex aqua per aliquot dies colluatur. Eandem ad oris & colli, qui & locorum muliebrium exulcerationes & vitia utilem esse, si lineis pannis aqua affectis partibus imponatur. Anginam etiam sanari Ligustico, si per caulem ejus continuò bibatur. Est Levisticum, autore Dodonæo, & radice & Temper. femine exsiccans ac resicans ordine tertio incipientem, & tenuius admodum partium, quo fit, ut aperire, incidere, digerere & provocare valenter possit: perinde ac Scilorum genera, inquit Matthioli. Dodonæus porro radicem siccata cum vino bibitam ventriculo prodesse scribit: crudorum item humorum concoctionem promoveri, ac præter cætera sudores elicere: semen eadem posse, ac præter alia adversus uteri strangulatus prodesse. Non piget ea latino sermone reddere, quæ Tabern. germanico idiomate de hujus facultate & usu scrip- ptis confirmavit. Suavis odor herbæ, inquit, radices, floris, & seminis; ad hæc etiam validus & acris sapor Ligustici adulterini, satis ostendunt, id calidæ & sic- cæ naturæ, proprietatisque esse in tertio gradu. Surculi novelli, Vere prorumpere soliti, in cibis à quibusdam assumuntur, & præsertim in acetariis. ventrem autem emolliant, viscososque humores educunt, ac serolos. Radix quoque viscosi do usurpata oppilationes referat hepatis & lienis: resistit veneno assumpto, ætè infecto, ac pestilentiæ; qui namque de hac fructulum manè assumit, securus est eo die, gratia DEI adjuvante, ab infectione. Per Vinum & sudorem expellit omne venenum. Medetur tussii viscosi frigidi que humoribus ortæ. Pectus expurgat & excreare facit. Confortat cor & stomachum. Dissolvit concretum sanguinem. Respirationi difficili succurrit, appetitum excitat, concoctionemque adjuvat, sive in vino, cerevesia, aut aqua decoquatur; pro ratione morbi, ægerque jus colatum bibat, etiam adversus venenatorum animalium morsus. Ad morbum regium accipe seminis Ligustici, Selini, & Fœniculi singul. Vnc. semis. Rasuræ Eboris drach. sex: pulverisentur cūbrenturque cūbro setaceo angustissimo. De quo pulvere propina drach. unam in jure Cicurum, aut aqua Fœniculi: hoc facto æger sudet, in, aut extra balneum, continuis aliquot diebus, & felicem successum deprehendes. Seminis duæ partes cum parte una Cuminii in pulverem redactæ, aut Drachmæ pondere cum vino potæ frigidos stomachi dolores sedat, itemque tormina intestinorum. Semen Drachmæ pondere potum ex vino necat lumbricos, & menses cit. Radicis pulveris drachma semis cum drachma una Theriacæ Andromachi ex aceto calidè hausta per sudorem pestilentiam avertit & expellit. Cum vino albo seminis tritici drachma una & semis setum mortuum ejicit. Herba vulneraria est. Vinum vindemianum tempore contra pestem & radice concisa parari posset, ut Helenites. Herba distillatur in Balneo Mariæ, cum flore in Augusto, unâ cum radice, caulibus & floribus. Paratur ex hac etiam extractum ad supra dictos usus, cujus dosi scrupulus unus, in suo menstruo, vino, aut alio aliquo liquore. Laserpitij Europæi oleum ex sicca herba, radice, floribus & semine extrahitur arte chymica, ut ex Absinthio. Danatur autem hujus olei stillatij guttæ duæ, aut

Sah

tres cum vino, aut succo aliquo convenienti. Præstat in dictis affectibus præcipue verò in colica. Sal contra quævis venena commendatur, itemque ærem pestiferum, pondere granorum decem, aqua appropriata. Quæ ex Tabernemontano ordinibus vertitur, jam ab aliis ante recensita sunt.

SMYRNIUM VETERIBVS.

CAP. LII.

Petrofelinu

Aff. canis.

Anerhi mu-

bella

Brassica se-

men.

Pires.

Folia in-

ba.

Radix.

Vrina dif-

ficulm.

Discurus.

Abortum

enfer.

Uchiu.

Fibres.

Plinius Sa-

re illustra-

tur.

Smyrniun

enr distillat.

Ufu.

Phalangia.

Tussis. Or-

thopne.

Secunda.

Nona.

Succus.

Pistis lepro-

suspecta.

Hydrop.

SMYRNIUM, quod in Cilicia Petrofelinum vocant, plurimum in Aman monte gignitur, aut the Dæle monte. Caulem habet Apij, copiosè cinctum agnata sobole: folia verò latori ad terram, infra ita, sub pingui, robusta, odore medicato, & cum quadam acrimonia jucundo, colore denique in luteum languescens: habet & umbellam supra caulem, qualis Anethi inest: semen rotundum Brassicæ simile, nigrum acere, Myrtæ sapore, ita ut alterum alterius qualitatem repræsentet: radix verò acris est, odorata, mollis, succosa, faucibusque mordens, cortice prædita foris nigro, intus verò pallido aut subpallido. Nascitur in saxosis, collibus, locis aridis & incultis angulis. Vim habent radix, herba, ac ipsum quoque semen excaustorium. Folia quoque muria condita oleram instar in cibos veniunt, alvumque sistunt: radix verò pota prodest contra serpentium morsus, tussis & orthopneas mitigat, ac urinae difficultatibus medetur: imposita verò recentia edematata, inflammationes duritiæque discutit, & vulnera ad cicatricem perducit: ferve facta autem subditaque abortum infert. Semen renum, lienis ac vesicæ vitis succurrit, mensis & secundas pellic: ischiadici utiliter in vino propinatur, & inflationes stomachi lenit, sudores item ciet atque ructus. Peculiariter verò potui datur contra hydropem ac febrium circuitus.

Plinius Smyrniun describens in paucis evariat à Dioscoride. Smyrniun (inquit l. 27. c. 33.) caulem habet Apij, folia latori, & maximè circa caulem, addit vet. stolones multos, quorum à sinu exilunt pingua, subpingua, &c. Diosc. ad terram infra ita, odore medicato, & cum quadam acrimonia jucundo, colore in luteum languescens, capitibus umbella, Diosc. caulium orbiculatis, ut Anethi semine rotundo, nigro, quod arefcit incipiente æstate. Radix quoque odorata, gustu acri mordet, succosa, mollis. Cortex ejus foris nigro, intus pallidus. Odor Myrtæ habet qualitatem: unde & nomen. Nascitur & in saxosis collibus, & in terrenis. Vfus ejus excaustere, extenuare. Vrinam & menses ciet folia, & radix. Semen alvum sistit. Radix collectiones & suppurationes non veteres item duricias discutit illa. Prodest & contra phalangia ac serpentis, admissio cachry, aut Polio, aut Melisophyllo, in vino pota, sed particulatim, quoniam universa vomitionem movet. Qua de causa aliquando cum Ruta datur. Medetur tussi & orthopneæ semen, vel radix: item thoracis, aut lienis, aut renum, aut vesicæ vitis. Radix autem ruptis convulsis. Partus quoque adjuvat, & secundas pellic. Datur & ischiadici cum Crethmo in vino. Sudores ciet & ructus: idè inflationem stomachi discutit. Vulnera ad cicatricem perducit. Exprimitur & succus è radice, utilis feminis & thoracis præcordiorumque desideris: [Vnus, morbus. In græco fortassis è τὸν θύαν, pro quo legit Plinius è τὸν θύαν, remediis admoveat thoraci & præcordiis, Dalech.] calfcit enim & concoquit & purgat. Semen peculi inter hydropis datur potui, quibus & succus illinitur, & malagmate [malagma, Dal.] è corti-

ce arido. Et ad obsonia utantur cum mulsio, & oleo, & garo, maximè in elixis carnis simul. Concoctiones facit, sapore simillim [simillimo, vet.] Piperi. Eadem in dolore stomachi effcax. Et hæc ex meliorum codicum lectione, juxta quos etiam verba, quod arefcit incipiente æstate legenda sunt, quale Brassicæ est: quanquam neque in ipsis integræ sit hæc lectio. Idem rursus ait lib. 19. cap. ultimo. Et Smyrniun olus sentit iisdem locis, Myrtamque radice respicit. Et hæc de propriè dicto Smyrnio cum Dioscoride loquitur. Rursus tamen Hippofelinu, quod & ipsi in impropiè Smyrniun appellatur, tribuit Myrtæ saporem. Atque ita verum Smyrniun cum Hippofelino confundit, Theophrastum in hoc sequens. Vtriusque verba capite de Hippofelino adscripsimus. Plinius Smyrniun etiam Myrtam appellavit, ut vult Cornarius l. 19. c. 12. ubi tamen Myrtam quid in legendum censent. L. banotis ait odorem Thui, Myrtæ Myrtæ habet Galenus de Smyrnio scripsit ut alimento, & ut medicamentum, quæ occasio quò Castalinus cum de duabus distinctis plantis egisset credidit. Et quidem omnibus hisce de Olufatro, quod Macerone inscribimus Smyrniun (inquit l. 2. alim.) non est infuave, ideoque Romæ plurimum venit, appellaturque vulgè non Smyrniun, sed Olufatrum. Multò autem acutius est & calidius, quàm Apium. quin & odorati quipiam habet. Quapropter effcaciùs urinam, quàm Apium, Hippofelinum, & Sion, mensesque mulieribus movet. Veris tempore caulem producit, qui crudus edendo est, haud aliter quàm folia, quæ sola per Hiemem inhzrent plantæ nondum caulem habenti, sicut neque tum Apium habet. Postea verò, accedente tota plantæ jucundior redditur, si quis crudam ipsam, siue coctam mandet, siue ex oleo & garo, siue acetum, siue vinum velit adijcere. Et l. 8. simpl. Smyrniun quidem Hippofelinon anguste cognominant. Ex eodem genere & ipsum cum Apio est, & Petrofelinu, sed Apio quidem validius, Petrofelinu autem imbecillius: menses itaque & urinam movet, calidum, sicum in tertio ordine. Et hæc de suo Olufatro intellexit Castalinus, quod Macerone est. Sequentia verò Galeni verba id Smyrniun Creticum refert. Cilices in Aman monte natum; Petrofelinu vocant; est quidem & ipsum Smyrniun, minus verò acre Petrofelinon: & Smyrni; idè ulcibus commodum, quia siccata sine molestia. Sed & digere, quæ & indurata sunt, potest. Reliqua vis Apio & Petrofelinon similis est: quare & semine ejus utitur ad menses, urinam & asthma. Hætenus Galenus.

Smyrni; porro non meminit Theophrastus, nisi cum Castalino & Marcello dicamus eum id Hippofelini historia assignasse, cujus verba suo adscripsimus loco. Cæterum, sentiebat jam tum, cum fuisseberet Dioscorides, à gravissimis authoribus confundi cum Olufatro Smyrniun, miserique simul communicatè invicem appellatione similes, quidem & congeneres, non tamen easdem plantas; deoque in Olufatri historia apertè omnes monuerat, aliud esse Olufatrum ab eo quod propriè, verèque Smyrniun diceretur. Et in Smyrni hoc eas nominavit natalium, virum, feminis, solum, aliis utique partium notas, ut his, qui Olufatrum novèrunt, nihil facilis post hac sit, quàm alterum ab altero fecerere, præsertimque ex Myrtæ gustu: idèoque pari & promiscuo alterius usus. Miscuissè autem veteres invicem similes & congeneres plantas, in Latinis Columella testis est l. 12. c. 3. scribens. Atrum olus quod quidam Græcorum vocant Hippofelinon, nonnulli Smyrni. In Græcis testis Nicander in Theriacis suis, qui Smyrniun vocat

Id est, ut dicitur in Hippocrate, &c. adjectiva formi
Hippocretini vocans hoc, sc. ut ab illo
separaret: addiditque interpretis ejus, magno Apio,
i.e. Hippocretino simile esse Smyrniū, vocarique
Smyrniū, quoniam Myrtham odore refert:
Vocari & Creticū auctore Anacreonte in comm.
de rad. cum sectione. Similitudo hæc misceat, & in ve-
terum historia confundi cogit, aliq. un. diversa sunt,
ut ex Dioscoride & aliis etiam Marcellus docet.

Ex hæcenus dictis constat, Smyrniū quoddam
Hippocretinum fuisse ac vocare.

Nec defuit, inter quos recenset Cilices Galenus,
qui Petroselinum dicant.

Alij verò Olusatrum non absque errore, nostro
judicio, asserere student.

Smyrniū n. Creticū n. perfoliatum, pro Smyrniū
vero probant non pauci.

Macerone multorum sententiā, Italorum autem
præcipue Smyrniū pronuntiant.

Quidam etiam sibi imaginari sunt Imperatoriam
esse Smyrniū, sed frustra.

Reperiuntur adhucodie, qui sibi persudant,
& quidem non sine occasione Angelicam vulgò di-
ctam esse Smyrniū Dioscoridis & Galeni.

Lacunar tamen opinione Smyrniū est Ligusti-
cum vulgare folijs Apij.

Euchar. Roefstin in herb. Spōndylium malè vo-
cat Smyrniū.

Cornarij Plinianus codex lib. 27. cap. 11. Sinon ha-
bet, ubi in vulgatis simul legitur, & quod sequitur
ad Sinon pertinens, Smyrniū attribuitur.

SMYRNIUM CRETICUM perfoliatum.



HERARI vitore
perfolia folia
prodeunt nitidq;
pedem longa, logo
nixa pediculo, quæ
in oppositas ex cer-
tis intervallis alas
dividuntur, atq; hæc
rursus in alias, ut
subsecutiones parti-
culares, haud malè
Apij palustris folijs
possint comparari,
altiusculè incisæ,
cassæ latisq; hæc
quidem statim à ra-
dice pronascuntur
nā quæ ramorū di-
varicationibus sub-
sunt, immane quā-
tum ab hac forma
discedunt, circinatq;
ferè rotunditatis, Perfoliatæ fo-
liorum modo à caule
ramisq; transfolia, se-
scunciam aut uncias duas lata
& interdum gemina, alterum alteri impositum, um-
bellis (ut testantur Adversaria) est Anechi aut Perfo-
liatæ, floribus albicantibus, aut pallentibus, semen
fuscum, subrotundum, Brassicæ par & simile, quale
nobis aliquoties mislum.

Smyrniū hujus (ut nostra fert opinio) in folijs ex
tate variationem agnovit Marantha Meth. l. 2. c. 3.
dicens: Smyrniū folia Apio comparat Dioscori-
des, latiora esse iniquens & subpinguia: ac rectè
quidem respondet comparatio, si folia caudici, seu
radici proxima assumantur: nam quæ foliones cir-
cundant ac caules, rotundantur, nullam præ se fe-
rentia divisuram, ita ut Aristolochiæ, aut oblongæ

Hederæ figuram potiùs, quàm Apij retineant.
Idem cap. 8. Smyrniū cum per se provenit in col-
libus, ac limitibus terrenis, folia exigua profert:
cū verò in hortis ferit, ac colitur, præter id quòd
folia multò latiora habet, ad majorem multò altitu-
dinem assurgit.

Matth. in Diosc. cū mag. fig. vocat Smyrniū
Creticū, semine haud Brassicæ simili, sed rotundò, ^{Smyrni.}
anguloso, & in acum. desinente, ac propterea ^{Creticum}
Smyrniū n. suum [Macerone] magis admodum ad
historiam Smyrniū accedere asserit; quæ à Diosco-
ride describitur. In epit. & hist. germ. cū addit.
Camerarij (qui refert putari Smyrniū alterum ^{Smyrni. al-}
apud Plin. & Dioscoridem, quod in monte A- ^{terū Diosc.}
mano Ciliciæ provenit, & ad nos ex Creta adfertur) ^{quibusdam.}
Smyrniū Creticū: Cur autem hoc Smyrniū
Creticū perfoliatum non potiùs Dioscoridis di-
catur, quàm Macerone, ut vult Matthiolus, non vi-
deo. Quæ obsecro Smyrniū Italicæ five Macerones
seminis similitudo, cū Brassicæ semine quòd cras-
sum, & angulosum: Matthiolo apparet non fuisse
nota semina Smyrniū Cretici, quæ multis numeris
magis accedunt Brassicæ quicquid ille dicat: da-
bito an inferiora viderit: ea namque quæ pingit pa-
rùm conveniunt. Vires & qualitates eodem teste
non differunt, à viribus Smyrniū Dioscoridis, apud
quem non invenio fieri mentionem duorum gene-
rum Smyrniū.

Iam itaque in procinctu fuerit vera Smyrniū co-
gnitio, & cū Hippocretino ac Levistico distinctio,
cui nota sit illa planta multis jam diu Belgicæ & Gal-
licæ hortis enata. Commentator commentatorum ^{Matth. in}
Senensis, morosè nimis, in hoc exquirendo Smyr-
niū semen Brassicæ satagit, lectorem seque intri-
cando suo more. Nam & illic paucis interjectis
lineis sibi refragatur, & Brassicæ semen negat
(quia, ut ferè ejus omnia, emendicatam habuit
plantam, radice mancā, umbellis feminæque char-
tis fortè appressis, coque minùs exactæ cognitioni
aptis) nec quicquam meliùs indicat, ut ait Lo-
belius, qui in adv. p. 316. Smyrniū in Icon. p. 709. belij.
Smyrniū; in Obs. p. 407. Smyrniū Advers.
Gall. Smyrniū de Candia aut Creta; Ital. Smyrniū di
Candia vocavit. Idem cap. de Hippocretino, Mat-
thiolum increpat dicens, eum Doctorum o-
mnium judicio in veri Smyrniū loco meliùs non
sufficere.

Dod. in foliat. inscribit Smyrniū Amani mon-
tis, ac differens tradit ab Hippocretino, quod etiam
Smyrniū vocat: In Ciliciā verò olim Petroselinum ^{Smyrni. d-}
nuncupatum fuisse, testibus Dioscoride & Galeno, ^{manus mon-}
credit. ^{tu Dod.}

Confaricator Lugdunensis unius hujus plan-
tæ tres figuras & tres descriptiones, summo ex-
tore. Prima est p. 707. hœc titulus: Smyrniū verum
Dioscoridis & Dodonæ. Altera hoc: Smyr-
niū Creticū Matthioli. Tertia sic inscribi-
tur p. 791. Perfoliatæ altera. Et hæc pessima
est.

Tab. hanc plantam Smyrniū inscriptione pictam
dedit, vocavitque græcè *Σμύρνη*, & *αντιόχου* ^{Smyrniū}
lat. Petroselinum Cilicium: itēque Matthiæ ^{Tabera}
Plinij l. 19. in fine: Herbariorum Smyrniū Dios-
coridis, Creticum & Candicum ad differentiam
Smyrniū Galeni, aliarumq; Pseudo-Smyrniū planta-
rum, quibus hoc nomen falsò & immeritò applicari
solet. Adhæc appellat Senirvion & Smirion Serrapionis de temp. simpl. c. 280. Sumirion Avicennæ,
& Semurion, Sumihon, Sumirion, Suramion, Surafion, Zimirion & Zimirion aliorum Arabum, quæ
nomina à Græco mutuata & depravata esse ait.
Germ. appellat Smyrnen: aut Myrthenfrant à
Myrthæ odore.

*Olixatrum
alterum
C. Bauh.*

Cæf. Olixatrum alterum constituit, ac Olixatrum genus peregrinum nominavit, utpote quod nuper ferri cepit. Hoc ita describit. Folis exit a radice longè exilioribus, quasi Apij tenuifolij, in caule autem sensim grandioribus segmentis, adè ut propè ramulorum cacumina, nulla ex parte scissa sint, sed rotunda, caulem ambiant formâ acetabuli, ut in Periclimeno, colore pallescente: umbellas fert luteas; & semina altero [Macerone] minora, ac rotundiora, similiter dura ac nigra, odore fennè Styrcis: radix brevior, ac tenuior, gustu suavior, simili modo cute nigra, intus lætè coloris: floret Vere: Hoc autem Smyrniij genus, Galenus ait Cilices Petrofelinon vocare, &c. De hoc Plinium eandem fennè ad verbum descriptionem cum Dioscoride habere.

Petrofelinon.

*Smyrni
peregri
nū C. Bauh.*

Bauh. phyt. Apium 15. & Smyrniū verum peregrinum, vel Smyrniū Dioscoridis: Smyrniū Creticum Matthioli, cujus figuram quo ad partem superiorem bonam esse ait, at quo ad inferiorem vitiolam. Quare adprobat Dodonzi & Lobelij iconem: Hoc autem non animadvertisse notat Lugdunensem, ideoque vitiolam proposuisse Matthioli iconem p. 707. ac dein bonam Lobelij. Idem appellat Perfoliatam 3. sive alteram geminato folio. In Animagv. in Lugd. p. 35. ait, Smyrniij figuram Dodonzi bonam esse cum descriptione ex Pena: ex Matthioli verò vitiolam: quia folia interna non sint Apij: hanc cum descriptione Matthioli omitti debuisse. Miror ego fratrem non assecutum esse ex historia Perfoliatæ alterius Lugdunensis, eam eandem esse cum Smyrniio Cretico, sed malam iconem, ac propterea non diversam ab eo statuendam, ac separandam. Eid. B. pin. Apium 14. Smyrniū peregrinum rotundo folio: Smyrniū Creticum, Matth. Cæf. Lugd. Cam. & Ger. Smyrniū Creticum putatum, Col. cui Hippofelinum aliud Diosc. Smyrniū, Dod. gall. Ad Lob. Tab. verum, Gesn. h. & Lugd. cui & Perfoliatæ altera.

Smyrni

Smyrniū Creticum missum Stutgardiam per hortulanum Ducis Florentiæ, seminavi in horto E. C. Montbelgardi, ex qua postmodum descripsi. Miram inesse Smyrniio Cretico proprietatem refert Camer. de hort. Altero, inquit, anno à satū prodit folijs geminis, ut locustarum ferè alas repræsentent, quæ paulò post marcescunt. Interea sub terra latitat radix rotunda Ervi magnitudine aut paulò grandior. Sequenti postea anno folia protrudit instar Ammi vulgaris, ut in pictura Matthioli apparent, radix verò tenuis sit & oblonga, quæ rursum per Hiemem ita perdurat. Primo denique Vere tandem emergunt folia Petrofelini, quæ Dodonzi suo Smyrniio rectè appinxit, caulisque enascitur circumdatus folijs perfoliatæ. Hæc planta semina matura profert, quæ excidunt, & anno sequenti proveniunt.

*Vires
nsm.*

Quia tandem Smyrniū hoc Creticum, idem cum Smyrniio Dioscoridis esse credimus, ideo hîc ejus vires & usum repetere superfluum fuerit, ut de quibus ante satis superque ex veteribus dixerimus.

SMYRNIUM PEREGRINUM folio oblongo.

Descri.

Huius inferiora folia ex radice prodeuntia, Apij folijs similia sunt, in complures particulas oblongas divisa, oblongis pediculis donata, per ambitum profundius laciniata, pallidè virentia, quæ verò in caule sunt cubitali, striato, non subrotunda, nec duplicia; ut in communi Smyrniio peregrino, sed eorum primum, uncias sex longum, tres latum, per ambitum profundius incisum; superiora verò, per quæ caulis ad exortum transit, & simplicia sunt,

uncias tres longa, duas circiter lata & superna quæ leviter crenata sunt, sensim minora sunt: caulis in summo brachiatus, & cuilibet alæ, ramuli quaterni, rariùs quini, biunciales insident, festucis aliquot, umbellam exiguum flosculorum luteolorum sustinentes: quibus semen nigrum, subrotundum, fudit; radicem non vidit autor C. Bauh. cui Doldius ex horto: Camerarij transmissit. Vocat in pin. Apium 15. Smyrniū peregrinum folio oblongo: pingit hoc Columna sub titulo, an Hippofelinon.

MACERONE, QVIBVS- dam Smyrniū, semine magno nigro.



Macerone dicta herba radice nititur crassa, foris & intus albâ, odoratâ, acricum quadam amaritudine: caules edunt plerumque bicubitales, farctos, ramulos, striatos, nonnihil rubentes: folia Apij palustres, ampliora, atrovi- rentia, sapore ad Apium hortense accedente, subdulcia: flores in umbella & quinque aut sex foliolis ex albo vire- scentibus, totidemque apicibus compositi:

femen crassum, nigrum, angulosum.

Hæc est illa planta, quam Corn. in Diosc. officinas quasdam pro Petrofelino Macedonico ostendere, vulgusque germanicum, Petrofelinum Italianum vocare scribit.

Cord. hist. describit nomine Hippofelini, cui Gesn. addidit figuram ex Trago. Is in Diosc. & disps. supra diacat. Mes. vocat Olixatrum, Olixatrum, & Alexandrum, carpitque officinas, falsò Petrofelinum Macedonicum appellantes. Eodem hoc errore culpandi sunt adhuc hodie Ebrodunenses, apud quos dicto nomine passim in hortis conspiciuntur.

Pingitur à Trago pro Petrofelino Alexandrino, a quo Macedonicum multum differre ait, ita ut Alexandrinum id sit semen magnum, sc. & nigrum, quo Sepaliariis uti scribit, quod genus lubens sub Hippofelino Dioscoridis comprehendi censet: siquidem magnum Apium esse statuit, & neque descriptionem reclamare: rursus verò ut Macedonicum minus sit genus, quemadmodum sub Pimpinellis & Apis fusè docet. Sed clamant contra Tragus Iac. Manlius & Matth. Sylvaticus, dicuntque Olixatrum, aut ut ipsi loquuntur, Olixatrum esse Petrofelinū Macedonicum & Alexandrinum, quæ ab invicem non distinguunt.

Hippofelinum seu Olixatrum inscripsit Pusch. cujus semine perperam officinas pro Petrofelino Macedonico uti attestatur, statuitque esse Hippofelinon antiquorum. Hunc sequitur Lonic. Gesn. cat. (ubi & Apium grande vocat) itémque de hort. (ubi & Olixatrum) Dod. gall. & lat. Ang. Lac. Lob. Tab. Cæf. & Bauh. itémque Turnerus, qui lecto Matthioli suam opinionem, tanquam falsam, meritò retractat ut paulò infra dicemus.

Subscribamus

Subscribamus nunc eorum placita, qui Macerone Hippofelinum conftituunt, vocantque græcè *ἵπποφελιον*; ger. n. groß *Ἐππίχ* aut groß *Ἐππίχ*; Belg. groote *Ἐππίχ*; gall. *Ache*, aut *Ache large*, itemque *grand Persil*. Lon. groß *Peterlin* auß *Alexandria*; Gefn. in cat. plat. etiam *Mürrhor* & *Meiſcheron Alexandri*. Turn. angl. *Alexandre*. Dod. belg. *Peterſelie van Macedonien*/ *Peterlin van Alexandriem*. Hiſp. *Perexil Macedonico*.

A magnitudine (inquit Dod. qui Hippofelinum inferbit) quæ reliqua Apit ſuperat, Græcis *ἵπποφελιον* dicitur, à Gaza Equapium: Appellatur verò & *Olyſatrum*; & à nonnullis *ῥοσίνιον* & *ῥοσίνιον*, h. e. ſylveſtre Apium: Galeno verò & aliis quibuſdam [Theophraſto aiti in hiſt. gall. ſetiam *Smyrnum* propter ſuccum ab ipſo profluentem, qui Myrrham, h. e. *σmyrna*, reſeroffit. (addit in gall. hiſt.) non ſine errore Petroſelinum Macedonicum, cum quo nullam ſimilitudinem habet.

Ang. epiſt. 7. hanc quidem pro Hippofelino recipit, Theophraſti ſc. non autem Dioſcoridis, atque nihil aliud eſſe, quàm vulgare Macerone & Aleſſandri, & Scribonij Lari *Olyſatrum*.

Lacuna reſutans eorum opinionem, qui Macerone *Smyrnum* eſſe volunt, vocat Hippofelinum, quod Apium beſtiale aut valde magnum denotare ait, ſcribitque quosdam excellentes viros intelligere plantam, quæ ſine ratione dicitur Petroſelinum Macedonicum, unde corruptè in Italia diſta ſit Macerone: quorum opinio non aſſentitur, quamvis ali j exercitati viri cenſent eſſe *Smyrnum*.

Lobelius (qui adv. p. 315. Hippofelinum, ſive *Olyſatrum* appellat, addè in Obſ. p. 407. & Icon. p. 708. Dioſcoridis; Macedonicum Belgarum) reprehendit Græcos nuperos, ac Matthiolum, quod perperam *Smyrnum* eſſe crediderint, hiſ verbis. Perquam ſimiles *Olyſatrum* & *Smyrnum*, adeò ut minus circumſpectè utrumque exploranti, alterutrum utriuſvis poſſit verum delineationem repræſentare; ac cui utraque planta viridis præ oculis, atque deſcriptio non item. Magis conſpicua differentia ſunt hæc. Iſtud genus, quod plebecula frequens eſtat, præſertim primum aparagos dum promit, vocitatque Macedonicum, vel Alexandrinum, ut Angli, in hortis copioſiſſimum. cui ſemen copioſum, atrum, unde illi *Olyſatrum*, plenum, grave, ſiſmiphærici figuræ, ſed paulum quid utrinque reſuſ in ſiſ. medicato gultu acri, ad *Smyrnum* accedente. Marcell. & Braſſavola eſſe verum Hippofelinum aſſeruerunt, quod qui reſpiciunt, anſiſ proſum argumento, non ut veritati, ſed ſux potius dignitati conſulant, ne & Levitiſcum vulgare abjurent, pro majore Selino, nè verum *Smyrnum*: doctiorum omnium iudicio, melius & repetum poſterius in Italia, in huius locum ſufficiat. Sicq; volens vidèſſe errores ingeminat, cudit, & tegit Senenſis dictator, inſaceto hoc ſeculo plaudente. Virgilius Marcellus ipſi perverſus interpres immeritè videtur, quippe hoc non eſt pervertere, ſi radices foris nigras, intus albas in quopiam non viſo ipſi codice aut exemplari legit, & ſcripſit. Perverteret autem, ſi contra, quàm autor innucri, ſenſum exprimeret, atqui ſi ut ipſe (Matth.) vult, Dioſcorides nullibi meminit, igitur, nec adyerſatur, nec Matthiolus meritiò Hippofelinum verum averſatur. Quod tamen vulgus Italorum avidiſſimè expetit in acetatis, non ſecus atque Germanorum, Anglorum & Græcorum, qui etiam nunc, ut jam tum tempore Dioſcoridis, cum *Smyrno* conſundunt.

Tab. Hippofelinum confirmat, ac in Iconibus ſuis (ubi figura tranſpoſita eſt, ſub Petroſelino Macedonico) adhæc Apium Hiſpanicum vocat, hæcque in hiſt. de eo ſcriptis mandavit. Nonnulli præſentem

plantam abſque ullo diſcrimine *Smyrnum* aliquod eſſe contenderunt, nec longiùs in eo aberrarunt, quàm quoddam *Smyrnum* Dioſcoridis æſtimarunt. Qui ſi Galenum, Aëtium & Apulejum hac de re conſultuiſſent, animadvertiſſent hanc ſtirpem non *Smyrnum* Dioſcoridis, ſed Galeni, Aëtij & Apuleij eſſe, quod Dioſcorides Hippofelinum & *Olyſatrum* nominavit, quodque *Smyrnum* ab aliquibus vocari reſtulit. Quæ Galenus, Aëtius & Apulejus de *Smyrno* ſcriptis prodiderunt, ea de Petroſelino Alexandrino intellexerunt. Ethoc diligenter obſervandum eſt, ne binæ hæc ſtirpes inter ſe confundantur, id quod Plinium & Theophraſtum feciſſe legimus. Poſito enim uno abſoluto, plura neceſſariò ſubſequuntur. Quæ verò Dioſcorides de *Smyrno* dixit, ea de Græco intelligenda ſunt. Apium Alexandrinum vocatur Græcè à Dioſcoride *ἵπποφελιον*, *ῥοσίνιον*, & *ῥοσίνιον*: à Galeno ceu & aliis *ῥοσίνιον*, Lat. Hippofelinum, *Olyſatrum*, Græcum: Galeno Aëtio & Apuleio *Smyrnum*: Gaza Equapium: Herbariis *Smyrnum* Galeni, *Smyrnum* holeraceum, Apium Hiſpanicum, Perſicum, grande, Alexandrinum, & equinum, Herba Alexandrina: Petroſelinum Alexandrinum, & equinum: Sorano Ephæſio Alexandrum, *Olyſatrum*, & *Olyſatrum*: Chyrgis & pharſmacopæis Petroſelinum Macedonicum nō ſine errore: Scapione lib. de temp. ſimpl. cap. 186. arabicè Samaritium: Ital. Macerone: Venetiis Herba Alexandrina: Neapoli Alexandro: In Candia Macedonico: Gall. Macero: Hiſp. *Perexil de Maciano*, & Apio Macedonico: Egypt. Deuterobon: Polon. *Gies*: Angl. *Alexandre*: Belg. *Petroſilie van Macedonien*/ & groote *Ἐππίχ*: Ger. n. *Alexandrinſcher Peterlin*/ aut *Peterlin auß Alexandria*/ Roſſ *Peterlin*/ Roſſ *Ἐππίχ*/ Spaniſcher *Ἐππίχ*/ Perſiſcher *Ἐππίχ* & *Alexander*.

Cæſalp. dicitur *Olyſatrum*, & vulgò corrupto vocabulo Macerone, ut putat à Macedonico Petroſelino: quia ejus loco aliquando acceptum eſt: ali j Alexandrium vocant: fert luteum florem, radicem nigram. Galenus, inquit, reſert Romæ plurimum vendi appellarique vulgò *Olyſatrum*. Iterum in ſimpl. cenſu *Smyrnum* quoddam Hippofelinon ſil. veſtre nominare; Theophraſtum verò Hippofelinon, quæſi equinum Apium, & ut Theod. veritè, Equapium, foliis vicinum Paludapio, hiſutum, & e. radice nigra, quod quidam in totum Myrrham eſſe aſſerunt Plinium tandem *Olyſatrum* & Hippofelinon & *Smyrnum* vocari tradere. Hæcille. An verò ubique Macerone proveniat radice albâ qualis eſt noſtra Montbelgerdi, non obſervavimus. Si Equapium ſive Hippofelinum Theophraſti eſt hiſutum, non poteſt eſſe Macerone: ſed interpretandum fortè *ſæd*, non hiſutum, ut tranſtulit Gaza & eum ſequutus Cæſalp. ſed denſum. Theophraſti locus eſt ſub Apio magno, ſive Hippofelino.

Bauh. eſt Hippofelinum vel *Smyrnum* vulgatum. apud Matth. Ac præterea Apium 14. in phyt. Eid. B. pin. Apium 13. Hippofelinum Theoph. vel *Smyrnum* Dioſc. Petroſelinum Macedonicum verum, Ger. *Smyrnum*, Matth. Cord in Dioſc. Gefn. Caſt. Lugd. Col. qui Dioſcoridis vult. Alexander, Qui Hippo- Tur. Et huius ore Hippofelinum eſſe aſſerunt, ſed iterum diſcrepat, dum pars Hippofelinum Theophraſti, pars Dioſcoridis, pars Galeni, Aëtij, & Apuleij, aut aſſerunt, aut negat.

Matthiolus *Smyrnum* eſſe contendit, ac ait. Si *Smyrni* ſingulæ notæ, quæ illi à Dioſcoride tribuuntur, rectè diligenterque expendantur, facile quidem perſpici poterit, *Smyrnum* ei herbz ſimilimum eſſe quæ à noſtris in Hetruria vulgò vocatur Macerone. Siquidem hanc naſci clarum eſt eo modo, ut notæ ſcè omnes, quas *Smyrno* Dioſcorides.

Obiectio.

didit, convenient. Verum quispiam, cui forte hæc mea sententia minus arrideat, obtrudet nobis seminem, ut quod Macerone nostro non insit rotundum; Brassicæ modo. Huic illud responsum volo,

Responsio.

quod cum cæteræ in universum notæ illi respondeant, facile in seminis delineatione mendum subesse potest. Vel quod non in rotunditate, sed in alio uni cum altero semine intercedat similitudo. Porro quamvis memoriæ non prodiderit Dioscorides, quod Smyrniū feratur in hortis, in quibus hodiè nostrum hoc sentitur, sed quod sponte in Amano Ciliciæ monte gignatur, tum etiā in collibus incultis, ac saxosis locis. Plinius tamen ætate passim in hortis ferebatur. id quod ipse Plinius manifestè demonstrat l. 9. c. ult. ubi Smyrniū inter hortensia refert. Idem quoque testatur Galenus, quod ipsum lib. 2. de aliment. facult. inter olera connumeret. Ex cuius sanè verbis liquiddè apparet, Smyrniū veteribus etiā inter olera fuisse receptum. Galeno verò ad stipulantur ea, quæ de Smyrnio mihi retulerunt Siculi. namque ij affirmant, plantam Maceronem appellatam passim coliri in suis hortis, atque eam Venis tempore (ut etiā Galenus perhibet) caulem tenerissimum emittere : qui non solum edendo sit, sed gratiam quoque ineat cum ore, præsertim si cum sale & Pipere Cinaræ modo comedatur. His itaque fortasse, vel etiā validioribus rationibus adductus Manardus, Smyrniū esse nostrum dictum Maceronem constanter asseruit. Quo fit, ut minus dubitem Ruellij opinionem improbandam esse, quod suspicetur Maceronem esse Paludapium. Smyrniū n. verò eam esse stirpem certò putet, quam in Galliis vocant vulgò Levecchia, h. e. Ligusticum vulgare.

*Nulli opinio improbanda.**Smyrniū Macerone.*

Camer. apud Matth. germ. vocatur Olusatrum sive Smyrniū, quā etiā in inscriptione pictum dedit an epit. Idem h. appellat Smyrniū Matthioli, ubi ait Hippofelinum cum Smyrnio confundi, non esse novum patere ex Hefychio, apud quem legimus *εμψυγιον τὸ ἰσχυρότερον καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τὴν ἰσχυρίαν*. Sed patere etiā ex Galeno & Dioscoride docet.

Turner.

Tandem Macerone non esse Hippofelinum ostendit sequentibus Turnerus. Præceptores meos in simplicium cognitione, Antonium Musam, Fuchium, Ruellium viros extra aleam doctissimos, sequutus, vulgare nostrum Alexandræ / Hippofelinon Dioscoridis credidi. Sed lecto Matthioli de Hippofelino, descriptionēque diligentius perpensa, notas quasdam deprehendi à Dioscoride Hippofelino tributas, quas in Alexandræ nostro non est reperire. Tribuit enim Dioscorides Hippofelino radicem albam gracilem, plantamque altiore Selino; foliaque in purpureum colorem vergere. Nostrum autem Alexandræ. radicem habet magnam nigram, plantaque tota, si intuearis, Selino nigrior est, nihilque habent purpurei, etsi talis colore in oculis appareat primum erumpentibus. Non est ergo

*De off. Hippofelini. Diosc.**Smyrniū.*

Hippofelinon Dioscoridis. Credo tamen Smyrniū, sed non illud à Dioscoride descriptum; ut vult Matthiolus, sed illud, quod rejicit Dioscorides, tanquam improprie dictum Smyrniū, quod tamen alij Græci, ut Galenus & Aëcius Smyrniū nominant. Hoc autem Smyrniū, ut ut à Dioscoridis Hippofelino diversum est, existimo tamen esse Hippofelinon Theophrasti & Aëtij, & plantam eam, quam Galenus de alim. fac. testatur suo tempore vocatum Olusatrum. Quod autem nostrum Alexandræ non sit Smyrniū Dioscoridis. hæc quæ in Smyrnio requirit Dioscorides & in Alexandræ non repetuntur, docent. Smyrniū Dioscoridis folia habet colore in luteum languescente : nostri Alexandræ folia sunt nigra. Smyrniū semen habet Brassicæ rotundum nigrum : nostri Alexandræ semina oblonga

*Hippofel. Theophr.**Olus atrum.**Smyrniū. Diosc. mox.**qf.*

sunt nullo modo Brassicæ familia, sed Selini, nisi quod multo sunt mitiora & nigriora. Radix Smyrniū intus viridis est, aut subalbida. Alexandræ, nisi fallit memoria, non habet radicem intus viridem, neque subalbidam, sed penitus albam quantum memini. Smyrniū Dioscoridis saxosis nascitur & collibus, atque squallidis & juxta semitas. Nostrum Alexandræ in opacis provenit, & humidis, & infusis mari ambiis, ut in insula quadam inter Somersetensis agri ultima & VValliam. Quare Alexandræ nostrum non est Smyrniū Dioscoridis. Quod autem sit Smyrniū Galeni & Aëtij, ac Olus atrum, cuius meminit Galenus, fuitque Romanis usitatum in cibis, atque etiā Hippofelinon Theophrasti, sequentes rationes aut penitus, aut ex parte evincunt. Aëcius de Smyrnio hæc scribit, Smyrniū aliis Hippofelinon dictum, ejusdem generis cum Selino & Petrofelino, sed semen habet nigrum, & multo majus. Ex quibus verbis colligo, Smyrniū speciem esse Selini vel Apij, & eum genus maximum, merito Hippofelinum vocari posse. Discimus etiam ob id Selini esse speciem, quoniam simile habet semen figura & viribus, neque esse posse Apij seu Selini speciem, plantam cuius semen cum Apio nihil habeat simile. Ex quo colligimus Ligusticum vulgare, cuius semen nullo modo Selino simile est, neque Orofelino, neque Petrofelino, non posse esse Hippofelinon Dioscoridis, nec Smyrniū Aëtij, nec Smyrniū Dioscoridis. Galenus de aliment. fac. de Selino, Hippofelino, Sio & Smyrnio, scribens inquit, Omnia vim habet djuretici, &c. Hæc verba Galeni perspicue docent, plantam quam ipse vocat Smyrniū, esse nostrum Alexandræ. Sed quæ mox apud ipsum sequuntur, facile probabant id ipsum assertum, atque etiā quoddā esse Hippofelinon (quod mihi est Dioscoridis, nō Theophrasti) quod nequeat esse nostrū Alexandræ; nec non nostrum Alexandræ veteribus Latinis Olus atrū dictū fuisse. Galeni verba sunt, sed Hippofelinum & Sion contra comeduntur, &c. Videamus jam porro an probare possimus prædictū Smyrniū, sive Olus atrum esse Hippofelinon Theophrasti. Theophr. Hippofelinon sūta describit; Folia habet Eleofelini &c. In qua descriptione nihil video, quod nō cum Alexandræ nostro conveniat. Habet enim folia Apio palustri similia figurā, majora, nec ita lævia, caulis magnus quoque; radices crassius Raphanum æquat, nigra, semē nigrum, magnitudine Orobi, sed alterius figuræ. Quod ad natales, copiosè in qualibet Angliæ provincia nascitur. Nihil video igitur cause, quo minus Hippofelinum Theophrasti sit nostrum Alexandræ. Quoniam autem opinati sunt nonnulli Myrrham, Græcis *quovras*, ex radicibus Hippofelini exstille, existimo postmodum plantam hanc Smyrniū nomen adeptam. Quod si quis obijciat Theophrastum & Galenum Hippofelino & Smyrnio folia tribuere toto anno virentia. Respondetur Theophrastum, sicuti ait Hippofelinum folia habere virentia, ita idem de Selino dicere, & iis quæ in summitate virentia sunt, i. e. folij extremo; nam caules qui semen tulerunt, Hyeme pereunt. Sed cum Selini duo sint generat. Femina fecunda. 2. alius Virgo, Viduum dictum, quod aut nunquam semen tulit, aut caules celerè incipiens decerptum est, antequam semen maturum ferat, ut in Apio hortensi, quod æstate vel Autumno semen tulit, nulla habet Hyeme folia, sed duntaxat Apium à Virgine nomen adeptum: Ita quoque de herba Alexandræ dicta se res habent. Tametsi enim non quilibet nostri Alexandræ radix folia habet Hyeme virentia: locis tamen calidioribus Alexandræ radix folia habet per Hyemem, secus ac Apium hortense tenellum. Et hæc Turnerus de Macerone nostro judicio scripsisse videtur.

Quod

Quod Macerone Italis, quibusdam verò Smyr-
nium semine magno nigro vocatur, dicitur pluribus
Galliae in locis, cum & aliis multis adhuc hodie Pe-
troleum Macedonium

Oritur Calapino in umbrosis hortis prope ma-
cerias pingui Solo: lætissimum autem in cœmentitiis.
Vide ego passim in hortis. Genevæ florebat Aprili
& Majo, primo anno non produens caulem, Hie-
me virens: se multiplicat semine deciduo, perire foli-
um postquam caulem produxit.

Valde familiare olus multis in locis, alit bene
& præstat eadem, quæ Apium, sed efficacius.
Calidum & siccum. Venit in cibum cruda & cocta,
tum radix concisa, tum folia tenella & caulis ex aceto
& oleo. Radix Autumnus eruta, acin arena per
Hiemem conservata teneriore vadit, aptiorque ac-
cetariis redditur, Ioanne Schvab referente, qui copio-
siam alit Ebrodum in horto. Radix Apij, quæ Alex-
andra multis in locis vocatur (inquit Ioub.) ante
coctionem præmacerari debet per novem aut de-
cem dies, affusâ quotidie recenti aquâ, ut condian-
tur radices.

SILPHIUM SIVE LASERPI- tium veterum.

CAP. LIII.

SILPHIUM, Dioscoride ita tradente, nascitur in
Syrta, Armenia, Media, & Lybia. Caulis ejus
Maspetum vocatur similis Ferulæ: folia habet Apio
similia, semen verò latum [foliaceum, Plin. & Orib.
qui addit ο καλὸν τοῦ μαγνὸς αἵματος] Radix exalfacit, æ-
gre concoquitur, inflationes facit [sic habet uterque
codex, teste Goupylo, at in vulg. exempl. desiderant
ur, nec etiam Coro. legit.] ac vellece quoque noxia
est. Strumis atque tuberculis cerato excepta & su-
gillatis cum oleo illita medetur. Ischiaeiis cum iri-
no aut cyprino convenit: excrecentia circa sedem
tollit, tegmini Mali punci incocta cum aceto & im-
posita: venenis eadem pota resistit: necnon & in-
tinctibus salibusque admista ori grata est. Colligi-
tur & liquor: & radice atque caulibus in suis. Pæfer-
tur is modicè ruber atque translucens, Myrrha æ-
mulus, odoréque valens, minimè porraceus, neque
saporis immitis & asperi: qui denique dum liquecit
aut diluitur, faciliè albescit. At Cyrenaici eum si-
miliculi quis ipsum degustaverit, madorem toto cor-
pore ciet, estque odorè blâdissimo: adeò ut ne os qui-
dem gustanti nisi paululum spiret. Medicus verò &
Syrtaei viribus minus valent, & magis virosum
reddunt odorem. Potiò liquor omnis anteaquam
siccecat addito Sagapeno aut Fabæ lomento [Faba
fracta, Plin.] adulteratur: quod maleficium gustu o-
dore, visu, ac diluendo quoque deprehendes. Sunt
verò qui caulem, Silphium radicem, Magadarim; &
folia, Maspeta vocaverint. Efficaçissimus est liquor,
mox folia, postremò caulis. Est autem ille acris, in-
flationesque facit, alopecias cum vino pipere & ac-
eto perunctas sanat: cum melle illitus oculorum
aciem exacuit, incipientemque suffusionem dissipat.
In dentium doloribus cavernis ipsorum inditur,
aut cum Thure linteolo illigatus circumponitur,
aut denique cum Hysso & Ficus in posca deco-
ctus colluitur. A rabioso cane commorsus prodest
vulneribus impositus, itidemque valet ad omnium
quæ virus ejaculantur animantium, venenatorum-
que telorum ictus, seu potus, seu etiam illitus. Scor-
pionum plagis oleo dilutus circumlinitur, gangræna
obscis patibus, prius sanctificatis, insunditur: nec
non & carbunculis, cum ruta, nitro & melle, aut
etiam per se: clavos callotque prius cucumers

extrahit, siquidem cerato, siccotumve Ficum cæ-
ne subactus antea fuerit. Sanat & lichenas recentes
ex aceto: itridæ nque sarcomata & polypos, si cum
atramento sutorio aut æruginè per dies aliquot illi-
natur: verum extuberantia forficè extrahi oportet.

Arteris quoque longo tempore exasperatis opitu-
latur, ac vocem quæ derepente irraucuerit aquâ di-
luta sorbitione confestim expedit. Quin & uram
illitas cum melle reprimat, ac in anginis cum aqua
multa utiliter gargarizatur. Vescenibus lætorem
colorem conciliat, ad tussim commodè in sorbili
ovo datur, itè nque pleuriticis in sorbitionibus. I-
cterici verò & hydropici cum aridis Ficus utiliter
exhibetur. Rigores etiam cum pipere ac thure in
vino potus discutit. Tetano, opisthotonôque distentis
oboli pondere devorandus datur: hærentes gulæ
hirudines gargarizatus cum aceto decutit. Quibus

haustum lac intus concreverit, & comitialibus, sum-
ptus ex aceto multo succurrit. Potus verò cum pipe-
re & myrrha menses ciet: cælicos in acino uvæ
sumptus adjuvat: denique in lixivio potui datus
repente convulsis prodest. Ad potiones autem A-
mygdalis amaris. Ruta aut pane calido dissolvitur.
Cæterum, foliorum succus eadem præstat, at liquore
multò inefficaciùs. Estur potiò utiliter cum aceto
multo ad purgandas fauces, maximè verò cum su-
pressâ interceptæ vox est: vescuntur & ipso cum
Lactucis, Erucæ loco. Sed & altera fertur Magadaris
in Lybia nasci, radix Laserpitio similis, at minus
crassa, acris verò ac fungosa, nullòque prægnans
succo: ejusdem tamen cum Laserpitio facultatis.

De Laserpitio [sic] nunc indicandum est ex
Theophrasto: Silphio radix multa, crassaque: caulis
quantus Ferulæ, & crassitudine ferè proximus; fo-
lium quod Maspetum vocant, Apio simile est; semen
latum, foliaceum, sc. quod Folium appellatur, caulis
annuus, sicuti Ferulæ [videtur]. Ergo Vere ineunte Ma-
spetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguecitque
vehementer, & carnes mirabilem in modum suaves
redduntur. Posthac caulem edit hominum cibo ido-
neum omnibus modis, elixum, assumque: corpora
eo quoque purgari ferunt, quadraginta diebus. Suc-
cus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice: plex
qua de causa alterum Scaparium [videtur] alterum
Radiciarium [sic] vocant. Radix nigro cortice te-
gitur, eumque detrahère solent. Sunt veluti certæ
mensuræ cædendæ radicis, quibus quantum con-
ferre putetur ad futuram cæsura reservantes, reli-
quum abscindunt. Nec enim devide [nec enim alio
pacto, forè meliùs leg.] neque plus constituto cæ-
dere licet: corruptum enim putrescitque, si diu
mansit [si in exercitatum, aut iners diu mansit, ex
græco.] Præparatio conficiturque in Pyrezum por-
tum adjectum hoc modo: Cum in vasa conjecerint,
farinamque admiscuerint, quatiunt crebrò & diu;
hinc etiam colorem capefit & conditum jam incor-
ruptum perdurat. Præparatio, cæsuraque ita se ha-
bet. Locum Africæ amplum occupat, ampliorem
quàm quatuor studiorum millia. In hortis Hesperidi-
um ferunt ejus magnam partem colligi, sed majore
apud Syrtis. Peculare hujus, cula fugere loca
proditur, quam obrem si colatur, mitescatque solum,
deviat [in desertum fugit, restituit ex Plinio. græcum
verbum est ἐκωαδίζω] atque omni: o degenerat,
utpote naturâ culturam aspernans, serocitatique
constans vernaculum [serum ac contumax Plin.
ego è græco legendum censeo, quum sit verum:
ἐκωαδίζω] Cyrenenses annis septem prius, quàm
ipsi urbem habitarent, Silphium [Laserpitium red-
dit Gaza] extitisse affirmant: habitant verò annos
maximè trecentos usque ad Simonidæ Atherismu-
m. Illi sic referunt. Alij radicem Silphij cubi-
talem esse tradunt, aut paulò majorem. Hancin

Ven. rauce.

Angina.

Hirudines.

Foliorum.

succus.

Magada.

ra.

Silphium.

Theophr.

Succus du.

plex.

Scaparium.

Radiciarium.

Radicarium.

Theophr. ro.

stusum.

Succi pua.

paratio.

३५६१२४७७
 ७५०७७०८०
 ९५०७७०८०

peccora, sed ægra sanari, aut protinus mori, quod in paucis accidere. Perfico Silphio prior[posterior] legit Dalech. Nam prior[posterior] narrationem convenio Libyco, sive Cyrenaico, apertissime Theophrastus indicat Perficum vocat, quod in Armenia & Media Persarum imperio subditi nascitur. Dal. opinio cōgruit. Alterum genus est, quod Magydaris vocatur, tenebrius & minus vehemens, sine succo: quod circa Syriam nascitur; non proveniens in Cyrenaica regione. Gignitur & in Parnasso monte copiosius, quibusdam Lasepticum vocantibus: per quæ omnia [per quod omnino. Vet.] adulteratur rei saluberrimæ utilissimæque autoritas. Probatio sinceri prima, in colore modicè ruffo, & cū in frangitur, candido intus, mox translucente: gutta aqua, salivæque liquescit. Vfus in multis medicaminibus. Hæcenus ille, qui usum ejus medicum l. 22. c. 23. proponit, pleraque juxta Dioscoridis præceptum tradens, his verbis: Imbre provenit & Silphion. Venit primo è Cyrenis, ut dictum est. Ex Syria nunc maxime importatur, deterius Parthico, sed Medico melius, extincto omni Cyrenaico, ut diximus. Vfus Silphij in medicina. Nam folia ad expurgandas vulvas, pelendosque emortuos partus decoquantur in vino albo, odorato, ut bibatur mensura acetabuli à balaneis [acetabuli. Ad lienas radix. M.] Radix prodest artens exasperatis, & collectionibus sanguinis illinitur. Sed in cibis concoquitur ægre. Inflationes facit & ructus. Vinæ quoque noxia. Suggillatis cum vino & oleo amicissima, & cum cera strumis. Verticis scdis crebriore ejus suffitus cadit. Laser è Silphio profusus, quo diximus modo, inter eximia naturæ dona numeratum, plurimis compositionibus inseritur. Per se autè algores exalfacit. Potum nervorum vitia extenuat. Fœminis datur in vino. Et lanis molibus admoveitur vulvæ ad menses ciendos. Pedum clavos circumscissos ferro, mistum ceræ extrahit. Vinam ciet Ciceris magnitudine dilutum. Andreas spondet copiosius sumptum, nec inflationes facere, & concoctioni plurimum conferre lenibus & fœminis: item Hyeme quàm Æstate, utilius, & tum aquam bibentibus: cavendumque ne qua intus sit exulceratio [quam acrimonia sua cum tenuitate partium junctâ irritet Dal.] Ab ægritudine recreationi efficax in cibo. Tempestivè enim datum, cauterij [Cauterium licenter vocare Plinius hic videtur medicamentum Græcis dictum *καταπονομήτης* & *μεταπονομήτης*, quod habitum & structuram corporis ac fabricam mutat: nempe quod admodum suâ caliditate & insigni tenuitate humores evocat ex alto, cutisque poros aperit: & intro sumptum sanguinem ac humores potenter in habitum corporis diffundit & dispergit. Dal.] vim obtinet: asferis etiam utilitas, quàm expertibus. Ad externa corporum indubitate confessiones habet. Venena telorum & serpentum extinguit potum: ex aqua vulncribus his circumlinitur: scorpionum tantum plagis ex oleo: ulceribus non maturefcentibus cum farina hordeacea, vel sico sicca. Carbuŋculis cum ruta, vel cum melle, vel per se visco superlitum ut hæreat: sic & ad canis morsus. Excrecentibus circa sedem cum tegmine [germine M. & CH.] punici mali ex aceto decoctum. Clavis pedum, qui vulgo Morticini appellantur [Morticinum (hominem sc.) per concivium & contumeliam Plautus in Perla vocat, ex anguem, tetrum, pallidum. Dal.] nitro misco, ante subactum. Carnes [vel ulcera cava explet, vel corpus obefum reddit, & talibi ait, pingue facit. Dal.] replet cum vino & Croco, aut Pipere, aut murium fimo & aceto. Perniones ex vino fovet, & ex oleo coctum imponitur: sic & callo [sic clavis add. Dal.] Clavis pedum superasis præcipue utilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, vel dies. In tussi,

uva, fellis veteri suffusione, hydropis, raucitibus: onfestim enim purgat fauces, vocemque reddit. Podagras in spongia dilutum poscā lenit. Pleurius in sorbitione vinum poturis datur, contractionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine ceræ circumbitum. In angina gargarizatur. Anhelatoribus & in tussi vetusta cum porro ex aceto datur: æque ex aceto his, qui coagulum lactis [coagulatum lac, vet. Alij colostræ lactis. Dal. quibus lac potum coagulatum est] sorbuerunt. Præcordiorum vitis, syntectis: comitialibus, in vino [in cibo, CH.] in aqua mullâ linguæ paralyti. Coxendicibus & lumborum doloribus cum decocto melle ihigitur. Non censuerim, quod autores suadent, cavernis dentium in dolore inditum [cavernis Dioscorides indit, aut cum thure in linteo circumligat. Interim distinguendam causam doloris censemus. In frigida quid nisi conferat? In calida quid non obstitit?] cerâ includi, magno experimento hominis, qui se ea de causa præcipitavit ex alto. Quippe tauros in flammâ naribus illitis: serpentes avidissimas vini admistum rumpit. Ideo nec inungi suaserim cum Attico melle licet præcipiant. Quas habeat utilitates admistum aliis, immensum est, referre: & nos simplicia tractamus: quoniam in his naturam esse apparet, in illis conjecturam sæpius fallacem, nulli satis custodita in mixturis concordia naturæ ac repugnantia. Nec plura Plinius.

Hipp. lib. 4. de morb. rationem reddit, cur in Libyæ Silphium sua sponte nascatur: quum ut in Ionia & Peloponeso nasceretur, à multis frustra tentatum sit.

Galenus de Silphio 8. simpl. brevibus scripsit. Lib. 4. inquit, calidissimus est, imò & folia, & caulis, & radix latè strenuè exalfaciunt. Sed omnia statulentæ magis essentia sunt, ac proinde coctû difficilia: foris tamen imposita corpori efficaciora, & omnium potissimum liquor, admodum trahentem facultatem habens, attamen & excrecentias ameliendi, & liquandi vim quādam propter præpositam temperiem obtinet. Hæc ille.

Serapio Silphium in simplicium censu præterit. Serapio. nisi Aloht & Anjuden nomine, de quibus mox particulatim dicturi sumus, historiam ejus tradiderit, ut plurimi, non sine ratione quidem, putarunt.

Strabo succi Cyrenaici defecisse causam, in Bar. Strabo, baros, non in Publicanos rejicit his verbis: Cyrenis finitima est regio, quæ Silphium gignit, & Cyrenaicum succum, quem Silphium posterius effert, vertendum, quem liquorem Silphium fundit. Interpretes enim non viderunt *οὐκ ἐν τῷ δὲ δὲ δὲ* duci, nec adverbium esse. Idem Strabo lib. 15. scribit Alexandro ab Arachosia transeunti ad Bactrianos per *Apud Bactrianos*, iter nudum arboribus, copiosissimum Silphium occurrere. Id propemodum defecisse cum aliquando Barbari odio quodam ingruissent, ac radices ejus penè omnes eruisent.

Columella l. 12. c. 57. in Moreto Oxyporo, vel ut *Columella*, alij, Oxyporo componendo, requirit Laseris radices, quæ *εὐλαγον* Græci vocant, seiscunciam. In fra pretiosiore Oxyporo faciendū inquit: quod si etiam cū Laser non habueris, pro Silphio, mellis adicies pondo semunciam.

Antiphanes apud Athenæum Deipnos. l. 1. in Silphio præcipue Carthagine, ter alias res etiam excellere putat Silphium sive Maspetum è Carthagine. Et lib. 14. in Philothe-
ba.

Libycum caulis Silphij
Adstat divinis arefactus radix.

Phavonius in Lexico suo. Græco ait Silphion *φασμα* speciem esse plantæ suaveolentis: & maxime Cyrenaicum. Et: Silphium esse radicem bene olentem,

Contra
Dioscorid.

Hippocr.

Colum.

Serapio.

Apud Bactrianos.

Columella.

Silphium
præcipue
Carthagine.

Anuletum, anuletum de collo suspensum. Idem Magydarim appellat, ac succum Silphij facit. alij verò, aliud à Silphio, esse dicunt. Priscianus l. 7. cap. de Accusativo inquit. Magudaris significat fugis, i. e. caulis genus, qui nascitur ex ea parte, cujus radix Silphij avellitur, vel, ut alij volunt, Siliginem. Hactenus Priscianus. Hanc, caulem Lasepitij quidam exitimant. Plaut. in Rudente:

Seu tibi confidis fore multam Magydarim.

Rob. Steph. Robert. Stephanus in Thesuro ling. lat. vocat Lasepitium, *σίσυριον*, virgultum herbicum, ejusque succum Lasef, subjungens in Dioscoridis de Lasepitio capite, cōmentariū Matthi. Rob. Constan. Lex. græc. ait. *Σίσυριον* planta est ferulacei generis, foliis Apij in agro Genevensi primū à nobis multis ostensa est. Ex Cyrenaica laudatissima, culturamque naturā effugiens. Lannus ipsa Lasepitium dicitur. Lasef verò, id est, *σίσυριον*, simpliciter per excel-

Rob. Conf. Robert. Constan. Lex. græc. ait. *Σίσυριον* planta est ferulacei generis, foliis Apij in agro Genevensi primū à nobis multis ostensa est. Ex Cyrenaica laudatissima, culturamque naturā effugiens. Lannus ipsa Lasepitium dicitur. Lasef verò, id est, *σίσυριον*, simpliciter per excel-

Silphium Genevense. Lannus ipsa Lasepitium dicitur. Lasef verò, id est, *σίσυριον*, simpliciter per excel-

Opor per excellentiā. Lannus ipsa Lasepitium dicitur. Lasef verò, id est, *σίσυριον*, simpliciter per excel-

Beniovin. Beniovin, seplatiariorumque est Asa dulcis, ut Asa ferida, sive iterus diaboli, i. e. *σίσυριον*, succus sc. ex deteriore genere Silphij, virolus, scetidusque admodum, præsertim dum sufficitur. Silphij folium à Dioscoride & etiam à Plinio Masepitium appellatur.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

Corrig. Pollux. Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίσυριον* pro *σίσυριον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίσυριον* nominatur, teste Galeno in glossis *σίσυριον* vocatur à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum; alius, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *σίσυριον* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce *κατ' ἑξῆς*) vocabitur *μαγυδάριος* semen. Pollux *σίσυριον* vocat *μαγυδάριον*.

quæ Suidas memorat. At idem in Equites scribit Silphium fruticem esse inamœni odoris: rursus juxta alios amœni, & ad medicamenta utilem: cuius usum primus invenisse creditur Aristæus Apollinis & Cyrenæ filius, qui & mellis invenisse traditur. Illud quid sibi velit nescio, inquit Roterodamus: Aristophanis in terpres ait; in altera numismatis parte insculptam *Βασιλειαν*, i. e. regnum, seu regiam, si transferas tonum: pro eo Zenodotus legit Ammonem. sic enim habet. *ΑΔΙΤΙΟΝΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ*, i. e. Nomismatis altera parte Ammonem, in altera Silphium expresse. rant. Ammonem, ut arbitratu Erasmi, sentiens Iovem regnorum largitorem, si quidem Homero credimus. Hujus Batti meminit & Pindarus in Pythiis: Respondit habitatori Batto frugiferæ Africæ. Eruditi quidam putant Silphium Lasepitij genus esse.

Theophrasto, Strabone, Plinio, Colomellâ, Græcique Medicis & Herbalis de Silphio tradentibus, diligentius auditis, omnique ejus in antiquis scriptoribus medicinâ & historiâ contemplatâ: non erit ut eam Marcello credimus, Silphij Ferula hæc, Balsami arbusculâ vilior, nec liquore liquor etiam inutilior. Siquidem peregrina Græciæ & Italiæ, ideòque in majore dignitate, ceu illa semper fuit ac certos privatumque sibi à natura traditos natales locos, quod omnibus eam fecit optabiliorem, acceperit: ad Cyrenem scilicet campos, est postea extinctum omne illud Silphium fuerit. Et nē longiores simus, ob raritatem, & quas habet, ad utramque valetudinē, egregias utilitates, gentibus ad speculaculum, & in Deorum templis ad religionē & anathemata, propolita diu fuit. Cyrenes Delphis Apollini quotannis Silphij caulem ex agri sui opibus offerrebat, Ferulamque hanc suam tantopore amaverunt, ut Conditore Batto perpetuum cura ea honorem haberent. In gemma, qua publicè in signandis epistolis civitas utebatur Battum gentis suæ auctorem ostendentes: cui mulier quo decebat corporis ornatu & habitu Silphij caulem porrigebat, fortunæ simul naturæque pro suis opibus gratias agens, gloriam, felicitatemque suam: gratâ utriusque beneficii memoriâ sic ostentans. Id certè maximum precij & honoris in Ferula hac argumentum fuerit, quod e gregium, rarum, amabile, preciosumque aliquid Græci significantes, non aliter quàm ut in dicto proverbio sit, Batti Silphium jactitabant: neque immerito tanta fuit quondam, utroque tempore, morborum & sanitatis, ex ea humano generi voluptas, simul & necessitas, tamque quotidianus & amabilis cunctis usus. Ob quam causam omnes plantam, partēque ejus, longiore historiâ illustrarunt, quàm legentium aliquis æquo animo ferre poterit, ab ipsis & à nobis dicta. Sed non inutilia, ut quæ causâ sint, ut certius intelligi possint. Cyrenaico autem agro probatissimum nascebatur, tantumque illi ex ea laudis & honoris acceverat, ut Catullus unâ hæc notâ Cyrenem illustraverit, Lasepiciferas in epigramate suo Cyrenas vocans. Noverant enim tunc omnes quod ubique nunc ignoratur, eratque in quotidiano ciborum usu Silphium, quod grato sapore & odore commendabant. Miscebatur id in indicat Columella Oxyporis: & ut plures alij testatur Lasepitiatum acetum in multo usu erat. Et ne huic de Silphio tractationi aliquid desit, illud quoque dixisse conveniat, quod Martialis de Simila ait.

Nec Lasepidates patris numerare nec fuit:
Cum medicamentis cum sit & quo totiens apertum
Vtebatur eo passim antiquitas, nunc autem tantum abest, ut nostrorum temporum Silphio uti gaudeat aut medicina possit: ut rem ipsam utraque ignoret; nec conjecturâ saltem ostendere possit, Noverant enim tunc omnes quod ubique nunc ignoratur, eratque in quotidiano ciborum usu Silphium, quod grato sapore & odore commendabant. Miscebatur id in indicat Columella Oxyporis: & ut plures alij testatur Lasepitiatum acetum in multo usu erat. Et ne huic de Silphio tractationi aliquid desit, illud quoque dixisse conveniat, quod Martialis de Simila ait.

Historia
relinquit

Interpres diversam originem adagij scribit. Battus à Thera juxta Cretam insula, profectus, oraculo monitus Apollinis, vel (ut alij tradunt) domestica pulsus seditione, Cyrenem condidit. Cui quum Afri beneficij memores summū honorē habere studeret; donarunt illi Silphium herbam apud illos omnium pulcherrimam: simulque numisma fementes, in cujus altera parte, regia facies erat insculpta, altera Silphium, quo fuerat à civitate donatus. Cujus rei meminit & Aristoteles in Republica Cyreneorum. Sed fufius narrat Herodotus in Melpomene, addēs, apud Libyas regem Battum appellari, & hoc nomine compellatum ab oraculo, significante fore regem. Sunt qui dicunt imaginem fuisse datam: sunt rursus qui anulum, in quo civitas erat expressa, regi Silphium deferens. Porro Silphium inter herbas primam gloriam obtinet, cujus & folia, & fructus, & caulis, & succus pretiosissimus sit. Vnde Ampeliotz (e agens quædam est Africa) Delphis Silphij caulem consecratum suspendunt, ut auctor est Alexander. Hæc ferè adfert in Plutum: nec dissident,

tunt quidem nostræ ætatis Medici, inquit Marcel-
lus, Opon Cyrenaicum, sed nomen tantum, & id
quidem nomen longissimè ab antiquo Opo Cyre-
naico differt. Idem enim Opos Cyrenaicum & Lafer-
pitium hoc quondam fuit: nunc autem in Asa fo-
etida eâ voce utuntur, quæ tecti & ingrati odoris
sensu tantum à Laferpitio differt, quantum verissi-
mile est, quoniam discrepasse eorum usus.

Ex hac varia Silphij apud veteres historia, judica-
tu perdifficile est, quænam sit hodie planta, quæ
Laferpitium dici possit.

Maceronē quidem non esse Silphium, eum aliun-
de tum ex semine (quod Silphio latum & velut foli-
aceum tribuunt, conjecerit Gesnerus.

Ligusticum vulgare nonnullis censetur Silphiū,
quorum opinio non placet.

Tradit Rob. Constantinus Silphium quoddam
agri Genevensis, ejus autem verba hoc capite ha-
bentur. Quare lectores investigent, quam plantam
intelligat.

Angelicam quidam faciunt Laferpitium Galli-
cum, de quo hoc libro agimus.

Impeiatorum quibusdam non est Silphium Cithalsinum
sive Laferpitium, non absque errore.

Silphij & Laferpitij nomine suam plantam ha-
bet Lobelius, quam ait circa Massiliam reperiri, de
hac mox dicam sumus.

Benivinum non est Lafer, vel Silphium, ut multi
voluerunt, de quo H. n. lib. 9.

Plurimum Asa foetida est Silphij sive Laferpitij suc-
cus: isque duplex sincerus & impurus.

ALTIHT ET ANIJDEN veteribus.

CAP. LIIII.

ANIJDEN est folium arboris Asæ Isaac E-
benamram apud Serapionem, & gummi ejus
Altiht dicitur, & radix Maharoth. Abugerit Asam
statuit calidam in quarto gradu, & nocivam stom-
acho & hepati, positamque in dente corrosa, eum
frangere. Mesurugia Asa foetens est subulior, & ca-
lidior, fortiorque odorifera. Aben Mesuz est bona
pustulis intrinsecis & confert ventositati hæmor-
rhoidarum & stringit ventrem. Azaravi reperit As-
sam multum bonam in ægitudinibus nervorum
phlegmaticis, & non comparavit aliquid ei in cale-
faciendo, & in inducendo febrem, deditque ex ea
ægroto in quantitate Fabæ manè, & tantundem
vesperi, in potu vini boni, quia inflammatur
corpus ejus statim. Radicem appellavit Abo-
hanifa Almaharet Anjuden & unâ Almohoro-
cha, quam nasci in arenis tradidit. Almaharoch
autem, juxta Meselah, est minor quam Asa
in virtute sua, & juvamentis suis, & in nocumen-
to, quod ipsa infert stomacho, & est facilioris
digestionis. Rasis Almaharoch ait calidum & sic-
cum, confortare stomachum & hepar, confer-
reque digestioni. Fusior de Almaharoch est Ha-
bix. Est, inquit, calida in quarto gradu, appropin-
quat operatio ejus operationi venenorum, &
est mala hepati & stomacho, & quando impo-
nuntur denti corrosa frangit eum, & ipsa habet
odorem fortem multum, & caliditas ejus est pro-
pe caliditatem Anacardi. Et dicunt quidam quod
aliquæ gentes, cum non possunt præservare fata
sua a rebus nocivis sine ipsa, quia ipsi suspendunt
Asam ligatam in petia, in campis suis super bla-
dam, & super flumina, quoniam ipsa occidit, &
fugatio odore canes fluviales, & omne quod ge-

tom. III.

neratur in feminibus, ex vermibus & aliis nocivis,
& homines quidam Armeniæ, quando inveniunt,
quod in vulneribus suis, quæ fuerunt à sagittis,
apparet venenum, propterea quod sagitta fuerit
toxicata, apponunt in vulnere Asam, & evadunt
à veneno illo sine nocumento. Et hæc de Asa &
planta ejus Anjuden Arabes apud Serapionem
perhibent. Is autem præterea hoc capite Laferpi-
tium Dioscoridis & Galeni miscet & confundit,
nonnihil varians à Dioscoridē, & præcipuè in fine
capitis de Magudari altera in Libya nascente, ubi
ait: Comeditur autem & radicis pars interior cu-
jusdam plantæ, quæ Moly dicitur, quæ assimilatur
radici Anjuden, nisi quia est minor eâ, acuti saporis,
non habens lacrymam quidem, sed castem cum
Silphio operationes. De hac planta vide Avicen-
nam l. i. c. 52.

Altiht porro Arabum plurimis est Laferpitium
sive Asa foetida officinarum, Silphium Medum à
quibusdam appellatum.

Pro Asa foetida quid pingat Euch. Roesslin ne-
scimus: figmentum huius putamus.

Asa foetida Galiori dicitur de Xyride, sive Spha-
culæ foetida.

Asam dici de Angelica, post apparebit.

Monachi in Mesuem dist. c. 55. notant, non-
nullos decipi, Asaram pro Asa intelligentes.

Idem eodem loco referunt, aliquos Hæce, quod
est Thymus, dum legant Asæ, intelligere.

Alios etiam quandoque pro Asa, rem combu-
stam intelligere. Vt e. g. quando legunt Galbani,
Myrrhæ, Asæ, &c. intelligunt Myrrham crematam.

Scilicet Eucherius de comp. med. l. 2. c. 13. et 54.

supra Oleum Irinum Nicol. Myrepsi, falsò in lat.
exemplaribus legi Asæ, pro Casæ.

Colleg. Florentinum in Antuball. pro Asa admit-
tit Scipionem, seu Anisomacum.

Tradit qui pro quo substituit ex Galeno pro Asa
foetida Scapinum.

Asa dulcis multis est Laferpitium sive Silphium, Ben-
quod Benivirum putant, de quo H. n. lib. 9.

Glycyrrham vocari à quibusdam Asam dulcem,
dictum est Hist. n. lib. 17.

ASA FOETIDA, NO- stras officinarum.

LENITA & sequax est Asa, compactæ substan-
tiæ, colore ruffo, glebis satis magnis coacta; odo-
rem nobis virosam, Allij ferè, vehementiorem,
magisque abominandum latè spirans, & nares ac-
riter feriens: sapore primum amaro, postmodum
mordaci, in officinis sæpè impura, admota igni fla-
vescens.

Verisimile esse ait Cornarius Silphium Medi-
cum & Syriacum esse hodie Officinarum succum,
quem aliqui gummi esse putant, dictum Asam foeti-
dam: Nam Dioscoridem virosi & graveolentis odo-
ris esse testatum esse. Asam vocem esse ex Lafer
corruptam, minimè dubium esse: foetidam propter
graveolentiam Germanos vulgo Diaboli merdā
appellare.

Asam porro foetidam eandem esse cum Lafer-
pitio, placet, si fallor, etiam Garcias, Matth. Catal.
trascosurteni, Clus. Lac. Amato, Monachis, Rob.
Constant. Apoll. Dod. Disp. Col. Cam. Colitz, Lugd.
Had. Junio, Bellon. Lob. Cæf. & C. Bauhino. Hos igi-
tur de hac re differentes audimus.

Tanta est in nominibus Altiht, inquit Garcias, Aliis
Anjuden, Asa foetida, Asa dulcis, sive odorata, &
Laferpitium confusio, ut hæc, in officinis possunt
Laferpitium

M

quandoquidē hactenus neminem invenire licuerit, qui plāte, ex qua hoc gūmi profluat, nomē indicare, aut formam describere mihi potuerit. Illud autem certum est, hoc gummi *Altiht* Arabibus dici, nonnullis *Anrit*: nam cuicumque Arabi gummi *Imgu* aut *Ingara* ab indis vocatum ostenderis, statim id *Altiht* sive *Antit* esse pronuntiabit. Planta ex qua hic liquor emanat, incolis Anjuden, quibusdam Angeidan dicitur. Sed quoniam hoc gummi ē longinquis, ut dicitur, adfertur regionibus, veram plantae descriptionem habere difficile est. Is vero ut paulo post dicemus, Asā solā sepius utitur, & retulit sibi narratum esse succum hunc ex planta quadam foliis Coryli extrahi, concilio caule, dein in bubula coria conjici, prius illa sanguine cum Tritici farina permisto, conservationis gratia: eamque ob causam si quid in Lasere futuribus simile conspicitur, non adulterationis, sed puritatis potius esse indicium. Multis ab Avicenna l. 2. c. 53. nominibus insignitum est hoc medicamentum, veluti est *Altiht* *Almaharut*, *Almharut*, propter linguarum in regionibus, unde advenit, varietatem. Quid autem interpretem moverit, cum *Asām* vertit, ignoro, nisi quod verisimile sit eum non *Asām*, sed *Lasere* vertisse; idque vocabulum deinde temporis injuria in *Asā* depravatum esse. Porro dicit aliquis *Altiht* non esse nomen plantae *Lasere* ferre, sed ipsius potius succi concreti & coacti: cuius sententiae esse videtur Gerard. Cremon. comm. in *Rasīn*, cap. de diminutione coctus. lib. Divis. l. c. 79. Huic si respondendum volo, Gerardum veram linguam Arabicam ignorasse, cum ex Boetica Hispaniae oriundus fuerit; lingua verò, quā Avicenna scripsit, legitima est Arabica, quā videlicet Syri, Mesopotamij, Persae & Tartari utuntur, apud quos Avicenna natus creditur urbe Basora (quae nonnullis Babylon fuisse putatur, certò tamen rescius Babylonem non esse eam, sed proximam huic fuisse cujus nulla nunc extant vestigia) in provincia *Vzbeque* sita, quae pars est Tartariae. Eamigitur linguam vocant illi *Araby*, i. e. Arabicam, quā videlicet scripta inveniuntur Galeni, reliquorumque Philosophorum, & falsi Prophetarum opera. Nostrorum verò Mauritanorum linguam *Magarabi* nuncupant, quasi dicas, eorum qui ad Occidentem habitant; siquidem *garby* Occidentem arabicè sonat, & *ma* eorum. Est itaque *Altiht* nihil aliud, quam ipsa planta *Lasere* fer, veluti plerumque sumitur gummi pro ipsa planta. Verum obijciat aliquis: Si *Altiht* non est *Asā* dulcis, quid est *Asā* dulcis? *Asām* dulcem apud nullum probatum auctorem, sive Arabem, sive Graecum, sive Latinum, legisse memini. Sed cum Arabes liquorem *guz* vocent; eum verò qui probè coctus sit & densatus *Robalcuz* (Rob enim arabicè densatum sonat, & *al* est articulus genitivi apud Arabes) hinc depromptum esse nomen *Asā* dulcis verisimile est. Ceterum, *Altiht* Arabum, esse *Laserepitium* Dioscoridis & Plinij, tametsi nemo legitimum Arabum (qualis est *Rasīs* & *Averrhoes*) ejus usquam meminerit, satis ostendit Serapio lib. simpl. c. 251. qui de *Altiht* agens, ad verbum earefert, quae Galenus & Dioscorides de *Laserepitio* scripsere. Cedit ergo eorum opinio, qui multis argumentis probare conantur, *Asām* foetidam à *Laserepitio* differre. Nam quod *Laserepitium* veterum in cibos admissum esse ajunt, *Asām* verò foetidam medicamentis solum utilem, idque rarò; in cibis verò planè damnum ob tectum odorem, plurimum à veritate aberrare mihi videntur, ut postea inter vires fusiùs dicetur. Mirari subit Ant. Musam, qui adeò credulus fuit, ut his fidem adhiberet qui Benivy

(quod veteribus fuit ignotum) plantam confimilem Silphio affirmarunt. Sic Ruellius *Agelica* esse *Laserepitium* gallicum sibi olim imaginatus fuit, cuius opinio l. 9. H. n. g. cap. de Benivino convellitur. Eiusdem sententiae fuit aliquando (ut sc. Benivinum *Lasere* esse putaret) ipse etiam Muthiolus, veritate tamen coactus, sententiam mutavit. Hæc Garcias.

Succum Syriacum longè alium fuisse, & Benivino vocato excelluisse in promptu est nosset cum legenti, alterum Ferulaceae plantae, alterum verò arboris proceræ multò suavisissimum excrementum esse, tum etiam facultates, qualitatesque exploranti, quæ gustui in Benivino, neque fervorem in intima seledantem, neque in corporis meatu pervadentem, sudorifice affatiente exhibet. Ac tametsi Syriacum illud celeberrimum jam tum defecisse Plinij ævo assentior, inquit Lobelius, non tamen profluum nullum extare in naturæ familia *Lasere* persuadeor. Præter enim quàm quoddam speciem nullam penitus posse interire docent Metaphysica dogmata, tum verò mihi suppetit *Asā* foetida, quæ potius est Syriaci, Armeniaci & Lybici *Lasere* opinionem sustinere. Si porro quis duplicem *Asām* meminerit, alteram dulcem, alteram foetidam, is nosset, mitiorem illam, quæ dulcis dicitur, minus aut nihil additum habere foetidi *Sagapeni*, autlicujus consimilis gummi; Foetidam verò multum. Quid sit ut interdum liquidior, lividior, rubicundior, remissiorque ternatur, prout mixta, recens aut vetustior fuit, neque dum exaruit, cujusmodi interdum videre est in rancidis officinis.

De *Asā* sive *Asa* hæc adferunt Monachi. *Asa* secundum aliquos, & secundum alios (quod putamus rectius) *Asa*, dicitur illud quod à Graecis *Lasere* appellatur, ut patet concordando capitula Serapionis & Avicennae de *Asā*, cum capitulis Dioscori & cæterorum de *Lasere*. Sunt aliqui, qui in duas species dividunt *Asām*, sc. in foetidam & odoratam: & sunt qui addunt & tertiam, sc. dulcem, quæ parum habet de amaritudine. Quorum opinio nobis non displicet. & quoniam scripta doctorum de *Asā* & *Lasere*, tradita sunt, ea hic brevitatibus causâ repetenda non sunt. Hoc tamen dicimus, quod iudicio plurimorum hæc, quæ hodie communiter utimur, tenetur esse vera species *Asæ* foetidae. Quod nos non audeamus affirmare, nec possumus reprobare, quia adhuc non vidimus plantam ejus, neque ab aliquo qui viderit, ejus formam discernere valuimus. Dum ergo non habemus certiore notitiam de ipsius *Asæ* speciebus, liceat nobis hanc communem & usualetam, tam pro foetida, quàm pro odorifera, quàm etiam pro dulci in medicinis ponere. Dulcem quippe *Asām* adhuc non legimus in proborum auctorum compositionibus. Odoriferam autem simul & foetidam Avic. can. 5. in oleo Isebuet descripsit. Nec mitetur quis, quod diximus pro odorifera apponendam esse foetidam, tanquam suum contrarium: quia similiter Avicennam in fine sui cap. posse fieri notavit, ut loco foetidae, æquale pondus de odorifera ponatur. Si ergo foetidum & odoriferum contrariantur ad invicem, hoc in loco Avic. malè scripsit. Quod absit. Item dicit forsitan aliquis, quod ponere odoriferam pro foetida (sicut Avic. dicit) est bonum, sed non econtra. Ad hoc respondemus, quod de consimilibus idem est iudicium. Quod præterea sit melior odorifera, ut idem Serapio autoritate *Melaturgæ* dicit. In permutatione autem ponere speciem meliorem

Antit. Imgu, Ingara.

Almaharut.

Obijcio.

Responsio.

Obijcio.

Responsio.

Error quorundam.

molestiam sui generis, non est nisi bonum. Præterea nos huc usque; non vidimus propriam & veram odoriferam Asiam. Et quamvis aliqui, ut Manardus & Bravallus, velint Benzoin vocatum, esse Asiam odoriferam, tamen hoc nobis non clarè constat. Vnde putamus pari modo, ut dictum est de dulci, dicendum esse de odorifera, sc. quòd illa quæ minimum habet fœtorem, respectu fœtioris vocetur odorifera. In quo videntur convenire verba Avicennæ, quæ ita: Asia est odorifera, non fortè habens odorem, &c. Odor enim in bonam & in malam partem capi potest, i. e. multoties ponitur odor pro fœtore. Ex quo etiam verba Serapionis conveniunt, cum dicit illam Asiam, quæ nascitur in Syria habere pejorem odorem. Pejor quidem non nisi à malo comparatur. Quibus visis, concludendum est bene posse poni Asiam fœtidam pro odorata. Insuper est advertendum, quòd nonnulli ob ignorantiam & affinitatem vocabulorum multoties decipiuntur, & pro Asia intelligunt Asiarum: & aliqui Hæcce, quod est Thymus: Alij etiam quandoque rem combulant, ut fusiùs ante diximus inter æquivoca.

Apollo rad. i. per Laser Medicum aut Syriacum, quod minus valere, virosunquè odorem præ se ferre scripsit Dioscorides, quodque etiam tunc temporis, ut hodie Sagapeno adulterabatur, Asiam fœtidam intelligendam comprobatur & accipiendam. Is monet ab insistoribus aded adulterari ut potius Sagapeno variis suppositum fucus videatur.

Anviden Latinos Silphium vocare testatur Pand. Mor. cap. 48. esse quæ genus Ferulæ, cujus gummi Asia fœtida dicatur, quam duplicem statuit, odoriferam sc. & fœtidam.

Camer. apud Matth. germ. deprehenditur approbare sententiam Garcie, videlicet Alchit Arabum esse Laserpitium Græcorum.

Costa Ital. cap. 62. scribit in Alchit, Anjuden, Asia fœtida, dulci, & odorata diffidere auctores: esse gummi, existimarique proprium ejus nomen esse Laser. Is autem qui dicit Asiam fœtidam diffidere à Laserpitio, quia Asia fœtida usus sit tantum in Medicina, respondet (cum Garcia) magni usus in cibis esse apud Indos. Fallit aut Sepulveda propterea, licet Guainerus & multi, solum in compositionibus recipiant: Mattheum Sylvaticum venenum dicere Galenum adducentem: quod quidem apud illum, nec ullum Græcorum reperitur: rem non bene considerasse Mattheum.

Lug. planè assentitur is, qui Asiam Laserpitium esse censent. Ac propterea re & scribere Garciam; errare verò eos attestatur, qui Asiam fœtidam & Laserpitium differe putant.

Bellonio de medicato funere, Almajemur, quod Serapio in cap. de Mumia sua citat, apud Galenum videtur Silphium esse, quod Romani Laserpitium vocent, officinæ Asiam. Insuper si Serapionem capite de Ajouden legamus, Almajemur Mesues, cum Serapionis Almajemur prorsus convenire, nos deprehendere. Cum itaque Mesues scorum Mumiam ab Asia descriptam habeat, quæ idem est cum Almajemur, liquere sanè ex eo quòd Mumie vires non confundat cum Silphio, neque sui Silphij vim suæ Mumie cum tribuere voluisse, ut à Serapione, aut ejus scilicet interprete immerito accusatur. Itaque si quem fortè apud Arabes similem errorem compertis, eum in interpretem, non autem in ipsam auctorem conferre debebis. Non enim Arabes Mumiam intellexisse Silphium esse, neque Silphij vim suæ Mumie cum tribuere voluisse, usquam legitur. Si quidem vires, quas Greci Silphio tribuerunt, Ara-

bes Asiae adscribunt, non autem Mumie, ut patet utrumque bene descriptum habeari. Ne autem aliorum opinio nos conturbet, ista de Mumia & Asia, & de Ajouden & Almajemur dicere voluit Bellonius. Ergo qui temerè bonos viros taxant, atque eorum sententiam non tenent, & reprehensione non carent. Quòd si Avicennam, Serapionem, Mesuem, Rasim, omnes denique Arabes capite de Ajouden legeris, in eo Silphij vires scorum à Mumie viribus descriptas esse videbis. Arabes, Arabes cum sua lingua scripserant, à nobis non essent *græcis literis* magno Græcarum & Latinarum litterarum, sed Arabicarum acervo corripiendi. Nam quum eorum sententias omnino non teneamus, neque Arabicam linguam intelligamus, eos fortè infantes accusamus.

Laser à recentioribus Medicis Asa vocatur, distinguentibus in odoriferam & fœtidam: ut per odoriferam succus Cyrenaicus significetur, ut vult Cæcilpinus: per fœtidam Medius & Syriacus. tamen in officinis non reperitur nisi fœdissimi num genus, quam Asam fœtidam vocant. Mirum autem si in Aphrica copiosum est Laserpitium, non afferri succum Cyrenaicum, qui ob excellentiam simplici nomine Succus appellatur, græcè *Oros*. cum ex eadem Cyrenaica regione Ammoniacum habeatur, teste Dioscoride: idèd querendum inter eas merces, an cum Ammoniaco feratur. Hæc Cæsalp.

Et hi sunt, qui Laser seu Laserpitium Græcorum, Alchit & Anjuden Arabum, Asam fœtidam officinarum esse argumentis & rationibus comprobare conantur, quos cum aliis quibdam sequuntur ij, quos supra commemoravimus.

Contraria sit sententia Brunf. tom. 2. in exeg. Laserpitium in Diosc. dicenti: Quanquam & Medici & officinæ pro Laserpitio Asi fœtidam utuntur, quæ præ illius odoris est, tantum tamen differt à Laserpitio, quantum à melle: fel.

Asam quoque non esse Laser aut Laserpitium concludit Agricola in med. herb. qui alibi ait, Laserem Medicum & Syriacum graviore odoris existere, & hinc quosdam elicere Asam fœtidam Tabernarum, hos succos dici posse: Asam Arabibus corruptè dictam esse credi posse pro Laser: Virosunquè habere odorem & putrilaginem respere, adulterari addito Sagapeno, &c. Cyrenaicum esse non posse hanc fœtidam Asiam, Diabolium sterces Germanis appellatum.

Montanus Asiam Aromatariorum fœtidam nihil aliud esse concludit, quam Laser putrefactum. Sed Asiam fœtidam puram, qualis non raro occurrat, nullo modo Laser putrefactum concessimus, quin melius de ea sentire Garciam existimamus.

Disp. Colonienf. de Asa fœtida sibi non constat, dans p. 2. esse Laserpitium, Syriacum, aut Mesuense. negans verò p. 46. ubi hæc habentur. Asa fœtida etiam est liquor Laseris Parthici & Persici, seu cum Mesue Medici & Syriaci, sed virus & putrilaginem respiciens: atque nostra Asa fœtida, portacetum quid potius respicit & olet quam virus & putrilaginem. Videtur itaque altius peregrinæ plantæ, quam Silphij habere ynam, aut acetum esse.

Fluchates Tabern. dnos habet diversis figuræ scilicet. 1. Asa folia. 2. Asa melior ex Carmania. Sed & Hort. sanitatis cap. 46. figuram proponit fœtidam.

Nunc ad Synonyma, nonnulla videntur addenda. Synonyma. *Græcè* *Nos* *Arabes* *Syrice*, &c. dicitur *Græcis*, quem plures Asiam, ut Monarda, & Lig. & Manlius, Asi.

Asam & Azam simpliciter nominant; Asam foetidam Garc. Lang. Lob. Bellon. Amat. (qui & virosum Laserpitium) Bacchanell. Rob. Const. Apollo, de Vigo Chir. Dod. VVirfung. Vefal. Platear. Costa Ital. Lugd. & alij. Asam foetidam, Agric. Corn. Clus. Catalog. francfurt. Lac. Lonic. Toxit. Euchar., (qui fictam habet figuram) Disp. Colonienfe, Hort. sanit. Adolph. Tab. & C. Bauhinus. Asam foetidam, Regin. in exerc. Azam foetidam offic. Tab. apud VVirf. Asam foetidam officinarum, Ruell. Cotn. Colleg. Florent. (qui duo tamen Asam scribunt simplici f. ut etiam Cord. in Diosc. Cat. francos. Clus.) Matth. Fuchf. Bacchan. Dod. Vefal. Succum aut liquorem Syriacum, Medicum, & Particum atque Persicum alij; nonnulli etiam Cyrenaicum. Laser Medicum, Syriacum & foetidum aliqui. Lactymam Syriacam, Medicamque quidam. Guido Chir. Gum nam foetidam. Laserpitium, Clus. Laser, Lac. & Cæl. Laseris alium liquorem, Harcho. Laserpitium & Silphium Diosc. Bauhinus. Eid. B. pin. dicitur Laserpitium veterum: Silphium Diosc. & Theoph. Laserpitium. Plinij: Althut Avic. Asa quorundam. Nec desunt qui Scordolafarum: Nicol. Myrepl. referente etiam Tabern. Scordolafarum: Alex. Bened. Opoparthicum, Opoparthiam & Scordolaser. Germ. Teuffels dreef. Belg. Quyuels dreef & Fierzenfonsa. Poloni Ezarcie. Stercus & Merda Diaboli ob insignem foetorem appellatur.

Nomin.

Locus.

Volunt nonnulli ex Corafone ad Ormuz, & inde in Indiam deferri alij ex Guzarate, tamen isti ex regno Deli adferri vulgo afferant, regione admodum frigida, quæ ad Corafone usque & regionem Chirvam ex Avicennæ testimonio extenditur. Frequentius est, Garcia referente, in Mandou, Chitor & Deli; præterea ex Ormuz advehitur in Pegu, Malaca, Tanafarim, & regiones alias vicinas.

Vires & usus.
In medicamentis & cibis.

Nullum medicamentum simplex per totam Indiam majore est in usu (fas enim credere est Garcia) quam Asa foetida, cum in medicamentis, tum condendis cibis. Eam enim pro suarum facultatum modo sibi emunt, cuiusmodi sunt Baneanes (qui neque occidunt rem aliquam animatam, nedum eam vescuntur, ut in longum eos apud Garc. describit Clusius.) & omnes gentes Provincie Cabayæ, quos Pythagoras imitatus videtur. Solent illi Asam suis iusculis & oleis commiscere, conficito primum ex ealebete, nec alio condimento utuntur omnibus in cibis. Bajuli & huiusmodi tenuis fortunæ homines, quibus duntaxat panis est Cepe, non nisi summa in necessitate eam utuntur. Commendarunt mihi multi condimenta istorum Baneanum, cum à saporis, tum ab odoris suavitate. Horum oratione persuasus aliquando ejusmodi condimenta degustavi, quæ sanè sic satis palato aridebant, non tamen adeo ut illi prædicabant; quoniam fortè neque iusculis, neque condimentis valde delector: odore certè suo non erant molesta; tamen nullus odor æquè mihi infestus sit, atque Asa foetida. Sumunt verò nonnulli Asam, ut dejecti appetitus fastidia tollant initio enim aliquantulum amara est Asa, ut sunt Olivæ conditæ; deinde devorata mirum in modum illis bene sapit. Solent etiam plerique eam solà ad stomachi corroboracionem, flatibusque discutiendos, medicamenti loco uti. Quamobrem multi hallucinantur, qui Sepulveda secuti nullo esse in usu medico asserunt, nisi aliis medicamentis permixta. Lepidam porò historiam, quæ in Bistager contingit, prætermittere nequeo. Lusitanus quispiam iste vivens equum habuit maximi pretij, quem illius provincie Rex libenter emisset; nisi multis flatibus obnoxium compertisset. Lusitanus Asam farinæ permixtam

Fastidium.

Historia
lepidæ.

equo præbet edendam, & flatuum morbo liberat. Equum jam sanum emit Rex, & quæ ratione curatus sit, percontatur. Respondet Lusitanus, Immo, sive Asam edendam dedisse. Tum Rex: haud sanè mirum si curatus, cum Deorum cibo illum paveris. Ad hæc Lusitanus, sed mustians, ne exaudiri posset, & Lusitanico quidem sermone, veris Cascodæmonum cibum nuncupasset. Sed non possum non mirari Matth. Sylvatici cap. 27. de Anjuden oscitantiam, qui Galenum citans, venenum esse asserit. Nam neque Galenus, neque Græcorum quipiam id unquam scripsit, cum omnes uno ore Laser magnopere commendent adversus venena, pestis contagia, lumbicis, & scorpionum plagas. Solent Indi cavernis dentium indere in dolore, quam facultatem etiam illi tribuit Dioscorides, tamen Plinius id non censet, exemplo cujusdam, qui hæc de causa sese ex alto præcipitavit. Sed is fortitan cachectia laboravit, & medicamentum eos humores, qui turgebant, nimium commovit. Magni apud Indos est pretij, quodd eo plurimum utantur etiam in venere proritanda. Radicis verò aut foliorum apud eos nullus est usus; sunt enim illis incognita. Succus conciso caule extractus in bubula coria conijcitur, prius illita sanguine cum Tritici farina permixto, conservationis gratia: eamque ob causam si quid in Laseri futurum simile conspiciatur, non adulterationis, sed puritatis potius est indicium. Atque interrogatus doctus quidam Baneanes, cur Asa vesceretur, quandoquidem admixtus esset bubulus sanguis: respondit ejusmodi esse medicamentum, ut hæc regula minimè in illo observanda sit. Porò Laseris duo genera ad Indos adferuntur, alterum sincerum & translucens; alterum turbidum & impurum, quod à Baneanibus repurgatur antequam in cibos admittatur. Sincerum colore est puro, Electro simili, id Guzarate convehitur ex Chitor, ut ajunt, & ex Patane & Dely. Impurum ex Ormuz adfertur: majoris pretij est sincerum, neque facillè mercatores impurum emunt (solet autem id magna parte in tenuiorum cibos & medicamenta cedere) nisi purioris defectu. Sincerum validioris est odoris, quam foetidum, utrumque tamen foetet, sed id magis quod sincerius esse putatur. Qui verò ejus usus assueverant, sincerius, odoratius esse asserunt; quod quadam consuetudine fit. Neutrum verò Porrum redolet, sed ad Myrrham nonnihil accedere videtur. Hinc factum puto, ut Avicenna Asam diviserit in foetidam & odoratam, quodd foetidam porraceo odore esse assereret, cum non ita sit. Siquidem veteribus odoriferum dicebatur, non quodd suaviter oleret; sed quodd validi esset odoris. Hæcenus Garcia.


Nefas fore duximus non subscribere ea, quæ Tabern. germanico idiomate de Asa foetida usu & facultatibus perhibuit. Asthamati cum ovo forbili sumpta medetur. Drachmæ pondere cum aqua bibita coagulum lactis in ventriculo dissolvit. Contra mandragoram & opium sumptum laudatur electuarium, quod recipit Asa foetida, granorum Juniperi, & Castorei ana Vnc. semis. Hac pulverizata cum mellis Vacuis quatuor & semis componunt Electuarium, de quo propinant in vino nucis Avellanæ magnitudinem. Ad uteri strangularum occipe Asæ & Castorei ana grana xii. Duarum drachmarum pondere cum vino venerem stimulat. Hirundines casu poti ejiciuntur Asa cum aceto potata. Succo mali Punici bibitur contra contusiones. Sæpius odorata à suffocatione matricis liberat. In collo suspensa anginam curat & affectus guttu-

ris. Cum ruta & pipere in vino pota nervorum affectibus medetur, & paralyſi. Odorata patum accelerat. Si sanguifuga deglutita habeat in lauribus, agrum suffumigat Guido cum Aſſa.

LASERPITIVM E REGIONE

Maſſiliæ allatum.

CAP. LV.




A doctor Pharmacopœo Iacobo Raynaudo, unde & Pena & Lobelius, Maſſiliæ ante annos multos Laserpitium accepi, cui caulis præaltus, striatus, geniculatus, fungoſus: folia in alas dividuntur è regione oppoſitas, quæ in minores rursû subdividuntur: folia ſingularia nullis hærent pediculis, ex adverſo ſita triplice ferè per extremû diviſura, Spigæ albae ſoliorum æmula, craſſiſcula & ſirma, averſâ parte rari pili, rigiduſculi. umbellas tradunt Adverſaria prægrandes eſſe Ferulæ, aut latiores quàm Anethi. ſemen Angelicæ foliaceum, rotundum, compreſſum, odoratum & colore buxo. radicem prægrandem, intus albam, foris cinericeam, ſucco prægnantem, mollem, pinguem, odoratam, majorem quàm Thapſiæ aut Ferulæ.

Lobelius vocavit. ady. p. 33. Laserpitium è regione Maſſiliæ repertum in Icon. p. 702. Laserpitium & Silphium. Lugd. p. 731. Laserpitium Pena. Bauh. phyt. & pin. Laserpitium. gallicum: itémque apud Matth. Tab. Laserpitium Maſſilioticum.

Ferulacea hæc planta Rondeletio viſa fuit Laserpitio aptius congruere, quàm quavis alia ex multis, quas ille vidit, Ferulis.

Laserpitium hoc vidi Lutetiæ in horto Robini menſe Auguſto, qui miſit E. Comid plantandum in hortum Montbelgardi.

LASERPITIO LOBELII SIMILIS anguſtiſolia.



Tom. III.

QVAM Laserpitio Lobelij ſimilem, ſed anguſtiſoliam cognominamus, vidimus in horto Robini Lutetiæ, qui ſibi miſſam affirmabat nomine Dauci montani. De hac plura ſcribere non poſſumus, cum eam nullibi alibi obſervaverimus, nec quiſquam autorum, quantum ſcimus, epiſtoliâ mentionem fecerit.

IMPERATORIA.

CAP. LVI.



POLLICARI Deſcr. craſſitudineno nunquam eſt radix, ſenſim gracileſcens, rugoſa & lateralib⁹ fibris, quibus ſe propagit donata, ſumma cellure obliquè acta, carne albâ, aromaticâ; acrimoniâ vehementer linguam vellicante, totumque os caſſificante: folia ternâ plurimâ juncta, Micrones, acutiora, rigida, quorû ſingula ruſum in tria ſegmenta ſerrata, aliâ levius, aliâ profundius dividitur: caules cubiti & ſeſquicubiti altitudinem aſſequantur, ſtriati, inanes, in alas diviſi: umbellæ ſorum alborum Myrrhidis, latæ: ſemen Anethi ferè, ſed paulò majus, candidum, plenum & latiusculum.

An veteres hanc noverint, aut ſub quo nomine intellexerint, necdum hodie apud Medicos & Pharmacopœos conſtat. Multi namque veteribus incognitam dicunt, Agricola hac in ſequentes, quorum opinioni & nos facile adſcriperimus.

Tragus ad Smyrniû commode referri poſſe exiſtimat, de quo Dioſcorides l. 3. Et Theoph. hiſt. l. 10. c. 1. inter ſuccos plantarum Smyrniû Hippoſelinû, h. e. Equapiû, quemadmodum Gaza tranſtulit, vocavit, quod & que Ciliæ authore Dioſcoride Petroſelinû dicunt, appellatûve ſit ab Anacreonte Copium, referre Marcello. Scapionem dicit cap. 350, tertium Apij genus Senirvion appellaiſſe, quo loco Smyrniû legendum eſſe putat Tragus. Idem aut de Smyrniû hoc diligenter ſcripſiſſe Plinium l. 27. c. 15. Cum iſ tamen nequaquam contenderit, qui cum Ruellio Silphium ſeu Laserpitium Dioſcoridis eſſe voluit. Ex hoc numero eſt Fuch. Turn. & Lemnius: itémque Solerius & C. Bauhinus.

Non eſt ſilentio diſſimulandum, inquit Ruellius, Laserpitii præcipuè cum in nonnullis compoſitionibus, veterinarie medicinae authores, Gallicum requirant Laserpitium, aliquando in Gallia produiſſe. Et jam quibudâ in locis apud nos [Patris] invenitur in hortis hæc ſpecie. Radix craſſa eſt & multa, foris nigricans, intus candida, tuber in ea, quæ ſuper terram eminet. caulis ei ſaniculaceus, folium Apij in auri colorem lanqueſcens. ſemen foliaceum, latum, nempe quod figurâ exile folium exprimit, mirâque fragrat jucunditate. Cum vulneratur caulis profluunt lentor modicè ruſus. Tam radix quàm lachryma, ſemenque ſua viſſimum ſpirant odorem. Cui, ut rei magnæ authoritatis, illuſtria indiderunt nomina. namque modò Angelicam, modò Sancti Spiritus radicem, modò Imperatoriam appellant herbarij, eique caſſificantem, ſiccatoriâque vim in tercio ſignant abſceſſu, &c. Vides huic plurimâ Medicis & Herbarijs, qui de ea periculum fecerunt, ſatis Laserpitio congruere. Sit ergo Gallicum Laserpitium, cuius veterinarj Medici manu curat. Vereor re- fundat.

Ind. 7a & 8a
ſcribus.

Smyrniû
Dioſc. Tra
go.
Hippoſel.
Theoph.
Petroſel.
Ciliæ.
Copium.
Senirvion.

Silphium
Dioſc. Ruell.
l. 10 & alia.

Angelica.
S. Spiritus
radix. Im-
peratoria.

Ruell.
l. 10 & alia.

Lasertium. *Σιασίν* Græcis, *Lasër* & *Lasertium* Latinis dicitur, si *Fuchſio* credimus, vulgò & officinis corruptâ voce, deſſexâ tamen quadam à *Lasertio* priſtini nominis umbrâ, *Oſteritium* vocatur. Primum ſiquidem *Lasertium*, dein depravatâ nomenclaturâ *Oſteritium*, poſtremo *Oſtritium* cœpit appellari.

Oſtritium. Qui ſanè *lapiſus facilis* admodum fuit. Abſjectâ namque primâ literâ, *Auſteritium*, & dein a mutato in o, *Oſteritium*, ac poſtremò magis concisè *Oſtritium* nominare cœperunt. Veteribus Germanis hand dubiè *Laſer wurz* dicta eſt hæc herba, quam quidem vocem, utpote ſemilatinam, poſteri non rectè intelligentes in *Meiſterwurz* mutarunt. Ex hujus quidem deſcriptione luce clariùs conſtat eſſe *Lasertium*, ſcilicet Germanicum. His accedit, quòd facultates *Oſtriti*j nominati, à *Lasertii*j viribus non diſcrepant quemadmodum poſtea patebit.

Lasertium. Non memini, inquit *Turner*us, quenquam videre aut legere ex recentioribus, qui auſit affirmare ſe verum *Lasertium* *Theophraſti* & *Dioſcoridis* viſiſſe. Putat *Ruellius* Angelicam eſſe *Lasertium* Gallicum. Si quod eſt in Gallia aut Germania *Lasertium*, malo *Imperatoriam* pro eo ſumere. folia enim *Apio* ſimiliora quàm Angelica.

Lasertium. Quod triviali voce *Angelium* ac *Magiſtrantiam* dici reſert *Lemnius* de occult. l. i. c. 17. id *Silphium* *Ciſalpinum*, & *Lasertium* vocat. *Solerius* verò nominat *Silphium* Gallicum, *Imperatoriam* *Ruellij*, & *Alegros Delphinatum*. Ex *Solerij* autem verbis colligitur *Ruellium* per *Silphium* Gallicum non Angelicam, ut vult *Turner*us, ſed *Imperatoriam*, quam modò quoque Angelicam dici teſtatus eſt, intellexiſſe.

Lasertium. Cæterum, qui plantam *Imperatoriam* vulgò vocatam, legitimum eſſe *Silphium* aſſerunt, noſtro judicio plurimum aberrant. Siquidem jam olim *Plinij* temporibus, unicuique ſolummodo *Silphij* ramulus inventus fuerit. *Imperatoriz* quoque nullus autorum alteram ſpeciem aſſignavit. Poſtremò *Silphij* caulibus inflationes faciunt (ſic dicit *quodammodo*, inquit *Dioſc.*) *Imperatoria* autem ſtatu diſcutit, ut poſtea ſuſius dicetur.

Lasertium. *Cordus* hiſt. *Struthij* hodie vocatî nomine deſcribit, cujus etiam inſcriptionis titulo *Gefnerus* figuram appoſuit ex *Trago*. *Cornarius* quoque *Oſtritium* (*Imperatoriam* noſtram intelligit) eſſe *Struthium* vilibus conſe&uris oftendere conatur, non approbans eorum opinionem, qui officinarum *Oſtritium*, ſive *Aſtritium*, aut *Magiſtrantiam* appellatam, eſſe *Sphondylium* conſtanter aſſerunt.

Lasertium. Nolo, ait, hic prætereire, eam quæ apud aliquos *Imperatoriz* nomen accepit, à *Mauritanis*, & *ſcipſos* ſequentibus officinis, *Struthion* appellari. Condiſi, in *Macri* verò vulgato libello *Oſtruthium* vocari, & ipſi omnia, quæ *Dioſcorides* & *Plinius* de *Struthio* habent, adſcribi. Vnde poſtea *Aſtritium* & *Aſtrens* & *Aſtrantia* vulgò dici cœpit. Hanc itaque ut verum *Struthium* eſſe credam, vel hinc maximè inducor. Suffragatur autem etiam ulus ejus vulgatus. Hæc *Cornarius*, cui ſcribere maximè veretur, quòd *Imperatoriz* herbæ ad lanas purgandas, lavandâſque hodie nullus fit ulus, qualis erat *Struthio* tempore *Dioſcoridis*, qui propterea quoque *Radiculam* & *Lanariam* herbam, *Struthion* appellavit. Ad *Sphondyli*j porrò deſcriptionem melius accedere videtur multis ea herba, quam multi imperiti apud Germanos *Brancham* urſinam falſò vocarunt. de hac infra agemus.

Lasertium. Nunc conſiderandum an *Smyrnio* Græcorum convenire poſſit, id quod *Trago*, uti oſtenſum, ac etiam *Gefnero*, itèmq; *Lonicero* placet. Nobilem *Aſtrantiam* appellat *Gefn.* in compoſitione caſei *Glaronenſis* [*Zyger* Germani vocant, ni fallimur]

Lasertium. ac ait, Sive *Laſer* hanc Gallicum dicas, ut *Ruellius* Angelicam, cujus hæc ferè ſpecies videri poteſt, ita ut ſexu aliqui tantum diſcernant, nam & *Laleris* duo referuntur genera; ſive *Oreofelinon*, ſive *Petroſelinon* Macedonicum, haud multum retulerit. Mihi ad poſtremum animus inclinat, cujus argumenta plura ſunt. Primò à nomine, quia veteres *Elſtreaticum* nuncupabant. Secundo à natalibus, in præruptis enim montium & petroſis, quamvis & in pratis montanis exiit. Tertiò à ſapore, quem inter omnia *Apiorum* genera, acerrimum amariffimūq; habet: ita ut *Galenus* univerſam ejus amaritiei inſciſcribat. Quartò ab odore, eſt enim odoratum admodum. Quintò à figura, quam foliis & umbella quodammodo ſimilem *Apiis* habet. Ab effectibus, qui eidem omnes, quos veteres adſcripſerunt, & præterea multò plures à noſtra gente ei attribuantur. Quæ ſciantur omnes etiam *Smyrnio* magna ex parte attribuantur, & *Cilices Smyrnum* in *Amano* monte naſcens *Petroſelinon* indigetant. Eſt tamen infirmus *Petroſelino*, & *Apio* vehementius, teſte *Galeno*. Et hæc idem prolixius reſcribit *Gefnerus*, ut caſeum *Glaronenſem* commendaret, quem etiam cum *Laſere*, i. e. *Batti Silphio* viribus excellentiaque certare ſcribit.

Lasertium. Cæterò, *Tragus*, *Gefnerus* & *Lonicerus* recentioribus, hallucinantes contendunt, plantam *Imperatoriam* vulgò vocatâ legitimum eſſe *Smyrnum*, argumento quòd ejus radices exterius nigreſcant, interius verò viſceſcant, inquit *Matthioli*s. Quibus addimus, quòd natalis & vires correfpondere videantur. Verum iſex eo aperte decepti deprehenduntur, quòd non animadvertunt, an hæc plantæ cæteris inter ſe notis conveniant, cum vel ſolum ſemeni apertiffimum diſcrimen manifeſtetur. *Smyrnum* Græcorum ſemen habet Braſſicæ, rotundum, nigrum, &c. *Imperatoria* ſemen *Anethi* ferè, ſed paulò majus, candidum, plenum & latiusculum. Dictos porrò viros ſibi falſò imaginari *Imperatoriam* dictam eſſe *Smyrnum*, teſtatur etiam *Lacuna*, qui *Oſtritium* ab *Imperatoria* diverſis capitibus ſeparat, quàm bene conſiderent periti.

Lasertium. Si vires hujus plantæ contemplerur & formam, maximè convenire videbitur cum *Panace*. Siſgitur, ſi ſos aureus *Herbæ* renæ in eſſet, conſtanter aſſimaret *Cæſalpinus* *Panacem* *Chironium* eſſe. at eadem difficultas contingit in *Panace* *Herculeo*, quæ enim in *Alpibus* etiam *Piſanis* oritur, in cæteris omnibus convenit cum deſcriptione ab antiquis tradita, excepto floris colore luteo; cùm in *Herba* renæ ſit albus.

Lasertium. Dod. gall. tenet ſententiam eorum, qui *Struthion* Græcorum aſſerunt, ac propterea latinè vocat *Lanariam* & *Radiculam*, Arabicè *Condiſi*, quam ait eſſe veram *Herbam* fullonum & *Saponariam*, ideòq; *Oſtritium* inſcripſit, gallicèq; appellari poſſe cœcedit *Herbæ* à ſorlong germ. *weſch Braut* & *Seiſſen frau* Belg. *Sepernyr*, ſed non abſque errore, in quo tamen non perleverat, ſed cum agnoſcens ingenuè retractat. Diſſert (inquit in ſol. lat.) multum à *Struthio* ſive *Lanaria* herba. Non autem ampliùs *Oſtritium*, ſed *Aſtrantiam* nominat. Alij verò *Aſteritium* ſive *Oſteritium* legere malunt. qui voces hæc à *Lasertio* depravatas volunt, & *Aſtrantiam* *Lasertium*, vel ejus ſpeciem eſſe. *Lasertium* autem cauſe deſcribitur ferulaceo, i. e. magno atque præcero: hujus autem tenuis ac brevis eſt cauliculus, qui ſolus à *Lasertio* diſferentem eſſe ſatis oſtendit.

Lasertium. Ignorant quidam *Imperatoriz* tribuit *Macroni* nomen *Italicum*, alterius plantæ. *Herb. ant.* *Cuba* & *Euch.* *Roſellin* malè nominant *Meu* & *Anethum* apocrite.

Lasertium. C. Bauh. *Imperatoriam* modicâ eſſe naturæ ait in- 6. B

Lasertium. ter

Lasertium. *Struthium* Cordus, & *Cornarius*.

Lasertium. *Sphondylium* negatur.

Lasertium. *Oſtritium* *Macri*.

Lasertium. *Struthium* non eſt.

Lasertium. *Aſtrantia* *volubilis*. *Laſer* Gal. *Angelica* *ſpeciosa*.

ter Laserpitium & Panaces, vocatque inter alia synonyma Ligusticum Anguillaræ (ex Lobelio) magno errore. Ligusticum enim Anguillaræ idem est cum Castalpini Ligustico, & Ligustico altero Matthioli, quod in Liguria Imperatoria dicitur, diversaque est ab Imperatoria fratri dicta. Poterit itaque si quandoque de stirpibus tractare cogitaverit, errorem hunc animadvertere ac corrigere, debuissetque hoc in descript. Baldi inter spontaneas Ponæ jam olim observasse, monuisseque in pin. ubi est Imperatoria i. major.

Imperatoria, quæ ob raras & præstantes facultates sic nominata fuit, dicitur Matth. Lac. Gesn. h. Lob. Adv. Cast. Cam. epit. & hist. & Tab. Imperatoria Matthioli, Lugd. p. 727. Imperatoria Ofsentium, Lob. Obs. p. 398. & Icon. p. 700. Astrantia, Brunfels. Gesn. de lacte & operib. l. c. c. 11. itemque h. Clusio. & Dod. lat. in fol. Magistrantia. Cam. & Offic. germ. Laserpitium germanicum, Fuch. Smyrnum, Lon. Smyrnum hortense, Trag. Herba Rena, Cxf. Struthium hodie vocatum, Cordo. Ostrutium, Dod. gall. & Lon. Alias vocatur etiam Officium, Astrencium, Ofsentium, Astrerium, & Astrutium corruptis nominibus dubio procul à Struthio Dioscoridis, falsoquidem multi hanc Dioscoridis Struthium esse falsò existimarunt. Germani vocant. *Meister wurtz*, quasi omnium radicū Magistratam & Reginam appelles, *Meyster wurtz*, *Astrenz*, & *Magistrantz*. Belg. *Meesterwortel*. Galli *Ostruche* & *Imperatorie*. It. Imperatoria, Angli *Pellitorye of Spayne*. Boh. *Wissdohr*.

In nonnullis Italia montosis gignitur præstantissima verò & frequentissima in Ananienlib. montib. supra Tridentinum: tum & apud Germanos, quibus tamen sæpenuerò, veluti & Belgis aliisque nationibus, hortensis est. Producit etiam in pratis ad radicis montium, Alpibus Austraciis & Suiaciis vicinorum magnà copiam. Injū flosculi apparent, quibus decidentibus semen succedit. hiemis patiens radix, multo tempore vivit, serpendo progrediens.

Sed posteaquam de Imperatoria herba incidit mentio, prætereundum sanè more nostro non duximus, quin non hæceus quoque facultates & usus subtraherentur. Radix itaque gustu admodum acris deprehenditur, mordax, subamara & odorata. Ex quo non temerè aliquis conicere potest, Imperatoriæ radicem excalescere tercio excessu completo, vel quarto inchoare: tescare verò secundo. Discutit hæc mitificet tum ventriculi, tum intestinorum, tum etiam uteri status. Quapropter coli cruciatibus ac ventriculi torminibus maximè utilis est: Cit item mensis atque urinam. Fovetur ejus decocto utiliter in dolore dentes, præsertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota, uteri strangulationibus prodest. conceptum adjuvat, quem frigiditas intercipit: concoctionem roborat. Commanducata est veluti præstantissimus apoplethmatis, ut quæ efficaciter cerebri pituitam expurgat. In pulverem contrita, vinòque subinde pota, frigidus occurrat morbis. Quamobrem resolutis, commualibus, convulsis, auxilio est. Ajunt nonnulli quartanà eos sanari, qui pulveris cochlearis dimidium horà ante accessionem, ex mero biberint. Oris halitum commendat, & omnes roborat sensus. Epidemiis morbis, venenis ferè omnibus, ac venenosorum animalium tum moribus, tum iustibus optem præstat. Asthmaticos seu anhelosos juvat, obstruções aperit, aqua intercut laborantes sanat, itemque liene affectos. In summa excalescit universas corporis partes, quas frigus occupavit. Vt hinc palam fiat, herbam hanc non immerito sibi Imperatoriæ nomen ascripsisse, cum tot tantisque viribus

Tom. III.

præstet, auctore Matthioli. Ferventis admodum Temper. Dod. facultatis Astrantiæ radicem testatur etiam Dodonæus, sed excalescentem ordine tertio, nec minis resiccantem. tenuium similiter patium esse: incidere, attenuare, digerere, sudores ac urinas movere, Sudores movet. Pessus omnia posse, quæ Matthiolus de ea scriptis manda. Tussis frigit. Fuchsius præter dicta hæc habet. Laserpitium da germanicum pestilentie populariter grassantis ardet contagia: tussi quam frigus attulit medetur. Sanguis concretus. Crassa enim, quæ in thorace coeunt, discutit. Coloris boni efficit. Sanguis concretus. ris corporis bonitatem iis, qui eo vescuntur, efficit. Stomacho Concretum in corpore hæc & sanguinem resolvit. Sanguis concretus. Stomachum esu corroborat. Pituitam ventriculi de- ducit. jecit, & elagrescentem appetentiam invitat. Rabi- Canis rabi- di morsus. si canis morsu, aut serpentis ictu liberat, si contrita folia vulnere indantur. Hypochondriorum vitii auxiliatur. Item lumborum doloribus. Carbunculi. Carbunculos cum polenta tritum & impositum sanat. Herba ipsa in vino & aqua cocta vulnera interna glutinat: & in terna summa: omnia quæ Angelica, & maj. in efficacia potest. Vt hinc etiam constat Ofsentium nominatum eisdem habere, quas veterum Laserpitium, in efficaciores tamen facultates. Quare cum metus sit ne Laserpitium adulterinum, aut saltè non optimum ad nos adferatur, præstat Laserpitio germanico uti, quod se. exigua admodum pecunia comparari possit, & viribus satis efficax sit. Nam eadem quæ Dioscorides & Plinius Laserpitio assignant, recentiorum testimonio præstare valet. Hæc illi. Ego cum Lugduni publico stipendio donatus in crudelissima peste profliganda occuparer, in officinis magno pretio Imperatoriæ radix pro Angelica vendebatur, leviori multò errore, quàm illorum, qui Napellum inibi pro Elleboro divendebant, publicà pœna digni. Tabernomontanus cum Fuchio Imperatorium in universum calidiorem atque acriorem Piperis ipso, adcoque calefacere & exsiccare radicem in tertio ordine, succum verò ad quartum usque statuit: semen cum radice folia & caulem superare, ita ut in ea efficacissimus omnium aliarum patium sit liquor, secundo loco radix & semen, tertio folia, & postremò caulis. Ex his particulatim radicem & se. Aroma pisci- men piscibus coquendis præ cunctis aromatibus commendat Succum porro eum præfert, qui è radice & herbà sicca exprimitur, eo modo, quo de Absinthij succo monstravimus. Convenientissimum tempus aquam distillandi, est mensis, quo in flore aqua distillat. est, in balneo Mariæ, cum radice, foliis & floribus, distillat. vinum. omnibusque ejus partibus. Fit vinū ex Imperatoriæ, Radicis conserva (cujus dosi drachmæ duæ) Extractum (hoc scrupuli pondere in menstruo suo serva propinatur) extractionis Syrupus (qui præparatur in modum Syrupi de cinnamomo, exhibeturque de hoc pro vice cochlearis unum) Sal, & Oleum stillatitium, chymica arte extractum. Quæ omnia ad enumeratos affectus unice conducere à multis experta sunt.

IMPERATORIA ALPINA.

Minor quàm præcedens est, omnibus suis partibus, nam & angustiora folia & pedicellos teneriores profert ex radice non absimili jam dictæ Imperatoriæ, & æquali etiam, gustu acioni & magis urenti.

Hanc quidam volunt Astrantiam marem nominari, ut refert descriptionis author Camer in hist. mas ubi Imperatorium Alpinam, Astrantiam Alpinam & Astrantiam silvestrem vocat, ceu etiam in Alpinam. Germ. *Bergstrenz* & *Bergmeister wurtz*, silv. C. Bauh. apud Matth. Smyrnum 4. & Imperato- *Smyrnum*.

M 4

riam Alpinam: In phyt. Imperatoriam a sive mon-
tanam in pin. Imper. a minorum.

Imperat.
Locus.

T. imperat.

Vires.
Quarta.
Tartus.
Mollius.



sedandos, id quod vulgaris quoque Imperatoria, au-
thore Camerario, præstare potest.

Hinc Camerarius in Alpi-
bus apud Helvetios pro-
venire ait. Sed mi-
ror, cur non anno-
tarit particulatim
locos Helvetie ubi
ab ipso observata
fuerit.

Calida est & sic-
ca ut vulgaris Im-
peratoria, quæ impe-
rior esse facultatib.
omnibus videtur &
ad agendum prom-
ptior. Utuntur hæc
planta ad quarta-
nas, partus eru-
dos & cerebrum
expurgandum, fla-
tus discutandos,
colicisque dolores

terdum ad dodrantem, tam longitudine, quam lati-
tudine accidentia, & tota Hieme virentia: sequenti
aut tertio anno caulis è medio foliorum allurgit,
dudum aut nonnunquam trium cubitorum altitudi-
ne, crassitudine pollicem plempumque superans, te-
res, geniculatus, glaber, in candido livente & abster-
si facili polline veluti conspersus, & concavus, ge-
niculatis foliis ornatus, prædictis multò minori-
bus, habet ramulos & adnata aliquot caulibus, in quo-
rum summitate magnæ sunt umbellæ, quinque aut
sex unciarum latitudine, formâ convexæ, candican-
tibus flocculis plenæ, quibus bina succedunt semi-
na, invicem conjuncta, oblonga, angulosa, paleacea
& in candido cinerea: oblongum, planum, foris ni-
grum, intus candicantem & cartilagineum nucleum
paleaceo & anguloso cortice claudentia. Umbellæ
antequam enascantur, in posteriorum foliorum par-
te instar utriculi tumidæ continentur, quæ intra ip-
sum utriculum augetur, rupto utriculo, erumpunt,
quandam conferi racemi speciem referentes, donec
in modo dictam formam adolefcent. Radice ni-
titur antequam caulis enascatur crassitudine ple-
rumque manuum complente, nonnunquam etiam
crassiore; oblongâ, in multas dodrantales aut peda-
les partes distinctâ, foris nigricante, intus candidâ,
carnosâ, molli, succosâque: quæ præcisâ flavum li-
quorem seu lachrymam ab interiori corticis parte
remitte, cui similis liquor etiam in foliorum venis
continetur, sed aquosior. Cùm verò caulis maturo
semine perit, ipsa quoque radix putrescit. eadem
quamvis tempestivè effodiatur, ob excrementi
humoris copiam faciliè ab innascentibus vermiculis
perfunditur. Saporem radicis, semen & folia habent
acrem, fauces scatiificantem, subamarum, tenue &
aromaticum: odorem similiter acrem, vehementem,
medicatum, atque aromaticum similem. Efficacissi-
mus omnium partium liquor est, mox semen,
deinde radix: flores & folia postremum locum ten-
ent.

ANGELICA.

CAP. LVII.

ANGELICA SATIVA.

Defr.



Enclut

pureus, geniculatus, concavus, striatus, bicubitalis,
multis alis donatus. folia è vulgisi proferunt con-
voluta in pilam quasi, multa, quæ ubi se explicave-
runt, in ambitu crenata, mollia, supernè virentia,
infernè dilutiora, formâ, ut fors tulit variâ, semper
tamen oblonga sunt, sed multo gibbo inæqualia,
modò continua, modò dissecta, sapore & odore mi-
nus aromatico, quam radix. Quia autem nec flores,
nec semina à nobis delineantur placet Cordi dili-
gentissimi Botanici descriptionem integram hic re-
ferre. Angelica primo anno cùm è semine prodierit,
pediculos emittit cubitales, crassitudine digitales,
teretes, teneros, glabros, & in terram repandos, ut-
trinque in binos, ternos, aut nonnunquam qua-
ternos, minores pediculos, cum brachia divilos &
expansos, in quorum extremitate folia sunt figurâ
Apij foliis similia, sed multò majora, in ternas ple-
rumque turbinatas partes antrosum spectantes se-
cta, propius ad Aceris cineræ folia accedentia, in-

Defr.
Cordi.

Angelica aut
enclutur.
Reclut.

et alia.

ANGELICA SATIVA. A
fativa radi-
cem altè demittit,
interdum multò
plusquam brachia-
li crassitudine, cum
multis adnatis pol-
licari crassitudi-
ne & fibris rugosâ,
cuticulâ in cinereo
rubescere non ni-
hil obiectam, pul-
pâ albâ, gustu ad-
modum calido &
aromatico, acri &
amaro, odore sua-
vi, succum ex inci-
sione remittentem
croceum, ejusdem
saporis: ex qua sur-
rigitur caulis cras-
sus, ad terram pur-

ANGELICA OFFI-
narum.



phium, vel eidem congenerem esse asserere non
dubitant Reperiuntur etiam qui Smyrion Diosco-
ridis esse perhibeant. Nonnulli Panax Heracleum
statuunt, aliis inter Panacis speciem tantum indi-
cantibus. Myrrhis etiam à quibudam dicta olim
deprehenditur. De his itaque fusiùs indicandum
est.

Silphium itaque Dioscoridis dixisse videtur Ruel-
lus esse Angelicam, quam tamen cum Imperatoria

Cæterum, pro-
stat in officinis ra-
dix Angelicæ, quæ
non parùm distat, à
precedenti. Quia
autem hæc à nobis
non integra visa,
dubitamus an sola
cultura differentie
causa sit. ea enim
constat plurimè,
tenuibus, longis,
nigricantibus fibris,
ex uno capite Ellebo-
rialbi modo.

Quamvis potè
Angelica, nostro
quidè judicio, no-
bisque ad stipulan-
tibus Brauschvveig,
& Tabernemonta-
no ab antiquis non
describatur, nihilo-
minus tamen non
desunt alij qui Sil-

re turpiter confundere deprehenditur, ut precedenti capite, ubi ejus verba adscriptimus, annotavimus. Nemo enim præter ipsum Angelicam Imperatoriam vocavit, præterquam eum secutus Lonicerus. Angelicam tamen ab Imperatoria vel Solerius distinxit utramque Silphium appellans. Silphium autem esse non potest, inquit etiam Fuchsius, quod folia Apij habere minimè deprehenditur. Garcias quoque Ruellium lapsus redarguit, qui Angelicam Laseis genus putavit & Belzuinum, uti indicatum H.n.l.9.c.de Belzuino.

Silphium congenerem fecit Gesn. h. & C. Bauh. phytitemq. Dod. & Cesalpinius. *Silphium*, sive Laseis, species esse apparet, inquit Dodonæus, si n. i. p. tum genuinè ac legitimè Laseis fuerit. Nam si cuius conferatur, quæ ex Theophrasto prolixè satis de Silphio adscriptimus, respondere compertetur. Radix namque crassa, superius veluti in caput exuberat: caulis quantus Fecula, cibo idoneus; qui post seminis maturitatem perit: solum Apij diffusum, sed longè majus, semen vento facillè abripitur, latum ac foliaceum; unde aliz stirpes rursus progeneruntur: amat silvestria loca. Quale omnino Silphium à Theophrasto esse traditur. Jam & meminimus olim me à Cortusio Laseis accipere, odore ac colore succo è radicibus Angelicæ incisus profuenti, simile: quod Angelicam Silphium esse quoque adstruit.

Cesalpino Angelica vulgo appellatur in Alpibus caule bicubitali, crasso & concavo, odorato: foliis Olusatri, oblongioribus, læviter serratis, mollibus: umbellæ ferens latas: flore candido: semen candidum, oblongum, striatum, quod in foliacea quædam labia dilatatur, valdè odoratum, quasi Moschum redolens, sapore acri: radicem palmi longitudine, crassam instar Napi, candicantem, fungosam, succosam, jucundissimè olentem, acrem & subamaram: Lachryma concreta pullefcit descendit & in plania juxta aquas, locis umbratis brevior: folio nigrior: radice minori, figurâ tenuioris Napi, quæ in pluribus radicularum definit, odore infirmo ad Pastinacam vergente: caulis recentes & tenelli, & folia utriusque gustui grata sunt. Celebrant radicem ad venena & pestilentiam. Extat & sativa quæ colitur in Germania: radice nigra, in multas fibras ducta, Elebori modo, gustu suavior, eruitur antequam caulis lescat. hanc ad Laseis peritum ferunt posse reor, quod Græci Silphion vocant, licet in Italia non ad eam magnitudinem crescat, neque ea sit succi ubertas, quæ in Aphrica & calidioribus regionibus, ut multis aliis contigit. Theophrastus de Laseis inquit, folium Malpetum vocant, caulem verò Magydari & folium &c. Dioscorides verò ait caulem Maspeton vocari, radicem aliquibus Magydari; caulem Silphion & folia Malpetum: hoc Laseis peritum in Syria, Armenia, Media & Lybia nasci tradit: Alteram præterea in sine capitis Magydari assignat in Lybia nascentem, &c. Patet nostrum Angelicam non multum discedere à Laseis Cyrenæico, aut saltem ab altera Magydari: immò Angelica montana & magnitudine, & odoris suavitate, & acrimoniâ, & succo maxime ad Laseis peritum accedit: Altera verò ad Magydari: Laseis à recentioribus Medicis nonnulla vocatur. Hucusque Cesalpinius, cuius Angelica Alpina videtur nostra hortensis: per eam verò quæ in plana descendit, fortè intelligit aquaticam nostram, de qua post. per sativam verò Germanicam nostram polyrrhizon, de qua dubitamus an sativa: facillè credimus cum Matthioli potius silvestrem.

Angelicam autem ab aliquibus Myrrhidem quandam falsè dictam fuisse offendit Matthiolus, dicens. Quod Angelica non sit Myrrhis ex eo evi-

dentissimum esse convincitur, quod Angelicæ folia sint sativæ Pastinacæ similia, non quidem multifida Cicuta, qualia Myrrhidi Dioscorides adscripsit. His addit Matth. in post. comm. cum mag. fig. Angelicæ *Angelica* 4. esse plura genera: namque aliam sativam, aliam domesticam, aliam silvestrem, & aliam in aquis provenientem tradit. Sativam radices habere nigras, atque fibratas, odore ad eodè eximio, ut meritò Angelicæ sibi nomen comparaverit: Domesticam vocatam sponte per se nasci iisdem in motibus in quibus silvestrem, sed foliis, caule, umbellâ, semine, & radice longè grandioribus: radicem huic esse succosam, subalbicantem, & suaviter odoratam. Sylvestrem autem pumiliores esse, sed viribus omnium præstantissimas: radice niti pollicis crassitudine, & sæpè majore, succo flavescente refertam, gustu acerrimo & odore præstanti: Aquaticam ceteris grandioribus esse, & viribus longè imbecillioribus. Idem in Hist. germ. Angelicam triplicem agnovit, majorem & minorem, sive silvestrem, utramque in montibus altis habitantem, & tertiam aquaticam. Majorem, Costi loco medicamentis admiscere jubet. Minorem sive silvestrem, majorem in omnibus similem nisi quod minor, aliquos Libanotum cathryosorum esse statuere perhibet. Aquaticam, formâ primæ similem, odore tamen & sapore imbecilliori multò, ad aquarum ripas & umbratis locis gaudere. In Epit. Angelicam duum esse generum, sativam & silvestrem, assignat. Sativam semine Lentium modo compresso, radice crassâ: feri colique in Germania in campis, præsertimque in Misnia & Saxonia. Sylvestrem pumiliores esse omnibus suis partibus, sed viribus longè præstantiores: radicem proferre minorem, paucis fibris donatam, nasci plurimum in altissimis montibus, in pratis & pascuis, amenis locis acerrimi gustus. Quam bene Matthioli dicitur Angelicæ semen Lentium modo compressum, judicent periti. Olim unicam tradebat speciem & figuram exhibebat, quæ silvestri potest competere, quamque in posterioribus modò pro minore pingit. modò meminit unius tantum, mox quatuor, iterumque trium, tandemque duarum, non rariè distinguens, neque describens. Quam pingit pro sativa in comm. Lat. cū mag. fig. & in Ital. pro domestica, in Hist. germ. pro majore, & epit. pro sativa, eadem nobis videtur cum hortulana & crassiore radice, cujus Fuchianam exhibemus figuram. Acerrima illa minor silvestris pumilio sanè non convenit cum officinarum illa Angelica polyrrhiza quoad iconem, nec cum vulgari silvestri quoad descriptionem. Quam potè dicit ad aquam provenire fortè referenda ad silvestrem, de qua post.

Est Angelica Smyrnum Dioscoridis Emerico Cordo, ejusque filio Valerio Cordo, dicenti: Pater Angelicam esse dixit, Smyrnum Dioscoridis. Et hac inde dubium non est. Ruellius non scivit Smyrnum hodie Angelicam vocari, alioqui non affirmaret Angelicam Laseis peritum gallicum esse, ut temerè fecit. Sed filius Val. Cordus parentis Emerici Cordi opinionem sequutus, eodem quo parens errore notatur. Neque enim Smyrnum est, Fuchsius etiam teste, quod sc. umbellam Anethi, & semen rotundum, aliaque multa, quæ descriptio requirit, non habeat.

Panacis speciem facit Brunfelsius, qui silvestrem & sativam agnovit, quam multos Germanorum Fuch & Solter (Valerianam puto) vocare refert. hujusque radici saporem negat, contra veritatem. Nulla nobis nota Angelica, cui radix sit insipida. Radici, inquit nullus sapor, nisi decipiantur ementes, & vendatur silvestris Angelica pro vera. Ceterum, testatur Radicem Sancti Spiritus doctissimos existimare esse Meum Dioscoridis. sed non convenit descriptioni.

Sativa.

Domestica.

Sylvestris.

Aquatica.

Angelica triplex.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Angelica.

Panax
Herculeum
Trago.

Trag. re-
proceditur.

Trag. re-
futatur.

Angelica
Lobelia.

Cosm. m-
ger.

Angelica.

Smyrnum
Angelica
fativa.

Angel. her-
tenfis.

Angel. ma-
ior.

Silphium.
Lugd. notat.

Angelica
alp.

Angelica
alp.

Hanc nostram Angelicam Panaces Herculeum Dioscoridis esse lentit, & ut ita judicet, plures causas adducit. Non enim tantum similem esse ait Angelicum Levistico, sed etiam recentis adhuc folia thui optimum redolere: vires habere adversus omne venenum efficacissimas. Sed ipse veterum scripta aut non legit, aut negligenter & obiter pertransennam quali vidit, ac propterea magno cum errore & auctore huiusmodi, insolenter, præter simplicium cognitionem, quam ex veterum scriptis haurire debebat, asserere non dubitavit. Vbinam folia alpina, in terra jacentia, & multum ad ficulnea accedentia? ubinam in umbella ceu Anethi oblonga, flores late? ubinam liquor radices candidus, amarisimus, atque graveolens? Non certè hæc Angelicæ nostræ competunt, quæ tamen Panaci suo Heracleo Dioscorides inesse scriptis comprobavit.

Vixitur credi par est nostrates Angelicas, indicant in delictis & prædictis nequaquam potestas bendas, antiquitati notas fuisse: nec enim siluissent tam divinam fragrantiam præstam, & vicarias divinæ beneficentiae vires, inquit Lobelius, triplicis nostratis Angelicæ. Quarum quæ procerior, binum triumque cubitorum, radice crassâ, intus candicante, foris pullâ, odore perquam suavi, floribus luteis. Nonnullis in hortis Londini, Antuerpiæ quæ visitata, tota minor, suavior odore, folijs imis ex purpura rubescentibus, supernis autem ex rubore virentibus umbellis, cæterisque similibus. Tertia est Angelica sylvestris, de qua postea seorsum pluribus dicetur. Idem in Obs. appellat Costum nigrum nuperorum. Sed quibus ita appelletur, aut quam ob rem non ostendit.

Angelica dicitur Brunf. Ruell. Eur. Cordo, Trago, Brunsch. Fuchf. Corn. Silen. Arg. Gesn. Lon. Matth. Dod. Lob. in Adv. p. 311. Obs. p. 388. Icon. p. 698. Cels. & aliis plerisque cum Officinis. Smyrnum, Corn. Lac. Schvvenckf. Euric. & Valer. Cordo. Angelica fativa, Lon. Hort. Lusitano, Brunf. Trago & Fuchfio. Angelica hortensis, Lac. Angelica major, Dod. Mt. Angelica odorata, Cam. h. Silphium, G. h. in cat. plant. Dod. & Cels. alp. Lugd. p. 724. pro fativa Angelica ponit duas figuras, unam quidem Angelicæ fativæ Matthioli titulo; alteram Angelicæ sylvestris Dodonzi inscriptione. Sufficiebat autem una figura. Nam Dod. non posuit pro Angelica sylvestri, sed pro fativa.

C. Bauh. Angelica fativa Laferpito cognata: varians radice, crassiore, qualis est nostras, & minore, qualis est Bohemica. In animadvers. testatur Lugd. duas figuras Angelicæ unius dare, quæ nullam fativæ differentiam ostendant. Eid. B. pin. Angelicar. fativæ: Angelica odorata, Gesn. coll. & Cam. Laferpitiolum, Lac. Variat radice; nostra enim crassior, Bohemica minor & nigricans, illa citius, hæc tardius corruptipitur. Huc referenda est Angelica Scandiacæ, sive Archangelica Tabernæmontani, quæ umbella est flava, semine rotundiore, & ex Norvegia & Pomerania adfertur. Nos hanc infra seorsim describimus, nec huc referendam ducimus.

Schvvenckf. Angel. alpina 2. vera, nobilior: Angel. montana, C. Bauh. fativæ Angelicæ similis, Rhizotomis Silestis, at tota minor; folijs ex atro-virentibus, radice in pauciores, sed crassiusculas fibras divaricata, in præruptis montium jugis & saxorum fissuris. Angelica alpina 3. montana Silesiaca; Camerario Angelica sylvestris montana; Adversariis Angelicæ varietas, Silestis in montibus frequentior, Solo pingui inter saxa, herbidis locis: radice acerrimi gustus, luteo & lento turgente succo, idèoque valentior cæteris omnibus, quæ mansa os, linguam & fauces maxime urit & inflamat: calida & sicca

ad quartum ferè gradum: corrigitur aceto macerata. Item Angelica hortensis, Smyrnum Cordi, Angelica major Matthioli & Dodonzi, gustu acris & amariscula, suaviter odorata, calida sicca in tertio.

Angelica fativa præcipue, dicitur ab aliquibus Germanorū Angelica ab alius dea Seyligen Geistwur, i.e. Radix Spiritus, à suavissimo ejus odore, quem radix spirat, aut ab immensa contra venena facultate, appellatur. itè quæ Brüsslurg & Engeldurg, Belg. Angelica. Gall. Ang. lic. & Angel. que. Ital. Angelica. Hisp. Angl. Angelica. Boh. Angl.

Angelica fativa Montbelgardi à nobis fata provenit copiosè in horto E. C. ac aliis, se ipsam semine propagans, nec facile proveniens vere: recenti siquidem semine dileminari cupit. Nostra valde magna est, ad eam quam pingunt pro Archangelica accens, valde odorata: sed crassæ radices, non tenues quales sunt ejus Angelicæ quæ solet Basileæ & passim vendi. Vidi Angelicam Florentiam in Cœnobio à Innocenti. Genevæ fata vere provenit, sed pauca; caulem incipiebat producere sequenti anno, Februarii principio: florebat junio, semine quæ decidebat Julio. Dum autem ex semine plantatur, ex humo primum prodire solet folijs primis Petroselinaceis similibus; transplantandæ dum in tenera sunt adhuc ætate, inquit Tragus; altero, aut tertio demum anno caulem emittit: multi hodie venditare non dubitant Angelicam veteribus incognitam, sed à neotericis herbatis in altissimis montibus eam fuisse inventam. Angelicam fativam Matthioli passim feri scribit in Misnia & aliis fortasse Germanicæ locis in campis, colique diligenter, quod inde non mediocre recipiant proventum. Erui tertio à fatu anno. Domestica sponte per se nasci iisdem locis, in quibus silvestrem; aquaticam in aquis. Item Angelicam majorem & minorem provenire in aliis montibus, Soli expositis, ut in Risenberg B. hemie: in finibus Silesiæ, ibi utramque speciem effodi; interdum Angelicam provenire ad ripas aquarum locis umbrosis copiosè invenit in Norvegia, Islandia, Pomerania & Helvetia. Angelica procerior & minor Lobelij, cellos utraq; montes, gelidæque amat juga, colitur & in hortis in Gallia, Anglia & Belgio.

Angelica, in horto Trago, alicubi adversus omne venenum tam internis quam externis in partibus corporis, præsertim verò contra ietus & morsus serpentis & canum rabiosorum, quod ille ipse quoque experientia didicit: venenum educit, sanguinem discipit, & corpus exsiccit. Eadem potest aqua ex radice, non herba, distillata. Si qui peste, febre repentinâ, Pestis aut cum sudore immodico corripitur, is radices Angelicæ in pulverem redactæ drachmam dimidiam cum Theriacæ drachma miscet, in tribus aut quatuor cochlearibus aquæ ex radice Angelicæ distillatæ bibat, deinde in lectum se componat, se quæ probè contegat, ac ad minus tribus post horis jejundet: quod si fecerit, incipiet sudare, & (Deo favente) periculum omne evadet, morboque liberabitur. Quod si Theiaca non suppetat, tunc pulveris radices drachmæ integram, cum aqua distillata sumat, ut jam dictum, pari ratione liberationem sentiet. Radix in aceto macerata, & tempore pestis odorata, & nonnunquam aceto illo etiam potio, si jejuni sit, præservat à ve pestifera corpus. Aqua radices distillata, aut radix ipsa in pulverem redacta cum vino pota, tormina ex frigore orta sedat, modo nulla illis alvi additio adjuncta adfuerit. Brevis omnibus internis affectionibus prodest aqua distillata, & radix in pulverem redacta, non pe pleuritico morbo incipienti, nam collectiones eiusmodi discutit, ruptis & pulmonis vitis, unde tussis pleurumque gravissima, torminibus, stillicidio

urinae, & stranguariae, mensibus inuendis, foetibus trahendis, internis denique quibusvis tu moribus & flatibus discutiendis. Ad omnia illa possunt decoctiones & potiones ex Angelica confici, si vel vino, vel melle, prout ratio aegrorum postulare videbitur, decoquitur radix. Succus Angelicae cavis dentibus inditus, dolore liberat. Aqua distillata auribus indita, idem potest. Succus etiam & aqua distillata, oculorum aciem illitu excitant, claritatem adjuvant, pelliculaeque oculis obduras, unde caliginem sequi necesse est, rumpunt. Ex Angelica & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quae in rabiem efferuntur. remedium praestantissimum est aqua distillata, succusve instillatus, aut pulvis radices inpersus in veteratis & profundis ulceribus, illa enim mundat, & nudata corpore ossa operit. aqua distillata postagris, ischiadicis, illitu prodest, dolorem enim sedat, & collectos ac lentos humores dissolvit. semen ejusdem cum radice est efficacia. Sylvestris Angelicae radix & semen non tantum sunt vestrum, hodie illis in vino decoctis in vulneribus recentibus sanandis utuntur. Et haec de Angelicae facultatibus memoriae prodidit Tragus, quae Fuchius aliter ita recenset. Calfacientem & deiccatioriam vim in tertio ordine ei assignant herbarij recentiores. Aperit, extenuat, discutit. Vnicuique venenis adversatur. Pestilentiae populatim saevientis arceat contagia. Corpora a luce pestifera vindicat, si tantum, ut adfirmant, in ore teneatur. Per Hiemem ciceris magnitudinem cum vino, per Aestatem ex stillatino Rosarum liquore sumpsisse satis est. Nec senturum eo die contagionem pollicentur, quo quis devoravit: nam urina & sudore venenum abigit. Lentitiam pituitae digerit, quapropter tussi, quam frigus attulerit, medetur. Crassa, quae in thorace coierint, discutit. Herba ipsa in vino & aqua cocta, vulnera interna glutinat, concretum sanguinem resolvit, stomachum esu corroborat, cor recreat, pituitam ventriculi deiecit, fastidia ciborum discutit, & elanguescentem in vitat appetitiam. Rabiosi canis morsu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta & melle folia indantur, dein cocta in vino bibantur. Libidinem extinguit ore jejuno sumpta. Lassitudines reficit, thoracem expurgat. Supra febricitantis caput imposita, fertur ad se febre removere. Valere contra fascinores adfirmant, si quis eam secum gestarit. Angelica vires & usum sequentem in modum tradit Tabernaemontanus. Angelica, praestertim hortenvis vim habet calefaciendi, aperiendi & desiccandi, & est calida in tertio, & sicca in secundo gradu. Semen in operatione sua radice si simile est, cum etiam Angelica montana minor. Aquatica parva & ea quae ex Northvegia adfertur, non excedunt secundum caliditatis gradum, sic neque primum siccitatis. Herba tam hortenvis quam silvestris Angelica, minus etiam radice calida est. Vtraque vulneraria, tam intro assumpta, quam foris admota ad curanda vulnera in positionibus & emplastris. Angelica masticata, non nihilque deglutita oris foetentem halitum emendat. Nonnulli folia in salsamentis adhibent, ad crassos humores dissolvendos, concoctionem adjuvandam, itemque oris foetorem corrigendum, pectus expurgandum, & appetitum excitandum. Salsamenta haec apud Anglos in frequenti sunt usu. Sed etiam potagia ex tenella herbae foliis, praestertim silvestris Angelicae, parant. Magnae uterque cibis pestis tempore commendationis. Radix cor confortat ex frigida causa laborans, maximeque conducit in vertigine & animi deliquis quovis modo usurpata. Radices Angelicae pulveris parte una cum mellis despumati partibus quatuor salutare componitur electuarium contra quicquid thoracis & pulmonum frigidos affectus, unde & Brustwurts / Peckoralla radix, nun-

cupatur. Et hinc radix in vino decocta ac cum melle despumato dulcorata manet & vespere quinque aut sex unciarum pondere pota pectus calfacit & pulmones, medeturque difficili respiratori. humectat enim & dissolvit viscositatem omnem. Haec ille, qui plura alia de Angelicae facultatibus adscribit, quae data opera lubentes omittimus, tum quod ex aliorum sententia ea jam recensuerimus, tum quod compositiorem medicamentorum concernant, de qua nos hic agere ex professo non statuimus. Sunt autem inter alia succus exsiccatus, qui & cum aliis medicamentis, & per se etiam usurpatur ad supra dictos affectus. paratur ut succus Absinthij, etiam ex sicca radice, qui praestat. Aqua variè distillatur. Aqua. Nunc enim accipitur herba & radix, minutim conciditur, distillaturque vase vitreo in Balneo Mariae, igne lento. Et ita vulgaris aqua conficitur. Si praestantior requiratur, capitur pulvis radices pondere unciarum quatuor, cui affunditur prioris aqua mensura una, maceraturque in Balneo Mariae die naturali, distillaturque. Alij accipiunt herbam & radicem, contundant, conciduntque minutim, macerantes in vino veteri aliquot diebus, distillantque. Alij radices exsiccatas eligunt, grosso modo pulverizantes, acin vino veteri macerantes aliquo tempore, ex qua infusione eliciunt aquam, Aquae vitæ similem, fortem multum. De Angelicae vino, Mulsa, Extracto, radicis conservae, Syrupi extractionis, Oleo stillatitio, radicibus conditis, Angelica saccharo incrassata, tabulis ex Angelica & Sale idem Tabern. plura scripsit. Spentioneales sativæ Angelicae caulem detracto edunt cortice, ut ab ipsis accepit Dodonæus, quos in Islandia peregrinantes hisce veluti alterius cibi quandoque coegit inopia. ferunt autem lapidum esse & palato esui entum gratum.

ARCHANGELICA.



DE hac variè sentiunt auctores, ideoque singulorum placuit subscribere opinionem.

Archangelica (i. Archangelica) vocat Lob. in *Urb. Lob.* Obs. p. 399. in Icon. p. 701. dicitur Gallo Belgis Angelick de Norwegen / foliis sativæ multo majoribus, atrovirentibus, latissq, humifusis, aversa parte glaucis, primo pulsatu rubris. Caulis multis concavus alis, proceritatis humilis, imò rubens. In lata umbella flores luteoli & semen foliaceum Angelicæ sativæ, majus & rotundius. Radix altè depasta, parum odora: ex Norvegia Belgio inquilinam factam afferunt. In hist. Belg. p. 850. vocat Archangelicam, Noortweeghsche / Angelicam, visam Antwerpæ, delatam ex Norvegia, & in Dornick apud Muttonum. Item Archangelicam cum duplici corona, quam habuisse ait Dominum à Rein outre.

Matthiolus & Gesnerus aquaticæ cuiusdam Angelicæ meminere, sed quandoque eam non descripsere, suspicatus est Dodonæus eandem hanc esse, quam ipse Archangelicâ nominavit & sic descripta.

Est hæc & foliorum amplitudine, sativa haud inferior, sed tamen singulata. Frequenti & numero fori in plurima enim folia, hujus diducuntur. caulis crassus, quandoque unâ cum foliorum pediculis rubens, geniculatus quoque, valde ramosus, è singulis squidem geniculis tres aut quatuor alas promittit, multis idcirco undequaque umbellis cingitur, quarum flores candicans: semen latum, longius & crassius quàm Angelicæ: alta radix & albida, exigui odoris, majoris tamen quàm folia, vel caulis, quæ nullius aut admodum obscuri. Nobis Gesneri aquatica Angelica non est diversa à silvestri, ceu post quoque monebimus. In Matthiolo autem omnia obscura fatemur. Dodonæus Archangelicæ flores candidos tradit; Lobelius autem luteolos; quibus visâ diducunt. Dodonæus separat ab Angelica Norvegica; Lobelius verò eandem facit: quare rem diligentius inquirent stirpem perici.

*Dod. mont.
sur.*

Clusius

Clusius in pannoni. Archangelicam à nonnullis appellatam & ipse amplioris quàm Angelicæ foliorum alis esse refert, & teneris adhuc existentibus, subpupureis: caule humanam altitudinem superare, brachiali, aut ampliori crassitie: frequentissimam in montibus arcu Greben, sitæ in interamni Pannonia, quam Germani Windischlande appellant: expansa enim est inter Dravum & Savum flumina: solere eam quemadmodum & Angelicam perducto ad maturitatem semine perire, atque illo in terra sinum sponte recepto renasci. Eandem habet in hist. post. ubi Archangelicæ titulo iconem etiam apponit.

Comparatij verba de Angelica Norvegica & Archangelica vide titulo de Angelica, sativa scilicet. In horto dicit Archangelicam depingi à Lobelio & Clusium in pannonicis ejus meminisse.

*Angelica
Scandiacæ*

Tabern. appellat Archangelicam & Angelicam Scandiacam, *Norwegisch* & *Pomerisch* Angelicæ. Ejus figura facta ad imitationem Archangelicæ Lobelij, additis in summitate ejus, alterius foliis & radice: verum Lobelius in Ic. & hist. Belgica sativam separat ab Archangelica Norvegica.

*Angel. silv.
montana.
C. Bauh.*

C. Bauh. phyt. Angelica 4. (5. in pin.) sive silvestris montana, Archangelica, Clus. pan. Angelica, Cæs. Angel. minor montana, Tab. Item Angelica 5. (6. in pin.) sive aquatica, Gesn. h. Archangelica, Lob. Dod. Clus. pan. & hist. Cast. Lugd. & Camer. Angel. altera, Cæs. Cur frater in phyt. separet Archangelicam Clusij ab Archangelica Dod. & Lobelij: eademque iterum in pin. ad duas referat, me lateris sibi constare non videtur nam omnes eandem iconem habent. Gesneri verò Angelicam non statuo diversam à silvestri.

*Angelica
alpina.*

Schvvenckf. Angelica alpina. Angelica Silesiacæ maxima, Archangelica auff der Jeserwiese. caule brachij crassitudine, tricubitali: radice longiore, crassâ, paucioribus fibris donata. ad ripam Ileræ fluvij majoris.

ANGELICA SILVESTRIS magna vulgatio.

Desj.

Cum sativa Angelica multas habet notas communes silvestris, ad id ex illa hæc non sit cognitum difficultis: radix similiter rugosa, crassa, sed minus quàm sativæ, sapore non minus vegeto, imò interdum luculentius exaltificante, verum cum minore suavitate: caules bicubitales & tricubitales, nonnihil hirsuti & albiculi subglauci, alioqui sativæ similes, quemadmodum & folia, utcumque tamen minorâ & imbecilliore sapore prædita. umbellæ candidæ immixtes: semen

*Trag. vni-
vers.*

Hanc cum sativa similem facit Tragus, quam bene ostendit descriptio nostra. Angelica silvestris, in-



quit, sativæ per omnia similis est, nisi quod nonnquam candidum fert florem, odor illi nec non & sapor non perinde venemēs: Germanis wild Angelicæ / & nonnullis wunderkraut, h. e. Vulneraria dicitur, quod vulneribus mundandis & sanandis conducit.

Cord. in Diosc. vocat Angelicæ genus in uliginosis. Cordo hic adscripsit Gesnerus Angelicam silvestrem vulgò dictam ali-

quos putare esse Libanotidem primam, Cordum item in Disp. sequutus impia Mithrid. dicentem: Libanotis hic non significat Rosmarinum, sed Angelicam silvestrem minorem. semen autem ejus accipi debet, quod Cachrys vocatur.

Matthioli merito Cordum in suo dispensatorio hallucinatum credidit, quippe qui existimaverit silvestre Angelicæ esse Libanotidem. Matthioli autem, cujus verba ante adduximus, olim videtur hujus Angelicæ figuram exhibuisse sub solo titulo Angelicæ, ut videre est l. 4. c. m. & postea in comm. cum mag. fig. Lat. cum. It. c. n. 8. titulo Angelicæ silvestris in hist. germ. Angelicæ minoris in ep. Angelicæ sylvestris pumilionis: Glossator & patrocinator pro silvestri. Iam itaque illi patrocinentur Matthiolo & apud eum demonstrant discrimen inter silvestrem minorem & in aquisolis provenientem, qualis ea cujus nos figuram Fuchianam exhibemus: eos demonstrasse velim an Matthioli Angelica ad aquarum ripas proveniens non sit ea, de qua hic agimus, quamque Fuch. in Ic. & hist. Angelicam vocat: itemque Lonic. (qui in edit. anni 1773. iconem malam exhibet) Lob. adv. p. 31. in Belg. p. 850. in Obl. p. 399. (ubi affirmat Guilandino Phellandrium Plinii esse) in Ic. p. 699. Thalius & Hort. Lusitanus.

Gesn. Angelicam aquaticam, ferulaceam herbam, hortenfi similem, circa rivos sponte crescentem, & reftibili fecunditate durantem. Tabern. Ic. & hist. Angelicam minorem aquaticam.

Dod. Angelicam silvestrem sive minorem, cui radicem tribuit tenuiorem & minus oleosam aut odoratam, passim in utraque Germania locis humidioribus provenientem, præsertim silvestribus. An autem illa sit quæ à Theophrasto magis aëre, Magudaris à Latinis appellatur, altera videlicet Lasertij species, expendendum & considerandum proponit. Quamvis autem, uti à nobis dictum, Matthioli de Angelica aquatica silvestri obscure scribat, nihilominus tamen haud puto diversam à silvestri, de qua hic nobis fermo, nec etiam Gesneri, ut ante diximus: Dodonæus in hist. gall. olim Fuchij figuram habebat, quam in Lat. mutavit licet sit ejusdem generis plantæ.

Cam. h. Angelicam silvestrem montanam, in locis humidioribus nascentem, foliis tenuioribus, satius tamen odoratis: frequentem ubique Norimbergæ circa urbem in locis palustribus, & alibi.

Deascones unius lupus plantæ & quædam in pi. Gasdat Lugd. p. 725. pumilionem Angelicam silvestrem Fuchij, alteram Angelicam silvestrem Matthioli.

odiosa est: nam abolere difficillimè potest. Ad eò re-
stibili & importuno proventu iuxta sepes hortò-
rum & parietes udis umbrosisque locis pinguibus
luxuriat, ut vix inde possit radicibus deleri.

r/su.

Odor huic fatis fortis, multò tamen imbecillior
Angelica. Adduntur folia recentia tenera oleribus.

Fehrs pu-
trida.
Podagra.

Radix aliquot diebus ex vino pota febres putridas
sanat. Vulneraria est. Podagricis optimè facit, autore
Schyvenckfeldio.

ANGELICA SYLVESTRIS

hirsuta inodora, C.

Bauhini.

Deser.

RADICEM habet crassam & fibrosam, foris pul-
lo cortice testam, intus albam, redvivam & o-
dore medicato; caulem cubitalem, in breves alas
brachiatum parte infernâ, paucissimis pilis cinctum,
nigrum; folia Angelicæ sylvest. sive Podagrariz æ-
mula, in alas, modò binas, modò ternas, easque ali-
quândo uncias quatuor longas, tres latas, aliquân-
do vix unciales, divisa, in ambitu profundè incisa, a-
tro virentia, hirsuta, quorum pediculi hirsutie asperi
sunt: umbellam habet parvis floribus albis referat.
quibus semen oblongum nigricans succedit.
Hanc ex Lusatia, nomine herbæ podagrariz cogna-
tz, D. Francus misit, cujus in horto Lusatiæ memi-
nit.

LIGUSTICVM VETERIBVS.

CAP. LVIII.

Ligusticum
Diosc.

LIGUSTICVM, Dioscoride ita referente, pluri-
mum in Liguria nascitur, unde & nomen traxit,
in monte sc. Apennino dicto, Alpibus contermino.
Ipsam incolæ Panaces haud abs re appellant, quo-
niam & radice & caule Heracleotico Panaci simile
sit, paribusque viribus præditum. Gignitur in altis-
simis, asperisque montibus ac umbratis, maxime ve-
rò juxta foveas & scrobes. Cauliculum profert te-
nuem, ceu Anethi [Margo recens Selini] geniculatum,
circa quem folia sunt Meliloti, at teneriora
[Ald. longiora] & odorata, prope verticem gracilio-
ra, pluribusque incisuris. In cacumine umbella, è
qua semen dependet nigrum, solidum, oblongum,
Fœniculo [Anetho. vet. Margo] proximum, gustanti
acre & aroma redolens [vet. scriptoribus tantum legit]

Vires & m-
ju.

Radix est candida, Heracleotici Panacis similis & o-
dorata. Seminis, radicisque vis excaustoria & conco-
quens: siquidem profunt ad interaneorum dolo-
res ac tumores, itémque ad juvandam concoctio-
nem. Valent & ad inflationes præsertimque ventri-
culi, nec non & ad venenatarum bestiarum ietus: u-
rinas quoque ac menses pota trahunt. Sed & appo-
sita radix idem præstat. Ipsa porò æquè ac semen u-
tiliter oxyporis & concoquentibus medicamentis
admiscetur. Hoc verò stomacho perquam utile est:
quare Piperis loco id indigenæ obsoniis immiscetur.
Adulteratur autem semine quodam consimili, quod
tamen gustu faciliè discernas: amarum enim est. Alij
quoque seminibus Fœniculi, aut Selseli simul admix-
tis fraudem faciunt.

Ligusticum
Plinio.

Ligusticum (inquit Plin. l. 19. c. 8.) sylvestre est. In
Liguria suæ montibus feritur. Vbiq; suavius sati-
um, sed sine viribus. Panacem aliqui vocant. Cra-
teas apud Græcos Cunilam 'bubulam' eo nomine
appellat. Et rursus lib. 20. cap. 15. Ligusticum aliqui
Panacem vocant, stomacho utile est, item convul-
sionibus & inflationibus. Sunt & qui Cunilam bu-
bulam appellaverunt, ut diximus, falsò.

Galenus *νεύριον* vocat, si scriptura non fessellit.
Cornarium, cujus radicem & semen ex genere ex-
calfacientium esse ait adeò, ut menses ciant, & uri-
nas provoquent, statusque discutiant.

Credimus cum Marcello, Ligusticum hoc esse
quod Columella l. 12. Panacis nomine Autumno &
Vere feri jubet leni & subactâ terrâ, raris interval-
lis, quò majus incrementum capiat. Idem vltimo ul-
timi libri capite Oxyporis misceri Ligusticum ju-
bet; & qualia antiquis Oxypora essent, & quo mo-
do conficerentur longissimè etiam docuit, sic dicta
quòd aceto condita ad intinctus fervarentur. Cor-
nario tamen *νεύριον* à celeri transitu appellata vi-
dentur, ut etiam videre est apud Aëtium l. 6. c. 10.
& 9. c. 24.

De Ligustico, non autem Smyrnio, quod cum Li-
gustico turpi errore confundit Pistorius, Macer hæc
prodidit.

A Ligurum Patria sumpsere Ligustici nomen,
Copia quòd major ibi nascitur illius herbe.
Tertius huius gradus est calidus, sicque vigor:
Major radice & semine ejus.
Et par est illi visum medicamine quorū:
Inflato stomacho cum vino sumpta medetur,
Et calidum purum digestivum juvatur.
Omnibus & morbis sic prodest interiorum:
Vrina sic sumpta movet, & menstrua purgat.
Tot a venenatu medicatur moribus herba,
Sic bibitur bene trita prius, vinòque soluta,
Et pars contrita ponatur desuper herbe,
Non modicum colicis prodest hac mansa, vel C.

hæc, ita,
Vel si radice elixatura bibatur,
Nec solum colicis decoctio proderit ista,
Sed si prædictis medicabitur omnibus hausta,
Digestibilibus semen bene jungitur ejus
Omnibus aut idotis, quòd sit huic pepsica virtus.
Hanc oculi Strabus, parique & odore nocivam
Asserit, auridior ejus & antummodò semen
Miseri iusti hoc verum dixerit à se,
Aut à docturum libris, non est mihi notum:
Hoc scio, quòd veteres non parva laudibus istam
Astolunt herbam, nec me legisse recorder
Vltum qui Strabi sermonibus astipuletur.

Ligustici nomen pluribus plantis attribui com-
perimus. Est enim Ligusticum multis, quod vulgò
Levisticum dicitur, de quo ante post Apia.

Ligusticum Rauvvolfij folio Aquilegiæ paulò
post referemus sub eo titulo.

Ligusticum de Selseli alpino, sive montano Clusij
dicitur, de quo paulò ante.

Selseli sive Siler montanum quibusdam dicitur de
hoc Ligustico, de eo egimus supra.

Est Ligusticum alterum Belgicum Lobelii, de
quo mox dicemus.

Vocatur quoque Ligusticum quorundam (ut
Mathioli) folius Angelicæ.

Ligusticum Mathioli & Lobelij quo referen-
dum sit nondum videmus.

Myrrhidem alteram parvam Penz, alij pro Ligu-
stico genuino in pharmacis ponunt. De hac post
Cicutarias, Cicutariæ latifolia titulo dicemus.

Ligusticum quorundam opinione, Imperatoria
est, statuitur, sed non absque errore.

Pro Ligustico Dioscoridis sumit in antiball. Col-
legium Florentinum Cuminum.

Sylvius in Antiball. phar. pro Libyatico substituit
semen Dauici.

Ligusticum sive Libyaticum idem ab eodem in-
terpretatur semen Staphylini, i. e. Pastinacæ, præter
agrestis.

Ligusticum

LIGVSTICVM QVORVN.
dam folijs Angelicæ.

MATTHIOLUS in post. com. cum mag. fig. lat. l. 3. c. 51. & Ital. c. 53. Ligusticum alterum vocat, eiusque imaginem pingi curavit missum ab amicis. Verum non magis Ligusticū Dioscoridis ipsi referre videtur, quàm eius primum Ligusticū, de quo paulò infra.

Camer. apud Matth. in hist. germ. & epit. inscribit Ligusticum Italicum, welschen Liebstöckel / notatq; Matthiolum, quòd figuram ponat sine descriptione; quibuldam in locis existimari verum Ligusticum. Is autem exprimit figurā suā plantam, quam habemus siccam Citræ nomine, odorem spirantem Meū, folijs non nihil accedentem ad Angelicam: comā valdè capillatā ad radicem ex foliorum antiquorum reliquijs, quæ bene exprimitur effigie ex ipsa planta à Camerario proposita notatq; litera A. Hanc unde acceperim, vel ubi collegerim, non recordor. Iconem Matthioli apud Camerarium denotat litera B.

Libanotidem Theophrasti maiorem (inquit Lugd. p. 775.) monstrat Lobelius folijs magis carnosis: Hæc secundum est Ligusticum Matthioli. Fallitur autem. Lugdunensis, confunditque duas plantas. Alia enim est Libanotis Lobelij major, & alia Ligusticum secundum Matthioli.

Mihi videtur Tabernæmontanus descriptionem suā accommodasse ad iconem, quam Ligusticū tertium herbariorum inscribit, & non ad plantā vīsam.

Subnectendam hic duximus diligentem Cæsalpini descriptionem. Ligusticum, inquit, in Alpibus Liguriz vulgò Imperatoria vocatur: folia à radice, rotundo pediculo & ferè lignoso, ac tripartito gerit, figura herbæ S. Marie, sed magis in acutum definitia, magisque serrata, terna in singulis pediculi ramulis, odorata, prædura: caulem cubitalem altioremq; paucis folijs: semina in umbellis, figurā & magnitudine Fœniculi, nigra, odorata & acria: radix candida, pollicis crassitudine, in duas aut tres prælongas desinens, odore jucundo, sapore acri; oritur in Alpibus propè rivulos: utuntur semine in obsonijs, & radice ad stomachi dolores, & imbecillitatem, ac omnes ferè internorum noxas. Dioscorides inquit de Ligustico plurimum in Liguria nasci, &c. Plinio Ligusticum silvestre est & in Liguriz suæ montibus feritur, &c. Eandem puto apud eundem inter Panaces appellari Pharnaceon, à Pharnace regis cognominatum, longioribus quàm catæra folijs, serratis & levioribus.

Ligusticum Anguillara epist. 12. nihil aliud existimat, quàm plantam hanc, quam in Liguriz montibus reperiri, & dici Imperatoriam refert, folijs Angelicæ, caule bicubitali, semine nigro.

C. Bauhinus per Ligusticum alterum Matthioli & Castoris Angelicæ alicujus silvestris figurā proponi censet. Revertit autē Ligusticū Anguillaræ ad Imperatoriā vulgare, cum sit eadē cum Ligustico Matthioli.

Tom. III.

LIGVSTICVM ALTERVM
Belgicum, folijs ferè Abinthij, semine rotundo.

LIGUSTICVM alterum n. Belgicū, ferè elegans plantā, multis jam annis à Lobelio reperta in Taurinis amoenissimis collib. non procul à Padi fluitis. In hortis Belgicis altur, caulem promens cubitalē & sesquicubitalē, quem ambiunt folia rutacea, Sileris & Abinthij, rotundiora, Abinthij fructis ferè paria. Flores & semen rotundum, nonnihil aromatum in umbellis Smyrnijs Cre-

Lob. in Obs. p. 457. Icp. 786. Ligusticum alterum Belgarum. Lugd. p. 744. Ligusticum alterum Lobelij. Tab. Ligusticum alterum Herbariorum. C. Bauhin. phyt. Selsi montanū. vel Alpinum Clusij, idem fecit cum Ligustico hoc Belgico, ut & in pin. ubi vocat Selsi i. montanum, Cicuta folio glabrum, notatque differentiam latiori foliorum ex horto Cl. Côtareni.

LIGVSTICVM, MAIVS SIVE
Imperatoria major flore luteo.

QUÆDAM in montibus nascitur Ligustico [al-tero folijs Angelicæ] major: folijs latioribus, rotundioribusq; caule crasso, proximo Ferula, umbellam ferens luteam: semina compressa & rotunda, candicante, Sphoradio minorā. Radicem candidam, Ligustico crassiorē.

Hanc quidam, Cæsalpino autore, pro Libanotide Theophrasti ostendunt: non tamen odor adeo insignis inest. Censeret potius apud Theophrastum genera Panacis recenseret, cum inquit sunt & alie quædam Panaces: una folio tenui, alia latiori: ut Ligusticum significet & hanc, quæ latiori folio constat, quasi Ligusticum majus dici possit, & Imperatoria major.

LIGVSTICVM MATTHIOLI
& Lobelij.

AN hoc intelligit Cornarius in Diosc. quando ait. Verum Ligusticum etiam hodie Liguribus notissimum, & in cibis condiendis familiarissimum, tale de pinguit, quale ipsi Dioscorides descripsisse videtur. Imò quale est id quo hodie Ligures utuntur, & quale etiam reliqua Italia novit.

Legitimum ac verum Dioscoridis Ligusticum in Ananienisibus & Coritienisibus montibus nasci scripsit in priore comm. Matthiolum, ut inq; Y. in horto Maphicæ etiam in Liguria, cujus Metropolis sit Genua. Id autem sibi vulgus notitiæ ait, ut cujus semine passim utantur incolæ in ciborum condimentis. His addit in post. comm. cum mag. fig. lat. & Ital. hujus plantæ imaginē amicos sibi missis, priusque hoc Ligusticum magis quàm secundum refert sibi videri, id velle, ut sit quoque alius jud. cū. In epist. cum addit. Con er. vocatur Ligusticum

Germ. wilder Stigam & Roß kummich; aliis wilder Galgant. In hist. germ. Fremder Liebsteckel; Dioscoridis Ligusticum. Annotatum legimus à Dalechampio cap. de Ligustico apud Matthiolum, plantam hanc in Allobrogum montibus frequentem nasci, ab incolis dici *Sermontanum*, eam Libanotum fructuosam esse se putare. Si porrò Matthiolo erat notum semen, quod ait sibi vulgaris notitiæ, cur non descripsit, ut melius innotesceret, cur in postremis non repetit nasci in Ananienfibus & Gortienfibus montibus, si olim vera & perspecta scriptiscon Matthioli videtur nobis repræsentare Siler montanum, sicuti & Icon nova à Camerario exhibita, semen tamè quod imagini ejus appinxit, differt. Sileris enim semen magnum & foliatum est.

Matth. natur. Matthiolum autem de Silere montano loquutum esse, asserere non ausim. quandoquidem Lobelius tradit plantam nasci in Liguria Sileri similem: præterea Matthioli in Diosc. l. 3. c. 54. Sefeli pharmacum [i.e. Siler.] iuncum fetorem repræsentare scribit.

Siler Mas. silense. Ponain descr. montis Pilati narrat nonnullos Ligustici. Matthioli pro Silere aut Sefeli Massiliensi uti. Contra Dodonæus, Gaillardinus, & C. Bauhinus volunt Ligusticum Matthioli esse Siler montanum, quorum opinio non placet, ut suo loco diximus.


Lacuna natur. Lacuna habet iconem Matthioli, nihilque præterea, quam autem plâtam intellexerit, dubitamus. Si Siler montanum voluit, improbamus ejus conjecturam propter semen.

Tabern. natur. Tabern. quoque imaginem Matthioli pingi curavit, historiamque ex Dioscoride & Matthioli concinnavit, quam pro vera venditat. Non existimo illum scivisse, quid scriberet. Nec scio an Siler montanum intellexerit. Si ita, semen non convenit cum Dioscoridis Ligustico.

Locus. Si quis Genuatitem terrestri Savenam proficiatur, & paulum ad levam Austrum, marè versus deflectat, inquit Lobelius, magnam copiam videbit Ligustici, inibi propemodum, ubi Saliunca visitur oriunda: verum illic unde nomen habuit apud Ligures, neglectui habetur: universo illo tractu maritimo reperitur hæc, cujus semen fuscum odorem, Fœniculi fermè, vescum est, multòq; usui illis montium accolis, Mei fœnili & par umbellis, caule ferulaceo, alis diviso, folia ferentibus angustiora Galegæ aut Sileris, radice Panacis odorâ. Pingitur hoc in Obs. p. 408. pro Ligustico Adversariorum.

LIGUSTICVM RAYVOLFFII, folijs Aquilegiæ.

Descr.



RADICE est crassâ, fibrosâ, cortice inæquali, quasi rugis transversis asperatâ, fuscâque coloristâ, medullâ candidâ, amarâ, modicū quid Aroma & Aristolochiam sapore redolens: ad cuius caput, pili tanquam veterum teliorū defluxorum fibræ solidiores & nigrescentes: enim folia, quæ numerosa ex radicis capite longis pediculis emergunt, unâ parte quasi vaginato exortu (nimirum ea quæ crassiora &

latiora sunt, ut & ea, quæ ex caule prodeunt) eisdem, tanquam membranacea filiqua circumdant, articulo crassiore, lineaque transversâ: quæ crassa sunt, rigida, glabra, viridia & splendens, subtus candicans, fibris majoribus subpurpureis transcurrentibus, quæ licet instar foliorum Aquilegiæ dividantur, non tamen omnia in pares lacinias (Aquilegiæ lacinij latiores) fissa sunt: inferiora namq; in vegetiore planta, plerumq; quinque folia habent, ex triplici rami divisione alia tribus pediculis insidentia. Caulis unicuque cubitos tres quatuorve superans, rotundus, striatus nodis distinctus, subalbicans, puniceo colore aliquando admixto, in tria, quatuor, vel quinque brachia distributus, quæ umbellam magnam, ex longissimis sessilibus & floribus albis parvis cõpositam, sustinent: semen succedit longum, latum, striatum, geminum, puniceum, gustu subamarum, Cumini saporem imitans, aromaticum, modice excalescens, & salivam ciens. Hoc D. Doldius Norinberga ex D. Camerarij orto, nomine Sefeli Æthiopici folio Aquilegæ misit, cujus Camerarius, (sed sine descriptione) in sui horti Catalogo, sub Sefeli Æthiopico altero meminit, & semen odore & sapore aliquantulum Cina bonum repræsentare scribit.

Est autè descriptio ejus à C. Bauhino in phyt. Libanotis latifolia 4. aquilegiæ formâ: Eid. in prod. Libanotis l. (6. in pin.) latifolia, aquilegiæ folio.

ELAPHOBOSCVM VER-

terum.

CAP. LIX.

ELAPHOBOSCON caulem habere Libanotidi aut Fœniculo similem, angulosum; folia duorum digitorum latitudine, satis longa, velut Terebinthi, contra & alpera quodammodo, auctor est Dioscorides. Habere & multas propagines ipsam caulē, quas ait umbellas habere Anetho similes: flores submelinosos [i.e. viscosos, vet. quidam caros.] & semen Anetho simile. Radicem esse trium digitorum longitudine, crassitudine autem unius [i.e. digiti. παχὺς ὡς δάκτυλον. Matth. eod. παχὺς δὲ ὡς πλάτος.] albam [i.e. ὑπόλευκη, Ald.] dulcem [i.e. ὡσὶν, Ald.] edilem. Sed & caulem olerum modo edi, dum recens est. Tradere quoddam cervas hujus herbæ pabulo resistere serpentium morsibus. Vnde & semen ejus commortis à serpentibus dari cum vino bibendum.

Elaphoboscon cervas monstrasse ait Plinius, qui l. 22. c. 22. sic describit. Elaphoboscon ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine, semine in corymbis dependentibus Silis [Sileris] effigie, sed non amarum: folijs Olusatri. Et hoc laudatum in cibis. Quippe etiam conditum prorogatur ad urinam ciendam, lateris dolores sedandos, rupta, convulsa sedanda, inflammationes discutendas, coli quoque tormenta. Contra serpentium, omniumque aculeatorum ictus. Quippe fama est, hoc pabulo cervos resistere serpentibus. Fistulas quoque radix Nitro addito illita sanat. Sicanda autem in eos usus prius est, ne succo suo madeat, qui contra serpentium ictus non facit eam deteriorem. Et hæc verioris Plinij codicis lectio est.

Galenus calidam & tenuium partium vim habere tradit, & propterea etiam siccantem secundo ordine. Nunc quod silentio non prætereundum, sunt qui Elaphicon, qui Nebrium, qui Ophigenium, qui Ophioctonon, qui Herpizen, & qui Lymen vocent. Egyptij Chemin; Aphri Aldruachu? Romani Cervicellū dicūt. Quæ Elaphobosci appellationes unâ, eandemq; caulam & originē habēt, Verba autem ea quæ Dioscorides nō procul à fine capitis, & Plinius 22. volumine ejusdem numeri capite retulerūt. Quomodo sc. fama sit hoc pabulo cervos resistere serpētib; cau

eam denominationem exprimentur quæ prima in Notis Dioscoridis auditur, Elaphicon sc. i. e. Cervinam herbam. Mox Nebrium ex eodem eventu: *Nebrium* enim cervorum inulos Græci vocant. Ophigenium itidem & Ophioctonon: quarum altera ab enectis serpentibus manifestam habet significationem: altera quod serpentes aliquo huiusmodi malo vexet. Corrupta enim est, ut ait Marcellus, nec licuit eam instaurare: quemadmodum & eam, quæ sequitur Herpixon, suspicari tamen in hac licet *ἑρπίων*, quæ Græcis reptilia & serpentes sunt, aliquid fuisse. In Romana etiam Cerviocelli voce certum aliquid non est, credimusque Græcarum hacum modo corruptam esse. Siquidem in græca Elaphobosco nihil est quod oculum aut ocellum indicet, quodque in ea auditur cervorum tantum pabulum ostendit.

Tandem, ut ad Elaphobosci æquivocationes deveniamus, Pastinaca Germanica silvestris plerisque hodie Elaphoboscum censetur.

Aliorum stat sententia Pastinacæ Germanicæ sativam esse Elaphoboscum.

Euchar. Roelslin variarum plantarum nomina confundens, videtur pro Elaphobosco pingere Staphylinon silvestre.

Iudicent periti stirpium, quàm conquirendæ Cæsalp. Fab. Columna, & C. Bauhinus Sistarum, Elaphoboscum Dioscoridis & Plinij esse statuunt.

Caucalis minor Bellonij semine pulchro à nobis dicta, creditur ab Anguillara Elaphoboscum.

Difficile est judicare, quam plantam per Elaphoboscum Plinij, missum Florentiis, intelligat Camerarius. Is enim eum non describit in horto.

Cornarius arbitratu esse eam herbam Elaphoboscum, quam Germanos *weisse Girsweurtz* appellare ait. De hac agimus sub Libanotide altera Dodonæi.

Credit esse Elaphoboscum Dioscoridis Lonicerus, quam Libanotidem Theophrasti Dodonæi, sive Sefeli Æthiopici Matthioli inscribimus.

Cordo in Dioscoridem ad Elaphobosci descriptionem satis accedere videtur herba, quam Anglicam silvestrem repentem appellamus.

Elaphoboscum, aliqui faciunt plantam à nobis Auriculæ leporis imagine propositam.

Monpelienfium Pabulum cervinum [Auriculam leporis alteram sive rigidiorum] Elaphoboscum putatum; multum abesse à veris notis perhibet nobiscum Lobelius.

Elaphoboscon cognominat Allium Gesnerus in ascriptis Dioscoridis.

Loco jam citato Salvia quoque de Elaphobosco dicitur.

AGRIOPASTINACA Cretensium.

CAP. LX.

AGRIOPASTINACA vulgariter hodie vocatur in Creta herba quædam Petroselinum vulgari simillima, nisi quod minor est, foliaque eisdem etiam incisuris prædita licet habeat, minora tamen & aliquantulum crassiora profert, caulis Petroselini est, flores in umbellis albos sustinens, quibus succedunt semina Petroselini, sed minora, colore ad atrium accedentia: radice nititur unicâ pollicis magnitudine, semper figurâ longâ; cortice tenui tecta, qui digiti atritu facillimè à radice separatur, quæ candida, edulisque est, Bulbocastani gustu: totâ Hyeme viret, semenque Majo profert, postea tota arefcit præter radicem, quæ tenâ latet, & pri-

Tom. III.

mus Autumni imbribus germina protrudat incipit, inquit Honorius Bellus in epistolis ad Clusium missis. Hujus stirpis duo reperiuntur genera, colore corticis radicum tantum differentia: nam unius rufus, alterius niger conspicitur. Nigrum genus in montibus totius Cretæ, & etiam in Dalmatia provenit. At rufum abundantissimè tantum in scopulis Cretæ propinquis inter saxa, & copiosè admodum in quadam insula parva, Grabulla vocata Occidentali Cretæ parte sita, ubi arx munitissima extructa est, quam insulam unam ex tribus Mussagoris olim à Plinio appellatis esse judicat Bellus. Hæc herba ad Buselinon à Plinio l. 10. c. 12. descriptum ipsi accedere plurimum videtur, siquidem differt brevitate caulis & radicis colore rufo à Petroselino. Potrà ut ait à Seplasiarüs pro Saxifragia usurpatur, & Saxifragia vocatur, à rusticis verò *ἑρπίων*, i. e. silvestris Pastinaca, à qua tamen longè differt, Pastinaca silvestris adhuc in Creta legitimum nomen retinet, nam eam *capud. nigr.* vocant, frequentissimèque radice, & herba cocta, verno tempore, vescuntur rustici.

Hanc anno 1597. semine sibi natam refert Clusius, sed cum valdè serò germinasset, & maximè tenella adhuc esset planta, Hiemem proximè sequentem corrupisse, ut observare nequiverit: fuisse verò ejus folia ex atro-splendentia, non minus quàm Eleoselini. Plura nobis hac de planta non constant. Bauh. in pin. vocat Apium, sive Petroselinum Creticum: Agriopastinacam vulgò in Creta, Belli ep. 5.

PASTINACA GERMANICA Sylvestris, quibuldam Elaphoboscum.

CAP. LXI.

GUAR.



NEQUA QUAM aliter quàm cultu nobis videtur à sativa, de qua mox agemus, differt, formâ partium omnium eadem, sed coactiore, saporeque vegetiori.

Cæsalpinus Pastinacæ vulgò appellatæ titulo sic describit. Folia fert simplici pediculo, longitudine duorum dodrantum, sectionibus oblongis, latitudine tertium digitorum, circumfatis, hirsutis, frequentibus: caulem crassum, bicubitalem, & ampliorem, striatum: umbellæ summis ramis insidentes latas, flore luteo: semina in rotunditate depressa, lata, candida: radix singularis in altum demittitur, vasta, cubitalis, sup pallida, cortice carnoso nervo intus duro.

Matthiolus & enim imitatus Lacuna solam iconem pro legitimo Elaphobosco proponunt: suspicamus autem plantam eis non fuisse cognitam. Dod. gall. eam Elaphobosci inscriptione pictam dedit, refertque ab officinis patriæ suæ Bracam urbinam, aut Bawciam appellari: gall. Cherry

N 3

[illegible]

Armeny
ETC.

Lonicera hanc habet malè pictam sub nomine
 Patinacæ sylvestris (wild Möre) & pejùs de-
 scriptam, confundens eam cum Carotis.

Amos.

Anguill. ep. 73 c. de Elaphobolus hujus meminit.
dubitat tamen an verum Elaphobolus & vocat
Paltinac. sp. ciem. De eadem autem cap. de Palti-
stinacis ait, fativas non differre à silvestribus nisi cul-
turâ. Item cap. de Cimino silvestri, ubi Paltinacam
silvestrem nominat. Hanc fortè eandem vocat ep.
5. Been album Aduarij in Dafatyrio, & Galeni
Daucum silvestrem.

Tametsi non esse figurā diversā a lativā Pasticinacae, sed viribus duntaxat ignavioribus ex Dioscoridis oratione non liquet, inquit in Adverbiis. beluistamen, quia posteritatis consensu & multo ulu ista recepta est, idē ut congenerem agnoscere visum est, (yl) vestrem Pasticinacae, sive Bauciam officinā distam, luteis florib. & radice lativā Pasticinacae concolare, & ejusdem saporis. Vocavit hanc idē alibi Patinacae silvestrem A. zabum. Bauciam pharmacopoeorum, si quē cum Elaphobosco Dioscoridis conferas, nihil prorsum esse ait, quod requiras. Nominatur in Obol. p. 408. Baucia, dubitaturque jam an Elaphoboscum.

Ваніа
ефіа

Б. 170007714.

Trago dicitur *Pastinaca* 2. sive *silvestris*, & *Pastinaca silvestre* genus. Cornuio *Pastinaca silvestris*, qui malè existimat *Staphylinum*, sive *Pastinacam* veterum. Fuchio in hist. Sifarum erraticum, *silvestre*. In Icon. Sifer *silvestre*. Lacunæ Sifar *tertia species*, & *species Elaphobolus silvestris*. Cam. apud Matth. in hist. germ. & epit. *Pastinaca silvestris*.

Augd., 1870.
ver.

Lugdunensis Elaphobotum Dodonzi seu Baucis.
Item in Elaphobotum Matthioli. Historia dicitur
figuræ habet unius plantæ. Cæterum, esse ait qui
Pastinacam prætenit Plinij esse velint, quam
etiam Hîbiscum, Pastinacam appellat, & *μαύρον χιόνιον*
ἐπέλεον Lugdunenles rusticos vocare *Païetz* *sausage*
i.e. Pastinacam silvestrem, ejusque radice vesci ut
hortensis.

Tab. Icon. *Elaphoboscum erraticum**, Branca Icon. 1, *wilder hutz Pasiensch* / *wilder Mierele* Icon. 2, *falsch phetium 2* craticum. Item *Elaphoboscum*: Matthioli, *falsch hutz Pasiensch*. *Matthiolum* ac ponere pro *Elaphobosco* plantam alicuius quodvis facere, quia verum *Elaphoboscum* potuerit pro *Psittinaca domestica*, quoniam verum illa planta sibi non confare. Sed miramur Tabernemontani non potius innuadere, e. Matthioli *Elaphoboscum* non differre a suo *Elaphosco erratico*, ac dicere falsum esse: quum ipse eundem proponat pro *Elaphobosco* suo quoniam, hęc figura Tabernemontius placeat. Male quoque a Gerard. de sub titulo *Spondylii* ponitur icon *Elaphobosci erratici* Tabernemontani.

Gerarda la-
i, 62.

Elphobolici Dioscoridis descriptio nostræ Pasticæ maximè quadraretur flos, tum folia, & caulis & semen, inquit Cæsalpinus, at radices brevitæ nequaquam, nisi genus ille vestre assumatur, cui radices brevior multò quàm fativæ, ac flos luteus. Ad id nequaquam disjungendum videtur à fativæ cum solo cultu differat.

Elaphoboloidi hujus effigiem & Lacunam & Ca-
storem poposuisse, & Tabern. nomine Elaphobolus
Matthioli meruisse testis est. C. Bauh. qui vocat
Pastinacam a. sive silvestrem latifoliam. Pastina-
cam. Brunf. Sylvestrem. Trag. Ang. Cord. Gelnh.
Thal. Cam. Spontē nazam, Cels. Sifer sylv. Fuchs.
Turn. Elaphobolcum, Matth. Dod. gall. Cast.
Sylvestrem, Lac. Bauciam, Pastinacam sylv. Ara-
bicum, Elaphobolcum, adv. Elaphobolcum er-
aticum, Tab. Pastinacam sylv. gallicam, Cordin.
Diosc. Pastinacam latifoliam sylv. Dod. Spody-
lum. Ger.

Paftinaca Germanica fylveftris, quæ quibufdam Elaphofofeum dicitur, provenit Montfelij & Genævæ: Bafileæ invenit florentem Octobri ad ripam fluminis Bifcæ in urbe. Montbelgardi frequens eft, prope Achonannapagum, florens Julio & Augufto. Matthiolum æpe vidit tamen Tidentino, tum in Goritiensî agro. Paffum provenire ait Tabern. inter fylvefres plantas in collibus agrorum & vinearum, herbofis locis & ficcis pratis.

PASTINACA SATIVA LATI-
folia, Germanica, lu-
teo flore.

GRAB.



CVLINIS notifi-
cūme Paffinace
hujus radices in
Germania, fingula-
res, longe, minū
crasſe, albe, in me-
dio nervo duro do-
nate, magis grato,
quā Sifamur, ſa-
pore: ab his caulis
lurgit bicubitalis &
procerior, ſtriatus,
inaniſ, multiſ aliſ
concavus: folia Pim-
pinellæ majori non
ineptè compares,
ſed multiſ numeris
majora, aut virgen-
tia hirtuta, ſapore
grato & aromatico
quoque: flores in
ampla umbella lute-
i, quorum ſingu-

li quinque foliolis reflexis umbilicum medium vi-
ridantem circumstantibus constant. semen latum
foliaceum, duplex, compressum, Angelicæ vulgò di-
ctæ semini simile.

FLEVRAM à nobis primo loco exhibitam exhibuit Puchius Siferati iusto magni tulo, dixitque *girolos* Graecus, Sifer Latinus, vulgo autem *Passim* hanc, quod ei congener sit, appellari. Esse qui extritis prioribus litens diminutive sonat, Scullum, aut Servillum, aut Chervillum, pro Sierculo nomen. Germanos ad corruptam hanc appellationem respicientes *Gerlin & Gerlin*, Gallos *Cherrys* aut *Giroles* vocare.

A Trago hae appellatur *Passi* ac i. *lūve fovea*. r. Sunt, inquit, qui Scaphylinos & Passinacae domus *stiacae* appellant, quod equidem per me illi sicebit,

modo non offendantur, si, quod ad me attinet, Pastinacam Elaphoboscum (quod Dioscorides alios

FIGURA ALIA.



Elaphicon, nonnullis Nephion, alios Ophigenion, quosdam Ophionon, aliquos Herpiceen, alios Lymen, Romanes Cervicellum, Aegyptios Chemin, Aphros Alcaucau nominare dicit) appellaverim. Sed si quis miretur, quæ sit caula, ob quam Pastinacam Elaphoboscum nuncupare vulerim, is herbam ipsam cum historia Elaphobosci conferat, & videbit dubio procul quid me permoverit, ut Pastinacam sic vocarem. Sin verò aliqui sint,

qui Pastinacam Sifarum interpretari velint, non ero illis impedimento, ea tamen lege, ut Rapunculos ab ea appellatione nequaquam excludant. Hæc ille, qui figuram falsam addidit: nec enim hanc suam descriptione tradit plantam, quam icona repræsentat sub Pastinacæ titulo.

Lacuna confundit hanc Pastinacam cum Carota, eumque forte sequutus Oliverius in Theat. agric. dicens Pastinacæ & Carotæ (*Pastinades & Carottes*) inter se differunt tantum colore, uni color ruber, alteri albus. In Languedoc & alibi *Carrote* vocat *Patenille blanche*: hæc duo vocabula confunduntur in multis partibus hujus regni, ut Lutetia, ubi indistinctæ hæc radices nominantur *Pastinades & Carottes*. Manifestum itaque ex dictis Oliverij sit, ipsi non fuisse nomen Pastinacæ Germanicam sive latifoliam foliis multum differentem: miramur etiam eum non meminisse Carotarum lutearum.

Et quoniam fortassis in Gallia Pastinaca sativa (ita namque vocatur Matthiolo) non feritur, Ruellius manifesto errore putavit, Carotas vulgò vocatas esse Pastinacas. Vt hinc maxime admirari subeat Ruellium. Siquidem hæc nomen nemo inventus fuerit, Matthiolo etiam annotante, de rei herbariæ scriptoribus, tam Græcæ, quam Arabicæ familia, qui cum Ruellio memoriæ prodiderit, Pastinacam sativam radice nitidæ rufâ, ut sanguineo succo maderat. Idem Matth. alibi dixit. Non desunt qui crediderint, album quoddam Carotarum vocatarum genus, legitimum esse Sifer. Cæterum eos hallucinari putaverim, Plinij testimonio ductus, qui lib. 19. cap. 5. hæc habet. Inest Siferibus longitudine nervus, &c. Id quod in hisce Carotarum radicibus hæud quamquam reperire licet. Hæc ille, qui quamvis l. 2. c. 107. Carotam pro Sifere depingat, suspicamus tamen eum per Carotâ albam intellexisse Pastinacâ Germanicam, quæ radice albâ, & Carotarum modo venditur, & editur in Germania, diciturque quibusdam Sifer. In hac sanè Pastinaca nervus & amaritudo quædam. Ipse Matthioli forte confundit Carotam cum hac Pastinaca, & ex postremis comment. satis apparet eum nescivisse quid tunc scriberet. Omisit siquidem ea, quæ in prioribus de Carotâ alba scripserat.

Dod. gall. videtur Pastinaca vulgaris esse *carotte*, sive, hæc Pastinacam Galeni & simplicium. Latinus in fol. Pastinacam latifoliam sativam contra negat esse

Tom. III.

verè & propriè Staphylinum veterum, videturque Elaphoboscum concludere.

Lonic. hanc confundit cum Carotis, quas Pastinacas vocat, ac hanc Staphylinon facit, & Pastinacam albam vocat sine pictura. Anguillara ait Pastinacam Græcos Staphylinon vocare, domesticamque hanc à silvestri cultu solummodò differre.

Lobelius in Adv. Pastinacam domesticam appellat, Dioscoridis Pastinacam esse existimans,

absque ratione. In Obs. p. 407. & Icon. p. 709. vocatur Pastinaca domestica vulgi. Lugd. p. 719. Pastinaca sativa vulgi Matthioli. C. Bauh. Pastinaca sive sativa latifolia: Pastinaca sativa, Trag. Lacicon. Lugd. Geln. h. & Cam. Pastinaca vulgaris, Dod. gall. & Ccl. Pastin. domestica, Matth. Ang. Cast. Ad. Lob. Pastin. latifolia sativa, Dod. Latifolia sylv. Ger. Sifarum sativum magnum, Fusch. Turn. Sifer Dioscoridis, Col. Elaphoboscum sativum, Tab.

Cæsalpinus statuit Theophrastum Daucum vocasse, quam Theodorus Pastinacam vertit, Lauri facie, colore Croci, sed verbum inibi positum Daphnoides postponendum putat, ut herbam propriam significet, nisi Pastinacam hanc nostram intelligat Theophrastus. Latifolia enim est, ut particulae quædam Lauri speciem habeant. Idem Cæsalp. ait Pastinacam vulgò appellari, radicem vastam, in hortis vulg. fecti solitam, cibi gratiâ. Plinium hujus meminisse nomine Pastinacæ majoris, cui nervus inest, ut Siferi, sed tantum anniculæ. Athenæum de magna Pastinaca dixisse, quod Caros vocetur, magnam esse Pastinacam, quæque facili augeatur, meliorem habere succum, quam Pastinacam. Profectò si aliqua magna dici debeat, hanc cognomen id mereri, sed apud Dioscoridem quo nomine donata sit, incertum esse: neque enim in genere Staphylini, neque Dauci ponendam videri: cum totius plantæ facies longè discrepet: neque cum Sifere, cui valde affinis sit, convenire: nam Plinium Pastinacam majorem se junxisse ab eodem: alioqui Sifarum facultates, quas Dioscorides & Plinius tradunt, maxime convenire cum hac Pastinaca: & vulgò cognitum tradit Sifer, ut apud nos Pastinacam. Videri autem Plinium per Germanicum Sifer aliam intellexisse ab hac Pastinaca, quam marem Pastinacam vocant.

Sed ex Dioscoridis, Plinij, Galeni, & Columellæ de Sifere verbis corrigere conatur Columna plantam hanc à nobis propositam Antiquorum Sifer esse Sifer anti. absque dubio ullo. Radicem namque Pastinacæ latifoliam similem formâ & sapore, verum amariore, atque odoratiore omnesque Pastinacæ generi adscripsisse, atque Pastinacam vulgarem sive domesticam appellasse. In hac radice nervum inesse longitudine, qui eximatur, postquâ elixata fuerit radix, non solum dulcedinis causâ, sed quia tenerior sit pars reliqua exterior, ciboque aptior, atque gratior; hoc & in Pastinaca sativa vulgari & Raphano perspicui, præsertim cum radices sint bene adultæ, duriores enim tunc continere nervum cibo ineptum. Hanc postremò pro Elaphobosco aliquos depingere, ab illius quidem descriptione longè aliam: differre namque radices forma, sapore atque odore Anetho dissimili, foliaceo, compresso. Quamobrem non fore verendum dicere non esse Elaphoboscum, atque Siferi perquam congruere, cum sapore, formâ, æque usu antiquorum monumenta etiamnum retineat.

Elaphoboscum sativum hanc inscripuit Tabern. *Elaph. sativ.* hæcque de eo tradidit. Multiple opinio de hac herba habetur. Postquam enim quidam animadvertunt cum Pastinaca Dioscoridis & veterum eam convenire non posse, Sifarum statuerunt, non minus lapsu id afferentes, quam ij qui Pastinacam concludunt. Si planta hæc cum Elaphobosci Dioscoridis

Elaph. sativ.
Tab.

HISTORIAE PLANTARVM

Nomina
Varia.

scoridis & Plinij descriptione conferatur, nulla nota deesse deprehenditur, quæ huic non conveniat. Apud Dioscoridem itaque nominatur *ἐλαφόβοσκος*, *ἐλαφίον*, *ἀργύριον*, aut *ἀργύριον*, *οισιότινον*, *ἀλύν*, *ἐλαφίον* aut *ἐλαφίον* & *videtur*. Apud Latinos Elaphoboscum (vel ut Helychius & Varinus legunt *ελαφόβοσκος*, Elaphoboscus in masculino, nomine Oxytono) Elaphicū, Ophiogonium, aut Ophigenium, Ophioctonum, Nephrium & Cervicellus. Apud Herbarios Pastinaca domestica latifolia, ad differentiam Pastinacæ Dioscoridis tenuifoliæ, Pastinaca cervina, Oulus cervinum, Herba cervina, Pabulum cervi; & Matthæum sylv. Cervaria; Turnerum Pastinacam adulterinam. Quia autem sponte hæc in agris nascitur, eaque quilibet paupercula gens pascitur, Lobelio Pastinaca dicta videtur, quemadmodum etiam Staphylos à radicis rapo Bryoniæ (quæ *ἀδύνη* etiam vocatur) non ita ab simili appellationem transisse potuit. A Germ. dicitur Pastinaken / Pestinaken & Pasteney / Moren / weis Moren & Zant Moren / Dod. Birgmorelden / Birgang / burg Pastinack & birgfraut / Tab. Boijs Tanne Moren. Brabantus Pastinaken / hoff Pastinaken & Moren van die Boucniere. Gallis *Pastinades* & *gr. and Cheruy cultivée*, Dod. gall. Ital. *Elaphoboscus* & *Pastinaca domestica*. Hisp. *Canaboria blanca*. Arab. *Iezht*, *Gezar*, seu *Giezar*. Egypt. *Chemis*. Africanis *Ascaurau*, *Ascaucau*, & *Aldruachu*. Angl. *Perfenippe*. Boh. *Pastinaf*.

Locum.

Pastinaca Germanica sativa flore luteo, vulgaris in hortis Möltbelgardi, ut etiam in horto E.C. in quem hortulanus introduxit genus crassiore radice. Genevæ meo tempore pauci habebant in hortis. Scribitur hæc semine, & postquæ exierit, ut major efficiatur radix, transfertur, alitè tamen prius resosso atque stercoreato Solo, atque rariùs ut cætera olera depontur. Dalechapius alios sequutus, quia planta à se descripta plures habebat radices, putavit atq; scripsit, non semine, sed radice feri: sed hallucinatus est, quia sequi voluit Matthioli scripta, quæ à Marcello Virgilio, qui verbis tantum Dioscoridem commentatus est, ea transcripsit. Neque animadvertit verba illa Plinij: *Oculus ex radice excisus, ut Harundo feritur*.

Dalech. h. d. lueripatur.

Inulz satum, inquit Columna, non Siferis demonstrare, de qua verba faciebat. Idemque postea Inulam, Sifer & Pastinacam eodem tempore magnis seminum intervallis ferit: Sifer verò transferri melius. Quod Neapoli quilibet Olitor facit, prius verò semine ferit, deinde opportuno tempore prius altero Solo resosso & stercoreato, ut melius convalescant, atque grandiora fieri possint, radices transfert. Lotos amat pratenses. Augusto mense semen perficitur. Pastinaca latifolia sativa Dodonæo Iulio aut Augusto florem profert, semen deinde perficit, & altero ex quo vel lata, vel enata est anno. Radix Autumno & Hieme usque in proximum Ver elui aptissima est. Qui Hieme colligunt radices caveant à Cicutâ vel Cicutatâ. Dum sum Möltbelgardi vidi duas familias in quibus qui decepti edebant pro prædicta Pastinaca penè extincti erant, sed sublevati vomitu, Theiaca & Saxonicæ pulvere, itemque purgantibus, salvi evaserunt.

Tempus.

Cautio.

Vires & usus.

Hujus radices sapor est Pastinacæ (veterum, intellige cum Columna) amarior atque odoratior, aromaticum quid amplius habens, gustu gratior, quapropter etiamnum à multis feritur, & præsertim in Gallia Cisalpina, ut ab illius provincie incolis amicis accepit Columna, in cibo avidissimè expetitur, atque ut palato gratior fiat, illam ita parare solent. Radicem adultam accipiunt lavantque, sibtas parvas cultro excidunt, postea elixant, atque cum refrixerint, per longum dividunt, nervumque extirpant, atque in frustra dissectam, patella oleo ferventi ple-

requerendi
vires.

na, farina prius obductam piscium modo figunt, ea evadere sapore aiunt, ut nec pisces bene conditos eâ mensâ gustare comedentibus placeat amplius. Non igitur mirum, si Tiberius princeps, ut à Plinio fertur omnibus annis è Germania afferri jubebat, cum sit ita palato & stomacho grata atque utilis. Ex his itaque notum esse ait Columna, plantam hanc antiquorum usum Siferis, atque vires ab illis tributas retinere, quare alias plantas ab alijs descriptas minimè Siferis vires atque gustum & usum referre judicavit. Pastinacam autem venire in cibos elixam exempto nervo plures alij testantur, dein fixam more fungorum verno tempore referre quoque Cæsalpinus ex eadem cum saccharo Electuarium confici ad vires recreandas cõvalescentibus, & puerperis, communissimum rusticorum remedium: appetentiam quoque præstare. Tabernæmontanus inter vires multa recenset imaginaria. Ego naturali anthipathia aliquando abhorui, cogente tamen patre p.m. Ioanne Bauhino Medico, tandem comedi & nunc sapiunt, à jure tamen adhuc abhorreo, nec sine nausea assumo. Incidendi tandem, attenuandi, detergendi, obstructions aperienti facultatem inesse, sapor, odorque demonstrant.

DE SISERE VETERIBVS.

CAP. LXII.

Dioscorides Sifer notum esse proposuit, ut Censuræ radice costâ ori grata sit, & stomacho cõmoda, & urinam cieat, & appetentiam ad cibum provocat.

Plinius Sifer duplex statuit. Inter medica (inquit lib. 19. cap. 5.) dicitur Sifer & ipsum Tiberius princeps nobilitavit flagitans omnibus annis à Germania. Gelduba appellatur Castellum Rheno inscriptum, ubi generositas præcipua. Ex quo apparet frigidis locis cõvenire. Inest longitudine nervus, qui in decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magnâ parte relicta, quæ multo in cibis temperata. etiam in gratiam vertitur. Nervus idem & Pastinacæ majori, duntaxat anniculæ. Et lib. 20. cap. 5. Sifer erraticum sativo simile est & effectum, stomachum excitat, fastidium abstergit. Ex aceto Lasere pituitum sumptum, aut ex Pipere & mullo, vel ex garo. Vrinam ciet, ut Opcion credit, & Venerem. In eadem sententia est Diocles. Præterea cordi convenire convalescentium: aut post multas vomitiones perquam utile. Heraclides cor tra argentum vivum dedit, & veneri subinde offerant, ægrisque se recolligentibus. Hieronius idem stomacho utile videri dixit, quoniam nemo tres Siferes edendo continuaret: esse tamen utile convalescentibus ad vinum transcurrentibus. Sativi privatim succus cum lacte caprino potus, sistit alvum.

Galenus de Sifere, quod inter alimenta omittit, 8. simpl. hæc tantum tradidit. Siferis radix costâ stomacho grata est, urinam movet: secundo ordine calfaciens, ad jejum habens amaritudinem quandam, cum levî adstrictione.

Columnella de hortorum cura agens ait, Pastinacæ convalescit alitè pastinato, & stercoreato loco, sed quam rarissimè ponenda, ut majora capiat incrementa. Palladius quoque velut de nota radice tradit. His, quæ ante ex Plinio adduximus, hæc adjungimus, Siferis satus mensibus Februario, Martio, Aprili, Augusto, Septembri, & Octobri. Idem paulo post. Scribitur & Sifer, & Pastinaca utroque tempore, Vere & Autumno, magnis seminum intervallis, nec minùs quam tenerum pedum, quoniam spatiosè fructant. Sifer autem transfertur melius.

Sifari

Sisari nomen claturam variis adscribi plantis nos minimè latet. Ac primum quidem Sisarum dicitur de Erica H.n.g.lib.10.

De Sisaro multis dicto, quamprimum posthac pluribus dicturi sumus.

Alij Pastinacam tenuifoliam propriè Carotam appellatam ad Sisarum, vel Sifer referunt.

Sisarum verò alijs Pastinacam silvestrem Græcorum esse statuunt.

Pastinacam sativam latifoliam Germanicam luteo flore, quidam Sisarum esse contendunt.

Siferis tertiam speciem credidit esse Lacuna Pastinacam Germanicam silvestrem.

Tragus non vult Rapunculum à Sisari appellatione excludi.

Bathades Indica seu Ges vocata ab Adversariis inter Sisarum refertur.

Sifer palustre. H. Lugdunensis an est Oenanthe aquatica?

SISARVM MLTIS.

RADIX propter maiorem suavitatem cupediis magis expetita, quam Pastinacæ latifoliæ Germanicæ, quæ non ut in ea unica, sed ex uno capite



plures pendule, glandulosæ, tenerræ & fragiles, rugosæ, cortice tenui, pallidoque obductæ, pulpâ candidâ digitatâ crassitudine, pedales quædam, aliæ multò breviores, dulci & grato sapore, non nihil aromatico; caulis surgit sesquicubitus altus, singularis, geniculatus, striatus; folia pinnatim disposita, Bauciæ minora, teneriora, acuminata, argutis per ambitum denticulis crenata, umbella can-

dicat suaveolentium flosculorum, quorum singuli quinque foliolis, totidemque apiculis constant. Semen in umbella productum Petroselinii modo,

Figura nostra ex Fuchsiis minùs congruit, ac propterea aliam pingendam curavimus.

Commemorat plantam à nobis descriptam & iconemeliore propositam Tragus lib. 1. cap. 146. dicens. Summè mihi placet, quòd Pastinacæ exiguas, quæ Germanis Gerlin dicuntur, ad Sifer, seu Sisarum aliqui referant, hoc enim verum illud hortense est Sisarum; quo Tyberius Cæsar delectatus fuit. In Hist. germ. ait. Quæ Plinius lib. 19. cap. 5. de Sisaro dicit, quod Tyberius è Germania accerserat intelligo Pastinacam minorem, Germ. Klein Morellen/ Wurzel Moren aut Gerlin vocatam. Alibi Sisarum Columellæ esse Rapunculum hortense docet. An autem Columellæ sit Sisarum dubito, quia me latet an bis in anno feri possit.

Sifer feri solum fuisse olim in Germania cibi causa, eamque quotannis à Germanis flagitasse Tyberium Cæsarem, vel Cordus in Diosc. quoque testatur, qui hæc se ignorare falsus sit, quid sit, Brunellio tamen omninò subscribitur, esse sc. illud olus, quod Germani Gierlen / vel Gerele & Gierge vocant; Hesi Klein gel Moren/ alijs Wurzel Moren. In



Sylvatico: & fructum fert nigrum Ciceris magnitudine, humore plenum, ac sapore dulcem: qui granum Culcul dicitur. Pisi autem folium non habet Sisarum, nec fructum: nec granum fert nigrum, Ciceri simile. Vnde satis constat, Sisarum à Serapionis Secacul plurimùm differre: tantum abest, ut idem sit.

Matth. in Diosc. est Sisarum alterum. In post. comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Sifer primum, quod Dioscoridis, Plinij, Columellæ, Marcelli & Ruellij ait. Nec obstat unicus illi tantùm scrupulus, quòd in hoc nostrate Sifere nulla ferè percipitur amaritudo, cum tamen Galeno & Plinio Siferamarore non vacet. Verùm hoc à sua eum non deducit sententia, quòd regiones sæpè plantis immanent saporem, non tamen legitimum facit Sifer. Epist. ait, si huic nostro Siferi folia essent Pisi, non Pastinacæ; semen rotundum, nigrum, non latum ac foliaceum Lentis ferè instar, ut in Spondilio, cum Cordo sentirem esse Secacul, Serapionis sc. ut vult etiam Hieron. in epist. ad Matth. itemque Arnoldus referente Fæcio in Pharm. sect. 7. Ceterum si Matthiolus vidisset semen Siferis longum, non foliaceum, non diceret latum, ut in Spondilio: nec pictura ejus tale demonstrat: in Epit. meliùs dicit esse Petroselinii modo. Mirum Tragum alioqui diligentem in descriptionibus dixisse latum: quæ sequenti fortè Cæsalp. & Dodonæus etiam latum scripsere.

Tam Fuchsius, quam Matthiolus duo Siferis generibus, nera proposuerunt: sed ut in secundo consentiunt, ita in primo dissentiant. Cum enim Fuchsius pro primo exhibet Pastinacam sativam Germanicam, Matthiolus Carotam pingit. Descriptio interim, quæ subjungit, figuræ Siferis minimè respondet: ita enim describit: Sifer habet folia Olusatris, &c. Quæ descriptio non convenit primo Sisaro, non enim folia habet Olusatris, sed Carotæ. Neque etiam secundo, cuius radices non sunt dodrantes, sed vix palmares. Plinij auctoritati de Sisaro si standum sit, tum nec Pastinaca Germanica dicta, nec Carota Sifer fuit, inquit Turnerus. Vtramque enim se gustasse affirmat, sed nullam unquam in ulla amaritudinem deprehendisse, sive in matrice lignosa, sive cortice. In radice hujus Siferi levem quandam amaritudinem quidem pertensisse, sed non quantam Plinius requirere videatur, acrioremque quam a maiorem deprehendisse, talibusque facultatibus præditam, ut certò ausit Siferi genus pronunciare. At Pastinacam Germanicam quemadmodum Sifer Plinij esse non posse contendit, ita se non videre ait, cur [hæc lego, ut Turnerus inter Sisarum non distinguat] Sifer Dioscoridis esse nequeat, nisi quid

Dispens. supra dicorum & in Triphera Saracemica, Secacul, verum esse Sifer, quod Germani Gierlen / rom: Bavar. Wudel / Suevi Geyle vocant, concludit. Secacul autem non esse, negat Coldenbergius, & cum eo Dodonæus, dicens: Serapionis Secacul autem Secacul, de Serapione quo cap. 89. ut nō nulli existimant, haudquaquam est: Secacul liquidem folio describitur Iulben, i.e. Pisi, interprete Matthæo

Sisarum alterum Matthioli.

Matth. notatur.

Fuchsius & Matthioli sibi contrariantur.

Pineæ nuci simili lacæ Panacis nomenclatura à
Canarinis adscribitur.

CAP. LXV.

De Panace Herculeo Theophr. lib. 9. hist. ita scribit. Panax Herculæa constat folio magno & amplo, ut quoquo versus tres palmos perficiat, radice crassitudine propè digitū, bifidā aut trifidā, gustu

Cornarius licet omnia Panacis genera incognita esse afferat, tamen haberi hodie Opopanax notissimum officinis haud negat. De hoc succo igitur posthac nobis agendum erit.

PANACIS liquor Opopanax est. grumi sunt Pisi
circiter magnitudine, aut fabelli crassioris, multo
etiam aliquando utroque majores, coloris rufi fo-
ris, qui dissecti intrinsecus ex flavo albescunt, sapo-

re acri & aliquantum amaro, eo ferè qui in Ligustico nostro observatur. Sordidissimæ quoque subinde adferuntur glebæ, caulium scissuræ & arboris remissis, succo concreto, qui admiscetur, ex rasso nigricante. Sunt porro mihi à quadraginta ferè annis grumi & lachrymæ majores, quibus remixta latis magnasq; montes, sicut hæc autem aut Ferocul, lignosis caulibus, fungosa, alba semina oblonga, Ferula glaucæ feminibus magnitudinè ferè similia, tenuia, & ferulacea, valde striata. Quæ magnitudine reperimus, curavimus appingenda Galbanis ferè figere Lobelianæ, Sapanum: non tamen propterea dicimus eadem, sed ibi locavimus, quia nondum nos ubi esset, de Opopanax plantâ.

*Panax
Heracleum
in Apulia.*

Matthioli licet Panacem Heracleum [Spondylium majus] in Apulia frequens nasci dicat. Verum non ob id affirmaverit ejus lachrymam, quam officinæ Opopanax vocant, excipi in Italia. Nam quam Venetiis reperiri scribit, ex Alexandria Egypti convehi refert. Legitima porro, si ciple narrat, non desit, est adulteratæ frequentior sit usus. *Opopanax* quæ nunc tur Lat. *Opopanax*, Ital. *Opopanax*, Hipp. *Opopanax*. Angustia verò capitula vocat *Rampa d'orso*, dubitatque meritò an sit Panax Heracleoticum, siquidem odore non convenit cum Opopanax, quod hodie affertur.

*Opopanax
Rampa
d'orso.*

*Panax Heracleum
Matthioli
fert Opopanax
Cordis la-
psum.*

Panax autem Heracleum [Spondylium majus] non proferre Opopanax, sed Panax Siculum, quamvis parum, testis est apud Matthiolum Camerarius in Historia ejus germanica. Labitur itaque Cordus, qui ex Panace Herculeo, quod in Italia feri audit, radice incisâ, liquorem manare perhibet, qui Opopanax & Opopanax vocetur, cujusque frequens usus sit in Medicina. Nec scio quomodo possit demonstrari ex Spondylis majore parari Opopanax, id quod somniat etiam C. Bauhinus.

*Panax flore
candido
& semine
candido
hirsuto.
Menses mo-
tatur.*

Panaci inquit Cæsalp. lib. 7. cap. 53. ex Sicilia flore candido, semine candido lanugine hirsuto, magis congruit Panax Herculeum: ex quo Opopanax fuit radice incisa. Habemus Opopanax inter merces externas, quem Mesues inter medicamenta purgantia ponit, at plantæ figuram aliter tradit, ut Asclepium Plinij & Theophrasti videatur intelligere.

*Turquetus
repi. ch.*

Videtur inscienter liquores cum gummi confuisse Turquetus, qui Opopanax inter gummi recenset, cum nomen ipsum inter liquores referendum esse demonstrat.

*Vires.
Error quæ-
runtam.*

Mesues tandem scribit Opopanax, hoc habere peculiare, quod concitet stum, longè ergo aberrantij à suo proposito, qui ubi sitis urget, id præcipiunt. Panacis Heraclei defæctum opumi chirurgi, cum denudata ossa carne explere volent, radicem segmentis, quæ lachrymæ comparsa reperiuntur, seligunt, & ad hunc usum in pulverem redigunt.

*Ossa denu-
data.*

SAGAPENV M VETERVM.

CAP. LXVI.

*Locus.
Delectus.*

SAGAPENV M succus est herbæ ferulaceæ in Media nascentis. Præstat ex ipso quod pellucidum est extrinsecus fulvum, intus album, odorem inter Silphij succum & Galbani medium habens, acri sapore. Facit ad thoracis & lateris dolorem, rupta, convulsa, tussis veteres. Crassa in pulmone hærentia repurgat. Datur & comitialibus, opisthotonicis, splenicis, paraliticis, perfrigeratis, in febribus per circuitum repentibus in potu. Sed & in unguentis commodè adhibetur. Ducit & menses, & scetus corruptum cum aqua mulsa potum. Auxiliatur com-

Vires.

moris à bestiiis venenatis cum vino sumptum. Eadem eas, quæ ab utero strangulantur, si cum aceto ipsum olasciant. Deterit cicatrices oculorum, & visus hebetudinem & quæ pupillis tenebras offundunt & suffusiones. Resolvitur ut Silphij succus, ruta & aqua, & amygdalis amaris, aut melle, aut pane calido.

Inter Sagapenvum & Sagapenvon Plinius distinctionem facit, ital. 20. c. 13. de ipsiloquens. Sagapenvum quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Illud enim Ammoniæ lacrimæ simile Sagapenvon vocatur. Et subdit mox medicum usum, parum ut Dioscorides habet: Prodest laterum & pedationis dolonibus, convulsis, tussibus veteribus, excreationibusque, præcordiorum tumoribus. Sanat & venarum, præcordiorum, opisthotonicos, lenes, lumbos, perfrictiones. Datur & olascandum ex aceto in strangulatu vulvæ. Cæteris & potu datur, & cum oleo infricatur. Prodest & contra mala medicamenta. Iuxta hanc itaque distinctionem, videtur etiam lib. 19. cap. 18. Sagapenvum legitimum esse, non Sagapenvum, ubi ait, Sagapenvum & ipsum in hortis quidem nascitur, sed Medicinæ tantum.

Genus in peremian Ferulæ similem, Sagapenvum primariò vocari dicit. Abusivè verò ipsius succum esse non solum, sed Sagapenvum, sed Sagapenvum dicere. Addit idem eam stirpem debilem & inutilem esse: Succum autem calidum & tenuium partium, sicut alios succos. Idem lib. 1. de anti. d. Sagapenvum probari dicit, si aqua, aut vino nigeretur. Quod enim verum esse, dissolvitur non liquecente eo, quod tale non est. Non autem referre si quis Sagapenvum simpliciter, siue Sagapenvum succum nominet. Hæc enim revera cujusdam Ferulæ succum, quæ Panaci similis sit. Cornarius adhuc hodie notum esse ait officinis, sed corruptè Serapinum vocari. Hoc itaque notis suis sic delineamus.

SAGAPENV M.

SAGAPENV M guttis constat magnis, veluti Thussis mammosi, aut masculi (interdum in glebas magnas coactum) Opopanax modo, rufescentibus, intus corneo quodammodo colore præditis, subdente, vel etiam digito, lentescens albescentibusque, mordaci, acrisque sapore, odore viroso, candelæ, ad motus flammam concipientibus. assidue rariùs in massa inventæ, substantiâ fungosâ, albâ, foris purpurascens, rariùs adhuc caulibus ipsius portiones justæ, digitalis crassitudinis, striatæ, fibris longis contextæ, quarum spatia opplet fungosa, laxæque substantia. Semen quoque gemellum, Ferulaceo par, semina longius, semina ferè latius. Impurius sunt glebæ, quarum vix grumos inter noscas, ita omnes lutei concretæ veluti fuscæ, colore sordido, sapore & odore simili.

Valdè inscienter Turquetus Sagapenvum, quod non gummi, sed liquor Ferulæ fruticis est, cum gummi confundit.

Herba Costa, autore Cæsalpino, indicatur à quibusdam non immeritò Ferulæ genus esse, quod Sagapenvum fert de quo Diosc. Mesues & cæteri Arabes paulò ante verba fecerunt.

SPHONDYLIO, VEL POTIVS

Pastinacæ Germanicæ affinis Panax,
siue Pseudo-Costus flo-
re luteo.

PASTINACÆ in Montbelgardensi viridatio viget, Des-
folius sesquicubitalis longitudinis, latitudinis
cultris, asperis, hirsutis, atro virentibus cum nitore
quodam, in alas divisæ ex adverso fitas, easque rur-



puria compressa, lata, fibrinam albam habentia, cili in medio nigricent, acria & linguas mordicantia.

Non defuisse jam olim Matthioli temporibus impostores, qui ex Gargano Apulie monte quod ad Senenses advenxerint Pseudocosti huiusmodi radices, amari saporis, quæ facie quadantenus Rhubarbarum repræsentant, ipsimet passim fuisse in comm. conquectus est & contestatus. Has, inquit, pro legitimo Costo vendunt nostratibus paucis præsertim, qui in rei herbariæ cognitionem negligentius incumbunt. Plantam nos quoque etiam depingi curavimus (ea enim aliqui non est vulgaris iudicanda) ut ex ejus radicibus discant imperiti, cujus plantæ sint radices. *fortasse fiet, ut si illi imposturam hanc omnibus cognitam esse intelligent, cam desinunt hac facere.* His addit in post. comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Pseudocosti radicem geram, esse crasso cortice, carnosæque vestita, colore cinereo splendente. In hist. etiam Germ. cum addit. Camerarij Pseudocosti nomine, ut & in Epit. ejusdem, pingitur ac describitur, cognominaturque Costus vulgaris, officinis Costus, sed perperam: Ital. *Costo bastardo & Costo di Puglia.* Olim autem Matthiolus nullam habebat descriptionem, sed figuram duntaxat, ad hanc fortè plantam faciendam: non placet in versione germanica folia dic. den gelben Ruben similia, h. e. Carotæ luteæ, sive Pastinacæ Gæcorum luteæ sativæ, cum qua nulla similitudo ejusmodi sit.

Dodonæus in fine, sive Epilogo libri de floribus pro Panacis specie hanc pingit: In fol. lat. pro Panace peregrino, quod ubique describit, ac præterea dicit. Ex hujus vulnerato, præsertim circa radicem, quæ longa & candida est, caule, succus æstivis mensibus manet, sponte concretescens, Opopanaci colore similis, odoris quidem exigui sed gustu exalfaciens. Non modò aut in Italia, aut aliarum calidarum regionum hortis, ubi quandoque sentur, succus è vulnerato caule exit, verum & in Belgio observatum est, Æstate fervida hujuscemodi quoque lachrymam incisio scapo effluxisse. Atque hic quidem succus Panacis genus hanc stirpem esse evidenter ostendit: Quod & semen confirmat in Panacis lachryma reperiunt, ex quo Petro Coudenbergo pharmacopœo Antuerpiensi hæc primum in Belgio enata stirps est: Cùm autem Panacis multa existant genera, quodnam ex iis sit considerandum occurrit.

Tom. III.

Non autem illud radum Panaces, nec similiter Atle-
pion esse satis patet. relinquitur ergo, ut vel Chironium, vel Synacium sit. Chironium autem Panaces folium habet Amaraco simile, florem aureum, radicem tenuem, non altè descendentem, gultu acrem, ut quidem Dioscorides. Cum quo & Apulejus convenit: Panaces chironium, ait, folia habet Amaraco similia, flores aureos, radice tenuem, non altam, acerrimam. Theophrasti verò descriptio ab horum multum differens est. Chironium, inquit, folium habet simile Lapatho, majus ac densius, sive hirsutius, *δασύτερον*: flores verò auricolores: radicem longam: amat loca pinguis, *τα πηνα*. Eadem & Plinius lib. 25. cap. 4. nisi quòd radicem non longam, sed parvam tradat, facili lapsu ex *μακράν* in *μακράν*. Ter-
tium, ait, Panaces Chironium cognominatur ab inventore. Folium ejus Lapatho simile, majus tamen ac hirsutius: flos aureus, radix parva. nascitur pinguibus locis. Nicandri interpretis verba Theophrasti de Chironio adferens, non Lapatho, sed Amataco simile tradit. Chironium, ait, simile Amaraco, majus tamen ac hirsutius: flos aurei coloris: radix longa, loca maximè amat aquosa. Ex his cognoscere est, veterum auctorum loca quædam esse corrupta, veluti Plinij & interpretis Nicandri: Deinde duo esse Chironia, unum folio Amaraci; alterum Lapathi. Prius Panaces humilis ac tenuifolia stirps est. Amaracus siquidem (cui simile esse scribitur) herba est ramosa, per terram serpens; folia habens hirsuta, acrotunda, tenuifolia Calaminthes æmula, valdè odorata quæ coronis adduntur, ut Dioscorides sub sam-puchi nomine describens, testatur. Theph. l. 7. Amaracum inter urbana coronaria reponit, quæ lignosa, tenuifolia, & idcirco ad suffruticum naturam accedunt. Alterum verò, quod folia habet Lapathi, majora ac hirsutiora non temerè Helenium esse videtur: Apuleio enim auctore, Panaces Chironium Inula campana quoque appellatur. Nec refert quod Dioscoridis adferens descriptionem folio ipsum esse tradiderit Amaraci. Non animadvertisse enim potuit aliter à Theophrasto, quàm à Dioscoride describi; ut multa valdè oscitanter à multis veterum, & observata & posteritati commendata, atque ab ipso Apuleio, sunt. Cum neutro autem horum, Panaces hoc peregrinum convenit, neque enim tenuifolio suffrutici Amaraco simile est, nec folium habet Lapathi majus, sed si particularia segmenta considerentur, multò minorata. Iam & vulneratum æstivis mensibus (ut dictum) lachrymam istud effundit, qualem à Chironio Panace profluere, à nullo veterum memorie proditum reperitur. Ex quibus sanè constat peregrinum hoc Panaces, non esse Chironium, & illud de causis Syriacum illud esse, unde Opopanax colligitur, vel maximè apparet: Nullius enim alterius, præter enumerata, apud veteres memoria extat. Effluere autem ex Syriaco lachrymam Plinius lib. 12. cap. 26. aperte scribit: Theophrastus verò innuit, dum per mensem ipsum scari (succum videlicet colligendi gratia) refert. Quòd autem succus hujus peregrini Panacis in Belgio, eo qui in officinis reperitur, minis odore aut sapore præstet, regionis frigiditas in causa est: In calidis etenim regionibus omnia odorata & fortiora; in frigidis verò minis odorata, ac viribus imbecilliora gignuntur. Hæc in longura Dodonæus, cujus figura & Lobelij, satis exprimit nostram plantam, si folia non essent ita acuta & serraturæ adessent, & non nimum Lapatho similia, sicut si eandem plantam, quam nos intelligit

Non Helena, nec Synacium, nec Panaces

*Ter-
plini*

*Chironium
duplex.*

*Emulacra-
pana.*

*Chironium
Panace
non est.*

*Panace
Syriacæ est.*

Icon Dodonæi

Panax al- Lob. adv. p. 312. vocat Panacem alteram recentiorum
tera Lobe- Olusatris aut Pastinacæ facie, de qua ait. Veneto-

Diser.

rum quidam peritiores, etiamque Leo ille circula-
tor, alebant & ostentabant quandam Panacis spe-
ciem, ferulaceo caule, binum & ternum & quater-
num cubitorum, multos in ramulos superne diviso,
ferulaceis autem folijs, squabris, asperiorib. in sin-
gulis petiolis, singulis prodeuntibus, amplis, tharsi
instar plumatimque ex intervallis æquis, positu
Pastinacæ, & folijs constantem multis in uno petio-
lo, oblongo, Africani ferme floris: floribus luteolis
aut pallentibus, in umbellis Pastinacæ aut Bauciæ,
quam etiam assimilat tota planta hirsutie incanâ,
radice longiore, albida, necita dissimili. In Venetis
& Flandriæ hortis hanc meminit Lobelius se de-
gustasse gustu aromatico, calfaciente & digerente,
gummeo, opopanaceum succum redolente: quare
putavit hanc, ut si quam aliam, Panacem legiti-
mam. Sehenlis [Matthioli] porro in post. comm.
plantam hanc insertam, Costi nomine ipsique sæ-
pius ab Herbarijs Illyricis ostentam, quia nihil Cos-
ti dignum habet, sed potius facie Elaphobosci
est, illuc rejiciendam censet Costum hunc spurium
Matthioli. In obs. pingit p. 400. Panacis alterius
titulo, ibique Costi hujus spurij Matthioli varieta-
tem assignat folio rotundiore, hirsutius, breviori,
Pastinacæ vulgari, sive Elaphobosci, odore potio-
re. Idem Lob. in Icon. p. 762. appellat Panacem
alteram recentiorum, Olusatris, aut Pastinacæ
folio. Et nos in hac plantâ varietatem quidem
observavimus non parvam. Vere namque quan-
do provenit folia habet talia, qualia in Costo de-
scribit Lobelius, sed postea mutat.

Herba Co-
sta Cæsalp.

Herba Costa vulgè appellatur, auctore Cæsal-
pino, quia radices pro Costo in usum venerunt: foli-
a sunt ab radice humi strata, initio lævia, sed pro-
cedente tempore horrescunt: caules fert bicubita-
les, pallentes, hirsutos unde emanat lachryma,
ærei coloris, odorata, acris. flores lutei, radices cras-
situdine baculi in diversis partes tendentes, nervo-
sas, exterius subrufas, gustu fervente. Iudicatur à qui-
busdam non immeritò Ferulæ genus esse, quod Sa-
gapenum fert, de quo ante ex veteribus abundè sa-
tis diximus.

Panax Chironium Dodonzi, Lugd. p. 741. &
Pseudocostus Matthioli, p. 758. unam eandemque
æstimamus plantam. Neque duas sequentes Ta-
bernæmontani stirpes separamus, donèc nobis
melius constet, qua in re differant. De Panace
Herculeo 2. quod Panax turges aut Seylfrant
vocat, veteres nihil scripsisse ait, videri tamen,
sibi potissimum, Opopanacum confici ex hac plan-
ta: eam peritos Medicos & se recepisse pro pana-
ce Herculeo: habere enim succum gravis odoris,
ut Opopanacum: coluisse in horto Philippum Ste-
phanum Sprengerum, ex qua curarit depingend-
um: vulgarem alioqui esse in Belgicis hor-
tis. Alteram, Panaces Costinum nominat, Costen
Seylfrant / affirmatque hujus radicem falsè pro
Costo vero vendi, cum quo nihil habeat commune:

Herbarijs Costum Illyricum & Costum adulteri-
num dici.

Gerardo dicitur Panax Heracleum majus, Her-
culeus great woodwort. Bauh. phyt. & pin. Pa-
nax 1. (quali παναίον, omnibus remedium adfe-
rens) Pastinacæ folio, an Syriacum Theoph. Sapa-
pentum existimatum, Gels. h. Panaces peregrini-
um, Dod. Panax altera recentiorum Olusatris
aut Pastinacæ folio, Ad. Lob. Panax Chironium,
Lugd. Herculeum 2. Tab. Herculeum majus,
Ger. An Panacis Heraclei alterum genus, Cæf.
Sagapenum Diof. Item, Eid. Panax 2. costinum:

Costus, Matth. Lon. vulgaris, Cam. ep. Costus
spurius Matth. 1. Lob. obs. & Cam. Pseudocostus,
Matth. Lugd. Herba costa, Cæf. Panax chironium
Theoph. Cam. Panaces costinum & costus Illyri-
cus, Tab. Vnam enim non duas credimus plantas.
Panacis Heraclei genus alterum Cæf. huc non re-
ferimus, sed mox seorsim tradimus.

An Gels. hort. Panaces Heracleum, purcherri-
ma planta, Ollingero, Kreichio, Condensbergio: ex
eo colligitur Opopanax dictus succus pharmacopo-
lis. Vidit hoc aliquando in Italiæ hortis, aliqua cum
Spondylho similitudine, uti narrat. An Cordo in
Diof. Panaces Herculeum, in Italia à quibusdam o-
stentationis gratia seri solitum?

Montbelgardi in horto E. C. ex semine natum
perculit ab aliquot annis Hiemem & semen tulit,
folia producens Martij principio, florens Junio, se-
menque maturans Julio, semen tamen suspicio-
nem non proferunt futurum, videtur enim medullâ de-
stitui.

Excalscit & siccatur ordine secundo completo, au-
thore Matthioli. Aperit, abstergit, incidit, atten-
nuat. Amara est & acris. Pæstant (ut referunt, qui
comportant) Pseudocosti radices ad omnes cere-
bri, & nervorum frigidos affectus, ad pectoris vi-
tia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum om-
nium obstructions, & ad renem, vesicæ, & uteri
morbos. Ideoque auxiliantur diutino capitis do-
lore affectis, vertiginosis comitialibus, stupidis, vo-
cerionis, convulsis, reclusis, athmaticis, tussientibus,
istericis & hydropicis. Eadem status pel-
lunt, vermes necant, urinam ducunt, calculos pel-
lunt, menses & partus cient. Infunduntur earum-
dem decocta ad colicruciatus & coxendicum af-
fectus.

PANAX SICVLVM SEMINE hirsuto, folijs Pastinacæ sativæ.

PANACIS Herculei alterum genus ex Sicilia
ad nos (inquit Cæsalp. lib. 7. cap. 53.) tranflatum,
folijs constat in terra stratis, initio quasi Pastinacæ
sativæ, sævibus, sed procedente tempore in vastam
amplitudinem dilatantur, simul & asperitatem indu-
unt, segmentis amplis, se tangentibus, ut unicum
solum integrè figurâ cruciformi ad amplitudinem
cubitalem accedat: vere caulem attollit, anno se-
cundo aut tertio, bicubitalem, rubentem, lævem,
in quo lachryma concrevit colore flavo, idem
procedente tempore subhirsutus redditur: umbel-
læ insident amplæ: flore candido: semine crasso
& oblongo, candidâ lanugine hirsuto: radix
non magna, candida, quæ perfectò semine exa-
rescit.

Dioscoridis descriptio huic magis congruit, quàm
Spondylho majori, quæ quibuldam Panax hercu-
leum dicitur.

SPONDYLIVM EX VETE- ribus & in genere.

CAP. LXVII.

SPHONDYLIVM [σπονδυλίον] ex Dioscoridis
sententia, folia quidem habet Platano [πλατάνος]
vulgatam autem hanc lætionera veram esse, ex
Plinio facile intelligi potest, Goup. tamen vet.
quidam ad marginem [σπονδυλίον] legit, sed perpe-
ram.] quadantenus similia, ad Panacis foliorum si-
guram

gura accedentia : caules verò cubitali altitudine, aut etiam amplius assurgentes, fœniculaceos, semen in cacumine Sefeli simile, duplex, verum latius, candidius, & magis acerosum five palaceum, gravis odoris: flores albos [Ruell. addit, aut pallentes] radicem item candidam, Raphani similitudine. Nascitur in palustribus & aquosis. Semen ipsius [calidè, Ald.] potum pituitosa per alvum excernit, ac medetur etiam hepaticis, ictericis, orthopnoicis, comitialibus & vulvæ strangulatui. Profundiore verò somno captos suffitu revocat. Ex oleo commodè irrigatur in capita phreneticorum, lethargicorum, itémque caput dolentium. Cohibet & herpes cum Ruta adhibitum. Radix autem regio morbo laborantibus ex hepaticis exhibetur. Circumfusa eadem & indita fistularum callos exedit. Recentis verò floris succus, exulceratis purulentisque auribus accommodatur. Ceterum, reliquorum etiam succorum modo insolutus ad ulum reconditur.

Plinius. 13. c. 26. ubi de Panace, Ferula sui generis egit, inquit. Ab hac Ferula differt, quæ vocatur Spondylium, folijs tantum, quia sunt minora, & Platanis divisa. Non nisi in opacis gignitur. Semen eodem nomine Silis speciem habet. Idem 12. 4. c. 6. usum medicum Spondylii, planè juxta Dioscoridem præscribit. Spondylium, autem de monstratum, infunditur capiubus phreneticorum, & lethargicorum : item capitis doloribus longis. Cum oleo vetere bibitur, & in jocinerum vicijs, morbo regio, comitialibus, orthopnoicis, vulvarum itangulatione : quibus & suffitu prodest. Alvum molliat. Illinitur ulceribus serpentibus cum ruta. Flos auribus purulentis efficaciter infunditur. Sed succus, cum exprimitur, integendus est, quoniam mirè appetitur à mulsis & similibus. Radix densa & in fistulas coniecta, calum earum erodit. Aunbus quoque instillatur cum succo. Datur & ipsa contra morbum regium, & jocinoris vitio & vulvarum. Capillos crispas facit peruncto capite. Nec plura Plinius.

Galenus juxta traditionem, Spondylii semen acrem & siccandi vim habet. Quare ad helationem, & morbum conutialem, bonum est medicamentum. Prodest etiam morbo regio. Sed & radix similem vim habens in idem convenit. Insuperque callos ex fistulis aufert. Verùm densam infundere oportet. Sed & floris succus reponitur, ad diuturna aurium ulcera.

Spondylii sive *apollonios*, & *spondylii*, sunt qui Araneum, qui Phalangium, qui Asterion, qui Spondylida, qui Chordanon, qui Oenanthen vocent. Aegyptij Ap(s)pher, Magi Olyrida, Romani Herbam rutinalem dicunt. In animalium autem dorso, Spondylos Græci primum, privatimque in homine viginti quatuor vertebrae, quibus tota eorum spina constat, appellaverunt, inquit Marcellus. Quarum septem in cervice numerantur. Scapulares duodecim sunt. Lumbares vero quinque : omnes, uti dictum, viginti quatuor, quas sacrum excipit os, quod ex spondylis simul concretis constare videtur. Quo nomine non tantum hoc ex concretis simul quasi Spondylis constans, appellatur, sed quod utrinque illi conatum est, latum & grande. Spondylorum huiusmodi, quos latini vertebrae dicunt, nota omnibus forma est, tereti structurâ per media foramina à cerebro descendente medulla. Ab eorum figura & similitudine idem Græci in muliebri lamificio & opere Spondylos vocaverunt pondera, quibus mulieres in ducendo ex colo in flum li-

no aut vellere aliquo fufos suos tam diu libravit, donec multo filo graves alterius ponderis ope, ut ad rectos angulos descendant, non indigent. Ab his rursus ad plura translatum nomen hoc est, quæ brevitatis causa relinquimus, & à quotidiano notæ rei spectaculo multarum rerum descripta, signatæque forma & eventus est. Quod evenisse & factum ab antiquis in Spondylio hoc credimus, cujus semen Dioscorides Sefelis semini simile dixit, quod in Peloponnesiaco Sefeli latius cæteris & carnosius describitur, mox *Sennæ*, quod non est simpliciter duplex, sed latum & grande. Id enim in Græcis ea vox aliquando significat : quemadmodum in Latinis Maro etiam dixit in Georgicis suis.

— duplici aptantur dentalia dorso.

Nec multò post duplex per lumbos agitur spina.

Vbiq; enim ea vox latum & grande significat. Quod ad Spondylos manifestè pertinet, multoque certius, quod Dioscorides ait, Spondylium hoc à quibusdam Arachnen, Phalangium & Asterion vocari. Sunt enim in Phalangiorum genere decem ab antiquis privatim suis nominibus numerata. Inter quæ etiam est, quod acino uvæ simile vocatur. Descripsitque id Nicander in Theriaco in media alvo ex inferiore parte os habere. verticulus ejus est.

Spina dicitur quoniam dicitur arachnen & asterion.

Quod est, ut Plinius de eodem agens lib. 29. cap. 3 ait, Ore minimo sub alvo. Quæ acini rotunditas in ea, & in media alvo minimum os quasi pervium foramen muliebris vertit, illi formam effingit. Eamque ob causam Arachne, Phalangium & Asterium vocatur. Totius enim generis prima illa duo nomina sunt : Asterium verò ex eodem genere ab eodem Nicandro privatim descriptum. *Asterion dicitur à stella triplocho, &c.* Dictumque ab eo hoc est habere in tergo pingue quoddam splendens, discurrentesque in eo lineas quasdam fulgentes : à quorum non omnium similitudine, sed à priore illo quod acino uvæ Dioscorides semen primum, mox ex semine plantam, Araneum, Phalangium & Asteritium Spondylium herbam vocari ait. Nec obstat quod alijs & non *pozi* illi comparaverit. Ab imperitis enim, & qui tantum in genere araneorum id esse scirent additæ appellationes hæc fuerunt. Ex quibus non suspicari tantum, sed ratiocinari licet non aliunde plantam hanc Spondylium, quàm à Spondylorum in spina & phalangij illius forma dictam fuisse. Siquidem rotunditate duo hæc similia inter se sunt, & ambo perviam concavitatem habent, quæ muliebrium futorum verticillis similia etiam sint. Eodem pertinet, & quæ feminino genere Spondylas sequitur. Cæteræ appellationes incertam, Marcello referente, habent significationem : nec Græcæ magis, quàm Latine, ob quam causam nihil ultra de eis dicitur. Reliquum autem est, ut quibus plantis Spondylii, sive Spondylii nomen adscribatur, annotemus.

Spondylii igitur, sive Spondylii nomine sequentes donantur plantæ.

Branca urfina Germanica à plarisque & ferè omnibus censetur Spondylium veterum, de quo mox.

Spondylium etiam dicitur præcedenti similis, alijs Panax Heracleum, de quo postea sub Spondylio majore, sive Panace Heracleo.

Spondylium crispum, & aliud alpinum parvum C. Bauhini.

Spondylium aliud alpinum glabrum.

Spondylii affinis Panax quibusdam, de quo jam ante diximus.

Quidam, ut Gerardus, qui pro Spondylia posuit iconem Elaphobosci erratici, vocant Pastinacam Germanicam silvestrem Spondylium. de hac dictum ante.

Angelica. Non defuerant, nec defunt adhuc hodie, qui Angelicam Spondylium existimant.

Imperatoria. Spondylium quidam putarunt Astrantiam vulgò dictam, de qua antè titulo Imperatoriz.

Spondyli & Sphondyli sunt capita Scolymi de quibus H.n.g.lib.

Apud Galenum lib.8.med.par.pro *sephondyli* [Aceris] putat Cornarius fortè substituendam vocem *sephondyli*.

Plures Spondylii significationes, paulò antè ex Marcello hic adduximus.

SPONDYLIVM QVIBVS- dam, sive Branca ursina Germanica.

Spondylium caulem profert rectum, cubitalem & bicubitalem, striatum, hirsutum, geniculatum, intus concavum: folia Acanthi, aliis plerumque lacinia-
ta, & ex pluribus foliis singularibus, in alam di-

G V A R.

Deser.



gestis, costæ adha-
rescentibus com-
posita, tam pronâ,
quàm supinâ par-
te, tenerâ lanugine
obtectâ, sapore dul-
ci: flores umbellæ
latis orbem cir-
cinant: candidi, mi-
nimùm odorati,
quorum singulares
floresculi, quinque
cordatis foliolis cõ-
stant, hocce semen
excipit geminum,
oblongum, sapore
acrisculo. radicem
verò demittit altè
actam, crassam, ru-
gosam, carnè albâ,
succum remittentem
suberosum,
servido & subama-

ro sapore, linguam vellicantem.

Matthiolus ait semen Sefeli non ab simile, latius tamen squamosum, sapore in jucundo, ut quod ci-
mices ferme respiciat: radicem gustu non ingrato.

Cordus in Diosc. l. 4. c. 19. testatur hanc vulgò vo-
cari in Germania Brancam ursinam: Nicandro &
Plinio Bupleuron, & à veteribus Græcis etiam Bu-
plestin. Capite verò 55. Italos quosdam Panaces
Herculeum esse putare, nobisque Germanis semen
ejus, seu re exoticæ mittere, cum tamen apud nos
nihil hac vulgari Branca ursina ex ferulaceis her-
bis inveniatur. Item cap. 90. ait Spondylium La-
tinos verticillatam vocare, hodie autem ignotam
plantam esse. Ruellium tamen eam cognovisse, di-
xisseque à Galis Panacem silvestrem appellari. Sed
annotavit quidam apud Cordum, Ruellium procul
dubio sentire de hac herba, quam multi im-
periti apud Germanos Brancam ursinam falsò vo-
cent.

Branca ur. Tragus l. i. c. 145. Brancam ursinam inscribit,
pana Trag. aitque Germanos uon abs re ita dicere, cum folio-
rum formâ, quæ grandia habet, aspera, nigricantia,

& dissecta, anterioribus urforum pedibus satis re-
spondeat. Re ipsâ autem Pastinacæ genus ali-
quod mihi videretur (mox subjungit) nisi in præ-
sentia Olus atrum (quod apud Dioscoridem Gric-
lon, Aptum agreste, & apud Columellam Smyr-
nion: Theophrasto verò *πρωτόκλων*, h.e. Equi-
pium, G.m. Grosz. Eppich aut Kos Eppich cognô-
minatur) vocare liberet. Hic verò clamabunt ad-
versum me Iac. Manlius & Matth. sylvaticus, dicen-
tibus Olus atrum, aut ut ipsi loquuntur, olixatrum
esse Petroelinum Macedonicum & Alexandrinum,
id quod lubens illis concesserim. Siquidem Petroe-
linum Alexandrinum à nostra Branca ursina haud
multùm differt. Quam ob rem Brancam nostram
ursinam modo Olusatrum, Hippocelinum Germa-
nicum, aut saltè Pastinacam erraticam nuncupa-
bimus. Idem cap. 146. Branca ursina nihil aliud
est, quàm erratica Pastinaca & Apiorum maximum
genus: Pharmacopœi Germanici vocant Bauciam. Hæc
Tragi mens est. Sed is apertè hallucinari de-
prehenditur. Nec enim ullam nomenclaturam
ex veteribus, ab eo plantæ, de qua hic agimus, præ-
attributam quemquam intelligentem, veritatisque
studiosum, approbaturum speramus, quod nulla
conveniat.

Spondylii semine uti quosdam Sefelis vice, quod
alterum alterius effectus præstare existimant, re-
fert Matthiolus. Ipse porro Fuchius merito non
videtur Spondylium novisse, quòd ipsum u-
nâ cum Acantho depingat, vocetque in hist. A-
canthum germanicam, in Icon. Acanthum vul-
garem. Huic autem facillè imposuisse officinas
Germanicæ, quæ foliorum similitudine de-
ceptæ, pro Branca ursina Spondylium usur-
pant.

Apollo rad. 10. supra Martiaton scribit Manar-
dum lib. 18. epist. 4. Brancam ursinam à Galeno &
simpl. Bunion & Arction, nunc Arcticum, vocari
putare, in quem errorem quomodo delapsus sit,
vix sibi fidere posse, ut quod Spondylium aliquod
silvestre pro Branca ursina à Germanicis officinis
usurpatur.

Dodon. gall. inscribit Brancam ursinam ger-
manicam gall. *Branche ursine bastarde*, Pseudoa-
canthum, aitque hodie existimari esse *sephondyli*
Græcorum. Lat. in fol. non amplius existimat,
sed appellat ac facit *σπώνδυλον*, seu ut in Galeni-
xemplari legi ait, *σπώνδυλον*. Germanicæ autem
ac Belgij Officinas taxat, quod Brancam ursinam
olim (quod ipse in Hist. gall. fecit) appellarent, &
pro Acantho in decoctis ad enematæ temerè ac-
ceperint: atque inde perperam Germani *Beeren-
claus* Brabantii *Beerendaus* & Galli *Branche ursine*
vocant. Extare hujus inter spurias voces, hæc
ejus nomina *Αρκεύνη*, *ραλδύγιον*, *νίσυρις*, *σπώνδυλον*,
χρυσόανον, *εινδύον*. Herba rutinalis. Et sic etiam
appellat Carol. Steph. in horto, qui cum Angui-
lara testatur Spondylium, sive Sphondylium, visam
esse Panacem, aut ejus speciem.

A Lobelin Adv. appellatur Spondylium, Germa-
nis falsò Acanthum. Nulli, inquit, non regionis
sponte oritur, & pro Spondylia etiam vulgò no-
scitur: liquidem præter odoris gravitatem, à qua
propter virorem, Spondylium, qui itidem scætet
& radici similis est, dicta videtur: etiam nullat-
prosum deest nota, aut adversatur descriptio-
ni. Universe nonnihil seculi olet: & ab A-
cantho vero non modò vitibus, sed etiam toto
genere differt: nec enim spinosa uspiam: aut per-
inde emolliens, est. In Obs. pag. 401. in Icon. p. 793.
vocat Spondylium, Acanthus germ. Fuch. l. ij. Acanthum
autem Germanicum Fuchij non esse Acanthum

plicantur latam, florum alborum, cordatorum, quos excipiunt semina nostratis Sphondylii, nisi essent paulò majora, plana itidem, ut illa, duplicia alba, foris quatuor striis nigricantibus, internè facie duabus donata, gustu acri & aromatico, non tamen jucundè. Videtur à priori in eo potissimum varietate, quòd speciosior & major.

Heracleum.

Paravio attulit frater Panaces Heraclei nomine; indicassem Sphondylium, si nomen non fuisset adscriptum.

Panaces

Heracleum

an sit Mat-

thioli?

An hoc intellexit passim in suis commentariis & Historia germ. itémque Epit. cum addit Camerarij, per Panaces Heracleum, de quo ait. Panax Heracleum in Apulia frequens nascitur, quemadmodum in Apennini jugis, & in Argentario in nostris montibus Senenibus. Habetur in quamplurimis Italicis viridariis, ubi summa diligentia colitur ab his, qui simplicium medicamentorum studio si, ad suum aliorumque commodum innumera plantarum genera suis in hortis, ac viridariis serunt ac colunt. Verùm non ob id affirmaverim, ejus lacrymam, quam officinæ Opopanaxum vocant, excipi in Italia. In Panacis historia apertissimè aberravit Melues, quippe qui initio capitis omnia ejus genera confundat. Quod omnibus jam notum est, quàm ut ostendat. beat. *παναξ ηρακλειου* ut Græcis, sic etiam Latinis Panaces Heracleum nominatur. Arab. Scusfir, Ieusfir, sive Gausfir: Italis Panace Heracleo. Ceterùm,

Melues re-

prehenditur

Matth. no-

tatur.

Matthioli non describit in comm. suis: descriptio verò quæ est in ejus hist. & epit. cum addit. Camerarij, ubi flore ait luteo, est ex Dioscoride: si ei nota fuit planta, cur non descripsit? Considerandum etiam relinquo lectori, an non figura efficta sit, ad Dioscoridis descriptionem. An deniq; Spondylium majus intellexit necne, me latet: intellexit certè glossator & patrocinator.

An de hac Anguilla ait epist. 12. Anno 1541. in Bononiensi Apennino in Alpibus Sclarum, inveni plantam foliis per terrâ expansis, in quinque partes divisis, Fico similibus, asperis, caule albo, ferulaceo, in cujus summitate umbellæ seminis lati, còpressi & albi: radicibus multis, crassis. Tota planta odoris gravissimi. Postea multis in locis, ut in Noris montibus, & di Viso, & in Abruzzo supra petram Camella, ubi vocatur *Rampa d'orso*. An autem sit Panax Heracleum dubito, quamvis multùm conveniat, cum descriptione: Opopanaxi quod adfertur, non respondet odor: semen non acre, nec lanugo in caule, quam expetit Dioscoridis. Hæc ille, quem miror, quòd non annotaverit colorem floris.

Locum

Rampa

d'orso.

An Pan.

heracl.

Panax He-

racleum

Herculeæ

Heracleia.

Deser.

Locum.

An Lobel. adv. p. 311. Panax Heracleum, Hercules sive Heracleia, fronde Pasticacæ? De hac ait. Dixi Panacis nomen claturam communem fuisse pluribus plantis, quæ neque inter se faciè, nec planè viribus similes essent, magnæ tamen celebritatis commendatione κατὰ τὸ πᾶν, seu quemlibet morbum, doloremve abigerent, dictæ fuissent. Hanc autem et si Herculis nomine claram difficilè noscitur sit, quia quàm multis, quas novi, in nostro cœlo oriundas, effluat nullus succus, tamen non desunt, qui quandam in hortis coli non ita diu ceptam, mihi etiam (commonstrante doctore Aflatio) ruri lectam, veram asserunt. Verùm petmultæ sunt aliz huic nullà dote, aut notà inferiores: radix exigua nimis videtur, duùm cubitorum, caule ferulaceo enim [Lob. in Obs. p. 399. legit duùm enim cubitorum caule, lanugine quadam incano] foliis quadantenus Smyrnij aut Imperatoriz, sed lacinij, ambituque magis circinato, viridis, pallentique coloris, rigidis, & leviter hirsutis. Radix non perinde succulenta Ligustici, vel Angelicæ, umbellà latà, floribus luteis. Crevit suà sponte in illo saxoso colle, qui Fontignana redeunti Monspelium ad lavam est, propè aut ponè Sacel-

lum dirutum, ut me monuit Doctor & P. f. for Monspelensis Aflatus: sed studioforum accursu, qui avidè istam plantam in chartis servabant, deleta illic ferè fuit. His addit in Obs. p. 399. (ubi vocat Panax Heracleum, ita etiam in Icon. Plant. p. 701. inscribitur, Herculeam sive Heracleam, fronde Smyrnij, vel Imperatoriz) in Belgij hortis flores quidem albos promere: meminit tamen se vidisse Venetiis Panacem, faciè non diversam in Franciscanorum Paradyso floribus luteis. Nos, ut verum fateamur, non intelligimus Lobelium: si ille Panax suum iconè non expungeret, assereretque Spondylium alterum esse Dodonæi, nos aliam intelligeremus plantam. Hæc etiam Lugdunensis credidit esse Spondylium Matthioli, quæ est Branca ursina germanica.

An Ponz in Baldo Panax Heracleum Herbariorum in horto proveniens.

Clusius apud Dod. gall. in fine Historiz lib. de gummis cap. 9. figuram habet ex Matthioli, quam non describit, vocans solummodo *παναξ ηρακλειου*, & Panax Gileni.

Dod. lat. in fol. Panaces Heracleum, vel potius Spondylium alterum inscribit, ac descriptioni Panacis Heraclei Dioscoridis respondere ait, excepto folio floris colore in Belgij hortis subinde reperti, quem Heracleum Panaces vocant. Spondylion autem hoc adeò simile esse affirmat, ut majus, vel alterum genus esse appareat. Ostendi hoc, uti dictum, pro Panace Heracleo, tametsi flos non luteus, verùm candidus sit: Lobelium tamen se floribus luteis istud vidisse scribere: Matthiolum & tale aliquod picturà exhibere, quod in Apennini jugis, in Argentario promontorio &c. Sibi non constare Panaces depictum legitimum, idèd maluisse Spondylium alterum aut majus appellare.

Gesneri in app. hort. Panaces Herculei planta, sibi à Calceolario missa, fortè fuit Spondylium majus, de quo fortasse quoque scribit de hort. vocans Panaces Heracleum, visum aliquando ab ipso in hortis Italicis, aliqua cum Sphondylion, dicto Branca ursina, similitudine, majus. Videndum tamen an Spondylion affinem intelligat Gesnerus, de quo postea dicturi sumus.

Traditur à Cæsalpino pro Panace Herculeo, vulgò ab Italis Panacea vocato, Ferula in Alpibus. Is autem asserit Panacis Herculei Dioscoridis descriptionem, præter floris colorem candidum, & caulis altitudinem in cæteris conditionibus huic convenire, sed magis adhuc Panaci ætati ex Sicilia translati, nempe Panaci Siculo semine hirsuto, de quo suo loco.

Lugd. duas icones ponit, quas ejusdem plantæ existimat Cam. & frater C. Bauhinus, mihi tamen adhuc non certò constât, an Panaces Heracleum Matthioli, quod Lugd. p. 716. pingit, idem sit cum Panace Heracleo Lobelij, & Sphondylion altero Dodonæi, cujus iconem dedit Lugd. p. 740.

Panax, sive Sphondylii folio (inquit C. Bauhin. phyt.) quod Panaces Heracleum Matthioli & Lobelij floribus est albis: luteis Dioscoridis, quales se vidisse testatur Lobelius. Apud Matth. ait Panax Panaces Heracleum, Matth. Gesn. h. & ap. & Cordi in Diosc. Hujus plantæ densata lachryma seu liquor Opopanax dicitur. Gesnerus autem an hanc plantam intellexerit, consideratione dignum fieri potest, ut eo modo quo dictum, continetur sub Panace. Cordum hanc plantam vocasse Panacem Heracleum non faciliè crediderim: ex Spondylion collig Opopanax non video quomodo monstrari possi Panaces tandem Herculeum Matthioli Lugd. p. 739. & Panax Heracleum Lobelij p. 740. duas distinctas esse plantas in Animad. non agnoscit, sed Lobelij figuram

figuram meliorem tradit, qualemque Lobelius describit, talem in viridariis Italæ selegisse testatur. Eid. B. pin. Panax. 3. sphondylii folio five Heracleum: Panaces Heracleum, Matth. Ang. Geln. h. Lac. Cast. Lugd. Panax Heracleum, Lob. Dod. Ger. Panax herculeum, Czf. Primum, Tab. Sphondylium alterum, Dod. 8. Nobis tamen uti dictum, haud est apertum, an Matthioli Panaces idem sit, cum Lobeliano.

Tabern. dicitur tam in Icon. quàm in Hist. Panax Heracleum, aut Herculeum 1. Panax fraut oder wurzel. Item in Icon. Sphondylium 2. Bcerenclaw: In Hist. Sphondylium 1. speciosius, pulchrius & majus. Icon Sphondylii primi fortè facta est ad imitationem Panacis Heraclei Lobelii: miror autem eandem herbam duabus imaginibus diversis locis exprimi: descriptioni Panacis Herculei non respondet: mutatio in numero & transpositio est fortè ex errore Typographico.

Gerard. appellat Panax Heracleum Bercules Alheale. Schvvenck. Panax Heracleum, Brancam ursinam alpinam, grosse Bcerenclaw.

Hoc Sphondylium non est ita vulgare, ut prius: provenit in pratis humidis [in montibus herbidis locis fruticat, S. hvv.] chyosis: meret autem plationem in hortis, ubi pulchrè evadit, in tertium usque annum durans, semènque proferens maturum.



pediculo, palmum longa, duas lata sunt, communiter tripartitis, sed non vq; ad pediculum divisus, per marginem crenatis: quorum inferiora pediculis palmaribus, hispidis & subspectis donantur: caulibus summo, umbella flosculorum candidorum, sed quam in reliquis speciebus minorum, insidet: semen succedit subrotundum, planum, cujus summitati apex insigitur. Hoc solum in monte VVasserfall & quidem ab anno 1595. usque ad præsentem annum 1618. Julio mense & florentem & semine prægnantem, observavi inquit C. Bauh. qui in Prod. pro tertio Sphondylia describit, & quartum in pin. facit, & in phyt. sub 2. proponit.

dem ab anno 1595. usque ad præsentem annum 1618. Julio mense & florentem & semine prægnantem, observavi inquit C. Bauh. qui in Prod. pro tertio Sphondylia describit, & quartum in pin. facit, & in phyt. sub 2. proponit.

SPHONDYLIVM CRISPVM.

SPHONDYLII Brancæ ursinæ dicti magnitudinem non excedit, verùm folia paulò minora sunt, nec ita aspera, crispà, visu amœnà in cæteris, ut caule, flore & semine, itémque radice Spondylia respondet.

Nec ita frequens occurrit, Spondylium 3. five crispum Tabernæmontani, qui id mediocriter abundare tradit, ad Sarz fluvij ductum, inter Saralben & Sarbrucken in pratis.

An C. Bauh. pin. Sphondylium 2. hirsutum foliis angustiorib; hoc in prod. pro primo sic descripsit: A vulgari foliis solum differt: nam cum vulgare folijs sit amplius, plerumque ex quinque partibus latis subrotundis compositis: hoc solum habet, in lacinias oblongas, angustas, acuminatas, hæque in alias, inordinatè tamen divisas, & per marginem crenatas, Hoc in pratis alpinis Rhæticiis observavi: dein ex Lusatia à D. Franco accepi.

SPHONDYLIVM ALPINVM parvum, C. Bauhini.

EX radice caulis assurgit pedalis, qui in summo in alterum ramulum triëalem, dividitur: quem folia cingunt pallidè virètia, longis pediculis donata, quæ in partes tres, vel etiam quinque alias subrotundas, alias acutas, per marginem crenatas & hirsutas dividuntur, umbella flosculis candidis, latis tamen, summo cauli insidet, quibus semen plenum, latum ac tenue, succedit. Tota planta levissimis pilis pubescit. Ex Austria alpinus, D. Burserus misit auctori C. Bauhino, qui secundum facit in Prod. & tertium in pin.

SPHONDYLIVM ALPINVM glabrum, Ejusdem.

RADICE est crassà, & aque albà, caule bicubitali, geniculato: folijs siculneis, glabris, quæ absque Tom. III.

TATARIA HVNGARICA E-
dulis; Panacis Heraclei folio, semine Libanotidis cachryferæ.

NON vulgaris est planta, quæ radicem habet crassissimam & longissimam: nam brachialis crassitudinis, & cubitalis longitudinis, aut etiam ampliores aliquot accipere meminit Clusius, hujus historig author, ab Ill. Dn. Balthasare de Bathyá, qui in ejus gratià ex Vngaria trans-Danubiana adferri iussit, ut in suum hortum Viennæ transferret. Illis autem folia emerferunt Rapi foliis non valde dissimilia incisuris & laciniis, breviora tamen, & verius ad Panacis foliorum formam accedentia, rudi atque asperà lanugine prædita, ex viridi pallèscencia, alia deinde paulò minoribus incisuris divisa, nec minùs aspera, inter quæ assurgebat caulis cubitalis aut amplioris longitudinis, pollicaris verò crassitudinis, striatus, concavus, & nodosus, perinde asper ac folia: quem lato pediculo amplectebantur minora folia & multifida, asperà etiam lanugine obrita: summus caulis in umbellam definebat, Panacis Heraclei umbellis similem, in quibus flores & formà parviores & colore, quibus evanidis, succedebant rara (nam singuli flores non sunt fecundi) semina, valde crassa, nec valde absimilia semini illi magno & striato Libanotidis cachryferæ. Biennio quidem eas radices aluit Clusius, ante quàm una illarum & caulem & semen proferret: deinde corruptæ sunt, tàmque foetidum odorem exhalarunt, ut horto fuerint eiiciendæ.

C. Bauh. pin. Panax 4. five Panaci Heracleo similis Vngarica.

Hujus porro radice Vngari Agriæ vicini, atque etiam ulterioris Daciæ contemini, in annonæ caritate & inopiâ, vescuntur alterius panis in jurâ, ut Clusio asseriebant non modo Heros ille Illustris, sed etiam alij nobiles viri, qui in ea provincia vixerant. Quæ adeò res effecit, ut dubius esset, an eadem esset, cum Balthacran in Tartaria nascente, de qua mox Balthacran agendum.

Maximo est in usu apud Tartaros hæc planta: nam abique eà, per magnas illas solitudines, in quibus

bus nihil edule reperitur, iter facere non possent itaque eà natà suas peregrinationes instituere solent.

Tataria. A Tartaris fortè hujus radices usum edocti sunt Vngari, propterea què Tataria nomen illi dederunt: Tarentum, ut & Germani, vulgò appellant, qui nobis Tartari dicuntur.

Chara radix. An verò huic similis, radix Chara, quà lacti adinstà, Cæsaris milites in opiam levasse legitur, indagandum proponit Clusius.

LIBANOTIS THEOPHRASTI

quorundam, sive Seselei Æthiopicum

Matthiolo, Cervaria alba.

CAP. LXVIII.

Diser.

GUARA.



verso sita subdividuntur. umbellæ latæ. Flores albi. semen gemellum, octo angulis donatum, cum quadam acrimonia & amaritudine.

Seselei AZ. Clusius sic describit. Seselei Æthiopicum Matthiolo nuncupatum, uberrimè nascitur per omnes Vngariz, Austriæ & Stiriz silvas, ubi illius folia in tantam amplitudinem interdum evadunt, ut palmum æquare possint: habent verò magna ex parte singulæ foliorum alæ quina duntaxat folia, uno extremam alam occupante, per ambitum serrata, supernè atro-virentia, infernè subcineracei quodammodo coloris: caulis bicubitalis est, aut amplior, geniculis interceptus, & supernè parte in aliquos ramulos divisis, sustinentes exalbescensium flosculorum umbellas, qui in oblongiusculum & angulosum semen transeunt. Cuminum aut Sileris montani semen odore & sapore referens: radix pollicaris aut amplioris est crassitudinis, crassioribus aliquot fibris prædata, & crasso cortice, sapore initio dulci, deinde amaricante, supremo capite hirsuta (veterum foliorum, quæ marcidia evanuerunt, fibris eam hirsutiem facientibus) perennis.

Folia.

Caulis.

Flores.

*An Seselei
genus
germ. Trago*

An est Trago Seselei genus, quod in silvis Germaniz provenit, caulèmq; fundit procerum, cuiusque non alter, atque anethum in fastigio umbellas ferentem in quibus semen à maturitate videre est oblongum, & angulosum, gustanti acre veluti Gingiber. Radix hujus prælonga est, sicut Pimpinellæ magnæ, odoris gratissimi, gustus verò acris: Seselei hoc secundum, quod oblongo prægnat semine, Dodonæi. *βίσηλον* vocant, h. e. Seselei

Massiliense, & *σάβιλον* dicitur: Hippocrati Seli, & Sili appellatum. Hoc in Gallia Saxifragia major ab herbatis existit, teste Ruellio l. 3. c. 42. Germani Seselei, aut Langen wald Fammel / h. e. Cuminum ilvestre oblongum vocantur, inquit Tragus, cuius verba ut verum fateamur, de qua stirpe accipienda sint, aut possint, ignoramus! suspicamur eum de non bene nota planta dicta hæc tradidisse: nec existimamus appellatum esse Saxifragiam majorem.

A Fuchsi. Ic. inscribitur Seselei Æthiopicum, vocatur: In hist. Dauci alterum genus, ubi icon sine descriptione, præterquam ex Dioscoride proponit, quæ nullo modo convenit: nulla folia Apij, huic Dauco secundo Fuchsi.

Matth. in suis comm. etiam cum mag. fig. itemque hist. germ. & epit. cum addit. Camerarij sub titulo Seseleos Æthiopicus ponit nudam figuram suo more, quasi nunquam viderit plantam, quam tractandam suscepit.

Lon. l. 5. c. 305. vocat weiß Birzwurz / Elaphobosum Dioscoridis, Pabulum cervi, Ocellum cervi, Gratiam Dei & Copariam. Idem cap. præcedenti hujus aliam habet iconem sub inscriptione Seseleos fecundi, sive Seseleos Æthiopicus, ita ut duas imagines unius plantæ diversis capitibus exhibeat.

Dod. gall. facit tertiam speciem Libanotidis, nominatque Libanotidem Theophrasti, quod Ic. is hanc descripsit, eiusque semen Canchryn aut Canchryn appellaverit. Lat. in fol. Seseleos Æthiopicus herbæ titulum ei fecit, cognominatque Seseleos hoc genus, Seselei herbaceum, quo nomine etiam describit, & dicit: Depinxere istud legitimo Æthiopico [Seselei sc.] Fuch. Trag. & quandoq; Matthiolo: at verum ac legitimum Æthiopicum, fruticans solummodo est. He. baceum ad Theophrasti Libanotidem citius referendum, quod folia ait habere in claus. e. palustri Apio majora, caulem ad magnitudinem cubiti: fructum candidum, præterquam asperum, & oblongum, quale herbacei Seseleos semen. Dod. gall. scripsit radicem albam: verum ibi nulla descriptio, præterquam Dioscoridis, sed sola icon. Vbi Tragus hanc depinxerit nomine Seseleos Æthiopicus me latet.

Lob. adv. p. 337 non multum videtur abesse à Theophrasti Libanotide, quam Commentatorem, si vidit tamen haud rectè descripsisse ait, verum suo pictori præcepisse, ut pro Æthiopico Seselei sculperet, qui perperam æmulatus sit iconem ex commentariis Dodonæi, cuius mentionem nuppiam cur non fecerit, facillè subodorari. Lobelius autem hic ait Theophrasti Seselei herbam memoratam, sibi nunquam visam. Idem p. 281. de Seselei Æthiopico vero ad finem dicit adversus Matthiolum, quod sit verum Seselei Æthiopicum, ut saltem hoc in Dodonæo pictum, vivum in agro vidisset Commentator, lubens & volens suffecisset in locum hujus plantæ, cui videtur postposuisse: est enim hæc non frutex sed herba, quam recentiores Libanotidem Theophrasti prodiderunt, viribus & figurâ aliena à Seselei Æthiopico, quod fruticem, adeoque magnam, Dioscoridis correctior codex esse statuit. In obs. p. 402. in Icon. p. 704. Libanotis Theophrasti. Gess. h. Libanotis ferulacea alba Dodonæo. Tab. ic. & hist. Libanotis Theophrasti alba major. Gross. weiß. Birzwurz. Item: Libanotis Theophrasti alba 2. Vna suffruticosa, altera. Leg. p. 28. Seselei Æthiopicum Matthioli. Item p. 765. Libanotis Dodonæi. Et: Dauce alterum genus Fuchsi. Infra tres figuras: una plantæ habet Lugdunensis: C. Bauh. ura Dodonæi tatis erat. Cam. h. Seselei Æthiopicum Fuchsi. Bauh. phyt. & apud Matth. Libanotis 3. sive latifolia altera, Seselei. Trago. Hujus verò haberi & alteram

speciem testatur frater in Baldo, latoribus foliis, nigroribus, magisque incis. *Deser. Folia.*

Thurnisus de hac fortè intelligendus lib. 1. cap. 29. cum ait: Sardinisch aut Rott hirscht war;: Causimon & Timoleon: Cervaria: Iudaicè Zibi Zanab: Græcè ἐλαφύρις. Quidam existimant haru a herbam unam ἐλαφύριον Dioscoridis lib. 4. cap. 8. Plinij lib. 22. cap. 22. alteram Pabulum Cervi, & Graciam DEI, & walds Salbey: propter formam capillorum posset esse Zibi Zanab, quamvis forma & loci situs non ita manifestè, ut virtutes, id demonstrent. Non dubito herbam esse, de qua Plinius lib. 8. cap. 32. dicit Græcorum fœminas se purgare ante partum. Vandali vocant Zehlehnwij, posset vocari Berz-tourg. In Syria vocatur Malz. ex hac herba fit Matzlack Turcis usitatum &c. Oleositas ejus vocatur Behalah aut θυμωδύνη. Descriptio Thurnisij videtur demonstrare plantam de qua hoc capite tractamus. Figura autem nihil tale ostendit. Quis quæso ex ejus figuris dignoscet plantas? Quale discrimen inter ejus Elaphurin & Tordilion, sive ἑλαφύριον ac alias similes. Planta de qua Plinius loco citato, dicitur ei Sefeli.

Libanotum Theophrasti Dodonzi, sive Sefeli Æthiopium Matthioli inveni Burmij in Rhetia, Julio menis florens, inter saxa Basileæ in monte Moutez semine maturo Augusto. Lugduni. Genevæ & Môtbelgardi in hortis. In monte Baldo observavit Bechius & Pona. Cervaria alba, referente Clusio, floret Junio, interdum etiam serius, semen Augusto maturat.

LIBANOTIDI THEOPHRA-
sti quorundam valdè similis, Costus
amara dicta, semine
crispo.

CAP. LXIX.

ACCIPIMUS olim à Domino Agerio Medico Argentineni clarissimo, & stirpium indagatore diligentissimo, stirpem collectam in Italia monte Sumano, cum inscriptione Costi amari. Erat hæc sanè valde similis Libanotidi Theophrasti quorundam, à nobis jam jam tradita, quoad folia, in quibus, hoc discrimen observo, quod minus & rarius ferrata, & quædam vix ferrata, nobis etiam videntur tactu crassiora: folia per caulem, quæ serratura omni penè destituta, habent pediculum caulem amplexantem, qualem etiam jam dicta: umbella ampla: semina oblonga crispa, nihil amaricantia, cum acrimonia.



Lobel. in Obs. p. 704. tradit Libanotidem Theophrasti majorem, cujus descriptionem, sequenti capite adscribemus, quæ non respondet iconi suæ. Ideo perpendendum an eâ

descriptione hanc intellexerit, de qua hîc agimus: dubium nobis movet, quod dicat folia amphiora, verum cultura fortè in caula.

LIBANOTIS THEOPHRASTI
quorundam, folio minus rotundo.



ANNO 1595. Heil delberge in hort. D. Sprengeri insignis pharmacopœia & Botanici, collegi folio amplissimo, cubitali, tripartito, & tripartitis denud brachiis, in terna quoque plerumque foliola definitibus, sublonga, minus rotunda, quam in præcedenti, ferrata, postremum etiam interdum trifidum: infernâ parte magis candicant.

Descriptit Lobelius herbam, quam qualis, in Obs. p. 401. in Icon. verò Plant. p.

704. titulo Libanotidis Theophrasti majoris imagine sculptam dedit, quæ plantæ huic nostræ optimè respondet. Descriptio autem ejus, nec cum nostra, nec cum ejus iconè convenit. Ea talis est. Varietatem folijs magis carnosius, rotundioribus amplioribusque nitentibus semine cristato, Lutetia missam alunt vireta Belgicæ: cetera similia & re ipsa una.

A C. Bauh. phyt. appellatur Libanotus altera latifolia major.

LIBANOTIS ALTERA QVO-
rundam, alijs dicta Cervaria nigra.

CAP. LXX.



RADICES plurimæ res digitales, capite Mei instar capillato, in unam coeunt, quæ sensim attenuata pedes duos aut tres horsum illorsumque vagatur, altius humo depacta, foris nigricans, intus alba, lentâ mucaginem, vulnerata manans, sapore resinaceo, aromatico, grato, ad Pastinacæ Germanicæ accedens saporem: substantia teneriuscula: folia cubitalia quæ tum à radice, tum caule oriuntur longis, appèsa pediculis, aliquatenus

Petroselinij Macedonici divisa & effigie, rigidiora, glabra, glauci ferè coloris, crenata, sapore remissiore, quam radix: caules autem serulacei, striati, duos, tres, quatuorve cubitos alti & in alas divisi, umbellas sustinent amplissimas, flosculorum albicantium, foliolis quinque constantium, priusquam de-

Semen. hifcant purpurascunt: semen latum ad Pastinacæ latifoliae semen nonnihil accedens.

An Daucus secundus Trago? An Trago lib. 1. cap. 148. Dauci secundum genus, cui in h. st. germ. (ubi die ander Beerwurtzel vocat) radicem assignat foris nigram, supernè hispida, ferventem, acrem & odoratam; folia autem instar Petroselinii vulgaris dissecta, sed majora. Audivimus, ut refert, qui hanc nominarent *Bertzwurtz*: ipsi tamen videtur Peucedani species, aut Sefeli Creticum. Idem paulo post, sibi non constans, inter Daucos, vel inter Tordyla referri posse putat.

Sefeli 3. germ. An eidè l. 2. c. 120. Sefeli 3, five Sefelis genus alterum in Germaniæ silvis proveniens, lato instar Cimicini, aut Pastinacæ semine, *παρακίμινον*, latum Cyminum ipsi dictum, Dioscoridi verò Peloponnesiacum nuncupatum, quod Germanos Breitenwald Bümel/h. e. Cyminum silvestre lati nominare posse ait, ac sic describit: Alterum [Sefelis genus in silvis Germaniæ proveniens] caule & folijs evadit altius & crassius, ita quidem ut non raro caules proferat bicubitales, digitumque crassos, uti Cicuta, folijs paucis, iisque vulgare Petroselinum referentibus, sed majoribus, gustuque acrioribus, denique & nigricantioribus vestitos. Umbellæ hij ferunt, exiguis candidisque flosculis emicantes, qui in semen abeunt latissimum, perque omnia Pastinacæ similitum, sed non ita scabrum, verum acrius eadem. Radicem habet hoc Sefeli admodum longam & teretem instar Foeniculi, hiemis patientissimum. Nascitur in altissimis silvis humo arenosâ. Hæc

Trag. tax. nov. Tragus, qui nec Sefelis sui tertij, nec Dauci secundi figuram exprimit. Quò denique hoc ejus S. seli sit referendum, adhuc asserere non audent, idè què ejus descriptionem datà operâ hîc adscripsimus.

Sefeli Peloponnesiacâ Fuchsi. c. vocat Sefeli Peloponnesiacum, *Schwartz Birtzwurtz*: In h. st. (ubi iconem sine descriptione propria pponit) ea enim, quâ habet delineationem, est Dauci tertij Dioscoridis) Dauci tertium ger us, quod ait in alis montibus provenire, quod nos non observavimus. Cornarius appellat Radicem cervinam nigram, càmque quosdam Libanotidem secundam fertilem esse putare narrat. An Corda in Diosc. Ambrosia, quam falsò quosdam *Birtzwurtz* putare scribit?

Matth. tax. natur. Matthiolus suo more hujus iconem proponit absque descriptione, quæ convenit cum planta, quam hoc capite proponimus. Inscribit autem eam in comm. cum mag. fig. lat. & ital. Daucum secundum. in epit. etiam cum addit. Camerarij Daucum alterum, *δαύκον ἑτερον*. Hic ejus Daucus, quem Coriandri folijs provenire tradit, & semine Cumino simili, in h. st. germ. chalcographorum negligentia, dum Pragâ, grassante pestilentia abesset, secundum Peucedani genus, five Cervariam repræsentavit. An eidem Elaphoboscum in Italia inventum, plurimum tamen à legitimo dissidens?

Libanotis altera Dod. gall. Dod. gall. iconem Fuchsi proponit, cui Libanotis altera titulum apposuit, semineq; lato, Angelicæ ferè simili tradit. Miramur autem eum hanc stirpem in fol. lat. omisisse, quasi ei non fuerit nota.

Syn. Gess. Gess. h. dicitur Libanotis ferulacea nigra Dodonæi. Item: Cervaria radix nigra, & Oreoselinum nigrum. Ego Gesnerum apud Cordum in Diosc. l. 3. c. 86. pro Sefeli Æthiopico, Peloponnesiacum voluisse dicere existimo. Libanotidem, inquit, secundam quidam putant *Schwartz Birtzwurtz* quam

Sefeli Æthiopica alij Sefeli Æthiopico faciunt. Idem in epist. ad Zeying. Sefeli Peloponnesiacum jam prius in horto habebam, abundat in saxis & collibus, circa Badam Helvetiorum, ego Oreoselinum potius, quàm *ορεοσέλιον* genus esse puto.

Lon. no. natur. Lonicerus hujus imaginem pictam dedit sub titulo *Schwartz Birtzwurtz* quam Elaphoboscum

Dioscoridis statuit, ac Pabulum cervi, Ocellum cervi, Gratiâ Dei & Copariâ latine cognominat, diversa, meo judicio, confundens nomina.

An Ang. ep. 5. hanc intelligit, per Rosinari species à Theophrasto traditas, quas Dioscoridis esse negat. Theophrasti enim ait esse folio Apij palustris, quæ reperiantur in monte supra Conum, qui dicitur Generosus, ubi herbarij vocant Levistico salvatico, qui omnes habet notas.

An Lob. Adv. p. 321. Icon. p. 720. est Daucus secundus Selineoides? de hoc ait. Veneti pharmacopœi quam Mattheolus Daucum alterum facit, Saxifragam dicunt, illique vires consimiles frequentè experimento asserunt: nihil tamen obstat, quin sit Daucus alter Dioscoridis. Folijs namque Coriandri, aut Petroselinii Macedonici veri, donatur. Semen illi in umbellis oblongum, angulosum, Fœniculi modo. Radix aroma olet, suavis gustanti, supernè que comata, Mei modo. Idem jam dicta repetit p. 323. An in Obl. p. 414. Daucus Selineoides secundus Adv. p. 321. Et p. 323. Rosinarium, five Libanotis prima Theophrasti. folio Apij palustris: Ital. Valdè bona vulgo & Saxifragia Venetorum? Item Dauci secundus Selineoidis varietas, persimilis, sed minor, exilior, in silvis Nervio proximis? Lobelius intelligere eandem nobiscum plantam, asserere non aumus: descriptio feminis non quadrat. Icon quam proponit, à Clusio pro alia planta exhibetur, nempe pro Sefeli Pannonico secundo. Miror Lobelium non meminisse Libanotidis alterius Dodonæi, five Cervariæ nigræ, nisi intelligat eam, per Daucum secundum Selineoidem.

Pona, ut paulò post dicemus, existimat Libanotidem minorem Lobelij, eandem esse, cum Dauci tertia specie Fuchsi, quæ opinio nobis non ardet.

An Catapino Levisticum alterum omnino in incultis nascens locis, (qualidis, montuosis, cui folia ab radice strata in terram, dura, & lenta, breviora alter, & ut plurimum subrubra, odoratque cauliculum fert levem, subrubentem, cubitalem, paucis ramis: umbellæ subrubentes & semina nigra: radicem fert longam, pollicis crassitudine, non sine odore: hanc nigram Libanotidem appellare possumus, quamvis Theophrasti nigræ non meminit. Plinius hanc significasse videtur, cum dixit, radicem habet Oisfari, nihil à Thure differentem.

Thurnisius de plant. l. 1. c. 30. vocat plantam nostrâ *Westreusch Birtzwurtz* fœminam, id quod ex descriptione ejus colligimus, licet figura nullam talem demonstret stirpem. Quibusdam, inquit, Pinastellum appellatur & Meon, alias Cordylon aut Tordilion. Possit vocari Ayaleiba & gracè *ἡ ἀνείρις*. Dioscorides hujus generis herbam vocat Tordylon, aut Cordylon: Paulus Ægineta Gordylon. Arabibus & Chaldeis Aithalibah: non malè dicitur *αἰθάλιβα*. Quidam voluerunt esse *Sarsfrang*, alij Ocellum cervi, alij Pedem porcinum. Vandalis est *Widlovossela*. Iudæis Atunsaal, existimatur à quibusdam rote *Birtzwurtz* est.

Lugd. p. 716. Daucus secundus Matthioli. Item p. 765. Libanotis secunda Dodonæi. Daucus tertia Fuchsi: eadem est planta, licet utrobique describatur: quòd verò addit, esse Libanotidem minorem Lobelij, fallitur, cum hanc plantam Lobelius Daucum secundum Selineoidem nominet.

Camer. h. nominat Sefeli Peloponnesiacâ Fuchsi, s. Bauh. phyt. & pin. est Daucus (tertius apud Matth.) five Montanus, Apij folio majore: Daucus 2. Trag. (cui & Sefeli 2.) Matth. Lugd. Dauci 3. genus. Fuchsi. Libanotidis alterum genus, Dod. gall. Lugd. Libanotis nigra Dodonæi, Gess. h. Sefeli peloponnesiæ, Fuchsi. c. Gess. h. & Cam. Elaphoboscum nigrum, Lon. Saxifragia Venetorum, Adv. Dau-

ens felinoides 2. Ad. Lob. Sefeli pannonicum 2. Cluspan. 2. montanum, Eid. hist. ic. Libanotis nigra, communiter Cervaria nigra, Thal. Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger. Variat 1. folijs pallidè virentibus & splendentibus. 2. folijs laevioribus, fortè ob culturam, quam Pseudocostum Cortusae nominabat. 3. folijs minùs divisis, supinà parte dilutius virentibus & aliquantulum splendentibus, pronà subcinereis, quàm Cervariae nigrae nomine, Lipsià D. Iungermannus misit. Hæc C. Bauhinus. Matthioli censuram merebatur, qui non descripsit. Lobelij descriptio non convenit, cum Libanotide 2. Dodonzi, cuius semina potiùs Pastinacae latifoliae Germanicae, quàm Formiculi, quod Matthioli patronus annotasse debebat.

Libanotidem secundum Dodonzi, sive Dauci tertium genus Fuchsi j invenit Basileæ in monte prope Moutez, mense Octobri cum flore & semine: in monte prope Krenzach, & juxta Leurach florentem Augusto: Geneva mense Martio incipientem protrudere folia in monte Salevz. Montbelgardi à la Chau juxta vineta florentem Junio, & in pratis prope Columbier Sivoceux & inter Ruppach & S. Germain, unde transfuli in hortum. Frater Bauh. attulit ex horto Patavino nomine Tota bonæ & Saxifragis majoris. is annotavit Cortusae dici Pseudocostum.

LIBANOTIS THEOPHRASTI minor Lobelo.



LIBANOTIS
Theophrasti minor (ut vocatur à Lobel. Obs. p. 402. Icon. p. 705. sive Panacis species nonnullis, folijs exilioribus multò, Saxifragæ Venetæ proximis, gemino situ Panacis alterius ritu, sed oris tantillè crenatis & lacinia- tis: caulis bicubitalis & procerior. Semen Anethi, candidum: flores in umbellis albi. Radix aromatica, grati & jucundi odoris.

Considerandam an Libanotis hæc

Lobelij minor, sit eadem cum precedenti, quæ Cervaria nigra dicitur, est quæ Libanotis altera Dodonzi, & Dauci tertia species Fuchsi j. Ea quidem fuit opinio Ponzæ in Baldo, sed nobis minimè probatur. Bauh. phyt. dicitur Libanotis 1. sive Apij folio. Eid. B. pin. Libanotis 4. minor apij folio: Daucus anguloso caule, Cord. hist. Libanotis alba minor, Thal. Libanotis panacea, Tab.

VALDEBONÆ NOMINE MIS- sa, Libanotidis secundæ quorundam, sive Cervariæ nigrae species

TOTA hæc plâta accedit ad Cervariam nigram, verùm foliorum color viret magis, nec ita glaucus: folijs etiam pauciores con- jugationes, sed eadem multò majora, amara, & acra non nihil, quam



amatitudinem non percipimus in Cervaria nigra: flos luteus ex umbellis minoribus, quàm in Libanotide, jam nominata, qui masticatus odorem reddit aliquantulum vinosum & aromaticum.

Anno 1600. à nobis factum est semè, communicatum ab E. C. V. Virtembergico rediit ex Italia, cui Vlisses Alldroandus Valdebonæ, sive Dauci secundæ inscriptione offerebat. Sequenti primùm anno provenit, & tertio anno caulem produxit, aliquot cubitorum, florebat Junio, & Julio semina maturabat. D. Aenus siccam dedit nomine Veeltgutz Bononien- sium & Valdebonæ nigrae, quæ prædictæ similis erat, quantum ex sicca colligere potui. Eam dicebat altitudinis Angelicæ, flore luteo collectam, in radicibus Apennini montis, seminibus ad Pastinacam Germanicam, sive latifoliam vel Anethum accedentem, duplicibus, simbrâ albicante, sapore aromatico & acro.

SESLII 2. CLUSI.



pes, unde exeunt magnæ & satis amplæ foliorum alæ, aliquot folijs per ambitum serratis & nonnihil incisus uni costæ inhaerentibus, sed ex adverso nascentibus constantès, colore supinà parte dilutius virente, & aliquantulum splendente, pronà subcinereo præditi: inter quæ sesquicubitalis nonnunquam emergit caulis, striatus, pollicaris interdum crassitudinis, geniculatus, in aliquot ramos divilus, quem ambiunt ad singulos nodos, sive genicula, minores foliorum alæ; summum caulem atque extremos ramos exornant umbellæ pallefcentium flosculorum: quibus succedunt semina Sileris montani semini similia. Hanc Clusij descriptionem congruere speramus huic nostræ plantæ à nobis descriptæ, cui etiam iconem, quam in Pannon. p. 692. Sefeli secundum [addit in hist. montanum] Pannonicum inscribit, ac inter Cervariæ genera posse referri existimat, plurimùmque habere similitudinis, cum

Hanc nostram plantam, ni fallimur, sic describit Clusius: Brachiali interdum nititur radice, præfertim si planta vetusta sit (recentiores & juniores pollicarem habent) in aliquot ramos inferiorem parte donata, crasso, rugoso, nigroque cortice sepiâ, gummoso primùm lentoque sapore prædita, deinde acro & salivam ciente: quæ summo capite in multa capita extuberat villosa, quemadmodum fere omne ferulacei generis stipites, unde exeunt magnæ & satis amplæ foliorum alæ, aliquot folijs per ambitum serratis & nonnihil incisus uni costæ inhaerentibus, sed ex adverso nascentibus constantès, colore supinà parte dilutius virente, & aliquantulum splendente, pronà subcinereo præditi: inter quæ sesquicubitalis nonnunquam emergit caulis, striatus, pollicaris interdum crassitudinis, geniculatus, in aliquot ramos divilus, quem ambiunt ad singulos nodos, sive genicula, minores foliorum alæ; summum caulem atque extremos ramos exornant umbellæ pallefcentium flosculorum: quibus succedunt semina Sileris montani semini similia. Hanc Clusij descriptionem congruere speramus huic nostræ plantæ à nobis descriptæ, cui etiam iconem, quam in Pannon. p. 692. Sefeli secundum [addit in hist. montanum] Pannonicum inscribit, ac inter Cervariæ genera posse referri existimat, plurimùmque habere similitudinis, cum

Dauci 2.

Veeltgutz Bononien- sium

Semina

Deser. Clusij.

Sefeli 2.

Pannon. Clusij.

coridis descriptionibus de Sefeli, videlicet Massiliensis & Aethiopici. Et potest stare quod Sefeli Massiliense Dioscoridis, sit Siler montanum vulgare. Erronea hæc est Monachorum opinio, etiam scribente Matthiolo, qui dicit in quamplurimis pharmacopolijs semen quoddam, Sefeli vicem explens vendi quod nulli prius Sefeli à Dioscoride descripto respondeat: quippe quoddam amaritudine tantum sit prædicum & olfactui civicum fœtorem repræsentet. Lapsum Matthiolum in Ligustico ait in Theone Guilaudinus, ut pro quo ineptè equidem, Siler montanum Herbariorum pinxerit, plantam solo feminis odore, qui civicum est, exacerandam Ligusticum autem, Matthiolo in Albobrogum montibus frequens nasci, ac ab incolis, *Ser montanum* dici, suo quoque ascripsit Matthiolo Dalechampi. Quare rem diligentius examinent periti. De Matthioli Ligustico supra egimus.

Dod gall. sub Ligustici vertitulo etiam Ligusticum Matthioli & Lobelij pictum dedit nominatque græcè dixit, *λυσισκος*, & Galeno, *λυσισκος*: lat. Ligusticum, ac alijs etiam Panaces Dioscoridis, quo nomine cognitum ait adhuc Genuæ in officinis: vocatque à Phio Cutilam bubulam. Lat. in fol. inscribit nostram hanc plantam, de qua nobis sermo est, Siler montanum, traditque in Liguria haud procul Genua in asperis montis spontè nasci, tum & alibi vulgè: nominare Gallos & Flandros nomine corrupto, *Sermontaine*; officinas nonnullas Seleleos. Non esse tamen Sefeli, nec Sefelies speciem, sed Ligusticum, quod Græcis, *λυσισκος* à *λυσος*, siue Liguria nomen accepit. Respondere Ligustici, quæ apud Dioscoridem, descriptione conuenire quoque natales, nam in Liguria plurimum nasci. *Is autem*, in Hist. gall. nihil habet de Ligustico, præter Dioscoridis & Matthioli verba & Iconem, quam in lat. mutauit. Sileris montani semen non respondet Dioscorideo Ligustico. Nos, uti dictum, lateran Matthiolum per suum Ligusticum intellexerit, Siler montanum. Camer. apud Matth. nouam dat Iconem, nomine Ligustici veri, quæ placet pro Silere montano, semina tamen particulatim addita videntur nobis minùs conuenire.

Sed & Lugd. p. 744. Ligusticum ex Matthiolo pingit, Silerque montanum Officinarum esse ait. Hoc verò multos [ex horum numero est Georg. Piætor] in expl. herb. Amilii: esse Sefeli Massiliense existimare, sibi tamen cum Dodonæo magis placere pro Ligustico.

Genuinis plantis Seleleos cognitioni præfere restitutus, in promptu est nosse, aliud ab istis esse Siler montanum officinarum [ita vocat in Ad. Lobelius p. 328. in O. p. 42.], ubi dicit vocari à Matthiolo Sefeli Massiliense, quod falsum: ibidemque hoc in Belgij hortis latiore semine variare tradit: in Icon. p. 737.] quod retinuerunt bono quidem consilio, ut Lobel. ait, qui Neotericis ansam errandi dederunt, atque faciendi nihil aliud esse, quàm Dioscoridis Massiliense Sefeli. Est quippe planta multò maioris acedinis & efficacitatis, quàm vllum Sefeli, eoque mensuris ciendis valdè quàm commendatum: folia adhuc habet, non modò Feniculo, ut Massiliense Sefeli, maiora, sed vel Peucedano latiora, ac paulò minùs Ligusticum vel Coronarium Rosmarinum æquantia, mollia: semen etiam factu charo conditum gustu acrius est quàm Aethiopicum: tantò magis quàm Massiliense, cui acrimoniam præfert Dioscorides Aethiopicum,

Tom. II.

Cum nullo quidem Sefeli apud Dioscoridem genere, Sefeli vulgè Siler montanum appellatum conuenire, etiam Geln. testatur, ac propria vel ipsum Petroselinum Veterum, vel optimum ejus Antiballomenum esse dicit: Idem autè, Ligusticum, seu Libysticum verum siue veterum Coldenbergij & Amilij vocat Siler montanum vulgè dictum pleiisque pharmacopolijs, quod quidem si Sil, vel Sefeli aliquid non sit, Petroselinum esse suspicatur: utpote acrimoniam & amaritudine insignie. Idem de Lunarijs sibi oblitus Sefeli quoddam genus constituit, cujus semen Pharmacopolæ Germani Sileris montani nomine vendunt pastoresque Suteses Tauram, *Stiudskrant*, appellant.

Lonie. vocat Siler montanum, Sefeli Massiliense, *Welsch steinbrech*, [Saxifragiam Italicam dixeris] & Saxifragiam maiorem. Sed ignorat ille quid scribat, dicatque figura etiam non est Sileris montani.

Ser montanum Italis vulgè appellatum semen, cum quadam grauitate odoratum, instar Cumini vulgaris, ut le quibusdam Platocyminum, i. latum Cymum vocatur, Dioscorides Sefeli Peloponense appellat, cujus Plinius quidem non meminit, sed notas, quæ huic conueniunt, Massiliensi tribuit, inquit Cæsalpinus; latum enim inquit granum est solum.

Quod Clus. in Pannon. & Hist. Siler montanum vocat, Castor verò Sefeli Italicum: Hoc fortè Tab. in Icon. Ligusticum verum Dioscoridis inscribit; in Hist. Ligusticum verum i. *Welscher liebschekel*.

Gerard. ponit Iconem à Tab. ex Matthiolo propositam, quam Leuisticum vulgare, *Lommon louage*, Ligusticum, & Siler montanum cognominat: germ. *liebschekel*, gall. *Linschek*; sed nullibi legi Siler montanum ita germ. & Gall. denominari: videtur duas plantas confundere. Vocatur propriè germ. *Siler montan*, & *Sermontaine*. It. & Hist. *Siler montano*: Gall. *Sermontaine*.

Bauh. phyt. & apud Matth. vocant Siler montanum, Ligusticum Matthioli. Nos contra, nò audemus asserere. Ligusticum Matthioli idem esse cum Silere montano, quamvis Icon accedere videatur: quia Matthiolum, uti dictum, ait Sefeli hoc officinarum civicum fœtorem repræsentare: Ligustici verò semen incolas Liguriæ passim in ciborum condimentis adhibere. Præterea Lobel separat: vellemus patrocinatores Matth. vel exposuisse, vel errorem apud eum demonstrasse, aliorum animaduersores sunt leuissimi, quæque carpentes, & interim grauissimos quosque errores in suis glossis non annotantes. Si Matthiolum, existimauit Ligusticum idem esse cū Silere montano, is sibi contradicere deprehenditur, & tanquam cæcus de colore iudicare, licet suo more nota faceret. Idem B. pin. Ligusticum i. quod Sefeli officinarum nuncupat: Siler montanum Trag. Guil. Ad. Lob. & Dod. Ligusticum Matth. Lac. Cast. Lugd. verum Dod gall. & Tab. Sefeli Massilioticum Cord in Diosc.

Genuæ Siler montanum inueni in monte Locus & Thuri florens mense Iunio, & semen matians Iulio, plantam hominem æquantem longitudine. Frequens est montibus Austriacis, at nusquam abundantiùs crescere meminit Clusius, quàm in eo qui Badensibus thermis imminet. Sermontani planta in Pisanis Alpibus prouenit locis vliginosis propè riuulos. In Liguria haud procul Genua in asperis montibus spontè nascitur, tum & alibi: In Belgij hortis

tis satum provenit, sed raro, & non nisi, ubi Æstas feruida, semen perficit.

Vires.

Sileris autem montani seminis vis exaltatoria, atque rescicans ordine est tertio, Dodonæo autore. Vrinæ & menses potu ducit: prodest ac intestinorum ex cruditate dolores: concoctionem promouet: status discutit: auxiliatur contra ventriculi inflationes ac tumores, serpenumque morsus. Radix eisdem præbet effectus, sed minùs efficaciter, ut pote minùs, calida, succâque.

SILER CRETICVM QVIBVSDAM,
femine longo, crispo, incuruo.

Descrip-
tio.

Sileris Cretici nomine datum *semen* pulchrum & magnum, pediculo vnciali circiter pendet, semunciam longum, recuruum, crassum fuscum: gemellum, vnum è quinque aut sex costis asperis coagmentatum, alterum simplex, intertexto ad extremum mucronem à pediculi fine filamentum: odor satis validus, nec in iucundus, cum Cymino satiuo habet aliquid simile, sapore etiam aliquo modo affini.

Gener Cherlerus attulit ex Italia nomine Sileris Cretici, quod satum in horto E. C. provenit, foliis Cicutæ, ut Camerarius in horto ait, sed latioribus & paucioribus, femine incuruo, grandis, hirsuto & fusco. Et propterea etiam C. Bauh. phyt. & pin. vocat Siler 2. foliis Cicutæ, & Siler Creticum Camerarij.

De hoc ait Bellus in epist. ad Clusium ex Grete Cydonia. Rosmarini folia Selino similia sunt, serrata, floresque in umbellis albi; quibus succedunt femina oblonga, aspera: radice nititur crassa, foris nigro cortice, eoque tenui, vestita, intus albâ, Thus maxime olente: ideo Libanotis legitima mihi videtur, quam Theoph. l. 9. c. 12. descripsit: licet radix sit nigra, quia detracto cortice leui, spectatur maximè albâ. Appellatur *σικωρία*, quod vertiginem inducere credatur. Et, ni fallor, Siler Creticum à quibusdam perperam appellatur.

Lignisticum 3. siue Siler montanum angustifolium C. Bauhini.

Caule est tenui, cubitali, in alas brachiato, quæ umbellam parvam albam sustinent, *foliis* paucis, in segmenta angusta, oblonga, peucedani instar (sed longè breuiora, diuisis, quæ in alis, ferè capillacea: prope oppidum Stein Austriæ D. Burserus legit.

SILAVS VETERIBVS.

CAP. LXXII.

Silaus
Plin.

Silai, quantum nobis constat, solus meminit Plinius, qui l. 26. c. 8. Silaum nasci glareosis (glabriosis CH.) & perennibus riuis ait, cubitalem, Apij similitudine. Coqui ut Olus acidum (Oxylapathum, Dal. Olusatrum vet.) magnâ utilitate vesicæ.

Æqui-
noc.

Cæterum, pro Silao sequentes depinguntur stirpes, ut latius suo quolibet loco diceretur. A quatica Lobelij, quam Sium minus Dodonæi, quidam Silaum Plinij, esse putant. Phellandriô, aliis Cicutaria palustris, est Silaus Plinij, Cefalopium palustre, à nonnullis Silaus esse perhibetur. Sefeli pratenfe Monspelienfium Lobelij C. Bauhinus Silaum suspicatur. Silaus confunditur cum herba Sion siue Lauer dicta, quæ & ipsa de

pl. uribus prædicatur.

SILAVM QVIBVSDAM FLORE
luteolo.

Silaum quibusdâ appellatur in pratis aliquibus. Sobuia planta umbellifera, cubitalis & sesquicubitalis, *caule* glabro, striato, alis concauo: *flores* umbellati, albicantes: quos *femina* excipiunt, binâ juncta, gibba, striata, sapore aromatico, vinofo: *folia* ampla, minutim dissecta, incisurâ ferè Sileris montani, sed segmentis longioribus. paulld, acutioribusque; quæ neruulus secundum longitudi-

nem percurrit sapore acris: *radix* longa, digitali crassitudine, foris fusca, intus albâ, in capita diuiditur plerumque, penes terram comosa; sapore aromatico prædita.

An planta à nobis tradita, est Cordi in Obs. silua. Herba Cicutæ foliis & odore: radice crassa, nigra, perenni, femine in



umbellis Caruo crassiore, quo in quibusdam Galliæ & Italiæ locis malè pro Ligustico vtuntur.

Hujus figuram Botanicum Francosurt. anno 1552 impressum, pictam dedit, quam Hippomarathrum, *Vuilewajf fenehel* inscribit. Eandem assumpsit Lonicerus, cui *baarsfang* & Peucedani titulum adscripsit.

Feniculum siluestre Loniceri H. Lugdunensi, p. 689. (quod Feniculum silu. nominare ait officinas auctore Ruellio & Loniceri) & Sefeli pratenfe p. 752. una eademque est planta: quamvis apud Lonicerum 1557. editum, non pro Feniculo, sed Peucedano pingatur. Quale autem Feniculum officinarum siluestre intelligat Ruellius, neminem diuinare posse credimus. Ita enim brevis & obscurus est ubi de eo, ut ipsi eum nondum intelligamus. Lobel. Iconib. pag. 738. Obseru. pag. 416. & Aduers. p. 128. Sefeli pratenfe Monspelienfium & Lutetianorum appellat. Clusius Pannon. p. 700. & hist. nominat Sefeli hoc pratenfe, cui alata adscribit folia, ac abundè in totius inferioris Austriæ pratis nasci scribit.

Dodon. latin. in fol. Siler alterum, quod nonnullis perperam pratenfe aut Monspelienfe nuncupari ait.

Tabern. Icon. sub Hippomarathri, Feniculi siluestris, & Mei inscriptione pingit. In Hist. verò sub Hippomarathri primi.

C. Bauh. phyt. Sefeli 10. pratenfe vocat: Hippomarathrum verò illud Tabernæmontani, Feniculum 3. siluestre: & Feniculum erraticum Matthioli: sic hoc ab illo separans & distinguens.

Obseruauit florens Junio Basileæ, inter Bessor. diagn.

diam & Than Septembri : Montbelgardi inter *Lisse & Longueville* in pratis. In nonnullis pratis ac humidis locis etiam in Gallia subindè gignitur. In Belgij hortis non infelicitè provenit, auctore Dodonæo. Clusius antè dixit in inferioris Austriæ pratis abundare.

Tabernamontanus quæ Hippomatatum esse credit, eius vires huic adscripsit, quæ an huic conveniant aliis comprobandum, & dijudicandum relinquimus.

Saxifragia Anglorum foliis Fœniculi latioribus, radice nigra, flore candido, semine Fœniculi, similis Silao.



AB eximia dote in frangendo calculo Saxifragam scitè dixerunt Angli plantam vdis familiarem : *foliis* Fœniculi latioribus, pratenfis Sefeli minoribus, *radice* odorâ, foris nigra, intus albâ, Peucedani facie : *floribus* in umbellis candidis : *semine* Fœniculi : *caule* selcubitali & cubitali.

Lobelius descriptionis auctori vocat Adu. p. 352. Obs. p. 456. & Icon. p. 784. Saxifragiam Anglorum, facie Sefeli pratenfis Monspelienſium, h. e. Silai quorūdam. H. Lugd. p. 713. Saxifragam umbelliferam Anglorum. C. B. phyt. Daucum. 4. siue Sefeli pratenſis facie. In pin. miscet cum Polygono suo secundo, angustissimo & acuto, vel gramineo folio, minore repente, quod nobis Polygonum 3. Dodonæi, siue tenuifolium est. Tab. ic. Hippomarathrum album, *Engliſcher Roſſſenche*. Eid. hist. Hippomarathrum 2. Hippomarathrum album, Hippomarathrum Anglicanum, & Saxifragiam Anglicam, *vveißer Roſſſenche*, & *Engliſcher Steinbrech*.

Saxifraga Anglicana, si Tabernamontano credendum, calida est in tertio gradu, & sicca in secundo. Vim habet aperiendi, attenuandi, dissolviendi & dissoluendi. Et his facultatibus etiâ Fœniculum superat. Easdem vires inesse ait & Silao quorundam.

CARVIFOLIA.

Caruifoliam voco herbam, *radicibus* singularibus, pluribus, valdè longis, satis tenuibus, intrus forisque albis, sapore viroso Coriandri virentis, nixam : *caules* emittentibus bicubitales & altiores, Petroselinii similes, tenues, striatos nonnihil, & glaucos, & angulosos, medullâ albâ fungosa plenos, ramosos : *folia* partim à radice statim, partim ex caulium geniculis, quæ membra : aneo striato pediculo obvolunt, oriuntur, Cari foliis proxima, latiora, maiora, glabra, palmo longiora, etiam prima, diuisurâ Pastinacæ siluestriſis, vel Petroselinii vulgaris, longioribus tamen segmentis (per quæ nervus discurrens

Tom. 111,

fulcum exarat) quæ ex intervallis cruces ramosas canaliculatæ rachi annexas æmulantur, sapore acriusculo & nonnihil aromatico : *flores* pediculis inæquali longitudine, canaliculatis, umbellatim digesti sunt, parvi illi quidem, & supernâ parte ex luteolo pallescentes & ferè albi, aversâ rubentes : quibus decidentibus *seminum*, rudimenta purpurasunt, matura verò lata, striata, similia ferè Pastinacæ Germanicæ seminibus, glabra, aromatica, cum amaritudine & acrimonia, minora quàm Peucedani, pallida.

C. Bauh. in phyt. vocat Siler tertium, siue *Sileri* Caruifoliam lo. Bauhini : In pin. Carui 3. siue Caruifoliam : Cuminum equinum & sylu. Trag. Fœniculum erraticum alterum, Lon. Peucedanum Eid. Ic. sed hoc malè, vt & Hippomarathrum, Bot. Fran. & Fœniculum sylu. Loniceri, Lugd. Ea enim nos melius ad Silaum quorundam flore luteolo referimus Caruifoliam præterea aliam latioribus, & aliam angustioribus foliis tradit, quod nos etiam in culta non animadvertimus.

An Cuminum equinum Trago ? An eidem Dauci tertia species ? An etiam eidem Cuminum siluestre ?

Cæterum Caruifoliam in Montbelgardenſi comitatu florentem inveni mense Septembri inter Blussans & S. Mauritium in dumetis : itidem inter Dampierre & pontem Vauiaucourt. Translata in hortum E. C. aliquot annos duravit, florens Iulio & Augusto mense, eodemque femina proferens, ac maturans.

Locus & Tempus

SION VETERIBVS

CAP. LXXIII.

Sion aquaticum, referente Dioscoride, inuenitur in aquis, *frutex* pusillus, rectus & pinguis, qui *folia* habet lata, Hippofelino [Olusatro. Corn. quidam *ἐὺθρόσμον* : alius *ἡδύσμον*] similia, sed minora & aromatici odoris : quæ quidem seu cocta, seu cruda esu calculos confringunt ac expellunt : vrinæ quoque mouent, ac menses & partus extrahunt. Commoda etiam sunt dysentericis in cibo sumpta. De eodem Sio agens Crateuas, herbam esse tradit fruticis specie, exiguam, foliis præditam rotundis [Corn. & Matth. legunt Herbam fruticosam, exiguam, habentem multa folia rotunda.] maiora quàm Mentha, nigra [Orib. *λίπαρη*] pinguis, & ad Erucam accedentia.

Plinius lib. 22. cap. 22. Sion latius Apio dixit, in aqua nascens, pinguis nigriusque semine, sapore Nasturtij [hæc postrema verba ad alterum Sion, quod Cardamine appellatur, pertinere notavit Cornarius :] Prodesse autem vrinis, renibus, lienibus, mulierumque mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semen è vino drachmis duabus. Calculos rumpe-re, atque iis quæ gignunt eos, resistere. Dysentericis prodesse infusum.

Sion in quantum saporem quodammodò aromaticum habere, in tantum etiam calfaciente vi participare, scripsit Galenus 8. simplicium. Discutere autem, & vrinæ ciere, & calculos in renibus confringere & menses ducere.

Cæterum, fuerunt qui Sion aquaticam Anagallidem, qui luncum aromaticum, i. e. odoratū, qui Daren & Lauer appellarint. Quare autem Anagallis aquatica dicta sit, indicat similitudo

Temper. Galenus,

Locus & tempus,

Anagallidis: non autem, vt videtur, dubitandum est, quo loco nascatur Sium. Lauer quoque cognomen, ob naturalium similitudinem, quoniam amobus vita in aquis sit. Quale porro sit Sium, indicat etiam odoratus luncus, ob cuius similitudinem, eandem cum Iunco odorato appellationem ab aliquibus adeptum est. Egyptius rex cognomento Euergetes, in Homeri lectione multum versatus, contra quam Grammatici censent, palustrem plantam Sion cum palustri Apio nasci indicauit. Sic autem cecinit quondam Homerus.

ἄνθος ἐν ἑσπέρῳ μαλακὸς οὗτος ἵδὲ πελὺς:

quod ignorantes aliqui eo tempore non. sed se, quod est Viola, legi oportere contendebant: contra quod rei peritus rex Sia, non Violas cum Apis in irriguis pratis nasci in emendato Homeri carmine voluit, non leui argumento nec indigno teste, palustre Sion esse, verumq; quod Dioscorides, ait, in aquis nasci & inueniri Idem autem hoc Sion à Romanis Lauer dici, refertur in nothis Dioscoridis. Meminit autem Laueris Plinius, non tamen idem Laueri in eo Sion est. Hoc enim, autore Dioscoride, odoratum est, Lauer nullo odore commendatur. Qualecunque autem Sion sit, non ad eò dissimile Apio describitur. Nec est, inquit Marcellus, quod miretur aliquis incertitudinem tantam in Sio: cum nec quondam florebat Græcorum fortunâ cognoscere.


Sion esse eam herbam, quam Germani *vasser* & *vasser Epich* Sion vmbelliferum, h. e. Apium aquaticum vocant, credit Cornarius. Quod autem idem Lauer appelletur, & sit hoc de quo Plinius lib. 2. c. 8. ait, Lauer quoque nascens in riuis condita & cocta omnibus medetur: in filiis nascit: glareosis & perennibus riuis, cubitalis, Apis similitudine, coquitur vt olusatrum, magnâ utilitate vesicæ: maximè ambiguum quem ibet facit hoc, quod neque Sion, hoc appellari, neque in Sij huius tractatione, id Lauer dici meminerit, quum tamen aliâ talia prætermittere non solet: vt ita videatur omnino alia herba esse Lauer, ab hac quam Diosc. & Plinius Sion appellauerunt. Nec satis est ad probandum quod vna & eadem sit, ex eo quod inter suppositas appellationes apud Dioscoridem Lauer siue Lauer de adscriptum habeatur. Quin etsi ea quæ Berula officinis quibusdam vocatur, Lauer esse credatur, sicut sunt, qui pro certo id affirmant, ita vt ex diminutiva voce Lauerula, resecta primâ syllaba, remanserit Berula: tamen neque sic Lauer idem quod Sion esse ostendit Marcellus empiricus c. 36. vbi latine Berulam dici ait, quam Græci Cardaminem vocant, de qua alibi egimus.

Diosc. nar. Dioscoridem de iisdem plantis non raro in diuersis locis pertractasse ait Guill. in Theone, ignorantemne an verò abundè diligentem non asserit: exemplum dat Sion Crateuæ, & Sisymbrium aquaticum.

Equivoc. Sij autem nomenclatura sequentibus attribuitur plantis: Scilicet Sio vmbellifero, & Sio maximo latifolio. Oenanthæ aquaticæ. Phelandrio: Cicutæ aquaticæ Gesneri. Anagallidi aquaticæ. Sio Crateuæ Erucæ folio Barbarea dicto. Menthæ verticillatæ à Trag.

go. **

SION VMBELLIFERVM.



Sij vmbelliferi radix multarum aquaticarum instar geniculatim incedit, demissis subinde fibrarum comis longiusculis, odore & sapore Sisari: cubitum longa, longo pediculo striato, glabro, intus cauo appenda, ex pluribus singularibus foliis pinnatis dispositis constant, Pastinacæ Germanicæ similibus, minus

rugosis: quæ verò in caule sunt, minora existunt: cæterum caules fœniculacei sunt, aut Petrofelini, striati, inanes, ramosi: flores minuti, candidi, vmbellati, Petrofelini, subiectis ad vmbellæ basin foliolis aliquot angustis: semen paruum, odoratum, acre.

Ostendisse autem suâ iam ætate Herbarios pro Sio Dioscoridis, dissimilem hanc penitus, fœniculi foliis, altiore crassiorèque caule: grandi in summo vmbellæ, fœniculo non dissimili, sed confertiore: colore in cunctis albicante dixit Marcellus.

Tragus lib. 4. cap. 155. cum vulgari Apio hanc confundereprehenditur, Apiumque secundum das ander Epif. facere, licet pro Sio odorato pingat & describat.

Apium aquaticum sita namque vocauit hanc nostram plantam Jesse eam herbam, quam Dioscorides Sion dixit, creditit Cornarius quidem, sed quod idem Lauer appelletur & sit Plinij, ambigit, vt præcedenti capite videndum.

Fuchs. inscripsit Apium palustre, & rusticum, Græcè ἐπιστάλιον ἢ ὁδὸς προσέλιον, quod in paludibus & aquosis locis proveniat. In Icon. Sij primum genus Lauer vulgò dictum inscripsit.

Matthioli in epit. anni 1571. Sium pingit caule recto, expansis foliis per ambitum serratis, Smyrnio similibus, sed minoribus & odoratis, Aniso non dissimile. Eos autem errare ait, quia Plinium secuti aquaticum Sisymbrium Sium esse censent. In comm. cum mag. fg. Sium tradit folio Maceroni simili. In Hist. germ. videtur describere Sion vmbelliferum: Icon tamen diuersa, nempe olim filiquosi. Cam. apud Matthiol. Sij veri titulo elegantem proponit Iconem.

An Monachi in Mef. dist. 1. cens. 5. de hac dicunt, Sion propriè est illa herba, quæ vulgari vocabulo Romæ Channæ vocatur, & ipsum est verum Lauer.

Hispanos adhortatur Amatus, vt caueant, ne herbam hanc in aquosis nascentem, quam Rabarias appellant, Apio vulgari simillimam, palustre Apium esse credant, quia vt ait Sion est, quod non absque errore (vt bene etiam annotat Turnerus) Bachpungen cognominat: figuram autem habet ex Fuchio.

Mior, inquit Turnerus, Matthiolum in filiquis

quis parvis semen Sio tribuere: cum omne Sion mihi in Italia, Germania & Anglia conspectum, semen in umbella ferat, Apij modo. Verum itaque Sion ab illo propositum non existimo.

Lacuna pro Sio figuram habet Matthioli, quæ sane multum differt summitatibus florum ab Amati Sio, cui umbellæ, & non Nasturtij aquatici filiquæ.

Gesl. hort. vocat Sium juxta Basileam. Is in suo Anguillara epist. 12. annotarat, Silaum Plinij omnino ejus Sium esse. Apud Cordum in Diosc. refert Sion, quod Germani *Flein vasser* vocant, Romæ in acetaria venire, vocarique Ranellam.

Dod. gall. inscribit Lauer Crateuæ & grande Berle (h.e. Lauer magnam assignat enim & minus Lauer, petite Berle, quam Oenanthen aquaticam vocamus): Idem de frument. & in fol. no. uam habet figuram ejusdem tamen plantæ, Sij titulo, de quo ait, Germanorum plerique *vasser* Epiph. *frosch* Epiph. (Fuchl. in Icon.) *Bawren* Epiph. *Bruanen* Peterlin & quidam *Hyent* aut Triago: Belgico idiomate, *vasser* Eppe nominant, h.e. gall. *Perfill* aut *Ache d'eau* i. aquaticæ Apium, aut Hydrofelinon quis dixerit: Galli quidam *Berle* & *Hache de maretz*, Fuchl. Itali *Sio* & *Gorgolestro*: Cæsalp. *Crescione* & *Herba Camella* Hilp. *Rabagas* Plinio ac Latinis Lauer: Dioscoridi *cior* est: quod in vetustis ejus exemplaribus, Anagallis aquatica, & fucus quoque dici odoratus legitur: vnde occasione sumptisse videntur, qui Anagallidem vulgò dictam aquaticam, verum Sium esse perpetim existimant.

Lob. Adu. pag. 71. & in Icon. p. 108. vocat Sion siue Lauer (ita etiam Obs. p. 105.) Dioscoridis, Olusatris folio, siue aquatica Pasticina. Nulli dubitandum affirmat, quin sit verum Dioscoridis Sion, etsi Dodonæus hallucinans Crateuæ Sion fecerit, in Hist. sc. gallica. Lonic. appellat Apium palustre.

Lugdunensis carpit Dodonæum, quod Sion hoc umbelliferum, perperam Sium majus Crateuæ dixit, cum non Crateuæ, sed Dioscoridis sit verum Sium. Id quod ipsum in Hist. aquatiliū agnouisse refert. H. verò Lugden. tres figuras dedit vnius plantæ. Primam pro Sio vero Matthioli: alteram pro Sio Crateuæ, majore Dodonæi, p. 1092. & tertiam p. 701. pro Apio palustri Fuchlij. Sium autem nomen sibi assignasse traditur *Deo* & *seiv*, ait, h.e. à concutiendo, quia quatitur, vacillandoque perpetuò succutitur præterlabentibus vndis, atque semper alluentibus. Vnde etiam Laueris nomen Latinos deduxisse scribit, nisi quis malit ab vrinis calculisque ciendis & excutiendis dictum.

Tabern. Sij quatuor species agnouit, quarum hoc, Sium primum & minus nominat, ejusque Dioscoridæ & Plinio meminisse scribit, ac appellari græcè *σιν*, ἀναγὰλλον ἐνὶ ὕδρῳ & *δαρένιον*. Lat. Sium & Plinio Lauer, ac etiam Angallin aquaticam & Darenium à Dioscoridæ: ab Herbariis Sium odoratum ad differentiam Sij alterius, vel etiam quod aliqui Anagallidem aquaticam ita nominare soleant. Vocari præterea Apium aquaticum, & fontanum: itemque Apium aquaticum seu fontanum minus, & Pasticinam aquaticam, ob hujus foliorum similitudinem. Aliis dici Berulam, Ranellam & Lauerulam: Auicennæ Pupillam oculi, Sumium & Chare alhayn: aliis Arabibus *Rorcat halmi*, *Inhamel hanelle* & *Hamehanelga*: Bohemis *Pot ocsuk*, Germ. *vasser* peter-
Tom. III.

lin *vasser* morellen. Plura nomina vide antè.

C. Bauh. phyt. vocat Apium 10. siue palustre alterum, foliis oblongis serratis, & Sion Dioscoridis: itemque *ἐλασθίων* Dioscoridis, Theop. & Plinij quorundam Is apud Matthiolum pro Sio vero ejusdem, posuit iconem Sij medij Tabernæmontani. Notatis in animad. Lugdunensem quod Apij palustris Fuchlij nullo verbo in contextu meminerit: quodque præterea vitiosam Mattholi figuram habeat cum descriptione ex Lobelio: itemque iconem Lobelij cum descriptione Dodonæi: tres denique figuras & duas descriptiones vnius plantæ.

Sij nostri umbelliferi, duplex genus assignat Cæsalpinus: dum ait, alterum scilicet caule infirmo, alterum caule crassiore: &c. Crescionem & Herbam Canellam nuncupans.

Sion umbelliferum vocant Monspelij Berlam: ibi copiosè provenit in aqua, vti Patavij, & inter Veronam & Castelfranc. Geneuæ inter pontem *Arue* & *Lanci*, & quæ itur *Chastelaine*, alijsque locis. Montbelgardi in fossis vrbis & prope *Dampierre* ad Dubium copiosè.

Sion, ut vult Amatus, herba sic dicta, quod excutiendi vires habeat, hanc crudam ex aceto mulieres & pueri incunte Vere comedunt. Nam post aduentum auis Cuculi dictæ, non amplius herbam esui aptam, mulieres Hispanicæ dictitant, imò illam inutilem, & tanquam ab aue dicta affectam prædicant. Est autem stomacho admodum grata, vrinam euocat, & vesicæ calculos expellit. De ejus viribus etiam scripsit Lobelius: sed tam ambigüe, ut non solum in iis dicendis sibi parum constituisse, verum etiam id vix cognouisse videatur.

SIVM MEDIVM.



Caulibus, foliis, floribus, seminibus prioribus est, singulis tamen multo majoribus: odor etiam gravis, nec ita gratus, ut prioris, Petroleum quodammodo resapiens, vel bitumen

Tab. hist. vo. Synon. cat Sium 2. siue medium, *vasser* peterlin, & Pasticinam aquaticam mediam siue palustrem.

In Iconibus ejusdem Sij medij imago, male transposita est, sub hoc titulo: Sium majus latifolium, Apium palustre, *grosse vasser* Pasticinach. C. Bauh. apud Marth. ponit hanc Tabernæmontani figuram pro Sio vero Matthioli, & Tabernæmontani latifolium, nō animaduertens in iconibus Tabernæmontani, transpositum titulum.

Gerardus capite de Nasturtio aquatico, tertio loco ponit iconem Sij medij Tabernæmontani: verum confundit Nasturtium aquaticum cum Sio umbellifero.

Abundat in Germania, Gallia, Brabàtia & Gel-

dria ad quiescentes aquas, stagna, & fossias.

SIVM MAXIMUM LATIFOLIUM.

Descri-
ptio.

Radicibus, foliis, caulibus floribus & seminibus, simile medio, nisi duplo esset majus, & bituminosus odor vehementior deprehenderetur.

Auctor Tab. in Hist. facit Sium 3, siue majus latifolium, cognominatque Sium bituminosum,

Synony-
ma



Apium palustre, aut aquaticum bituminosum, & Pastinacam aquaticam majorem latifoliam, germ. *vraffer petersling*, *grosse vraffer pastinack* & *maiez pastinack* posséque vocari ait Torph *petersling*, propter locum ubi provenit. In Ic. hujus figure titulus transpositus est, additusque Sij medij Pastinacæ palustris *vraffer peterslin* *Voyer Peterlin*, non conveniens appositæ figuræ, cujus vera inscriptio addita Sio medio, quæ sic habet: Sium majus latifolium, Apium palustre, *gross vraffer Pastinack*.

C. Bauh. phyt. vocat Apium 11. siue Sium latifolium.

Gerard. Sium 1. siue majus *great vriater Pastinack*, Lauer maius Dioscoridis, Sium odoratum Tragi, alias Pastinacam aquaticam. Sed Gerardus c. 17 sui libri secundi, de Nasturtio aquatico turpiter confundit Sium umbelliferum cum Sisymbrio Cardamine, quod verè Nasturtium aquaticum, cujus iconem mox secundo loco ponit, sub titulo Sij minoris, & dein tertio loco Sij umbelliferi genus, de quo antè sub titulo Nasturtij aquatici, *vriater Cresset*, quod Crateuæ Sium & Sisymbrium aquaticum, itemque Lauer Crateuæ, cognominat: ita has plantas confundit.

Locus.

Reperitur ubi aqua Rheni regurgitat, & immobilis remanet, inter Spiram, Vormaticam & Oppenheim, ad locum dictum *Alt Rhein*.

CICUTA AQUATICA GESNERI.

Descri-
ptio.

Radix pollicari crassitudine, sensim tenuatur, fibris compluribus capillata: vulnerata succum remittens rufescentem, gustu acri: *caulis* cubitalis & bicubitalis, crassus, imò parte rubescens, superius ex viridi pallefcens, striatus, glabror, genicularus, inanis: *folia* longis pediculis appensa, Sileris montani diuifurà quodammodo, segmentis longioribus, acutioribus per ambitum serratis: *flores* candidi, Petroselinii, in umbellam latiore digesti.

Vocatur hæc à Gesn. Cicuta aquatica, herba venenosa, *Bartzenkraut* Saxonum. Lob. Obs. pag.

105. & Ic. pag. 208. Sium alterum Olufatri facie



Dod. in fol. Sium alterum H. Lugd. pag. 1094. Sium alterum Erucæ folio Lobelij. C.B. phyt. Apium 12. siue Sium maius Erucæ folio. Eid. pin. Sium 3. erucæ folio: Sium alterum, Dod. Olufatri facie Lobel. Sium, alterum erucæ, folio, Lugd. Sium maius angustifolium, Tab. Cicuta maxi-

ma quorundam, Eyst. an Crescionis alterum genus, Cæsalp. C. Bauh. vti dictum duas diuersas confundit plantas, præsentem sc. & præcedentem. Cur autem H. Lugd. & Fratri Erucæ folio dicatur, nondum intelligimus.

Circa paludes, & in paludum marginibus spontè oritur, vt ad lacum felium, *katzensee*, agri Tigurini. Lobelius in palustribus ac ferocibus nonnullis haud procul Antuerpiâ reperiri refert: Dodonæus in perennibus nasci riualis, & subinde, sed rarius, in resedibus exire aquis: Iulio & Augusto florere. Plantare si quis velit, inquit Gesnerus, in aqua aut loco palustri pangatur oportet.

Locus.
Tempus

CICUTA VETERIBVS ET NEOTERICIS IN GENERE.

CAP. LXXIV.



MYrrhidi, Defcri-
ptio. etiam magis Cicutarie odoratæ tam similis est, vt legètibz plerumque damnosa sit parilitas, non satis accuratè eas distinguentibus: non alia enim *radix* est: non alius *caulis*, bicubitalis & inanis, levis tamè exuuij serpentini, indè ve nomè inde præ Serpentariae *caulis*, maculofus est: simili quoque *folio* multifariam par-
tito, glabro, odore ingrato, sapore non ita, sed nonnihil acri: *ymbella* *florum* illis similiter al-
bicat: *semen* Aniso par, striatum, obscure viret: tota denique planta viroso odore, quo ab illis maximè differt, perniciem testatur. Radix in
horto

culofus est: simili quoque *folio* multifariam par-
tito, glabro, odore ingrato, sapore non ita, sed nonnihil acri: *ymbella* *florum* illis similiter al-
bicat: *semen* Aniso par, striatum, obscure viret: tota denique planta viroso odore, quo ab illis maximè differt, perniciem testatur. Radix in
horto

horto priusquam caulem ferat, longæ, pedalis, juniori Pastinacæ latifoliæ germanicæ similis, cortice tenui flavescente, carne candida, fungosâ, odoris grauis, sapore subdulci.

Myrrhidi autem, caule & folijs similem esse Cicutam perhibet cum Dioscoride etiam Plinius, qui licet & flore parem dixerit, sed minore tantum & exiliore, tamen alibi Myrrhin similem Cicutæ ait, folijs minoribus & caule breviori, rotundo.

De Cicutâ inquit Dioscorides: caulem producit geniculatam, vt Fœniculum [*μαράβρον*] magnâ: folia Ferulæ [*ράβδον*] similia, sed angustiora & graueolentia: in cacumine propagines & umbellæ: florem subalbum: semen simile Aniso, sed candidius: radicem cauam, non profundam.

Anguillara Dioscoridis textum corruptum esse existimat, & legendum pro *ράβδον*, cum Plinio Coriandri, & pro *κόλην*, radice, *λευκήν*, vt habet Crateua.

Nostra Icon. ex Fuchsiâ minùs placet, folia enim nimis incisa. Gesnerus apud Cordum in hist. assumpfit figuram Tragi, non admodum laudabilem. Lobelij Iconem Cicutæ posuit Clusius pro Cicutaria vulgari.

Cicutam in solo pingui propè vrbes caule bicubitali tradit reperiri Cæsalpinus, flore graueolente, semine, candido, & crassiore Aniso. Eandem inueniri in Alpibus, breuiorem & odoratiorem, simili semine.

Ceterùm, auxerunt Cicutæ famam Athenienses, Philosophorum non contemptores modò, verùm etiam hostes, succo ejus ad mortem in publicis iudicijs vtentes, vt suo damno vel Socrates testari potest, quem ad Cicutam hauriendam compulerunt. Alioquin indigna erat herba, quæ omnium Poëtarum carminibus, & sapientum commentarijs inueneretur. Sed hæc est omnium fortuna rerum, vt aliquando ex vfu, gentiù honorem, & quam possunt gratiam inuenerint. Factum id tunc in Cicutâ est, quæ neglecta modò & incognita multis jacet. Mutatæ enim leges, & pœnarum insceleribus rationes pecori herbam relinqui cogerunt, quæ quondam malo hominis fato nascebatur.

Non erimus in hujus historia longiores. Quod enim satis est, ab herbarijs omnibus cognoscitur Fœniculi caule, folio Ferulæ, aliisque à Dioscoride descriptis notis. Apulius tamen Plinius, vt Maranthæ videtur, Coriandri folijs comparat, quàm Ferulæ angustioribus.

In Cicutæ capite plures à principio nothæ appellationes. Sunt enim quibus *Æginos* [Angynon Marcell. & alij] quibus *Ethuta*, quibus *Apolegusa*, quibus *Dolia*, quibus *Amaurosis*, quibus *Paralysis*, quibus *Aphron*, quibus *Creidion*, quibus *Cœten* [Coiten, Marcell.] quibus *Cathechomenion* [Catheomenion Marc.] quibus *Abioton* [Abroton Marcell. sed malè nostro iudicio,] quibus *Apseudes* quibus *Ageomoron*, quibus *Timoron*, quibus *Polyanodynos*, quibus *Dardanis*, quibus *Catapyxis* dicitur. *Othanes* *Babaty* nominat: *Ægyptij* *Apemphii*. Sed hæc appellationes quàm vetustæ sint, licet pro comperto esse dicat Marcellus, paucaque ex tam multis facilem intellectum habere profiteatur. Atamen Tragus hæc sanè vniuersa ferè nomina Cicutæ inde imposita esse autumat, quoddam & homines & pecora interficere possit immensâ suâ frigiditate, quod & experientia & Nicanerini Alexiphar. testatur.

Græcis *κύνειον*, Latinis, vt Trag. Matth. Angl.

Fuchf. Dod. Turn. Lac. Adu. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Tab. & Germ. Cicutâ plantâ à nobis exhibitâ, vocatur: *Gefn. h. & Thal.* Cicutâ vera: Cordo hist. & Cam. Cicutâ major: H. Lugd. p. 788. Cicutâ Matthioli: C. Bauh. phyt. & pin. Cicutâ major: Clus. hist. Cicutâ vulgaris: Germ. *Schirrling*, *vvurzerling*, *Wuesterich*, & *vvuetscherling*, itemque, *Zigerkraut*, Matth. & *kelber* Cordo in Diosc. l. 4. c. 116. Belg. *Dullekruid*, *Scheerlinck*: Gall. *Cigue*, *Sigue* & *Cocue* Matth. It. Cicutâ: Hipp. *Ceguta*, vel *Canaheta*, Angl. *bomblocke* *Boleblauv*: Hung. *Beurck*.

Ceterùm Cicutæ nomen etiam plerùmque apud poëtas sumitur pro calamo pastoralis vt patet ex Lucretio lib. 5.

Agrestes docuere canas inflare Cicutas.

& ex Politiano.

Ece Syracusinas sentas inflare Cicutas.

Ex his autem colligere est, Poetas Cicutam Epithetâ cognominare, cauam, pastorem, leuem, argutam, Syracusiam à Theocrito pastore *Syraculano*: tenuem, quæculam, rancam & triualem: itemque fragilem: Quia potèd herba est venenosa, ac priori seculo inuisa, propter publicam Atheniensium pœnam, qui ad hauriendum Cicutam cogebant delinquentes, mortique deuotos: idèd mœstam, diram, seueram, ac lethiferam dixit Poëtæ. Sic enim Laur. Lippius:

Russice lethiferam monco vitare Cicutam.

Itemque gelidam. Nam qui eâ necantur, incipiunt frigere ab extremitatibus corporis. Et hinc Festus aiebat.

quem carcere ceco.

Sorbisio gelide râpnis porrecta Cicutâ.

Detegendum hic ex Angelo Politiano erratum in codicibus Plinianis, super Cicutâ, vinòque. Quodque mendosè apud Macrobiûm [*mendo* fortè exemplarium, lubrico de Conio in Aconitum lapsu] Aconitum pro Conio. Verba itaque ex Epist. Androcidis ad Alexandrum Magnum, vitiosè posita in Plinianis codicibus repetuntur hoc modo: Vinum potaturus tex, memento te bibere sanguinem terræ. Sicuti venenum est homini Cicutâ, ita & vinum. Lewis profectò sententia nimisque violenta, & coacta: addo etiam insipida, falsaque, vinû esse homini venenum, sicuti Cicutam. Sed enim in vetustissimo Médicæ familiæ Plinianio codice, sic inuenias: Cicutâ homini venum est. Cicutæ vinum. Nam vt hominem Cicutâ, sic Cicutæ virus meri potus extinguit. Ex eoque persuadere Alexandro nititur Androcides, vt tanquam re potentissima parciùs vratur vino, quoddam veneni venenum sit: &c.

Et hæc de Cicutæ appellationibus dicta sufficiant, si tamen priùs monuerimus, nos æstimare Vitium Apij idem esse cum Cicutâ: in eo tamen differre quoddam Vere oritur Vitium Apij, Cicutâ Autumnâ, propter quod etiam formam mutare videtur. De hac tamen separatim mox dicemus, sub Cicutaræ Apij folio denominatione.

Circa pagos & Oppida Cicutâ passim abundat, locis vmbrosis & pinguibus, propè fustas Locustæ aggerèque agrorum, pratorumque sepimenta. Cum floribus Iulio; semine prægnantem Augusto ac ferriùs videre est, & nonnunquam per totam Hæmem virentem folijs suprà terram expansis.

Dioscorides Cicutæ vim exitiosam & multum in Medicinâ vsum, sic declarat. Est & Cicutâ in

Mammæ
cervicis.

Plinius.

lethalium venenorum genere, quippe quæ vi sua refrigerator à eneet: merum vero remedio est: succus exprimitur contusus cacuminibus, proquam semina comæ ficelescant, qui Sole dentur in pilulis: multus ad medendi rationem usus est aridè commode miscetur collyrijs, quæ levandi doloris gratia temperantur: ignes tactos & vlcera quæ serpunt, illita restinguit: herbæ coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit: sed genitale resolvit, lac puerperarum mammis apposita extinguit: in virginitate mammas coëctæ, & necesse non parit: puerperis præstat, ut eorum testiculi alimentum non sentientes, intrabescant. Porro de signis sumptæ Cicutæ & remedijs fusidè egit his verbis. Cicuta pota vertigines excitat, & oculis caligines offundit, ita ut ne tantillum quidem cernatur: singultus etiam ciet, ac mentis alienationem & extremorum artuum refrigerationem infert. Tandem agri commoti accensæ spiritus intercepto strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicuta non vomitu excutimus: postmodum dejectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum facit excernamus. Tum demum ad meri potio nem ceu præsentissimum auxilium, deueniemus, idque interjectis intervallis, in quibus proderit lac asininum aut bubulum potui datum, aut Absinthium cum Pipere & vino: item Castorium, Ruta, Menthaque cum vino, aut Amomi, Cardamomi, vel Syriacis drachma: aut Pipet cum semine Vrtice ex vino, aut denique Lauri folia. Præterea Laserpitij succus ex oleo & passo. Sed & vinum dulce per fese largius potum egregiè auxiliatur.

Plinius de Cicuta consentanea tradit cum Dioscoride. Cicuta quoque, inquit, venenum est, publica Aheniensium per a iouisa, ad multa tamen vsu: non omittendi. Semen habet noxium. Caulis autem & viridis estur: à plerisque & in patinis Radix nullus usus. Semini & folijs refrigeratorijs vis, quæ si enectis cito necat. Incipiunt, &c. M. Incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est priusquam proueniat ad vitalia, vini natura excelsatoria. Sed in vino pota, intermedialis existimatur. Cicuta, inquit Galenus; quod extremè refrigerantis sit facultatis, omnes norunt. Sed nò ubique similiter perniciosam esse tradunt auctores. Theophrastus enim scribit Thrasym Mantinentem ad venenum conficiendum censuisse lamendam Cicutam non vndeliber, sed ex Susis. Et alibi dixerat Homeri testimonio, optimam esse Cicutam circa Susa, & in frigidissimis locis. Dioscorides maximam effici acutissimamque vim Creticæ tribuit, Megaricæ, Atticæ, & in Chio ac Cilicia nascenti: Plinius, natæ Susis Parthorum [Cornarius legit Fioibus Parthorum. Susa enim vrbs Parthiar: mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ: in Græcia verò Megaricæ, deinde Atticæ. Matthioli non adeò exitiosam esse in Italia tradit: eamque in Hetruria, si aëni depascantur, non extingui, sed profundissimo somno tantum & tempore corripit, ut non solum stupidi, sed planè mortui videantur. Id quod aliquando rusticos fecellit, nam dum aëni, quos extrinsecos credebant, pellem ad usum detraherent, accidit mirum, quod in medio ferè operis aëni experrecti sunt, non sine magno extoriantium terrore, atque ingenti spectantium risu. Perniciosum quoque virus tam foliorum, quam radices Cicu-

tæ huius pro Pastinacæ & Carotæ radicibus, illorum pro Petrofelinii, folijs imprudenter comestorum, historijs confirmant idem Matth. Comment. in l. 6. Diosc. Tragus: & alij. Idem Tragus Aleses, cum primum Cicutam degustarint, insani: & ac fatere scribit.

Flos Cicutæ, inquit Cæsalpinus, ita grauitèr olet, ut propè accedentibus, quasi murium fœtor videatur, & diutius obuersantibus capitis grauitas accedat: seminis esu aues obstupescunt ut manu capi possint, & si amplius vertigine tentantur, moriuntur.

Ceterum, exhibet Aëtius, præter Dioscoridis antidota, Cicutam haurientibus, Apij semen ex vino potandum, aut Iridis radicem, aut Selsi Massiliense: Item Nitrum ex aqua copiosiore potum. Totum præterea corpus calefacere conducit, & præsertim præcordia: quamobrem ad vehementiorem motum, ac cursum [ut ipse inquit] cogendi sunt ægrotantes. Conciliator tamen theriacam maximopere commendat, duarum diachmarum pondere, ex Distamni decocto potam: aut Gentianæ radicem ex vino. Namque hoc Cicutæ verum esse antidotum putat. De Cicutæ viribus consule Langium epist. med. 69.

CICUTARIA APII FOLIO.



Pro plantæ ratione. exiguæ est radix, alba: caulis bicubitalis, ferè minimi digiti crassitudine, longis internodijs distinctus, inanis, striatus, colore viridi, subrubente, 16 tantum ut Cicutæ maculosus siue guttatus: folia Cicutæ, quorum singularia propius ad Petrofelinum accedunt, atroviuentia, odore nullo, ut nec

sapore villo excellentè. Umbella cum Cicuta conuenit: semen gemellum, Cicutæ par, canu- latum.

Tragus scribit Cicutariam Apij folio Vitium Petrofelinii esse, aut certè aliqua ratione ad Cicutam pertinere. Cord. H. Cicutæ minoris titulo describit. Dalechampius apud Plinium Cicutam Apij hortensis specie dixit. Lobel. Obs. p. 423. Icon. p. 260. Cicutariam farum Schvvenckf. Apium cicutarium, bundis Peterlin, Stenckender Peterlin: Batileenses, ka. z. Peterlin.

In Silesia abundè luxuriat in hortis oleraceis maximè cum Petrofelinio, cuius vitium dixit Tragus.

Venenosam & perniciosam esse plantam, testatur Dalechampius, dicens: Eiu Cicutæ, quæ Apij hortensis specie incautum sefellera: ego quendam noui ad extremum vsque vitæ deuentem factum.

CICUT-
AL

CICVTARIA VVLGARIS.

Radix caussa longa, multis adnatis donata, alba, potissimum internè, sapore acri & aromatico: caules proferunt cubitales, & altiores, inanes, hirsutos, nonnihil rubentes, cannulatos: folia Cicuta foliis proxima, latiora, odorata, sapore aromatico, splendens, auersà parte subhirsuta: flores in umbella candidi, quorum singuli quinis foliis constant, supremo reliquis maiore: semen Chærefolii vel Antrisci quorundam, longum, striatum, tenue, spicco colore lucens.

Tragus vocat Chæriam 2. & Chærefolium silvestre, iudicatque esse Cicutariam; quam Dioscorides Myrrhidem cognominat. Satio autem Chærefolio consimile facit, nisi quod caules gignat Pastinacæ respondentes. Ceterum, magnitudine totius substantiæ, omniumque partium, odore etiam & gustu, satium superare ait, & interdum in proceritatem Cicutæ adurgere, radicemque quotannis nouos emittere alparagos.

Fuchsius hanc Myrrhidis titulo pinxit, dixitque vocari *Gæticæ Myrrhidis Nigellæ*: Latine Myrrhin, vulgaribus Herbariis Cicutariam, quod scilicet caule & foliis Cicutæ similis sit. Quà similitudine quosdam deceptos veram esse Cicutam putasse, cum tamen ab ea, viribus potissimum diuersa sit. Germ. Wilder Forssel appellari: Gall. verò *Perfil d'Asne*.

Dod. gall. Fuchsi figuram assumpsit, Myrrhidemque inscripsit, licet descriptio non quadret, neque nomina, quæ veræ Myrrhidis sunt. Aliam & meliorem iconem in fil. lat. pro Myrrhide exhibet.

H. Lugd. p. 79. vocat Myrrhidem Fuchsi.

De hac ait Matthioli in Diosc. Gignitur in quam plurimis Italici locis planta quædam Cicuta sicem representans, minor tamen minusque graueolens, Cicutaria nonnullis vocata, quam quidam legitimam Myrrhim censent.

Clusius Cicutariæ vulgarem appellat: verum hoc nomine Cicutæ Lobeli iconem habet. Gesn. Cicutariam, & Cicutæ similem herbam, innoxiam, quam imperitos pro Cicuta accipere ait. Bauh. phyt. est Myrrhis 4 silvestris.

An Corn. Myrrhis & Wilder forssel herbes fern Germanorum. An Cordo in Diosc. Herba minime venenata, Cicutæ nomine in pharmacopoliis prostant, semine longo & gracili: Item Myrrhis umbellifera, Cicutæ valde similis, nascens iuxta arbuta, Germ. *Büschmören* & nonnullis *Felberfern* appellata: An Amato Myrrhis, vulgè Cicutaria, ubique obuia, apud Salmanticenses abundans.

De hac Turnerus hæc scriptis mandauit. Dicitur plerisque Myrrhis putatur Cicutaria dicta vulgè. Eisdem tamen dubitare video, aut perfectè nescire quæ planta sit Cicutaria, inter quos est Amatus, qui est affimet Myrrham esse Cicutariam, tamen cum professus sit Hispanica, Italica, & Gallica nomina docere, quod & facit passim, ubi nouit, hic Germanico solo contentus est, perinde ac si diuisis in Germania, quam Hispania aut Gallia vixisset, aut occuparetur esset lingua Germanica iam dictis, aut Germani Cicutariæ nomen inuenissent, reliqui nullum. Matthioli quoque haud obscure videtur ambigere, verum Cicutaria sit Myrrhis, nec ne? Inquit enim, planta est vulgè in Italia Cicutaria dicta,

Tom. III.

quæ Myrrhis putatur: & paulò post: si Myrrhis in Italia prouenit, &c. Ego hæcenus nullam melius descriptioni respondentem inueni eam quam hæc propono. Ex quo videtur nondum penitus cognitam. Dux sunt, de quibus dubito, vitæ sit Myrrhis. Vnam Angli nuncupant *Casshea*: prouenit in pomariis inter graminum sub arboribus, Cicutæ per similes, quam nolumus copiosorem videri, quam in pomario ante Pombracensis Cantabrigiæ. Altera parum à prædicta differt, nisi quod in siluestribus proueniat circa sepes & in pratis, breuior præcedenti, foliis hirsutioribus, Chærefollii similibus: vnde *Mos Cheruel* appello: adulta tamen Cicutæ similior est, adeo ut quantum ex figura licet iudicare; eisdem sit cum Myrrhide Matthioli, Fuchsio Wilder Forssel dicta.

An de hac *Casalp.* ait, Cicutaria in collibus nascitur locis huiusmodi Cicutæ simillima: sed breuiore caule, striato &c.

Montbelgardi passim abundat in hortorum pratis arboribus confitis, multum se propagans radicibus, ac propterea extirpatu difficilis, gramenque multum suffocans. In omnibus vero iis, quas Clusius adiit, regionibus spontè crescit, non modò graminosis hortis & pomiferis, sed & aridioribus quibusdam pratis, florens Maio.

Chærefolium silvestre ad ducendos menses Chærefolio efficacius esse in vino decoctum ac potu ac aduersus pestem aliâque venenâ epotù facere traditur à Trago. Nos autem non consulumus ulli, ut imitetur eum, qui Myrrhidem existimans, eam internè exhibeat, quia venenatam plantam suspicamur. Ditas familias nouimus Montbelgardi, quæ existimantes se colligere Pastinacas Germanicas hiemali tempore, his fortè fortuna offenderunt foliis destitutas, ex quorum elucet pauco, inciderunt in grandia symptomata suffocationis, torporem, infaniam, ita ut ebrios ueris exprimerent. Horum autem unus per integram diem non potuit excitari: qui vomebant, facilius liberabantur.

Curauero hos uomitu primò, dein in os per cochlear argenteum, instar lagenulæ paratum, puluerem saxonicum &c. iniiciebam. Prima familia fuit intoxicata an. 1572. Matet quidem cum filia in iure comederat radices, pro Silaro maiore quorundam, siue Pastinacæ Germanicæ; cui radices habet similiores, quam Cicutæ, eam etiam frequentior in hortorum pratis. Symptomata apparebant, qualia Dioscorides Cicutæ tribuit. Filia reiectis radicibus per vomitum, statim bene habebat. Sequenti die vocatus ad matrem ei Diaphoricon cum Mithridatio propinavi & conualuit.

CICVTARIÆ QVODAMMODO SIMILIS vel Chærefollii accedens.

Bicutales & altiores sunt caules glabri, in radicibus diuisi, per quos folia Chærefollii, tenius tamen dissecta, vel potius Phellandrii Dodonæi, verum hirsuta: umbellæ minimæ floribus albis compactæ: semina bina hispida, alpera, sublonga, longiora quam in Antrisci specie altera, à cuius seminibus facile discerni possunt, non enim ita aspera, minora, & acutiora: radices albae, fibrosæ, odore & sapore aromatico, non tamen vsquequaque grato, ceu & foliorum.

Q



Locus & tempus.

quibus Cicuta provenit: floret & semen fert Maio & Iunio. Bedfordiz iuxta murum arcis, canelcentem ob eruam Aprilis principio.

CICUTARIA LATIFOLIA HIRSVTA.

Descri.



veluti & per pediculos: umbellæ magnæ in plures alias minores diuise. flosculorum candidiorum, aliquando luteo purpureorum, aut potius amethystinorum: sub quorum pedicellis foliola acuta quaquaversum radiata: flosculos singulos sequuntur semina bina iuncta, bicornia, longa, quæ relicto stylo medio facillè diffiliunt, deciduntque, odor & sapor aromaticus subacris, sed ille quàm hic gravior & suavior: radices crassæ, obliquæ, perpetuæ, aromaticæ.

An Cord. Hist. Pityospermon à resinaceo seminis odore saporeque nomine efficto.

Meminit Gesnerus hanc herbam locis Helueticorum montanis inuenisse & in horto plantasse, foliis Cicutæ, semine oblongo.

An Lob. Adu. p. 327. vocat Myrrhidæ alteram? ac ita describit: Cicutariæ odore, siue Myrrhidis, affinis ea admodum est foliis & ramosis umbellæ minoribus; delicatioribus tamen, & semine

Pityospermon unde dictum

oblongo, Dauci Cretici, exiliore, non hirsuto, nec ita absimili sapore: è Geneuæ & Saleuæ vicinis montibus Medicus Penninus Anglus Londini ferendam curauit, mihiq; imperauit. An idem vocat Obs. 423. Myrrhim alteram paruiam Aduers. Daucoides minus Cordi? In Icon. p. 734. Myrrthum alteram paruiam. Non potest autem esse Daucoides minus Cordi, Myrrhis altera Aduers. Cordi enim Daucoidi semina sunt. Anisi minora, aspera: Myrrhidi Aduersariorum, Dauci Cretici non hirsuta: figura etiam Lobelii semina glabra demonstrat Chærephylli.

H. Lugd. præter Myrrhidem hanc alteram paruiam Lobelii, quam p. 761. pingit, ac de qua iam diximus: exhibet & aliam quam p. 789. Cicutariæ albæ inscribit. Sed & tertiam iconè dat H. Lugd. pag. iam dictâ 789. quam Cicutariam rubram appellat. Caterum Cicutariam albam Lugdunensis eandem existimamus cum nostra. Eandem etiam à nobis obseruata est, flore vel purpureo, vel rubente, in qua præter colorem discrimen haud agnoui: stirpium diligentes indagatores petiquant diligentius an differat ab H. Lugdunensis siue Dalechampii rubra: & an non tres figure vñus eiusdemque plantæ.

Camerarius b. vocat Meum Silesiacum, foliis Cicutæ & pendè caule, sed perpetuâ radice, & nonnihil aromaticum referente gustu, multiplici, nodosâ, & iuxta latera se propagante, non rectâ descendente: umbellis candidis, oblongo semine. Hoc ait Sebizio sibi communicasse.

Stirpium sanè penitus Doldius hanc plantam siccam nobis transmisit, pro Meo Silesiaco, quod scripsit esse Olnicense, & Olfenichium dictum in Mœnia, & in Saxoniz officinis pro Meo haberi: à quibusdam verò pro Imperatoria, cuius radix vegeta aromaticitate non careat, quæ subamara sit & acris quodammodo, cuius in pestefusus non contemnendus: semen ei esse longum, angustum, pectinum dentium æmulum, quale Chærefolii. Hæc ille, Diuersum tamen tradit Olfenichii Cord. ab hac Cicutaria l. 29. hist. c. 80. cui semina Anetho similia, & duplicia assignat.

An Cæsalpino Silaus Plinii, Herba in riualibus nascens: An eidem Cæsalpino Cicutaria alia Alapina?

Bauh. phyt. videtur malè multiplicare entia, separando Meū 5. Cicutæ foliis: Silesiaco Cam. cuius non amplius meminit inter Mea in pin. & Cicutariam 6. (5. in pin.) palustrem latifoliam: albam: Cicutariam albam, Lugd. Cicutariam palustrem fl. candido, Cam. an Meum Silesiacum eiusd. Itemque Cicutariam 7. (6. in pin.) palustrem latifoliam rubram: Cicutariam rubram Lugd. Cicutariam palustrem flore purpureo, Cam. Considerent tamen stirpium periti, an vna planta, vel plures: & an duæ postremæ, ut iam antè monitum, solo colore floris variant, vel diuersæ sint, ut vult Lugdunensis. An etiam eadem cum dictis sit, Myrrhis eius secunda in phyt. & pin. j. vel minor: Cicutaria 2. Cæf. Myrrhis latius minor, Cam. Myrrhis montana. Tabl. Myrrhis altera parua, Lob. & Lugd. quam Pons in Baldo spontè, etiam in horto, prouenire ait, ac perperam Lobelium Daucoides Cordi fecisse concludit, ac tandem quoddam pro vero Selsii alios pro Ligustico genuino in Seplasis ponere, quàm autem congruè, tacet.

Gesnerus cum apud illum essem vocabat Selsii æquicum, Cicutariam alteram Dalechampii, cuius figura non placet, Geneuæ proueniensem vidi: itemque prope Masimundum

ad d.

ad ripam fluminis, unde transfuit in hortum E.C. Montb. Tiguri obseruauit: vt etiam in valle Griefbachiana, bi fontes acidi. In montibus Helueticis circa Solodurum, iugis prælerum summis humidioribusque satis obuia. Circa S. Vrsane florentem mensē Maio conspicebam flore albo & purpureo.

CICVTARIA ORAA B. VLBOA
D. T



Singulari as-
urgit caule
hominis altitudinem excedente, crassiusculo, purpurascente, varico, cauo, propter terram hirsuto, palmatis internodiis distincto: folia ex articulis prodeunt crassis, magna, in alas diuisa, easque in minora folia subdividentias, Cicuta foliis similia, delicatiora, glabra, sapore non ingrato, nam & totius a-

liquin plantæ sapor est aromaticus, non fœtidus: umbellas fert paruas, styculis albis compactis: semina longa, Cicutarie vulgaris pratorum, quibus matris & decidentibus Autumno, perit & caulis, & radix, plantæque nouella ex semine nata, totâ Hieme durant, vsque ad Ver, quo tempore folia terna, vel quaterna supra terram sese expandunt, ad Chærefolium accedentia, ex virote lucida, in tres lacinias præcipuè diuisa, tres circiter uncias longa, odore & sapore aromatico, quorum pediculi ad tres uncias longi procedunt à radice singulari, breui, terbinatâ crassiusculâ, Anticoræ radici simili, vel Napis minimis, testâ cortice tenui, pullo, internè albâ, fungosâ, grati saporis, ad Staphylinum accedentis, desinente in paruas fibras longiusculas, paruas alias laterales habentes.

An. Cicutaria Pannonica quam describit Clusius?

Hanc vocat Cam. Bulbocastanoh. coniophyllon, Cicutariam Pannonicam Clusius Pan. & hult. qui quo nomine hanc plantam donaret, diu am- biguus fuit: accuratius tandem notis eius per- pensis, succurrit magis proprium (nostrâ etiam opi- nione) nomen dari non posse, quam Cicutaria. Vulgus Austriacum Peperlin appellat: Hungari Magiario salara: quod eius radice & teneris foliis in acetariis vescantur.

Bauh. Phyt. Cicutariam g. (Sin pin.) bulbosam: Myrrhidem Cicutariam Tab. Vlappen försfell. Dubito autem an sit Myrrhis Cicutaria Tabern. suspicorque radicem eius non factam esse ad plantam.

& Prope Entzheimiam Alsatia in sepibus & alibi provenit tinere Basilienis versus Milhusiam, mē- selunio florens & semen proferre incipiens, quo deciduo planta perit. In horto E.C. Montbelgar- di lata, quotannis caulescit & perit, ac semine de- ciduo mirâ se propagat. Primus qui mihi plan-

tari attulit, fuit insignis Medicus Petrus Turne- rus, qui dederat pro Myrrhide collectam Heidel- bergæ, obseruatamque Spiræ & infra Argentinam. Cicutaria Pannonica Clusii nouo Vere in hortis & herbidiis Viennensis agri locis proditi nascitur & quibusdam similibus Vngariæ locis: florens Aprilis & Maio, lunio semē plenè maturans. Bul- bocastanum coniophyllon, quod sic ob folia Ci- cutam imitantia rectè dixerit Camerarius, bien- nium solummodò durat, vel ad plurimum trien- nium. Nam è semine quo per totam Hiemem iacuit intra terræ viscera, ineunte Vere demum pronascitur; foliis binis oblongis acuminatis, an- gustis, vt multæ huius generis plantæ, à quibus tamen hoc discriminis obtinet, quod alterum germen non è medio horum, sed iuxta pedicu- lum, quo ambo nituntur, ex ipso bulbo, qui vix Orobi granum æquat, nascitur. Id si non eodem anno iustam magnitudinem assecutum fuerit, si- ue altero caulem proferre quauis causa prohibi- tum, quod vtrumque tamen rarò contingit, ter- tio demum anno floret ac semē perficit, & mar- cescente radice penitus interit; semine interim sparsio multipliciter se restaurans.

Nouo Vere radices firmiores & magis succu- lentæ cum nouellis suis foliis in Viennensi foro venales reperiuntur: coquantur enim & cum oleo, aceto & sale, primis mensis istic vulgates, quàm salubri cibo, se nescire faceret Clusius: fre- quentem tamen eius sum non sine noxa esse, & capitis grauedinem, doloremque inducere, se ex- pertum esse memoræ mandauit.

PHELLANDRION PLINII.

CAP. LXXV.

Phellandrium, cuius meminit Plinius l. 27. na- scitur in palustribus folio Apii. Bibitur semen eius propter calculos & vesicæ incommoda. Ce- terum, qualis herba Phellandrium hodie sit, inter Au. flores nondum conuenit.

Phellandrium suum habet Dodonæus; quod quibusdam Cicutaria aquatica dicitur.

Petro Turnero Cicuta aquatica Gesneri dice- batur Phellandrium.

Phellandrium esse crediderunt nonnulli Ap- pium siluestre Dodonæi.

Phellandrium Plinii sunt qui eandem esse cum Helioselinò, i. e. Apio palustri censcant. Tectis est Gesnerus in cat. pl.

Phellandrium alii pro Lauere accipiendum putant, vt idem lib. iam citato refert.

Idem rursus ait suspicari Ruellium Siler aqua- ticum herbariis hodie dictum esse Phellandrium.

Phellandrium Plinianum discitabant Lute- tiani, referente Lobelio, Rutas prætenses, quas Thalictrum nigrum Cordi cognominamus.

Phellandrium Plinii est Guilandino Ange- lica siluestris, vt testantur Lob. & Pena.

Idem tamen Phellandrium Plinii existimant potius esse Saxifragiam hircinam maiorem, Phellandrium tandem [inquit Gesn. cat.] aliis ea videtur esse, quam Filipendulam vulgus Her- batorum appellare consuevit.

PHELLANDRIVM, VEL CICVTARIA A- quatica quorundam.

Quas amat, extra quas caule extat bicubitali & altiore, pollicari, sæpè etiam brachii crassi- tiem adæquante, striato, inani, geniculis distin- cto, in ramos varios diuiso. Folia dodrantalia
Q. x plus mi.

Myrrh.

In Gsa.
Viennensis.

Aequiuoca

Phelland.
Gel Cicuta-
ria aquati-
tica

Apium sil-
uestre

Lauere

Seseli aqua-
ticum

Angelica
silu
Saxifr. hirci
maior

Descriptio

Sic describit Lobelius. Vniuersa planta simul ac tantillum tangitur virus exhalat. Radice crassa & tota facie Myrridem odorem vscam quantenus exprimit, sed folia latiores, longiora, nigriora, & semen breuius Angelicæ, vel maximæ Cicutariæ faræ par, in vmbellis latis excusso candido flore. Caulis alis brachiatus, sesquicubitus & duos cubitos æquans.

Matth. passim & Lacuna Sefelis Peloponenfis solam exhibent iconem, quasi plantam ipsam nunquam viderint. Quis autem quæso huius plantæ virosi odorem cum Sefeli Peloponenfis Dioscoridis conuenire crediderit?

Lonicerus Matthioli habet figuram, ac Sefeli tertium. Peloponnesiacum vocat. Sed nec ipse plantam agnouisse videtur.

Sefeli autem Peloponnesiacum, quod Matth. pingit, idem videtur Gelsnero, quod Rhætorum aliqui vulgò *Pidrie* vocant, vel *Pantegim*.

Lob. Obs. pag. 423. [itemque Icon. p. 733.] vocat Cicutariam latifoliam foetidissimam, perperam Sefeli Peloponenfis quorundam. Herbarii tamen Septentrionales Belgæ [nondum inuento genuino Peloponenfis Sefeli, folio Cicutæ latiore & crassiore] Sefeli Peloponenfis folio Cicutæ dixere, sed facultates reclamant. Vniuersa namque planta, vt dictum à Lobelio, simul ac tantillum tangitur, virus halat, quâ folia etiam notâ à Peloponenfis Sefeli discernitur. Quare iure quodam Tab. Cicutariam foetidam, Germ. *Stinsefer* d. *Schirling* inscripsit: Cicutam latifoliam foetidissimam Ger. Cicutariam Cast. siue Cicutariam myrridem Thal.

Mirari subit Lugdunensem duas proponere icones, quum etiam Lobelius monuerit diuersa esse nomina eiusdem plantæ. Sefelis enim Peloponenfis Matthioli figura p. 750. posita, repetitur p. 790. Cicutariæ alterius latifoliae foetidissimæ Lobelii nomine, etiam fratre Bauhino hoc obtinente: qui tamen & ipse censurâ nostrâ dignus, vt qui non animaduertit: apud Matthiolum poni iconem aliam [quàm pro Sefeli 5. Peloponenfis exhibuit, quam in phyt. & pin. Cicutariam 3. latifoliam foetidam nuncupat] eamque sine descriptione: erant monendi lectores, ipsum Matthiolum non describere, & periculum in eius opinione latere, qui foetidam plantam pro odoratâ exhibuerit: quæ animaduersio etiam magis necessaria, quàm ea in Histor. Lugdunensem.

Sefeli Peloponenfis Matthioli Tiguri in horto Gelsneri vidi, è Rhætici montibus allatum.

THAPSIA QVORVNDAM, HIRSVTA
& aspera, Cicutæ folio, flore luteo,
semine lato, alius Sefeli Peloponnesiacum.

CAP. LXXVI.

Herba cubitali & altiore, ferulaceo, tereti, in-
tusque fungoso caule, ramis multis brachia-
to, folia Cicutæ foliis quodammodò similia,
crassiuscula, hirsuta multum & aspera, in alas op-
positas subiecta, quarum segmenta singulana
semunciam longiora, serrata: vmbella lata, lutea;
semen magnum per extrema bifidum, ex rotun-
do oblongum, labiis foliaceis, simile Thapsiæ
Gargani montis, sed minus: radix sesquipalma-
ris, crassa, solida, exterius nigricans, intus alba,
Tom. III.

gustu amaro, attriti & aromatico, terram versus ca-
pillata.



Sefelis Pe- Lobelii
loponensis. *Fig.*
radix magna
est, inquit in
Adu. Lobe-
lius, intus al-
ba: foris nigri-
cans, recta &
altè porrecta,
Ferulæ, Thap-
siæve modo,
odorata & a-
liquantulum
actris. Caulis
digitum æ-
quat crassitie,
sesquicubitu
altus, ferula-
ceus, à quo
promuntur a-
lae tunonæ sue
in ambitum
sparsi, vbi fo-

lia multa. Cicutæ magnitudine, sed incurua, molo-
sa, & crispa, rugatæque. Vmbellæ multæ, Anethi,
luteæ sunt: semen latum foliaceum, compressum,
Angelicæ figura & magnitudine, sed multò mi-
nus, grauius: color illi ex pallore flauescit: o-
dor suauissimus, Æthiopici adedò simili-
lis, vt statim odoratu, cum primum videret
sem, Peloponenfis coniectarim. Et conie-
cturam certiore exploratione notarum & vi-
rum, Præceptores Monspelientes fulciant, ita
vt nullus illic ambigat de eius assertionem: cum
tamen antea nonnulli Thapsiæ speciem suspica-
ti fuerint. In Obs. à sola magnitudine differen-
tiam addit dicens, in Belgii stirpium cultioribus
& ditioribus hortis Hispano semine Pelopo-
nenfis Sefeli ortum, altero tantum maius, maio-
ribus, latoribusque foliis & semine videri. In Ad-
uers. p. 327. vocat Sefeli Peloponenfis, folio Cicu-
tæ (& sic etiam in Icon. p. 735.) huius autem figu-
ram in Obs. omittit, recipiens pag. 424. iconem
Thapsiæ r. Clusii latifoliae, pro Peloponenfis Se-
feli eius maioris: sicut etiam in Icon. p. 736. capi-
te quidem de Thapsia latifolia r. censuram poni-
mus ex Clusio, qui cum supinæ negligentia ac-
cusat, quod Thapsiam suam quam nunquam vi-
derit; eandem faciat cum Sefeli Peloponenfis, de
quo hoc loco scribimus.

Sed & C. Bauh. in phyt. in eo versatur errore,
vt Sefeli suum i. siue Peloponenfis, quod ex Lo-
belio maius & minus constituere videtur, & so-
lâ magnitudine differre refert, cum Thapsia latifolia dicta Clusii, ignoranter confundat, cum in-
terim ipse Clusius differentes asserat, & doctos
inter has distinguere se scire scribat.

Cautione sane fuit Lugd. quæ p. 751. plantam no-
stram Sefeli Peloponenfis, folio Cicutæ Penæ
vocat, & Seseleos maioris, solâ magnitudine dis-
crepantis iconem Lobelii, esse Thapsiam latifolia
Clusii & quorundam admonuit.

Tab. nominat Sefeli Peloponnesiacum *Dir.* Thapsia
Chischer Sefel. Cam. apud Matth. Thapsia. *Fig.* Camer.
ra autem à Camerario appositâ Matthiolo est ex
Gelsnerianis factâ ad plantam meam siccam, quæ
nihil simile habet cum Matthioli Thapsia, quam
ait Ferulæ ita similem, vt non facile nosci pos-
sit. Ad eandem figuram appictum semen, sub
Q 3

numero I. Cetera sem in aliarum plantarum sunt, quorum descriptiones erant apponendae: quae addit de Thapsia, & Turpetho, potius tenebras lectori adferunt, quam lucem.

Locus &
Tempus.

Thapsiam, cum essemus Montis, vocabant. Deferebatur nobis non longe ab Arelata ex Provincia di *Sahr Martin* à Leobh. Rauvolfio. Audio prodire in montibus circa Nemausum: florere mense Maio. Hanc plantam nobis etiam communicavit Iac. Rainaudetus Thapsiae nomine. Semen aliquando misit Iac. Vtenbonius nomine Seselei Peloponnesiaci. Frater C. Bauh. attulit inuentam in monte Ceti.

THAPSIA I. CLVSII, LATIFOLIA, FLO-
re luteo, semine lato, similis Seselei Pelopon-
nensis Lobelii.

Descriptio



Ferulacea habet folia, viridia, villosa, seu lanugine quadam obducta, humi veluti in orbem diffusa, ingrati saporis, inter quae cubitalis, interdum etiam bicubitalis exilit caulis, digitalis crassitudinis, nodosus, intus cauus & fungosus, raris foliis praeditus, summo fastigio magnam & latam sustinens umbellam luteorum seu flavorum florum.

quae dam maturuit semen, quod latum & acerosum est, germenque habet longum & angustum, sphaericam & orbicularem figuram quodammodo refert: radix crassa, longa, summa parte capillata, ut pleraque ferulacei generis, crassius libro vestita, foris subnigro, vel fulco, interiore parte candicante, lacteo succo plena, gustu amarissimo & acro, nauseam tamen mouente, aded ingrata est, medius eius nervus fungosus.

Thapsia 1.
Clusii

Ceterum, Thapsia haec prima Clusii, à Murcanis & Valentinis cumulo, à succi, ni Clusius descriptionis author fallitur, abundantia dicitur: reliqui Hispani *Cannaheia*, appellant, quam vocem omnibus ferulaceis plantis [quarum summa varietas per vniuersam Hispaniam] tribuunt: nam Ferulæ & Libanotides illis etiam *Cannaheia* dicuntur, quia videlicet harundinaceum caulem habent. Mirari autem subit quosdam inueniri, qui aded proclives sunt, ut non expensis probe stirpium singulis notis, sed ex leuibus duntaxat picturæ coniecturis, statim de illa iudicium ferant, quod vlti venisse iis videt author, qui huius suæ Thapsiae iconem, ad Seselei Peloponnesensis historiam accommodare non sunt veriti, & illi quidem, qui hanc nunquam crescentem viderunt, ut taceat vtriusque plantæ facultates esse dissimiles. Tab. Hist. Lugd. Lob. & C. Bauh. in Phyt. dicitur Thapsia latifolia Clusii. Verum Lob. & Bauhinus cum Seselei Peloponnesi confundunt. Id quod Clusius hic conqueritur, & nos praecedenti titulo insinuant.

Supina
quorundam
negligentia

Lob. & C.
Bauh. not.

Gaudet collibus petrosis, quales sunt non procul ab ostio Tagi supra Vlyssipponem, & multis alibi Lusitaniae, Hispaniaeque locis editoribus & Temincultis. Floret Augusto, nonnunquam maturius.

Granatenfes imperiti Pharmacopœi, huius radice loco Turbith magno errore vtuntur: peritiores autem discrimen obseruare norunt.

THAPSIA II. CLVSII, FLORE LVTEO,
foliis tenuioribus, fœniculi penè instar.

Thapsiae hoc genus cubitali donatur caule graciliore tamen quam superioris, umbellæ etiam simili florum & seminis, sed minore: folia illi multo tenuiora, quam illius, fœniculi penè foliorum instar, nullam insignem qualitatem habentia: radix longa, digitalis crassitudinis, foris nigra, intus candida & fungola, acris, summo capite villosa.

Bauh. pin. Thapsia 4. fœniculi folio: Thapsia Diosc. Aduers. Lob. & Lugd. Thapsia 2. vel tenuifolia, Clus. Hist. & hist. Thapsia angustifolia Tab. tenuifolia, Gerardo.

Thapsia haec secunda Clusii, siue tenuifolia, iisdem cum Thapsia 1. siue latifolia locis inuenitur.

THAPSIA SALMANTICENSIS, SIVE III.
Clusii, magna, flore luteo, semine lato.

Et haec longè maior superioribus, utpote caulem habens trium aut quatuor digitorum crassitudinem aequantem, instar caulis Ferulae, & sexagesimè humanam altitudinem superantem: florem & semen primæ Thapsiae non dissimilia: folia, antè quam planta in caulem assurgat, multo ampliora, in orbem tamen non secus, ac illa humi diffusa: radicem etiam crassioram.

Sed nec parum hallucinantur, qui Thapsiam hanc, siue Salmanticensem, Salmanticensibus vulgò *Cannaheia* dicunt. Cicutariam maximam & fortissimam Lobelii esse censent, inquit Clusius, descriptionis auhor. Videant autem Lectores verba Lobelii cap. de Cicutaria maxima fortida, simili Thapsiae: Clusii.

Bauh. pin. Thapsia 1. maxima latissimo folio: Thapsia 3. Clusii hisp. & hist.

Tertium hoc Thapsiae genus, quod Clusius obseruabat in Hispanica sua peregrinatione, natus est non solum agro Salmanticensi, sed etiam circa Pinciam, vulgò Valladolid dictam, & tota veterè Castellâ, ad Pyrenæos vsque montes.

Vetula Salmanticensis medicina isthuc exercebatur, huius radice vtuntur ad prouocandos menses, aliaque deiectiones molientes. Tantâ autem vi cum supernè, tum infernè purgat, vt summentes in maximum periculum saepenumero coniciat.

THAPSIA IV. CLVSII, TVERO VO-
cata, foliis glutinosis, radice nigra foris.

Eodem Salmanticensi agro & vicinis locis nascitur haec ferulacei generis planta, foliis Libanotides, per terram similiter expansis, lento quodam & glutinoso rore semper aspersis, saturâ viriditate splendentibus: radice crassâ, longâ, tenerâ & fragili, foris nigra, intus alba, lacteo succo

plena, caulem nullum obstruabat author, sed cum ferro audiuit rectum, tenuem, & in eo umbellam florum pendere in globum coactam. Cæterum totam plantam teteritimi odoris esse ait: unde verisimile esse conicit non minus esse notam Thapsiam hanc quartam Salmanticensibus uero nuncupatam, quam sit ipsa Thapsia, ad unum genus ipso autore, referenda videtur. Bauh. phyt. vocat Cicutariam 4. latifoliam scridissimam alteram. In pin. Thapsiam 3. foliis Lianotidis scridissimam Thero. Clus. hisp. Thapsia 4. Euclid. hist.

Tabernamontani. Est autem illorum imago Ferulæ folio glauco. Quomodo præterea possit Cæsalpino esse, Thapsia Carotæ folio, non video: quum longè alia ei tribuat folia 1. 7. c. 3. & semen crassius; & longius, quam Ferulæ feminæ. Tandem etiam absque ratione Cordi Thapsia 4. hist. c. 74. refertur ad Carotæ faciem Thapsiæ, cum ille in Diosc. lib. 4. c. 157. Thapsiā dicat foliis ferulaceis & Fœniculo similibus. Gesneri Thapsiam denique ad Thapsiam Carotæ folio referendam minime cenleo, quia Gesnero dicitur latissimo semine, quod huic non conuenit.

Prouenit nobis Thapsiæ Carotæ facie Montbelgardi in horto E. C.

THAPSIA CAROTÆ FACIE.



ET lata & longa sunt Thapsiæ huius folia, pediculo tam primario, quam aliis minoribus segmentorum hirsuto, aspero, rubente: segmenta in alis foliorum singularia non ex aduerso nascuntur, aliqui facie totâ Carotæ vulgaris folia satis referunt, hirsuta, venosa.

Quamuis autem hæc Herbariorum Thapsia vulgaris Carotæ effigie, ab officinis sit ueritior exstima-

uit Lobelius, & superiori Thapsiæ Ferulæ facie Thapsiæ, siue Turbith Gallico radice non parum assimilis, tamen certum est, longius à descriptione Dioscoridis abesse: est enim foliis potius Carotæ, siue Dauci agrestis, quam Ferulæ. Eidem in Obleru. & Icon. Thapsia vulgaris Carotæ effigie: Math. & Ital. Thapsia. Gal. Turbith gris. Tab. dicitur Thapsia vulgaris, & Turpetum griseum:

C. Bauh. phyt. Thapsia 2. (5. in pin.) Carotæ folio: dubitatque [ut & Lobelius] an sit Ferula agapenifera? Huius autem radice pro Turbith ueludam uti scribit. Apud Matthiolum huius conem Thapsiæ titulo pictam dedit ex Tab. dicitque Thapsiam esse Math. Ang. Lac. Lon. Cast. Lugd. & Cas. cui & Turbith albū Mesuei: esse item & Thapsiam maiorem, Cordi hist. Thapsiam ueram & Turbith montis Gargani, Gesn. h. Thapsiā uulgarem & Turpetum griseum Tab. itemque Thapsiam uulgarem Carotæ effigie, Lobelii. Sed non dissimulandum est, fratrem C. Bauhinū hinc turpiter esse hallucinatum. Cum enim Matthiolo Thapsia ad eod. Ferulæ ad similes sunt non facile, nisi à rei herbariæ peritis, una ab altera dignoscatur: præterea cum ad Dioscoridis descriptionem referat, quam in epit. & hist. germ. posuit: quæ obseco Carotæ foliis cum Ferula similitudo: ut de cæteris, ut figura, quæ non similis Carotæ. Idem dico de Thapsia Lacunæ, Loniceri, Castoris, & Lugdunensis, qui omnes figuram Matthioli habent, ductam a

THAPSIA CÆSALPINI, SEMINE CANDIDO, crasso.

Caulem ferè non excedentem bina cubita, candican. em. velut cinere asperso: folia proportionè minora, sed latioribus segmentis, & subcandida: florem luteum in umbellis: semen autem candidum, striatum, crassius & longius, in foliacea quorundam labra deorsum: radix subest candida, crassa, capite, in ramos diuiso, succo lacteo, valde acri, ut tractantium & manus & facies intumescant.

Cæsalpinus, descriptionis author, vocat Thapsiam Pisitis illa nascentem, Ferulæ feminæ similem, sed minorem & candidiorem. Quare eam ad Thapsiam Carotæ folio referendam cum C. Bauhino non puto: Carota namque & Ferula quantum discrepent, non nisi in herbaria valde rudem latet. Videtur autem Cæsalpinus statuere esse Thapsiam à Theophrasto & Plinio descriptam: Dioscoridem uero per Thapsiam non hanc stirpem, sed Ferulaginem, quam Ferulam feminam [nos Ferulam glauco folio] appellat, intelligere.

CICUTARIA MAXIMA FOETIDA SIMILIS Thapsiæ tertia Clusii

CAP. LXXXVI.



Lob. Obs. Cicutaria maxima foetida Brancionis, itemque in Icon. p. 422. ac quærit à sit Thapsia Salmanticensium Clusio, vulgè Canahæia dicta, annuè potius Cicutaria maxima foetida? Sed mirari subbit Lobelium, Cicutariā suā maximam foetidam Brancionis non describere. An

fortè non uidit plantam, sed tantum iconem. Dicta sua hæc, caule humana proceritate, crassitie

Thapsia Cæsalpini

Thapsia Cordi Thapsia Gesneri

Defect

quatuor digitorum; foliis, femine, & radice Sefeli
Pel ponensis longe maioribus, qua clinicis celebra-
tur ad menses, vomitus & alias deiectiones ci-
endas, ex Clusio desumpta sunt, & mutata voca-
bula, ut dum vocat Sefeli Peloponense, intel-
ligi Thepsiam r. Clusii.

Thapsia
Cis, 11
tertia
non est.

H. Lugd. p.790. vocat *Cicutariam maximam*
foetida n Lobeliv. C. Bauh. phyt. *Cicutariam* 5.(4:
pin.) siue *latifoliam tertiam*.

APIVM SILVESTRE DODONÆI, THYS-

felinum quorundam, plerumque lacteo
succo turgens, locis humidis
proueniens.

CAP. LXXVII.

Descri-
ptio



Stem liquorem, si rumpantur, reddentia, sapore ingrato, mixta cum amaro acrimonia: umbellam gerit *Stefalium* Petiole-
lini albidorum: *semen* rotundum, planum; Ane-
thi simile, Dod. *radices* spargit complures, digi-
ti minimi ferè crassitudine, longitudine alias
palmari alias dodrantali, candidas, eodem cum
foliis sapore.

Synon.
Arium
m. y.

Dodon. gall. inscribit Apium siluestre, appel-
latque Græcè *ἄπιον σιλουέστρον*, ἄπιον αἰ.
Gall. *Perfil* aut *Ache sauvage*, ger. *Wilder epich*,
aut *epich*. Belg. *wilde eppe*. Huius meminisse
ait Theophrastum, et adscibentem caulem ru-
beum l. 7. c. 4. Plin. uerò suspicatur *Thyselinum*,
quamvis quidam eiusdem *Silaum* existiment.

H. Lugd. p. 701. *Apium silvestre* Dodonæi.

Daucus
pallast.
Gesn.

C. Bauh. phyt. Apium 6. siue silvestre lacteo succo turgens, quod ad Daucum referri posse existimat, Gesnero forte autore, qui Daucum palustrem de hort. vocat.

Silau
Pliny.
Valerandi
non est
contra
Lobel.

Lobel. hanc pingit in Icon. p. 711. Thysfelini Plinii titulo, itenque in Obf. p. 409. ubi præterea Silaum Plinii Valerandi vocat. At Silaus Valerando Dourez & Roberto Constantino, longè alia erat planta, ni fillumur, cui flos ex luteo pallascens, cdm huic sit albus in rotundis mulsariis, etiam Dodonzo teste.

Monte.

Hort. Lul. Cuminum Alni, Thyselinum
Plinii. Oelſjuts Erlem & Cunnich. Offi-
cinæ Belgii, & præſertim Botanici Antuer-
pientes, olim perperam Meum nuncuparunt, ac

legitimi Mei loco in usu habuerunt. A nonnullis vero apud Belgas, Apium tſylueſtre, h. e. ſilveſtre Eppe, dicitur: non deſuerunt tamen alii, qui Hydroſcllinon, ſive Apium aquaticum, i. e. water Eppe, nominarent. Hydroſcllinon autem, ut alibi ſcriptum, & Sium quandoque appellatur.

Cordus in Diosc. l. c. 3. & hist. itemque Thal.
in Har. Olsenicium, Olsentz germ. nomina-
runt. Aludernum Phellandrium Plinii Apium
palustre Dodonæi existimant. Sed, auctore
Dodonæo, sylvestre Apium rectius dici potest.

Iuxta lacus, inquit Dod, virginolis ac humidis
Lucis, in ferrobibus aquas relides habentibus,
quandoque etiam Alnorum iuxta veteres trun-
cos reperitur, Iunio ac Iulio flores ac semen pro-
ferens. Reperi ego inter *Masmunster* Abbe-
tiam & *S. Germain* pagum ac regione *Kotten-
burg*, iuxta ripam stagni inter *Alnos* & *Salices*
mensis Iunio, transiit *Montebelgardum* in hor-
tum III. E. C. vbi florēt Iulio & Augusto. Locis
humidioribus, sed rariis, vt plurimum tamen
occurrit *Thalio auf der laugen Harnitz* Saxo-
nothorię

Est autem huius radix calida, auctore Dodo-
næo, & licca tertio ordine: commanducata multam
ex ore pituitam elicit, & dentium dolores
sopit. Non dubium verò est, quin & eadem ex-
tenuet, & quæat, & aperiat: vrinæ & menses mo-
ueat; & quæ Apu genera reliqua, eadem & nec
seguis, sed etiam efficiat præstat.

APLUM CIOVTÆ FOLIIS, SELINVM
alterum Clusit, semine lato.

CAP. LXXVIII.

Mylta habet ab vna radice prodeuntia fo-
lias. Cicutæ foliis non dissimilia: sed quæ
caulem ambiunt, minora sunt: caulem cubito
maiores, læpè vnicum, nonnunquam plures, &
in his vmbellæ candidorum florum, quibus suc-
cedit semen latum, minus tamen quàm Ferulæ:
radicem digitalis etiam crassitudinis, albam, o-
doratam, & vtcunq; acrem.

Clusius historiae author, vocat Selinum peregrinum alterum. C. Bauh. phyt. Apium 8. siue peregrinum folio Cicuta.

Provenit apricis, & à Sole illustratis locis: Iulio floret, Augusto semen profert, in Salmanticensi agro.

Mirum in modum urinam ciere plantæ deco-
ctum, aut aquam in qua radix macerata, Clusio
Salmanticenses referebant.

SESELI PALVSTRE LACTESCENS, A-
cris, foliis ferulaceis, flore albo, semine lato.

CAP. LXXIX.

Sefelis palustris vnicam plantam reperit Camerarius, vbi videre est in eius Horto, in quadam palude sylul vibi [Norimbergae] vicinæ, prope piscinas amplissimas, iuxta putridos arborum truncos, foliis ferulaceis, radice longa bulbifera, non exiguo admodum gustu, ceu feruore non exiguo, fauces tentante: in hortum verò translata minus vrens euasit & saporis foetiditatem deposuit, & caulem protulit ramosum, tri-

cubitale: flores candidos in umbellis, & semen latum, foliaceum. Planta est laetescens, ut quaedam alia umbelliferæ, quales sunt Thysselum Dodonzi, Chærefolium &c.

C. Bauh. phyt. meminit Seseleos palustris Camerarii, quod nono loco recenset.

OENANTHE VETERVM.

CAP. LXXX.

Oenanthē [οἰνάνθη] alii Leucanthum [λευκάνθη]: hæc non leguntur in Ald. Dioscoridis codice, nisi inter notha: nominant: folia habet Pastinacæ (ὀστράκη παρυσίνος: flores albos. caulē crassū palmi altitudine [σπυδαίου]: semen verò velut Arriples (Ἀρρίπλες): radicem magnam, multa rotunda capita habentem. Nascitur in petris. Huius semen, & caulis, & folia bibuntur in vino mulso ad secundas eiiciendas. Radix cum vino ad vrinæ stillicidia, & regium morbum utilis est.

Dioscoridis hoc caput hinc expressit Plinius lib. 21. cap. 24. Oenanthē herba nascitur in petris, folio Pastinacæ, radice magna, numerosa. Caulis eius & folia cum melle ac vino nigro pota, facilitate parienti præstant secundasque purgant. Tussim è melle tollunt: utinam cient. Radix & vesicæ vitis medetur.

Apud Athenæum lib. 10. Aristoteles libro de ebrietate scribit, coruos & canum genus inebriari, si Oenanthem herbā [τῆν οἰνάνθην]: sic enim legit Dalech. & non τῆν οἰνάνθην, quā voce quidā significari putant, Dioscoridis τῆν οἰνάνθην, cuius radix vinum olet, & madefacta, potu feras mitigat, & cicurat.] depascantur.

Obseruandum autem est Oenanthem multarum rerum æquiuocum esse. Nunc enim herbam hinc descriptam significat, quæ tamen & ipsa de pluribus & diuersis dicitur, ut mox annotabimus. Nunc Labruscæ florem denotat. Nunc Oenanthē est Vitis domestica. Nunc Armerios flores siluestres designat. Nunc Nostrum Lilium conuallium, de quo lib. 31. H. n. g.

Hodie etiam pluribus herbis Oenanthēs nomen attribuitur. Sunt enim qui Filipendulam esse dicant. De hac & sequentibus ordine dicemus. Oenanthē siue Filipendulam Monspessulanam folio Apii, veræ Oenanthæ similiorem dixit Lobelius. Oenanthem, Staphylii folio aliquatenus accedentem, habere magnam similitudinem cum Oenanthē Dioscoridis testatur Tabern. Oenanthē siue Filipendula aquatica negatur esse legitima. Considerandum an à iam dicta diuersa sit Oenanthē, siue Filipendula Rutæ folio, vel uarietas minoris bene picta à Tabernomōtano Oenanthem Myconi exhibet H. Lugd. quam ex Hispania missam ait. Est & Oenanthē succo Cicutæ facit Lobelius. Oenanthē Guilandini, vix duarum vel trium vnciarum plantula, inscribitur à nobis Flos cuculi flore multiplicato. lib. 29. Oenanthē siue Filipendula alteram montanā, diximus Pediculatē alpīnā. lib. 28. Bulbocastanō pingit Matthioli in Hist. germ. ac veram esse Oenanthē existimat. Spondyliō apud Gesnerum in scriptis Dioscoridis cognominatur Oenanthē. Oenanthēs generi referri posse Pimpinellam & appellari Oenanthillam putat Fracast. de contagios. morb. lib. 3. cap. 6. Oenantharia, de quibus Paulus lib. 7. cap. 21. agit, non sic dicta sunt, quod ὀνάνθη, h. e. è La-

Tom. III

brusca fiant, sed quod τῆν οἰνάνθην καὶ τὴν αἰσίδα καὶ ὀνάνθη, h. e. à vino & floribus Lili.

Ceterum ad Oenanthē redeamus. Alia hæc est, ab illa, inquit Marcellus, quæ in vitium genere Labruscæ flos est: hæc in herbarum censu à Theophrasto inter coronarias plantas, & flores qui secundi per Ver florent, numeratur. Illa primò & per se Oenanthē est, Vinum & florem ipso nomine indicans. Hæc, ut fit, deficientibus propriis, indicationem & nomen floris & odoris sui similitudine, ab illa facillè imptauit. Nec idèd Oenanthē dicta est, quia Labruscæ flos sit: sed quod candidus illi flos, racemi specie, ut in Labrusca, sit: & præter racemosum illum florem odor qualis in pubescente Vite, floreque eius sentitur. Amat hæc tepidiora loca; quondamque ad coronas in hortis etiam ferebatur, in quibus non tantum odore, sed longiore florum suorum vitā placebat. Hanc Dioscorides ait Cerascomen vocari: quā voce Staphylinum, i. e. Pastinacā, à quibusdam nominari dixerat. Cui, quoniam hæc folio similis est, idèd & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Cerascome significet in Pastinaca querendum est. Eandem Leucanthum vocari hinc ait, manifesta à florum candore significatione. Neque enim ipsa eius vocis vis est. Hactenus Marcellus, qui quam plantam per suam Oenanthē intelligat, nos latet.

FILIPENDULA.

CAP. LXXXI.



Nomen huic fecit radicis in latum magis spactæ, quam altè depactæ glandularum; oliuarum, aut longiorū, minusque ventriorum, Aphodeli more, foris ex rubro nigricantium; intus alben- tium, acrimoniā quandam cum adstrictione dulcedine & leui amaritu- dine sapien-

tium, per fibrarum fila pensilis connexio: folia Pimpinellæ seu Saxifragæ maioris, atro virore splendentia, angustiora, profundius lacinata; nullis pediculis alternatim costæ adnascuntur; quæ minima hederacea foliola intercedunt: cau- les cubitum vnum aut duos alti, solidi, teretes; laeues, subrubentes, in alas diuisi flores sustinent, in paniculæ modum sparsos, inuicem volentes, al- bos, aucto quoque foliorum mucrone rubentes, in quorum mediò magnus apicem luteorum ple- xus sese explicat: semen sequitur muscosum, squa- mosum, rotundum, Pimpinellæ.

An Molon à Plinio lib. 26. c. 7. descriptum? Melius certè accedere videtur ad Oenanthēs

R.

Dioscoridis descriptionem, quamvis non desint qui Filipendulam, Oenanthen Dioscoridis esse negent, nullum ipsi aliam, aut saltem meliorem interim ostendentes.

Oenanthe
Theophr.

Marcelli
Ceras
& Tabern.
Lap. us.

Vitis flo.

Cham.
terrestris.

Cham.
madri.

Cham. it.
terr. lris.
Oenanthe
aduersus
Necrosis.
lun.

Ab hac quidem Filipendula, siue Oenanthe Dioscoridis nobis alia videtur Oenanthe Theophrasti & Hilt. vitis, flore commendata, ubi Vitis floram Gaza uerit. Theophrasti descriptione considerata. Quare etiam à Marcello & Tabernamontano dissentimus, qui duo, duas has Oenantes unam eandemque facere deprehendunt. Sed nec Cordi opinio nobis ardet, dicentis in Diosc. lib. 3. cap. 14. Oenanthen Gaza Vitis florem apud Theophrastum interpretatus est. Satis huic respondet herba, quæ Filipendula iā vocatur, quod glandibus similes radices à longis & tenuibus fibris seu filis pellant. Germani proprio vocabulo *Erdeißen* / quasi terrestrem glandem, à radicum similitudine appellant. Videndum tamen est, ne cum hac Chamædri confundamus, quæ nobis *Erdeyße* / i.e. terrestris Quercus vocatur.

Filipendula hanc & ex inquit Lob. eo Camerarij, radice & flore sua quiddam halantem, præsertim quibus in tractibus Linguæ, gotticis & Aquitanicis, obesse naris Commentator non respulset, inquit Lobelius, ne Dioscori (Corn. Tragi, Fuchl. Gels. Tabern. Dod. & aliorum) sententiam spreuisset, si verba Dioscoridis pressius perpendisset: & locis aridis petrosisque plurimum creuisset. Siquidem flos candidus, semen muscosum, squammosum, caulibus cubitum & squicubitum altus, itemque radix non altè infosca, sed late sparsa & ampla è pendulis fibris multis pilularum, perbellè quadrant Dioscorideæ effigie &c.

Filipendulam hanc vulgè dictam Arnoldus Villanouanus à radicis similitudine, Antore speciem fecit: nos tamen cum Gesnero de Lunario, toto genere differre asserimus.

Theod. Dorst. Viscaginem & Scrophulariam turpi errore cognominat, eamque apud Laurentium Phrisium à Græcis *Sefeli* vocari scribit, cum quo viribus conuenire quidem, sed formâ discrepare refert. Quod huic si concedamus, tamen rursus merito hallucinari dicitur, ut qui non significet, quod *Sefeli* intelligat. Ego quidem eo modo *Sefeli* aliud dixerim quo is Scrophulariam & Viscaginem appellauit.

Incertum est inquit Cæsalp. utrum hanc Filipendulam folijs instar Millefolij, aut Tanacetij, aliam in. er Apii genera à nobis descriptam Recentiores intelligant, nomine Filipendulæ, cui vires ad calculum frangendum & vrinam pellendam tribuunt. Quicquid autem sit, huic quoque Filipendulæ eandem vires inesse, & efficaciores ob amaritudinem putandum est.

Synon.
& Numi.
na ling.

Medicis vulgè, ut Trago, Corn. Theod. Dorst. Cordo. Matth. Dod. gall. & Lat. Anguill. (qui ait vocem esse vitatam Trotulæ & Galeno, vocarique in Syria Antula) Gels. hort. & de Lunario itemque cat. plant. Lonic. Cast. Thal. Camer. Tabern. & Cæsalp. Filipendula dicitur. H. Lugd. p. 782. Filipendula; Oenanthe multorum. C. Bauh. Filipendula vulgaris. Cordo in Diosc. Fuchl. & Lac. Oenanthe. Lob. in Obs. p. 420. in Icon. Plant. p. 729. Oenanthe, Filipendula. C. Bauh. phyt. Oenanthe 9. Nic. Myrepto, *φάρμακον*, Filipendula: Italis ac Hisp. *Filipendola*, Gallis *Filipende*. Germ. *Koot Steimbrey*, id est, Saxifraga rubra: item & *Wildgarben* / i.e. Millefolium filuestre: Boh. *Čáskyf*.

Filipendulam obseruari Butmii Rhetorum in pratis, Patuui in orto publico, D. Cortusi, & aliis. Ferrariæ in orto Cænobij S. Dominici à l'Angeli, Genevæ in multis pratis, ut pagi *Bourdignis*, florentem Maio, Junio, & Julio. Lugduni habebam in orto, itemque Montbelg. in orto Ill. E. C. ubi feliciter prouenit ex plantatione, & se multiplicauit, ac Hieme folia virentia reseruauit. In asperis, aridis, ac petrosis apud Germanos ac Britannos humilior exit, in hortis luxuriat ac altius attollitur, inquit Dodonæus: Iunio ac Maio in flore est, succedente mox femine. In Anglia non procul Bristoia ad Vicentii rupes & caules deuectas, eodem tempore flores Lobbello. In montibus ab utraque parte Rheni Filipendulam nasci scribit Tabern.

Cæterum, Matthæus Sylvaticus ac Simon Iannensis puluerem radices aduersus morbum comitialem commendant: atque cibis frequenter mixtum, valde vtilem, & efficacem referunt, & contra tormina, intestinorumque status conuenire, præsertim addito Fœniculi semine quoque affirmant. Dodonæus Filipendulam ac præcipue eius radicem, manifestè calidam ac siccam esse, aperientem & abstergentem dicit, cum nonnulla tamen adstrictione: ac Decodum radices vrinæ & calculo pellere: *dysurie* ac vrinæ stillicidio laborantibus prodesse: & simile de Oenanthe Dioscoridem scriptum reliquit. Alii Filipendulam proximè accedere qualitatibus ad Præoniam scripsere. Et hinc epilepticos, analepticos, atque vertiginosos, eximia quiddam prærogatiua magnopere iuuare Filipendulæ radices reulit Lobelius. Bayrus tamen de morbo. dist. 1. tract. 5. c. 3. ad epilepsiam succum Filipendulæ multum commendauit. Fuchsius etiam in lotij stillicidio & vrinæ remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorumdem conuenire testis est: eadem stomachi inflammationes discutit, medetur & tussipiosis, & anhelantibus, & omnibus morbis, quos causa frigida concitauit: farinam eiusdem cibis comitialium inspergunt. Quicquid sit, huic quoque Filipendulæ eandem cum sequenti vires inesse & efficaciores ob amaritudinem putauit Cæsalpinus. Pulsis, inquit, radices cum vino haustus dolores stomachi sanat, & iliacam ex frigida causa ex statu: lapidem frangit, & vrinam impellit: idem præstat extrinsecus fouendo, inclusus faculo, & in vino & oleo feruefactus: in cibis confert epilepsie & asthma. Aqua totius plantæ distillata medetur pesti, & venenis, & calculo renum, & vesicæ. Plura de huius usû & facultatibus scriptis prodidit Tabernamontanus.

OENANTHE, SIVE FILIPENDULA Millefoliata, folio Apii.

CAP. LXXXII.

Perinde ut Oenanthe vulgari, seu Filipendulæ, ita & huic glâdulose radices longis fibris pendulæ latius quam alijs propagantur, tunica nigricante contecta, intus alba, Pastinacæ germanicæ quodammodò sapore, gratiore tamen, dulci: huius folia plurimum ladunt, primâ germinatione lata, mox Petroselinij vulgaris seu Apii hortensis (à cuius etiam sapore parum abluunt, nisi quod plusculum adstrictionis habeant) ex virore penè lucida, supra terram expansa



panis, demum
Peucedani ef-
figiem in-
duunt: caules
plures surri-
guntur caeli,
angulosi, stri-
ti, cubitum &
sesquicubitu
alti, multis a-
lis concavi:
flores in um-
bella muscosi,
admodum mi-
nuti, vel ex al-
bo purpura-
centes: semina
differunt à præ-
dicto Petroseli-
no, quo mul-
tò longiora,
veluti capitulum habent.

tia.

Videtur plantam in præsentia delineatam, Matthioli in post. com. cum mag. fig. Oenanthen 3. vocare, non tamen legitimæ Oenanthæ speciem facere.

Gefn. hort. appellat Filipendulæ aliam speciem foliis ferè Apii hortensis, circa Monspelium.

An Cæsalpino Petroselinum filuestre vulgò appellatum, & à Recentioribus Filipendula?

An Lobelio dicitur stirps nostras in Adu. p. 326. Oenanthe minor & verè Oenanthæ [sive Filipendulæ vulgari] similior? An eadem in Obs. p. 420. Oenanthe angustifolia, exiliore folio à vulgata Oenanthæ solùm diuersa? An in Icon. Plant. p. 729. Oenanthe angustifolia? An hæc inquam Oenanthe angustifolia Lobelii diuersa sit, vel tantum variatio, aut summitas nostræ Apii folio, arefactis prioribus foliis, inuestigandum damus posteris.

An Oenanthæ species Scrophularia dicta Hist. Lugd. An eadem Hist. p. 783. Oenanthe 3. Matthioli?

Tabern. vocat in Hist. Filipendulam 3. & Oenanthem selinophyllon, præcedentibus similes habentem radices, nisi quòd paulò maiores & longiores sint: caules similes secundæ; folia verò similia Petroselino Macedonico, sed multò minor: flores ex umbellis.

Camer. in Hist. Matth. Germanica in tabella Oenanthæ alius hoc signo †, itemque in Epitome (duas enim icones in una tabella exprimit, quarum maior cum nostrâ Oenanthæ folio Apii conuenit) figuram nostram pictura exhibuit, ac dixit, Matthiolum in lat. herbario plures Oenanthæ species ponere, nullam tamen integrè describere solùmque dicere, radicibus & umbella cum Filipendula conuenire. Se verò depingendam curasse, non quòd sit vera Oenanthe: sed quia nominæ destituitur, maluisse sub hoc nomine ponere quàm sub alio.

C. Bauh. apud Matth. & phyt. vocatur Oenanthe 1. sive Apii folia: secunda Matthioli Lugd. Angustifolia Lobelii: Filipendula Castoris, Filip. tenuifolia Tabernamontani. Item phyt. Oenanthe 2. sive Pastinacæ syluestris folio, semine oblongo: Oenanthe species Dalechampi, Scrophularia quorundam Fl. Lugd. p. 783.

Tom. III.

Florentem circa Iunium Monspelii reperiri inter Perous & lacum. Audio etiam in silua Aigremont prouenire: Eandem obseruavi in horto Gelnerti & Ioh. Funckii florentem Septembri. In hortis quidem mutatur nonnihil hæc Oenanthe, sed non tantum ut Pastinacam foliis sub muscariis imitetur, vt exprimitur à Matth. Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. perennem, florentem Iunio, Iulio & Augusto. Martio mense autem obseruavi veteres radices putrescere, & novas producere. Hanc etiam in Italia spontè nascentem, in horto D. Cortusi vidi. Prouenire tandè scripsit Camerarius in collibus & locis à Sole illustratis.

Credetur iisdem esse viribus, quibus Filipendulam pollere diximus.

Vires

OENANTHE STAPHYLINI FOLIO

aliquatenus accedens.

CAP. LXXXIII.



Folia huius Deser.

Inferiora ad infima folia Oenanthæ Monspelulanae accedunt, nisi tenuius essent dissecta: pediculus est plusquam spithameus, cui æquales ex aduerso sitæ alligantur alæ in folia Petroselini subdiuisæ, delicatiora utrinque, & incisurâ concinniore, ad Staphylinum quodammodò accedente: reliqua folia ad caulium alas enata Peucedani foliis proxima, id quod etiam in Monspelula Oenanthæ obseruamus, cuius etiam cauli similis est, & huius caulis pulchrè striatus: alludit quoque umbella densissimis muscariis albicantibus stipata.

An est Matthioli in com. cum mag. fig. Lat. & Ital. Oenanthe secunda, quam ait à Cortuso missam, negatque legitimæ Oenanthæ speciem. H. Lugd. p. 783. vocat Oenanthem Matthioli secundam.

An Oenanthe secunda Matthioli

An Tabern. in Icon. Filipendula tenuifolia, Roter Steinbrech? An in hist. Filipendula secunda? Icon eius accedit ad Matthioli iconem, mutatâ tamen, prout apud eum consuetum, illâ nonnihil; an in melius ipse iudica: nobis non placent folia sub umbellis.

Plantam à nobis descriptam vocat C. Bauh. phyt. Oenanthem tertiam, sive Pastinacæ syluestris folio, semine Atriplicis, itemque Oenanthæ alteram speciem; qui nobis plantam ex horto Patavino attulit.

OENANTE SIVE FILIPENDULA

aquatica.

CAP. LXXXIV.

Billi oliuares ex tenuibus pendent filis plures, quos nò nisi attentâ cautione cueli.

R 2



las, abruptū. tur quippe facilē; sequentibus cautem dūtaxat fibris: caulis cubiti & lequicubiti altitudine, striatus, concauus, ramosus, geniculatus. Folia inferiora parcius secta, reliqua longioribus & tenuioribus segmentis celsa. Umbellæ parvæ, albæ: semen oblongum in duas veluti cuspides definit.

Æst Matthioli in post. comm. cum mag. fig. Lat. lib. 3. cap. 118. & Ital. cap. 129. Oenanthe quartam in Compend. p. 548. describit: nec saporem, nec odorem, nec colorem assignans.

Tabern.

Tabern. omisit figuram Matthioli, & tantum descriptionem ad iconem factam ponit pro Filipendula quarta.

C. Bauh. omissa Matthioli pictura, reponit Lobelii maiorem.

Lauer minus Ded. gall. Inuus odoratus a quatuor Lant. in fol.

Dod. gall. vocat Lauer minus, *Petite Berle*. Lat. in Hist. num. p. 261. & in fol. 580. Iuncum odoratum aquaticum, facitque Sii speciem alteram. Quantum autem ex Descriptione & icone licet conicere, is in sativo non observavit bulbos.

An Loban Adu. p. 326. Filipendula Oenanthe non adeo dissimilis? In Obleru. p. 421. picturam ex Dodonæo habet, hoc titulo: Oenanthe aquatica. In Icon. Plant. p. 712. sub vno Oenanthæ aquaticæ titulo duæ exhibentur figure: minor quæ in Obs. & alia maior postremò addita.

Oenanthe 4 Camer. Camer. n. 101.

Camer. apud Matth. in Hist. germ. & Epit. vocat Oenanthem quartam, testaturque in paludibus nasci spontè sine tuberculis radicum, has verò in hortos translatam, aut in aridam deplantatam, sibi demùm adfiscere. Is autem Matthioli figuram ponit nonnihil mutatam, ac aliam in eadem tabella iungit, minorem sc. Dodonzi sine tuberculis, locis aquaticis repertam.

An. Hist. Lugd. duas habet figuras

Sed & H. Lugd. p. 783. Oenanthem 4. Matthiolipingit, & fortè aliam ab ea non diversâ p. 773. Bulbocastani feminæ Dalechampii titulo. An autem Historia eandem quam nos per dictam Bulbocastani feminam intelligat, adhuc asserere non audeamus, multa licet conveniant in descriptione.

Dua plantæ Tabern. Filip. aquatica

Tabern. in Hist. dicitur Oenanthe 4. & Filipendula 4. Rotter Steinbrech sine icone. In Icon. Filipendula aquatica Wasser Steinbrech: Eadem hæc in Hist. Filipendula palustris prima die erit Wasser Filipendelwurz & Saxifraga aquatica.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. fecit Oenanthem quintam siue aquaticam, cognominatque Oenanthem quartam Matthioli H. Lugd. p. 783. & Sium, siue Lauer minus Dodonzi sine icone. p. 1093. ac etiam Sifer palustre p. 724. dubitat præterea, an sit Petroselinum silvestre Cæsalpini. Cæterum, in hortis adol. lere, ex figura Matth. refert & folia terræ proxima Chæresolio similia acquirere. Nobis autem videtur Sifer palustre Hist.

6. 2. not.

Lugdunensis p. 724. potius esse Oenanthe folio Apii, quæ loco palustri creverit, ac diversam ab Oenanthe 4. Matthioli, à qua etiam separavit Camerarius, cuius nullam videmus descriptionem ex Matthioli in H. Lugdunensi, licet id asserat in animad. C. Banthius. Quod verò sit in phyt. Bulbocastanum 3. siue radicibus multis simul runcis, quæ est Bulbocastanum femina Dalechampii H. Lugdunensi, multum cum Oenanthæ aquatica convenire, non improbat, sed nec certò affirmamus.

Oenanthem aquaticam, vt pingitur à Dodonzo, Genevæ in prato quodam copiosè inueni, ut ad fossas & riuulos. Repertam in pratis inter Bolweyer & Werththal plantam in horto Ill. E. C. sed perit. Audio in palustribus Michelfeldensibus non longè à Basilea provenire. Provenit in Misnia (inquit Camer.) & aliis locis, circa palustria, radicibus omnino repentibus, si plantetur loco sicco omnino mutatur, & acquirit bulbos in radice, quæ latè se spargit: si ramulus terrâ operiatur, citò radicat. Iuncus odoratus aquaticus vterque Dodonzi æstivis mensibus floret: Augusto semen, in hortis quidem, ad maturitatem pervenit.

Cæterum, Sium istud, auctore Dodonzo, vt odore saporeque Sium refert, sic & viribus ac temperamento simile: calidum videlicet ac siccum, & vrinæ diens. Matthioli de viribus sententiam antè posuimus. Filipendulæ palustres [inquit Tabern. qui hoc nomine plantam de qua hic agimus & sequentem, quam mox tradituri sumus, intelligit] sapore sunt amarifculus, cum levi adstrictione, calidæ & siccæ naturæ, aperientis & abstergentis facultatis. Mouvēt vrinam & arenulas, extrinsecus & intrinsecus vulturatæ. Apertur obstructions, expurgantque meatus vrinarios.

OENANTHE, SIVE FILIPENDULA FOLIO RUTÆ.

CAP. LXXXV.

Radicem habet è multis fibris compositam ab uno capite prodeuntibus: caules Oenanthæ aquaticæ: folia ab imo ad summum usque Rutæ similia, inferiora tamen breviora & minora, aliàs in duas aut tres partes divisa, superiora longiora, bina semper opposita, quorum quædam non duabus aut tribus incisuris serrata conspiciuntur, flores in corona albidos, non aliter visu, ac si quilibet corona, flos unicus esset. Nascitur in paludosis, locisque inundantibus. Sapor illi amarifculus cum aliqua adstrictione.

Tabern. huius Historiæ author, vocat in Icō. Filipendulam palustrem (secundam addit in Hist.) & Rutam palustrem, siue aquaticam, Wasser Filipendelwurz & Wasserraut. Suspiciamus nos ab Oenanthæ aquatica, hanc non diversam sed varietatem duntaxat, minus benè pictam. Lectores diligentius rem considerent.

OENANTHE MYCONI. CAP. LXXXVI

Perdoctus bonus Myconus Medicus Bælonensis tor Oenanthibus generum numerum

LIBER XXVII.



merum quoque auxit, alia hac ex Hispania missa, cuius nec nomen nec usus ante ipsum innotuit.

Hec in montibus & petrosis nata, folia prope radicem per terram spargit, minuta, incisa, latius, quadantenus Hederae modo, multo tamen minor, ut foliorum hic pictorum magnitudinem

vix excedant, inter se coniuncta & congesta, atque ideo Coriandri foliis aut Pastinacae similia, e longis pediculis pendencia, caule striatis cubitali, ab imo rubescentes, paucis geniculis cincto, tereti, leui, fere striato, & aliquantulum cauo. Radices sub sunt multae, ut in Asphodelo, septem aut octo, quandoque pauciores, coniunctae, crassae, foris luteae, intus candidantes, ex quarum extremis radicularum tenuis, & longae producuntur. In summo caule flores velut in umbella pendunt. candidi, ex quinque foliolis constantes, in medio masculi, quibus pereuntibus in valculis seu filiquis semen maturescit, foliorum & caulium sapor subdulcis, ut & radicem cum leui quadam adstrictione, corticis vero eorum amarus.

Ab H. Lugd. p. 785. (vbi haec descriptio legitur) inscribitur Oenanthe Myconi. A.C. Bauh. phyt. Oenanthe 6. siue Hederae foliis iunctis.

OENANTHE SVCCO VIROSO, CICUTAE facie Lobelio.

CAP. LXXXVII.



Non admodum nota nisi Boeae realibus praefertim Angliae erumpit ruuulis, latulentis, uic & rigis, vbi Paludapiu, cui foliis non absimilis, vel Rutae pratensis similior, multo pullulatu, virore tetro, colore & facie Cicutae. Caulis bi cubitales spargit, & radice in pares Asphodeli albi bulbos multi-

partita, & quasi brachiata, nullius fibrae vinculo, aut interuentu (locus Matthioli) continuos, teneros, gustu acres & ingratos, succo lacteo pri-

Tom. III.

mum, deinde flauescente, viroso, & exulcerante praegnant: umbella Cicutae, cui affinem autumant, qui maleficio parem expertos se asserunt. Vlos namque in acetanis nihil factum fuisse propius, quam ut interirent, aiunt: alios, qui elitasent, vertiginis tenebrosas palantes, nutantes, attonitos, inque gyrum versantes se vidisse. Et certe tam non est Oenanthe quam ab ea distat Ruta pratensis, aut Cicuta. Et haec Lobelius, qui vocat Oenanthen Cicutae facie succo viroso crocante, (croceo in Icon. Plant. p. 730.) In Obs. 421. Oenanthen Cicutae facie, eandem facit cum Olfenichio Cordi. An autem haec, sit Oenanthe tertia Matthioli, ut videtur innuere Lobelius in descriptione sua, ut etiam asserit C. Bauhinus, nescimus. Olfenichium Cordi negamus, est enim Olfenichium idem cum Apio siluestri Dodonaei.

H. Lugd. p. 783. dicitur Oenanthe alia Penae Cicutae facie. Camer. apud Matth. germ. Oenanthe Penae venenatis radicibus.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Oenanthe quarta [& non quartum] siue Charephylli foliis, tertia Matthioli H. Lugdunensi, eidemque Oenanthe alia Penae: Filipendulae altera species Gesn. hort. Filipendula 3. & Oenanthe sclynophyllos Tabernamontani. Verum si Matthioli per suam Oenanthen tertiam, & Tabern. per suam Oenanthen sclynophyllon, intelligunt eandem, quam C. Bauhinus Oenanthen, Lobelii Cicutae facie, insignis & periculosus erit Matthioli & Tabern. error, ut qui statuant salubrem esse plantam, quam tamen Lobelius venenatam dixit. C. Bauh. pro Oenanthe 3. Matthioli, posuit iconem praesentem Lobelii, an bene aliorum esto iudicium.

Umbella
Cicutae

Olfenichium
Cordi
Lobelii
notatur

C. Bauh.

CRITHMUM ET BATIS VETERIBUS.

CAP. LXXXVIII.

Crithmum, seu ut alii Crithmum [Crithmum vet. non leg.] herba est fruticulosa (Bauhinus in Botanicis) vndeque foliosa, cubitali fere altitudine, nascens in petrosis & maritimis locis, folijs referta pinguibus [oleosis] & subalbicanthibus, Porulaceae [Crithmum] folijs similibus. lactibus (Crithmum, vet. cod. Crithmum), crassioribus Lic. ex Plinio suspicatur Anguill. superfluum vocabulum tamen, & longioribus, & in gustu saluginosis. Flores habet albos. Fructum veluti Libanotis, mollem, odoratum rotundum, qui sic catus disparatur (dehiscit Sarrac. rumpitur Plin.) & semen intus velut Triticum (veteres & recentes Diosc. interpretés, alii quidam legunt: conuertunt enim, ut Triticum, Tritici modo & figura. Plinius tamen & Porulaceae videtur legisse, reddidit enim semen feruens. Et si quis Crithmum legat, ut fere Graeca exemplaria habent, & saluum semen accipiat, etiam sic ad Tritici semen similitudo aliqua fuerit, Corni habens. Radices autem crassitudine digitali, tres aut quatuor, odoratas, iundas. Semen & radix & folia in vino cocta & posita auxiliari possunt vrinæ difficultati & morbo regio. Mouent etiam menses. Editur oleris modo coctum. Conditum quoque in muria seruatur.

Dioscoridi
lustratur

Vires

Crithmi descriptio & pictura clarissima est apud Plinium lib. 26. cap. 8. Eadem vis doloris vesicae sedandi Crithmo ab Hippocrate adin-

R 3

dum laudata [de nat. mul. item de morb. mul. ac etiā lib. 2. de dicta, vbi corruptè pro *κρηθμ*, *κρηθμ* legitur, Corn.] Est autem inter eas quæ eduntur syluestrium herbarum. Hanc certè apud Callimachum apponit rustica illa necale, speciesque (eius, addit vet.) est Batis hortensis. Caulis vnus palmum altus, semen feruens, odoratum, seu Libanotidis, rotundum, siccatum rumpitur: habet intus nucleum candidum, quem aliqui cachryn vocant. Folia pingua albicant veluti Oliuæ, crassiora & falso gustu. Radices digiti crassitudine tres aut quatuor. Nascitur in maritimis petrosis. Estur crudum, coctumue cum olera, odorati saporis & iucundi. Seruatur etiam in muria, præcipui vsus ad stranguriam, folio vel caule, aut radice ex vino. Colorem quoque corporis gratiorem facit, verum largior inflationes. Aluum soluit decocto, vrinamque, & arenibus humorem trahit. Meminit idem Crethmi, quem Agrion i.e. siluestrem vocat, eiusdem libri capite decimo. Et rursus eiusdem libri cap. 15. dicens: Acoron vile est interioribus feminarum morbis, & Conyza vitæque, & Crethmos. Item lib. 25. cap. 13. ait, Crethmos agrios gramias [gramias C. H. gramias Corn. *ταρ λήγας*, gramias Festus vocat] oculorum tollit impositus, tumorem quoque potenter addit. His itaque locis de Crethmo marino loqui videtur, de quo etiam Diosc. egit. Sed idem Batim appellat, quæ est sativa Crethmus: quamquam & marinam & hortensiam Batim coniungat lib. 21. cap. 15.

Batis
Crethm
sua

Conditu
ra ex
Columella

Olus chor
dum

Columella lib. 12. cap. 7. de condienda Bati loquitur, & conditura modum cap. 13. eiusdem libri docet his verbis. Sunt etiam quædam herbæ, quas appropinquante vindemia condire possis, vt Portulaca, & Olus chordum, quod quidam satiuâ Batim vocat. Hæ herbæ diligenter purgantur, & sub umbra expanduntur. Deinde quarto die sal in fundis fidelitèr substernitur, & separatim vnaquæque earû cõponitur, acetoque insulo iterum sal superponitur. Nam his herbis muria non conuenit.

Ex his itaque colligitur, vt ait Cornarius, Crethmum esse eam quam officinæ quædam Cretham marinam, quædam Cretham, velut etiam vulgus Italicum, appellant, & quam Ligures Baticulam vocant, diminutiuâ à Bati voce. Sunt quoque qui affirmant, sale & aceto conditam in Gallias deferri. Imo etiam translatam istic ab olitoribus ad quotidianos vsus seri, & ab ipsis Bacillam vocari: quamquam etiam Fœniculum marinum aliqui appellant.

Baticula

Bacilla
Fœnicu
marinum

Dorstenio

Dorstenio & Merdissel Germanicè dicitur, in quo eius apparet impenitua, siquidem herba hæc vmbellifera nihil cum Carduis habet commune.

Galenus 7. simpl. de Crethmo ait. Est quodammodò salsuginosum gustantibus, vñ cum modica amaritudine. Quare etiam vim habet extergendi, simulque siccandi. Verum in vtraque debilius est, quàm sunt amara.

Hippocrates lib. 2. de Dieta, Crethmi succum, inter eos, qui vrinam cient recenlet. Exemplaria tamen græca *κρηθμ* vocem corruptè pro *κρηθμ* habent. Idem etiam aliàs Crethmum maximè Æthiopicum probat.

Cæterum, Crithmi nomine hæ plantæ donatæ sunt. Crithmum siue Fœniculum marinum. Crithmum tertium Matthioli flore luteo. Crithmum quartum Matthioli vmbelliferum. Illegitimus ille Matthioli Tragus, Pena auctore, Crithmi falcicornii seu Kali congener est. De Tragoma Matthioli agetur H. hac. lib. 55. Portulacæ

Tragus
Matthioli
Portulaca
marina

marinam, de qua diximus H. g. lib. 3. Crithmi Dioscoridis descriptioni melius congruere, quàm Fœniculum marinum, contendit Lobelius. Pastinaca marina, quibuldam Secacul, & Crithmum spinosum.

CRITHMV MVLTI, SIVE FOENICVLUM MARINVM.

CAP. LXXXIX.



Seculenta - De
Sedmodum
est herba, in la-
tum diffusa, pe-
dem circiter al-
ta: folia latiora
& breuiora,
quàm Fœnicu-
li, crassa, nec
tam crebrè inci-
cata, atro-viren-
tia, sapore sub-
falso: caulis Fœ-
niculi striatus,
porracei viros,
vmbellæ lute-
tex.

Trago quo- Cr
que referent, Dis
non desunt
qui Fœniculū
hoc marinum,
Discozidis Crithū,

seu Crithamon, quod & Batin vocat, esse putant. Inter hos est Cordus, Corn. Dorsthen. Matth. Anguill. Cast. Dod. H. Lugd. Cæsalp. Tabern. C. Bauh. & alii. Negant hoc Lobjtemque Tragus, cui videtur Batis hortensiana Plinii, genus esse Portulacæ verum, hodiè inco-
gnitum, illud nimium, quod Olus chordum vocant Columella.

Coniectura mera est [inquit Marantha, qui in hoc contra P. Collinutium Matthioli assentitur:] cum nescio quis vult Empetron herbam, illam esse, quæ Fœniculus marinus vulgò appellatur, quam eandem herbam, S. Petri vulgus appellat, quasi corruptè Empetrum, in Sempetrum sit mutatum: non aduertens, nihil cæteris notis conuenire: neque enim deiiciendi vim habere: sed omnium consensu Crithmum esse. Totam porò descriptionem Crithmi Dioscoridis, (deimpto tamen vñico vocabulo, respondere plantæ S. Petri, eidem tamen vocabulum *παρατις* ex Plinio superfluum videtur. Quin & Apollo hanc vocem Dioscoridi acceuisse suspicatur. Sed & auctor H. Lugdunensis Dioscoridis veterem codicem Portulacæ foliis, non latioribus (*παρατις* sed crassioribus (*παχυτέροις*) habere testatur, hancque lectionem maximè conuenire Fœniculo marino.

Lobelius contra in Aduers. negat hanc esse Crithmum, asseritque Portulacæ marinam Crithmo melius congruere quàm Fœniculum marinum, quod neutiquam Portulacæ facie sit, vt Dioscoridi placeat.

Lobelij rationem refellit Cæsalpinus, qui dicit: Baticula vulgò appellatur, & corrupto magis vocali uo *Baticula*, quæ latinè Batis dicitur, herbula fruticosa in scopulis, quæ & se-
ritur

ritur in ædificiis, videris gratia. Dioscorides cum herbulam vocat foliis Portulacæ, innuit nostram Baticulam [Crithmum multis siue Fœniculum marinum dictam] quasi parvam Batim: cum verò cubitalem altitudinem tribuit, alterum genus [Crithmum, siue Fœniculum marinum grandius cui succus lacteus] significare videtur grandius. Plinius utrumque distinguit, tradens Batim hortensem diuersam à crithmo, quam Crethmon agrion vocat, i. e. siluestre. Nec plura de hac stirpe apud autores leguntur, præterquam quòd Rondeletius Empetrum Dioscoridis esse crediderit. Et licet eandem vim & facultatem ferè cum Empetro Dioscoridis habere dicat Tabernamontanus, indeque Empetrum marinum cognominat, ad Empetri Dioscoridis differentiam, non tamen verum Empetrum constituit, ut suo loco fusiùs indicabitur, sed verum Crithmum Dioscoridis [quod huic *ῥιθμῶν* & *ῥιθμῶν*, Galeno autem *ῥιθμῶν* & *ῥιθμῶν* appellatur; Latinis verò Crithmus, Crithmum, Crethmum, & Crithamū,] cum multis aliis affert.

Crithmum dicitur Matthiolo. Dod. gall. Dorlth. Cordo & Corn. in Diosc. Lac. Anguill. Cast. & Tabern. in Icon. ubi & Fœniculum marinum. Crethamum marinum Cordo in Hist. cui & Crithmum Veterum. Crithmum marinum Dod. in fol. latino. Crithmus, Batis, Batis hortensiana Plinii, Crithmus marinus Coldébergii Gesn. de hortis: Item in Append. Crithmus vulgò Creta & Salis marina. H. Lugd. p. 768. Crithmum Matthioli & Batis Plinii. Camer. Crithmum vulgò. C. Bauh. apud Matth. Crithmum i. seu Fœniculum marinum & Batis hortensis Plinii. Phyt. Crithmum i. seu Fœniculum marinum alterum. Lob. in Obs. p. 213. Icon. Plant. p. 392. Fœniculum marinum Empetrum & Calcifraga. Baticula, quasi parua Batis vulgò Cæsalpino, Creta marina Lonicero.

Ceterum, esse scribit Tabernamontanus, qui Petroselinum marinum, herbam D. Petri, Crethamum marinum, Sampetram, Batim matijnam, Calcifragam marinam, Saxitragiam marinam, & Vnguem aquilæ vocent: Petrum verò Crethcentium Rincum marinum: Arabes Ierain, Alhulaic: Germ. Meerfenchel / Meerbacillen & Meer Peterlin: Belg. & Biabant. Zeevenfel & Zeeperfellic: Gallos Bacilles, Saint Pierre, Fenouil marin, Cresse marin. Ital. Fenocchio marino, Herba di Sant Pietro, Crithmo, Crithamo & Crethmo: Hispan. Perexil de la mar, Hinoio marino, Fenol mari, Fungo marinho, & Vnbas de agnula yerua, h. e. Vnguis aquilæ herba: Angl. Sampere & Persilpepier: Boh. stracyuio Josa.

Nascitur maritimis saxosisque locis, in lapidum rimis, ac commissuris, plurimumque maritimis Liburniæ partibus, ac non modò in omnibus Tyrreni promontoriis, scopulis ac rupibus, præsertim Argentario monte in maritimis Senensibus, & vniuerso circum Italiam littore: sed etiam in Adriatico sinu, vbi scopulosa loca: quædammodum Matthiolo contigit videre eo tractu, per quem à Timano fonte Tergestum nauigatur: namque inibi illa scopulosa littora Crithmo referta sunt. Romæ & in vniuersa ferè è Hetruria, ac aliis quàm plurimis Italiæ locis, à maritimis in hortos, ac viridaria transfertur. Vidi Patavii in hortis: Basileæ in orto Cælii florens & semina ferens nondum matura mense Nouembrii Lugduni in hortis Monspeli & Bisantii,

unde accersitum habemus Montbelgardi in horto, in quo repositum optatè conseruatur, copiosè florens, semen autem non maturans.

Qui Crithmum Veterum nobiscum statuerunt, ille legant quæ antè circa vires & usum ex his in Vires & medium attulimus. Narrat Amatus Romanum *vius*, quendam meracioris vini potui indulgentem cum Crethami, i. e. Fœniculi aut Petroselini marini dicti, muria conditi, largiore victu usus esset, in diabetem lapsus fuisse, sed adhibitis remediis intra duodecim dies sanitati restitutum fuisse. In Rhætorum Veltinia aceto conditum aliquando comedi, valde lapidum, non tamen me purgavit, vnde non abs re Empetrum esse nego. In muria autem conditum quandoque in Belgium inferri solitum scripsit Dodonæus, quod coctum, velut Cappares cum oleo & aceto edatur. Gratum quidem ad modum ciborum condimentum esse: ventriculo bene facere, iocundior, lieni, renibus, ac vesicæ prodelle: vrinam moderatè prouocare: viscera ab obstructionibus expellere: appetentiamque ciborum, excitare.

CRITHMVM SIVE FOENICVLVM MARINVM grandius, cui succus luteus.

Baticulæ hoc alterum genus ex Sicilia habetur grandius: *foliis* tenuis incis, odore Apii, sed sapore Baticulæ: *caules* tert cubitales in Autumno, ex lignosis ramis, in terra procumbentibus, crassis, *umbellis* candidis: *seminibus* iam dicto candidioribus, modicè oblongis, striatis, odoratis, & gustu feruentibus: è caulibus recentibus incis, lacteo succo manans, in lachrymam subrusam concretescente *radicibus*, vt prius ramosis & candicantibus.

Baticulæ alterum hoc genus, inquit Cæsalp. *Synon.* descriptionis author, per Crithmum cubitali altitudine intelligere videtur Dioscorides: Plinius vocat Crethmon agrion, Crethmon Hippocratis, & speciem Batis hortensis. C. Bauh. phyt. Crithmum i. seu Fœniculum marinum maius, odore Apii.

Efficacius est minore (priori) in mouendo vrinam: nam renes & vesicam mixto modo purgat.

CRITHMVM QVARTVM MATTHIOLI vmbelliferum.

CAP. XC.

Odiosum reptatu *radicum* est: sunt enim ex longissimæ, & vel minimæ fibræ reliquæ redituæ, satis crassæ, albæ, Eryngii & gustu & similitudine: *folia* in quatuor, tria, plura, paucioraue segmenta oblonga diuiduntur, semunciali latitudine, aut ampliore, longa, circumquaque serrata, sapore cum radicibus communi: *caulis* fœniculaceus, striatus, farctus, nodosus, valdè ramosus, *umbelle* latis magnæ minimis contextæ sunt flosculis, colore albedo: *semen* gracile, sublongum, quod aiunt acre & odoratum.

Tragus Crithmum hoc ad Triticum vaccinum refert, & tertio loco sub Crithami agrestis titulo describit, vocatque Germanicè Sichel *Morren* & Sichel *fraut*: quibus etiam nominibus Cordus in Dipsens. vocauit.

Crith. 4.
Camer.
P. 101.



apertis illa Tralliani diuretica. Sed cum Betonica Musz dicatur Brionitis, hæc fortè etiam Tralliani fuerit.

Tabern. in Icon. p. 101. huius iconem exhibet sub falso Crithmi Chrysanthemi titulo: itemque sub alieno in Hist. Crithmi sc. quarti, quod spinosum & Pastinacam marinam cognominat. Quare hæc nomina plantæ, de qua hic agitur, non conueniunt. Propria verò penitus omisit in iconibus, quæ in Historia, sub quinti Crithmi (cuius figuram pro quarto exhibuit) nomine dedit. Qualia sunt Crethanus aruensis Crithmi aruensis, Crithmus terrestris, & Falcaria herba. Ital. Crithmo terrestre. Germ. Suedelkraut / Sichel Möhren / Aker Bacillen & feldbacillen. Qualiter, aut à Veteribus fuerit appellatum, nemini constat.

Falcaria
herba
Veterib.
indicta

Leb. nota-
tur

Locus &
tempus

Vite

Lobelius in Adu. p. 168. Crithmum hoc 4. Matthioli nihil similitudinis habere dicit cum Crithmo Veterum, sed idem, meo quidem iudicio, malè Eryngium appellat, licet & Dodonæus in folio Eryngius adscribat, & quartum inter spuria constituat, odore & sapore fretus, quo non Crithmum led Eryngium referre ait.

Crithmum Montbelg. in agris mense Iulio, Iunio, & Augusto, in Allatia abundat, translatum in hortum Ill. E. C. suo reptatu ingenti redditum est valde odiosum, quamuis crassam habeat radicem. Circa Bisileam intra D. Ioannis portam, & pagum hünningen provenit in agris ad sepes. Nascitur in Bohem. copiosè, præsertim in agro Prageni, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus & secus vias. Copiosè provenit etiam in Flandriæ sabulosis secus Blanquebergam Brugarum, referre Lobelio.

Aperit, digerit, exsiccatur, & mediciter incidebat auctore Matthiolo.

PASTINACA MARINA, QVIBVSDAM
Secacul & Crithmum spinosum.

CAP. XCI.

Deser.

Pastinaca marina herbæ radix crassa, tenera, alba, gustui gratissima, dulcis, & rugosa, vt Pastinacæ sativæ Germanicæ latifoliæ: folia crassa, duos ferè palmos longa, spinosa, crebris diuturnis incisâ, sapore atque maturo cum quadâ salugine.



ne: caulis cubitalis, in multos diuisus ramos, quibus insidet umbellæ spinosæ floribus parvis albis donata.

Plantâ hoc Syriacè à nobis pictam & descriptam, P. itenacam marinam Monspelienfes dixere, quidam Hippocrati pophacen Dioscoridis, cuius historię respondere videtur Dalecham-

pio, diligentiùs tamen id disquirendum relinquit, alii Tribulum marinum.

Matth. in comm. cum mag. fig. itemque Hist. germ. & Epit. cum addit. Camerarii (qui apposuit figuram ex Gesnerianis & mea planta, n. falor cum pilis, inscribit Crithmum secundum seu spinosum, à Cortuso missum).

Lobelius vexat Matthiolum, ac de hac Pastinaca marina ait. Et sciunt exercitati, secundum Crithmum Commettatoris planè Pastinacæ aut Etingii gustum odoremque præ se ferre, vnde Arabum Secacul opinionem fecit, vulgus Pastinacam marinam vocat. Vtrumque litus superi inferique maris Italici hæc planta scatur, ne non putet Senensis se munus leuidentis à Cortusiana Magnificentiâ accepisse, quod pueriliter solitus est iactare, & inculcare putidiuscula infamia. Hæc ille, qui immerito Matthiolum taxat. Numquid ingenuum est fateri, per quos profecerimus: Tacuisset Matthiolus si Lobeli supercilio cõtectus fuisset, qui plures Historias clam excerptis, & ex autoribus descripsit. Lob. in Obs. p. 408. l. c. Pl. p. 710. Pastinacam marinam dixit, quam antè Dodonæus Crithmum spinosum inscripsit, ac pro Crithmo 2. Pastinacæ albæ sapore & figurâ descripsit.

Duas figuras & descriptiones vnius plantæ habet H. Lugdunensis. Eius enim Tribulus marinus p. 1367. & Pastinaca marina Penz & Lobelii, ac Crithmum secundum Matthioli p. 1396. idem est.

Tabern. in Icon. vocat Crithmum spinosum, Crithmum & Pastinacam marinam. In Hist. pro Crithmo pingit, ac pro quarto describit, ac dicit vocari Pastinacam marinam à dulci & grato sapore Pastinacæ, ob quem etiam in cibis usurpetur.

Anguill. epist. 5. dicitur Secacul: Apollini secacul. Rad. 1. supra dialatyron, Secacul legitimum. Coldenbergius in Disp. Cordi, si genuinum Secacul non fuerit, in eius locum tamen commodè substitui posse arbitrat.

Monspeli observauit ad mare florentem Augusto mense, & Vere prorumpentem: Venetiis ad litus maris: Lugduni habui in orto, accersitum Monspeli. Idem provenire locis in maris litoribus, in quibus Crithmum marinum Matthiolus prodidit.

Eodem autore ea omnia præstare potest, quæ 1. Lob. Crithmi genus, cui quod vim aliquam inusuatam habere

habere videtur. In Narbonensi Provincia radices erutas plebecula editat.

SESELI ÆTHIOPICVM FRVTICOSVM,
folio Periclymeni.

CAP. XCII.



Ramis alibitalibus, & altioribus fruticat, rigidis, lignosis, nigricante cortice interstis, in multo stramulos diductis, folia per ramos sublonga Periclymeni, angustiora, leviter acuminate, breviora quam Laureola glabra, sapore & odore lugladiis, sed multo mitiore gratiore.

q. umbella pulchra, fœniculaceæ: semen delapsis flauescens, tubus floribus gerit oblongum, canaliculatum, magnitudine seminum Fœniculi. An Tragiū Creticum Cordi in Obs. Sylu.

Matth. in post. comm. cum mag. fig. solam dat iconem Seseleos Æthiopici secundi inscriptione. Nec existimari repertam in plantam, quæ descriptioni Dioscoridis melius illa conueniat. Camerarium dixerim in Hist. germ. Matth. & Horto nostram plantam exhibere pro Sesele Æthiopico vero: in Epit. pro Sesele Æthiopico: Et sic etiam vocant Castor, Lob. in Icon. Plant. p. 644. Tabern. in Icon. & Hist. Anguill. epist. 12. & Dod. gall. qui præterea nominat Aegyptiorum *ἰσχυρὸν ὀπύων*, h. e. Cyonum phrycen, sine icone. Latinus in fol. addit figuram, cui Seseleos Æthiopici fruticis titulum appoluit, interpretatusque est *κρόνον*, *ὀπύων*, canis horrorem.

H. Lugd. p. 750. Sesele Æthiopium verum. C. Bauh. apud Matth. Sesele 4. in Phyt. Sesele 5. siue Æthiopium Herbariorum.

De Sesele Æthiopico differt Lobel. in Aduers. Matthiolum increpans his verbis. E Galloprovincia Massilia, circum atque prope Ceti montem, ora Narbonensis maris, non procul Montepelio, nonnulli studiosi stirpem hanc deferendam curarunt Lutetiam, Antuerpiam, adeoque in Italiam, ubi nondum innotuerat vel doctis. Quin ne nunc quidem notam esse Senensi Commentatori, in postremis Imaginum reculis & mutatis sententiis, magnâ iniuriâ factâ Pharmacopœorum plebi, Medicisque ignavis: Et sanè multo maiore suæ dignitatis detrimento, id contigisse magis dolendum, quam ridendum moderatis ingenii. Qui norint non vulgari moderatione & certâ prudentiâ illum quâ tum licuit lapsibus vno loco tam multis occurrere conatus: cum enim per opinionem tum fiduciæ, tum etiam emunctæ cognitionis, quam illis de se iam dudum excitaret, licuisset illi (si libuisset) non solum picturis mendosis, sed etiam verbis

Tom. III

subdolis persuadere, picturis tamen contemptus fuit, & silentio suæ dignitati consuluit. Si quæ tamen usus est vasiculâ inuersioniculâ, est illa leuis ferenda: non enim nouerat aptiores: aut si norat, se tantopere deceptum fieri, eius dignitatis non erat. Igitur quas potuit, dono puta emendicatas, idem nec recens animaduersiones, aut descriptas, in paginas congestit, perperam quidem binas (diuersæ penitus formæ pro Æthiopico Sesele) censitas, sed tamen earum unam ferè correctam istam, quæ est Sesele Æthiopium verum: cuius effigiem mutatus fuit à Dodonæo Medico multum exercitato. Quod Sesele, si ut pictum in Dodonæo, ita viuum in agro vidisset Commentator, lubens & volens suffecisset, in locum illius plantæ, cui videtur postposuisse: est enim illa non frutex, sed herba, quam Reciores Libanotidem Theophrasti prodiderunt, viribus & figurâ aliena, ab hoc Æthiopico, quem fruticem, adeoque magnum, Dioscondis correctior codex statuit esse.

Hunc fruticem vidi apud Clariss. Virum D. Cortusum, virentem mense Ianuario, qui etiam misit semina, quæ Montbelgardi lata prouenere, plantasque produxere Hiemem perferentes, Iulio ac Augusto cum floribus ac seminibus in vigore existentes. Sed & Dodonæus hoc statu & eodem tempore, in saxosis, & maritimis, haud procul Massilia, tum & aliis Narbonensis Gallie locis reperiri prodidit: Lobelius præterea etiam ad Ceti montis celsi radices, quæ in lacum vergit, uberi prouentu fructificare scripsit. Belonius author est temper virere, sponte nascens quibuldā locis apud Orgon & Salonem petram.

Idè eximiarū virū huius semen esse dixit, cuiusq. copiam se misisse Venetijs & Lugdunensibus ad Theriacam, quod scilicet, ut Dioscorides inuenit Massiliensi Sesele multo odoratus sit & efficacius.

PERFOLIATA IN GENERE.

CAP. XCIII.

De herba Perfoliata dicta, ut hoc capite verba faciamus, requiritur ordo noster Botanici. Siquidem & hanc ipsam umbelliferam non nulli Sesele Æthiopici esse censent: Alii tamen an Cacalia sit ambigunt: Nonnulli tandem, ni radix obstatet, Cotyledonem esse pronunciant. Nostro autem iudicio, tam Dioscoridi, quam aliis veteribus indicta est. Perfoliatam ex eo recentiores appellant, quod caulis eius singula folia pertranseat, penetret, atque dissecet. *Διόσκου* græcè dicitur Schvuenckl. quod nomen aliquis ante ipsū legerit, nos latet. Germani vocant *durchmax*, *Stopploch* & *Brüchwürz* itemque *Klabellfraut* / quod sc. multi vltus sit ad vmbilici rupturam, ac etiam genitalium membrorum. Quare autem Tragus concedat posse dici *Koffellfraut*, non video. Belgæ nominant *Suermas*: Gili *Persefeuille*: Ital. *Perfoliata*: Angli *Thoron Waxe*: Boh. *Pupřova bylina*.

Perfoliate nomine sequentes donauimus plantas: Perfoliata simpliciter dicta, vulgaris, annua. Perfoliata crispa seu muscota. Perfoliata annua longioribus foliis. Perfoliata alpina magna longifolia. Perfoliata minor foliis græ-

Locus & tempus

Virum
Lugdunensibus

Sesele Æthiopium
An Cacalia
An ambigunt

Nomina
ling.

Equi

mineis. Et de his quidem ordine dicemus. Ad-
dit Perfoliatam rubram Gesnerus, aliis Vacca-
riam dictam, de qua H. n. lib. 29. Itemque de Per-
foliata lutea. Perfoliata filiquosa, cuius & alte-
rum genus purpureum, tradita est H. n. lib. 21.
Perfoliata 3. C. Bauh. phyt. est Smyrni-um perfo-
liatum.

PERFOLIATA SIMPLICITER DICTA
vulgaris annua.

Defer.



Pollicari-
ferè crassi-
tudine radice-
m habet vnicam,
albam, paucis
fibris capilla-
tam, sapore
Rapunculi,
sua: canis cu-
bitum & ses-
quicubitū al-
tus, aut maior,
levis, teres,
striatus, geni-
culatus, con-
cauus, in mul-
tas alis diuisus
odore nonni-
hil aromatico
naris cum dis-
cinditur rum-
pitur ferè:

filia, quæ singulis singula apposita, ex rotundo
sublonga, glauca, Dodon. dilutè virentia, leuius,
glabra, transadigit caulis vel ramus, à quo ceu
centro vndique in circumferentiam folii excur-
runt obliqui, arcuati nervuli, sapore oleraceo, sed
feruidiore: extremi ramuli in pediculos aliquot
satiscunt: *folia* tria, quatuor, aut quinque acumi-
nata parua sustinentes, inter quæ emicant *stipules*
pusilli vmbellati, suis singulis pediculis innixi,
colore luteo, vel subluteo Dod. Alchimilla: *se-
men* iis succedit oblongum, altera parte acutius,
pullum: [Dod. subnigricans] maius quàm Palegii.
Et hæc est illa perfoliata cui primò & magis prop-
riè paulò antè recitata linguarum nomina con-
ueniunt, itemque vires de quibus mox infra di-
cemus, licet & aliis quoque attribui possint.

Synon.

Matth.
repreh.

Icones

Perfoliata dicitur Brunfelsio apud quem non
suâ effigie picta est, Cordo in Hist. Apollinari,
Dod. lat. in fol. Gesn. hort. Cast. Lonic. H. Lugd.
Tabern. Schyvenckf. & Matthiolo, cui hanc
in mentem redegit planta, quam Personatam
vocant. Egregia mehercle Matth. combinatio,
qui non inuenit commodiorem locum introdu-
cendæ Perfoliatae, licet sit interpres Dioscoridis:
is tamen satis laudabilem figuram habet: patro-
cinator verò deterior: sed & nostram sanè, quæ
Fuchsiana, meliorem optatim.

Cacalia
Lacuna
C. B. not.

Fuchs. inscribit Perfoliatum, & Dod. gall. Per-
foliatam maiorem & minorem Camer. hort.
Perfoliatam veram Thal. Perfoliatum vulgatius
flore luteo, folio vmbilicato Lob. in Obs. p. 21. &
in Icon. Plant. p. 396. Cacalia Lacuna.

C. Bauh. Perf. liatam i. siue vulgarem qui apud
Matthiolum iactat se in Phyt. septem assignasse
Perfoliatas. Sed quod annotare oportebat, Per-
foliata eius tertia, nihil aliud est, quàm Smyr-
ni-um perfoliatum. Quattam etiam & quintam
eandem credimus, sc. Perfoliatam Alpinam ma-

gnam longifoliâ, ita vt ipsi tantum quinque no-
biscum veræ & genuinæ superstitæ mancant
Perfoliata.

Malè Tragus pro Cotyledone primo Diosco-
ridis aut vmbilico Veneris exhibet Perfoliatam.
Nec placet Cæsalpinum Perfoliatâ ad Sefeli Æ-
thiopicum reducere.

Nonnullis locis in aruis, inter segetes spon-
tè exit, nascitur & in pratis ac iuxta agrorum
margines in Italia, Germania, Thuringia, Bohe-
mia, & Vvritembergiam non infrequens, alibi in
hortis feritur. Per me in hortum semine transla-
ta, semine deciduo satis se propagat. Reperit
Perfoliatam etiam in vineis Matthiolum. Iulio &
Augusto præcipuè floret: stirps est annua, quæ
semine perfecto intercidit.

Modicè calida, paulò verò amplius sicca hæc
est: vt pote non nihil amicans & adstringens.
Inter eas numeratur, quibus solidandi & ferru-
minandi vis est. Datur decoctum herbæ ex vino
paratum, aut folia in puluerem trita, internis af-
fectionibus, ruptis, & ex alto de lapsis: ad rames
intestinarum præsertim puerorum commenda-
tur: horum etiam prominentum vmbilicum, re-
cens cum farina & vino tusa, ac cataplasmatis
modo imposita, reprimat. Strumas etiam hoc mo-
do adhibita resoluit, & contra *lymphas*, vulgò
Vberbeyn efficax est. Ad fracturas etiam, her-
nias & erysipelata magni vsus esse perhibet
Schyvenckf.

PERFOLIATA ANNVA LONGIORIBVS
foliis.



Annua
huic vita
vt vulgari: cau-
les non furrigit,
sed per hu-
mum spargos e-
dit, ramulos,
cubitales, cre-
bris ceu geni-
culis intercep-
tos: *filia* tran-
sadigentes, quæ
vulgarè longio-
ra, modicè acu-
minata, quinis,
septenarius per
longum currè-
tibz venis do-
nata, quæ ta-
men à monta-
na foliorum
longitudine

vincuntur: flores in summorum foliorum aceta-
bulis sessiles, lutei, Auriculæ leporis similes. Ra-
dix tenuis gracilis, multis adnatis diuisa.

C. Bauh. phyt. vocat Perfoliatam 7. siue mi-
norem ramis inflexis, quam refert me, Perfoli-
atam aliam minorem annuam non surrectam,
vocare.

Anno 1595 mense Maio & Iunio Stutgardiz
in horto E. C. à me visa & descripta.

PERFOLIATA ALPINA MAGNA, LONGI-
folia.

Maior, maioribusque foliis donata est Alpina
perfoliata, iis verò oblongis, palmaribus
& ampli-



& amplioridus, ad Perfoliatæ Liliqoiz folia accedentibus, quæ nec aliter canis trahit; pinarum dumtaxat abs caulem complexa: verum superiora folia propius ad Perfoliatæ vulgaris accedunt, ex oblongo nonnihil rotunda. fl. parv^o, luteus, foliis rotundis obvallatus: semen oblongum, striatum, maius quam Perfoliatæ vulgaris: radices crassæ, perennes.

Eandem H. Lugd. p. 1321. Perfoliatæ longifoliæ Dalechampii titulo describit: quæ C. Bauhino quinta est, nostra verò quarta, eo sic illas perperam separante.

Tossianus Carolus pharmacopœus misit nobis Perfoliatæ Bupleuri folio nomine anno 1592. Ego eam semine colere incepti Môtbelgardi in horto Ill. E. C. ubi semen maturabat Iulio & Augusto pluribus annis durans. Hanc postea communicabat Gesnerus Quingero.

PERFOLIATA MINOR FOLIIS GRAMINEIS.



Perfoliata minor crassiusculam habet radicē, & terram velut comosam, ex qua caules pululantes plures, palmates, pedales, & cubitales, teretes, striati, per quos folia acuta, basi latiore caulem complexa, vnam, aut alterā longā, semunciam circiter lata, alia verò graminea, palmata etiam longiora.

ora, culmum lata: umbellæ inæqualibus constant muscatis stilosulorum luteorum foliorum rotundorum, vallo munitorum.

Cæsalp. vocat Selethi Ethiopici genus paruum, foliis gramineis. C. Bauh. phyt. Perfoliatam 6. siue montanam minorem folio acutissimo.

BUPLEVRON VETERIBVS CAP. XCIV.

Meminit Bupleuri Nicander in Ther. ubi memina aduersus serpentum venena commendat. Demetrius Bupleurum arborem esse

ait: sed hoc negat Scholiastes Græcus, qui Olus [*ῥαζανον*] facit, cuius mentio fiat apud Nicandrum in inscripto Hyacintho.

Bupleuron autem in sponte nascentium numero Græcos habuisse prodidit Plin. lib. 22. cap. 22. ubi hæc præterea addit. Caule cubitali, foliis multis longisque, capite Anethi (vel umbellæ tantum figuræ, vel etiamnum floris colore Dalech.) laudatum in cibis ab Hippocrate: in Medicis a Glaucone & Nicandro. Semen contra serpentes valet. Folia ad secundas foeminarum, vel succum ex vino illinunt: & strumis folia cum sale & vino. Radix contra serpentes datur in vino, & vrinæ cœdæ. Idem lib. 27. cap. 8. repetit dari Bupleuri semen ad ictus serpentium, fouitque plagas decoctâ cætherbâ, adiectis foliis Mori, aut Origani.

Quæ Ruellius lib. 2. cap. 127. de Bupleuro scripsit, cum Plinii verbis coincidunt. Eadem in Caroli Stephani prædii rustici Horto; itemque apud Phauonnum, & Gesnerum de quadruped. legitur. Sed hic quidem inter Paltinacas erraticas censeri vult, quibus & descriptione & facultatibus fauere scribit. Idem Bupleurum, bouis costam reddidit, & esse Dulbub Syluatici ait, sed quid sit Dulbub se nondum reperisse.

Plinius apud Dalechampium scriptum reliquit Bupleuron esse quibuldam Ammi vulgare. Iacob. autem Geuinus, qui specialia remedia aduersus omnia venena recenset, Bupleurin tam incognitam nobis asserit, quâ Pulbatam. Gortens tamen in catmine suo Bupleuro (ita enim vocat) eandem, quæ Idæ Cupressillo assignauit: ita enim canit.

Quibus addita disti

Semina Bupleuri iuxta Ideæque Cupressi:

Omnia quandoquidem certa sunt illa medela,

Institos que abigunt serpentum dente dolores.

Sed nec desunt, qui præter iam dicta, censent Bupleurū esse Auriculam leporis umbellā luteā, quæ alijs, ut Lutetianis Gratta DEI dicitur.

Quin & Auricula leporis altera seu rigidior, à quibuldam Bupleuron existimatur.

Acanthum germanicam, Brancam vrsinam vulgò dictā, nobis autem Spondylium, vocari à Nicandro & Plinio Bupleuron, & à Veteribus Græcis Buprestin, videtur concludere Cordus. Sed hic non leui errore Bupleuron cum Buprestis confundere deprehenditur.

Paltin.
erratica
Gort.
Bouis
costa
Dulbub
Syluatici
quid

Auricula
leporis
umbellā
lutea
Auricula
leporis
rigidior
Spondyliū
Buprestis
Cordus
error.
Buprestis
olus

BUPRESTIS VETERIBVS.

CAP. XCV.

Theophrastū hanc agnouisse, vel inde merito quis coniectatur, quod Buprestim [*Βύπρεστις*] primis imbribus, post æquinoctium germinare dixerit.

Galenus in explicatione vocum obscurarum Hippocrates scripto testatus est, præter Βύπρεστιν animal, Cantharidi assimile, esse Βύπρεστιν, olus aliud quod agreste [*ῥαζανον ἄγριον*] cuius meminerit Dioscorides partim in 7. libro saluberrimum, partim etiam in eo, qui de oleis [*περὶ λαζανίων*] inscriptus sit.

De Buprestis Plinius hæc adfert lib. 22. cap. 22. Buprestim magnā inconstantia Græci in laudibus ciborum etiam habuere: iidemque remedia tanquam contra uenenum prodiderunt. Et ipsum nomē indicio est, bouem certè uenenū esse signa-

Græcorum
incon-
stantiam
arguit.
Plinius.

Plin.
C. 27.

ranter hęc Plinius. De Buprestis herba id non traditur, sed de Buprestis insecto, scarabæo longipedi non dissimili, à Plinio lib. 30. cap. 4. descripto, Dod. J. quos dissilire degustatà fatentur.

Plinius
confundit
Buprestis
herbam et
insectum

Gen. de quad. in boue & vacca, Plinii verbis iam citatis hęc subnectit. Videtur autem animal Buprestis, quod bubus venenosum est cum herba eiusdem nominis confundere, ideoque Græcorum inconstantiam reprehendere. Cuius & ignorantie & confusionis Plinium etiam arguunt Rob. Constant. in Lex. Græco: Eortheus in defn. & Etymologia autor.

Æquiuoca

Satis itaque superque patet ex dictis Buprestis herbam eiusdem esse nominis cum animali ex Cantharidum genere.

Sinapi si-
milis

Buprestis vel Buprestis Varino est genus oleis siuestris simile Sinapi, de hoc H. G. lib. 21.

Bupleuri

Bupleuri veterum Græcorum, Cordus indigitat Bupleuron Nicandri & Plinii, non sine lapsu. Idem Buprestis veterum Græcorum ait esse herbam umbelliferam. Beancam vrsinam vulgo Germanico dictam nos Spondylium inscripsi-
mus.

Buprestis tandem quibusdam est Auricula leporis quam duplicem agnouimus, & iam tractandam aggredimur.

AVRICULA LEPORIS VMBELLA lutea.

CAP. XCVI.

Defect.



Auriculæ leporis appellantur vulgo plantam cui radix parua, rugola, subuindis fibrata, sapore acris: caulis tenuis, teres, læuis, striatus, crebris geniculis donatus, intus inanis, altitudine cubiti vnius, aut duorum, ramis multis concauis, colore subrubente interdum, aliàs viridi: folia, præsertim

quæ in caulibus existunt, longiuscula, stricta nervis secundum longitudinem pluribus donata: inferiora autè latiora sunt [quæ tamen nostra figura Guatiniana non exhibet: Flores Fœniculi lutei in umbella minus patula: quibus semen succedit Petroseini acre.

Synon.
Elaphoboscum
Ocell.
cerui
Gratia Dei
Herba co-
paria

Hęc est illa, quam Ruell. lib. 3. cap. 48. Elaphoboscum vocat, itemque Romanorum Cerui ocellum, officinarum Gallicarum Gratiam Dei, & Succisionis agri Herbarum copiarum.

Quam Tragus Herbam vulnerariam [vunde fraus] inscribit, ac Panaces Chironium esse suspicatur, eadem cum nostra est. Ipsi autem [vt & Lonicerò] assentiri non possum, vt qui Panacem vocat, cum Panax chironium, folia similia Amaro, vel vt Lacuna legit, Origano, habeat, hęc autem longè diuersa.

Cordus in Hist. Aphylli nomine describit: Camer. in horto & Dod. gall. Bupleuri: lat. in fol. Bupleuri angustifoli. Loban Adu. Bupleuri quam non malè Bupleuri Hippocratis, ex Plinii historia, nomenclaturæ & effigature quadrare credidit. Sed quæ effigies quæso apud veteres Bupleuri habetur? In Obs. p. 243. vocat Bupleurum Dodonzi & Herbariorum. In Icon. Plant. p. 456. Herbariorum Bupleuron angustifolium. H. Lugd. p. 436. Bupleuron Dodonzi.

An Anguill. epist. 11. Bupleuron Demetrii, inter Veronam & Brixiam inuentum, pulchrius montis Baldi?

Catal. Francoford. & Helfico dicitur Auricula leporis, ætiam ad 70. Casen. epist. Gall. Oreille de l'œuvre.

Montbelgardi variis in collibus copiose provenit, vt iuxta collem Rolfe, nec non propè Arbouans florens Augusto, ac etiam Octobri, Basilæ circa molendinum ad Birsam etiam Iulio, semen autem maturans Septembri & Octobri: circa montem Krenzaek in Marchionatu: Geneuz in monte Thuri. Aphyllum Cordi nascitur montanis locis, solum amat argillaceum, ciliario lapidi mixtum; radice nititur perenni. Reperturque variis Germaniæ, tum & Hispaniæ locis: Iulio ac Augusto florens deinde semina perficit.

Quia potè tota planta saporem habet subacrem, aliquantulum amarum, & saluam prouocantem, Perfoliatæ, Cordo teste, non dissimilem: ideo non abs re Dodonæus semen calidum, sicunque secundo ordine esse dixit.

AVRICULA LEPORIS ALTERA SIVE rigidior



Differentia in folio est, quod non tantum maius, sed etiam crassius, rigidius, nervosius, modicè in acumen desinens, introque flexis oris concauam carinam, aut potius leporinam, sicut etiam auriculæ referens. Et talem habeo inter meas siccas plantas

Dalechampii descriptionem, quæ placet, hic subiicere.

Fol. conspicitur longo, rigido, latiusculo in medio superne in angustum desinente, fere lanceolato, multis striis quasi distincto, nonnihil concauo & inflexo, vnde illi Auriculæ leporinæ nomen: caule procerò geniculato, in ramulos superiorem parte diuiso, umbellis in summitate pusillis, sparsis, luteolis floribus, semine Anisi aut Anethi, oblongo.

Dod lat. in fol. Bupleurum alterum latifolium inscribit

inscribit, atque Cordum Ispophyllon vocare. Sed fallitur: nostra enim stat sententia, esse Bupleurū angustifolium.

Lobel. in Adu. p. 192. alteram Bupleurum cō-generem latifoliam, Auriculam leporis dictam. Elaphoboscū n. esse negat. In Obs. p. 244. & Icon. Plant. p. 456. alterum Bupleurum latifolium.

Hist. Lugd. duas & descriptiones & figuras habet vnius plantæ, ac planè similes, vt vna ex altera facta videatur. Harum prior est p. 436. hoc titulo: Bupleurum alterum latifolium Lobelii, cuius etiam descriptionem retinuit, ac officinas Monspelienses Auriculam leporis vocare ait: Lutetiz nunc Graciam, nunc Elaphoboscum: Quoddam Bupleurum Plinii. Alteram, quæ p. 741. Panaces Chironum quorundam Dalechampi inscripsit, alios Bupleuri speciem, Monspeliensibus Auriculā leporis dictam, vocare retulit; alios Elaphoboscum, quoddam verò Bupleurum Plinii. Vides inanem repetitionē duarū descriptionum & figurarum.

C. Bauh. phyt. vocat Bupleuron 2. siue folio rigido, & Bupleuron maius Gesnero.

Multi sunt anhi ex quo habeo Auriculam foliis rigidis, vnde, non recordor. Gener Cherlerus attulit collectam circa Monspelim, in idem in locis, in quibus prior occurrit, & procul Gramōtia silua, longè frequentiore.

AVRICVLÆ LEPORIS AFFINIS, ODON- titis lutea Valerandi & Dalechampi.

CAP. XCVII.



DVRā, li-
gnosa, al-
bicante, sim-
plici radice
nascitur, à qua
statim colliculi
aliquot sur-
gunt dodran-
tales aut paulò
maiores, Bu-
pleuri similes,
in multis ra-
mos diducti:
folia incōdita,
linariæ f. sculi
lutei Persolia-
ta, vallo folio-
rum oblongo-
rum, acutiorū
que circūdati:
semen Poly-
gopi Tragi fe-

rè simile, quod fœculi vocant.

Cæterum, magnam eam affinitatem cum O-
donitide purpurea Plinii, quæ est flos cuculi
Tragi, ob quam à Dalechampio apud H. Lugd.
1668. nominata est Odonitis lutea, animadu-
tere non possum.

Miror etiam C. Bauhinum hanc plantam re-
ferre ad Caryophyllos [Petonicas sc. coronarias]
facereque in phyt. Caryophyllum 40. siue flos-
culo mirulo luteo.

Rantzius hanc quoque dedit collectā in Eu-
ganeis mōtib. I. H. Cherlerus ex acchibus
Ætius Castellonouanum Monspeli attulit, sub

Tom. III

nomine Bupleuri graminei. Locis humidis gau-
det.

Huius decoctio si quis os colluat, dentium vī-
cruciatu sedari scripsit Dalechampus.

AVRICVLÆ LEPORIS MINIMA.

CAP. XCVIII.



PEDALIS aut
cubitalis Desf.
est piacula, quæ
ex radícula
candida, dura,
lignosaque, fi-
bris aliquot
exiguis prædi-
ta, colliculus sur-
rigit graciles,
teretes, multas
ramulis, ab
imo ad summū
brachiatos, in
paruas veluti
umbellas de-
sinentes, quæ
exiguas foliolis,
tenuibus, &
rigidiusculis
constant, & in
eorum medio

semina prominent ex breuissimis pediculis, tria,
vel quatuor, striata, ad Petroselinum vulgare ac-
cedentia. Alas verò singulas, singulum ab ima
parte inuestit folium, longitudinis vniæ & semis,
Q. lonicæ Valerandi & Dalechampi per simile,
tribus aut quatuor per longitudinem nervis
præditum, acuminatum. Flos mihi hæcenus non
visus. Sapor exsiccate euanidus & obcurus.

Philoxæ inter Bytham & syluam, quæ Augustā
itur crescere audio in hi data à Richnero.

NARDVS INDICA VETERIBVS

CAP. XCIX.

HÆC EST illa Nardus, quam Theoph. hist. lib.
9. cap. 7. cum omnibus aliis, aut plurimis e- Nardus
doratis ex India aduehi narrat. His sc. quibus v. Theoph.

Dioscorides duo Nardi huius genera tradit:
vnum Indicū appellatum, alterum verò Syria-
cum: non quod in Syria nascitur, sed quod mōtis
Indiæ, in quo reperitur, pars una Syriam, altera
Indiam spectet. Ac in eius quidem, quæ Syria-
ca dicitur genere præstantiore eam censeri,
quæ recens sit, lauis, comosa [arabum quæ], Vet. cum
Ruell. præstantior, colore flauo, perquam odora-
ta, quæque præterquam quod odore Cyperum
imitetur, breuem [uncguem, manu vet. unguem]
habeat spicam, gustu sit amaro linguamque ma-
ximè siccante, ac in sua odoris gratia diutine
permaneant. Ex Indiæ verò Nardi genere esse
Gægeticam dictam, à fluio quodā Gangēte no-
minatō, qui montem, ad cuius radices ea nasci-
tur, præterfuit. Hanc viribus esse infirmioribus
quod in locis aquosis proveniat, esseque proce-
norem, atque complures habere spicas ab eadem
radice tum comolas, tum sibi inuicem circump-

voluntas, vniſque redolentes. At quæ in editiore montis parte legatur, odoratiorem eſſe [vet. addit *ἡ μὲν τῆς ἀριστερῆς*, cui lectioni adſcribitur Galenus S. ſimpl. & Paul. cap. de Nardoſtachi: puſillaſque habere ſpicas, iucundumque Cyperi odorem æmulari, ac ceteras habere in ſe dotes, quas & Syriaca cognominata. Eſſe quandam, cui Samphariticæ nomen à loco inditum ſit, admodum puſillam, attamen magnas habere ſpicas, inter quas mediis interdum prorumpat caulis, candidior, & ſupra modum hircum olens. Hanc dammare in totum oportere. Vendi & madefaſtam: quod vitium ex eo deprehendatur, quodd candida ſit ſpica, ſqualida, nullaque obſita lanugine. Adulterari inſpirato Subſio cum aqua aut vino palmeo quò videlicet magis compaſta, ponderoſiorque appareat. Vſus temporis, ſi quid luti radicibus adhaeſerit, idipſum auferre oportere, vt & puluerem cribro ſecernere, ad aquam eluendis manibus dicatam accommodum. Vin habere exalſcandi, exſiccandi, vrinæque ciendi. Quamobrem & alium epotas ſiſtere, & appoſitas ex vtero fluxiones, ſanienque compellere. Ex frigida vſu potas, nauſea & ſtomachi roſionibus auxiliari: itemque iis, qui à flatibus exagitantur *ἡ γὰρ τῆς αἰτίας ἐστὶν. Vet. ἡ γὰρ τῆς αἰτίας ἐστὶν*] hepaticis, & encis atque nephriticis. Aqua autem incoctas euſu ſeu inſeſſa [coctas verò in aqua & pro ſomento ad inſeſſus adhibitas] vſu inſtammationibus adhiberi. Facere & ad ſuperfluo humore redundantes oculorum palpebras, dum ipſa cilia adſtingunt & condenſant. Quin & ſiccās humentibus corporibus ad ſummouendam graueolentiam vtiliter inſpergi. Miſceri etiam antidotis. Porro ad ocularia quoque medicamenta vſque ad ſummum leuorem tritas & cum vino in paſtillos conformatas vaſe nouo non picato recondi.

De folio Nardi plura dici par eſt, vt principali in vnguentis, inquit Plin. lib. 12. cap. 12. Frutex eſt grauiſ & craſſa radice, ſed breui ac nigra fragilique, quamuis pingui ſtem redolente, vt Cyperi (aut Cyperum M. CH.) aſpero folio, paruo, denſoſo. Cacumina in ariſtas ſe ſpargunt: idèò geminā dote, Nardi ſpicas ac folia celebrant. Alterum eius genus apud Gangem naſcens, damnatur intotum, Ozænitidis [Gangitidis Dioſc.] homine, virtus redolens. Adulteratur & Pſeudonardo herba [item luto ſiccæ radici permixto, ex Dioſc.] quæ vbiſque naſcitur, craſſiore atque latiore folio, & colore languido in candidum vergente. Item ſua radice permixta ponderis cauſa, & gummi, ſpumæque Argenti aut Stibio, Cypetine cortice. Synterum quidem leuitate deprehenditur, & colore ruſſo, odorique ſuauiſſime, & guſtu maximè ſiccante os, ſapore iucundo. Pretium ſpicæ in libras x. c. Folia (Malabathri, ſubintelligi vult Dalech. quodd ſc. de Malabathro verbis totidem & iſdem hæc referat Arrienus:] diuiſere annonam: [Annonam pretium mercis vocat] ab amplitudine Hadroſphærum vocatur maioribus foliis [pipul's CH.]. xxx. Quod minore folio eſt Meſoſphærum appellatur: emitur x. lxx. Laudatiſſimum Microſphærum è minimis foliis: pretium eius x. xxxv. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui ſi M. inueterauerit nigriori melior. In noſtro Orbe proximè [primum Dal.] laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum [Ponticū Dioſc.] quod aliqui ægium vocant, &c. Sunt autem ea omnia herbæ præter Indicam. Idem lib. 13. c. 1.

Nardinum ſive foliatum [vnguentum] conſtat Omphacio, Balanino, Iunco, Coſto, Nardo, Amomo, Myrrha, Ballamo. In hoc genere conueniet meminiffe herbarum, quæ Nardum Indicam imitantur, ſpecies nouem à nobis eſſe diſtas: tanta materia adulterandi eſt. Omnia autem [vnguenta: ergo etiam & hoc,] acutiora ſunt Coſto, Amomo, quæ maximè nates ſerunt: craſſiora Myrrha, ſuauioraque: Medicinæ autem vtiliora Croco: acerrima per ſe Amomo. Lib. 16. cap. 32. inquit. Non ſciunt Amomi Nardi delitæ, ne in Arabia quidem ex India naue peregrinari. Tentauit enim Seleucus rex. Illud maximè mirum ipſas arbores plerumque exorari, vt viuunt atque tranſmigrant: aliquando & à ſolo impetrari, vt alienas alas, aduenasque nutriet: cælum nullo modo fleſſi. Tandem lib. 21. cap. 3. ait. Eò luxuria proceſſit, vt non eſſet gratia [coronis] niſi mero folio: (Merum ſolium dicit aroma Indicum, non autem floris Roſæ folia, Dalech.) ſubtilibus mox petitis ab India, aut vltra Indos. Laudatiſſimum quippe habetur è Nardi folio eas [coronas] dari, aut veſte ſerica verſicoloreſ vnguentis madidas.

Nardi ſpica vocatur à Galeno, quo authore 6. *Spica ſimpl. exalſcit* exceſſu primo, deſiccatur ſecundo completo. Compoſita eſt ex adſtingente ſufficienter ſubſtantia, ac acri, calida non multa, & quadam leuiter amara: ex his conſtans facilitatis radix, & ad iecur, & ad ſtomachum rationabiliter conuenit, tum pota, tum extrinſecus impoſita. Vrinam ciēt, morſus ſtomachi ſanat, in ventre ac inteſtinis conſiſtentes fluxiones deſiccatur, ad hæc & eſs, quæ in capite & thorace. Valentior eſt vocata Indica, quæ nigrior eſt, quàm Syriaca.

Nardi ſanè deſcriptionem & integram & euidentem propoſuit Dioſcorides nec ambiguum eſt vbi locorum mons ſui quo naſcitur. Clarè enim dixit in India ipſum eſſe, & alteram ipſius ſpeciem Indicam, alteram Syriacam dici, prout altera montis pars ad Indos, altera ad Syros ſpectat. Declarat ampliùs ex eo quod alteram Indicam Nardi *ἡ γὰρ τῆς ἀριστερῆς* Gangidem appellari dicit, vt quæ ad Gargem naſcitur fluuium qui montem præterlabitur. Nec verò radices auferre Dioſcorides iubet veluti mutulas & ad vſum damnatas, ſed hæc ſolæ ſunt quarum vſus expetit ad medicamenta, in his affectionibus ad quas illas commodas præſcribit. Quod autem radicem vſus ſit, & hæc primo abſceſſu calidæ ſint, ſecundo ſiccæ, Aetius & Paulus ex Galeno tranſcripſerunt:

Lapſus eſt hæc in parte Manardus, cum credidit id eſſe ſpicam, quod radix eſt. Cūm [Galeno 1. de Antid. autote] per ſimilitudinem, quam cum ſpica habet, hæc radix Spica nominetur, non quodd reuera ſpica ſit: neque enim propriâ appellatione vitur Dioſc. aliique qui de ea loquuntur. Distinguit paſſim Demet. Conſtant. de cura accipit. Spicam Indicam à Nardo ſpica, ſed quæ in re differant, non monſtrat. Sed nec ipſi nos diſcrimen nouimus. Quare conſiderandum vobis relinquimus, quid ſibi velit, ac etiam quid per Spicam ſimpheter intelligat.

Eſt nobis Nardus Indica, Nardus vulgè recepta, de qua tamen dubitat Anguillara, qui ſibi Samphariditam Nardum incognitam ait.

NARDVS INDICA VVLGARIS

Nardi Indicæ nomen particula dūtaxat plantæ hodiè obtinet, quæ & Spica ob figuram dicitur

dicti meruit. Est autem nihil aliud, quam comarum radicis caput, ex marcidorum foliorum nervosis filamentis conuolutis congestum, colore rufescente, sapore amaro, acrique & aromatico, odore Spicæ Celticæ, validioris: adhaeret hæc con-



radici digitalis crassitudinis saturatius rufæ, solida, sed fragili: est ubi folia quoque nondum in nervosis diuoluta albicantia inueniuntur, cauliculi concavi, striati, pluresque ex eadem radice capillata spica enatae subinde conspiciuntur.

Ceterum Nardum hanc vulgarem officinarum Anguillara non existimat esse

verum Syriacum Nardum; & adhuc multo minus Indicum: sed Gangeticum, simili ratione persuasus. In Nardo vulgari officinarum, non inuenitur odor, similis odori Alari, vel Cyperi, qualem requirunt in Nardo Dioscorides & Plinius: sed odor grauis & non gratus, qualem Gangitidi tribuit Dioscorides: Ergo Nardus vulgaris officina non erit Syriaca, nec Indica, sed potius Gangitis. Huic ex posteris subscribat, qui velit.

Nos interim cum sanioribus, senioribus, & prudentioribus posteris credimus nos habere Nardum Indicam, licet interdum, vel ob vetul-tatem, vel ob vliginem, maris humorem sibi as-citum, vel ob adulterium corrupta, situm con-trahat, ac tunc odoris, tunc saporis suauolentia illa, quam Veteres desiderant, non referat, nec colo-rem gepuinæ repræsentet, quibus omnibus ab initio prædita erat.

Potior non sunt diuersa Nardi genera, sed uni-cum duntaxat sibi notum testatur quoque Gar-cias, id sc. quod in monte quodam iuxta Gangem, fluium prouenit, qui altera quidem parte Ori-entem spectat, altera Occidentem, ad quem sc. Occidentem sita est Syria, multis regionibus ab India discreta. Neque vna præstantior est altera, Spicamue habet alia altera multo longiore. Nec est quod quis ex ingenti pretio, quo antiquitus, teste Plinio lib. 12. cap. 12. emebatur, inferre, stu-deat, nostram Nardum non esse legitimam. Huic enim obiectioni respondet Garcias, cum ait In-dias nunc magis apertas & cognitatas esse, quam tempore Plinii fuerint, & ipsa aromata maiori copia ad nos adferri. Illud affirmare possum, inquit, multo plura aromata, maiori que quantitate, & minus adulterata adferri, viliorique emi, quam antiquitus fiebat: quod nunc Lusitanorum na-uationibus Indiæ nobis apertæ sint, ipsæque regiones, quæ aromata gignunt, longè cultiores nunc sint, quam Veterum tempore fuerunt. In eorum numero Nardum repono, quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur. Inuenitur quidem interdum fordida & puluerulenta, villis ipsius plantæ in pollinem redactis. Emittit tamè

à mercatoribus Arabibus & Persis, quos eo pul-vere manus eluere intelligo. Id porro genus, quod Sepulveda Satiach & Satiach appellat, id esse puto, quod ex Sanguam adfertur, celeberrimo regni Bengala portu & emporio ad flumini Gangis ostia.

Vocatur autem incolis Cahzgara: Auicennæ lib. 2. cap. 646 & omnibus huius tempestatis Arabi-bus gambul, quod est spica, & gambul Indis, i. e. Spica Indica. Quod autem corruptè Matthæus Siluaticus cap. 640. Simbel & Sumbel & Matth. in Hist. germ. & Epit. cum addit. Camerarii Stru-bel & Senhel protulerit mirum non est, cum il-linguam Arabicam ignorarint: nisi malimus tem-pore paulatim corrupta fuisse vocabula: Latinis, vt Indis, Spica Nardi, & alius Nardus Indica: Græcis γάρδα & γάρδαχον: Germ. Indianischer Nardus & Spise Narden: Gall. Aspic d'outre mer Ital. Spico & spig. nardis: Hisp. Azumbar aut Espige fil: Angl. Spik Narde Boh Nardus Indianisfy.

Videamus nunc Matthioli & aliorum de Spi-ca opinionem. Cum igitur simpliciter Nardi vocabulum (à Nardo verbè Syriacæ Euphrati conterminata fortè nuncupatum, C. Bauh.) apud auctores reperitur, semper Indicam intelligendam censet Cordus. Et licet Dioscorides multas Nardi differentias proponat, loco tamen nata-li solum differre credit, siquidem omnes in vno monte proeuant, vt potè Syriacæ in Occi-dentali eius parte, Syriam respiciente: Indica verò in Orientali parte ad Iudæam vergente. Rursus Indica in suas species diuiditur, quarum vna in monte, altera ad radicem montis proue-nit, non procul à præterfluente Gange, quæ Gan-gitica, quæ omnes hodie indistinctæ adferuntur.

Nardum Officinæ Nardi Spicam appellat, inquit Matthiolus. Sed non desunt, qui credant Indicam Nardum in nostras terras non aduehi, ob regionis distantiam, Syriacam opinantes esse quæ nostro æuo Seplassiani vtuntur: tamen (ut inquit Dioscorides) in Syria non oritur, verum idè Syriacæ dicatur, quod ea montis parte proue-niat, quæ flectitur ad Syrios. At cum inter In-dos & Syrios amplissimè interponantur regio-nes, nempe Deserta Arabia, Persis, & Carmania, Gedrosia, Darangia, aliæque nonnullæ quæ vltra quatuor millia milliariorum continent, nesciue-rim profecto, quonam pacto fieri possit, vt mons ille ad Gangem positus, altera parte Syriam tam facile respiciat, vt Nardus ea parte proueniens Syriacæ dici mereatur. Quo fit vt quandoque me-cum disquirere licuerit, eam potius à Syriacæ regione, quæ ad Indicum fluium est, Syrii nomè sibi asciuisse, quam à Syria, quandoquidem, si Ptolomæus vera refert, mōs in India visitur, qui à Gange fluiuo ad Syriacæ extenditur. Ex-terum, Manardus Ferraricæ officinarum Nar-dum nec Indicam, nec Syriacam esse censet. In cuius sententiam non equidè pedib. eo, quippe quoniam Venetiis plurib. in locis Nardi ingentè copiam vidi, nullis deficientib. notis, quib. optima ex Dioscoridis sententia explorari potest. Sed illud accidere quandoque non eo inficias, vt ascito sibi maris humore, dum per Indicam & Arabicum in Alexandriam deferretur, & inde Vene-tias, vel situm contrahat, vel subputrescat [hoc namque facile fieri posse concedo, quod Nardus sit siccissima] vnde postea amissa suauolentia, grauius oleat. Quo fit vt hac in re Manardum longè hallucinatum crediderim: &c. Hallucina-

Satiach & Satiach Sepulveda

Nomina linguar.

Matthæus Siluat. & Matth. not.

Nardi fari- & Eymen. Nardus simpliciter dicitur

Syriacæ in Syriacæ regione dicitur.

Matthardus lapsus.

tus etiam Brassiculus, inquit præterea idem Matthioli, ut pote qui Nardi Spicam, non modò non esse radicem censet, sed nullius usus eam existimat: cuius doctrinâ sequuti Hermolaus & Ruellius aberrant iidem. Rationes Senensis petat Lector ex eius Commentariis: Nos breuitati studentes eius sententiam Turnero examinandam committimus.

Matth. &
Amarus
censetur

Matthioli, inquit ille, eumque secutus Amatus multum laborant, ut probent spicam Nardi non esse spicam in caulibus fastigio nascentem, sed radicem Nardi: contraque omnes aliter sentientes, grauitè inuehuntur, contra tres potissimum viros clarissimos Hermolaum, Ruellium & Marardum, qui tamen errarunt, propter magna tamen in vniuersam Europam merita clementius debebant à nouis istis Censoribus tractari. Ego quidem [inquit Turn. part. 2.] spicam hanc vel iuxta terram, vel partim etiam intra terram nasci existimo. Non tamen propriè radicem nominandam censco. Quod autem ex Galeno de antidotis adducunt, aut intelligendus Galenus impropiè spicam Nardi vocare radicem, aut in aliis locis negent oportet auctoritatem non tantum Galeni, sed etiam Philonis, & Diosc. quoque, qui manifestè distinguunt inter Nardi radicem & spicam, aut planè negent spicam esse radicem. Galenus lib. 9. *katà rînos* in antidoto Philonis duos, inter alios multos, versus recitat, quibus clarè negatur Nardum esse radicem. Et drachmam dicta falsò radices &c. Quæ verba Galenus ibi. explicans inquit, Quin & Nardi ipsius drachmam vnam coniiciendam censet, quam radicem falsò dictam appellat, quòd quidè spica Nardi verè nominatur. Dioscorides quoque in descriptione Nardi Gangitidis ait spicas multas ex vna radice prodire: ex quibus verbis patet Nardum non esse radicem Nardi. Ex quo sequitur spicam Nardi non propriè dici posse radicem, nisi quis Philoni, Dioscoridi & Galeno contradicat. Matthioli multos grauitè erroris in simulans de Nardo parum abest ipsomet ab errore, nisi iam eodem inuolutus est. Videtur enim existimare Nardum caule penitus carere, ideoque spicam in caulibus [qui vel nullus est, vel certè nusquam reperitur] fastigio non posse oriri. Verba eius sunt, Ego enim tamen, &c. Quid autem est hoc argumenti? Nihil vidit Nardi præter spicam, Ergo præter nihil habet? Quòd si hæc sit Matthioli ratio, ut ed saltem videtur tendere, tum videtur Nardus neque caulem habere, neque radicem aliam præter spicam, quod planè Dioscoridi, quem interpretandum suscepit, repugnat, qui Nardo & caulem tribuit, & radicem præter spicam. Et quanquam in Germania non estis simplicium delectus, qui Venetiis, hoc tamen anno 1777. in offic. Jacobi Dieter Pharmacopœi Wifenburgensis Nardum inueni cum caule digitalis longitudinis, concauo, straminis maioris crassitudine, quem vel hodie possum offendere. Quod ad radicem Nardi, si eius nihil præter spicam Venetiis potuit reperire, miror ubi radiculam illam inuenierit, ex qua spica oriatur, in figura quam in Comm. in Diosc. pingit. Censet etiam Amatus spicam Nardi esse radicem. Apparet tamen ex eius verbis tum cap. de Meo, tum cap. de Nardo, velle cum spicam Nardi esse radicem Nardi partem inferiorem: utrobique enim radicem Nardi, cum Mei radice censet: utrobique etiam ait capillatam radicem Mei, quæ Nardo sunt persimiles, in infima

Non est
propriè
radix

Radix falsò
dicta.

Matth. re-
arguitur

Nardi
caulis

&c.

partè radicis nasci. Posteriore loco ita inquit: Quod dicit Dioscorides Nardum ex vna radice plures proferre spicas, pro nobis facit, cum ex vna radice primaria, ut reliquarum matre, multæ radices veluti comosæ spicæ confertim nascentes prodeant, quemadmodum in radice Mei videre est, cuius infinite radices in spicis diuidebantur, ut quicunque viderent, spicam Nardi esse iudicarent. Et paulò post, Concludendum ergò nullam aliam in Nardo inueniri radicem quam spicam. Si ita intelligit ut verba sonant, plurimum fallitur. Præterquam enim quod eò caulem immediatè ex spica prodeuntem vidi [caulis autem nunquam immediatè ex radicis infima parte prodit] ostendit Dioscorides multas spicas ex radice oriri vna. Quod autem cum Matthioli negare videtur caule, haud alia opus est confutatione, quam quæ supra, contra Matthiolum vti sumus. Hæc igitur Turneri est sententia de Nardo, habere radicem paruum, in terra, ex qua spica oriatur, caulemque, ut se vidisse semel ait) ex medio spicæ oriri, ætæ purpurei coloris, gracilem, concauum.

Tantus igitur est labyrinthus, & tanta opinio-
num varietas & inconstantia iudiciorum, circa Nardum, ut tutius videatur iam in medium allatis acquiescere, quam pluribus super hanc rem differere. Illud tamen adducannotasse conueniat, Acostam dixisse, quoddam apud Dioscoridem Malobatræ esse solum arboris spicæ Nardi constituisse. Cæsalpino spicam Nardi ex Algarum generi esse videri.

Cæterum, nasci Nardum in Mandou & Chitor provinciis, regnis Delhi, Bengala, & Decam vicinis, iuxta fluium Gangem, quem incolæ Ganga appellant, prædixit Garcias.

Sed & hic fabulosum omnino iudicat, quod And. Lacunain Diosc. scribit, Nardi usum apud Indos esse periculosum, quoniam ex ea fiat veneni quoddam genus mortiferum, quod non modò haustum, sed etiam cuti in sudoribus aspersum hominem illico ingulet, idque toxicum Pisum vocari. Nam cum multis in India annis Medicinam exercuerit, & non modò versatus sit cum omnis generis Medicis Asiaticis, sed etiam Regibus & Principibus familiaris fuerit: nunquam tamen hoc Pisum ipsi videre contigit, aut eius nomen audire. Fontanonus de morb. intern. lib. 3. cap. 18. in pesto ad fluxum sanguinis ex utero præsentibus Nardum existimans sistere menses. Sed quum tutiora multa habeamus remedia, Nardo vti nolim odorato & calido, quin ipsemet lib. 2. cap. 16. de hydropse, in qua opus appetentibus, aperire perhibet. De Nardi viribus plura qui desiderat, legat quæ antè ex Veteribus adduximus. Ex eorumdem tamen sententia, hoc loco pauca quædam de Nardino unguento, de quo tunc dicere obliui sumus, adscribemus. Vanè itaque præparabatur iam tum Dioscoridis ætate, tum cum Malabathrico folio, tum sine ipso. Plerumque verò ad Balaninum, aut Omphacinum oleum, ammiscetur spissamenti gratiâ luncus rotundus odoratus, ad odoris autem gratiam, Costus, Amomum, Nardus, Myrrha, Balsamum. Est autem bonum, quod tenue est, non acre, & Nardi siccat, aut Amomi odorem habet. Vis ipsius attenuatoria est, acris, exresoria, & rarefactoria humorum, & calfactoria. Est autem liquidum, non strigmentosum, nisi resinam habuerit ammixtam. Præparatur etiam simpliciter ex oleo Omphacino, luncus rotundus odorato, Calamo,

Calamo, Costo, & Nardo. Galenus lib. 1. cap. 2. τὸν κατὰ τὴν φύσιν, ad defluuium capillorum licere aliquando vnguentum Nardinum adhibere refert in ætate frigida, & tempore hiemali. Bonum autem pharmacum ad omnia est diuitum Fœminarum vnguentum, immò magis foliato commodum, quod Romæ spicatum appellant.

NARDVS CELTICA

CAP. C



Celtica Nad°, vt inquit Dioscorides, nascitur in Liguria Alpibus [ἀλπεσι, pro quo quidam ἀλπεσι] vernaculo sermone Gallica dicta, sed & in Istria prouenit. Est verò pulchellus, brevisque frutex, qui cū radicibus in manuales fasciculos colligitur: foliis oblongis [vet. & Orib. ἀπὸ τῆς]

Subflauis, flore luteo. Caulium & radicem duntaxat vsus est, & odoris suauitas. Quare pridie aspersos aquâ fasciculos, amoto terreni, si quid inhæserit, in humidior solo suppositâ prius chartâ insernere oportet, ac postdiē repurgare: siquidem vile cum aceroso & alieno minime propter humoris vim excutitur. Adulteratur autem herbâ persimili quæ unâ cum ea velitur, quamque propter virosolum odorem Hirculū nominant. Facile verò est hanc ab illa interuolere: quandoquidem herbâ est sine cauliculo & candidior, minusque oblonga habet folia: quin neque radicem amarā, aut aromaticā, quemadmodum legitima Nardus. Itaque abiectis foliis cauliculos radicesque seponito: ac siquidem ad vsum reponere volueris, tritos vino excipito, tandemque ex iis concinnatos pastillos scitili vase nouo ac diligenter operculato reserua. Optima verò censetur, quæ recens est, & odorata, radicosâ, plena, minimèque fragilis. Iisdem quibus & Syriacâ viribus pollet: sed & valentius urinas ciet, & stomacho est accommodatior. Iecoris inflammationibus, suffusisque felle auxiliatur: itemque ventriculi inflationibus cum Absinthii decocto pota. Eodem planè modo valet & ad lienis, vesicæ, renūque vitia itemque ex vino ad venenatorum morsus. Cæterum, additur etiam in malagmata, potiones & vnguenta calfacientia.

Memorat Plinius lib. 15. cap. 7. fieri ex Nardo Gallico oleum. Idem 24. cap. 16. ait facitatum è Nardo etiam Celticum vinum aromatites.

Integros, inquit Clusius, interdum cespites occupat serpendo radix, & latè summâ tellure sese inter muscum diffundendo: oblongi procumbentesque homi ramuli, tenuēs, plurimis uet. Toin. III.

luti foliolis, aut siccis squamis circumsepti, subinde fuscas & nonnihil capillatas fibras agunt, summâ parte in vnicum, aut bina, ternæ extuberant capitula, aliquot longis, secundum caput angustis, deinde in latitudinem paulatim sese laxantibus foliis, latiusque crassis & succulentis plena, colore, dum primum emergunt, viridi, deinde sub Autumni initium, aut Æstus finem, flauo-scente, gustu amariusculo: palmari aut dodrantalis, nonnunquam etiam maior, inter ista emergit cauliculus, latis firmus, vt in minoribus Valerianis siluestribus geniculatus, bina ad singulos nodos inter se opposita habens exigua foliola, vi, circa summum, ex singulis alis enascuntur pedicelli, binos aut ternos fasciculos coloris pallidi sustinentes, quibus succedunt semina, Valerianæ siluestri Alpina, saxatili præsertim (Valerianæ minimæ Nardi foliæ) proxima: paulò tamen minor. Tota plantula aromatica est & radicem Valerianæ silvestris odorem amulat.

Officinas ostendere hanc folio oblongiore, admodum angustâ, & Florum S. Matæ Magdalenz nomine appellatæ; Spicam item Romanam ac Celticam, refert Cornarius, qui & Nardum Celticam, & Gallicam, itemque Saliuncam appellat.

Matthioli cōtra eos errare credidit, qui Nardum Celticam & Saliuncam eandem plantam existimant. Sed ipsemet in errore versari deprehenditur.

Non dubitat tamen Anguillara, quin Spica Celtica, quam Plinius vocat Saliuncam, non sit ea quæ provenit in Hungaria & Carinthia, quæque adhuc Venetiâ inde adfertur. Saliuncam autem Virgiliū aliam plantam esse ait, quod Scriuius Grammaticus exponens hunc locum dicat, suâ ætate vocatam Orcutunicam, quod nomen apud Græcos significet Anemone, quemadmodum videatur intellexisse Virgilius in dicto versu. Huius autem Nardi Celtici caule, cui adhærēt radices, & flore ex Galeni sententia, vtendum præcipit, perhibetque Dioscoridē, Serinē vocare: Scribonium verò Largum Nardum siluestrem.

Clusius extra dubium hanc plantulam ad siluestrium Valerianarum classem referendam censet, quod ad illas odore, & nonnihil etiam formâ, præsertim minimam Nardifoliam referat. Cæterum, Nardum Alpinum ipse inscripsit, aitque incolas Speiç appellare, nomine è latinâ vocē desumpto: Pannonēs autem Bechy siu. h. e. Viennensem herbam nominare, quia Viennâ copiosè ad eos transferatur. Arabes referente Garcia & Acosta, Cembul Rumin & Rumi cognominant, i. e. Spicam Celticam. Germ. Celtscher Nardus / langer Spieß / Magdalenenkraut / Marien Magdalenen blumen. Angl. Celtick Nardus & freuch Spisnarde Celtis / Nardus. Galli Nardus Gaulois: Itali Spica Celtica & Nardo Celtico.

Cesalpini Nardum Gallicum & Spicam Celticam vocat, testaturque eam Diosc. & Plinium tradere: Plinium autem videri alibi quoque describere, sub nomine Saliuncæ, quam Alian-giam Dioscorides vocari dicat.

C. Bin phyz. Nardus Celtica quæ Spica Celtica, vel Romana officinis, Dioscoridi καὶ τῆς νάρδος & ἀλπερι, siue Saliunca dicitur: itemque lib. 6. ovin.

De reliquis Lobelius in Ada. Lygusticâ Nardum hodie potius nuncupandam autumat: Gen.

Synon:

Flos

S. M.

Magdal.

Spica

Romanæ

Saliuncæ

Matth.

Non est
Saliunca
VergiliæSerine
Diosc.
Narda
Sic. Scrib.
ValerianaNard
Alp. Clus.
Viennens.
he. bin.

tiarelli s admodum similem folii aromaticitate, ipsoque habitu, quam Selliga Vallesii vernaculè quasi Saluncam dicunt: nec dubitat quin sit ea, quam Matonis versus innuit: foliis Gnaphalii montani, aut Gentianellæ minimæ: radicis propaginibus Afari odore, & modo in terrâ sparsis, acris, amaricantibus, aromaticis; Spicam Nardi spirantibus.

Locus. Copiosè provenit in Alpibus Germaniam ab Italia dispelcentibus. Montosis gaudet Genuefibus, Lygurizque Alpibus sterilibus, non procul à Saona vrb. Authore Clusio copiosè nascitur in summo Iudenberg Stiiriacarû Alpium iugo inter muscum, laxosis, locis. Mense Augusto floret sub ipsis ferè nivibus: folia deinde promittunt, cum illæ dissolvi & diffuere incipiunt: tunc etiâ summam habet odoris gratiam; quæ caret dum folia primum promittit, & adhuc viridis est.

Vires & plus. G. leno *nar. vrb.* eadem præstat Nardus Celtica, quæ Indica, sed imbecillius, præterquam ad prouocandâ urinam. Si quidem calidior illa est, & minus adstringit. Consultis itaque videtur Turnero, Celticâ vtendum esse, vt quæ recens haberi possit ex Italia & Germania. quàm Indicâ exoletâ. Pannonibus frequens eius vsus est, in capitis lotionibus. Vires & vsum ex Dioscoride; ex quo Plinius sua transcripsit, vide antè.

NARDO CELTICÆ SIMILIS HIR- CULUS.

CAP. CI.

Hirculus Clusio Plantula est Nardo Celticæ similis, candidior tamen, & veluti ex viridi cinerea, sine cauliculo, minoribus breuioribusque foliis, villosa admodum secundum radicem, & nigricans, nullâ odoris iucunditate. Folia præmanâ nullum aromaticum saporem reddunt, sed lenta & viscida sunt, cum Nardi Celticæ folia calida sint, cum aliqua tamen adstrictione, odore saporeque iucunda.

Hirculus Diosc. Ceterum, cum præcedenti capite de Nardo Celtica ex professo egerimus, facere non potuimus, ducti equidem autoritate Clusii, quin hoc sequenti Hirculi meminissemus, vt pote cuius iconem etiam cum illa oculis lectorum subiecerimus, & quæ ad amussim quadret cum Dioscoridis Hirculo, quem & ipse capite de Nardo Celtica describit dicens: Adulteratur [Nardus Celtica] imposita herba simili, quæ Hirculus vocatur, ab odoris grauitate. Sed facili cognitio: namque herba candidior est, sine caule, minis oblongis foliis, radice neque amara, neque odorata, vt Nardum est.

Hirculus. Vires. Vrb. Clusio. Inscribitur à Clusio, ex quo & Iconem & hircoriam desumpsimus, apud Garciam arom. lib. 1 cap. 33. Hirculus veterum: à Camerario in Hist. Matth. germ. itemque Epit. Hirculus, & sic vocatur etiam à Lob. in Aduers. p. 133. in Obs. p. 170 [vbi & Nardo Celticæ similis herba] in Icon. Plant. p. 114. Tabern. [qui impropiè Germanicè Celtischen Nard vocat.] C. Bauh. Cz. alp. & Gesn. in cat. pl.

NARDVS SIVE SALVNCA NEAPO- litana.

CAP. CII.

Salunca Clusio Aliunca genus Neapoli missum in Apuliz smonibus nascitur, quidam solum odoratum

esse putant, à Malobathro diuersum. Ceterum, eos falsi ex eo percipuum est, quod & Folium & Malobathrum Indis peculiariter sint. Pharmacopœi quidam Itali eam pro Folio Thetiæ immiscent, quàm rectè ii viderint.

In tam exigua quidem planta conspicua est radicis crassities rugolæ vicinque flauescens, fibris capillatæ, in nodos extuberantis, de quorû lateribus hinc inde folia prodeunt, vt ex ea figura serpente radicem, & ætius illis nodis sese propagare non abs re existimem. Folia illa oblonga

sunt, angusta, Plantagini vtique similia, infernè arcta, supernè latiora. Sapore & odore planta ista Valerianam refert, vt non dubitem ob odoris suauitatem, & saporis qualitatem egregius adueni morbos variis facultatibus prædicam esse, ac Folii loco substitui posse.

C. Bauh.

Phyt. vocat Nardum s. siue Nardum ex Apulia.

VALERIANA MINIMA, NARDIFOLIA.

CAP. CIII.



Parua herba Fragrans odoris sunt radices Nardi Celticæ, tenues, ex obliquo capite hirsuto, ex quo folia emergunt vncialia, oblonga, ad Plantaginis vel potius Nardi Celticæ folia accedentia: inter quæ erigitur colliculus vnicus, tenuis, palmaris circiter.

An Clusio in Pannon. p. 513. Valeriana Alpina 2. In Hist.

post. Valeriana filu. Alpina saxatilis. C. Bauh. Phyt. Valeriana s. siue montana Bellidis foliis. An Tabern. Phu minus Apulum?

NARDVS MONTANA VETERIBVS

CAP. CIV.

Nardum montanum [Nardus montana] quæ à quibusdam Thrylaciis [Bulgaricis] & Neris [Galys]

Gal. 8. simpl. legitur *αυρίνη* appellatur, in Cilicia et Syria nasci dixit Dioscorides *φύλιν & αὐρίνη* Eryngio similibus, sed minoribus (*τὸν μαλακωτέρον*) non tamen asperis & aculeatis [vet. hæc non agnoscit. Sunt qui pro *ταχία, ταχία* legant.] Radices subiacent nigræ, odoratæ, binæ plurius, ceu Hæstulæ regiz [*ἀσποδία*] sed graciliores longæque minores [addere videtur Orb. & candiores.] Verùm neque caulem, neque fructum, neque florem diu sustinet. Valet ad eadem omnia radix, ad quæ & Celtica Nardus.

Nardum montanum Galenus, Paulus, & Aëtius superioribus debiliorem esse fatentur, & in Cilicia plurimam nasci, itemque Thylacitin ac Pyritin: appellationum priorem etiam Dioscorides habet, pro posteriore verò Nerin vocari didicit: satis obscuris omnibus his appellationibus. Nam si quis Thylacitin inde appellari putarit, quod Thylacis, i.e. facculus, & Cilicia ac Syria in alias regiones exportata sit, ei etiam aliarum appellationum Etyrna exquirenda sunt, & ostendendum cur hæc priuati inde nomen repperit, quum haud dubiè etiam alia medicamenta simplicia facculus exportentur.

Porro, quod attinet ad Nardum montanum, pugnantia esse in vulgari lectione Dioscoridis, certum est. Vidit enim Anguillara exemplaria vetusta, inter se discrepantia, quod effecit, ut certò crediderit totum caput corruptum esse & deprauatum. In vno enim exemplari legitur *καυλόν* δὲ τὴν καρπὸν ὅτι ἄθος φέρει, n altero pro *φέρει* *φύει*. Eidem præterea Anguillara dixit Excellentiss. D. Alexander Iustinianus ex Chio insula Doctor Medicinæ & Philosophiæ Venetiis, posse pro *φύει*, legi *συμφέρει*, quam lectionem ipse approbavit, & multi sibi vlturparunt. Matthiolo etiam inclinatus animus ut in fine capitis mendum subesse, illudque ex malo vnius vocis græcæ intellectu ortum esse arbitretur. Siquidem verbum *φέρει* non profert, sed pro *συμφέρει*, i.e. confert, accipiendum esse dicit. Itaque non dicitur δὲ καυλόν, ὅτι φέρει, ὅτι ἄθος φέρει; ut vulgari codices habent, & legerunt interpretes, sed ὅτι δὲ καυλόν, ὅτι φέρει, ἄθος φέρει, h.e. Neque caulis, neque fructus neque flos confert, prodesset legendum esse iudicat. Etenim radices, utpote odoratæ, vsum præcipuè commendari, non aliarum partium, quas ut odore carere, ita etiam inutiles habendas esse censet. Et certè facilis potuit esse error librarii Græci imperiti, vel potius temerarii, casus nominum mutantis ad ineptam & incongruam huic loco verbi illius significationem. Et huic suæ castigationi cùm alios, tū Fallopium, subscribere refert.]

Contra Matthiolum verò sic infargit Guiland. in Theone. Quanta sit Matthioli in Nardo montano obicitantia, ne dicam summa Græcarum literarum, qua de re plurimi docti & eruditi amici sui, me quidem refragante, nunquam dubitarunt; valde miror, ignorantia, quando obliquo in rectos vertit, & verbum *φέρει* *συμφέρει* [malum] accipit, quodque deterius multò est, *φύει* cum negadi particula pro *χρησὶν ὕψους*, eo in loco exponit, alii iudicent. Quis quæso Medicorum vnquam ita locutus? Adeone omnis doctinæ insignis ille Dioscoridis interpretis expers est, ut formulam loquendi non Anazarbeo modò illi, sed etiam omnibus Medicis protitū, *χρησὶν ὕψους* ἐν τῇ καρπῷ δὲ φέρει ignoret. Sentire secum Fallopium illum purgatissimæ auris hominem, verisimile mihi non sit, qui si hæc vnquam ad eum perscripsit, loco non seridè perscripsit.

Tóm III

Cæterum, si quando syluestrem Nardum aliamquam ingredi compositionem, Marantha videt: dubitat ipse, debeatne Afarum, an Phuaccipere, vtrumque enim siluestre Nardum propter odoris affinitatem appellari Dioscorides assentit.

VALERIANA BVLBOSA.

CAP. CV.



Planta hæc Descri.

Valeriana bulbosa nobis dicta, à nemine quod sciam huc vq; propostita. Prima emitit folia Hyosciami albi emula, sed paulò minor: At sequentia profudè dissecta. Flores quales Valerianæ maioris. Radix subest singularis, bulbosa, Nardum spirans. Quapropter Nardo montano simillima, cum formâ, tum

odore. Aliqui inter species Nardi referunt. Incola est montium Liguriæ. Valerianam bulbosam sub Nardi monte nã genere reponi posse, Ferd. Imper. Hist. nat. lib. 82. c. 1. p. 1. concludit.

VALERIANA TUBEROSA.

CAP. CVI.



Quam exhibemus Descri.

Valerianam tuberosam à nullo alio, quod nobis quidem constet, quàm Imperato propostita est. Folia producit effigie simillima Valerianæ minoris, sed crassiora: flores albos instar maioris, aliquantum odoratos. Radices tuberosæ odorem referunt Nardi. Nascitur in

montibus Liguriæ.

CARPESIVM EX VETERVM SENTENTIA.

CAP. CVII.

Meminis Carpesii Galenus 7. simpl. med. his verbis, Carpesiũ simile est vocato Phyllo.

T 2

Vires

b.e. Valerianæ, non gustu tantum, sed & facultate. Sed plūs habet tenuitatis: proinde magis eo etiam viscerum obstructiones extergit, & urinā mouet, renisque calculis degreuantos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est partium, ut liceat loco Cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est Ponticum Carpesium Lærtio, non tamen vel ipsum Cinnamomi viribus vicinum est, immo non paruo deterius optima Casia. Nancupatur vtrumque à montibus quibusdam Pamphyliz in quibus nascitur. Ingensque eius proventus est in Syria. De eodem l. de Antid. cap. 14. hæc habet. Quinti sententiam, quam de Carpesio habui, commemorare tempestuum. Ipsum namque non solum à Satyro, sed & aliis etiam

Locus.

Quinti discipulis accepi. Impõebat igitur Quintus, ut aiunt, quoties Cinnamomum deerat, Carpesium, perinde atque uiribus optime Casie non inferiorem: egoque Carpesium idcirco multum mecum attuli ex ea peregrinatione, quā Orientis provincias adi, diligenterque repositum nunc usque plurimum seruo, quod odorem etiamnum & laporem, si non qualem prius habebat, certe nondum extenuatum retinet. Est autem Carpesium herba Phu appellato genere similis, validior tamen, atque aromaticum quiddā plus spirans. Plurimum hæc in Sida vrbe Pamphyliz nascitur. Emiturque propterea illic vilissimum pretio. Quocirca si quis vestrum illuc accesserit Carpesii multum emat, cum id sibi longo tempore duraturū nouerit. Tenuia autem quedam Carpesii sarmenta Cinnamomi virgulis similia sunt. Eius duo genera reperiuntur. Vnum quod Lærtium, alterum quod Ponticum nominatur, à monte in quo nascuntur vtrique nomē

Plurimum
in Sida
vrbe
Pamphylia

Lærtium.

Ponticum.

Delectus.

Phu.

Cubeba

Auiennæ.

Serapio

hallucinat.

Asaro

substitu-

tur: Pro

Cinnamo.

Pro Phu.

Cubeba

non sunt.

Bē album

et rubrū.

adepta: sed Ponticum melius est. Quod cum plurimum haberem per multis medicamentis admixtum, in quibus Phu vocata imponi debuerat. Est enim Carpesium, ut dixi, Phu simile, validius tamen, & qualitate quandam aromaticam, gustu, odoratuque remittens.

Galenus Carpesium hoc Auiennam cap. 137. Cubebas facere autor est Dodonæus, qui hoc quoque à Rusco, seu Myrto agria Serapionis, quam eandem cum Cubebis esse sentit, multum differens ostendit, ex his, quæ de Carpesio Gal. l. de Antid. scripta reliquit, ac propterea Serapionem hallucinatū ait, qui tale aliquid suspicatus fuerit.

Cæterum, quid hoc tempore sit Carpesium Galeni, arduum admodum explicatu duxit Matthiolus. Et hinc nescitur, inquit Brassauolus, quid sit Carpesium. Siquidem Galenus 2. de comp. med. κατὰ τὸν αὐτὸν Carpesium pro Asaro coniici docet. Et Quintus pro Cinnamomo in penuria vitur. Ac tandem Galenus pro Phu vocata medicamentis imposuit.

Sed & Garcias Matthæum sylvaticum falli testatur, ut qui ex Serapione & Arabum autoritate, Cubebas nihil aliud esse crediderit, quam Carpesium Galeni.

Matthiolus epist. lib. 3. ad Io. Hesselum Medicū ait nihil penitus argumenti sibi sese offerre, cur siliquis, quas pro Carpesio miserit, legitimum Carpesium probet: Esse namque Piper Æthiopicum. Huius etiam opinionem refellit in post. comm. cum mag. figuris.

Quid sibi velit Garcias lib. 1. atom. cap. 43. ubi minus audiendos esse ducit, qui Ben album & rubrum, Carpesium esse volunt, videndum est.

Carpesium pusillo Caryophyllorum surculos Scabiger somniasset, nisi in Ponto & Pamphylia nasci prodidisset Galenus: quam Scaligeri opinionem amplecti videtur Cæsalpinus lib. 2. cap. 51. & 4. cap. 21.

Carpesium, vel ei cognata herba, videtur Gesnero de hort. Phu petraum, quod Valerianam Alpinam inscribimus, deque qua mox agemus.

Valerianam, quam optimam [nos Valerianā maiorem odoratā radice vocamus] appellant, Galenus ex opinione Cæsalpini Carpesiū dixit.

VALERIANA ALPINA. CAP. CVIII.



Valeriana Alpina, radice lōgā, odoratā, subdulci, scopulorū rimis se infigit, altē impacta: caules profert aliquot, crassiusculos, geniculatos, sapore resinoso, acrisculo, nonnihil rubentes, infima parte lignescētes, & cortice cinereo vestitos, multis ramis brachiatos: folia inferiora hederacea, sinuata, penē rotunda, nonnunquam alis duabus aucta, pediculis longis appensa, quæ postea in festucas abeunt, ut solent Alpine perennes: quedam Alines similia sunt minima, alia magna, non sinuata: superiora autē oblonga, mucronata, lacinia, & triplici aliquando diuisa, ad costam vsque incisa: florent in vmbellam digesti plurimi, minuti, purpurascētes, ut Valerianæ siluestris minoris.

Clusius, ni fallor, in Pann. p. 512. itemque Hist. post. Valerianam 1. Alpinam vocat, & Valerianam siluestrem Alpinam primam latifoliam, palmati cauliculo assurgentem, radice odoratā, cum aliqua adstrictione amarifuscula.

An Cæsalp. lib. 4. cap. 5. Valerianarum in odorarum ē tribus prima, in vmbrosis montium iugis, radice gustu subdulci, non sine aliqua suauitate.

An Tabern. Hist. Valeriana 3. Herbariorum? Valerianam Alpinam Montbelgardi plantatam habui in horto Ill. E. C. collectam in transitu Harcinæ syluæ. Reperi Geneuæ in monte Saleuæ & aliis locis folia producentem mense Martio, ostendentemque etiam florum rudimenta, & tandem florentem Aprilis principio.

VALERIANA ALPINA FOLIO SCROPHULARIZ.

CAP. CIX.

Ex radice oblonga, nigricante, nodosa prædi-
caulis vnicus, cubitalis & sesquicubitalis, ca-
uus striat-



uus, striatus, viridis, quem folia cingunt multum Scrophularia folia similia, pauca, oblonga, bina semper iuncta, quorum inferna pediculis brevibus, superna nullis donantur. Verum ad radicem ad caulis exortum utrinque prodit quasi alius caulis, ex quo tantum folia fena, septena longis pediculis prodeunt, quorum quaedam subrotunda, quaedam oblonga, quaedam leuiter sinuata: caulis in summo brachiatur, ut flores sustineat Valeriana siluestri similes, sed minores, pallide rubentes.

Hanc in monte masserfall collegit C. Bauh. qui in phyt. Valerianam & siue montanam alteram appellat, ac multum similitudinis cum Valeriana montana H. Lugdunensis habere ait, non tamen eandem statuit.

PHV VETERIBVS ET IN GENERE.
CAP. CX.

Phu [q] quod & ipsum aliqui Nardum syluestrem vāpdu dicitur appellant, auctore Dioscoride in Ponto nascitur, foliaque profert Elaphobosco, aut Hippofelino [Olet atro, Sarrac.] similia: caulem cubitalem, aut etiam maiorem, lauem, mollem [triplex tenerum Corn.] purpureo, in medio cauum, geniculis interseptum: flores ad Narcissi flores accedentes, sed & maiores [p] [q] minores tamen reddiderunt Sarracenus & Columna, forte legendum cum Ruell. & Fuchsio [q] similes. Quidam [q] vel [q], & teneriores, & in albicante colore purpureos: radicem superiore quidem sui parte digiti parui crassitudinem ferme aequantem, sed ex obliquo radices paruas agnatas [capillamenta Sarrac.] lunci, aut Veratri nigri instar, inter se perplexas, subflauas, odoratas, atque adeo odore Nardum emulantes, cum quadam tamen odoris virofa grauitate.

Ponitur autem [q] inter Nardi genera etiam à Plinio, libro sc. 12. cap. 12. ubi inquit: Nardo color qui in uetera uerit nigriori melior. In nostro orbe proximè laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum, quod aliqui agrium vocant, alii Phu, folio Olusatri, caule cubitali, geniculato, in purpura albicante, radice obliqua, villosa, & imitante autum pedes.

Phu Dioscoridis & ceterorum Græcorum, nostras Valerianas plurimum exprimere dicere Syluius, nisi forum, qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desideraretur.

Pro Phu officinæ Valeriana vtuntur. Sed duas habent, minorem, cui Dioscoridis descriptio non conuenit, inquit Cornarius, etiam si quædam notæ ad ipsam detorqueri possint: maiorem autem Valerianam iam ferè consensum est, verum Dioscoridis Phu esse, ut cui ex toto respondeat descriptio.

Et sanè non videtur nobis Valerianam maiorem odoratâ radice, quod Phu horrense & magnum vocant, minus descriptioni Dioscoridis conuenire, quam Valerianam vulgarem siluestrem. De his igitur & aliis Valerianæ speciebus deinceps nobis agendum erit.

VALERIANA MAIOR ODORATA.
radice.

Cubitales & altiores tollit caules: fistulosos, geniculatos, alis donatos: folia, alia integrâ, Tom. III.

alia Centauri maioris Deser. modo profunde distincta, nullo eximio odore, aut sapore: flores in umbella suauolentes, ex albo purpureascentes, quorum singuli quintis foliolis constant, apicibus productioribus, coloribus: semen cum lanugine, quadam papposa auolat, radix subest transversum posita, digiti crassitudine, rugosa, multis fibris donata, albicans, sapore & odore aromatico, radicem ferè Asari.

Hæc est illa, quam Tragus Valerianam veram seu Nardum agrestem & q[ui]d græcè vocauit: itemque primum maior ac nobilissimum Phu, quod haudquaquam vulgare sit, siquidem in hortis seri & plantari necesse habeat: Mulierculas verò Argentoratenses pro Calamo aromatico venditare solere, non alio iudicio quam si Basilicon loco Viuæ exhibeant: In Diosc. dicitur q[ui]d & q[ui]d, des: Hieron. Braunfchweig Martinellam, Genicularem Herbam benedictam & Valerianam: Autori Luminis maioris supra vngt. Alabast. Amantillam & Potentillam: Serap. cap. 62. & Razi cap. 44. Sistrum & Spicam siluestrem.

Appellatur autem præter ea, quæ ex Trago adscriptimus nomina, q[ui]d Dioscoride, & quibusdam [q]ia. v. d. des. siluestris aut rustica Nardus, & Nardus Cretica à Plinio, hæc ætate ab aliquibus Valentiana & Theriacaria in offic. Valeriana domestica: Theophr. Paracello Teidina: Geun. Grof Balorian: Belgis groote Valeriane / Speercury / & Joris: Gall. Valeriane: It. Valeriana: Hispan. Teru benedette: Angl. Serival: Boh. Fosly: Polon. Foslef. Ceterum per q[ui]d simpliciter nominatum, Geinerus latifolium hoc Dodonæi intelligit. Valeriana autem dicta videtur eò quòd ficultatibus plurimis prædita sit: Phu verò à putore, graui odore mixto Nardæ suauitati, quem Phu siue Phy aduerbio admirantis & abhorrentis auertentur subdorati.

Phu igitur plerisque, siue eorum qui hodie, siue superiore sæculo scripserunt, putatur esse Valeriana maior. Nec sanè quidquam inuenire se testatur Turnerus, quod descriptioni repugnet, nisi quòd folia sint planè Smyrnio similia, nec flores Narcisso. Sed cum candidâ interpretatione tum folia Smyrnio, tum flores Narcisso possint assimilari, reliqua autem omnia satis conueniant, Valerianam maiorem sine piaculo arbitrat pro Phu posse accipi.

Dioscorides porro duas plantas, Valerianam, sc. maiorem, quam optimam: & alteram, quam siluestrem cognominant, Phu vocat, sed vniua descriptione, inquit Cæsalpinus, videtur duas prædictas significare: Nam folia Olusatri, priori magis conueniunt: similitudo Elaphoboscifundæ magis: radice descriptio prior quadrat:

Valeriana
Gera Tra-
Calamus
aromat.
Phu Diosc.
Marmella
Genicul.
Herba be-
nedicta
Amantilla
Potentilla
Sistrum
Spica silu.
Phu ma-
gnum
Matth.
Nominis
linguar.

Valeriana
maior est
Phu Diosc.

*Diosc. v. 10.
v. 10.*

*Q. i. Gal-
viana i.
Phu. i. de
herb. i.
qui amb-
t. i. in
quique pe-
nitias ne-
gavit*

Synon.

*Locus in
tempus*

*Vires & v-
sus*

*Strangula-
tiones
Pectoris
dolores
Oris, Si-
cera
Temp. ex
Duo.*

Ex Matth.

floris color secundæ. Quod autem de flore in-
quit esse Narcisso proximum, maiorem ac tene-
riorem puto pro Narcisso Nardum legendum
esse. Nardi enim Celnicæ flos luteus traditur:
Phu autem ex candido purpurascens, qui & ma-
ior ac tenerior est: ponitur autem Phu inter Nar-
di genera, tum à Dioscoride, tum à Plinio Nar-
dum filaeftrem & Creticum vocantibus.

A Trago igitur, Matthiolo, Dodonæo, Tur-
nero, Cæsalpino & Lobelio, vt ex eorum dictis
apparet, Valeriana maior pro vero Phu recipi-
tur. His consentiunt Monachi in Mef. Corn.
Sylu. Cronemb. Bacchan. & Cordus in Diosc.
vbi quædam reprehendit in Fuchfio, nempe,
quod voluerit secundam speciem (Valerianam
filu.) esse Phu Antiquorum, vt postea fuchfius
eo dictum sumus. Nobis autem videtur Fuchfius
dubitare de Phu Dioscoridis, & vtramque Valerianam
esse concedere. Sed dubitant & Camer.
in horto, & Anguillara, dicēs: Difficultas quæ est
in dignosce do vero Hippofelino & Elapho-
bosco non finit me asserere, quæ planta sit Phu.
Cum prioribus tamen concludunt Phu esse Valerianam
maiores, Io. Agricola, H. Lugd. Gessn. Tabern. Gerard. Schvvenckf. & C. Bauhinus.
Negat autem Fabius Columna, Phu Valerianam
filueftrem esse concludens.

Ceterum stirps quæ hoc capite a nobis tradi-
tur, Phu horrens, à Gessn. de hort. inscribitur,
Phu maius ab eodem de coll. stirp. Pha magnum
à Fuchf. in Hist. & H. Lugd. p. 927. Phu verum
à Fuchf. in Icon. & Tabern. in Hist. Phu à Dod.
g. 1. Gerardo Brunsfeld. Bacch. Apollac Rob.
Sephano. Valeriana maior à Lob. in Obf. p. 411.
in Icon. Plant. p. 714. Turn. Schv. & Camer. hort.
cui & Phu vulgaris. Phu Ponticum & Valeriana
Pontica à Tab. in iconibus: Valeriana 1. siue hor-
tensis à C. Bauh. phyt. Cætera Synonyma ex iam
dictis colligere licet.

Valeriana maior odoratâ radice vt plurimum
in hortis colitur, vt Florentia in horto & Ferrariz
florens Aprili: Bononia in horto S. Salu. al
Burgo di S. Catharina: Patavii: Monspelii, & Lug-
duni flores Maio: Bifilez vires adhuc Octo-
bri, vt & Montbelgardii. Reperitur etiam in qui-
busdam altis montibus in siluis.

Vim habet calefaciendi & ciendi vrinæ radix a-
rida trita & potui data: sed & decoctum ipsius idē
efficere potest. Facit etiam ad lateris dolorem, &
menfes ducit, & antidotis miscetur. Adulteratur
autem Rufci radicibus ammixtis: sed facile est
illas dignoscere: sunt enim duræ & frangi con-
tumaces, citra gratiam odoris vllam, referente
Dioscoride. Phu herbæ radicem odoratam quod-
dammodò esse, testis est Gal. lib. 8. simpl. Nardo
vitibus similem, sed tamen ad pleraque infirmio-
rem, vrinæ mouere plus, quàm aut Indicam, aut
Syriacam Nardum, perinde vt Gallicam. Phu
autem radicem dari potui tritam, vel decoctam
ad strangulationes vel pectoris dolores, vellat-
terum, perhibet etiam Plinius, & menfes quoque
ciere: bibi cum vino. Folia & radices ad oris quo-
que & gingiarum cum inflammatione exulce-
rationes decoctæ & pargarisatæ prodesse ferun-
tur. Excalfacit autem Phu legitimum [Valeriana
hortensis Dodonæo:] sed tamen non intensè, ne-
que ipsa recens radix, sed arefcens tantum. Re-
centem siquidem exiguum omnino calorē habere
facileprehenditur: arefcentem verò ca-
lidiorē esse, & gustus & odor, vterque inten-
fior, ostendunt. De facultatibus Phu hæc pro-

didit Matthiolus: Radix calida & sicca secundo
gradu est: aperit, attenuat, concoquit, & promou-
cat: hausta status pellit, auxiliatur lateris com-
punctionibus. Præstat quoque aduersus stran-
guriam, veterem tussim, & asthma, cum dulci ra-
dice, vuis passis & aniso decoctâ. Miscetur Anti-
dotis, vt Theriacæ & Mithridatio, aliisque medi-
camentis præternatiuis à veneno, quod venena-
tis sc. bestis & pesti ipsi resistat. Additur quo-
que in potionibus internorum vulnerum. In
vino aut aqua decoctâ, & in oculis guttatim in-
stillatâ, oculorum claritatem adiuvat. Confert
etiam ad eorum ruborem & dolorem, Et vires
cum radicibus contusa capitique adhibita do-
lorem eius sedat.

VALERIANA SYLVESTRIS MAGNA aquatica.

Radix ex pluribus composita est fibris, albis,
gustu aromaticis, reptatu subinde fese pro-
pagantibus: caules ad humanam altitudinem ex-
surgunt, recti, fistulosi, longis internodiis inter-
cepti, striati, modicè hirsuti: quorum geniculâ
amplexantur basi suâ folia Valerianæ satiuæ,
magis pinnata, saturariique virentia, non nihil
auersâ parte hirsuta: flores in umbella satiuæ si-
miles, quinquefolii, ex albo purpurascens, hircum
olent, tandem quæ in pappos facessunt.

Hanc Columna Phu nomine pingit, ac Phu
Dioscoridis esse contendit.

Brunsf. quoque Valerianâ filueftre pro Phu
Dioscoridis sub nominibus Baldrian/Quennem-
mark/ fatzenkraut exhibet. Quin & Fuchfius
huius quoque cõsiliũ fuisse deprehenditur, dicens,
quod si apud vnde, Græcis Phu & Nardus filuestris,
Latinis Valeriana officinis & Herbariis, Germa-
nis aut etiam Arugenswurzel appellatur quod
sc. cati odore radicis eius, quo eorum oculi robo-
rantur, impensè delectentur. Hoc alio nomine
Valeriana vulgaris, Gemein Baldrian dicitur, &
à pictura Dioscoridis non abhorret: quod omnia
ferè scillicet respondeant, vt profors nulla recla-
mare nota videatur, &c.

Contra Columnam, Cæsalpinum, Brunsf. solum
& Fuchfium se opponit Cornarius, qui Valerianam
minorem officinarum (in quibus solis error
hic remansisse videtur) descriptioni Phu Diosco-
ridis conuenire negat. Phu siquidem radices, vt
ipse etiam Marantha obiicit, ex obliquo villosæ
sunt, capillamentis inuicem commixtis, vt planta
ipsa ostendit, quod in hac Valeriana non cerni-
tur. Phu nostrum, inquit Eur. Cordus, non re-
spondet historiz Phu apud Dioscoridem, imò alia
quædam magis, quæ Theriacaria in Hestia no-
minatur. Vocatur autem hæc ab officinis, quæ
pro Phu ostendunt, Herba cattorum & parua
Dania. In Buphtalmum & Elurum Gessnero?

Inscribitur à Trago Valeriana vulgaris, de qua
ait: Alteram verò Valerianam, Germani appel-
lant fatzenwurzel/ & mendwurzel, ea nimirum
vera est Serpentaria herba, aut Serpyllum. Sunt
enim qui eò, quodd hinc inde serpat seque con-
uertat, Serpyllum maius vocent.

A Dod. gall. Valeriana filuestris maior, Belg.
wilde Valeriane, Gall. Grande Valeriane sauage.
Lat. in fol. itemque Lobelin Adu. p. 319. Obf. p.
411. Icon. Plant. p. 715. Valeriana syluestris. Clus.
in Hist. post. Valeriana filuestris prima. C. Bauh.
phyt. Valeriana 2. siue filuestris maior. Ta-
bero.

Taber. in Icon. Valeriana maior, herba benedicta, Gresser Baldrian: in Hist. Phu vulgare. Gerardo Valeriana maior silvestris, great wilde Dalerian. H. Lugd. p. 1044. Valeriana silu. maior Dodonzi, Phu paruum Matthioli. Gesn. de coll. stip. Phu minus vulgare, & Phu silvestre. Fuch. in Icon. Phu vulgare, gemcin Baldrian.

Valeriana aquatica maior passim prouenit in Comitatu Montbelgardensi, etiam in horto Ill.

E. C. Geneuz. vidi folia protrudentem mense Maio, florentem Maio & Iunio ac Iulio, Visa etiam Lugduni, Montpelii: Patavii: Bononiæ: Florentiæ: Balex: Vulgaris Clusio in Pannonia, Austria, Siria, vicinis, que provincis. Lobelio in Northmanie & Angliæ humenibus. Nasci ait Fuchsius in humidis locis & prope aquas, hanc que ad mirandam altitudinem surgit: Prouenire etiam in lucis & cædis silvis, sed hoc in tantam proceritatem non emergere. Hanc Valerianam, rupis, conuulsis, ex alto præcipitatis vitem censent: sed & folia huius, vt & satuz, ad ois & gingiuarum cum inflammatione exulcerationes, aphtas, decocta & gargarizata prodesse feruntur. Nec desunt, qui radices aridas, tulasque, drachmaz pondum cum vino sumptas, infra, supraque purgationem moliri affirmant. Columna huius radices puluerem ad Epilepsiam commendat, vitem etiã esse iocibus à mulcis venenatis illatis autopfia me docuit, administrante Rodeletio: Ad visum acendum & conferuandum commendat etiam Hieronymus Brunschuueig Valerianæ vulgaris radicem, vel collo suspensam, vel in media vola compressam, insigniter corroborare congrementum ciliu muliere narrat Agricola. Contra febres, maxime verò tertianas, non semel, sed multoties expertus est Iohan. Schvvab plurimum valere.

VALERIANA MINOR PRATENSIS, VEL aquatica.



Valeriana silvestris minor radice tenui serpit, quaque terat attingit: ex geniculis demissis fibris radica-tur, sapore amaro: caulis dodrantalis, angulosus, striatus, cauus, geniculis aliquot interceptus, ubellam sustinet florum ex candido rubescens, vt in Valeriana silvestri maiore, minus tamen magnâ:

quorū singulorū orē in quinque lacinias minutas reflexas diuisas, apice altiusculo tripicite: sed & umbella interdū ex foliorū cauliculis alis pro-dit: folia alia integra, subrotunda, parua, pediculo longiora, vt ea plerūque, quæ in caule conspiciuntur, binæ opposita, pediculorum expertia, imâ partelacinata, & quasi pinnata, superiore integra & oblonga, sapore nonnihil amaro & visci-do.

Obseruani hanc Lugduni florentem Aprilis in pratis & in horto meo: Geneuz cum flore Maio, & tempus & semine maturo Iunio: vt & Basileæ in pratis

VALERIANA RUBRA LATIFOLIA & angustifolia.

CAP. CXI.



Digitali-circa. Dicitur ra-dice nititur, lignosa ferē, sapore Valerianæ: qua cau-les surgunt cubitum & sesquicubi-tum alti, tere-tes, laues, co-lore casti, fistu-losi: ad quo-rum singula genicula filia bina aduersis, ex lata basi, caulem am-plexantia, in acumen desin-entia, lacinis quibusdam su-

binde donata, pinguis, glauca, quorum quæ minora sunt, plurimū n referunt Papaueris spumei vulgō dicti folia: sunt autem sapore subacri: flores in muscatis dependent perquam conferti amœni, colore purpureo, quorū singuli quinque partiti, oblongo, sed admodum tenui tubulo, vitenti pedicello agglutinantur, corniculum insuper calcaris instar protendentes: semen pap-posâ cristâ Valerianæ modo succedit.

A Dod. gall. pingitur pro Polemonio, quod ab aliis dicitur Chelidonium h. e. centū viriū: officinis, Herba tunica, ab Herbariis moder-nis Behen & Been album: A Lat. in fol. pro Valeriana rubra.

Inscriptis hanc Lob. in Adv. p. 144. Ocimal-trum Valerianthon. In Obs. p. 184. iam dicta inscriptione pingit: ac etiã in Icon. Plant. p. 341. & præterea vocat Behen rubrum, Belgicum, Saponariam alteram, & Struthion Vlyssis Aldroandi, quæritque an sit Condurdam Plinii lib. 26. cap. 5.

Tabern. in Icon. & Hist. appellat Valerianam rubram, C. Bauh. phyt. dicitur Lychnis 22. siue rubra. Sed ad Lychnides cur referenda sit non video: cum nec flores, nec valcula conueniant. H. Lugd. p. 187. vocat Polemonii speciem Dodonzi.

Sata hæc Valeriana Montbelgardii prouenit in horto E. C. vbi primo anno flores non protu-lis: altero verò floruit Iunio & Iulio, hiemem-que pertulit,

Valeriana rubra angustifolia.

Valerianæ rubræ latifoliæ similis est quod ad flores suauiter rubentes: calcaris donatos, in pappum abeuntes: caulis quoque bicubitalis: persimilis, at quæ per eum conspiciuntur folia, plurimum differunt, sunt quippe palmi ferē Sznoni longitudine, latitudine verò culmi.

Locus & tempus

VALERIANA GRÆCA QVORVNDAM
colore cæruleo & albo.

CAP. CXI.

Deser.



natim vtrinque, pulchrâ serie stipatis, sapore fœdo & lento: ex quorum alis & caulis fastigio flores confertim multi emicant, Campanularum specie, non continui tamen, verum è quinque foliis compositi, magis coloris cærulei, vel albi gratiâ quàm fœdi odoris, quem olfacienti affiant, commendati: è quorum medio præter tripitem stilum violaceum productiorem, flammæ quoque concoloria apicibus croceis procedere solent.

Dod.gall.&lat.in fol. Gefn.hort. Phu peregrinum. Lobel. in Aduerf. Obf.p. 412. Icon. Plant.p.716. Valeriana, peregrina Belgarum &

C.Bauh.phyt. Lychnis 22. siue rubra, Valerianæ rubræ dictæ genus alterum, oblongo & angusto folio.

Valerianam rubram angustifoliam repesi florētē mense Iulio Nantuz Sabaudorum in colle extra Portam quā nūc Gencuam ad dextram.

Herbariorum. Sed & Tabern. in Icon. cum Gerardo Valerianam græcam vocat: in Hist. autem Valerianam adulterinam. C.Bauh.phyt. Valerianam siue peregrinam, cæruleo flore, rariùs albo. In Rhætia spontè prouenientem inueni in siluis. In hortis Franciæ, Belgicæ, & potissimum Angliæ familiaris Lobelio. Plurima Æstatis parte floret.

Nullius est vsus, nisi quòd hortorum exornet margines, vt testatur Dodonæus.

VALERIANA PEREGRINA, SEV

Indica.

CAP. CXII.



Dodrantalis & cubitalis est planta, cui multa sunt similia Locustæ herbæ quæ S. Claræ quibusdam dicitur, ac de qua sub finem lib. 28. radice nixa tenui, breui, candidâ, multis fibris capillatâ, sapore amaricante, non sine acrimonia aliqua aromatica: caulis ferè repandus, lupi-

ausne magna ex parte, partim erectus, longitudine dodrantali, læuis, concavus, teres, inanissus, subrubens, alternis aduersisque coniugationibus, serie quadam sæpiùs bipartitus: alarum diuaricationibus incipienti præsertim apposita folia bina priora ex aduerso sita, Plantaginis latifoliæ ferè minora, vberiore nervorum diuisurâ, tenera, pinguis, sapore aromatico, quorum quæ superiora, sunt minora & denticulis obiter crenatâ, priora quidem Valerianæ latius similia: flores quasi in umbellâ, inodori, seu è rubentes, ex longo, tenuique corniculo, in quina folia dissecti, Ocymastri Valerianthos, sed sine calcari: quibus delapsis succedunt vascula oblonga, fungosa, articulis distincta, foliis quibusdam oblonga, crassa, concava, in calyces plures diuisa, in quibus vasculum latitat, velut in foliaceum corniculum bipertitum, in quo semen longiusculum.

Semen acceptum à Calabona, latum Montbelgardi in horto Ill. E.C. prouenit, & Iulii principio & Augusto floruit. Floret interdū eua Maio & Iunio maturius lata, teste Clus. subinde tamè in Hiemem vsque flores & semen proferte visâ.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXVIII

VERTICILLATÆ ET FLORES GALEATOS FERENTES,
hîsque affines pleræque aromaticæ.

Ipse, qua nunc dicitur, herbarum aromaticarum claritas, medicina tantum gignente eas tellure in admiratione cura Priscorum diligentiaque animum agit. Nihil enim intentatum inexpertumque illis fuit, quo ipse aded Plin. eos dicat honore: nihil deinde occultatum, quod non prodesse posteris vellent. Hinc ab ipse pleraque nobis innotuere aromata, & inter ea odoratarum aromaticarum stirpem præstantissima quæque. Et nos nobis oblata vel negligere, vel abscondere atque suppressere cupimus, & fraudare vitam etiam propriis bonis. Ita certe recondunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes aliis, nihil noui perquirunt, nihil discunt, nihil docent: & quod Plin. iam suo æuo conquirebatur, neminem docere, vel ea qua scimus, in auctoritatem scientia est. Tantum ab excogitandis nouis ac inuanda vita mores absunt: summi inque opus ingeniorum diu iam hoc fuit, ut intra unumquemque rectè facta Veterum perirent. Ar, hercule, paucorum huius cura, & aliqua etiam nostras odoratarum herbarum familia accreuit, quanquam iamdudum benignè largiente natura, eiusque æterno moderatore Deo Opt. Max. ut nobis etiam hodie aromata præ foribus, in hortis & agris nasci, indubie affirmare ausimus, tam benignâ gratiâ diligentia referente. Non æque cura eorum mira esset in his, qua satù blandiuntur, aut odore inuitant: sed culmina quoque montium, & solitudines abditas, omnisque terra fibras scrutati inuenire, quid quæque radix polleteret, ad quos usus herbarum filia pervenerent, qua salubritas ex florum odoratu resisteret, etiam quadrupedum pabulo intacta ad salutis usus venientes.

Verticillatas dicimus, quia flores caulem articulatum, veluti verticilli amplectuntur. Flores galeatos, quod galeam quodammodo representent.

MENTHA EX VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT I.



Ediosmon esse refert Marcellus qui Mintham, qui Calamiuthen, qui Nepetâ, qui Perxo, qui Macetho, qui Perithromundo vocent: Esse Ægyptios qui Tis, & esse Romanos qui Mentham, quo solo nomine, inquit, in Græcis Mentha commendatur: nec quisquam est qui eo audito suauitatem odoris in notissima omnibus herba non amet, id enim Hediosmus Græcis est: quod ambitiosè nescio an molliter ab eis factum fuit. Qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam conuersæ honorem haberet, parum contenti, noua & quod viræ tantum delitias indicaret, vliginosis locis fœliciter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, voluptatis suæ magis quam alieni nominis ambiçiosa, libentius & frequentius quam antiquiore illo vta est. Theophrastus enim non alio quam Minthes nomine pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum tota Græcia: præsertimque Arcadia in qua non procul à Pylo nobi-

lis Minthes cognomine mons fuit: Quam Plutonis pellicem & à Proserpina, ut solent pellices semper odisse vxores, in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant Poëtarum fabulæ: æterno in æterna planta hominis monumento. Quam vocem Romani magis amantes quia in ea malè habitæ ob amorem puellæ memoria seruaretur: vnâ tantum & alterâ mutatis literis, Græcorum Minthen Mentham suam fecerunt, quotidiani in sanitatis vsus & præsentis in medicina contra tot mala remedii. Quam cum Calaminthe quæ Nepeta est miscere non decet. Sui enim generis Calaminthe herba est à Mentastro pôst à nobis dicenda: quæ ab imperitis aliis Menthæ appellationibus importunè adiecta est. Nec desunt qui illi voci aliam tribuant originem, inter quos Dalechampius: cui *μινθῆ* Græcè dicitur *ἀπὸ τῆς μινθῆς*, à stercoreis fœtore, per *ἀπὸ τῆς μινθῆς*, quod minime fœtida sit.

Κωνσταντῆ νύμφῃ Oppianus 3. *ἀλευπιδών* vocat, quod Mintham Cocyti filiam, Plutonis amicam aduentanti Proserpinæ insensam & minitantem,

Improbam
herba.

Ceres in *apulei* *Bomboli* mutauit. Eadem ferè leguntur apud Strabonem lib. 8. de monte Minthe. Improbam herbam vocat Oppiani interpres, quòd ante coitum appositâ mulierum genitalibus, conceptum impediât; vulnera si inferatur, curari cohibeat, lacti mixta ante coagulum, densari non patiarur, quæ Florentinus libro 12. Geoponicon tradit.

Theophrastus Hediofinon inter olera recenset ruralia : miratur autem Cæsalpinus Gazam Mentastrum conuertere non Mentham : At id fuit erroris causa, quòd alibi Theophrastus Græcè Mintham vocat herbam, in quam degenerat Sisymbrium cùm negligitur, putauit enim Gaza hoc Mentam esse domesticam, cùm potius significetur syluestris herba esse, vt alibi dicitur. Putat autem Cæsalpinus Mentham apud Theophrastum significare ipsum Mentastrum: non quidem quòd species in alteram speciem conuertatur, vt notauit Theophrastus, sed odor tantum.

Dioscorides Mentham notam plantam dicit, nec describit: genera autem duo facit Satiuam & Siluestrem quam Mentastrum Latinis dici Interpretes secuti Plinium volunt.

De Mentha autem Plinius inquit lib. 19. cap. 8. Eodem tempore [quo Apium] feritur Menta plânta: vel si nondum germinat, spongia. Minus hæc humido gaudet. Aest. te viret, hieme flauescit. Nomen suauitatis odoris apud Græcos mutauit, cùm alioqui Mintha vocaretur: vnde Veteres nostri nomen declinauerunt. Græco Veteres nostri nomen declinauerunt. Græco Grato Mentha mentas odore percurrit in rusticis dapibus. Semel sita diutina ætate durat. Congruit pulegio, hæc quoque seruat in simili genere. Eodem lib. cap. 10. Ferro quoque non expedire tangi Mentam auctor est Sabinus Tyro in libro Cepericôn, quæ in Mœccenati dicauit.

Galenus 6. simpl. duplicem habet Mentham, Odoratam quæ Dioscoridis satia est, & alteram quam dicit non odoratam, Calaminthen vulgò dicunt.

Mentha cùm hortensis tum etiam syluestris, quam Hetrusci nostri Latinum nomen retinentes, vulgò *Mentastro* appellant, inquit Marthiolus, adeò omnibus vulgaris notaque, vt sine vitio eius delineationem silentio prætermitti posset putauerim. Et quamuis plures, quàm describat Diosc. in hortis sint Mentha species [una enim brevioribus & crispioribus constat foliis, alia rubenti caule & flore, alia verò albicante] huiusmodi tamen specierum differentia non sunt meo iudicio plurimi faciendæ. Venereis voluptatibus Mentha commendata est, etsi Plinius non sine errore lib. 20. cap. 14. planè contrarium scriptis tradiderit, vt mox patebit. Græcis *ἡδίοφυρος* dicitur, Latinis patiter & Italis Mentha, Arabibus *Nahanaba* & *Nahanaba*: Germ. *Münz*. Hisp. *Hierua buena*, Gall. *Mentha*. *Hacille*, qui dicit non plurimi faciendas differentias Mentharum, quia non nouerat eas, ideoque non poterat distinguere, quod satis indicant eius icones, & omnia quæ scribit de Sisymbriis & Méthis. Nos cum Posterioribus plures differentias, de quibus singulis separatim dicemus, agnoscamus.

Tempestiuum est vt Mentha vires declaremus: itaque vt à Dioscoride ordiamur: Mentha, inquit is, *ἡδίοφυρος*, ab odoris suauitate Græcis dicta, (*ἡδίο* enim idem est quod suavis *ἴφους*) verò odorem significat, quam alii Mintham vocant, cognita herbula est. Calefaciendi, adstringendi, atque exsiccandi vim habet: quamobrem

sistit sanguinem potu ex aceto succo: tinea in ventre teretes enecat: Venerem stimulat. Singultus, vomitiones, choleraeque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurariones discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti [vt *ἡδίοφυρος* *ἡδίοφυρος*] capitis dolores mulcet: mammas si tendantur, aut Lacte turgent compefcit: cum sale canum moribus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulla subuenit: vuluæ ante coitum admota conceptioni resistit: linguæ scabritiem confricta laeuigat: lac coire densarique in caueum non patitur, si folia [aliàs *ἡδίοφυρος*, id est, ramuli] portionibus Lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Et hæc Dioscoridis verba de Mentha satia intelligenda sunt, quam tanquam notam non deferibit.

Mentha ipsius odor animum excitat, inquit Plinius l. 20. c. 14. & sapor auidentatem in cibis, ideoque embammatum milturæ familiaris. Ipsa acescere aut coire densarique lac non patitur. Quare lactis portionibus additur, ne huius coagulari potu strangulatur. Datur (Data M. & C. H.) in aqua, aut mulso: eadem vi resistere & generationi creditur: cohibendo [prohibendo] genitalia densari. Aequè maribus ac foeminis sistit sanguinem, & purgationes foeminarum inhibet. Cum amylo ex aqua pota, cæliacorum impetus. Sytiation & vomicae vuluæ curauit. Ille & iocinerum vitia ternis obosis ex mulso datis. Item sanguinem excreantibus in forbitionem. Huiusmodi in capite infantium mirè sanat. Arterias humidat, siccat, adstringit. Pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci [Muscorum & *ῥοδάκτων*] iuuat autem, quia fluxionem sistit in fauces euntem, & raucedinem efficienrem. Succus sub certamine vilis duntaxat, qui & gargasatur vuâ rumente, adiecta Ruta & Coriandro ex lacte. Vtilis & contra tonsillas cum alumine, linguæ asperæ cum melle. Ad conuulsa intus per se vitilisque pulmonis. Singultus & vomitiones sistit cum succo granati, vt Democritus monstrat. Recentis succus narium vitia spirita subductus [subducto. Vet. jemendar. Ipsa trita choleras, in aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta: & si mammae tendantur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra Scolopendras, & Scorpiones marinos, & ad serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus: item sedis vitis. Intertrigines quoque: vel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lienimederi eam in horto gustatam, ita ne vellatur: si is qui mordeat, dicat se lienimederi, per dies nouem. Arida quoque fatinam tribus digitis apprehensam & stomachi dolorem sedare in aqua: & similiter asperam in potionem, ventris animalia expellere. Magna societas cum hac ad recreandos defectos animo Pulegio, cum surculis suis in ampullis vitreæ aceti vitiusque deiectis. His Plinius partim plures virtutes Menthae quàm Dioscorides tribuit, partim Dioscoridi appertè refragatur, tradens eam Veneri officere, adducta etiam curid faciat causa: Sicut Florentinus in Geopon. rinceptam ac incommodam rebus Veneris habet dicit.

Dioscoridi etiam Hippocrates & Aristoteles aduert-

Nahanaba

aduersantur, vterque diuersam rationem secutus. Sic enim Hippocrates, Mentha calfacit, vrinam ciet, & vomitus sistit. Et si quis saepe comedat, semen genitale colliquetur, ut diffusetur, arrigere prohibet, & corpus debile facit. Aristoteles in Problematis sic proponit. Cur dicitur Mentham belis tempore, neque edendam neque ferendam esse? Num quia refrigerat corpus? Indicat autem id seminis corruptio. Hoc autem contrarium est fortitudini atque audacie, sicut ipse ostendit alio problemate, cum ait, eos qui natura sunt frigida formidolosiores esse, contra qui calida, audaces. At Hippocrates immo dicunt Mentham esse venerem resistere intelligit, quod caliditate sua sanguinem extenuet & semen genitale colliquet, eamque ob causam arrigere prohibeat: Galeno, Dioscoride, Paulo, aliisque quamplurimis Mentham calidam siccam esse cum eo statuentibus. Aristoteles verò, Mentham corpus ex accidente refrigerare, atque debilitare, quod Semen corruptum pat.

Conciliator anxius est & verè fateatur esse calidam & siccam ac Venerem excitare Mentham. Addit tamen: Mentham per se quidem calidam, per accidens autem frigidam: ac idem docet Hermolaus Barbarus corollar. 263. Demum verò Conciliator aliam problematis solutionem affert, cum inquit. Potius dicendum Mentham in bello neque edendam, neque ferendam, quod calefaciendo homines ad Venerem incitat, propter quam milites debilitatur & redduntur timidi, quam quidem resolutionem admittendum censet Massaria. Quamobrem quod nequeo dissimulare, inquit, legi aliquando cum stomacho Montanum Veronensem, qui de affectibus vterinis hunc locum tractans, cum totum peruertit, scribens ad hunc modum. Hac in re Aristoteles errauit in problem. vbi volens redde causam, docet, esse frigidam, quod falsum est. Hac Montanus. Quæ ab Aristotele & Conciliatore aded sunt aliena, ut certissimum sit hunc hominem neque Aristotelem neque Conciliatorem legisse, sed potius, quod alii quoque hoc tempore faciunt, hæc ex aliis transcripsisse.

Non abs re autem erit etiam huius loci facere hos Reulneri versus:

Mentham ne comedas: neque plantas tempore belli:

Sic equidem Veterum regula sancta monet.

Cur? an quod timidas facit, imbellesque cohortes

Frigida? sic magnus censet Aristoteles.

An quod delictis facit indulgere, gulaque

Cum condimentis hæc, & odore placet?

An quod & hac metuit ferrum, si credere fas est:

An quod disfidis tunc veterat esse locum:

Quando semel longo durat sata tempore Mentha

Fertilis, & damnis dirior usque suis?

An potius Venerem quod iners remoratur amicam?

Nec reparat damnum Martis ab ense datum?

Galenus Menthe facultates, & causam cur ad Venerem incitet, exponit his verbis. Hediōsimos alii verò Minthem odoratam vocant. Est enim & alia quedam Mentha insuavis odoris, quam Calaminthen vocant. Vtraque gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine calfacientium. Infirrior tamen est Mentha odorata quam Calaminthe, & minus calefacit. Ut enim in vniuersum dicam hæc seu siluestris quedam est, illa seu domestica. Quamobrem ob eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter ad Venerem excitat. Id quod omnibus accidit quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent. Ob

Tom. III.

talem ipsius herbe temperatam in abscessibus eam quidam cum polenta mixta vrantur, id quod in Calaminthe facere nequeas, propterea quod valentius tum excalefaciat, tum delictis quam id genus medicamenta possint. Habet verò etiam quiddam amarum in se & acerbum. Illo quidem lumbricos interficit: acerbitate verò si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis eiectiones reprimat. Substantia est, si quæ alia herba, tenuium partium.

Nec omittenda sunt quæ Simeoni Sethi de ea prodidit. Iuuat iecur frigidum, ac ventrem corroborat ac stomachum, coctionem facit, vomitum sedat, ac singultum. Prodest etiam ad cordis morbum, & appetitionem suscitatur. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimum siluestris Menthe ius. Venerem stimulat, & iecoris obstructions tollit. Verum hac vsci ad satietatem non oportet: quoniam sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in fluam bilem mutat. Dein efficit ut sanguis, qui maxime est tenuium partium, discutiatur, & crassus ac melancholicus relinquatur. Quare oportet biliosos ab ea obtinere. Contrita cum sale & ribiosi canis morsui imposita, medicamentum fit salubre. Arida verò trita & post cibum sumpta ad concoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum vino pota difficulter parienti succurrit. Ferunt etiam quod mansa lippienti imposita fiat remedium: quodque eius decoctum absorptum confestim sanguinem ex faucibus effluentes sanat. Huius semen ventrem purgat, & pulmonem lædit.

Scribit Matthioli aquam à tota planta Menthe distillatam, quatuor vnciarum pondere epotam sistere sanguinem è naribus profuèrem. Succum etiam ad idem prescribunt alii, nec non ad hæmorrhoidas. Ego autem cum multa habeamus optima remedia quæ sanguinem cohibent manifesta qualitate, nolim uti hac herba acris, quæ etiam sternutationem odore & acrimonia mouere potest.

Hic porro videndum quare Galenus in Elect. de Aromat. potius posuerit Mentham siccam, quam vrentem. Respondent Monachi, quia istud electuarium est stomachicum, & non recipit nisi medicinas stomachum confortantes. At quia Mentha virens est ventosa, & stomachi conturbatiua non recipit ipsam. Cum autem siccatur, amittit ventositatem illam, & restat illi pars confortatiua, quam quærit author in presenti electuario, idè recipit siccam. Vnde notandum, quod herba aut flos, vel simile, cum siccatur, tripliciter operatur. Aut amittit virtutem, ut sunt Borrage, Buglossa, Cymbalaria, & similia multa: aut acquirit virtutem, ut Mentha, Hyssopus, & similia: aut transit de virtute in virtutem ut Viola & similia. Item nota, quod cum in aliqua compositione petitur Mentha humida, non intelligitur virens, ut dicatur humida ad differentias sicce. Sed illa quæ in pingui, vel humida, vel aquosa humo nata est. Ut puta, illa est humida, quæ irrigatur &c. vnde cum non specificatur de virenti, ut puta pro excipiendo succo ipsius Menthe &c. vel legitur Mentha simpliciter, vel Mentha humida, semper sicca intelligitur. Et similiter Hyssoppus & alia plura.

MENTHA CRISPA VERTICILLATA folio rotundiore.

Repratrix radix huic cum reliquis speciebus communis existit, nec non caules quadrati,

qui huic cubitos binos altitudine superant, rigidi, recti, propter terram purpurascetes, hirsuti,

Descriptio



multis alis cō-
cavi : folia o-
dorata ex ra-
morum & cau-
lium geniculis
enascuntur a-
tro-virentia,
superiora, ru-
gosa, crispata, per
ambitum ferra-
ta, glabra, aut
minimum hir-
suta, flores ex
foliorum alis
verticillatis,
Pulegii, in ca-
ruleum languē-
tes.

An Cordo in

Diosc. dicitur

indurget, siue

quidam, quā Ger-

mani ipso refe-

rente, Fraus Münz appellant, Saxones verò

Fraus münchen & Phariacopolæ Mēham cris-

pam. Hanc fatiua appellat, & nisi saepe trāf-

feratur Sisymbrio similem fieri scribit.

An Trago Mentha prima, Mentha domestica,

Mentha rubra, Sisymbrium?

Dod. Gall. hanc exhibet sub titulo Menthe fati-

uæ, [sic etiam Lat.] primæ, quam gallicè vo-

cant *menthe crepue*, Ger. *deymment* & Fraus *dey-*

ment [forte malè legitur in his vocabulis d pro

B.] Belg. *Bruynbeylsche*.

Fuchl. & Hiltor. & Icon. Mentham fatiua

primam inscribit. Et sic etiam Lacuna, qui eius

figuram assumpsit. Sed & Lonicerum per Men-

tham fatiua primam die crst zam Münz/

Kott Münz/Mentham rubeam, aut deymment,

hanc intelligere suspicor, quamvis figura dis-

pliceat.

Rob. Const. apud Amar. in Diosc. lib. enarr.

39. figuram hanc Menthe fatiue nomine inscri-

bit, quam è Fuchio assumpsit. An Amarus verò

de ea locutus fuerit, nescio.

Marthol. lib. 3. cap. 35. an huius Menthe

Mentionem fecerit me later, saltem nullam eius

figuram exhibet, nec integram descriptionem,

confiderent lectores quæ scribimus sub Mentha

crispa spicata & sub Mentastro folio rotundio-

re hirsuto rugoso : descriptio Germanica non

demonstrat plantam de qua hoc capite agimus,

spicatam enim dicit.

De hac Lobel. in Aduers. pag. 218. ait: Mentha

vulgata serpens, rotundifolia, Pulegii flore, ver-

ticillata, seu Fusca, sacra minime dicta Mentha

fuit, quia mentem percellat: quum potius spi-

ritus oblectet, gratia odoris, vnde *indurget* voca-

tur. Nec de odore, qui non semper suavis est, vt

Galenus etiam notauit, aut illius contratio sensu,

sed potius quia *uirtus* esset concolor, aut hirsuta,

dicta videtur *uirtus* vel *uirtus*, vt legitur apud

Theophrastum. Est enim *uirtus* Lanugo mus-

cidæ pubes humentibus & putrescentibus

penè cunctis sub dio apertis obduci soli-

ta, qualem cernere est in succis & decoctis

herbarum diutulè seruatis & passim in ole-

is & sterquilinis: cui haud absimilis tenera illa

hirsuties pulla, quæ in Mentha. In Obsor.

pag. 271. vocat Mentham vulgatam serpentem ro-
tundiore folio, flore coronato. In Icon. Plant.
figura eius est pag. 507. sub transposito titulo nē-
pe Cruciatæ Menthe. Titulus autem verus est
pagina 506. qui talis est. Mentha vulgata siue
Fusca sacra, & Mentha fatiua prima Dodonæi.

H. Lugd. pag. 671. Mentha fatiua crispa, Do-
don. prima. Obscurè de Menthis scribit Ge-
rardus, ita vt nesciam an per Mentham fatiua
rubra in, hanc nostram crispa intelligat. Icon
eius est Calaminthæ montanæ vulgaris primæ
Tabern. quæ est Calamintha vulgaris magno
flore.

C. Bauh. phyt. Mentha 2. siue crispa verticilla-
ta. Apud Matthiolum, Mentha tercia siue
crispa verticillata, Mentha cruciata Lobel. in
Obs. quoad iconem puta, non autem titulum.

Schvvenckf. Mentha crispa: Mentha vulgata
seu fusca sacra Adu. Mentha 2. (legendum puto 1.)
Dodonæi: Mentha simplex officin. *indurget*
Dioscoridis: *Mith* Græcorum: *Sisymbrium hor-*
tense, *Garten Münz*, *Fraus Münz*, *Frauser*
Balsam.

Hec à Cæsalpino ita traditur. Mentha hor-
tensis quæ rotundo folio constat, odoratior est:
Mentham Romanâ vocant: germinat incipiente
hieme: cauliculis humi repentibus, subrubris:
foliis rotundis: quo tempore vsque in Ver-
tella germina odoratissima, & gustui suauia ex-
petuntur in cibis cruda ex oleo & aceto: aduen-
tante æstate caules eriguntur, foliis grandioribus
circumferratis, odore non adeo grato, sapore
subamaro, rotundis, crispis, & subnigris: flores
summis canaliculis fert spicatos, purpurascetes,
aut candicantes: radices summa tellure serpen-
tes, tenuis, Graminis modo, viasque admodum
vnde copiosæ germinationes erumpunt.

Puchetrimam, & suauissimi odoris Mentham
verticillatam à me plantatam & florentem in
horto Ill. E. C. mensè Augusto ex Entzemia at-
tuli, collectam in hortò nobilissimi viri D. Io.
Henrici à Reinach Entzheimæ: hanc etiam vidi
Argentina in hortò D. Friderici Meier. Stutt-
gardia in hortò Ill. E. Wirtemb. Augusto floret,
omnibus ferè hortis nota.

Authore Schvvenckfeldio, tenuissimum est par-
tium. Excalescit & exicat in fine secundi
ordinis. Attenuat, digerit, resoluat, aperit, inci-
dit, prouocat: Flans & lumbricos peccat, vom-
itum compescit. Cœliacis & Ventriculi vterq;
que doloribus à flatu prouementibus competit.

MENTHA VERTICILLATA, MINOR acuta, non crispa, odore O. ymi.

Reliquis Menthe speciebus conspicuum
suauissimi odoris Ocymi saporisque Me-
lissæ discrimen hanc facile dispecit: siquidem
radici multiplex reptans illi cum aliis communis
est, perinde vt & caules quadrati, ramosi, hirsuti
cubitalis, folia autem primè Ocymo medio se-
mitia, nonnihil hirsuta, quæ denique scortiora ex-
adant, ex geniculis aduersa: ex quorum alis
flores verticillati dilectose præparati videri eme-
gunt: minores, quam in Mentha aruensi.

Trag. in Hist. germ. & lat. lib. 1. cap. 3. hanc et
ser siluestres Menthas recenset, primamque fau-
cit: Figuram autem eandem habet cum ea quam
exhibuit pro Nepeta agrestis, de qua loquimur
sub Mentha aruensi verticillata.

Dodon.

Dodon. Gall. & Lat. in fol. *Mentha sativa* quarta, *Herbe du vent*. Germ. *Herz frant*, quasi Cardiacæ & Cardiacæ Métha, Germ. nonnullis *Balsam frant*, vt Fuchsius tradit, vocatur.



Género hort. *Mentha* tertia minima, tuberculata, suavi admodum odore ad *Sisymbrium* & *Ocimum* accedens. In Catal. pl. *Sisymbrium* hortense vulgò *Balsamita*. Cornarius in Diosc. vocat *Acinon* qui secundum Dioscoridem & Paulum mentes sinit, iuxta Plinium verò cieat. Hunc officinas *Ocimum*

mastrum incognita ipsi *Acini* appellatione vocare scribit: Alios *Ocimum* silvestre. Germanos *Heine* oder *Wilde Basilien* hoc est, *Basilicum paruum* vel *silvestre*.

Camer. in histor. German. *Matth. lib. 3. Mentha* alia species, species *Mentha Cardiacæ*, vt vulgò vocatur, *Herz frant*, aut *Herz münze*. Item hort. *Mentha Cardiacæ*. In *Epit. Mentha altera*, It. *Mentha minore* siue *Gentile*. Non existimo *Matthiolum* sua *Mentha 2.* hanc intellexisse, pictura monstrat spicam non verticillatam.

Hist. Lugd. pag. 67. *Mentha sativa* quarta *Dodonæi*.

Tabern. Icon. & Hist. *Calamintha* *Ocymoides*, *Basilien Münz*. *Compilator* non bene describit, existimo ipsum nescivisse quid scriberet. C. *Bauhin. Phyt. Mentha prima* siue *hortensis* verticillata.

Schwenckfeld. *Mentha vulgarissima*, *Mentha vulgaris* serpens rotundifolia. *Mentha hortensis* verticillata *Ocymi* odore. Cruciat *Mentha Lobel*. *Mentha Rubra*, *Balsam Münze* / *Rote Münze* *Balsam* vulgò. Nos non possumus intelligere *Schwenckfeldium*, *Mentha* quæ est *Ocymi* odore non est rotundifolia, nec etiâ cruciat *Mentha Lobel*. is enim dicit spicam: nescio cur nomina germanica *Herz balsam* & *Herz münze*, & *Cardiacæ*, alteri *Menthe* tribuat, ac contrâ vocet hanc *Mentham* *rubram*, & *Rote münze* & *Balsam münze*, cum hæc ita vocari non soleat.

Cesalpino. *Mentha hortensis* folio oblongo, candidiorique.

Mentham verticillatam minorem *ocymi* odore habeo in horto III. E. C. attuli *Basilæ* ex horto patris Joh. Baah. medici, quam primò colui in horto meo, Genueæ etiam in hortis observavi: *Mentha* autem hæc floret Iulio & Augusto.

Hanc ea omnia posse, quæ *Mentha* spicata folio longiore acuto, glabro, nigriore, præstet, infra dicitur ex *Matthiolo* *Camerarii*.

MENTHA ARVENSIS VERTICILLATA hirsuta.



Mentha ætius nomen fecerunt naturales, vt quæ arvis frequenter in nascatur, reptando se longius propagans, caulis quadratis, albâ lanugine villosus, ramulis folia aduersa, Clinopodii *Matthioli*, per ambitum leniter hirsuta, lanugine odore genero calaminthæ sapore aculeo non insuavi: flores verticillati, *Mentha* *Sisymbriæ*, minores, dilutius tubentes & in albidum propemodum pallescens: *radix* terens admodum.

Apud *Brunfelsium* in *Herb. Germ. ex Hieron. Brunsch. Mentastrum* dicitur.

Tragus lib. 1. cap. 4. vocat *Nepetam agrestem*, *Herz Nept*, *Nepetam* quateram: atque quoddam velle *Pulegium silvestre*, *Wilde Poley*: sed horum errorem esse manifestum. Huius eiusdè figuram repetit capite 6. hæc titulus: *Mentha aquatica* exigua, *Heinrich Münz* / quanti *Pulegium silvestre* *Dioscoridis* esse statuit. Ne autem lectores decipiantur, fatemur nos non intelligere *Tragum*, nec novisse discrimen, ne scire cur duas similes figuras exhibuerit.

Dodon. Gall. Calaminthæ alterum genus (sic & *Fuchsius*, qui hoc genere solo pro *Calaminthæ* officinas vti scribit.) facit, ac *Gall. Poutier* [*Pulegium* *Fuchii*] siue *age*, græcè *πύχων θυελλος*, Lat. *Pulegium silvestre* & *Nepetæ*, Germ. *Forst münze* / *Wilde Poley* / Belg. *Wilde Delage* & *Wilde münze* appellat.

Nepetæ altera, Latinis particulariter *Nepetæ dicta*, inquit *Lonicerus*, *Pharmacopœi* utuntur, vocantque *Pulegium silvestre*.

Amatus [qui *Calaminthæ* tertiam facit ac *Calamentum* *pharmacopolarum* vocat] huius plantæ nomen cum *Calaminthæ* nominibus miscet.

H. Lugd. duas icones vnius plantæ proponit hist. pl. pro diuersis plantis, pag. sc. 906. & 907. titulis *Calaminthæ aquaticæ* *Matthioli*, & *Nepetæ* 4. *Tragi*.

C. *Bauhin. Phyt. pag. 432. Calaminthæ* 6. siue *arvensis* verticillata hirsuta, *Brunfels* in 4. pag. 210. *Mentastrum*. Sunt qui *πολύκρημον* *Dioscoridis* esse velint. Apud *Matthiolum* *Calaminthæ aquatica* *Matthiolo*. *Tabern. Icon & Hist. Calaminthæ arvensis*.

Mentham *arvensis* verticillatam & hirsutam habeo à me plantatam in horto illustr. C. W. repletu suo odiosam, alioqui passim in agris provenit.

Locus & Tempus

MENTHA SPICATA ROTVN.
difolia crispa.
CAP. II.

Descriptio **F**acie Rotundifoliæ crispæ spicatæ qualis verticillatæ, radices reptantes se propagantes: caulibus quadratis, hirsutis, infima parte lubrêtes; folia è geniculis aduersa, crispa, rugosa, vix hirsuta, serrata, ad Verticillatam odore & sapore accedentia: at florum positus multum diuersus, licet singularium flosculorum non aliis sit vultus aut color: siquidem in spicas vnciales & sextantales digesti sunt.

Plantam à nobis hic delineatam vocat Tragus lib.1. cap.9. Mentham satiuam seu crispam. Dodon. gall. Mentham satiuam secundam: Gall. *Baume crepu*: Germ. *Brausmünz*, & *frausbalsam*: Belgis *fensmunt*, & quibuldam *heylighe*. lat. in fol. Mentham alteram hortensem quam alias satiuam dicit. Germ. aut *frausmünz*, id est, ut ait, Mentham cruciatam, Bohemis *Mata*. sed Germanicè *fraus* significat crispam, non cruciatam.

Lonicero dicitur die *andere zam Müng*: Mentha crispa. Geln. hort. Mentha altera nobilior, rotundioribus & rugosis seu crispis foliis: Silybrium hortense Matthiolo.

Dodon. nat.



An Matthiolo in Dioscoridem Mentha simpliciter, Mentha Crispioribus foliis, Mentha crispa Cordi in vnguento Martiato. in histor. germ. Certen munge aut deymen. Métha prima, grecis *indolentior*?

Fuch. histor. Mentha sativa secunda, *Frausbalsam*. Iconum Mentha sativa altera. Lobelio Ad. p.218. Mentha altera, *Cruysmüntz* siue Cruciatæ Mentha dicitur, flore spicato. Obs. pag.27. Mentha rotundifolia altera flore spicato, siue cruciatæ Mentha, Mentha secunda Dodonæi. In Icon. Plant. pag.506. titulo inuerso pro Mentha vulgarè posita icon. Quæ Lobel. scribit de Silymbrio folio 272. ita dubia videntur, vt nesciam an huc referenda figura: sanè quam ibi ponit posset non minus convenire Menthe crispæ spicatæ quàm ea quam iam posuit, potest item exprimere meo iudicio Mentastrum rugosum satiuum: lectores, rem perpendant.

Lobel. nat.

An Amato *id est* *quæ in uirgine*, Mentha ubique nota quæ semper in hortis reperitur, Hortulana ab Hispanis nonnullis appellata? Monachus in Melicem dist.6. cens.178. Mentha altera rotundioribus foliis, quam fæminam cognominant. Luminari maiori Mentha domestica quæ propriè hortulana, & Mentha communis vel odorifera.

An Amato *id est* *quæ in uirgine*, Mentha ubique nota quæ semper in hortis reperitur, Hortulana ab Hispanis nonnullis appellata?

Monachus in Melicem dist.6. cens.178. Mentha altera rotundioribus foliis, quam fæminam cognominant.

Luminari maiori Mentha domestica quæ propriè hortulana, & Mentha communis vel odorifera.

risera.


H. Lugd. p.672. Mentha altera satiuæ.

C. Bauh. phyt. Mentha 3. siue rotundifolia crispa, spicata prima: Trago crispa: Lobelio rotundifolia altera siue spicata. Item apud Marth. in Diosc. lib.3. c.35. Secunda Mentha altera Marth. Mentha satiuæ 2. Lacun. Mentha minor Calabri. Quam iconem & quam plantam proponat Frater pro Mentha altera me later, eius icon videretur facta ad imitationem Menthe Dodon. alterius, siue Lobelii Menthe rotundifoliæ alterius, melior tamen illorum: cur non annotaret se eam intelligere, si intellexit, miror! Si Mentham aliis indicem intelligit, cur icon eius ita accedit ad iam dictam?

Mentha rotundifolia crispa, flore spicato nostræ operæ nunc Montbelgardi in Horto Ill. E.C. abundat, Florens Augusto & Septembri. Vidi etiam Basileæ & Colmarie in hortis.

Ad dolores capiti sæpe recurrentes Wirtembergicus madefacit lincea, triplicata aut quadruplicata, in aqua Menthe crispæ, vtrique temporaria applicans. Mentham spicatam commendat Holsius ad dysenteriam pestilentialem.

MENTASTRVM SPICATVM CVLTVM,
folio rotundiore, rugoso.



In hortis colitur, odioso reperiatur tandem hortulani parum gratum. Causibus pluribus quàm Menthe crispæ spicatæ, nigrioribus, hirsutis & mollioribus quàm Menthe crispæ verticillatæ: flores spicati digesti, minimi, albi, odor gratus. Nostra icon est exemplis iconibus.

An Marth. in Diosc. Silybrium hortense? Et in hist. Germ. *Frauserbalsam*/Silybrium domesticum? An Anguill. epist.7. Silybrium primum? An Camer. apud. Marth. & Epir. Silybrium domesticum, Balsamita, *Frauser Balsam*. Mentha crispa siue Balsamina?

Lob. obs. pag.272. Silymbria Mentha agrestis [ita quoque inscribitur in Icon. Plant. p.508.] satiuæ cruciatæ Menthe congener aut eadem. Italis etiam Balsamita seu Mentha Crespa, Silymbrii satiuum Matthioli. Figura à Lobelio posita non malè exprimit nostrum Mentastrum folio crispo: verum non parum differt à Mentha satiuæ cruciatæ, folia multò hirsutiora & molliora.

An Lacunæ in Diosc. lib.2. cap.17. Silymbrii hortense, Barbaris Balsamita, aut Mentha Romana, Silymbrium primum, Græcè *σπυλινος ἀγριος*, Lat. Serpillum siluestre, Arab. Sifnabar. Castell. *yerna buena aquatica*. Gall. *Mente aquatique*. Lacunahabet figuram Marth. an verò intelligat hoc Mentastrum rugosum, vel Mentham crispam spicatam.

Spicatum afferere non auiſim, videntur alii.

Hist. Lugd. pag. 677. Sifymbrium hortense, cuius Theophrastus mentionem fecit, quod Matthioli & periti Herbarti eam esse putent quam officinæ Balsamitæ appellant, vulgus Mentham Romanam siue Crispam. Galli *Baulme creſpu*: Nos non eandem plantam facimus Sifymbrium hortense & Mentham crispam. Icon autem ex Matthioli placet, & melius quam Lobelii, ac etiam ea quæ à nobis proponitur.

Turnero parte 2. Menthastrum, Mentha siluestris, Græcis Hedioſiſos agrios, nobis Horſemint.

C. Bauh. Phyt. pag. 429. Mentha 4. rotundifolia, crispa, spiculata Matthioli. Sifymbrium hortense. Lob. Sifymbria Mentha agrestis. Apud Matthioli. Mentha rotund. crispa spicata Marth. Lacun. Caſt. Lugd. Sifymb. hort. Gcfm. Mentha hortensis 2. siue crispa Lob. Sifymb. Mentha agrestis.

Menthastrum hortense crispæ Menthæ spicatæ simile feliciter mihi prouenit Montbelgardi in horto Ill. C. W. florens Iulio, quod vt Mentha crispa ſerpit: ac idem etiam obſeruauit Tubingæ apud Fuchium: vt & Stutgardiæ & Argentinæ in hortis.

MENTHASTRVM SPICATVM MINVS.

CAP. III.

Obſ. pag. 273. Menthastrum minus Spicatum, odoratum, mitius, minusque graue, folio Heliotropii tricocci. H. Lugd. p. 674. Menthastrum minus spicatum folio Heliotropii tricocci. Pro hoc Menthastrum H. Lugd. ponit Iconem Lobelii positam pro Calamintha. Dioſcoridis Menthastrifolia aquatica hirsuta. Considerandum proponimus an Lobelii Menthastrum sit nostrum Menthastrum spicatum folio rotundiore rugoso, de quo antè.

C. Bauhin. in Animaduſ. in hist. Lugd. pag. 33. Menthastrum minus spicatum Lobelii. Perfectè hoc loco [pag. 674.] Descriptio non ponitur: reperitur Descriptio pag. 906. sub Menthastrifolia aquatica hirsuta Penz & Lob. sed sine icon. Hæc frater. Perfectè descriptionem qualem Lob. concinnauit posuit H. Lugd. Sed iconem non bene adaptauit quæ alterius plantæ.

MENTHASTRVM SPICATVM, FOLIO
crispo rotundiore, colore partium albo, partim cinereo, vel virente.

Perinde vt huius generi aliæ, radix Menthaſtri, quò de Sermo nobis est, reſpat: caules quadrati, hirsuti, ſubrubentes, folia aduerſa, ſubrotunda, ſerrata, tomentosa colorum varietate in eadem planta mirè ludentia, modò tota candida: modò ex albo in herbida languentia, aliàs dimidia parte alba, alterà viridi, aliàs vtroque hoc colore variè maculoſa, odore minus graui quàm vulgare Menthaſtrum, ſapore ſatiuz crispæ; acri, non ingrato: flores ſpicati albicant odore ſuaui, non vehemente.

Lobel. in Aduerſ. pag. 229. Menthastrum cinereum & niueum in Anglia cultum. Obſ. p. 273. & Icon. Plant. p. 510. Menthastrum niueum Anglicum. Dodon. Lat. in fol. pag. 96. Menthæ siluestris species quædam foliis ſubindè partim virentibus partim niueis. H. Lugd. pag. 674. Men-



& Diacymini, hæc, utpote grauiorem, nec minus efficacem, præstatet indere:

MENTHASTRVM FOLIO RVGOSO

rotundiore spontaneum, flore spicato,
odore graui.



Cordas sic Descriptio

Menthastrum caules erigit cubitales, quadrangulares & hirsutos: Folia ex intervallo in contrariis lateribus, alterno ordine & cruciformi posita proferentem, longitud. beſſis, latitudine autem vnciam quarta aut tertia parte excedentia, rugosa, atque lanuginosa pube obducta: ramulos

supra medium plerumque caulis è foliorum sinu producit, vere & estate numerosis vndique floribus in candido rubentibus & hiantibus, Denticulatis calicibus insidentibus, & posita quadam spicæ imaginem referentibus circumdati: quibus exiguum nigrumque semen succedit: radice nititur multis capillamentis fibrata, laterales viticulas propagationis causa in terra spargente & perenni. Saporè habet amarum, acrem & adstringentem, odorem verò grauem & acrem, satius Mentha multò iniucundior. Hæc Cordus in Hist. (vbi Menthastrum vocat, & in Dioſcor. mentham agrestem cognominat, quam G. Pſerdes mûnz exponit) cui figura ex Trago apposita, quæ mihi non placet quia mala. & præterea nò huius plantæ videtur. Nemo autem, quod ſciam, Menthastrum folio rotundiore melius Cordo describit, quæ occasio vt eius descriptionem hic assumptum.

thastrum niueum Anglicum Penz & Lobelii.

Partim album, partim cinereum genus Menthæstri pulcherrimum habemus Montbelgardi in horto Ill. C. W. ac variis in Burgundiæ Comitatus locis obſeruauit: ac id etiam cultiores horti in Anglia alunt.

Balneis & compositionibus officinarum vt pulueribus Diacalaminthæ

An Anguillata epist. 7. Silybrium & *Sesambro* sponte proueniens in Italia.

Monachi in Mesuem dist. 1. cens. 25. vocant Mentastrum verum, folia habens rotundiora.

Tab. not.

Tabern. Icon. & Hist. Mentastrum, Wilden Balsam/ Wilde münz & Rossmünz nominat. Verum compiler Tabern. nihil distincte de hac planta scribit. Gerard. Angl. sub Mentha aquatica Valde mint iconem Mentaltri dicti Tabern. proponit, verum de hac etiam indistincte scribit. Casp. Bauh. phyt. Mentha 7. siue sylu. rotundiore folio dicitur, & Cordi Mentastrum.

Camer. not.

Schvvenck. Menta siluestris i. *indioques d'egies* Diosc. Mentha caballina folio rotundiore, Mentaltri Tragi. Mentha alba officin. Wilde münz/ wilder Balsam/ Rossmünz. Sapore est amaro acri & adstringente. *Ast non placet dici albam*

Locus & tempus.

Mentastrum folio rugoso flore spicato sponte passim prouenit Montbelgardii, vt eundo ad Molendinum & Domum leproforum. Hoc etiam Mentastrum folio rugoso rotundiore, ni fallor multum obseruauit Basilea propè Sanctum Iacobum ad flumen Mense octobri. Geneta passim *au plein pais*. Montpelii secundum aquas. Mentastrum Cordi nascitur secus gelidos riuulos, solo pingui, interimque saxoso: arenoso autem nunquam.

MENTHA SPICATA, FOLIO LONGIORE acuto, glabro, nigriori.

Non secus ac alia Mentha, *radicum* longo reptatu, subinde fibris de nissis se promouet, *caulibus* bicubitalibus, ubi rubentibus, quadratis: & quorum nodis per certa intervalia ge-

Descriptio



Varietatum
lapis.

cilli longiuscula serie spicam effigiant.

Brunfels. in herb. germ. & Hieron. Braunschweig. itemque Dorst. cuius icon non placet, Balsamita & Mentha Sarracenica, Germ. Balsammünz, aut *Vunser fräven Münz*. Sed hi plures plantas confundere videntur, praesertim Dorst. qui & Silybrium vocat.

Tragus
not.

Plantae sane à nobis descriptae videtur Tragus lib. 1. cap. 5. duas habere figuras: vnam nomine Menthae rubrae siue *Silybri* Rote münz, alteram [quod tamen lectoribus diiudicandum re-

linquimus] titulo Nepetae aquatica. Spigamint Balsam: Spigamünz: Calamintha alterius de qua Diosc. lib. 3. locutus sit. Puto autem figuram sub Menthae rubrae vel Rote münz male positam, ac non loqui de Mentha, cuius ibi figura: Obscure meo iudicio de Menthis scripsit Tragus.

Dodon. Gall. dicitur Mentha satua tertia, Mentha Sarracenica, & Mentha Romana: Gall. *Menthe de nostre Dame* & *Menthe Romaine*. Germ. Balsam münz/ vnser fräven Münz/ Spigamint. Belg. Roomschemunte & Balsam munte. Lat. in fol. Salvia Romana, Mentha tertia aut Herba S. Mariae.

H. Lugd. pag. 671. Mentha satua Matthioli 1. Dod. 3.

C. Bauh. phyt. Mentha 5. siue angustifolia spicata: Brunfels. in 4. pag. 200. Mentha secunda angustifolia longissimoque folio in horto Montbelgardico visa. Apud Matthiolum, Mentha Matthioli. Mentha hortensis prima Gesn. Satua 3. Fuchs. Dod. Mentha Romana officinarum angustifolia Lob. hortensis oblongo folio C. Bauh. Satua Cast. Lugd. odorata angustifolia Cain. 2. cuncta Tab. Frater proponit iconem Tabernae: Verum an Matthiolum eam intulerit dubito.

Monachi in Mesuem dist. 1. cens. 5. de hac forte loquuntur cum dicunt: Multi pro Mentha Florentina, intelligunt Mentham communem, id est, Hortulanam. Item dist. 6. cens. 78. Mentha communis & vitiator. Mentha hortulana quam Graeci Hediosnum satuum cognominant longioribus foliis quae nonnullis masculina vocatur. Mentham melius putamus scribi cum aspiratione quamuis communiter scribatur sine ea. Item Mentha dicitur Arabicè *Nababana* vel *Nahanna* &c.

Coldenberg. apud Cordum in Disp. supra Marc Nicol. Mentham Sarracenicam, vocatam quoque Romanam, quam in suis de Stirpium libris imagine & scripto depinxerit Dodonaeus, hoc loco intelligendam ait, quicquid Fuchs ex suo corruptissimo Nicolao in medium proferat. Dicitur autem Fuchsio hist. cap. 3. Mentha satua tertia, siue Romana, vel Sarracenica. Lobel. in Aduers. pag. 218. Mentha Romana officinarum siue praestantior angustifolia (ita etiam inscribitur in Icon. Plant. pag. 307. Germ. Spigamünz/ spicata, cuius differentias duas assignat. Quia autem folia albiora, hirsutiora habeat, & efficacior, inde Romanam & Balsaminam appellat. Obser. p. 271. Mentha Romana officinarum praestantior. Mentha prima Matthioli. Quaedam in Lobelii descriptione conueniunt, quaedam non respondent, scilicet albedo & hirsuties: Icon vero eius optime placet: is forte à glabra non distinguit hirsutam.

Marth. ponit duas figuras penè similes Menthae, quas spicatas facit, & folio longo acuto: non autem indicat qua in re differant, nec meo iudicio rite describit: neutra enim figura respondet descriptioni primae Menthae quam in Histor. Germ. ait folio rotundo, molli & rugoso nonnihil: Secunda icon forte Menthae spicatae folio longo acuto, descriptio tamen non in omnibus conuenit: Sanè existimo nullam Mentham rite cognitam fuisse Matthioli.

Camer. apud Marth. germ. lib. 1. cap. 34. Mentha acuta Spigamünz: An eadem hort. pag. 100. Mentha odorata angustifolia? In Epit. Mentha: Graecis *Hediosmos*: Arabibus, *Nababana*: Germ. Münz:

Müntz: Hisp. *Hierra buena*, & *Ortolana*: Gal-
lis *Menthe*.

De *Mentha* spicata folio acuto hæc inter alia
prodidit Turnerus parte 2. fol. 83. Dioscorides
Mentham non describit, & latius vnicum dun-
taxat facit genus. Quare cum latius *Menthe* ho-
die plura sint genera, difficile est statuere, quæ
sit Dioscoridea. Fuchsius quatuor facit *Mentha*
latius genera, cæque accuratè describit. Mat-
thiolus tria, quæ ieiunè & leuiter describit &c.

Tabern. Hist. & Ic. *Mentha acuta*, *Spizmüntz*,
non benè describit, nec ab aliis distinguit.

Gerard. Angl. *Mentha cruciata*. Icon est Ta-
bern. montani non conueniens cum *Mentha* cri-
spa quam cruciatam vocat: verum nihil distinctè
scribit de *Menthis*, & confusè ponit figuras.

Schvvenck. *Mentha Cardiaca*, *Mentha an-
gustifolia* Lobel. *Mentha 2*. Matth. *Mentha
acuta* Tab. *Bergbalsam* / *Bergmünze*, *spiz-
müntz*. Minus vulgata ac prior.

Gesl. *Mentha hortensis* prima communis &
maior. Lonic. *Mentha acuminata* & *Mentha
Romana*.

Mentha spicata folio acuto, non crispa, nigri-
or abundat Montbelgardi in hortis, nec non Pa-
rauii, Genevæ & Balicz, ubi in hortis etiam ob-
seruauit.

Gustu est acris, calidæque facultate prædita, ex
tertio quadamtenus excafacientium ordine, sed
minus excafacit quam *Calamyntha*. Habet &
in se quiddam amarum, & acerbum, substantia
est tenuium partium. Adstringit quoque ac sic-
cat, Dioscoridi. Succus ex aceto potus sangui-
nem sistit: teretes ventris tinea necat: Vene-
rem stimulat. Terni rami cum acidi mali pu-
nici succo poti singultus, vomitiones, choleraeq;
sedant: Folia cum farina hordacea illita, suppura-
tiones discutiunt. Mammæ item tensas, aut
lacte turgentis compescit. Cum sale canum mor-
sus illiuntur: vuluæ ante coitum admota, concep-
trum impedit. Lac coire non patitur in ventri-
culo, si folia lacti immergantur. In summa sto-
macho utilis est, & in condimentis peculiarem
gratiam habet. Aqua stillatitia è tota *Mentha*
plata puerperarum mammis cum linteolis ad-
mota lactis concretionem inhibet, animum ol-
factu excitat, vlcera manantia infantium capiti-
bus rursè sanat. Matth. in Epit. Camer. Tu.
Odor *Mentha* cerebrum roborat, memoriam
conferuat & auget, lacti indurta coagulari ipsam
nō sinir, hæc morrhoidas sistit. Colicis cruciatibus
confert cum gigartis mali Punci.

MENTHASTRUM SPICATVM FOLIO longiore candicante.

EA *Mentha* agrestis species quam hic tradi-
mus duos cubitos alta est, aliquando proce-
rior: radicibus geniculatis reptantibus fibratis:
caules item quadrati sunt toti hirsuti: quorum
geniculis apposita folia oblonga, acuminata, per
ambitum serrata, molli lanugine canescentia,
magis tamen infernâ quam supernâ parte; odore
facis grato, minus multò vehementi quàm *Men-
tha* latius spicate verticillatæ, sapore item simi-
li sed remissiore: flores ex robore in album pal-
lescunt. Icon quam proponimus à nobis empta
cum aliis non vndique placet.

An Cordo in Dioscoridem *Menthastrum*, a-
grestis *Mentha*, *Pferd Müntz*.

Tom. 111.

Schvvenckf. *Mentha silu.* 2. *Mentha equina*
acutioribus foliis, *Menthastrum* Lobel. *Mentha-*
strifolia aqua-



tica, hirsuta
Mentha. wilde
trauß Müntz/
Spitzige Roß-
müntz, *tisch-*
müntz.

Camer. 2.
pud Matthiol.
Germ. *Méthas-
trum Wildes*
müntze aut
Roßmüntze.
In Epit. *Men-
thastrum* siue
Mentha silue-
stris, Græcis
ῥόδανθον & *ῥόσος*
Ital. *Mentha-*
stro, German.
wilde müntz,
Gall. *Menthe*
chevaline. Nul-

lam provinciam, inquit Clus. in post. histor. adire
memini, in qua non conspexerim *Menthastru*, si-
ue sylu. *Mentham* spontè secundum aquas & ri-
guis locis nascentem.

Fuch. hist. cap. iii. *Mentha siluestris* *Mentha-*
strum vocatum & vulgò *Equina Mentha*: Ic.
Menthastrum. *Mentha silu.* Matthiolo quàm
Hetrusci retinentes Latinum nomen vulgò *Mē-*
thastru appellant. German. *Wilde Müntz* aut
Roßmüntz.

Trag. German. & Lat. *Mentha altera silue-*
stris, (die andere wilde Müntz, verum *Bach-*
müntz) propriè dictum *Menthastrum*, *Mentha*
campestris Dioscoridis & Apuleii.

Dod. call. *Menthastrum*, *Menthe chevaline*,
Mentha prima siluestris, ῥόδανθον & ῥόσος Diosc.
latine *Menthastrum* Plinio, *Menthe sauvage* gall.
Bergbalsam / *Roßmüntz* / *wilder balsam* / *wilde*
müntz / vide *Polemonium Absyrti*. Lat. in
fol. pag. 96. *Mentha 5*. Dioscor. ῥόδανθον & ῥόσος.
Mentha silu. lat. *Menthastru* n Plinio auctorè.
Offic. alba *Mentha*. Germ. *wilde müntz*. Italis
Mentha siluatica, Hisp. *Mentastro*. Angl. *Borse*
mint, Bohem. *Plana Mäta*.

Lobel. in aduers. Obs. & Icon. *Menthastrum*.
Gall. *Menthe sauvage*: Anglice *Borse* & *wilde*
Müntz.

Lonic. hist. lib. 5. cap. 101. die *wilde müntz* / *roß-*
müntz aut *wild Balsam*.

Gesl. hort. *Mentha siluestris*, *Menthastrum*
uocata. Lacunè ῥόδανθον & ῥόσος, *Menthastrum*,
Castilienisibus *Mastrantes*, Cat. *Mentastro*, Por-
tug. *Mastrantes*.

An Monachis in Mesuem dist. 6. cen. 25. *Calam-*
menthum fluiale siue aquaticum, *Menthastru*
species.

C. Baub. Phyt. *Mentha 8*. siue silu. longiore fo-
lio: variâs foliis longioribus & nigrioribus, mi-
nusque incanis.

Menthastrum folio longiore, candicante, florè
spicato abundat circa urbem Montbelgardi iux-
ta riuos. Existimo me etiam Genevæ vidisse: vi-
di etiam Luteriè in horto D. Robini hortulani
regii. *Menthastrum* Matthioli in Epit. Cameræ-
rii nasci scribitur plerumque vliginoso solo &
prope riuos aquarum:

Virg.

Excalfacit authore Matthiolo, attenuat, adstringit, incidit & aperit. Suffici vapor feminas à partu purgat: datur eius decoctum vtiliter anhelosis & aegre spirantibus, quin etiam mulcendis torminibus qui à flatu oriuntur. Substratum vel accensum serpentes fugat. Infunditur succus vermiculosis auribus. Item cum potus rûm testibus illitus, nocturnas pollutiones prohibet. Auxiliatur potus regio morbo affectis: frumosos illitus iuuat: ex aceto potus ventris animalia pelgit: folia ram. pota quàm illita præstant aduersus venenosorum ictus.

MENTASTRI AQUATICI GENVS
hirsutum (spica latiore.)

CAP IV.

Descriptio

Quadratos promit caules, duum vel trium cubitorum altitudine, hirsutos: folia Menthae spicata folio acuto, vel Mentastri albi, oblonga, ferrata, lanugine multa subeas canescentia, minus tamen quàm Mentastri vulgaris rotundior folio, vel candidi, sapore insigniter acri feruidoque, odore ferè Sisymbrii: siue Menthae aquatica rubra, caulium scapus trifariam partitus, totidemque gerit velut spicas latiusculas [non angustas vt in Menthis & Mentastri spicatis] non multò vicià longiores, in quibus flores subpurpurei, quinque partiti, ex calycibus hirsutis, striatis, rubentibus, in apices quinque fissis: radice est reptrice.



An Lob. in Adu. & Obl. & Icon. pl. Mentastri folia aquatica, hirsuta, Calamintha tertia Dioscoridis? &c.

C. Bauh. phyt. pag. 431. Mentra 12. siue palustris oblongiore folio.

H. Lugd. pag. 674. Mentastrum minus spicatum Lobelii. Item pag. 906. Pena & Lob. Mentastrifolia aquaticam hirsutam Calamintham tertiam Dioscorid. esse censent &c. Quidam silu. Sisymbrium Diosc. esse putant. Hanc videtur Tragus nomine Nepeta quartæ agrestis depinxisse. Primo loco H. Lugd. non bene posuit iconem sub titulo Mentastri, cum ponenda fuisset secundo loco pro Mentastrifolia: quæ cum Lobelio dicatur spicata habere flores non potest esse Nepeta agrestis Tragi 4. cui flores verticillati.

Locus & tempus. Reperi duobus milliariibus à Montbelgaro in Ionceray pago ad ripam fluminis, florebat autem principio Septembris:

SISYMBRIUM ANTIQVIS ET
in genere.

CAP. V.

Sisymbrio, inquit Theophr. 4. caus. 7. moter cul-
teus. Id enim quasi effeminatur, & amisso sui odoris acore, transit in Mentham: quippe alimenti, neglectusque causa, sylvestris habitus provenit &c. 2. de Caus. c. 22. Sisymbrium si transit in Mentham, odorem tantum Menthae recipit, proprio amisso, quia cultura caruerit: Speciem verò non recipit, sed quasi Nepeta redditur simile. Omnia namque in simile sibi quicquata mutantur, non in remotum penitus transeunt. Cultus autem & translatio naturam propriam retinet, atque seruat.

Sisymbrium (quod referente Diof. lib. 21. alii Serpillum silvestre [*ἰσχυρὸν, ἀγριον, ἄγριον* Ald. *uiva* Orib.] vocant.) in solo inculto nascitur, Menthae herrensis similitudine, sed latioribus foliis atque odoratis (*ἰσχυρὸν, ἰσχυρὸν* Orib. quod quidem in coronas recipitur. Calefaciendi vim habet: ac Semen quidè cum vino [*σὺν οἴνῳ* & vet. omittit] potum ad vrinæ stillicidia calculos commodum est: & tormina ac singultus sedat. Folia verò contra capitis dolorem fronti ac temporibus imponuntur. Item ad vespærum & apium idèus. Cæterum vomitiones quoque potu cohibent. Quidam autem vetusti codices caput hoc Diof. de Sisymbrio in libro tertio locant. Alii protus excludunt, & cap. de Sisymbrio altero tantum retinent cum titulo simplici *σῖσυμβριον* de Sisymbrio. De Sisymbrio autem altero Cardamine dicto egius H. g. lib. 21.

Galenus prius hoc Sisymbrium in vsu medico tenuium partium, discutientem, calefacientem, ac siccantem tertio ordine vim habere, ac temperamentum tradit. Semen eius item tenuium partium & calidum esse. Vndecum vino quoddam exhibere ipsum singultuentibus & his qui tormina sentiunt.

Leuissimum nasci tradit Plinius Sisymbrium in pureorum parietibus, & circa piscinas ac stagna. Quod in riguis nascitur, simile Nasturtio est (gustu Diosc.) vtrumque (prius Dioscor.) ficax aduersus aculeata animalia, vt crabrones & similia. Quod in sicco ortum odoratum est, & inseritur coronis angustiore folio. Sedant vtraque [prius Diosc.] capitis dolorem. Item epiphoras. Sanat & Epiphyridas, cutisque vitia in facie mulierum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet, siue in cibo sumptum, siue succo potum. Non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum eiicit. Mouet vrinam cum vino potum, silvestre & calculos. Quos vigilare opus sit, excitat insulam capiti cum aceto. Diximus lib. 21. Plinium hoc Sisymbrium cum altero Dioscoridis, Cardamine vocato, siue Nasturtio aquatico confundere.

Non cessat natura, inquit Cornar. quotidianis & in omni sui parte in pelus mutationibus quàm grauis & facilis negligentie iactura sit homines monere: & quod posita coctum degenerare otania & in vitium ruere nisi vis humana quotannis interierit: honoremque & bonitatem suam rerum semina & genera seruare coegerit: vt contraria ratione disceremus nihil tam asperum, rude, difficileque & incultum esse quod non labore & ope.

& opere humano meliorecat: & assidua cultura ad honestiorem suavioremque usum mitecat: in quo non minus facilem sequacemque homini quam ad vitium naturam se præbuit. Multa sunt ad vitamque partem naturæ mutationis exempla, sed longè plura in peius degenerantis. Facile enim & lubricum ad vitium iter est: degeneratque Triticum in Lolium, Populus alba in nigram: Ocimum in Serpillum: dulcia in amara, & fatiua in siluestria. Habentque omnia quæ id patiuntur mutationis suæ diuersas causas: Sisymbrium tamen vt odore in Mentham, figurâ in Neperam degeneret, præcipuam à culturæ negligentia: nisi enim assidua cultura coërceatur, & translatione nouos veluti natales quotannis accipiat, in eas quas dicimus plantas quamprimum diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticæ, & plantarum historiam tradentes, scriptores omnes. Theophrastusque præsertim &c. Quibus ostendit Cornarius prius Sisymbrium esse illud quod officinæ Balsamitam vocant & Mentham rubram, hocque Sisymbrium, etiam si siluestre sit, in Calamintham degenerare docere Plinium, Theophrastum verò modum quo id fiat. Alterum autem Sisymbrium esse id quod Sisymbrium Cardamine dicatur, de quo egimus H.n.g.l.21.

Tamet si, inquit Matth. porro prodiderit Dioscorides Sisymbrium in solo inculto nasci, Theophrastus tamen lib.6. cap.7. de plantarum historia, & lib.5. cap.8. de earum causis, fatium etiam Sisymbrium in hortis reperiri posteritatis memoriam commendauit. Quod sanè eam herbam esse crediderim, quæ hodie in omnibus ferè hortis prouenit, quæ nostrates officinæ Balsamitam, vulgus verò Mentham Romanam, vel crispam appellat.

Sisymbrium tandem dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit veteribus comedii meretricula. Coronam etiam Veneris nonnulli dixerunt, vel quòd ob odoris suauitatem quam præ se fert eo iuuentus quæ amoribus gaudet, coronata, in emollitionibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras commendaret: Vel potius quòd Sisymbrii caulis articulatum per internodia verticillato florum ambitu concinne coronetur. Ceterùm, Sisymbrium vrbani apud Theophrastum, & Acinum apud Dioscoridem vnus esse stirpis nomina Guilandino aliquando annotauit Iacob Zuingerus.

Mentha aquatica siue Sisymbrium videtur Dioscoridis C.Bauh. & aliis quibusdam quod tamen aliqui negant.

Mentastri aquatici genus, esse dicunt aduersaria Sisymbrii speciem quandam Recentiorum. Ea vocant Mentastri folium aquaticam hirsutam Calamintham Dioscoridis.

Mentham Crispam esse Sisymbrium fatium Theophrasti credidit Matthiolus. Is vocat Sisymbrium hortense & Domesticum.


Sisymbrium cuius meminit Plinius lib.19. cap.8. quidam existimarunt vulgare Mentastrum.

Plinius vt attestatur Marantha lib.1. cap.8. Si Sisymbrii aquatici facultates confundit.

Barbarea vocatur Sisymbrium hibernum & Pseudobunion ab Harchio in Enchir. Sisymbrium aut Serpillum turpiter impluisse Arabes author est Apollo Radic. 1. Consec. ex Aloë ligno. Sisymbrio, Ocimum substituit Tractatus quid pro quo. Idem Sisymbrio florem Syriacum i.e. Maluam.

MENTHA AQUATICA SIVE SISYMBRIUM.

CAP. VI.



Hymidio-ris foli amalia ex radice reptice, crebris fibris donata caules aliquot emergunt quadrati hirsuti, aut intus concavi, aut fungosa medulla farcti multis alis concavi: folia ex articulis, Mentha crispæ verticillatæ parua, minime tamen crispæ, quam perinde vt illa per am-

bitum serrata, inque obtusum mucronem desinentia, odore vehementi Pulegii, colore ex nigro rubente. Flores verticillati, dilutè purpuræ rubescunt quadrifidum calathum imitati, staminibus emicantibus exalbidis apices rubellos sustentibus.

An Tragus lib.1. cap.4. in Hist germ. Wildes fatzenkraut. Miror, aliàs diligentem, circa figuras & descriptionem Mentharum negligentior fuisse, nullam figuram habet quæ bene hanc plantam exprimat.

An Anguillara epist. 12. Calamintha tertia quam ait aliquos fumere pro Sisymbrii primæ speciei, & multum commendari in Nicandri Theriaca.

An Lonic. lib.5. cap.101. Alterum siluestris Menthae genus.

An Monachi in Mesuem dist.1. Cens.5. Hanc intelligunt, cum dicunt: Sisymbrium, alterum videlicet genus Menthae quam nonnulli Balsamitam, & Mentham aquaticam appellant, & aliam (vt Braslauolus scribit) Mentham florentinam nominant. Verum etiam multi pro Mentha Florentina intelligunt Mentham communem, id est, hortulanam. Alii autem, teste Dioscoride, Hoc Sisymbrium vocant Serpillum, & herbam Veneriam vel Veneream. Arabicè autem dicitur Nemam seu Nemem, vel Nomen, quo nomine etiâ & Serpillum vocant Arabes. Et hoc genus Sisymbrii dicitur terrestre: quoniam in terrenis & campis nascitur quamuis etiam iuxta riuos aquarum plurimum reperitur. Vnde & Mentha aquatica nominatur. Et dicitur etiam terrestre seu campestre ad differentiam alterius Sisymbrii quod est aquaticum: quoniam semper in aquis oritur &c.

Menthae aquaticæ (quam Matth. in post. comm. in Diosc. pro Sisymbrio siluestri pingit) figura nõ placet: in Hist quidem Germ. satis commodam habet: descriptionem autem non exactam.

De hac Sisymbria Mentha egisse crediderim Turn. part.2. fol.139. dicentem: Duo facit Dioscorides Sisymbrii genera, vnum terrestre, alterum aquaticum. Ex eadem colligere est Sisymbrium

Pulegio simile esse; aut tum folio, tum serpendi, crescendique modo aut certe serpendi similitudine: nec non folia debere esse Menthae sativa foliis maiora. Mentastri minor. Matth. posteriori editione Silymbrium ait germ. vocari *Bachmüntz*, *Wassermüntz*: quod convenire minime potest descriptioni Silymbrii hortensis, quam tradit. Quomodo enim Mentha aquatica (*Wassermüntz* aut *Bachmüntz*) fuerit Silymbrium hortense? Quomodo etiam Silymbrii rectè dici hortense possit, cum Dioscorides incultris gaudere dicat, cum horri colantur. Dubito igitur an Matthiolo verum Silymbrium notum fuerit, nec ne. Ego Silymbrium opinor Menthae Balsamica [Angl. *Baüm munt*] speciem esse. Siue autem in silvestribus crescat, siue in hortis transferatur, media inter Mentastrium (*Houß mint*) & Mentham hortensem (*syne garden*) mint magnitudinis est.

Apollin. v.
Dorsth. nov.

Apollinaris lib. 2. fol. 115. nomine *Bachmüntz* videtur intelligere Silymbrium, quamvis figura nullius sit momenti. Theod. Dorsth. plures plantas confundens titulo Mentastri, ponit iconem Menthae aquaticae.

Planta à nobis exhibita dicitur Brunfelsian 4^o p. 200. sine iconē Mentha rubra. Eidein in fol. pag. 80. Tom. 2. Rapl. 21. Mentha: Cordo in Diosc. lib. 2. cap. 155. Silymbrium primum, [& sic etiam Thallio] & Mentha species, nigricantem habens caulem: Eidein lib. 3. cap. 42. Mentha aquatica: Lumin. maiori Balsamica. Corn. in Diosc. Silymbrii primi species prima. Fuchf. Dod. gall. & lat. itaque Camer. hort. Silymbrium. Matthiolo & H. Lugd. itemque apud Matth. Camer. Silymbrium silvestre. Gein. hort. Silymbrii agreste aquaticum. Lobel. in Aduers. p. 218 in Obseru. p. 272. in Icon. Plant. p. 509. Aquatica siue Silymbria Mentha rubro folio & flore nigra Menthae Balsamine officinarum. Cels. 1^o p. Mentha silvestris prima & Silymbrium terrestre Dioscoridis & Theophrasti: Tabern. Calamintha aquatica.

C. Bauh. phyt. Mentha 11. (2. apud Matth.) siue rotundifolia palustris, *moüüceü* Diosc. varians foliis, aliquando maioribus, aliquando minoribus, aliquando tota rubens, aliquando magis [ut pictura ostendit] minusque hirsuta.

Schvvuenckf. Mentha sylu. 3. *Siüüüüü* Diosc. Mentha aquatica & Balsamine palustris.

Nomina
linguarum

Siüüüüü Græcis. Lat. Silymbrium, siue Mentha aquatica Ger. *Wassermüntz* / *Bachmüntz* / *fischmüntz* / wild farzenfraur: Trago *Rossmüntz*: Do. 1^o lat. *Wasserpokey* & *Rosspolei* Silesiis: Schauenckf. Belgis *Watter münste* / Gall. *Menthe aquatique* Dod. gall. *Menthe sauvage*. Dod. Lat. Ital. *Sisimbrio* & *Mentha Romana* Matth. Italorum *Balsamica* Lob. Hisp. *Hierua buena de agua*. Boh. plant. *Balsam*. Silymbrium Hungar. *Feste mentha*, h. e. nigra Mentha, Arab. *Sinasbarion* seu *Sinasbar*: Damagerani *Siimbron* teste Constantino Imperatore.

Locus.
et tempus.

Mentha aquatica siue Silymbrium provenit Möchelgardii passim secundum riuos, & in hortis & E. C. à me plantarum. Tubingæ cum essem Fuchsii præceptor meus vocabat Silymbrium Recentiorum, ac dicebat potius reponendum inter Mentastria, Geneuz & Basileæ etiam annorauit. Mentha sylvestris 3. Schvvuenckfeldii rigorum ac humentium alumna est; secus aquas labentes & piscinas multa, Julio florens, ac Vere reuolvens.

Ceterum Silymbrium, Menthae sylvestris species, inquit Dodonæus, calidum ac siccam facultate est, non minus quam Mentha: odore vero etiam vehementius. Commendatur ad eadem, ad quæ Mentha, tum & ad apum & vesparum ictus. Vfus autem eius in medicina nullus est, non deficiente Mentha, quæ suauior ac natura humane gravior apparet. Dodonæo consentiens Schvvuenckfeldius, hæc tradit: Tenuium est partium, digerentis, exalfacientis, exsiccantis temperature. Mouet vrinas & calculos pellicum vino pota. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet. Folia in capitis dolore fronti aut temporibus illinuntur, item contra vesparum apumque ictus. Lentiginis & cutis à Sole nigritiem & asperitatem exterit illita: Aqua huius stillacitæ, auctore Camerario, multum confert contra difficultatem spirandi & pulmonum infarctus & angustias. Antigonus in congerie mirabilium narrationum Aristotelem ait scripsisse ex putrefactis Silymbriis scorpions nasci: quod de Ocimo alii memoriam prodiderunt. Nouit quendam Bruyerinus de recubaria (lib. 3. cap. 43.) non ignobilem, qui cum Silymbrio liberaliter vesceretur, genituram per somnos effunderet.

MENTHA AQUATICA SIVE Silymbrium hirsutius.



Non solum caules quadrati, & folia, sed etiam ipsi florum calyces densa lanugine pubescunt, adeo ut canescant: folia vicia & fescualia, subrotunda, per ambitum obiter serrata: è quorum sinu prodeuntes pediculi flores sustinent conglomeratos, verius quam spicatos. Hanc esse illam credimus,

quam Cordus in Diosc. lib. 2. cap. 155. vocat Silymbrium, *fischmüntz* / Et Menthae speciem alteram facit hirsutioribus foliis. Balsamita à pharmacopolis nominatur. Confunditurque ab imperitis cum alia Silymbrii specie. Et hæc est foliis rotundioribus quam Mentastri aquatici genus à nobis descriptum, fibre etiam & pili colorque differunt.

An Tabernæ Calamintha aquatica, Calamentum aquaticum, *Wassermüntz* / *Wassernep*: Caulen pingit hirsutiorē, nec bene describit, neque distinguit à congeneribus.

Gerard. Angl. lib. 2. cap. 217. Silymbria Mentha *Watter mint*. Amicatur Tabernæ, cuius figuram habet. Et vulgaris omittit eum illo Silymbrium.

C. Bauh. apud Matth. iconem Tabernæ propit pro Silymbrio silu. sed eam etiam sub Mentha aquatica.

Ante-

Antequam verò ad Mentham catariam deueniamus, enumerabimus breuiter omnes plantas ab Aeluro, Cato, siue Fele denominatas earumque æquiuocationes. Bupththalmum itaque Dioscorides Aeluron dici meminit. Aelurum alii Valerianam vulgò dictam vocant: Alii Buglossum: Alii Nepetam: Aeluri sanguinem, Strazioten aquaticum vocarunt Magi. Germani tertium Sedi genus acrimonia inligne, minimum, floribus luteis, fatzentreubel, id est, vnam Catti nominant.

Menthastrum apud Germanos nomen à fele fatzenbalsam habet, quasi Balsamum felinum.

Sic quoque Lagopus trifolia A fele nomen Germ. fatzenflee, Cati trifolium traxit.

Sic quoque felis fumarie nomen, Germ. Katzenferföl, Cati Cherephyllon fecit. Sed & Hippuris à fele Germ. fatzenfchwantz vel fatzenmadel, Cati cauda vocatur.

Carus agrorum quod Germ. feldfatzen vel fätzle à fele dicitur, & Gnaphalium Fuchsi & Impia Plinii multis.

Carulos à fele, Germ. fätzle, Arborum quarundam, Salicium præcipue, flores molli lanugine pubescentes nominamus. Nec parum felis vrinam Ribes nigra redolor.

MENTHA CATTARIA.

CAP. VII.



Nepeta ex lignosa radice caulem surgit bicubicalem & tricubicalem, quadratum, hirsutum, propter terram subrubentem, aliqui incanum, articulatam, multis alis concauum, iisque binis semper aduersis: quo etiam ordine, sicut non parum semper numerosa folia ferè ad genicula emicant, grauitur

odorata, Melissa paria, in ambitu leuata, acuminata, cana lanugine pubescentia, sapore feruido. flores verticillati nodos ambiunt, Melissa, exalbi, labio raris punctis guttato: apices è rictu promicant, pulli, staminibus albicantibus insidentes. Icon nostra ex Fuchsi omnino displicet.

Ex hac descriptione liquet Marantham lib. 2. cap. 12. meritis Ruellium damnassee, quod herbam Gattam vulgò dictam protertia Calaminthæ specie substituerit: quia licet foliorum cum menthastrum, cui illam Dioscorides comparat, similitudo tolerari possit id tamen quod addit longiora esse debere, in illa planta non adest, immodè depressiora sunt. Idem lib. dicto 2. cap. 13. iussit negat Calamintham 2. non esse herbam Gattæ sed illud consideratione dignum cur herbam Gattæ dicat Melissa phillo similem.

Brunfelsio in herb. Germ. ex Hieronymo Brunsch. dicitur Mentha non odoriter. Cordo in

Dioscor. lib. 3. c. 45. Nepeta 3. fruticosa & procera: Notatque hic malè priuatiu Nepetâ dici. Monachis dist. 1. cens. 25. Calamentum filustre Meus, ceu etiam dist. 6. cens. 186. vbi hoc Calamentum secundo loco descriptum dicunt à Dioscoride. Gess. hort. Calaminthi species quorundam. Eidem in Catal. plant. Calamintha tertia. Clus. Calamintha vulgò Cattaria vocata. Lobel. in Adu. pag. 219. (vbi etiam in Icon. Plant. pag. 51. & in Obs. pag. 276.) Cattaria siue Mentha Catti. In Obs. pag. 276. Mentha cattaria. Lonic. Mentha montana. Huius pictura non placet, & multò minus descriptio, non respondens figuræ & nomini fatzen münz. Fuchsi Calaminthæ primum genus, & propter montes, quos amare dicit, Calamintha montana. Eius figura omnino displicet, idèoque aliam pingendam curauimus. Dod. gall. Calaminthæ 3. genus. Et Nepeta officinarum: Lat. in fol. Cattaria herba. Turn. part. 1. & Thal. in Hirc. Calamintha 3. siue Nepeta. Camer. hort. Nepeta Germ. & Gattaria vulgi. Tabern. Icon. & Hist. mentha felina [Non bene describit nec bene distinguit: ut neque Gerardo. C. Bauhinus Phyt. Mentha 14. siue Cattaria. Apud Matthioli. Herba Gattaria. Hist. Lugdun. pag. 908. Herba felis Matthioli. Negat hinc esse Nepetam Antiquorum, aut aliam Calaminthæ speciem: esse autem hortensem & agrestem, ambas tamen similes.

Matthioli, in prior. com. Herba Gatta dicitur: Ait is hallucinari Braslauoli existimantem Calamintham secundum Dioscoridis esse: neque etiam putandum eandem esse tertiam, vt crediderit Ruellius. In post. comment. ait errare Monachos dum censent herbam Gattam esse Calamintham 2. Equiuocare eos, quia Lombardiam Neue la vocent.

Tragus vocat Nepetam, Nepetam 2. ac vulgarem, eius autem figura non placet.

Mentha cattaria dicitur offic. Nepeta, Græcis *Nominā* nonnullis *καταινθία*, German. *Stein oder fatz* *linguarum* *münz*/fatzen Vlept. Belgis *Latzen cruyt*. Flan- *dris* *Vlepta*, Gall. *Calament & herbe au chat*, It. *Gattaria*, Hispan. *yerba Gattaria*, Angl. *Lattise mynte*/Boh. *focurnis*. Nomencl. Pannon. qui Nepethæ genus facit, vocat cattariam, *Natrá* siue, h. e. matricis herbam.

Antiquis fortè ignoratam hanc plebecula cattariam vocat, petamani spectaculi argumenti: vixdū enim conspectam vbi olfactarit catus, amplexatus & dislauiatus fuerit, lasciuendōque illi iam accedendo, iam recedēdo sese vtriusque pedibus diu & multum affricuerit, colludēdo tādē miris gestationibus vniuersam auidè ligurit, sed audidus si ea ex agris in hortos fuerit trāsmota: tenerior nāmque tunc est, odorēque non perinde vehementi, alioqui agresti similis.

Nascitur aliàs circa margines hortorum, secus aggeres, scrobes ac vias: humidum & vliginosum solum amat. Variis in locis obseruauit, ac habeo etiam Möbelgardi ex Allaria accersitam.

Strenua calefaciendi & attenuandi dote prædita est, sed eximia prærogatiua ad conceptus faciliendos, prolificumque vteram reddendum, auctore Lobelio. Calefacit ac admodum siccit (inquit Matthioli in hist. Germ.) attenuat, penetrat, promouet: habetque omnes facultates, quas Calamintha, cuius loco hæc vlturari potest. Idem in Epit. cpm addit. Camerarii ait. Feruido quidem gustu herba est, cum amantudine haud obscura, exalfacit & siccit Calaminthæ modo. Valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, &c.

vetri morbos, à pituita genitos, menses elicit tam pota quàm in deflectionibus addita. Herbe vñs steriles prolificas facit, vbi causa fuerit humida frigidaque intemperies: succus natibus inditus, pituitam valenter trahit, ac visum acuit: In summa, vbi excalefacere opus sit, Gattaria plurimum præstat: valer ad omnes [dixerat in prior. comm.] capitis, pectoris, ventriculi, & vetri morbos, à pituitosis extremitis aut flatu genitos. Ideò diurno capitis dolore affectis, vertiginosis, stupidis, resolutis, comitialibus, asthmaticis & suspiriosis auxiliatur. Item medetur ventriculi torminibus à flatu prouenientibus. Plerasque ex iis viribus illi etiam tribuit Dodon.

MENTHA CATTARIA HISPANICA

olim mihi Sideritis altissima flore
subcaruleo & albo.

Descriptio



Multis assurgit caulibus, quadratis, canaliculatis, fígosa medullâ farctis, subinde inanibus, glabris, cubitos res altis & maioribus, multis alis concavis, in ramos sibi oppositos diuisis: folia Mentastri vel Nepetæ vulgaris, sed longiora, pollice latiora, glabra, superne atto-virentia, inferne magis candicantia, rugosa, in ambitu serrata, odore graui, ad genicula ex aduerso nascuntur: ex pediculis duobus flores verticillis crebris, spicam quodammodò æmulantur, colore carneo, intusque punctis saturatè rubentibus guttati: semina bina aut terna oblonga ruffa. Sapor foliorum ingratus. Summitates purpurascunt.

An Lobel. obs. p. 276. & Icon. plant. p. 50. Mentha Cattaria peregrina latifolia?

An H. Lugd. p. 909. Mentha cattaria peregrina latifolia Lob.: Tabern. icon. & Hist. Mentha felina 2. sativa latifolia. Breit blättrich 3 am Fassenment. Murauit figuram Lobelii, non descriptis, nec benè distinguit. Gerard. hist. Angl. lib. 2. cap. 216. Mentha cattaria altera Great Catmeint. C. Bauh. phyt. Mentha 16. siue cattaria latifolia.

Mentham Hispanicam quibusdam dictam aliquando quum nullum scirem nomen, denominavi Sideritum altissimum quæ in hortu Ill. E. C. Montbelgardi multum durat, florens Iunio & Iulio ad Septembrem vsque.

MENTHA CATTARIA HISPANICA

angustioribus foliis.

A Præcedenti duntaxat angustioribus minoribusque foliis variat, vnde an separatam

sit genus à præcedenti asserere non ausim.

Lobel. Obs. pag. 276. & Icon. pl. pag. 512. Mentha angustifolia, & Métha cattaria peregrina angustifolia: Tabern. Icon. & Hist. Mentha felina sativa angustifolia. Schmal 3 am Neptentkraut. Non describit, nec bene distinguit. Gerard. Angl. Salvia Romana, Mentha Saracenica, Mentha Romana, Herba S. Mariæ. Mentha angustifolia. duarum plantarum nomina confundere mihi videtur & prætere



MENTASTRUM MONTANUM

folio coloris viridis.



Caut ampliori assurgit caule, quadrangulo, medullâ pleno, multis nodis constâte, ex quibus bini semper ex aduerso oriuntur ramuli similiter quadranguli, circa quorum extremas partes oblongæ spicæ, verticillatim compositis caliculis constantes, in quibus flores Menthæ siluestris, aut illius potius Calaminthæ, quam vulgò Cattariam vocant, floribus similes, exalbidigrati odor s: folia aduersis inter se pediculis caulem & ramos ad singulos nodos ambiunt, Mentastro ferè similia, sed magis ad Cattariæ folia accedentia, colore tamen minùs albicante quàm illa, aut Mentastri, sed potius viridi, Mentastri odorem referentia, acri & calefaciente sapore: radix dura, & lignosa ex lateribus propagines spargit, vt reliquæ congeneres plantæ.

Clus. Pann. & Hist. post. Menthastrum montanum 1. & Menthastrum montanum 2. C. Bauh. phyt.

Phyt. Mentha 13. siue montana verticillata.

Spontè nascentem hanc plantam inueniebat; Clus. ad Austriac. Alpiū radices Augusto florētē; deinde maximā copiā in Vngariā ad radices scopuli, in quo extructa est munitissima aīx Nemethyvyvar, tum etiam alibi Iunio florentem; quo tempore similiter, in hortos translata; flores producit.

MENTHASTRUM TUBEROSA RADICE.

Cubitalis habet caules, quadrangulos; rectos, frequentibus, ut superior nodis cinctos, subhirsutos: folia longiuscula rugosa, in ambitu nonnulli serrata, superioris Menthastrī foliis non dissimilia, magis tamen incana, non suavis odoris, amari & acris saporis; singulos nodos aequali; sed appposito inter se situ ambiunt: summi rami cum extremo caule, in molles, canescentes, exilium foliorum spicas desinunt, & inter ea verticillorum ritu cōpositi nascuntur caliculi, è quibus prodeunt strobili candidi, Cattariz florum amuli: his marcidis succedit semen



illi par, exile, nigrum: radix crassa, succulenta, raphano ferè aequalis, foris aliquantulum fusca, in multos hinc inde ad latera quasi paruos adnascens nāpos exuberat; aliisque longiusculis fibris donata est: perennis, & plures singulis annis caules proferens: imò ipsi etiam nati à matre abrupti, & terra obruti, nouas interdum plantas, procreant.

Clus. Pannon. pag. 585. Menthastrum 2. tuberosa radice ex Hispanico semine Calaminthæ teritiæ nomine missio. In H. post. loco citato. Menthastrum (tertium quoad iconem, secundum quoad descriptionem) tuberosa radice.

C. Bauhin. Phyt. Mentha 10. siue tuberosa radice, quam magnitudine variare scribit. Camer. hort. Menthastrum tuberosa radice maiore & minore.

Hanc Clusius sibi Viennæ semine natam fuisse perhibet, & aliis quibus id communicarit, accepto ex Hispaniis.

DE PYCNOCOMO FLORE OCYMI RADICE rotunda: Veterum sententiæ.

CAP. VIII.

Pycnocomon [πυκνόμενον; addit Ald.] folia habet Erucæ (κρηβέττης; add. Lac. ex vet.) similia, sed aspera & crassa & acriora: caulem quadrangulum: florem Ocyμι flori similem: se-

men velut Marrubii [μαρρυβίου] pro quo Lac. ex vet. Marrubii cod. apud sic etiam Oribal.] radicem nigram, rotundam, [intus legit Sarracenus] pallidam, (ad. Ald. μαρρυβίου) velut parū malum; terram blentem. Nascitur in locis petrosis: Vinum habet semen drachmæ pondere potum, turbulenta & graui [multa vet.] insomniā inducendi. Discutit etiam tumores impositum cum poleita: & aculeos ac spicula infixa extrahit. Sed & folia imposita, tubercula & furunculos discutit. At radix ipsius aluum soluit & bilem euacuat. Datū drachmarum duarum pondere in aqua multa, ut memorie prodidit Dioscorides.

Galēnō Pycnocomi & radix & semen & folia; discutiendi & attrahendi vim habent, & ad guttū acris sunt. Folia itaque & tubercula; furunculos discutit. Semen autem robustius est. Sed & spicula & quæ huiusmodi sunt, ad summam cutem extrahit. Radix autem ad prædicta quidem deterior est ac debiliior, bilem tamen flauam purgat.

Sunt Plinio, inquit Marcellus, & Dioscoridi de Pycnocomo ferè omnia eadem: tantūque non iisdem verbis cuncta Latinus scriptor ex Græco genti suæ reddidit. A foliorum conferta densitate nomen illi fecerunt græci, neque enim aliud Pycnocomon indicat quàm quod densa & conferta coma est. Herbarum autem comæ folia sunt. Discrepare etiam videtur in radice colore Plinius & Dioscor. Ille lutei coloris tantum, hic nigram primum, mox albam i. e. pallidam: quod idem luteo colori est, descripti: Suspici multa in varietate hac licet aut deesse Plin. aut abundare. Certè quorūque græcos vidimus omnes nigrū & luteū colorem illi assignant: Eaque ob causā inclinat animus nobis ut credam diuersos colores illos ad diuersas referri oportere partes. Animaduertendū etiam illud in viribus & potestate radice dicere Plinium exinanire aluum: bilem (bilem extenuare malè habetur apud Barbarum) & picuitam. Hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum.

Hanc etiam inter Dioscoridem & Plinium conuenientiam sic notat Cornarius. Plin. [inquit] consonè admodum cum Dioscor. nisi quod x. ii. id est denarios duos, pro duobus drachmis habet: non ita magno discrimine, cum in vincta denarii septē, drachmæ verò octo habeatur, &c.

CALAMINTHA VETERIBVS

& in genere.

CAP. IX.

Calamintham Menthæ congenerem aliqui; Caliqui verò tantum similem è Græcis fecerunt: Subscribitque illorum sententiæ, nomen quod coniunctum sibi habet Menthæ. Triplicem hanc Dioscorides ait; diuersisque notis ab inuicē separat, sed non facili cognoscendis, tanta trium generum similitudo est: Calamintha, inquit, quedam montana (ὄρηνη, Vet. ὀρηνη) est; habens folia similia Ocyμο, subalbida. (καρμυνη, Vet. καρμυνη & καρμυνη) ramulos & furculos angulosos, florem purpureum (πορφυρῶν) Vet. add. ἡ δὲ ὀρηνη. Altera [Vet. his usque ad ἡ δὲ ὀρηνη caret] Pulegio similis est, sed maior, unde quidam syluestre Pulegium nominarunt ipsam; quod & odore illi similis est: hanc Romani Nepetam vocant. Tertia verò similis est Menthæ sylvestri (Vet. vocem ὀρηνη delent foliis obliqioribus, cau-

le & ramo, prædictis maior, sed minus efficax. Nascitur in Campetribus & alperis ac præhumidis [i.e. *sub arboribus* Vet. *sub arboribus*] locis.

Plin. nat.

Licet autem Dioscorides Calaminthæ tria proponat genera, Plinius tamen lib. 20. cap. 14. vnum tantum constituit, prima duo in vnam Mentastri speciem confundens, & falso colore Pulegii, pro odore habens, velut eius verba clare docent, ut postea inter vires intueri licebit, ubi etiam Nepetæ vires seorsim exponit.

Nicander in Theriacis duo quidem, sed aliter, Calaminthes genera cognouisse videtur, aquaticum sc. palustreque alterum: alterum verò montanum: haud sanè quia Montanam Calaminthem ille dicat.

Galenus Calamintham non in genere distinguit, sed velut siluestrem quandam Mentham, satius opponit, velut locus habet, quæ de Mentha ex 6. simpl. adscripsimus. Sed postea l. 7. de Calamintha idem egit, cui duplex est, do. nestica, & eo efficacior montana, quam ab Andromacho minore miratur Nepithæ voce Romana, potius quam Calaminthen Græca, vocari in sua Theriace, cum cætera græcè appellaret. Galeni verba de Calaminthæ facultatibus infra recitanda.

Apuleius Nepetham hanc ait Mentham Montanam à Græcis dici, à Migiis Sanguinem Hammonis, ab Italis Nepetam montanam. Quæ voces scrupulum & suspitionem Marcello iniiciunt an in capitis huius Dioscoridis principio desideretur aliqua huiusmodi appellationum.

Cæterum, Ruellio quidem vel Syluio dictatore, Calamintha prima videtur Calamentum vulgare, secundum Pulegium silvestre, tertia herba Cattaria. Mule coti, tertia, Tertia vulgare Calamentum: Secunda, Cattaria putata. Turnero prima Clinopodium Matthioli: Secunda, Calamintha aruentis: Tertia, Nepita siue Mètha Cattaria. Brassauolus ut videtur Matthiolo, aperte hallucinari d. prehenditur, quod pro certo existimet Calamintham secundo loco à Dioscoride descriptam, illam herbam esse, quam, eò quod Catti magna eius capiantur voluptate, Cattaria quidam vulgò nominant. Error hunc Manifestè proditur, quod Cattaria sit herba foliis Vrticæ, similibus, quæ quantum à Pulegii foliis diffideat, non modò cæteris noris, verum etiam odore, in quo Brassauolus nititur, si diiudicent, qui has differentias norunt rectius &c.

Aequiuoca

Ex hæcenus dictis patet tam ob Calamintharum imperfectam historiam quam ob sententiarum circa eas varietatem, quænam vnaquæque sit, difficile esse iudicare. Calaminthæ enim Nepitæ, Melissæ, Menthæ & Balsamitæ species & nomina veteres soliti sunt miscere, teste Trago. A nobis autem & aliis quidem plures Calamintha cognominantur & describuntur, ut Calamintha flore magno vulgaris. Calamintha montana flore magno, excolice oblongo. Calamintha flore minore, odore Pulegii. Calamintha flore minore odore iucundiore. Calamintha folio & flore paruo, incana. Inter Calaminthæ species etiam numerant alii Mentham Cautariam, alii Mentastrium tuberosa radice: alii Mentham aruentem: alii Mentham aquaticam: Monachi Mentastrium candidum: alii Mentastri foliam aquaticam: alii Mentham spicatum angustifoliam: alii Mentham verticillatam odore Ocymii: alii Melissam Fuchii & Dodonæi: alii Clinopodium Matthioli: alii Scordotin: alii

Mastichinam herbam Gallorum: alii, sed malè, Acinum: alii Conyzam mediam Matthioli. Nō placet Pulegium dici Calamintham. Calaminthæ vice Tractatus qui pro quo substituit Vrticam.

CALAMINTHA FLORE magno vulgaris.

CAP. X.



PER caules
ramosque
quadratos
folia ex aduer-
so sita nascun-
tur, vnciam
aut fescunciâ
longa, serrata,
pilola, odore
satis grato, à
medio ad sū-
mum vsque
ramorum ex
solidum alis
pediculis duo in
plures mino-
res dissecan-
tur, quibus
flores inhi-
dent
è caliculis
barbatis stri-
atisque, semun-

cialis aut paulò longiores, [maiores enim sunt quam in ea quæ Pulegium redolet] hiantes, colore purpurascens, odore iucundo præditi.

An Anguill. epist. 12. Calamentum montanum? An Cordo in Disp. supra Syr. de Calam. Calamintha sylu. & Calamintha montana? An Aretio in descr. mont. Stockornii, Calamintha montana? Dod. gall. sine pictura Calaminthæ species 1. Calamintha prima offic. Calamentum montanum, Gall. *Calament de montagne*: Germ. *Stein* vel *Bergmünz*. Lat in fol. Calamintha montana, de qua ait: *Kalmus* à Græcis dicitur, quasi elegans aut vtilis Mentha: Latini nomen seruant.

Lobel. Obs. p. 274. Icon. Plant. pag. 513. Calamintha montana vulgaris.

Camer. hort. Calamintha vulgaris, Calamintha flore rubro circa Francofurtum ad Mœnum spontè proveniens. Apud Matth. Germ. *wilder Peley*, *Kornemünze*, Calamentum vulgare, veta. Nepeta. In l. p. Calamintha, Græc. *καλὰ μινθὰ*. Arab. & officin. Calamentum, Ital. *Calaminta*, Hetruscis *Nepetella*, Germ. *wilder Peley*, Hisp. *Neneda*: Gall. *Puliot sauvage*. Icon Camer. appositæ non displicet pro Calamintha nostra vulgaris, verum non placet pro Nepetæ & pro descriptione Matthioli. An Thalia Calamintha secunda quæ alias etiam vbiuis ferè existens in agris montanis?

C. Bauh. phyt. Calamintha 4. siue vulg. offic. Calamintha montana vulgaris Lobelii. Apud Matth. Calamintha 1. vulg. officin. Figura est Tabernæ Matthioli nam exprimens.

Tabern. hist. & Icon. pag. 350, Calamintha montana, vulgò *Gemen bergmünz* / aut *Steinmünz*. An bene fuerit nota Tabernæ planta de qua scribit hæreo, figura est ex Matthiolo.

Gerard.

Gerard. *Mentha sativa Rubra*, Rod garden mung. Gerard. non bene *Calamintha* Tab. iconē ponit pro *Mentha*.

Calamintha flore magno provenit circa Mōrbeldgardū in collibus, & in horto Ill. nostri Principis, iucundē florens Augusto, & Septembri: *Genevæ* passim provenit: Lugduni observavi florentem Octobri. *Calamintha montana* Dodonæi montes amat, atque in ipsiſ vmbrosos & saxosos clius: Italia, Gallia, & Hispania compluribus locis, vt & alibi reperitur, transfertur quoque ad hortos, in quibus feliciter adoleſcit, ac ſeipſam facillimē ſerit. Viget Aestate, ac ſerē toto anni tempore: à Iunio in Autumnum flores, ſemēque perſcit.

Est autem *Calamintha* hæc (inquit Dodonæus) in montibus proveniens guſtu ſeruēis, & acris, calida, ac tenui eſſentia, ſiccāque ordine quodammodo, vt Galenus ait, tercio: Tenuēs humores digerit: crallos vērō extenuat, ac incidit. Proinde intra corpus aſſumpta, cū ipſa per ſe, tum cum Melicrato perſpicuē excaſcit, ſudorem cit, omnēque corpus & digerit & exſiccāt: febrium rigores per circuitum repentes tollit: quod & præſtat oleum in quo incocta, toto corpore cum hoc inuncto, adhibita frictione haud ſegni. Decoctum eius potum vrias cit, menſes pellit & conceptum eiicit: quod & admota facit. Ruptis, conuulſis, orthopnœ (Galenus aſthmaticis) torminibus ac cholera, Dioſcoride auctore, auxiliatur. Ictericis prodeſt: vtpote Iecinoris, ac fellis obſtructiones aperiens & expurgans. Præſumpta in vino venenis reſiſtit: pota aut impoſita demorſis à ſerpente opitulatur: accenſa aut ſubſtrata ſerpentes fugat. Sugillata tollit, & atris cicatricibus candorem reſtituit: ſed ad talia recentem magis quā reſiccata (inquit Galenus) adhibere præſtat. Lumbricos & aſcaridas cum ſale & melle pota enecat: eadem ratione & aurium vermes ſuccus inſuſus. Plinius ſuccū naribus ſupis mitillarum ſanguinis profluuium ſiſtere ait: & radicem [que Dioſcoridi inutilis] cum Myrthi ſemine in paſſo tepido gargarifata anginis mederi. Iſchiadicis imponitur: humorem ſiquidem ex alto euocat, & articulum totum excaſcit. Paulus Aegineta etiam ad coxatū in dolores ab inferioribus iniici reſert: Bonum etiam Elephanticorū eſitata remedium eſt ſi quod Dioſc. ait] poſtea ſerum lactis bibant. Apuleius folia inquit frequenter commanducata elephantiacos ſanare certum eſſe. Componitur autem ex hac Antidotos ab ipſa nomen habens, à Galeno lib 4. de ſanitate tuenda deſcripta, quæ non modo maximē digerit, ſed & virginibus, quibus muliebria non ſuccedunt, vtiliter exhibetur, vacuationibus præmiſſis, temporis ſiquidem ſuccellu citra omnem violentiam aut vllam modicam menſes promouet.

CALAMINTHA MONTANA FLORE

magno ex calyce longo.

Folia aduerſa, ſemuncialibus pediculis nixa, ſeſuncial: longitudine, longiora enim quā in vulgari, paulo minù lata, ſubhiſſuta, profundē in ambitu ferrata: è quorū vniuſcuſque ſinu pediculus exit vnus ſemuncialis, quinos quaternorū ſue peculiaribus pediculis geſtans flores, paulo hiatu purpureſcentes, vncialis, ſuprà ſimbrium, ſtriatum, longum calycem, longitudine prominentes: radix ſanè multò longior quā in vulgari.

Hanc *Calamintham*, ni fallimur, ſic deſcribit Tom. III.



Lobel. Quasi elegantior aspectu odorēque delicate effert quā *Mentha*, *Calaminthe* vocata fuit: certē hilariorē nitidiorēque habitu eſſe nullus inſiciabitur, qui Vicentinam & Veronensem viderit, Vnam ceterā etiam periadē & ſcitē expedire Dioſcor. atque *Calamintha* diff. rentias ſi-

gnauit. Non obuium iſtud Calamentum montanum, niſi Narbone: ſis Scuenæ vmbroſis, ſaxolis cliubus, & in Romano atque Patauino agro, vnde meminit quorūdam medicos Taurinenses curaffe quotannis magna vi accerſendum, cuius aquā ſtillatitia ad mentrua cienda vterent, ſperato ſuccellu: eſt enim guſtu & oſſactu ſua uer acri. Etiam dum eſt viride plurimi ſit apud Italos: arefacto non aliud ad Theriacam præſtantiuſ, virgis riger quadratis, nitidis, cubitum altis & quā *Mentha* gracilioribus: folia edentibus *Ocyimi* aut *Melillophylli*, ſed minora, ſpecioſiora, hiſtuciora: flores item *Meliſſæ* ſed purpureos, ſemine *Portulacæ* minuto, odore *Amaracino*, *Mentha* ſuauiore.

C. Bauh. Phyt. *Calamintha quinta* (apud Matthiol.) magno flore: an prima Dioſcor. *Calamintha montana* præſtantior Lobel.

Camer. hort. *Calamintha montana* aliis præſtantiſ. Tabern. Icon. & Hiſt. *Calamintha* 2. præſtantior, Ed. del Bergmūng.

Gener Cherlerus attulit neſcio vnde, ſimilem *Locus & Tempus*. autem omnino vidimus Heidelbergæ in horto Domini Sprengeri florentem Iunio. Copioſe naſcitur in montibus Euganeis propè Patauium in Vicentinis, vnde naſtus eſt Camerarius. Facile in hortis Norimberg. ſeſe propagat, etiam in ſurculis.

CALAMINTHA FLORE MINORE,

odore Pulgii.

Altē conſurgit rigidis quadratis *caulibus*, in frequentibus alas diuiſis, hiſtutis, ſubrubē-
tibus, folia ex intervallis oppoſita, raris crenis incifa, hiſtuta, odore graui *Pulegii* vel ſerē *Silymbrii*, ſaporis acris, vegeti: flores verticillatim coaceruantur, parui, purpureſcentes pediculis longiuſculis hērentes.

An Cordo in Hiſt. libr. 5. cap. 22. *Calaminthe montana* ferrata?

De *Calamintha* hæc vt exiſtimo loquūtur Monachi in Meſuem diſt. 1. cenſ. 25. & diſt. 6. cap. 178. & 187. vbi inter alia hæc: *Calamintha* Campeſtris & montana Meſue eſt Nepera, vel Nepita (vtrouque inquit modo ſcribitur apud autores) & proptiē illa, quæ vulgò dicitur Mentucia & Nepitella.

An Angnill. ep. ſt. 12. de hæc dicit: Crediderim

Y



cos retinere ait, ac Italos vulgò appellare Nipotellam. Nepitam itaque Dioscoridi nil aliud viquequam fuisse, quàm vulgarem Calamintham, quâ officinæ vtuntur, quamque Itali vulgò vocent Nepitellâ: quæ Dioscoridis testimonio à quibusdam siluestre Pulegium vocetur: etenim non odore tantum (vt Braslausolus velle videatur) Nepetam Pulegium imitari, sed & foliis & caule.

Dod. gall. quoad descriptionem & titulum Calaminthæ alteram genus, Græcè *νηπιτella* vocatum: lat. Pulegium siluestre, & Nepita: Germ. Formmungs-wald Poley: Gall. Pouliot sauvage: Belg. wilde polaye & wist Munre. Lat. in fol. Pulegium siluestre, siue Calamintha altera.

Lob. Aduers. pag. 219. Calamintha altera foliis maculosis: odore graui Pulegi: Dioscoridis. Nepita, antiquis Pulegium siluestre: Perperam Matthiol. Icon. 677. Calamentum montanum. Obs. p. 275. Calamintha altera, Angl. Calament. Ital. Niputella montana. Item Icon. Plant. Calamintha altera odore graui Pulegi. Icon ex Matthio lo non vndique placet, nec etiam nostra ex Fuchsiânis, non enim facis sunt verticillatæ.

Camer. hort. Calamintha secunda. Nipotella in Italia. C. Bauh. phyt. & apud Matth. Calamintha 3. siue Pulegi odore fortè Diosc. 2. Calamintha montana Matth. lat. lib. 3. cap. 39. Calamintha odore graui Lobel.

Tabern. icon. & hist. Calamintha aruenfis 2. Zsermûng. Tab. existimo nesciuisse quid scriberet, cur separat ab aliis Calaminthis cum icon sit ex Matth.

Gerard. lib. 2. cap. 113. Calamintha montana præstantior. The mare excellent Calament. Iconi Tabernæ cur titulum præstantioris apposuerit Gerardus nescio, quæ præstantior à Lobelio dicitur & ipsa à Tabern. diuersa est.

Montbelgardi in horto E. C. mihi prouenit: reperi variis in locis in agris vbi seges demissa est, uel cum requiescunt, & alibi contingit locis apricis, ac soli expositis, quibus gaudet. Aestiuus mensibus viget & florèt hæc Calaminthæ species; ac sub Autumnum colligi potest.


Facultate autem & calida quoque, ac sicca, & hæc Calaminthes species est. Eadem quæ Calamintha flore magno vulgaris præstat. Est tamen hæc minùs potens quàm Môtana. Galenus veluti efficaciorē reliquis Montanam etiam prætulit.

potius Nepitellam esse Pulegium Dioscoridis: de hac idem dicit potius Calamentum secundum, hodie suum adhuc nomen tenet Nepitellæ.

Matthiol. in Dioscor. vocat Calamintham alteram & Calamentam frequentioris vsus. Nepitam vocatam & secundo loco à Dioscoride traditam, Nomen hanc apud Herul-

CALAMINTHA FOLIO ET FLORE paruo incana.

Caulis hirsuti cubitum excedentes, ramulis oppositis, in summitate flosculis hiantes, albidis, grauis odoris, ex binis longiusculis pediculis binis, folia Maiorana, quædam multò minorâ, potissimum superi-
riora, vix crenata: aut rariùs, valde hirsuta inferiori potissimum parte, penè incana.



Lobel. Obferu. pag. 275. Icon. Plant. p. 514. Calamintha 2. incana. Camer. hort. Calamintha Cretica exiguis foliis incana. Quan-
doquidem nō describit Camer. & pauca verba eius conueniunt cum

nostra, nos non separamus in præsentia.

C. Bauh. phyt. Calamintha prima siue Ocimi siluestris foliis non crenatis, Calamintha 2. incana Lobelii. Item Calamintha 2. siue minor, Cretica Camerario. An Calaminthæ secundæ incana alia species Lobel. obseru. pag. 275. siue icon? Lobelius non tradit duas Calaminthas incanas: si vnam ed loci traderet sine icon, prior esset sine descriptione.

Tabern. icon. & hist. Calamintha montana vulgaris. Calaminthæ montanæ mint. Tabern. nec quisquam alius iconem quam proponit, posuit pro Calamintha montana vulgari.

Hæc nobis oblectata in hortis insignium viro- rum D. Doctoris Melchioris Sibitzii & Domini Frederici Meier Argentinæ cum copioso flore Iulio & Octobri.

Omnium Calamintharum radix inutilis, auctore Dioscoride: folia gustu impensè feruentia & acris potu aut illitu demoris à serpente opitulantur. Decoctum eorum posu menses & vrinâs expellit: ruptis, conuulsis, orthopnæ, torminibus, cholericis, horribilibusque auxiliantur: regium morbum expurgant: præsumpta in vino venenis resistunt: tinas, cæteraque interancorum animalia, cum sale & melle pota, enecant: nec secus cocta erudæ, si terantur. Elephanticos esitata adiuuant, si postea serum lactis ebibatur: folia detrita si in vellere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa aut subtrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt: in vino cocta & illita, sagillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, vt ex alto humores euocet, summam cutem exurens: vermes necat succus auribus instillatus. Et hæc Dioscorides lib. 3. prodidit. lib. verò 5. ait E Calamintha vinum fit, eodem quo Thymites modo. Prodest stomachicis & cibum aduersantibus: ac valet etiamnum ad morbum regium propterea quòd vrinâs ciet. Quorum rationes

Locus & tempus

Vitis

rationes deducit Galenus lib. 7. simpl. facult. quo auctore Calamintha est essentia tenui & calida, sicque temperie, ex tertio quodammodo ordine utraque qualitate, horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita: gustu liquidum acris & palam calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet. Igitur incidendi ei quidem vis adest propter calorem eius, tenuitatem & amaritudinem: abstergerendi vero propter unicam amaritudinem. Nunc Plinii qui ut supra admonitum Menthastri duo prima genera à Dioscoride tradita in vnam specie confundit, & post Nepete vires seorsum exponit. Mentastrum [inquit lib. 20. cap. 14.] siluestris Mentha est, differens specie foliorum quasi figura Ocymi (Dictamni, Rondel. Nam Dictamno, ut Méthastro, folia tomentosa, cana, alba: Pulegio vero minimè talia. At cum Dioscorides hæc de secundo Calaminthes genere ad verbum scripserit, & de trium Calaminthes specierum facultate in vniuersum tradiderit, quæ Plin. de Méthastri virib. prodit, rerum ignoracione Mentastrum cum primo Calaminthes genere, quod foliis est Ocymi, & cum secundo quod foliis ex Pulegii, confudisse arbitror Plinium, vocibus *αἰσίνης* & *αἰσίνης* deceptum. Dalechamp.) Pulegi colore [odore Diosc.] propter quod quidam siluestre Pulegium vocant. Iis commanducatis & impositis sanari elephantiasim, compertum est. Potum feminas purgat à partu: sed partus necat. Orthopnoicis, torminibus cholericis, efficacissimum: Item lumbis, podagris impositum. In regio morbo bibitur. Strumis illinitur. Somnia Veneris inhihet. Tincas pellit ex aceto potum. Contra porriginem ex aceto infunditur capiti in Sole. Nepeta quoque vires contra serpentes habet. Fumum ex ea nidorè quæ fugiant, quam & subternere in metu obdormituris vile est. Tusa zgilopsis imponitur & capitis doloribus recens cum tercia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius infillatus naribus supinis, profluvium sanguinis sistit. Item radix quæ cum Myrthi semine in passo tepido gargarizata anginis medetur.

Dist. 1. tract. 1. cap. 4. commendat Bayrus Calament. infusum & decoctum ad tingendos capillos, ita ut eorum etiam radix tingatur, quod eius experientia felinquinus.

MELISSOPHYLLON VETERIBVS & in genere.

CAP. XI.

Habet auctore Dioscoride, *folia & caules* Ballotæ similes, maiores tamen & tenuiores [ita Corn. Sarr. & alii, malim tamen ego cum Ruellio vertere, folia similia, maiora & tenuiora] non ita hirsutos, Citrium malum olentes. Folia cum vino pota atque etiam imposita, profunt contra Scorpionum ictus, necnon & phalangiorum, canisque rabidi morsus. Eorundem decoctum foris ad eadem valet. Convenit etiamnum feminarum defensionibus ad ciendos menses. Colluitur & in dentium doloribus, atque etiam dysentericis infunditur. Folia quoque addito nitro bibita, iis auxiliantur qui à fungis strangulantur, necnon torminosis: orthopnoicis vero, in Eclegmare sumpta. Cæterum imposita cum sale, strumas discutiunt, itemque ulcera purgant: sed & articularios dolores illita sedant.

Tom. III.

In Coronamenta, inquit Plinius l. 21. cap. 9. folio venit Melissophyllon quod Apiastrum est hoc nomine græco indicandum, quia nostris maiori ex parte huius nomenclaturæ defuit cura. Eè cap. 20. iam dicti libri eiusdem vsum medicum sic tradit. Melissophyllo siue Melitide (Melittæna Diosc. & CH.) si perungantur alucaria, non fugient apes. Nullo enim magis gaudent flores: Copia iltius (Scopis eius, CH.) examina facillime continentur. Idem præstantissimum est contra ictus earum, vesparumque & araneorum, item Scorpionum. Itè contra vulvarum strangulationes, addito nitro: contra tormina, è vino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis vitiis, cum sale decocta. Succus feminas purgat, & inflationes (inflammationes CH.) discutit, & vlcera sanat. Articularios morbos sedat, canisque morsus. Prodest dysentericis veteribus, & colicis, & orthopnoicis, lienibus, vlcibus thoracis. Caligines oculorum cum melle iungi exinium habetur.

Melissophyllum Marrubio facultate simile esse scribit Galenus, sed plurimum ab eo vinci: quamobrem nec eo vti queam. Superuacuum enim foret præsentè Marrubio, cuius tantus vbique terrarum proventus, velle uti Melissophyllo. Cæterum si cui fortè ad manum Marrubium non fuerit, illo licebit uti ad eadem, modo quantum ab hoc superetur cognitum habuerit.

Sed Melissa alias facultates easque excellentiores tribunt Mauritanii. Scribit enim Serapio Melissophylli proprium esse animum hilare reddere, humenti ac frigido ventriculo auxiliari; concoctionem adiuuare, cerebri obstructions reserare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, eamque præsertim quam somnus frequentius noctu intercipi solet: quin & eius tremorem reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab attrahibile, tum ab exulta pueritia gignuntur. Quibus assentitur Auicenna, scribens Melissophyllum exaltare siccatæque ordine secundo, exhilarare, vitalesque facultates roborare odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumque tenuitate. Quibus facultatibus cæteris etiam visceribus competere. Vires adiectionarias habere, nec adeò imbecilles, quin attraharios vapores à spiritibus & à sanguine, qui cordi & arteriis inest, educere queat, quod in cæteris corporis partibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit.

Plinius porro non agnouit Apiastrum & Melissophyllum vnam & eandem esse plantam. Si quidem seu differentes ac diuersas plantas, primum quidem Apiastrum ac deinde Melissophyllum alucariorum & apum causa ferere oportere l. 21. cap. 12. præcipit. Eadem autem esse Varro aperte demonstrat l. 3. c. 16.

Inter nothas Dioscoridis appellationes, sunt, auctore Marcello, qui Melissophyllum, Melitæum, Melittænam, qui Meliphyllon, qui Erithram qui Demelen (Teinelen, Sarrac. *melissin*.) appellant. Galli Meritemorion (Metisimorion Sarrac. *melissin*.) vocant. Romani Apiastrum siue Citraginem. Omnibus autem his in græcis appellationibus mellis aut apum ratio & significatio coniuncta est: nisi Apiastrum ab apibus quibus gratissimum est. Latinis dictum sit: Citraginem autem ab odore Citri, quod si nates confulas Citrium malum oleat & cordi profuit.

Officinis dicitur Melissa: Arab. *Baderangies* Nomina *Bedaringi*, *Bedarenzeum*, *Turingens*, siue *Trum* linguarum

glam, & *Marmar.* i. Hodie Græcis *μαρίνα*, & *μαρίνα*, teste Angull. epit. 11. Germ. *Melissen* / *Melissenkraut*, *Sonigblum* / *Zmenblat* / *Bienfaugen* / *bergkraut* / & *Pfaffenkraut*: Belg. *Confilie de grein* & *Melisse*. Dod. *Gallis Melisse* & *Pomme crade*: Ital. *Melissa*, *Cedronella*, *Arancia*, *Naranzata*, *Meladella*, *Melisseno* & *Allegriacore*, *Camer. Citrona* & *Basichia*, Aug. Gall. *Hilpan*, *Torngil*, *Hierua cidreira* Matth. Dod. *Terna cidreira*, & *yerua auegata*, *Hadi*. Angl. *Baume* / id est, *Balsamum*, Boh. *Melisse*: Hungaris *Méz-ganchy*.

Dalech. mor.

Fuchsius cum Dod. gall. *Melisse* duo genera facit, vnum verum, tam grato odore, ut in ædibus stratum eas gratissimo odore compleat. Et hæc est *Melissa* adulterina quorundam, & non *Calamintha montana* præstantior *Lobellii*, ut falso contendit *Dalechampsius*. Alterum adulterinum *Melisse* genus, quo perperam officinas, pro vera, uti censet: est *Melissa* nostra vulgaris odore Citri, quam cum permixtis *Melissophyllum* *Dioscoridis* esse credimus. Hæc locis frigidis graueolentior est, calidis autem odoratior & hinc *Camer.* apud *Matth.* *Melissam* vulgarem duplicem tradit: vnam in hortis cultam, & alteram in syluis ac montibus vel aliis neglectis sponte natam.

Dod. Lat. in fol. distinguere deprehenditur *Melissam* in vulgarem & peregrinam siue *Moluccam* quæ duum generum est, vna lævis, & altera asperior fortida, siue ut ipsi vocatur *Molucca spinosa*, quam [nisi pictura fallat] *Matthioli* *Constantinopolitanum Melissophyllum* appellat.

Habemus nos, quandam *Melissam* nigriorem & hirsutiorē à nemine celebratam. Exat præter hanc alia *Melissa*, multis *Turcica* siue *Moldauica* appellata flore purpureo & albo. Nunc *Melissa* siluestris *Tragi*, non est *Cardiaca*, ut voluit *Gesnerus*, sed potius *Melissa* adulterina quorundam. *Melissa* speciem existimat esse *Menthā* carrariam *Tragus* lib. 1. cap. 4. *Selinum* vocat *Melissophyllum* *Lonic.* in *Diosc.* lib. 3. cap. 67. *Rosmarinum* siluestem vocat *Melissam* *solutudinē* *Schvvenckf.* quā ratione a. non video. *Apuleius* cap. 45. tradit quoddā vocare *Melissophyllum* *Marrubium*. *Melissophyllum* dicitur de *Marrubio* fortido siue *Ballote*. De quibus omnibus suo ægetur loco. *Ocimum* citratum non est *Melissa*, inquit *Monachi*, licet tamen altero pro altero uti. *Idē* dist. 6. cen. 178. *Scribunt* *Melissam* à nonnullis *Menthā* *Apum* vocari.

Rosmarinū silu.

MELISSA VULGARIS ODORE Citri.

CAP. XII.

Descriptio

A Pibus gratissima *Melissa*, ex argumento nomen nata, caulibus adolefcit cubitalibus & altioribus, quadratis, lævibus ferē & nitidis, in plures alas ex aduerto fitas diuisis, solidis, duris: folia è geniculis opposita pediculis circiter vncialibus appenduntur, Calamenthe æmula, cum splendore atrouirentia, breui lanugine hirsuta, per ambitum ferrata, odore Citri, sapore acrimoniam aliquā linguam vellicante, ex quorum alis verticillari flores emicant, albi pallidius rubentes, suprema lacinia bifida, labello lateraliisque duabus lacinis saturatiore, ex calyce hirsuto *Marrubii*. Radix subest lignosa, multifi-



da, teretes, obliquo actu per terram lata, fibrosa.

Vulgaris hæc *Melissa* omnium doctorum iudicio, vel Clusio teste, verum *Dioscoridis* & antiquorum *Melissophyllum* censetur: tamē cum nonnullis locis lectam: quidam pedoris, aut cinicum odoris ascitū habere con-

tendant multi, idcirco dubitant verane sit, an alia eius species, nostras hæc, *Melisse* nomine etiam muierculis nota & omni regioni in hortis frequentissima. His resp. nōdetur *Melissam* nostratē duplicem inueniri. In hortis quidem læpe *Melissam* colit: & in siluis, montibus, ac aliis neglectis sponte quandoque nasci. Et hanc in locis præsertim frigidis graueolentiorē esse, quam quidam odoris distinctione capri, cinices referre velint. Illam verò odoratiorē.

Tragus mihi est obscurus in hist. *Melisse* dum ait vulgō dictam non esse *Melissam* & tamen ei attribuit nomina *Dioscoridis* & vires: præterea nō intelligit quid velit, cum ait in descriptione, flos alius purpureus alius sublateus: an flore sublateo uita fuerit, dicant qui viderunt, ego non vidi.

Matthioli facit *Melissam* quidem facinam & siluestem, verum qua in re differant, non demonstrat.

Theod. Dorst. *Melisse* iconem exhibet sub titulo *Eupatorii* pag. 177. Eandem verò describit pag. 186.

Melissa hæc vulgaris odore Citri, vocatur à *Matth.* *Cordo* in *Diosc.* *Lac.* & *Lob.* in obs. pag. 277. in *Icon. Plant.* & *Aduers.* *Apiastrum*, & sic quoque *Sarrac.* apud *Dioscorid.* & *Camer.* apud *Matthiolum*. A *Brunfels.* *Dod.* lat. in fol. *Anguill.* & *Cæsalp.* *Melissa*. *Camer.* hort. *Melissa* nostras. *Trago* *Melissa d. mesica*. *Dod.* gal. *Gesn.* [cui & citrago] hort. & *Clus.* *Melissophyllum*. *Brunfels.* *Matth.* *Clus.* in *Icon.* *Castori.* & *Tabern.* *Melissophyllum vulgare*. *H.* *Lugd.* pag. 957. *Melissophyllum* *Matthioli*. *Fuchs.* in *Hist.* *Melissophyllum adulterinum*. *C. Bauh.* in *phyt.* & apud *Matth.* *Melissa prima* siue hortensis, ubi *Melissam* ab apibus, quas Græci *μαρίνας* dici scribit: & *Apiastrum*, quod apes ea delectentur, denominari refert. Plura nomina vide antē.

Melissam vulgarem odore Citrii *Mal.* & non *Cinicum*, *Geneuz* vidi spontaneam in sepibus pagi *Bernay* & *Thronay*. præterea iater *Balsart* & *Wallenburg.* Colitur autē passim in hortis, ut *Basileæ*, *Lugduni*, *Montpelii*, *Parauii*, ubi virebat *Ianuatio*, *Ferraria*, *Montbelgardi* & in *Masamunster*. Floret autē Iunio, Iunio, & Augusto: sub hyemem tota marcescit radice restitibi, quæ prima vere noua folia, atque inde cauliculos promitt.

Veretres

Vereres de viribus Melissæ, si eos consultum velis, lege quæ antè ex iis retulimus. Melissâ, inquit Tragus, calefacit exsiccat, discutit, sanat & conglutinat: internis enim & externis corporis partibus adhibita magni est usus. Vino albo quidem decocta, & per aliquot dies pota, pectus purgat, asthmaticis prodest, cor confortat, tristitias à Melancholia profectas tollit, morbum comitalem, & omnes prope morbos internos curat, quamobrem clysteres ex ea rectè conficiuntur. Minutim concisa perque noctem vino albo optimo macerata, ac deinde in vino distillata, imprimis commendatur, nam non tantùm ad mulierum tormina, & vulvarum strangulatus seu præcipitationes mirè conducit, mensurâ trium, vel quatuor coclearium pota, verùm etiam Cardiacæ & fungorum strangulatus auxiliatur. Ovis exulcerationes si cum illa abluantur, sanat, oculorum claritatem adiuuat. Herba cum floribus Camomillæ lineo sacculo imposita aquæ decocta, deinde expressa, ac calida matrici inquietæ, & suo loco motæ, imposita, præcipitationem eius cohibet, inque locum suum reponit. In defessibus mulierum ad ducendos menses perutilis est, lumborum dolores sedat. Viridis cum sale illita cataplasmatibus instar strumas discutit. Aqua Melissæ omni scabiei, ac pustulis medetur, quemadmodum & scorpionum, & aranearum ictibus, ac canis rabiosi moribus, si cum illa colluantur. Aqua vino turbulento infusa, pristina illud claritati restituit. Eadem carnibus aspersa, à muscarum & vermium iniuria iptas vindicat.

Fernelius lib. 6. m. m. c. 6. scribit Melissam sanguinem melancholicum & atrabiliarium purificare, ac partim purgare omnem tristitiam, ac timorem à melancholia profectum depellere: sônia procreare leta, sensusque acuerre. Hinc commendatur à Rondeletio in melancholia capitis, paralyti, morbo caduco, paralyti, aliisque cerebri frigidis affectibus, cum vino cocta, aut macerata, & bibita. A Gratarolo in confortanda memoria, & ingenio acuendo, hominèque, quocunque modo comedatur herba, industriam faciendo, animi tranquillitate præstanda, saporem capiti iucundum inducendo. Conferre etiam in lotionem pedum, in ablutione capitis. Sic etiam debilitatibus cordis subuenit, & animi deliquia præcauet, maxime si à causa frigida prouenerint, nocturne molestant, & somnum impediunt. Medetur frigido & humido ventriculo. Mulierculæ in Gallia teneros turiones ufos, ouis, saccharo & rosaceo excipiunt, placentalasque pin sunt parturientibus, puerperis & enixis, quibus vires impendio deiectione fuerint, ac secundæ non probe educæ. Orthopnæa laborantibus parati potest ex hac Eleutherium, Conferua, Syrupus & Extractum cum aliquo liquore sumendum, quibus etiam ad supra dicta usus esse potest. Scillatitæ ad Cardiacas confectiones multus usus. E floribus sic acetum, ut Beronica coronariæ, confortando cordi idoneum.

MELISSA ADULTERINA QVORVNDAM
amplis foliis & floribus non grati odoris.

criptio Fibrosa radice, subacri, & amarâ nititur: caules quadrati, hirsuti, geniculati, multâ medullâ facti: folia Galeopsis, oblonga, rugosa, hirsuta, geniculis enata, opposita, in ambitu ferrata, odore parum grato: ex quorum alis, flores vtricu-

lis oblongis, laxis, hirsutis, emicant purpurei, candidi, vel carneo colore prædici, oblongi floribus Antirrhini similes, labello in res laciniâs diuiso, casside surrecta, promicantibus ex rictu staminibus. Eius aliquot species nouit Clusius.

De hac loquitur Tragus lib. 1. cap. 2. dicens. Nican der in Theria eis scribit Marrubiû à pastoribus *μα- λισσιν* vocari, quod quidam propter apes Melitragam interpretantur, quæ sanè verba ego de Vrtica G. Zinsaug dicta, intelligo, quæ dubio procul vera est Melissâ, neque enim quæ vulgò dicitur, Melissâ est.

Fuchsius hanc Melissophyllum siue Apialtrum verum cõstituit, ac per consequens ei verè nomina adscripsit in Hist.

Gesl. hort. dicitur Melissâ vera Rurpodii, & Melissâ Fuchsi, de qua mox ait. Melissophyllum quod pro vero exhibuit Fuchsius, copiosè

in siluis nostris nascitur: & in hortos translatus aliquot annis manet. Lamium siluaticum dixeris, quamquam à cæteris Lamiis nonnihil differt: à Melissâ quidem vulgò dicta, toto genere distat.

Euchar. Ræss. vocat Melissam. Lobel. Obs. pag. 277. Melissophyllum Fuchsi, Cordi, & Tragi, Herbam sanam Agrippæ, & Lamium Plinii quorundam. In Icon. Plant. pag. 515. Melissam Fuchsi. H. Lugd. p. 958. Melissophyllum Fuchsi & Dod. (gall. icicet.) Camer. hort. Melissâ Fuchsi passim in Germania occurrens. C. Bauhin. Phyt. Lamium 8. siue montanum, folio Melissâ.

Clusius huius plantæ duas icones proponit. Vni quidem titulus est Lamium Pannonicum 1. verticillate flore. Alteri Lamium Pannonicum 1. albo flore, de quibus ait. Fuchsius & Tragus hanc plantam Melissophyllum appellarunt, cum tamen exigua odoris grati prædita sit, nec apes eius floribus valdè delectentur: & haud scio an



prædita sit, nec apes floribus valdè delectentur: & haud scio an apta sit ad aluearia intus conficienda, alliciendarum aut retinendarum apum gratia, vt est vulgaris Melissa, quibusdam Citrago, ab odore Citri mali, dicta, quæ omnium doctiorum iudicio verum ^{melissæ quidam} censetur. Ego ad Lamii genera potius referendam arbitror.

Locus & tempus Melissa Fuchsi minùs odoratam magno folio & flore vidi Monspelii, si bene recordor, Genue in monte Salene incipiebat florere Aprilis, in colle *la Bastie* flore albo florebat Maio & Junio: Lugduni obseruauit *au bois du bon Alemand* florentem Maio mense. Basileæ abundantem in monte Moutetz, Montbelgardi prouenit in monte *la Chau* flore purpureo & albo, transituli in hortum E.C. vbi florēt Maio, quidam commendat ad affectiones vteri. Reperi & in aliis locis plurimis.

MELISSA TURCICA MVLTIS dicta.

Descriptio



geniculis circumnascuntur, cærulei vel albi, labello bifido, bifidoque cucullo brevior, binisque alis exiguis constant.

Melissophyllum Turcicum dicitur planta à nobis tradita Aduersariis quam describunt & depingunt. Lobel. in Icon. Plant. pag. 515. Melissophyllum Turcicum. Fuchsio lib. 3. comp. med. Melissa altera vulgaris, purpureis floribus, Turcica discriminis gratia nominata: Gesnero hort. Melissa vel Cedronella, id est, Citrago Turcica à quibusdam cognominata: Bizantio vt audit, allato semine, odore multo grauiore & magis ad cineres accedente, quàm vulgaris, floribus purpureis. Camer. apud Matth. hist. germ. Melissa Moldauica [ita etiam in Epit.] siue Turcica Turcisch melissen/ floribus cæruleis & albis Hort. Melissa Turcica siue Moldauica. C. Bauh. phyt. Melissa 2. siue peregrina, Turcica dicta: Melissa Moldauica Matth. icon. 4. pag. 515. in fol. lib. 3. cap. 101. Variat magnitudine & paruitate.

Hanc duabus distinctis figuris H. Lugd. pag. 960. expressit. Et quidem maiorem Melissæ Moldauicæ Matthioli, & minorem Melissæ Turcicæ alterius Dalechamp. nomine. Matthiolus non describit, licet in variis editionibus eius memi-

nerit.

Seritur in hortis, sed ex Muldauia primùm ad nos delata est, vbi spontè per se prouenit. Obseruauit Genue in orto meo florentem adhuc Nouembri, vt & Lugduni: Montbelgardi in orto E.C. flore purpureo ac albo, ac eam secundo anno prouenientem ex semine deciduo, æstiuæ planta est.

Vinibus non differt à Melissa & potissimùm odoratum semen existimatur, vt refert Camerarius. Excalfacit, siccaturque ordine secundo, aperit, attenuat, & incidit, Matth.

MOLVCA.



Peregrina planta Molucca nomine donata, caulem habet rectum, sesquicubitalem vel maiorem, glabrum, subrubentem, ferè quadratum, satis robustum, paucà medulla factum, in ramos multos satis diffusum, eoque binos oppositos: folia subrotunda, per ambitum serrata, longis pediculis ap-

penfa, foliis Marrubii nigri similia, verùm non ita nigra, planè glabra, neruosa, bina ex aduerso posita: in caule ramisque à medio ad summum vsque ex interuallis calices magni, paruli calathoides, cutanei, neruosi, semi verticillati digesti: *stipulas* comprehendunt Galeopseos ex albo purpurascens, galea hirsuta, apicibus in medio: tandem feminibus succedentibus, in singulis calycibus quaternis triangulis: cæterum vnicuique verticillo folia bina adherent longo interueniente pediculo inferioribus similia, ad pediculorum ipsius exortum spinulæ aliquot longiusculæ proliunt. Radix lignola est & fibrosa, annua herba cui folia amara [amara tota Match.] flos ferè insipidus. Huius plantæ odor mihi gratus.

Gesn. in epit. ad Occonem de hac loquitur. Molucca vel Constantinopolitana herba mihi ante biennium nata, & probè depicta est. Videretur autem ad Lamium vel Vtricam mortuam quodammodò accedere, feminis tamen [vade ego maximè cognationes stirpium iudicare soleo] higurà differt, utpote triquetra.

Matth. in Diosc. cum magnis figuris vocat Melissophyllum Constantinopolitanum, è Constantinopoli allatum, foliis Melissophylli similibus: verùm haud quaquà Citreum pomum olentibus. In Hist. Germ. cum addit. Camerarii, itemque Epitome Moluccam, siue Constantinopolitanam, Cardiacam, & Moluccam læuem, & sic etiam appellat eam Dod. lat. in fol. Lobel. autem in Aduers. pag. 221. Cardiacam Melicam, siue Moluccam Syriacam, Melissophylo congenerem Melinum & Moluccam quidem appellat non ab Oceanis trans Tropicum nostrum insulis Moluccis: sed no mine

nomine cum planta misso è Syria Venetias Martinelli Sequini opera. Obs. pag. 278. Cardiacam Meliccam, vti & pag. 279. vbi præterea Molucca minus asperam, seu etiam in Icon. Plant. p. 316.

Hist. Lugd. pag. 959. Moluccam siue Melissam Turcicam Dalechampi: Item Melissophyllum Constantinopolitanum Marthioli. Vnus plantæ duæ proponuntur icones ab Hist. Lugd.

C. Bauhin. Phyt. p. 434. Melissam tertiam siue Moluccanam odoratam: apud Matth. Melissam Constantinopolitanam. Tab. Ic. & Hist. Cardiacam Sirciacam vocat.

Moluccam primum vidi in horto clarissimi præceptoris mei D.D. Gesneri, postea curavi seminandum Basileæ, & Lugduni: ubique prouenit copiose, in horto meo florens Maio, Iunio, Iulio, & Augusto. Geneuæ vt & Montbelgardi habui florentem: & semine abundantem adhuc mense Nouembri.

Herba contra venena magni sit, succus eius capitis vulneribus apprimè conferre creditur, & ad cordis affectus.

MOLVCA ASPERIOR FOETIDA.



Longis nuntantur pediculis folia circumscripta prione ferè rotunda, lacinia, nervosa, foetida: flores è calycibus verticillatim caulem ex internallis amplectentibus erumpunt: sunt autem calyces minus paruli quam in Moluca priore, nervosi, lacinia, quorum lacinia in longas, rigi-

das, infestas spinas desinunt.

Camer. apud Marthioli Hist. Germ. Dodô. lat in fol. dicitur Moluca aspera. De hort. Moluca altera, dicta foetida potius quam odorata, non ita facilè ad maturitatem perueniens. Lobel. in Aduers. pag. 221. In Ic. Plant. pag. 217. Melica siue Molucca asperior Sirciaca. In obseru. pag. 279. Mafeluc Turcarum, & Molucca aspera.

Hist. Lugd. pag. 959. Molucca spinosa Dodonæi à Clusio pro Galeni Alyssio picta. Fallitur compilator, Alyssio Clusii folia sunt Marrubio similia, magis incana, inodora, hæc & alia nullo modo conueniunt cum Moluca.

C. Bauhin. Phyt. pag. 435. Melissa 4. siue Moluccana foetida, quam ait Alyssio Galeni congenerem aliquos velle.

Tabern. Icon. & Hist. Cardiacæ Syriacæ altera Randi Syriaci herbesper.

Moluccam asperiorē & foetidam Geneuæ habui in horto pulchrè virētem adhuc in fine Nouembri, Lugduni etiam & Montbelgardi in meo etiam & M. C. Witt. aliquoties: nunquam autem semen maturuit.

DE ORIGANO VETERIBVS

& in genere.

CAP. XIII

Organum pluribus plantis conuenit, id quod ex eius generibus seu rectius cognominibus ostenditur. Primum Diafcoridi nuncupatur *οργανον ημετεωτικον*, quam refert nonnullos *οργανον* vocare. Quæ tamen & ipsa pluribus conuenit, vt ostendimus eum de Cunila propriè dicta agimus. Et hæc etiam à Galeno Heracleotica vocatur, à Plinio autem Cunila gallinacea & Origanum Heracleoticum. Secundum genus est *Ονιτες*. Sic & tertium *αγριον οργανον*, siluestre Origanum.

Origanum verò siue Origanus quoddam montibus gaudeat appellationem apud Græcos inuenit, *αμνός ορος* id est, monte, & gaudio. Herodianus quoddam visum exacuat nomen duxisse testatur, ab *ορος* videre, & *αμνός* clarifico, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus græmaticus, nomen ex aduerso ductu putat, à *ορος*, & quod est algeos fieri *οργανον*, quasi algens, censet, & tandem alcita litera principe, *ο*, in Origanum esse confectum, contrario tamen sensu, quod minime refrigeret.

Arabice dicitur Origanum Fandenigi, Fudenegis, seu Fandenigi, Fandenigi Trago: cui & Heracleotica & Azaba: Hebræis, *Karinth*: vocatur teste Aruch Monister, tamen species Hyssopi ibidem quoque tradatur. Germ. *dosten* / *wolgemuth* [quasi dicas animi bonitatem, aut lætitiā] *Cossteng* (Costum) & *Bergmünz* (Menthā montana: n.) Gall. *Origan* & *Mariolaine bastarde* (Majoranam spuriam: n.) Ital. *Origano*: Hisp. *Origan*: Angl. *Origane*. Boh. *Dobramisl*. Hung. *sefese te gyopar*.

Ceterum per Origanum simpliciter dictum, videtur & plurimum intelligendum Heracleoticum, de quo hoc loco primum agendum, quod ab Heraclea Ponti nomen desumpsit, quoddam illuc potissimum nasceretur.

Præter quod autem Diafcorid. Origanum Agerato frutici maxime simile dicit, & Papaueri Rhæadi eius folia comparat, rursus particulatim hæc de eo scribit. Origanum Heracleoticum, quod nonnulli cunilam appellant, solum habet Hyssoppo non dissimile: umbellam autem non in tota specie orbiculatam, sed veluti diuisam, & semen in summis virgis haudquaquam densum.

Plinius in Origanum nomine, tum Historia ambiguus admodum est, qui hanc Cunilam galinaceam latine appellat, Græcè, Origanum Heracleoticum: Optimum autem Creticum, nam & iucundè olet: proximum Smyrnum: deinde Heracleoticum quod Onyrit vocant &c.

Origano autem esse genera complura sumis differentiis discreta author est Theophrastus 6. Hist. cap. 1. ex quo Plinius sua transcripsit. Idem cap. 2. ait Origanum genus nigrum sterile esse: candidum verò manifestè fructuosum. Lib. 7. cap. 11. Germine Origanum desiguitur. Lib. 2. de Caus. c. 15. suffruticem esse, semperque vitere 4. c. 5. aggrè germinare. Et 7. cap. 1. Origano dies plus quam triginta dari, antequam nascatur.

Palladius cap. 13. Mense Septembri circa Aequinoxium ferendum præcipit, stercoreandum ac rigandum donec conualecat: amare loca aspera & laxola.

Præterquam autem ad alia progrediamur, con-

sulendæ & considerandæ veniunt variæ circa Origanum Neotericorum opinioes. Hæ enim ad oculos ponit difficultates, quas Veterum breuitas peperit & obscuritas.

Marcellus inter alios hæc scripsit: Duo statim à principio sexti de plantarum hist. voluminis Origani genera Theophrastus fecit: Nigræ quæ sterilem: & candidæ quam fructandam & seminis feracem nominauit: quod manifestum multoque certius in Satureia videatur: hinc inde, & post eum Columella: Plinius deincepsque alii multa diuersis nominibus & historiis tantaque cum varietate & incertitudine Origani genera tradiderunt: vt non facile nunc sit eligere quod dicat aut quos potius auctores sequatur aliquis. Nec quicquam, si inuenisse id liceat, obtandum magis, quam animal quadrupedemue aliquam, quæ certius saluti suæ consulere à natura docta, dum sibi in periculo necessariam Origanum querit, & inuentâ vitur, tam multas eius species & earum discrimina nobis ostenderet: quod facere à diligentioribus deprehensa Testudo est quæ cum venatis carnibus pasta fuerit, Origanum querit & inuentam venenis aduersantem deuorat. Difficillimum enim est cõcordem tor veterum Scriptorum Origani historiam facere. Nec nos proferri id pollicerique audemus. Liceret sanè quæ ab eis tradita sunt omnia, aut saltem plura repetere hoc loco: sed nos nunquam pro bonarum artium studiis id genus laboris amauimus: simulque iniquum vilum semper est ab antiquorum scriptorum lectione & laude deuio in admirationem sui tam mala ratione posteros agere: translatisque in sua commentaria eorum monumentis laboris sui fructu omni posthac eos priuasse. Agemus ad eam causam rem nostrâ &c.

Varia, inquit itidem Marth. ac confusa est apud Antiquos rei herbariæ auctores Origani historia. Quandoquidem Theophrastus lib. 6. c. 2. de plantarum historia duo tantum constituit Origani genera, nigrum sterile & candidum fructuosum. Plinius verò lib. 20. cap. 17. post Onitidis Origani, & Trigorigani mentionem, Heraclium Origanum subiunxit, quod tria habere genera prodidit. In quibus verbis Plinius deprehenditur non sine errore Tragoriganum cum Origani generibus confudisse, quod Heraclii nomine, quod constat Origani genus esse, duas illas Tragorigani species, quæ à Dioscoride redduntur, huius ferè imitatione expresserit: licet tertium quoque addiderit ex alio fortè auctore, nisi dixerimus, quod & hanc pro aliquo Origani genere sumpserit, & simul confuderit. Sed de his aliis placitis, & Dioscoridem quem nobis ducet, & auctorem propotimus, duntaxat secuti, dicimus tam Heracleoticum quam Onitum appellatum Origanum aut in Italia non oriri, aut inibi hætenus, quod sciam, à nemine repertum fuisse. Etsi Brassauius Ferrariensis medicus nostræ ætatis clarissimus asserere videatur, Heracleoticum illud herbæ genus esse, quod in Italia passim nascitur, quodque perperam Origanum vulgo ab omnibus vocatur. Verum huic pice eius dixerim (nunquam assentiri potui: qui potius eam plantam Origani siluestris genus esse semper existimaui, quod sua sponte in campestribus, asperis cliuosisque locis & montibus proueniat, purpurascens admodum umbellâ.

Aliter verò statuit Anguill. dicens, Origanum in Italia notissimum, sed excellentius nascitur in Apulia & Calabria, quam in alio loco. Proue-

nit præterea in Illiria & Sclauonia, & in Græcia; vbi vtuntur vice aromatum ob acrem saporem. In Creta, inquit Bellonius, inueniuntur tres species Origani quæ florent in principio Iunii. Onitis autem, propriè prouenit inter rupes in collibus à parte siccioris quæ meridiem respicit. Heracleoticum autè locos amat humidos quod verò siluestre vocatur, neutrum locum amat, prouenit libentius iuxta sepes & agros quam locis detectis. Non longè à Betleheimo in rudibus quibusdam reperitur Onitis & Origanum Heracleoticum. Præstantius & verius siluestre est, inquit Amat, quod nullibi quam in Hispania hucusque mihi videre contigit: in Gallia verò & Germania ac Italia, genere quodam vtuntur, non adèd tamen potente ac bono.

Vnde meritò Cronemburgius, vbi quæ alii dixerunt recensuit, dicit: Quum parum inter Græcos, minus inter Latinos, omnium minime inter virosque, circa Origanum conueniat, haud imperitiâ quispiam indiceret inarticulatamque Origani delineationem mitteretur.

Origani Heracleotici nomine donantur hæc plantæ, à diuersis quidem authoribus. Origanum vulgare spontaneum, cuius tres sunt species flore differentes Trago, duæ Dodonæo. Origanum Heracleoticum Ruellii siue Maiorana maior. Origanum Heracleoticum Matthioli; & Dodonæi, vocatum Hispanicum, aliis fortè Creticum. Onites Marth. & Dodonæo, Tragoriganum Marth. Tragoriganum Dodonæi. Maiorana Anglica Dodonæi de quibus suo loco. Hyslopis vulgaris. Clinopodium Dodonæi. Origanum Creticum. Geranium. Agrimonia. Acinosis. Clinopodium Matthioli. & hyssogorum. Eryngium. Satureia. Thymus. Pulgium plebeculæ Anglicæ est Origanum. Plinius pluribus locis confundit cum Origano Conyzam.

Ceterum in tanta nomenclationum varietate cum non facile sit certi quicquam statuere, lubet de omnibus suo loco differere & hic quidem Heracleotici Origani equiuoca, & ad ea aliquo modo facientia, specialius petra tractare, adicientes in fine, facultates, quæ Origano Heracleotico Veteres ascribere. Nec in re admodum incerta, multum operæ aut laboris contineat infundendum esse, necessarium putauit Fuchsus.

ORIGANVM VVLGARE



Origani vulgatis radices tenues, et quædam de lignosis, oblique aguntur, frequentibus Capillamentis fibratæ, sic vt ramulorum pars infima horu ope denud radiceatur. Sugunt autem complures caules cubum vni aut duos cubitos alti, duri, quadrati, hirti: ad quæ

quorum nodos aduersa oriuntur folia, Calamitæ arenensis, hirsuta, & ex horum alis minora alia, maioranæ foliorum æmula: sapor autem tū his, tum illis acer, aromaticus, odor suavis: *stipulis* tanquam in umbella foliolis rubescentibus obvallati emicant, colore carneo aut candido, pusilli, vnum foliolum bifidum sursum reflectentes, infimum maius trifidum, ceu labellum demittentes, staminibus in medio flori concoloribus: semen minimum, Maioranæ semini simile.

Huius autem Origani esse, quoad florem attinet, tria genera, attestatur Tragus. Horum aliud phœniceum, aliud ex candido rubicans: potestimum verò planè candidum.

Fuchsius autem Tragoriganum, aut saltem eius speciem quandam esse ait. A Matth. Cronemb. Lacuna & Dodonæo existimatur Origanum siluestre Dioscoridis. Amatus ad nullam speciem certam reducit, sed tantum Origani quoddam genus facit. Cornarius simpliciter Origanum vocat: ceu & Monach. dist. i. cens. 40. vbi dubii hærent an sit recipienda opinio Brassauolæ, afferentis esse Origanum Heracleoticum. Tragus quod rursus attinet, sentit is Origanum nostrum esse Dioscoridis Hyssopum. Camer. in Epit. Matthioli. hanc plantam Pseudooriganum magis appellandum censet quàm siluestre Origanum, vt quidam credere. Huic enim flores candidos, non purpureos ait.

Vocatur planta à nobis descripta, Fuchsio, Dod. gall. & lat. in fol. Geln. hort. Cast. Tabern. Camer. Matth. in Hist. germ. & C. Bauh. (4. apud Matth. i. phyt. vbi Cunilam bubulam Plinii facit) Origanum siluestre. Ruspodio Tragoriganum. Cordo in Dioscor. Origanum siluestre. Brunfels & Trago Origanum: Matth. Eonic. Geln. hort. Lacuna, Thallio & Camer. in Epit. Origanum vulgare: H. Lugd. pag. 887. Origanum vulgare siluestre. Lobel. in Aduers. pag. 211. Obf. pag. 263. Icon. Plant. pagin. 492. Agriorganum siue Onitis maior. Celsus. Origanum italicum, cui & Tragoriganum Dioscoridis. Origanum Onites in Lombardia proueniens Anguill. epist. 12. Camer. hort. Origanum siluestre flore albo. Et ita quidem vulgò vocatur, ait, quod passim crescit, & potius ad Heracleoticum est referendum. Nā siluestre quod secundum Nicandrum Dioscorides describit, cum umbella Anethi instat, alba tamen, Anguillara dicebat in Italia sibi non visū. Origanum siluestre, esse Cunilam Bubulam dictam Ruellius probare conatur.

Ceterum, Origanum vulgare mirè variat, interdum enim foliis est rotundum, interdum longo & magno, interdum flores spicati, plerumque non spicati. Montspeli passim prouenit, florens Augusto, coloris purpurei. Vulgare Genevæ abundat vitens principio Ianuarii. Basileæ copiose prouenit etiam flore albo. Montbelgardi frequēs & circa Blaumontium Castellum E. C. licet videre flore purpureo, rubente cum albedine, & albo, vnde transfusi album in hortum E. C. Montbelgardum. Nascitur in inculto solo secus itinera, in collibus & apricis non modò in calidioribus regionibus sed & in Germania, æstiuis mensibus florens: semen deinde periciens.

Origanum Heracleoticum à Veteribus descriptum hanc esse plantam qui nobiscum sentiunt, vires si requirant, videant antè. Hæc quidem particularia trademus. Excalescit, inquit Matthioli, quòd gustu subacris sentiat, & siccatur quoque similiter, sed haud strenuè. Aperit, digerit, incidit & resoluunt, sed longè mitius quàm præ-

Tom. III.

scripta Origani genera. Perdices, Cicônias, & Palumbos vulnere accepto, Origanum imponentes ad sanitatem reducere, neque hominum vllā medicina habere necesse, narrat Elianus: Inspersum piscibus, carnibus & aliis abigere muscas tradunt alii. Huius decocto Vngaricas mulieres ad filum lanæ pullo colore inficiendam vt, auro Nomenc. Pannonicus. Ad arcendum pediculos & pulices Origanum præscribit Lac. du Fouilloux. Arnold. de morb. cur. ad dolorē capitis à pituita in gargarismo Origani semet commendat: Ego pluri faciem folia.

ORIGANVM HERACLEOTICVM Ruellii, siue Maiorana maior.

Maioranæ alii, alii Origanis accensent plantam quadratis, hirsutis, subrubentibus, cubitalibus, ramolis caulibus fruticantem: cuius folia ex aduerso posita, bina pluræue, Maioranæ foliis maiora, Origani vulgaris ferè paria, cinerea, hirsuta, venosa: extremi ramuli in spicas duorum versuum (quammaras semunciam aut vnciam longas abeunt, è quarum imbricatis foliolis stipulis emicant.

Descriptio

Ad inarticulatam Heracleotici Origani, quod alii Cunilam vocant, Dioscoridis delineationē magis accedere, nullam scio (inquit Ruellius l. 3. cap. 25.) quàm quæ vulgò degeneris Maioranæ cognomento seritur in hortis, frutice Hyssopi: foliis eidem vel Serpillo siluestri proximis, minoribus tantum, vmbra culis non in orbem coactis, sed diuisis, florum plenis. Tradunt olitores neglectum simplicem in eam degenerare, frutice Serpilli plerumque humi reptante, cauliculis puniceis, foliis simplicibus, flore purpureo, in umbella cinctis, in qua semen: vnde multis Gallicis locis Cendree nominatur.

Hanc intelligit Tragus lib. 1. cap. 9. per Maioranam siluestrem, siue alteram foliis, caulis cacuminibus, nec non & florum crassitudine, longitudine & magnitudine, Maioranæ satius maiorem, eiusdem tamen ferè cum satius odoris & temperamenti. Is nisi stultæ temeritatis argui se posse vereretur, affirmaret Maioranam siluestrem ad Caput Dioscoridis de Maro pertinere.

Gelsner. hort. vocat Amaracum & Sampsuchū siluestrem, Maioranam maiorem. Camer. hort. Amaracum silu. perennem. Harch. in Enchir. siluestrem Maioranam: Item Anglorum peculiariter Origanum, quo vti posse putat in aliorum inopia. Lob. in Aduers. pag. 212. Hyssopum, Maioranam Anglicam, Origano similem plantam. Lacuna Marum Dioscoridis & Origanum. Dod. gall. Marum quorundam inscribit, & Marolaine d'Angleterre gall. vocat, Belg. Engelsch Marz ioleyn / Maioranam Anglicam. Hanc describit pro Origani tertia specie. Non placet autem nec descriptio, nec figura, quamuis Lacuna eandem habeat.

C. Bauh. Phyt. Maioranam secundam siue siluestrem perennem vocat.

Montbelgardi vbi in hortis abundat, grosse Marolaine nuncupatur: ididem hiemem perfert.

ORIGANVM HERACLEOTICVM MAT- thioli, aliis fortè Creticum.

Hoc nominè mihi visum & collectum Origanum, cubitali caule, quadrato, hirsu-

Z

Descriptio



ganum Heracleoticum, flosculis ex albo purpurascens & nonnunquam candidis. In Epit. Matth. Origanum. In Hist. Germ. Origanum Heracleoticum, Origanum verum 1. Casp. Bauh. phyt. Origanum 2. huc Heracleoticum: Origanum 1. vel 6. Tragi: Cunila Gallicaria Plinii: esse ait flosculis ex albo purpurascens, & etiam candidis.

Tale habebat Fuchsius in horto quod vocabat Tragoriganum tenuifolium. Habemus & Montbelgardi in horto E.C. ubi fert hiemem nisi admodum saeuierit.

ORIGANVM CRETICVM.

Descriptio



tigit, hirsuta, minora quam vulgaris Maioranae, minimeque rotunda.

Anguill. epist. 5. & 12. vocat Origanum album, nihilque aliud esse ait, quam Hyssopum Cilicium à Dioscoride descriptum.

Matth. dicitur Origanum Onites [ita & Lacunæ & Cam. in Epist. & Hist. germ. qui & Origanum verum 2. vocat] è Creta allatum & à Luca Ghino missum. Trago Origanum alterum pulcherrimum peregrinum. Lobel in Aduers. pag. 211. Origanum siluestre Syriacum,

to, vulgaris instar Origanum: folia ex geniculis minora, modicè hirsuta, odore & sapore aciore: flores albi aut subpurpurei in squammatis capiculis, minime spicatis, & in umbellæ ferè modum sparsis.

Lob. in Aduers. pag. 262. & Icon. Plant. pag. 492. Origanum Heracleoticum. Camer. hort. Ori-


quod optimum ait, è Syria aut Creta allatum, hocque vti Venetos pharmacopoeos & medicos. In Obseru. pag. 263. Origanum siluestre: Hyssopum Dioscoridis Cilicium Anguillæ: Ital. *Origanum bianco*. C. Bauh. phyt. Origanum 5. huc Onitis alterum.

An à Fuchsius de compos. med. lib. 1. cap. 5. Origanum Creticum appellatur?

Origanum Creticum cum longiusculis corymbis spicas æmulantibus, flore albo & rubello Gæppingæ in horto Ill. E.C. & in horto Admirab. balnei, obseruauit.

ORIGANVM MONSPELIENSE pulchrum Camerarii.

Similimum est Oniti à Matthiolo depicto (Origanum sc. Cretico nostro), sed non idem: ab Origanum vulgari, nō multum differt, nisi quoddam habeat multas,



pulchras & oblongas quasi Sy spicas, purpureas, caulis etiā totus purpurascit, semen gignit rufum, pusillum, vt reliqua Origanum genera. Crescit in Gallia, prope Monspe- lium.

Est hoc C. Bauhin. phyt. Origanum 6. Nobis autem idem videtur cum eius Origanum 4.

Origani vires in genere.

Origanum Heracleoticum, auctore Dioscoride, vim habet calefaciendi. Vnde decoctum ipsius cum vino potum, commotis à bestiis venenatis conuenit: cum passo verò his qui Cicutam aut Papaueris succum hauserunt: cum aceto mulso his qui gypsum aut Ephemerum biberunt. Cæterum ad conuulsa & rupta ac hydropas, editur cum ficu. At aridum potum acetabuli mensura cum aqua mulsa, nigra per aluum ducit. Idem cum melle delinctum, menses mouet, & tussis curat. Ad pruritus & scabiem & morbum regium, decoctum ipsius in balneo prodest. Succus ipsius dum adhuc viridis est, & tonsillas, & columellas, & feruida oris vlcera sanat: & si cum oleo irino ipsis infundatur per nares ducit. Cum lacte verò aurium dolores mitigat. Paratur & vomitorium ex illo medicamentum, additis Cepis, & Rhoë qui obsonis. inspergitur, omnibus in ære Cyprio, sub canis ardore, ad dies quadraginta, insolatis, Herba ipsa substrata, reptilia & serpentes fugat.

Origanum Heracleotica quidem efficacior est Onitide: sed agrestis, quam quidam Panaces Heracleum, alii Conylem cognominant, valentior vtraque est, inquit Galenus: Omnes verò incidendi, extenuandi, exsiccandi, calefaciendi facultatem possident: hæcque tertio excessu

excessu obtinēt. Porro ea quam Tragoriganum appellant assumpti etiam attritionis quippiam. Idem in lib. simplic. med. ipsi attributo, ait. Origanum & ipsum omnibus notum est, & habet vires acres & exsiccatorias & relaxantes, & euaporantes: vnde & suspitionis & tussientibus prodest. Et serpentes fugat item biles & ventrem detrahīt. Sed vrinam & menstrua prouocat.

Apuleius ad tussim potenter auferendam Origanum in puluerem molissimum terit, & melle visque ad tertias decocto miscet, & exinde figurat trochiscos & dat ad bibendum in aqua calida.

Nunc ad Plinium deuenimus, qui lib. 20. cap. 16. ait. Est alia Cunila gallinacea appellata nostris, Græcis Origanum Heracleoticum. Prodest oculis tria addito sale. Tussim quoque emendat & iocinorum vitia. Lateralum dolores cum farina, oleo & aceto in sorbitionem temperata. Præcipue verò Serpentium morsus: de quo etiam plura habet eiusdem libri c. 7.

Aristoteles Origanum multo iniectum efficeret vinum dulce prodit: quia partes aquosas auferat ad sese, quemadmodum Sol ab vis, quæ passè dulciores fiant. Origanum verò acrimonia sua non tam attrahere ad se vini acrimoniam, quam eius partes coquere dulciores.

Auicenna Origanon commendat in doloribus dætiū, quod f. omnem putredinem arcet, vnde prouerbium ē *οργανος μαχης το δεσποτης ονειν*. e. putre balsamentum Origanum amat. Origano adhuc in Illyria & Græcia vtuntur propter, acrem saporem in ferculis loco aromatatum.

Antigonus in fartagine memorabilium narrationum scribit Testudinem vbi serpentem adit, Origanum insuper edere & quodam tempore accidisse, qui hac re obseruata. Origanum eo loco abstulerit, & tunc testudinem eo orbatam peritisse. Idem author Græcus addit palumbes percussas Origanum vulneri indere, & hoc remedio sanari. Item si Origano & Sulphure formicari acerui obturentur, statim illas aufugere, quod etiam tradit in Homil. D. Basilus. Decoctum Origani cum Cariophyllis & Sackharo paratum plurimum singulū prodesse constat. Huius etiam puluis cum paucō sale nitro vulgari & melle instar eclegmatis mistus vtiliter dentibus infricatur, & reddit cadindiores ac firmiores. Origanum intueri, prouerbium est apud Suidam ex Aristophane sumptū, ab acrimonia herbæ, & dicebatur de eo, qui robur & maximum animū præ se ferebat. Cæterum vinum Origanites ex Origano Heracleotica parari similiter vt Thymites, testatur Dioscorides: facere & ad eadem.

De Origano Onite.

De Origano Oniti Dioscoridi dicto, quod nomē retinent etiam Galenus & Plinius, variae sunt opinioniones: tradit enim Hermolaus ornithin h. e. gallinaceum quibusdam dicti: aliis Buglen Ruellius. Nicander quoque meminit Origani, cuius folium, quod Añnis pabulo gratum esset Onopetalium vocauit Origanum, quodque Onitis inde secuta ætas ab eo didicit appellare, Onitis quid sit ex Dodonæo colligere non possū, nihil enim addit præter ea quæ à Veteribus dicta sunt, addens tantum hac in regione incognitum esse genus.

Mathioli verò depingit quidem plantam pro Origano Onite sibi missam à Luca Gui-

Tom. III.

no ex Creta allatam, vt supra ostensum; sed non describit. Nisi multum fallor hoc Origanum Onitis Matthioli nihil aliud est quam Hysopus Anguillare, vt videre est capite de Hysopo.

De Onitide autem hæc dicit Anguillara cum locutus est de Origano. Onitis est species Origanum quæ tantum minor est acrimonia, odore & facultatib', vt dicit Galē. & Diosc. Nec aliud est quā Origanū quod reperitur in Lōbardia. Quod verò non sit vique ad album in causa est locus quia in locis calidis albidius est & violentioris saporis ac odoris. Hæc Anguillara.

Galenus eadē tribuit vires Onitidi quas Origanum Heracleotico nisi quod imbecilliores.

De Origano siluestri.

Αγροχαρας, μαχης, ονιδαν, & ονις Dioscor. iidem etiam nominibus insignita Galeno. Plinio recensetur inter Panaces, ac vocat Panaces Heracleum ac Origanum Heracleoticum siluestre. Siluestre autem cognominatum quod sine cultura & sponte sua proveniat.

Dicitur Germ. *colfen wolgemut*, quasi dicas animi bonitatem aut læticiam, Braundofen / vel Bergmuntz / Wilder maioran. Flandricè *Graue-Marioleine*. gallicè *Origan & Mario-laine bastarde*.

Eius tres species facit Teagus, duas Dodonæus. Meminit verò cuiusdam Origani hispanicæ Amarus, quæ, ni fallor, Origanum heracleoticum Matthiolo, & Dodonæo. Tragoriganū siluestre esse Origanum volunt etiam nonnulli. Alii Panaces heracleum, aut Cun lam, inter quos Nicander & Diocles. Siluestris Origani non meminit Plinius; Cuius tamen bubulæ vocabulo comprehensum iri putamus. Nec per Cunilam aliud intellexere Columella & veteres veterinarie artis Scriptores quā siluestre Origanum.

Id autem Origanum siluestre se non nouisse scribit Anguillara, nec vllam plantam provenientem in Italia quæ dici possit verum Origanum siluestre. Amatus dicit se nullibi quā in Hispania siluestre Origanum vidisse: & in Gallia & Germania quadam vti non adeo potente ac bona. hanc autem speciem hispanicam videntur Dodonæus & Matthioli existimare esse heracleoticum, vt patet ex superioribus, quandoquidem vna & eadē figura Matthioli & Dodonæi. Snum autem cum Amato vult Dodonæus ex hispania afferri: Snum ex Creta Matthioli.

Præuatim autem folia siluestris Origani & flores cum vino bibuntur, & commotis venenatis bestiis opem ferunt. Galenus huic eadē vires tribuit quas Origano heracleotice & Onitidi, nisi quod valentiores.

Vires

DE SAMPSUCHO SIVE AMARACO

Veteribus & ingenere.

CAP. XIV.

Theophrastus amaracum vocat, non Sampsuchum, licet Theodorus modò Sampsuchum, modò Sampsuchum vertat: aliquando Amaracum inter suffrutices coronarios perpetuè vires, provenit & semine. & auulsiōne: præstat seminis copia, & iucundi odoris semen est, & quidem mollioris odoris: nec non & planta eius transferri potest: radices in summo terræ hærent, mul-

Z 2

trifida, torridaque: Æstate floret, recipitur in vnguentis odoratis. Et rursus 1. de caus. plant. (vbi tamen cum aliam intelligere statuit Cæsalp. licet quænam illa sit, non determinet) ait. Amaracum recens radicem succi bonitate & carnis ad ferendum habet, inter ea quorum radix crassa & carnosæ est.

*Apellatio-
nes spurie.*

Sampfuchum [sunt qui in nothis Trifolium, qui Agathides, Agethides Marcell. qui Cnecium, qui Acapnon: Pythagoras Thramben, Ægyptii Sopho, Armenii Myuron, Magi Hecigonon, siue genituram Ifidis, & Ichrei asinum, Romani vero Maioranam dicant] in Cyzico laudatissimū:

*Delectus à
loco petitus.*

secundum ab hoc locum sibi vendicat, Ægyptiū. Vocatur autem à Cyzicenis & Siculis Amaracū. Herba est ramosa, per terrā repens, foliis hirsutis, ac rotundis, tenuioris folii Calaminthæ æmulis, vehementer odorata, & exalfaciens (quidam, *χλωμική*) nexilibusque coronis inferitur. Decoctum ipsius potui incipientibus hydropicis vile, ut & iis, quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: mensæque subdita in pello trahunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinunt. Luxatis autem cerato excepta imponuntur, itemque eodem ritis. Sed & ad oculorum inflammationes cum polline polentæ illinuntur. Ceterum acopis & malaginis exalfaciendi gratiā commiscetur, autore Dioscoride, apud quē in veteri codice, teste Goupylo, Sāpfuchi loco inuenitur caput *inagorichidis* ipsius nec dictis verbis. Amaracum autē Dioscoridi idem esse cū Sampfuchum, manifestè ostenditur ex vnguentis sampfuchino & amaracino, licet hæc diuersis capitibus profequatur, ut apud ipsum videre est.

*Descriptio
Calamin-
tha folia.*

Vires

Plinius de Sampfuchum, siue Amaraco pluribus in locis disseruit. Ait enim lib. 21. cap. 11. Amaracum Diocles Medicus & Sicula gens appellatur, quod Ægyptus & Syria Sampfuchum. Seritur utroque genere & se. nine & ramo, viuacius prædictis (Origano, Thymo &c.) & odore melius. Coptisolum Amaraco æquè quàm Abrotono semen. Idem cap. 22. Sampfuchum siue Amaracum in Cypro laudatissimum & odoratissimū, scorpionibus aduersatur, ex aceto & sale illitum. Menstruis quoque multum aceto infusum [trahendis in pello subditum, Diosc.] Minor est eidem potu vis. Cohibet & oculorum epiphoras cum polenta. Succus decocti tormina discutit. Et vrinis & hydropicis vt leuouet & aridum sternutamenta. Fit ex eo oleum, quod sampfuchinum vocatur, aut Amaracinum, ad exalfaciendos emolliendosque nervos: & vulvas calfacit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum cera profunt.

*Ex Plinio.
Amaracum
gens Sicu-
la
Sampfuchū
Ægypto &
Syria.*

Semen.

*Oleum sam-
puchi aut
amaraci-
num.*

Amaracum à Sampfuchum videtur distinguere Galenus, siquidem de simpl. lib. 6. Amaracon exalfacere non instruenē, non valde autem desiccare, sed in caliditate tertiū esse ordinis, in siccitate verò secundi tradit. Et rursus simpl. 3. Sampfycon vocat, ac tenuium partium, & digerentis esse facultatis ait: desiccare enim & exalfacere ordine tertio. Plura ex Galeno de Amaraco trademus mox capite de Maro.

*Sāpfuchus
& Amarac-
us idem.*

Sed Sampfuchi & Amaraci vocibus eandem rem significari, testatur præter Dioscoridem & Plinium, etiam Marcellus, cuius verba hæc sunt. Nota omnibus in quotidiano sanitatis vsu Amaracus est. Eam communi appellatione Græci Sampfuchum neutro genere vocant. Et ex hoc Columella in hortulo suo dixit:

Sāpfuchū

Grætaque iam veniant bilari Sampfucha Canopoi cum tamen Lucretius & Maro alteram illam vocem, magis amauerint: Plinius eandem manifestè dixit esse Sampfuchum & Amaracum: nec certè differunt nisi diuersis diuersarum gentium nominibus. Vnum idemque ergo olus, Sampfuchum & Amaracus est: non idem tamen omnibus locis nomen, neque eadem vbique bonitas & vnguenti ex eo confectio. Ceterum Amaracus Sicularum linguā à Cynaræ Cyprii regis eiusdem nominis filio dictum, quem in hanc herbam conuersum fuisse, fabulis proditum est. Seruius autem in primam Æneidos

(vbi mollis Amaracus illam

Floribus, & dulci aspirans completitur umbra.) scribit Amaracum puerum fuisse regis vnguentarium, qui casu lapsus, dum ferret vnguentum, maiorem confusione odorem creauit: vnde & optima vnguenta, amaracina dici ceperint: hanc postea in herbam Amaracum fuisse conuersum. Hæc clariùs ita retulit Rausius Textor. Amaracus, inquit, vt Poetæ fugunt, filius fuit Cynaræ regis Cyprii, qui quum vnguentarium Alabastrum quod ferebat, lapsus fregisset, tanto dolore intabuit, vt Deorum commutatione in odoriferam eiusdem nominis herbam sit commutatus. Sed relinquenda Poëtis sua signenta, dicendaque alia, in quibus præfari illud inutile non fuerit. Magni in plantarum historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur, & quæ diuersis locis, iisdem aut aliis nominibus appellentur, obseruasse. Nisi enim id fiat, geminari aliquando & augeri in numerum contingeret, quæ vnum sunt, & quod idem natura, aut paulo diuersam vbique fecit: aliud videri, eaque ratione confundi intellectum, & miseri rerum historiam. Quod in Sampfuchum hæc fit, in qua si Galenum, Dioscoridemque & Agnetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco videbitur. Si quidem omnes scotum de vtraque egerunt, aliaque in medicina alterutri vires assignauerunt. Si Theophrastum, Plinium, Poetasque Latinos, Lucretium, Maronem, & Columellam, eandem cum Sampfuchum Amaracum esse, omnes intelligunt, nec esse inter hæc nisi appellationis discrimen.


Cornarius Sampfuchum & Amaracum apud Dioscoridem, eandem quidem herbam esse concedit: sed non item apud Galenum, Aëtium, & Paulum. Diuersæ omnino herbe sunt, inquit, Galeno & posterioribus Græcis, Sampfuchus & Amaracus: &c.

E contra verò et si Galenus & Paulus Sampfuchi & Amaraci diuersis capitibus meminerint, Matthiolus tamen Sampfuchum & Amaracum idem esse sequentibus ostendit. Quanquam ex Theophrasti, Dioscoridis, & Plinii sententiā idem esse constat Sampfuchum & Amaracum: cum tamen Gal. & Paulus de his diuersis capitibus scotum scripserint, eorumque temperamenta per gradus diffidere tradiderint, non abs re credere nonnulli aliud esse Sampfuchum, aliud verò Amaracum. Quorum opinionem auxit etiam Dioscorides, quod in vnguentorum compositionibus Sampfuchinum & Amaracinum diuersis capitibus digesserit. Quod facile plerisque ad credendum induxit, has stirpes tum facie, tum viribus differre, hac ratione fratros, quod si alterum ab altero non distaret, omnino præter rationem de his variis in locis scripserit Dioscorides, alterum vnguentum Amaracinum, alter-

rum verò Sampfuchinum appellans. Porro
 ut huiusmodi controuersia tollatur, sciendum
 est itipem eam, quæ Galeno & Paulo Amara-
 cum appellatur, id sanè Amaracū non esse, quod
 Theophrastus, Dioscor. & Plinius Sampfuchum
 vocauerūt, sed potius, ut ego existimo, Marum.
 Namque Mari nec Galenus, nec idē Paulus quic-
 quam prorsus in simplicium medicamentorum
 libris meminerunt. Quare non deest suspicio,
 quin librariorum culpa in Galeno Mari titulus
 in Amaracum abiit: quandoquidem in eius tū
 gradibus, tum facultatibus assignandis Galenus
 à Dioscoridis Maro non longè recesserit. Cē-
 terum, licet Dioscorides Sampfuchini & Amari-
 cini diuersis capitibus per se meminerit: non ob-
 stat propterea, quominus idem esse possint Sāp-
 fuchum & Amaracum. Siquidem duabus de cau-
 sis ut alterum ab altero distingueret, Dioscorides
 facili impulsus fuit: quarum altera est, quod si
 diligenter animaduertantur vtrorumque com-
 positiones, utique Amaracinum tum multò o-
 doratius, tum Sampfuchino pretiosius iudicabi-
 tur. Ideoque Dioscorides, eò quod nolebat vne-
 quentum hoc apptimè nobile intactum relinque-
 re, quodque ob eius claritatem id particulari de-
 scriptione dignum censebat, ut præstantiæ discri-
 mine faceret, utque etiam minus probatum à pro-
 batissimo dignosceretur, homonymiam immu-
 tauit: ipsūque non quidem Sampfuchinum,
 sed Amaracinum appellare voluit: nam si id nō
 fecisset, quodnam altero præstantius esset, dis-
 cerni non potuisset. Huc accedit alia ratio, quā
 alterum Sampfuchinum, alterum verò Amaraci-
 num Dioscorides appellauerit: quod in Cyzico
 Sampfuchum Amaracum appellabatur, unde
 hoc vnguentum insigne petitur. Et quoniam à
 Cyzicenis ex eorum more Amaracinum vocabat-
 ur, talem nomenclaturam Dioscorides haud-
 quaquam permutandam censuit. Quare ipsū
 in eadem reliquit appellatione, quā secum ex
 Cyzico attulerat. Hæcenus Matthiolus cuius o-
 pinio de Amaraco Galeni & Pauli, secuti etiam
 Cōrnatii, omnino reprobanda videtur.
 Quādam demum ex Sicilia in Italiam allatā
 sub nomine Mari, similem Serpillo recto: sed ra-
 mulis humi procumbentibus: foliis breuioribus,
 candidioribus instar Maiorana: flores inter fo-
 liola ferentem non racemosos, sed raros, Cala-
 menti modò purpurascētes: odore totius plan-
 tæ valido, ac suauī, sapore feruenti cum quadam
 amaritudine, putat Cæsalpinus Sampfuchum
 esse apud Dioscoridem. Nostrā autem senten-
 tiā Sampfuchum; quod & Amaracum vocatur,
 nihil aliud fuerit, quā Maiorana duplex, de qua
 posthæc dicturi sumus:

rum extremis imbricatæ spicæ oriuntur, quarum
 hirsuta squammæ compacta folia è sinu pro-
 munt styculi pusillos, albicantes, hialcos, la-
 bello quadrifido, demisso, cui folium surrectum
 imminet, bifidum, & rictu stilum albidum profa-
 rentes.

Dodonæus & Lobelius duplicem Maioranam
 hortensem assignarunt, maiorem sc. & subinde



maioran
 duplex spe-
 cies. —
 tenuiorem, ac
 minorem, o-
 dorēque præ-
 stantiorē,
 quam Itali
 Dodonæo te-
 ste *Perjam gen-
 titem* nomi-
 nāt: Lobelius
 autem in Adu.
 Amaracum a-
 liam tenuiorē
 gentilem, &
 minutam ple-
 beculæ: in
 Obs. pag. 265.
 Amaracū te-
 nuiorē [&
 sic etiam in I-
 con. Pl. p. 498.]
 & Maioranam
 tenuifoliam,
 delicatiorē.

Anguillara quoque epist. 12. Maioranam vulgō
 cognitam ait, cuiusque duo genera tradit: nobi-
 liorem: alteram siluestrem: ambas in Græcia &
 Italia notas. Nos autem credimus Maioranam
 siluestrem Anguillaræ ad Origanum aliquod ef-
 se referendam. Maior vocatur à Lob. in Adu.
 Amaracus vulgior, siue Maiorana nostras (ita
 etiam in Icon. Plant. pag. 498.) non Dioscoridis
 Sampfuchus repens, sed eius species: in Obs. p. 265.
 Sampfuchus siue Maiorana.

Creditur autem esse Veterum Sampfuchum à
 Fuchf. Corn. Harc. Lonic. Cordo in Diosc.
 Geln. hort. Matthiol. Amato, Roberto Conf.
 apud Amatum, Turn. Brunfels. Ruell. & aliis
 plerisque.

Negat contrā Marantha, quid dicit: Si Samp-
 fuchum Dioscoridis ea planta sit, quā Maiora-
 nam vulgus appellat: quis non videt falsum id
 esse, quod de ea legitur, herba est per terram re-
 pens? aut si quis serpentem plantam pro Samp-
 fucho querat, quando eam adinuenturus est? E-
 iusdem etiam opinionis est Dodonæus: ob eas-
 dem rationes: iūque subscribit Matthiolus cuius
 verba antè recitauimus.

Apollinem quod attinet, is, Rad. in Conf. A-
 loes, non admittit apud Galenum Amaracum
 idem esse cum Maro, imò Matthiol. reprehē-
 dit, & contradicōne Brassauolum seipsum im-
 plicare credit, quod fusè & doctè demonstrat,
 ut ex illo ipso loco videre est. Tandem conclu-
 dens, non eundem inficias, duplicem nobis ad-
 esse Sampfuchum, primam nobilem, suauis fra-
 grantem, minoribus foliis, tenuioribus, cre-
 brioribusque cymis: secundam rudem, nullā lege
 excultam, hirsutiorē, minus odoratam: per
 quam rudem Maioranam diuertam à Maiorana
 plantam, nempe Origanum Heracleoticum Ru-
 cellii, videtur intelligere.

Græcis vocatur *μαϊόρα*, & *αυδοάνα*, Lat. Nomina
 Sampfuchum & Amaracus, officinis & vulgo Ma-
 linguarum

MAIORANA, VNA TENVIOR ET LI-
 gnosior, altera maiori folio ex semine nata.

A Donidis hortis, quos hæc ætas pensiles aut
 in fictilibus translatis excolit, norissima,
 fragrantissimi odoris Maiorana, fruticulus pal-
 mum, aut etiam dodrantem altus, alis creberrimis
 concauis, iisque lignosis, plerumque qua-
 dratis, subhirsutis, & tantillum rubescētibz:
 folia ex aduerso posita sunt, Origani vulgaris for-
 mæ, sed longè minora, incanā lanugine obducta,
 odore fragranti, sapore acrisculo & subamaro
 aromatico & grato: circa caulis ramorūque
 fastigium ex foliorum alis, adeoque & in ramulo.

iorana. Arabicè autem *Mezenius*, vel *Mercenius* nuncupatur, vt in Pandectario, vel *Merzanzius*, vt est in l. cap. ii. tractatus libri primi. *Abumeron* Auenzoar: vel *Marcanzus*, vt est in Antid. eiusdem Abumeron, Monachis. Germ. *Mazoran* & *Meyran*. Belgic. *Maryoleyne*. Gall. *Mariolaine* & *Marone*. Ital. *Maiorana*. Hisp. *Maiorana*, *Moradux* & *Almoradux*. Angl. *Marieron*. Boh. *Mariantfa*.

Sampfuchum deduxit Mich. Neander phys. part. i. *ant. rē hūicē* & *lygē*, quod sc. blandiatur grato odore animæ, quam mirificè suauitate temperati odoris reficere dicitur.

Locus & tempus.

Maiorana sunt mihi notæ duæ species, vtræque hortenses, vna quæ semine prouenit, qualem serunt Lugduni, Genææ, Basileæ, in Burgundia, vt Clareuallæ, & Montbelgardi, quibus omnibus in locis satam obseruavi, semine allato ex Gallia Narbonensi, vel Provincia. Hæc quidem Maiorana folia habet latiora, & nihilominus quotannis ferè perit, ea tamen si conseruari possit, tandem in arbusculas euadit, & surculosior, robustiorque fit, folia etiam minora, ni fallor, & candidiora redduntur: conseruanda autem in calidioribus regionibus in hortis, in frigidioribus reponenda. Quæ Montbelgardi surculis plantatur, & tenuior est, Hieme in perferet. Maioranam virentem vidi Patavii mense Ianuario & Martio adhuc in horto D. Muscari: Bononiæ etiam in horto di S. Saluator al burgo di S. Catharina. Libanius de vniuers. lib. 4. credidit leui occasione transire posse Maioranam in Origanum & vicissim. Sed hanc metamorphosin nobis obiter nunc nondu m leuit, quin harum similitudine, quæ multos decipit eum illud fuisse potius crediderim.

Libani l. 4. p. 10.

Vires & visus.

Excalfacit autem Maiorana & refecit, auctore Dodonæo, & in vtraque qualitate secundus est ordinis: auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis, quouis modo assumpta. Pulvis herbarum sicæ naribus instillatus, sternutamenta ciet, & puerum euocat, cerebrumque corroborat: sed idem etiam præstat foliorum succus naribus infusus. Valet ad pectoris vitia: stomacho præterea utilis est, ac iocunorosus, & lienosos iuuat quouis modo assumpta: sed & ad veri flatum, ac cæteros eiusdem frigidos morbos conseruit. Vrinæ & aquosos humores in potu sumpta ducit, & menses mouet: dentium dolores lenit commansa, aut apposita: admiscetur Antidotis. Oleum eius calfacit & corroborat nervos. Sampfuchi loco Tractatus quid pro quo semē Saturæ indit. Et nunc cingunt tempora folia & flores Amara- ci sua uolentis.

Morbi capitis frigidis sternutamenta ciet.

MAIORANA CRETICA ODORATISSIMA, quibusdam Marum.

Similis est Maioranæ vulgari, nisi quod folia minora, candidiora, odoris & sapotis vegetioris, pertinacis, nec nisi longo tempore exolescentis, per ramos tenuiores, quadratos, nullo

Descriptio digesta ordine: capitula hirsutiora, & candidiora, quam in vulgari.

Maioranæ huius Creticæ albæ semen habuimus ab hortulano Ducis Florentiæ, pro Maro Cretico exhibitur, quod satum Montbelgardi in horto Ill. E. C. plantam, qualem descripsi, produxit.

Marum Creticum.

Hæc est Maiorana illa, ni fallor, quam Bellon.

Obf. lib. i. cap. 17. sponte prouenire ait in Creta circa montem Ida, quæque incolis rusticis Ma- therina dicitur.

Maioranam Creticam albam assumpsit Lugduni Valerandus Dourez in suam Theriacam. Viret Nec dubium est, quin ea omnia præstare possit, de quibus in præcedenti diximus genere.

DE MORO VETERVM.

CAP. XV.

Marum etiam olim herbam notam fuisse, patet ex Dioscoride, qui sarmentosam esse ait, flore Origanum similem. Folia tamen huius multo candidiora, & florem odoratiorem. Vim habere Sisymbrio similem, subadstringentem, & leniter calfacientem. Vnde impositam nomas sistere, & in calida vnguenta ammisceri scripsit. Nasci plurimum, iuxta Magnesiâ & Tralleis.

De Maro Plinius breuiter lib. 12. cap. 24. ita tradit. In Ægypto nascitur & Maron, peius quam Lydium, maioribus foliis ac variis. Illa breuia ac minora & odorata. Nec dubitandum sanè Plinium & Dioscoridem de eadem herba loqui: contra quam falso sentiat Ruellius.

Galenus ac Paulus & Aëtius in simplicium censu Marum præterierunt. In Hedichroi verò compositione Mari drachmas duas recipit Galenus: Et lib. i. de Antid. cap. 10. quales sunt herbarum Marum & Amarae aliquo modo declarat: easque ab inuicem distinguit.

Ex prædictis itaque cognoscimus qualis sit herba marum, nimirum peregrina, apud Lydos iuxta Magnesiâ & Tralleis nascens, imò etiam in Ægypto, sed deterior. Cuius ne nomen quidem ad officinas prouenit, & hæcenus saltem doctis cognita est.

Clinopodium Dodonæi, siue Mastichina, Marum dicitur, cum quo tamen nulla in re, vel ipsius Dodonæi iudicio, conuenire videtur.

Clinopodio verius siue Mastichinæ affinis planta, Matthiolo à Corrufo missa, in omnibus descriptioni Mari respondet.

Maioranâ multi legitimum esse Marum contendunt, sed neutiquam par est id asserere.

Origanum Heracleoticum Ruellii est Marum Dioscoridis Lacunæ.

Clinopodium quorundam, siue Mastichinam Gallorum, sunt qui Marum esse contendunt.

Hæc nolaus in Dioscor. Coroll. 473. Melissam esse constituisse deprehenditur.

MARVM CORTVSI.

CAP. XVI.

Thymi durior siue Mastichinæ instar densè fruticat, lignosis virgulis & incanis, quas vestunt folia crebris gemculis, Serpylli foliis paria, Thymi foliis maiora, subtus incana, superius virentia, sapore amaro & acro, odore grato. Chamædryos verè floribus par, nec figurâ quoque ablutens, multitudine demisso labello, galæe locum suppletibus tortilibus staminibus, calyce quoque Chamædryos pari, villosulo, incano.

Planta à nobis præfenti loco propo- sita videtur Matthiolo in omnibus respondere historiæ Mari, quam sententiam improbandam nefas duci-

ducimus. Meminit autem huius primò in post.
cò. cum mag. fig. hist. germ. & Epitome, flores ei
adscriptibz subpurpureos, odore eximio fragrantes

Camer. quo-
que apud Matth.
Marum inscri-
bit, ac in Hist.
ait, autoris [Mat-
thioli] Mari pul-
chrum genus, ex
calidis regionibus,
potissimum ex
Syria adferri,
& hoc posse esse
Maioranæ gen-
us. Et hinc
figuram habet
ex Matthiolo,
cui adiunxit ra-
mum plantæ, quã
mileram Gesne-
ro, quæ multum
differt à Maiora-
na. Sed & Tab.
in Icon. & Hist.
Mari Matthioli

titulo plantam hanc expressit.

Marum hoc Cortusianum, Tragoriganum al-
terum facit Lobelius. Apollo tertiam Maioranæ
speciem. Ferrariæ mihi denominavit Anguilla-
ra pro Helenio Crateuæ, sed sine ratione.

Huius descriptionem aliquando cum planta
secca misit Gesnero Mari nomine, quo etiam mi-
hi ostendit Cortusius Patauii, fruticosam plantã
in olla excultam.

Is referebat hæc herbã summè delectari feles,
vixque ab eis tutam manere, ac eã comestã cis-
cumcirca illos semen genitale effundere.

MARINVM SVPINVM.

CAP. XVII.

Lobel. in Obs. pag. 266. vocat Marum supinum
non ab simile [Maro dicto Mastichina] sed
cauliculis repentibus. In Icon. Plant. pag. 500.
Marum. Tabern. Icon. & Hist. Marum repens.
C. Bauhin. Phyt. Maioranam repentem verticil-
laram.

MARO PLANTA PEREGRINA

odoratissima.

CAP. XVIII.

A Trīginta
iam an-
nis plantę
fragmen-
ta habu-
imus missa
Valerando
Dourez ex
Italia, non
memini-
mus à quo. Li-
gnosi sunt ca-
les, densã
lunagine ob-
siti, in ramos
oppositos di-
dūti, folia è
geniculis bina
ex aduerso sita
proferentes,
tota tomento-
sa, Maioranæ
fatiuæ foliis

paria, aut etiam paulò maiora, cinerei coloris,
crassiuscula, odore fragranti, sapore vegeto, ad
Camphoram accedente, sed cum gratia aromati-
ca, acri, & subamaro.

CLINOPODIUM QVIBVSDAM,

Mastichina Gallorum.

CAP. XIX.



Maioranæ
instar fru-
ricat, imò in-
terdum in bi-
cubitalem ex-
crescit altitudi-
nem, multis
ramis brachia-
tum, per quos
folia ad Mari
Cortusiam fo-
lia accedentia,
minùs cãdida,
paulò maiora,
inter Thymii &
terpylli media,
sapore acri
prędita, mi-
nùque vt mihi
videtur amaro:
ad nodos & in
extremis ramu-
lis ex mucosis verticillis emicant fl. sculi albi:

Descriptio

radix subest lignosa. Odor gratus cum aliqua
grauitate.

Tragoriganum Dioscoridi, & Heracleum O-
riganum Plinio, collatis vtriusque delineationibz,
in neutro satis exactè designatis, ea erit herba,
quam vulgus nostrum (inquit Ruell.) Mastichi-
næ herbæ cognomẽto serit in hortis, frutice Ser-
phylli vel Origani, coliculis ramisque non dissi-
milibus, foliis Samplici, flore paruo odorato
in umbella, in qua propendent incani hircorum
villi, vnde dictum Tragorigani nomen existimo,
odore Samplicis non cedit. Studiosè quẽ nuper
in hortis nostris cepit seriri, & vt nouæ rei, nouo
officinis indito nomine, quoniam lentore quodã
interdum madescit, Mastichinam herbam cõ-
perunt vulgò nominare, aut quodd iucundum Ma-
stiches spiret odorem. Quod pinguibz locis v-
bertate foli lætiùs affurgit, latiore, glutinosò-
que folio vestitũ, tunc Samplicis folium repre-
sentat. Si ieiuno prodeat sitis, tenuius, foliis &
colibus Serpyllum potiùs videtur æmulari. Alter-
rum syluestrius, quod propter sepes nascitur, fo-
lio Samplicis, multò maiore, caule sesquipeda-
li, comante supra cacumen muscario, in quo flo-
res emicant purpurei. Vtrumque iucundo o-
dore placet & coronis inseritur. Sed hæc loci po-
tiùs, quàm naturæ discrimina sũnt. Hæc Ruell-
ius de Mastichina Gallorum, quæ si noua res est
& Tragoriganum, velim eum annotasse, vbi nam
locorum Alterum syluestrius prouenit, cuius di-
scrimen potiùs loci, quàm naturæ.

Dodonæus Marum esse negat, & Clinopodiũ
decernit. Clinopodium Dodonzi vocat Gesn.
hort. itẽmque Maron Ollingeri. In cat. pl. Tra-
goriganum Dioscoridis. Rob. Const. apud A-
matum Galeni & Pauli Amaracum, quam lin-
guã gallicã Masti dici, ab aliis verò Marum esse
Dioscoridis credi, refert, quorum tamen opi-
nionem non approbat.

Tragori-
ganum Di-
oscoridi. Orig.
Heracle-
um Plinio
Mastichi-
na.

Mastichi-
na cur di-
scit.

Tragorig-
alterum.

Ruell sa-
natur.

Clinop-
Dodonæi
Gesneri.
Amaracum
Galeni.

Marum
Lobelia.

Marum tamen esse contendit Lobelius. Ait enim in Adu. p. 213. Marum, est *Mastic* Gallorum & Anglorum. Regi Thraciae, cui nomen Maroni esset, sunt qui Mari herbae appellacionem acceptam tulerint: verum tamen potuit etiam ab Amaraco per apocopen dici: utpote cum Amaraci species videatur Marum, adeoque tantopere affine sit ut multi hodie Maioranam legitimum esse Marum in literis miserint: iidemque ausi sint Marum receptum, siue *Mastic* Gallorum decernere Clinopodium: quae tamen herba parum Clinopodio congruit: odor, sapor, & color Marum fatentur: eoque Galli vocant *Mastic*, quia odoratior & gravior est, quam Origanum aut Sampuchum, uti Galenus vult Marum, libro de Antidotis. Idem in Obs. p. 265. in Icon. Plant. p. 499. vocat Marum, quæritque an sit Helenium odorum Theophrasti. Figura autem eius est Dodonæi.

Contra Dodon.

Huius meminit Clus. in Hisp. lib. 1. cap. 64. vbi ait: Tragorigani duo genera statuit Dioscorides, quibus per similes duas plantas vidisse memini. Vnam, Tragoriganum i. [Mastichina Gallorum intelligit] quod Castellani Sarilla vocant, incanam omnino. Eadem in Hist. post. vbi figuram ex Lobelio proponit, hæcque præterea addit. Non desunt etiam qui Clinopodium nominent: plerique tamen pro Maro habent, aliqui Helenium Theophrasti esse augurantur, &c.

Sarilla.

Helenium
Theoph.

Apud H. Lugd. p. 384. planta nostra pingitur & describitur pro Maro vero quod Gallos præfertim Andes, & Cenomanos *Mastic* appellare perhibet. Ac denuò describitur, sed sine icone p. 389. pro Tragorigano primo Clusii, siue Tragorigini Dioscoridis per simili planta prima.

Vindicatur
H. Lugd. ab
inuria
Bauhini.

C. Bauhini censura in H. Lugdunensem, iniqua quidem, vindicanda ac ostendenda. Marum, inquit, Matthioli p. 384. Tragoriganum Dodonæi p. 388. utrobique describitur. Tragoriganum primum Clusii, describitur denuò, sed sine icone p. 389. nulla nisi in floribus colore differentia: hoc candidis, illud subpurpureis, vel purpureis. Item Mari huius Matthioli descriptio reperitur p. 389. sine icone sub Tragorigano altero Penz. En vnde herbae figurae duæ & descriptiones quatuor. Sed eni inultam animaduersionem in H. Lugdunensem. Ecce duplicem lapsum leuiter centis C. Bauhini. Marum Matthioli p. 384. itemque Tragoriganum alterum Penz., est Marum Coriuli. Tragoriganum verò Dodonæi, est Tragoriganum nigrius. Sætis ita credo censorem, Leonem stimulasse.

C. Bauh.
duplici
lap-
sur.

Maiorana
Mastichen
redolens.
Varietas.

C. Bauh. phyt. dicitur Maiorana s. siue *Mastichem* redolens. Et hanc *Sampuchum* Dioscoridis & Theophrasti credidit. Ludit foliis modò longioribus, modò rotundioribus, modò angulosis hederæcis, quemadmodum Luteriæ in hortu Robini hortulani Regii se obseruasse scribit. Item: Tragoriganum g. siue angustifolium primum. Cur separat frater?

C. Bauhin.

Marum Tab.

Locus &
tempus

Tabern. vocat tam in Icon. quam in Histor. Marum, *Amberfrut.* Clinopodium Dodonæi Luteriæ *Mastich* nomine mihi misit frater C. Bauh. Multis annis autem durauit Montbelgardi in orto Ill. E. C. ramulis propagatum, flores Augustò & Septembri, semen nondum maturuit apud nos. Lugduni colui in orto & Geneuæ: Montpelii & Luteriæ, ac etiam Bisantii magnos fructus obseruauit. Floret autem Clusio, cum Thymo & Stechade multis Hispaniæ locis: prouenit solo arido

& petroso: nunc inquilina facta multorum hortorum, cum in Gallia, tum in Anglia, & Belgio.

FABREGVE.

CAP. XX.

Fabregue Gallis dicta, autore Oliuierio de Serres, odore quodammodo accedit ad Thymum, Satureiam duriorem, & Serpyllum. Sed delicatior est, quam vel Thymus, vel Satureia, ideoque non nisi culta in hortis prouenit: legitur semine: tum plantulae nouellæ Hieme transfacta, semperque Lunâ crescente transplantantur. Hoc peculiare in hac obseruatur, quòd valde gaudeat aquis. Nam & euulsa radicibus & in phialam vitream aquâ plenam immissa, radices spargit & emittit in ipsa aqua, ac haud secus nutritur, quam in terra, sed eâ lege ac omne, ut phiala interdum Soli exponatur non aprico: Ita miraculo videas hanc plantulâ in humidissimo Elemento viuere ac nutrirî, & radice tenè per vniuersâ aquâ, ceu per terram diffundi tantâ tenuitate, ut eas vix per vitrum sit videre.

Nobis nondum constat quam plantam intelligat Oliuierius: lectores considerent, num conuenire possit cum herba *Mastichina* (siue Clinopodio) Dodonæo olim dicta.

OCYMVM VETERIBVS ET IN genere.

CAP. XXI.

Theophrastus sparsim de Ocimo inter cætera hæc habet. Semences hortensium, quibus seri singula solent, tres certè notantur, vna hybernæ, alia æstiuæ, tertia quæ inter eas cadit post hybernum solstitium, siue brumam, ac Ianuario incipit: quas ita appellant, non ratione satûs, sed ortûs, vsûque cuiusque. Tertia verò, quam æstiuam appellant, mense Martio agitur, quâ Ocimum, Satureia, &c. feruntur: germinet etiam desiguntur: nam hoc quoque transfertur, cum ad palum, aut plûs quoque altitudinis venerit, dimidio abscisso: radix huic, ut Betæ, vnica data est, quæ crassa esset, atque descendere: cæteræ verò quæ de latere præternues oerentur, admodum prolixè adhærerent: hæc quidem omniû radicum lignosissima est, sicut etiam caulis. Particulatim verò primum inferiûs, deinde cum ea defloruerit parte, florere superiûs incipit: vnde fit, ut diutius istud floreat, ut Faba: semen cortice continetur: Lactucæ laciugine obducitur. Omnia seminis germinisque largè fecunda: sed fecundissimum omnium Cuminum [Corn. vult legendum *δευκων*] est. Peculiare etiam quod de hoc dicunt: imprecari namque & maledicere ferendo oportere affirmant, quòd læriûs, copiosiusque proueniat. Soli expositum transiit in Serpyllum, quod superaccedente siccitate fit, &c.

Ocimum non describit Dioscorides. Ex aliis tamen locis colligi potest foliorum eius forma. Ocymoidi namque, Mercuriali, Heliotropio, Solano hortensii (huic tamen maiora & latiora) & Erino (cui minora & parte supernâ diuisa) folia tribuit Ocymi. Ergo qui vel Ocymoidem, vel Mercurialem, vel Heliotropion maius, vel Solanum hortense,

hum hortenſe, vel Erinum nouerit, facile etiam Ocymi folia, qualia eſſe debeant, nouerit. Sed & Acino ſimile dixit, ita ut etiam hinc colligi queat eius forma & qualitas. Floris tandem effigiem Pycnocomi flores, quibus illos comparat, aperte declarant.

Ocymi quoque Plinius diuerſis in locis mentionem fecit. Inquit enim lib. 17. cap. 22. quod in vinea feri Caro iubet, antiqui appellabant Pabulum, vmbra patiens, quod celerrime proueniat. Idem lib. 19. cap. 17. Nihil, inquit, Ocymo fecundius. Cum maledictis & probris ſerendū præcipiunt, ut lætius proueniat. Satum etiam paucit terrā adactā, & qui ſerunt, precantur ne exeat. Et ſic quidem Cornarius hunc locum legendum putat. [*ἀντιμαρ* ſcilicet, non *ἀντιμαρ*, ut falſo voluere nonnulli: id etiam declaratibus Theophras^{ti}. ipſius verbis: quæ quamuis in contrariū trahantur ſenſum: præcipue tamen id demonſtrant hæc verba apud ipſum Theophrastum repetita: *πολλὰ καὶ τὰς τῶν ὀνείων ἀντιμαρ*.]

Eſſe reſert Fuchſius qui ſignificantiſſe per z ſcribendum ducant Ozimum ab *ὄζω* quod redolere denotat, quoniam herba tota ſuauiſſimum ſpirat odorem. Ab eodem odore quod Baſilicā & regia domo dignum ſit, Baſilicum hodie nuncupari ſoluit Ocimum, garyophyllatum. Latine autem & Græcè rectius Ocimum quā Ozimum legi volunt Monachi: deriuantes forte à Græco verò *ὄζω*, quod valet cito, quod celerriter proueniat: vel propterea quod citet alium bubus, cum ſcilicet illis datur, ut purgentur: quod genus Pabuli ſunt fegetes virides ſectæ antequam gerant ſiliquaſ.

Vnde duo conſtat eſſe diuerſa Ocymi genera, alterum pabuli genus, alterum in hortis nalcens: de quo ait Palladius lib. 5. cap. 3. Nunc Ocimum ſeritur, cito naſci dicitur, ſi ſtatim quum ſeueris, aqua calida perfundas:

Rem miſam de Ocymo Martialis affirmat, quod modò purpureos, modò albos flores, modò roſeos pariat. Et ſi ex eo ſemine frequenter ſeratur, modò in Silymbrium mutetur. Theophrastus 5. de cauſ. pl. hoc, ut dictum, aliter narrat, & cauſam ad Solem reſert.

Sunt autem Ocymi ſpecies multæ Cornario. Nam & magnum & paruum, & medium oſtendit: & quoddam etiam ſilueſtre. Et de hoc Ocymo Dioſcoridem agere, & Galenum 8. ſimpl. dicit.

Serapio quatuor Ocymi genera videtur agnoſciſſe: Videlicet, *Scexabram* cap. 73. de temp. ſimpl. quod Ozimum Carmenum & Baſilicum garyophyllatum Simon Ianuenſis interpretatur: eſtque Ozimum paruum. 2. *Berengetiſch* cap. 156. quod Ozimum garyophyllatum tranſfertur, ſtat Ebenaſſam autorem: 3. *Berendarog* c. 157. i. e. Ozimum non garyophyllatum, ſed aliud commune, cuius meminerit Dioſcorides in capite de Solatro domeſtico, cum dixit: folia habet coloris nigri, ſimilia foliis Berendarog, ſed maiora & latiora. 4. *Amehim* cap. 175. quod etiam Amehim, & Amachim nuncupatur, & apud Romanos Selichi, & dicitur eſſe Ozimum domeſticum, habens lata folia, nominariſque in Seni Ozimum Nabathi: habere verò ramos virides quadrangulatos: colorem ſloris eſſe album: ſemen Ocymi.

Græcè *ὄζω*, & per *o* prima ſyllaba *ὄζω* Græci appellant: nonnulli etiam *ὄζω*: Latini Ocimum. Diſtinctum ab Ocymo, pabuli genere, quod ad diſtinctionem huius per *o* ſecundā ſyllabā.

ſcribendum moniet Dodonæus: ſed & per *o* etſa hoc, & maxime odoratum ſcriptum reperitur. Recentiores *Βασιλικόν*, i. e. Latine Regium & Baſilicōn: itēque Herbam baſilicam & Herba regiam quoque nominant. Germ. Baſilien & Baſilgen. Belgæ Baſilicom: Galli Baſiligi. It. Baſilico. Hiſpan. Albahaca. Angli Baſil. Boh. Baſaltſa. Hung. Boſolicom. Germani præterea alicubi *Blümlin der lieb*: i. e. Florem amoris appellant: & ruriſ alicubi corruptā hanc latinā appellatione, *flormor* ac etiam *floramot*, quo tamen nomine proprie *Amaſanthum* Vicienſes Auſtriaci vocant.

Ocimi demum & Ocimaſtri nomine ſequentes plantas exhiberi nouimus. Ocimum odoratū ſiue Baſilicum, cuius aliquot genera reſcenſunt. Ocimum magnum, citratum communiter appellatum, & garyophyllatum. Ocimum medium vulgariſ album & nigrum, Ocimum non garyophyllatum. Ocimum minimum, Ocimum Carmenum Monachi dicunt, Serapionis paruum. Ocimum Sancto-Mauritanum, latum, criſpum, maximum, maculatum. Ocimum Indicum maius, album, criſpum, circinatum. Ocimum Indicum Cluſi. Ocimum Aegyptiū longioribus, anguſtioribuſque foliis, Rihau dictum. Ocimum garyophyllatum Monachorū, ſiue Acinon Columnæ. Acinon Fuchſii. Menthā verticillatā aquaticā. Meliſſa quibaſdam dicitur Ocimum citratum & Ocimum fluuiale. Ocimum etiam dicitur Silymbrium. Naſturtiū aquaticum. Ocimum aquaticum quorundā Herbariorum, aliorum Herbarum Lactoris, hoc eodē libro Scrophulariam maximam radice fibroſā inſcriptum. Ocimum etiam dicitur hæc: Chamaemyſſine. Scrophularia maxima. Hieracium Sabaudum. Eſula dulcis. Noli me tangere. Et Ocimaſtram vetrucolum.

Planè verò explodenda videtur Loniceri opinio, quod non ſine errore ridendo Fagotriticum, Ocimum eſſe ſimile exitimet, cum pabuli genus ſit: ut capite de Fagotritico ſuſſus hac de re diſſeruiſſus.

OCIMUM ODORATVM SIVE Baſilicum.

Cordus in diſpenſ. ſupra diamoſchum dulce Meſue, vocat Ocimum quoddam citratum, non Meliſſam, ſed ſpeciem quandam Ocimi, ſiue Baſilici, odore Meliſſæ, aut Citrei mali, cuius defectu Garyophyllatum hoc Ocimum ſumi poſſe ait.

Tragus hunc in modum de eo diſſeruit. Tria ſunt genera Ocimi, quorum duo ſatiua ſunt, ut quæ in hortis quotannis in Maio ſeri oporteat: tertium ſilueſtre nobiliſſimum atque pulcherrimum, folia Amaraço ſimilia, paullo tamen maiora, odoris ſuauiſſimi, præſtantiffimique. Itē alibi: Ocimum quod odoratiſſimum eſt & garyophyllatum cognominatur, Baſilica eſt ſatiua, ſeu nobilis, & à nobis capit Dioſcoridis aſcribitur, quicquid dicat Matcell. Virgilius, qui Epimætron quo de Theophrastus lib. 3. cap. 11. & Acinon, vnam & eandem plantam eſſe iudicat. Ac tandem concludit Baſilicam noſtram diuerſiſſimam eſſe ab Ocimo veterum.

Carol. Stephanus de re hortenſi libellum conſcripſit, in quo inter cætera Ocimum partim ad Lenticulam, partim ad Viciam reſerre videtur.

Baſilicum.

Acquiboc

Ocimum
citratum,
Ocim. garyophylli.Ocimum
nobiliſſimum.

quâ rectè ipse viderit. Suspiciamus, inquit post
fulam dissertationem Monachi in Mesuem, hoc
Basilicium gariophyllatum esse Ocinastrum Dio-
scoridis, quod 3. lib. describit, quodque Acinos, si-
ue Aconos & siluestre Basilicum ab aliis dicitur.
Diximus autem quod est in 3. libro, quoniam in
4. aliud tradit, quod est alterius herbæ genus.

Ozimi E- Esse refert Fuchsius qui significantius per Z
tymon. scribendum ducant Ozimum, ab *o*, quod re-
dolere denotat, quoniam herba tota suauissimum
spiret odorem. Ab eodem odore quod basili-
câ & regiâ domo dignum sit, Basilicum hodie
nuncupari Ocimum garyophyllatum.

Sario & Ocimum, inquit Cæsalp. quod vulgò Basili-
culura. cum appellatur quotannis semine seritur
post æquinoctium vernum inter æstiuâ: nam
Hyeme perit: gaudet Sole & aqua: herba ad-
modum odorata: gustu subacris: recipitur inter
olera cruda & cocta & in condimenta: eius tria
genera magnitudinis differentia communi om-
nium consensu habentur, vnum latifolium, al-
terum tenuifolium, & tertium medium. Diosco-
rides Ocimum tanquam vulgò notum non de-
scribit, ex attributis tamen videtur intellexisse so-
lum illud genus quod lato folio constât, vt patet
in Ocimoide, Heliotropio maiore, Mercuriali,
Solano hortensi, quorum folia Ocimo compa-
rantur. Theophrastus cum ait Ocimum transire
in Serpyllum, videtur genus Ocimi pumilum
innuere. Plinius præter latium siluestre quo-
que tradit, sed cum neutrum describat in-
certum est quod siluestre apud ipsum sit,
nisi Acinum intelligat, quod Ocinastrum
appellari ait. Arabes quatuor plantas osten-
dunt, quas interpretes Ocimum vocant. V-
num Ocimum garyophyllatum, quod colligitur
mense Iunio. Hoc pumilum dicere, nisi tem-
pus collectionis seminis obstitet: propiatur e-
nim in Autumnum, vt cæterorum semina. Hæc
ille. Considerandum autem an collectio intelli-
gatur de semine, an de herba: si de herba tempus
nihil impedire videtur in locis calidis, Iunium
mensem existimamus.

C.E. not. Geln. hort. Ocimi, quod vulgò Basilicum nomi-
nant, id est, Regium, maioris, aliud garyophyl-
latum & aliud citratum dicit.

Inquirendum quod vult C. Bauh. in phyt. an
Vattonis Ocimum idem sit cum nostro Basilico.

OCYMVM MAGNVN.

Descriptio



Dv plo tri-
maius huic fo-
lium, quàm
vulgati, oblo-
gum, raris cre-
nis serratum,
pallido virore
præditum, aur
rubrum, odo-
re suavi, Ci-
tri vel Garyo-
phylli, flores
spicati, albi vel
rubri.

An est hæc,
Basilica maior
Tragi. Quod
quidem ico-
nem attrinet, ea
non malè qua-

drare deprehenditur. Descriptio autem eius,
quam antè posuimus, videtur esse Basilici medi.
Monachis in Mesuem commentantibus est O-
cimum citratum siue Basilicum, quod paucis no-
tum esse dicunt. Fuchsius verò & Taberna-
montano dicitur Ocimum Magnum.

Dodon. gall. eandem cum Fuchsi iconem ha-
bet [sub Ocimi maioris titulo, cui flores pur-
pureos, ac etiam albos concedit.] Ocimum
inquit Matthiolus, quemadmodum odoratissi-
mum, ita & omnibus notissimum est. Namque per-
rare sunt vbique edii fenestre, petraque eoa-
nacula, ac viridaria, quæ Ocimo non redolent,
vt pote quod frequens feratur, & foueatur in si-
gularis vas. In Italia hoc æuo Ocimi tria ha-
bentur genera. Quorum primum (magnum)
foliis astringit Amarantho longè maioribus, latis,
longis, ac crassis, citræ malo similibus, à quorum
effigie ipsum facile vocauerunt Arabes Ocimum
citratum, quo modo ipsum Mesues nominat. Lat.
verò in tol. hoc titulo pingit Ocimum tertium
maximum.

Lobel. in Adu. vocat Ocimum maximum Car-
ryophyllatum ac Citratum: Itemque Obs. p. 268.
in Icon. Plant. p. 503. (quibus in locis figura De-
donæ: Rarius istud ait, & regionum calidarum
amantius, cuius folia, cunctaque planta quadru-
plo maiora, odora, Caryophylli cum Citro
confusa iucunditate, semine, nec vlla sui parte alio-
qui diuersa.

Cum pleræque plantæ noctu vtilius irrigen-
tur, Ocimum tamen affusa aquâ interdum & sub
Solis æstu proficere plurimum solet, vnde contra
aliarum plantarum naturam magis gaudet cali-
dâ irrigari, quàm frigidâ, cuius rei doctissim. Co-
stæus hanc asserit causam: An, inquit, quia imbec-
cilla sit planta? imbecillitatem enim id prodiit,
quod nili frequenter irrigetur, tabescit. At con-
tra tepor laxando corpora, imbecillitatem po-
tius augeat, quàm minuat. Neque Ocimi imbec-
cillitas ob caloris esse penuriam potest, in quo
caliditatem vigere insignis odor, persuadet. An
ergo potius Ocimi imbecillitas ob laxitatem est
substantiæ, cuius causa, quia profusior sit innati
humoris dissipatio, propterea celeri quoque &
assiduâ opus illi est alimenti penetratione, hæc
autem sit beneficio teporis. Non est hoc pro-
fectò à vero dissimile. Sic ille lib. 2. de natura
stirpium cap. 9.

Idem perhibet Ocimum Æstate tota in a-
qua non locus ac in terra, virere, florere, & se-
mina quoque interdum proferre, quod sanè ad-
miracione non caret. Refertur apud Carda-
num, Ocimum primâ lusâ tritum, & in ol-
lam nouam inditum, sub plenilunio ab altero
capite flores emittere: quod si duplicato tem-
pore sub terra defodiatur, stitiones generare,
cùm aliâ dictum sit scorpiones.


Libet hic inferere lepidam historiam de hac
planta Augustini Iustiniani Genuensis lib. 6. Frâ-
ciscus Marchio Iurisconsultus missus à Genuen-
sibus Orator ad Ducem Mediolanensem, cum eum
non veller audire, nec pactis conuentis cum Re-
publ. Genuensis stare: Captâ occasione obtu-
lit Duci manipulum herbæ Basilici. Qui admi-
rabundus, quid sibi hoc donum veller quæsiuit.
Cui ille responder: Eiusmodi proprietatem huic
plantæ inesse, vt leniter & suauiter contrectata
præbeat gratum odorem, nimis autem duriter
compressa & attrita, tandem produceret scorpi-
os: atque ita simile esse ingenium Genuensium.

Dux

Dux ingenuoso hoc responso admodum delectatus, & sententiam priorem mutauit, & Legatum honorifice dimisit. Scorpiones autem sub fictilibus, in quibus Basilicum colitur, libenter stabulari, sæpius Venetiis obseruatum. Ocimum incipiens putrescere foetet, inquit Bodinus, absoluta verò putredine bene olet.

Ocimum siue Basilicum magnum Montbelgardi in horto Ill. E. C. prouenit duplex, rubrum & album. Ex Italia nobis attulit siccas plantas C. Bauhin. hoc titulo: Ocimum variabile Italis: in eo apparebant maculae purpureæ. Cum summitatibus albicantibus & rubentibus vidi Montpelii in hortis, & Genevæ florens Iunio: Basilicæ adhuc Septembri.

OCIMUM MEDIUM VULGATIVUM & nigrum.



Dodranta-
lis est plā-
ta, pluribus ra-
mis stipata,
quadratis, non-
nihil rubenti-
bus, subhirsu-
tis: folia Pa-
rietariae, mino-
ra, glabra, aliās
per ambitum
incisā, aliās mi-
nimè, ortu è
geniculis ad-
uerso, odore
fragrantis, sa-
po re nullo ex-
celente: flores
verticillatī, in
spicam longi-
usculam diges-
ti, suauiter len-
tes, colore albo purpurascēte, labello longius-
culo, angusto, cui ex aduerso respondet silium
vergens in quatuor lacinias diuisum solum, pro-
minentibus è rictu staminulis albidis cum stilo
purpureo: radix lignosa, nigra, fibrata.

Existimamus apud Tragum Ocimum hoc de quo agimus hoc loco, dici Basilicum secundum, quamuis icon videatur demonstrare magnum, de quo antè.

Existimamus apud Tragum Ocimum hoc de quo agimus hoc loco, dici Basilicum secundum, quamuis icon videatur demonstrare magnum, de quo antè.

Mittholus vocat Ocimum secundum, siue medium, & Ocimum à Dioscoride descriptum; Ocimum non garyophyllum Serapionis.

Lob. in Adu. describit duplexque tradit, hoc modo. Quauis antiqui excusi, tum calamo exarati, codices, vbiue Ocimum, non Ocimum aut Ozimum habeant: tamen quia herbula hæc eximie odora cerebrum feriret, & sternutamenta eiceret, eam primulūm Ozimum vocitatum i. e. odorem fuisse, naturæ & doctis assentiri par est, Mirum enim quantæ fragrantia sit Ozimu Trogodyricum, & quantæ syuestre nascatur iamdiu notum est. Nec ocyūs cæteris quamplurimis o-
riti certum: quare id Ocimum farraginis legu-
minum tribuendum fuit. Ocyū autem vel O-
zimi, cuius varietates tres notissimæ vel mulier-
culis, quas odoris & oleris gratia in figulinis va-
sculis colunt aut in puluillis areolisque viridario-
rum: frequentissimum autem Ocimum vulgare,
siue medium dictum, quod quidem duplex odore
habetur: vnum quippe vilis & abiectius, odo-

T. N. III.

rem quidem spirat suauem, sed Apiastrum mistum: radicem & cauliculos pedales & folia Mercurialis, Parietariae, vel Agriorigani, sed nigriora mit-
tit: Rosculis è caliculis verticillatim caulem am-
bientibus: semine pusillo nigricante, quadante-
nus Thlaspi. Alterum nullatenus distat, præter-
quā odore gratiore, & cordi amabiliore, qui cor-
ticem Citri mali redolet: idcirco citratum vocit-
atur vulgus, non à Citri folio, vt falsò scribunt
quidam. Hæc ille, qui in Obl. pag. 268. in Icon.
Plant. pag. 50. Ocimum medium vulgatiū pin-
git.

Ocimum hoc, quod Olitoribus medium est; tertium facit Cæsalpinus idque Acinum esse non dubitat.

H. Lugd. vnius plantæ duas proponit icones: *H. Lugd. not.*
Vni titulus p. 580. Ocimum medium Fuchsi. Et
huic sunt caules hirsuti: alteri Ocimum medi-
um Matthioli.

C. Bauhin. Phyt. vocat Ocimum 4. siue vulga-
tius, & Basilicum Brunfelsii.

Ocimum medium album & rubrum habemus *Locus*
Montbelgardi in hortis, etiam Ill. E. C. itemque
Basilicæ: est passim in Gallia & Germania vulga-
re.

OCIMUM MINIMUM.



Palmaris
aut paullo
maior est plā-
ta, ramulis cre-
berrimis ligne-
scentibus den-
sè fruticans:
per quos folia
Serpilli aut
Maioranae fo-
lis paria, ex
oblongo rotū-
da, viridantia,
aut rubra, sa-
po re vegetissimo
& suauissimo
Garyophyllo-
rum: st. sculis
exigui, verti-
cillatim per ra-
morum scapos
disponuntur:
radix fibrosa.

Descrip.

Nostri icon quæ sculpta empta minus placet, vt & alia plures. Fuchsius Ocimum exiguum in-
scribit.

Cordeus in Dioscor. nobis videtur hanc intel-
ligere per herbam suo tempore, vt ait, omnimò
incognitam, quam Germani *fraus* Bastien vo-
cant, quā vque Acinum, si non Ocimum garyo-
phyllum fuerit, ipse adstruxerit.

Synonyma

Trago, vt existimamus, in Hist. germ. dicitur
Basilica minor & Baccharis germanica, de qua
antè: Icon tamen non placet. Ejdem in H. Lat. *Baccharis germ.*

Ocimum primum, de quo vide antè.

Autor est Robert. Stephanus Acinum multis
putari, quosdam verò Ocimastrum dicere. h. e.
Basilicæ *saunage*, herbam hanc, quæ in quibusdam
Gallia locis Ocimum minutum appellatur. Ali
nomen siluestris Ocimo minuto non conuenit.

Est hæc Basilicum illud aliud, siue Ozimum
leptophyllum Monachorum in Mesuem com-
mentantium, quod vulgò Basilicum minutum
appellant: quandoque multi tenent esse Basilicu

A 2 2

Basilicon garyophyllum ex eo, quod Serapio titulo de Ocimo gariofilato dicit: Et folia eius sunt parua &c. sed hi errant, & est potius Ocimum eius carmenum, &c. vide titulum, de Ocimo odorato, siue Basilico.

Sunt aliqui, inquit Martholus, qui Acinum eam Ocimi speciem existimant, quam vulgò [nos Itali] vocamus Basilico gentile: sed horum opinionioni refragatur Plinius lib. 21. cap. 15. & cap. 27. ex quo palam fieri potest, Acinum non esse Ocimum tenuifolium. Idem rursus Ocimū tertium, quod foliis conset minutis atque angustis, si-

que ceteris odore fragrantius, Italici vulgò appellatur Basilico gentile. Huius [sicut & ceterorum] meminit Serapio, vocauitque garyophyllum, quod ceteris tum minutius, tum odoratius habetur. Idcirco videant quæso Patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios scripserunt, quo iure, quæue ratione in El. de gemmis se iactent Ocimum garyophyllum hac tempe-

Monachi
hallucinantur.

state primos adinuenisse, cum hoc Serapioni foliis exeat paruis, & caule quadrangulati: Monachis verò foliis Melissophyllo maioribus, per ambitum serratis, & caule minimè anguloso. Qua in re eos, pace sua, aperte hallucinatos putauerim. Nec equidem credendum arbitror, quod de alio Ocimi genere intellexerit Mesues, quàm de tertio illo genere in deliciis habito, de quo dicimus. Nam cum ceteris odoris fragrantia præster, nulli dubium est, quin in roborandis cordis ipsius viribus ceteris sit longè aptius, atque etiam præstantius, ut quod in electuarium de gemmis addatur ad cordis affectus.

Amator credidit Basilicon minutis foliis ornatum [ita vocat] Acinum esse. Cuius opinionioni refutatur Rob. Constantinus.

Sed & Gelsius eundem cum Amaro sententia esse deprehendit. Vocat enim in cap. 1. Ocimastrum, Acinum, & Ocimoidem ex quorundam opinione, quam non damnat. Idem de hort. Ocimi siue Basilici paruum genus, crispum, & glaberrimum.

Lobel. in Aduers. Ocimi minimi Amaraci figurâ, caryophyllati titulo describit (eodemque in Obs. p. 269.) & postea capite de Acino dicit: Quam Acino florem non negasset Dioscorides, Ruellius Ocimum, siue minus Basilicum, posse esse Acinum, ni obstat Theophrasti Plinique mutila historia, dixisset: Senensis hæc accipit, & quasi sua obstrudit, exprobatque doctis, nec interea lectori quidquam commodi molitur: explorato Ocimo illo minino. In Icon. Plant. p. 504. appellat Ocimum minimum Garyophyllum.

Crediderunt ergo, ut patet, recentiorum plerique tenuius Ocimum Acinum siue Aconum esse: sed cum non hirsutius Ocimo solum, quin etiam glabrescat, Acinum esse nequaquam poterit. Id verò quum Ocimum garyophyllum existimant esse Monachi, suam profectò non agnoscunt inscitiam. Quare caryophyllati vice, minutius Ocimum, succedaneum omnibus fiat: ne nos ipsos hisce implicantes, Brassiuolo, ac Marthiolo similes, maius flagitium perpetremus.

Ocimum minimum vocat Camer. hort. album & nigrum. Tabern. Ocimum caryophyllum minus. C. Bauh. phyt. Ocimum 5. siue minimum. H. Lugd. duas figuras habet p. 681. vni titulus est, Ocimum caryophyllum. Et hæc nobis valde placet: alteri titulus, Ocimum paruum. An Cæsalpini Basilicum nanum siue pumilum?

In horto Ill. E. C. Montbelgardi habuimus

Locus.

Ocim. mi-
nimum.
Ocim. ga-
ryophyllati
minimum.

Marth. ca-
natum.

Amator
Diosc.

Monachi
hallucinantur.

Ocim. ga-
ryophyllati
Serap.

Errorum
multorum
Ocim. car-
menum
Acime non
est.

Ocimum minus, ac alibi sæpius etiâ obseruatum.

Traditis ita vulgarioribus Ocimi speciebus, superest ut earundem vires & vsum adscribamus. Ocimum, ut tradit Dioscorides, copiosiore cibo oculorum aciem habet, alium mollit, flatum mouet, vrinam pellit, lac euocat: agrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est [græci cod. pulmonum vocem non habent, nec etiam Cornarius in versione sua expressit, sed eam redundare ait ad inflammationes additam.] Draconis marini & scorpionis ictibus per se prodest, & cum vino Chio oculorum doloribus (quæ aliter ex græco sunt intelligenda, Draconis ictibus, per se autem in vino Chio, &c.) Succus visus caliginem abstergit: distillationes exsiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatque naribus haultum subinde mouet stercumentam, quod idem herba efficit. Sed oculis premi necessum est, cum stercumentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censcant: quandoquidem manducatum, & in Sole positum vermiculis creat. Aphri autem adiciunt, si feriantur à Scorpione qui Ocimum ederunt, nullo confictari dolore.

At non solum ut noxium in cibis, sed & ut in medicina inutile & perniciosum, Veterum quidam grauitè repudiauerunt, quod declarat Plinius his verbis. Ocimum quoque Chrysippus grauitè increpuit, inutile stomacho, vrinæ, oculorum que claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iocinoris vitia: ideoque capras id aspernari. Hominib. quoque fugiendum censet. Addunt quidam tritum si operiatur lapide scorpionem gignere: commanducatum & in Sole positum vermes asferre. Aphri verò, si eo die tritum quispiam à scorpione, quo dedit Ocimum, seruari non posse. Quinundò tradunt alioqui manipulo Ocimi cum cancris decem marini, vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones ex proximo omnes: Dioscorus in Empiricis, etiam pediculos facere Ocimi cibum. Secuta atas acriter defendit id esse capras, & scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque venenis mederi ex vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque compertum deficientibus ex aceto odoratum salutare esse: item lethargicis & inflammationis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex vino, stomacho quoque vile, inflammationes & ruetum ex aceto dissolvere sumptum. Aluum sistere impositum, vrinam ciere. Sic & morbo regio, & hydropicis prodesse, choleras eo, & distillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam cæliaci Philistio dedit, & coctum dysentericis, & colici Plistonici. Aliqui & in tenefimo, & sanguinem excreantibus in vino, duritia quoque præcordiorum. Illinitur mammis, extinguitque lactis prouentum. Auribus vtilissimum infantium, præcipue cum adipe anserino. Semen tritum & haultum naribus stercumentum mouet, & distillationes capiti quoque illitum. Vulsus purgat in cibo ex aceto. Verrucas misto atramento lutorio tollit. Venerem stimulat, idè etiam equis asinisque admissura tempore ingeritur.

Auicenna etiam in libro de viribus cordis à Dioscoride dissentire videtur: scribit enim Ocimum sanguinem turbidum & melancholicum generare: quoniam superuacua humiditas quæ in ipso

in ipso est, parit inflationem in venis.

Nec aliter videtur sensisse Galenus, cum ait. Ocimum ex secundis est ordine excafacientium, habet autem recrementitiam humiditatem, proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Ceterum foris illitum ad digerendum, & concoquendum utile est. Et 2. de alim. Ocimo plerique ut obsonio vtuntur, ex oleo & garo efictates. Vitiosi autem est succi, quod impuit quodam, vt falsa de eo prodiderint, affirmantes quam celerrime paucis diebus scorpiones generare, si tritum in ollam ad Solem calefactum fuerit, quod falsum est. Verè autem dixeris olus stomacho esse noxium, prauique succi & concoctu difficile.

A parte Dioscoridis videtur itare Simeon Sethi. Basilica Ocima, inquit, olfacta cor & caput. Si aqua irrigantur, humidiora sunt, & somnum conciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succurrit. Animi morem ex atra bile ortum, in hilaritatem & læticiam mutat.

Ex sua & aliorum sententia ferè ad omnia ea ad quæ Dioscorides, commendat Serapio. Hæc inter alia habens. Quando reperit Hunaim aliquos ex antiquis Physicis dicentes, quod stringit ventrem, & aliquos qui dicunt, quod laxat, videtur ex hoc quoddam habere in se duas virtutes contrarias, sicut caules. Quando ergo inuenit virtutem expulsiuam fortem in corpore, adiuvat ad fluxum. Sed quando inuenit virtutem retentiuam fortem, adiuvat ad retentionem, idè quia in eo sunt duæ virtutes, sc. virtus laxatiua, & stiprica, sed fit sicut dictum est.

Scribit Brasauolus tantam de Ocimi viribus inter Plinium & Dioscoridem esse controuersiam, vt alterum ipsorum errasse dicendum sit. Quippe ex Aphris tradit Dioscorides, quod si à scorpione feriantur qui Ocimum ederint, nullo dolore affici. Contra verò Plinius ait, si eo die feriantur quispiam à scorpione, quo edierit Ocimum, feruari non posse. Qua in re lectionis impatiens deprehenditur Brasauolus, inquit Matthiolus, Plinius refragatur eorum placitis, qui Ocimum tam acriter damnant. Precipitem ergo Brasauolum appellat Matthiolus: quia tantam de Ocimi viribus, inter Plinium & Dioscoridem controuersiam esse scribit, vt alterum ipsorum errasse dicendum sit, propter eos qui à scorpione icti sunt: quod si patienter vniuersum Plinii caput expleuisset, cognouisset vtique Plinium illorum sententiam refellere, quam in capitis initio proposuerat. Quantum autem impatiens, ne dicam temerarius (Apollinis verba sunt) eo magis caligauerit Matthiolus, Brasauoli verba pensculatiùs expedientes facillimè diiudicabant, &c. Vides ergo, addit, in referendis Ocimi facultatibus, non parum inter se dissentire Dioscoridem, Galenum & Plinium, ita vt vix pugnantibus illorum sententias conciliare possis. Quare consultum erit vt hic, quemadmodum in aliis etiam, Galeni amplectaris opinionem, qui quodammodò inter hos medius interiectus, commendat exteriorum eius vsum in iis, quæ *ocimum* & *diaporphum*, s. e. c. coctionem & discussionem desiderant: damnat verò internum, ob excrementitium humorem, quo grauatur & lædit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens, pleraque alias Dioscoridis & Plinii contradictiones tollere poteris.

Ocimi vulgò dicti vires Tragus ita perstringit. Duæ nobiles & odoratæ Basilicæ hortenses vitio & iniquitate scriptorum indoctorum penè in cōtempnum deuenere, idque eo nomine, quod (vt illi affirmabant) non solum inuiles, sed & ven-

tibus noxiæ sunt. Quæ sententia minimè recipi debet, quippe quæ erroris plena sit: nam qui ita sentiunt, Ocimum Catonis, cum hoc nostro confundunt, atque ita decipiuntur. Nostra enim Ocima garyophyllata, siue Basilica, temperaturæ sunt calfacientis, quamobrem facultatem obtinent resoluendi ac discutiendi, viscosos lentosque pulmonis & matriæ humores, quare vtiliter vtinque adhiheri queunt. Basilici herba viridis fronti alligata, capitis dolores sedat, idem præstat aqua eius distillata: siccata non aliter atque Amaracus & Rosmarinus in cibis vsurpari potest. Eadem masq̃ impolita quousque deferbuerit, vinum odore & sapore iucundissimo commendat, vtque Apianum, seu vt vulgò vocant, Muleatellum, n. referat, efficit. Basilicō vino decoctum, suspiriosis medetur, pellit inueteratam tussim, humoresque crassos discutit, mane & vespere potum, vinum ciet, nenses proritat, vt Pulegium. In deflectionibus & fomentis muliebribus Pulegi & Mentha facultates obtinet. Semen per modicam aquā rosacā maceratum in succum albumi seu gummi quodnam resoluitur, quod præsentaneo est remedio, inflammationibus, exulcerationibus, & aphris oris, nec non laborum scissuris & verrucis mammarum illitum. Sed & aqua non tantum omnibus inflammationibus oculorum, capitique, igni etiam sacro, qui tumori mammarum & pudendis adesse solet, auxilio est. Semen & aqua distillata sumpta, cor confortant, & aduersus Lipoplychiam faciunt.

Ex eorum genere, quæ sanguinis è naribus profusum sunt, inquit Vesalius, est succus Ocimi maioris, in quo Camphora læuigata sit, & nariibus ita immixtus. Sunt qui tradant Ocimi substantiam adstringere, succum verò laxare. Non autem videtur verisimile quod asserit Hollerius cuidam Italo ex frequenti odoratu Basilicæ herbæ natum scorpionem in cerebro vehementes & longos dolores ac mortem denique attulisse. Sed vermes in cerebro generari Ocimo etiam non odorato apud omnes in confesso est.

OCYVM SANCTO MAVRITANVM, latum, crispum, maximum.



AD cubitalem altitudinem crescit, quadratis caulibus, raris pilis vestitis. C. Bath. quos aduersi rami diuidunt: folia ex longis pediculis ad articulos circinata circumseriptione, ampla crispa, fimbriata, atro-virentia, aut rubro admixto maculosa, fragrantis odoris: flores Ocimo vulgari similes, verticillati, in spiram digesti, qui auctore C. Bauhino ex candido rubescunt: semen paulò maius, nigrum, ex rotunditate oblongum, foliaceis capitulis inclusum.

Synon. Est hoc, illa Ocymi differentia, sub nomine Basilici Indici, vel potius Hispanici ad Camerarium, vt ipse in horto testatur, ex Italia missa, ferratis & crispatis foliis, subcæruleis, vnde crispum Basilicum meritò cognominatur.

C.B. not. Columna vocat Ocimum exoricum foliis purpureis maculis infectis fimbriatisq; C. Bauh. apud Matth. Ocimum latifolium maculatum, vel crispum, à nemine pictum, elegantissimum, primū. Præterea in phyt. Ocimum latifolium Cæsalpini. Nos quidem existimamus Cæsalpino hoc Ocimum Indicium incognitum adhuc fuisse.

Locus & Tempus Primò nobis Vespanti visum vt & Argentinae anno 1593. antequam aliquid de eo à quoquam scriptum obseruauerim. Ex India autem in Hispaniam, inde in Italiam & Germaniam semen transmissum.

OCIMUM ÆGYPTIVM LONGIORIBUS foliis, Rihau dictum.

CAP. XXIII.

Descriptio Ocymus, inquit Prosper Alpinus, in Ægypti Alexandriae viridariis copiosissimus crescit ad altitudinem trium & plūs cubitorum, foliis nostratis longioribus, tenuioribus, colore rubro fuscis, odoremque eximium spirantibus. Suauitate enim odoris nostris omnibus præferendus meritò videtur, ob quem illi hanc plantam *Rihau* appellant, quod idem est, ac si dixeris, odorem, ita vt hic Ocymus præ odoris iucunditate eximiā odor per excellentiam ab iis vocetur.

Rihau.

Vius.

Ocymi garyophyllati plantā odoris causā iuvantur: medicos verò vius apud eos ipsa paucos habet, qui aliis multis præditi sunt. C.B. phyt. vocat Ocimum 2. siue garyophyllatum roazinum.

Ocimum Indicium.

Describit etiam ac depingit Ocimum Indicium Clusius, quod Germanicè primū anno 1590. innotuerit, ac reliquorum magna sit varietas.

CLINOPODIVM VETERIBVS.

CAP. XXIV.

Ex Diosc. Clinopodium frutex est parvus, sarmentosus altitudine duorum palmiorum. Nascitur in petris. Folia Scapyllo similia: flores similes lecti pedibus, ex intervalis, Marrubio [ocymus] similes. Bibitur herba & decoctum ipsius, aduersus venenatarum bestiarum morsus, conuulsa, rupta, vrinae stillicidia. Ducit etiam menses & fetus. Pensiles quoque verrucas excutit per dies aliquot potum. Aluum [vltima hæc in hoc capite secundum quosdam] abundans, pro quibus in Veneta interpretatione hæc leguntur. Multis experimentis confessum super hoc frutice est ramulos eius ad tertias decoctos, ex vino albo mederi coarctis furore: In quo non parum dissident: sistit idem ad tertias decoctum & potum, non febrientibus in vino, febrientibus in aqua.

Clinopodium, vt legimus apud Plin. lib. 24. c. 19. alii Cleonicium [καλωνικον, Corn. inter suppos.] alii Zopyron, alii demum Ocimoides appellant, Scapyllo similem, furculosam, palmi altitudine plantam. Nascitur petrosus, orbiculato florum ambitu, speciem lecti pedum præbens: Bibitur

ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentum ictus. Item decoctæ succus.

Clinopodio Galenus 7. simpl. ex calcificandi vim adscribit, sed nondū adurendi esse verò ait essentia tenuum partium, ponitque ipsam in tertio ordine tum calcificantium, tum resiccantium.

Plantæ quibus Clinopodii nomenclatura appropriatur, sunt hæc. Clinopodium quorundam Origani facie, Clinopodium Matthioli alterum. Ocimois Fuchii: Acinos multis. Clusii Clinopodium Austracum; nobis pulchra Acini species. Clinopodium quintum C. Bauh. quod inscribimus Ocimo similem Acinon Columnæ. Clinopodium Dodonæi, siue Mastichine Gallorum. Tragoriganum Matthioli. Satureia. Thymbra S. Iuliani. Polygonum tertium Cordi. Heliotropium. Herba orbiculata. Guiland. in Theone lapsū afferit Matthiolum in Clinopodio, vt qui perperam Ægypticæ Betonicæ exhibeat.

CLINOPODIVM QVORVNDAM, Origani facie.

CAP. XXV.

Descriptio Ex radice fibrosa plures emittit caules quadratos, lanuginosos, cubito altiores, ad quorū nodos folia nascuntur opposita, Origani vulgaris, minus odora, sapore quodāmodo Saluie re auiore: flores denso stipatu verticillatim caules ambiunt, purpurantes, interdum albi, Calaminthæ, ex oblongis, gracilibus, villosis calyculis, odore longè minus vegeto, quàm Calaminthæ.

Lobelio in Aduers. & in Icon. plantar. Acinos. In Obi. p. 269. vocat Betonicam Pauli quorundam, Germ. wild Basilic Belg. wilde Basilicon Gall. Basilic sauvage, Hisp. albahaca saluage. Angl. wild Basil; quæritque an sit Clinopodium Lacunæ.

An Cordo in Diosc. Cornat. & Riffio Clinopodium, Germanicè mibeldoss, quod hic Herbam orbiculatam & Pulegium montanum vocari refert?

Matthiolus passim Clinopodium vocat, ac ait in editione anni 1554. & 1559. Nascitur vbiq; frequens, foliis non modò Scapyllo proximis sed etiam montanæ Calaminthæ, quam maximè repræsentat. In comm. cum mag. hg. Duæ plantæ à quibuldā rei indagatoribus pro Clinopodio ostenduntur. Prima foliis exit Scapyllo haud ab similibus, laciorebus tamen, caulibus quadrangulis, tenuibus & hirsutis: floribus purpureis, caulem verticillatim ambientibus: Hæc longè magis quàm altera Clinopodium refert. Credi di legitimum esse Clinopodium. Verū degustatā herbā mihi à sententia recedendum fuit. Idem in Epit. Cū Clinopodium adeò tenuium esse partium (scribit Galen.) vt ex tertio calcificantium siccantiumque ordine habeatur, atque operæ pretium esse, vt quæ in huius censu sunt plantæ, aut gustu acres, aut admodum amaræ percipiantur: cumque neutra qualitas in Clinopodio, cuius imaginem dedimus, reperiatur, non ausim ego ipsum legitimū facere Clinopodium: Sed potius alterum. Ex his Matthioli dictis satis apparet, quomodo sibi constet cum suis iconibus sine descriptionibus: eius contrarietates erant olim in diuersis editionibus: nunc iunctæ sunt in editione Casp. Bauhini, qui apud illum

illum scribit Origano simile Clinopodium.

Lacuna in Dioscor. Clinopodium & Lectipeda vocat; notatq; confundi in quibusdā cum Pulegio montano, cui similem ait, terrēque in singulis geniculis quatuor flosculos tenues, similes pedi lecti: provenire locis siccis & sterilibus: calefacere & siccare tertio gradu. Sed quare quāto est Pulegium montanum, cui confert Lacuna: eius sanē descriptio non videtur respondere cum icone quam ex Matthiolo proponit: existimamus illum tunc temporis nescivisse, quid scripserit.

Turnerus Matthiolum reprehendens dicit eius Clinopodium esse Calaminthæ speciem. Verba eius hæc sunt. Clinopodium Matthioli est Calamintha prima: folia enim habet Ocimi, subtus incana, caules quadratos, florem purpureum, & in montibus ut plurimum nascitur. Non est autem Clinop. siquidem folia non possidet Serpylli, ut ex Matthioli icone Serpylli probari potest. Ait quoque Matthiolus plantam suam non tantum Serpyllo esse similem, sed etiam Calaminthæ montanæ: id quod verum esse non potest: Calamintha namque montana, quæ foliis est Ocimi, nullatenus Serpyllo similis est, cuius rei argumentū esto Serpylli figura, ab ipso Matth. proposita, collata cum foliis Heliotropii maioris Ocyimo similibus auctore Dioscoride. Fallitur ergo Matthiolus, plantam vnam duabus inter se distimilibus similem faciens.

Geshort. Clinopodium ac etiam Polycnemō appellat, cognatamque Origano dicit.

Lonic. duas ponit figuras, priori loco Matthioli, pro Wirbelrost/ Clinopodio officinarum, & Pulegio montano: Secundo Tragi, nomine Flein dossen: quasi diversæ essent plantæ.

Trago est Origani genus aliud siue quartum, sylvestre, siue Originum minus, Flein volget mut.

Camer. in Epir. dicitur Clinopodium. In Hist. Germ. Clinopodium 1. In orto, maius & minus, & maius Matthioli flore candido.

An Cæsalp. lib. II. cap. 37. Herba Origano vulgari similis, orbibus per intervalla Marrubii, seu Pulegii: flosculo subrubente: &c.

H. Lugd. pag. 912. Acinon, siue Clinopodium sylvestre inscripsit: ac iterum pag. 931. Clinopodium peius Matthioli. Eadem penitus figura.

Clus. in Hist. Clinopodium vulgare inscripsit, ac Matthioli ptimum siue maius cognominavit.

C. Bauh. Phyt. facit Clinopodium 4. siue Origano simile, hoc duplex, elatius, maiore folio, & alterum humilius minore, statuit, & tertium foliis Teucrii modo incisus in monte Krenzachio Iac. Cargillum Scorum sibi obrulisse refert: flore esse ait communiter purpurascēte, repenti & albo: Huic autem quarto Clinopodio pulchre convenire Clinopodium Dioscoridis & Plinii.

Thal. vocat Origanum verticillatum, testaturque falsò quosdam pro Clinopodio exhibuisse. Schvv. Clinopodium maius. Clinopodiu Matthioli primum considerent lectores an possit esse Alysson Galeni & Aërii.

Hoc passim iuxta fepes provenit Montbelgar-di, Genevæ, Lugduni, Monspelii & Patau, ut Obseruavi, flore purpurascēte & albo, Iulio florens. Passim in cædis siluis aut inter fruticetas, aut ad fluuiarum margines per Pannoniam provenire refert Clusius: Sic in Silesiæ montosis Schvvencckf.

Odoratum autem est, ut Schvvencckf. perhibet, nihil gustanti siccus, tantillo caloris subad-

stringens: ut ætonica. Calefacit, siccāt, digerendo modicè repellit. Caput & viscera roborat. Additur insectibus. Menfes iulit, & partes imbecilles confortat.

CLINOPODIUM MATTH. ALTERUM

Foliū est Serpylli modo oblongis, in cacumine mucronatis, floribus inter folia subpurpureis, balauitii effigie, caulibus exilibus, angulosis, & quibus folia per intervalla exeunt utrinque bina: lator illi acutus.

Camerarius retinens iconem Matthioli vocat in Epir. Clinopodium alterum: in H. Germ. Clinopod. secundum. C. Bauhin. apud Matthiol. Clinopod. siue Ocimum luestre, & Pseudoclinopodium. Putamus autem nos Matthiolum nescivisse, cuius plantæ iconem exhiberet: ac meritò olim scripsit propriā manu Casp. Bauhinus miram esse Matthioli inconstantiam, ut qui in com. Ital. dicit hanc minùs convenire cum Clinopodio: in Icon. verò se non dubitare, quin legitimi Clinopodii faciem referat. Addimus nos has & alias huiusce modi contrarietates Matthioli satis demonstrare quantum tribuendum sit eius iconibus & cognitioni botanicæ.

Schvvencckfeldius verò Pseudo-Clinopodium hoc Matthioli, Stachyn aquaticam Tabernmontani esse statuit: in quo illi assentiri non possumus.

DICTAMNUM ET PSEUDO-DICTAMNUM Veteribus & in genere.

CAP. XXVI.

Grauis scriptor Theophrastus l. 9. Hist. c. 16. Dictamni duo primum genera numerat; Dictamnū sc. & Pseudodictamnū, quibus vnam naturam esse: ait, quodque in eis discrepet, natale solum tantum esse: & quoniam feracior & pinguiore solo altera nascatur, idè viribus deteriore esse: quemadmodum pleraque alia huiuscemodi. Amat enim Dictamnus aspera loca. Mox tertiam addit nomine tantum Dictamnū; quæ nec figuram, nec vires eandem habet: sed Silymbrii forma & ramulos.

Iis autem quæ habet Theophrastus nihil ad triplicem Dioscoridis Dictamnū constitutendam aptius adferri unquam potuit. Sunt enim in vtroque eadem omnia Dictamnū, inquit, quod sylvestre Pulegium aliquibus appellatur; herba est Cretensis (χρητη): pro quo dictum Cat.) acris, levis, Pulegio (πυλῆγιον) similis: sed maioribus lanuginosisque foliis, ac lanosa quadam veluti pube obductis. At neque florem neque semen profert. Quod Pseudo Dictamnū vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, at minùs quàm illud acre. Defertur & è Creta alterum Dictamni genus, folio Silymbrii: at tamis maioribus, in quibus flos emicat sylvestris Origani, niger ac mollis. Odor foliorum inter Silymbrium & Saluiam iucundissimus. Et ita vertit Sarracenus. Codex meus Basileensis verba illa, Pulegio similis, &c. ita reddit: ὅμοιον πύλῃ, καὶ ὡς ἡ ἀφροσύνη τῆς εὐλατῆς, ἢ ἐρυθρῆς τῆς δάκτυλ; sed maiora & Gnaphalii specie folia habet, & lanuginosam superficiem. ἡ δὲ με-

Descriptio

Math. inconstans.

Error Schvvencckf.

Dictamn. triplex Theophr.

Dictamn. triplex Diosc.

molita conuertit: pulegio simile, maioribus foliis & mollibus, fomenti (tomenti legendum) modo, & lanugine quadam circumdatis. Marcellus: Similis Pulegio est maioribus tantum foliis, tomentosis, lanofaque pube obductis. Legebat γαρφαλίδιον Ruell. Pulegio simile, maioribus foliis, quæ tomento quodam, spissaque lanugine pubescent. Corn. Pulegio similis, sed maiora & tomenti specie folia habet, & in ipsis lanuginosam quandam excrefcentem propaginem. Rob. Constantinus legit γαρφαλίδιον γυμνα, folia tomentosa, seu tomentitia, tomento quodam pubescentia, mollia tomenti modo. Nos verò retinendum censuimus nomen Gnaphalii, & vertendum Gnaphalii specie, vel formâ, monitu industrii & diligentis Botanici Siluerii Theodochini Pharmacopei in Candia Cræte, vt copiosius dicemus cap. 6. Dictamno adulterina quorundam sue Gnaphallo Dioscoridis. Per ἄνθος autem videtur Dioscorides hic idem intelligere, quod Theophr. per ὄσπρ. Vulgata portò lectio nem illa ἄνθρ. ὄσπρ. ὄσπρ. φέρει, neque florē, neque fructum ferit, deperatam ai, putare verum esse, si legatur ὄσπρ. ὄσπρ. φέρει, i. e. neque verò flos, neque semen conferit: Sarrac. scribit vetustum codicem habere ἰσφέρει, exportatur, quæ lectio melius nobis placet.

Appellatio-
nes ipſarū.

Acritipitia Dioſcoridi nomina, quæ Hermo-
laus & alii retinuerunt, ſunt: Embardron, Be-
loacon, Artemideſum, Cretica herba, Epheme-
ron, Eldia, Belotrice, Doreidion, Elbulion, & vt
Romanis dicitur, Vitilago ruſtica. Apuleius ca-
p. 62. Artemedion, Creticon, Labrum Veneris, E-
menipſen iuxta Aegyptios, Eubolion, ſc. pro El-
bulion, & Dipſicon nominat.

Æ Plinio. Dictamnium memorat Plinius lib.8. cap.27. Herbam, inquit, extrahendis fagittis cerui mon- strauère, percussæ eo telo, pastusque eius herba- lectio. Idem lib.25. cap.3. Dictamnium ostendêre vulneratæ, statim decidentibus telis. Non est a- libi quàm in Creta, ramis prætenue, Pulegio si- mile, feruens & acre gustu: foliis tantum vtun- tur. Flos nullus ei, aut semen [apud Dioscori- dem legendum, neque semen exportatur,] aut caulis. Radix tenuis ac superuacua. Et in Creta autem non spatiose nascitur: mirèque capris ex- peritur. Pro eo est & Pseudodictamnium, multis in terris nascens, folio simili, radici minoribus,

Chondris. in trea faciens, trea tunc, tamquam in trea, trea
à quibusdam Chondris vocatum. Minoris effe-
ctus statim intelligitur. Dictamnium enim mini-
mā portione accendit os. Qui legere eam in Fe-
cula, vel Harundine condunt, præligantque, &
potentius evanescat. Sunt qui dicant vtramque
nasci multifariam, sed deteriores in agris pingu-
bus, veram quidem Dictānum non nisi in asperis.
Plin. tam. Est & tertium genus Dictamnium vocatum, sed
neque facie, neque effectu simile, folio Sily-
mbrii, ramis maioribus: procedente persuatione
illā, quicquid in Creta nascitur, infinito præste-
re cæteris eiusdem generis albi genitis. *Et hæc*
Plinius, qui sua fere ad verbum transtulit: verūm
hoc mirum videtur Cornario, quod duobus pro-
ductis locis cæris attribuat, quod Theopha-
stus de capris, & hoc etiam Aristoteles lib. 9. Hist.
cap. 6. & Valer. lib. 1. cap. vltimo capreis tribuit,
Diocorides verò & Virgilius capris: Nisi hu-
ius rei de capreis fidem illud ei sustulit, quod a-
liās depascens Dictamnium, sagittis icta ad
ipsam festinare, & prius iam ictus medelam que-
rere debere non videntur: aut alium autorem
sequeutus, sit, qui de cæris hoc prodiderit. Sed i-
psūm Cornarium mirari subit, qui ipse potiū

meritò ridendus est, quòd de capris auctorum dicta intelligi credat, & non capreis, quæ sagittis & telis peti hodie adhuc solènt vt antiquitùs, teste Martiali lib. 13.

Pendentem summa capream de rupe videbis:

Casuram speres, dicitur illa canes.

Et hæc siluestres sunt capræ, ob similitudinem
quidem aliquam sic dictæ, quæ Plinius non ab-
que omni periculis ratione ceruis forsan anume-
randas esse non negabit: ut etiam inferis ostend-
itur. Cornarii porro argumentum illud non
probat, Dictænam Vigiliis esse Dictamnum
tertium, eo quod Dictamnii primum genus nec
floreant, nec semen, nec caulem habeat, cum e-
tiam nostro seculo consistat flos, semen & caulis,
licet feminis non meminerit etiam ipse Virgi-
lus, ut cuius versus 12. Aeneidos dilucide testatur.

Tum Venus indigno nati concussa dolore

Dictamnium genetrix, Cretæ² carpit ab Ida,

Puberibus caulem foliis, & flore comantem

Purpureo, non illa feris incognita capris

Gramina, quum tergo volucres hæsere sagitta.

Et hinc mendum in Dioscoride adesse, quod plantæ huius cognitioni impedimento est. sequētibz ostendit M. ranth. lib. 2. cap. 16. Hiltorini de Dictamnno Cretico mendosum esse, non leui quidē argumētō suspicari sumus: falsū enim proculdubio est quod dicit Dioscorides florem nullum aut semen proferi: videmus enim in planta, quæ pro Dictamnno Cretensi ab omnibus ostēditur, tum flores tum semina inesse: nam quamquam florum fructuumque varietatem ob regionum naturas, posse euenire concedimus: tamen magis ad credendum inducimur locum in Dioscoride deprauatum esse ita, vt illa negatio non tam partes, quā partium facultates auferat, atq; ita restituatur locus: flores & semen nullum uisum præstant; vt velit Dioscorides idem cum Theophrasto dicere, q̃. Hilt. cap. 16. ita habet: vñs foliorum, non ramorum, nec fructus est: nam cum Theophrastus Dictamnno ramos, & fructus tribuat: neque possint fructus esse, nisi flores etiam præcellerint [vt magnā ex parte in plantis fieri cernimus] videtur & flores tacitū ei velle inesse. Cur igitur negauerit Dioscorides, quod Theophrastus affirmat, si veritatem eandem plantam, non diuersas describit? Hoc Dioscoridis mendum, tantum valuit apud nonnullos, vt crederent Creticum adhuc esse incognitum; plantamque quæ floribus & seminibus careret, esse querendam. Verū hi non reddē sententiā: nam quid multa in Dioscoride superaddita sint, multa deficiant, multa etiam verā ac genuinā lēctio exuta, alienam falsāque uidetur, inueniri, omnibus ferē concessum est: quæ omnia quamuis magna ex parte Librariorum incuria euenire soleant, aut temporis iniuria; vt cum vel caries, aut tale aliquid pagine partem corroserit; sensumque ē medio abstulerit: tamen aliæ sunt causas, nempe quorundam curiosiorū superstitiones; qui nonnunquam addere, nonnunquam & demere à Dioscoridis scriptura aliquid ausi sunt. Quin etiam interpretum vitio idem sæpius accidit: quippe qui græcæ phrasīs energiam, ac vim in quibdam non satis assequuntur. Hactenus Marantha, qui cum Matthioli *ouera* apud Dioscoridem legendum censet. Quæ lēctio licet non omnino reprobanda sit, melius tamen placeat *exetis* legi. Quia oliuif flos [inquit Sarrac.] Dictamnii solia sola cum radicibus ē Creta exportabantur, semine ac flo-

te catere ipsum Diocorides existimavit. Quod si non in eundem errorem Plinium lapsum fuisse constaret, probabilior foret vetusti codicis illa lectio: *ovres* & *ovres*, *ovres* & *ovres*, neque flos, neque semen exportatur. Sed ne quid temerè auri videremur, vulgatam lectionem retinere maluimus. *Stance* demum Matthioli, Marthæque lectionis Dioscorideæ correctione, introque eadem omnia deprehenduntur.

Ad appellationes quod pertinet addendum adhuc est: *Artemidium* sc. dici dictamnium à venatrice Dea Diana, quam Græci Artemidia vocant, quoniam vulnerat ab ea in venatione caprea & ceruæ eius herbæ pastu sanarentur. Quod erat numini in primis gratum sine maleficio & naturæ iacturâ studium, & voluptatem suam amanti. Eademque de causa *Dardidion*, quasi ceruasem: dardæda enim Græci hinnulum, & in ceruorum genere minores vocant: quod animal Plinius ait Dictamnium hanc ostendisse, vulneratis eo pastu statim decidentibus telis. *Cretice*, vel Cretica dicta est, quia propria Cretæ insule est & non alibi nascitur. *Ephemerion*, i. e. Diarium, h. e. vnius diei. Pro *Eldia* Humelbergii exemplaria, *Aelæa* scriptum habent, unde suspicatur aliquibus immutatis literis legendum potius esse *Idæa*, quoniam in Idæ monte Cretæ plurimum nascatur. *E-bolion* dictum est, quòd extrahendis telis sit conueniens & bonum medicamentum. *Dysfaci* appellatio huc importunè translata est. Similiter & ea quæ inter Latinas refertur, *Læbrim* veneris. *Sylilag*, dicta est, quòd feruens & acris gultu minimâ portione os accendit. Verùm exemplaria quedam non *Vitilago*, sed *Tusfilag* scriptum habent.

Fæminino genere Dioscorides veluti herbam: Theophrastus, plurèque alii neutro tradiderunt. Quæ generis inmutatio multa in plantis est, non tam quia sexu aliquo à Veteribus discreta fuerunt, quam quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit. Interposita siquidem littera Dictamnus non Dictamus dicenda est. Indicantibus id Græcorum codicibus, aliorumque omnium qui fortè Dictamni meminerunt. *Dardidion* vocem deriuat Cornarius *ovres* & *ovres*: alii *ovres* & *ovres* nos verò à monte Cretæ *ovres* & *ovres*.

Arabibus dicitur *Mescatrensis*, *Anegen Araba*, siue *Bari*, vt refert Serapio capite de Pulegio. Germanis & Belgis *Diptam*, nec recipienda est nomenclatura Golii, qui *wilden Potey* vocat. Gallicis *Dictam* & *Diptam real* nec placet dici, *Gingembre de tardin*, Italis *Dittam*, & *Dittam di Candi*: Hisp. *Diptamo*. Angl. *Srensch Diptamner*, i. e. vt vult Lobelius, Gallicum aut Francum, non secus ac Germani *Welscher*, exotica & raræ institutionis plantas vocitant. Boh. *treidawer*. Officinæ pro Dictamno per primâ syllaba Dictamnium per legunt, leuis momenti errore.

Quod reliquum est, Dictamni & Pseudo-Dictamni æquiuocationes & substitutiones, ad amussim quòd fieri potest posthac trademus.

Et quia antè ex Veteribus recensuimus; quæ fuere Dictamna & Pseudo-Dictamna à Veteribus memorata, hic primo loco statimur Dictamnium Creticum ab omnibus penè approbatum & receptum, de quo primo loco mox agemus, quodque in Cretæ nascitur, esse verum & genuinum.

Dictamnium Creticum, ubi aliis locis protenit, dicitur Pseudodictamnium, vt apparet ex antè allegatis:

Tom. III.

Dictamnium adulterinum, siue Pseudo-Dictamnium Matthioli & aliorum, quod meritò improbatum ab Anguillata & Camerario, Gnaphalium Veterum existimamus.

Pseudo-Dictamnium, quod non modò in Cretæ, sed aliis etiam locis nascitur, vulgò, auctore bellonio Obi. lib. 1. cap. 18. *Cromida*, filio nuncupatur.

Dioscoridis Dictamnium tertium non existimamus spurium & diuersum à Theophr. tertio, vt diximus antè.

Pseudo-Dictamnium, quam Hispani auctore Amato, vocant Pulegium ceruinum, quænam est: Eius verba posuimus capite de Dictamno Cretica, seu vera.

Dictamnium Cretica altera, cuius folia Cressionis, & flores odore Natanii, inquirendum quid sit: de ea vnâ cum præcedenti.

Parum abest quin Serpyllon suum alterum Tragus Dictamno accenseret, neminem tamen secum in errorem deducere vult. Quale hoc Serpyllum sit nos latet. Dictamni Cretici alterum genus, quod flores Origani siluestris gerit, qui dixerit esse agrestem Hyssopum, quam descripsit Tragus, videtur ipsi nequaquam à scopis veritatis aberrare.

Mentham verticillatam videtur Lonic. lib. 9. c. 105. Pulegium siluestre appellare, ac hoc cum Dictamno turpiter confundere.

Fraxinellam, Polygonatum, Helleborum album, & Trifolium biuminosum sunt qui Dictamnium cognominent, sed perperam.

Dictamno deficiente substituant Pulegium, Syluius, Fuch. & Coll. Florentinum: Syluius etiam Eleisphacum, (Saltiam vocat Fuchsius.) Radicem Gentianæ Placotomus. Partem mediam Sabinæ Thad. Dunus ep. 10. Verum non placet hoc substitutum: præferrem Pulegium.

DICTAMNVS CRETICA, SEV VERA.



Superiore
Sæculo de-
siderata Dicta-
mnus Cretica,
nostro demum
innouit iursu:
Est autem cau-
tibus hirsutis;
nonnihil pur-
purascentibus,
ex quorum ge-
miculis aduer-
soriuntur rami,
& ex his eodè
ordine alii:
solorum situs
quoque aduer-
sus, circum-
scriptio ferè
circinata, in-
terdum oblon-
gior, vncialis,

substitit canescente tomento vndique obducta, aliquando in hortis glabra, odoris validi, saporis acris: capitula ramulorum extremis insidentia spicam mentiuntur longiusculam, è foliis Maiorane ferè paribus squammatum compacta: quorum è sinu promuntur flores purpurascèntes, tubuli paculi forma, prominentibus ex

Bb

hiatu staminulis, calyci insidentes striato.

Iamdudum a doctis deprehensum est, nos verâ Dictamno carere, & diversissimam ab ea radicem (Fraxinellam auctor verborum horii Cordus intelligit) in eius locum recepisse, quam magno errore Dictamnium nominamus. Constat vera Dictamnus Pulegii foliis, nostrâ verò quâ pro Dictamno utimur, Fraxini folia habere, quæ longè à Pulegii foliorum similitudine recedunt. Vera Dictamnus etiam foliis tantum medicinam facit, radices enim lignosæ sunt, propterea rarus illarum usus fuit. In nostrâ verò solæ radices medicam vim habent. Dictamni præterea folia densa lanugine utrinque vestita sunt: nostræ autem folia omnino glabra cernuntur. Quapropter in Dictamno hæc valde erramus. Ne autem calumnias & conuicia audire cogar, quoddam communi persuasionem recedam, indicabo vbi nam vera sit Dictamnus: Georg. Agricola primus in Germaniam Dictamnium veram attulit, cum ex Italia rediret. Vidit hic viam Dictamnium cum Scordio in scitilib. vasculis Venetias ex Creta allatam. Post hunc magnam illius copiam Olingerus Norimbergam Venetiis aduexit. Nunc autem quotannis magnæ eius sarcinæ ex Creta Venetias, & Venetiis Francofordiam afferunt. Etiam graphicè ab omnibus descripta historia exprimit, ut nō possit melius. Veram minimè caule caret, ut Theophr. scribit. Minimè etiam flores, ut Dioscorides putat. Habet enim purpureum florem. Quapropter hac in parte potius Virgilio, quam Theophrasto & Dioscoridj crediderim, qui caulem, & flores purpureos Dictamno tribuit. Sed veni dignos pronuncio, cum multæ herbæ quibusdam temporibus & locis neque caulem, neque flores habeant. Non tamen id à proprietate illis inest. Hæc à Cordo de Dictamno profertur. Fit autem meo iudicio iniuria Theophrasto, quod apparet consideranti verba eius. Pro Dioscoride opponitur à Matthiolo pro *phor* legendum esse *purpureum*, & u. a. confert, & per consequens deprauatum esse locum in Dioscoride, ita ut illa negatio non tam partes, quam partium facultates auferat, atque ita restitatur locus: flores & semen non conferunt, seu nullum usum præstant; ut Dioscorides idem cum Theophrasto sentiat.

Theophr. &
Dioscorides
mutantur.

Theophr. ex
mutantur.

Dictamnium vidit inquit Turn. in Anglia in horto D. Richesi: alioqui in Creta duntaxat spontè prouenit. Negat ei semen & florem Dioscorides: fortè quia tunc vidit, cum semper & floribus careret: palam enim est utrumque ferre tam in Anglia, quam in Germania, & his Cretâ longè frigidioribus. Theophrastus Dioscoride antiquior, & Virgilius semen & fructum ei tribuunt. Damocrates ei quoque florem assignauit, ut in Galeno legitur lib. 5. de comp. med. per genera cap. 10. in emplastro ex Dictamno: Plinio Dictamnium non modo flore & fructu caret; sed etiam caule, quod tamen planè falsum deprehenditur.

Matth. &
mutantur.

Nescit etiam Matthiolus qua authoritate scripserit Dioscorides nec florem, nec semen proferre, nisi dicamus locum eius esse corruptum, ut antè declaratum. Cur quæso in com. Ital. cum mag. fig. omisa est correctio Dioscoridis?

Dubitatur ut refert Anguillara multi an Dictamnium quod adfertur à Candia sit Dioscoridis, quia florem & semen ferret, quod opinioni Dioscoridis resistit, verum illum descripsisse testatur vi uenerit. Quod ad Pseudo-Dictamnium atti-

net, cum de eo nihil sciat, plura non dicit. Quod de tertia specie scriptum in Dioscoride est, adulterinum, nihil commune habere ait cum Theophrasti tertia.

Bradusolo incognitum fuisse verum Dictamnium satis ostendit id quod absurdissimè scribit: Folia habere familia Elleboro.

Quum alteram Cretensem Dictamnium, inquit Apollo, folio Cressonis, & ad fenestras frequentem, Aurentiorum odore depingit Amatus, amenam se oppressum significat.

Dodonæus, qui in Hist. gall. descriptionem Dioscoridis tantum ponit, & iconem Dictamni adulterinæ, ait Dioscoridem contra omnem veritatem, flore & semine carere scribere.

Veri Dictamni radices an sint longo in usu, Pal. ut vult Palmarius de feb. pest. cap. 18. hæcenus nō tam obseruari: radices enim quæ passim exhibentur pro Dictamno sunt Fraxinellæ, cuius non vidi exhiberi aut præscribi folia, ut ille ait: quid si confundit duas plantas?

Videtur insequi Theophrastus Theophrastum eodem ordine & iisdem, ferè verbis, & primo Dictamno, Pseudo-Dictamno & altero Dictamno loquens, paucis quibusdam immutatis, quæ oppositam sententiam significant teste Celsipino. Fortè autem Dioscorides plantarum partes effecatas, & descriptas, descriptis: & tanquam diuersum genus tradidit, quod Hæmæ collectum est. atque quam fructum ferat, & quod Æstate & Autumno facie diuersum, ut plantæ quæ contingit.

Dictamnium Creticum, seu Cretensis Dod. gall. Lonic. Gesner. in cat. pl. Euchar. Rossin. Collegio Colonienis, Casp. Bauhin. Clusius Exot. & Camerario. Dictamnium Creticum Celsip. Cast. & Lacunæ. Dictamnium Matth. & Lobel. atque Columnæ. Dictamnium verum: Dod. in fol. lat. & H. Lugd. Dictamnus vera Cordo in Cordo in Dioscor. & Gesn. hort. Pseudo-Dictamnium Matth. Dodon. Lacunæ. Cast. Hist. Lugd. & Camer. Pseudo-Dictamnium florib. verticillatis Lob. Hic duplex inodorus & odoratus C. Bauh. qui Pseudo-Dictamnium verticillatum vocat.

In Creta solummodò prouenire Dictamnium Veteres tradiderunt, ut antè ex eorum verbis apparuit, id quod etiam asseruit Bellonius. Nunc autem quoque feritur in Italiæ hortis feminibus à Creta allatis. Quin Camerario aliquoties creuit, & florem produxit copiosum. Nisi verò pangantur plantæ, rarè, etiam diligenter asseruatæ per Hiemem, durant. Satiùs igitur est ut supradictis propagetur, qui in alterum annum florem producant.

Dictamnium Creticum, ut inquit Dioscorides, præstat omnia quæ satium Pulegium, sed efficacius multò. Nam non potum modò, sed & apostemum ac suffium, partus emortuos eiicit. Aiant & in Creta capras tela, quibus icte sunt, huius herbæ pastu excutere. Porro purgandi vim habet illius, aut cum polenta affricus. Imposita verò herba plantæ pedum reliquæ corpori impactos aculos resigit extrahitque. Est & efficax ad lienis dolorem: siquidem ipsum immittunt. Legitur autem Æstate & Autumno. Radix gustu exalcat, nec non & partum accelerat. Sed & succus cum vino potus contra venenatorum morsus auxiliu est. Herbæ verò tan-

ta vis est, vt ictu venenato seuientes bestias & olfactu abigat, & contactu perimat. Cæterum expressus ex ea succus, vulneribus ferro illatis aut venenatis moribus intillatus præsentaneo est remedio, si præterea in potu assumatur. *Pseudo-Dictamnus* minus quam illud acre, eisdem præbet effectus, ac ineficaciùs. Alterum *Dictamni* genus ad eadem, ad quæ & antè dictum efficac, sed minus nares ferit. Miscetur & emplastris ac theriacis compositionibus. Et hæc *Dioscorides*.

Dictamnū, Galeno auctore, tenuiore essentia constat, quam *Pulegium*, cæterà illi simile. *Hippocrates* ad secundas remorantes, inter præstantes quas nouit medicinas, ponit *Dictamnū*. Eūdem propinat ex vino ad molam expellendam. Quin & ad duos obolus tritum ex aqua calida ad accelerandum partum bibere iubet.

Plinio auctore strangurias discuti *Dictamnū* certum est. Sed & potum aggras pellit, & alia tela extrahit illiū. Bibitur ex aquæ cyatho foliorum obolus. Proximè *Pseudo-Dictamnū*. Vtraque etiam suppurationes discutit. Et aliquāto pōit ait. Sed præcipua *Dictamni* vis est, menses ciet, partus mortuos vel transuersos eiicit. Bibitur ex aqua foliorum obolus: aded adhuc efficac, vt ne in cubiculum quidem prægnantium inferatur. Nec potu tantum, sed & illitu, & suffitu valet: proximè *Pseudo-Dictamnū*. Sed menses ciet cum mero decoctum pondere denarii. Et in fine cap. 15. lib. 26. *Dictamni* folia præclarè dantur ex aqua. Constat vel oboli vnus pondere: vel si mortui sint in vtero infantes, protinus reddi sine vexatione puerperæ. Similiter prodest *Pseudo-Dictamnū*, sed tardius.

Lud. Bonaciolus nimium extollit *Dictamni* vim *Plinium* secutus: quis enim crederet transuersum factum posse expelli eius facultate, vel abortum ciere, si in cubiculum inferatur?

Thadæus Dunus mulieri, quam morituram omnes arbitrabatur ex factu mortuo post alia medicamenta, in balneo sedenti, dedit pulueris foliorum *Dictamni* Cretici obolus ex aqua fontana: quibus peractis sperauit illa, vt ait, rem ex voto successuram: omnia enim ad inum ventrem vergere videbantur. Eā nocte satis commodè habuit, sed non dormiuit. Ante diluculū mortuum factum feliciter expulit. Et facile quidem *Dictamnū* sumitur, cum alia, quæ factus mortuos expellunt, vel nimis amara, vel feruentia, vel nimis acris, vel stomacho inimica sunt, & aliquo modo nocere possint.

GNAPHALIUM VETERIBVS.

CAP. XXVII.

Gnaphalii foliis albis, mollibusque pro tomento vtuntur. Efficaciter autem ad dysenteriam in vino austero propinantur, inquit *Dioscorides*.

Inter spuria sunt qui *Iren*, qui *Ampe-tocon*, qui *Anaxiton*, qui *Anaphalida*, appellant: *Aegyptii* *Semeon*, *Galli* *Gelasinen*, *Romani* *Centunculum*, siue *Centunculem* herbam, & *Marcellus* *Tomentum* vocat.

Antequam, inquit ille corruptis amplioris fortunæ veneno moribus cæpissent homines molliter & laciue agere, non autum plumis, aut ouium lanis strato cubili dormiebant. Sed, quod *Lucretius* ait, & frutices inter condebant squalida membra, circum se foliis & frondibus inuoluentes, erantque illis pro culcitratum tomento,

Tom. III.

quas *Aestas* & *Aurumnus* herbas & frondes passim strauerant, præsertimque *Gnaphalion* hoc, Græcis ab eo vltu sic appellatum. Græci enim *γνῶδαλον* inter cætera tomentum vocant: sic ipse in *Dictamno* dixit, folia *γνῶδαλον*, quasi tomentitia. Sed de voce *Gnaphaloide*, *Gnaphalio* simili vide plura cap. de *Dictamno*.

Plinius lib. 27. cap. 10. *Gnaphalion* aliis *Chamazelon* [*Chamazilon* Lob.] vocari auctor est: folia tomento similia esse: dati in vino austero ad dysenteriam, ventris solutiones, mensisque mulierum sistere. Infundi autem tenebmo: illinique putrescentibus vlceribus.

Gnaphaliō idē sic nominatum esse, quod foliis eius mollibus *γνῶδαλον*, h. e. pro tomentis vtrentur, perhibet etiam *Galenus*, qui ea candida & mediocriter adstringentia dixit.

Multas plantas *Gnaphalia*, Latinis *Centunculos* vel *Centunculares* herbas dicta, *Herbarii* nuncuparunt, quod molli lanugine, seu lana, vel tomento essent obuolutæ: (*γνῶδαλον* enim est tomentum.) Et quidem primò *Dictamnus*, & *Pseudodictamnus*. *Gnaphaliū* maritimum: *Gnaphaliū* pulchrum *Alpinum*: & id genus quod *Leontopodium* dicitur. *Gnaphaliū* Germanicum & ci alfine. *Pseudo* *Leontopodium*. *Gnaphaliū* minimum quorundam, minus *Tab. & Hort. Lusit.* *Filaginis* species tertia *Dodonæi*. *Stæchas* citrina altera inodora. *Gnaphaliū* vnico cauliculo. *Gnaphaliū* umbellatum minimum. *Gnaphaliū* Americanum. *Gnaphalio* congener *Hosteoclon Bononiensiu*. *Pilosella minor*: *Bombax*: *Alga*: *Scorba*: *Siliqua Syriaca*.

Chamazelon
lon
Chamazelon

Gnaphalia
plura.

DICTAMNVM ADVLTERINVM QVIBUSDAM, verticillatum, vel potius
Gnaphaliū Veterum.



Placet *Cæsalpini* descriptio quæ sic habet. Quedam ex *Creta* ad nos allata est pro *Pseudo-Dictamno*: *cespes* amplus, virgis numerosioribus, altioribus & candidioribus *Matrubio*: foliis rotundioribus, minoribus, similibus, *Dictamno* *Cretensi*, oblitis candidiori lanugine, gustu subamaro, odore exili, non iniucundo: verticillos inter folia fert molles, in quibus flosculi sunt purpurescentes.

Descriptio
Cæsalp.

ro, odore exili, non iniucundo: verticillos inter folia fert molles, in quibus flosculi sunt purpurescentes.

Cæterum, planta quæ nunc vulgò Græcis *γνῶδαλον* dicitur, non potest esse *Pseudo-Dictamnū*, vt aliqui volunt: reclamant enim odor & sapor, vt rectè annotat *Anguillara*, cui lubentes assentimur.

Caliceoimoi
stheia.

Dodonæum aliud à *Pseudo-Dictamno* *Matth. H. Lugd.* depinxit & descripsit vult *H. Lugdunensis*. Et
Bb 2


quamvis icon & descriptio Dodonæi nonnihil variet à Matthiolo, non propterea aliud statui-
mus, sed varietatem à loco & cultura depende-
re digimus. Atque Matthioli Gnaphalium,
Dioscoridis Gnaphalium non esse cum Silacio
Tedeschino insigni botanico & Honorio Bello
statuimus.

Locus,

Pseudo-Dictamnium vidi Patavii Februario &
Martio mense in horto publico; Ferrariæ in hor-
to Monasterii S. Dominici à l'Angeli plantas va-
rias. In horto E.C. Montbelgardi per Hiemem
reponere solebam multis annis durans floren-
que, sed semen non maturans: furculis facilè pro-
pagatur. Lobelius audiebat à quibusdam Italis
in monte Nigro dicto, Pise & Liburniæ conteri-
mino, & aliis locis maritimis nullo fatu oriri.

ZATARENDI HERBA.

CAP. XXVIII.

Descriptio
foliorum.Vires
&
vires

Herba par-
ua, quam
Egyptii Zata-
rendi vocant,
quod ex India
illuc compor-
tetur, Alpino
autore foliis
est crassius, ro-
tundis, albis,
succo plenis, o-
doratis valde.
Mulci vt O-
riganum sicca-
rum pro obso-
lio coe-
dant. Audiuit
author Alpi-
nus multis ad-
tullum, spiran-
diq. difficul-
tatem & ad
prouocandum

vt nam ac menstruas purgationes in vfu esse.

PULEGIUM. CAP. XXIX.

Descriptio



Impertuno
cun-que terrâ
attingit è can-
tinnu quadrato-
rum hirsu-
torum dodra-
taliu gen-
culis demul-
tis fibris radica-
tum luxuriat,
longè lateque
subiectam fol-
lorum ex ar-
ticulis est ex-
ortus, ad Ori-
gani folia ac-
cedentiũ, mi-
norum, odore
cum suavitate
gravi, sapore

feruido:quadripartitorũ floru verticilli purpuraf-
centes breuib. interuallis longâ spicacque se-
rie caules & ramos coronant subiecta vique fo-
liorum coniugatione vna.

Pulegium, vt herbam vulgò notam, non
describit Dioscorides. At cùm Dictamno iam
fatis noto, folia tribuat Pulegii, sed maiora: ac
rotunda sint Dictamno folia, eiusmodi quoque
fuerint Pulegii. Erti autem Pulegium vulgare
florein gerat purpureum, alterius tamen memi-
nit Plinius flore albo: illud fœminam appel-
lat, hoc marem, de quo pòst agemus.

Vulgatum hoc Pulegium, regium nominatum
immericò respuant publici Censores, & rationis
ne micam quidem addunt. Dubitauerunt etiam
Recentiorum nonnulli vtrum vulgare Pulegium
legitimum sit Pulegium, nec ne; quod, vt dictũ,
ob eius vulgarem notitiam nullis foliorum flo-
rumque notis eius faciem tradat Dioscorides:
Non desunt tamen rei herbariæ periti qui velint
Pulegium vulgaris vsus, Dioscoridis Aliorumque
Antiquorum esse Pulegium. Hocque argumen-
to nituntur: quod non modò experientia com-
pertum sit, vulgare pulegium omnibus iis viribus
esse præditum quas suo tribuit Dioscorides, sed
quod etiam Puinianæ Historiæ maximè respon-
deat. Quapropter eos apertè hallucinati vel
Matthioli crediderit, qui Pulegium communis
vsus, vnam vel alteram Calaminthæ speciem esse
contendunt. Quin & illud Pulegium nostrum
legitimum esse ostendit, quod folio sit Cretensi
Dictamno simile, cui folia Pulegio similia red-
didit Theophrastus, vt etiam Dioscorides, qui ta-
men illa maiora fecit.

Gerardus nescio cur pro hoc Pulegio iconem
proponat Pulegii Massiliotici Tabernamontani,
siue ceruini, quasi ei incognitum sit Pulegium
vulgare.

Græcis dicitur *ῥαίον, ῥαίον, ῥαίον, ῥαίον, ῥαίον*
& *ῥαίον*, Latinis Pulegium. Sunt tamen qui
Blechona, qui Anfenicanthon, qui Galioplin
vocat, Poludon & Henithon in Northis. Aliis
Pantagathon, imbona dicitur, aliis Dimoron,
Ciceroni & Colamelle Puleium, Martiali Pullei:
Aphri Apuleiũ, Galli Aluolum (Abuolũ Lonic.)
Mauritani *Alnam*, *Alnegem*, seu *Aluegen*: Ger-
mani *Poley* & *herz poley*: Belgæ *Paleye*: Galli
Pulior & *Pulege*: Itali *Pulegio*: Hisp. *P. leo*, & *P. leo*:
Angli *Peuy royall* / *Pulioil royall*, *po-
dang g. affe* & *Orgauye*: Hung. *Chombor*,
Kézueny menta / h. e. *Podagraria Mentha*.

Pulegium autem dicitur à pulicibus, quod flos
eius recens incensus, eos nidore suo fuget & in-
terficiat: Blechon græcè quasi balans herba, eò
quod vt tradit Apuleius, balantum animalium
floris sui tempore sit pascuosa. Plinius tamen
& Dioscorides aliam reddunt rationem, vt pote,
quod gustatum à pecore, quum floret, acri & per-
amaro gustu, ei balatum quamprimum concitet
& extorqueat. Vnde quidem Græci literas mu-
tantes Blechon, quasi Glechon vocauerunt. Hinc
igitur *ῥαίον* nomẽ factum illi: nisi etiam, vt vult
Lobelius, sit, quia è pulmonibus pituitam cras-
sam facilius extrudat.

Locus gaudet palustribus, & quæ hybernis mē-
sibus rigantur, incultis tamen. Iulio & Augusto
floret, & tunc quidem colligendum. Pulegium
germanicæ mulieres in hortis serunt, ac etiam in
hugulinis vasis fouent diligenti admodum cura,
suis affectibus eo consulentes. Vbi lætius totâ
comâ conspicitur, & sectido Calaminthæ generi
hanc

(hanc enim illi assimilavit Dioscorides) folio simile: acerrimo gustu, quadantenus amaro,

Tota planta odorata est, & gustu acris, non sine quadam amaritudine. Quo magis mirum vulgare istud Pulegium à quibusdam pro legitimo respui & secundum Calaminthes speciem haberi, cum omnibus facultatibus, iisdemque efficacissimis præditum sit, quas Dioscorides Pulegio suo tribuit. Extenuat, inquit, calfacit concoquit: potum menses, secundas, fetus eicit, e-ducit & ea, quæ in pulmone hærent, cum Aloë & melle potum (non *per drosos* sed *per dros* hic legendum vult cum Plinio Cornarius:) & consu-
lis auxiliatur. Nauseas etiam & stomachi rosio-
nes siue morfus cum posca potum mitigat. Attrā-
bilem per Aluum educit. Cum vino potum ven-
enatorum moribus succurrit: defectos animo
cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum
& in puluerem tritum, crematumque gingivas
firmat. Illitum cum polenta inflammationes o-
mnes mitigat. Podagris per se confert, vnde dū
rubeat cutis. Cum cerato varos tollit. Lienos-
is cum sale vtiliter illinitur. Decoctum eius
pruriginis, si eo lauentur, sedat. Inflationes du-
ritias, & conversiones vulvæ in deflectionibus se-
dat. Eundem vsum ei cum Diosc. tribuit Plinius.

Pulegium, inquit Galenus, cum acre sit & sub-
amarum, valde tum calefacit, tum extenuat. Por-
rò quod calefaciat abundè, magnum est testimo-
nium, quod illa rubore tingit, & si quis diutius
toleret: exulcerat quoque. Extenuare satis indi-
cat, quod humida, crassa, lenta, & ex thorace &
pulmone excreta facilia reddit, & menses mouet.

His assentitur Simeon Sethi, dicens: Pulegiū
attenuat & calfacit vehementer: quapropter in
humidis & crassis auxiliatur, & in pulmone hu-
mida glutinosaque detergit, & vt excrecentur, ef-
ficat. Cum vino albo coctum & calidè potum, mē-
ses prouocat. Extrinsecus illitum ischiadicis, &
aliis partibus frigore affectis auxiliatur. Io. de
Monte. Exper. Pulegii puluerem sæpius sumptū
ieiunio ventriculo, cum æqualibus partibus ace-
ti, mellis & aquæ, repurgare vetriculū ac oculos
clarificare refert. Pulegium existimatur apud
Bapt. Códronchium, ex aceto tepido potatum, &
naribus etiam appositum, loquelam amissam sta-
tim restituere.

cari ait. Est Pulegium mas Plinii Lobelio in
Icon. Plant. p. 501. C. Bauhin. Phyt. Pulegium
2. siue latifolium alterum. Castori p. 181. Pulegiū.
Gerardo Pulegium mas. Cur autem is proponat
iconem Pulegii Cretici Tabernamontani, siue
ceruini pro mas hoc, nos latet.

Gerard et
rer.

PULEGIUM CERVINUM AN-

gustifolium.

CAP. XXXI.



Frequentes
profert vir-
gas, teretes, te-
nuas, subrubē-
tes, genicula-
tas, pedem lon-
gas & maiores,
modicè ere-
ctas: *fl.* ex ge-
niculis aduer-
sa exeunt, Sa-
tureix, non-
nunquam tan-
tillū dentata,
odore efficaci
vulgaris Pule-
gii, sapore fer-
uido & mor-
daci: *florum*
verticillati glo-
bulicis virgul-
torum fastigia

ad nodos oriuntur, colore dilutè cæruleo, quorū
singuli quatuor foliis constant, è quibus stami-
nula emicant floribus concoloria: *radix* adulti-
or lignosa, multis tenerioribus, albicantibus, Gra-
tiolæ radicem asparagis aucta, fibras summo ce-
spite vagantes promittit.

Pingitur planta à nobis descripta à Lobelio
in Adu. & 501. hoc titulo: Pulegium angustifoliū,
siue ceruinum Monspelienſium odoratius. Ab
H. Lugd. pag. 892. Pulegium ceruinum. C. Bauh.
Phyt. Pulegium 3. siue angustifolium.


Tabern. Pulegium Creticum, Rosmarin Pe-
ley. Compiler ponit duas figuras, vt & Ger-
ardus, quod non placet in plantis quæ, vt in de-
scriptionibus earum habetur, magnitudine sola
differunt.

Monspelii spontè prouenit, florens Autumno
prope Aigremont & quæ itur Petous. Basileæ
florens vidi in horto Felicis Plateri mensis Iunii
principio. Montbelgardi in horto Ill. E. C. Au-
gusto: Tiguri in horto Gesneri Iulio. Facile au-
tem crescit, si sub Hiemem ramuli in terram cur-
uentur & obruantur. Tametſi Narbonæ Mon-
spelii sit vbique obuium, & nulli non cognitum,
in luco Gramontio pone cænobium, & in pri-
mo aditu ad lutosas scrobes, inquit Lobelius, ta-
men haud temerè facile occurrit in Italia, Ger-
mania, aut aliis Galliæ regionibus.

Hoc etiam magna vulgaris Pulegii copia sup-
petat, pharnacopœis Regii & Monspelienſes
Professores accipiendum imperabant, quod viri-
bus, sapore, & odore, multò quàm alterius, gra-
tioribus, vehementioribus & probatioribus esse
dixerint. De viribus Pulegii Cretici & Massilio-
tici nihil particulare scripserunt authores, verum
eius vsum esse, qualem Rosmarini Tabernamon-
tani voluit. Sed si cõpilatori notum fuisset hoc
Pulegium, non tribuisset vires plantæ valdè dif-
ferentis.

Locus &
Tempus

PULEGIUM MAS PLINII CAP. XXX.



Foliis vt il-
lud Sisy-
mbrii, aut Origa-
ni, roto caule ex
interuallis cum
floribus verticil-
los alterius pla-
næ modo constā-
tibus: vires, o-
dor prorsus eadē.
In via quæ Ri-
uolo Taurinum
itur ad agrorum
margines obser-
uauit Matthio-
lus.

Hoc est Pule-
gium illud maf-
culum flore al-
bo, quod Apu-
leius Leucantho,
Albiflorum vo-

Vires & vi-
sus

ACINOS VETERIBVS ET IN
genere.

CAP. XXXII.

Acinos.
Aconos.

Vires.

Basil. filu.
Ocimostru.Acinos coi-
t ipso.
Epipetron.Plinius Sa-
vius a Dio-
scoride.Acinos ab
Aconos dif-
fert.

Acinea.

Ruell. nor.

Acynus.

Matth. ra-
ciat.Acini Ery-
man.

Quod haftenus legerim nulla Theophrasto Acinos est. Dioscorides *ἀκινος* & *ἀκινος* appellat, atque herbam esse tenuibus furculis, coronariam, & admodum similem Ocimo: hirsutiorē verò atque bene olentem: apud aliquos in hortis plantari solitam. Hanc alium & mentes potam sistere. Panos [*πῶνος*] præterea & erysipelara [sacros ignes alii,] impositam sanare. In reiectaneis quidam siluestre Basilicum, Romani verò Ocimastrum dicunt.

Plinius diversis in locis Acini meminit, & modo Acinon, modo mutatis aliquibus literis Acinon, librariorū culpā, legit. Acinos, inquit l. 21. c. 15. Acinos quam Epipetron vocant, quæ nunquā floret. Sed his certiora, à Dioscoride accepta, tradidit cap. 27. Sed hoc illi non est cum Dioscoride idem quod Menses & vinas ciere dicit, cum sistere tradat Dioscorides, cui subscribit Paulus Aegineta.

Differt autem Acinos ab Aconos, inquit coroll. 474. Hermolaus, quod Acinos Ocimastrum, siue Ocimi siluestris genus; Aconos spinosa brevis & lata herba, Eryngio à quibusdam contributa, spinis latioribus. Acinos sponte nascitur Aequinoctio, hanc & Acinon & Acinean Plinius appellat, & Epipetron nunquam florentem, & Achinen, & Chenopium.

Ruellius asserit Epimetron Theophrasti, esse Epipetron Plinii, & Acinon Dioscoridis: at non demonstrat, quam plantam intelligat.

Matthiolus dum propter florem Manardi Acinon reiecit, ostendit se intelligere Acinum siue Epipetron Plinii, idem esse cum Acino Dioscoridis.

Non tantum persimilis, ait Lobelius, sed & congener Ocimo videtur *ἀκινος*, ac per y proferenda, quod sterilem infæcundamque signat plantam, vti etiam Plinius fortè interpretatus fuit, qui hanc herbam Epitreton vocat, aut potius Epipetron (vt Theophrastus habet, qui hanc inter *ἀκινος* censet) scribit. Quare cum illi florem non negisset Dioscorides, & Ruellius Ocimum, siue minus Basilicum, posse esse Acynon, ni obstaret Theophrasti, Pliniique mutila historia, dixisset: Senensis candor consuevit hæc arripit, & quasi sua obtrudit, exprobratque doctis, nec interea lectori quidquam commodi molitur. Quare fieri potuit, vt quod Plinio in Bechio, & Dioscoridi in Dictamno contigit, idem vsu venetis Theophrasto: nempe vt nullum agnosceret florem in Acyno; quem postea Plinius sequutus sit, apud quem tamen legunt nonnulli Acynon non penitus flore carere: sed in hortis non florere. Et si coronaria fuit, versatilius est, flores habuisse. Sed quemadmodum Bechio & Petasidi, quia præpropere florent, & citissime deflorescunt, deesse florem quidam putarunt: sic fortè isti quia obscurius & serius flores promittit, ac sæpius interdum emerfos amittit intempestiva Autumni qualibet minimā sæuitia: sicuti videre est in nonnullis pusillos & serotinos flores edentibus. Aut aliud fortè sit Theophrasti Acinos, à Dioscoridis.

Acinos dicta fuit planta hæc ab a litera, quæ nota est priuatiua, & verbo *κύνω*, quod significat

moueo, incito, cieo; vnde *κύνω* *κύνω* & *κύνω* dicitur apud Dioscoridem, ciet alium & menses: hæc autem quia contrariam habet facultatem, sc. quod menses & alium pota sistat, Dioscoridis sententiā, ideo *ἀκινος* dicitur, quia *ἀκύνω*, vel *ἀκύνω* *κύνω*, & *κύνω* *κύνω*.

Acini nomine plures donantur plantæ: scilicet Calaminthæ genus. Acinos multis. Acini pulchra species. Acinus Anglicæ. Ocimum garyophyllum siue Acinos Columbinæ. Ocimum. Clinopodium i. Matth. Origanii facie. Menthæ species in Græcia. Lunaria minor siue borrytes. Pes anserinus. Oleaster. Agnus.

ACINVS MANARDI MATTHIOLI
Calaminthæ folio.

CAP. XXXIII.

Recordatur huius plantæ passim Matthiolus. Manardus [inquit in prior. comm.] nil aliud Acinum esse putauit quam quandam quæ in omnibus incolitis provenit locis, sed præcipue & agrorum & viarum ægeribus, Ocimo hirsutior ac tuauiter olens, quæ quod Ocimum admodum æmuletur, à quibusdam siluestre Ocimum appellatur, &c.

De hoc Manardi secundum Matthiolum Acino ita differit Apollo. Vulgaris notitiæ plantam, rusticanis Basilicum siluestre dictam, in aereis camporum & viarum marginibus, odoratam, Acinum credidit Manardus, nec ab eius opinione abhorruit vulgaris Matthiolus: at latinè, se à veritatis semitâ deuiasse deprehendit, quod Acinum nunquam florere Plinius testetur: idè quum huiusmodi herbam florere animaduertit, Acinum esse nequaquam voluit. Verumtamen quum in Dictamno florem negarit Plinius, præter experimentum, eum verius quam Manardum errare suspicari debebat: quum præsertim siluestri illo Ocimo ad menses & alium sistendam non efficaciter vti assuevit rustica plebs nostra, vt ad quæ Acinos ex Dioscoride potissimum cõmenderetur. Ast Apollo hic malè irradiat, quandoquidem eius plebi nota Acinus Manardi, & non descripta à Matthiolo, ab eo debebat describi vt alii docerentur, iisque innotesceret. Hæc verò de eodem habet Lob. l. in Adu. Senensis [Matthiol.] exprolo Ocimo minimo. Calamentum inodorum viarum, vbique frequens & cõtemptum, à Manardo iam diu adductum im profert, illique nulla probatione præfert. Sed enim qui acris, menstruique ciendis aptum Calamentum istud norit, neuiquam assentietur. Et aliæ sunt plantæ quæ multò aptius quadrarent, ni aduersarentur vires, nempe sistendi menstrua, & igni sacro medendi, si congruerent etiam folia, & rami floribus vidua, ex Theophrasti & Plinii historia, quod nusquam tradit Dioscorides. Hæc Lobelius. Nos autem later quid vocet Calamentum inodorum: illud præterea notandum nullum Calamentum inodorum posse esse Acinum Manardi: eius enim planta erat odorata, vt apparet ex eius verbis quæ posuimus capite de Ocimo garyophyllo Monachorum siue Acino Columbinæ.

H. Lugd. transcribit præscripta Lobelii verba: H. Lugd. verum non docet quale sit illud Calamentum inodorum, vel Acinos Manardi & Matthioli: proponit quidem iconem, cui hunc titulum fecit, p.

cie p. 912. *Acinus Matthioli* : & aliam sub hac inscriptione: *Acinus*, siue *Clinopodium silvestre*: Hanc eandem figuram etiam exhibet p. 931. pro *Clinopodio* priore *Matthioli*: diuersæ admodum plantæ à *Matthioli* *Acino*: est enim *Acinus* H. Lugd. p. 912. *Clinopodium Matthioli* *Origani* facie.

ACINOS MVLTIS.
CAP. XXXIV.



Hunc ita describit Lobelius in *Aduersariis* p. 217. In *Clinopodio*, ait, siue *Leclipe*, propter lectipedium, quorū furculis delin-
neat effigiatu-
ram notissimā,
hodie eodem
nomine, vel
Pharmacopae-
orum vulgo a-
pud Monipen-
senses & Lug-
duenses, dicto,
vix est quod ad veri
Clinopodii ex-

pressionem optes. Aridos namque & glareos occupat tractus, *serpens* pulvisculis. *Scilicet* palmarum longioribus, *radicis* exiguae foliis parvis *Serpyllum* æquantibus, cui & similia vel *Calamintha* montani, vel *Ocimi* minimi, nonnullis leuiusculis in ambitu crenis apparentibus: *cauliculi* complures sarmentosi, præduri, crebris ab imo summo tenus geniculantur verticillis, & alabastrulis *Lamii* quaternis, sed multò minoribus, trifidula toridem exprimentibus, purpureis *stolis* *Calaminthæ*. Calida planta, calorem non ita magnū gustanti præbet, sed siccitatem odorem suam spirat *Serpylli* quadrantes. Hanc si propius figuram intucare, quæ melius *Clinopodium* exprimat, inuenies nullam. Haecenus Lobel. qui in *Obs.* pag. 270. vocat *Clinopodium vulgare* (ita etiam *Jc. Plant.* pag. 506.) odore *Pulegio* iucundiore, *wilder Birch* *Jfop.* Is autem taxat *Tragum*, quod perperam *Calamintham* montanam fecerit: cuius *Kyberus* taxandus erat, non vero *Tragus*.

An est *Cornario* in *Dioscor.* planta illa, quam ignotā *Acini* appellatione officinas *Ocimastrum* vocare narrat: alios *Ocimi* silvestre, Germanos *Flein* / aut *wild Basilien* / h. e. *Basilicum* paruum siue silvestre?

Fuchsius *Ocimastrum* concludit, ac *Ocimoides* græcè haud alia ratione dici, quàm quod *Ocimo*, suis potissimum foliis, simile sit. *Ocimastrum* autem *Latinos*, quasi silvestre *Ocimi* appellare, officinis inusitatum atque incognitum. *Caules* autem in figura *Fuchsi* ac etiam nostra *Guariniana* nimium hirsuti videntur, vti etiam in *fig. Dod. gallici*.

Lonicerus *acinon* pingit, nec distinguit ab *Ocimo* siue *Basilico*. *Riftus* *acinon* & *Aconon* vocat, ac ab *Acano* separat. An *Serpyllum* maius *Trago*:

Pulegium petraeum vocari potest, inquit *Ges-
netus* de hort. Germanici nominis *Steinpooley* *Pulegium*
imitatione, herba aliquibus *Clinopodium* ex-
stimata, quæ spontè apud nos in muris & locis
siccis, saxosisque & apricis collibus crescit. Hanc
puto *Calaminthæ* montanæ nomine non rectè
exhiberi à *Trago* (*Kybero*). Eadem fortè est,
de qua *Car. Stephanus* sic scribit: *Aquatico* *Pu-
legio* similis quædam planta in montibus & sic-
cis locis crescere solet, quæ *Gallis* *Pouliat* *sauna-
ge*, quibusdam *Polium* montanum appellatur: fo-
lio *Serpylli*, sed paulò latiore, flore cæruleo: a-
pud eum collem *Lutetia* vicinam frequens, qui
Eritius dicitur.

Dodon. gall. hanc inscribit *Acinon* & gallicè
Basilic sauvage, h. e. *basilicum* silvestre. *Lat.* de
Florib. & in *fol.* *Ocimum* silvestre, *Acinos*. Is au-
tem & *Ocimum* silvestre & *Clinopodium* negat,
esse *Acinon* sentiens.

Rob. Const. Apud *Amatum* capite de *Acino*,
Fuchsi *Ocimastrum* iconem exhibet, licet *Amatus*
ibi de eo non scribat.

H. Lugd. pag. 912. de *Clinopodio* quorundam
Origani facie (*Acinum* siue *Clinopodium* silue-
stre vocat) & hoc *Acino* multorum (cuius so-
lam delineationem ex *Lobelio* sine figura tradit)
confusè scribit: ac sibi minime constat. Pingit e-
um & describit cap. de *Acino* *Clinopodium*
quorundam *Origani* facie, statuitque esse *Acinon*
multorum, quod *f. llium* est. Huius autem i-
conem pag. 682. *Ocimastrum* *Fuchsi* titulo dedit,
quod *Dodonæum* *Acini* nomine pinxisse fate-
tur.

Anguill. nullam novit plantam quæ *Clinopo-
dio* respondeat, quàm *Ocymoides* *Fuchsi*. *Ta-
bern. Icon.* & *Hist.* *Clinopodium* 2. *Stein Po-
ley / wirbelrost.* *Schvv.* *Clinopodium* minus,
& *Polium* montanum officinarum nonnullarum
Flein Bergmüntz. *Clnf. Pann.* & *hist. post.* *Acinon*
Fuchsi, *Clinopodium* vulgare. *Thal.* *Clinopodium*
verumque, maius & minus. Hoc ra-
pius, illud crebrius: *Gesneri* *Pulegium* petraeū,
& *Dodonæi* *Ocimum* silu. seu *Acinos*.

C. Bauhin. apud *Matthioli*. *Clinopodium* 1. siue
Ocimum silvestre: *Acinos* *Dioscoridis*: *Basilic-
um* 3. *Tragi*: *Pseudo-Clinopodium* *Matthioli*,
& *Clinopodium* alterum in *Epitome*: *Calamintha*
quædam *Ocimi* ferè foliis *Cordi* in *Dioscor.*
variis foliis modò lanoribus, modò angustiori-
bus: sic tota planta modò erecta, modò repens:
aliquando hirsutissima, aliquando penè lævis:
quæ res facit vt *Clinopodium* alterum *Matthioli*
dissimile videatur: reperitur etiam floribus albis.
C. Bauhin.
Nobis quidem *Basilicum* tertium *Tragi* huc refer-
dum non videtur: quod *Trago* ita dicitur, potius
est *Mentha* verticillata minor *Ocimi* odore. O-
stendimus præterea *Acinum* *Matthioli*, non esse
Acinum siue *Ocimastrum* *Fuchsi*, vt opinabatur
C. Bauhinus.

An *Cæsalpin.* *Betonica* alia, *Cestren* *Dioscori*
dicta?

Acinon *Dodonæi* *Bessfordiæ* collectum plan-
tatum in hortu *Ill. E. C. Wirt.* non perit. *Obfer.*
uauit *Basilic* florens *Octobri* variis in locis, vt i-
tinere versus *Montetæ*, & in ipso monte: item in-
tra & extra vrbis muros. *Lugduni* cum flore
Mai. *Genevæ* au *plain palas* florens adhuc
Novembri, & virens mensis *Februarii* principio:
item in muris domus senatoriæ cum flore
mensis *Mai.*: *Monspeli* *Aprilis* & *Mai.* quæ i-
tus *Castelnus* in regione domus leproforum, &
in colle prope vrbem: In *Pannoniæ*, *Austriæ*,

Pulegium
petraeum
Gesneri

Tragus
falsi acini
satur.

Polium
montanum

Acinos
Dod.

Chas. Hist.
Lugd.

Clinop. diu.
plex.

Ocimi
sil.
vestre.
Acinos
Diosc.

C. Bauhin.
not.

Locus &
Tempus

vicinarumque regionum locis aridis collegit Clusius: in incultis & apricis petrosus in alto litis Schvvenckfeldius. Id etiam saepius in Germania observavit Turnerus.

Vires & v-
sus

Authore Schvvenckfeldio, calefacit, siccit ter-
tio recessu. Aperit, prouocat, discutit, roborat.
Tenuum est partium. Menfes & partus pellit.
Ex vino potum melancholicos restituit. Dodo-
naeus facultate aliquantulum calidam & sicca di-
xit, non absque tamen adstringendi vi ac potetia.

ACINI PVLCHRA SPECIES.

Descriptio



Folia non
admodum
vulgaris Acini
foliis ab similia,
bina ex aduer-
so posita, acu-
minata, crenata:
flores ad ar-
ticulos ex fo-
lorum sinu bi-
ni aut terni,
duplo, triploque,
quam in Acino
vulgaris, maio-
res, spatuli, pur-
purascens.

C. Bauhin. phyt.
vocat Clinopod-
ium; huc la-
tifolium, no-
tatque in figu-
ra Clusii cre-
nulas esse omif-

fas. Is verò fuscè describit & eò quod non alibi
observauerit, Clinopodium Austriacum nun-
cupat.

Crescit in montibus Badensibus thermis im-
minentibus, & ceteris vicinis ad Danubium pro-
currentibus: variis præterea aliis locis. Floret
Majo, semen Junio maturum.

OCIMUM GARYOPHYLLATVM

Monachorum siue Acinos Columnæ.

CAP. XXXV.

Descriptio



Est Ozimū
siue Basilicū
cum gariofila-
tum, quod ex-
tra regnum A-
pulie omnibus
terre erat inco-
gnitum, cuius
primum Romæ
attulim⁹ semē.
Nunc Romæ
pluribus Medi-
cis & Pharma-
copæis ac aliis
cognoscitur,
quoniam paucis
ante annis in-
cognitum esset.
Quicumque vi-
dent fatentur

verum esse. Planta autem eiusmodi est. Folia
sunt Melissæ, longiora tamen, nonnihil serrata:
caulis squicubitalis, aliquando altior, quadra-
tus, pilosus, non hispida tamen, ramulosus, colo-

re viridis, ut foliorum, quæ pilosa & plana, ex
peciolis longis, inter folia & alia folia spaciū
trium digitorum, vel circiter: flus ei & spica se-
minis, ut ceteris Ozimis: quolibet spica habet
quoddam alios veluti adnatos spicarum ramulos.
Semen eius aliis minutius est, & rotundius, sub-
ruffum, nigricans. Tota planta præter radicem
habet odorem & saporem acutissimum Gariofil-
lorum: folia linguam vellicant, ut Gariofilus.
Quò senior plura eò odoratiora & acutiora folia.

An Acinus Manardi? Hallucinatur autem
Monachi se primos Ocimum garyophyllatum
aduenisse exultantes: id enim pro Acino ve-
riore & vritibella affert, cone exprimit, & descri-
bit Fab. Columna.

C. Bauh. apud Matth. meminit Acini Colum-
næ: eam autem siccam vnā cum seminibus Nea-
poli ad eum misit Fer. Imperatus.

DE TRAGORIGANO VETERIBVS

& in genere.

CAP. XXXVI.

Tragoriganum Græcis pariter ac Latinis di-
ctum, frutex est, authore Dioscoride, Ori-
gano aut Serpyllo siluestri, & foliis, & ramulis
nimis. Et quædam vltine reperitur in quibusdam
locis speciosior, & lauis foliis, multum glutinosa.
Quædam tenui firmitate, & tenuibus foliis, quæ
de Præfion quidam vocat. Optima est, & que in Co-
& Chio, & Smyrna, ac Creta prouenit. Calefa-
cunt omnes, vnam cient, & ventri commoda
sunt, si decoctum ipsarū bibatur, deducunt enim
biliosa. Profunt & splenicis potæ cum aceto, &
his qui etiam biberunt, cum vino. Quia & men-
ses augent: & ad tussim ac peripneumonia cum
melle dantur in elegmate. Est & potio ipsarum
lenis. Vnde nausæabundis, & stomacho male af-
fectis, & acidum ructantibus, & in quibus anxie-
tates, & nausæ ac calor præcordiorum comita-
tur. Discutit insuper tumores Tragoriganus in
cataplasmate inposita cum polenta.

Tragoriganon, inquit Plinius, simile est Serp-
illo siluestri. Vnam eior, tumores discutit, contra
vifcum [Ixiam Diosc.] potum viperæque iclam
efficacissimum, stomachoque acide ructanti, &
præcordiis.

Galeno adstringit: Celso verò discutit Trago-
riganus.

TRAGORIGANVM MATTH.



Tragoriga-
non, cuius
plantam exhi-
bet, frequens
nasci in oroi-
liis agro affir-
mat Matthio-
las, foliis Ser-
pylli æmulis,
seu gustu Pule-
gii. Vnde non
abs re statim
post ipsum, Pu-
legii meminisse
ait Dioscoride.
In Hist. germ.
vocat Trages-
desien / Gall.
Grasse Mariolat-
ne, atque ab-
dare in colli-
bus


bus saxosis & veteribus multis Foroiulienſibus, in vrbe Anſtia dicta, quæ ſita eſt octo miliaribus Italiciſ a Vtina: ei verò tenues tribuit *ramulos, foliis parvis, oblongis, ſive longiusculis, ſtellæ modo diſpoſitis, ſaporis ferè Pulegii: floribus parvis carnei coloris o-muſtis, à media parte cauſis. Radicem parua, multis fibris donatam, eiſdem odoris cum foliis. Difficile autem eſt certè affirmare de qua planta intelligat Matthiolus, niſi nos aliquis Foroiulienſis doceat, quæ planta apud eos iconi Matthioli reſpondeat: in comm. & Epit. non demonſtrat plantam quam intelligit, niſi ſola icone. In Hiſt. germ. deſcriptionem ponit, quæ non reſpondet nomini gallico, nec germanico: nec nobis conſtat an ea deſcriptio facta ſit ad propoſitam aliquam plantam. Matthioli gloſſatores & patroni ac imitatores nihil certi de Matthioli hoc Tragorigano ſcribunt.*

Lacuna in Dioſcor. iconem Tragorigani Matthioli proponit ſine deſcriptione, quod abundare tradit in montanis Tibuli & Subiaci. H. Lugd. p. 888. eandem figuram ſub Tragorigano Matthioli pingit. Hoc autem Lobel. non Tragoriganum, ſed Calaminthæ ſpeciem alteram eſſe ait, Serpylli & Clinopodii figura.

Tabern. vocat Tragoriganum primum (Boschenſenſi) caulibus pedem & ſemis longis, albis, quadrangulis, in ramulos paruos ligneos diuiſis: foliis Hyſſopo ſimilibus, paulò tamen latioribus: floribus ſimilibus Pulegio petro: odore grato, ſapore acris. Tabern. quidem Matthioli imaginem aſſumpſit, in qua tamen ſummitates cur mutant & magis verticillatas pinxerit, cauſam non reddit. Illud etiam non conſtat cur Matthioli deſcriptionem ex Hiſt. germanica unde figuram ſuam deſumpſiſſe deprehenditur, omiſerit.

C. Bauhin. apud Matthioli. pro eius Tragorigano ponit figuram ex Tabern. quæ an melior deſcriptione quam Matthioli, iudicent quibus nota planta: ſi Camerarius veram iconem poſuit, deſcriptio multò eſt.

TRAGORIGANVM TENVIORIBVS foliis, flore candido.



Minores ſunt huic ſurculi & candidiores, tenuiores, longioræque ſolia, aliquantulum incana, acris guſtus: odor minùs incundus, quàm in Tragorigano primo Cluſii, ſive Clinopodio quoruſdã, Maſtichina cognominato: flores etiã verticillati circa ſummos ramulos naſcuntur ex vtricu-

lis prodeuntes, maiores aliis & galeati, candidi:
Tom. III.

ſemen non obſeruauit deſcriptionis auctor Cluſius: radix iam dictæ ſimilis, lignoſa, dura, multiſida.

Inſcribitur autem Tragoriganum alterum à Cluſio, qui Hiſpanicum 2. & Fraſion nonnullorū vocat. A Dod. lat. in fol. Tragorig. Cluſii alterū. Lob. Obſ. p. 264. Tragoriganum flore albo Cluſii. In Icon. Plant. p. 494. Tragoriganum Cluſii. H. Lugd. p. 590. Trag. 2. Cluſii. Tabern. H. & Icon. Trag. ſecundum, Boſchdoſten. Quid venit in mentem Compilatori, vt Tragorigani Cluſii, cuius iconem aſſumpſit, flores dicat purpureos, præter autoritatem Cluſii: cur quæſo non adſcribit, vbinam tales viderit? C. Bauh. Phyt. Trag. anguſtiſolia ſecundum.

Solo Valentino agro Martio florentem & ſpõ-tè naſcentem obſeruabat auctor.

Synonymiſ

Tab. nũq

Locus & Tempus

TRACORIGANVM QVII VSDAM

nigrius, folio duro, flore purpureo.

Virgultis fruticat dodrantalibus & longioribus, aduerſo plerumque ramorum frequentium poſitu brachiatis, lignoſis, rubicundis, quadrangulis, hirsutis: ſiſta ex aduerſo naſcuntur per modica interualla, oblonga, ſatureiæ toliis quodammodo ſimilia, latiora, naſiq; rotunda, interdum in hortis noſtris & Maioræ foliis nõ minora, ſtigmaris punctata, nigricantia, tactu dura, guſtu acris & aromatico, odore ſuaui, ex quorum ſinu alia minora folia quoque emicant: flores verticillati, duobus ſubiectis foliis, ad ſcapi nodos, ſatureiæ flores æmulantur ex purpura pallescentes, rectu hianti apiculos exſerentes calyculis hirsutis, in quinque aculeos deſinentibus: radix lignoſa exterius rubet, intus albet, ac in ſurculos aliquot abit, capillaribus fibris donatos.

Deſcriptio

An eſt hæc Cam. hort. Tragoriganū Neapoli miſſū? An Thymbra Cretica Cæſalpino? An Theoph. Helenium Anguillare? An Bellon Obſ. l. 1. c. 18. Origanū ſilueſtre, neutrius naturæ (Origani Onitidis & Heracleotici) particeps: nam libentius circa ſepes creſcit, quàm apertis locis.

Dod gall. huic titulum hunc fecit: Tragoriganum alterum. Latin fol. Tragoriganum, de quo ait: In Foroiulienſi agro, Tragoriganum naſci Matthiolus tradit: verum an illius cum noſtro, foliis aſperis, hoſculis verticillatis idem ſit, in tanta ipſius breuitate incertum relinquitur. ſed icones ſolæ demonſtrant ſatis diuerſas eſſe plantas. Gefnerus de hort. Dodonæi verba de hoc Tragorigano recitat.

Tragoriganum
Dodon. à
Matthioli
diuerſum

Lobel. aduerſ. appellat Tragoriganum Cretenſe apud Venetos (ita etiam in Icon. Plant. p. 493.) & Origanum hircinum, itemque Thymum Creticum, ex recentiorum ſententiã.

Tragoriganum
Cretenſe
Lob.

H. Lugd. p. 888. Tragoriganum Dodonæi. Itẽ p. 889. Tragoriganum prius Cretenſe apud Venetos: Item: Tragorigani Cluſii alterius genus alterum. Tres deſcriptiones vnius plantæ, vniuſque figuræ.

H. Lugd.
lapſus.

C. Bauhin. Phyt. ſatureiam 4. ſive Creticam appellat, apud fratrem [me] Montbelgardi prouenientem, & Thymbra Cretenſem Alpini, quam eſſe nos in dubium vocamus. In animad. in H. Lugd. Tragoriganum prius Cretenſe, cuius deſcriptionem ab Hiſtoria poni, figuram verò omitti ait, & petendam ex iconibus Lobelii, qui Trag. Cretenſe apud Venetos nominari tradat.

C. Bauhin.
ver.

*Tragorig.
3. genus
alterum.*

Locus.

Clus. dicitur Tragorigani secundigenus alterum, siue species altera, & Tragorig. Hisp. tertium. Clusi icon ab aliis variat nonnihil.

Prouenit mihi Montbelgardi ex semine misso Sturgardia nomine Thymi Cretici aculeati, & Thymbræ veræ Candia. Lugduni in horto habui florentem Septembri; Bitulæ in horto Cordii Iulio & Augusto. In Valentino agro Martio fleret & sponte nascitur. In Belgicis verò hortis etiam conspicitur & quibuldam Germaniæ, sed isthic vix Hiemen perfert.

THYMVS VETERIEVS.

CAP. XXXVII.

*Thymum
duplex
Theoph.*

PRIMA Thymo laus in antiqua plantarum Historia Græcis à Theophrasto est, quia à principio statim texti de plantarum Historia voluminis longiore descriptione totam eius naturam fortināque complexus est, his verbis capite secundo. Thymum candidum nigrumque reddunt: sed id admodum floret: nam circa æstiuum Solstitium incipit. Mel apes hinc capiunt, & hoc augurio ipsarum constare affirmant, an probe melletur, nec ne: etenim si aliter desloerit, mellatio minus probe succedet: destruitur, peritque flos, si imber incescit. Semen fecundū Thymi nullum ostendi potest, sed floribus quodam permiscetur modo: flores enim serunt, itaque oritur Thymum. Qui tamen Athenis deportare desiderant, querant atque inueniunt. Peculiare tam præ his ipsis, quam præ reliquis omnibus, vel ex locis forriti Thymum aueumant: nam quo flatus è mari nequeat peruenire, illic nasci, duratque posse omnino negant. Et hæc Theophrastus, qui Thymum alibi succo acri constare testatur.

*Virgilii
Thymus.*

Post Theophrastum ex Latinis à Plinio & ante Plinium plerisque aliis, qui Romanorum Italiæque hortos & mellationem instruxerunt: Omnium maximam & eternam æterno carmine Maro illi fecit, cum in Georgicis suis ececenit Redolensque Thymo fragrantia mella:

*Thymus
Plinii.*

Quæ ad Thymi historiam, factique ex eo mellis bonitatem pertinent, Plinius à Theophrasto accepit. Hæc verò Dioscorides. Cæterum, Thymos ab omnibus cognoscitur, frutex parvus, sarmentosus, foliis multis & angustis circumdatus, habens in summo capitula floris purpuream referentis. Nascitur maxime in petrosis, & tenuis terræ locis.

*Dioscorides
duo
genera
agnovit.*

Etiā porro Dioscorides vnius tantum Thymi meminere, tamen capite de Epithymo duo videtur genera agnouisse: vbi ait: Epithymum esse durioris Thymi Saturejæ similis florem. Et videmus, inquit Turnerus, Thymum Venetiis & è Creta allatum alterius esse generis, à Thymo Anglisano.

*Epithymus
Thymus.*

Enothis Thymi appellationibus sunt Epithymus & Thymion solo declinationis genere diuersæ, antiquæ & ipsæ, inquit Marcellus. Siquidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: sed feminino genere alii, herbam Epithymida sc. intelligentes. Ægyptij accepta à Græcis voce, quoniam fortè eo coronarentur, Stephanem, i. e. Coronam appellarunt. Sic & Græci Thyr-

*Stephanus
Thyrion.*

son, quoniam Bacchicas hasas, quas in orgiis eius dethyrsos vocabant, pro hederis cramulis Thymi fortè inuoluerent. Suspiciones tamen, seu, si malis dicere, coniecturæ hæc sunt. Quod porro est *κεφαλον*, quod capitulum significat, certam ex figura floris, capitulorumque eorum, in quibus Dioscorides florem Thymi purpureal- cere dixit, rationem habere potest. Sunt tandem, qui addito colore album Thymum appellant: vt Daci Mozulam.

Thymi verò nomine sequentes donantur plantæ. Thymum Creticum. Thymum vulgare. Thymum latiore & viridiore folio. Serpillum. Satoreia. Tragogitanum nigrum. Hylsopus. Sampfuchus. Marum. Calamintha. Ceps. Porrum.

THYMVM CRETICVM, SIVE ANTIQVORVM.

Thymo Cretico [quod legitimum Antiquorum cum malis, itauimus] plantæ fruticosa, cubitali, virgula, dura, rotæ ferè albicant, subhirsuta: in quibus ad genicula veluti, modicè distantia, folia ex aduerso posita plura, alba, hirsuta, quædam paulò nostratis Thymi maiora, aliaque etiam minora: singuli ramuli in capitulum desinunt oblongum, vix vnciale, multis foliis longiusculis & mediocriter latis, multam pilosis, squammatim compactis, constantes: Huius plantæ sapor valde acris. Descriptio hæc est plantæ sicæ magnæ Creticæ datæ Patavii ab insigni pharmacopæo Io. à l'Aquila. Anno 1586. Lureti mensè Augusto obseruauit quoque Thymum Creticum in horto Robini, insignis Botanici regii, capitulis, ac etiam foliis superioribus, paulò maioribus, acin singulis denum geniculis foliis duobus longioribus, & aliis minoribus.

Thymi nostri Cretici meminere Bellonius lib. 1. Obser. cap. 2. Gallica gens, inquit, & magna pars Gentis subiectæ Romanæ Ecclesiæ hæcenus ignorauit Thymum, quod enim in hortis colitur, non est Thymum, nec Thymi species, sed Serpylli. Herbam Thymum, teste Dioscor. & Theophrasto, oportet habere parua capita, similia Stæchadi & verrucis in nare & pudendis proueniens, quæ dicæ Græcis Thymæa, vt testatur Cellus. Verum Thymum ita frequens in tota Græcia, vt nulla herba in montibus facilius proueniat, vbi pro loci diuersitate florem profert omnino album, vel cæruleum aut purpureum, vel mixtum. Vti autem Thymus nomen dedit verrucarum generi, ita etiam pisci, qui dicitur Thymus, aut Thymalis & in Lobardia Themero aut Themolo. Idem cap. 13. in Thimo prouenire scribit in Creta Epithymum. Hanc etiam intelligit cap. 76. per Thymum Græcum. Et lib. 1. de Conif. vbi Galliam atque Septentrionalem regionem Thymo prorsus carere scribit.

Matthiolum non videtur distinguere Thymum Creticum album à Thymo Monspelienfi. Thymum in Italia, inquit, notissimum: [An Creticum Thymum in Italia sit notissimum dubitamus.] Præstat autem quod ex Apulia fertur, quæquam laudatissimum est, quod è Creta insula, aliisque nonnullis Græciæ locis adachitur. Theoph. & Diosc. Lat. Thymus & Thymum dicitur: Mauritanis, Hæse: Germ. Römischer Quendel & welscher Quendel: Gallis Thym, seu Mariolaine d'Angleterre: Hisp. Tomithu safoero: Bohem. Thym: Polon. Szycetelina.

Anguillara epist. 12. Thymum notissimum in Græcia

Græcia dicitur, & prouenire etiam in Apulia, sed nigrius Cretico: Venetiis cognitum iis, qui herbas Orientales vendunt. Sanior multo opinio, quam Matthioli, Anguillare.

Dodon. gall. Thymum Creticum vocat. Lat in fol. Thymum cephaloton, *Θύμυς κεφαλότυς* Græcè, id est, capitatum. Clusius Thymum Hispanicum suum [quod fusè describit] legitimum existimat.

An Creticum Thymum folia habeat Thymbrae aut Hyssoyi, vt statuit Lobelius, non affirmauerim: ego talia in eo animaduertere non potui, sed multo minora.

Apollo Rad. i. in Diacumino Nicolai meminit Thymi Cretici, Brassauolum aq. Matthiolum reprehendens: sed ipsemet omnibus ineptior.

Thymum verum capitatum annuum Norimbergæ habuit Camerarius in horto, quem in Italia circa Neapolim reperiri scribit & imprimis in Sicilia.

C. Bauhin. in phyt. vocat Thymum 3. siue capitatum, & Thymum Dioscoridis. Deduci refert *Θύμυς ἀπὸ τῷ θυμῷ*, quia adhibeatur iis, qui patitur animi deliquium: alii quòd eo Veteres primum vsi sint in sacris, quæ accenso igne fiebant, *ἀπὸ τῷ θυμωστικῷ* & *τῷ θυμῷ* desumunt, vt videre est apud Rhodoginum lib. 3. cap. 23.

In Creta insula copiosum nascitur: vnde illi Cretici cognomen datum est. Dioscorides gracili folio & petroso prouenire scripsit. Sed & Melitæ rupes magna ex parte Thymo scateant. Clusius non modò circa Hispanicum copiosè nasci dixit, sed Gadibus etiam, quâ parte insula ponte iungitur continenti; & totâ insuper Bætica in maritimis collibus meridiei obuersis. Thymum obseruauit Bellonius Hierosolymis. Thymum colligi oportet in flore & in vmbra siccat.

Dioscoride autem teste, Thymum cum aceto & sale pituitam per alium detrahit: eius decocti ius prodest orthopnoicis; & anhelatoribus, tinea ventris exigit, menses, partus & secundas pellit, atque vrinas ciet: cum melle in eclegmate faciliore efficit excretionem: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissoluit: verrucas peniles tollit cum aceto: ilchiadicis cum vino & polenta impositum subueat, hebetibus oculis in cibo prodest. Est enim & sanitatis tempore ad vsum idôneus loco condimenti.

Pares illi facultates tribuit Plinius, & insuper addit, dari comitialibus, quos correptos olfactus excitat Thymi: viris còtra inflationes cum melle & aceto, & si venter turgeat, testeluc, aut vesicæ dolor exigat: articularibus morbis & luxatis, tritum ac lana inspersum ex oleo imponi: dari & potionem articularibus morbis tritum obolorum pondere in tribus cyathis aceti & mellis. Thymum quia gratissimi odoris, illo in aqua decocto vtuntur Hispanenses, Clusio referente, ad dosia, quibus vinum asseruatur, elucida, & repurganda: non minoris etiam vsus est ad conciliandam odoris gratiam iis vasis, quibus conditæ vitz asseruari solent.

In exsalfaciendo autem, vt Galenus tradit, exsiccatòque in tertio statuendum est ordine, incidit & calfacit vehemèter: ob id & vrinam & menses prouocat, foetum euellit, viscera expurgat, educendis ex thorace & pulmone con-

fert.
*
*

Tom. III.

THYMVM VVLGARE RIGIDIVS,

folio cinereo.

CAP. XXXVIII.

O Doris iucundi commendatione culturam multis locis meritum est, quod hodie plerique omnes Thymum vocamus, lignosâ radice, satis numerosis filamentis donatâ. Ramuli teretes, itidem lignosi, subhirti, foliis Serpylli, angustioribus, incanis, cinereisue, sapore acris præditis, verticillatim per intervalla vestiuntur: *stylum* verticilla bienniore interuallo spicæ figurâ est vbi mentiatur: sunt autem in colore purpurascens vel albo, labelum veluti promittentes trifidum, vnicâ lacinia surrectâ, è medio stylo purpurascens exsertens, calyculis Serpylli hirsutis, striatisque.



Descriptio

Et hæc hodie *Thymum* nomen apud Græcos obtinuit. Et hinc à Germanis *Thym* / *thymian* / *Römscher* & *welscher* quendel, h. e. Serpyllum Romanum & Italicum appellatur: item *demut* / *Humil* tatem dixeris, ac *Serut* alibi Camer. teste. Belg. *thymis* / & *ghencin* *cleym* *thymus*. Gal. *du Thym* & *Thym*, & quibusdam *Mariolaine d'Angleterre*: Genevæ *de la Mignotise*: Montbelgardi *du Citron*: It. *Thymo*. Hisp. *Tomilho*: Angl. *ryme*: Vocatur autem *Thym* Græcis ab excitando, quod *Thym* dicunt.

Nomina
linguarum

Nonnullis potius hoc placet erymum, vt Thymos quasi Thymos, h. e. sanguinem impellens dicatur, inquit Fächlius, cuius figura non placet, licet & nos eam exhibeamus paratam emptam: sed planè eadem est Tragi & Dod. gallici, ite m. Amati. Plura de Thymi Erymo diximus præcedentia capite.

Icon

Coll. Florent. Thymum vulgare, Thymbrae speciem facit, sylvestreque Hyssoptum Mesue, in montibus nascens asserit. Tragus Thymum inscribit ac Argentoratenses id meritò Romanum Serpyllum vocare ait.

Hissop filio
Mesue

Thymum in hortis cultum, nec Thymum, nec Thymi speciem esse, sed Serpylli, contendit Bellonius Obs lib. i. c. 2.

Thymum vulgare Dalechampsius in 6. librum Aeginetæ cap. 38. Thymum nigrum Aetii, & Serpyllum Zygis Dioscoridis pronunciat, diuersum à Cretico.

Thym. nigrum
Aetii

Marthiolus Thymum in Italia notissimum, non distinguit à Cretico: eius verò speciem ponit pro Satureia, de qua mox sub capite Thymi vulgarioris folio latiore.

Thymum i. siue vulgarem tenuiori folio variare tradit foliorum colore C. Bauh. in phyt. quòd alteri sint virentia & suauis odorata: alteri candida.

Cc 2

da & graucolentia, quæ verba de odore sunt Dodonæi, quæ dixit de suo Thymo duriore, in Hist. Lat. in fol. vbi figura hoc titulo: Thymum durius.

*Thym. Cul.
gatum pu-
sillum Lob.*

Lobelius in Adu. vocat Thymū vulgatum pusillum, folio & flore Serpylli rigidiorē, passim Epithymi cincinnis & capillamentis delicatissimis obuolutum, Norbonæ in maritimis collibus natum. Vide caput præcedens. Figuram quam penit in Obs. Belg. p. 508. & Icon. Plant. p. 425. hoc titulo: Thymum durius Plinii, non placet.

*Thym. Cul.
gare Clus.*

Thymum vulgare, quod nonnulli durius cognominant, quoque teste etiam Plinio, lapidei campi in Norbonenſi Prouincia referti sunt: & mediterraneis, quemadmodum & Salmanticensi agro, & aliis Hispaniæ locis sponte crescere gracili & salebroso solo, testatur quoque Cluius. Et id quidem nunc purpureo, quale in Narbonensi Gallia, & Aquitania, nunc albicante flore.

*Locus
& tempus*

Thymon hoc Monspelii passim sponte copiosissime in montibus & locis saxosis provenit, et ceteris multo eo quod in Germania in hortis feritur. Floret copiose mense Martio & tota Æstate ac Autumno. Basiæ in hortis Hiemem difficulter tolerat, nisi recondatur: Lugduni verò facili. Montbelgardi ex semine ex Gallia Narbonensi allato facile provenit.

THYMVS REPENS PISANVS. CAP. XXXIX.

*Locus.
Delempio
Iureuli*



Thymi repentem hanc speciem in horto Pisano lectam exhibuit Nic. Agerius Medicus Argentinenſis. Surculis fructicat pusculis, lignosis, pedalis, curvatis ad terram repandis. Quos ex vincti interuallo brevissimis ramulis glomerati adaggesta foliola viridia, rigida, angusta, albidis, sed brevibus per ambitum pilis hirta, stipant: flosculi rubelli, ut idem perhibet: sic & sapor aliquantulum aromaticus.

DE EPITHYMO VETERIBVS & in genere. CAP. XL.

Quum grauium authorum grauis controuersia de vero veterum Epithymo inueniendo, constituendoque sese offerat, placuit ac necessarium debuit singulorum audiri opinio. Nec enim cuius datur tantas componere lites. Epithymum itaque & ex autoritate Dioscoridis, Thymi durius, & Thymbræ similis, flos est. Habet capitula tenuia, leuia, caudas velut capillos habentia. Epithymi semen ut Alypi. Eadem Orisibius lib. ii. habet.

*Epithymū
Thymi du-
rius flos
Diosc.*

Plinio lib. 26. cap. 8. Epithymon est flos & Thy-

mo, Satureiæ simili. Differentia autem, quod hic herbaceus est, & alterius Thymi albus. Quidam Hippopheon vocant. Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice nati, tenui similitudine pallioli, rubens: siccari in vmbra.

Mesues Epithymum Thymo, Thymbræ, cuiusdam speciei Origani, supercreſcere Caſſiæ modo voluit: duplexque id ait, Creticum, idemque præstantius, præcipue capitulis florulentis, subruſum, acre etiam, odoratu abſolutum, graue. Alterum Syriacum, minus ruſum, ignobilius, ut etiam pallidum & subcitrinum. Hæc ita apud Serapionem leguntur: Ex Epithymo melius est graue, cuius color est propinquus rubedini, acuti odoris, & illud quod deſertur ab Inſula Cretensi, & a domo sancta.

Paulus Epithymbrum, ut arbitratu Ruellius, vocat, quod Epithymi modo ſupra Thymbram increſcat.

Sic parum hæcenus inter auctores conuenit. Alii Thymi florem esse dicunt, & capitulis leuibus, quasi crines dependentem, quibus & Dioscorides & Plinius astipulantur. Florem tamen putauerit appellari Ruellius, quod crinium, vel cincinnorum modo capitula Thymi comat, quadam florum imagine. Alii in Thymo sine radice succreſcens nasci produnt, quadam capillamentorum specie.

Videatur autem Manardo (quem sequitur Tagaultius) Epithymum Mesue ad secundum Plinii referendum, sicuti & id quod in usu nunc est, & vel ex Apulia, vel ex Orientalibus locis afferitur.

Epithymum Arabum velut Caſſiæ Thymi esse, ut etiam Hyſſopi, Satureiæ, & Sampluchi sæpe se vidisse testatur Syluius. Epithymum autem Græcorum & quid reuera sit nondum plane compertum haberi. Quanquam hoc ab illo diuerſum existimet. E contra verò Epithymum Græcorum & Arabum vnum & idem esse contendit Fuchſius.

Vnum etiā & idem statuunt esse Monachi Epithymum: tum apud Dioscorum tum apud Mesu. & Plinium ac alios auctores: sed, cum, ut ipsi ſeſmet ſententur, quātō magis legerent de Epithymo apud auctores, tantō magis mens eorum vexaretur, & confuſionem maximam inuenirent: Phantaſticatur, machinatur, fabricantque ſuo modo vaniloquia.

In ea opinione, inquit Marthiolus, verſantur Braſſauolus & complures alii, ut credant, Dioscoridis, aliorumque Græcorum Epithymum, magno diſcrimine ab eo diuerſum esse, de quo ſcripſerunt Mauritani, præſertimque ab illo, cuius meminit Meſues. Quippe qui aſſerant, nil aliud Arabicum Epithymum esse, quàm capillaris Caſſiæ genus quoddam, quod Thymo circumuoluitur. Græcum verò idem esse volunt, cum proprio flore durius Thymi Satureiæ ſimilis. Suam autem ſententiam hoc argumento comprobare videntur, quod ſi vulgaris uſus Epithymum, Arabicum ſc. illud eſſet, de quo diſſerit Dioscoridis, is non dixiſſet, Epithymum florem esse durius Thymi, ſed alterius plantæ Thymo adnateſcentis, eique ſeſe conuoluentis. Id quod etiam Plinii auctoritate confirmant, ut qui eorum opinioni, ex eo maximè adſtipulari videatur, quod duo Epithymi genera prodiderit, quorum alterum illi ad Græcos, alterum ad Arabes referunt, & ita ſuam tuentur ſententiam. Horum certè iudicio ego quoque facili ſubſcriberem, niſi quadam ſele nobis offerrent, quæ aperte reclamare videntur, atque etiam oſtendere, Plinio

nium ipsum Dioscoridis codicem, unde illa mutatus est, deprauatū habuisse, vel aliū aurorē in hoc minū graue secutū fuisse, vel alio modo deceptum, ut in aliis pluribus euenisse adnotauimus. Palam enim faciunt, quantum equidem reor, nostri vñs, & Dioscoridis Epithymum, vñm & idem esse medicamentum, quā de eo Aëtius, & Actuarius, Dioscoridem & Galenū secuti, concordēs posteritatis memoriæ prodiderūt. Quorum sanē verba liquidō ostendunt, quod nō secus Epithymum in Thymo prosilit, atque Epithymbrum in Thymbra, & Epistabe in Stæbe nascitur. Hoc idem præter Aëtium & Actuariū longē antē testatus est Paulus. Ex quibus non dubitauerim asserere, vñm tantū esse Epithymū, non autem plura. Quandoquidem si Paulus, Aëtius, & Actuarius pro certo non habuissent, legitimum Epithymum esse illum Thymi florem, de quo scribit Dioscorides, putassentque duo eius genera reperiri, nulli dubium est, quin & ipsi explicassent duplex in Thymo nasci Epithymum. &c. Eorum autem qui contrariū tuentur fundamenta quod attinet, ita illa reiicit idem Matthiolus. Quod autem Dioscorides Epithymum florem Thymi dixerit, haud ineptē dictū putauerim: nam cū is sciret Epithymum Thymo innasci, nullā radice propriā, sed Thymi adminiculo fultum, florēque per se albos ferre, qui cū in Thymo sunt, huius plantæ proprii videntur: idē non absurdum fore duxit scribere, Epithymum esse florem durioris Thymi. Præterea Plinius cū & deprauatum Dioscoridis codicem habuerit, nec eius mentem rectē percepit, nō affirmatē dubiē duo Epithymi fecit genera, & aliorum potiūs opinionem, quā suam retulit: Nisi omnino concludendū, quod satis perspicuum est, tam confusē & inconstanter de Epithymo & Thymo tractasse Plinium, ut nihil certi in hac re ex eius verbis elici possit.

Cornarius in Diof. de hisce difficultatibus nihil omnino asserit.

Amatus de Epithymo hæc prodidit. Est igitur Epithymus, siue Epithymus, crinis tanquam palholum Thymum ambiens, vel potiūs flores Thymi. Nascuntur autem potissimū capilli isti, tanquam inuolucrum super Thymo, qui eadē floribus Thymi vires habent, & ea de causa authoris nonnunquam per Epithymum flores Thymi intelligunt, nonnunquam verō crines supercrecentes in eo cum suis floribus. Nascitur Epithymus iste Salmantica (ut ceteros silicam locos) ad ripas fluminis Thormidis, & si rectē memini prope Sacellum S. Mariæ dicatum. Est & alius Epithymus rubens, qui capillorum modo absque radicibus crescit, & aliis obnoluit, circumligaturque plantis, præcipuē Lino, & ea de causa Podagra lini appellatur, quam Plinius Cuscutam aliquando nominare non dubitauit, quāmq; etiam inter Epithymi genera commemorat.

Contrariū statuens Anguillara, Dubitandū non ducit, Epithymum plantam esse separatam à Thymo & Cuscuta, consistentibus etiam Dioscoridis verbis. Malus autem, inquit, quorundam intellectus, quibus incognitæ erant plantæ Epithymi & Alipi, efficit, ut Dioscoridis res duæ diuersæ in eodē subiecto intelligantur. Dioscoridis verbis patet eum voluisse vocare plantam Epithymū, licet sit Thymus, qui similis est Thymbræ. Dicendum igitur, reperiri duos Thymos, quorum vnus cognomento Epithymus, & alter simpliciter vocaretur Thymus &c.

De duello Brassauoli & Matthioli, si liceat, & mihi integrum fuerit [Apollinis verba sunt] impune loqui. Matthiolo honoris manubias offerendas iudicamus, vulgatumque Epithymum id esse, de quo Dioscorides scripserit, nec scire quid dicat Brassauolus, si quæcunque capite de Thymo, in eum, ut etiam Matthiolum reiecta sunt, diligenter examinentur, duplici tantum existente Thymo, eoque Satureiæ simili, è quo Epythymon lib. 4. idem cum Thymo lib. 3. descripto, quod et si è durioris Thymi genere sit, cui Epithymum insurgat, non idē diuersa in specie appellanda: propterea si quæ aduersus eum obtorqueri possunt, animo agitentur, iure cadit Brassauolus, tametsi Matthiolum nihil ferē aduersus eum opponat, &c.

Porro Tragus pro Epithymo, si deficiat, vtiliter sumi refert Cuscutam nascentem in vitica. Gesnerus verō Cuscutam nascentem in Hyslopo nostro vulgari. Fallopius Cuscutam in Thymbra nascentem subornat, ut infra dicemus de viribus. Apud Euch. Ræsi. confunditur Epithymon cum Trifolio acetoso, ut cuius icona pro illo malè ostenditur.

Potum igitur cum melle Epithymum, purgat Vires & deorsum pituitam, & bilem atram, priuatim conueniens in melancholicis, & inflatis, acerbabili mensura ad pondus drachmarum quatuor, cum melle & sale, & modico aceto, author est Dioscorides. Thymi facultatem habere Epithymum testantur, Galen. 6. simpl. Orisab. lib. 15. Paul. 7. Aet. lib. 1. sed ad omnia efficacius: exsiccat & exsiccacere in tertio gradu. Alium purgat ex aqua mulsa etiam Epithymon, inquit Plinius: stomacho minū vtilis, uomitiones minū mouet (stomacho inutilis, uomitiones mouet Corn.) sed tormina & inflationes discutit. Sumitur & elegmate ad pectoris vitia cum melle, & aliquādo Irīde. Mesues Epithymum calidum & succū secundo dixit gradu, duplici substantiā compositum, terræ pauca parum adstringente, & ignea acri, melancholiam præter cetera, tanquam prærogatiua quadam, facile & citra molestiam purgante, ob id affectus melancholicos, potissimum capitis melancholiam, epilepsiam, delirientiam, tumorem, vertiginem, cephalalgiam melancholicam, syncopen quoque cardiacam, cordis tremorem, & affectus alios cordis melancholicos, Obstructionem lienis, & morbos inde ortosانات, & melancholiam hypochondriacam, obstructions renum, cancerum, lepram, vlcera nigra, quartanani, vsu multo sanat: nam tenuat, resoluunt, obstructions aperit, viscera roborat. In calidis & siccis naturis non vtendum: quia calorē immodicē auget, ac inde sitim excitat. Imbecillius & tardius purgat, nisi largius sumatur, aut cum Myrobolanis Indis, aut pauco Elleboro nigro, aut mulsa, cum pauco sale aut vuarum passiarum decocto, cum sale præsertim gemmeo, vel Indo, vel Naphthico, aut sero lactis caprini, vel Pipere aliquo, Zingibere, vel alio acri: sic enim citō & facile purgat. Sumendum autem omnino est, vel cum oleo Amygdalarum dulcium, vel decocto vuarum passiarum purgatarum, ut leniendā alium magis subducatur, & ne substantia nitrosa partes lædat, quas permeat. Parum diu coqui sustinet. Datur decocto à drachmis quinque, ad drachmas viginti: puluere à drachmis tribus ad drachmas septem: cauendo Aestatem. Epithymum [inquit Aët. tetrab. 1. sect. 3. cap. 29.] atram bilem infernē purgat. Dantur ex ipso con-

Matthioli
argumen-
ta contra
Brassauo-
lum lenia.
Substituta.

Vires &
vñs, ex
Diof.

Galen.

Plin.

Calidis &
siccis non
conuenit.
Cum qui-
bus sumi-
dum ut
promptius
purgat.

Deco-
do.

HISTORIAE PLANTARVM:

aiso ac cribrato scrupuli 12. cum passo & aceto mulsio ac modico sale.

Caterum, Mefuem dosin nimium auxisse asserunt Manardus & Tagaultius. Syluius autem cum Mefue, ob imbecillitatem à drachmis quatuordecim ad drachmas viginti dandum censet. Tagaultius contrarium asserit, dicens nequinem esse, præter vnum Mefuem, qui ad septem vsque drachmas progredi audeat. Proinde consultit, ut quinque tantum, vel sex ad summum drachmas, idque paucissimis concedamus. Porro verò ipsius Epithymi infusi seu macerati offerri potest, Tagaultii quidem opinione, ab vncia vna, vsque ad vncias duas. Galenus idem pondus exhibet in sero lactis, vel mulsæ m. m. lib. 14. Oribasius in suo compendio vix drachmas tres transcendit. Auicenna portionem Epithymi quatuor esse aureos præcipit.

Fallopium de Epithymo opinio.

Epithymum autem Mefuem agere perhibet, eiusque tria genera esse, scilicet Epioriganon, Epithymum & Epithymbram Pauli, siue Epithymum officinarum, quam in usu esse perhibet loco Epithymi, eademque habere vires, licet aliquantò debiliores: supra alias verò plantas, præter iam dictas, natam non habere vim purgandi. Propriū enim esse plantarum orientium supra alias, ut exsurgent alimentum à plantis, in quibus proueniunt vnde sicut illa planta attrahit succum à terra, quo alitur: ita planta supra ipsam producta trahere succum ex se pro sua nutritione, & sic illam absumere, eiusque puriori & tenuiori succo nutrirī: & hinc esse, quod Cuscuta orta supra plantam habentem vim purgatoriam, non solum & ipsa purget, sed & magis etiam ipsa planta, quia succo subtiliori nutritur. Epithymbram tandem fugiendam ait illam, quæ Thymbræ adnata & implicata folia atque flores non habeat, quia nihil aliud sit, quam capillamenta, quæ aliquando non soluant ventrem, quæque Sepiasarii acceperint ex plantis, quæ non habent vim purgandi: siccat Epithymum validè, & calefacit: & ideo fugiatur ipsum in siccis habitibus: quod etiam vult Fallopius esse dictum de aliis Cuscutis, ortis supra plantas purgandi facultatem habentes.

CASSUTA SIVE CUSCUTA.

CAP. XLI.

Descriptio Cū Epithymum, Cuscutam nobis in memoriam reuocet, hic locus postulat, ut deinceps de ea differamus. Alienæ quadræ affecta nunquam non parasitatur Cassuta, ingrata hospes; quippe quæ herbas fructusque, quos semel arripuit, longissimis stamineis clauiculis rubentibus tam arcto nexu complectitur, ut eorum genium defraudet, subductoque alimento eos penitus enecet, nullis postquam in altum confendit nixa radicibus, quibus tamen primum erumpens haudquaquam destituitur: flores per capreolorum mæandros nullo ordine subleuantur glomeratis, quorum singulares flosculi

rubefcentes, albicantesque, quatuor foliolis radiatis constant, fibrillis purpurantibus medium obliuentibus, Epore insigniter acri: capitulis succedentibus insunt semina rotunda, Papauerinis magnitudine paria.

De hac nihil veteres Græci, quoddam inue-



nerim (inquit Ruellius) memoriam prædiderunt. Plinius in calyce decimi-sexti voluminis, cuiusdam consimilis herbæ meminit, quæ ut visum in aliena stirpe viuithæc in Siria vocatur Cassitas. Hæc, ut testatur reliquerunt auctores, si calidæ insidet herbæ arbori te, calidum sortietur facultatem: & si decubuerit frigida, vim si-

bi frigidam vendicabit: sic suæ parentis ingenuū referens, nec à conditione materna degenerans,

Tragus Androsacen facit, ac duplex eius genus constituit, candidum scilicet & rufum, præfectque omni reliquo in medicina vitiis adnatum. Illud præterea negari non posse contendit, eam in hortis nequaquam vilem, sed damnosam esse, ac propterea à quibusdam Podagram, & Anginam Lini appellatam fuisse, & rectè quidem, cum vitiis herbarum accenseri possit. Adhæc Orobancham Dioscoridis meo iudicio non ineptè negat, sed non sine periculo lapsu illam in Dioscoride Androsacen appellari dicit, Antonii Musam & Euritium Cordum secutus. Cum porro cum Epithymo similitudinem aliquam habeat, Epithymum hanc nostram herbam appellandam censet, ac fororem Epithymi esse iudicat, ac etiam pro Epithymo vilitè usurpandam censet.

Anguillara Epithymum esse negat, ac Androsacen, si apud Dioscoridem æquum legatur, esse comprobat, non absque temeritate.

Dodonæus Cassutham in sol lat. duplicem tradit, his verbis. Reperitur, inquit, Iunio, & Iulio & Augusto mensibus, in Rubo, Vepribus, Lupulo & Lino, maior, crassior, & candidior: in Thymo verò, Thymbræ, & aliis humilioribus, ac durioribus, ut Eryngio, Genista, & aliis, tenuior ac rufior. Maiorem, crassioremque Officinæ passim Cuscutam appellant: nonnulli quoddam Linum amplexantur, podagram Lini: doctiores Cassutham aut Cassytham, Gelsenus de hort. Linodesmon: Arabes Kessuth, aut Chassuth: Illyrii nonnulli Pophith, Germani siligraus, Toderen, dottenfraut, Sciden Toderen, Seidenfraut, & schlachsyden: Brabantæ & Belgæ Schorste, wranghe, & Veldcrayt: Galli Goute de Lin, & Angure de Lin. Ital. Cuscuta: Angli dodder: Boh. foforicen: Hung. Göreny fia. Minorem ac tenuiorem, quæ duriori Thymo, Thymbræque se implicat, Dioscorides æquum nominat, Officinæ nomen seruant. Alii inter quos

quod Acturius folius Thymi Epithymum: quod verò Thymbrae Epithymum: simpliciter quod Stæbe innascitur Epithoben nominare, singularem cuique generi appellationem tribuentes. Hæc inter alia Dodonæus, qui præterea negat Cassutham, quod quibusdam visum est, eandem esse cum Cadya, quam Theophrastus Syriacam herbulam tradidit arboribus, vepribus, & aliis quibusdam innascentem.

Fuchsius eos errare refert, qui Dioscoridis Androsacen esse putant: Plinium eius meminisse placet ipsi, ac propterea Cassythas apud Plinium etiã Hermolao admonere, legendũ iudicat, & nõ Cadyas. Et sic iã memoriã Plinii Cassythã herbã nomine Syriaco venisse in Latinum, quod multis postea seculis usurpantes tam Pœni, quã Arabes, suis scriptis protulerint. Quod autem Plinius sine spirite protulerit, id liberiorum culpa factum esse suspicatur, quin inuidentes mutasse Cassythã in Cassyas.

Sunt, inquit Matthiolus, qui putent admirabile hoc plantæ genus Plinio Cassytham appellari. Exeniũ equidem verbis, quod reperiantur Pliniani codices, in quibus Cadyas, non Cassyas legitur, quodque hæc arboribus tantum, & spinis se circumuoluit, nostra verò Cassutha duntaxat herbas & frutices, non arbores complectatur, & irriterit, non autem asserunt vulgarem Cuscutam esse Plinii Cassytham: præsertim cùm in Syria tantum nasci scribat ipse Plinius. Hæc Matthiolus, cuius vltima verba hæc, veritatĩ cõtrariantur: Plinius non dicit tantum in Syria prouenire, sed herbam Syriã esse, & non tantum arboribus, sed & ipsis etiam spinis sese circumuoluerit.

Cordus in Dioscor. ait Epithymum, quo nos hodie vitmur, verum Epithymum esse, id tamen infirmis argumentis negare Musam Brassauolã: verum enim Epithymum in pharmacopoliis haberi, & nihil aliud esse, quã Cuscutam in Thymo nascentem: adnasci etiam Thymbrae Cuscutam, quæ Epithymum appellatur: Cuscutam aliarum herbarum accedens esse: Bene legi apud Plinium Epithymum sine radicibus nasci: nam proprias radices minime in terram agere, &c. Nobis tamen Cuscuta non omni radice caret.

Cassutham copiosam obseruauit Montpelii supra Thymum, eam autem vocant Epithymum: itemque supra Aspalathum secundum, pluresque plantas alias: Basileæ copiosè extra portam lapideam in superiori parte ad dextram mensè Iulio & Augusto: Montbelgardi copiosè in horto Ill.E.C. supra Vrticam, in horto Nofodochii supra Lupulum in suo adhuc vigore Octobri: in agris versus patibulum Septembri. Cuscutam supra Ebulum luxuriantem obseruauit Ioannes Schvvab in pago Stissenfrid ad fluiuiam in finibus Austriæ. Non in terra, inquit Fuchsius, sed in herbis arboribusque passim nascitur Cassythã, quas tam spisso sæpius irriterit contextu, vt tentorii modo herbosum cespitem à Sole vindicer. Nonnunquam cacuminihus impendens stirpes humi deturbat, propriamque parentem suis lacis strangulat, aut continuò materni alimenti succu producit ad eadem. Ætate Iulio potissimum & Augusto mensibus, maximus illius in Germania prouentus esse solet: hoc enim tempore tanta eius est luxuria, vt mole suã stirpes onerata ferè procumbere videantur. Et hæc Fuchsius, qui radicem temerè nimium è medio tollit. Planta hæc, inquit Tragus, viridis adhuc

radicem habet prælongam, quam non multi, quod sciam, obseruauerunt. Solet autem è terra prodire Androsaces Iunio mensè, ac in fine eiusdem rotundos proferre acinos, semine perexiguos, Argemonæ, seu erratici papaueris simili, ex quo ubi in terram deciderit, quocannis sponte sua repullulascit, refertos. In Belgio planta lubèter prouenit in Rubo, Lupulo & Lino, ac in aliis etiam herbis, maxime locis calidis, vt in Thymo, Thymbra, Tithymalo, Chamædri & Eryngio, sed valde parua & tenuis est: at locis siccis, in Genista parua, & Absinthio.

Serapio Cuscutam tradit calidam esse in primo gradu & siccam in secundo: abstergit, aperit obstructions hepatis, renum, folliculi fellis, humores expurgat crassos & biliosos, robur addit vetriculo & iecinori. Vetriculo tamen vilius eius nimius aduersatur propter adstrictionem immodicam: corrigitur tamen Aniso & semine Apii: purgat bilem, idque efficacius quam Absinthium: propinatur decoctionis scilicet cum sacchari boni drachmis decem. Sunt in ea sententia quidam, vt pro plantarum, quibus innascitur, temperamento, iam calidam, iam frigidã esse putent. Tragus magno experimento aquam destillatam Cuscutæ laudat ad sudores ciendos, & sanguinem purgandum, & obstructions hepatis & lienis, & luem Veneream. Ceterum iis, qui Cassytham parentis suæ facultatem aliquam sibi quoque adscribere audent, subscribit etiam Dodonæus, sic vt quæ Genistam superat, vrinas potentius moueat, & ad alui deiectiones magis efficax sit: humidior quæ Lino implicatur: adstringendi facultatem admixtam habeat, quæ Rubio insidet, quæ & propter hanc potentiam adiunctam, aliis ad iecinoris, lienisque affectus merito præfertur: cùm enim expurgandi, adstringendi que facultates simul habeat, visceribus istis imprimis vtilissimã est: talia enim iecinoris lienisque oportere esse medicamẽta, Gall. l. v. m. mabudè docet. Lob. tamen etsi plantæ cui innascitur, vires quadantenus referte concedat: è Lino tamen Practicis & officinis præferri scribit, quod citra calorem minus adstringat, magis emolliat, leniat, extergeat, & ad educationem & deiectionem præparet: in Vrtica verò natam vrinis potentius eliciendis & obstructionibus soluendis efficaciorẽ. Manipulus huius herbæ vino decoctus & potus obstructions epatis & lienis soluit, morbum regium sanat. In fomentis, deiectionibus & balneis sudatorii ad quasiis melancholicas affectiones, regiumque morbum inueteratum præstantissimi habetur Cuscuta.

Vires & vilius
Obstructiones

Correctio.

Temperamento variat.

Ex vrtica

In deiectionibus

SERPILLVM VETERIBVS ET

in genere.

CAP. XLII.

Amagibus cunctis relictis, Serpylli plantis in locis meminit Theophrastus, in genere tamen ait. Ex herbis viret perperu Serpyllum (serpillum) videturque ex superioribus orti. Sunt enim qui omnino fructu carere asseuerent. Sæpè enim exsiccatum, tritumque seruasse se inquirunt, sed nunquam germen erupisse: nam huius quoque periculum se fecisse affirmant: at tamen & florem & semen fert. Neque defunt qui vel hæc experti fuerunt, & natura ipsa siluestrium planè attestari videtur: Serpylli etenim siluestre etiam genus est, quod deferentes ex montibus ferunt, vt apud Syonem fieri solet, atque etiam

Serpilla
Theophr.

Satur

Athenis ex monte Hymetto: apud alios verò, vt in Thracia, montes & plana omnia Serpyllo scaturit: apud nonnullos etiam Thymo figura, folio, rectis virgulis, flore, odore, viribus & facultatibus simile [Dioscorides enim legitur in græco textu, pro quo Gaza perperam transtulit, Thymum penitus redolet.] Constat ergo quod sui ortus primordium ex semine capit: in summo terræ adhæret, radice multifida, torridaque, & lignosa: Ramulorum proprium quoddam est incrementum. Quippe cum possit in quantalibet longitudinem produci, arrepto pedamento aliquo, aut si propè sepes plantetur, aut ex altiore loco demissum, auctu facillimum. Species autem vrbani (sc. Serpylli) tenere non est (facile sc. fieri nequit, vt quis eius species recenscat.) Syluestris verò [sc. Serpylli.] aiunt esse [sc. certas species & dictu faciles.] Hoc enim in montibus (sc. prouenit) Thymbæ odore simile, acrimoniaque. Illud verò odoratum & mollius [sc. odore non acri.] Serendi verò opportunum ipsius tempus, vt plurimum est Autumnus, in quo properant inter: prima conferere. Cæterum, Vere nonnulli quoque ferunt: & cum cætera vmbra, aquas, sinumque ament vnicè, hoc squalorem patitur, atque in totum aquæ pauca indigum est: sed humo præcipue gaudet, & iumentorum potissimum: Transfereadum quoque id sæpius censent vt melius reddatur. Serpyllo, inquit Plinius, lib. 19. cap. 8. sub finem: cætera quæ alibi de Serpyllo tradit parum distincta: nec bene dixit Serpyllum suis innasci adminiculis: montes plerique [planaque Theophr.] scaturit, sicut in Thracia, vbi aquæ, vbi quidè Theophr.] deferunt ex iis auulso ramos, feruntque. Item Sicyone ex suis montibus & Athenis ex Hymetto, &c. leuissimè nascitur in putorum parietibus, & circa piscinas ac stagna. Lib. 20. cap. 22. Serpyllum à serpendo putant dictum. Quod siluestri euenit, in petris maxime. Sarium non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit. Pinguis voluntarium & candidioribus foliis, &c.

Serpyllum
duplex
Dioscoride

Dioscorides Serpyllum vnum agnouit herentis, odore Samoluchum referens, & coronarium. Nomen item habere à serpendo, & quod prout quæque ipsius pars terram contingit, radices agat. Habere folia & ramos Origano [m. g. a. legendum arbitror] Clus. similes, sed candidiores. Verùm ad sepes demissum, auctius assurgere. Alterum siluestre statuit, quod & Zygis appellatur, non serpens, sed erectum: ramos emittens tenues, sarmentosos, foliis plenos, similibus Rutæ, angustis tamen, & oblongioribus ac durioribus: flores gustu acres: odore iucundum: radicem inutilem.

Et hæc ex Dioscoridis authoritate, apud quem Appellatio Serpillum quidam agrestem Zygida, alii verò Polium, Ægyptii Meronopon [Meronopii alii] Romani Cicer erraticum appellant. Herpillon autem Græcorum, & inde Serpyllum Latinorum, dictum quidem est à serpendo, tum quia per terram, qua illam contingens radicatur, serpit: cum quia iuxta sepes plantarum, aut ex altiore loco deorsum demissum, adiecto illi pedamento, in longum protrahitur & serpit, autore Theophrasto, Dioscoride, & Plinio. Zygis appellatum est siluestre genus, idque vt videtur à trutina, quæ Græcis Zygion dicitur, eò quod in rectum, instar trutinæ, ramulos suos erigat: Seu quia ramulis eius ad vincendum & ligandum, iugandumque

præcipue vites, quod Græci ζυγίον aliquando dicunt, antiquiores vterentur. Cicer erraticum ac rusticum appellatum est à foliorum similitudine, conuenitque syluestri generi hæc appellatio, quod stat, & Ciceris modo ramulos suos erigit, inquit, Humelbergius apud Apuleium, qui floribus esse ait Serpillum agreste omnibus in virgis constitutis, in summitate purpureis, remordentibus linguam, odore iucundo: nasci præterea in petris, vehementiorem autem esse quam rubeam, feminalem siue hortualem appellatam. Cætera eadem tradit quæ Dioscorides.

Nicander in Ther. commendat Serpyllum ad arendos serpentes: νεκταρ appellans, quod continuè in anteriorem partem progreditur, eorundem modo, quæ aut in armentis & gregibus, aut in corporibus nostris pascendo progrediuntur & serpunt: & quædam, quod vitam amant, ideoque ipsum seipsum non continet sobole, & propagatione radicat, & in petris, id est, radices agentibus foliis, quod Dioscorides ait: quæ parte terram contingit, seipsum radicat. Vocatur itaque Serpyllum piscens, quod vitæ cupidum, madidè depalcitur herbam: Aut quod radices agens hirsutis semper foliis, seipsum in altum suspendens, pascat. In montibus etiam dici perhibet Scholiastes Græcis, eò quod vt plurimum radices ipsius serpunt, ac propterea etiam νεκταρ vocari, quod subinde vitæ natus pascit.

Hermol. transcribit multa de Serpyllo ex Theophrasto eo non citato: deinde ait, satium non serpere Plinio, sed ad palmi altitudinem increfcere: voluntarium & siluestre serpere in petris maxime: Dioscoridi contra serpere satium, non autem siluestre.

Marcellus nihil scribit, quod multam lucem adferat Serpyllo à Veteribus tradito: Tam suauis, inquit, quem ex se mittit, odoris halitu delectat omnes Serpyllum: tamque vno hoc bono vbi que sese commendat, & amabile facit, vt in delitiis vitæ homines id sibi semper fecerint, & adhuc faciant coronis in conuiuiorum lætitiis, & si lignosum sit, adicientes rutilis pulmentariis, licet multo calore ferueat in ore: nouerunt id quæ vrbes & agros incolunt gentes omnes, pauci tamen siluestre à satio discernere didicerunt. &c.

Serpylli æquiuoca traduntur, dicimus Serpyllum vulgare esse Serpyllum antiquorum: inuenitur autem flore maiore, & minore, colore purpureo, & aliud albo. Serpyllum maius Serpyllum Citri odore. Serpyllum angustio folio odore Nucis Iuglandis, vel nullo. Serpyllum angustio, lanuginosoque folio. Serpyllum longifolium hispidum. Serpyllum Thy. mi folio Narbonense. Serpyllum siluestre Zygis Clusio, Thymo vulgari rigidiori simile. Triagus auctor est Thymum Germanos Serpyllum italicum vocare.

Serpylli præterea nomine apud Authores sequentes donantur Plantæ. Thymus latiore & viridiore folio. Acinos multis. Serpyllum alterum Tragæ. Tragoriganum Matthioli. Origani. Silymbium. Valeriana siluestris maior. Artemisia. Veronica semina Dodonæi.

Serpyllum Tralliani quale sit considerandum.

SERPILLVM VVLGARE.

TAm græco, quam Latino nomini originem dederunt serpentes ramuli, duri, lignoli, quadrati,

drati, subrubentes, modicè hirsuti, qui vbi terram attingunt, nouas subinde radices agunt : primæ autem lignosæ sunt, satis crassæ & frequentes, fulcæ, plurimis fibris capillatæ : ad ramulorum nodos singulos folia plura, Thyini vulgaris latiora, subrotunda, neruosa, sapore acri & aromatico : flores in capitulis Thyini interdum candidi, plerumque tamen purpurascens.

Eius duplex habetur genus. Primo flos est media parte minor, apice in medio interdum bi-



fido : colore vt plurimum purpurascens : folia, vt sequentis, odore nõnihil ad Melissam accedente. Secundo flos maior duplo, in medio quinque apices, color remissior & minus purpurascens : in foliis non differt à præcedenti, nisi odore, qui nobis suauior videtur. Serpyllum interdum degenerat in capitula

to mentacea, candicantia, quæ florum loco sunt. Est nobis præterea genus aliquod, foliis & caulibus præcedentibus si mile, sed hirsutum valde.

Nota vulgo est herba, & Græcis quidem ἡ ἑρπύλλη dicitur : Latinis autem Serpyllum : Germ. Quendel/ kümel/ Funckel/ Kyenlein/ hünertöl/ hünertsee/ wild Pöley/ vnser frauen bestir/ hünertserb : Belgis Quendel/ wieden thymus/ & vnser vrouwen bestroo : Gallis Serpuler & Pillolet, Dod. It. Serpillo, seu Serpillo : Hisp. Serpill & Serpillo, Dod. Serpillio seu Serpam, Camer. apud Matth. Angl. wild ryme : Boh. Materii Quassiffa : Sclauon. Babaduffa : Hung. Bafut seu h.c. Cuculi herba. Arab. Hemen, Serapioni autem Arclas.

Porro tam Dioscorides, quàm Plinius, duo faciunt Serpylli genera : in descriptione tamẽ non conueniunt, quorum alter Serpyllum syluestre negat serpere, alter affirmat : difficile hinc est dicere, cui sit adherendum. Auctoritas Dioscoridis ad se trahit Turnerum : sed experientiã nonnullã adducitur, vt in Plinii sententiam penè facessat. Quemadmodum enim nullum vnquã vt ait vidit Serpyllum, etsi ex siluestribus translatum, serpere, & ex cacuminibus, caulibusque radicari denuò, ita nullum unquam, rectum surgere obseruauit, præsertim adultum, sed semper in terram caducum : fatetur tamen Serpyllum etiam siluestre, cùm capitula florẽsque producit, coliculum tollere, sex circiter vnciarum : & hinc fieri posse, vt Dioscorides Serpyllum syluestre, quo tempore florẽt, contemplatus, alio tempore non perpendens, pronunciarit Serpyllum siluestre non reperire, hortense autem serpere, & ex gemculis denuò radicari, quod obseruationi Turneri repugnat, nisi de siluestri intelligatur in hortis translato.

Tragus in Hist. germ. Serpyllum penè Dicta. Tom. III.

innum Dioscoridis existimarat, nolebat tamen suã opinionẽ quemquam decipere, ac idẽ in lat. tanquam erroneam omisit.

Serpyllum hortense in Hetruria haud negligitur : sed in hortis seritur, & magnã admodum diligentia colitur, quod etiam inibi (vt Dioscor. inquit) in coronamenta additur. Siluestre duorum est generum vnum flore candido, odore citrei Mali : alterum verò flore purpureo, gustu perquam acri, Satureiã simili : vtrumque copiosissimè nascitur apud Goritenses Saluatico monte, quo mihi (inquit Matthioli) hætenus lætius nusquam videre contigit, nec item odoratius. Serpyllum Theophrasti hortense nil aliud esse censo, quàm siluestre in hortis satum.

Dodon. in fol. lat. Serpyllum vulgare pingit & describit, ac dicit : Officinæ Serpyllum : præterque verò etiam Pulegium montanum nuncupant. Et pilli n quidem Serpylli Veterum existimatur : non tantum tam Serpyllis, quàm Saxifragæ Dioscoridis respondens. Si etenim diligenter, & ad Serpylli vtriusque & ad Saxifragæ descriptionẽ expendatur, exiguum Serpyllis, plurimum verò Saxifragæ similia esse conperietur.

Varietatem in flore Serpylli perhibet Lob. in A. lu. cùm ait : Serpyllum hodie quoddam satium quod habetibus & grandius : quoddam verò siluestre, in calis marginibus, sterilibus, & collibus gaudens : facies vtriusque Thyini nostratis vulgaris : flosculi purpurantes, nonnunquam et albescentes. In Obs. pag. 2. o. in Icon. Plant. p. 423. huius figuram habet inscriptione Serpilla & Saxifragæ Dodonæi. Clus. Serpyllum vulgare ceptens vocat.

Tabern. Icon. & Hist. Serpyllum minus flore albo : Item Serpyllum minus flore purpureo. Frustra duas figuras ponit, herbæ solo colore floribus variantis.

Camer. hort. Serpyllum maius flore purpureo, & aliud candido. Thal. Serpill. passim, sed rarioribus floribus candidis. Hort. Luf. Serpill. vulgare : item album : ac Serpill. minus.

C. Bauhin. Phyt. Serpylla. siue vulgare maius : Camer. Serpill. maius flore purp. & candido : Tabern. Serpill. album, qui & alteram habet figuram, Serpilli albi 2. nomine. Item Serpill. siue vulgare minus : Brunfels. Serpillum : Lobel. Serpill. & Saxifragæ Dodonæi : Apud Matth. Serpill. satium 1. Serpill. vulgare minus 2. Duo hæc Matthioli Serpillia cur Frater separet, & duas figuras ex Tabern. sc. priorem eius & posteriorem assumat, credimus excusationem adferre cum vix possit : nec Matthiolus duo hæc Serpillia ab inuicem se iunxit.

Nulli porro sunt, auctore Clusio, nudis colles, gramineiue campi, aut ficiora prata, vtriusque margines herbei qui vulgare Serpillum in Pannonia non alant : in omnibus Europæ provinciis occurrit, passim locis siccis, restante Gesnero, asperis & apricis luxurians : & pro diuersitate locorum ac cæli odorem mutat. Sercebatur olim in hortis, idque succulo, non semine. Serpillum hortense in Aprilis initio florens conspexit Marantha : sed Iunio & Iulio mensibus florere scribit Fuchsius. Ego Serpillum obseruauim Montpelii, Patauii, & Basilæ florens mensibus Iulio & Augusto. Genevæ florens passim mense Maio & Iunio. Montbelgardi in orto Ill. E. C. vnum flore minore, & alterum maiore.

Serpylli Vires & facultates ex Dioscoride & Plinio Poëmate hoc describit Mæci :

Serpyll.
hort. Mabi.
thiol.
Syluestre
duorum ge-
nerum.

Pulegium
montan.

Saxifragæ
Dodonæi.

Serpyll. du.
plex.

Saxifragæ
Dodonæi.

Tab. nat.

C. Bauhin.
nat.

Locus

Vires &
vires

*Serpillum veteres dixerunt quod quasi serpar
Terra vicinum, hinc seruida sicque vis est,
Acri cum vino c. etum contundis Olliuo,
Cui Rosa dat nomen, hoc vinguine per lue frontem
Ægroti, capitis s. lex hoc sedare dolorem:
Nidor combusti serpentes effugiat omnes,
Et quoduis animal infundens ore venenum,
Hoc idem misere cibis messoribus est mos,
Vt si forte sapor fessus depresso illos,
Vermibus à nocuis eud requefcere possint.
Pestiferos morsus bibitum iuuat, appositumque
Prouocat urinas, compefcit tormina ventris:
Splen iuuat admixto si sapè sumatur aceto:
Si mel prædictis iungatur, sputa cruenta
Lactantes, mire potus s. lex ille iuuare.
Haustum cum vino iecoris sedare dolorem
Dicit. r. hique solet producere menstrua potus.*

Oculor.
caligo.

Serpillum autore Galeno, vsque adco exalta-
cit, vt & menses. & urinas moueat, gustu multum
acre. Serpyllum cum melle & aquâ coctum, ad
caliginem oculorum, si eo lauuentur, commendat
Arnoldus Villanouanus. Quoniam è Serpil-
lo cum Saccharo parat Elethuarium pro pauperi-
bus à peste præseruandis, quos ante ientaculum
nucis Castaneæ quantitate accipere iubet. Ser-
pillum refrigerare putatur corpora æstu Solis
ternida, nõ lecus atque Allia, Cæpe, cæteraque
acria vesca. Rationis quædam vestigia videre
est in diuini Maronis Bucolicis.

Testylus & rapido fesis messoribus æstu

Allia, Serpillumque herbas contundis Oleses.
Facultate Serpillum vulgare calidum & siccum
esse perhibet Dodonæus, tertio penè ordine, te-
ninium partium & incidens; menses euocare; v-
rinam ciere, calculos expellere; & in balneis
ac fomentis adhibitur, sudorem euocare.

SERPILLVM CITRII ODORE.



Serpillum hoc ab aliis
non obserua-
tum ait Clu-
sius, qui sic de-
scribit: Admo-
dum, vt opi-
nor, simile est
vulgari, in om-
nibus Europæ
prouinciis oc-
currenti: cras-
siora tamen &
magis atra ha-
bet folia, quæ
trita, Citrii
mali, vel Me-
lissophylli o-
dorem refe-
runt & capitel-
la paullo ma-
iora, magisque

Locus
tempus

purpurascencia, similibus tamen *flosculis* prædi-
ta: crassiores *ramulos*, quadrangulos, palmares,
per terram fusos, ad lingula internodia fibras
agentes: *radicem* verò lignosam, multifidam, fi-
brofamque, numerosos proferentem cauliculos,
summâ tellure in orbem sese spargentes.

Clus. in Pann. p. 626. & Hist. post. vocat Serpyl-
lum Pannonicum 1. & Serpyll. Citrii odore. H.
Lust. Serpyllum citratum. C. Bauh. phyt. Serpil-

lum 4. siue foliis Citrii odore, & Serpyll. citra-
tum Tabernamontani.

In Pannonia mixtum cum vulgari prodit, cum
eo etiam florens Iunio. Ego prope Dornach
Serpyllum Citrii odore mente Auguito obser-
uaui.

SERPILLVM ANGUSTO, LAN- GINOLQUE folio.



de fundunt in ambitu cauliculos foliis non mi-
nus quàm proximè præcedentis, oblongis, & iis
quidem angustioribus præditos: incana, molli-
lique lanugine pubescentibus: longa in summis
cauliculis capitella à Serpylli longo glabròque
folio capitellis non differunt, & similibus floscu-
lis plena sunt: femina in villosis rufescentibus
vtriculis parua, rotunda, fusci coloris. Tota
stirps pineum quodammodo siue resinaceum o-
dorem trita refert, & calido gusta est.

Clusius descriptionis auctor in Pannon. p. 627.
itemque in Hist. post. Serpyllum Pannonicum
tertium inscribit, ac Serpyllum angusto lanugi-
nolque folio cognominat. Idem etiam ibidem
aliud describit Serpyllum: Angusto scilicet fo-
lio, odore nucis iuglandis, vel nullo: nec non
etiam Serpyllum longifolium hispidum, cuius
figura etiam existat in tabella huius Serpylli ang.
lanuginolque folio. C. Bauh. phyt. Serpyllum
7. siue angustifolium hirsutum: illud verò quod
odore est iuglandis 6. angustifolium glabrum.

In Pannonia, Austria, & vicinis prouinciis cū
vulgari nasci ait, & florere Iunio. In hac porò
tabella exhibemus ramum Serpylli longifolii
hispidi, quod hic subicitimus.

Serpillum Thymi folio Narbonense.

In Ericetis Egidii pagi vulgò S. Gilles agri Mon-
spelientis, Thymi angustifolii facie rarior Serpil-
li species signosis & durioribus surculis repit, cu-
ius radix & flores similes nostrati. Huius ramu-
los nobis communicauit Franciscus Peninus.

Pingitur à Lob. in Obf. p. 250. in Icon. Plant. p.
423. sub hac inscriptione: Narbonense Serpyllum
foliis & facie perpylli angustifolii Thymi no-
stratis. C. Bauh. phyt. vocat Serpyllum 1. siue
Thymi folio. An Camer. hort. Serpyllum mi-
nus

nus folio Thymi; sed virentiore, angustior

not. Tabern. dicitur in Icon. & Hist. Serpyllum Creticum. Illi vel eius Succenturiato placuit in hac planta fingere, quæ libuit: Figura ex Lobeliana mutata & mutata: falsus titulus appositus, descriptio facta ad malè consideratam figuram.

SERPILLVM SILVESTRE ZYGIS

Clusio, Thymo vulgari rigidiore simile.

Serpillum silvestre: Zygis appellatum, quale Dioscorides describit, obseruabam, ni fallor,

(inquit Clus.)

in Castella veteri, iisdem locis cum Thymo duriore, siue nigro, cui perquam simile est figura,

ramis, altitudine, & radice: folia verò paullo

latiora habet quam Thymum,

minus odorata, sed grauius nonnihil olentia, vt pote

quorum odor ferè sit inter Abrotonum & Stœchadè medi-

us: in virgibus item ramulos,

qui floribus verticillatim nascentibus vestiuntur,

coloris ex albo purpureiscentis: quæ florum dispositione & odore, à Thymo discerni penè duntaxat potest. Minor est præterea eius acrimonia quam Thymi, quippe quæ aliquid adstrictionis admittum habeat.

Clusius author huius historiæ in Hisp. vocat

serpillum dycen & (vbi) Dioscoridis, id est, vt in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam vterque intelligat, ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconæ suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei appolimus.

Clusius

in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis. Est autem hæc Clusii imago apud

in omnibus generibus.

Cunilam bubulam Origanum silvestre Græcorum esse, Ruellius conuincere nititur lib. 3. c. 25. placetque hæc opinio, etiam Dalechampio. Gesnerus Bubulam appellatam coniecit, quod inter bouum remedia fortè olim in vfu fuerit, quam apud Scriptores in Hippiatrica solum mentione eius inueniatur.

Cunila nomine sequentes plantæ passim apud autores occurrunt. Satureia hortensis. Satureia siluestris. Origanum Heracleoticum Matthioli. Origanum vulgare. Clinopodium Matthioli primum. Ligusticum. Conyza. Origanum silvestre. Encensaria. Scryu. filu. Siler montanum. Acinos. Conyza. Conyza maior Matthioli. Conyza mediæ minor species. Conyza media Matthioli.

Aequiuoca

THYMBRA VETERIBVS.

CAP. XLIV.

Thymbra Dioscorides notam ait, prouentientem in tenuis, terræ & asperis locis, similem Thymo, minorem tamen & tenebriorem, ferentem spicam flore plenam, viridem. Possit eadem, quæ Thymum, si similiter sit utitur. Et in sanitas ad vsum idoneam esse. Nasci & satiuam Thymbra, per omnia minore. n. siluestris, sed vtiliorem in cibo, eò quod non ita intentam habeat acrimoniam.

Thymbra Diosc.

Thymb. sat. siluestris

Thymbra siluestris quidem, inquit Paulus, eadem quæ Thymus potest: satiuam verò per omnia debilius est, sed etiam melior. Si inola ex crassa genitura, intus ad herescentem, generatam, Satureiam [Satureia] ex aceto ex aqua tenuiter trita, potui exhibendam præcipit Hippocrates.

Cæterum, habuisse se antiquissimum & probatissimæ fidei Dioscorideum codicem refert Marcellus, in quo plures Thymbrae principio appellationes, præter Cunilam & Satureiam, hæc segerentur: Clinopodium, Probation, Agrostum, Origanum agrestis: & post barbatas, nulliusque intellectus pleraque alias, à Romanis Cunilam rusticam appellari.

Thymbra appellatio. nec nota.

Cunila rusticæ

Marcelli sententiæ quæ Thymbra, Cunilam & Satureiam vnam eandemque herbam facit, contrarius esse deprehenditur Cornarius, vbi in hæc verba promittit: Plinius eandem herbam Thymbra, Cunilam & Satureiam facit. Columella verò, inter Thymbra, & Cunilam, quam Satureiam vocant, distinguit. Quod verò inter Thymbra & Satureiam sit differentia, in carne mine docet:

Marcelli opinio reprobatur.

Satureia quid Cornarius.

Et Satureia Thymi referens Thymbraque saporem. Mihi itaque mangonio parata fuisse videtur Satureia, & ex Thymo ac Thymbra composita, vt non simpliciter Thymbra, Satureia dici possit. Galenus in simpl. tractatu Thymbra præterit, nisi excidisse putandum est.

Cornario subscribit inter alios etiam Dodonæus, dicens: Græcis Thymbra est, nec aliud Latinis nomen verè habet. Nam quod Satureiam interpretes dici velint, Columellæ Latino scriptori repugnat, qui inter Thymbra & Satureiam manifestum discrimen ostendit. A vulgo autem in officinis Thymbra nullum nomen accepit.

Confundi tandem tres diuersas plantas vna appellatione, testatur Marcellus. Vnam, inquit, agrestem Origanum, Thymbra, & Thymum non simul miscerent Herbarii.

D d 2

CUNILA VETERIBVS.

CAP. XLIII.

Meminit Cunila Plinius lib. 20. cap. 16. eiusque præter satiuam plura statuit in Medicina genera. Est enim quæ Bubula appellatur. Est quæ Cunila gallinacea appellata, Græcis Origanum Heracleoticum dicta. Est quæ à Græcis mascula, à nostris Cunilago vocatur: è contratio est quæ Mollis vocatur: est quæ Libanotis: & præter satiuam est etiam montana. Commendantur à Plinio Cunilæ species contra serpentes, tussim, iecinozum vitia, & laterum dolores, vt & ac mouedas vrinas, ac ducenda mulierum lochia. Masculæ verò dictæ vires vehementissimæ.

Tom. III.

De Thymbra in Lex. Rob. Constant. hæc scribit : *Thymbra* Dioscoridi, dicitur *Thymbra* Hippocrati, & *Thymbra* Theoph. histor. 7. l. Plinio *Thymbra*, *Cunila*, & *Satureia*: *Columella* tamen inter *Thymbram* & *Satureiam* distinguit. Aetius etiam *Thymbram* dixit in plurali.

Cæterum Virgilius 4. Georg. *Thymbræ* graue odorem esse perhibet:

Serpilla, & grauius spirantis copia Thymbra.
Phaoninus verò *Thymbron*, olus esse acre & amarum statuit.

Thymbræ demum species prima Dioscoridis *Anguillaræ*, videtur nobis *Thymbra* Græcæ.

Thymbra vera Dodonæo, est nobis *Satureia* durior.

Thymbram hortensem multi faciunt *Satureiam* satiuam, de qua mox agemus.

Thymbræ
nomine
donatæ
plantæ.

SATVREIA SATIVA.

CAP. XLV.

Descriptio



Lignosa nuncitur radiculæ & simplicis, ex qua virgula surgunt, pedem aut cubitum alta, teretia, rubescens, subhirsuta, geniculis certis distincta, ad quorum singula folia nascuntur Hyssopi vulgaris, non nihil hirsuta, & crebris foraminulis, non tamen peruiis, erosa, odore Thymi vulgaris, mitiore, sapore æque acris: ex eorundem alis *stipuli* exeunt in quatuor laciniolas diuisi, ex albo purpurascens: *semen* paruum, *Chelidonio* conferendum æstimat *Tragus*, tametsi illo magis sit incanum, & colore sub igricans.

Post *Serpillum*, inquit *Tragus*, atque *Thymū*, sequitur *Satureia*, seu hortensis *Hyssopus*, & iure quidem, quod enim ad formam & temperamentum attinet, consimiles penè apparent commemoratæ plantæ. Est autem hæc inter illas statuenda differentia, quod *Satureia*, maior & æ magis fruticosa, & quæ instar arbusculæ multis ramulis brachiata, quotannis incrementum.

Multi, vt *Fusch.* *Trag.* *Corn.* *Lacuna*, & alii *Satureiam* satiuam, *Thymbram* esse concludunt, quibus ad stipulari videntur *Matthioli* & *Dodonæus*. Et hinc quoque *Cordus* in dispens. supra *Thymbræ*, siue *Satureiæ* siluestris, sanit satiuam *Thymbram*, h. e. *Satureiam* hanc nostram.

Hist. *Lugdunensis* contra neutram *Dioscoridis* *Thymbram*, nostratrem *Satureiam* dici voluit: cuius fuit etiam opinionis *Bellonius*.

Cæterum, Latinis *Satureia* appellatur, *Trago* sc. *Corn.* *Matthiol.* in prior. comm. *Lacuna*, *Turn.* *Dodon.* *Camer. hort.* & *Taberna montana*.

Thymbræ
Disf.

Descriptio

no: *Satureia* sativa *Fusch.* *Satur.* siue *Thymbra* sativa *Cordo* in *Hist.* *Satureia* hortensis *Lob.* in *Adu.* p. 182. in *Obs.* p. 232. in *Icon. Plant.* p. 426. *Satur.* vulgaris hortensis *Matthioli* *H. Lugd.* p. 898. *Satur.* altera *Matth.* in comm. cum mag. fig. in *Epit.* cum add. *Camerarii*; in *Hist.* *German.* eiusdem *Satur.* prima. *Gerardo* *Satur.* hortensis altera: *C. Bauh.* phyt. *Satur.* 1. siue hortensis; apud *Matth.* *Satureia* altera: *Brunfels.* *Hyssop.* agrestis. *Dodonæo* inter *romina* *Cunila* *Columellæ*. *Gesn. hort.* *Thymbræ* hortensem vocat; in *Cat. pl.* *Thymbram* herbam: *Cæsalp.* *Satureiam* herbulam.

Stigitur alia est *Thymbra* *Dioscoridis*, & alia *Satureia* hæc sativa seu hortensis, meritò hanc appellabimus Arabicè *Sabater*, seu *Sbatat*, & cū *Rhaze Carohn*: *Germ.* *Saturon* / *Saturey* / *Sadaneu* / *Sergenfrant* / *funell*: *Zwibelhyssop* / *Garten hyssop* / *Zoseple* & *Hünerfäll*: *Belg.* *Scülen* / nomine vt apparet à *Cunila* derorto, item *Saturey*: *Gall.* *Sariette*, *Sarriette*, *Sadrée*, *Sauorée*: *It.* *Sauoreggia*, *Corniola* & *Pesarella*. *Hisp.* *Cast.* *Azedren*; *Cat.* *Sagorids*; *Port.* *Saturagen*, *Segurelha*; *Brab.* *Timbria*, & *Saturegia*: *Angl.* *Sauery* / & *Sommer Sauorie*: *Boh.* *Saturege*: *Polon.* *Egimbr*: *Hung.* *Bors* fin.

Satureia autem à saturando fortè dicta, quod edulis frequenter indatur & incoquatur, id quod germanicum illud nomen *Hünerfäll* innuere videtur, quod ad gallinaceum genus faciendum non raro adhiberi consuevit. Prouinciales quidam, vt nobis relatum, vocant *Pebré d'an*, vel *Pebré d'axe*.

In hortis vbique ferè scitur, quotannisq; moritur. Planta enim est æstiuæ, quæ per Hiemem durare non potest. Non solum autem in hortis scitur, sed spontè per se nascitur in apricis collibus, & in torrentium alueis, si fides *Matthioli* haud neganda. Eodem quo prouenit anno flores, semen facit, ac deinde perit.

Porro *Satureia* calida & sicca tertio ordine, sed minùs quam *Thymbra* (*Satureia* durior) quàm mitior est, atque idcirco etiam vt *Dioscorides* ait, in cibis commodioris vñs: Attenuat autem & flatum insigniter discutit, proinde vnà cum *Phascolis* (*Fabis* cum *Selino* incisa & infixa edulium gratum *Belgis* frequens habetur, *Lob.*) & aliis leguminibus flatuosis vtiliter coquitur ac editur: imò ventri calens in fomento apposita, vteri ex flatu strangulatus mox sedat, auctore etiam *Dodonæo*. *Thymo* suis in qualitatibus similis est, inquit *Matthioli*, proinde excalfacit, aperit, incidit, & digerit. *Satureiam* planè eandem cum *Serpillo* vires obtinere ait *Tragus* (sed illo odore suauiore ac remissione, gustu autem & natura calidiorem esse, proindeque condimentum pauperum: nam omnibus edulis tam carniū, quàm piscium concoqui: inducere enim appetentiam ciborum, stomacho conferre, venterque stimulare. Alia, si quæ sint, *Satureiæ* iuuenta, in historia *Serpilli* & *Thymi* declarata esse. Vnum hoc addere libet, consuetudinem nimirum esse pauperibus, in nostra Germania, vt hac herba *Brassicas*, quas vulgò vocant capitatas, condiant, qui sit, vt illæ iucundissimum odorem, ac saporem gratissimum inde accipiant.

SATVREIA DVRIOR.

CAP. XLVI.

Satureia durior folia habet minora, *C. Bauh.* *Shino*, aliquando latiora; multòque duriora, dilu-

dilatius virentia; quam sativa, numerosa in ramulis brevioribus, multis statim è radice

lignosa, perenni, pullulanti- bus: ex folio- rum alis spicę vtrinque emi- cant breues, Hyssopi quo- dammodò si- miles, *flosculor- um* candido- rum.

Hanc Bel- lon. Obs. lib. 1. cap. 62. com- memorat, ac vocat, Trago- riganum circa Hierosolymā in montibus repertum.

Anguill. spe- ciem Thym- brę facit, &



quidem siluestris, quę in Tuscana vocatur *Tomo*, *Tombl* ac etiam *Thima*, quodd. sc. folia habeat si- milita Thymo, sed maiora.

Dodon. Columellę authoritatē innixus, inter Thymbra & Satureiam discrimen statuit: ideo- que Thymbra præsentem plantam inscripsit, Thymbraque Græcorum asserit, vulgo ac offi- cinis incognitam. Satureiam autem non esse, et- iam ex Plinio concludit.

Lobel. in Aduers. itemque Icon. Plant. p. 426. dicitur Satureia siue Thymbra altera: in Obs. p. 212. pingitur sub falso Satureię hortensis titulo. Dicit totam gustu esse Piperis, eoque vulgo Piperellam appellari. Camer. in Epit. Mat- thiol. itemque Hist. eiusdem generis. Saxifragiam secundam inscribit.

Non dubitandum quin H. Lugd. vnius plantę plures proponat figuras: & primę quidem p. 897. hunc esse inscriptionem, Satureia durior: alteri verò hanc, pag. 898. Thymbra effigies Dodonæi: fortè & tertiam habet p. 898. sub hoc titulo, Thymbra Dodonæi, quę figura inepta videretur, nec dum eam apud Dodonæum reperi: prior ad- hæc icon & secunda describitur: tertię nulla sit mentio. Indagandum denique quantum ab hac differat Hyssopus Fuchii nomine posita p. 934. Et an eandem cum Hyssopo Belloni.

Tabern. in Icon. & Hist. Thymbra 1. *Römisch Saturey* 1. Item Satureia Romana 2. Pro hac Satureia Romana 2. ponit Compiler iconem, quę Linariam Beluidere potius exprimit, quam vllam Satureię speciem. Quam itaque plantam intelligat nos fugit, & forsitan ipsemet ignorat quid scribat.

In Germania ac Belgio temerè fuerit alibi, quā in hortis quærere. Fertur in montosis & saxosis Narbonensibus & Pedemontanis, asperis quibus- dam & incultis vberim provenire. Nos variis in hortis eam obseruauimus florentem Vere ac etiam Autumno. Montbelgardi in orto Ill. C. Hiemem interdum perfert, nec quotannis perit: nimio tamen frigore existente reponendam cu- rauimus.

Facultatem autem Thymbre [Satureię durio- ri] Dodonęus calidam & siccam tertio excessu assignat: attenuare, incidere, meatus expurgare: breuiter, omnia quę Thymum posse & præstare:

Ex opinione Camerarii apud Matthiolum, vrinā cit, calciplos in renibus frangit & eiicit, visum- que, si edatur, acut Saxifraga secunda, cuius titu- lo Satureiam hanc duriorem exhibet.

THYMBRA GRÆCA. CAP. XLVII.

Multis ea ramis statim à radice fruticat, Thymi instar, quadrangulis, subasperà lan- uagine obductis, purpurascens, quibus inna- scuntur alternatim semper ex aduerso ramuli, foliis eadem serie digestis onusti, Thymi genuini foliis pænè similibus, subhirsutis, odoratis, medi quodammodò inter Cunilam & Thymum odo- ris, acrisculique saporis: summos ramos verti- cillatim ambiunt aliquot capitula multis foliolis constantia, inter quę caliculi, è quibus emer- gunt suauiter purpurascens *flosculi*, Thymi flo- sculis similes in quatuor lacinias diuisi quarum infima latior est & repanda, suprema etiam lata, sed breuior, reliquę duę minores, prodeuntibus è medio quinque staminibus candicantibus, quo- rum apices fulci coloris, & medio stilo bifido: è semine hæc planta nata pusillo, nigro, Thymi se- mini non abssimilis: radix dura, lignosa, quam in Belgio perennem futuram, vix tibi peritadere potest Clusius, licet rami procumbentes fibras egerint.

Clusius legitimam Thymbra statuit, quam etiam nunc hodie Cretenses *Thymbr* & *Thymbr* appel- lent. Arabes, si Rauuollio credimus, *Satbar* dicunt. Insule Sio incolis *gnylia* dicitur, vt *rabum*. vult Anguillara. Cretensibus *rela* vt scribit Bel- lonius.

Primum Clusio conspecta fuit & exactè nota anno reparatę salutis humanę 1596. vt quę illi il- lo ipso anno in Belgio nata fuit, semine à Bello è Creta vsq; misso. Octobri autem & Nouēbri dū- taxat flores protulit: eamque ob causam nullum semen præbere potuit.

Clusius easdem illi facultates tribuit, quas Thymbre Diosc. & Paulus.

SATVREIA FOLIS TENVIBVS, SIVE tenuifolia S. Iuliani quorundam. CAP. LXVIII.



Satureia, si- Sue Thym- bra vera S. Iu- liani, siue Sa- tureia vocata, in Icon. Plant. p. 425. vt refe- runt Aduersa- ris, in Tyrre- ni maris aspe- ris & salubro- sis S. Iuliani Hetrusci, ma- gno prouentu oritur, aspectu perquam ele- gans herbula, quam nullus non fatetur Satureiam ve- ram, quamque Pisani etiam

bellum binis alis superioris parte donatum demittitur, colore caeruleo saepius, albo aut rubro rarius: *semen*, minutum in vasculis oblongis. Odo-
re nonnunquam grato Molchi, differens reperitur.

Cæterum an prætribus hæc Hyssopi varia-
tibus, tribus opus sit iconibus, vt quidam credi-
derunt, iudicent lectores. Lobel. in Icon. Pl.
tres habet. 1. est p. 433. hoc titulo: Hyssopus Ara-
bicum, Mesûæ & officinarum: secundus est p. 434.
Hyssop. Arab. flore rubro: tertia p. 435. Hyssopus
albis floribus. Sed & Gerard. tres dat imagines:
Duas vtd Tabernamontanus & totidem Hill.
Lued.

C. Baubin. cæteris oculatiō in inueniendis & offerendis plantarum differentiis, ita de his differētiis. Hyssopus sive vulgaris cæreula communiter ex vna parte floret; aliquando ex vtrāque, vt expresse Lobelius. Elt. & odore tantum differētiis, inchoium redolens. Hæc etiam spica breui, & rotunda aliquando variat. Hyssopus 2. sive cæreula folio dissecto, aliās à vulgari non discrepans, quare tantum ramum (cum vulgari vt & nos) apud Matthiolum exprimi curauit. Hyssopus 3. albo, vel rubro flore, flores habet sæpius vno tantum ordine digestos, aliquando vtrinque.

Præter *Hyllopura vulgrem*, aliam quoque agnoui Gesn. hort. moschatam sc. quæ pro *Ciliola* à Dodonæo describitur, & cum icon bas stirpiû primi tomi Fuchsi Antuerpiæ excusis cum nominibus & descriptionibus Hispanicis sub libri finem depingitur.

Facile exstinamus Euch. Rœsslin. intelligere
 Hyssopum vulgarem, quamvis descriptio non
 correspondeat. Apollinaris etiam lib. 2. fol. 128.
 vires sub his nominibus *3fen Ephem*, adscribit,
 huiusque figuram habet, utenque aliam fol. 100.
 pro *Eppid*, i.e. Hedera, sed malè.

Fuchſius malam exhibet iconem: quin & Porta phyt. lib. 2. cap. 31. ineptam vulgaris Hyſſopi figuram habet.

Cæterum, non immerito controuertitur ab auctoribus An Hyssopus Græcorum, cum hæc Ara bium idem sit, nec ne. Et quidem pro Dioscoridis Hyssopo recipitur a Fuchsio, Cordo, Matthio lo, & Amato. Negatiuum uerò tenetur sententiæ Monachi, Anguilara, Turnerus, H. Lugdunenſis, Lobelius, Hort. Luſit. Gerardus, Sylius, Cluſius, Bellonius in Obſeru. & C. Bauhin. & alii: quorum argumenta reſutandæ nobis minime ſatiſſaciunt Fuchsius, Cordus, Matthiolus & Amatus: Vnde nos vulgarem noſtram Hyſopum Dioscoridis & Pinnii eſſe aſſerere nondum audeamus. Illud interea negare hæud poſſumus Hyſoppi noſtram vulgarem non inſelici cum ſuccreſſu ejus loco in medicamenta venire.

Cæterùm quod nòs Hyssopum dicimus , Tragus Origanum Dioiscoridis esse sentit , quam verò doctè, ipse iudicato.

Quia autem Cæſalpinus non audeſt aſſerere Hyſſopum vulgi floribus caruleiſis eſſe Hyſſopum antiquorum ob ſaporem. Idẽ magis ipſi vide-
tur cum Symphyto petræo Dioſcoridiſis contine-
re, quod Plinius Alũ vocari teſtatur. Illud ſo-
lum ambigatũ facit, quod capitula Thymi
tribuuntur: non enim cum Thymo Cretico, ſed
potius cum Italico ſimilitudinẽ gerit cãmuni-
bus.

Hysopum hanc passim officinæ & vulgò appellant: Serap. cap. 260. *Halcusa* Cyse: Hebræi 3. Reg. 4. Leuit. 14. *Esof*, & *Osfon* vocant: Thal-

multitudo *Schoenobolus*: Germ. *ysop* / *hyssop* / *eloster*
hyssop / & *firden yssop*, ob vltim, vt nonnulli cre-
derunt, quem in Ecclesiis ac monasteriis pre-
buit, vt populus cum ipsa respergeretur. Vnde
& illud esse ait Plalm. 50. *Asperges me Domine*
Hyssopo, &c. supra quem textum D. Augusti-
nus de *Hyssopo* quædam monet. Verùm *hyssop-*
us quæ vitmur, li *Zescriel* in fulm. credimus, nõ
est *hyssopus* de quo Salomo loquitur. Non de-
sunt, inquit, qui plantam illam, quæ in Hebræo
dicitur *Esf*, seu *Esfos*, quod Rosmarinum in-
terpretatur, seu *Libanotis*, *hyssopus* transula-
runt, vocabulorum vicinitate decepti. Sed, nõ
strum non est præsentis compoæcere lices. Theo-
logis disceptandum hac de re fuerit. Instituit
notri ratio requirit, vt nomina linguarum ac fide-
litatæ quâ fieri poterit, recenscamus. Belgæ *Zs-*
pen ar yssope dicunt. Galli *hysspe* & *hyssope* Lob.
Itali & hispani *hyssopo*, & *ysopo* Dod. Angli
hyssop. Boh. *hyssop*. Nomencl. Pann. *Zfop*.

hyssopus angustifolius spicatus vulgarem,
flore caeruleo, albo, & purpureo copiose colui.
Monte-ligardi in hortis : floret in Germania ac
Belgio, Iulio ac Augusto mensibus. Genevæ vi-
di in hortis Novembri, interdum hieme folia re-
tinentem. Tiguri & Tubingæ apud D. Gefnerum
& Fuchium oblataui hyssopus moscharam,
quam illi montanum quoque vocabant : nobis
crevit postea in orto Ill. E. C. Collibus asperis
Romanæ & Veronensibus tractis, præsertim locus
Athesin, quæ Imperatoriam à Venetorum ditio-
ne discernit, & regione montis Baldi, spontè
fruticare hanc refert Lobelius, cuius nupiam al-
quod nifi in hortis invenisse dicat.

Vires quod attinet, *Discordes* suo hyssopo vim tribuit attenuandi ac calefaciendi. Decoctum cum ficibus & aquâ, mellæque ac Ruta, & pocum, peripneumoniciis, anhelosis, tussi diuturnæ, destillationi, & erectæ cervicis spirationi auxiliari, itæque lumbicos occidere, scripsit. Et si cum melle delingatur, idem facere. Decoctum eius crassâ per alium ducere, cum aceto mulso pocum. Edi & cum ficibus viridibus tritis, ad alium subducendam. Sed vehementius purgare ammixto Nasturtio aut Iride, aut Itrione. Inducere item bonum colorem. Eandem ad splenem & hydropem, in cataplasmate imponi, cum ficu & Nitro: cum vino verò ad inflammationes. Discutere etiam sugillata, cum aquâ feruente impostam. In anginis commodissime gargarizari, cû ficum decocto: dentium quoque dolorem mitigare cum aceto coctam, si colluatur. Soluere & autium inflationes eiusdem decocti vapore: *Galenus* hyssopum tenuium partium esse dicit, & tertio ordine calefacere ac liccare. *nippocrates* 2. de dietâ & sanâ *Medici* & *Aræ* præcipiunt esse statuit. De hyssopi viribus *Plinius* sparsim hæc annotauit. Anginæ medetur hyssopum cum vino decoctum & gargarizatum. Faciles præstat vomitiones tritum cum melle, vitulus præsumpto Nasturtio, aut Itrione. Manipulus huius decoctus ad tertias cum sale, pituitas trahit illius, vel contritus cum oxymelite & sale, pellitque ventris animalia. Ad lienem prodest cum fico decoctum. Comitialis sanant bacæ tene contritæ, & in aqua potè diebus sedecim. hyssopus, inquit *Mesues*, (qui plerique ex Dioscoride & Galeno transcribit) calidus & siccus est ordi ne secundo, vel potius tertio. Pituitam etiam crassâ purgat sed minus quàm Thymus confert præsertim paribus respirationi dicitur, & cerebri affectibus: &

Locus &
Tempus.

Vires in
genere.

viscerum tumoribus, lumbricos necat & prodest aurium tinnitui.

Notandum verò apud veteres auctores, non leui sed ob communitatem vocum facili errore pro *Cardamo* supponi solent: & pro *Cardamo* *Cardamomum* ut apud Diosc. scite annotat Cornarius.

Ex herba *Hyssopi* *Tragus* fomenta, epithemata, & balnea rectè confici testatur: clysteribus item in passione colica vtiliter adhiberi. Aquam in qua *Hyssopus* decocta fuerit, omnes ploras, scabies: & mentagras sanare, si ex illa colluantur. *Hyssopum* nostrum flore spicato iis omnibus pollere viribus, quas *Hyssoppo* reddidit *Dioscorides*, experientiam comprobare asserit *Matthiolum*: aduersari serpentium moribus, cum sale & *Cumino* ad mortuum: ex oleo illitum pediculos necare, & capitis pruriginem tollere: comitiales iuuare quouis modo sumptum. *Dodonaeus* præter alia Obstructiones aperit, crassa incidit: leuita attenuat, & ut facilius expuantur, præstat. Cum carnis bubulis decocta, non insuauiter ex iure editus, ori ac ventriculo grata: vrinas verò etiam mouet, & ad vrinæ stillicidium vtilis est. Eius *Syrupum* ad calculum valde commendat *Mizellus*. *Euchar. Roesslin* Aquæ varias tribuit vires inter alias contrarias, nostro iudicio, dum scribit aperire venas & postea utilem mulieribus laborantibus copiosioribus mensuris.

Euch. notat.

Prepara-
tiones
via.

Præter aquam verò *Hyssopi* hodie quoque vimur succo, syrupo, conserua, vino, & oleo, ad iam dictos vsus, de quibus plura in medium adducere non statuimus.

HYSSOPVS SPICA BREVI, LATA.

Descriptio




formâ similibus. Verùm hæc species rarissima.

HYSSOPVS PARVA ANGVSTIFOLIA.

Locus.

Aluit aliquando Belgica hoc genus humilioris & tenerius, hi panico femine natum, alioqui formâ non multum differens à vulgari. cæruleis floribus, quod *Hyssillo* vocabant, quia nimirum semen, ex quo natum tali nomine insectum fuisset. An verò *Hyssopus* hic *Hispanicus* minor *Closii* istic etiam nunc alatur me latet. *Hyssopum* hanc tenui folio attulit ex Anglia

Hyssop. Hisp.
panicus mi-
nor Closii.



Doct. Thomas Plateus, folio angustiori, quam in vulgari, odoris grati.

Lob. in Ic. Plant. p. 434. vocat *Hyssopum* paruum, angustis foliis. In Belg. *Hyssopum* vulgari omnino similem, sed multo minorem angustifoliam.

An est *Gerardo* *Histor.* Angl. *Hyssopus* 4. tenuifolia, thin leas fed *Hyssope*.

HYSSOPVM GORITIENSE FLORIBVS verticillatum ambientibus.



Hyssope ex agro Goritienâ ramum pedalem dedit D. Agorius, rectum, hemisphaericum, folia producet glabra, per geniculos bina, vnciam circiter longa, culmum lata, Satureiæ duriori similia, alia inter illa multa, sed minora, odoris grati & suauis, sapore nonnihil acri, cum leuissimâ amaritud. ne: spicam

vnciis duabus longiorem, angustam, siue tenuem, tenuiorem multo quam in vulgari, multis paruis constantem verticillis, & secundum vnum quodque verticillum foliola duo floribus longiora: flores non vergentes in vnam partem ut in vulgari, sed ambientes, paruos, multis apicibus donatos, quos cæruleos fuisse conicio.

An *Matth. Hyssopus montanus Goritiensis* agri?

HYSSOPVM MONTANVM MACEDONICUM Valerandi Dourez.

Dodrantis est ramus, lignosus, quadratus asperiuscula incana lanugine hirtus: breuibus furculis adnatis fissus: folia ex interuallis verticillatim disposita, Satureiæ vulgaris foliis nonnihil similia, breuiora, rigida, nigricantia, aspera, angusta, acuminata, lanugine candida ciliari per margines ornata, sapore acri, aromatico, ad Satureiæ saporem accedente: flores eodem modo ex foliorum sinu, per ramorum summities,

HISTORIAE PLANTARVM.

278

Curauit, inquit Cordus, Arabicum Stœchadas, nostro orbi peregrinam plantam mihi adferri, aliarumque ex Narbonensi Gallia, semen terra mandauit aliquoties: & è semine prodit plantam ramulis, foliis, odore, sapore, & ramulorum, foliorumque posita spica Lauendulaceæ per omnia similis. Porro Mesue vehementer errat, quod scribit Arabicam Stœchada semen non habere, cum illi satis manifestum & perspicuum sit. Stœchadem etiam exoticam facit Syluius: ex Creta enim habitioem & melius nutritam, ob id meliorem peti scribit: multam tamen nobis domesticam ex insulis Stœchadibus esse non negat. Prouenire etiam multam in Arabia, quam inde Arabicâ cognominant, & quæ à Mesue præfertur, flore præsertim, post foliis: spica ex purpureo cærulea, odorata.

Mesue lap-
sae

Stœchas
Massiliensis

Stœchas
montis
Gargani
præstat.

Synon.

Tabern. &
Gerard.
notantur.

Nomina
linguatum

Amat. Ital.
lucinat.

Locus &
Tempus

Cæterum, Massiliensis pelagi Stœchadem prærumque Arabicæ vicem explere testatur est Matthioli. Stœchadem, inquit, officinarum vulgus Sticados appellat. Nascitur hæc non modo in Gallia (vt Dioscorides scribit) ex aduerso Massiliæ in insulis, quas Stœchadas vocant: sed & in Arabia, vnde cum aliis mercimoniis, quæ ex Alexandria aduehuntur, Venetias comportatur. Quapropter tam à Medicis, quam à Sepaliariis, indito ab Arabia cognomento, hodie Arabica nuncupatur: et in Massiliensis pelagi Stœchas plerumque Arabicæ vicem implent. Prouenit præterea in nonnullis Italicis locis, verum ea cæteris in Italia præstat, quæ ex Gargano Apuliæ monte aduehitur: quoniam in omnium probatissima est peregrina, quæ ex Arabia defertur, hanc deinde sequitur, quæ in Stœchadibus insulis nascitur, à quibus primū nomen aduenit.

Lobelius in Obsp. 234. Leon. Plant. p. 429. sub Stœchadis, siue Stichadis titulo, pingit Clusii Stœchada breuioribus ligulis, vel vt ipse ait in in Obs. summis cauliculis vt plurimum foliis stipatis. In Obs. dicta pag. in Ic. Plant. p. 430. Stœchadem nudis cauliculis summis. Illam vocat H. Lugd. p. 918. Stœchadem Matthioli; Hanc, Stœchad. capitulis foliatis, quam Clusius longioribus ligulis appellat.

Compiler non apposuit Stœchadis Arabicæ, vt vocat, figuram. Gerardus verò pro Stœchada ponit iconem à Tabernamontano pro Spica hortulana exhibitam, florē albo. Ipsemet autem quasi duas confundat plantas, titulum facit, Stœchas, siue spica hortulana.

C. Bauh. phyt. Stœchadis primæ, siue purpureæ titulo, dupio procul intelligit Stœch. cauliculis foliatis: secundam siquidem, Stœch. cauliculis non foliatis appellat.

Stœchas, & Sticadas, Græcis, Lat. Stœchas, Stœchas, Sticas, Stichas, & vulgo officinarum Stœchados & Stichados. Arab. *Astchados*, *Astchados*, siue *Astchades*. Germanic. *Stichas* fraut & *Stichas* fraut. Gall. *Stœchadas*. Ital. *Stœchadas*, seu *Stœchas*. Hisp. *Tomani*, *Cantuello*, *Cantuello*, *Tomillo*. Angl. french *Lauender*.

Stœchas verò nomen accepit à Stœchadibus ex aduerso Massiliæ (vt ex Matth. dictum) sitis Gallie insulis, in quibus prouenit. Sunt tamen qui existimant Stœchadem rectius Stachim quasi spicam dici.

Quoniam congruè Amatus herbam fruticosam dicat, in vniuersa Hispania admodum frequentem, Lusitanique Rosmarinum appellent, non video.

Herbarios in multis Germaniæ hortis Stœcha-

dem seminare, & magna cum diligentia colere prodidit Fuchsius. In plurimis Hispaniæ, Lusitanie, & Gallie Narbonensis locis, Aprilis, Maii, nonnunquam etiam Autumno florere scripsit Clusius. Galenus Stœchada multam vbiq; terrarum nasci dixit, sed plurimam in Creta, & insulis Stœchadibus in Iberico mari sitis. Stœchades verò insule non è regione Massiliæ, vt perperam scripsit, annotante Lobelio, Dioscorides [bidui enim itinere & litore inde absunt] Sed è regione Olbiæ sitæ sunt, vulgò *Nyeres*, oppidulo olim tam lauto, quàm nobili, à quo etiam hodie insulæ Stœchades nomen retinent. Non solum verò Stœchades insulas, sed etiam colles Narbonæ, asperosque tractus Gallo-provinciæ tanto prouentu Stœchade scatere legimus, vt etiam cibariis calfaciendis satis suppetant. In quibusdam Italia montibus quoque prouenire affirmavit antea Matthioli, & Camerarius in monte S. Iuliani, prope Pisam. Nobis Stœchas Arabica in horro Ill. E. C. sata sæpè prouenit, sed non tantum non floruit, sed nec Hiemem etiam reposita pertulit.

Stœchadis decoctum, auctore Dioscoride, quæ admodum Hystopi, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis commodè miscetur: quæ sequuntur, defunt in exemplari græco Basilien. Liberrat ab obstructione, attenuat, extergit, & corroborat viscera omni: & totum animantis habitum. Menses ciet potu, inquit Plinius, pectoris dolores leuat. Antidotis quoque miscetur. Ichiadicis dolores & spinæ leuat Stœchadis farina ex aqua mulsâ pota. De Stœchadis viribus Galenus hæc prodidit. Stœchadis gustu quidem qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Cæterum, temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida, exigua, vnde sanè adstringit: & extenuat altera terrena copiosiore, à qua amara est, & mediocriter subadstringens: ob vtrorumque verò conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, corroborareque tum viscera omnia, tum totum corpus ea potest.

Mesues plures & insigniores vires eidem assignat. Tenuat, inquit, terget, purgat, resoluat, aperit hepatis & lienis, & aliorum viscerum obstructionem, putredinem prohibet, omnes internas partium intemperies, præsertim cum materia, corrigit: cerebrum, neruos, cor, & alia viscera, partefque omnes internas vi parum adstringente roborat. Purgat autem bilem atram, & pituitam etiam ex cerebro, neruis & sensuum instrumentis, easque partes roborat: omnibus frigidis affectibus est salubris, fori, balneo, potu. Oleum quoque Stœchadis cerebrum & neruos calfaciendo, seu vitam illis restituit. Sympu, vel aliâ formâ Stœchas sumpta, quartanis & reliquis diuturnis febribus præsertim pituitosis succurrit. Calidis, siccis, biliosis, præsertim quibus multa bilis flaua in ventriculo redundat est noxia, quia turbat ventriculum, & sitim, vomitum, ardoremque molestem excitat: ac quoniam imbecillius purgat, ipsi additur pars sexta salis communis & salis gemmæ: additur & Myrobolanas nigra, aut Capula, vt valentior eius fiat vacuatio item Scilla, præcipue in capitis affectibus. Eadem serola-ctis macerata, vel incocta fit potentior: cum vino autem, nassis purgatis, succo pomorum dulcium cocta innocenter. Oleum verus Stœchade & paucâ spica imbutum, est magnarum virium. Pars Stœchadis porior flos, paucam decoctionem sustinet, longiore verò eius folia floribus igno-

ignobiliora. Potatur Stœchadis decoctum ab vnciis quinque ab vncias septem: pulvis autem à drachmis tribus ad drachmas quinque.

STOECHAS VIRIDIS.



Stœchas viridis Dalechampii à Bauhino missa, tota iucunda viriditate nitet, foliis per interualla in caules multis duobus longis, aliquot aliis multò breuioribus, capitulo in caulis summitate longo, rotundo, cum duobus in summo foliolis, ex quo lutei flores exeunt.

C. Bauh. phyt. vocat Stœchadem viridem à

I. B. Lugduno missam, facitque Elichryson vnde cinnum.

STOECHAS SERRATO ET-CRISPO folio.



Stœchadis Sgenus hoc valde rarum Clusio obseruat, eiusdè cum Stœchade Arabica altitudinis, lignosis, fragilibus, tenuibus, quadrangulis ramis: Folijs etiam olongis, angustis, omnino serratis & crispis, parte superna virentibus, inferià candidis, calidi & amari gustus: eius extremi quoque

ramuli desinunt in dodrantes virgulas, nudas, quadrangulas, incanas, quæ spicam sustinent Stœchade longiorè & rariorem, ad Lauendulæ minoris spicam prope accedentem, è multis similiter veluti membranaceis squamis congestam, cū eminentibus in summo quibusdam latiusculis foliolis è purpura cæruleis, vti in Arabica: flores ex singularum squamarum sinu copiosi, purpurei, vti in præfata: semen etiam simile, quemadmodum & radix.

Stœchas serrato folio, ab Hist. Lugd. p. 1200. Secuds Auicennæ Myconi titulo pingitur & describitur. Tabern. Hist. & Icon. dicitur Stœchas serrata. Lob. in Obs. p. 235. in Icon. Plant. pag. 430. itémque Gerardo Anglo Stœchas folio serrato.

Tom. III.

rato, Angl. Toothed Sticadenz. C. Bauhini phyt. Stœchas 3. siue serratifolia.

Stœchadem crispo folio non nisi in summa Hispaniæ Calpe nascentem, & suis floribus onustum Februario mense inueniebat Clusius, primum ipsi conspectum Scintæ in Regiæ arcis hortulo, quatuor supra Vlyssiponem leucis, floribus & semine plenum. Sucudum H. Lugdunenſis quoque in Hispaniæ incultis aridis, montosisq; locis nasci, & in hortis etiam coli refert. Facultates eadè huic insunt quæ Stœchadi Arabicæ.

Locus & Tempus.

Vires

CAPVT AQVILÆ, HYSSOPI FOLIO, summitate Stœchadis.

CAP. LII.


Herbæ Capitis aquilæ nomine ab Amato descripta, caulis est subtilis, quadratus, dodrantis altitudinis, in quo folia stricta, oblonga hyssopi modo sunt, quibus à latere alia duo folia à caule orta hærent, summitate verò caulis flores Stœchadis modo plures sunt, in quorum infimâ parte alij flores nascuntur, cum albedine rubricantes. per medium diuisi, vt vnusquisque illorū flus, serpentis caput referre videatur, vel potiùs Achillis [fortè legendum aquilæ] vnde nomen traxisse videtur.

Descriptio

Hæc autem adstrictoria herba est, & vt sapore percipitur, frigida temperaturâ.

TRAGIVM ALTERVM DIOSCORIDIS quibusdam folio Trichomanis.

CAP. LIII.



Radice est albicante, log usculi, gracili. Ex quas forculi emergunt lignosi, vix minora n digitū longi: quibus filis 12 adheret logiuscula, pulchra serie disposita, aduersa, haud secus ac in Trichomane digesta, iis tamen longiora, vt in Asplenio, quibus & colore similia: nam supernè pulchre vident, infernè verò cinereo tomento obsita, minora præsertim & ab imo primū pullulantia. Inter hos furculos alij prodeunt coliculi, nudi, purpureos flores spicatos sustinentes.

Descriptio

Rauuvolstius descriptionis auctor vocat Tragium alterum Dioscoridis, Incolæ verò Halepi Secudes, quo nomine & Arabibus, præsertim Auicennæ cognitum fuisse suspicatur, ac ideò parte 4. Icon. n. 123, Tragii Dioscoridis, Secudes & Secudi Auicennæ titulo pinxit: itémque H. Lugdun. in append. pag. 29, licet aliam plantam, Stœchadem sc. serrato & crispo folio, Secudes Arabum esse cum quibusdam alijs potiùs existimet.

Ec 2

Sed & C. Bauhin. Phyt. Tragium alterum Dioscoridis constituit. Hoc tamen negat Fab. Columna, qui in Tragio hirci odorem requirit, quæ plantam hanc exoticam habere non referunt. Considerandum igitur quantum differat à Suocude H. Lugdunensis, de quo antè sub Stæchade ferrato folio. *Aequiuoca* Tragii & quæ veteres de eo scripserunt, legenda erunt lib. 29.

Locus.

Cæterum, in agris circa Alepum & montibus vicinis, copiose obseruatum Tragium hoc alterum Dioscoridis Rauuolfio, vdis præsertim locis, vt ad fontium riuulos ex alto scaturientium.

Est & aliud Tragium secundum Dioscoridis quod Anguillara Epist. 14. & Lobelius Tragium alterum Scolopendri folio nuncuparunt. Vid. loc. Anguill.

PSEUDO NARDVS, QVÆ VVLGO

SPICA.
CAP. LIV.

Etymon.

Descriptio



ODORIS

Nardi affinitas Pseudo-Nardo nomen imposuit, non item facies, Stæchadi similior: *virgis* autem cubitalibus, & sesquicubitalibus, quadratis, duris, iisque multis ex lignosa radice ortis fruticat: *folia* infima quidem incondita, superiora ex aduerso bina per interualla lon-

giuscula, incana, culmum, aut etiam secunciam lata, duarum, triumue vnciarum longitudine, neruo medium percurrente, odore vehementi grato, sapore anaricante: summis ramulis *spicam* gestat longam, verticillatis calyculis cæruleis constantem, è quibus *stachadi* emicant cærulei seu violacei.

A Cordo in Hist. Lauendulæ maioris titulo describitur, ex qua sc. oleum Spicæ. Illi autem appositæ figura ex Trago, & annotatum Lauandulam maiorem, vulgus Spicæ Nardi nominare, Dodonæum verò Lauandulam marem.

Trago hæc spica, est Nardus Germanica, quæ reponit sub libanotide prima Dioscoridis. Gesner. hort. vocat Nardum vulgare, Stæchadiq; veterum cognatam ait, ex Cordi sententia. In cat. tamen Nardum & Spicam appellat, & Pseudo Nardum statuit.

Ol. spicæ.
Spica Nardi.
Lauand.
mar.Nardus
germ. Trago
Libanotis
Diosc.

Stæchas.

Genera duo

Pseudo-nardus græcè & latinè nominatur, inquit Fuchsius, quod sc. non sit vera & genuina Nardus, cuius Dioscorides & alii Veteres meminerunt. Duum cernitur generum, mas & femina. Mas vulgò Spica cognominatur: femina verò, Lauendula nuncupatur. Mas procerior est, & maiorem spirat odorem, nec minùs quàm Nardus placet. Frutex est folio crassiore, carnoso, angusto, colore languido, in candidum vergen-

te, piloso, frequentibus spicis in aristis sparsis: flocculis in spica ferè cæruleis. Hoc nos Pseudo-Nardum marem diximus: Osticinæ & vulgus herbariorum Spicam, à spicatis floribus nominant. *Spicanardi* itemque *lauender*: Galli *Narde* & *Aspic*, Aspicum Gesner. Itali vulgari lingua *Spigo* nuncupant. Hisp. *Nardo* al *ispieglo*, al *huzuma*, & *Lauandula*. Angli *strenche Spice Nard*: Boh. *Spifanarde domaci*: Nomenclat. Pannonicus Lauendulam maiorem Spikanard vocat. Et haud abs re nomen Spicæ latinæ & tritum ad Stæchadem allusit, idem enim signat Stæchas græcè, quod Spica latinè; nempè propter similitudinem rotius, primum faciei, deinde saporis & loci.

Cæterum, Spica à Lauendulæ specie non est diuersa, sed hoc tantum discriminis interest; spicæ, vt dictum, fragrantia odoris maior, & grauior: folia maiora & latiora Stæchadis, & spicæ longiores & inflexæ: Lauendulæ aromatici & gratiæ plusculum, folia breuiora & tenuiora, spicæque breuiiores, & rectæ.

Porro, Pseudonardum hunc marem vocat Matthioli. Nardum italicum: Lobel. in Aduers. Spicam, in Obf. p. 235. itemque Icon. Plant. p. 431.] Spicam recentiorum, & Nardum italicum, Stæchadem Arabicam Mesues, & Spicam Siliginis Mutoni: Dodon. Lauendulam: Clus. Lauendulam spicam; item Lauendulam longiorem habentem spicam inflexam, longioraque folia, flore cæruleo, siue purpureo. Hist. Lugd. p. 920. Lauendulam marem: C. Bauh. phyt. Lauendulam 1. siue latifoliam, flore cæruleo.

Compiler Tab. in Hist. & Icon. cur Spicam albam inscribat, scire haud possum. Ille minùs diligenter descripsit & depinxit Pseudo-Nardi species.

Gerard. proponit iconem Tabern. titulo Lauendulæ hortensis minimæ, The Schmalestlaender, an bene iudicent Lectores.

Lauendula in genere exultimatur esse Casia, odorata illa herba, cuius Virgilius subinde meminit. Sed horum opinionem tanquam erroneam damnamus. De Casia egimus Hist. n. g. libr. 4.

Qui tandem Lauendulam hanc, Cneorum albam esse contendunt, omninò hallucinantur. Nequaquam enim crassa est, vt Cneorum, radice, nec altè descendente, ramulis non lentis, & non Autumno, sed Estate florens: proinde Cneori species aliqua esse non potest.

Vestiantur in Hispania & Narbonensi Gallia plerique montes & campi deserti Lauendula mare. In reliqua Gallia, apud Germanos & alibi in hortis feruntur, Iunio, ac Iulio flores exerens. Montpelii inter saxa spontè proveniens floret etiam Autumno. In vitibus plantata feliciter etiam provenit.


Pseudo-Nardus quæ Spica flore albo.

Hæc quia solo floris colore albo à præcedenti differt, superfluum esse duximus propriâ imaginem eam exprimere, contrà quàm statuit Tabernamontanus, qui Spicæ hortulanæ flore albo titulo inscriptam dedit. Eandem penitus iconem Gerardus Stæchadis, siue Spicæ hortulanæ, inscriptione pictam exhibuit, licet Stæchadi non conueniat. Deprehenditur itaque Gerardus con-

confundere Stæchadem cum Spica Tab.alba.

Vocatur hæc à Lob.in Adu. Spica alia flore
Viciis albo: à Dodon. Lauendula flore albo:
à C.Bauh.Lauendula latifolia flore albo: à Clus.
Lauenda longiore folio & spica, flore albo, in
Hispania spontè proveniens.

PSEUDO-NARDVS, QVÆ LAVEN-
dula vulgò.



Totà quidē
facie, vti
dictum, Spicæ
vulgò dictæ, seu
Pseudo-Nardo
mari proxima
est fœmina, si-
ue Lauendula
vocata, minor
utrunque, nec
foliis adeò albi-
dis, minoribus,
nec odore adeò vehemen-
ti præditis, spi-
cati flosculi nō
distantes, sed
spica breviori
& erectiori.

Pseudo-Nar-
dum hanc am-
plitudine & o-

dore minorem, fœminam appellat Fuchsius: Of-
ficinæ & herbarii recentiores Lauandulam, vel
Lauendulam: eò quòd b ilneis & hominum la-
uacris expetatur, elotæque omnia, si petriscau-
tur, odoris commendat suauitate. Germani ad
hoc nomen alludentes, laubel & laubender nū-
cupant: Belgæ & Angli laubender: Galli *Lauan-
de*: Itali *Louanda*.

Hanc Cordus in Dioscor.vulgarem Lauendu-
lam appellat, & ex maiore illa in hanc dege-
nerasse scribit. In Hist. Lauendulæ minoris ti-
tulo describit. Ei autem figuram ex Trago adap-
tauit Gesnerus, qui Lauandulam vulgò dici &
Stæchadi Veterum cognatam esse contendit.
Tragus quidem Calliam germanicam vocat, &
sub Libanotide prima Dioscoridis reponit.

Lobel.in Obseru.pag.236. & Icon.Plant.p.431.
Spicam Lauendulam vocat. Clus. inscribit Lau-
andam vulgarem breviori folio & spicâ: Ta-
bern. Ic.& Hist. Lauandam primam. Gerard.
Lauandam flore caruleo: Hist.Lugd.pag.419.
Lauandulam fœminam: C.Bauh.in. Lauandâ 2.
siue angustifoliam: Dodon.Lauandulam akte-
ram: alii Lauandam & Lauandulam minorem,
itêmque fœminam.

Gaudet apricis & petrosis, vbi perpetuâ comâ
exitu Veris canescit, & Iunio & Iulio mense
spicatur, floribusque prægnans sit. In Hispania
quidem & Gallia Narbonensî spontè provenit.
In Germania verò & Belgio non raro in hortis,
locis à Sole illustratis, seritur: sed etiam in vine-
arum collibus lætâ fronde nascitur.

Pseudo-Nardus quæ Lauendula flore albo.

Lauendula: albæ Lobel.in Ic.Plant.p.432. itêmq;
Compiler Tab.ram in Ic.H.ponit iconem par-
ticularem, quasi differat à præcedenti: si cogno-
uerat differentiam aliam, præter colorem, cur

non de ea admonuit? Iam si color solam facit
differentiam, vt nos equidem existimamus, quid
opus erat iconem illa, quam Gerard. quoque hoc
titulo expressam dedit: Lauendula flore albo;
utque flores laubender spite.

LAVENDVLA MVLTIFIDO FOLIO.



Vitali in-
terdū alti-
tudine assurgit, Descrip-
tione quadrangulis
& hirsutis ra-
mulis, quos
multifida, re-
nuitque inci-
sa ambiunt fo-
lia, lanuginosa,
cinereque co-
loris, acris gu-
stus, & iucun-
di odoris: fl. res
in summis vir-
gulis quadran-
gulis, nudis &
lanuginosis, spi-
ce natis, vt in
Lauendula, cõ-
giti, caruleo
color: præditi,

odorati: spica autem aliquantulum contorta est,
& in quatuor veluti versus aut ordines digesta,
alia interdum ex alia nascens: radicē habet du-
ram lignosam, & multis ramulis donatam,
quam viuacem esse facile sibi persuaserit, de-
scriptionis author Clusius.

Lobel. in Obseru.236. Icon. Plant.p.432. & H.
Lugd.p.920. inscribunt Lauendulam multifidam
folio Clusii: C.Bauh.phyt. Lauendulam, siue fo-
lio dissecto: Gerard. Stæchadem multifidam: Ta-
bern. Lauendulam secundam.

Synonyma

Nascitur circa Malacam Bœoticæ urbem, vbi il-
lam primū inueniebat Clus.colle quodâ illi vrbis
vicino, Februario mense florēt: deinde circa
Murciam mense Martio, nec vltimū alibi. Excal-
facit & siccatur ordine tertio completo, inquit
Matthioli; aperit, attenuat, resoluit & conco-
quit. Confert omnibus frigidis cerebri affecti-
bus: ventriculum roborat, & iecur ab infar-
ctu liberat. Lienosos iuuat, utrumque calefacit, &
menses ciet. Flores ex vino decocti, & illiti vi-
rinam pellunt, & status dissolunt. Eorundem
decoctum ictericis, auxiliatur, à iocinorâ infar-
ctu affectis, additis Marrubio, & Feniculi radi-
cibus. Stillatina florum aqua pota, amissam red-
dit loquelam: præstat eadem ad animi deliquia
cum pota, tum naribus, & arteriis admodum. Oleum
quod è floribus distillatur, illinitur vbi ex-
calfacere est opus. Matth.

Locus & tempus

Oleum è florib.

Est Dodonæo Lauandula, potentiâ ac viribus
calida siccatque, & ordine quidem tertio: tenu-
ium item partium, est ex multis æcreis spirituo-
sisque partibus constans: frigidis ea de causa ca-
pitur morbis quouis modo adhibita confert, &
præsertim iis, qui non ex copioso humore, sed ex
sola potissimum qualitate originem ducunt. Pro-
inde & stillatitius eius liquor odoratus, & tem-
poribus ac fronti illitus, catalepsi, leuiori hemi-
plexiâ, ac subinde comitiali morbo, ac non raro
lyncopie laborantes reficit. Sed vbi humorum
copia adest, præsertim sanguini commixtorum;
non satis tutus huius vsus est: caput enim im-
plet & morbum intendit: Dodon.

Ec 3

VERONICA VULGATIOR FOLIO ROTUNDIORE.

CAP. LV.



Descriptio

Ethæc rep-
tracibus
accēfenda ve-
nit, quæ subin-
de demissis fi-
bris se propa-
gat: vicia
tenues, teretes,
longæ, hirsutæ
gemulatæ, foli-
is, binis ad-
uersis, ad sin-
gulos articulos
enatis donan-
tur, hirsutis, in
ambitu serratis,
Pruni foliis
similibus, sa-
pore amaro,
& acti: flores
spicatum oriū-
tur Chamæ-

drios vulgaris, seu adulterinæ more, è quatuor
foliis ex diluta purpura cæruleis striatis com-
positis, staminibus concoloribus medium occu-
pantibus, quibus decussis semen relinquitur Chamæ-
drios vulgaris, loculentis parvis conclusis,
veluti Bursæ pastoris. Est & alia Veronica mihi
huius generis, foliis duabus vnciis longioribus, &
vnciæ latioribus, caulibus cubitalibus: Et alia
multò minor, foliis ad Veronicam foeminam
serpillifoliam magnitudine æccedentibus.

Teucrium
Trag.

Veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit
nec ne hæc herba, nondum liquidò constat. Tra-
gum autem hanc per Teucrion intelligere existi-
mo, licet figura aliquid in Veronicam rectam
angustifoliam referre videatur.
Andernacus quoque Veronicæ Herbariis & Offi-
cinis dictam verum Teucrium esse contendit lib.
de peste.

Veronica
maris fo-
mina.

Fuchs. per Veron. mare[m] in mare[m] & foemi-
nam enim communiter distinguunt Veronicam
nostrā folio rotundiore exprimere existit, no, quā-
uis figura non multum ab illa, à figura Tragi,
possit quodammodo angustifoliæ rectæ conue-
nire, quæ occasio, vt Fuchsianam figuram iam
sculptam ponamus pro recta angustifolia & no-
uam curauerimus sculpendam pro ea quæ rotun-
dior folio, de qua hoc capite agimus.

Synon.

Matthioli Veron. mare[m] humi repere per-
hibet. In eius autem figura (quam etiam malè
assumpsit Lobelius) non placent semina, nec
flores: in Epist. vocat Veronicam Germanorum.
Dodon. Gall. Veronicam mare[m]. Tabern. in
Icon. & Hist. Veronicam. Lobelius in Adu.
Veronicam mare[m] & maiorem. Anguill. Ve-
ron. mare[m]: Gesn. hort. Veron. mare[m] Fuchsi
Casalpin. Auriculam muris tertiam: Corn. in
Dioscor. Betonicam alteram ex Dioscoride ex-
emptam, & inter supposita relictam, à Githio
ad calculosos, & Paulo ad renales composicio-
nes probatam, Veronicam Herbariorum vulgi
vocat.

H. Lugd. pag. 1319. sine necessitate vnius herbæ
duas habet figuras: 1. Veronicæ maris Fuchsi ti-

tulo: alteram Veronicæ maris Matthioli, sub
vna descriptione.

C. Bauh. phyt. Veronica 3. siue mas erecta (ma-
ior Clus. apud Matth.) Matthiolo mas, quæ du-
plex maior & minor. Item, Veronica 5. siue mas
supina Teucrium Tragi.

Nascitur incultis & siluestribus locis, apricis,
sabulosis, ac arenosis, non raro iuxta tumulos, ac
aggreges, agrorum sepimenta, quandoque & saxo-
sis reperitur. Iunio ac Iulio quidem flores, vi-
get, & semine abundat, reliquis anni mensibus
etiam viret. In Pannonia, Sciria, Austria, & Mo-
raua in cædis silvis maxima in copia etiam in-
fra Onasum vulgare[m] supinam Veronicam ob-
seruauit Clusius. Nos Patavii virentem in horto
mense Martio vidimus: Lugduni vero au b. u. de
la bonne Alemande: Genevæ virentem in sylvis
montis Saleux, principio Februarii, & florentem
Iunio: Montbelgardi in proximis sylvis.

VERONICA SPICATA RECTA MAIOR,
& minor.

Veronica spicata recta maior.



Veronica spicata recta minor.



Obliquam
radicem a-
git fibream,
calem rectum
rollens, inter-
dum quatuor
vnciarum tan-
tū, aut peda-
lem, vel cubi-
talem, & inter-
dum altiore[m]
multò, simplici
plurimum: ad
cuius nodos fo-
lia nascuntur,
angustiora, a-
cutiora, quàm
Veronicæ vul-
garis, leuiter
crenata, hirsu-
ta, ad radicem
latiuscula: cau-
lis in spicam lō-
gam definit,
plerumque vi-
su simplicem,
interdum flori-
bus Veronicæ
vulgatæ cæru-
leis densissimè
stipatum, paul-
latim florescē-
tibus, primum
inferioribus,
denique sum-
mis, quibus ex-
cidentibus sta-
minula reman-
ent longa: se-
men autem pla-
nis, bifidis cap-
sulis continetur.

Quia autem
existimamus, vt
postea quoque dicemus, Veronicam spicatum rec-
tam maiorem à minore tantum variare magni-
tudine,

indine, eas simili relinquimus, pro maiore tamen i comen Fuchianam proponimus, ut quæ in sculpra erat, & ei lactis accedat. Figuræ quoque Clusii maioris angustifoliae non male exprimit nostrâ maiorem. Minorem quidem curauimus pingendam de nostris plantis siccis, licet, ut dictum est, eandem putemus cum maiori.

Maiorem C. Bauhin. vocat Veronicam 2. siue spicatum angustifoliam; minorem, Veron 3. siue spicatum minorem.

Veronicæ porro rectæ vulgaris duas species inter se discretas inueniri aliter nam quoque Clusius. Nam alteram maiorem esse, latioraque habere folia, & longiorem florum spicam animaduertit; alteram minorem, graciliorem caulem, angustiora folia, breuioremque spicam. Sed considerandum an eandem Clusius nobiscum intelligit.

Si compilator T. betin. per Veronicam rectâ primam: itaque Veron. rectam minorem, eandem nobiscum intelligit plantas, non multum placet pictura rectæ minoris, in qua minus feliciter allequitur iconem Lobelii.

An est Celsalpino lib. 8. cap. 27. Auricula muris quarta, hisciuntur tertia: Veron. cā vulgariori?

Utamque etiam obseruamus Geneuæ, & in Sabaudia florentem Iulio. Circa montem Saleg non longè a Genea Februario, sed siccam. Morbelgardii prouenit in agris prope Audincourt Insignis Medicus Petrus Turn. aliquando detulit collectam inter Heidelbergam & Spiram: is assererat prouenire in Angliæ Britania. In Pannonia & Austria infra Onalium, nullæ sunt cædæ siluæ, nulli aridiores colliculi & aggeres, qui non alant vulgare in supinam Veronicam, teste Clusio, maximâ copiam.

Recentiores huius usum vnicè commendant. Tragus, qui Teucrium vocat, totâ suâ substantia amarum ait eandemque cum Veronica & Chamædri facultates obtinere. Si quid verò de præstantia eius dicendum sit, hoc vniûs affirmat, Teucrium vino maceratum ac distillatum mirabili & efficacissimâ vi aduersus aëris pestilentem intemperiem ac quasuis pestilentes febres polleat, adeo quidem, ut ea in re multas alias plantas longo post se intervallo relinquat. Ad eandem commendat herbam in vino decoctum. Teucrium, inquit præterea, vitis lienis opitulatur lienē ipsū potenter absumit, per aliquot ex ordine dies potum. Aqua Teucrii stillatitia per aliquot dies binis viciis pota, vertigini auxiliatur, lentam incidit pituitam, sanguinem purgat, stomachum exaltat, meatus iecoris aperit, pulmonis & lienis vitia emendat, venas purgat, thoracis crassos humores discutit, nec non matricem & vesicam, sudorem & venenum expellit, regionemque similiter morbum, & calculum renum, & si quæ sunt alia corporis totius pestilentes affectiones. Pecoribus ruffientibus pastores herbam in puluerem redactam, cum sale exhibent. Folia cum aceto, vel tusa, vel cocta, per aliquot dies imposita, induratum lienem discutunt & absumunt. Vncia Vitrioli in puluerem redacta ac in aqua Teucrii liquata, collutione putrida ulcera, lichenas, serpigines, papulæque, & alias quasuis scabies purgat, sanatque. Idem succus herbæ præstat, vel per se, vel cum alumine. Et vt paucis omnia dicat, Teucrium non solum hominibus, sed & iumentis, ad internas & externas affectiones, vtilissimum prædicat.

Fuchsius ex amaritudine quadam & vehemēti adstrictione, quam in guttu præ se fert, cali-

dam & siccam esse comitè. Mirificè ad cruenta ac vetera vulnera & vlcera sananda conferre. Scabiei denique & omnibus cutis vitis mederi. Latum est quondam huius herbæ adiumento Regge Gallie elephantis morbo correptum, & quodam venatore sanatum esse, cum is ceruum à lupō vulneratum eius herbæ comestione, & assiduâ in illa volutatione, curasse se ipsum animaduertiret. Quisquis igitur, inquit, usum Veronicæ verum tenuit, is certè ad grauissimas affectiones corrigendas non duntaxat volissimum, sed necessarium deprehendit, &c. Is autem præsertim ad pulmonum quæcunque vitia, pestem, discutientes tumores, & expurganda quæ in vesica, renibus & vtero sunt summe prædicat: atque ad aperiendos omnes obstructions.

Veronicæ extracto contra pestem multum tribuebat Io. Crato trium Imperatorum Archiater. Veronica autem optima quæ ad radices Quercui crevit: colligitur Iulio.

VERONICA MAIOR LATIFOLIA Folia splendentibus & non splendentibus.



Cubitalis proferit caule, interdam etiam ampliores, non valde ramosos: certè quam rarissimis alis, sed multis nodis, præditos: siliæ contractis inter se periculis, ad singulos nodos nascuntur, duas aut tres uncias longa, vnam lata, crassa, ex atro viridia splendentiaque, raris &

vix conspicuis crenis serrata, gussus admodum adstringentis & exsiccantis, deinde aeris: summo caule spicatum crescent multi conferti *fusuli*, Veronicæ rectè dictæ floribus formâ similes, sed colore paullo dilutiores, ab infima parte spicanti explicare se incipientes, quemadmodum Teuerii flores, & alij plerique qui spicæ in modum congesti nascuntur: semen in planis vasculis continet, exile, fuscum: radix crassa est, multique fibris donata, singulis annis nouos ex latribus caules producens.

Est & alia huius species, cubitalem altitudinem non excedens, mutilque in summo caule ramis prædita, cuius folia superioribus non minus ampla & crassa sunt, sed neque splendent, neque adeo atra sunt.

Conspicitur & tertia species, secundæ non valde dissimilis, cuius folia euidentioribus crenis serrata sunt ramulique oblongiore florum spicâ præditi, in reliquis conveniunt: vtrique sapor idem, qui in priore, auctore Clusio.

Inuenitur genus hoc cum suis speciebus, in multis Pannoniæ siluosis montibus, gaudetque

umbra: sed & Stiriacarum & Austriacarum Alpium radices hanc alunt. Floret Iulio, aliquando etiam Iunio, in hortis praesertim: semen Augusto & Septembri maturum est.

VERONICA MAIOR ANGVSTIFOLIA,
caulibus viridibus.

Descriptio



Fibrosa radix lateribus se propagat, novos lingulis annis stolones promens, cubito non minores, rectos, virides, veluti nodis aut geniculis distinctos: folia in singulis nodis bina, ex aduerso nascentia, oblonga, eius Lyfimachiae, quae caeruleum fert florem, penè similia, sed crassiora, & in ambitu minus serrata, gustu adstringente, & ingrato, posterius acriusculo: summi rami in spicas desinunt caeruleorum floretulorum, quatuor foliis constantium, in quorum umbilico duo staminula cum exiguo stilo: semen in bifidis vasculis, planis quidem, sed aliquantulum tumulentibus & puluinatis, exile admodum & rufum.

Habet etiam hoc genus alteram speciem, cui media sunt inter utrumque genus folia, h. e. illo paullo latiora, illo (praecedenti) tamen angustiora, caules minus ramosi, dilutiorque florum spica: sapor quidem adstringit & exsiccit, sed non adeo vehementer, ut in prima specie, auctore Clusio.

Ceterum, Veronica haec secunda Clusii, siue maior angustifolia, multum conuenit cum nostra Veronica spicata recta.

Locus & Tempus Eisdem locis quibus latifolia prouenit, & cum eadem eodem tempore floret, & semen perficit.

VERONICA SPICATA RECTA,
profundè serrata, quam Lyfimachiam
caeruleam quidam vocant.

Descriptio

Cervicalis, teres, glabra, ex certis intervallis aeterna, aut plura stila ad nodos habet, Parmiacae Fuchsianae foliis similia, vncias duas aut tres longa, culmum lato, valde serrata, glabra: spica longa stribus dense congestis constat, caeruleis, quibus deciduis remanent longa staminula. Flores dicit Lobelius nitidos, Teucrii, Germandree, aut Lauendulae longiores; plura emissa succedere marsipiola, in quibus semen minutum: exigua & fibrosa radice niti.

Lyfimachia
caerulea
germandree.

Inscribitur autem in Adu. Obs. p. 186. & Ic. Plant. p. 344. Lyfimachiam caeruleam hortensem, Veronicam rectam quorundam: Dod. Gall. Lyfimachium caeruleum: Lat. in fol. Pseudo Lyfimachium caeruleum: nonnulli Lauendulam silue-



streim vocant sed male: ut Gesnerus etiam perperam Angulididis aquaticam speciem dicendam existimauit.

Clusius & H. Syon Lugd. Lyfimachiam caeruleam flore quoque vocant, C.B. phyt. Lyfimachiam 14. siue spicatum caeruleam. An Camer. hort. Veronicam spicatum caeruleam? An Tabern. Icon. &


Hist. Veronicam rectam secundam.

Rarior haec in hortis; Londini Iunio & Iulio floruit in horto Morgani: Belgicis autem siluis dicitur crescere sponte. In hortis vero apud Belgas facile luxuriat soli expositis locis, non omnino aridis: vmbrosis non proficit, aut agere: tota aestate flores gignit Dodonaeo auctore. In Pannonia, & vicinis Austriae atque Stiriae regionibus, vel secundum riuos, vel in montanis pratis sponte nasci narrat Clusius.

Rarior omnino & parcius huius vltus. Nam facultates eius explorare nondum quicumque curae fuit.

VERONICA SAXATILIS.

CAP. LVI.



Folii vestiti- cur caluelli lignosi palmares, crebris, binis, ex aduerso sitis, Scryphii foliis paullo longioribus, obtusis, bina crenatis, glabris, p. e. extremum rotundis, summos caules ornant flores masculi, caerulei, Chamaedrios spuii vulgaris floribus similes: radix lignosa, satis longa: tota planta valde amara est.

An Veronica minor alpina Scryphii folio Ponnar: C. Bauh. phyt. dicitur Veronica 7. siue frutescens.

Reperi plantam in Valle Telina Rhatiae, & in mense in muris: Geneuae in Monte Thuri. Prouenit in Sneberg & alpestribus Stiriae iugis, ubi Iunio floret: at, teste Clusio, etiam in hortis Maio, semen Iunio ad maturitatem perducit. In alioribus

tioribus verò summitatibus Baldi Orientem versus fleret Iulio mense: semen Augusto maturitate perficitur. Ceterum, perennis nature planta est: licet frigore deperant come.

Tota planta, & semen gustu adstringente deprehenditur, nullâ percepta acredine, aut mordacitate: unde in fluxibus, & in quibus adstringere sine caliditate opus est, aptum esse medicamentum iudicavit olim Pona.

VERONICA FOEMINA QVIBVS DAM,
aliis Veronica Pauli, Serpillifolia.

CAP. LXII.



Radice tenui infirma per terram serpit: quâ terram attingit, propagatis fibrâs se radicâs: coliculi attolluntur aliquot semipalmares, tenues, geniculati: ad singulos articulos folia bina opposita, Serpilli, oblonga, subrotunda, nihil interdum crenata: strobili ex foliorum supremorum alis tenui &

brevi pediculo pulchelli, inodori, quatuor foliis constantes quorum tria cærulea, aut albicantia, striata, quartum reliquis minus, albidum, nullis striis pictum: staminis in medio alba, apicibus cæruleis: succedunt utricula Veronicæ similia.

Euphrasia dicitur Brunfelsio, sed falsò: Tragopogon agreste. Dodon. gall. Veronicæ foemina vocat. gall. *Veronique femelle*, germ. *Erenpreis weiblîn* / Belg. *Erenpreis wyffen*. Lat. in fol. Veronicæ pratensis, Veron. tercia. Lobel. in Adu. Obs. p. 250. Ic. Pl. pag. 472. Veronica minor Serpillifolia. Gesn. hort. Betonica Aegineata secundum Turnorum. Thallio dicitur Veronica foemina. Hort. Lusitan. Alfine palustris. C. Bauh. phyt. Veronica 6. siue pratensis Serpillifolia, glabra & hirsuta: Myosotis species apud Dioscoridem quibusdam, Alyssum Dioscoridis Columnæ. Alii Alyssum Columnæ alia est planta de qua sub Alfine: neminem præterea novimus qui Veronicam serpillifoliam hirsutam aut dixerit, aut pinxerit, ut frater voluit.

Descriptio Veronicæ foeminae Dodonæi apud H. Lugdunensem est duarum plantarum simul confusarum: nempe huius de qua agimus, & Eclatines, quæ quibusdam etiam Veronica foemina dicitur.

Veronica foemina Dodonæi in pratis ac humentibus exit: Iunio & Iulio fleret, ac viget; reliquis anni mensibus etiam virer. In silvis sub Quercubus, locis arenosis, montibusque ac collibus & agrorum limitibus nasci auctor est Tragus. In horto Sionis & silvis plerisque non procul Sione, flore albo, mixto cæruleo: semine

Tom. III.

Bursæ pastoris observata à Turbeto Montbelgar di in horto Ill. C. W. & aliis locis abundat. Basileæ non longè à Castello Hermes fleret Maio: Lugduni Martio: Genevæ in fegetibus Aprili.

Eadem pollicetur quæ Veronica mas, sed infirma: efficacius: radix nonnihil calida & desiccans ad Serpilli gustum insipidiorem accedit Lobelio, licet à Dodonæo ignava & nullius vsus habeatur.

CHAMÆDRIS SPURIA ANGVSTIFOLIA.

CAP. LVIII.



Multas ab una radice tenui, sed longâ, repente, lignosâ, fibrosâ, virgulas per terrâ diffusas, interdum nonnihil humo delatas profert, teretes, & hirsutas. it. deniq; lignosâs, tenues, longitudine palmari & dodrantali in quibus bina per intervalla folia opponuntur, oblonga, in ambitu serrata: virgulae in ramulos aliquot circa extremum divitæ, flores sustinent in spicam digestos, non simul se expandentes, cum inferiores existant, cæruleos, singulos quatuor foliolis constantes: staminibus concoloribus & stilo tenuissimo, quorum pedicellis brevibus & tenuibus appositum est foliolum tenuissimum oblongum viride.

Hanc autem non esse Teucrium, nec legitimâ Chamædrin, notius est quàm refelli opus habeat. Nihilominus tamen ante notam Chamædryn, vel etiam Teucrium, huic Chamædris in officinis nomen accesserat, ac pro Chamædris in medicamentorum compositionibus admittitur: nostro quidem iudicio non sine errore.

Brunfels. Rhaps. 10. Tomi tertii malè huius herbæ figuram sine descriptione, Chamæpityos titulo pingit. Nec multò melius in Herb. germ. Chamædryn & Quereulam minorem appellat.

Fuchsius inscribit Chamædryn vulgatam matrem, sed hanc ab aliis Chamædryos speciebus suâ descriptione non distinguit. Tragus in eius descriptione obscurus est. Marth. in comm. cum mag. fig. solam imaginem proponit Teucrii secundi titulo. Sed & Cast. Dur. ineptam dat iconem Chamædryos alterius inscriptione. Dorst. quoque pro Chamædry Pseudo-Chamædrya hanc exhibet.

Dod. gall. Verbenacæ annuerat, eamque Hierobotanes foemina, *Veruaine basse femelle*, titulo ostendit. Lat. verò in fol. proprio capite pro Chamædry silvestri describit, & depingit.

Ceterum, Dodonæus lat. vnicam dat figuram & descriptionem, nempe angustifoliæ, cum gall. duas proposuisset figuras ex Fuchsio (maris sc. de qua hic agimus, & quam is foemellam cognominat: & foemine, de qua postea dicemus, & quam

Ff

is marem inscribit.) & duas descriptiones, quæ placebant: cur autem Lat. alteram reiiciat, nobis haud constat.

Facile crediderim Chamædryn angusto folio, & sequentem lato, intelligere Geln. hort. per Chamædryn falsam, inspidam flosculis cæruleis, suæ spontis vbiq; Schaffraut; & alteram eius speciem in siluis & montibus nascentem: de collo. stirp. Chamædryi affinem, flore cæruleo duorum generum: Clusium per Teucii primi genus Chamædryos nomine à vulgo nuncupatum in Pannon. In Histor. per Teucii quarti tertiam speciem. Lobel. in Obs. 239. per Teucium pratense alterum, Herbam sacram, & Verbenacam supinam fœminâ Dodonæi. Ic. Plant. per Veronicam supinam facie Teucii pratensis. Cur autem supinam dicat, rationem non adfert: in Aduers. non separabat à sequenti. Teucium 2. Tabern. Auricula muris 5. Cæsalpino; Chamædryis 9. siue spuria maior 3. C. Bauh. phyt. Eide apud Marth. Teucium alterum, Chamædryis altera Tragi.

Nascitur pluribus locis in pratis iuxta flumina, riuulos, serobes, ac fontes, subinde & in memoriosis: Et Iunio, Iulio ac Augusto cum floribus viget.

Locus & Tempus

CHAMÆDRYS SPVRIA LATIFOLIA.

Descriptio



oriuntur, Chamædryos veræ foliis similia, latiora quàm Chamædryos adulterinæ maris, vtrisque molliora, tristius virentia, hirsuta, similiter tamé serrata, sapore amaricante prædita, qualia, sed proportionem minora, per ramos, qui oppositi sunt, nascuntur, & quidem tam hæc quàm illa, sine pediculo, caules digesti per aduersos ramos hilari cæruleo nitent, è quatuor foliolis compositi, non ita frequentes vt in adulterina mare: in quorum medio apices violacei singulorum autem florum pediculo ligula apposita est.

Chamædryn vulgarem fœminam lato folio obseruauit Ferratæ in Monasterio S. Dominici à l'Angeli, Basileæ etiam & Montbelgardi frequenter in hortis, sponte quoque nascentem.

Locus.

Vires.

Caloris & siccitatis cum amaritudine participem esse, ac Tussi, incipienti hydropi, indurato lieni, stranguæ, viscerum obstructionibus, Ca-

cochymia & virginum fœdis coloribus conferre tradunt Tragus, Lobelius & Dodonæus.

CHAMÆDRYS FALSA MAXIMA, AN Teucium 1. siue maius Pannonicum, Clusio.



Congener Chamædryi vulgari, verum multis numeris eâ maior: folia longa, acuminata, serrata, per hirsutos caules bina: rami itidem ex aduerso positi longam sustinet florum spicam, Chamædryos vulgare similem, maiorem, succedentibus compressis, bifidis, capulis. Florentem repeti Genuæ mense Iunio in colle la

Basie: Clusius verdè in collum omnium & montium Pannoniæ petrosis herbosis locis.

Chamædry falsa supina atro-virente folio.

Lobelius è Teucii familia esse existimauit, docereque id flores cæruleos spicatum prodeuntes, & foliola; sed angustiora, longiora, minusque serrata; Polio montano paria, atro-virentia, in cauliculis dodrantalib. humi fuis, ideoque Teucium paruum supinum appellauit. Oritur in Frisia iuxta Deuenteriam & Ouerissel.

CHAMÆDRYS FALSA SPECIES. Teucium 2 aut 5. Clusii.



Huius pro-cumbunt huius rami dodrantem longi, per quos ex opposito bina sæper folia Chamædryos foliis similia, serrata, in obtusum mucronem desinèntia: flores magnam ramulorum partem occupant, spicati, Chamædryos adulterinæ cæruleæ floribus similes: bifidæ succedunt compressæ capella, semen compe-

hendescentes ruffum: radix subest fibrosa.

Hanc etiam describit Clusius, eius tres faciès species: ratione scilicet caloris vel cærulei saturati-

rātissimi, vel dilutioris & quasi cineracei, vel ex carneo candicantis.

Clus. in Pannon. vocat Teucrium Pannonicum minus, Teucr. 2. In Hist. post. Teucr. 5. Tabern. Teucrium Pannonicum *Vngerisch Bæthengel*. C. Bauh. phyt. Chamædryn n. line spuriam minorem latifoliam secundam.

Nascitur omnibus ferè siccioribus agris incultis, herbosisque aggeribus & colliculis, secundum vias publicas inferioris Austriae præsertim Viennei agro, & apud Neapolim vicinam urbem loci natura munitissimam. Floret Maio.

CHAMÆDRYS SPURIA MINOR angustifolia.



Chamædrii hanc siue spuriam minorem angustifoliam, prædicta valde similem, sed ramosiorè, altiorè, foliis duplo, triploque angustioribus in agris Rauracis siccioribus incultis, vt circa balneum Brüglingen copiosè obseruare est, authore C. Bauhino. Talem mihi dedit Thomas Platerus Basileæ collectam: eadem flore albo repeti in hortis quibuscumque circa Montbelgardum.

CHAMÆDRYS SPURIA TENUISSIME laciniata.



Sanè quàm selegans hæc est Chamædrys species. Canales erigit pedales, altiores, reteres (præterquam crassiores, qui ab ima parte quadranguli videntur) nitidos, ramosos, lanugine quadam modicâ obritos: folia secundum genicula singulis vtrinque plura hærent, tenuissimè ac profundis segmentis laciniata. Ramulorum extrema vascula ex longiusculis pediculis gerunt singularia, cordata, Chamædrys vulgaris, foliaceo caliculo comprehensa, in quibus semen exiguum coloris spadiceo.

Tom. III.

compressum: Radix crassiuscula multis nigris fibris donata.

In Goritienfi agro D. Agerius legit, nobisque pro figura & descriptione elegantes aliquot plantas exhibuit.

CHAMÆDRYS VETERIBVS

& in genere.
CAP. LIX.

Chamædrys falsè vulgarioribus speciebus traditis, reliquum est, vt ad genuinam ex Galeno, Theophrasto, Plinio, & Dioscoride tradendam nos accingamus, iuniorumque in corâ sententiis explicandis opinionem intelligamus.

Chamædryn igitur sunt qui Chamæropa, qui Lynodryn, qui Trixaginem dicunt. Sunt etiam qui hæc propiæta, quod aliquam cum Teucrio similitudinem habet, Teucrion pariter appellent: Nascitur in asperis & petrosis locis. Est autem frutex palmi altitudine: folia habens parua, figurâ & fissurâ quærens similia, gustu amara: flores subpurpureum, & ipsum etiam exiguum.

Colligere oportet suo semine pregnantem herbam. Vinum habet viridis decocta cum aqua, & pota auxiliandi conuulsos, tussientes, liene indurato laborantes, difficultatèque vitæ oppressos, ac hydropicos in principio. Ducendi etiam menses & fetus. Lienem quoque liquandi cum aceto pota, & imposita. Trita verò & in cataportia efformata ad eadem efficax est. Potest & vlcera vetera repurgare cum melle. Tollit etiam caligines oculorum cum oleo trita ac illita. Natura autem ei est calefaciendi, vt Dioscoridis scripta testantur. Chamædrys inquit Plin. lib. 24. cap. 15. herba est quæ Latine Tussago dicitur. Aliqui Chamæropem, alii Teucrion appellauerunt. Folia habet magnitudine Menthae, colore & diuisurâ Onocæ. Alii Serratam, & ab ea serram inuentam esse dixere, flore penè purpureo, Carpitur prægnans succo in petrosis, aduersus serpentium venena, potu illiusque efficacissima. Item stomacho, tussi vetula, pituitæ in gula coherenti, ruptis, conuulsis, lateris doloribus: liem consumit, vrinam & menses citet. In plerisque is cum Dioscoro consentit.

Theophrastus tamen lib. 9. c. 11. Hist. aliam vinum foliis, & aliam semini assignat, similibus verbis. Chamædrys quidem folia adrupta & vulnera in oleo trita valent, & ad vlcera: fructus autem purgat bilem. Oculis quoque prodest. Folium verò ad albugines tritum in oleo confert. Habet folia, &c. Sed partes quidè omnes herbæ eiusdem minimè ad idem vtilis fore haud quicquam absurdum fortasse. Radicis verò eiusdem partem vnam superna: alteram inferiora purgare profectò mirabilis.

Ex Galeni auctoritate Chamædrys vincentem habet quasi aciem amaram: est & quodammodo acris. Quocirca merito lienes colligunt, & vrinæ ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions purgat. Potatque eam quispiam in tertio ordine excafcientium & desiccantium: plus tamen calfacit, quàm desecat.

Chamædryn porro nihil aliud quàm humilem & terrestrem Quercum exponit Matcellus, ac ab eiusdem coacta breuitate aliud Chamæropis nominem illi ab aliquibus factum esse narrat. Sic enim ex veterum Græcorum & Latinorum fide legendum existimât, etsi Dioscorides Chamæropa

F f 2

vocati tradat. Plinii quoque codices omnes ante Barbari castigationem Chamædrys vocari Trixaginem dicebant.


Aequiuoca Ad Chamædryos æquiuocationes quod attinet : Sciendum est Chamædryos eius, quæ verior existimatur, & procul dubio non multis officinis in Germania nota est, nec etiam visa, quatuor esse differentias Clusio, sicuti etiam Lobelio. Eodem nomine præterea sequentes donantur plantæ. Chamædryos arborea. Teucrium. Chamædryos spinosa. Chamædryos montis Sumani. Chamædryos saxatilis Baldi. Clinopodium alpinum Ponce. Chamædryos alpina flore Fragaria albo. Chamædryos vulgaris officinarum quarundam, Chamædryos maxima. Chamædryos spuria minor angustifolia. Chamædryos spuria tenuissimè laciniata. Botrys altera siue verticillata. Scordium. Veronica. Radix Lapathi acuti. Chamædryos vulgaris spuria latifolia, folio rotundiore.

CHAMÆDRYS VULGO VERA

exultimata.

CAP. LX.

Descriptio



rad T

dine semituncialis, rigida, nervosa, hirsuta, sapore subamaro, subdulci, & aromatico, flores in folia spicatum quodammodo exeunt purpurascens, labello scutellato, alis duabus acutiusculis ad angustam ceruicem appositis, supra quas surrecta ceu spicula : pro galca verò, quæ destituntur, purpurantia stamina surriguntur.

Matth. aut. Matthioli, qui non describit, picturam habet quæ non in omnibus placet, nec in comm. post. cum mag. figuris meliorem exhibet : Præstat autem Camerarii in Hist. germ. itemque Epit. Triffaginis & Chamædryos titulo.

Did. var. Dod. lat. in fol. Chamædryon repentem vocat, ac in minorem, vt Clus. quoque, & maiorem distinguit, duasque figuras pingit, quamvis in descriptione vnius tantum plantæ meminerit : In icone autem, quæ maior inscribitur, nihil repentis apparet, ac propterea displicet.

Lonic. lib. 5. cap. 14. huius Chamædryos figuram absque descriptione dedit, his nominibus, quæ inter se confundit : Chamædryos vulgaris mas, Barthengel Mänlin/Erde weyrauch.

Synonyma Chamædryos porro dicitur planta, de qua hic

agimus, Fab. Columnæ, Gesn. hort. Turn. Cast. Dur. (cuius icon non placet) Matth. Anguill. & Cornario. Chamædryos vera (ita etiam Cord. in Diosc.) itemque Chamædryos siue nobilis Trago. Cham. vera mas Fuchsi. Chamædryos vulgo Quercula, Cast. salpino. Cham. mas maior & minor Hort. Lusit. Chamædryos siue maior repens, 1. Tragi C. Bauhino in phyt. Item Chamædryos siue minor repens : vera mas Fuchsi, maior Lob. ic. Chamæpyris Brunfelsii. Quam ob rem quæso separat frater Tragi 1. Chamædryon, à vera mare Fuchsi; similes cum sint icones : Brunfelsii Chamæpyrityn diuersam admodum esse, nempe Pseudo-Chamædryon, asserimus, in quo etiam lapsus est Cordus.

Græcis hæc planta χαμαίδρυς, ἢ χαμαίδρυς (Marcell. tamen χαμαίδρυς legendum censet) ἢ χαμαίδρυς, quibusdam etiam Τριχάδρυς : Lat. Trixago, aut Triflago dicitur, iuxta nostri seculi Medicos : Chamædryos in Hetruria. Senenibus præsertim; vulgo Quercinola (aliis Querciula) Quercula minor & humilis Quercus : Plinio lib. 24. cap. 15. ob incisuras quas retinet, Serrata, & aliis Serrata : Insubribus & Manlio Calamandriana : nonnullis Febrifuga & Herba februm; Apuleio Drys, Drylices, Barbaris & Arabibus (vntibus genitiuo pro nominatiuo) Camedreos, Camedryos, Damederios, Chamedrius & Kemadrius : Laurent. Phrysiio Kamel & Trizaoga appellatur. Germanicè Erdeiche / Camandere / in / Germanderlin / Barthengel / Klein Barthengel & Barthonien : Chesnettes, perit Chesne, & Germandree : Italis Quercinola : Hispan. Camedreos : Angl. Germander, & in Agro Cantabrigiensis Englische Triacle, h.e. Theriaca Anglorum. Boh. Ozanka meussy.

Chamædryon & Chamædryopa Guiland. in Theon. vnam eandemque credidit, ac propterea Galenum & Paulum, de hac planta in diuersis locis sub diuersis nominibus pertractasse sentit. Vbiuis locorum præsertim apicorum adolefcere auctoritas est præcipuorum Scriptorum. Vidimus nos copiose Lugduni vigentem mense Martio, & Aprilis a la Roche, & Genex passim; Montbelgardi prope la Croix, & ad vites : Patauii in orto quodam virentem Ianuario : Montpelii florentem Aprilis prope Castelneuf : Basileæ in monte prope Moutets, & alibi mensibus Iunio, Iulio, & Augusto.

Chamædryon repentem tenuium esse partium, ac incidendi facultatem habere dixit Dodonæus, calidam & siccam propemodum ordine tertio; veluti de Teucrio Galenum scribere testatur, quamobrem & lienosis conferre : recentem cum oxycrato, vt Diosc. aut aridæ decoctum, potenter licentem absumere. Imponi verò lienosis cum aceto & ficibus : serpentum verò moribus cum aceto solo : Possè autem omnia, quæ & asurgens, siue fruticans (Chamædryos falsa, siue spuria) proinde & citra errorem pro Chamædryo accipi & vsurpari possè. Pestilentie, Lumbicis, Sanguini concreto, Podagra, Hemorrhoidum doloribus, Capitis morbis frigidis, Ictero, Auribus vermiculosis, suppressis Venis & Febribus tertianis fæliciter adhiberi scribit Matthioli.

CHAMÆDRIS SPINOSA.

CAP. LXI.



Hanc, quā
C. Bauh.
in phyt. itēq;
apud Matthiol.
Chamædryn 4.
siue spinosam
ex horto Bemb
nuncupat, anno
1594. Basilæ in-
ter eius siccas
plantas, obser-
uauit: nusquam
verò alibi: Icō
quādamus
ex sicca planta
depicta.

Clusio, & circa finem maturans semē, semper-
que virens.

CHAMÆDRIS MONTIS SVMANI.

CAP. LXIII.



Sanè quā
Selegans a-
spectu planta-
la videtur: can-
liculis est pal-
maribus, do-
drantalibus,
firmiusculis,
teretibus, albi-
cantibus, qui-
buldam bre-
uissimis pilis
oblitis: quibus
folia harent
aduersa, quæ-
dam rotunda,
alia oblonga,
medio ambitu
ferrata, sedi-
ma supremis
multis nume-
ris minora, la-

Descriptio

nugine item prædita: supremis fastigiis flores
in spicam fastigiantur, qui hinc videntur, vti et-
iam pictori videbatur, quod tamen asserere non
audemus: cuius porro coloris ex sicca certò de-
finire nolumus, candicant tamen. Hos *vascula*
exciunt quadripartita, in pyramidem exacuta,
per angulos quibusdam foliolis pilosis, densè ob-
septa: semen quod intus est, minimum est, & pe-
nè araneolum, sed quod longius, quā crassius,
rufum: Folia sicca amarificant, cum modica
adstrictione. Hæc planta magis habet simi-
litudinem cum Veronica petræa semper virente
Ponæ.

D. Agerii liberalitate ad nos peruenit nomine
prædicto, lecta in monte Sumano.

CHAMÆDRIS VULGARIS FALSÆ ALI-

quatenus affinis Alpina, & Clinopodium

Alpinum Ponæ.

CAP. LXIV.



Ex aduerso si-
ta sunt per
caules folia, Cha-
mædryos paria,
acuminata, rugo-
sa, hirsuta, per
ambitum ferra-
ta: ex quorum a-
lis per caulium
partem superio-
rem bina ex ad-
uerso quoque o-
runtur *vascula*
Pedicularis Al-
pinæ in binas ca-
rinas, singulas
totidem diuisas
loculis, sese a-
perientia, semine
plena paruo, ni-
gro: caules do-
drantales, & pal-

Descriptio

Ff 3

VERONICA PETRÆA SEMPER VI-

rens Ponæ, ad Chamædryn vulgarem
fallam accedens.

CAP. LXII.

Ex scissuris simplicis & omnino nudi saxi Bal-
di, hæc nascitur, quinque, sex, vel pluribus
etiam caulibus rotundis, non ramosis, altitudinis
seculipalmatis, & quibus *foliola* bina exiunt [sicet
aliqua magna reperiantur] æquali ordine dispo-
sita, vti Chamædryn, tamen non sic profundè



incisa, admodū
crassa, splendi-
da, supernè vi-
rentia, & lanu-
gine quādam
donata, infernè
verò albican-
tia: fert in su-
mitate multos
flores ad instar
spicæ, quater-
nis, quinis, &
septenis foliis,
ceruleo colore,
aliquantulum
albicantibus:
quibus cadenti-
bus relinquitur
calyx, in quo se-
men continetur,
vt in aliis Ve-
ronicis fit. Ha-
bet radices par-

uas fibrosas ac nigricantes, quæ ita saxi illis hor-
ridis paucissima commixta terra includuntur, &
adhærescunt, vt difficilimè etiam ligonibus euelli
possint. Acerbi & amari saporis planta esse
gustu percipitur.

Veronicam hanc petræam Ponæ, siue vt Casp.
Bauh. in phyt. vocat, Chamædryn 6. siue saxatile
Baldi, Clusius Hist. post. Teucris 6. (3. in Pannon.)
pumili titulo delineauit.

Ex scissuris simplicis & omnino nudi saxi Bal-
di nascitur, florens initio Iulii, testibus Ponæ &

mares, firmi, multi, è radice lignosa, nigricante, multis capitibus diuisa.

Locus

Hæc planta collecta est in Alpibus Allobrogicis, cum Genuea degerem, quam tunc ex sicca sic delineauit.

Io. Pona industrius Botanicus transmisit anno 1690. plantam minorem, pluribus capitibus è radice repente fibrosa exeuntibus donatam, quam eandem cum nostro ramulo esse statuimus. Ei autem in monte Baldi Clinopodii Alpini titulum attribuit.

CHAMÆDRYS ALPINA FLORE
Fragariæ albo.

Descriptio



DVra lignosa virgulta palmaria aut dracantalia crassifuscula per terram spargit, colore rubente prædita: per quæ silis nullo nascuntur ordine Chamædryos verioris foliis similia, minor, duriora, rugosiora, serrata, inferne incana, superne atro-virentia, gustu adstringente: pe-

diculis tenuibus, palmaribus, hirsutis insident singulis flores, singuli, candidi Fragariæ, duplo maiores, foliis semis aut pluribus contantes, quorum medium occupant circhi staminum numerosi, quibus delapsis succedit plumatum Pulsatillæ capitulum, semine oblongo, ruffo: rotius autem floris basin fulciunt folia hirsuta, oblonga, angusta: radix longè lateque serpit, crassa, lignosa, ex ruffo nigricans.

Synon.

Vocat eam Lobel. in Adu. Chamædryn montanam frutescentem duriores. Dod. lat. in fol. Chamædryos aliam speciem. Clus. in Pannon. Chamædryn 3. [s. C. Bauh. in phyt.] siue Alpinam, Cisti flore: in Hist. post. Cham. 3. siue montanam. Camer. hort. Cham. Alpinam, Leucadem quorundam, & Helueticorum hirsutius, h.c. Herbar. cern.

Locus & Tempus.

Genuea in monte Thuyri floret mense Iunio & Iulio, itemque in Rhætiæ monte Brailio, & montibus Ingadinæ. Frequens est, authore Clusio, in summis Austriacarum & Siciacarum Alpium iugis: floret Iunio.

Vires & visus

Chamædryn montanam ad ventris profusiones, mensium abundantiam, sanguinis effluxiones, & vomitiones immodicas Alpini commendant, sed ad dyenterias præcipue, huiusque frondes damas audissimè carpere narrat in locis huius plantæ feracibus degere consueta.

TEUCRIVM VETERIBVS.
CAP. LXVI.

Ex Drsc.

Teucrium, aliis ob similitudinem Chamædryos dicta herba est, inquit Dioscorides, vir-

gæ speciem præferens, similis Chamædryi, tenuia folia, & Ciceri simile folium habens. Nascitur plurima in Cilicia, iuxta Gentiadem & Cissadem appellatam. Vim habet viridis cum posca pota: aut arida fœruefacta pota, lienem fortiter liquandi. Imponitur etiam cum ficibus & aceto in splenicis. Verum in his qui à venenatis bestiiis commorshi sunt eum aceto solo, absque ficibus.


Teucrium à Teucro Aiæcis fratre inuentum, sic tradit lib. 25. cap. 5. Plinius. Inuenit & Teucer Teucrion, quam quidam Herimion (vt Matthiol. Hemionitin Corn. Hemionium Dalech.) spargentem luncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore, nunquam florentem: neque semen gignit. Medetur lienibus, constatque sic inuentam. Quam exta, sapet eam proiecta essent, adhuc se heni, eumque exinanisse. Ob id à quibusdam Splenion vocatur. Narrant lues qui radicem eius edant, sine splene mucri.

Teucrium, inquit Galenus, vim secandi & tenuium partium habet. Vnde & lienibus medetur. Et posuerit quis ipsam in tertio ordine siccantium, in secundo calefacientium.

Teucrii autem nomine apud Autores sequentes donantur plantæ: Teucrium multis. Teucri. Bæticum. Chamædrys. Chamæd. vulgò vera. Teucrium foliis Scorodoniae. Chamæd. falsa maxima. Cham. falsa angustifolia. Cham. vulg. femina. Cham. vulg. mas. Chamædryi aliquatenus affinis. Chamædrys falsa supino folio atro-virent. Veron. petrae semper vitens Ponz. Veron. saxatilis. Veronica. Veronica femina Dodonæi. Hemionion. Asplenium silu. Hemionitis. Scolopendria. Lingua ceruina. Faba grossa. Teuthrium. Pimpinella. Alceuo Oconis. Teucrium Creticum.

TEUCRIVM MVLTIS.

CAP. LXVII.



COgnatum Chamædryi Teucrium, aliis tamen fruticat, rectis, lignosis, quadratis, hirsutis virgulis: in quibus ex breuibz interval- lis cernere est adu. rto posita folia bina & vtrinque hirsuta, superius atro uiore splendens, inferius nonnihil canescentia: & inferiora quidem formæ & magnitudine

Chamædryos spectantur, serrata, ex oblongo rotunda (iucundi, inquit Clusius: si terantur, odoris) quæ verò virgularum fastigia ornant, ad Hormini folia quodammodo accedunt, nequam per ambitum incisa, & circa basin la-

riora

tiora in acumen desinunt : flores porro ex foliorum superiorum alis emicant plures iuncti, pediculis satis longis hæretes, calyce hirsuto canescente, Chamædrys florum formâ, labello quidem longiori dimisso, sed cucullo vidui, cuius loco *stamina* luteola exeunt, quo colore flos quoque ipse est præditus, Clusio ex albo pallecente : *sapor* herbæ est acrisculus cum amaro non ingrato.



prodeunt) superne atroficientia, inferne admodum alba & nervosa, & lanugine densiore ob-



sita : flores per rami summa ex foliorum alis candidi labium longum demittunt, progæla, quam nullam habent, *stamina* longa exerunt : calyces candidi, striati in quinque mucronatas laciniis dividuntur.

Teucrium Bæticum Tab. tam Icon. quam Hist. *Tabern. r. præh.* Griechische Bartsengel getmanicennommar, quod, ut ait, in Græcia provenire solet. Sed in qua parte quas Gæcia co-

pilator Tabern. hoc Teucrium observavit? Bætica regio mihi ex Strabone Hispaniæ pars est.

H. Lugd. pag. 166. Teucrium Bæticum Clusii Synod. appellat : C. Bauhin. phyt. Teucrium 2. siue peregrinum sinuoso folio. Hoc variare refert floris colore candido, & purpurascens ex caeruleo.

Ex semine, dato à D. Zvingero, in horto Montbelgardeni Ill. C. provenit. Montibus autem circa Calpen, ad Herculeum fretum, & Bæticæ maritimis, in sepibus & inter alios frutices inveniēbat Clusius : tum etiam Gadibus, eâ parte quâ Continenti recens coniuncta tum erat insula à ponte admirabili, vulgò *Puente de Chag*, dicto, sed humiliorē, quàm commemoratis locis. Florebat Februario.

Eidem Clusio mittebatur Teucrii semen à Tempus. Creta Chamædrys maioris appellatione : unde ei natum Teucrium vulgari fruticanti non valde abstinile.

TEUCRIVM SCORODONIAE FOLIO.

CAP. LXIX.

Planta hæc ex Italia Camerario missa Teucrium veri nomine, foliis fuit penè Scorodonie vulgò dictæ, sed minoribus. Florem eius non observavit. Cauliculos verò per Hiemem cum seminis foliis durare scripsit. Non autem ipsi videntur congruere Dioscoridis descriptioni.

C. Bauhin. Phyt. est Teucrium 2. siue alterum Scorodonie folio. *Diosc. descriptionis non commemor.*

SCUTELLARIA TEUCRII FACIE.

CAP. LXX.

Urbitalis est planta, caule quadrato, hirsuto in ramos oppositos brachiato : per quem ex aduerso posita folia bina, quorum superiora ad Teucrium accedunt, quæ verò in imo sunt ex oblongo rotunda, maiora, omnia per ambitum serrata, hirsuta, ex pediculis longiusculis. Ramorum extrema ex toto ferè spicati flores occupant magni, Galeopsæos, colore aliàs rubro, aliàs albo præditi, subhirsuti, in vnam ferè partem vergentes, ex breui villosa calyce : foliis subiectis

TEUCRIVM BOETICVM ET Creticum Clusii.

CAP. LXVIII.

Ignescit Teucrii Bæticæ ramus, candidissimus torus, lanuginosus, quadratus : ad cuius genicula aduerso situ nascuntur folia, Teucrii vulgarioris (è quorum tamen sinu alia minora

Scordii speciem primam, & Scordium verum: quod non vbiq; & copiosè reperiri posse putat.

Scordii tandem nomine alia quoque donata sunt plantæ. Scorodotis siue Scordium folio Saluiz. Scorodotis tomentosa Cretica. Stachys Fuchsiana. Gallitrichum. Alliaria. Allium vrsinum. Personata.

Quidam (vt ab Aequiuocis ad Substituta fiat progressio) malè Allium siluestre pro Scordio usurparunt, cuius diuersa genera H.n.g.lib.19. de Alliis prosecuti sumus. Gesnerus scribit luâ aruensem, vt vocat, siue Botrym alteram sibi videri substitui posse, paullo minùs efficacem: Fabr.Hildan. Obs. Chir. cent. 2. Obs. 93. Scordio vero subministrat Scordii 2. duplum: Obs. verò 94. Alliariam Veterum quorundam imitatione Scordio vero etiam substitui posse censet.

His ita absolutis reliquum est, vt natales perlustremus. Scordium nasci in montanis & palustribus locis nouit etiam Dioscorides: in Ponti campis pinguib; humidisque Plinius. Nec inter se pugnat Dioscorides & Plinius, dum hic in campis humidis, pinguib;que, ille autem in montanis nasci scribit. Verque enim verum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnibus, prouenit, sed [quod Dioscorides etiam adducit] humenibus tantùm. Scordium olim à Mercatoribus è longissimis regionibus sumptibus magnis afferebatur, vnde quidam, quoddam vltimarium hoc nouissent, excellentissimi Doctores appellari voluerunt, licet nunquam eo in loco subolfecerint, aut collegerint. Et hos quidè, dum extera cõtemplantur, in fossam reprehensionis illapso, Thaletis ancilla iure eam eos pati dixerit, quod se patria, & iuxta pedes posita ignorent, & in longè distitis regionibus querant. Annon in Germania nasci compertum est Scordium excellentius, nostrisque Germanis vtilius, eiusdem speciez formæ, cuius illud est Barbari & extraneum. Scordium, inquit Cordus, in multis Germaniæ locis nascitur. Ego Scordium in comitatu Montebelgardensi obseruavi inter vrbe & pagum Souchaut ad fossas quasdam: inter Dalle & Audincourt locis paludosis, florens mense Augusto: in paludibus prope S. Maurizium, ad viam lapideam illic stratam. Montepelii vidi in vicino prato florens Maio & Septembri: Circa Lugdunum abundè: Genetz copiosè multis in locis au præ l'uesque, in pratis prope Arue florens Iulio. Fuchsio & Dodonæo Iunio & Iulio mensibus florere, hos tamen non nisi diem vnum durare videtur, sic continuè vnus alium sequitur. Plantarum autem Scordium non difficulter in hortis nascitur, & possunt de vno duntaxat ramo, siue furculo complures prouenire, modò solo humido & vmbroso committantur: semine quoque si feratur, celerrimè germinat. Translatum in hortos facili negotio perit.

Viribus & vsu more nostro sermonem huc de Scordio absoluamus. Dioscoritæque auctore vim habet herba calefacientem, cientem vrinas, vitidis [χαρπὰ] trita, itemque arida cum vino decocta, contra serpentum morsus & lethalia medicamenta bibitur. Item ad stomachi rorsionem (pro σπασμὸν, legit Lacuna σπασμὸς & λυγρὸς σπασμὸς) & dysenteriam, & vrine difficultatem, duarum drachmarum pondere cum aqua mulla. Purgat & crassa purulenta è thorace. Facit ad tussim veterem, rupta, conuulsa, si arida cum Natrurio, & melle, ac resina mixta, in eclegmate delingenda exhibeatur. Præcordia diu inflammata cerato excepta lenit. Facit & ad podagram cum acri a-

Tom. III.

ceto oblita, aut cum aqua imposita. Eadem appositæ menses mouet. Glutinat & vulnera, & vlcera vetera repurgat, & ad cicatricem perducit cum melle. Arida verò excrecentem carnem reprimat. Bibitur etiam succus ex ipsa expressus ad relatas affectiones. Efficacissimum autem est Scordium Ponticum [legit Lac, λυγρὸν] ac Creticum.

Ex Galeni sententia, ex variis tum sapotibus, tum facultatibus constat, nam & amari quid obtinet, & acerbis, & acris. Maximè autem Scorodo, h.e. Allio, adsimilis eius est acrimonia: vnde sanè nomenclaturam sortitum est. Expurgat igitur sinuque excalfacit viscera: tum menses vrinamque prouocat. Præterea conuulsa, ruptaque, & laterum dolores ab obstructione, & frigore natos sanat epotum: denique viride quidem illitum magna vulnera conglutinat: sed sordida purgat, & contumacia ad cicatricem perducit illitum aridum. Et hæc de simpli. med. facult. habet. Libro autem 1. de Antid. cap. 12. ait: Scordiū quoque pulcherrimum Creta mittit. Quanquam in aliis regionibus etiam minimè contemnendū Scordium reperis. Litterarum quippe monumentis traditum est, à quibusdam celebribus viris; cum in prælio interemptorum cadauera multos dies insepulta iacuisent, quæcunque supra Scordion fortè fortunà ceciderant, multò minùs aliis computruisse, ea præsertim ex parte, quæ herbam attigerant. Ob quam rem sanè persuasum est omnibus, tam reptilium venenis, quàm noxiis medicaminibus, quæ corpus putrescere faciunt, Scordium aduersari. Plinius passim hæc de eo tradit: Contra venena omnia, magicæque artes Scordotis, ex vino priuatim ad angues pota & illita, siue succo, siue folio, siue decocto, &c. quæ habet Dioscorides.

Aegineta Galeni verbis conformia recitat. Matthiolus vermes necare scribit.

Scordium [inquit Camer. in Horto] quamuis in locis humidioribus & palustribus frequentius inueniatur probatur tamen magis quod ex montanis locis irriguis defertur: quale est Pannonicum, quod odore caput ferit, & cæteris est acris. Commendatur quoque Creticum lanuginosum.

SCORDOTIS, SIVE SCORDIVM folio Saluiz. CAP. LXXII.



Radice nititur flexuosa, lignosa, & fibrata citris, quæ auctore Cordo, inutilis & singulis annis perit, ex qua caules plures eriguntur, cubitales & tri-
triticubitales, quadrati, hirsuti, purpureascentes vel nigricantes, maiores; medulla albâ fæcti: ad quorum

G g

Temper. &
Galeno.

Dele. Bui.

Memora-
bitur histo-
ria.

Ex Plinio.

Defect.



in vnam partem vergentes, Chamædryos, sed colore herbaceo, vel candido, pallido, ad Saluiz flores accedentes, ex quorum rictu loco galeæ, stamina emicant purpurea: semina calyculis continentur luca, Ocimi granis similia, amaricantia; rotunda & fusca, tradente Lobelio; plerumque terna in singulis Florum calyculis, Chamædryos seminum quantitate, Cordo. Huius odor nobis aromaticus, ac Allium aliquatenus olens.

Polemonium
Ruellii.

Hæc Scorodotis est illa stirps, quam Ruell. l. 3. cap. 31. Polemonion & Polemoniam, à certamine regum inuentionis appellari refert; ab aliis verò Philætarion & Philætarium; à Cappadoci-bus utem à multitudine vilitarum, Chiliody-namin. Non defuisse porro dicit, qui eam esse crediderint, quam omnes gallicæ cum suis herbariis pro ambrosia demonstrant, licet perperam: rura Bosci saluiam, i.e. nemorensem Saluiam appellare.

Ambrosiam habent officinæ & Herbarii, omnino à Dioscoridea diuersam, quam Germani wild Saluey, i.e. Saluiam siluestrem appellant, inquit Cordus in Diosc. qui in Hist. Scorodoniz siluestris titulo eam describit. Ei Gesnerus addidit figuram, quam Scorodoniam inscribit, ac Scordium montanum Odi esse concludit.

Erron Tra-
g.

Nepeta.

Lonic. tan.

Hanc, quam Germanos ait wild Saluey i.e. Saluiam siluestrem nuncupare, Scorodoniz siluestris titulo describit Cordus: Scorodoniam verò vocat Gesn. Errorum autem non paruum comittit Tragus, Scordium hoc Nepitam existimans. Quare vires etiam ab ipso appositæ, merito suspectæ esse debent.

Apollin. nomine wild Salbey & Alpenkraut/ vires huius perstringit, sed figuram malâ exhibet.

Lonic. stirpium peritus duplicem exhibet figuram lib. 5. Et primam quidem cap. 100. Alteram 214. his nominibus, wild Salbey, Alpenkraut, & Bulstkraut/ qui adscribit flores cæruleos, ac Sphacellum Theophrasti esse posse concedit. At postremo hoc loco inepam habet figuram, quâ fortè confudit Gallicrichum siluestre cum Scordio nostro, folio Saluiz.

Gesn. notat.
Lobel. car-
pitur.

Gesnerus autem Ambrosiam hanc officina- rum, Stachyn esse pronuntians, quod pace eius dixerim, à vero non parum declinat. Nimis secutè Lobel. in Adu. p. 210. Obs. p. 262. Icon. Plant. p. 497. Scordium alterum Plinii pronuntiat, officinarum Saluiam hanc agrestem, & Saluiam

bosci, Belgarum wilde Saue, Angl. wood sage. Sed & Camer. hort. Scordium secundum Plinii facit, eadem quâ Lobelius temeritate.

Thalius, qui Scorodoniam & Scordium mon- tanum Cordi vocat, notat apud Cordum pro hac stirpe falsò poni iconem Vrticæ Heracleæ Tragi, sicuti & in adiecto ibi scholio errorem admissum esse ait, in nomine Odi, quod & aliàs aliquoties in Cordi de stirpium historia libris factum dicit. Nam pro Odo, vult semper Cordum esse legendum: Scholia autem illa subiuncta, quæ præfixâ stellula notantur, Emiliis esse, ab ipso subscripta in autographo, qui quoties Cordi nomen scriberet, veluti priores tres literas abbreviaturus, cordis humani effigiem pinxerit. Quod cum i- gnoraret ille qui autographum in exemplum prælo typographico committendum describeret, accidisse vt perperâ Odû legerit, transcripseritq.

Honor. Bellus Scorodotin hanc vt notham & spuriam reiecit, vt quæ Allii non spiret odorem, nec viribus à Plinio attributis respondeat: quæ duo argumenta non mihi satisfaciunt. Scorodo- tis siquidem nostra, non solum nobis, sed etiam aliis, vt Hild. Cordo, Lobel, & Camerario, Allii olet: ac viribus præferendâ Scordio putatur Gesn.

H. Lugd. p. 380. Saluiam agrestem, & Sphace- um Dodon. vocat. Tab. Ic. & H. Saluiam siluestre. Compilatorem autem nesciuisse quid scriberet, satis indicant subiectæ vires, quas dicit minores, quàm in Saluia hortensi.


C.B. phyt. Saluiam 7. siue siluestre, vocat quâ ali- quâdo foliis Meissæ instar amplius reperiri narrat. Mihi autè nunquâ visâ Scorodotis folio Meissæ: huic enim sunt subrotunda nō Saluiz modo longa.

Nasci refert Cordus editis incultis inter ar- busta, & syluis Germaniæ & Angliæ frequentè Lob. lucidioribus: solum amare aliquatenus a- renolum, vel alioquin asperum, non tamè omni- nò sicum: prouenire iuxta sepes & agrorū mar- gines addit Dodanzus. Ego Monspelii obseruauî flores Octobri in montibus circa Esperon: Lug- duni au bois de la bonne Alemande proueniens Mar- tio: Genevæ in horto virens Ianuario.

Gesneri iudicio ad remedia Scordio præferen- da fuerit Scoronomia folio Saluiz, Fabr. Hildanus hanc miris laudibus in vlcibus gangrænosus celebravit, & duplicatâ dosi Scordio substituit.

SCORODOTIS TOMENTOSA CRETICA.

C. A. P. LXXII.



A Fratre Cas- paro ad nos missa planta hæc pro Scorodoniam Creticam, quæ pul- chrè exprimitur supremâ parte O- cymastri Valæini Clusii, cuius figu- ram exhibemus.

Pona in Baldo vocat Scorodotin legitimam Plinii Belli, qui, nec præ- ter ratione, negat Stachym vel Gal- litchum esse.

C.B. phyt. Sta- chydem 4. siue Creticam.

Vi- res & facultates huic ex dem quæ Scordio, teste Plinio, de quibus antè.

VINO.

VINOSA HERBA, SIVE VINACEA RY-
ta, Gallis rusticis pueris Minone dicta.
CAP. LXXIV.

Ambrosia inuenitur apud nos (inquit Ruell. lib. 3, cap. 61.) copiosa inter exiles & madi-
das legetes, quā mēflores se coronant, vt in solata
diu capita iucundo & vinoso simul odore recre-
ent, & vt frondosa comā se vindicent ab æstu.
Pueris rusticis optimē cognita, qui vertices ra-
cemofos lanugine molli per initia vestitos, Mi-
nones vocent: Vinosa herba rusticis dicitur. Au-
dio à quibusdam vinaceam Rutam, quōd folio
Rutam, & odore vinum imitetur, nominari.
Dodrantali vērō surgit frutice ramoso, foliis ru-
taceis, circa imum caulem minoribus. *Canticu-
li* feminibus racematim collectis grauidi, nun-
quam florem pariunt, facti in vertice racemoso,
& odore vinoso, radice tenui nec sesquipalmo
longiore. Superior [Scordium alterum] longā
radice nititur, hæc breui: illa floret, hæc mini-
mē: illa ramis riget, hæc invalida fesc, vt fertur,
adminiculis quibuscunque inuoluit: hæc vinum,
illa herbaceum virus olet.

CHAMÆPITYS VULGARIS ODORATA
flores luteo.

CAP. LXXV.

Chamæpitys plantula est palmaris, nonnun-
quam vix vnam, aut duas vncias alta, radi-
culā latis longā, simplici & dura: *coliculus* teres,
hirsutus propter terram rubescens, ceterā ex her-
bido in luteum vergens, quemadmodum & folia,
quæ ex breuib. interuallis ad nodos gemina,
opposita nascuntur, hirsuta, auiculæ digitatos
p. des, siue tridentem, imitata, sapore & odore
picis aut resinæ: ex quorum alis *pl. res* emergunt
lureoli, labello latiore bifido, superiore parte pā-
ctolis rubris guttato: galeæ vērō vice *flum. na*
promant dilucē purpurascencia: succedunt capi-
tula in quatuor togulos turgencia, totidem *femi-
na* triquera continentia: duas ponimus hic Fu-
chianas figuras, quæ vnius plantæ, sed neutra
placeat.

Chamæpitys vulgaris ineptam iconem exhibet
Ryffius in Dioscor. lib. 3, cap. 105. Poliū titulo.
Matthiol. in prior. co. nm. ponit solam figuram,



Tom. III.

siue illa de-
scriptionē,
quali plantam
non viderit,
nisi pictam,
nec valdē affa-
brē. Sed &
Fuch. conten-
tus malā figū-
ra suā, quam
ex eo proponi-
mus, nihil ad-
dit in Histor.
pietati Diosc.
verba, quasi ei
planta ipsa nū-
quā visa. Lō-
nic. lib. 5, c. 13.
Chamæpitys
alterius inscri-
ptione imagi-
nem habet lū-



chianā non
meliorē. Cap.
187. vocat feld
Cypræ: tan-
dem c. 19. verā
Chamædryn
fœminam, vbi
descriptio est
Botryos alte-
rias, & figura
apposita pro-
Chamæpity
prima, quæ nō
conuenit: sic
folet stirpium
ignarus omnia
confundere.

Ceterū, Chamæ-
pitys, *ty. triplex*
quam referen-
te Dioscor. in
Ponto Holo-
cyron vocant,
Athenis Ioniā,

in Eubœa Sideritin, herba est per terram serpens
subincutua. Folia habet similia Semperuiuo par-
uo, sed multo tenuiora, & pinguiora & hirsuta,
circum ramos frequentia, odorem Pini habentia:
flores tennes, melinos aut albos: radice velut
Cichorium. Est & altera Chamæpitys, ramos
habens cubitales, in anchoræ speciem incurua-
tos, tenui sarmento: eam autem prædictæ si-
mitem: florem album, semen nigrum: redolens
ipsa Pinum. Et tertia quædam est quæ mas ap-
pellatur, herba exigua, foliola habens tenuia, al-
ba, hirsuta: caulem asperum, album: flores me-
linos: semen iuxta alas: redolet & hæc Pinum.

Chamæpitys latinè Abiga (aliis Augia) appel-
latur, si Plinio credimus, diciturque propter
abortus: ab aliis Thus terre, cubitalibus ramis,
flore Pinus & odore. Altera breuior, & incur-
uæ similis. Tertia eodem odore, & idēd no-
mine quo hæc, paruulo cauliculo, crassitudine di-
gitali, foliis scabris, exilibus, albis, in petris
nascens.

Tragus paullō meliorem nostrā habet figuram
pro Chamæpity tertia, die triti feld Cypræ, quā
exiguam ait, Sepalsarii que luam appellant, af-
ferentes ad proprium genus referendum, quod
& ipse dat, ac propterea Chamæpityn vocat, lib.
1. cap. 25. Eius autem appellationes præcedenti
capite 24. has enumerat. Dioscorides, ait, Cha-
mæpityn, Cupressinam, Bryoniam siluestrem, Pi-
tylorysin, Orizelon, & Olocyron, Ioniā, Side-
ritin, Dochlam, Sanguinem Pallidis, Atragum,
seu Abigam appellat: Apuleius cap. 25. Orozelō,
Holocryton, Bryon agrion, Hæma Athenas, A-
bigam, Rapam, Cypræssum nigram, Spiculam,
Mammalent, Nemenepe. Anthyllida alii pu-
tant. Anguillara epist. 5. Peristereon Crateæ, *Anthyllid.*
luam, i. e. Chamæpityn vulgarem esse credit. Ga-
tinaria cap. de paralyti, luam vocat, atque dici à
Sim. Ianucci. Speciem Chamæpitys, & vocari à
Mefue Zuniam, ita exponentibus Nicolao & An-
tonio Guainerio.

Præter Chamæpityn hanc, vulgō luam voca-
tam, Celsalpinus alteram quoque tradit, maiorē
appellatam, peregrinam apud P. sanos, ramofam:
foliis & floribus ratiōribus: in ceteris similē
prædictæ: Huic descriptionem Chamæpityos 1.
Dioscoridis conuenire ait, at flore candido n. n.

dum esse visam. Tertiam verò siue marem optimè luteo vulgari quadrare. At incertum esse quæ ostendi possit pro secunda.

Synonyma Chamæpitys prima dicitur Matthiolo, Dod. & Cordo in Hist. Chamæpitys vera in Diosc. Aiuga siue Chamæpitys mas Dioscoridis Lobel. in Adu. Obs. p. 207. & Ic. Plant. p. 382. Chamæpitys tertia Trago. Vulgaris Aiuga, siue Chamæpitys flore luteo, Clusio. Chamæpitys maior Tabern. Chamæpitys 3. siue foliis in tres partes fissis, C.B. phyt. Chamæpitys 1. apud Matth. Aiuga Castori. Fuchsius pingit Chamæpityn 1. & 3. omittitque secundam.

Nomina linguarum *Xanthoxerus* Græcè, Chamæpitys Latine: item Iua, Iua arctica & moscata, Aiuga, Abiga, & Ibiga, quod nomen Hermolao teste ferè seruant Illyrici. Hinc abiectis duabus literis i. & gi lba: & ab Aiuga abiectioe literarum a & g. Iua manuit in vulgi nomenclationem. Chamæpitys autem dicta est, quasi humilis & brevis humique depressa Picea: nam eius folia Piceam [Pinum ali] olent, inquit Fuchsius. Mauritanis dicitur Humescithecus, seu Chamesthius: Germ. Erdpin, Erdkysel / Schlagkrautlein, & quibusdam Zengler se hebet: Trago seld Cypressen: Belg. Delt Cypres/hee langher hee lieuer. Gall. *Tue muscate*, & *Arthetique*. It. *Camepito* & *Iua*. Hisp. *Pinilho*, *Iua arctica*: Boh. *yina*.

Locus & Tempus Chamæpityn vulgarem odoratam flore luteo obseruavi Monspelii florentem Martio, & in pòte Maio; Lugduni copiosè Septembri & Octobri, Genue Nouembri, Aprili, Maio & Iunio, variis in locis, vt circa pontem *Arge*, & iuxta Rhodanum versus *la Basse*: Basilæ quæ itur Doruacum, & prope Haltingen Augusto. Tota Austria, adeoque Pannonia, frequentissimam collegit Clusius in agris & gramineis campis.

Vires & Vitis Folia primæ Chamæpityos, teste Dioscoride, & septem diebus in vino pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, Ischiadicos sanant: dantur peculiariter vrinæ difficultatibus, iocinoris & renum vitiis: torminosis profunt: & apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra Aconitum vtuntur, bibentes decoctum: ad antè dicta illinitur, cum polenta iute decocti subacta: trita in farinam & cum sicibus in pilulis sumpta aluum ex cepta melle cum æris squamma & resina purgat: apposita ex melle, vuluæ vitia extrahit: mammarû durities discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet: Secunda & tertia vim habent prædictæ similem, non tamen ita efficacem. *Galeno*, saporem habet amarum validiorem quàm acrem, effectu verò expurgat abstergitque viscera plusquam calfacit: proinde autriginosis, & omnino quibus facillè iecur obstruitur, bonum est remedium, quin & menses ducit, tum pota, tum apposita cum melle: sed & vrinæ mouendæ medicamen est: sunt autem etiam qui eam exhibent decoctam in melicrato iis qui coxendicis doloribus torquentur: herba porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat, & vlcera putrescentia sanat: præterea vberum durities discutit: est enim in siccano ordinis tertii, in calefaciendo verò secundi. Quibus addit *Matthiolas*, omnibus frigidis cerebri, neruorum & artuum morbis conducere, cuiusmodi sunt apoplexia, epilepsia, arthrosis, si herba puluis cum oximelite bibatur.

Temper.

CHAMÆPITYS SIVE IVA MOSCHATA Monspelicium.

CAP. LXXVI.



Complures ab radice crassiuscula longâ fundit caules lignosos, palmares aut dodrantaes, hirsutos: per quos folia crebra uillosa albicantia, duas trësue vncias circiter longa, vix semunciam lata, quæ cauli hærent angustiora, vnâ aut altera circa medium apophylli Coronopii instar, donata, aliquando circum circa

integra, sibi quæ similia, vnico neruo per longum decurrente: flores satis magni, purpurascetes, hirsuti, patulo recto hiant: semen nigrum, crispum, sublongum, vermiculi instar aliquantulum incurvum, in capitulis torundis lanuginosis. Tota planta odorata est & nonnihil amara.

An est Dioscorid. lib. 3. & Plin. lib. 26. cap. 8. Anthyllis altera: Lum. maiori in pil. arthet. Arctica: Castori & Clusio dicitur *abundis* *erigat* lat. Anthyllis altera: Lusit. *Herua crima*: Monspellianis yua moschata, Geln. hort. Chamæpityos alia species Monspelio allata. C. Bauh. phyt. Chamæpitys 2. siue Monspeliaca foliis serratis. 3. apud Matth. xbi Chamæpityn alteram & maiorem Cæsalpini esse statuit. An verò Cæsalpinus per maiorem & 2. hanc nostram Monspeliacam intelligat, ambiguum admodum est: folia siquidem Monspeliaca non tripartita habet, aut similia Chamæpity vulgati: flores etiam non luteos.

Iam porro moschatam Monspellii vago hoc nomine vocatam (pluribus enim plantis id competit) prouenire in montibus prope Castellneuf locis valde petrosis, florentem mense Septembri obseruavi. In Oliuetis & atidis aruorum marginibus Norbonæ ac Galloprovinciæ fruticat, inquit Lobel. nec alibi temerè nota, Moschata hæc vulgo vocata, contrariæ fragrantie significatu (ironicè nempe) est enim odora, sed olfactu minime grata, nec Pinum tedolente, veræ & odoratæ Chamæpitydi cognata, vnde proximus illi locus datus est. Nasci lato solo ad Tagum flumen in Lusitania, Granatensi etiam regno, & Gallia Narbonensi dixit Clusius: florere autem Æstate & Autumno, Granatensi tamen agro maturius.

Anthyllis altera si sit hæc, bibitur, teste Plinio, in duritia vularum, & in torminibus, in comitiali similiter morbo, cum melle & aceto, quatuor drachmis. Lusitani & Granatenses Clusio referebant, eius decoctum ad repurgandum sanguinem impurum propinari.

CHA-


CHAMÆPITYS ORIENTALIS.
CAP. LXXVII.

Pulsculis *stomatibus* palmaribus, crassis, quadratis, tomento multo candido obfistis fructuat: *folius* ad nodos confertis, vncialibus



circiter, lue moscharæ Mōspeliensium, lagnuginosis, crassiss, pae extrema denticulatis, gustu amaris: ex quorum alis ab imis tamis ad fastigium vsque *vascula* erumpunt hirsuta in quatuor carinas dehiscencia.

Preteriere triginta anni, ex quo hanc plantam pro Chamæpity Orientali habeo, vnde non recordor.

CHAMÆPITYS FOLIO NON
laciniato.
CAP. LXXVIII.

Radice fibrosa Sōchi, aut Dentis leonis minore: ramulos proferit palmum altos, humi stratos, & foliis septos. Semperui minoris, aut potius Vermicularis, minus carnosus, sed incanis & hirsutis: in quibus *flosculi* ex melino albid: suauorem spirat odorem, interdum vliginosum, vti vinea, mulcū-

ne querntis, aut cedrinus. Minus nota & paucis locis obuia, magis tamen odora, collibus aridis & aruis editioribus Nicæ Sabaudæ, & Geneuæ Ligusticæ, circum urbem Penem in Italia fructuat, vt quidam affirmant. Quin etiam eandem vireta nonnulla Belgii sedulo colunt, inquit Lobelius in Aduers. vbi (sic etiam in Icon. Plant. p. 383.) Chamæpity primam Dioscoridis odoratiorem inscribit: Pinum redolentem in Obs. pag. 208. itemque alteram Matthioli, & tertiam Dod. luteolis floribus. Figura autem à Lobelio proposita pingitur sine pilis, quæ apud Dodon. ex Fuchio cum pilis.

Chamæpitys i. dicitur Fuchio: Germanicè

ye lenger ye lieber weible/ quam etiam in Icon. pingit, sed si nota fuit, cur solam recitat descriptionem Dioscoridis, nihil addens de suo, nec locum vbi viderit: cur etiam nomen adscribit Germanicum quod Amare dulci potius competit, vt rectè notat Ryfius.

Dodon. gall. pro Chamæpity tertia, *que mus- que melle* assumpsit figuram Fuchii: Lat. in *Dodon. re. preb.* fol. autem eam habet quam Lobel. de ea ita scribens, vt existimem ab eo nunquam fuisse gustatam, nec etiam visam.

Ryfius in Dioscor. lib. 3. cap. ultimo, vt stirpium ignarus ponit figuram Fuchianæ similem, quam non describit, nec vbi viderit annot.

Chamæpitys i. Loniceri lib. 5. cap. 187. figura est qualis à Fuchio proposita, sed descriptio longè diuersa, nempe eius quam Botrym alteram vocamus.

Marthiol. in Diosco. Chamæpity alteram & postremam vocat, non ad eam omnib. notam, quam sepius se vidisse refert: mediam autem hæcenus sibi quidem aspicere non licuisse. Eadem repetit in eodem cum mag. fig. Lat. & Ital. vocans Chamæpity tertiam: Et hanc in Hist. germ. omisit. Figuram autem quam in prior. comm. ponit Matthioli, est sine pilis, quam in postremis nonnihil immutat: dicit mediam quæ secunda, sibi non visam, & tamen ponit figuram sine quidem descriptione. Postremam quæ tertia, quam ait sibi sepius visam, nobis inuidet, nec describit, nec depingit, nec locum vbi reperiri possit, assignat. Si eius figura secundo loco posita, est tertia, cur in post. comm. non indicat suum vel typographi errorem in præcedentibus.

De Chamæpity folio non laciniato hæc Casp. Bauhin. in phyt. Chamæpitys i. siue foliis non incisis: Aug. i. siue Chamæpitys altera Matthioli. icon. 4. p. 612. (in Ital. 3. & Dod. i. Fuch. & Lobel. addit apud Matthioli.) Alii foliis hirsutis, alii glabris pingunt: (quare nostra vtrumque exprimit, inquit aut Matthioli.) nondum vidi: non desunt qui existimant Echium scorpioides hæc exprimi: alii Chamæpitydem vermiculatam: nisi sit Anthylloides Thalii, quid sit ignoto. hæc frater, in cuius figura, quam Matthioli apposuit, nihil hirsuti obtruo, & ob id nullam demonstrat differentiam. In Anthylloides Thalii descriptione, quæ est in Hærcinia, nihil quoque inuenio, quod conueniat cum Chamæpity Lobelii i. quinimò suspicor, Anthylloidem Thalii, longè diuersam plantam, nempe Spergulam.

BOTRYS VETERIBVS.

CAP. LXXIX.

Botrys à Dioscoride herba esse dicitur tota lutea, fruticosa, diffusa, multas habens alas: *semen* circa totos ramulos enasci: *folia* Cichorio similia esse: & tota multum odorata. Quare etiam vestibus interponi. Nasci maxime circa fossas, & torrentes: Vim habere cum vino potam, erectæ ceruicis spirationis leniendi. Et hanc Ambrosiam Cappadoces vocare: quosdam verò Artemisiam.

Botrys à Plinio lib. 27. cap. 8. ita describitur, vt ex Dioscoride transcripsisse videatur: Gale- *Ex Plinio.* nus Botryn præterit. Paulus verò ex Dioscoride eam commemorat.

Cæterum, officinis ignota est Botrys, sed plerique Botanici agnoscunt, ipsamque ad Græcæ

vocis imitationem Botrym herbam appellant. Gale etiam vel Gagel : Amomum : Artemisiam & Ambrosiam Botrym vocari testes sunt Ruclius, Fuchsius, Plinius & Dioscorides.

BOTRYS PLERISQVE BOTANICIS.

CAP. LXXX.

Descriptio **R**Adix ex albo subrubra est, lignosa : caulis dodrante altior, hirsutus, multis alis concauus : folia Senecionis, latiora, quercinorum æmula diuisura, colore viridi, in luteum languente, odoris grati & vegeti, subhirsuta : flusculi vndique numerosissimi, ex foliorum alis, in ramulorū summitatibus & lateribus, primulūm erumpentes, Vitum botros æmulantes, qui expansi ex minutissimis fibris ochreis compositi consistunt.

Synon. cñ nominibus linguarum Græci *Βότρυς* appellant. Latini (vt Trag. Cord. Fuchf. Dod. Geln. hort. Lonic. Lobel. in Ada. Obs. p. 115. l. c. Plant. p. 228. Matth. Anguill. & alii) eadem appellatione vtuntur : C. Bauh. phyt. (qui Plinium Botrym cum Artemisia confundere perhibet) Botrym sive ambrosioidem vocat. Hort. Ludit. Chanædriū feminam & Chamæpitym : Dodonæi. Germani Traubenkraut, i. e. Herbam botri, Krottenkraut / i. e. Bufonum herbam, Tursischen Deyfus / i. e. Artemisiam Turcicam, Gewand / & Krottenfamen : Belgæ Puncne / & Druyenkrout : Galli *Pymen*, & *Tament*, quidam alii *Millegram* ; nonnulli etiam *de la Patience*, i. e. *Botry*, & *Lisue*, vt Cremonenses : Hisp. *Bien granada* : Angl. *Ote of Sierusalem*.


Locus Botrys Montbelgardi lata in horto Ill. E. facile prouenit, & quædamis femine deciduo se peopagat. Circa Genenam spontaneam offendi, item Montpelii prope Gangen aliquot mûiribus ab vrbe. In Oliuetis Neinausenibus, ceterisque tepidioribus & apricis aruis agri Narbonensis, & Nitiobrigum sponte fructicat. In Flandria, Anglia, & Germania, quod Fuchsius equidem sciat, non nisi siccâ crescit. Augusto & Septembri ad maturitatem peruenire consuevit.

Vires & vîus Quæ veteres de Botryos viribus & vîu memoriz prodiderunt, antè ascriptimus. Existimat autem Tragus herbam in puluerem redactam eclegmati admisceri, & ita ad orthopnœam vsurpari posse. Matth. Botryos herba in puluerem redacta, melleque in electuarii formam excepta, præstat contra pulmonum vomicas, quo remedio multos ego curavi, qui pus creabant. Non parui momenti est remedium contra veri dolores, si super candentem laterem Botrys calefiat, asperso vino generoso, aut Cretico, atque ita calida hypogastrio inducatur. Multi tandem aduersus blatas commendant, ideoque in hortis magnâ curâ seminant, reponendâ inter vestes. Suffiuntur eiusdem herbæ vapore vtiliter feminæ ad menses ciendos & emortuos fatus eiiciendos.

BOTRYS VERTICILLATA.

CAP. LXXXI.

TOto vultu hilarior est Botry satius, sed staturâ contrahiore, palmari, ramis qua-



turgidulis, supernâ angustioribus, in quorum singulis femina latet quaternâ nigricantia : radix lignosa, gracilis, piceis fibræ sonata.

Clusius Pannoniæ & Hist. post. vocat Chamæpityn tertiam multifidis foliis & tubefcente flore, multis Pannoniæ locis incolam : Item tertiam (sc. Chamæpityn) Fuchsius & Dodonæo, quæ tamen nomine apud eos eam nondum inuenio. Chamædriū feminam vocat Lonicerus : Chamædriū alteram Matthioli : Chamædriū feminam & Chamædriū siccæm Camerarii hort. Chamædriū feminam Dodonæi Hist. Pann. Lugd. Chamædriū minimum Lobel. in obseru. & icon. plant. Chamædriū laciniatis foliis : Chamæpityn alteram Aduers. tertiam Dodonæi, in quo Lobelius titubat : est enim ipsi Chamæpitys secunda.

C. Bauh. in Phyt. & apud Matth. Botrys 2. siue Chamædryoides. Ambrosia Placeto : Hæmælea Cordo : Chamæcyparissus agrestis Trago : Sideritis Turnero : Ryllo vterque plures plantæ simul confundenti Chamæpitys femina & Polium montanum dicitur.

Botrys altera passim Montbelgardi prouenit inter segres : in horto Ill. E. C. facam habui, virentem Nouembri ; Genene in aruis obliuiscunt & in horto adhuc virentem Ianuario : Montpelii circa monrem Esperon. Floret mense Octobri in agris Basileæ. Nasci tradit Cordus in vineis & earum muris, caluisque apricis, & editis locis, nonnunquam etiam in aruis : ac solum amare pingue, calcario lapidi mixtum, cui & nos subscribimus.

Quia verò saporem habet amarum, odorem vitæ etiam acrem & grauem, veluti si quis vinum & Lupulum commisceat, teste Cordo : ideo non abs re ordine secundo calidam & siccæ eam quis statuerit. Facultatibus hanc cognitionem habere cum Chamædryi author est Matthiolus. cum aded amara non sit, inquit, vt Chamædrys, ea quidem minis calida, siccatæ fuerit, itaque ad omnia munia inbecillior, non tamen multo.

ÆGIPYRVS, VEL ÆGYPYRVS

Veteribus.

CAP. LXXXII.

AEgypti nominis authorem Theophrastum agnoscimus, lib. 2. Hist. c. 9. Plant. dicentem :

ἡ δὲ γένεσις ἐν τῷ πόλει, ὅταν αἰετὶς ἢ πῦρ.
i.e. nostra quidem interpretatione, Aiunt verò
caprificare Polium quando Aegyptus multus fu-
erit. Gaza sic reddit: Quin & Polium culices
reddit, cum copiose fructuat. Scaliger contra
Theod. apud Theophrastum αἰετὶς Polii fructum
esse contendit.

Hanc plantam Anguill. epist. 8. existimat eam
esse, quam Ononidem & Restam bouis voca-
mus.

Αἰετὶς Theophrasti, Scaligero est fructus
Polii, quæ opinio præ cæteris, quæ sequuntur,
nobis arridet, Anguillæ verò, Rob. Constantino
& Dodonæo est Ononis. Gesnerus propter
flore purpureum Glauci Dioscoridis conueni-
re credit: ac malè αἰετὶς, pro αἰετὶς apud
Hesychium legi docet, Grammaticis plantarum
imperitis diuersas confundentibus.

POLIVM ANTIQVIS.

CAP. LXXXIII.

Theophrast. Polio tribuit folia carnosæ: quia
pulpæ constant, perpetuè virentia: valere
contra vermiculos noxios vestimentis interposi-
tum. Culices gignere, cum copiose fructuat: ad
omnem rem seriam, & magnificandam, & fa-
mam, effodi noctu tabernaculo structo Hesiodo
& Musæo auctoribus.

Dioscorides duo Polii genera tradit: Monta-
næ (ὁ ἐν τῷ πόλει) quod Teuthrion (τὸν Θεῦρον) dicitur,
& cuius est vltus: tenuis frutex est, candidus, do-
drantalis, semine refertus, capitulo in cacumine
quamdam corymborum speciem præ se feren-
te, paruo, similis cano hominis capillo, grauiter
olente, non sine quadam fauilitate. Alterum
magis fruticosum, non ita validi odoris, & viri-
bus inefficacius. Decoctum horum potum com-
moris à bestiis venenatis auxiliari potest. Hy-
dropicis item & morbo regio. Splenicis autem
cum aceto. Inducit & capitis dolorem, & sto-
macho incommodum est. Ducit quoque alium
& menses. Quin & substratum & lustrum vene-
natas bestias fugat. Idem impositum vulnera glu-
tinat.

De Polio Plinius lib. 21. cap. 7. ita scribit. Vt
Saliuncam vestibus interponi gratissimum. Si a-
pud Græcos Polion herbam, inclytam Musæi &
Hesiodi laudib⁹, ad omnia vtilem prædicantiū,
superque cætera ad famam etiam, ac dignitates,
prorsusque miram, si modò vt tradunt, folia eius
(hic Plinius Polium cum Trifolio confundit)
mane candida, meridie purpurea, Sole occiden-
te cærulea aspicuntur. Duo genera eius, cam-
pestre maius, siluestre quod minus est, &c. quæ
Dioscor. habet.

Galenus Polium amarum esse dixit gustanti-
bus, & modicè acre. Quare obstructione libe-
rare viscera omnia urinæque & menses ciere, ac
cætera præstare quæ antè ex Diof.

Meminit Polii & Nicander in Ther. quod cõ-
mendat ad arcendos serpentes à grabato.

POLIVM MONSPESSVLANVM.

CAP. LXXXVI.

Folia ex certis intervallis multa eodem loci ex
opposito nascuntur, angusta, oblonga, denti-

culata, candida, tomentosa, sapotis acris, & ama-
ri, per ramos dodrantes aut palmates, firmos, ro-
tundos, incanos, ex radice lignosa, paucis fibris
donata: capitula glomerata, alba, tomentosa, caly-
culis constant oblongis, è quibus flores emicant
hiantes, candidi. Huius virgulis intertexi solèt

Descriptio



Epithymo si-
milis flamina.
Odor tectus
plantæ gratus
etiam post tri-
ginta annos,
nec inclusa ta-
men. Cultra
min⁹ incana
& latiora quæ-
dam emittit fo-
lia.

An Polium
secundum albo
flore Clusio?
An Ru. lilio lib.
3. c. 50. Polium
montanum,
Narbonensis
Prouincie?

De Polio e-
iusque specib⁹
Matthioli hic

inter alia memoriæ mandauit. Sepalsarii
illi qui pro Polio herbam quandam vsurpant, quæ
númerosos profert cauliculos, tenues, rectos, ro-
tundos, semine vndique refertos, errant. Vtrū-
que Polii genus, quod nullà reclamante nota le-
gitimo respondeat, in pluribus Italiæ locis pro-
uenit. Primum vulgus herbariorum suam mu-
scatam appellat, à quo secundum effigie non
longè distat, quamvis non adeò sit odoratum. Se-
cundi generis Polium, cuius etiam picturam
adeci, viret Veneriis in horto Miphæi. Et hanc
in prior. comm. habet, quibus in post. cum mag.
fig. sequentia addit Polium montanum. planta est
candicans, foliis oblongis, per ambitum serratis
caules habet copiosos, rectos, rotundos, lignosos
que albicantes, & qui in cacumine capitula edūt,
florida, candicante, Thymi figura. Tota planta
odorata est, odore tamen acuto & subgravi. Est
& alterum, quod Herbariorum quidam suam
moschatam vocant. Id ego inter Polii genera re-
censendum volui, quòd capitulis, foliis, caulibus,
odore, facultatèque Polium referat &c. In Hist.
germanicè [etiam cum addit. Camer.] vocatur
Berg polium, Polium montanum, Teuthrion:
Item, Feld polium, Polium campestre, wild
Rosmarin. In Epit. cum addit. Camer. Polium:
Item, Polium alterum, Herbariis nonnullis sua
moschata, Marientraut / wild laundel. In
comm. cum addit. Casp. Bauhin. Polium 1. Po-
lium 2.

Iua mus-
cata.Polium
montanum

C. Bauh. apud Matthiol. Polium maritimum
erectum, Matthiol. Polium 1. in maior. fig. in mi-
noribus enim transpositæ sunt figure, & pro al-
tero positum in litore Mediterranci maris, Mò-
spessuli etiam cum Epipolio obseruati. In phyt.
Polium 3. siue maritimum erectum Monspelien.
Matthiol. & Clusii primum. Clusius autem in
Hisp. asserit Polium suum habere cauliculos hu-
mi sparsos: In Hist. autem post. imaginem exhi-
bet, quæ non representat Polium Monspelien-
se, quod fructuat, nec humi spargit ramos.

Pol. mariti-
mum ere-
ctum C. B.

Epipolium

C. Bauhin.
not.

Geln hort. Polium 1. siue montanum Dioscori.

dis vocat, & recentiorum quoddam Polium maius. In append. Polium Italicum.

Dod. gall. Polium, Pol. montanum Teuthrion (sic etiam vocat Tabern.) An Lat. in fol. quoad descriptionem Polium 1.

Lobelio in Adu. Πολύων ὀρεῖον, Polium maritimum montanum: Angl. poleye dicitur.

Polium 1. Monspelii apud mare provenit copiose, odoratus multo montano altero, quod depingitur apud Cordum, florens mense Maio & Augusto, acre valde & amarum. Cultum multum degenerat, minus candidum evadit, foliaque redduntur latiora, ut Genevæ in horto observari ex semine satum, virens Ianuario. In Belgio sponte non provenit, sed in hortis magno labore cultum, Iulio verò floret. Locis maritimis & denudis collibus & arenosis litoribus observatum à Lobelio, cuiusmodi ad Ceti montis insulam & Magalonam Narbonensis Galliz.

De illo porro rei herbariæ studiosi obiter admonendi sunt, omnis generis Polii ramulos in terram umbroso loco depactos, sine difficultate radices agere, modo ipsa terra bene subacta, & repurgata sit, ut in aliquot eius generibus Clusius periculum fecit.

Polii ramuli
si se par-
gunt.

POLIUM VENETVM.

CAP. LXXXV.

Descriptio



nit in insula Lyo Veneræ ditionis & clientelæ, nec ita incanum: vocaturque Polium montanum purpureum.

Polium supinum (ita vocat apud Matthiolum) in litore Adriatici maris apud Venetos legit C. Bauhinus. Is in phyt. appellat Polium 2. siue maritimum supinum Venerum; Dodon. gall. Polium 1. Lobel. Polium montanum purpureum.

POLIUM CYPRIVM CANDIDVM.

CAP. LXXXVI.

Descriptio

Ignosum Polii Cyprii nomine ramum palmo longiorem Fattulit rater, quod Monspeculano candidius totum, magnif-

que tomentosum, odoris iucundi & fragrantis, sapore prædictum est amaricante: folia perpusilla, per quorum margines crenæ vix tantillum apparent.

An Lobel. Aduers. Polium Creticum, Veneto magnitudine par: lanugine & habitu maritimo Monspeliano simile: An Polium minus Cordo, in Hist.

POLIUM CANDIDVM TENELLVM,
tomentosum, flore purpureo albo
CAP. LXXXVII.

Porro tenellum est, exilibus ramis humifusis, dodrâcalibus, multâ lanugine candidâ repletis, qui subinde ad nodos radios agunt: folia illi sunt mediæ inter primum & secundum (Polium Apenninum nostrum existimo, & Mo. speliense) genus magnitudinis, breviora tamen, denticulata,

valdeque tomentosa, quæ ad eam causam est ut in tenellis foliis nulla dentium vestigia conspiciantur, nisi à diligenter observantibus: capitella superioribus paulo minorâ, totaque tomentosa, in quibus flos purpureus.

Inter iam descriptum, describendumque nunc Polium, sola teneritas stirpis, & floris varietas discrimen facit, quod albis floribus est prædictum. Vtrumque enim genus nihil ferè nisi tomentum sunt, & odoris inauitate reliqua generâ superant. Vtrumque suis floribus onustum Martio reperiebat descriptionis auctor Clusius; nec differentiam animaduertisset, nisi floris color, diligentius conferendi singulas plantas, ansam præbuisset.

Prius inscribit in Hist. post. Polium montanum quintum purpureo flore: In Hist. Polium 4. flore purpureo. Alterum in Hist. post. Polium 6. albo flore: In Hist. Polium 5. albo flore. Lob. in Icon. Plant. p. 487. itemque Obs. p. 257. Folium montanum purpureum: Polium repens supinum, & πικρὸν ὀρεῖον Clusii, & quintum Rosculis albis. Dodon. lat. in fol. Polium repens, & Polium tertium, & πικρὸν ὀρεῖον. C. Bauh. phyt. Polium 5. siue maritimum supinum secundum: H. Lugd. p. 929. Polium 4. Clusii.

Incolæ Murciani regni Chamapitryn esse putabant, apud quos vulgare nomen erat *amarilla*. Murciano regno duntaxat inter Lorca & Velez el rubio in accliuatibus tumulorū arenoso solo observabat author, florens Martio. Icon quâ proponimus desumpta est ex Clusio, quam nec pictor nec sculpsor bene adumbravit.

Polii

Polii appellationes notha, Aequiuoca & Subfutura.

Ceterum, quod superius adnotadū erat, sunt qui Polium Teuthrion, qui Pheuxastidiō, qui Achamenida, qui Ebeniten, qui Melosinon, qui Belio, qui Leonthocaron vocent: Mauritanī Cahade, Iahade, seu Giade. Est autem Polio nomen à canitie canisue capillamentis, & tomento hirsuto, quæ non modò capitula corymbacea, vt ait Dioscorides, sed etiam vniuersam plantam incanam reddunt, perinde ac Gnaphalium.

Præter autem hæcenus recensita Polia (nam & æquiuocationes annotasse conueniat) Polii nomine sequentes donantur plantæ. Serpillū. Saturcia. Pulegium ceruinum. Acinos. Impia Plinii. Stachys citrina. Tripolium. Vinum album. Periclymenum. Guacaton herba. Chamæpitys.

Polio in extractione vermium & prouocatione vrinæ & menstruorum, pondus æquale de Ligni Granati viridis, & duas tertias ponderis corticum lignorum Cassiæ lignæ supponit Tractatus qui pro quo. Fuchsius in Antiballom. pro Polio semen Eucæ recipit: Alii Chamæpitys specie in Sephali pro Polio vtuntur teste Fuchσιο, quid improbat, etiam si odore atque sapore concurrant.

BETONICA VVLGARIS PVRPVREA.

CAP. LXXXVIII.



Betonica caulibus surgit numerosis, cubitalibus & altioribus, quadratis, ex longo intervallo nodosis: folia alia ad caulium genicula gemina, aduersa, alia humi sparsa, incondita, pediculis palmaribus circiter donata, per ambitum laciniata, rugosa, aspera, hirsuta, sapore aromatico præditæ flores spicati verticillatim genicula circūstâr purpureascentes, galeâ reflexâ subrotundâ, labello triſido demisso, è medio rictu stamina flori concoloria exseruntur: semen, Trago, oblongum, angulosum, in spicis quibusdam Marrubii instar occultatum: radix pollicem crassâ crebris longisque fibris capillata.

Cestron, inquit Dioscorides, quod Psychotrophon vocatur, quoniam in locis frigidissimis reperitur, & quod Romani Betonicam vocant, herba est caulem habens tenuem, cubiti altitudine, aut etiam maiorem, quadrangularem: folia longa, mollia, quernis [Pini] similia, per ambitum fissa, odorata, ad radicem maiora. In summis caulibus semen est Thymbra modo spicatum.

De Betonica Plinius ait. Verones in Hispania Tom. III.

inuenerunt eam, quæ Betonica dicitur in Gallia, in Italia autem Serratula, à Grecis Cestron aut Psychotrophon, ante cuncta s laudatissimam. Exit anguloso caule cubitorum: duorum à radice, spargens folia ferè Lapathi, scilicet ricta, semine (stamine, Ruell.) purpureo.

Galenus lib. 5. de sanitu. tuenda; Betonicâ herbam à Celtis *οψις* vocatam refert: Dioscorides autem omnino aliam Saxiphagon describit. Galenum tamen locò citato distinguere vult Cornarius inter Cestrum & Betonicam: & Cestrum quod apud Gallos nascitur; Saxifragam vocare, testemque adducit Aërium, calculosis Betonicam admilcentem & Cestron, Saxiphragon dictum: sicut etiam Paulus duplicem facit Betonicam.

Multi verò ancipites fuerant in vsuali hac Betonica, non esse eam existimantes quæ à Dioscoride describitur propterea quod folia non videantur aliquè recinere odorem, quem tamen inesse debere vult Dioscorides. Atque ex his multi suspicari sunt veram Betonicam esse plantam illam quæ quibusdam locis Mentha Romana, Neapoli Mentha francesca vulgò appellari solet: capiti solum ex odoris fragrantia. Sed hi dum odorem querunt, multas alias notas se amittisse non considerant, ac præsertim flores, & radices, quæ nullo modo Dioscoridis descriptioni conueniunt.

Betonici hanc vulgarem duorum generum obseruauit Clusius. Nulli, inquit, in Pannonia; Austria, vicinisque prouinciis montes herbosi, nullæ siluæ, nullæ præta sunt, in quibus non abundantissimè proueniat Betonica vltata flore rubro, siue purpureo: quæ duorum generum est. Vna enim breuiorem florum spicam habet, & maturius floret. Altera autem longiore, molliore, & magis fuscâ est florum spica, illaque etiam serius flores suos explicat: solet præterea hæc postrema in maiorem altitudinem exercecere, quàm prior, licet eodem modo utraq; spontè nascatur, vel eodem puluino excolatur.

Betonica Græcis, vt Dioscor. & Galeno, *ψυχωτροφον* vocatur, à floribus spicatis & mucronata acutis, veruculum, seu, vt apud Plinium in vulgaris exemplatibus legitur, viriculum præferente, sic enim ille Cestrum interpretatur. Dicitur etiâ *ψυχωτροφον*, quoniam, vt dictum, frigidis in locis reperitur: ipemque *βερωνική*. Latinis Cestron Betonica, *Veronica* (Plinio auctore) ab inuentoribus Veronibus Hispaniæ populis, & Serratula: Recentior tamen ætas aliam comprobât Serratulam, de qua suo dicemus loco. Antonio Musa, referente Trago, Britannica, Prionites, Pyrenes, Adianthos, Thyariza, Seropodion, Pandiona, Hierobotane, Serrata, & Rusmatina. Arabibus, Herb. antiquo Jo. Cubæ, bastaren vel Castaron, aut Chastara: Scapioni denique cap. 32. Rastata, Auerrhoi Alchifon & veragnes. Manlio Lingua bubula; & Lingua equi appellatur. Germanis Betonien & Barthonien / Bethoniens fraut & Barthonienfraut: itemque Betonif. Gallis *Betonifne* & *Betonifne*. Italis *Betonica* seu *Betonica*. Hisp. *Betonica*. Anglis *Betonif* / & *Betonifne*. Sclauonis Serpar. Anguilli *Betonifne* *gerefele*. Hort. Lullii. *Bol fia* / hic. Hirci *Barba* Nomencl. Pannonico. *boh. Buckvice*.

Eam verò quæ purpureo est flore (conspicitur enim & albo, de qua mox) Germani propriè *Braun Betonien* cognominant. Latine verò apud plerisque, vt & in officinis solum betoniæ

Serratula

Lapathi folio.

Saxiphragum Cestrum Gal.

Cestrum gillitum est Saxiphragum Corn.

Betonica purpurea duplex.

Nomen Cestron.

Serratula.

simplex nomē retinuit. Trag. & Hort. Lufit. purpuream: Lonic flore purpureo: Anguill. veram & legitimam: Cord. & Gefn. hort. Vetonicam.

Nascitur in pratis, siluis montosis, frigidis & opacis locis, & plurimum Maio & Iunio mensibus floribus abundat. Montbelgardi in multis locis prouenit: abundat inter Aeffort & Raupach. Montpelii in sylua Aigremont. Basileæ adhuc florens Octobri in monte Moutets, & prope Krentzsch: itemque in colle extra portam S. Albani ad Birsam mense Iulio. Patauini in horto viret Decembri. Lugduni & Geneuz Ianuario. Nasci in pratis, frutetosis & herbosis locis, solo ferè qualicunque retulit Cordus. Betonicam multis durare annis, si non accedat femina menstruata ex Constant. lib. 12. cap. 20. & Iosepho lib. 7. belli Iudaici, scribit Coler. æcon. lib. 5. cap. 44. De Betonicæ cultura consule Aug. gall. agric. die 6.

BETONICA FLORE ALBO.

Descriptio

Hic, autore Clusio, multa sunt folia rugosa, subhirsuta, in ambitu serrata, Betonicæ vulgaris foliorum prorsus æmula, non aded tamen fusca viriditate nitentia, sed dilatoria: quadrangulares caules, geniculati, subhirti ex illorum medio exeunt, & in pedalem altitudinem excrecunt, subinde extremâ parte in alas sese diuident: folia in singulis geniculis caulem æquali situ ambiunt, humi fusis minora, nullo pediculo



fulca, odorata, quemadmodum & illa, gustus amaricanti: summi caules & rami in densam caliculorum spicam desinunt, è quibus stipes emergit vulgari formâ similis, sed coloris omnino albi: semen deinde in vasculis, Betonicæ vulgaris semini par, fuscum: radix non dissimilis, viuax, singulis annis augescens, &

plures caules producens.

Huius meminit quoque diligentissimus, peritissimusque Cordus lib. 1. Hist. pl. cap. 159. his verbis: Vetonica alba genere à rubea non differt, habet tamen suam propriam & ab illa solo colore florum diuersam speciem. Et hanc à vulgari solo colore florum differentiam obseruauit, etiam Tragus qui Dioscoridem miratur, quod cum diligentissimè Betonicæ historiam persecutus sit, non tamen florum colorem indicatit, fortasse ided quod in flore Betonicam non uiderit, vel potius quod illam ex verbis, quibus Betonicæ semen, ueluti Satureiæ spicatum inesse tradit, animaduerti facile posse arbitratus sit. Sed utrum hæc quidem se habeant, satis erit, si eas quas iam descripsimus, veras Betonicas esse, nullatenus dubitemus.

Dicitur hæc Betonica candida Brunchf. & Trago. Alba Tabern. Io. Agric. Hort. Lufit. & Schvencxf. Flore albo Clus. & Camer. hort. itemque Lonicero. Vetonica alba Cordo. Ger. weiß Berbonien.

Nascitur Cordo isdem natalibus cum rubra, inuentum tamen rarior est. E silua quadam Mediomaricam ad Tragum allata. Et hinc non passim obuam arbitratus est, nec multis in Germania visam. Crescere tradit Clusius in ascensu montis Neuberg, Etscheri iugi, & aliis quibusdam editioribus locis: sed omnium abundantissimè supra Zeehof, magno ultra Garingam miliari germanico, quâ iter est in Herrenalben, & Dürrenstein. Florere istic Iulio, in hortos translata maturius aliquantè, ac egregiè augescere. Ego reperi florentem Angusto inter l'ise & Longuelte pagum Ill. principis Viri. itemque Bedfordiæ & Raupe.

Folia Betonicæ, præceptore Dioscoride, collecta siccare oportet, maiorem ad usum. Radices cum aqua multa [hydromelite] potz pituitosam vomitionem prouocant, folia dantur ruptis, conuulsis, vuluæ affectionibus, & eiusdem strangulationibus drachmæ vnius pondere, cum hydromelite. Ternæ in vini sextariis duobus contra Serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita venenatis moribus prodest, aduersus etiam venena drachma in vino pota conuenit. Hanc si quis præsumperit, lethale haustum venenum nihil nocebit. Vrinam cit, aluum subducit, medetur comitialibus & furiosis cum aqua pota. Iocinoris & siens vitiis drachmæ pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionem adiuvat si quis à cana eam fabæ magnitudine cum melle decocto deuorauerit. Eodem modo & acida ractantibus propinatur: stomachicisq; eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum forbeatur. Datur sanguinem excreantibus trium obolorum pondere, cum diluti vini egelidi [lactei] reporis, Com. cyathovno: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua: hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, & non febrientibus cum mulso. Regio morbolaborantes recreat, menses ducit drachmæ pondere cum vino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem potz: cum melle tabidis, purulentis, auxiliatur, folia cum inaruerint trita sicili vase reconduntur. Eisdem vires eidem assignas Plinius. Galenus vim habere incidendi scripsit, ut gustus indicat, ac præterea pleraque ex prædictis viribus ei tribuit.

Scripsit & de iis proprium libellum Antonius Musa clarissimus Augusti Cæsaris Medicus, in quo hæc de ea memoriæ prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, & montibus mundis & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficiis & periculis. Loca sacra & busta à visis metuendis tuerur, & defendit: denique res omnino sancta est. Cestron vocatur & Plichotrophon, siquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrsis pariter tenui, cubiti altitudinem excedens, quadrangulo, folia proferunt Quercus, odorata: semen in summitate thyrsi spicatum Thymbæ modo. Pollet vniuersa planta dotibus ferè innumeris, quandoquidem in rufa, capitisque vulneribus illita, eam mirâ celeritate

tate conglutinat. Præstæ id tamen efficacius, si tertio quoque die iterum atque iterum imponatur. Aiunt præterea tam valentis esse facultatis, ut ossa quoque fracta extrahat. Radicū ex aqua decoctum ad tertias, fortè, oculorum doloribus medetur, quod item præstant contrita folia, & fronti superimposita. Succus à foliis per se tritis expressus, aut prius aqua maceratis, aurium dolores mulcet, si addito rosaceo in aures egelidus instilleretur. Idem drachmæ pondere haustus in aquæ calidæ cyathis quatuor sanguinem illum per inferna trahit, cuius redudantia caliginem oculis offudit, quo fit ut etiam visum acuant comela folia. Eadem cum salis momento confusa, naribusque immissa sanguinem inde fluentem sistit. Betonica decoctum ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo os sæpius colluatur. Herba ipsa ex tepè aqua pura spiriosus & anhelosis maximè proficit, folia melle excepta rabidos iuvant, præsertim qui purulenta extulsiunt. Eadem tribus diebus continuis deuorata drach. quatuor pondere, aut ex frigidæ aquæ cyathis quatuor ebibita, ventriculi dolores mulcet, iocinoris verò, si ex calida hauriatur. Ex vino decocta hienis vitis medetur. Sanat & renum vitia ex mulso bibita duarū drach. pōdere : ex vino autem vetere triū drach. pondere, additis Piperis granis septē & viginti : ad lateris lumborūque dolores vilissimè bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis sumpta, alui & intestinorum tormina remouet, si tamen à crudis non fiant succis, foliorum quatuor drachmis in aquæ mulæ cyathis octo epotis, commodè citatur alius, sananturque iis ex vino sumptis coli inflammatione vexati. Pariendi celeritatem adfert, vterique cruciatus à frigore conceptos mulcet, si ex calida aqua, aut mulso duarum drach. pondere propinetur. Contrita folia & illita præcisos glutinant nervos, & resolutos iuvant. Eadem trium drachmarum pondere ex caprillo lacte sumpta tribus diebus, sanguinem ore reiectum cohibent : pari vini veteris mēsurā, medentur ruptis, & ab alto deuolutis. Præsumpta ebrietatem arceat. Ex vino frequenter hausta ictericos sanat : fuisso adipi admista carbunculos curat. Pota ex aceto mulso vnius drachmæ pondere viatoribus longo itinere defatigatis vires mirificè reficit : fastidia abstergit, & stomachicos recreat. Aduersatur venenis, & serpentium, & venenosorum, rabidorūq; quorumcūque animalium moribus, non modò intus sumpta, sed etiam extra emplastri modo imposita. Cuniculosa sinuosos sanat vlcera cum sale indita. Ex vino hausta menses ciet. Pota dolores podagricos lenit, præsertim radicū decoctum potum, idemque præstant contrita folia imposita. Hæc Antionius Musa.

Betonica quantum ad duas potiones satis est, in aqua decoquendum, & decocti repentis duas Tom. III.

heminas ad collidendum vterum præscribit Hippocrates. Radicem Fontanus ad choleram commendat. Post purgationem Betonica in aqua Rosarum, vel vino decocta reparat omnes spiritus (ut habetur apud Arnoldum lib. 1. cap. 17. de cur. morb.) inque cōseruatione visus, & augendo acie oculorum iam obtenebratam multum iuvat. Aquam Betonicæ expellere febres legitur apud Iod. de Monte Exper.

Ceterum in hac herba id obseruandum, radicū facultates longè dispares à foliorum & florum viribus, utpote quæ multum stomachio, ori- que ingrata, nauseam, rugitus, vomitūque cieant, folia contrā odora, aromatica, & grato sapore, nonnihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica. Et hinc non temerè eam tanto- perè laudauit iusticia & vrbana plebs omnis : nunquam non in extollenda boni alicuius multiplici potestate & vtu Veronicæ vtilius dicere solita. Idque à tam multis & tam sæpè factitatum fuit, ut caperit iam pridem non secus quàm in pro- uerbio aliorum bonorum formula & exemplar quoddam Italicæ genti herba hæc esse : Quoties- cunque enim aliquem laudibus familiariter extollere volunt, vulgari prouerbio. Tu hai pin virtute non ha la Betonica:

Obseruatiō

Prouerbiū

BETONICAE FOLIO ALOPECVROS quoruādam.

Cap. LXXXIX.



Est radice nigra, tuberosa, fibrata : caulibus multis, cubitalibus, rotundis, imā parte vestitis, corticis quibusdam ex- tantibus velut laciniis, partim è nigro rufis, densius congestis, in cuspidem desinensibus : foliis Betonicæ, rotundioribus, breuioribus, latioribus, venosis ; quā medius nervus protenditur, nigris, ad extremam oræ

Descriptio

marginem valdè crenatis, magnis intervalis per caulem prodeuntibus, geminis ex aduerso positis : in caulium vertice ex geminorum foliorum tanquam alā caput exoritur, oblongum, inætæ figura, innumeris villis hispida, densissimè stipatis, candicantib. eleganti protius huius congerici figura, emicanti omni ex parte illa pilorum castærie, ordo, & densitas, utcunque vulpinæ caudæ speciem æmulatur, vnde nomen impositum est, Alopecurus montana ab Herbariis, à fructus sc. villosi quadam similitudine cum eius animalis cauda.

Alopecurus montana

Nascitur in altorum montium opacis conual- libus, arborum frequentia vmbrosis, & illapsus aquarum vdis.

Locus

Quā facultate prædita sit & ad quas ægritudi- H h 2

nes valeat; nobis cum H. Lugdunensis auctore, qui p. 1358. Alopecuri genus inscribit, compertum non dum est.

SALVIA LATIFOLIA.

CAP. XC.

Descriptio



flores in spicam digesti, ex foliorum quorundam alis cærulei, aut ex albo purpurascens, Lami, cucullo hirsuto, labello bifido, ex calycibus oblongis, si nris, stant.

Hanc sic descripsit Dioscorides. Salvia fructus est oblongus, ramulos, virgas quadrangulares, & subalbicantes habens: Folia Malo Cotonæ familia, longiora tamen, & asperiora ac crassiora, latenter velut detritæ vestes hirta, subalbida, vehementer odorata, graui odore. Semen in summis caulibus Hormini siluestris modo habet. Et sic etiâ delineatur à Serapione, qui tamen legisse videtur, & est etiam, addit enim strictiora, pro asperiora & crassiora.

Salvia genera duo
Theophr.

Et licet Dioscorides solum hanc Saluiam agnouisse deprehendatur, Theophrastus tamen duo eius genera prodidit. Differunt autem (inquit lib. 6. cap. 2. Hist.) Spacelos & Eleliphacos, quod altera sativa, altera sterilis est: habetque Sphaceli folium maiorem lauiorem [minorem asperitatem, alius:] breuius illo est, & minus squalet. Eleliphacos grauiore odore sentitur. Hæc sic legit Gaza: Sphacelus & Salvia inter sese distant, quasi alterum vrbianum, alterum genus siluestris dixeris. Sphacelo folium lauius, contractius, minusque squalens: Salvia scabrius. Verum vtralectio magis conueniat, ipse iudicet.

Illud obiter monemus, nos plures Saluis tradere, sed in præsentia duntaxat de maiori agere.

Plinius lap.
sus.

Plinius vocis *salvæ*, lentem significantis aminatione deceptus Eleliphacum Lentis siluestris genus facit. Est Eleliphacos, inquit, dicta Græcis, ab aliis phacos. Est ea sativa Lente lauior, & folio minore & sicciore, & odoratiore. Est & alterum genus eius siluestris, odore graui, hæc mitior. Folia habet Cotonæ Malis egie, sed minora &

candida. Et mox post hæc verba, quasi alia esset Veterum, alia sui temporis Herbariorum Eleliphacos, subdit hæc verba. Nostri qui nunc sunt Herbarii, Eleliphacum gracè, latinè Saluiam vocant, Mentha similem canam, odoratam.

Ceterum, Matthioli præter vulgaris notitiæ Saluiam hortensem, habet & ipse Saluiam siluestem, foliis domesticæ similibus. Quam autem siluestem appellat, ea ipsi non est, quæ in Hispaniæ campetribus & asperis locis ac in Massiliensi agro nascitur, quandoquidem hæc non siluestris Salvia est, sed ea ipsa quam domesticam vocant. Porro genera Saluiæ, quæ à Theophrasto redduntur, in Italia quoque in hortis quàm plurimis inueniri asserit: in eaque est sententia, ut existimet Sphacelum marem esse, Saluiam verò feminam. Et quia Græci Eleliphacum Saluiam vocarunt, inde factum esse perhibet, ut Plinius vocabulorum cognatione deceptus, crediderit Eleliphacum Lentis speciem esse.

Dioscoridis textum esse corruptum, testatur Anguilla: ac folia non esse Malo Cotonæ similia, sed Mentha: legendum enim cum Cratæa *gala* & *exi* quia *ti* *ndos* quæ, fidemque facere Plinium. Dioscoridis allegatum locum quoque reprehendit Lobelius.

Hist. Lugdunensis attestatur nota esse vulgè duo Saluiæ genera (licet Dioscorides vnam tantum describit) Saluiam sc., maiorem, Gallicè *grande sauge*, & Saluiam minorem siue nobilem, *saugefranche*, & *saugemenue* vocatam. Addit Theophrasto totidem esse genera.

Clusius, qui Saluiæ multa genera obseruauit, latifollam inueniri scripsit folio viridi, eoque crispo, vel non crispo, purpurascens. & veriscolore: itemque in Austria floribus candidis, cuius semen istinc in Belgium amicis misit: è quonata plantæ.

De Saluiæ generibus Camer. in Hort. hæc annotauit. Salvia latifolia & altera cuiusdem formæ cum auriculis item tenuifolia auriculata, & eiusdem generis Hispanica à frigore munienda, sicuti quæ flore albo, cuius meminit Anguillara, Hæc non fimo pingui, sed luto veteri cum terra debet stercoreari. Lixiuu etiam cinere muniunt olitores & sic lætiores prouenire testantur.

Saluiam hanc nostam latifollam, inscribit Matthioli. passim in suis comm. itemque Hist. germ. Saluiam maiorem. Et ita quoque Dozon. gall. (qui 2. facit, & quorundam agrestem cognominat) & Lat. [qui tamen primo loco eam describit:] H. Lugd. p. 379. Lobel. in Obl. p. 299. (& sic quoque in Adu. & Icon Plantar. addens tamen scabriorem Dioscoridis.) Tabern. & C. Bauh. in phyt. Saluiam latifollam Tragus, itemque Brunfels. in 4. pag. 280. sine icon: figura enim adposita, est Eupatorii cannabini. Cæsalp. Saluiam domesticam floribus cæruleis, vel candidis. dis.

Apollinaris lib. 2. Saluiæ species non separat, easdem omnibus vires adscribens. Ego tamen maiorem infirmiore minor existimo. Matthioli in Epit. cum addit. Camer. Saluiam inscribit, & Saluiæ genus vrbianum Theophrasti pronunciat.

Cuius porro ex imperita multitudinis nota est non solum facie, sed etiam certissimi remedii herba Græcis *Ἐλελῖφακος* vocata: Latinis & officinis *Salvia*: Arabibus *Ἀλελῖφακος*, & *Ἐλελῖφακος*: Melius *Brui*: Germanis *Salbey*: Belgis *Sas* *uic*

nie: Gallis *Sauge*: Italis & Hif. [his & *Salua*] *Salua*: Angl. *Sage*: Boh. *Sfaltwig*: Polon. *Szaluca*: Hung. *Salya* & *Borany* rom. h. e. agnium Absinthium. Hæc autem cum retortida semper & exucca videatur, factum est ut Græcis Eleliphacon siue Elcliphacos, quasi in tabem redacta, vel in syderationem flaccescens dicta sit, ἐλελίζον & σφάκος vocibus in vnam coalescentibus appellationem. Est autem ἐλελίζον, contrahere, & σφάκος, seu potius σφάκαλον malum in plantis, quum per æstatem, & ardentissimum canis æstus, vi Solis altius penetrante, humoræque, quo nutriuntur, deficiente, languent & arefcunt: Latini Syderationem nominant. Potuit tamen æquè scitè dici (inquit Lobel.) à mœdendis Sphacelo penè demortuis partibus, quibus calorem natium roburque insitam reuocaret, quâ pollet familiari facultate nostræ vitæ primordiis beneficiâ, vnde *Salua* dicta, quod saluos homines & incolumes efficiat. Aut quod præsertim ad fecunditatem salutaris sit. Hanc namque sæpè vsurpantes steriles, grauidæ redduntur. Quare Agrippa Sacram herbam vocauit, ut author est Actius.

Inter nothas verò appellationes & hæc nomina occurrunt. Eliphoboscœon, Phagnon, Phacon, Ciofnis, Ciofnire, & Beceon, quod nomen apud Apuleium quoque legimus. Græcè autem sonant hæc voces ἐλαφίσκος, σφάκων, σφάκων, σφάκων, σφάκων, & σφάκων. Et Galeus in confectionibus dolorem sedantibus, quæ tabescentibus & sanguinem reiciantibus sunt commodæ, βερβηρινὴν meminit, & βερβηρινὴν simpliciter, quam herbam Cornarius *Saluam* conuertit, & βερβηρινὴν pro βερβηρινὴν substituendum censet, ut sit βερβηρινὴν vna aliqua appellatio ἐλελίζον, quam nos *Saluam* dicimus. Et Plin. altera Bechii speciem *Salmiam* appellari testatur. Omnibus his appellationibus Apuleius cap. 101. Ciffon addit. Sed & Cor^{saluam} quibudam dici refert Dod. gall. Tragus verò monnet Latinos Tussilaginem *Saluam* appellare. Apuleius, inquit, c. 101. vocat suam Tussilaginem & Bechion *Saluam*: ubi igitur in Apuleio scribitur Tussilago aut Bechion, intelligenda *Salua*.

Potè, *Salua* hæc latifolia, siue maior dicitur Germ. *groffe* aut, breuiter *Salbey* / Edel *Salbey*: Belg. *Groue* siue *groote Saue*. Gallicè *Sauge grande*. It. *Salua maggiore*. Angl. *Great Sage*. Hæc subinde locis asperis & ruderatis in Germania reperiri refert Dodonæus. Camerarius testatur eam in Gasconia, Gallia Narbonensi & Pedemontio in vineis luxuriare: in hortos verò translatam pulchriorem euadere. Monspelii & Lugduni floret Maio: seriùs in Germania, Iunio scilicet Iulio, vel etiam Augusto. Martio verò, ut & aliæ *Saluæ*, commodè transfertur ac plantatur.

Salua nigra vel rubra.

Ex genere *Saluæ* maioris est, foliis magnis, sed plerisque ex atro rubentibus, potissimum antequam caulescat, vel florescat, alioqui florida folio parum differt à maiore vulgari.

Est Dod. gall. *Saluæ* maioris tertia species, dicta rubra, gall. *Sauge rouge*. Lat. in fol. *Saluæ* maioris species alia, foliorum pediculis ac nervis, tum & recens enatis foliolis rubentibus. C. Bauh. Phyt. *Salua* 2. siue nigra. An Clus. *Salua* folio purpurecente.

Nusquam hanc vidi nisi in Castello Beuuge, vnde transfuit in hortum Ill. E. C. florentem Iunio.

Salua albis foliis:

Ex genere *Saluæ* maioris & hæc est, quæ folia Descriptiū quadam tota, quadam verò media ex parte candore niueo prædita habet. Hæc vocat Dodon. Synonyma gall. *Saluæ* maioris alteram speciem, *Saluam* albam dictam, gall. *Sauge blanche*. Lat. in fol. *Saluæ* maiori speciem nonnullis foliis vel totis, vel partim albidis: C. Bauh. Phyt. *Saluæ* maioris speciem foliis albidis. An Clus. *Saluam* latifoliam versicolore, quam in Austria flore albo obseruauit?


Saluam huiusmodi Luteriâ misit Robinus hortulanus regius: itenque Cargillus Londinorum cum hac inscriptione, *Salua versicolor ex albo viridi & rubro*.

Salua ferrata crispa.



Idem Cargillus Scotus Medicinæ Doctor huius *Saluæ* misit duo folia, ad tactam *laui*, tenuia, breuia, latera, ferrata, nonnihil hirsutæ albicantia, *Saluæ* saporem habentia, collecta Londini in Lobelii orto. Horum inscriptio erat hæc: *Salua ferrata & crispa folio latiore*. Ceterum an Clusio *Salua* latifolia folio crispato?

Salua minor auriculata



Minorem *Saluam*, quæ minorâ capiat infusus incrementa dixerunt: frutescit ea tamen, contractior interim maiore, quadratis stolonibus & hirsutâ canitie lanuginosis: folia aduersa Maiori magnitudine cedunt, odore vehementiore, saporeque vegetiore vincunt, magis candicantia, quibus ad imum pinnule duæ appositæ, aliquando vna, est ubi nulla: spicatos cæruleos flores ex Maiore promptum est discernere.

H. Lugd. pag. 880. hanc pingit Sphaceli veri Theophrasti titulo. Sed & Matth. [qui *Saluam*

Synon:

minorem inscribit, vt & Tabern. itemque Dod. gall. qui primam cognominat, & Lat. qui secundam] ac Lobel. Sphacellum esse asserunt. Hic in Aduers. Saluiam minorem pinnatam vocat. Clus. Saluiam angustifoliam. C. Bauh. phyt. Saluiam 4. (2 apud Matth.) siue minorem, & Saluiam nobilem Brunfelsii in 4. p. 280. Hanc autem aliquando pinnatam esse, & aliquando non, vnâ figurâ expressit Tabernamontanus. Foliis verò nonnunquam eam reperiri Lauendulae concoloribus, sed latioribus & grauioris odoris; rarius etiam luteolis variare, & flore albo esse monuit C. Bauhinus.

linguarum nomina.

Germanicè dicitur *Spiz Salbey* / *Creutz Salbey* / Klein: Edel: & *Creutz Salbey*: Belg. *Cruys Sante*, & *Orens Sante*: Gall. *Sauge fraiche*, *Sauge menue*: Ital. *Salvia minore*: Angl. *litle Sage*.

Locus


Hæc Salvia est lignosior maiore, nec ita facile multiplicatur. Qualis pingitur à Fuchsio & Matthiolo Montepeli prouenit. Genevæ cum auriculis, quæ in in eo affinitatem habet cum gallifera Cretica. In Gallia & Italia quibusdam locis ita abundat potissimum in terra aspera, vt eâ calciant clibani, Matthiolo auctore. In campestribus Hispaniæ in Massiliensi agro spontanea occurrit, cum tamen in Germania non nisi culta in hortis habeatur.

Vires.

Nos minorem hanc Saluiam cum Trago maiori præferimus, à Lobelio dissentientes quidem, qui nullum in sapore discrimen esse ait, cum tamen eo sit magis amaro & aromatico ac acriori. De viribus in genere plura infra dicemus.

SALVIA TENUIFOLIA.

Descriptio



SALVIAM foliis minus spissis, angustioribus; itemque parvis auriculis donatâ, mihi verò Bisantii in horto Clariss. D. à Belle fontaine à S. Mauritio demonstratam, sic describit Clusius. Multos statim à radice profert ramulos, lignosos, ex fusco subrubentes, quos alternis bina semper ex aduerso ambiunt folia, longè angustiora, quàm in vilo Saluiaz genere, in ambitu nonnihil interdum crenata, seu crispâ: è quorum sinu alii pusilli ramuli prodeunt: medius *caulis* in spicam purpureorum *florum* definit, nullis intermixtis foliis: *radix* dura, lignosa, in ramos diuaticata. Quo tempore floruerit, & an semen retulerit, nihil Clusio à lac. Placæu, qui eius iconem viuus coloribus depictam ad ipsum misit, significatum fuit. Ramis aliorum Saluiaz generum instar, illam pangi posse, putat Clusius. Clusius porò, qui nascentem non conspexit, Saluiam Creticam angustifoliam appellauit. C. Bauh. phyt. Saluiam 6. siue tenuiore folio, Cameraarii Hispanicam & Tabern. Indicam.

Syn. m.

SALVIA GALLIFERA CRÉTICA.

TOTA denso villo obrita canescit, infernâ potissimum parte, tam *caules* lignosi quadrati, quàm *folia* partim auriculata, partim mutila, crassa, in mucronem obtusum desinentia: obseruauimus in iuvene planta ternas & quaternas pinnas: ad iuncturas pediculo fuscunciali gallæ insident rotundæ, pilulis Querneis, in folio nasci solitis.

Dodon. Lat. in fol. videtur non galliferam, sed tuberosam cognominare, itemque Matthiolum. Anguillara epist. 12. non tuberculum, sed fructum appellandum censet. Clusius eam Saluiæ Creticæ non pomiferæ titulo donauit. Lobel. in Adu. Saluiaz cocciferæ siue baccatæ Cretensis: l. c. Plant. p. 554. & H. Lugd. p. 381. vbi figura quæ non placet, Saluiaz bacciferæ Cretensis. Tabern. Saluiaz cum gallis. C. Bauh. phyt. Saluiaz 5. [3. apud Matth.] siue bacciferæ, à lo. Bauhino communicatæ. Creuit enim mihi Montbelgardi in horto Ill. E. C. Wirtembergicæ.

Foliorum & ramorum Saluiaz decoctum, inquit Dioscorides, potu vrinam ducit, menses & fetus extrahit, pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur, capillos denigrat. Vulneribus herba utilis est, sanguinemque compescit, tetra vlcera purgat. Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum, cum vino, si eo abluantur, sedat. Nescio quid humani Plinio acciderit, qui Eleliphacon Lentis syluestris genus fecit: Et rursus, alterum eius genus tale, quale omnino Diosc. describit. Verba eius supra adscriptimus. Est syluestris & Eleliphacos dicta, &c. Alterius generis folia cum ramis decoquantur. Menses ciet & vrinas, & pastinacæ marinæ ictus sanat. Torporem autem obducit percusso loco. Bibitur cum Absinthio ad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit, abundantes sistit decocto eius potu. Per se imposita herba, vulnenum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Et mox, quasi alia sit Veterum, & alia sui temporis Herbariorum Eleliphacos, subdit: Nostri qui nunc sunt herbarii Saluiam menthae simili appollitâ partus emortuos extrahunt item vermes aurium, vlcerumque. Ad muliebre profluium compescendum, & procurandum conceptum eius vsum commendat Aëtius: Holierius ad sanguinis sputum, quod minimè probamus, alii ad Lac augendum eâ vtuntur.

Cæterum, viroli & pestilens ea maximè censetur esse, quæ foliorum pinnas, veluti carbunculas præ se fert, estque toto habitu, nedum foliis, retorrida, emaciata, & languidula. Post hanc summè periculosam & noxiam, adhuc etiâ viridem & bene habituatam, esse conicit Ioh. Schvvab Feldkirchen's Rhætus, quæ cæmeteria incolit, quòd non rarè in iis, non tam frequentes quàm prægrandes & virosos bufones offendit, vt loco cadauerum corruptioni dicato & generationi bufonum, serpentum, omnique generis vermium, insectorumque obnoxio. Est siquidem vt Philosophorum norunt filii, corruptio, unius, alterius generatio.

In cuius etiam venit probationem notus ille duorum amantia lugubris casus qui ambo cum in horto essent labii leuiter afflicta Saluiâ subitò occubuerunt, vnde lo. Boccatio occasio hunc scribendi versum.

Cm

Cur moriatur homo cui Salvia crevis in horto? Idem Feldkirch. Rhetus Adagii haud inelegantis. nobis auctor fuit: Illo Salvia non temere esse vitendum, h.e. Viro incognito nec ante bene experto.

SALVIA ABSINTHIVM REDOLENS.

CAP. XCI.



Flore est satis magno verticillato, purpurascens: observandū an ab albo differat, vel solo colore ludat: *foliis* Salviae minoris pari, nunc pinato, nunc mutilo, Absinthii obolente, quem tamen odorem siccata vix referunt folia.

C. Bauhin. phyt. vocat Saluiam 3. siue odore Absinthii, flore rubente,

cum vulgari minore convenientem. An Camer. hort. Saluiam latifoliam alteram cum auriculis: Item Saluiam flore albo?

Sturgardie in horto Ill. E. C. itemque Montbelgardii vtramque flore rubente & albo observavimus: Adhuc Argentinae Iulio & Augusto in horto Frid. Meieri.

VERBASCUM SYLVESTRE SALVIFOLIUM
exoticum folio rotundiore.

CAP. XCII.



Hæc foliis rotundioribus, candidioribus, densioribusque, minus tamen lanugine canis, sed Salviae æmulâ confectione: alioqui lignosa, fibrataque radice, caule & facie non ita dissimilis: iidem gaudet Syriæ nataliis, quibus Verbascum Lychnites Syriacū: flores descriproi Lobelio

videre non contigit, quia ut refert, iam marcidierant.

Is in Obs. p. 302. Verbascum sylvestre Saluifolium exoticum intulit: itemque in Icon. Plant.

H. Lugd. p. 302. Verbascum silu. exoticum Lob. C. Bauh. phyt. Verbascum 4. siue exoticum subrotundo folio Salviae.

VERBASCUM SYLVESTRE MONSPELIENSE, flore luteo hiantes.

CAP. XCIII.



Acco siluestri Matthioli diuersum est Monspelienſe, quippe cuius *folia* duplō aut triplō angustiora, lanuginosa, & incana, potissimum parte inferiore, superius enim colorem Salviae referunt: *caules* quadrati, villosi, in ramos ducti, in quibus ex interuallis breuib. longā

Defetip:

serie verticillati calices, pinnatis cristis insignes, flores proferunt luteos, galeatos, Verbasci siluestris Matthioli, quibus bina subiecta folia calices omnes vndique fere complexa, latiuscula.

An Matthiol. in Hist. germ. plantam nostram intelligit per Verbascum siluestre minus, cuius in descriptione obiter meminisse

Lobel. in Aduers. appellat Verbascum silu. Saluenuifolium Narbonensium: In Obs. pag. 301. Phlomon Lychnitidem inscribit. Sed huius inscriptionis effigies reducenda ad præcedentem titulum, Verbascum siluestre foliis Salviae tenuifoliae: & contra huius inscriptionis imago, ad sequentem titulum, Phlomi Lychnitidis: transpositæ enim sunt figuræ: In Ic. Plant. Verbascum hoc, vero titulo expressit p. 358. Verbasc. silu. foliis Salviae tenuifoliae, Narbonensē, Hispanicum, Illyricum aut Syriacum. Dixerat enim in Obs. plantam esse non modò Narbonensem, sed Hispaniæ, Syriæ & Illyriæ indigenam: quæsieratque etiā in Adu. an Phlomos Lychnitis Dioscoridis: ac paulò post Saluiam siluestrem plebi dici, Dioscoridisque Phlomon Lychnitidem videri.

Sic licet non ignarus Clusius, alias stirpes pro Phlomide Lychnitide à variis rei herbariæ scriptoribus proponi: nullam tamen ad Dioscoridis descriptionem propius accedere iudicavit, quantum à nobis proponitur, & ab illo Phlomidis Lychnitidis titulo pulchrè pingitur, & à quibusdam Squarilis appellatur: à Monspelianis Verbascum siluestre: Castellanis *Candilera*: Granatensibus *Menchera*, eadem propè ratione, quia sc. eius folia, non modò sicca, sed etiam recentia oleo impolita, ellychnii vicem supplere possint, si accendantur, quod etiam Dioscoridis Lychnitidis & Thryallidi tribuit.

Non benè tres figuras eiusdem plantæ, quasi diuersarum proponit Hist. Lugdunensis: Verbascum silu. Dodonæi, p. 301. Phlomidem Lychni-

Synonymia
Lob. lapsum.H. Lugd.
repreh.

ridem Penz p. 1303. Item Phlomidem Lychniti-
dem Clusij.

C. Bauh. phyt. vocat Verbasum 2. siue angu-
stæ Saluæ foliis, dubitatque an sit Verbas. silu.
foliis Saluæ Dioscoridis? Anagathi aliquibus
dici refert.

Locus &
Tempus.

Ad miliare quâ itur Monspelio Frontignan
inter saxa vidi florentem Vere. Frater C. Bauh.
annotauit florere Maio & Iunio, ac dici Verbas-
cum Saluifolium, & Saluam spicatum in His-
pania. Sara à Gesnero Tiguri prouenit, & in va-
se Hyeme domi viruit: sed iniuria quadam pos-
tea ante florem peritit. Exit collibus, sicciori-
busque & petrosis locis, per vniuersam Hispa-
niam & Lusitaniam: obseruauerat & antea Clu-
sius in Narbonensi Gallia. Semen subrum Ver-
basco syluestri Matthioli ferè simile in vasculis
Iulio profert.

Aequiuoca
Saluæ a-
grestis.

Saluæ agrestis nomine donantur sequentes
plantæ: Scorodotis, Gallitrichum satium. Gal-
lit. siluestre. Mentha Sarracen. Stachys. Sta-
chys Fuchsi. Stachys Matthioli. Cistus femi-
na. Tusilago. Ruta muraria. Saluæ syluestris
Tragi adulterina Lobelio quid?

HORMINVM EX VETERVM sententia, & in genere.

C A P. XCIV.

FRUGUM generi adnumerat aliquot locis, de
de plant. Histor. Theophrastus Horminum,
quod Gaza Geminalem vocat.

Theoph.
Geminalis.

Dioscorides Horminum in genus satium & sil-
uestre parit. *Satium*, inquit, herba est Mar-
rubio similis: caule quadrangulo, semicubitali;
circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt,
ad radicem nutantes; in quibus semen diuersum
includitur: nam in syluestri rotundum, fuscumque
inuenitur: in altero oblongum & nigrum, cuius
& vsus est ad venerem stimulam cum vino
poti. Purgandi autem cum melle oculorum al-
bugines, eorumque vlcera, argemata Græcis vo-
cata. Ex aqua emplastri modo impositi tumores
discutiendi, & furculos extrahendi. Quin &
& herbæ ipsius eodem modo impositæ eadem
præstandi. *Siluestre* autem efficaciores habet vi-
res: eamque ob causam vnguentis miscetur, mu-
steoque præsertim, Glucino vocato.

Vfus.

Plinius Hormini meminit & Horminii: per
Horminium, Cæsalpino auctore, intelligens Af-
paragum siluestrem: verumque nomen inditum
quia venerem stimulat. De Hormino, inquit
lib. 22. cap. ultimo, semine ut diximus Cymio si-
mile est, & in reliquis Porro [malè. Scribendum
erat Martubio] dodrantali altitudine. Duorum
generum, alteri semen nigrum, & oblongum. Hoc
ad venerem stimulam, & ad oculorum ar-
gema, & albugines: alteri candidius semen, &
rotundius. Vtroque tuso extrahuntur aculei ex
corpore, per se illto ex aqua. Folia ex aceto
imposita, panos per se, vel cum melle discutiunt:
item furunculos prius quàm capia faciant, om-
nesque acrimonas. Libro 13. cap. 10. Theopha-
stum sequutus inter fruges numerat post Erysimū
& Sesamum. Quanquam ambigat inter fruges
& medicamenta. Eiusdem nature (cum Erysi-
mo) & Horminum, à Græcis dictum, Cumino
simile: feritur cum Sesama & Irione inter æsti-
ua: nullum animal vescitur virentibus.

Galenus quoque inter fruges numerat lib. 2.
lim. Hormino, inquit, videntur, torrentes, ut fa-
rina fiat. Anmifcent ipsi etiam mel. Habet au-
tem in se alimentum, naruram mediam habens,
inter Erysimū & Cuminum, tenuium est par-
tium, attrahendi detergendiq; potentiam habes.

Plinius Hormini o folia Porri tradidisse, Græ-
corum nominum vicinitate deceptum, testatur
Matthiolus. Qui & aliud Hormini genus esse
falso credidit, à Theoph. Galeno, & Plinio inter
fruges annumeratum. Hormini, inquit, de quo
hic nobis sermo, meminisse Galenum in libris
simpl. med. non reperi, quamuis eius mentio-
nem fecerit Paulus, qui tamen illa tantū re-
fert, quæ à Dioscoride mutuatus est. Hæc ille. Et
verum quidem est, teste Cornario, Plinium ex-
tasse, *med. ca* pro *agris* legentē, & Porro pro Pra-
sio, i. e. Marubio, conuertentem. Sed maior est
error eius & aliorum, qui tamen de diuersis pro-
dunt, alterum Horminum cereale facientes: &
alterum herbarum genus: quum Theophrastus,
Plinius, Galenus, & omnes veteres, vnum Hor-
minum nouerint, de vno omnes prodiderint,
quod tamen tum siluestre, tum satium sit: & hoc
etiam inter alimenta retulerint. Et hinc, Dios-
corides, inquit Marantha, Horminum satium
& siluestre depingit: in nulla re, quantum ad
formam attinet, libi inuicem dissentire per hoc
nobis significans: sed in se, in solū a d f ren-
tiam ponit: siquidem in siluestri rotundum, fus-
cumque; in altero nigrum & oblongum inueni-
ri tradit. Iam quis non admittet eos, qui duas
plantas, floribus foliis magnitudine, caulibusque
inter se multum distantes, pro duobus Hormini
speciebus depingit, cum Diosc. nullam, nisi in se-
minibus, ponat discrepantiam.

Cæterum, quod Matthiolus Hormini Gale-
num in simplicium Pharmacorum numero me-
minisse cum Cornario & aliis quibusdam negat,
id cum doctioribus, vt Guilandino, Phorbion
esse iam olim Gesnero notante, didicisse poterat.
Si dubitat Paulum adeat, vtroque sub nomine
eadem verba referentem.


Quia porro non desunt, qui Gallitrichum
Horminum Dioscoridis esse contendunt, fore
non abs re fuerit, de vtraque sic differentem
Turnerum addire. Dicit, inquit, in ea hæc opinio-
ne in qua etiam est Ruellius cum aliis vltis,
Horminum esse Gallitrichum, Barbaris Sclarea
dictum. Sed accuratius perpenſa Dioscoridis
descriptione Hormini, deprehendi cum Sclarea
non conuenire, nuper etiam comperi eiusdem
esse sententiæ Matthiolum. Itaque aliud hormi-
num exhibet (hæc nos duplex agnoscimus, i. e. co-
mā purpureo-violaceā, & alterum comā rubrā,
de quibus mox agemus): sed, pace eius sit dictum,
nimis ierunè descriptum. Sed præstet vtraque
plantam ad descriptionem Dioscoridis expende-
re. Sclarea in multis videtur à descriptione
discrepare, atque etiam in vno etiam hormi-
num Matthioli: folia Sclarea multum differunt
magnitudine, nonnihil etiam formā, à foliis
Marubii. Caulem habet duos cubitos altum; at
hormini caulis cubitum semis altus est: quæ in
caule Sclarea apparent, sursum spectant, in Hor-
mino deorsum. Quare Sclarea nostra hormini
descriptioni non responderet. Dioscorides in
suo Hormino vnius tantum caulis meminit: at
horminum Matthioli, vt minimum septem habet
caules: quare cum Diosc. nō oleat tales insignes
notas prætermittere, verissimile est, si tor caules
haberet

haberet Horminum, non fuisse silentio præteritum &c.

Gallitricha tandem quibus Hormini nomen adscribitur hæc sunt: gallitrichum fatium. Gallitrichum. exoticum. Gallitrich. silu. vulgo. Gallitrich. silu. flore maiore albo. Gallitrich. glabrum folio Saluæ. Gallitrich. silu. versicolore folio. Gall. silu. comâ virecente. Gallitrich. folio rotundiore. Gallitrich. tenuifol. Gallitrich. fl. minore. Gallitrich. fl. minimo. Gallitrichis affine Maru. Gallitricho affine Horminum. Galiohis species lutea. Asparagus silu. Corrua.

Quæ sint illa Hormina campestris, quæ Tragoponicas siluestres dicit, inquirant lectores. Hormino deficiente, vt & hoc obiter moneamus, substituitur auctore Fuchsio de compos. med. in antiballom. semen Lini.

HORMINVM COMA PVRPVREO-violacea.



Multâ habet Horminum cum Salvia similitudinem: caules subrubentes, multis alis còcaui, quadrati, copiosâ lanugine hirsuti, pedales & maiores: ad quorû genicula folia Saluæ bina aduersa, non ita retortida & squalida, sed assatim hirsuta, odore nullo eccellente, sapore amaricâ-

te: at verò foliorum, quæ in extremis sunt ramulis, densior est phalanx, quorum summa purpuro-violacea faciem ad huius plantæ cognitionem viam monstrant: flores ex foliorum alis, Saluæ minores, partim purpurei & albicantes, ex caliculis verticillatis, Marrubio similibus, foliaceis, hirsutis & striatis, furtim vergentibus, dum flores gestant, deorsum nutantibus, semine onustis: radix lignosa & fibrosa. Herba est annua.

Matthiol. apud Dioscor. ex sola effigie Pisidis ipsum missa à Luca Ghino, iudicat suum Horminum, verum fatium repræsentare, omittens nouæ plantæ descriptionem, eique folia valdè rotunda appingens. Eandem Matthioli figuram proponit & Dod. in H. gall. foliis rotundis. In postremis nouam assumpsit iconem, foliis non ita rotundis. Considerandum igitur fuerit an huius duæ species. Olim ipse in horto publico Patavii Horminû foliis rotundis obseruauit, quale deinceps videre non memini: à me culta & ab eo tempore obseruata, non solum minùs multò rotundis erat foliis, sed etiam ramis longioribus. Icon Tabernamont. & alia Camerarii, multum quòque differunt. Placet præ cæteris, quæ apud Dod. & Lobelium.

Græci *ἡρμινον*, Latini, vt Matthiol. Anguill. Tom. III.

Lob. in Adusitèque Obs. pag. 300. & Icon. Plant. p. 555. Dod. Tab. & Camer. in Epir. Matthiol. Horminum vocant: Horm. Matthioli H. Lugdunen. pag. 964. Horm. fatium Camer. hort. Horm. fatium & hortense Camer. apud Matth. in Hist. germ. & Dod. gall. Satiuum i. Schvvenckf. i. lue fatium C. Bauh. phyt. Domesticum & fatium idem apud Matth. Geminalem nonnulli. Hormini pulchram speciem, & Crinum sine aspiratione nonnullorum, itèrque Pformian Galeni, Gesneri hortus. Germani *Garten scharlach* & *Römischen scharlach*; itèrque *welsch tag vnnid nacht*: Itali *Hormin.* Dicitur autem & Horminum, *ἀνὰ πύργον* impetu agi instinctûque ferri & cieri in venerem, quòd *ἄπὸ τῆς πυρρίδος παρρησίας*, vt loquitur Dioscorides, ad Venerem stimulet.

Locus.

Copiosè crescere dixit Camerarius in agro Senensi, sed copiosius in Apulia, Illyrica, & in Lesna insula, atque vniuersa Græcia. Nusquam nisi in hortis cultu herbariorum à me visum verum Horminum, Geneuæ, Lugduni & Basileæ, vbi in horto publico mense Februario virebat, cuius folia cum nascerentur, mense Martio, erant rotunda. Montbelgardi floruit Iunio & Iulio.

HORMINVM COMA RVBRA.



Similis est Hormino Descriptio
comâ purpuro-violacea, caulis suis quadrangulis, tripartitis, hirsutis: foliis prioribus ex longis pediculis, Saluæ accedentibus: itèrque per caules verticillis: At floribus differt minoribus, summitatibusque caulium rubris, ac odore nullo insigni.

Locus & Tempus.


Visa mihi prius hæc planta in horto cultiff. D. Friderici Meier Argentinæ, florens Iulio.

GALLITRICHVM SATIIVM. CAP. XCV.

Satium Gallitrichum ad cubitum alterum sexcrescit, & altius, caule quadrato, minimi ferè digiti crassitudine, rigido, hirsuto, medullâ albâ pleno, in oppositos ramos ex interuallis coniungatim fillo: quâ etiam serie & rami in alios minores deinceps abeunt: flores spicati ex multis compositi verticillis, Saluæ floribus perfimiles, cucullati, colore cæruleo in album vergente, ex striatis pyxidulis, tactu glutinosis, quaterna semina claudentibus lubrico læuote perpolita, alterâ facie gibbosa, alterâ angulosa, coloris rufescentis: folia ex aduerso bina sita, rugosa, Aethiopidis, minùs villosa, radix lignosa. Odor totius plantæ vehemens, sapor amarus.

Descriptio

Varia de
Gallitricho
opiniões.



Syn. in.

Gallitricum siue Sclarea H. Lugd. p. 966. quæ cum cunctis aliis cæcutit, qui semē huius nigrū esse cōtendunt. Galli centrum officinarum & Herbariorum vocatur à Cornario: Gallitrichon Tagault. l. 2. cap. 19. de Purg. Gallitrichum hortulanum à Constant. Platear. & multis ex Neotericis scriptoribus; Horminum fatiui in officinis & herbariis, notum à Corn. horm. fatiuium 2. & Salvia Turcica transmarina Ruellii à Sch. venckf. Horm. 3. siue Sclarea dictam à C. Bauh. phyt. Hormini Oldingeri, Sclarea vulgò dictæ, species fatiua à Gesn. hort. l. 1. fol. 111. Sclarea vulgò nuncupata à Clus. Panu. sine icone: ab eodem in Hist. post. horm. silu. cum icone. Orminum à Lonice. qui duas figuras habet: Orm. fatiuium à Fuchl. qui de co. ap. med. lib. 2. Tuder. Auicennæ vocat. Oc minor hortenſe, & Sclarea hortenſis, Gart. in Scharlach à Gesn. in cat. pl. Orminum fat. malè Gallitrichum appellatum à Cordero in Diosc. Sclarea à Matth. (qui etſi ſciat Dioscoridis horminum non eſſe, tamen horm. maius & odoratum cognominat) Anguill. Camer. in Epit. Alois. supra exam. Braſil. Turn. & Tabern. in Ic. & hist. Sclarea Matthioli à C. Bauh. apud eundem: Sclarea à Lob. in Adu. ac Obſ. p. 300. & Ic. Plant. p. 556. Oruala à Dod. lat. de flor. & in fol. (cui & Orualia dicitur) à Gesn. in cat. pl. Oruala, aut Tota bona olitorum, & Sclarea Italorum à Ruellio: Sideritis heraclea odorata hortenſis, à Fracast. de morb. contag. itemque herba S. Ioannis Alektorolophos à Gesn. in cat. pl. Bezomo à quibusdam, referente Trago: à Germ. Scharlach/ gemein Scharlach/ Gartē Scharlach & Scharlag: à Belg. Scharleye: ab Ital. sciarra: à Gallis Oruale & T. use b. nne: Ebrodunenſib. du l'Orne: ab Angl. clarye: ab Vngaris Zent Janos siue, h. e. S. Ioannis herba, vocatur.

Nomina.
lioguarum

S. Ioannis
herba.

Locus &
Tempus.

Vires &
Vfus.

Vinum.

Scratur in hortis & viridariis: translaturum recens, aut satum primo anno caulem non fert, & secundo à satione maturato semine, interit: Iunio ac Iulio florens: Basileæ & Genevæ adhuc Nouembri, & virens Ianuario: ceu etiam Patavii Lugduni & Montpelii, obseruauit. Ceterum, calida & sicca est temperaturæ, auctore Trago, & resoluendi, extenuandi, expellendique vim obtinet. Vinum Gallitricho imposito, si effuerit, & d. coctum fuerit, apprimè stomachi frigiditati conuenit, nam phlegmata incidit, & consumit: idem potum frigidis & infecundis ac albis mensibus laborantibus mulieribus subuenit. Sunt qui Gallitrichon capiti, ob odorem quem habet grauissimum, noxium esse dicunt, id quod facie concesserim, sed ita demum cum quis intemperantiùs hoc vini genere usus fuerit. Sed certe sulphurata illa vina longè magis nocent, quàm omnia alia ex quibuscunque herbis confecta. Id licet experientia testetur, nemo tamen non vinis sulphureis detestando suffitu infectis vitur, neque quisquam, quæ est humani iudicii prauitas, his deliciis carere vult. Gallitrichum in pulverem redactum, & naribus inditum, sternutamenta prouocat, catarrhum tollit & cerebrum purgat. In aqua decoctum in deflectionibus mulierum vtile ad trahendos menses, secundinas & alia id genus non aliter atque Dictamnium. Folia ex aceto imposita, panos per se, vel cum melle discutere dixit Matthiolus: item furunculos antequam acuminentur. Dodonæus calidam & siccam ordine tertio statuit, ac menses modo quouis sumptam m. uere, ac secundas euicere: Orualæ ac Hormini quauis specie, calore & viribus potentiorum esse: Scavvenckf. mederi epilepsie & suffocationi matricis. Crato inter alia sua iuramenta commendabat, in suffocationibus vteri & similibus effluuiis vnguentum ex Sclarea, cum butyro coctum, cui addicitur aliquid gummi exotici Takamæ, quod umbilico imponendum. Nunc testibus Ant. Mizaldo, Ambros. Paræo, Fab. Hildano, & aliis, semen Gallitrichi fatiui vtile traditur, ad excutiendam oculorum caliginem, & educenda corpuscula ea, quæ in illos inciderunt, ut sunt arena, testacea, legumina, & similes sordes: in oculum siquidem immixtum granum vnum (tria imponit Paræus) & multâ reuolutione circa bulbum eius circumductum, tandem humore prægnans, & sordidus onustum, non sine fructu, modò non adhareat vehementer membranis, elabitur, id quod experientiâ multoties comprobatur est, & non omni penitus ratione destituitur. Similis enim in oculo lubricitas id mucilaginosum reddit, & extranea illa ei adhaerere facit.

Fertur si semen in puluere sumatur, cum aliquo potu aut cibo, ad recuperandam memoriam mirabiliter conducere, teste Gratarolo. Semen, inquit Lobelius, capitis sue grauitatem inducit, odore, quem etiam vniuersa spirat planta, non tamen in grato: eoque magni usus quibusdâ Septentrionalium ad Zytis, Bieræque confectio-nem. Lupuli namque vel penuria, vel vegetioris potionis faciendæ causa, cortinis feruentibus addunt: sitque temerum, quo non multis depletis poculis temulenti sunt, hilaritate propemodum insanâ: in nonnullis tamen, miseratione quàm risu magis digna. Venerem stimulat.

GALLITRICVM EXOTICVM FLORE
magno albo.

CAP. XCVI.

Exotica planta Bifermas, nostram Sclaream fatiuiam totâ facie egregie refert, caulibus quadratis, pilosis, nonnulli tactu asperis, in frequentes alas aduerso situ coniugatis positis diuisis: folia Sclareæ nostratis, infra priora parua, oblonga, sequuntur deinde ampliora, rugosa & hirsuta, odore suauis Ocymi, potius Sclareæ.

su Sclareæ; qualis etiam est situs



florum in spicis longiusculis per intervalla verticillatorum, quibus bina seper subiecta similiter folia acuminata & cœcaua, coitu labrum efficiunt: cæterum flores ex lœgis, striatis, lanuginosis calycibus emicant suaeuolœtes, Sclareæ, sed colore lacteo, labello punctulis paucis intortum guttato, prominentibus sub galea staminibus incuruis, vno coccineo re-

liquis duobus argenteis, ochreos sustinentibus: semen simile Gallitricico satiuo, sed paulo maius, vna parte gibbosum, alterâ ferè triangulare, coloris varii, ex nigricantibus & rubentibus maculis oblongis.

Bifermas Hormino nostro vulgari, vel Sclareæ dictæ congener facit Camerarius hort. Horminumque Syriacum vocandum censuit, eò quod ex Syria per D. Bernh. Paludanum primò dclatū sit. Et hinc C. Bauhin. apud Matth. & in phyt. Horminum Syriacum quoque denominauit, & 2. Horminum fecit.

Camer. autem nomine Bifermas semen communicauit, quod satum Montbelgardi in orto Ill. E. C. feliciter prouenit, & Iulio, Augusto & Septembri floruit. Idem aliquando mihi iuuenem plantâ Sturgardiæ in orto D. Gerardi Vicecancellarii demonstrauit, & Aman syriacam cognominauit. Aman etiam nomine, sed Ægyptii nominati, semen dedit Zvinger. Ab Ægyptio habui Hormini Cretici titulo.

GALLITRICHYM SILVESTRE VVLGO,
siue silu. Sclarea, flore purpureo,
cæruleœue magno.

CAP. XCVII.

Hanc plantam videre est interdum cubitos futo, inani, in alas diuiso: *filia* quàm Hormino satiuo veriori maiora, squallida & veluti siderata, quædam nonnihil sinuata & serrata potissimum prima, quæ breuiora, ex longioribus pediculis, alia ad Saluix magis accedentia, odore graui, sapore aliquantulum aromatico: flores in longa spica gestat cæruleos & purpureos, magnos, Saluix florum formâ: semen nigrum: *radix* lignosa, odorata. Flores Scarleam redolere ait Lobelius: Icon est ex Clusianis.

Gallitrichum vulgò vocat Cæsalp. ac Alektorolophon Plinii credit, multòque Veronicam rectam putare scribit. Gallitrichum silu. Corn. & Lonic.

Centrum gallinæ aut Galli centrum appellat Tom. III.

Ruell. taxatque idem officinas; quod perperam Gallitricum appellant, aliqui verò etiam



Gallitrichi varietas.



Tabernamont. & quam posuerat Tab. pro Sclarea siluestri, dat Gerard. pro Colo Iouis. histor. Lugd. proponit quidam duas icones, pag. 965, non tamen diuersarum plantarum ait, Horminū silu. Matthiol. & Horm. silu. Fuchsi. Ad Hormini siluestris classē, Gallitrichum hoc silu. nostrū, cum nonnullis aliis stirpibus, de quibus post hoc scribendum erit, Clusius quoque referendum censet.

Lobel. in Aduers. p. 240. Obs. p. 300. Icon. Plant. p. 556. & hist. Belg. p. 617. pro suo Hormino silu. ponit figuram Clusii folio non laciniato, licet in Adu. dicat foliis aliquantulum laciniatis oris, Blatariæ similitudine. An Dodonæo Gallitrichum flore minore?

C. Bauhin. phyt. Horminum 6. siue siluestre alterum caule purpureo.

Et hi sunt, quod mihi quidem constat, qui Gallitrichum, Horminum siluestre pronuntiant. Sed horum sententiam minus probat Marth. in prior. com. qui tamen & ipse in post. com. hanc suam censuram omittit, ac Horminum siluestre vocat, fo-

II 2

Sed & Cord. in Dioscor. quoque credidit recentiores inexcusabili errore Callitrichon vocasse, ac idē

Orminum siluestre maie Gallitricum appellatum nominauit. Orminū silu. Lonic. Orminon silu. Gesner. in cat. Pl. Orminum alcerum silu. Fuchsi. Horm. silu. Camer. in Epit. & Hist. germ. Matthiol. flore cæruleo in orto: Hormin. silu. Matthioli & Lobelii Schvve. Horminum silu. maius flore cæruleo & rubicundo Thal. in narc. Horm. silu. à Patauinis pro Beronica usurpatum Anguill. Horm. silu. & Oculum Christi, Gerard. qui ponit iconē

Beronica

Oculus Christi, Gerard. not.

- ho Sclarez ferè simili: caule sesquipedali, aspero, quadrangulo, leuiter hirsuto, iternatoque: flore Saluiz, colore purpurascens: siliquis pluribus, in humum reflexis, semine rotundo, fusco colore, Gallitricho passim vocato, haud longè ab simili prægnantibus. Icon autem eius proponit Gallitrichum siluestre folio non laciniato flore maiore. Longè denique aberrare vult eos, qui pro siluestri Saluiz, agrestem Sclaream vsurpant. Sclaream statuit esse Sideritim Heracleam præter sem Fracastorius. Et hoc quidem contra Ruellium negantem & volentem esse Horminum. Sclaream siluestrem dixit quoque Marcell. Ficinus, Cæsalp. & Tabern. qui & Matri-Saluiz cognominavit: Sclaream silu. flore cæruleo Thal. Sclaream alteram siluestrem flore cæruleo Gesn. hort. Saluiz denique agrestem cum Brunfels. aut siluestrem cum Trago [qui etiam Gallitrichon agrestis, & Ambrosiam quorundam appellat,] qui inscripserit, habeo neminem.
- Icon.**
Matth.
- Error quorundam**
- Sideritis Heraclea Sclarea silu.**
- Nomina ling.** Græcè dicitur *σικερίτις* multis: Germanicè *Wilde Schaalad*; Fuchf. Gesn. *Wilde Salbey*. i. e. *Saluia siluestris*, Brunfels. & Trago: *Türckisch* aut *Römisch Salbey*, i. e. Turcia aut Romana *Saluia Schwenckf. Gall. Toute bonne sauage*, i. e. *Tota bona siluestris*: Ital. *Schiaria*, ni fallitur Anguillara, *Saluatica*, & *Hormino saluatico*: Angl. *wilde Clarie*.
- Tota bona**
- Locus** Secus itinera in agrorum limitibus, in collibus iuxta cultos agros litis, & capestribus prouenit, vel Trago testis. Fuchsius passim omnia prata exornare scribit, Ianio mense floribus & semine prægnans.
- Tempus.**
- Vires & Virtus.** Iners, & nullius facultatis esse videtur Dodonæo, Matthiolus tamen omnia ea præstare credit, quæ de domestico scripta perhibentur.

Gallitrichum siluestre flore maiore albo.

Descriptio **H**æc Gallitricho siluestri, flore purpureo, cæruleoque, magno, similis quidem est, sed floris colore variat, qui profus niueus est, folia etiam incana, non virentia, in reliquis conueniunt.

Synonyma Gesn. hort. dicitur Sclarea altera siluestris albo flore. Tabern. Icon. & Hist. Sclarea sylu. flore albo. Huius iconem proponit Gerard. pro Hormino siluestri. Thal. Horminum siluestre maius, flore nonnunquam candido, sed rariùs. Camer. hort. Horminum silu. flore albo. Clus. Pannon. p. 580. Horminum silu. quartum niueo flore: In Hist. post. Hormini silu. quartæ species altera. C. Bauh. phyt. Horm. 6. siue siluestre alterum, caule purpurascens, flore albo, foliisque incanis.

Locus & Tempus Et sic Camer. frequens in Sueviæ quibusdam pratis, absque vilo ferè flore per Ætatem, sed Hieme cæruleo, Lupuli odore, obseruauit. Clusius inuenit Maio mense in siccioribus pratis, Sopronio Pannoniæ vicinis, vnicam plantam, quam erutam Viennam deferebat, in D. Aicholzii hortum, vbi aliquot annis permansit, & deciduo semine multiplicata est, atque aliis communis facta. Ego reperi in pratis itinere l'Isle inter Longueville & Bauans: in Tigurina ditione prope Bârgensee florens Maio: Nos Montbelgardi non longè à molendino obseruauimus.

GALLITRICHVM GLABRVM, FOLIO

Saluiz, flore purpureo CAP. XCVIII.

Siluestri Gallitricho vulgari est persimile: *folia ex opposito ad caulium nodos nascuntur,*



dicti syluestris Gallitrichi: subiectis vnicuique verticillo, binis breuib; latiusculis foliis, nonnihil etiam cæruleis.

Icon ex planta sicca pictori delineanda fuit. Non placet autem ab eo hic adiuncta radix, & caulis racemosus ex imagine Clusii huc non pertinet.

Lobel. in Aduers. Verbas cum nigrum Saluifolium purpureo flore: vt & in Obseru. vbi illis addit, Matthioli. Clus. in Pannon. p. 581. vocat Horm. silu. quintum Saluiz folio, refertque p. 584. rhizotomas mulierculas Austriacas, *wild salbey*, h. e. Agrestem Saluiam appellare, vulgoque venalem proponere. In Hist. post. Hormini silu. quinti speciem priorem.

Vbiq; circa Viennam Austriæ nascitur, totaque Pannonia, secundum vias, in agrorum, vinearumque marginibus, integræ Ætate florens, & subinde semen proferens.

GALLITRICVM SYLV. COMA VIRESCENTE.

CAP. XCIX.



Quam Gallitrichum silu. flore magno maiori altitudine excrescit, caule quadrangulo vt reliquæ species, & foliis ad singula genicula ex aduerso nascentibus: sed eius extrema pars non purpurascit, verum virefcens est: flores tamen si formæ similes, dilutioris sunt coloris: folia inferiora maiores habent incisuras, vt nonnihil laciniata

ma laciniata videantur, reliquæ notæ conveniunt.

Clus. descriptionis author in Pannon. p. 180. appellavit Hormini filu. quarti alteram speciem, & Horminum filu. 4. diluore flore: In n. post. Hormini filu. 4. speciem tertiam.

C. Bauhin. phyt. norm. 7. sine sylvestre 3. caule virenti: norm. filu. 4. Clusii, sine icone. Ego in hist. post. Clusii iconem sub titulo Hormini filu. quarti specie prima exhibitam huius esse speciei puto, & per Typographum transpositam.

Passim in silvis cæduis, montanis pratis, vîrûnque marginibus spontè nascitur cum prima [Gallitricho filu. flore magno] non modò in Pannoniis & Austria: sed in Bohemia, Moravia, tota Germania, & aliis plerisque provinciis, florens Maio, interdum etiam Iunio.

GALLITRICHVM FOLIO ROTVNDIO-
re flore magno violaceo.

CAP. C.



nè longa, ovalem formam non malè representantia, quædam etiam rotundiora, in circuitu serrata, Betonicæ modo, glabra: caules quadranguli: flores magni, violacei, hiantes: calyces deorsum nutantes, verticillati.

In montium Tyrolensium pratis altis expandere folia indicabat D. Agerius.

GALLITRICHVM FLORE MINORE
purpurascens & rubro.

CAP. CII.

Viuaci radice multos perdurat annos, sylvestri Gallitricho affinis planta, odorata, facie non ita dissimili, caule, foliis, crescendique modo: at flores ita parvi, ut vix extra calycem promineant, purpurascens, nonnihil hiantes, cum in vulgari flores magni sint, galicæque magnâ prominentes apices multos condant: calices deorsum nonnihil reflectuntur, breviores quàm Hormini verioris. Idem Gallitrichum floribus purpureis minoribus: foliis profundè satis laciniatis, diuisis, nonnihil hirsutis.

An Dod. H. flor. & lat. in fol. Oruala secunda: An Lobelio in Aduers. Verbasum purpureum Erucæ folium?

Basileæ in horto D. Felicis Plateri florebat

Loeus &
Tempus.



GALLITRICHVM FLORE MINI-
mo albo.

CAP. CII.



Pura humi spargit folia, longo pediculo donata, crassifolia & rigidifolia, Betonicæ æmula, sed ad pediculum nullo sinu prædita, obtusa, crenata, pilis albis per venas oblita, inodora. Caules modò singulares, aliàs plures, quadrangulares, hirsuti ex longo intervallo in ramulos oppositos diuisi: ad quorum exortum folia quoque bina opposita longo pediculo nascuntur infernis planè similia. Flores verticillatim digesti per intervalla summitates occupant, odorati, exigui, & vix ex calycibus prominentes, albi. Quorum verticilla singula sustinent foliola parua, in acutissimum apicem terminantia: radix oblonga, exiguis fibris donata, nullo gustu notabili prædita.

An Horminum minus Supinum Creticum Clusii:
Ex femine à genero Cherlero ex Italia allato in horto Ill. E. C. satum Vere, floruit Iunio, & deciduo femine se propagavit. Perit ubi caules protulit.

GALLITRICHIS AFFINE MARV. SI NON
genus aliquod, Sclarea Hispanica Tab.

CAP. CIII.

Anno 1595. Iulii principio demonstravit D. Höchsterer Pfortzhemias in hort. D. Soceri

herbam nomine Maru celebrem, foliis spissis, sine manifesto sapore. Incipiebat autem tunc floridam comam deprimere. Clusius, cuius iconi, quā proponimus, folia optimē respondeat, sic describit. Hormini silu. quarti quinta species, hispanico semine Viennæ Austriæ nata, illi [Gallitricho flore paruo rubro] non valdē dissimilis: etenim caules habet non minūs altos, quadrangulos, nodis cinctos, villis quibusdam obritos, & folia in singulis nodis ferē similia, paulō tamen duriora, læmiora, angustiora, angulosa quodammodō, mucrone magis obtuso, & laxioribus dentibus prædita, præsertim quæ secundum radicem nascuntur: è cauliculis, in extremo caule summisque ramis verticillatim nascentibus, & veluti in spicam desinentibus, emergunt flores reliquis speciebus longē minores, Lauendulæ florum ferē æmuli, nec colore ab illis valdē differentes: quibus decidentibus succedit semen nigrum: radicem habet superioribus similem: & tota planta simili cum reliquis odore prædita.

Synonyma Vocat Clusius in Pannon. p. 580. Horminum silv. 4. Lauendulæ flore: p. 582. Hormini 2. speciem tertiam: p. 584. Horminum semine ex hispaniis Baccharis nomine misso natum. In Hist. post. hormini silu. 4. quintam speciem.

Sclarea Hispanica Tabern. Tabernomonte in Sclarea Hispanica, Sclarea Romanæ similis, paucioribus ramis, caulibus quadrangulis, foliis magis glabris, & magis acutis, firmioribus, floribus Lauendulæ quodammodō similibus; Maru nostro foliorum firmitate respondet, licet icon nonnihil diuersa videatur.

C. Bauh. phyt. vocat Horminum 8. siue silu. quartum Lauendulæ flore: Clusii Hormini 2. speciem tertiam (in Pannon. sc.) siue iconē. Sed cur C. Bauh. dicat esse siue iconē, me latet: est enim p. 582. vt iam annotatum.


C. P. nat. Nasceitur spontē in Anglia satis frequens ad regie arcis Grenviciū hippodromum Septembris initio cum florens, tum semine onusta. hispanico semine Clusio Viennæ Austriæ nata, florebat Iunio.

GALLITRICHIO AFFINIS PLANTA,

Horminum silu. latifolium Clusio.

CAP. CIV.

Descriptio



desinentia, rugosa, & ad pediculi vncialis, vel sc-

EX radice pollicari, plurimis fibris longiusculis donata, ex qua plura capita, caules edic prociduos, quadratos, copiosā medullā albā fardos, insigniter hirtutos: cuiusmodi etiam sunt folia, quæ ex caulium geniculis bina ex aduerso oriuntur Marrubii, subrotunda, in mucronem exiguum mox

quincialis commissuram falcata: inferiorum ceterum foliorum pediculi multo etiam longiores: Ad foliorum verò exortum auriculæ quædam velut fœturæ adnascuntur, modō vnicæ, modō duæ: flores in caulis fastigio sæpè rubentes & in paucis breuibuscque alis similiter rubentibus verticillatim sine villo foliorum interiectu, breuibuscque intervalis dispositi spicam deformant, perquā numerosi, Lamii parui, carulopurpurei, galericula exigua apicem album occultente, labello in binas lacinas diuiso, è calyculis oblongis, subrabentibus, hirsutis, striatis prominuli, pediculis atropurpureis hirtis: decidentibus flosculis in calycibus sunt semina quatuor oblonga subrotunda. Sapor plantæ nullus notabilis.

Clus. in Pannon. p. 577. & p. 578. Horminum silu. 1. siue latifolium alterum vocat: in Hist. post. Horm. silu. tertium: Horm. Sclæræ foliis minüs incanis & odore minüs graui, floribus purpureis, Lauendulæ vix maioribus. C. Bauh. phyt. Horminum 5. siue silu. latifolium. Schvvenck. Horm. siluest. 2. m. uale Sclæræ, vider matver Sclæræ. An Camer. hort. Horm. silu. feruē abique vilo p. Ætatem: flore sed in hieme paruo cæruleo, Lupuli odore, simile secundo, quod Clus. in Pannon. depinxit.

Prouenit mihi Montbelgardi in horto Ill. E. C. florens Iunio Iulio & Augusto: hiemem pertulit, & semine se propagauit: multis etiam annis durauit. Inuenitur, inquit Clusius, passim Viennensi agro iuxta vias, in montanis pratis circa Mariæ cellam, & S. Crucis Abbatiam, supra Badentes thermas, & plerique Alpistribus Austriæ atque Stiriz locis:

GALIOPSIS SPECIES LVTEA, VISCIDA,

odorata, nemorensis.

CAP. CV.



INSIGNITER fibrosa radice nititur, multos inde caules surrigens bicubitales, & altiores, quadratos, hirtulos, fungosā medullā fardos, in alas brachiatos: folia è geniculis exeunt opposita, longis pediculis hirsutis appensa, Ari modo alata, sed Lamiarum instar rugosa & hirsuta, cæsi multo maiora, in ambitu serrata, nonnulla interdum per margines aspersa saturā rubedine: flores in longis spicis verticillatim ramos ambiunt: foris hirsuti, intus glabri, labello tripartito, mediā laciniā substriatā & crispā, colore foris ex albo luteo, intus obsoletois notis maculoso: superius verò folium, seu galea, foris guttatum, intus luteum: è rictu medio prodeunt stammina alba: insident autem flores calycibus oblongis striatis, viscidis: in quibus succrescit postea semen: tota planta tactu viscida est, odorata, sapore nullo insigni.

Variis

Varia hæc adepta est appellationes. Nos quidem, quia apud Dodonæum de Florib. à Dalechampsio propria manu legimus annotatum, esse galiopsis luteam, viscidam cognominavimus, & maxime ut amphibologiam vitaremus; alia liquidè est præter hanc galiopsis lutea nuncupata. Propter viscositatem verò quidam Pulicariam nominarunt. Dod. de Flor. & H. lat. in fol. Orulam tertiam, Horminiam luteam, & Horm. Tridentinum à plerisque appellatum. Lobel. in Adu. Colum. lous folio Vrticæ, aut Hormini, Galiopsin recentiorum. In K. Plant. pag. 557. & Obf. p. 301. Colum. lous, Horminum silu. pingue quorundam. Clus. in Pannon. p. 576. Horminū silu. 3. In Hist. post. secundum. Cæsalpin. Melinum vulgò, aliis Meligo. Gessn. lib. 3. epist. ad Zyving. Orminum luteum, Herbam pinguem flore luteo, Italorum quorundam Cerinthen, & Germanorum Flöfraut h. e. Pulicariam, quod foliis per cubicula sparsis, cum pinguis & viscosa sint, pulices adhareant, & facile simul euerantur.

An huc sit referenda Salvia alpina Tabern. inc. latet: descriptioni ieiunæ, in qua ei tribuit flores purpureos pauca fides tribuenda. Gerard. ponit pro Colo. lous iconem Sclæræ silu. Tab. quæ non respondet Colo. lous.

C. Bauh. phyt. Horminum 4. siue luteum glutinosum, Staph. Plinii quibusdam. Item Salvia 8. siue Salvia alpina Tabern. ex Lonicero: Hormini species. In animad. in H. Lugd. Galiopsis lutea Dalechampsii p. 1246. dicitur esse Lamium luteum: ego verò suspitor esse Colum. lous, inquit C. Bauhin. Hist. Lugd. Colus. lous Lobelii: Galiopsis lutea Dalechampsii: Phlomis Lychnitis altera Syriaca Lobelii.

Montspeliæ circa montem Esperon reperi florentem mense Octobri: in Rhœtia non longè à balneo Fidis Iunio: prope wallensiat Julio: in montibus prope Basileam Octobri: Genœ germina protrudentem principio Aprilis in colle La. batie. Per vniuersam Pannoniam ad radices montium obuiam dicit Clusius: in hortis apud Belgas teri Dodonæus. Scaturigines, vñque silvarum margines Gallie, Germaniæ & Italiæ amare Lobelius.

Facultates eius nondum à quoquam exploratæ sunt, præterquam quod Gesnerus eam calefacere, emollire ac discutere crediderit.

ÆTHIOPIS VETERIBUS ET IN GENERE. CAP. CVI.

Æthiopsis, auctore Dioscoride, folia habet Verbalco similia, sed valde hirsuta, & densa, in orbem circa radices innum: caulem quadrangulum, crassum & scabrum, similem Apiastro aut Arctio, multis alis concavum: Semen Erui magnitudine geminum in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite multas, longas, crassas, gustu glutinosas. Quæ siccæ nigre ac duræ sunt, coriubus similes. Plurima nascitur in Messenia ac Ida. Radix cocta ac pota ischiadicis, pleuriticis, sanguinis spuro, arteriæ asperitati auxiliatur, sumitur etiam cum melle in eclegmate.

Eadem prorsus Plinius habet, ut ex Dioscoride transcripsisse videatur. Galenus in simpliciū censu Æthiopidem præterit. Quæ Paulus de ipsa recultat, ex Dioscoride transcripit. Quin &

Ruellius recenset, quæ Diosc. & Plinius scripserunt.

Æthiopidi porro herbæ nomen dedêre magicæ vanitates; teste Plinio, quod sc. amnes ac stagna sicari huius coniectu, tactu clausa omnia aperiri, somnariit Asclepiades. Somnariit, inquã, nam si vera sunt, ut Plinii verbis utar, nonne satius fuisset Aemilianum Scipionem Carthaginis portas herbâ patefacere, quàm machinis claustra per tot annos quater? Siccentur hodie Æthiopide [Meroide] Pontinæ paludes, tantum agri luburbanæ reddatur Italiæ. Verisimilius itaque erit Latinos Græcum Æthiopidis nomen seruisse, ab Æthiopia sc. regione, in qua nasci gloriabatur: Vel quod fuliginosa & veluti cinere aspersa sit: *ἀπὸ* enim fuligo est, siue fauilla adusta.

Cæterum, Æthiopidem quamvis ignotam dixerit Cornarius, non desunt tamen, ut Matth. Anguill. Dodon. Lobel. Amato. Cæsalp. Castor, Schvvenckf. C. Bauhin. & alii, qui eam agnouisse videntur.

Hesperin, Violam albam, Persicam hermolai, si radicem haberet nigram, & instar cornu duram, facile dixerit Æthiopida Tragus.

Eorum opinionis esse non vult Anguillara, qui in insula Candix gallicum satium Æthiopidem vocant.

ÆTHIOPIS MVLTIS. CAP. CVII.



Folia per terram primò spargit palmo latiora; haud multò longiora, tenera lanugine ceu carptâ suprâ infraque vbertim obducta, alioqui Sclæræ satiuæ non multum dissimilia, sinuosa, quædam etiam laciniata: inter hæc caulem profert foliis consimilibus, sepe minoribus, stipatum, quadratum, pa-

riter villosum, multis alis concavum: in quibus ad nodos, flores verticillati, duorum foliorum acuminatorum complexu Hormini modo obulati, candore niueo, vno folio cuculli instar surrecto, compresso, apices luteos, stilumque argenteum è sinu proferente, labro Corulæ instar concavo, ex calyce oblongo quinquepartito, quem circumquaque tam densa obregit lanugo, ut vix conspici possit: odore est foetido, Lamii vel Galeopsis: radix fibrosa: semina in singulis vasculis quatuor Hormini seminibus similia, fusca, lubrica, triangula.

Matthioli. (qui Roberto Constant. teste olim scripserat incognitam, in post. verò comm. eius ostendit effigiem) Amato, Anguill. Dodon. Gessn. Cast. Lob. in Adu. Obf. pag. 304. & Ic.

Magica
vanitates

Hesperin

Descriptio

Plant. p. 566. Lac. Lonic. Camer. in hort. & apud Matth. Tabern. & Hist. Lugd. p. 1306. Æthiopis: Schvvenckf. *Æthiopis* Dioscoridis: C. Bauh. Æthiopis 1. siue foliis sinuosis. Æthiopidis verò eius secundæ, siue foliis in profundas lacinias diuisis, qui meminerit, non habeo vllum. Æthiopidem Monspessulani *Cotonariam* vocant: Germ.

Cotonaria. *Wohrenfraut*: Itali *Eriope* & *Eriopide*.

Locus &
Tempus

Copiose provenit in Græcia & Illyria, unde ad nos primum delata. Nobis Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine Surgardie in horto Ducis collecto nata fuit: semen maturabat Iulio & Augusto. Primo anno caulem non ferebat, secundo autem semine deciduo se propagabat, & peribat. Patavii observavi virentem in horto publico mense Februario.

MARRUBIUM IN GENERE.

CAP. CVIII.

Marrubium
duplex
Diosc.
Theoph.

Marrubium Dioscorides duplex assignat: Album quod *μεῖνον* dicitur, & Nigrum, quod *βαλάντιον* vel *μεῖνον* nominatur.

Sed & Theophrastus duo quoque genera tradit. Aliud, inquit, folium herbaceum [ραβδον] habet magis serratum, incisuralque profundiores, valde manifestas, quo vnguentarii vti ad nonnulla consueverunt: Alterum verò rotundius, & squallens [*ἀχυνδόν*] vehementer, ut *τοῦ ὀφθαλμοῦ*, incisuralque habens obscuriores, minusque serratum.

Ceterum, Ruellius primum Theophrasti Marrubium folio herbaceo, officinas Prasion viride nominare testatur, comâ herbaceâ ferratiori, crenisque profundioribus, reliquâ parte candido simile, eiusdemque naturæ. Alterum verò folio rotundiore, candidum interpretatur, quamvis non desint, qui hoc Balloten, illud candidum appellant.

Prasion
Linosyroph.
Philopada
Philocha.
vi.

Marrubium inter primas herbas plerique commendauere, quod Græci *μεῖνον* vocant, alii *Linosyrophon*, nonnulli *Philopada*, aut *Philochares*, notius quàm ut indicandum sit. Huius folia semenque contrita profunt contra serpentes, &c. inquit Plinius, qui & ipse duo genera Marrubii, ex Castoris sententiâ proponit nigrum, & quod magis probat, candidum, quanquam eius sententia parum memor, nigrum Marrubium postea in Porrum nigrum commutauit.

Plin.
notatur.

Prasium, inquit Amatus, Marrubium est Prasium verò Porrum, cuius inaduertentia Plinius sæpe in errorem labitur. Plinium itaque consummatæ lectionis & eruditionis autorem, perpetuum (ut eius verbis utatur Constantinus) aut ut Varronis, indefinenter vellicat Lusitanus, cæsim quidem & punctum petens, nequaquam tamen feriens, ut malus gladiator veteranum militem.

Aequiuoca

Nunc & hoc obiter indicandum recentiores Medicos quatuor Marrubii genera constituisse *Primum* Marrubium album, siue Prasion. Ad quod reuocamus Marrubium candidum folio subrotundo: Item, Marrubium Hispanicum odore Stæchados Lobelii, Ocymastum Valentinum Clusii. Et tertium Marrubium album angustiore folio. Secundum Marrubium nigrum siue Ballote quod duplex habetur: alterum foliis maioribus, alterum minoribus. Tertium aquaticum, quod, ni fallor, quidam pro Siderite exhibent. Postremum campestre, vel agreste quod à nobis Stachys Fuschii inritatur.

Marrubii præterea nomine sequentes etiam donantur plantæ. Cardica. Herba Venti. Meliphylon. Vrtica. Melissa. Tragoriganum. Eupatorium. An Galeopsis angustifolia. fœtida. An Galeopsis minor folio caulem ambiens?

MARRUBIUM ALBUM.

CAP. CIX.



Caulibus assurgit cubitalibus, quadratis, canâ lanugine pubescentibus. tubulo peruiis: ad quorum nodos folia nascuntur bina ex aduerso sita, perquam rugosa, subrotunda, in ambitu serrata, ex viridi albicans, hirsuta, sapore acri & amaro: ex quorum alis tubuli numerosi verticillati: oriuntur, bifidam cristam surrigentes, labello vtrinque alati demisso, in calyculis albis lanuginosis. semen subrotundum asperiusculum: radix fibrosa, nigricans. Tota herba Dod. suavis & grati est odoris, & nonnihil moschum redolet, præsertim hybernis mensibus.

Marrubii, seu Prasii Dioscoridei delineatio ad amussim huic nostro respondet. Frutex est, inquit, ab vna radice multorum ramorum, subhirsutus, albicans, quadrangularibus virgis: folium pollicis æquale, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amarum: semen per intervalla in caulibus est: flores velut verticillati, asperi.

Quodnam autem sit Marrubium hoc apud Theophrastum, auctores non conueniunt. Ruellius & eum securus Casalp. volunt eum hoc pro secundo genere describere. Dalechampius contra id eum intelligere credidit per prius: per alterum verò Dioscoridis Balloten, hoc ab illo discrepantem, quod plusculum ad virorem fuscum porraceum vergat, unde Marrubium nigrum vocetur, & odorem grauem, factoremque vibret. Cornarius primum Theophrasti Marrubium narrat officinas quidem viride Prasion vocare: aramen Prasii huius, genus alterum esse ait, & non id quod Ballote, nigrumque Prasion dicitur. Et certè D. Agerius huius Marrubii varietates communicauit. Dedit namque Marrubium in Marca Anconitana collectum, Germanico candidius, foliisque minoribus & ramosioribus. Et aliud maius, odoris suavis, Romanorum agrum inhabitans.

Græci, ut Diosc. Theoph. & Galenus *μεῖνον* appellât. Latini, ut Matthiol. Lobel. in Aduers. Casalp. & Dodon. Marrubium; Marrub. album Matthiol. in Epit. & Histor. germanicum add. Camer. Lobel. in Obs. pag. 27. & Ic. Plant. p. 517. H. Lugd. p. 961. & Gerardus: Marrub. candidum alterum & vulgare Tragus. Vulgare Clus. in Pannon. legitimum vulgare in H. post. Tertium & album vulgare C. Bauhin. Marrub. notius

hotius quàm vt indicandum : itémque candidū Castori magis probatum Plinius. Marrub. siue Prassium album Tabern. candidum Schvenckf. Marr. feminam Brunfels. Prassium Anguill. & officinæ. Videtur autem, inquit, Pena, prasinus viroz, aut certè virosus odor, appellationem dedisse Marrubio, tam nigro illi fortido, quod Ballore dicitur, quàm albo huic & odoro. Inter nothas voces & apud Apuleium eius & hæc nomina extant, *Ευπατόριον, φυλλόφαρος, τριανδύλιος, χυμυλοπόδιος, κρηνοπόδιος, φιλιδόφαρος*, Labeo, Labeo-
gia, Asterion, Asteope, Asteiope, Atyrbesia, Vlceraria, Marua Iantusa Serap. Tauri sanguis, Horu genitura, Melitana & Meliphyllon. Dicitur quibusdam Hebraicè, vel potius Chaldaicè *Tamcha*: Maurit. *Faraso* siue *Frasium*: Germ. *weisser Andorn*, *Marobel*, *Gortee vergiß*, *helfe-frant*, *lungenfrant* / & *wilder taurant* Silesiis Schvv. Belg. *Malroue* / *Malruene* / & *whitte Andorè*: Gall. *Marrubin* & *Marochemin*. It. *Marubi*: Hilp. *Maruno* & *Maralbo*: Angl. *horehounde*: boh. *Zableutif*: Hung. *Feyer pözerce*.

Multis locis frequens spontè crescit, vt Monspelii passim, vt etiam Burmi in Rhætia: itémque circa Colmariam, horburgum E.C. castellum, & Entzheimiam, aliisque Alsatia locis: propè Bessfordiam paucas plantas vidi, ac etiam inter Ferrariam & Bononiā. In Silesia oriri propter ædificiorum ruinas & rudera perhibet Schvenckfeld. dicitque in arsis pagorum vulgò notum. At in Austria & Pannonia rarum est, & certis duntaxat locis, iisque paucis spontè nascitur, auctore Clusio. Colligitur Aestate, Iulio potissimum mense, cum semine prægnans est.

Huius folia arida, inquit Dioscor. cum semine decocta in aqua, aut viridum succus expressus datur cum melle Asthmaticis, tussientibus & tabidis. Crassa è thorace, cum Iride sicca, ducunt. Datur mulieribus quæ non purgantur, vt menstrua & secundas pollant: itém difficile parientibus, & iis qui à serpentibus morfi sunt, & qui lethale quid biberunt. Vesicæ tamen & renibus nocent. Folia cum melle illita sordida vlcera purgant, pterygia, nomiaque cohibent: dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex foliis contritus succus, & Sole coctus. Cum vino & melle illitus oculorum claritatem exacuit. Morbum regium per nares expurgat. Aurium doloribus per se, aut cum rosacco instillatus prodest. Marrubium plerique inter primas herbas commendauere, inquit Plinius, eadem tradens quæ Dioscorides: ac præterea alium soluere, vrinam ciere: strumis, gangrenis, & laterum doloribus conferre. Ad eadem commendat etiam Galenus addens in caliditate esse quidem secundi ordinis iam completi, in siccitate tertii medii, aut completi. Marrubii decoctum, inquit Marthiolus, datur commodè iocinorosis, & aqua intercute laborantibus: eo quoque foliorum puluere necantur interaneorum vermes. Recentia folia cum veteri axungia trita & illita canum morsus persanant, & mammarum tumores persoluant. Lichenas purgant, sanantque ex aceto illita. Ad viscerum obstructions commendat præterea ex Marrubio parata decocta, vina, eclegmata, syrups, & alia eiusmodi.



les sunt, quadrati, lanugine incana obiecti, multis alis cœcati: ad quorū singulos articulos, folia ex aduerso binā oriuntur mollicello holofertici tactu, villosa, intensiusque quàm in vulgari enascētia, latiusculo pediculo appenda. in ambitu serrata, longiora, quàm latiora, obtusa, odore nullo excellentē: sapore calidiu-

culo, non tamen ingrato: flores ad genicula verticillatim caulē amplexantur Marrubi vulgaris, ex oblongis, incanis, mollicellis calycibus.


Clus. in Pannon. & hist. post. vocat Marrubium alterum Pannonicum, quæritque an sit Marua Iantusa Serapionis? Eius autem delineatio non malè conuenit cum Marrubio iam descripto, nisi quòd ait esse odore iucundo. Lob. in Ic. Plant. p. 518. Marrubii candidi alterius hispanici titulo, eandem habet iconem quam Clusius: itémque in Obs. pag. 279. Tab. inscripsit Marrubium candidum hispanicum: Gerard. candidum. C. Bauh. phyt. 4. siue album latifolium peregrinum.

Synonymi

Ad eò vulgare est toto Viennensi agro, vt vinerorum agrorūque margines, sicque & s. aminei campi eo abundant: imò in ipsas vrbes (quæ ab aquis sunt liberae) fossis nascitur: floret Iulio. habemus nos Montbelg. in hort. Ill. E.C.W.

Nullò tamen apud Viennenses, quod Clusius sciat, in vsu est.

MARRUBIO ALBUM ANGSTIORE folio. CAP. CXI.



Candidius nostrati Marrubio, caulibus ramisque quadratis tenuioribus: folia ex geniculis aduerso situ oriuntur impensè candida, oblonga, serrata nervosa, sed nervis plerisque recta secundum longitudinem decurrentibus: flores in ramis, subiectis binis parvis foliis, K k

MARRUBIUM CANDIDUM FOLIO subrotundo. CAP. CX.

Caulis, quos ex radice vulgari Marrubio simili coplures profert, cubitales & bicubita Tom. III.

verticillatim positi, interdum & in spicæ formam digesti, parui, candidi, bifido foliolo surrecto, labello demisso è candicantibus striatis calyculis.

Synonyma

Lobel. portr. in Aduers. & Icon. Plant. p. 519. vocat Marrubium Creticum angustiore folio : H. Lugd. p. 962. Marrub. Creticum Penz. [Existimauit autem compilator hoc à Marrubio candido Hispanico non differre : sed errat: diuersum est & vtrumque mihi notum:] Camer. hort. Marrub. Creticum aliud, à Lobelio & antiquis depictum: Tabern. & Gerardus Marrubium Creticum: C. Bauh. phyt. Marrub. 5. siue album angustifolium peregrinum : Apud Matth. Syderitidem 2. Matthioli & Castoris.

Locus

Ex semine per fratrem C. Bauhinum Marrubii albi veri nomine Lutetiâ misso prouenit mihi Montbelgardii in horto Ill. E. C. vibi Hiemem perfert.

Hoc Creticum Marrub. qui cum Schvvenckf. opinantur, id ceteris prastantius credunt.

MARRVBIVM NIGRVN SIVE

Ballote.

CAP. CXII.

Descriptio



SEsqubiculato altius est, caulibus quadratis, hirsutis, nonnihil rubentibus, inanis: ad quorum genicula sesquiuncialibus pediculis oriuntur folia Melissæ atroviuentia, rugosa, scetida, in ambitu serrata, ex eorumdemque alis surculi alii foliis confimilibus minoribus donati: flores Lamii

rubri, verticillati ex calyculis oblongis striatis: radix Vrticæ fibrosa.

Balloten, inquit Dioscorides, quod nomine alio Marrubium nigrum vocant, caules edit quadrangulos nigros, lubrifutos, complures ex vna radice: folia hispida, vel vt alii, densa per interualla in caule disposita, quam Marrubii maiora, subrotunda, graueolentia, Apiastro proxima: vnde aliqui Apiastrum eam vocauerunt: candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem coronant. Plinius similiter depingit.

Synonyma

βαλλοτη autem dicitur Græcis & μίλας πεινον, & in quibusdam exemplaribus μετὰ πεινον: Latini Ballote, Marrubium nigrum, Marr. magnum, Marr. spurium, Marr. scetidum, Marr. nigrum scetidum, Marrubiastrum, & Prassium scetidum: Itemque inter nothas appellationes Nophtan, Notianoscemin, Nospation, Nothera, Nochelis, Nostelis, Nophrys, Gnothuris, Gnotera: Aegyptiis Alphas, aut Elce: Prophetis sanguis Ixionis: Romanis Apnium aut Medata, aut Vlceraria, aut Marrubium, aut Cantherinum. Marrubium quidem à foliorum similitudine, ni-

grum à colore, qui ad colorem fuscum magis vergit, quam in Marrubio, Prassium scetidum ab odore graui & fetore. Germ. Schwarz Andorn/ Stundend Andorn/ & Andorn weible: Gall. Marrequin puant: Marrubin noir: Ital. Marrubio bastardo: Hisp. Marrubio negro & bastardo: Angl. Stinking & black horehound scetere pözereze.

Gerardus pro Marrubio aquatico, ponit iconem Tabernamontani Marrubialtri, & pro Marrubio nigro iconem Lamii albi eiusdem.

Marrubium nigrum alterum haberi foliis maioribus & alterum minoribus obseruauit C. Bauhinus.

Monspeliu florens intuebat Aprilis & Maio mensibus: Basileæ Octobri. Frequens in agrorum marginibus Geneuæ, Lugduni, Montbelgardii, & alibi, passim etiam secus vias, parietes & sepes vmbrosis locis florens Aestate.

Huius folia, inquit Dioscorides, cum sale trita canis moribus medentur. Feruenti cinere flaccescunt, vt condylomata reprimant: sordida vlcera cum melle purgant. Plinius eadem iisdem ferè verbis retulit. Vis eius efficacis aduersus canis morsus ex sale foliis tritis impositis: item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vulcera cum melle. Galenus Ballotes ne meminit quidem in simplicium medicamentorum censu.

MARRVBIVM AQVATICVM QVORVM-

dam.

CAP. CXIII.



ALtitudine cubitali, aut sesquicubitali, caule rigido, quadrato, subhirsuto, in ramos oppositos diuiso: folia bina semper ex aduerso sita, Betonicæ foliis paria, profundè serrata, interdum laciniata, in singula segmenta exposito nervo obliquo, in acumen desinètia, inferius nonnihil hirsuta, superius glabra, breuiusculo

pediculo hærentia, sapore amariante: ad quorum exortum verticillati globuli sunt: hosculorum candidorum, punctis rubentibus asperforu: ex calyculis asperiusculis & veluti spinosis vix tantillum prominentium: radix fibrosa, albicans, modicè adstringens.

Quidam, vt Matthioli, Syderitum primam facit, quâ alii, vt Dodon. & C. Bauh. rectius Marrubium palustre vocant: aquaticum Thalius & Schvvenckf. Marrub. 4. aquaticum & palustre Tragus, qui Sentrum Avicennæ statuit. Marrub. aquat. vulgi Lob. in Aduers. & Obf. p. 283. & Ic. Plant. p. 524. (vbi malè Syderitum secundam vocat) & Hort. Lusit. Syderitum Matthioli, Lanaceam Christi Gesneri, & Aegyptiacam herbam quorundam, Camer. hort.

Germ. Wasser Andorn / weyher Andorn: Gall. Marrubin aquatique: Angl. water horsehound: Hung. Víz pözeceze.

Marrubium aquaticum Tragi floret Basileæ ad ripam fluminis Birsæ intra urbem Iunio & Octobri. Montbelgardi spontè Augusto locis humidis. In Silesia viget & floret, referente Schvenckfeldio, æstivis mensibus ad rivulorum margines & secus fossas, ac scrobium extremitates aquas habentes: rigati crenum postulat: in aridis autem non provenit.

Cætèrùm, refrigerandi, atque vnà validè adstringendi facultatem habere videtur: & nonnullis succus eius colore tingere nigro creditur, quod indagandum proponimus.

ALYSSVM IN GENERE, VETERIBVS, & Neotericis.

CAP. CXIV.

Varia est apud auctores Alyssi historia. Et quidem ex Dioscoridis sententia ἀλυσσός est frutex parvus (σφυρίδιον). Ruell. addit vnicaulis: subaspera folia habens, rotunda, circa quæ fructus, duplicis seuti figuræ in quo semen est aliquantulum latum. Nascitur in montanis & asperis locis. Eius decoctum singultus, qui sine febre sunt, potu soluit: idem efficit, si quis eam, aut teneat, aut naribus odorandam admoveat: at cum melle trita lentiginis & maculas Solares [vitia cutis in facie] emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. Sed & in domo suspensa salutaris esse creditur, tum hominibus, tum aliis animalibus, nec fascino lædantur. Quin & purpureo lineo, seu puniceo panniculo alligata, pecorum morbos abigit.

Ab hoc, vt quidam opinantur, Alyssum Plinii discrepat: is namque videtur Rubiam minorem Alyssum facere.

A Dioscoride alienum quoque est Aetii Alyssum quod Heracleam Sideritidem esse statueri videtur. Aegineta libri 5, capite 23. cum Actio de Alyssio conformia scripsit. Ab illis verò omnibus circa Alyssi historiam dissentit Galenus Ex cuius verbis palam est, Alyssum ab eo ex Asclepiade descriptum, potiùs primam, quàm vltimam Sideritidem referre.

Sive porò frutex sit ille Dioscoridis exiguus, hætenus non satis cognitus: Sive alicuius plantæ (quæ eam habeat proprietatem, qualem ex Asclepiade voluit esse Præstii speciem Galenus: Sideritidis, Heracleam sc. Paulus, ait baccius de venen. & Antid.) cognomen Alysson, sic tamen dicitur à proprietate sanandi morsus canis rabidi. Et hæc Etymologia potiùs Alyssio conuenit, quàm Melanthio, quod Arabes à græca voce ἀλυσσός, sic dictum testantur.

Cùm igitur varia admodum sit de Alyssio auctorum sententia, cùmque eius historia tam varia, incertaque habeatur, difficile quidem fuerit asserere, quænam planta Alyssum legitimum, aut Dioscoridis, aut Plinii, aut Aetii, aut Galeni, vocari possit & debeat. Magnus enim numerus plantarum occurrit, quæ pro Alyssio à rei herbarie studiosis passim & certatim ostenduntur, inculcanturque. Quas licet Matthioli, quod fortassis earum nullam legitimum Alyssum referre crediderit, potiùs suppressimendas, quàm declarandas existimarit. Nos tamen contrà eas hic nominandas, & suo quoque loco pingendas, sus-

Tom. III.

usque pertractandas esse, consultum duximus. Illud nobis saltem indicasset sciolus, quodnam Alyssum illud foret à Galeno ex Asclepiade representatum: quodnam & illud, cuius meminit Aetius: siquidem ambo hæc in Italia provenire non amplius inficiatur. Cur bonus ille vir aliis diiudicandum relinquit, quid Ruellius per Cannabin rusticam, quam ipse Dioscoridis Alyssum esse putat, aut saltem ad ipsum propius accedere ait, intellexerit, & tamen carpit? Cur non Cristam galli pronunciauit?

Cætèrùm Alyssi nomine sequentes apud Aucthores donantur plantæ. Alinæ fol. serrato hirsutior. Veronica. Veron. pratensis serpilli. fol. Alysson filiqua latà, &c. Alyssum Anguillæ. Thlaspi minus. Thlaspi maritimi. Clinopodium quorundam Origanii facie. Alysson Galeni, Moluca asperior. Moluca. Carduac. Ladan. segetum fil. albo. Lad. seget. fil. purpureo. Syderitis glabra. Syder. Alysson Columnæ. Sideritidi affinis. Sclarea. Betonica. Consolida media. Costus annuus Ledi folio. Cynoglossa topiaria fortè Plinii. Cynoglossæ pulchra species. Aparine. Rubia minor. Alysson Plinii, &c. Gallium secundum Tragi. Rubiis affinis Asperula Dodonæi. Rubia cærulea elatior. Rubia parua fl. cæruleo. Geranium Robertianum. Liliun Martagon. Lilialis. Cyanus. Alysson Cytiis facie. Periclymenum. Numulatia.

STACHYS VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. CXV.

Stachys Dioscoridi frutex est Marrubio similis, Sed longior (quæ vox in Cratæua desit, Anguill.) folia ferens plura, sed rara: Cratæua legit: οὐρανίου Anguill.] hirsuta, dura, odorata, incana: virgas ab vna radice plures, Marrubio candidiores. Nascitur in montibus & asperis. Vim habet exalfactoriam & acrem. Vnde [quæ vox in aliquibus omittitur:] foliorum decoctum potum menses & secundas ducit.

Plinius l. 24. cap. 15. de Stachyde Laconicè loquutus est. Ea quoque, inquit, quæ Stachys vocatur, Porri similitudinem habet, longioribus foliis, pluribusque & odoris iucundi, colorisque in luteum inclinati: pellit menstrua. Sed & hic vocum vicinitate deceptus Plinius, ἀλυσσόν pro stachyde agnouit. Non enim Porri similitudinem habet Stachys, sed Marrubii, vt Dioscorides dixit ἀλυσσόν μαρρυβίου.

Quin & Galenus quoque Marrubio similentem fruticem Stachyn esse dixit, gustu acrem & amarum, qui tertii ordinis sit calefacientium, vt necritò non solum menses moueat, & secundas eiciat, sed etiam abortus procreet.

Stachydis nomine donatæ sunt sequentes plantæ quatum quidem nobis constat. Stachys Fuchii. Stach. Cordi. Stach. candidior & minor Matthioli. Stach. Lusitan. Pseudonardus quæ Spica vulgo. Sideritis spinosa. Scorodotis tomentosa Græca. Scorod. folio Saluiz. Stachas. Galioptis lutea glutinosa. Galiopt. for-tida angustifolia.

STACHYS FUCHII.

CAP. CXVI.

Redimuiam Stachydis radicem numerosæ fibræ vbertim circumquaque productæ cō-

Rk 2



Stachys
Corda

Stachys.

H. Lugd.
carpat.

Synonyma

ronant: caules autem promit plures (sæpè vnicum) cubicum altos, aut paulò proceriores, quadratos, lanugine incanà villosos, fungosa medullà rarios: ex quorum geniculis folia ex opposito sita prodeunt, Marrubii foliis longiora, lanuginosa, mollicella, per ambitum serrata, sapore c-

tra omnem morsum siccante: flores ex foliorum alis verticillatim ex longa veluti spica caules summos ambiunt, foris hirsuti, intus glabri, purpurealcentes, ad Lamii flores quàm proximè accedentes, labello trifido subinde guttato, galeâ item saturatiore, dilutioreque purpurâ versicolore, ex calyculis oblongis villosis: semen rotundum & nigricans: odor totius plantæ grauis.

Cord. in Diosc. Stachydem spicatam herbam esse ait, & Marrubio similem, candidiorem tamè, & ob eam causam Germ. weissen Andorn, h. e. Marrubium album, & Stein Andorn Marrubium petraeum, appellat.

A Trago pro Marrubio tertio describitur, appellaturque Marrub. agreste siue campestre feld Andorn, si que genus Gallitrichi siluestris, ac idè germ. feld scharlach nominatur. Hoc ipsum tam suaue olens Marrubium, Stachyn Dioscoridis esse existimat. Is autem odorem totius plantæ gratissimum ait, qualem nos non obseruauimus.

Stachydem appellat Fuchs, quodd verticillato florum ambitu & orbiculis spicarum caules cingentibus coronetur: germ. riechenden Andorn / gall. Sauge sauage. Is autem more suo Dioscoridis verba pro descriptione repetit, nihil addens præter florum purpureorum verticillatum ambitum: odorem & folia dura non obseruauit.

Sphacelum esse statuit Guilandinus, sed perperam, reclamant enim folia. Gesn. in cat. pl. Stachyn Marrubio similem rura Tygurensia rusticam, vel montanam, vel mollem Saluiam: Herbarios Nauiculam, alios Coronaram herbam appellare, ex Ruellio, ni fallor, perhibet.

Lobel. in Obs. p. 285. (itemque Icon. Plant. p. 530.) Stachydem Dioscoridis inscribit ac Scorodoti Plinii constituit: alibi Marrubium agreste Tragi, & Pseudostachyn Matthioli vocat.

H. Lugd. p. 963. duas habet icones: vni titulus Pseudostachys Matthioli: alteri Stachys Fuchsi: descriptiones etiam duas habet, quasi diuersæ essent plantæ. Vna est Fuchsi ex Dioscoride petita, altera Lobelii.

Stachys dicitur Castori, itemque Lonic. & Tabern. qui trium plantarum, quas pingit, nomina confundit in Hist. Stachydis, Pseudostachydis & Saluiæ montanæ, quæ quanam ei sit, iam non occurrit. Stachys maior germ. Camer. hort. Floribus purpurascens C. Bauh. phyt. Sta-

chys Fuchsi Dod. lat. in fol. Marrubii tertia species Dod. gall. Marrub. montanum alterum, generis secundi Thalia. Marrub. campestre Hort. Lusit.

Honor. Bellus ait Lobelium pro Scorodoti Plinii secunda, stachium Dioscoridis describere: sed eam stirpem notham, spuramque esse: nam neque Allii odorem spirare, neque viribus à Plinio attributis respondere. Ego Stachydem vulgarem non esse Scorodoti Plinii Bello quidem cedo: sed hoc ipsi non do, nec etiam Lobelio quod Stachys sit Dioscoridis: haud enim responderet odor, qui, Plinio teste, iucundus: nec color consentiret, qui in luteum inclinans, esse dicitur: sapor etiam contrariatur, hic enim Galeno teste, maris & acris esse debet: neque calefacit tandem, vt docet Dioscorides.

Asperis locis, montibus ac collibus prouenit: floret Iunio & Iulio mensibus: Basilicæ etiam Iunio, extra portam lapideam Iulio & Augusto: inter Basilicam & Leurach versus Moutetz Octobri.

CARDIACA.

CAP. CXVII.

Hanc sub Lupi pedis nomine sic describit Ruellius. Lupi pes, quam Græci Lycopoda nominant, herba est Marrubio sylvestri similis, folio Lupini pedis effigie, dissecto, grauis odoris, caule anguloso & geniculato, furcosus intus medulla, radice frequenti capillamento fibrata: Galli nunc Patam lupinam, nunc Herbam pectoralem: nunc Manum S. Mariæ nominant.

Hæc itaque herba Lycopus Ruellii est, quam multi in Germania Cardiacam vocant: nimirum quodd Cardia (sic etiam stomachum siue ventriculi veteres appellabant) imposita medeatur. Quod verò Ruellius ait græcè Lycopodem dici, nusquam reperitur, vt auctor est Gesnerus quadr. de lupo, apud Græcos, neque apud Plinium: quare consuetam ab eo ad imitationem gallicæ vocis, græcam esse coniecit, & pro Galeni Lycopersio admisit: huius enim & nomen à lupo, & odoris insignem grauitatem, leuiter tamen aromaticam & ni fallitur, etiam colorem conuenire dixit præsertim maturo iam semine prægnanti herbæ. Hæc Gesnerus qui in cat. pl. Cardiacam opinatur dictam, quod folia trita præsentaneo remedio dissoluto stomacho imponantur.

Kapdi. Borden Nicolai dicitur Fuchsio: Sideritis prima Hecaclea Dodonæo: Euricius Cordus Marrubii, vel Melissophylli speciem esse putat, quia non aliter, quàm Melissophyllum apibus gratissima sit, scribitque se propterea ipsam ad alueraria plantasse, neque credi posse quanto examine, ac quàm sonoro murmure circum hanc florentem densæ apes susurrarent.

Marrubium & quidem primum Cardiacam vocat C. Bauh. phyt. dubitatque an sit primum Theophrasti. Quidam Alysson Galeni & Aetii esse volunt. Sunt etiam qui Marrubium mas Brunfelsii faciunt, vt C. Bauh. & Schvvenckf. qui Palmâ Christi à Parisiensibus appellari testatur. Brunfels. quidè Tom. 2. ante raphodiam 25. p. 158. ienem habet sine nomine: & aliam quoque sine titulo pag. sequenti 159. & sequitur Raphodia vigesima quinta: prior autem icon est Cardiacæ, secunda Marrubii. Vbi verò Cardiacam Marrubium

bium mas vocat, vt annotarunt C. Bauhin. & Schvvenckf. non mihi constar.

Lycoplyn tandem Cardiacam vocat Anguill. epist. 12. Aliam demum esse Cardiacam à Balloce perhibet Fuchsius.

Quo igitur nomine herba hæc à Veteribus sit appellata, adhuc sub iudice lis est. Herbarii nostræ ætatis vulgò Cardiacam appellare cōsueverunt haud dubiè quòd cordis palpitationi, quam multi perperam *herzgespan* appellant, misicè conferre videatur: germ. *herzgespeer* / *herzgespan* / & *herzfraut* : Schvvenckf. nonnullis *Wolfstope* vocari ait, i.e. Patam lupinam. Belg *herzgespan* : galli *Agripaulme*, testibus Fuchf. Dod. & Lob. Quà autem ratione Agria palma dicatur, haud scit glossator Fuchf. in impress. Lugdunensi, nisi fortè à rudi foliorum fissura tanquam in digitos à qua, sed perfectiore, Ricinus vulgò etiam Palma Christi nuncupatur. Angli *Mortemorte* : Boh. *sedecnuß* : Hung. *ziu siu*.

Passim rudetibus, lapidosis, ac aliis incultis & asperis gaudet iuxta sepes & veteres muros subinde inuenitur: in hortis nimis faciliè calescit. A Iunio in multum vsque Autumnum viget, & floribus (præsertim Iulio) abundat, seménque perficit. Caules Hieme intercidunt: radix viuax est, Dodon. Prouenit etiam in pagorum areis, iuxta semitas, & propè vrbiū mœnia, vt etiam Basilææ vidi florentem Octobri.

Fuchsius æ amaritudinem insigni sumpto argumento, calidam statuit in secundo ordine & siccam in tertio : rectè à recentioribus scriptum, contra cordis palpitacionem, conuulsionem, & resolutionem conducere : posse enim cum amara sit herba, suâ caliditate & siccitate crassos humores, qui in venis & aliis partibus, nervosis potissimum, sunt, incidere, extenuare, & discutere: hac etiam ratione morbo comitiali conferre, vrinam mouere, & menstrua educere, aliâque facultates, quas Galenus lib. 4. de simpl. med. facult. cap. 17. amaris tribuit, obtinere. Hisce subscribit Matthiolus, addens eam in puluerem cōtritam, & cochlearis mensura ex vino haustam, difficilè parientibus mitum in modum opitulari: obstructions aperire, quas causâ frigida induxit: pectus à pituita detergere, & lumbricos necare. Cum expurgandi, adstringendi quòque facultatem habet, inquit Dodonæus. Ad cordis affectus à nonnullis commendatur, & tantum valere existimatur, vt ab effectu nomen inuenisse putetur. Fertur & conuulsis ac quoque resolutioni mederi, obstructions viscerum aperire : ventris tinea ac lumbricos interimere, & puluerem herbe cum vino exhibitum, non modò vrinam & menses euocare, sed & difficulter parientibus prodesse. Ad cruenta eadem quoque laudatur. Medetur & quibusdâ boum morbis, ac à rusticis ea de causâ subinde expetitur.

GALIOPSIS VETERIBVS. CAP. CXVIII.

Galiopsis, quam auctore Dioscoride, aliqui Galeobdolon vocant, frutex (*ῥαδων*) est rotus cum caule & foliis, similis Vrticæ: sed folia læuora sunt, & dum teruntur valde grauem odorem reddunt: flores tenues (*λίαν*) purpureascentes [*πυρροῦ χρώματος*]. Nascitur ad sepes & circa vias, ac domorum areas vbique. Vim habent folia, succus, caulis, & semen, dissipandi duritias,

carcinomata, strumas, parotidas, panos: Verum cum aceto bis in die imponere oportet, & cataplasma tepidum facere. Sed & decoctum ipsius vtiliter in fomentum affunditur. Facit etiam ad nomas, gangrænas & putredines, cum sale imposta. Dioscoridis verba habet Plinius. Paulus vires eius ex Dioscoride quoque habuit. Galeus verò Galioptions mentionem non fecit.

Galeopsis inter nothas, aliis galephos, Aegyptiis Aethiopsis, Romanis verò Vrtica Labco dicitur.

Græcis *Γαλιόψις* vel *Γαλιόψις*, & *Γαλιόψις*. Dicitur autem galioptions, si cum i scribatur, à floribus effigie galeata, quòd eius flores galeæ aspectum referant. At quoniam inusitatum fuit græcis præsertim veteribus, Latina nomina cum græcis componere, *Γαλιόψις* potius per n scribendum erit, vt & multa exemplaria habent, & Plinius ita legendū testatur, qui galioption nominat, à florum figura mustelæ faciem & ricum quandenus exprimente. Id quod etiam videtur innuere *Γαλιόψις* nomen i.e. mustelæ foetidae: quo quænam sit herba indicatur, nullâ videlicet descriptioni aptiore, quàm galioptions siue vrtica foetida mortua, Corn. Cordo, Trago, Fuchf. Matthiol. H. Lugd. Clusio & Schvvenckf. autoribus.

Hanc tamen opinionem tanquam falsam reprobauit Marantha. Odor, inquit, qui in galioptions descriptione proponitur, nisi nonnullis consideratis intelligatur: eius cognitionem impedit. Et hinc colligitur error (quod eorum pace dixerim) volentium galioption esse, quam vulgò Vrticam foetidam appellant, inter alias notas eius herbæ graueolentiam in medium afferentes: non enim animaduertunt graueolentiam galioptions foliis Diosc. assignasse, si terantur: non autem integris: at in Vrtica foetida, etiam si non confricentur, grauiusculum longius emittunt odorem. Huic subscribit Clusius, cui nullus recentiorum satisfacit in icone galioptions historię addita: nam vel Lamii genus aliquod, vel Scrophulariam vulgarem eos sublinere perhibet, cum ad illarum nullam Dioscoridis descriptio aptari possit.

Nos Galeopsis nomine sequentes denominauimus plantas, quarum quænam sit legitima iudicium penes lectorem relinquimus: Galeopsis siue Vrtica iners flore purpureascente maior folio maculato & non maculato. Galeopsis siue vrtica iners floribus albis. Galeopsis siue Vrtica luteo flore. Galeopsis siue Vrtica iners folio & flore minore. Galeopsis siue Vrtica iners minor folio caulem ambiente. Galeopsis siue Vrtica iners magna foetidissima. Galeopsis siue Vrtica fatua incana reptilis. Galeopsis siue Vrtica fatua maxima flore magno rubro. Galeopsis si foetidissima affinis. Galeops. fl. paruo atro-purpureo. Galeops. angustifolia foetida. Galeops. lutea viscida Dal. Scrophularia maior. Scroph. maxima. Scroph. 3. Dod. Pulegium.

GALEOPSIS SIVE VRTICA INERS flore purpureascente maiore, folio

non maculato.
CAP. CXIX.

Radice nititur hæc Galeopsis fibrosâ numerosâ, repente, perenni, ex qua caules plures surriguntur, logi, quadrati, concaui, purpurei, modicè hirsuti, geniculis inferius crebrioribus, medio caule internodiis longioribus: ad radicem

Kk 3

folia subrotunda, ad Marrubium foetidum accedentia, ex satis longis pediculis, superiora ad singulos geniculos purpureis semuncialibus latiusculis appenda, Vrticæ similia, pilis hirsuta, sed inertibus, rugosa, atroviolenta, atroæ purpurea, serrata, foetida: ad quorum alas flores hirsutis loculis rubentibus insident, seni vel deni verticillatim caulem coronantes, purpurei, pilosi, inodori, rictum ostentantes, foliolo concavo, ceu galea, sursum reflexo, bifido, labello punctis carneis & sanguineis notato, deorsum reflexo: ex medio hiatus stamina profert quaterna recurva alba, capitulis atroæbentibus, nec non stilum album tenuem bifidum: semen in caulibus per interval- la copiosum & nigrum.

Synon. &
Nomina.
linguarum



Hung. Bot. chlan

Vrtica non mordax, & Galeopsis vulgaris purpurea, Lamium Plinii, itemque Archangelica vulgi dicitur Lobel. in Aduers. Vrtica labeo & Lamium Nomenclatori Pannonico: Vrtica mortua & alba Corn. Vrtica foetida Apollinari: Vrtica foetida floribus purpureis Matth. Schvveckfeld. appellauit Lamium purpureum vulgaris, & Diofcoridis, & Vrticam labeonem, foetidi & grauis odoris: Fuchf. Lamium 3, fl. purpureis: Tabern. Lamium 3, purpureum: Item, Galeopsis 1. (in Hist. 2. in Icon.) Lamiis similis, exceptis foliis paullo rotundioribus, & albis maculis aspersis: Ego duas plantas nondum facio. C. Bauh. phyt. Lamium 2. siue purpureum folio oblongo, non solum a priorie ratione formæ foliorum differens, sed etiam odore: hoc enim non foetet. Lamium purpureum a nobis semper fuit obseruatum foetidum. Gerard. Lamium rubrum Item Lamium Pannonicum siue Galeopsis. A Gerardo non bene pro Lamio Pannonico Clusii ponitur icon Tabern. Galeopsis primæ.

C. B. nat.

Lam. rubrum
Gerardus
not.

Camer. in Epit. Matth. itemque n. Germ. hanc figurâ exprimit titulo Galeopsis. Cur verò Lamium Euch. Ræfl. germ. Unser frauen schülün vocet, rationem non habet.

An Thal. Galeopsis rubra? An Anquill. Lamium Plinii, Bononiensibus Milzatella, quasi piccola Milza. Milzadella Cæsalp. vulgò dicitur, quia alienosis egregiè opitulatur.

Locus &
Tempus.

Galeopsis purpuream in Italia inter Vicentiam & Villanouam vidi florentem Martio, Genue: Nouembri, Basileæ Octobri, Monspelii toto anno floret. Montbelgardi frequens est etiam in horto

Ill. E. C. spontè, florens Aprili: Amat ædificiorum areas, plateas & hortorum sepes.

Foetidi est & grauis odoris. Eius calor & siccitatem sapor arguit, inquit Schvvenkf. qui ex Diofcoride eius folia durities, strumas, & carminomata discutere, itemque ad putrescentia vlcera, gangrænæ, & nomas vtiliter cum sale illini perhibet.

Galeopsis folio maculato.

Scalia planta Vrticæ foetidæ non absimilis, quæ à lacteis, maculis singula folia in longum procurrentibus, Vrtica lactea, à Senensibus vulgò cognominatur, quam rectius forte quis Galeopsis dixerit, si à *gala* dictam esse statuat. quod ex Diofcoridis ordine coniecturâ quadam colligi posset: hanc legitimam esse Galeopsis, quasi affirmare non dubitarem, inquit Matthioli, nisi Plinius eam Lamium appellari prodidisset, laudibusque extulisset album, quod medio in folio habet. Quibus sanè Plinii placitis decernere cogimur, primam, quam Vrticam foetidam diximus, esse Galeopsis: alteram (hanc) verò Plinii Lamium. Sed si sustinere velimus hanc secundam esse veram Galeopsis, dicere nobis liceat, Plinij non cognouisse Galeopsis: neque id fortasse temerè diceretur, quod in multis aliis Plinius euidenter errasse deprehendatur. Hæc ille. Ego facile crediderim eandem esse hanc cum præcedenti Galeopsis purpurea, & in foliis foliorum maculis consistere differentiam.

Camer. in horto vocat Lamium Plinii, & Milzatellam Italorum, in foliis albas maculas proferentem, in locis humidis & opacis circa fossas. And. Spieg. Lamium verum Plinii. Schvvenkf. Lamium pictum. C. Bauh. phyt. Lamium 3, maculatum, & Milzadellam Cæsalpini, de qua vide plura cap. præced.

Solenander tradit eius vsum esse crebrum in Hetruria, exhibendo puluerem foliorum in ouo sorbili in lienis obstructionib: atque asserit scilicet puluerem istum in vino feliciter se in iisdem affectibus exhibuisse.

Galeopsis siue Vrtica iners floribus albis.

Tragus huius meminisse videtur Vrticæ quintæ neque pungentis, neque vrentis, floribus albis titulo. Fuchf. vocat Lamium 1. siue floribus albis, Lamium Plinii propriè. Camer. hort. Lamium Tragi flore candido. Lobel. in Adu. & Obs. p. 280. itemque Icon. Plant. Lamium siue Archangelicæ flore albo: perperam Galeopsis Herbariorum Matth. Lacunæ. Tabern. Lamium 1. album. Iconè Tabernam. Lami albi malè pro Marrubionigro ponit. C. Bauh. phyt. Lamium 2. siue folio oblongo flore albo. Schvvenkf. Lamium candidum.

H. Lugd. p. 1246. Lamium Fuchfii vocat; Lami Plinii putatum, vrticam inermem & mortuam floribus albidis, seu pallentibus, vulgò Archangelicam, ab extimis viribus: Lamium fortasse à florum figura, veluti cucullo lacratam Lamium quandam representante: Italorum Milzatellam, & Herbam de la Milza, ab insigni eius aduersus splenis obstructionem & duritiem efficaciam, qui splen illis Milza vocatur: Galeopsis Matthioli Lobelii. Falsò autem ita vocat: reicit enim Lob. eorum opinionem, qui Galeopsis Matthioli statuunt.

Turnero

Turnerò dicitur Lamium, siue vrtica iners aut mortua alba. Cordo in Diof. Galeopsis flore candido. Thal. Galeopsis Matthioli, seu vrtica vulgaris mortua, flore verticillato candido passim, grandiore nonnunquam folio locis pinguiorib. Dod. lat. in fol. vrtica iners siue Lamium primū. An Celsalp. Leucas montana Rosculus candicantibus, nullam albam maculam habens in folio:

In Italia vidi florentem Martio inter Brentelam, & Vicentiam; Lugduni mense Aprili, & in Sabaudia circa Mirebel; itemque Montbelgardi in horto Ill. E. C. frequentem spontaneam. Humida & opaca occupat loca fossas & areas, Iulio flores ostendens, Schvenckf.

Calidum siccumque est Lamium, id quod ex facultatibus eius & amaro constat gustu. Ex vino porum iccidiis adimit obstructions. Flores Lamii candidi menstrua muliebria alba absumere [sistere Dodon.] foeminarum experimento celebrantur, putatūque à nonnullis in eum vsum ex floribus istis cum faccharo (vt vocant) conferua, quam singulis aliquot diebus sumendam præcipiunt. Herba tusa auctore Schvenckf. cum sale plagis & contusioni vtilis, nec non vlceribus putridis & vulneribus, vlcera, peripiginosa, vulgò den murr, imposita sanat. Recentiores Vrtica hac mortua vntur (id quod legitur est apud H. Lugd.) sistendo ruentis è naribus sanguinis impetu ceruici, vel scapulis alligando: nam inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum.

GALEOPSIS SIVE VRTICA INERS flore luteo.

CAP. CXX.



A Superiore Galeopsi alba differre non videtur, nisi proceriore caule, numero flore, hirsutior folio: flore pereleganti luteo toto, labello saturatioribus punctis & striis croceis notato: aliàs modò unicoloribus, aliàs labello modo picturatis.

Tragus hanc Galeopsios nomine pingit, ac Vrticam sextiã

facit floribus croceis. Fuchf. Lamii genus alterū. Dod. gall. Lamium luteum. Hi tres vnã iconẽ & descriptione, Galeopsum purpuream, albã & luteam complexi sunt, colore tantum ab inuicem distinguentes, ignoranter quidem, quicquid dicant: picturã autem hanc potissimum exprimere videntur.

Cord. vocat Galeopfin flore luteo. Dod. lat. in fol. Vrticam inertiẽ tertiam, siue Lamium luteo flore. Tabern. Lamium 2. luteum, Calsp. Bauh. phyt. Lamium 2. siue folio oblongo luteo flore. Schvenckf. Lamium luteum, & Archã-

gelicam luteam, geele wald Kiesel / geeler basen Koff.

Nascitur ad riuos, ad piscinas, in montibus opacioribus, & aliàs locis humidioribus. Florentiã vidi in horto. In siluis opacis floret Maio mēse potissimum, & tota ferè Aestate. Apud Quados, Marcomannos & in Pannonia superiore notior est.

Non dissimilibus quoque viribus illo, sed multò efficacioribus esse perhibetur ad vulnera, vlcera, tumores.

Galeopsis, siue Vrtica iners folio & flore minore. Hęc quamproximè accedit ad Galeopfin flore purpurascēte maiorem.

Iuxta sepes, parietes, vias, in rudetibus, secus agrorum margines, ac in ipsis quoque aruis obseruauit Geneuæ, aliisque in locis florentem magna ex parte tota Aestate. In hororum areis parum excultis non rarò occurrit, & valdè molesta est, vt Montbelgardi, florens ibi Februario, Martio, Aprili, ac etiam Septembri.

De Galeopsios viribus in genere, & de nonnullis aliis Galeopsios speciebus, ceterisque plantis illi affinis.


Vrticas inertes omnes eandem cum vrentibus vim habere, plus tamen posse in externis vlceribus, & tumoribus dissipandis credidit Tragus: quapropter illis in balneis ad vaporaciones & emollendum vterum vti consuluat, præsertim filuetri, quam Heracleam dixit, nos Galeopsum magnam fortissimam. Experientia probe certa de olentibus Vrticis, quæ in vetulitis areis & sepibus proueniunt: illæ enim si virentes adhuc contundantur, earumque succus cum foliis cataplasmatibus instar, phagedænæ, quam Gerden worm vocant, imponatur, breuẽ eam enecat bunt. Amb. Paræus Galeopsis cuiuscunque generis succum ad hæmorrhoidas commendat. Plura lege antè in specie, & de Galeopsi veteru.

De ceteris Galeopsios speciebus, Lamio, Cannabifluestris, ceterisque affinis plantis, consulat lector huius Tomi Appendicem: Nos enim ibi de his: nec hic præterquam Locusta herba superest Locus, cuius historiam ad huius Libri calcem tradidimus superiori promissimus.

LOCUSTA HERBA.

CAP. CXXI.

Locusta herba prior.



Descriptio

Herba Locusta dicta, parum interdum palmū superat, aliàs dodrantalis & maior, etiam cubitalis, radice donata tenui, adimum fibrosa, gustu subdulci & ferè insipido: folia tenera & delicata, longitudine semunciali, vnciali, aut sextantali, colore herba-

ceo latitudine trientem vnciz parum excedentia subrotunda, nullo pediculo appensa, interdum serrata, superiora sapore ferè eodem cum radice, à qua vnica caules plures, angulosi, tennes, brachiati, binaque ramulorum coniugatione semper diuisi: inter foliola summorum ramulorum *slofculi* simul aliquot pulchelli, albidi, aut diluta purpura languentes, oblongi, in quinque lacinias dissecti, apices amplectuntur tenuissimos, obrutum ferè fugientes *semen* obseruare non licuit.

Icones.

Iam, antequam ad alia deueniamus, figurarum nostrarum reddenda ratio. Est autem prior ex ipsa herba viacente, cui appingi curauimus Oleris albi ramum Agerii. Altera ex Icone Plantiniana Phu minimi alterius p. 717. foliis nempe serratis, qualis inter nostras herbas siccas Locusta reperitur.

Locusta altera foliis serratis

Saccharum
divaricatum
Locusta
herba.
Hermolaus.



Ceterum, meminit Locustæ herbe Hermol. Coroll. 256. dum inquit: In sacris certè literis sunt quibus Locustæ mandī solitæ, non animal insectum, sed herbam hoc nomine significant. In qua sententia magnus auctor Chrysostomus & prior eo Athanasius fuisse creduntur, quasi pro animali acceptæ, vespando non essent. Cum tamen in Africa vt Dioscorides commeminat, ad Leptin cibo

etiam frequenti commendatur, & hodie quoque vulgò eas comedant Egyptii. Plinius etiam gentem quandam & Aethiopum quoque partem Locustis tantum viuere fumo & sale duratis in annua alimenta prodidit post Diodorum Strabonemque, vt ob id Acridophagi [Acridas enim Locustas Græci vocant:] nomen habeant. Locustam igitur, siue Pedem locustæ pro herba sumptam interpretantur, quam vulgò Rapunculum, siue Napunculum vocamus [H.n.g. lib. 23.] folio angusto, desinente in mucronem, cauliculis vertice torulos habentibus, vt in Asparago & Salsicario lupo cernitur. Itemque multi lateris. Ex quibus minores alii, alterno semper inguine profiliunt. Radicula vel diuicium, laurorumque mensis perita: Rapiſtri quidem sapore: non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniucundus: semen ei tam exiguum, vt discerni ferè aliter non possit, quam grana sabuli. Alii Pedem locustæ pro Blito aut valdè simili herba capiunt in Arabicis scriptori-

Acridophagi.
gi.
Pes
locustæ.
Rapunculus.
Napunculus.

Blitum.

Acris

bus. Sunt etiam qui vocabulo Acridis non herbam vnā aliquam, sed summam omnes, quibus victitavit homo sanctus in solitudine, intelligi velint. Dioscoridis certè paniculas Auenę dependentes Locustas appellauit.

Gesnerus de hort. vocat Locustam herbam foliis ferè Oleæ: Oliui etiam sapore quodammodo, inspidam alioqui. Lobel. in Icon. Plant. p. 717. Phu minimum alterum inscribit, vt etiam in Obs. p. 412. vbi ait vocari Gallo-Belgis *Salade de Chanonne*, Velt troppen verò Belgis: quasi dicas Lactucam campeſtrem, quia folia primo pullulatu habet Lactucis aut Seriolis adhuc tenellis similia.

Phu minimi alterius Lobelii imaginem & descriptionem assumpsit H. Lugd. p. 1127. Cuius tamen & aliam figuram & delineationem ante p. 554. Polypremi titulo dedit: addens vulgò appellari de la Blanchette & Poule grasse.

Tabern. tam in Icon. quàm Hist. duplicem exhibet picturam, Lactucæ folicet agnuz primæ & secundæ titulo.

C. Bauh. phyt. dicitur Valeriana n. siue campeſtris inodora maior, quæ Bupleuron, Hippocratis apud Plinium lib. 22. cap. 22. ipsi videtur, Itemque Phu minimum alterum Lobelii Obs. p. 412. & Icon. Plant. p. 717. Eidem vocatur Valeriana 12. siue campeſtris inodora lacinata, & Herba S. Clare Monspeliensium, ac etiam Phu minimum Aduersar. p. 319. & Lob. Icon. Plant. p. 716. Dod. lat. in fol. huius meminit nomine Albi olearis.

Locusta herba Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine Sturgardiâ misso, nomine Sonnenwurbell, sata mense Ianuario & Februario, frequens prouenit. Huius verò semina quidam mense Septembri terræ committere solent, quò hybernis mensibus in acetariorum vsum venire queat. Locusta herba, Pinguicula aliis dicta, aliis Lactuca agnina: Germ. *basenorlin* / *Rebens* / *Freſſig*: Geneuz *Rampon*: Burgundis *oreille de Lieure*, frequens est in agris, vineis, & hortis, teste Tabernam.

Quam porò Hermolaus in Corollario, si bene memini, ait Gesn. in epist. ad Cos. Holz locustam appellat, aliqui eas esse Locustas nugantur, quibus in deserto Io. Baptista pastus sit Refrigerans est hæc herba, & nonnihil humectans, facultate ac temperamento Lactucæ haud dissimilis: cuius loco hybernis & primis Veris mensibus infertur, ac cum aceto, sale & oleo iucundè editur, veluti alia acetaria: inter quæ haud postremum locum obtinet. Ambæ Lactucæ agnina, Tabernomontano id referente, grati sūt saporis, alium emolliunt, præsertim si cum iure carnis bouinæ aut veruecinæ coquantur, atque calidè coctarum ius absorbeat. Frequens earum vſus in cibis potissimum per totam Hiemem niue liqueſcente & Vere, vſque ad mensem Aprilem donec caules ferat. Salubriter exhibuit gratum hunc & sanum cibum febricitantibus, qui ab esu carniū abhorrent, Spinachiorum modocōcisum & in iusculis cum omphacio decoctum. Agni demum huius pastu multum delectantur, & iuantur, impinguanturque.



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XXIX.

CORONARIÆ SEMEN IN VASCVLIS ET CALYCVLIS
GERENTES, ET QVÆ FLORVM FOLIORVMQVE, AC TO-
tius aded Plantæ, forma nonnihil accedunt.

Coronariarum vel per se tantum immensa contemplatio, si quis estimet varietatem, numerum, flores, odores, coloresque & succos, ac vires earum, quas varietatis fluidissima natura, selectis, aut voluptatis gratia gignit. Est sane, ut Plinius ait, inenarrabilis florum maximè subtilitas, quando nullis potest facilius esse loqui, quam rerum natura pingere, lasciuienti prorsum, & in magno gaudio fertilitatis, tam variè ludens. Quippe reliqua, usus alimentique gratia gignit: idèque seculis, annisque tribuit. Flores verò odoresque in diem gignit: magna (ut palam est) admonitione hominum, qua spectatissimè si reant celerrimè marcescere. Sed ne picturâ quidem sufficiente imagini colorum reddenda, misturarum varietati siue alterni æque multiplices inter se neantur, siue priuatis Generum funiculis in orbem, in obliquum, in ambitum quadam corona per coronas currunt. Coronarias porrò omnes hoc vno libro complecti nec volumus, nec possumus: n, in nec rosa natura unico hortu, unicâ tribu, completi potis, alias in fruticum, alias in herbarum, & harum rursus in nonnihil diuersis familiis collocant. Dicemus autem potissimum vascula ferentes post florem, & his iunctis specie accedentes, ut Limfolias, al sinefolias, &c.

DE BETONICA CORONARIA SIVE CARIOPHILLO
flore in genere: & specialius de vulgari latua flore pleno.

CAPVT I.



IX in omni genere stirpium villa existit quæ tantâ colorum varietate flores suos commendet, atque Betonica coronaria, cuius duo fastigia summa: Alia enim syluestris, alia latua: Hæc rursus nunc simplici foliorum in floribus ordine contenta est [minor Dod.] nunc duplici prædita [maior Dod. qui & Armenios flores in Cariophyllorum numerum recipit:] de quâ præfens instituitur sermo.

Ex Cariophyllis itaque plenis [etiamque simplicibus plerique foliis sunt] è singulis geniculis, binis, angustis: alii penè teneris, ac breuioribus magisque exiguis [potraceis Ruell.] duris, per extremum acuminatis, cæsis quasi, siue glauco, colore: caulibus læuibus, teretibus, cubitalibus, raro altioribus, geniculatis, nodosis: in quorû fastigiis longiusculis spectantur calyces teretes, orbiculo superiore denticulati Ruell. quibus dehiscentibus paulatim diuersa apparent florum genera, candida sc. ex cædido purpurea, coccinea, nigricantia, vermiculata, diuersoque colore variegata, idque non vnâ, sed variâ ratione. Inuenias liquidè in quib.

Tom. III.



rum genera, quod ad colorem attinet, hæc est, partim candidi, rubrisque maculis notati, partim

candidus, & coccus, color ita miscetur, ut in alio candida, in alio rubra foliola nuxvero superiora euadant. Quid? quod nonnullos videas ita candidos, ut minutissimis rubris punctulis sint redimiti, contra qui rubent lacteis notis aspersi videntur. Postremò ex vno & eodem calice non raro duo florum

LI

candidi, rubrisque maculis notati, partim verò coccinei, proflunt, & quod mirū magis videri possit, sæpè vno pediculo diuersi coloris flores suffultos, deprehendas, quod ipsum non semel se obleruisse testatur Tragus, in florum medio staminei emicant gemini apices candidi: semen in vasculis oblongis, paruum ac nigrum Dodon. latum Cæpæ simile Trago: radices fibræ: simplices, geniculatæ Ruellio.

Nomina
linguarum

Quam Betonicam coronariam magis propriè appelland. in censemus, Caryophylleum florem ab odore Caryophyllorū Recentiores nominant, licet sint alij odoratiores māgonio, alij minūs, & alij etiā inodon: Dicūt Germ. *Negelin, Negelblumen* & *Grassblumen*: Belgæ *Ginosselblumē* & *Groffelsbloemē*: Galli *Ocellers*, & *Ocellersita*: Itali *Garofoli*, & *Garofani*: Hispani, *Clauel*: Angli, *Gelsiflores* & *Gelouera*. Bohem. *Barasfille*, Hung. *Zecf* fuu.

Betoni coronaria indid. & a Veter.

Ioh. Ruell. (& post eum Eur. Cord. itēque Matth.) Caryophylleum florem incognitum Veteribus existimauit; cuius optimum iudicium videtur. Mirum creditur, ait, vt tam celebris flos itāque iucundus fuerit à Veteribus silentio prætermisus, qui amplitudine, pulchritudine, varietate, Rosā non inferior videri possit, imò cum eā de principatu certet; quando nec colore superatur purpureo, candido, vermiculato: nec odore, nisi quoddā longinquo plūs olet recens Rosa. Iam nihil Rosā fugacius, longissima nāque decepta mora dies: illi in quadrūm & amplius vita vigorque durat, aliquibus potissimū Damascenis. Tanta magnitudo eorum curā, vt orbem vtrique manus, completi ferè nequeat. Non defuere qui Baccarem id genus esse floris existiment, sed sylvestris, toto herbe habitu apertissimè reclamante, Alij Caltham Veteribus fuisse putant. Sed cū Virgilius luteolo colore nobis tinctam cecinerit, nec Plinius à Virgilio dissentiat, non video quī possit ita statui. Vetoniam hanc coronariam, Galli à specie floris, vt arbitror, Ocellum: ab odore Caryophyllum nominant: vulgus verò Ocellum Damascenum appellari existimat, quoddā fortasse è locis quorum gentilitiū nomen refert, ad nos venerit. Sunt qui Oenanthem quasi Vitifloram putant dictam Theophrasto. Sed cū flos Oenanthæ racematim cohzreat: huic autem in pulcherrimas Rosas, nec vsquam vnā videantur in racemosam speciem colligi, sed vertices furculorum coronare, certè altilem hanc Betonicam Theophrasti ætas non nouit.

Turnerus contra Fuchsum (qui Vetoniam sine Betonicam inter notha Dioscoridis, esse voluit) negat Caryophylleum florem esse Betonicam, (quā de re tamen dubitet Lobelius) asserens Cantabricam Plinij. Sed nec Tragus vllum ex Caryophyllez generibus ad Betonicam pertinere testatur, ac propterea genus hoc Caryophylleum altilem & Narcissum Germanicum vocauit.

Ocell. Barbaricum.

Quam Recentiores Caryophyllos, & nonnulli etiam Ocellum Barbaricum & Barbaricam nuncupant, Gesner. hort. Betonicam & Vetoniam, altilem aut coronariam cognominat [Matthiol. Vetonium Coronarium dicere maluit Dod.] ad differentiam sc. alterius Betonicæ, quæ Græcis *κίση* & *κίση* dicitur: atque hinc etiam, Tunicā flores dictos, vel etiam Tunicam

herbam cum plerisque hanc esse existimat: licet Bernardus Gordonius herbam Tunicam, Dioscoridis Polemonium esse tradat. Caterum, Iphyum apud Athen. lib. 15. quidam esse voluerunt annotante Dalechampio. Alij Iphyum Theophrasti & Hist. 2. & 7. Hist. 12. sed malè, Bulbosam enim esse plantam vel ex Theophrasto liquet. Aliqui tandem inter Saxifragias numerant, & præsertim sylvestre genus, teste Calp. Bauh. de quo infra dicemus.

Betonica coronaria satiuā flore pleno, dicitur Syon Caryophyllea Trago: Matthiolo & Camerario Caryophylli domestici: Lonicero, flos Caryophyllorum: Cræsalp. Caryofilus quem alios Viam Damascenam vocare ait. Dod. Lat. in fol. appellat Caryophylleum florem maiorem. Lobel. Obs. pag. 241. Icon. Plant. pag. 441. & Taberna Icon. & Hist. Caryophyllum multiplicem. Gesner. hort. Betonicam altilem Fuch. Vetoniam altilem: Dodon. gall. Betonicam coronariam: Laccuna Cantabricum Turneri. Calp. Bauh. Phyt. Caryophyllum 2. siue altilem vulgatum. Schv. Caryophyllum satiuum, item albi Caryophyllos domesticos plenos. Cur Gerardus Caryophylli sylvestris multiplicis titulo, iconem Tabernæmontani Betonicæ satiuæ proponit?

Betonica coronaria satiuā flore pleno Basileæ colitur diligenter in hortis & sæpe flores magni venduntur: floret Maio, Iunio & Iulio, & perunque toto anno colore albo, rubro, nigricante, rubro minūs obscuro, cæruleo, mixto ex albo & rubro: Monspeli, rubro, purpureo, rubello, vel incarnato, vt vocant, Aprilis, Maio, Iunio & Iulio: Lugduni frequens flore variegato mense Septembri: Geneuæ copiosè florens Nouembri: Montbelgardi in horto illustrat. Excell. Celsit. variorum colorum etiam ex semine flore pleno, multæ species ferunt hiemem non repositæ: quibuldam tamen infesti sunt mures, teneras summitates, si non reponantur, rodentes, quod mihi sæpè euenit. Pulcherrimi sunt illi Caryophylli maiores foliis latis, partim rubri, partim albi, & punctis rubris notati, quos Germani vocant *Junkerblumen*. Vbiuis in Silesia in fenestris, pensilibus vasis, necnon in hortorum torulis spectantur vt nihil vulgatius. Florent diutissimè tota quidem ætate, & autumnō, etiam interdum fauente loci tempore, hieme tamen rigida Schvvenckfeldio referente. Habentur in hortis inquit Dodonæus: sed speciosissimi ferè in fistilibus vasis.

Seruntur frequentius autulis exiguis cum foliis furculis, seminibus rariis: Nam è semine nati flores, ad agrestem naturam redeunt: minūsque odorati, vt simplices, etiam si prius multiplices, redduntur. Adiguntur subinde furculis plantarum filis Caryophylli, quod illorum odorem flores alliciant, & iucundam eorum suauitatem naribus abundantius representent. Viuax est planta, & multis durat annis, si hybernis mensibus à frigoris iniuriā tuta, in cellis vinariis, aut aliis similibus locis tepidis asseruetur.

Annotat Camerarius singulare huius esse floribus, vt lalminis & Rosis, quod interdum primò tabescente flore, similem alium in eodē pediculo producant: Infusione quoque propagatū vidisse se aliquando ad tantā crassitudinem in logenis plantis caulem

is caule siue stipitem peruenisse vt brachii medioctis æquaret crassitudinem. Florem variegatum efformati, si semina plantarum diuersorum colorum in calamo scriptorio includantur, terræque committantur.

BETONICA CORONARIA RARA flore phœniceo pleno.

criptio



Perelegans hæc & rarior Betonice coronarie species, caules emittit rectos, longos, subgraciles. Folia glauca cæsiave, canaliculata, firmiuscula, subangusta. In flore elegantia & varietas præcipua est. Huc antequam emergat, cornicula terna præmit: pallidè rubentia: succedit flus medioctis inter huius generis Betonice magnitudinis, cognitudinis, unde vulgò lutei dicuntur, cum tamen floris Anagallidis phœnicei colorem non malè expriment, ac etiam ad coccineum colorem accedant. Folia floris eleganter secta, veluti cristata videntur, raris subindè maculis aspersis. Eam parvo flore tria prædicta cornicula eminent semunciali longitudine plus minus, Odor gratus vè in cæteris.

phyll.
olox
us.

Betonice hanc Coronariam Caryophyllum pleno flore Silesiacum miniaturum vocat. Clusius. Schvvenck. Caryophyllū multiplicem miniaturū, Caryophyllum domesticum plenum Arantii pomi colore, Pomerantiofarbe Negelin.

Duo genera habemus Montbelgardi in horto E. C. vnum flore simplici alterum pleno: vidi etiam Stutgardie in horto Principis: floret autem Iunio & Iulio.

Præ cæteris ob colorem elegantem ad corollas in Silesia expetitur, verum odore minus fragrat.

BETONICA CORONARIA SIVE Caryophyllus maior flore vario.

Betonice huic folia lata, flores magni, valde pleni & odorati, colore vario, multis lineis & punctis rubris, quædam folia semirubra, & quædam serè totaliter, interdum in eadem planta flores omnino rubri, cæteræ partes floris albicantes.

Lob. Icon. Plant. pag. 442. dicitur hortorum Caryophyllus multiplex maior & minor rubro striatus, varicolor, peramœnus. Cæsp. Baph. phyt. Caryophyll., siue multiplex variegatus.

Figura nostra facta ex ipsa planta virente, cui appinximus folium vnum iuxta suam latitudinem & longitudinem. Flores ex Plantagio huic Tom. III.



Basilæ exellunt vbi vocant Juncfer blumen.

BETONICA CORONARIA FLORE pleno maxima, punctis rubris variegata.



appictos nolumus: Lobelia enim icon fortè melior est pro maximo Tabernemontani, licet tamen pro vario non malè conuenire possit, quamvis in eo aberratum.

Montbelgardi in horto illi. Cels. Wirt. abundant sub flores ex Butgundia eò delati: habuimus etiam ex semine Stutgardie, no minores.

Caryophyllum hic depictū apud Tabernā non descriptum vidi Atgerinæ apud Dom. Fredericum Meierum, maximum, volam maonum penè implentem, albicantem, & stigmatibus rubris aspersum, plenum, sed pauciorib. foliis quàm vulgariis maior varius.

A Tabern. icō. Synonyma

hoc titulo. Caryophyllus multiplex maximus, Groß gefült Neglein blumē/oder Grass blumē. C. Bauh. phyt. dicitur Caryophyllus r. siue altis maximus. Lobel. maior. Tabern. maximus. Lob. Obs. Belg. pag. 528. Groote debele roodtschinge vnde witachighe pespicket Ginoossen. Caryophyllus maior rubeus; & albicans, flore pleno punctulis rubentibus fortuitis aspersis. Gerardo, Caryophyllus maximus multiplex, The great double Carnation. Dod. lat. in fol. Caryophylli floris multiplicis solam iconem sine descriptione habet.

Elegantia amœnitatisque pariter ac magnitudinis spectatas nobiliores Gallie Narbōnensis ciuitates alere obseruauit Gener H. Cherlerus, Nemaufii præsertim, vbi dum ibi sub regio militaret stipendio Professor, non paucè eidem à studiosis auditoribus oblata instam Rose rubre magnitudinem æquantem. Florent Iunio Iulioque, cæpius aut tardius etiam pro cultorum industria.

BETONICA CORONARIA, SIVE

Caryophyllos flore simplici satius.

Descriptio

Tota facie satius siue domestica densiflora similis foret, si folia angustiora, & flores è quinis vt plurimum foliolis simplices responderent, qui nunc rubri, nunc albi, nunc ex rubro fulci, nunc rosei siue rubelli, nunc ex rubro & albo variegati, striis vel punctis distincti conspiciuntur, odore etiam suavi, & odoratos Indicos Caryophyllos nonnunquam referentes.

Synon:

Dod. de flor. & Latin fol. Caryophylli florem simplicem vocat, & sex vt plurimum foliolis constare dixit. Autopsia tamen nostra aliter rem habere testatur: Inscritbitur autem in Icon. Plant. pagina 240. Caryophyllus sylu. maior vulgarior.

Tab. icon. & Hist. Caryophyllus hortulanus, Betonica coronaria, Klein Same Negelin. Cal. Bauh. Phyt. Caryophyllus s. simplex flore maiore. Gerard. Caryophyllus syluestris simplex siue rubens.

Locus

S. hyvenck. Caryophylli domestici maiores similes rubri, albi, miniati, purpurei variegati, Einsiede oder hole Negelin/ rot weiß, leibfarbe/ Pomeran farbene, wingespir gre. Ex semine facile nascitur & hiems si gora perferit in Silesia.

Betonica coronaria flore simplici satius eodem tempore floret cum domestica plena, ex cuius etiam semine vt plurimum pronascitur.

BETONICA CORONARIA SYLV.

flore simplici laciniato rubro.



Lobel. Icon. Plant. pag. 443. Caryophyllum syluestrum flore simplici laciniato rubro inscribere videtur I ceticon non in omnibus titulo respondeat. Casp. Bauh. Phyt. Caryophyllum 7. siue simplicem minorem.

BETONICA CORONARIA ARBOREA

Cretica.

Descriptio

Dvis stipitibus & nodosis fruticat, crassiusculis & ramosis: folia glauca, sesquiuicium circiter longa, angusta, rigida, in acutum & pungentem mucronem desinentia, in stolonum & surculorum extremis duntaxat confertim posita conspiciuntur, vt muscaria totidè videre videaris, nam in reliqua ramorum parte, caduca, vestigiis relictis nodosam illam aspredinè efficiunt calyculi antequam in flores explicantur, exigui Echini instar spinulis hærent ipsèq; ad eò eius mucro pungit: ceterum manentibus iisdem spinulis calix productior redditus florem exhibet simplicè cincinnatè rotunditatis, è quinque foliis conflatum



quem noster pictor non bene expressit in nostra iconè, per extremam oram incisus, colore diluè purpureo præditis, striatis, paulò vltra mediū lineola guttata saturatius ruber te pictus, ex quantū omniū concursu circulus describitur, infra què lanugo quædā apparet: mediū occupant stamina florum concoloria.

Quartus iam est annus quod Locu temp

Semen Stutgardiam à Iosepho Cafabona hortulano ducis Florentiæ, nomine Caryophylli arboris Candix missum accepi. Floret mense Iunio & Augusto, hieme in hypogæum reponendus: multis anni mihi duravit.

BETONICA CORONARIA SIVE

Caryophyllea repens, tubra & alba.



Dies huic sunt cauliculi teretes geniculati: folia in singulis geniculis bina inter se opposita, oblonga, angusta, dura, mucronata, colore quasi cæcio, stros è calyculo rubente emergens, singulis cauliculis vnicus plerumque insidet, (interdum binus) quinque foliis constans, lentè fimbriatis, coloris in

dilatà purpura rubentis, circa vmbilicem hirsutus, & saturatior purpurâ nitens, atque odor ex vnus medio vmbilico duo breuia stamirula prominent: semen in calyculis paleaceum, sulcū: radix longa, tenues fibras spargens, ex cuius capite plures cauliculi latè in ambitu, & confertim sese diffundunt, fibrasque subinde agunt.

Cuius descriptionis author, tam in Pannon. quàm in Hist. post. caryophylleum siluestrum primum inscribit, narratque esse qui Vetoniam appellare maluit. Non desunt tamen qui ad Plin. cantabricum referendam putent. Germ. Wilda negelin, Steinnegelin vocant. Vngari Zet sil. Geln. hort. & Lob. in Obs. Syluestrii a vetoniarum species floribus albis. Ruell. Betonici vultantari: Betonica posterior. Tab. icon & Hist. caryophyllus virgineus, Jung frauen negelin. Dot. lat. in fol. Armerius flos tertius non nihil odorator, colore vt plurimum eleganter rubens. An Camer. caryophylli sylv. odorati & inodori languinei

sanguinei coloris flore pleno. Arido & inculto solo, quandoque iuxta margines aruorum in ple-
risque Germ. Bohem. Silesiæ & Moraviæ locis fre-
quens reperitur. In multam ætate floret & viget,
autore Dodonzo. Genevæ habui, & etiam nunc
Montbelgardi habeo florentem Maio & Iunio.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllea Corolla purpurea
insignis.



Non a'te
aufurgit
& hæc Caryo-
phylli species,
Rami supra
terram sparsi
vt in Betonica
coronaria re-
pente, denso
filiorum stipa-
tu muniti, mi-
nus cæliorum:
qui ima parte
duriusculi &
ferè lignosi,
caules in duos
aut ad sum-
mum tres alios
ramulos diuisi,
quorum qui-
libet singula-
rem sustinet

florem elegantissimum, quinquepartitum, in am-
bitu pulchrè dissectum, & in medio aræna co-
rolla saturatiùs purpurascens decoratum. Cuius
odor suauissimus gratissimisque.

An Lob. Obs. pag. 241. Armerii floris varietas?
Eleganter prouenit Stutgardia & Montbel-
gardi in hortis Ill. Ducis Wirtembergici ex semi-
ne. Præcox est, & reliquos anteuerit: floret cum
coronaria repente antè dicta Maio. Iunii medio
penitus defloruerat.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllea ex rubello albicante &
crispante flore cum corolla.



Tom. III.

Betonica hæc
coronaria
obseruata Stut-
gardia in horto
Ill. e. c. florens
Maio, similis
est nostræ re-
penti foliis: ea
tamen paulò ci-
tius floret: flos
autem simplex,
quinquefolius,
ex rubello albi-
cans, corollâ
sternis purpurâ-
centibus &
fimbriâ nonni-
hil crispa.

BETONICA CORONARIA MINIMA
micis aureis aspersa.



cem minorem alterum. Nec plura de hac Betoni-
ca legere memini.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllus minor folio viridi,
nigricante, repens, flore
argenteis punctis
notato.

CAP. II.



Lob. in Ob-
serv. Belg.
pag. 330. sub
hoc titulo pin-
gitur: Alder
cleynse redt
op Gaende
Zeer aerdtighe
ghepleeste wils
de Ginoefflen/
Caryophyllas
alter minimus
flore simplici
micis aureis
asperso: Et hæc
inscriptio
habetur etiam
in Icon. Plant.
p. 444. C. Bauh.
phyt. nominat
Caryophyllum
s. sine simpli-

Foliorū hu- Descriptio
ius Caryo-
phylli raritas
descriptionem
promouit est:
ea enim tam
sunt Hyslop
foliis toto vul-
tu similia, co-
lore, figurâ, nō
item odore &
sapote, vt le-
genti impo-
nant: ceterum
coliculi palma-
res, Caryo-
phyllorum sil-
uestrum in-
star geniculati,
nonnihil aspe-
ri, subhirsuti,
flore sustinent

Caryophylli siluestris, quinquepartitos, supinâ
parte hirsutos, suæ rubentes, argenteis punctis
guttatos, quorū singula folia lambdoeides linea
coccinea saturatior pingit, oræ autem crenatæ
sunt: porro autem pronâ parte color est ex lu-
teo virescens, leui rubore perfusus marginibus:
reptatrix est planta.

An Lob. Icon. Plant. pag. 444. Caryophyllus
minimus pulcellus lupinus, maculis aureis argen-
teisve aspersus?

Clus. Hist. post. Caryophyllei silv. 7. inestig.

ptione pingit & supini cognomento describit.
 Locus & Nobis Mörbelgardii floret Maio & Iunio: Clusius verò crescere audiuit in monte illo non procul à Niclasburg Moraviae diffuso & vmbrosis locis delectari.

BETONICA CORONARIA MINIMA

rubello flore pleno, repens.

CAP. III.

Descriptio **B**etonicam coronariam minimam reperit in caulibus in aliquot ramulos diuisis, in eorumque extremitate singularibus floribus, parvis, plenis, rubellis, foliis breuibus, latiusculis, florentem vidi Iunio Heidelberg apud Dom. Sprengerum, Spitz apud Dom. Tengenadel, & Argentina apud Dom. Frid. Meier.



An Tabern. Icon. & Hist. Caryophyllus 15. montanus multiflorus, geniculatus, stein n. glan.

An Gerardo Caryophyllus montanus purpureus wild Purple jagged Pinkie:

BETONICA CORONARIA FOLIO

aruginoso latiori, flore rubro laciniato, repens.

CAP. IV.

Hic cauliculi paulò maiores crassioresque [Betonica coronaria parua folio viridi, flore magno.] Pedali plerumque altitudine assurgunt, geniculati, singula genicula ambientibus binis foliis, primo genere (Beton. coron. repens, flore rubente & albo) longioribus & latioribus aruginis quodammodò coloris: ex summis albis binis, ternis, singularim autem nascentes flores, priori nominatae non multum ab similes, quinque foliis per oras laciniatis, atque vmbilicum carneâ lanugine pubescentibus, constantes, rubri coloris, nullis corniculis inflexis praediti, odorati, qui è caliculis primùm emergentes; candidi futuri videntur: floribus succedunt cornicula satis crassa, semen nigrum, planum, ut ceteri Caryophyllei, continentia: radix oblonga, fibrosa, à capite plures furculos in orbem diffundit, qui plerumque fibras agentes, adeò se propagant, ut breui totas atcas occupent.

Caen.
Radix

Synon.

Locus

Tempus

Clusius descriptionis autor vocat Caryophylleum tertium: C. Bauh. Phyt. Caryophyllum 26. siue filuestem Pannonicum, laciniatum rubrum. Vnde autem primùm illatus, ignorat: sed in omnibus Austriacis, Vngaricis, Bohemicis, etiam Germanicis plerisque hortis coli refert, & Maio

menfe cum reliquis florere.

Temperatura mediâ praeditos esse Caryophylleos flores voluit Tragus. Sunt qui ex iis Conferuas, ut vocant, conficiant, quemadmodum & Rosae, Buglossae, & Violae saccharo conditi confueverunt. Eiusmodi confectio imbecillitati cordis praesertim in ardentibus febribus apprimè conducit: alij aceto imponunt flores Caryophylleae rubros, quod iucundo odore commendat: hoc acetum dolorib. capitis olfactu & illitu temporibus, opitulatur. Flores Caryophylleae campestris, qui naturâ ceteris calidiores existunt, destillantur. Ea aqua singulari experimento ad pellendum, calculum mensurâ duum aur trium cochlearium bibitur. Calidâ, sicquæ pollere facultate hosce flores perhibet etiam Matthiolus. Et sanè indicio esse potest odoris fragrantia & saporis amarulentia quaedam. Qui purpureo colore nitent, praestant ad omnes cordis affectus, ad vertiginem, apoplexiam, paralysem, & convulsiones, ex Betonica, aut Amaraci decocto poti. Afferuntur saccharo, non solum ad praedicta omnia viles, sed etiam aduersus venena, venenorumque animalium ictus. Dantur contra pestilentiae contagia. Id quod valentius operatur succus, ex vniuersa planta expressus. Haustus enim quatuor vnciarum pondere, ubi morbus inuaserit, liberat. Praestant syluestres quoque ad ea omnia, ad quae satius siue altius praestare diximus, verum longè remissius operantur. Fuchsius filuestris succum calculo atterendo, ac educendo, necnon comitiali morbo laborantibus à recentioribus vilem credi, scriptum reliquit. Praestant (inquit Schvveitck) purpureo nitentes colore, Caryophyllos aromaticos redolentes: roborant ventriculum, cerebrum, cor, & iecur, vnde commendantur ad omnes praedictorum viscerum affectus, antidoris quoque inferuntur. Succus haud inferior eo, qui ex granis tinctoris Kermes dictis colligitur. In cordis affectibus, palpitatione, lypothymia, in capitis malis, vertigine, apoplexia, paralyfi & convulsione, cephalalgia, &c. ventriculi imbecillitate, cardialgia, &c. praestantissimè remedium. Commodissimè etiam in febrib. malignis propinatur. Acetum florum Oxyrrhodinis vtiliter permiscetur. Aqua ad eosdem vsus vitreis organis elicitur. Iulepis cordialibus & epithematibus hepaticis & cephalicis non sine fructu miscetur. Radix inodora, insipida, cur floribus in compositis sit praerenda, non videt Schvvenckfeldius. Plura qui vult de Caryophyllorum florum viribus & vsu, legat Tabernamontanum, qui ex iis, & vinum, & syrupum, atque oleum fieri commemorat. Gesnerus pro Been albo & rubro flores Caryophyllorum eiusdem coloris, id est, albos & rubros saccharo conditos substituit.

BETONICA CORONARIA TENVISSIMA

dissecta, siue Caryophyllea superba elatior, vulgaris.

CAP. V.

Caulis huic sunt multi, cubitales & bicubitales, ramosi, geniculati, foliis inferioribus pluribus, latiusculis, dorsantalibus, virelcentibus, superioribus ceterarum Betonicarum coronarium similibus, binis, geniculos amplectentibus, saporis amari: flores sparsi ex pediculis longioribus



ribus, quinque foliis, nunc albis, nunc purpurascens, constantibus, longissimè & tenuissimè dissectis, virbilico-virescente, hirsuto, odore suavisimo: *ascilla* succedunt duas penè vicias longa, tenuia, supèr à parte in quatuor partes crenata, extra calicem eminentia, qui tunica constat & aliquot breuib. foliis

iuxta principium: semine abundant nigro, compresso.

Trag. in Hist. germ. vocat *Müsterwils* & *hochmüt*, i.e. Superbam: in lat. Caryophylleam siluestrem alteram, flore odorato, ex cand. leuiter purpureo: Anguill. epist. 12. Diolanthon Theophrasti: Gesl. hort. Vetoniam tertiam: Fuch. Betoniam silv. alteram.

Clus. in Pann. p. 325. inscribit Caryophylleum 6. cognominatque siluestrem 2. tenuissimè laciniato & albo flore: In Hist. post. Caryophyll. silv. sextum: Caryophylleorū florum sextum genus, Austriacis mulieribus ob odoris fragrantiam in deliciis habitum.

Tabern. dicitur Caryophyllus silv. plumarius albus, Weissfeder aut Pflaum Niegelen, wider müßwilen: Gerard. white wilde, jagged Pinke.

Lobel. in Adu. Superba Recentiorum, phœniceā purpurā insignis, Centaurio minor concolor: in Obs. p. 43. Superba Fuchsi & Recentiorum, Italorum *Fior d'amor* & *Balsamin*: in Ic. Plāt. p. 45. Superba Austriaca Clusii.

Schvenderk. Caryophyll. silv. 2. colore varians, candido aliquando, interdum purpurascens.

Dod. gall. Betonica altis minor, tertia Vetonice species, Vetonica altis, aut coronaria. Lat. in fol. Caryophylleus minor alter, Vetonica altis siue coronaria minor, aut altera nonnullorū, Belgis à flosculorum foliis fimbriatis & plumarum similitudine dissectis. *Pflümfens klein Gienoffen*, h.e. Caryophylleus minor appellatus.

C. Bauh. phyt. Caryophyllus 20. siue altis flore tenuissimè dissecto: Superba Tragi: Vetonica altis minor Dod. gallica: Superba alba, medio corolla purpureo-violacea obsoleta cincta: Item, Caryophyllus 22. siue silvestris alter flore laciniato odoratissimo, Caryophyll. 6. Clusii. flore nunc candido, nunc purpurascens: Superba Austriaca Clusii.

Betonica coronaria, siue Caryophylleus superbus elatior vulgaris, tenuissimè dissectus Babilæ floret Junio & Iulio: Genevæ colitur in hortis: in Sabaudia silvis copiosè reperitur, item in Sandecouia circa arcem Möspurg diuersorum colorum, Montbelgardi in orto Ill. & c. floret in fine Iulii & Augusto: semen maturat Septembri. Clusio auctore spontè nascitur in humi-

dioribus Viennensis agri pratis, atque etiam ad cæduarum silvarum, pratis vicinarum, declives margines, plenique Austria locis: feriis reliquis floret, nempe Iulio & toto Augusto, interdum etiam feriis. Apud Belgas hortensis est.

BETONICA CORONARIA, SIVE

Caryophylleus flos, folio tenuissimè dissecto, flore pleno purpurascens.

CAP. VI.



Duple x est Descriptio

Hæc Superba plena: vna enim intensius purpurascit, & speciosior videtur, altera paulò minor, minus purpurascit, & plures albas ferè partes habet: folia vtri- que angustiora, & non ita glauca, vt aliis Caryophyllis plenis. Noster pictor folia paulò latiora pinxit.

Inscripsit hæc Synop.

Lobelius in Icon. Plāt. p. 442. in Obs. Belg. p. 59.

Caryophyllum purpureum flore multiplici profundè laciniato. C. Bauh. phyt. Caryophyllum 4. siue multiplicem profundè laciniatum.

Superba plena duplicem differentiam ob. Loc. & seruauit primò in Plumberg apud nobilem Joh. tempus. Chutophorum à Pfort: post Stutgardia in orto Ill. & c. florentem Nouembri: Montbelgardi floruit Iulio.

BETONICA CORONARIA, SIVE

Caryophyllea, flore tenuiter laciniato, maiore albo & dilutius rubente.

CAP. VII.



Firmioribus Descriptio

& longioribus est cauliculis [Betonica coronaria minus ramosa, &c.] maiore etiam flore, h. c. non minus profundè per oras laciniato, nec odorato, aut lactei candoris omnino, aut dilutius rubentis & quodammodo carnei coloris, breuib. villis purpureis virbilico circumferentiam sig

utraque specie occupantibus, nullis similiter corniculis, sed decem staminibus, ut in *Betonica* corniculis ramosa, &c. prominentibus, alioqui *foliis*, *radice*, & florendi tempore conueniunt.

-71001-

Clus. in Pannon. pag. 322. & Hist. post. vocat *Caryophyllei* quinti speciem 3. siue genus tertium. Lobel. in Icon. Plant. pag. 449. itemque in Obs. Belg. p. 538. Superbam maiorem flore albo, white groote Pluymskens mit gheerolde hayefens in de middel. C. Bauh. Phyt. Caryophyllum 21. siue siluestrem flore laciniato albo inodoro. Et hunc Caryophyllum haberi ait flore albo, & suaue rubente, ac propterea Lobelium in Icon. Plant. duabus expressisse imaginibus pag. 449. & 450. sic & Tabernamontanum lib. 2. sect. 1. c. 1. p. 5. & in Icon. p. 289. Caryophyllis siluestris plumarj albi duas dedisse effigies. Tabernomontani verò effigiem eodem titulo proposuit Gerardus.

Locus:

Clusius hanc inueniebat ad radices montis oppido Medeling imminens, tertio ferè à Vienna miliari.

BETONICA CORONARIA MINV'S
ramosa, flore tenuiter fimbriato, albo,
corniculis duobus emergentibus.

CAP. VIII.

Descriptio



Cassa huic & nigra radix est, dura, lignosa, multos ramulos humi sparsos fundens, nigros item illos lentosque, & subinde fibras agentes: ex ijs cauliculi exeunt dodrantales, geniculati, infimà parte gramineis quibusdam, breuibus, angustis, colore caesis folijs, binis semper ex aduerso inter se oppositis, deinde secundum genicula, aut nodos alijs rariorib. onusti: extremis cauliculis insident longi calyces, ut in alijs Caryophylleis siluestribus, florem continentes album odoratum, quinque folijs valde laciniatis constantem, è quorum umbilico bina emergunt stamina longiuscula, corniculorum papilionis instar inflexa: Semen deinde in longioribus capitulis planum, quale reliquorum Caryophylleorum.

Clusius descriptionis author inscripsit hanc *Betonica* cor. minis ramosam in Pannon. pag. 320. Caryophylleum quintum, cognominatque Caryophylleum siluestrem 1. albo flore & laciniato: In Hist. post. Caryophylleum sil. quintum.

Synon.

Casp. Bauhin. Phyt. Caryophyllum 24. siue siluestrem 3. flore laciniato, staminulis corniculatis.

Locus & Tempus.

Pronenit spontè in Hamburgensi monte inter saxa, quà Austriam & Septentrionem spectat: floret Maio, Iunio & Iulio in horto Ill. E. C. Montbelgardii.

PLANTARVM.

BETONICA CORONARIA MINV'S
ramosa flore tenuiter fimbriato platè
albo, sine corniculis.

CAP. IX.



Betonica coronaria prioris genus est, longioribus cauliculis, & plures flores proferens, superiori quidè formà & candore similes, sed inflexorum corniculorum expertes, verum eorum loco decem staminula ipsius floris superficiè paululùm exuperantia habentes: capitula etià in quibus semen continetur, oblongiora, Clusio teste.

ra, Clusio teste.

Betonica hanc cor. minis ramosam sine corniculis Clusius vocat in Pannon. pag. 322. & Hist. post. Caryophyllei sil. quinti speciem alteram. An *Superba* alba altera & suaue rubens Lobelio? An *Caryophyllus Armerius* 2. Schvvenckfeldio?

BETONICA CORONARIA MINV'S
ramosa, flore tenuiter fimbriato,
albo, cum corolla purpurascente hirsuta.

CAP. X.

Lobel. in Icon. Plant. pag. 450. dicitur *Superba* Syn. *Alba* medio corolla purpureo violacea obsoleta cincta: Clusio in Pannon. p. 322. & Hist. post. Caryophyllei quinti genus, siue varietas floribus circa umbilicum purpurascente lanugine hirsutis: Dod. Lat. in fol. Caryophylleus minor quoad iconem. Eandem enim habet cum Clusio & Lobelio, licet descriptione plantam hanc non distinguat à *Superba* quam olim posuerat ex Fuchio pro Caryophylleo minore, & cuius in fol. lat. nouam dedit figuram ex Clusio & Lobelio pro Caryophylleo minore altero: descriptio Dodonæi non conuenit cum iconem, quam ponit, sed cum *Superba* alba altera & suaue rubente Lobelii in Icon. plant. p. 450.

In horto Ill. r. c. hoc *Betonica* coronariae genus parum ramosum, flore albo, cum corolla rubente, floret Iunio & Iulio.

BETONICA CORONARIA FLORE
tenuiter fimbriato purpurascète, cum
corolla fusca & penè rubente,
sine hirsutie.

CAP. XI.

Et nobis in horto Ill. r. c. *Betonica* coronariae species hæc, ubi floret Augusto. An *Tabern.* in Icon. & Hist. Caryophyllus plumaris

plumarius purpureo cæruleus, brun balam wild
feder Nägelein. An Gerard. Caryoph. plum.al-
bus, Purple tagged Pinks?

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA
petra, flore punctulis albis notato.

CAP. XII.



Lignola ra-
dis caules
emittit cubitū
vnum aut al-
terum altos, le-
ues, teretes, ge-
niculatos, inae-
nes: ad quorū
singula genicu-
la folia liliacea,
atro-virentia
flores in caulū
& alarum ex-
tremis, suauo-
lentes, multi fi-
mil in umbel-
le formam iun-
cti, ex oblon-
gis rubentibus
calycibus,
quinque foliis
constantes,

coccinei, crenati, circumlā d punctis albis, satu-
risque purpureis, citra imam foliorum partem
efficientes.

Lobel. Icon Plant. p. 447. Armeria altera, mul-
tis in latum orbiculum congestis floribus orna-
ta, punctulis in gyrum aspersis, foliis quā supe-
rior latiores. Gesn. hort. Vetonica, vel Beto-
nica silv. alia in petrosis collibus, & asperis, sabu-
losis, apricisque locis nascens: Scarlata quibus-
dam dicta: tanquam à coccineis floribus colore.
Idem in append. Violam Marianam vocat.

Dodon. Hist. flor. & lat. in fol. Altera Armerio-
rum species quam Germani Stein Niegele vo-
cant, aliqui Scarlatam à rubeo floris colore coc-
cum referente.

Camer. hort. est inter Armerios flores ille, qui
elegantius flosculum stipaturā umbellam conficit,
colore rubro & albo variegato; Carthusianer
blümlin/ i.e. Flos Carthusianorum. Clus. fortē
huius meminit, sed obscurius nomine Armerii
floris, cuius verba paullo post ponemus.

Tabern. in Ic. & H. fl. dicitur Caryophyllus
Carthusianorum 1. Scharlach blümen. C. Bauh.
phyt. Caryophyllus 15. siue barbatus latifolius, &
Lychnis Monachorum Gesneri de hortis: Ge-
rardo Armeria suave rubens, Narrow leaved
sweete williams. Schvenckf. Caryophyll. Ar-
merius, folio latiore & brevior Saponariz. An
H. Lugd. p. 810. Viola barbata latifolia.

Betonica coron. petraeam latifoliam obser-
uavi florentem Iunio, Iulio, & Augusto diuersis
Germanie in hortis: dum ex femine prouenit,
primo anno caulem non fert.

Vsum huius introduximus Montbaldardi,
ad panni scilicet maculas tollendas, si,
cuiuscunque generis is fuerit, huius
herba fricetur, deinde limpida
aqua abluatur.

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA,
angustiore caliculo, foliis fastigiatis cincto,
suave rubente flore Lobelii, &
Armerius simplex flos Pā-
nonicus Clusii.

CAP. XIII.

Lobelio Ic. Plant. p. 448. dicitur Armeria alte-
ra suave rubenti flore, sed angustiore caly-
culo, foliis fastigiatis cincto: Cesp. Bauh. phyt. Ca-
ryophyllus 16. siue barbatus hortensis angustif-
olus. Dod. lat. in fol. Armerius flos alter, quoad
iconem: descriptio enim est Betonice latifoliae
petrae, flore punctis notato. Clus. Caryophyl-
leis florib. congener Armerius simplex, & Arme-
rii genus simplici foliorum serie praeditis flori-
bus: cuius quinque tradit differentias.

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA
petrae pleno flore rubro, vel ad purpureum
accedente & albo.

CAP. XIV.



Hic folia Descriptio
inferiora
lata, vt in pe-
trae simplici
dicta, minus ta-
men: flores ru-
bri, vel ad pur-
pureum acce-
dentes, vel
quod rarius, al-
bi, pleni.

Clus. in Pann. Armerii
p. 327. itemque
Hist. post. dicitur
Armerius
pleno flore, du-
plici, triplici ve
foliorum tex-
tura constans.

Lobel. in Ic. Synon!
Plant. Armeria
rubram multi-

plicem vocauit: Tabern. in Icon. & H. fl. Caryo-
phyllum Carthusianorum 3. Gerard. Armeriam
rubram latifolia, broad leaved sweete williams:
C. Bauh. phyt. Caryophyllum n. siue siluestren
pleno flore.

BETONICA CORONARIA MINVS
latifolia, flore profundē dissecto.

CAP. XV.

Eradice alba fibrosa plura prodeunt capita fo-
liorum vnciam ferē latorum, palmum longo-
rum, atro-virentium, similitum quodammodo
Plantagini angustifoliae, in quibus duo nerui exi-
gui iuxta costam secundum longitudinem exten-
duntur. caules sesquicubitalis, recti, glabri: in
plures ramos diuisi, per quorum genicula gemi-
na filia alterno posito discrepantia, angusta, sur-
recta. Summitates ramulorum flores stipant sua-
uiter olentes, accedentes quadantenus ad Su-
mm

Descriptio



perba dicta
florem, minùs
tamen profun-
dè atque tenui-
ter lecti, sed
profundius mul-
tò quàm in Be-
tonica alia lati-
folia, purpurei
potissimū circa
foliorum media
& umbilicum,
extremitatibus
atque segmen-
tis ad albedinē
tendentibus, in
quibusdam etā
siticulis can-
dicantibus, in
quibus apiculi
eminent gemi-
ni, candicantes,

exigui: sapor radicis & foliorum amarus.

Caryoph.
Coronaria.
Tabern.

Extat huius imago apud Tabern. in Icon. &
Hist. Caryophyllei Carthusianorum secundi in-
titulatione, sed sine vlla descriptione. In eius
etiam effigie defunt folia lata, per capita disposi-
ta, quæ etiam præter nostram mentem à pictore
nostro omiſsa: maluisse quoque flores paulò
profundius in nostra iconē fuisse pictos. Gerar-
do dicitur Armeria rubra.

Armer. ru-
bra.

Floret Iunio & Iulio in horto Montbelgarden-
si, egregio naturæ coronariæ specimine, ob flo-
rum copiam & elegantiam. Vnde nacti sumus
non recordamur.

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA,
flore picturæ Vesuntina.

CAP. XVI.

locus &
campus.



bus, ruber, carneus, guttatus in eodem ramulo.

BETONICA CORONARIA SYLV.
sive Caryophyllus flore albe-
scente, striato.

CAP. XVII.

Betonica coronariæ sylv. similis foliis & multis
Bamul florib., pulcherrimis, albicantib., striatq;

purpurascens. Reperta in sylvis à D. Tengen-
gel aſseſſore Spirensi, qui eam in hortum tranſtu-
lit, ibidēque floruit Iunio, cubiti altitudinem
excedens.

BETONICA CORONARIA, SIVE
Caryophyllus filu. vulgarissimus.

CAP. XVIII.

Hic caules plures, & diuersis capitibus, recti,
rotundi, strigosi, nunc palmates, nunc pe-
dales, ac etiam cubitales, non ramosi, nisi interdū
in summitate: folia graminea, vitidia, ad genicu-
la bina, propter terram numerosiora: radix lon-
ga & satis crassa, colore foris fusco, intus albo, sa-
pore subamaro: flores modò singulares, modò
plures simul, suauiter rubentes, odore nullo excel-
lente, per obtulum marginem crenati, quinque
foliis constantes, ex valculo oblongo, tereti, a-
tro-rubente, cui ad basin foliolū acuta calyci æ-
qualia, sæpè breuiora, apposita.

Hæc est illa Caryophyllea siluestris, siue tertia
Tragi, flosculis, radiculis, calycibus, Caryophyl-
lex istius, sed longè minutissimis: flosculis qui-
dem senis, interdum octonis, rubore nigricante
quasi, nonnunquam & dilucidiorē tinctis, i squæ
exilioribus magis, quò caules proceniores aſse-
runt.

A Fuchſio Betonica siluestris inſcribitur, ac ad
Betonicam alteram diſcondeam cum ſatiua re-
fertur.

Matthiolus in prior. comm. vocauit caryo-
phyllum florem siluestrem, plantam spontè na-
ſcentem, traditque in poſt. comm. alteram flori-
bus rutilis, & alteram candidis. In Hiſtor. germ.
& Epit. florib. dilutè rubris, aut valdè rubris, inter
Caryophyllos omnium minimis, penè inodoris.

Camer. apud Matthiol. nouam poſuit iconem,
quæ an ſit caryophylli, de quo hic agimus, dubi-
tamus.

Dodon. gall. appellat Vetonicam secundam
veram, & Herbam tunicā quorundam, floribus vt
plurimum rubris, interdum punctis notatis, duo-
bus, tribus, nonnunquam nouem aut decem ſi-
mul foliis anguſtis. Lat. in ſol. Armerium florem
primum, & Armeriorum florum ſpeciem pri-
mam, foliis aliquantulū, quàm maioris Caryo-
phyllei latioribus, colore herbaceo virentibus:
flosculis parvulis, pluribus ſimul in quandam
veluti vmbellam congeſtis, ſemper ſerè cocci co-
lore rubro ſplendentibus, punctis interim can-
didis, circa medium variegatis: rariſſimè candi-
dis. Ornare ait hunc flosculum Belgicorum hor-
torum areas: apud Italos & alibi locis incultis,
& aridis exire: Geſnerum circa Gryphij lacus ri-
mas in Heluetia à ſereperum ſerbere: proue-
nire & alicubi in Belgio locis deſertis, iuxtaque
arborum & pratiorum margines ac ſerobes, ſed
multò quàm in hortis minorem & tenuiorem:
maturè & Aprilis ſæpè menſe, aut Maio florere,
Caryophylleos flores antecedentem: pluri-
ma inde æſtatis parte vigere: Cæterū, hunc
florem nihilò magis, quàm Caryophylleum ſa-
tium, cum Vetonica altera, aut Polemonio
conuenire.

Lobelius in Adv. remittit ad iconem Dodo-
nei, quæ olim erat Fuchſiana: in Obſ. p. 241. &
Ic. Plant. pag. 446. Armeria ſiue minoris Caryo-
phyllei ſilueſtris, minùs odori ſin Obſ. hæc duo
nomina non leguntur. foliis latioribus titulo
proponit

proponit eandem figuram, quam Dodonæus in postremis, quæ flore pleno, ac indistinctè de Caryophyllis floribus scribit.

Caryophyllus montanus primus Tabern. in Icon. & Hist. an ab eius Caryophyllo 13. siue mô-
tano albo secundo colore tantùm differat, & an
iidem cum nostra Betonica vulg. siluestris, asserere
non audeamus, quia non describit. Easdem icon-
es & Gerardus assumpsit, & Armeriam albam,
white John, lib. 2. cap. 174. & Caryo, hyllum mô-
tanum aloum, white mountaine Pinke cap. 178.
in scriptis, an autem has intelligat, me latet.

Schvvenckf. Caryophyllum silv. primum vo-
cat, & Caryophylleum siluestrum Thali: Germani
Sonder Negelin / Stein Negle / feld N. geln /
wild Negelin blumen / wild gras blumen, heys-
denblûmlin / & blutz tropffle: Belgæ Cuyderels
les / quasi dicas fasciculum florum enim fascicu-
lum propriâ linguâ nominat. Gallo-Belgæ Cuy-
derelles: Galli Armoires & Armoires: Itali Garo-
fani & Garofoli saluaticchi.

Basilæa floret adhuc Octobri quâ itur Mou-
rets & inter portam Stein & Eschen extra vr-
bem, & quâ itur Krenzack luno, Julio, Augusto,
& Septembri: Genevæ in pratis Mûo. Gignitur
etiam in sylvis cædiis, deinde & arenosis aridis
& incultis campis, teste Trago. In pratis, monti-
bus, nitidisque locis nascitur in Ætate magna
copia, Fuchlio referente. Vbiis spontè proueai-
re ait Schvvenckf. in petris, montosis & siluo-
sis marginibus.

Satua calidior censetur. Succus cum aqua O-
nonidis, & florum Lili conuallii calculum atte-
rit & comitialibus prodest. Plura lege antè.

BETONICA CORONARIA

(squamosa siluestris.

CAP. XIX.



Redios cõ-
plures e-
mittit caules,
laues, genicu-
latis, dodran-
talis, interdũ
cubito lon-
giores, ad quo-
rum singulas
iuncturas bi-
na graminea
folia, angusta:
summo cauli,
extremisq; de
ramulis calyx
insidet squa-
mas habens
albas, florem
promens par-
uum pallidè
rubetern, quo
marcescente

alius quoque flos, subinde plures suis singuli ca-
lyculis obuoluti subnascuntur, tanto numero, vt
tandem prægnanti calyci, qui reliquos iuniores
cum suis flosculis complectitur, alius sobolis
multitudinè rumpatur.

Inscribitur hæc a Lobel in F. Plant. p. 449. &
Obs. Belg. p. 534. Armeria prolifera, Finnerfene:
Tom. III.

C. Bauh. phyt. Caryophyllus 18. siue siluestris pro-
liferus. Tabern. in Icon. & Hist. Caryophyllus
silv. minimus, Flein wild Negelin. Gerardus
inepto Viscariz titulo huius iconem dedit, cum
qua Viscaria nihil commune habet. Thal. Ly-
chanis 4. dicitur.

VIOLA BARBATA ANGUSTIFOLIA

Dalechampii.

CAP. XX.



Caulibus Description.

Celt spon-
tanæ, non
multum palmũ
excedentibus,
culis cubitali-
bus & altiori-
bus, teretibus,
tenuibus, hir-
sutis, genicula-
tis, ramosis,
sæpè vnicaulis:
folia ex articu-
lis bina aduer-
sa, basibus
coëuntib. cau-
lè amplectun-
tur, culmũ la-
ta, palmũ circi-
ter longa, pilo-
sa, obscurè vi-
rentia, sapore

quodammodò viscoso: calyculi in extremis rama-
lis modò singulares, modò plures, nullã ferè vm-
bellæ formã, tenues, vnicali longitudine, striati,
foliis acuminatis, æqualibus, aut etiam altiori-
bus obuallati, è quibus flosculi emicant Armeriz
hortensis, sed longè minores, quinque foliolis
non vt illis rotundatis, sed mucronatis, & per ex-
trema modicè crenatis, colore foris ex viridi ruti-
lo, intus suat rubente, punctulis argenteis gut-
tato, qui facili conuoluuntur, ac quibus superue-
niunt vascula longa, semen, vbi maturum, com-
pressum, latum, & nigrum continentia: radix li-
gnosa, tenuis.

Lobel in F. Plant. pag. 443. inscripsit Arme-
riam siluestrẽ alteram. H. Lugd. pag. 810. Vio-
lam barbata angustifoliam. Figura autem Plan-
tiniana nobis ardet, displicetque Dalechampii,
ac etiam nostra ex Fuchianis emptis, vtpote
quæ minis bene expriment flores.

Floret Maio & Iunio circa Montbelgardum:
in horto Ill. x. c. Julio & Augusto: in monte
Rolsberg prope Malmunster etiam adhuc Oc-
tobri.

Locus &
Tempus.

APHYLLANTES MONSPELIENSIBVS.

CAP. XXI.

Mltos iuncoos enodes caules bipalmes c. Description
mittit, quorum singulis flos satis magnus
insidet vnicus in summo, quatuor denticulatis
cæruleis foliis constans, ex calyce oblongo erum-
pens, gustu dulci: radix fibris multis longis con-
tortis, lignosis, duris, albis constat: circa quam
filia multa graminea, celeriter marcescentia.

M m 2

Synon.



Locus & Tempus

nūm ex Montpelio, locis saxosis floret Aprili: In cacumine montis Ceu in fine Maij & Iunio.

GARYOPHYLLEUS FLOS APHYLLOCAULOS, vel junceus, minor & maior.

CAP. XXII.

Descriptio



quot capita diuisa, ex reliquiis veterum foliorum quasi capillata: *caulis* primò aliquot vnciarum, deinde palmatis, tennis, capitulo Scabiosa: ouinæ accedenti, vaginâ longiusculâ: exterior facies capituli constat foliolis membranceis, exterius viridib., interius, argenteo colore lucentib.: totū capitulū scater membranceis foliolis lucentibus: inter ea exoriantur flores, quos subsequuntur semina aliquantum longa, cum membraneo umbilico, vt in Scabiosis.

Descriptio Maioris. Caulis

Flos

Radix

Maior eadem vel valdè similis Iunceo *caules* dodrantes & cubitales emittit, rectos, enodes, quorum vniuscuiusque cacumini (quod vncialis & longior vagina membrancea obuoluit) *flos* insidet item glomeratus, Schœnoprassii ferè similitudine, ex albo purpureus, foliacearum squamarum vallo circumdatus: *radix* longa, lignosa, teres, crassiusculâ, in multa capita diui-

Lob. in Adv. Aphyllanthis Herbatiarum Monspelisium titulo depingit, & describit. Sed in Icon. Plant. p. 454. Aphyllanthis Monspelienſe vocat: Taber. Ic. & Histor. Caryophylleum caeruleum. Casp. Bauh. Phyt. Caryophyllum 13. siue caeruleum Mōspeliensem.

Mōspelij prope Castelnou in mōte, & quā itur Frōtignia-

ditur, vnde terram proximè magna seges foliorum emergit, gramineorum, glaucorum, latitudine paulo subinde variantium.

Cur radicem tenuem huic assignet Dodonæus non video, nec prior, nec posterior talem sortita est: Is etiam in Hist. gall. vocat Gramen marinum, ac etiam Pseudo-Moly, licet non Moly speciem, sed potiùs Graminis faciat in Histor. lat. in fol.



Lob. in Adv. hunc in modū præsentē stirpem commemorat: Caryophyllus marinus omnium minimus, quē Belgæ Moly marinū indigitarūt, alij Holostium, propter folia graminea, rigidiuscula, colore glauco, similia Caryophyllis, &c. Has arearum margines ornant Belgæ & Angli, apud quos

in maritimis frequens oritur: calidis & mediterranei maris litoribus, non perinde occurrit. Sed conuallibus Calcaris Sequenæ montis, passimque alibi in Gallia Lugdunensi, locisque à mari distitis, pro fus eadem repentur, nisi plures funderet cauliculos pedales: folia item quadruplò maiora, & reliqua grandiora. Hæc Lobelius, qui in Obs. pag. 242. itémque Ic. Plant. p. 452. Caryophyllum marinum inscripsit priorem: posteriorem verò Caryophylleum montanum alterum. Et hanc perperam Cantabricam Plinij cognominari ait, creditque potiùs esse Statice eiusdem. Testatur autem hanc Louanij flore albo variare in horto D. Io. Limoges, aliàs Nonnij.

Priorem H. Lug. p. 1594. Pseudo-Moly Dodonæi: posteriorem pag. 1190. Statice.

Statice hanc H. Lugdunensis vocat Clus. in Pannon. p. 716. Caryophylleum, vulgè Gramen minus cognominatum, foliis Graminis montani spicati. In Hist. post. vtriusque meminit. Ad Armerium florem, inquit, procul dubio referendæ sunt duæ hæ plantæ, quæ à rei herbariæ studiosis Belgis Graminis marini maioris & minoris nomine vocantur, tametsi plerisque aliis procul à mari distitis locis etiam spontè proueniunt, &c.

Garyophylleum aphyllocaulon minorem vocat Tabern. in Icon. & Histor. Gramen marinum minus, germ. Blein Meergras: Belg. Zeegras, Zeeginoslen: Gerard. Caryophyll. marinum minimum Lobelij: C. Bauh. phyt. Caryoph. 38. siue montanum minorem, vel marinum: Schvvenckf. Caryophyll. silu. 7. Klein gras Niegelin. Maiorem. Tabern. Gramen marinum maius, groß Meergras: Gerard. Caryophyllum mediterraneum. C. Bauh. phyt. Caryoph. 37. siue montanum maiorem, radice longissimâ: Schvvenckf. Caryoph. silu. 6. groß Meer Niegelin.

Caryophylleum aphyllocaulon minorem delatū ex Anglia dono accepi à Turnero anno 1571.

Loc. ten. anno

anno verò 1599. à Do. Vursifio collectū in horto Reginz Angliæ. Sed ex Anglia quoque transmissit Carygillus Caryophylli graminei marini nomine: Tabern. collegit in superioris Germaniæ comitatu Fagensenbogen locis humidis, arenosis, gaminosis, ibique copiosè: Schvvenckt. in aggetibus secus itinera frequentem, Augusto cum flore. Maiorem nos collegimus Lugduni & circa Lutetiam an. 1586. Augusto cum suis capitulis. Statice Dalechampsius in aridis & petrosis, quin etiam ex lapidum saxorumque rimis integraneueller volens, saxum diffregit. Gramen polyanthemum reperiit in pluribus per Germaniam, Bohemiam & Silesiam locis in agris, ac non rarò iuxta Rhenum ac Mosam, æque vno quidem loco maius ac altius, alio verò minus ac humilius, auctor est Dodonæus: exire & in palustribus nonnullis, haud procul à mari in Zelandia. Quæ de loco Clusius & Lobel. scripserunt legenda antea.

Cæterum, licet Dodonæus vsum in medicina nullum habere testetur, sed flosculos in coronis solum gratiam aliquam obtinere dicat, Dalechampsius tamen saporem totius Statices plantæ adstringentem perhibet, ac facultatem habere ad miraculum vsque desiccandi, & erumpentium humorum impetum cohibendi, siue trita admodum, siue succus eius bibatur. Dysenterici succurrere, mensium abundantiam, sanguinis è naribus profluyum sistere, sanguinem excreantibus opitulari. Denique vulnerariam esse, & maligna vlcera ad cicatricem perducere.

BETONICA CORONARIA, QUÆ
Caryophyllus pumilio Tauricus
Clusio.

CAP. XXIII.



Longiuscula radice squamosa figitur, in capita aliquot diuisa, ex quibus exeunt pediculi vnciales & secundiciales vno aut altero nodo articulati, binis gramineis ad singula genicula foliis vestiti, florem sustinentes purpurascens magnum, è quinque foliis compositum, ex calyce vnciali, striato,

hirsuto, in quinque laciniis diuiso, quæ non ineptè cum Genianellæ Heluenicæ flore compares.

Clus. in Pannon. facit Caryophylleum & cognominatque pumilionem Tauricum: in Hist. post. inscribit Caryophyll. silv. octauum. Tabern. in Leon. & Hist. Caryoph. montanum tertium, Swin. Hegelin. C. Bauh. Caryoph. 29. siue alpinum calyce oblongo, hirsuto. Gerard. Caryoph. mont. Clusii.

Tom. III.

Prouenit in Tauro Carinthiæ monte solo tenui & arenâ splendende referto: floret sub finem Iulii & Augusto.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllus gramineus pulillus.

CAP. XXIV.

Multorum capitum est radix, mediocriter cretilla: folia coriacea, rigida, dimidio Hyssopi foliis minora, acutiora, viridantia: caules crebri, palmares, graciles, geniculati, foliis binis ad nodos donati, indiuidui aliquando, interdum in pauculos breues surculos diuicati: calyces singulares, vel geminos gerunt semunciales, vel penè vnciales, è quibus flores emicant.

An Caryoph. silv. humilis fl. maiore gemino C. Bauh. ? An Caryoph. silv. Tauricus Clusii? Geneuæ collegit Gener Cherlerus, & inde attulit.

BETONICA CORONARIA SIVE
Tunica minima.

CAP. XXV.



Betonica siue Tunica minime radix pro plantula modo crassiuscula, multorum capitum, coliciti numerosi, palmares & altiores, ramulosi, ad quorū singula genicula sunt foliola binaria ex aduerso posita, perangusta, vnciam circiter longa: extremis ramulis strobili masculi, singulares supernasuntur, ex

albo purpurascens, è quinque foliolis compositi, in quibus stria purpurea, calyce ambiente ex squamis oblongis lineis viridatibus striatis. Figura hæc Fuchsiana non bene exprimit nostram Betonice, & potissimum radicem.

H. Lugd. pag. 191. dicitur Tunica minima, & Holostium quorundam, radice candida, flore gustu austero: C. Bauh. phyt. Caryoph. 29. siue silv. C. Bauh. flore minimo, aliquando maior, aliquando erecta, not. alquando repens, ramosa, Saxifragia Lobelii, & Tunica minima Lugdunensis. Sed parri assentiri non possum existimanti Lobeli Saxifragiam eandem esse cum Tunica minima Lugdunensi.

Tunicam minimam inueni inter Lugdunum & Moluellam Sabaudia: Geneuæ florentem Maio in muris, è regione domus Senatoriæ, & passim au Plain palati mense Iunio. In sabuletis, aridis locis, & murorum subgrandiis Gallia & Italia nasci perhibetur.

Aldroandum ad hæmorrhoidas fluentes hæc vi replet Agerius Med. Argentinenfis.

Locus & tempus.

M m 3

BETONICA SIVE TYNICÆ MINIMÆ
similis planta.

CAP. XXVI.

Descriptio. **D**odrantal is est plantula, aliquando pedalis, gracilis, plurimā ramulorum diuisurā stipitata, haud secus ferè ac Alline angustifolia, à quā tamen pluribus notis manifestè differt, quemadmodum à Betonica minima quoque.



Foliola rara & ad singulos ramulorū geniculos bina, angustissima, longiora, quàm in Alline dicta. Extremis ramulorum *fusculi* appendici subpurpurei, pulchelli, Betonica supra dicta aliquatenus similes, calyce folioso, qui & vascula sequentia flosculos sustinet, quæ nullis stribus prædita sunt vt Allines tenuifolia. Semina continent exigua, valde nigricantia. Radix exigua tenuisque alba, sed dura ac lignosa, in aliquot diuisuras secta. Annua est.

Locus & Tempus. Florebat & semen gerebat mense Augusto in agris montis Rofsberg prope Malmunster: Montbelgardi Iulio supra muros. Frater reperit in monte prope tres pontes dictos Gab in Gallia Narbonensi florentem Verè.

SAXIFRAGA ANTIQVORVM QVIBVS-
dam & de Gypophyto, siue Symphyto pet-
tro, maiore & minore Thalij.

CAP. XXVII.

Descriptio



Digiti par-
ui ma-
gnitudine siue
crassitudine
obseruamus
radicem ligno-
sam, palmo lō-
giorem, in nu-
merosa capita
diuisam, vnde
stolones pul-
lulāt innume-
ri, palmares &
longiores, ge-
niculati, foliis
ad iuncturas
binis, exaduer-
so positis, Hyl-
sopi similibus,
minorib. ami-
di: flus vniuf-
cuiusque sto-

lonis cacumini insidet vnicus; multis in medio staminibus, ex calyce albidio, semunciali, stribus vi-
dantibus virgato, inferius angustiori.

Matth. in Diole. Saxifragum tertium maius vo-
cat, à forma & ab effectu: In post. verò comm.
cum mag. fig. Saxifragiam magnam inscribit.

Lob. in Adv. Saxifragiam, siue Saxifragam An-
tiquorum sine tergiversatione intitulat, monet-
que Saxifragæ vocem apud authores esse multi-
uocam, nec vnus cuiuspiam stribus indicem, sed
omnes vulgò Saxifragas vocatas esse ob insignes
vires, efficaciamque quā prædita sint. In Obs.
p. 233. Itē nque Ic. Plat. p. 428. pro Saxifraga ma-
gna Matthioli & Itolorum, nouam habet iconem,
Idem etiam meminit Saxifragæ Aduers. p. 183. ex-
hibetque eorundem effigiem in Ic. Pl. Saxifragæ
antiquorū inscriptione. Ceterū obsecrus no-
bis videtur Lobelius, vt qui in Adv. non distin-
guat suam Saxifragiam antiquorum, à Saxifraga
Itolorum, secus quàm in Ic. Plant. & Obs. vbi, qua-
si diuersæ essent, duas icones & descriptiones
proponit: nec annotat an eadem vel diuersæ sint,
aut saltem varientur ita vt dubius hætere videatur:
prior quidem descriptio Lobelij non malè con-
uenit Saxifragæ Matthioli, si radix non adscribe-
retur parua: verum accidit forsitan illi vt cum de-
linearet vnica habere ad manum plantam su-
uam aliquam aut variantem.

Camerarij apud Matth. Saxifragæ magnæ no-
ua icon (cui in H. st. germ. flores paruos pallidè
luteos, vascula verò rotunda paruo femine plena
assignat) non in omnibus consentit cum Saxifra-
gia Matthioli magna, quinimò multa habet simi-
lia cum Betonica coronaria siue Tunica minima,
licet color floris pallidè luteus non respondeat:
Matthioli etiam florem album assent, & Camer. in
Epitome, ita vt in floris colore etiam sibi contra-
dicat. C. Bauh. Caryophyllo suo in phyt. 36. siue
Saxifrago appinxit iconi Matthioli flosculos ex
sex foliolis constantes. H. Lugd. p. 113. inscripsit
Saxifragiam magnam Matthioli: Castor Saxifra-
giam quintam.

Huius magnam copiam Italia, Gallia, Delphi-
natis, Angliæ, quam plurimūque aliorum tra-
ctuum arida, cretacea, montosa, saxosa, sterilia &
sabulosa fundere prodidit Lobelius. Nobis ve-
rò attulit Genor Cherlerus ex Gallia Narbo-
nensi.

Miris laudibus hanc plantam Matthiolo com-
mendauit Calzolarius ad calculos renum edu-
cendos in potu.

Thalij Gypophyton, seu Symphytum petre-
um, maius & minus quod attinet, vtrumque sibi
ignotum facitur Frater C. Bauhin. quod & nos, id,
quousque melius innotescat, ad Antiquorum Sa-
xifragam referri posse existimantes.

SAXIFRAGA BAVARICA.

CAP. XXVIII.

In admirabili montis Baldi corona, Pona teste,
lex rimis cautis prodit Saxifraga Bauarica, pri-
mum ibi locorum à D. Ioach. Iungermano obser-
uata: fruticet ex subtili radice, albâque, frequen-
tibus caulibus, teretibus, nodosis, coloris diluti: fo-
liis oblongis, crassis, atque æquali ordine, sed ad
opposita latera alternato situ bina distincta, in
quorum summitate frequentes flores laetæ colo-
ris asserunt, quinque foliis compositos: quorum
in medio

ordine, sed ad opposita latera alternato situ bina distincta, in quorum summitate frequentes flores laetici coloris afferunt, quinque foliis compositos: quorum in medio quaedam staminula pallida conspiciuntur. Huius semen planum est, coloris nigri splendescens. Planta perennis est, proterfoliisque subacei saporis. Plantulam iconem innotem misit diligentiss. Botan. Io. Pona Veronâ anno 1609. Iunii principio floret, cuiusque semen eodem mense ad maturitatem peruenit.

DE LYCHNIDE CORONARIA AC
Sylvestri, ex Veteribus & in genere.

CAP. XXIX.

Lychnide coronariae [λυχνὶς κορωνοειδής] florem esse similem Leucoio ait Dioscorides sed purpureum [purpureum] & qui in corollas ne-ctatur: cuiusque semen cum vino potum ictis à scorpione auxiliatur: vel ut legit Marcellus, cuiusque semen & flores cum vino bibantur: & per se utrumque contra Scorpionum ictus.

Sunt qui hanc inter nothas Dioscoridis Athanaton, i.e. immortalem, quod longissimè à prima Aestate ad extremum Autumnum floreat: qui Acyloium, qui Billarion, qui Geus pedem, qui Corymbum, qui Taurium, qui Sceptum, & qui Maloion appellant. Magi Apocathemenes sanguinem, & Egypti Semeon, Romani Genicularem siue Bellariam dicunt, & Bellaryon, quæ vox licet incertam modò habeat in Grecis significationem, antiquam tamen fuisse in Lexico suo Hesichius indicat, Billario Trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicquam de ea testatus est. Ceterum, quo argumento nautis in mari sæpe visum piscem, *Lycernam* veteres Romani appellauerunt, ignea per os exercitâ linguâ tranquillâ nobilibus resplendentem: eodem, inquit Marcellus, in humidis nascentem magnitudine Violæ, sed figurâ Rosæ, florem Lychnidæ, ut fertur, Veteres Græci dixerunt. Nobilibus enim hic etiam fulgêre credunt, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam videntium oculos in se cõuertere. Non aliter quàm & Felium oculi flammæ modo in tenebris fulgent, & putres in tenebris caudices eodem tempore ignium speciem quandam videntibus afferunt. Quorum et si diuersa materia sit, communis tamen omni-bus causa, humoris copia est, nisi fortè in scilicet; quod ab Egyptiis obseruatum fuerat, non in humore, sed in Lunæ luminibus lucis eius causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augentur, dilatenturque in eius animalis oculo papulæ: & eum toto orbe mortalibus fulget id Sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domesticos parietes animalis eius nobis oculis splendeat. Verum tamen alterius questionis est, horum causas & rationes inuenisse.

Apud Theophrastum in Gaza I uernulam vertit, inter flores æstiuos & coronarios. Sic Plinius Lychnim flammeâ (ex eo quod diximus argu-mento), & Rosam Græcam (à gente) vocat, non nisi in humidis provenientem, nec vnquam excedentem quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Ex quo demiretur aliquis, quod coronarius flos sit factus, & coronari nominis honore ab agresti distinctus, & deficiente odore ob folium floris speciem in coronis amatus, inque tam magno nominum & appellationum ambitu

in gentibus sit habitus.

Lychnis sylvestris à Dioscoride non describitur, sed omni ex parte sativæ similis traditur. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante eum Nicander in Theriacis. Quod denique per omnia similem sativæ, Lychnidem sylvestrē Dioscorides dixerit, eundemque usum ac vim attribuerit, inde factum putat Cornarius, quod Gale-nus 7. simpl. huius non meminerit seorsim, de ea quoque intelligendum relinquens, quod de co-ronaria dixit, nempe semen calidum & siccum esse ordine secundo, aut etiam tertio, modò non obliuiscamur sylvestria omnia esse sativis for-tiora.

Iam non parum eos errasse constat, Dioscore Miranthâ, qui diuersas plantas pro coronaria Lychnide ostendunt, floribus vel subpurpureis, vel ex purpureo rubris, vel rufis constantes: cum sciamus à Dioscoride purpureum colorem ei tri-bui: qui cum in floribus sit perfectus quæri de-bet, ac propterea Senensis opinio in hac planta ad veritatem magis accedit: quam ob rem si Lychnidis florem (si veram adinuenire optemus,) non purpurascentem, non ex purpureo ad alium quemvis colorem vergentem, sed verè purpureû quærere oportet.

Constat igitur Lychnidis nomine antiquè herbas alios alias ostendere. Et hinc Lychnis coronaria vulgò dicta, siue Dioscoridi descripta, controuertitur. Est & Lychnis coronaria altera flore pleno. Sunt qui Pseudo-Melanthium sylvestrem Lychnidem faciunt, atque horum placitis subscribendum haud censet Matth. Ocimoides rubrum, Lobel. Camer. Clus. Schvvenckf. H. Lugd. & alii multi Lychnidem silv. purpuream vocant. Est & altera Lychnis agrestis multiflo-ra, nobis Ocimoides purpureum pleno flore. Ocimoides nostrum flore albo vocat Lychnidē sylvestrem Dodon. & Lob. qui tamen alibi Ocimoides nomine describit. Lychnis alba sylvestris multiflora à nobis appellatur Ocimoides flore albo pleno. Extat & Lychnis agrestis abortiuæ multiplici viridi flore Lob. in Ic. Plant. p. 263. Ocimoides album non speciosum vocauit Lychnidem sylvestrem albam noctifloram Schvvenckf. Lychnis Neapolitana ptolifera Frider. Meieri flore purpureo. E Lychnidis generibus dicitur esse Chalcedonica siue Constanti-nopolitana miniata, nobis Flos Constantino-politanus. Inter Lychnides reposuit Saponariam C. Bauhinus. Muscipulam siue Viscariam Lychnidem sylvestrem quartam [Lobelio, Taber. & H. Lugdunensi teste,] vocabat Clusius: ut & Muscipulam alteram: atque etiam Muscipulæ maioris species aliquot. Habet idem & Lychni-dem silv. (i. in Hist. 8. in Hist. post.) foliis angustis pluribus ex singulis geniculis. Habetur & Lychnis quædam plumaria Tabern. dicta. Lychnis sylvestris viscosa alba latifolia, an Polemoni-um petraum? Lychnis silv. latifolia alia est cognominata Viscaria Auriculæ facie Cretica. Lychnis silv. lanugine canescens flore maiusculo rubefcente. Lychnis, vel Ocimoides repens montanum Casp. Bauhini, inscribitur à nobis Saponaria minor quorundam. Lychnidem silv. Creticam nominamus Ocymoides flore minore rubello Candia. Lychnis repens folio viridi flore albo, viscosa alba angustifolia maior Casp. Bauh. Lychnis repens folio & flore albo minore, viscosa alba angustifolia minor Casp. Bauh. An Lychnis minor, Lychnis silv. hista minima;

Lych. silv.
Diosc.

Error quo-rundam.

Acquiubea

Flos Con-stantino-politanus
Saponaria.

Lobel. H. Lugd. & Hort. Lusit. lanuginosa palmaris C. Bauh. Ocyroides siue Lychnis semper virens, appellatur à nobis Been albo officinarum similis planta semper virens. Been album officinarum dici Lychnidem siluestrem patebit hoc libro. Lychnidibus sylvestrib. affinem dixit Lobelius Lychnidem Anglicanā marinam. Lychnidis elegans genus describit Fab. Columna, quod Ocyroidem Lychnitin cum Clusio appellare placuit. An stirps illa quam aliqui Lychnidem putauerunt siluestrem, est Centaurium minus adulterinum? Quam Lychnidem quidam vocant, nonnulli Persoliatam rubeam, aliqui Lychnidem Monachorum, nos cum Dodonæo Vaccariam nominamus. Silvestris Lychnidis appellationem quoque assuetæ sunt sequentes plantæ. Flos cuculi: Betonica coronaria Germanis feld Negelin dicta: Alfine corniculata Clusio dicta: Valeriana rubra latifolia: Cyanus: Campanula Lychnida Mycom: Lutea Plinij: Leontopetalum: Corneola Ruellij, nobis Flos tinctorius dicta: Filus ante patrem: Hippoglossum Ruta capraria: & Candelaria Gellorum de qua Ruellius l. 3. c. 57. & Gesnerus in cat. pl.

Cornarius postquam apud Aginetam lib. 3. c. 24. de sanguinis eruptione è naribus cohibenda, l. g. sicut in naribus vultu id est in naribus (quod Andernacus interpretatur, vel fuciculum lucernarum in naves conjicito) nullamque Lychnidis speciem sat quinis sistendi vim habere c. d. t. de corrupta lectione hæsitauit, & aliquandiu *oxyntide* legendum esse suspicatus est. Est autem Lychnidus vox æquivoca, nunc enim denotat Cyarum alpinum, nunc Digitalem purpuream, nunc Verbascum vulgare, & nunc Verbascum Montpellierense. Sed & Matthiolas Lychnitin Verbasci speciem constituit, de qua nullus apertè tradit, quod sanguinis eruptionem sistat, nisi quis ex eo quod Paulus lib. 7. de Verbasci generibus tradit, quod acerba sint, id colligat, &c. Tandem in eam sententiam adductus est, ut Lysimachiam legendum esse crediderit.

LYCHNIS CORONARIA VVLGO.

CAP. XXX.

Descriptio



denso villo canescentia: flores ex calycibus oblongis, canaliculatis, villosis, emicant, parum odorati, coloris rubri, albi, & ex carneo candidoque mixti, ex foliis quinis latiusculis constantes,

Rosulam exprimentes: singulis autem foliis ad exortum appolui apices, bini, a cuti, rigidè reperitur & flore multiplici rubro, de qua post seorsim verba facienda.



Matthioli. in Diosc. comme morat duplicè Lychnidè coronariam: vnā hertensem flore purpureo, & alterā eiusdem generis frequentissimam apud Ananienfes siluestrem, satius per omnia similem, quam merito Lychnidem siluestre appellari posse putat.

Camerarius Lych. in eius Epit. & re

Hist. germ. no- uam dat figuram, additque in Hist. flore esse albo, rubro, & rubello, non nihil odorato. In Horto tamen, ubi ambigit sitne Dioscoridi descripta Lychnis, flore variare dixit solum albo & rubro. Velim autem Patrocinatorem indicasse, vbi nam siluestrem satiuā odoratorem viderit.

Lonicerus inter Verbasca reponit, sextū nque facit, depingit & leuiter describit. Cordan Dioscor. Verbascum coronarium appellat, flore purpureo, & candido, vocatque refert græcè Lychnitida & Thryallada: Hinc subscribere videtur Dodonæus Lychnis coronaria, inquit, à Gaza Lucernula [*oxyntide*] conuertitur. Videtur eadem & *oxyntide*, inquit, per, esse Verbasci species, quæ & *oxyntide*.

Conradus Gesner. hunc Iouis florem, & græcè *Διὸς ἄλφειον* nuncupari exstimat. Sed Theophrastus inter Lychnida, & Iouis florem, lib. 6. dicit *Διὸς ἄλφειον* facit: æstima sunt, ait, *oxyntide*, *Διὸς ἄλφειον*, &c. & similiter Plinius, lib. 21. c. 11. hæc Theophrasti verba refertens.

An Corymbe Columella Ruellio de qua hæc Columella:

Nunc veniat quamvis oculis inimica Corymbe.

C. Bauh. phyt. Lychnidem 3. latiuam facit, & coronariā Dioscoridis, Theophrasti & Plinij Lychnidem censet, licet non desint, quibus *Διὸς ἄλφειον* Iouis flos, apud Theophrastum 6. Hist. 1. & 6. dicitur: sed vbi quæso minuta folia, quæ Theophrastus requirit? Alij Ocyroides faciunt.

Tragus attestatur in ea Gesnerum esse sententia, ut putet ad Iouis florem Plinij referendam esse Rosam Marianam floribus rubeis & candidis: aliis verò quibundam *oxyntide* & *oxyntide* dici, sed quam rectè se nescire.

Schvvenckf. triplicem Lychnidem coronariā Lych. adscribit, rubram sc. quam propriè *oxyntide* vocat, & *Διὸς ἄλφειον* Dioscoridis, & *Διὸς ἄλφειον*, ac Lucernulā appellat: alteram albo flore, Rosam Marianam 2. & Lychnidem albam maculis rubris aspersam, & *oxyntide* sprengit. Veitrosen & Lychnidem 3. sub purpureo flore, bleid rote Veitrosen. Et ob hæc floris colorum varietatem, duas exhibuit figuras Tabernamontanus, Lychnidis coronariæ albae & rubræ, sed frustra, vna enim sufficiens ipsi, ceu probè, & nobis, verum quum paratæ fuerint, datâ opera appolui.

apposimus: fatemur etiam nostras melius pingi potuisse. Sed & Lobelius abque necessitate effigies duplicavit, vnam inscribens in Ic. Plant. pag. 334. *Lychnidem coronariam*, Obl. pag. 181. alteram pag. 335. *Lychnidem candidam & rubram*. Castor Dur. eiusdem plantæ duas ponit figuras: vnam pag. 255. *Lychnidis titulo*, alteram pag. 256. *Lychnidis siluestris inscriptione*.

Græcè *λυχνίς* & *λυχνίς σφαραστίνη* dicitur: Latine similiter *Lychnis*, *Lychnis coronaria* & *latina*: Germ. *Margen Röslein* / *Margen Röslein*, *frayen Röslein*. hoc est, *Dominarum Rosula*, *Sancet Rosen*, *Damoff Rosen*, *Lampel Rosen* / *Marien Rosen* / id est *Rosa mariana*, *humel Rosen* / *Rosula cal. humel blümen*, *Flos cal. Weil Rosen* / *Summer Rosen*, *Atatis Rola* / Belg. *Christus oogsen* / *Oculus Christi*: Gall. *Oeillets*, & *Oeillets de Dieu*, *Oculus Dei*, *Parisien sibi*, *Passerofes* / It. & *Hilp*. *Lychnide coronaria*: Angl. *Rose campii* / Boh. *Svate Marie*. Propter flores roseâ purpure rutilos ac nitore flammantes, oculorumque aciem perstringentes, *Pyropi* aut lapidis *Lychnidis* modo, nomen adeptæ.

Scitur in hortis & fistilibus, Junio, Julio, ac Augusto ætius mensibus florens, & Basileæ etiâ Nouembri: apud Ananienfes, vt *Matthioli* refert, siluestris, sponteque exit.

Bilem per alium trahere, vulneraque recentia glutinare dixit *Schwenckf*. Radicum porrò succum attractum naribus sternutamenta ciere, cerebriumque efficaciter purgare: Mirum verò in modum ruralibus, vrbisquæ virginibus ad coronas faciendas expecti tradit *Matthioli*.

LYCHNIS CORONARIA FLORE pleno:



Caulis foliis & florum calycibus à vulgati coronaria minime differt: ac flos rubens densa foliorum stipatu multiplex spem seminis omnem præcipit.

Est hæc illa quam *Lobel.* in *Icon. Plant.* *Lychnidem* alteram rubram cognominat: *Camer.* in *Hort.* & *Marth.* *Hist. germ.* *Lychnidem* flore pleno Belgii &

Angliæ: *Dod. lat.* in fol. *Lychnidem coronariam* floris foliolis multiplicatis: *Casp.* *Bauhhus phyt.* *Lychnidem* 4 siue coron. latiuam multiplicem: *H. Lugd.* pag. 815. ex *Lobelio*, *Lychnidem* omnium pulcherrimam: floribus ad eò confertis & multiplicibus vt semine orba telinquarur, exhibitâ nimirum formâ vi, & pabulo in florum commodum absumpto.

Et nobis *Montbelgardii* in orto:

Tom. III.

PSEUDO-MELANTHIVM.

CAP. XXXI.



Simplici & Descriptio

Salba radiculâ; nititur: caulis cubitalis & squibitalis, steres, lanuginosus, incanus, ramosus, inanis, geniculis oppositis: latus: filia culmum plûs minus lata: longitudine palmari & sesquipalmari, pilosa, bina ex geniculis opposita: Flores oblongo, canulato, villosa calyci, in quinque segmenta angu-

sta flore altiora diuiso insident, *Lychnidis coronariæ*, purpurei quinque foliolis constantes, apicibus obsoletæ purpuræ: quibus oblongum succedit pericarpium, semine nigro, amaro referunt.

Germani *Kaden*, *Katten* / *Fornhofen* / *Korn neze* / *gelbloemen*. Galli *Nielle vulgaire* & *Nielle des bleds*, & *Iurea* appellant: Itali *Githone*, *Githone* & *Gitrone*: vnde plerique similitudine vocis inducti, verum ac legitimum siue siue *Melanthium*, in officinis *Nigella* nuncupatum, esse crediderunt: sed hos à veritate recessisse notius est, quam vt refelli debeat. A verò siquidem *Melanthio* non solum foliis, & semine, sed & aliis proprietatibus differt. Et hoc iam olim probe animaduertent *Hermolaus* & *Ruellius*, qui asseruerunt omnino hallucinari eos, qui putent hanc stirpem, legitimum *Melanthium* esse, quæ inter segetes in aruis passim nascitur, in quo *Brassavolus* & cum eo *Brunfelsius* manifestè cæcuerint.

Non desunt [inter quos est *Tabern.*] etiam, qui velint hanc plantam siluestrem *Lychnidem coronariam* esse, quibus, qui vtramque nouerint, subscribere nequeunt.

Sed longè minus id fuerit *Lolium* [*Trago*, *Cordo*, *Corn.* *Lycuna*, & *Matthioli* testibus], vt *Fuch. errat.* apertissimè hallucinatus credidit *Fuchs*.

Hippocrates *Gith* siue *Melanthium* à seminis Synon; nempe nigredine appellasse videtur, verum non simpliciter, sed cum adiectione aliqua, ad differentiam legitimi *Melanthii*, sc. *μαλάνθιον ἐν τῷ πυρρί*, hoc est, *Melanthium* ex *Tritico*. *Octavius Melanth.* *Horatius* *Gith* quod in segete nascitur ipsum nominauit: & eandem ob causam ab huius ætatis doctis [vt *Ruell.* *Muth.* *Dod.* *Gall.* *Lobel.* in *Adv. Obl.* pag. 23. *Icon. Plant.* pag. 38. *Lonic.* *Cast.* *H. Lugd.* pag. 438. & *Thal.*] *Pseudo-Melanthium* dicitur: *Nigellastrum* *Dod. lat.* *Nigella* vulgò dicta *Corn.* & *Lacunæ*. *Trago*, qui pro sexto *Marianæ Rosæ* genere describit, *Githago* [sic etiam *Ruell.*] & *Lolium* multorum Germanorum [vt *Fuch.*] sed perperam. *Nigella* *Brunfelsio*, verum non sine errore. *Lychnis aruenfis* *Tabern.* *Lychnis*.

Nomina lingarum

N a

*Apemem
foliosum.*

*Locus &
tempus.*

Lychnis alia inter Triticum Czfalp. Lychnis fegeru Schvvenck. Lychnis (6. in phyt. 5 apud Matth.) fegeru Mutoni. Ruellius à Gallis Nielle & florem M cancalum (sic & Gefn. in cat. florem vocat) appellari refert, & Theophrasti *ἀνθεμόν φυλάκας* (Anthemion foliosum appellat Gefn. nulla mentione facta Theophrasti) esse iudicat. Sed Anthemion Theophrasti, Anthemis est apud Dioscoridem, teste Dodonzo, & *ἀνθεμόν φυλάκας* Anthemidis species, cum Nigellastrum parum conveniens.

Pseudo-Melanthium observatur passim in agris inter legetes: Maio ac Iunio mense cum flore viget. Monspelij etiam April: vidi etiam Basileæ florentem Orobri, viridisque Genevæ mensis Februarij principio.

Caterum, autore Dodonzo, Nigellastrum semen, calidum & siccum secundo est ordine satis intenso: in pello cum melle subditum menses euocat: ut Hippoc. in lib. dem. m. testatur. Octavius Horatianus, semen fructum & tritum ad auriginem bibendum exhibet. Lolij facultates huic etiam herbe, Germanis Ratten nominata, Recentiores tribuere refert Fuchsius: Et hinc misficam in sanandis impetiginibus, alijque scabiei generibus commendare: Item vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, compelescendoque sanguine, eius esse vsum tradere.

OCIMOIDES VETERIBVS ET

in genere.

CAP. XXXV.

Descriptio

Quo siluestre ad sativum discrimine Mentastrium, Apiastrumque Latini veteres dixerunt: eadē naturæ & nataliū analogiā Ocimoides ab iisdē Ocimastrū dictū fuisse verisimile est. Ocimoides siquidem, seu, ut alij, Phileterium [*ὀκμοειδὲς ἢ φιλῆτεριον*]. In alio hæc est inscriptio: *ἔπερ ἐχέρην ὀκμοειδὲς*.] folia habet Ocymo [*ὀκμο*] similia: ramis palmi altitudinis. [*ἐχέρην δὲ ὀκμοειδὲς, dodrantales, Sarrac.*] hirsutos: *στῖλαι* [*ῥαβδῖ*] similes Hyoscyamo, semine refertas nigro, simili Melanthio. Vim hanc habet semen in vino potum, ut viperarum, ceterarumque serpentium moribus cedat. Datur & ichiadidis cum Myrrha (vet. caret) & Piperi [Marcell. & Corn. & Aldin. in nothis, addunt, & vino. Ruellius, cum melle & vino. Sed illud, & vino, quid opus fuit ex præcedenti periodo repetere, cum satis per se subintelligatur?] Caterum, radice nititur tenui [*λεπτή*]: vet. alba, [*λευκὴ*] & superuacua, inquit Dioscorides.

*Herba ap-
pellationes.*

Sunt porro qui & hanc Echion appellant inter nothas: alij Scorpiron, alij Sparganon [Sparganion leg. Marcell.] alij Althæam, alij Amarantida, alij Probatazon [Probathzam Marcell.] alij Elaphion, alij Antimimon, alij Porphyrida, alij Augion, alij Nemefion, alij Hycnopolon, alij Thyrsuin, alij Thermitin [Thermitin scribit Marcell.] alij Misopathen, & Romani Ocimastrum. In magno autem honore veteribus fuisse Ocimastrum ex tam multis eius appellationibus colligi potest, quarum plures ex alicuius partis ad alias herbas similitudine illi à gentibus per tempora accreuerunt.

*An Ocymo
siluestre
Plinio.*

Plinius tantum siluestre Ocimum contentus dixisse paucis medicinam & historiam eius absoluit. Sed quum parum consentiant ea quæ Plinius de Ocimo siluestri tradit, cum his quæ Dioscori-

des de Ocimoides habet, ambiguum est an de eadem herba Plin. lib. 20. cap. loquatur. Sylvestri Ocymo, inquit, vis efficacior ad eadem omnia: peculiaris ad vitia, quæ vomitionibus crebris contrahuntur, vomitique vultus, contraque bestiarum morsus, radix in vino efficacissima. Hæc ille. Dioscoridi acque Galeno 8. simpl. Ocimoidis radix inutilis est: semen autem tenue, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

Ocimoidis & Ocymoidis, siue Ocimastrum & Ocymastrum nomen plures obtinuerunt plantæ. Et quidem Cornarius, & Gesn. in cat. pl. wilbe Basiliæ germ. Matth. verò *silico saluatico*. Ital. *Basilio saunage* gallicè, & Bunselius in Lex. Basileon siluestre vocant, non sine hallucinatione. Existimamus hos ignorasse quid vocarint Basileon siluestre.

Idem nomen obtinere præterea sequentes plantæ. Acinos Dodonzi. Ocimum medium. Botrys altera. Ocimastrum Valentinum. Scrophularia maxima. Scroph. vulgaris maior. Ocimoides album multis. Ocimoid. album flore pleno. Ocimoides purpureum multis. Ocimoides, purpureum polyanthes. Ocimoides non speciosum. Saponaria minor quibusdam. Flos Constantinopolitanus. Ocimoides minus Creticum. Releda minima. Ocimoides lychnitis reptante radice. Caryophyllus angustifolius. Valeriana rubra quorundam latifol. Ocimastrum verrucarium. Cacubalum quibusdam. Clinopodium. Erinus: & Chamæleon niger.

OCIMOIDES ALBUM MYLTIS.

CAP. XXXVI.



Perenni nititur radice cubitorum duorum aut trium longitudine, interdum brachiali ferè crassitudine, multifida, alba, acri, & subamarâ, quæ antequam de terra emergat innumerosa capitula pollicaris crassitudinis, aut minora, dodrantalia, aut palmaria diuiditur: caules emittit crebros, cubitales & squicubitales, vel etiam maiores, hirsutos, geniculatos, ramulos: ad quorum singulas iuncturas folia bina aduersa, oblonga, acuminata, pilosa, ex sinu ramulos emittentia: flores summis hærent ramulis, Ocimoidis rubri similes, sed colore niveo radiati, & calyce hirsuto, canaliculato, turgidulo: semen vasculo turbinato, Nicotianæ æmulo, in creatum denticulatūve orificium dehiscens, sed inuolucro exteriori striato, continetur copiosum, Hyoscyami par, rotundum, compressum nonnihil, coloris cinerei,

germani hanc *Gledweid: Gledraut Margen* Synonyma *Röselin*

Roslin, wild Margen Roslin / tauben Kropff / miter stoß, Spley spirtel, & Lydwich appellant: Belgæ Jencetickens: cæli Oceller fauages. Latini & græcum quoddam acceperit nomen apud Veteres, inter authores non conuenit, aliis aliter eam appellantibus. Aliis enim Ocimoides siue Ocimastrum esse videtur, vt Matthiolo. H. Lugd. pag. 682. inscribit Ocimoides maius Matthioli: Ocimastrum & Ocimoides Ruellius (qui & albam iaceam): Tabern. Icon. & Hist. Lob. in Adv. pag. 149. [vbi & iaceam albam Monspelien-sium, & Herbam tunicam Gordonii] & Obs. pag. 184. Ocimoidem maiorem flore candido Cæs-alpinus: Ocimoides albam duplex Gesn. hort. marem sc. cui apices in medio adscendit, & scæmi-nam, quam sine apicibus ait vesperi odorem spi-rahntem tanquam Hesperidem Theophrasti. I. c. de coll. stirp. Ocimoides albam duplex: vnum in medio apicem exerens minus odoratum: al-terum (sine apicib. puta) odoratius, eodem die marcescens.

Er hi præcipue sunt quibus Ocimastrum esse videtur: at *ocimoides* Ocimo foliis simile est, ra-mosque habet breues dodrantes modò, radi-cemque tenuem & superuacuum. Præsens verò hæc planta caules præmit cubito longiores, folia oblonga, Ocimo nullatenus similia, & radices longas, crassasque, quæ manifestam contradic-tionem, & euidens huius cum Ocimastris diffe-rentiam ostendunt.

Non defunt porro ex recentioribus, qui cum inferioris Germaniæ Pharmacopolis Saponariam hanc esse dicant: est tamen & alia Saponaria, de qua inferius.

Plenque Lychnidem siluestrem pronunciant: sed cum Lychnidem siluestrem fatiunt omni ex parte similem fecerit Dioscorides: hæc verò à fa-tua Lychnide caulibus, foliis, floribus & radici-bus multum differat, Lychnis siluestris esse ne-quit. Hallucinatut ergo inter alios Dodonæus, qui Lychnidem siluestrem statuit, & nomencla-turas, quas inter nothas & reiectas retulimus, huic adscripsit. Camer. hort. & Schwenckfitem-que Lob. in Icon. Plant. pag. 336. Lychnidem silue-stre albam appellant.

C. Bauh. phyt. dicitur Lychnis nona, siue sim-plex silv. alba, & Saponaria hirsuta: Clus. Ly-chnis silv. flore albo: Dubitat autem an sit Me-landrium Plinii: Lonic. Lychnitis silv. flore al-bo. Fuchsius cum Tubingæ apud ipsum essem vocabat Iouis florem albam. Tragus Polygo-nati titulo pingit, & tamen inter Rosas marianas reponit.

Ocimoides vulgò dictum obseruauit Mon-f. pelii florens Martio & Aprili: Basileæ Iunio, Se-ptembri & Octobri, ac etiam Nouembri inter portam cineream & lapideam extra urbem, & quæ itur Krenzack, & quæ descenditur ad mo-lendina papracea: Genevæ passim in sepibus virens principio Februarii, duplex, cum & sine apicibus, quasi sit mas & femina. Passim copiose nasci in Italia, præsertim inter segetes prope se-pes & agrorum margines, perhibet Matthiolo: In Siliciæ dictis locis florere Iunio & Septembri author est Schwenckfeldius: Passim in Austria, Scitia & Pannonia cum in silvis, tum montanis pratis Clusius: plurimà Æstatis parte, & in Autu-mnum usque florere Dodonæus.

Vaseula pueri Senenses colligunt, vbi exarue-runt, & semen excidit, vt intus insufflantes acu-tissima edantibilia.

Tom. III.

Ocimoides albam flore pleno.

Hirsuta per ramos ex aduerso sita folia pos-sidet, adeoque totâ facie cum eo quod simplice est flore conuenit, solo excepto flore, qui tam multiplici foliorum stipatu luxuriat, vt Rosam albam imitetur.

Clus. vocauit Lychnidem silv. flore albo, ple-no, odorato, in cultis. Lob. in Adv. p. 142. Ly-chnidem silv. multifloram albo flore. Argl. 202. ble Rose Champion. C. Bauh. Lychnidem g. siue siluestrem albam multifloram, vel Sapona-riam hirsutam.

Ocimoides albam longo cultu aliquando florum folia multiplicare, & polyflorum reddi, perhibet Dodonæus.

OCIMOIDES PURPUREVM MULTIS.

Ocimoides rubrum ex radice minimi digiti crassitudine, alba, sapore subacri & suba-maro; fibris multis donata. caules emittit aliquot cubitales & bicubitales; geniculatos, hirsutos, concauos, nonnihil subinde rubentes: ad quorû singula genicula, folia binâ oriuntur opposita, foliis Plantaginis aliquatenus similia, oblonga, lata, acuta, tactu mollia, hirsuta: flores simul ali-quot in caulium summitate fert inter folia simul iunctos, sed non simul se expandentes, & quin-que foliolis suauiter rubentibus bipartitis, corda-tisæ compositis, stamina quinque alba flore al-tiora ambientes, calyce striato, lanuginoso, par-tim rubente, partim vidente, pediculo breui, vil-loso, in quo seminis conceptaculum oblon-gum.

Gesn. de hort. vocat Ocimoides purpureum, vel roseum, duplexque ait. marem cum, & scæmi-nam sine apicibus. De coll. stirp. Ocimoides ru-brum duplex, purpureum dilutum, albo cognat-ius, odoratiusque Alpino, etiam die se claudens: Item, Ocimoides purpureum: vnum in medio apicem exerens, minus odoratum: alterum non odoratius, eodem die marcescens. Th. Lus. Oci-moides rubrum: Matth. Ocimastrum purpureû: Camer. apud Matth. in Hist. germ. Ocimastr. flo-re simplici rubro: Tabern. Ocimastrum tu-brum.

De hac, ceu & alba ante dicta, Lobel. in Adv. pag. 142. ait: Lychnides siluestres affines passim secus satorum sepes exeunt, radice non ita ma-gnâ, gracilioribus ac paucioribus, tum cauliculis, tum foliis, & mollioribus, nec perinde tomento-sis, sed ex pallido herbaceis: Alteri flores rubelli dilutionis Rosæ, alteri verò niueo candore re-nident.

Dodon. dicitur Lychnis silv. flore rubenti: Lobel. in Obs. pag. 181. I. c. Plant. p. 335. Lych. silv. rubello flore: an Hesperis Theophrasti? Camer. hort. Lych. silv. rubra. Schwenckf. Lych. silv. purpurea: C. Bauh. phyt. Lych. 8. siue aquatica purpurea simplex: Clus. Lych. silv. flore rubro & dilutius rubente & subuirelcente. Lonic. vo-cat Lychnitidem flore rubeo, negatque meritò esse Polemonium & Been rubrum: Tragus Ro-sam marianam flore rubeo, traditque de hac ca-dem, quæ de 3. siue alba: Fuchf. quondam Iouis florem cæreuleum.

Genevæ in monte Thuiri vidi florentem men-se Maio: Basileæ & Montbelgardi multis in locis prouenit. In Austria, Scitia, Pannonia & Siliciæ

Nn z

Descriptio.

Synonyma.

Locus

Descriptio

Ocimoides purpureum vel roseum.

Lychnis silv.

Synonyma

Polemonium non est Rosa mariana. Iouis flos cæreuleus. Locus & Tempus.

herbulis & humidis montium tractibus, autore Schvvenckfeldio, plurima Aestatis parte in Autumnum floret.

OCIMOIDES NON SPECIOSVM.

CAP. XXXVII.

Descriptio.



O Cimoidis genus haud speciosum, Ocunoidi albo simile, planta est annua, pedalis vel cubitalis, ubi suae spon-tis est, in viridariis culturâ maior adole-scit, radice satis crassâ, albâ, breui: *fol. lu* Ocimoidis al-bi, atro-viren-tibus, lanugi-nosis, ex nodis aduerso situ positus, oblon-gis: *flore* mino-

re quàm in Ocunoides tam dicto, parte supinâ al-bo, ac etiam dilutè rubente: pronâ ex languido luteo pallecente, quinque foliolis bifidis con-stante, quæ mane expansa, vesperi circumfle-ctuntur, vt in Polemonio Petræo Gesneri: caly-ces longi, villosi, canaliculati, æquales, viscidum tota plantæ summitate, qui succrescente se-mine cinereo, minuto, Papanetis, turgescunt, à pericarpio glabro distenti.

Synon.

Camer. hort. vocavit Lychnidem siliu, viscidam vel noctifloram, annuam, noctu tantum floscu-lum odoratissimum explicantem, coloris albi & nonnihil puniceantis: Item, Ocimoides noctiflo-rum Autumno & ingruente Hyeme in odorum: Calp. Bauhinus phyt. Lychnid. 12. siue Lychnidis speciem, flore noctu tantum in Aestate odoro: Schvvenckf. Lych. sylu. albam noctifloram, wild. Nacht-Margenroseliu.

Locus &

Tempus.

Provenit in agris circa Boll & admirabi-lem fontem floret Augusto & Septembri, & ad-huc Octobri.

SAPONARIA MINOR QVIBVSDAM.

CAP. XXXVIII.

Descriptio

R adices habet crassas, longas, multifidas, fi-bratas, in multa capita diuisas, molles, exte-rius nigras; intus albas: caules per terram supini procumbunt, hirsuti, rubentes, geniculati, ramo-si, quorum nodi adnascuntur ex aduerso prorsum folia bina, Polygoni aliquatenus figurâ, hirsuta: flores purpurascens, Saponariæ minores, ex calyce oblongo, hirsuto, rubente, quinque & fo-liis & apicibus in medio constantes.

Mathiol. in post. comm. figuram Cneori Theo-phraستي titulo pingit, quæ videtur exprimere Sa-ponariam hanc minorem quorundam. Label-lus A. 1. vocat Ocimoides repens polygonifolium: Gesn. Ocimoides paruum.



In Hist. Lugdunensem, Saponariam minorem Dalechampi pag. 823. & Ocimoides repens Poly-goni folio p. 1429. virobique describi, & figuram posteriorem meliorem esse. Eandem p. 1365. pro Cneoro alio Theophrasti Matthioli, sine vlti de-scriptione, & vitiosâ figurâ extare. Sed censura hæc de Cneoro, meritis aduersus Matthiolum effun-denda erat, ex quo desumpsit compiler H. Lu-gdunensis. Is enim quamvis Romæ se accepisse dicat, nullis deficientibus notis, non tamen de-scripsit, nec addidit sine candidum an nigrum. Verum hoc non foret patrocinari Matthiolo, Cneorum Theophrasti (ait apud Matth.) nobis non videtur aliud quàm Lychnis aut Ocymoi-des repens: Nolumus Matthioli figuram amo-ueri, meliorem exhibituri cū in Appennino legitimus. In phyt. vocat Lychnidem 33. siue Ocimoides repens montanum. An eidem Oci-moides minus Herbariorum, Vtceolatis Plinii: An Cam. hort. Ocimoides repens, itēq; angustifoliū flore rubello: An Casalp. Ocymoides paruum. Delectatur loris ad merid. & sitis, arenosis & col-lib. in xta Rhodanū & Arne Genue. Aliquādo Cu-ria Rhætor. reperi florētem Maio, Iunio & Iulio: Sub finem Aprilis prope S. Hippolitū Burgidiz.

FLOS CONSTANTINOPOLITANVS MI-nutus albus & varius. CAP. XXXIX.



Ex his patet

H. Lugdunen-sem huius effi-gies multipli-care. Primam enim propo-nit p. 823. ut uld Saponariæ mi-noris Dale-champij. Alte-ram habet p. 1365. Cneori al-lias Theophra-sti Matthioli, in-scriptione. Tertiam dat p. 1429. Ocimo-idis repentis Polygonifolio, in-scriptione. Et hinc ait C. Bauh. in anim.

Numerosis Describri radice, gustu subacti: caules tollens, cubitū & sesquicubi-tum circiter al-tos, teretes, hirtos, inanes, crebris genicu-lis interceptos: ad quorū sin-gula bina folia coningati, al-ternante con-iunctionum situ, adnascuntur re-diculo nullo, sed latiore basi caulem ample-ctentia,

Centia, *Lychnidis sylvestris* æmula, verum nigriora, rigidiora, magisque aspera lanugine obfusa, priora cum Caryophyllis laetifolia magnam similitudinem habentia, gustu acri: flores in ramulorum extremis umbellam deformant, odore suavi quamquam obscuro, sed colore perquam amœno, miniato, aut cinnabaris factis, aut carneo, quorum singuli è quinque foliis constant, oblongis, bisulcis, utrinque cis medium alatis, & ad exortum binis appendicibus incumbentibus autis, sic ut integrum & explicatum folium papilionem occultato corpore exprimere posse videatur: inter hæc, stamina purpurascens apiculis violaceis sustinet: emicat autem flos ex calyce oblongo, hirsuto, viridante: in quo postea est semen pullum exiguum. Figura nostra Fuchsiana minus placet.

Flos Constantinopolitanus inscribitur à Dodonæo, qui Gesnero auctore, duplicem facit, bicubitalem sc. floribus, in latis umbellis, multis simul congestis: & cubitalem aut paulo altiore, ratiore, ac primo anno flores proferentem, de quibus ait: Nostri vulgò Constantinopolitanum appellant florem: Germani verò Hierosolymorum: Aldroandus Creticum cognominat: alius Lychnidem coronarium. Sunt qui velint Lanariam nuncupatam Latinis radicem esse, quæ Græcis *ῥυθιον*, Arabibus *Condifi* dicitur, quæ ad purgandas lanas, qui eas eluunt, olim utebantur: quos veritatem minus assecutos esse evidentiuss est, quam ut refelli debeat. Gesnerus hort. Ocimoides peregrinum dixit flores quos ab Hierosolymis denominant, croceo colore splendente longè pulcherrimos, odore carentes, vocaque nõ marcescentes. Idem in append. vocavit Ocimoides croceum, aliquot annis durans, licet primo anno floreat.

Tabern. in Ic. & Hist. dicitur Lychnis Chalcedonica, Zimber Rösslin: Lobel. in Adv. pag. 143. Obs. p. 183. & Ic. Plant. p. 340. Lychnis Chalcedonica siue Constantinopolitana miniata: Camer. hort. Lych. Constantinop. vel Cretica. Clus. Lychnis Byzantina miniato albo, & versicolore: Schvvenckf. Lychnis peregrina miniata, *ῥυθιον* Theophrastis & Negelin. h. e. Caryophyll. Turcicus, Jerüsalem blümlin, Flocculus Hierosolymitanus, Spornblümen, & Ungeri *ῥυθιον* Rösslin/ Rosula Hungarica.

Peregrinus est flos: feritur in hortis: Iunio & Julio altero à satione anno floret, deinde pluribus sequentibus aliis. Radice etenim constat vivaci: diuque durat: Hiemis & frigoris patiens: E Dacia florem hunc allatum narrat Gesnerus.

Cæterum, Flos Constantinopolitanus, præter eam, quam in hortis & coronis gratiam assecutus est, nullum, quod sciamus, medicum usum habet: facultas eius ea de causa incomperta est. Radicem tamen, quæ gustu aliquantulum acris est forsan haud ineptè quis calidam in primo gradu statuent.

STRUTHIVM, RADICVLA, SEV Lanaria herba veteribus, & Condifi.

CAP. XL.

Dioscorides quamvis Struthiũ non descripserit, tanquam vulgò notum, ut quo fullores ad purgandas lanas utantur, foliorum tamen similitudinem indicavit in Papauere spumæo, id est, Herculano, ut Theophrastus vocat, & in

Tqm. III.

Phyteumate. Eius radicem verò acrem esse ait Vires vinamque ciere: auxiliari iocinorosis, tussis & orthopnææ, sumptam cum melle cochlearis mensurâ, & alium quoque subducere. Eandem cum Panace & Capparis radice calculos frangere, & cum vrina expellere, lienemque in scirrhus induratum liquare. Subditam verò menses trahere, & partus efficaciter enecare. Cum polenta autem & aceto illitam, lepram emendare. Discutere & panos cum farina hordeacea & vino decoctam. Misceri præterea collyriis exatuentis oculorum aciei dicatis, itemque malagmatis. Sternutamenta etiam facere, atque per os purgare tritam cum melle ac naribus insusam.

Hæc inter nothas Dioscoridis appellationes Appellat: à quibusdam *Cadre*, ab aliis à purgando *Catharsis* nothæ vocatur. Sunt qui & *Struthocamelon*, qui *Chameyron*, i. e. humi sparsam appellant. Magi denique *Chaltryriton*, Egyptii *Aeno*, Aphri *Sirin*, Romani *Radiculam*, siue *Herbam lanariam* vocant: à radicis tanquam præcipuæ partis vsu.

Vnde autem Græci Struthion nominaverint, non satis nunc patet, nisi fortè à foliorum positura: quæ avium alas quadantenus imitantur, nomen illi fecerint: *ῥυθιον* enim & *ῥυθιος*, ea gens passerem, & minores alias appellat aues. Quod si in cibos radix huius transfret, crederet Marcellus ob caliditatem quam in quarto ordine habet auctore Galeno, venerè stimulare. & ob id Struthion dictam. Græci siquidem *ῥυθιον* passerem dicunt, & ab eius avis salacitate, *ῥυθιος* quasi passores, ad Venerem procliviores homines: & ex ea ratione id facientem herbam Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro compertò est.

Hanc Dioscorides ait in nares coniectam sternutamenta excitare: in quem vsum Celsus lib. 7. cap. 22. eam quoque recipit.

Struthii radice [inquit Gal.] maximè utimur, *Galeo*: quæ gustu quidem acris est, temperamento verò calida & sicca ex quarto ordine. Vim habet extergendi & irritandi: propterea etiam sternutamenta movet, similiter ut alia, quæ sapore acris, & temperamento calida existunt.

Hipp. de nat. & morb. mul. radicem Struthii [*ῥυθιον ῥιζαν*] læviter tritam & contusam ad pugillum vnum, mellèque subactam; & in pessario subditam, menses & puerperia purgare, aqualque educere, auctor est: Produci autem in Andri [Andri alibi] insulæ præcipuè litoribus.

De hac ita Plinius lib. 9. cap. 3. At quæ vocatur *Plinio*: Radicula, lanandis demum lanis succum habet, mirum quantum cõferen candori mollitiæque. Nascitur sativa vbiq;e, sed spontè præcipua in Asia Syriaque, saxosis & asperis locis. Trans Euphratem tamen laudatissima; taule fetulaceo, tenui, & ipso cibis indigenarum expetito, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur, folio Oleæ: Struthion Græci vocant, floret Astate, grata aspectu: verum sine odore, spinosa, & caule lanuginoso. Semen ei nullum (Plinio repugnat hic Columellæ versus: *Plinio cõtradiçtionem*.)

De eius verò vsu pleraque ex prædictis habet lib. 25. cap. 5. & lib. 24. cap. 11. Malè autem in Struthio ramulos appellat, quod radices debuisset dicere: cum excepta radice Struthion nihil sit, re. & annotante Marcello; vnde etiam, seu ex portiore radicem vsu, Romanis Radicula dicebatur.

Sed an Struthiũ in Italia nascatur asserere noluit

Matthiolus, quippe quodd ipsum non viderit, nec qui illud cognosceret, animaduertit.

Struthion [inquit Marantha] est planta, quæ alio nomine Radicula & Lanaria appellatur: sed & Struthion etiam est Mali Cotonei genus quoddam.

Marantha. Geropius in Vertumno Herbari lanariam duplici ratione nomen Struthij accepisse credit: semel vt moneamur tam puram coniugij castimoniam esse debere, quàm sit lana radice fullo-nia emendata: cursus quodd eadem Radicula libidinè etiam exciter. Vulgò pro Struthio ab Herbariis sumuntur Plantæ sequentes. Saponaria vulg. Flos Constantinopolitanus. Ocimoides purpureum Valeriana rubra quorundâ lausolia. Beem albû. Fraxinella. Cruciat. Lutea herba. Imperatoria. Asterantia. Elleborus.

SAPONARIA VULGARIS.

CAP. XLI.

Descriptio

Tenues Saponaria radice vario implexu vagantur: caules plures ferè recti surguntur, cubitales & altiores, subrubentes, hirsuti, crebris geniculis articulati: folia ex nodis bina aduerso posita nascuntur, Gentianæ cruciatæ, colore minus hirsuti, rigida, nervis communiter ternis, secundum longitudinem decurrentibus, saporis nitroso: flores tum in scapis summis, tum ex foliorum supremi scapi alis exoriantur in umbellam digesti Floris Constantinopolitani, albicantes aut ex albo tantillum purpurascens, odorati, quinque



Struthium
qui facit aut

Car. Steph.
repreh.

Struthium
Fuchf.

Gesf. sibi
convartum

& Ruellius.

Car. Steph. in colle huius Clymeni & Saponaris siue Saponariæ meminit, plures plantas confundens ex malè intellectis verbis Ruellij.

Tragus quidem Saponaria nomine depingit & describit, adque Violam agostem [Ocimoides fortè purpureum] referendam esse censet, & tamen Struthium Dioscoridis [cuius nothas appellationes adscribit] facit, & Códex Serapionis cap. 352. atque Códex officinarum.

Fuchf. in Hist. Struthium inscribit [in Icon. Struthium laucum] ac de eius appellatione eadem legit, quæ ex Marcello antè præcedenti capite ad- quimus: Saponariam autem & Herbari fullo-

num recentiores vocare, ex Ruellio docet: sed nec huius, nec illius mentionem facit.

Quam Gesf. de Hort. Saponariam vulgò dici refert, eam in cat. pl. Struthium vocat: sed malè, vel ipso de coll. stirp. monente, subscribentibus- que Corn. Matthiol. Dodon. Lobel. Lacunâ, Camer. H. Lugd. & C. Bauhino.

Licet autem Saponaria hæc ab extergendi potestate, quâ saponis ritu pannos eluit, purgâque, Struthium, seu & al. quædam eluit, vocari possit, à verbo *spithi*, quod Græcis, lanas purgare & candidas facere significat, tamen nostram Saponariam antiquorum Struthium, Arabum Condi- si, siue Latinorum Radiculam aut Herbari Lanariam (hæc enim nomina eandem designant plan- tam) non esse, tum ex Theoph. & Plinio liquet, tū ex iis quæ sequuntur ostenditur. Struthium Græcorum, siue Radicula Latinorum in Syria vbius colitur, ideoque Columella Syriacam radicem, ac eius semen Syrium vocat, Gaza Lanariam her- bam. Gignitur & ibidem in asperis & saxosis locis, radice magna [longa & tereti addit Serap. ex Diosc. quæ in nostris exempl. desiderantur.] gu- stu acri, & feruida, sternutationes irritante: folio Oleæ, spinoso: caule lanuginoso, tenui, ferulaceo, indigenarum cibus expetito, & quicquid tingen- te, cum quo decoquitur: flore alpe & grato, ino- doro, æstuali. Ab hoc igitur Struthio multis no- tis, ac præsertim facultatibus Saponaria nostra differt, teste Lacuna.

Cæterum nonnulli Herbari Tunicam appel- lant: non est tamen Vetonice coronariæ, multò minus Polemonij aliqua species, quas pro Tuni- cis herbis haberi, de Caryophyllis scripsimus. Videri etiam posset Alisma, siue Damalonium, ni- si caulis ei crebrò, non simplex, sed lubinde in alas qualdam diuisus, & radices essent quàm Ve- ratri nigri crassiores: folia siquidem habet Alisma- tis descriptioni conuenientia, & globosam flo- rum in summo caulium congeriem. Sed Alisma- tis tenuis est caulis & simplex, & radices simili- ter tenues: quæ differentiam Saponariæ huius & Alismatis ostendunt, inquit Dodonæus, qui Saponariam cum Lobel. in Oberu. pag. 170. in Icon. Plant. p. 314. inscripsit: Lacuna & Camer. Sapo- nariam vulgarem: Cæsalp. Saponariam vulgò: Lob. in Adu. Saponariam vulgi, foliis plantagi- neis aut Gentianæ, flore Ocimoidis: Schv. Sapo- nariâ, Herbari fulloniam & Lychnidem fullo- niam: Germ. Seiffraut/ weschfraut/ Speichel- wurz/ Silefj/ Runda/ Negelin/ Maackkraut/ & alibi Sparsenwurz/ autore Trago.

H. Lugd. frustra vnius huius plantæ duas de- dit icones: prima titulus est p. 322. Saponaria ma- ior; alteri p. 823. Struthium Fuchfij.

C. Bauh. phyt. vocat Lychnidem ro. siue Sapo- nariam læuam, floris colore ludentem, commu- niter dilutè purpureo, aliquâdo ex roseo ruben- te, nonnunquam candido: item caule leuiter hir- suto, foliis verd læuibus (qualè Tragum & Fuch- sium exprimere refert) nonnunquam etiam cau- le & foliis læuibus, qualem Lob. & Dodonæum pingere testatur. In hac & abortum se obseruasse ait, vt pro floribus sint copiosiores ramuli folia- cei paucis floribus intermixtis. Idem & Vircola- rem Plinij esse negat meritò. Anguill. epist. 14. est Ocimoides Ghini.

Apud Belgas in hortis colitur: alibi, seu in Ger- mania iuxta fluuios, torrentes, & stagna locis a- pricis & arenosis spontè nascitur, flores Iunio, Iulio, Augusto, Septembri & Octobri: Genera in colle

in colle la Bastie viret Aprili. In hortis diu durat
& vitæ est pertinacis. Reptatu in hortis odiosa
est.

Porro, Saponariam, calidam quidem & siccam
esse temperie attestatur Dodonæus : faculitate
autem abstergendi non exigua præditam. Preslu
(inquit Schvvenckf.) nitrosum extergentemque
remitit lictum, vnde vi pollet absterforia, adeo
vt etiam pituitum & capite chæst, ac steruena-
menta moueat tantâ violentiâ, vt partium mor-
tuum excutiat : Rustica gens puluere alcarides
puerorum expellit : abstergit scabiem & omnes
cutis fædicates. An autem hæc experientiâ ha-
beat Schvvenckf. ipse nos docet. In coronas
aut floribus tam suauissimi odorem, tum sum-
mam pulchritudinem, venit. Maculas vnde uos
vestium tolli, si cum Saponaria herba lauentur,
extra contrahunt verum est.

LANARIA SIVE STRUTHIVM
Dioscoridi Imperato.

CAP. XLII.

Lanaria Diofcoridis nomine ex Italia ad Fratrem missa planta eubothris, canie & ramis subinde angulosis: ad genicula *folia* nascitur bina ex aduerso folia, vinctula aut lescuncialia, angusta. *Garyophylli* holostii foliis similia: est quorum limbo rami exantem idem geniculati, foliis eodem situ amicti, quorum extrema nescio quid *stisolum* gerunt: inferiora folia ad Luteæ vulgo dictæ folia accedunt, longitudine ferè palmari, lescunciam lata. De eadem planta aliquot annis post ita proditum ab Imperator inuenimus, lib. 28. Hist. nat. cap. primo: Lanaria paganis dicta prouenit in Calabria, & in regione Bisilicata vicina Regni Neapolitani prouinciis. Dicta autem est Lanaria, quòd huius radice ramique commodè vtantur ad mundandas lanas. Ortus huius plantæ similis ferè Soponariz vulgaris, aut Lychnidis, sed ramis tenuioribus minutioribusque: quorum extremis *stiscoli* harent parui, albi. *Ipso* alioque rami subtilissimi articulatum ferè in ramulos subdiuisi. Semina minimis inuolutis continentur nigra, magnitudine grani Milii, saporis amarifculi.

STRUTHIVM SPINOSVM, SIVE
Conditi Bellunenſis.

CAP. XLIII.

Belluensis radicem effe scribit plantæ foliis spinosæ Carduorum modo, crassitie pollicis, intus subflauam, nigram foris, odore & gustu acrem: eius decoctio lanas, laneoque pannos sordidos abtergi. Damascenus Sepsariis eius decoctum immiscere confessionibus paratis de melle ac sapide, idque candoris tantum conciliare, vt ex amylo & saccharo purissimo consistare videantur: quin etiam sic durare, vt tenaciores sint, & vix morsu diuellantur. Constat eius radicem in globos coactâ, Syros vestium, linteorum, & indusorum sordes ac inquinamenta eluere, lapideis aut lixiui modo.

POLYCNEMON VETERIBVS.

C A P. XLIV.

Hippocrates m. m. πολὺν χρόνον (vel vt Fœl. in
ὁσόν ποτὺν χρόνον) nominat, ac fortè & suffitu

utero malè habenti adhibet, lib. $\pi\alpha\tau\epsilon\iota$ $\alpha\phi\alpha\sigma\sigma\omega\gamma$.

Dioscorides fruticem aut sarmentulosam, *folia*
habentem Origano similia, *caulem* verò multis
geniculis præditum [supplicatur Corn. hic inter-
ponendum ex Plinio, τὸν δὲ κανὼν πολυανθῶσαν,
στῆμα δὲ ὡστὶς γλῆχοντες:] velut Pulegium. Non
tamen *umbellam* habet, sed parvus in cæminibus
corymbos, cum acri quadam odoris iucunditate.
Seu recens, seu aridum (χαλῶν ἢ ἑρρὸν, vet. ξανθὸν)
ex aqua impositum efficitur vulnera glutinat:
sed quinto die folii debet. Ad stranguriam
itidem & rupta ex vino bibitur. Cætera quæ
huius capitæ accreuerunt, vet. adulterina cum Mar-
cello reuincunt.

Non habet Polycnemon certam in Latinis historiam: Plinius lib. 26. cap. 24. Cusilæ bubulæ, quæ inter Origana numeratur, similem tantum dixit: cætera ex Dioscoride iisdem verbis ab eo reddita sunt.

Galeno Polycnemon siccat, & calefacit se-
cundo ordine, vt propterea etiam vulnera
glutinet.

Nicander in Theriac. contra venenata eam
laudavit : ἀλλὰ τ' αἰνέσεις ψῆμα πολέμηνον, &c.
quo loco transmutatione literarum , vt solent
Poëtae, vsus est, Polycmenum dicens,

Meminit eiusdem Apollonius in comm. de
herbis, nec dissimilem Origano fecit.

Hanc inter spurias appellationes Clinopodii,
Iouis colum, Echeonymon, à Romanis Puteolo-
gen, & à quibusdam Polygonaton di-
cunt. Non quia verè Polygonaton similis sit, sed quon-
iam geniculato per totum caule est. Quam eti-
am dicitur Marcellus etiam fuisse causam ut Polycnemom
Græci eam vocarent, quasi frequentibus furis:
veritas enim furcis illi vocant, quæ in furculis
herbæ huius intervalla sunt, quibus folia inter
se distant.

Plinius lib. 20. cap. 16. de *Cunila bubula* obli-
vius ea scripsit, quæ de *Polynemo* lib. 16. et 14.
prodidit: ita ut cum historia *Cunilæ bubulæ*, *Pol-
ynemini* descriptionem confuderit.

Ceterum Polycnemonis appellatione sequētes donantur plantæ. Tricnemon. Consolida media. Prunella. Polygonum tertium Dodecxi. Polycnemon Dalechampii. Mentha aruensis. Clinopodium. Polycnemon Origano simile. Alline minor Thalij.

POLYCNEMVM DAL. FOLIIS
hirsutis, vasculis longis.

CAP. XLV.

Gignitur a radice brevis, florata, nigrescente, *sal-*
gibus palmum altis, fusculosis, crebris gen-
iculatis, foliis Tragorignis, digitis, odoratis, acerbis,
eximium ac suavem quandam odorem spiranti-
bus flore non umbellæ specie, sed in summis caulibus oblongo, ac ex vasculo hoc Dalechampii H.
Lugd. pag. 92. sibi ignotum fatur C. Bauhinus.
Ex aridis & æstivis Corficæ montibus ad Da-
lechampium allata fertur.

FLOS CVCVLI, ODONTIS QVIBVS DAM.
CAP. XLVI.

Subinde reptante, fibratâque radice se propa-
gat Flos cuculi dictus, *caules* tollens cubitales

*Diosc lectiss
illustrat.*

Plinius

Galenski

Nicander

Apollon.

Appellations-
nie (1911)

Polychaeta

P. im repub.

Acquiescence

Description

& altiores, inanes, hirsutos, geniculatos, striatos: in quibus folia ad genicula, bina, stricta, oblonga, acutiflora Caryophylli superbi dicti, rubete, carneove colore, rarius albo, fimbriati, apicibus cinereis, ex calyce oblongo, purpurante, striato, & quasi cannulato. Huius ex flore pleno suae rubente petita varietas.

Flos cuculi vulgò appellatur teste Clusio in Pannon. pag. 33. itemque Hist. post. (vbi Odontidis Plinij simplici flore titulo eam donavit.) & Lonicerò: Trago cuculi flos pratensis, qui respectu floris Armones speciei sciendam censet: Gels. hort. Odontidis Plinij Kreichio: Eidem in cat. pl. Odontidis Fœni genus: Ruellio Odontides fruticosus, à Plinio inter Fœni genera, Fœnaria rustica: Camer. hort. Odontis quorundam. Sed huic non omnes Odontidis Plinij notas respondere in Hirc. perhibet Thalius, qui *Agrostis* alterum, siue *Agrostis* speciem alteram vocat: Cesp. Bauh. phyt. dicitur Caryophyllus 29. siue pratensis, flore simplici, communiter rubello, rarius candido: Schvvenckf. Caryoph. silv. tertius: Dod. de Flor. Caryophyllorum, vel Armeriorum species quarta: Hist. lat. in fol. Vetonicz 4. species, & Vetonica silvestris: Lobel. in Adv. Ar. motari silv. pratensis, & Armeria silv. nonnullorum practicorum, Tunix Arabum: Icon. Plant. p. 451. Armeria pratensis silv. Flos cuculi Lob. in Append. Tunt. 316.

Nescimus quâ occasione Tabern. huius plantæ duas figuras dederit, vnam nimirum pro flore cuculi, alteram pro Caryophyllo pratensi, quam in Hist. 18. fecit.

Nomina
ling.

Germani vocant Gauchblum/ fuchtblumen/ Ped blumen/ & Pedtiegeln. Belgæ Craye bloemfens, i.e. Cornicis florem & Lockeornas bloemfens: Galli fleur du coqui, h.e. Florem cuculi.

Prata communiter ornat Maio, Iunio, Iulio & Augusto. Ad venena commendatur.

FLOS CVCVLI FLORE MVLTIPlicATO
purpureo, & altero albo.

Descriptio



Armer. a.
quat. Poly.
ther.
Odontidis
Plinij flore
pleno.
L. cus &
Tempus

terum Armerium aquatile flore albo.

Clusio est in Hist. post. Odontus Plinij pleno flore: Venetis *Margarita* nomine habuerunt Camerarius & C. Bauh. Floret adhuc Augusto: facile verò pent, nisi turculis propagetur.

ODONTIDI SIVE FLORI CVCVLI
affinis Lychnis sylvestris 1. Clusij in
Pannon. 4. in Hist. post.
CAP. XLVII.



constantes, Saponariz floribus accedentes, ex calice oblongo: semen rufum sequitur in vasculis ex principio angusto paulatim dilatatis: radix crassiuscula, nigra, multas fibras spargit, & singulis annis novos, eoque numerosiores caules profert.

Clusio in Pannon. p. 329. vocat Lychnidem silv. Sy. primam [4. in Hist. post.] Tabern. Lychnidem silv. purpuream in Icon. [7. in Hist.] C. Bauh. phyt. Lychnidem 29. siue viscosam rubram angustifoliam. Schvvenckf. Caryophyllum silv. 4. viscosum. Thalius *Agrostis* rubrum, propter florum colorem & Hesperidem, quorundam aliorum verò *Villegrem*.

In omnibus ferè Pannoniz & Austriæ inferioris montanis sylvis, editisque & herbidis locis invenitur, atque etiam sylvis Francofurti vicinis: floret Maio, semen Iunio maturefcit, Clusio: apricis & aridis delectari dicit cautib. Schvvenckf. Vbi in Hircinia locis aridis frequentem perhibet Thalius. Mhi verò ostensa Argentinz flore conspicua Maio.

LYCHNIS SILV. FOLII ANGVSTIS
& pluribus ex geniculis singulis,
Clusio 1. in Hispan. 8. in post.

CAP. XLVIII.

Geniculatos habet caules, tenues, in plures articulos divisos, pedales, aut maiores: folia in singulis bina, ternave, interdum plura, angustiora quam iam dicta, vinctis candido perfusi & quasi cæsi coloris: flores in summis ramulis nascentes, quinque foliis bifido mucrone præditis constantes, internâ parte candidos, externâ aliquantulum purpureoscentes, & antea quam omnino tabescant, seles contrahentes & circumvoluentes: calices admodum duros, breves, subrotundos: semen parvum, rotundum, Papaveris rhizadis, cinereis



raci coloris
continentes:
radicem satis
crassam, albam
multifidam, al-
tero anno pe-
reuntem.

Est hzc Clu-
sio in Hisp. Ly-
chnis silv. 1. in
Hist. post. 8.
Behen album
Salmanticensiu
& vulgo Colle-
lias. Lobelio
in Icon. p. 338. &
Obf. (vbi &
Behen album
Salmanticum
vocat, ipsique
minimè ani-
maduersu ait.)

p. 32. itemque H. Lugd. p. 317. & Tabern. in Ic. &
Hist. Lychnis siluestris Clusii prima. Cesp. Bauh.
phyt. Lychnis 18. siue silv. pluribus foliis simul
iunctis. Sulpicior me hanc habere collectam Ar-
gentinæ in horto D. Georgii Obrechtii foliis la-
tusculis ob culturam.

LYCHNIS SILV. LANUGINE CANES-
cens, flore maiusculo rubescente, Clusio 5.
CAP. XLIX



Multos
habet ex
una radice cau-
les, rotundos,
longiusculos,
cæteris infir-
miores, in terrâ
procumbentes,
geniculatos; fo-
lia in singulis
geniculis bina,
longa, mollia,
& lanugine
quadam canes-
centia, inter
quæ flores al-
ternatim secu-
dum ramuloru
longitudinem
enascuntur. O-
dontidi affini
Lychnidi silv.
formâ similes,


maiores & dilutiore colore rubescentes, vel, ut
ita dicat Clusius, incarnatos: semen illi in valculis
par, subrefum: radicem crassam & fibrosam, quæ
tamen plerumque alterum annum non superat.

Pingitur à Clusio in Hisp. & H. post. Lychni-
dis silue stris 5. titulo, itemque à Tabern. in Ic. &
Hist. vbi Lychnidem 12. silv. Græve wilde Ma-
rien Rôßlin cognominat. C. Bauh. phyt. vocat
Lychnidem 15. siue silv. lanuginosam incarnato
flore: H. Lugd. pag. 313. Lychn. silv. Clusii, hirtam
Lobeli: Lob. in Ic. Plant. p. 337. & Obf. p. 181. Ly-
chnidem siluestrem hirtam.

Clusius author est hanc subamaro esse sapore
& in marginibus quorundam Castellæ agrorum
inueniri.

Tora. III.

MUSCIPULA VISCARIA, SIVE
Lychnidis species.
CAP. L.



Crebris
Cilicium à
radice fruticat
ramis multis,
canlem ipsum
cubitalem alti-
tudine & quan-
tibus, genicu-
latis, solidis,
rotundis, pef
quos ad genia-
cula nascuntur
folia aduersâ
duobus plura;
oblonga, acu-
minata; qui-
bus latiora &
obtusiora sunt
in fima, ad Bel-
lidis acceden-
tia, viridia, glâ-
bra: flores tum

extremis ramulorum, tum è foliorum sinu pro-
deunt rubelli ex calyce simili Polemonio petreo,
oblongo, striato, qui delapsis floribus à pericar-
pio & valculo in ventrem turgente distenditur,
semine subnigro: radix lignosa, alba, multifida:
Sunt nobis plantæ aliz patuz huius generis do-
drante minores.

Muscipula siue Viscaria, Lobelio in Obf. pag.
242. [vbi Lychnidè silv. 4. Clusii & Silenen Theo-
phrastii Aldroandi quoque vocat.] & Ic. Plant.
p. 453. Spontè nascitur in aruis, inquit Clusius, &
inter segetes pingui solo, plenique Castella ve-
teris locis: in hortis culta, floret eodem quò fata
est anno à Maio mense vsque in Autumno: spôn-
tè etiam seritur, & ante Hiemem prodit.

Hanc Lychnidem silv. 4. Clusii pingit H. Lugd. Synon.
p. 313. & Tabern. in Icon. & Hist. vbi & Lychnidè
11. siluestrem appellat. C. Bauh. phyt. dicitur Ly-
chnis 25. siue viscolo caule, & Muscaria Adn. An
Viscago vulgò vocata Cæsalpino?

MUSCIPULA MAIOR CALYCE
turgido ventrioso.



Viscaria ma-
ior cubita-
lem emittit cau-
lem rectum, sta-
tim à radice ra-
mosum, crassius-
culum, hirsutum
striatum, fragi-
lem: folia Ocy-
moidis non spe-
ciosi, hirsuta,
mollia: ex ra-
morum diuani-
cationibus, fo-
liorum sinu, ex-
tremisque flores
ex pediculo sa-
tis longo ap-
penfi, quinque
foliis bifidis
purpurascen-
tibus, ortu sole
Oo

flauescentibus constare, apicibus in medio albis, ex calyce oblongo, hirsuto, pulchrè striato, quem in immensum distendunt seminū vascula è lata sessilique basi ventriosa in mucronem desinentia, semen continentia pulchrum, nonnihil ad papauerinum accedens, sed maius, compressum, striatum, cinereum: *radix* robusta est, recta, ex lateribus fibras producens: Tota planta ad tactum viscida: foliorum sapor glutinosus.

Synon. Hæc est illa, quam Clus. in Hisp. Lychnidem silu. 4. in H. stor. post. 2. inscripsit. Lobel. verò in Obs. p. 133. & Leon. Plant. p. 339. Lychnidem silu. 3. Clusij.

H. Lugd. & Tabern. notantur. H. Lugd. p. 88. hanc itidem pingit, titulo Lychnidis silu. 3. Clusij: cauliculis calyculis legendum. Compiler Hug. Lugdunensis errorem apud Lobelium à typographo commissum ignorauit: vt & Tabernam. qui idem etiam inscripsit: striatis, ponitque eius descriptionem p. 819. & aliam p. 816. Melius C. Bauh. phyt. dixit Lychnidem 20. siue silu. latifoliam calyculis duris striatis.

Locus & Tempus. Muscipula siue Viscaria maior floruit mense Maio Genetz ex semine eodè anno lata in horto meo: annua est herba: Montbelgardi sapientis prouenit ex semine deciduo. In arvis & inter segetes pingui solo, plerisque Castellæ veteris locis collegit Clusius: & in hortis Belgij florentem, eodem quo lata anno, à mense Maio in Autumnum vsque.

MUSCIPVLÆ MAIORI CALYCE ventrioso, similis.

CAP. LII

Descriptio



nos breues ramulos, in quorum extremis calyces turgentes, magnos, breuioribus multo quam in precedentibus vascula breuiora, tunicis diuisa, femina Papauers modo, parua, cinerea, continentia. Et sic quidem siccam descripsimus.

C. Bauh. phyt. vt iam annotatum, dicitur Lychnis 10. siue silu. angustifolia caliculis duris striatis.

H. Lugd. p. 817. & 219. Lychnis silu. altera Clusij, Papauer spumeum quorundam: Figura Lychnidis silu. alterius Clusij posita apud H. Lugd. p. 817. titulo non correspondet, inquit C. Bauhin. est enim figura Lychnidis silu. alterius incana

cauliculis striatis Lobelij, quare non huic figura descriptio Clusiana addenda: Clusij enim descriptio, quæ hoc loco habetur, est eius figura, quæ Muscipulæ, siue Armeriz alterius nomine p. 809. ponitur & describitur. Quare hæc figura p. 317. referenda est in pag. 819. vbi ex Lobelio, Lychnis silu. altera incana describitur. Dicitur pag. 819. videri Lychnidem quartam Clusij, Nego quia Clusius suæ tribuit folia intenso vitore ferè nigricantia: ex Lobelio verò vniuersam plantam albicare tradit.

Montspelij secus vias obseruauit gener Chelidonium præsertim quæ Castelnouanum pergitur, siccam etiam plantam dono nobis dedit D. Iacobus Zvingerus.

MUSCIPVLÆ MUSCOSO FLORE, siue Ocymoides Belliforme.

CAP. LIII



Ocymoides Belliforme
à foliis primū
pullulantibus
Bellidis folia vel
Globulariz referentibus, latis
densis, hirsutis,
obscurè virentibus, sapore nullo
insigni: licet reliqua per caules
folia oblongiora, angustioraque
conspiciantur, & ad
genicula multo
breuiora & tenuiora enascentia:
caules sæpè
excedunt cubitos duos, teretes,
hirsuti, inanes:

à caulis medio ferè ad summum flores aliquo modo racemosi ex longiusculis pediculis, spicam longam mentiuntur, pluribus ad genicula ortis mucariis, singulares autem parui, ex lacteo herbaceo, calyculo striato insidentes, quos vascula excipiunt turgida semine cinereo, papauerino ferè simili, insipido, plena: *radix* longa, mediocriter crassa, alba: tactu glutinosa est herba potissimum circa superiora. Totam amaram scribit Clusius: ideo tamen in culta Basileæ non obseruo amaritudinem.

Est Muscipula seu Viscaria altera flore muscoso, Lob. in Aduers. Muscipula altera flore muscolo, Papauer spumeum quorundam, & Sefamoides magnum Salmanticum Clusij, in Leon. Plant. p. 451. & Obs. p. 242.

Cæsalp. vocauit Viscaginem quandam, racematim tanquam in spica, flores exiles, & subpallidos ferentem. H. Lugd. pag. 684. Muscipulam alteram flore muscolo Penz. Tabern. Odontidem siue Lychnidis silu. 4. ge. us: Item, Sefamoides Salmanticum magnum. C. Bauh. phyt. Lychnidem 26. siue Viscalam alteram flore muscolo, multum cum Papauer spumico Dioscoridis conuenientem, si spumeum ob viscum inhaerens sit appellatum. Frazer postrema hæc verba ex Cæsalpino desumpsit.

desumpit: an autem conueniant huic potissimum, vel Viscagini priori Cæsalpini potius, aliis indicandum relinquo.

Ocimoides minus siue album, non est Sclamoides magnum Clusii, vt videtur H. Lugdunensi p. 683. Ocimoides enim minus florem habet album instar Been albi, oblongum: Clusii verò Ocimoides magnum fuscus racematin coarctatos exiguos ex pallido herbaceos: & hoc Clusii Ocimum sequenti p. 684. Muscipula alterius flore musculo nomine positi est, rectius tamen fecisset, si figuram Clusii, quæ melior est, Compilator assumpsisset, teste C. Bauhino.

Burnii in Rhœtia inueni florentem Iunio: Tiguri Gesnerus in horto alebat, vti ego Geneva, vbi non nihil culturæ formam mutabat. Eandem postea Basileæ obseruauit florentem & semine abundantem Iulio in horto D. Zvingeri, vbi à pluribus annis ea se conseruat radice perenni.

LYCHNIS PLUMARIA.

CAP. LIV.

Lychnidem plumariam, Pflaum Mergen Rößlin/ siue Lychnidem 4. Tabernomontano ita dictam à globulis albicantibus, rotundis, striatis, in quibus flos lanæ, vel plumæ similis, plantam caule firmo, recto, binis foliis ex nodo-



sis geniculis, incognitani sibi esse fatetur C. Bauh. phyt. vbi Lychnidem 24. facit. Mihi verò suspecta est iciuma hæc descriptio, fortè per Compilatores Hist. Tabern. facta ad figuram: mirum quod non annotetur locus, tempus, & sapor: vereor etiam ne figura minus sit artificiosa: quædam habet similia cū Muscipula

musculo flore, siue Ocimoides Belliformi: perquirant lectores.

POLEMONIUM PETRÆVM

Gesneri.

CAP. LV.

Radix longa, crassiuscula, lignosa, alba, subacris, ex pluribus radiculis in vnam coeuntibus, composita, à qua falsa infima nullo ordine nascuntur numerosa, vnciam circiter lata, tres, quatuorue vncias longa, pediculis satis prolixo, atro-virentia, hirsuta, sapore subacri & subamaro, pediculis rubentibus, hirsutis: caules cubito & sesquicubito nonnunquam longiores, tenues, rubentes, hirsuti, lento succo oblit, geniculati, binis foliis oppositis, hirsutis, oblongis, acutis, quæ ad singulos articulos: flores à calyce, qualis

Tom. III.



tum, crispum. Figura nostra ex Fuchsi: non placet.

An Trago Floris cuculi genus siluestre flore albo? An Tabern. Icon. & Hist. Lychnis silu. wild strawen Rößlin/ wild Mergen Rößlin / Lych. silv. 6. flore albo, ac etiam rubello: Hic si eandem nobiscum intelligit, non placet iciuma descriptio: An Cæsalp. Viscago flore candido?

Genevæ & Tiguri in muris abundat, sicuti & Basileæ: floret mense Aprilis & Maio. Plantatum in horto E. C. semen maturat Augusto & Septembri: prouenit etiam à la chaux florens Maio & Iunio: abundat in rupibus iuxta Morimontium: Gesnerus, qui Tiguri in horto colebat, me præfente Polemonium petraeum, vel laxapile denominabat, & Ceraicalem Val. Cordi: Dalech. Saxifragiam, Ocimoides minus, & Perdicium alterum Plin. cap. 17. l. 12. Ceterum, auctore Clusio nona (falsè legitur octaua) non modò in cædis siluis, sed etiam ad restibulum agrorum margines, nascitur per vniuersam Austriam infra Onasum. Moratiam, Bohemiam, Pannoniam, vltraque Muræ & Drauum, abundè etiam in siluis Francosurto vicinis. Meminit idem & in Belgica videre Lutzelburgensi Ducatu: Schvvenckf. in Silicia petrosi & asperis, florens Iunio in Gießmansdorf.

Locus & tempus:

Polemonium
petraeum;
Ceraicalem
Val. Cordi
Perdicium
alterum
Plin.

VISCAGO AVRICVLÆ FACIÆ RETICA,
& variæ atq; Clusii Lychnides.

CAP. LVI.

Radices agit fibrosas, Psimularum Veris instar, è quarum capite folia promittatis ampla, Auriculæ vrsi vulgò appellatæ flauo flore foliis non valdè dissimilia, candidiora tamen & lanugine pubescentia, etiam illis crassiora, densiora, & succo abundantia: altero demum à satione anno caulem producit duorum aut trium cubitorum altitudine, firmum, rotundum, succo quodam lento & glutinoso oblit, quo muscæ & alia minuta insecta insidentia detinentur magno numero: in summis ramis plurimos profert flores, veluti in umbellam congestos, etiam ad centesimum interdum numerum, satis tamen exiguos pro plantæ magnitudine, quinque foliis

Oo 2



bifidis constan-
tes, coloris ex
viridi flavesce-
tis. Huius se-
men ad se mis-
sum meminit Clu-
sius ex Italia, à
Iosepho de Ca-
sa bona, quum
ex Creta redux
esset, Muscipula
Auricu' x vrsi fa-
cie cognomine.
Iconem verò,
quam hac ta-
bella expressum
damus, ad ipsū
mittebat Iaco-
bus Plateau, quā
Clus. Lychnidē
filu. latifoliam
inscripsit.

Sunt verò illi & alia varia Lychnides quas de-
scribit, verbi gratia:

Lychnis filu. Clusio è semine nata, folio lanu-
ginoso 1. flosculo piceo, viridatix, Muscipula Ita-
lorum.

Lychnis filu. Clusio è semine nata folio lanu-
ginoso 2. flore foris ex fulgine purpurascente,
intus albo, viridatix.

Lychnis filu. Clusio è semine nata, folio lanu-
ginoso 3. flore carneo, annua.

LYCHNIS PARVA.

CAP. LVII.

Descriptio

Hoc nomine ad me misit Frater Lychnidis
plantam annuam, dodrante paulò maio-
rem, vnciale, rectam, radice singulari, lignosā,
fibratā, satis tenui: folia infima propter terram,
vngue non multò longiora: at superiora longio-
ra & latiora paulò existunt, Polemonij petrazi
folijs similia, minora, magis hirsuta, ad caulis hir-
suti & teretis genicula nascuntur: à caule medio,
summo tenuis tenuia foliola & flosculi conscen-
dunt oblongi, tunica striatā, rubente, longis pilis
obstitā inuoluti, eo ferè modo quo Polemonij
petrazi flores: vascula tandem oblonga, turgi-
dula, superius crenata alternatim per caulem ex
breui pediculo, tunica iam dicta obuoluti.

Synon.

Inscripsit hanc Lob. in Obl. p. 83. Icon. Plant.
p. 339. Lychnidem filu. hirtam minimam: H. Lu-
gdun. p. 819. Lychnidem filu. minimam 6. Clusij;
Tabern. in Ic. & H. st. Lychn. filu. minimam, kleinest
wild. Kame himmels Roslein; Lychnidem 14.
C. Bauh. phyt. Lychn. 16. siue filu. lanuginosam pal-
marem.

LYCHNIS MINIMA RIGIDA Cherleti.

CAP. LVIII.

Descriptio

Rigidula est planta, dudum triūve vnciarum
altitudine, raro palmum attingit, costiculis
durtis, rigidis, ramosis; folia ad nodos bina ex ad-
uerso posita, semuncia breuiora, perangusta, pi-
losa, è quorum alis nascuntur calyces semunciales,
bimuli, perquam graciles, æquabiles, hirti &



asperis: è quo-
rum apice sta-
sculus profluit,
quem præ exi-
guitate vix vi-
sus capit, put-
pureus: radix
dura lignosa:
collecta per Ge-
nerum Cherle-
rum prope Ne-
mantum iuxta
molendinum.

OCYMOIDES FLORE RVBRO, minus, Creticum.

CAP. LIX.



Ex semine Det
Cretico,
Ocmoidis mi-
noris flore ru-
bro Cándix
nomine à Ca-
sabona misso,
nata est plan-
ta, caulibus pe-
dalibus, hirsu-
tis, tenuibus,
plusculis ex ra-
dice tenui pul-
lulantibus: ad
quorum arti-
culos conspi-
ciuntur bina
folia oblonga,
mucrone ob-
tusis, ex quorū
alis ramuli duo
aduersi germi-
nant, fastigio flores rubros sustinentes longos, tu-
nicā longā striatā obuolutos, quemadmodum
Lychnis filu. 4. & 6. à Clusio depingitur: subse-
cutus est calyx longus.

Hanc est Lychnidem sylvestrem 7. Clusij al-
serere non dubitamus. Caspar. Bauhinus in
phyt. Lychnidis decimæ nonæ speciem facit,
sed folijs breuioribus, floribus minoribus, in
ramulorum summitatibus sitis, ac nomine Ocy-
moidis minoris flore rubro Cándix à me accepit.
se ait. Anno enim 1594. ex semine à Casabona
accepto mihi prouenit. Ego autem non possum
hanc ad Lychnidem 19. Fratr. siue incanam Lō-
belij, quæ ab illa non parum differt, referre. Ac-
cepi Statgardia semen, quod satum, Apili
prouenit, & floruit Iunio, semen
maturauit Iulio: ad pedis
autem altitudinem
peruenit.

Locu-
Tem.

OCYMOIDES LYCHNITIS
repante radice.

CAP. LX.



Elegans hoc Lychnidis silv. genus depingit Fab. Columna dicto Ocyroides Lychnidis repante radice titulo, sicque describit. Media est planta hæc inter Ocyroidem & Lychnidem coronariam: Ocyroidi vero, quia foliis sit parvis ab radice statim binis singulis geniculis hærentibus: at Lychnidi quia incana, pilosa,

atque carnosa folia habeat, non minùs quàm Lychnidis folia ad ellychnia formanda apta, similis videtur. Spontè ac frequens oritur in monte D. M. Virginis appellato, locis humentibus petrosis.

Radice tenui admodum firmatur, parum sub terra descendente, atque circum reptante, ex qua plures fruticantes viticuli rotundi, incani, hirsuti, bina foliola singulis geniculis hærentia habentes, quæ in imo minora sunt, deinde maiora in medio viticuli, quod contrà euenit in plantis, ab radice statim foliatis, ante caulis eruptionem, ut in Theophrasto legitur, hirsuta, carnosa, incana, Lychnidi similia, sed magnitudine & formâ Ocyroidi, Polemoniz Belgis dictæ. Cuius etiam, sicuti & aliarum congenerum ritu flores edit Aprilis atque Maio mense candidos, quinque foliolis constructos, stamina intus quinque lutea habentes, atque singula folia in summo quo latiora sunt, diuiduntur uti folliculi Thlaspi: Iunio semina in oblongis pericarpis mollibus, cartilagineisque perficis, folua; angulosa, hirsutaque. Pericarpium verò non vesica uti in superiore Ocyroides (Ocimum silv. intelligere puto) obducti sunt, sed tantum basim quinque foliolis constructam; ut in planta, Gallinæ mortis appellata. Huius radix viua admodum est, ideoque multum fruticat, atque perennat, terramque ipsius coma operit.

Sapor plantæ dulcis est, quare non ineptè Herbariorum, fœmellarumque vulgus ad eliciendum lac copiosum vitur, atque plantam sicuti cætera olera iusculis admixtis intus omni distraxis decoquunt, non sine Piperis, atque Amaraci modico, vel, ut alii solent, in placentam efformant, cuius elu magnam lactis copiam provenire experimèto se habere asserunt, atque hodie vtuntur. Ex his igitur, calidam atque humidam, nec aded terrena substantiæ participem esse censi potest. Hanc Herbarii Neapolitani, Herba lactaria vulgò appellant, à lactis eliciendi facultate ipsius nota.

Tom. III.

CENTAVRIVM MINVS FLORE
purpureo & albo.

CAP. LXI.



Obliquè radicem agit gracilem, lignosam, ex-lucentem, inspidam: caulis vnus [plures nonnunquam] angulosus dodrantalis circiter, lævis: folia per terram alia sparguntur, alia in caule, bina ex aduerso sita, Hyperici foliis maiora: flores in extremo caule, ramulique plures simul iuncti, ex oblongo viridante calyce suave rubentes; quinque foliis constantes, apicibus totidem luteis, quibus delapsis succedunt longa capitula, strigosa, pulvisculo farinaceo plena: sūt autem tum folia, tum flores, insigni amatore prædita.

Centaurium Diole testio paruum (& te-illustratur.

nue addit Lacuna ex vet. κενταύριον τὸ μικρὸν καὶ λεπτόν] quod alia qui, auctore Dioscoride, Lim: ζύ[μυα] δὲ Corn. κενταύριον

quo modo habetur apud Plin. quòd circa κενταύριον, id est, locos irriguos nascatur:] vocant, quòd humecta amet loca, herba est Hyperico aut Origano similis, caulem habens palmum excedentem (dodrante altiore) Sarrac. angulosum: flores ad Lychnidis florum similitudinem accedentes, è puniceo sc. colore ad purpuram inclinantes: folia minuta, prælonga [κένταυρον, vet. tamen κενταύριον] velut Ruta. Semen simile est Tritico: radix parua, lævis, & superuacua. Plinius eadem forè transcribit.

Quantis, inquit Theophrastus, Centaurii folia, caulesque amara sunt, vilia tamen planè sentiuntur. Huic cultus minimè adhiberi potest: Hoc enim imminutis viribus hebetatur, atque effeminatur, & aquosum redditur. Quærit loca argentia. In Elío agro sæcundum: quod montuosis æditur, infœcundum: quod planis, flore tantum gaudet: quod concavis ne floret quidè, nisi improbè. Cæterùm, quantum colligere licet, Theophrastus distinguit inter κενταύριον & κενταύριον. Κενταύριον enim ei est Centaurium maius, vt lib. 9. Hist. cap. 9. & 14. Item cap. 1. vbi legendum censeo pro κενταύριον κενταύριον, facili errore, cum Plinius ita legisse videatur, ac id Centaurio maiori competat. Κενταύριον etiam Hippocrati est Centaurium maius, vt videre est in principio lib. de aff. internis. Centaurium verò minus à Theophrasto simpliciter κενταύριον vocatur, vt patet ex lib. 3. cap. 1. lib. 4. cap. 6. lib. 7. cap. 9. Hist. Item de caus. lib. 6. cap. 4.

Gaza autem in versione sua Centauridem & Centaurium sub nomine Fellis terræ confundit, vt lib. 7. cap. 9. Hist. Item lib. 3. cap. 1. & lib. 6. cap. 4.

O o 3

Gaza nō
tatur.

Caus. quo loco Centaurion vertit Fel terræ. Lib. autem 9. cap. 14. Hist. idem rursus *κνιταριόνη* etiam Fel terræ reddi libro autem 6. cap. 6. item 9. c. 9. Hist. *κνιταριόνη* Febrifugam interpretatus est.

Centaurion minorē à Græcis Elleboriten vocari refert Apuleius, à Prophetis Hæna heracleo quasi Sarganum Herculis, Ægyptiis Amaranthum, quod non facili marcescat, Dacis Stirfolum, Italici, ed quod febres fugat, & procul à corpore pellit, Febrifugam, aliis Multiradicem. Eorum autem notharum appellationum difficilis, Marcello teste, est cōiectura: nihil enim inter eas tam propriura & simile est, ut misceri & communicari cum diuersarum plantarum nominib. non possit.

Græci *κνιταριόνη* appellat: item *κνιταριόνη* & *κνιταριόνη*, quod à videlicet circa palustria nascatur: Latini communiter Centaurion minus, paruum Lob. & alij tenue cognominant: Plinius, ut ostendimus, à loci occasione Libadion (si integra est lectio) ac propter summam amaritudinē, Fel terræ dici affirmat. Arabibus *Kanturion*, *Chanturion*, & *Katariun* sege. *segr*, seu *sages* dicitur, ac Linnæum eo teste, qui de Cetaurea libelli cōscripsit. Germ. *Tausendguldenkraut*, *Erdegal*, *fel terræ fieberkraut*, *Febrifugam*, *biberkraut*, Belg. *Santorie*, & *Rleyn Santorie*: Gall. *Perire Centaure*, siue *Centaure poulet*, & *Reperere*: It. *Centaurea minore*: Hetrulcis *Biondella*: Hispania *intoria* & *Fel de tierra*: Angl. *Centory*: Boh. *Zentluc mensay*: Polon. *Centurzia*: Hong. *Kü Centaurea*, & *exoriofil*.

Tabern. in Hist. hunc titulum fecit Cetaurion minus flore luteo perfoliatum, *geel tausentguld*: den: Item, Centaurion minus album, *weiss tausent gulden*. Sed quæ cognitio stirpium Tabern. vel eius cōpulatoris? ponit duas figuras Cetaurij minoris sub falso titulo, nulla addita descriptione, ac facit Luteum Centaurion simile purpureo quàm album, quod sanè nulla in re differt à purpureo quàm colore albo: luteum autem perfoliatum plurimum discrepat.

C. Bauh. apud Math. & in phyt. vocat Centaurion minus flore è puniceo colore in purpura rubente, pethibet quæ aliquando esse albo & ferrugineo: in humidis bicubitalis altitudinis: in aridis vix duos tresve transversos digitos adæquare.

Centaurij minoris vires & descriptionem cum Gratiolæ descriptione & facultatib. à Theophrasto & Plinio permixtas fuisse censet Dodonæus.

Centaurion minus nullis ferè non cognitum, quod passim in officinis habetur, verum & legitimum esse, omnibus, ut arbitratum etiam Matthiolum, exploratius est, quàm ut hic multis ostendi debeat. Quippe quod nullis in vniuersum notis Centaurij minoris historia refragetur. Quo fit, ut non parum aberrauerint inter Mauritanos Melius, Auicenna, & Serapio, utpotè qui Cetaurij minoris vires cum maiori turpiter confuderint. Inter alios dubitat Anguill. epist. 11. Difficile est, inquit, affirmare, Centauream minorem, quæ ostenditur esse eam, de qua locutus est Dioscorides. Verba enim eius cum dicit plantam similem Origano aut Hyperico, ostendunt esse similem tū foliis, tū ramis, quod non appareat in nostra.

Loca amat herboſa, aratro non proficilla, aliquantulum, sed tamen non omnino, rigua. Est non modò in Italia provinciis, verum & in Germania ac Belgio abundè frequens in collibus riguis. Iulio & Augusto vna cum florib. ac siliquis legitur. Basilæ prope Leutachin monte, & cir-

ca Dornacum in syluis Augusto florens obseruati: in siluis circa Geneuam pulchrè virens locis humidis mensis Februarij principio. Albo flore multis locis reperitur, potissimum circa Augustam.

Magni, multique vsus herba Centaurion minus. Herba ipsa virens contusa & imposita, vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Decocta eadem & pota legendum enim *μυαδόν*, & non *αμυαδόν* deuorata, ut legit Sarrac. bilem, humoresque crassos per aluum ducit. Decoctum ipsius ischiadicis conuenientissimè infunditur, trahit enim sanguinem dolorēque leuat. Succus ad oculorum medicamentum perquam vilis est: quippe qui quæ pupillis caliginem offundunt, vna cum melle discutiatur. Vultus subditus mentes & partus extrahit: peculiariter verò neruorum vitii epotus prodest. Galenus ob ingentes, iniaque eius facultates, de ipsius viribus integrum librum conscripsit, Papiæque dicauit, eiusque lib. 7. quoque simpl. meminit, sic inquit: Centaurij minoris radix planè inefficax est: sed caulis eius extremus & potissimum folia, quæ illi inhaerent, & flores vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum admodum exsiccatum est medicamentum, expers mordacitatis, &c.

Manipulus, inquit Tragus, herbæ vna cum floribus, dimidia mensura vini albi vel aquæ ad dimidias decoctus ac potus, bilem crassosque humores per aluum exigit: quæ de causa, vtilissima est hæc decoctio iis qui morbo regio, continuèque febribus laborant: eadem potio vesperti ac mane per aliquot dies sumpta iecoris lentisque obstructions soluit, omnia corporis vitia expellit, tinea ventris enecat, mentes, fortūque emortuos euocat: eodem modo usurpata tormina, colicam passionem, abasque ventris affectiones perlanat, maximè eas cum quibus nulla est coniuncta alui adstrictio: aquæ ex herba & floribus facilius vsus, sed non perinde efficax: quare delicatiorum ac puerorum esto remedium, qui lumbricis infestantur, quos si commodè pellere velint, singulis vicibus mensurâ tantum vel quatuor cochlearium haurient illam: quidam herbam in puluerem redactam è vino ad omnia ea quæ diximus bibunt, nonnulli pilulas conficiunt ex ea, quæ quidem ischiadicis, neruorum vitii & podagricis adhiberi possunt: quin & clysteribus haud inutiliter adicitur. Auctor est Matthiolum in Hetruria Biondellam nuncupari, quoniam abstergendis dealbandisque mulierum capillis ex lixiuo plurimum præstat. Detrahit hoc bilem & pituitam, quæ sanè facultate Cetaurion maius planè carere deprehenditur. Datur eius decoctum vtiliter tertianariis, quod bilem per inferna deiciat, quo factum est, ut quidam hanc Febrifugam vocauerint. Idem, ac pariter succus, iocinoris ac lienis obstructions & durities tollit. Alui tinea pellit, ex melle drachmæ pondere potus, tum vmbilico illitus. Hebet eamque decoctum, lentigines, varos, albos, & cæteras cutis infectiones exterit, infectis particulis adhibitum. Instillatur succus vermiculosis auribus, quinetiam illinitur contra papulas, & manantia capitis vlcera. Camerarius exhibet in apoplexia, paralyſi, epilepsia, similibusque morbis, quod ad intestina validè reuellt. Ceterum, quod Dioscorides & post eum Galenus scribit, Centaurion minus bilem & crassam per aluum ducere, ischiadicisque infundi deco-

Varia nomina.
Herculis
(sanguis).
Amaranthus
Sergius.

Nomina
ling. & Sy-
non.

Tabern. re-
preh.

Varietas

Locus &
tempus.

Decoctum : nos, inquit Dodonæus, tametsi frequenter ac feliciter hoc vsi, per alium tamen expurgationem vllam facere, obseruare non potuimus. Quamobrem nullam huic Centaurio minori commouendæ aut expurgandæ alui vim ac potentiam adesse existimamus : quas quidem virtutes Gratiolæ, cuidam Italici stancæ caulillo dictæ, & Centaurio minori amari tudine non cedenti, inesse non iam inficiamus.

PERFOLIATVM CENTAVRIVM luteum.

CAP. LXII.



Inutili fibrosa, multitudine alba radice nititur : caulem tollens modò simplicem, modò ramosum, teretem, glabrum, dodrante longiorem, vel sesquipalmum, qui folium ad singula genicula gemellum mucronatum traiecit : haud secus atque calidarum regionum Periclymenon : ceteroqui circa

radicem, proximeque terram folia sternunt multa in orbem, Centaurii minoris rubri (Clus. Saponaria vulgaris non dissimilis, minora tamen & candicantia) summis autem caulibus, ramulisque è foliorum sinu enatis flores insident maiores quam Centaurii iam dicti, Hyperici pates, intenso aut fulgore nitentes, quos magna excipiunt vascula semen minutissimum [Clusio nigru] copiosissimumque claudentia. Monspeli flores abundant succo luteo.

Gen. hort. Perfoliatam Achilleam appellat : Idem de coll. Perfoliatam hanc aliquos inepte Centaurium maius vocare refert. Lobel. in Adv. Centaurii lutei titulo pingit. In Obs. pag. 219. & Icon. Plant. pag. 401. inscribit Centaurium floribus luteis siue citreis pallidis Mesuci. Clus. in Hist. Centaurium luteum : In Hist. post. Centaureum paruum flauo flore. Suspiciamus iconem Clusii & Lobelii ad siccam plantam paratam, & ab eis foliorum formam negligentius obseruatam.

Centaurium luteum prius, H. Lugd. p. 1290. & Centaurium luteum alterum p. 1291. (quod ab illo discrepans fecit, quòd nullos furculos edat, ut illud, quibus flores insident, sed in summo caulis fistigio florem singularem mittit, Chrysanthemum similem) non sunt duo, sed vnum. Et postremum quidem nihil aliud est, quam primò proueniens, quòd cum vnum habet florem, vnumque caulem, ad latera plures producit. Idem locis reperitur, eodemque est gustu.

C. Bauh. phyt. dicitur Centaurium 3. siue luteum perfoliatum ramosum : Item, Centaurium 4. siue

luteum perfoliatum non ramosum. Eidem apud Matth. Centaurium 3. siue luteum perfoliatum ramosum, floribus aliquando pallide, aliquando intense luteis & planè autem, vel croceis : seminibus minutis nigris : Duplex, alterum angustioribus foliis & non perfoliatis, alterum latioribus multò, & caulem ambientibus. Centaurium 4. siue luteum non perfoliatum. Diximus nos antè esse Centaurium luteum vnicum non duplex, & quidem cum primum oritur ramosum non esse, sed successu temporis tale fieri. Propter errorem verò, ut puto, pictoris, qui figuram à Clusio & Lobelio exhibitam pinxit, nolim facere genus particulare Centaurium luteum non perfoliatum, quum etiam Lobel. dicat idem cum suo, quod id Adu. tradit.

Tabern. vel eius compilator in Hist. non describit Centaurium luteum, sed titulum solum ei imponit, qui non competit, scilicet. Perfoliatum luteum montanum quorundam.

Camer. apud Matth. vocat Centaurium minus luteum flore perfoliatum : Cæsalp. Achilleon in incultis nascentem, Centauream maiorem vulgi, & Centauream florum colore citrino paleari Mesuci.

Genevæ & Monspeli obseruauit florens mensis Maio. Tiguri in collibus reperitur, non frequenter tamen : Quamplurimum Galliarum Angliæ locis : Monspeli. Basileæ in pratis humidioribus Michelfeldensibus Autumno floret : sic in agro etiam Bononiensi & Monspeliensi, in pratis vdis versus Latte & Lupum montem : prouenit læto solo in collibus iuxta Tagum, ac aliis etiam Hispaniæ locis : vbi obseruauit Clusius.

Idem pollet facultatibus quibus Centaurium flore puniceo.

Tabern. 96. ratur.

Locus & tempus.

Virces & visus.

CENTAVRIVM MINVS ADVLTERINVM quibusdam Lychnidis viscidæ genus.

CAP. LXIII.

Tenuis est huic caulis, proceritate enibit vnus, aut sesquicubitus, rotundus, lævis, geniculatus non nihil rubescens, præsertim propter terram, superius cæsius, paulloque sub geniculis, visco tenaci obductus, in ramos diuisus : ad singulos nodos folia immediate cauli adnascuntur, binæ oppositæ, plerumque surrectæ, Been albi officinarum, sapore ferè oleraceo, magis nitrolo, colore glauco : in ramulorum summitatibus, veluti umbellæ florum ad Centaurium minus accedentium, suæque rubentium, quinquepartitorum, ex oblongis sed tenuibus, striatis, rubentibus calycibus, in quibus succedunt vascula longa extenuiore principio sensum crassescencia, semen minutum continentia, cineræci coloris : radix singularis : paucis fibris donata. Spontanea in quibusdam locis dodrantem assequitur, & paucos fert flores.

Descriptio

C. Bauh. phyt. dicitur Lychnis 27. siue viscosa altera purpurea lanfolia, atque eandem esse cum Lychnide silu. 2. Clusii in Hist. pag. 337. & Muscipula siue Armoraria altera Lob. in Obs. p. 242. in Ic. Plant. pag. 454. Idem in Animad. in Hist. Lugdunensem dicit Muscipulam primam Penz H. Lugd. pag. 684. sine iconem, putare Histoniam esse idem cum suo Oculoide minore siue albo pag. 683. sed falsum hoc esse. Penz namque Muscipulam primam esse, quam Historia p. 809.

Synon.

Muscipulae siue Armoriae alterius nomine pinxerit, & pag. 817. Lychnidis filu. alterius Clusij titulo, appositâ figurâ non conuenienti, descripte.

Ceterum, H. Lugdunensis sub titulo Lychnidis filu. alterius Clusij malè posuit iconem plantae, Muscipulae maiori calyce vtriusque similis, quae non respondet descriptioni. Eademque Histor. eiusdem plantae tres diuersas habet descriptiones, Sc. Muscipulae siue Armeriae alterius p. 809. Altera descriptio est Alfinis purpureae pag. 1235. Tertia Lychnidis filu. alterius Clusij p. 817. Sed & duas icones habet Muscipulae alterius & Alfinis purpureae tertia alterius est plantae.

Gesner. hort. vocauit Caryophyllatam siluestrem & Lychnidem quorundam: Tabern. Ic. & Hist. Viscariam satiuam, & Muscariam, Zam. leunfrant. Authore fratre Casp. Bauhino. Cortuso dicebatur Centaurea 2. & Euaginata Anguillae Centaurium minus existimanti. Montbelgardi se propagat semine deciduo, ubi Augusto mense florebat: Montpelij eam obseruauit. Spontè nasci ait Clusius in aruis & inter legetes pingui solo pleni quae Castella veteris locis in horis culta floret eodem anno quo sata, à Maio usque in Autumnum: spontè sentitur & ante Hiemem prodit.

POLEMONIUM VETERIBVS.

CAP. LXIV.

Disce illustratur.

Disce lecta suspensa.

Vites.

Calen.

Polemonion [πολυμόνιον] enim genere neutro Graeci, quamvis non desint quibus genus femininum Polemonia placeat] quod alij Philetaria [φίλεταρία] Philetariam legunt nonnulli. Cappadoces Chylodynamin [χυλοδυναμιν] à multiplici potestate dicunt. Ald. tamen χυλοδυναμιν. Marcell. ut fusiis dicitur, χυλοδυναμιν, appellant, ramulos habet tenues, utrinque pinnatos: folia paulo quam Rutae maiora [sequentia ascripta suspicatur Dodonaeus, quoniam neque in Crategei fragmentis habentur:] at longiora ad Polygoni, aut Calaminthae folia accedunt. In summo verò veluti corymbi sunt, in quibus semen est nigrum. Radix cubitalis [mox uia: Vet. m. χείρα, & sic quoque Lacuna:] albicans, Struthio seu Radiculae similis. Nascitur in montosis & asperis. Radix ex vino bibitur contra venenatas bestias ac dysenteriam: & ex aqua aduersus urinae difficultatem & ischiadem. Datur autem ex aceto drachmae pondere lenosus. Eadem contra scorpionis ictum amuleti instar adalligatur. Tradunt porro, qui radicem eam gestauerint à scorpiionibus minime feriri, aut si ab ijs icti fuerint, nihil mali passuros. Dentium quoque dolores mitigat commanducata, inquit Dioscorides.

Polymoniam, inquit Plinius, alij Philetariam à certamine Regum inuentionis appellant [certantur enim ob id olim reges, tradente Marcello ut aliquarum insignium virium plantarum, & accedentis ab illis humano generi beneficij Authores dicerentur:] Cappadoces autem Chylodynamin [i.e. mille vires habentem, quidam pro Chylodynami Chelydoniam legunt, Marcellus:] radice crassa [cubitali Dioscorides:] in reliquis eadem tradit quae ille.


Galeno Polem. tenuium partiu est, & siccantem facultatem habet: Vnde quidam ad ischidas, & dysenteriam, & induratum splenem, radicem bibendam dant cum vino.

Pro Polemonio, autem siue Polemonia di-

uerse plantae proponuntur: scilicet Been album officinarum. Polemon. Siciliae hirsuta, &c. Beton. coron. sitia. Beton. coron. filu. Saponaria. Ocimoides. Vaccaria. Valeriana rubra angustifolia. Valer. rub. latifol. Scordium alterum: Mentostreum. Fraxinella: Polem. petrzum.

BEEN ALBUM OFFICINARVM.

CAP. LXV.



Lignosa r. d. d. crassa & alba caules emittit cubicu & selquicubitu altos, tenues, teretes, laeues, geniculatos, in alas circa summum diuisos: ad singulos articulos folia bina opposita nascuntur, lychnidis formâ, sed penitus glabra, cû distichine quadâ, acris assatim & obscure amara: flores ex laxis vtricularu in-

star habentibus calycib. quinque partitis, rubris, herbidoque & albo verticilloribus, glabris, parum prominent, vel albi, vel ex albo purpurascetes, ex quinque foliis bifidis compositi, staminibus purpurascenribus medium occupantibus: calyces postea pericarpia continent Lychnidis semine plena.

Been album officinarum, Fuchs. lib. 1. de comp. med. itémque Dod. gall. & lat. in fol. Polemoniam esse putant, sed ab ijs planè dissentit Matthioli, quod hoc ramulis non sit utrinque pinnatis: ac quod corymbos nullos proferat, sed calycem Ocimoidis modo: quod denique non solum in montibus & asperis proveniat, sed ubique, praesertim in pratis. Licet autè officinae vulgò Behen album nuncupent, non est tamen id, de quo Mauritanii scripsere. Struthion nonnulli coniectant, verum plurimum discrepat. Nonnullis practicis ut Gordonio Tunica herba dicitur. Appellatur verò & à nonnullis, ut Lobel. in Adu. p. 143. Obs. p. 184. & Ic. Plant. p. 340. Papauer spumeum, cum quo similitudinis habet nihil. Clusius, qui eandem iconem cum Lobelo habet, Melandryum Plinij quorundam inscribit: Dodon. in fol. lat. Been album siue Polemonium, Ceterum, eorum figura minus placet, nec etiam nostra, quaternaria folia exprimens in flore: semper enim quina & bifida obseruauimus. Tabern. Herbarum articulare: Casp. Bauhinus Lychnidem 21. siue siluestrem Been album siue Polemonium dictum: Schvvenckf. Lychnidem filu. candidam 2. & Mo-

Duorum verò generum esse obseruabat etiam Clusius: Vnum enim in montanis nascent, altius adolescit, crassiores habet caules, qui cum laxis folliculis florem amplectentibus ex vindi purpurascunt: Alterius autem quod in omnibus etiam Germaniae pratis obuium est, diluotius & quasi albicantes

albicantes sunt. Sic & Gefn. in app. hort. Polemonium pratenſe ſita enim vocat, & Been albi duplex aſſignat, aliud apicibus ſorum albis, aliud purpureis. Sed C. Bauh. alteri ſorem candidum, alteri rubeum, & alteri viſcentem adſcribit.

Obſervauit Monſpeli, Lugduni & Geneuæ in ſiluis, aruis, & paretinis, ſorens menſe Maio: Baſileæ in pratis Iulio & Auguſto. In Auſtriaz, Bohemiæ & Sileſiæ herboliis ac latius collibus multa exit.

Eſt porro Been albi vulgò dicti ſi Polemonium non ſit facultates incomperatas Dodonæus crediderit. Tragus tamen commendat ad fomenta & balnea ſudatoria, quibus induratos nervos & articulos emollire conſueuimus, vtiliter parari dixit. Succus ophthalmiam calidam tollit, docente hoc Schwenckfeldio, & dolores oculorū mulcet: Semen pituitam purgat, & comitialibus datur. Suppoſitū egris neſcientibus criſin moliri vulgus credit. Quercetanus in phar. reſt. in ſuo extracto Bezoardico cur præſcribit Been album & rubeum, radices officinarum, quæ nihil habent Bezoardici, vt norunt vel mediocriter docti: Eſtne reſtituere aſſumere reiecta ab illis?

BEEN ALBO OFFICINARVM SIMILIS planta ſemper virens.

CAP. LXVI.

Hic multi ab eadem radice prodeunt rami palmares, craſſiſculi, lignoſique quidem, ſed fragiles, in quibus naſcuntur binæ ſemper aduerſa inter ſe folia, Bellidis folio non maiora, ab imo paulatim in latum expanſa, ſed ſummo mucronata, viridia admodum & ſplendens: & ſummi aliquot ramis alii enaſcuntur dodrantales, aut pedales interdum ramuli, geniculati, graciles, binis inter ſe oppoſitis anguſtiſſimis foliis ad ſingula genicula donati, & ſummo in alas contrario ſitu utrinque naſcentes diuiſi, quibus inſident membranaceis pinguibus caliculis incluſi flores, quinque biſidis foliis conſtantes, coloris quodammodo carnei, & quorum medio terna gracilia, incuruæque prodeunt ſtamina: radix candicat, pauciſque fibris prædita eſt, perennis tamen: Floret Iunio nouum hoc & elegans genus Melandryi Plinii quorundam [Been albi officinarum:] quod Cluſio, ſemite ex Italia miſſo Ocimoidis arborei ſemper virentis appellatio- ne, natum fuit, quodque Lychnidis ſilv. ſemper virentis titulo tradita deſcriptione delineauit.

Camer. hort. vocat Ocimoides arboreum vel frutiſum potius, foliis Myrti, ſplendens, flore rubro. Caſp. Bauh. phyt. dicitur Lychnis 17. ſive fruteſcens myrtifolia.

LYCHNIS MARINA ANGLICANA.

CAP. LXVII.

Been albo officinarum apprimè ſimilis eſt planta, vt haud à quoquam ita facile diſcerni queat. Nam, vt in illa, bina quoque geniculis herent folia, multò tamen minora, craſſiſcula, glabra, glauca, per oras eorum pilis breuiſſimis albis ſerrata: cauliſculi teretes, dodrantales, & lon-

Tom. III.

giores, glabri, humi ſpati: flores ex turgidis fol- liculis prodeunt ſpecioſi, ſtriatis, & Auellanae magnitudinem ſerè adæquantibus, pauciores, foliis conſtantes quinque biſidis, niueis, quàm illo latoribus, & ita geminatis, vt ſos plenus illius reſpectu videatur: in medio ſtamina totidem ſine apiculis, & plura quoque cum capitulis geminis, ex fuſco luteolis, ſapor nullus inſignis. Ad hunc modum in horto Montb. ſatam atque cultam deſcripſimus.

Huius ra- Synonyma:

multum Lobe- lianae figura appropinquat, ob eam quam ſuprà diximus, rationem. No- ſtra enim Ly- chnidis Angli- canæ, hoc no- mine exhibita figuram non damus, quippe quæ ex Lobe- liana iam erat parata, hæc minus ſeliciter picta videatur.

Lychnidem maritima Ang- licam pingit Tabern. in Ic.

& Hiſt. vocatque germ. Engliſch Morgen Röß- lin: Lobel. in Adv. & Ic. Pl. n. p. 137. H. Lugd. p. 136. C. Bauh. phyt. vocat Lychnidem 17. ſive maritimam repentem.

In ægæen. maritimis Vechis inſula Angliæ, tor- roque illo littore frequentem, nō nīſi inter ſilices & Bräſſicas marinas, quæ ſerè vndæ aſſuunt, e- naſci auctor eſt Lobel. Floret menſe Iunio, Iulio, Septembri. Lychnid. Anglicanae marinae nomine nullum ſemen per Roburum hortulanum Regis Gallia, ſatam Martio, ſtoſe protulit Iulio, aliquot annis durauit in horto e. c. Montb. Exiſtimo tan- dem periſſe ſuffocata vmbra maiorū plantarū.

Locus & Tempus

VACCARIA.

CAP. LXVIII.



Vaccaria Deſcriptio
caule ſur-
git ſingulari,
cubitali & al-
tiore, læui, te-
rete, concauo,
qui circa ſaſti-
gium in oppo-
ſitos diuatica-
tur ramos, at-
que hi in alios,
ſitu ſemper
contrario: folia
ad cauſi geni-
cula, bina ex
aduerſo naſ-
cuntur, ex
glauco pallen-
tia, oblonga, a-
cuminata, aliſ
ſuiſita cauloru
Pg

amplexentia, et ab eo transadigi videantur: singulorum extremis floris insidet dilute rubescens, quinque constans foliis, paulum è calyce prominens, qui canaliculatus, glaber, strias habet virides, cæteroque paller: pericarpium eodem obvoluitur, turbinatum, semine plenum nigro, rotundo, Sinapios magnitudine: radice lignosa, candida, recta, fibras à latere spargit.

Thamec-
men Cordi.

Thamec-
men.

A Cordo in Histor. Thamecmeni titulo describitur. Gessero autem, qui figuram addidit, videtur ad Polemonij vel Perfoliatæ species pertinere, ac græcæ linguæ peritum fortè Thameocneum potius dicere, siue à *thamē*, siue à *thameō*, quod est creber. Idem de coll. stirp. Cantabricam quorū iam nominat, sed non est. De hort. Lychnidem silu. quorundam, herbam in arvis nascentem, Perfoliatam rubeam nonnullorum, & Lychnidem Monachorum [Carthusianorum] *farthū* ser blümle. Anguill. epist. plantam hanc pro Glasto primo vero describit. Sed hallucinantur (teste Dodonæo lat. in fol. qui Vaccariam nominat, & Ocimoides suspicatur), qui Glastum, siue Itatidem esse, aut eius aliquam speciem iudicant: ad tincturam, siquidem inuolvis est. Lob. in Ic. Plant. p. 357. in Obi. pag. 190. Itatidis silu. Vaccariæ dictæ titulo hanc pingit, ac in Adu. eandem cum Myagro Matthioli esse contendit, sed falsò, vti capite de Myagro dicemus.

Lob. lapsus.

C. Bauh. phyt. Lychnidem 23. siue legetum rubram foliis Perfoliatæ, variare scribit foliis nunc latoribus, nunc angustioribus: totamque plantam modò maiorem esse, modò minorem & hinc tres apud H. Lugdunensem extare icones. Harum prima est p. 500. Itatidis siluestris Lobelij: Vaccariæ pallidæ titulo. Altera pag. 515. Vaccariæ rubræ maioris inscriptione, ibidemque tertia vaccaria tubra minor.

Vaccariam plantam vocat Herbarij, quod eam libenter vacca depascantur, tubram & pallidam à floris colore. Quidam Còrdurdum Plin. esse volunt. Cæsalpino verò Rapū syluestre dicta est, & genus Polemoniz læuis, c. Been albi officinarū Gignitur Montbelgard, Genevæ & Monspelij, ac etiam florens Iunio & Iulio, quo etiam mense semine maturo obseruatur.

Locus &
Tempus.

LYCHNIS REPENS FOLIO VIRIDI,
flore albo Clusij.
CAP. LXXV.

Descriptio



Singulis annis ex eadē radice noui prodeunt cauliculi, per terram sparsi, & subinde circa internodia radices agentes, deinde sursum denud sese erigentes palmari altitudine, graciles, geniculati, bina folia in singulis geniculis ex aduerso opposita ferentes, longiuscula, angusta, obtusò mucrone,

viridia, prominulo dorso: flores in summis cauliculis & lateralibus ramulis elegantes, candidi, quinque laciniatis foliolis constantes, inodori: quibus succedunt obtusa vascula, exigua, nigricante, planòque semine, quā notā quandam affinitatem cum Armeriis floribus habere videtur.] referta: fibrosam habet radicem, quam faciliè pangere licet. Vbi adoleuit lento quodam & glutinoso humore, superiore parte, illita videtur.

Clusio descriptionis auctori est in Pannon. p. 330. & seq. Lychnis 3. siue albo flore 2. In hist. post. Lychnis silu. 30. Casp. Bauh. phyt. Lychnis 31. siue silu. viscosa alba angustifolia maior [minor verò ac Lychnis 32. C. Bauh. phyt. quæ Clusio folio & flore est minore.] Lob. in Ic. Plant. p. 445. Caryophyllus minimus humilis alter exoticus flore candido amœno.

Prouenit ad Suriacatum Alpium & Senealben supra cœnobium Neuberger radices: abundantius tamen in Etschero lapidis commemorato.

AVRICULA MVRIS, SIVE
Myosotis Veteribus.

CAP. LXXVI.

QVÀ Dioscorides Muris auriculā [*μυρὶς ἀυρίδα*, alij verò Myosotida [*μυρὶς ὀτρίδα*] vocant, caules promit ab vna radice plures, aliquatenus infernè rubentes, & coneuos: filia verò oblonga & angusta [*ἐκείνη δὲ ἐκ τῆς ὀτρὶδος γὰρ ἐστὶν*, Matth. tamen legitur *αὐτὴ δὲ τοῦ μύρου*, h. e. tenuia & parua, non absque errore fortè] dorsi spinam elatam & emittentem habentia, nigricantia, per interualla assidue geminata, & in mucronem desinentia. Prodeunt verò ex alis tenues cauliculi, in quibus *stilosuli* caerulei, parui, vt Anagallidis. Radix digitali est crassitudine, multis fibrata capillamentis. Est denique herba similis Scolopendrio, sed læuior ac minor (vet. hanc partem non legit alij) continuè legunt, Sax.) Huius radix imposita ægilopas sanat. Sunt & qui Allinen [Helxinen quidam legiti] Myosotida vocitent.

Myosota, siue Myosotis, inquit Plin. læuis herba, caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus rubenibus, concauis ab imo: foliis angustis, oblongis, dorso acuto, nigris, per interualla assidue geminatis: & tenuibus cauliculis ex alis prodeuntibus: flore caeruleo: radix digitali crassitudine multis capillamentis fibrata. Vis eis sepulca & ægiloceratix, idè quæ ægilopas sanat.

Galenus secundo ordine ficeare, nullam autem manifestam caliditatem habere dicit.

Auriculæ muris nomine donantur etiam sequentes plantæ: Anagallis. Auric. muris Matthioli. Aur. muris 2. Veronica. Veron. Spicata. Aur. muris quibudam. Auricula muris pulch. fl. albo. Polemonium petraeum. Boreonaria Anguill. Pilosella maior, Pulmon. Galorum. Pilosella maior Fuchsio. Pilos. altera Tragi. Pilos. minor Fuchs. Stoech. citrina germanica. maiorana. Pyrola. Pulmonaria Italicorum. Aur. muris Camerarij leguminosa. Asperula Dodonæi. Matrifolia. Alline-folia Lædrensis. Bursa pastoris minima.

Alline etiam vulgaris non solum Recentioribus, sed etiam Antiquis Auricula muris vocitata fuit: nec defunt, qui eius historiam huius capitū apud Dioscoridem cum Marcello præfigunt: Alij verò

verò vt Cornificius & Sarracenus ceu supposititiâ remouent, & lib. 4. reponunt.

AVRICULA MVRIS MATTHIOLI.

CAP. LXXVII.

Passim mense Maio floribus ornata visitur, nimirum in pratis, in campis, in hortis, secus vias, & vbiq; ferè locorum: vocatur germanè *Mangolm blâwen blâmen*. Auriculæ muris Matthioli meminit Dod. gall. sed lat. in fol. eam præterit.

Compiler H. Lugdunensis satis demonstrat se parum in stirpibus versatum. Ex sola siquidem icone [quam falsam credimus] Auriculæ muris Matthioli iudicat omnia, quæ Dioscorides & Plinius scripserunt, aptissimè competere plantæ ei, quam ex Matthiolo pingit p. 137. Inconsideratè tandem eadè pagina eadè Matthioli effigiem repetit pro Dodonæi Auriculæ muris secunda, quam tamen Dodon. in Hist. gall. posuerat pro prima: descriptio etiam ex Dodonæo non conuenit.

Auricula muris Matthioli quæ sit se ignorare fateatur C. Bauh. nisi sit, quam Echium scorpioides aruente vocat, & Lobel. in Ic. p. 461. Alsinem Myosotin appellat.

Dodonæo icone exhibita Elatnem faceret. Si tertia Dodonæi Auricula est Ocimoides minus album, multum discrepat Dioscoridis descriptio. Auricula muris altera Dodonæi non est figura illa apud H. Lugdunensem p. 137. eo titulo posita [inquit C. Bauh.] cum longè alia sit quàm in Hist. sua gallica nomine Auriculæ muris quorundam pictam dedit, & in suis Iconibus p. 59. Myosotidis nomine exhibet, cuiusque figuram in post. edit. laena omisit.

Nos ad hoc caput referimus Auriculam muris 1. siue magno flore, Alsinè hispida dictam Præterit C. Bauh. phyt. Item, Auriculam muris 2. siue Alsinem alteram hispida viscotam, cum Auricula 3. siue Alsinè hispida minore. Quid autem frater si bi velit per Auriculam suam 1. siue flore magno, non intelligo: Dodonæus enim ait hanc florculos ferre, & non flores magnum.

An Thalia Alsinè hispida passim, locis præsertim humidioribus?

Geneux passim in hortis Auricula muris quibusdam flore paruo albo, siliquâ tenui longâ, viret mense Ianuario, floretque etiam in agris Februarii principio. Montbelgardi & Basileæ viret in hortis tota Hyeme, & passim floret Martio ac etiam Iunio & Iulio: spontè ad fontem mirabilem Augusto, Septembri & Octobri.

Auricula muris 1. 2. 3. C. B.

An Alsinè hispida. Thalia. Locus. & Tempus.

AVRICULA MVRIS QVORVNDAM

flore paruo, vaticulo tenui longo.

CAP. LXXVIII.



Capillatibus stirpibus radica- tur: cauliculi palmares aut dodrantes, partim erecti, partim supini, tenues, teretes, hirsuti, inanes, ad quorum singula genicula bina folia opposita, musculorum adres acutius, hirsutaque ad vnguem expriment, sapore nullo: strobili exigui, colore albo, quos excipiunt loculi longi, lucidi, in qui-

bus semen copiosum.

Dodon. gall. Auricula muris quibusdam, Auricula muris 2. *Aureille de souris vulgaire*. Eidem in H. Lat. in fol. Alsinè spuria tertia.

Dodonæus in Hist. gall. [inquit Lugd. p. 138.] alteram pinxit Auriculam, quæ plerisque Auriculæ muris videtur: Hanc periti quidam Herbarii veram Elatnem esse suspicantur, satis congruente historâ. Tertiam adiecit, sed non depingit Dodonæus. Et hæc est Ocimoides minus albâ à nobis p. 63. descriptum. Hæc H. Lugdunensis, quæ pro Auriculæ Dodonæi alterius icone ponit effigiem eius primâ, quæ ex Matthiolo. Neminem verò noui qui ex Auriculæ muris prima à Tom. III.

ALSINÉ CORNICVLATA

Clusii.

CAP. LXXIX.



Palmaris. Descriptio hæc est herbula, vnicocaulis, qui in aliquot ramos diuiditur, constans, coque geniculato, tenero, subhirsuto, vt Alsinè vulgaris: folia Alsinè foliorum amula, paullo longiora, subhirsuta etiam, inter se opposita, & ex interuallis gemina: alarum cauis insident pusilli flores,

lucidantes, quibus succedunt membranacea & transparentia cornicula gallinaceorum calcarum formâ, quæ lento quodam comperfa humore à tangentibusprehenduntur: semen in illis exiguum, maturitate nigrum: radix inutilis & annua. Tota insipida est, auctore Clusio.

Lobel. in Icon. Plant. pag. 462. Alsinem corniculatam Clusii inscribit, eamque in Obs. pag. 246. Nigellastrum genus facere videtur. Calp. Bauh. phyt. Lychnidem 7. hæc segetum minorem vocat. Ego nec Lychnidi, nec Pseudo-Melanthio subiungendam dico, quod eis non similis, vt satis constat ex figura & descriptione.

Synon.

Inter segetes frequens Salmanticenâ agro tempus.

Locus.

P p 2

vbi Maio mense flores producit, & semen maturum præbet.

AVRICVLA MVRIS PVLCHRO
flore albo.

CAP. LXXX.

Descriptio



Radice tenui vario reptatu vagante, fibrarumque; è geniculis demissatum opere rufus terram apprehendete constat: caules autem teretes, hirsuti, geniculati, in ramulorum fastigio flores habet amœnos, lacteos, quinque; foliis in medio aliquotque; vnicâ diuisurâ incisis & striatis cõpositos, quos foris ad

basim totidem hirsuta viridantia foliola sustinet, in medio verdè stamina & stilus colore luteo: folia ad genicula binâ ferè, opposita, interdum plura, hirsuta, semunciam longiora, ex latiore basi line pedicello, sensim in acumen desinentia.

Synon. Placet figura Tabernamontani nomine Holostij Caryophylli; wetz & Hegelin grass.

Locus Non est autem vulgaris hæc planta: Geneuz tamen abundat & Montbelgard: itémque ad Rhenum in montium cespitibus & colliculis.

Vires & Vius. Sicca est natura, in caliditate temperata. Affectionibus cordis medentur flores, maximè que caduco morbo succurrunt. Nonnulli conferunt parant, alij è floribus aquam distillant, quam infantibus epilepsia correptis propinant. Extr. necus ad paraly sin & resolutionem neruorum extollitur.

AVRICVLA MVRIS PVLCHRO FLORE
folio tenuissimo.

CAP. LXXXI.

Descriptio



Locus

Folia habet per genicula tenuia, laticè: ramulos multos, dodrantes, ligneos à radice crassa dura & perenni emittit: flores magni sunt & albi, non differentes ab Auricula muris flore pulchro: calices satis magni. Prouenit in montib. circa Geneuam, vt Thuin.

AVRICVLA MVRIS ALPINA GLABRA,
siue Lychnis glabra minima, aut Caryophylli minima species flore albo.

CAP. LXXXII.



Diviusculis, & pro plantæ modo eadè crassiusculis radicibus nititur, albis, nõ admodum fibrosis, sapore nullo manifesto, calyculis plusculi palmares, tennes, laues, inferius rubetes: folia oblonga, glabra, acuminata: flores turreti, candidi; foliolis quinque per extremum denticulatis, in medio apiculis: calyculus in Lychnidum sylue-

strium morè formatus, striatus, superius nonnihil fimbriatus. Vasecula succedens, vbi dehiscit, denticellis sectas habent oras, in quib. semina tenuia. Herba perennis est.

C. Bauh. phyt. Alfine 21. siue pratensis glabra: An porro ab alio descripta sit, nondum mihi constat.

Inueni eam in rupib. ad meridiem sitis in monte Roßberg prope Mafmunster vbi florebat Junio & semina maturabat Octobri.

CARYOPHYLLVS HOLOSTEVS

tomentosus.

CAP. LXXXIII.



Totus cernit dido molli densoque tomento est oblitus, vt vix aliud quàm tomentum esse videatur: caliculi geniculati dodrantes è singulis nodis bina proferunt folia ex aduerso sita, Caryophylli holostij siue Auriculæ muris specioso flore paria, nec formâ dissimili, si solum excipias cū mollitie tomentum, ex quorum sinu subinde ramuli propagantur: caulis superior in ramulos plusculos abit, quorum vnicuique flos innascitur candidus, Auriculæ muris specioso

Speciolo flore : horum calyces tontentosi quoque, internè verò membranei argenteo sc. ceu Margaritarum splendore lucent : secundum ramulorum diuisionem sunt etiam breuissima folia argenteo colore micantia.

Elegantissimam hanc plantulam Romæ primum in horto Corvini Belgæ, Pharmacopœi Romani; postmodum eum Florentiæ in horto Magni Ducis obfervauit & legit G. Cherlerus.

XXXXXXXXXXXX DE JAY

ymbell-ferus.

CAP. LXXXIV.



nues, parui & rotundi, spithamei, tribus aut quatuor geniculis distincti, quibus enascuntur opposita binasolia, inferioribus, quæ à radice protuberant, æqualia. Summitatibus insident sex aut septem ac etiam plures & pauciores longis pediculis surrecti flores, illi, illius floribus similes : hos decedentes sequuntur capitula parva laepta, paruum semen includentia, terram versus spectantia.

CHANDLER, J. W. & J. W. W.

Leucanthemon.

CAP. LXXXV.

TEnui & infermā *radicalissimū* cepite genitalatū reptat, demissis tamen altius fibris: *calyculis* inanes, quadrati, dodrantales & cubitales geniculis distincti, ad quorum vnumquodque bina folia, gramineā, acuta & rigida: ex quorum alis *pediculi* exeunt, tenues, hirsuti, quibus insident *strobili* amœni, candidi, è quinque foliis profundè fissis & striatis compositi, in quorum medio apices croci: dehiscentes autem calycis

Tom. III.



ricam, Vascolis verd Teuffels blumen/.e. florem
Diaboli, dici ait.

Gefn. de hott. Gråmen à Fuchſio exhibitum ap. Syno.
pellat: Lobelin Adv. Holosteif Dinctoris floribus
albis, & æstivæ Agnetæ: in Obſ.p.26. Ho-
lostium Ruelli (& sicetiam in It. Plant.p.46.) her-
bariorum & Lutetianorum, Chamæſſon Ori-
basi Italorum, & Gramen alterum floridi Matth.
Tabern. Gramen floridum, blümen gras, Gramé
virginum, Eustasiam virginæ, Jungfrauen
gras, Strichwart Anglorum; Cogentrosi gras
Flandriæ & Brabantiz. C Bauh. phyt. Caryophyl-
lum 31. siue aruensem glabrum flore marisco, &
Gramen floridum.

GRAMINI FVCHSII LEVCANTHEMO

affinis & similis herba.

CAP. LXXXVI



quina folia vi-
rescentia flori
toti subfunt,
capitulum suc-
cedit rotundū,
femen conti-
nens.

Quibusdam
etiam Sep-
tarius Euphra-
siam dici, au-
thores sunt
Tragus & Do-
donæus : hic
autem Gramæ
Leucanthemū
inscribit : illi
Gramen nodo-
sum cognomi-
nat : alii etiam
Euphrasii can-
didam & No-

Synopsi:

Locus &
tempus.

Vires & V.
fus.

Description

Seriùs hoc
floret, te-
nuioribus, qua-
dratis virgulis:
stipulis ex longi-
ssimis pediculis, la-
teis, è bis qui-
nis foliolis, prio-
re illo minori-
bus, apiculis ru-
tilantibus: capi-
tula minora ob-
longa: folia
breuiora, repan-
da, bina: radix
similiter fibrosa,
serpens. Mul-
tùm habet hæc
planta cum Alfi-
ne nostra longi-

folia, quæ quamvis humilior, latiora ei folia.
 Lob. Ic. Plant. p. 46. Diversitas Holostij Ruel-
 lij. Tabern. Gramen floridum minus, Klein blus-
 men gras. C. Bauh. phyt. Caryophyllus 33. siue
 arvensis glaber flore minore.

Locus & Tempus. Obleruauimus Geneuæ in dumentis Tiguri florentem Maio mense, ceu etiam prope malmunster in monte Rossberg. Montbelgardi spontè in horto Ill. E. C.

ALSINE VETERIBVS ET
in genere.

Cap. LXXXVII.

Alinae quidam Myos otadicunt, inquit
Dioscorides, ex eo quod folia Auriculis mu-
ris similia habeat. Alinne vero dicta est, quod o-
paca[lucos, quos Graeci *ἀλιν* vocat] nemo colaque
loca amat. Herba est Helixine similis, at humilior
[*παρανεύριπα*] longiorib[us]que foliis [*χαλκωγε-
φυλλοτέρα*]. Onb. *χαλκωγετέρα*. Vt. tamen me-
gastora.) Non iurata. Et cum teritur (*διατε-
ρβίζουσι τς*, Vet. caret.) odorem Cucumeris reddit.
Vim porro refrigerandi adstringendique (*σπλν-
χου*, Vet. caret.) obtinet: quam ob rem oculorum
inflammationibus commodè cum polenta illini-
tur, auriumque dolori succus infunditur: denique ad
eadem omnia, ad quæ Helixine valet. Et hoc Dios-
coridis caput, rectius nostro iudicio lib. 4. post
Helixinem, quam lib. 3. ante Auriculam muris col-
locatur, veriusque Alinae, quam Myosota inscri-
bitur.

Sunt autem qui & Myoton, qui Anthyllion, qui Myortocon, qui Myotosplenon vocent: Aphri *Labastolabat*: alij & murium aures, quibus similia folia habet, muris auricularum dicunt. Eadem quæ Diosc. habet & *Plinius* lib. 26. c. 4.

Alūne (inquit *Galenus* lib. 6. simpl.) aut myo-
sota similem facultatem Helinx obinet, nempe
refrigerantem & humectantem: est enim essentia
• aquæ, frigida: quare & citra adstrictionem re-
frigerat. Quocirca ad feruents phlegmonas &
mediocria erysipelata competit.

Æquiuoca. Quamvis porrò Dioscorides, Plinius & Gale-
nus vnius tantum *Alfines* mentionem fecerint,
tamen recentiores multò plura eius adinuene-
runt genera, vt est *Alfine* maior repens pereni-
s. *Alfine* maxima Histior. Lugdunensis. *Al-*
fine vulgaris, siue morisus gallina. *Alfine* Plan-
taginis folio. *Alfine* marina Dodonæi. *Al-*
fine pelagica & littoralis Clusio. *Alfine* mini-
ma. *Alfine* tenuifolia nostra. *Alfines* species
aliquot Thalij. *Alfine* muscicola quorundâ. *Al-*
fine longifolia in virginosis proueniens locis.
Alfine fœtida. *Alfines* fœtida quodammodò fi-
milis laciniata. *Alfine* serrato folio glabro. *Al-*
fine serrato folio hirsutior. *Alfine* oblongo fo-
lio serrato, flore cæruleo. *Alfine* folio profun-
do secto, flore purpureo siue violaceo. *Alfines*
genus Fuchsi, folio Hederulæ hirsuto. *Auri-*
cula muris Alpina glabra. *Alfine* nodosa, femi-
ne globosa. *Alfine* corniculata Clusij. *Alfine*
Boetica eiusdem. *Auricula* muris quorundam
calyce oblongo. *Auricula* muris quorundam flo-
re pulchro albo. *Auricula* muris pulchro flo-
re, folio tenuissimo. *Polemonium* petrum.
Alfines folia xyagri capitulis. *Tridactylis* mu-
rariz flore albo. *Saxifraga* alba petrea. *Andro-*
saces alterum xantholli. *Bursa* pastoria minima.

Anagallis, Anagallis lutea. Pilosella maior. Echium corpioides minus. Alfine viscaria. Centaurium minus adulterinum. Erinos Columnae. Herba trientalis. Asperula. Parietaria. Cacubalum quorundam. Periclymenon. melampyrum luteum Dalech. Galiofus minor folio caulē ambiente. Melixine cissampelos; siue Convolvulus; qui etiam Melixine dictus est.

ALSINE MAIOR REPENS PERENNIS.

CAP. LXXXIX.



Aline de
Aqua hie
agimus, ex ra-
dis perenni-
repente fibro-
sa caules pro-
fert plures, qui
latè le diffun-
dunt, cubitos
aliquot longi,
teretes, subru-
bentes, lanugi-
nosi, & ramosi
ad quorū sin-
gulos nodos
filia ex aduer-
so sita nascen-
tur quorum
maiora Patie-
tarix aqua ex-
quant, formā

eadem, secundum nervos & per oras hirsuta, mi-
nora verò vt *Alfines* vulgaris, pediculo aliàs nu-
lo, aliàs medio critor longo, piloso, sapore fatuo:
flores speciosi, *Graminis* leucanthei, quinque
foliolis confanti, singulis ad inum vsque filis,
candidis, steratis, staminibus niueis, medio oc-
cupantibus cum capitulo viridi è cuius summo
quinque reflexæ fibræ emicant, totidémque toti
fiori sustinentur subscituntur folia viridantia, hy-
pophæ quæ vascula subsequéntia obvolvunt, hypo-
pici vasculis similia; turbinata, in quibus *grami-*
continentur *Papaverinis* paria, rufa, circa clauam
racemant coherentia.

Brumfeld. Morsum gallinæ maiorem, Großes
gelbtraut vocat. Casp. Bauh. phyt. Alfinem 20.
sive altissimam. Dodon. gall. Alfinem: Lat. in fol.
Alfinem maiorem, plerique hippiam maiorem
appellatam: incognitam tamen multis, ac etiam
(quod admiratur) diligenter de stirpium ma-
teria scriptoribus.

Lobeliu[m], quod Dodon. & gall. figuram assum-
pfit ut in Ic. Pl. p. 460. quamin uisitor. Belg. pag.
445. pro alisme maxima, Alder meesse & uer
susplicamur in Aduerl. non cognouisse Alismem
maiores, vtetiam vocat Camer. in horto, & a-
pud math. germ. vbi figuram addit: ite[m]que
hort. Lufit. & H. Lugd. p. 123. vbi ramulos humi
repentes negat, sed contra quotidianam obser-
uationem. Thaliss Alismem medium vocat.

LIBER XXX.

testa tam in Ic. quàm Hist. eiusdem plantæ aliam ponat figuram Alfinis palustris titulo, nullâ annotatione differentia.

An morsus Gallinæ genus secundum Trago? Inter repes, in dumeris, sub rubis, locis opacis & aliosis, itemque prope fontes & defluentes aquas exiit. Floret Æstate & Autumno, hocque tempore semen maturat.

ALSINE MAXIMA H. LVGDVNENSIS.

CAP. XC.

Radicem est supernè crassiuscula, paulatim gracilecente, innumeris fibris capillatâ: caulibus multis, pedibus, foliis Alfinis primæ [vulgaris] per intervalla sæpè quaternis, interdum singulis, interdum binis, ramulis multis, brevibus, copiosum florem producentibus, antequam hiet oblongo, & acuminato capitulo inclusum, cum apertus est, candidum, exiguum, radiatum, sex foliolis constantem, ac totidem filis tenuissimis. In opacis gignitur (inquit H. Lugd. p. 123.) aliorum Herbariorum Alfinæ maior, siue maxima. Sed miror cur dicatur maxima inter Alfines, cum Historia ei caules attribuat pedales & folia Alfinis vulgaris.

C. Bauh. vocat Alfinem 16. siue oblongo folio.

ALSINE VULGARIS SIVE

Morsus gallinæ.

CAP. XCI.

Non multum dissimilis majori est, aliofio locis perinde gaudet; radiculis capillaribus: humi stratis, tenellis, hirsutis, subrubentibus, geniculatis viticulis: folia Anagallidis, minora quàm in maiore, subhirsuta, ex geniculis similiter aduersa, gustu satuo: strobili candidi, stellati, minores: semen in pericarpis non dissimile.

Quamquam autem hæc, quæ vulgò Morsus gallinæ dicitur, Anagallidis quadantenus, maximè quod ad folia attinet, affinis esse videatur, non tamen ad illam referri potest, sed ad proprium ac peculiare genus pertinet. Quare minis probanda eorum sententia, qui cum Hier.



Brunsch. hanc herbam, mediam vocandam contendunt. Fragus quoque Anagallidem negat, & Telephum Dioscoridis, Plinii & Serapionis esse iudicat, cuius iudicio quoque quominus acquiescamus, utraque descriptio necnon temperamentum & vires nos urgent.

Errant & ij qui cum officinis quibusdam, Auricula muris, & qui Pilosellæ nomine vocant, diuerlas siquidem plantas confundunt.

Agricola turpiter commiscet Anagallidem Dioscoridis cum Morsu gallinæ. Sed & Apollinaris retinendo nomina & vires eundem errorem committit.

Lobelio in Aduers. Alfinæ: Hippia. Alfinæ minor Recentiorum seu Hippia minor. In Obseru. & Icon. plant. Alfinæ. In Hist. Belg. Alfinæ, Hippia maior. Et rursus Alfinæ minor Recentiorum: & Hippia minor. Obscurus est Lobelius.

Alfinæ dicitur Turn. Gesn. hort. (cui & Morsus gallinæ vulgò femina) Anguill. Lonic. Matth. in Hist. germ. & Tabernamontano. Alfinæ vulgarissima Hort. Lufic. (an eadè Alfinæ media:) Alfinæ Matthioli H. Lugd. p. 1232. Alfinæ media, siue 12. C. Bauh. in phyt. Alfinæ media à Fuschio exhibita Camer. hort. Alfines primum genus & Alfinæ maior Fuschio, qui malè apud Dioscoridem cap. de Alfinæ per Helxinen intelligit Cissampelum. Hippia minor Cordo in Hist. Morsus gallinæ officinis, Lonicero & Trago. Dod. lat. in fol. Alfinæ minor.

Germani vocant Vogel frucht / Auium herbâ: Hûnerbiß / Morsum gallinæ, Hûnerdarm / Intestinum gallinæ: Hûnerfieb. Genß frucht, anserum herbam, & Meier. Belg. Mûer & Voegel frucht. Gall. Mouron & Morgelaine, q. e. Morgelina. Itali Centocchi, Centone, Gallinella, Pauerina, & Pauatina, Paparina, Pizzagallina, Budello di Galline, & Cenrouice. Ruellius ab Ital. Passerinam etiam dici refert. Angl. Chidistweede. Bohem. Fûrimor: & Furrstrewce. Hung. Tif hur. Sclauis Mûsch.

Locus & Tempus.

Lucos, & humentia etiam amat, sed tamen in hortis intertolera, ac in vineis nascitur. Viret etiam Hieme: Vere fleret, ac semen perficit.

Morsus gallinæ, vt inquit Tragus, refrigerantem & humectantem, quemadmodum Portulacæ obtinet facultatem. Aqua distillata eadem habet vires, sed & hoc illi experientia tribuit, quod iis qui diuturnis morbis & magnitudine ægritudinum consumpti sunt, vitibusque deficiunt, & macrescunt, vtilissima sit, vel per se, vel in vino pota. Eadem infantibus in summis caloribus & ægritudinibus exhiberi debet, nam non solum internas inflammationes restinguit, sed & impedit, qui accidere possint morbi, vt sunt Spasmi. Herba ipsa, succus & aqua distillata non secus atque Portulacæ & Sempervivui minoris, vulneribus calidis & vlcenibus vtilissima sunt, impositæ, illitæ, & si ex illis colluantur. Ex succo inuenta refrigerantia confici possunt, inflammationibus iecoris, aliorumque vulnerum, commodissima, non minus quàm Populeon. Auiculæ caueis inclusæ, cum escam fastidiant, huius herbâ recreantur. Pauerinæ puluis, Solenandro præceptore, fluentibus hæmorrhoidibus inspersus, vel illitus fluxum & dolores compescit: Alii cum theriaca dant. 3i. ad Epilepsiam: ad tormina puerorum all. dicta, propinant alii Aquam Alfinæ per aliquot dies.

Vires & Vires.

ALSINE PLANTAGINIS FOLIO.
CAP. XCII.

Alfinæ vulgari persimilis: radicis fibris staminibus capillata: ramulis conformes, pulsi,



An Alsine
hirsutior &
nigrior?

Dodonæo?

Tab. repræb.

Tabern. amentarum nesciuisse quid scriberet, cum exhibuit figuram titulo Alſines, mihi persuasit, eam ubi nihil aliter pinxit, quam Dodonæus suam. Figura autem illa, quam pinxit pro Alſine tertia media, Steinvogelſtraut / (quam vulgari parum Alſinæ omnino ſimilem, ſed in eo tantum d. ſtrentem ait, quod in laxoſis proveniat locis nonnihil accedit ad noſtram Alſinem Plantagin. ſimilem; melius tamen convenit cum Alſine vulgari. Que obſecro ſcientia botanica ponere figuræ plantarum diverſas non aliter quam loci ratione differentium?

An Camer. Hort. Alſine hirsuta, mediæ ſimilis, ſed nigrior, hirsutior ac durior ſpontanea? An Horto Luſit. Alſine hirsuta mediæ ſeu vulgari ſimilis, ſed hirsutior? An Thalia Alſines minoris alia ſpecies, foliola edens rotunda, ſed diverſæ magnitudinis, ita ut maiora foliola per totos coliculos, minimis ſubinde intercuſſentur?

Locus.

Alſinem Plantaginis folio obſervavi in l'ſſe in Burgundia in vineis, & in Roſſberg prope Maſmuſter.

ALSINE MARINA DODONÆI.

CAP. XCIII.

Deſcrip.

Alſine marina ſive quarta Dodonæi lat. in fol. ſecundum eius (vulgarem) refertur, niſi caules craſſiores eſſent, & biemeres, crebre uſque geniculati: folia ſtem ſimiliter craſſiora: capitula non in rotunditate oblonga, ſed latiuſcula: in quibus ſemina terna, quaternave. Alſinem autem maritimam natales appellandam requirunt. Si quidem fruſt. à ſibi fuerit, quam in manibus expetere. Et hæc ex Dodonæo, qui an exhibuerit figuram ſux Alſines marine dubitamus. Si quidem imago, quæ pro Alſine marina ab illo ostenditur, à Lobelio pro Alſine maiore, ac paſſim naſcente recipitur: Suſpicio ego eam convenire poſſe cum Alſine noſtra Plantaginis folio: exprimendam tamen curavi eius portionem in præcedenti tabella.

Tabern. Alſinem marinam, ſteer Vogelſtraut / vocat, de primo genere [Alſine vulgari] planè ſi-

milem ait, & in eo ſolùm differentem, quodd prope mare proveniat. Sed ſi Alſine marina ſolo ſitu differt, cur figuram apponit vix differentem: b Alſine vulgari ac paulò aliter pictam, quam in Dodonæo, vel Lobelio, qui eandem habet imaginem ſub diverſis titulis, ut antè quoque monuimus.

ALSINE MINIMA. CAP. XCIV.



Niſi totius plantæ parvitas obſtaret, media Alſine eſſet, ita totâ facie effigiatuſque adſimilis eſt, vêtum per omnia minor, tenellis ramulis & hirsutus donata, magis à que ex parte ſimplicibus: foliis minimis, Alſines mediæ minorib. nigricantibus, paulùm hirsutis pediculis breviffimo

nix, & flore ſimiliter albo: ſemen in petiolaris, minutiffimum ruſum.

Fuchſio dicitur Alſine minor & Alſines tertius Syn. genus. Dod. gall. Alſine minor. Lat. in fol. Alſine minima, & ſic etiam Lob. in a. lv. Obſ. p. 246. Ic. Plannt. pag. 461. Camer. hort. Alſine minima: à Fuchſio exhibitæ. H. Lugd. p. 123. Alſ. minor ſive minima Dodonæi. C. Bauh. phyt. Alſine 17. ſive minor multicaulis folio oblongo.

An Trago Morſus gallinæ quarta ſpecies? An Hort. Luſ. Alſine minor? An Thalia Alſine minoris tertia ſpecies minimis prædita foliolis, ſubrotundiuſculis, ac in mucronem excreſcentibus?

Morſ. pel. j. ſpontè in cœnobiiſ menſe Aprilis tempore florere animaduerti. Genevæ vixit tota Hyeme.

ALSINE TENUIFOLIA.

CAP. XCV.



Radices habet numerosas, albicantes, ignoſas, multifidæ: ex quibus ſurgunt cauliſculi palmares & ſcſquipalmares, teretes, ramoſi, ad quorũ nodos folia bina naſcuntur Tunice minime, longa & tenuia: ſiſculis ſaſtigis hærent ramulorum, pediculiſque longioribus ex foliorum ſitu

finu ortis, *Alfines* tertiz Fuchsi, minores, candidi, stellati. Sapor huius plantæ nullus conspicuus. *Montpelii* in agris florens *Aprilis* occurrit.

ALSINE MVSCOSA QVIBVSDAM.

CAP. XCVI.



TEnella admodum & infirma est plantula; veluti musco terræ superficiem operiens, palmatibus & bipalmatibus ciliatis, interdum duas, aut tres vncias longis, prætenuibibus, ramosis, quorum nodis folia adnascuntur vncialia, & scuncialia, aliquando vix femuncialia, filii instar tenuia, lætè virentia, flores minimi, ex quatuor foliolis constantes, albi,

Spergularæ facie & formâ, quorum media apiculi albissimi nodulo viridanti insidentes occupant: stilosulos sequuntur caliculi exigui, spadiceo, aut atro-rubente semine, Portulacæ ferè, facti: radix gracilis, inutilis, articulatum fibrata. In hac plantula tantillum amariantis saporis percipimus.

Apud *H. Lugd.* pag. 125. *Alfines* muscosæ titulo pingitur. *C. Bauh.* in phyt. *Alfines* 24. facit, & tenuifoliam muscosam cognominat.

Montium summis aditibus vmbrosis vtilique ferè gaudet. Vidit verò in monte *Salve* non longè à *Geneva*:

ALSINE LONGIFOLIA VLIGINOSIS

proueniens locis.

CAP. XCVII.



In vlginosis montis *Rosenberg* inuenta est nobis, florens *Octobri*, radiculis tenuibus, serpentibus: caules pedales quadrati, infirmi, ad quorum genicula, folia bina Gratiolæ foliolis paria, minora, nec per ambitum ferrata, in acumen desinentia, glabra, nervo unico medium decurrente, circa

medium latiora, quàm in *Graminis* *Holostii* *Ruellii* varietate, cui tamen flores satis similes, aut *Alfines* vulgaris, extremis hærent ramulis, stellati albi. Viscidus & fatuus herbæ sapor. Ceterum, foliola florem ambientia, quinque sunt viti-dia, alba, autem decem, & præterea apices.

Apud *Tabern.* in *Icon. & Hist.* inscribitur *Alfines* fontana, *Brunnenvogelkraut*. A *C. Bauh.* phyt. fit *Alfines* 14. siue aquatica. An à *Lob.* in *Icon. Plant.* pingitur pro *Anagallide* aquatica quarta? An *Hort. Lus.* *Alfines* fontana?

ALSINE FOETIDA, FABIO

Columnæ Dioscorideæ.

CAP. XCVIII.



Ex radiculis fibrosis & frequentibus, caules compacti, cubito longiores, humil repantes; teretes, crebris nodis intertepti; læues, inanes, fragiles vt *Portulacæ*: ex geniculis prodeunt folia, non illa quidem vt plurimum vtrinque, sed altero duntaxat latere (licet sit etiam ubi coniugatim

Descriptio

etiam trigemina emicent) plura simul iuncta, quorum vnum productiori pediculo appendicem coniugii expers multis numeris reliqua, quæ & adueria & contrario situ posita, indidem oriuntur, magnitudine superat, *Hippiæ* maximæ paria; pinguiora, atro-virentia, attritu pundum, quid cedolentia: ex opposito foliorum coniugii expertum, cæteroqui ex aliis, semper tamen ad genicula stilosulos muscosi plures ex albo in herbaceum colorem languent, ex duobus aut tribus foliolis, lubæta bracteolarum tenuitate nitentibus, & oris plerumque extorsum reflexis; quibus delapsis succedunt semina cannabins minor.

Nostro autem iudicio hæc minus, quàm nostra vulgaris, cum *Alfines* *Dioscoridis* conuenit. Et hoc vel odor sætidus comprobatur, qui non est *Cucumeris*, vt voluerunt *Columna* & *Czsalpinus*.

Quam porrò *Fab.* *Columna* nomine *Alfines* facie plantæ nouæ expressit, eius ab *Antonio Cortuso* semen *Cynocrambes* *Dioscoridis* inscriptione se accepisse apud *Matthiolum* refert *C. Bauhinus*, quæ occasio vt *Cynocrambes* tertiam siue *Dioscoridis* fecerit. In *Phytop.* verò *Alfines* 13. statuit, & *Parietariz* foliis cognominat. Sed & *Pona* in *Baldo* *Cynocrambes* legitimam esse voluit. Ceterum, minus nobis probatur opinio *Cortusi*, *Honorii Belli*, & *C. Bauhini* existimantium *Cynocrambes*: quænam enim similitudo cum *Mercuriali*? ybinam reperitur mas & femina?

Locus &
tempus.

Loca videtur amare eadem, quæ Helxine, atque ex insula Capreis, ubi frequens sponte oritur, habuit aduectam Columna: Octobri mense exit, Verè floret, atque Aestate perficitur. Casp. Bauhin. Monspessuli, locis umbratis sponte ortum legit. Mihi verò Montbelgardi prouenit in horto Ill. E. C. ex semine fratri C. Bauhino Neapoli à D. Imperato misso nomine Plantæ nouæ Alfinæ facie.

Vires &
Vitus.

Gustu insipido aqueo sunt folia, in semine verò aliquid inest tenuium partium, quo extergi lingua largè manso percipitur, non autem calorem imprimit. Ex quibus colligitur, extergere, adstringere, atque humectare posse, sicut Helxine.

ALSINES FOETIDÆ QVODAMMODO

similis lacinata.

CAP. XCIX.

Descriptio



Palmaris est, & ex frequentissimis cauliculis,geniculatis, alicubi purpurascen-
tibus, folia, quib. breues pediculi, exerit quodammodò ferrata, coniungata, & quorum combinatione & cauliculi alij, & minora foliola alia subnascuntur. In eadem & strobili verticillati oriuntur, parui, muscosi, ex herbido pallidi. Quib. succedunt semina parua, ex rotundo oblonga, canabinis minora, sed supernè pulchrè cristata. Radix alba, crassiuscula, flexuosa & longiuscula. De odore nihil pronuntiamus, quia siccam accepimus. Sapor herbidus. Monspelio attulit D. du Vernoy.

PARONYCHIA ANGVILLARÆ QVI

buldam. Et Paronychia, siue Alfine-
folia incana.

CAP. C.

Descriptio
Radix.
Folia

Floris

Simplici nititur radice, duriusculâ & crassiusculâ: ramulis per terram sparguntur, quinque vel sex circiter pollicum longitudine, variè diuisi: folia Alfinæ tertiarè serè similia, nigriora, minus mollia, & paulò maiora, primò rotunda, pediculis breuibus nixa: flores quoque non multum dissimiles, sed numero & positu dissimili, multi simul, umbellæ simulachrum faciunt, gustu est viscido. Vti autem nunc descripti, ita obseruauim Monspeli. Similè attulit mihi ex Italia C. Bauhin. Bi quoque similis quæ gener Cherlerus Monspeli collectam communicauit, ac cuius hic iconem damus ex sicca paratam. Hæc humi spargit numerosos coliculos palmares, subrubentes, crebrè geniculatos, subinde in ramos diuisos: quorum arti-

culos folia verticillatim coronant, Alfinæ mimis, per extremum rotunda, glabra, incana, bina & etiam quaterna, breuiora quàm præcedentis, fo-

Paronychia, Alfine-
folia incana.



liolis membranaceis lucentib. subiectis: strobili albi copiosissimi, extremis caulibus, ramulorumque acervatim congesti hærent, pusilli: radix simplex, breuis.

Anguill. epist. 12. vocat Gramæ secundum Plinij, & Paronychiam, ei assignans folia Pappi paulò latiora, flores umbellæ modo, coloris albi, & radices capillares. Qui Paronychiam alterâ (sic appel-

lat in post. comm. lat. & ital.) legitimâ Dioscoridis Paronychiam faciunt, eorum sententiam nec probare, nec improbare voluit Matthioli.

Maximè incana Anthyllidis Alfine folia Narbonensium Lobelij in Ico. Plant. p. 468. pictura, quæ Matthioli figuræ satis similis, placet. Caspar. Bauhinus in phyt. dicitur Anthyllis 3. siue maritima Alfine folia. An Dalechampio Loti pratensis genus?

Monspeli, quâ itur in Aigremont, prope siluam inueni florentem Septembri & April mensibus, Maio verò Cherlerus. Supra petras prouenire, & copiosam esse in horto Patauino testatur Anguillara.

TRIFOLIUM PARVVM QVODDAM, siue Lotus pratensis purpurea Dalechampi, fortè Paronychia altera Matthioli.

CAP. CI.

Lotus purpurea pratensis radicem gignit gracilem, candicantem, partim capillatam: cauliculos multos, serè pedales, furculosos: folia Loti nunc terna, nunc quaterna, exigua: flores in ramulorum vertice copiosos, purpureos.

In phyt. vocant C. Bauhinus Trifolium septimum siue pratense minus strobilis purpureis.


In pratis & humidis locis nascitur, vt apud H. Lugdunensem p. 510. descriptionis author Dalechampius perhibet.

Considerent stirpium periti an cum Paronychia 2. Matthioli comparari possit.

ALSINE SERRATO FOLIO GLABRO:

CAP. CII.

Alfine serrato folio, pumila est plâta è radice alba, fibrosa, caules aliquot sustingēs, rubescens nonnihil



foliis cæruleis, rariùs albis, infernè continuis, staminul; pauca & stylum tenue circumstantibus: floribus decidentibus succedunt loculi bipartiti, in quibus semen totundum.

Trag. tertiam Morfùs gallinæ speciem vocat: Dodon. gall. Elatiorem alteram: Lat. in fol. Alsinem spuriam alteram: Fuchf. Alsinem alterum genus & Alsinè medium: Camerarius hort. Alsinem flore cæruleo, interdum spontè proe-nientem lacteo aut dilutè purpurascente flore: Tabern. Lobel. in Ic. Plant. pag. 464. & Hort. Lufit. Alsinem foliis Trillaginis, hünerdarm mit Germandele blettern. C. Bauhinus phyt. Alsinem Chamædryfoliam. H. Lugd. pag. 1239. E. latinen alteram Dodonzi, & pag. 1232. Alsinem mediam siue minorem Dodonzi. Cur bis Hist. eandem plantam proponit. An Cæsalp. Antirrhinum?

Passim in hortis florens Mattio prouenit, & adhuc Iunio & Iulio & aliquando tota Hieme & Vere.

Eiusdè cum vulgari facultatis esse dixit Fuchf.

ALSINE SERRATO FOLIO HIRSV-
tiori, floribus & loculis cauliculis
adherentibus.

CAP. CIII.

Radice niti-tur tenui, fibrosa: caules fert multos do-drantales maiores ac minores, rectos, parum ramosos, in principio rubentes, hirsutos: folia longiuscula, minus profundè serrata, nonnihil hirsuta, per longi-tudinem cau-lum alterna-tim crebra foliola Thymi, quæ loculos bipartitos am-

biunt, immediatè hærentes; non ex longis pediculis, vt in Alsinè serrato folio glabro: flores paruos; quadripartitos, purpurascences, striatos, plerumque ocellulos: sapor plantæ amaricans.

An Tabern. Alsinè foliis Veronicæ, floribus cæruleis, hünerdarm mit Ehrenpreis blettern? Fab. Columnæ Alyssum Dioscoridis appellatur. An C. Bauh. phyt. Alsinè prima?

Obseruavi in Malmünster & S. Hippolito Locis & Burgundorth florens Aprili in agris & circa hortos. Sed & Columna Apuli mense florere incipere testatur: Maio perfici fructum: In edinis locis & Sole illustratis, saxosis, non cultis; patetibusque, Neapoli oriri, & etiam vallibus, pratensibusque, sed non ita frequentem.

Ad cruenta & vetera vlcera, & vulnera fanhda minificè confert. Scabiei & omnibus cutis vitiiis medetur. Tumores discutit potissimum in cervice: contra tussim, & vitia pectoris: pulmonisque datur stillatitia aqua potanda: Iocinoris & lienis obstructions aperit: vterum, renes, & vesicam expurgat. Ad febres, contagiososque morbos, trium drachmarum puluis epotes cum Theriacæ drachma ex vino commendatur, si statim operatur vt sudet æger: Dioscoridis Alyssum facie refert, vt & vitibus, si modò vt illud rabiem etiam fanaret.

ALSINE OBLONGO FOLIO SERRATO;
flore cæruleo.

CAP. CIIII.



Angulosos caules emittit, palmares & sesqui-palmares, hirsutos, satis validos, ramosos: per quos alternatim folia oriuntur, semü-ciam, aut vñ-ciam longa, latitudine semü-ciali, per ambitum serrata, hirsuta, gustu glutinoso: flores parui, cærulei, quibus subiecta folia maiuscula, pilosa: succedunt cap-

sulæ, paruum semen continentes: radix lignola, alba, multifida.

C. Bauh. phyt. vocat Alsinen 3, siue foliis profundè incisiss.

Florentem vidi prope Monspeliam mense Aprilis: Frater Maio & Iunio.

Locis & Tempus,

ALSINE FOLIO PROFVNDÈ SECTO,
flore purpureo siue violaceo.

CAP. CV.

Aliquando duarum aut trium vñciarum est plantula hæc, raro palmaris: cauliculis

Q9 2



Tom. III.



supinis ferè & pilosis, in quibus folia opposita in aliquot profundas lacinias celsa, alia integra, potissimum inferiora, pinguicula: ex quorum sinu orti pecioli stilosus gestant purpureos, qui bifidas post se relinquunt capsellas, alias inter folia sedent flores: Radix parua, fibrosa.

Tragus, nifallor hendeltrau insculpsit, Thal. D. dylobotanon appellauit: H. Lugd. parua. Elatine triphyllon: Lobel. in Ic. Plant. Alfinen parua rectam folio Alfinis: Hort. Lus. Alfinen rectam Ruthæ-folium huncerauen. C. Bauh. phyt. Alfinen 4. lue tradit. elyten. caruleam.

Locus & tempus.

Florentem in segetibus inueni mense Martio circa Geneuam: in agris versu Chastelaine videtur nonnihil variare, foliis non diuisis, sed ex rotunditate oblongis.

Vires & Vfus.

Vim habere refrigerantem & humidam auctor est Tragus, posseque citra noxam vtrique corpori aduersus inflammationes vsurpari, quemadmodum & Anagallides. Esse autem facultatis Portulacæ similem.

ALSINES GENVS FUCHSIO, FOLIO Hederulæ huius.

CAP. CVI.

Descriptio



ditio & parabili factos: in quibus folia alternatim sita semuncialibus pedicellis hirsutis appensa, prima germinatione rotunda, mox in Hederacei folij modum angulata, sed crebrius incisa, in tres,

quinque, septemve portunculas, carnosa, superna parte atrouerentia, infernè dilutiora, adnata interdum obscurè purpura, vtrique hirsuta: ad vniuscuiusque folij exortum pedicelli sulci, aut purpurascens, vnciales ferè in aueram partem intorti, sustinent quatuor foliola cordata, glabella, margine lanuginoso, quæ complectuntur stilosum caruleum quaternè diuisurâ insecum, infernè continuum, striatum, staminibus binis tantillum caruleis donatum, qui facillimè excidit: succedunt didymæ capsellæ per transversum futurâ commissa, in quibus semina bina, terna, quaternæ, aliquando vnicum, oblonga, gibba foris, intus concava, nauiculæ instar, in cuius medietulio tuberculum prominet, malum cymbulæ emulans.

Est Alfinis 4. genus Fuchsio. Alfine hederacea Tabern. & Hort. Lusitano. Alfine 7. siue Hederulæ folio, varians foliorum magnitudine & paruitate, flore purpurascens, aut dilutè purpurascens, interdum lacteo C. sp. Bauhin. i. h. t. quæ & Centumculum quorundam vocat. Ego colorum varietatem hanc non huic tribuo, sed illi cui folia serrata glabra, id quod fecit Camerarius in Horto (vbi Alfinen flore purpurascens, & Alfinen tertiam Fuchsij statuit. Sed legendum quartam, vti Fuch. in Icon.) ex quo hæc varietas desumpta videtur. Lobel. in Adu. Obs. pag. 247. & Icon. Plant. p. 463. Morfus gallinæ folio Hederulæ. Dodon. gall. Elatine: Lat. in fol. Alfine spuria prior, siue Morfus gallinæ. Anguill. epist. 12. Lappago Pharij.

Geneuæ florentem collegi spontaneam mense Ianuario, Februario & Martio, ceu & Montebelgardi in horto meo.

ANDROSACE MATTHIOLI altera.

CAP. CVII.

Non est fabulosa, vt putarunt Aduersariorum auctores, Matthioli Androsace altera, cuius radix singularis, tenuis, fibrata, caules emittit septem, plures aut pauciores, viginti interdum, vt ego obseruavi, palmares aut dodrantes, nudos, enodos, teretes, hirsutos, quorum fastigium in sex septemve abut pediculos vnciales & longiores, umbellam mentientes, ad quorum coitum & exortum radiata foliorum septem corona, oblongorum, pilosorum, paucis subinde crenis incisurum, cæterum singuli pediculi calycem gestant maiusculum, in quinque lacinias acutas, foliorum instar habentes, diuisum, quorum umbilicum, cum globulo stolis obsidet albus paruus, quo marcescente globulus in Pisi molem grandescens semen continet copiosum, triangulum, oblongum, rufum: filia frequentia per terram in orbem sparguntur, vncias duas circiter longa, semunciam lata, hirsuta, Plantaginis instar neruola, & per ambitum subinde crenata.

Auctoribus Aduers. Lobel. & Penæ, itemque compilatori Hist. Lugdun. qui pagina 362. Androsaces alterum Matthioli [& sic Camerarius in Horto vocat, ac in Historia Matthioli, german. eiusdemque Epitom. optimam & pulchrâ plantam experimentem figuram habet] inscribit, non fuisse notam Matthioli Andro-

Androsacem alteram (Mans harnisch vocat germ. Tabern.) satis apparet, dum Alines speciem esse contendunt, cum tamen planta sui generis sit, & ab Alines speciebus longè distincta.

Androsaces alterius Matthiolam duntaxat iconem, & eam quidem non admodum scitè expressam, nullà insuper historià traditâ edidisse perhibet Clusius, qui cur Matthiolus ex Syria maritimis eam accesserit, non videt, quandoquidem Austria in qua vixit, abundè subministrasset, si diligens Aulhiacorum stirpium scrutator fuisset: etenim copiosè nascitur inter segetes circa Badenses thermas sæpius memoratas, atque adeò locis Viennensib. vrb. vicinis. Nul- lum porò vulgare nomen illius intellexit Clu- sius.

Locis dictis floret Aprilis, semen verò Maio & Junio maturat. Basileæ prouenit in horto patris fata per Fratrem C. Baubinum : deinde Mont- belgardi in horto Ill. E. C. ex semine à Cortuso & fratre misso : semine maturo Augusto perit planta.

Anagallis caruleo semina.



Porò Her- bariis neoteri- cis nota est v- traque Ana- gallis, quam Græcè simili- ter *anagallida* vocant, germ. Gauchheyl / Godheyl / Zochheyl / Grundtheyl / & Colmaræ fraut : Belg. Guychelheyl / Gall. Morron. Ital. Anagalli- da. Hsp. Mu- rges. Angl. Pimpernell. Hung. Tif- tará.

Radix, in- quit Lobelius, græcè Hya-

cinthus dicebatur, unde à colore hyacintheo A- nagallis nuncupari potuit. Fortè dixit antiqui- tas Anagallidem, quia superbuia floribus ventu- stis vias passim ornat, colore oculis grato & ami- co. Plinius tradit Anagallidem quibusdam Cor- choron [quæ vox etiam inter suppositicias habe- tur] vocari. An autem accipiendum sit de Cor- choro Theophrasti vt videlicet Corchorus sit A- nagallis, ambigunt Cornarius, cui cōtrariatur Trag^o.

Malè quidam Anagallidem & Auriculam mutus confundunt, naturâ diuersas herbas. In horum censu sunt Pardect. Mor. cap. 43. & Sintes Arduinus de venen. lib. 6. cap. 1. itemque Hier. Brunsch. qui in editione anni 1595. posuit inep- tam Anagallidis figuram, quam & pro Veronica primò, & post pro Numularia exhibuit.

Indolissimè tandem nonnulli, vt Toxites, Eu- char. Santes, Hortus cap. 31. & Jac. Manlius, ac- etiam officinæ nonnullæ, Anagallidem hūnerbiss^o hoc est, Morsum gallinæ, Alsinem, Pauarinam Moigelinam, Hippiam & Centonem quoque vocant. Et hoc in errore Car. Steph. in vino, versari deprehenditur, cum ait, Anagallidem Græcis dici, sed vulgò Morsum gallinæ: quia eius semen (quod Coriandro simile ait) non priùs de- cidat, quàm à gallinis & auib. demorsum sit, & earum rostro concussum.

Sed & Dorsthenius se parum peritum Herba- rium ostendit, vt qui & ipse pro Anagallide pin- gat Alsinem, & cum eius viribus etiam confun- dat, licet ipsemet hunc errorem sub Auricula mutis annotari.

Quin & Senensis suo more planè hallucinatos queritatus queritatus & Hermol. & Ruell. Trag. Fuch. Brütell. Turn. & L. Luna qui herbâ vocita- tã Pauarinam Barbaris Insubribus. Petruscè verò Centone, Anagallidem tradunt : atqui si sciret v- tramq; harum Pimpernell plebi pharmacopœo- rum & muliercularum in Anglia dictari, nã ille multò grauius sibi ferendum putaret. Quasi ve- rò non vulgi sit peruertere nomenclaturas, vete- res delere, nouas suo, non nostro [aiunt Aduer- saria] arbitrio, cudere, & commutare : si seipsum intueatur, iamiam & vulgi decipulâ captum di- cet. Nam Morsum gallinæ, qui est Alsinem, & na-

Nomina linguarum

Auricula mutis ma- li.

Indolè ap- pellatur Morjagat- lina.

Car. Steph. error.

Dorst. nota- tur.

ANAGALLIS PHOENICEA ET carulea.

CAP. CVIII.

Albam multumque fibrosam radicem habet: ex qua ramuli palmares, sæpè supini, qua- drati oriuntur : quibus stila ad nodulos adnascuntur Alsinem medix, ex aduerso posita, sapore feruido : totidemque ex alis flores, longis, tenuissimis pediculis insidentes, ex quinque foliis radiatis colore phæniceo præditis compositi, apiculis staminum purpureorum luteis : capitulum succedit Alsinem, semine minuto refertum. Feminam dicunt, huic cætera similem, flore ta- men caruleo.

Anagallis phænicea, mas.



Anagallidis autem duo ge- nera, siue du- plicem speci- esse, flore tan- tum distantem tradit Diosco- rides. Quæ enim caruleum florem habet, femi- nam [dicitur] quæ puniceum, marem [dicitur] dici ait : esse verò frutices paruos, per terram fufos, folia habentes in quadrangu- lis caulib. par- ua, subrotun- da, ad Helxi- nes similitudi-

nem : fructum rotundum.

Sed & Plinius Anagallidis duo genera fecit, marem flore phæniceo, feminam caruleo, non altiores palmo, frutice tenero, foliis pusillis, rotundis, in terra iacentibus.

Tom. III.

gallidem hanc vulgi more hallucinatus fecit.

*Variorū la-
plus notan-
tur.*

Non minus culpandi sunt ij, qui Anagallidē Ci-
chorcam esse dixerunt. Sed & eorū dānatur opi-
nio, qui Anagallidē Maioranā esse statuerūt. Nec
defuerunt qui Portulacam silueſtrem affirmarēt,
non ſine haſitatione. Anagallidem pro Matri-
ſylua interpretans Razes, decipitur. Pandeſt.
Moreti nescio quā datā occasione Anagallidos,
ſemen Myricæ tranſtulerit. Plurimū etiam ij
hallucinantur, qui Moronem vulgò dictū, flo-
rem candidum ferentem, huic Anagallidi con-
nubio retulerunt.

*Anagall.
phænicea
numida*

Cæterū, Anagallidis phæniceæ, & cæruleæ
(quæ neutiſquam effigie diuerſæ ſunt, ſed dunta-
taxat colore, atque vt quidē Dioſcorides ex alio-
rum hiſtoriis infrā recensēbit, effectu) plures ap-
pellationes annotantur. Quæ phænicea eſt floris,
mas habetur, & à Scapione Xantala nuncupatur,
ab aliis Aenitis, Egitis ab aliis; ab aliquibus Sau-
ritis, quod nomen cum facultate, quam habet ex-
trahendi ſpicula, conuenit, vt teſtatur Marantha.
Prophetæ ſiue Magi Oculi ſanguinē vocant, aut
Chelidonium; Romani, vt Marcellus Maciam,
Thuſci Maſatipon, Galli Sapanam, Daci Cercera-
phron. Corn. ſeu vt Trag. habet, Cerceraphon. Ea-
dem Phænicion & Corallion dicitur. Eginetæ, vt
opinatur Hadr. Iunius, quod Corallium flos pun-
niceo, vel purpureo robore mentitur. Cæterū
Germani Gauchheil Manlein / aut Gauchheyl
mit rotten blumen nomināt: Belgæ Guychheyl
Rooden: Angli Pimpernell the male. Galli Mon-
ron rouge.

Altera, cærulei floris, ſcēmīna vocatur, & à Se-
rapione Cardabella nuncupatur, & Anagallidis
cōmunis nomine ſpurio dicta reperitur; ab aliis
etiam Corchori, Halicacabi, & Zehauri voce no-
tā donatur: Prophetis ſiue Magis Nycteritis
dicitur: Aegyptiis Mecii Trago, ſiue vt vult Corn.
Miciei: Romanis Anecaton, ſiue Mecraton: A-
phris Alirtilæ, ſiue Alirili: Germani Gauchheyl
weiblin & Gauchheil mit blauen blumen: Bel-
gis Blau guychheyl: Angli Pimpernell the
femal.

Mirum autem, quod Plinius commemorat:
ſcēmīnam Anagallidem pecora vitare, at ſi de-
ceptā ſimilitudine (flore enim tantū diſtat) degu-
ſtaſſet, ſtatim eam in remedio quaerere, quæ A-
ſyla vocatur, à Romanis Ferus oculus.

Iconis

Potro, Fuchſ. & Lobel. in Obſ. p. 247. & Ic. Pl.
p. 465. duas habent figuras: verū ſufficiebat vna:
ponimus tamen & nos duas, quod iam ſculptæ
erant, & plures alij vtramque pinxerint.

Anagallides, aut ore Plinio, naſcuntur in hortis
& aquis. In aruiſ etiam, iuxta ſemitas, ac vineis
non rarò prodeunt: tota æſtate. poſſimū tamen
Auguſto mēſe, florem faciunt.

Locus

Dioſcorides vtramque mitigandi vim habere,
inflammationes arcere, adactos corpori aculeos
extrahere, & nomas cohibere tradit: ſuccum itē
caput gargaſatu purgare: naribus inſuſum dolo-
rem dentium lenire, ſi in aduerſam narē ini-
ciatur; argema cum melle [Attico addunt quidā]
emendare; reſuſ oculorum aciei auxiliari: contra
viperarum morſus, jocinoris, ac renū vitia ſi ex
vino bibatur, prodeſſe: addit dici eam, quæ cæ-
ruleum florem proferre, prociduam ſedem repri-
mere, quæ verò Phæniceum, impoſitione [illitu
alius] euocare. Plinius ad eadem etiā commen-
dat. Galenus omnia clariùs & modo diuerſos tradit.
Anagallis vtraque, inquit, & quæ caruleum flo-

rem habet, & quæ puniceum, multū exteſioriam
vim habet, inſuperque quid ſubcalidum, & attra-
ctorium, vt etiam ſpicula inſixa attrahat. At ſuc-
cus ipſarum ex naribus purgat caput, ob eandem
cauſam. Et in ſumma ſiccantem citra mordacita-
tem vim habent: vnde etiam vulnera gluuant,
& vlceribus putrefcentibus opem ferunt.

Anagallis, vt ait Tragus, vino decocta, mede-
tur iſtibus ſerpentum, & viperarum, ſi bibatur,
aut ſi ex decocto vulnera colluantur & herba im-
ponatur. Propter hanc ipſam cauſam, aduerſus pe-
ſtem Anagallis vtraque mirificè conducit, ita v-
ſurpata, vt poſteaquam ex illa mediocrem hauſſū
acceperis, in lectum te componas, probè conte-
ctum, & ſudes, tum enim omne venenum per ſa-
dores expelletur. Quædam mulier Lutetiæ aqua
ē phænicea Anagallide diſtillata multos ſuſſuſio-
ne laborantes curauit. Poſteſt autem diſtillari, te-
ſte Hollerio, cum melle.

ANAGALLIS LUTEA, NUMVLARIAE ſimilis.

CAP. CIX.

Non, vt Numularia, ſerpit terræ appreſſa, ſed
Anagallidis phæniceæ & cæruleæ modo, in-
firmis tamenſi ramis, erigitur, per quos ſolia acu-
tiora quàm Numulariæ, Anagallidum iam dicta-
rum bina aduerſa; quibus & ſlos aſſimilatur, ſed
colore tinctus luteo.

[Anagallidem] luteam vocat Lobel. in Adv. &
Obſ. p. 248. ac Ic. Plant. p. 466. itēque Camer. apud
Matth. in Hiſt. germ. & Tabern. qui huius
& alteram figuram habet titulo Hirundinarie ſi-
ue Numulariæ maioris. H. Lugd. pag. 1237. Ana-
gallidem luteam Lobelij, à qua haud diuerſam exi-
ſtiſſimo, Alſinen luteā, quā Hiſt. p. 1235. antè pin-
xit. Anagallidē luteo flore Camer. hort. & Cluſ.
in Pannon. p. 492. Idem in Hiſtor. poſt. Anagall.
flauo flore: S. hvvenkf. Anagallidem luteam
montanam: C. Bauh. Anagall. ſiue luteo flore
nemorenſem: Thal. Anagall. luteam ſolis Nu-
mulariæ: Gefn. de coll. ſtirp. Numulariæ genus mi-
nus acutius, erectum in ſiliis: Idem de hort. Nu-
mulariæ ſpeciem aliam, ſiluaticam, aut mare-

Reperi in ſiliis le Cheſnois. vnde habeo à me
plantatam in orto E. C. Virentem vidi mē-
ſe Februario in ſilua inter Mompelgardum &
Dell. Floret Iunio, Iulio, & Auguſto.

NUMMVLARIA SIVE CENTIMORBIA.

CAP. CX.

Longis, ſed tenuibus viticulis, anguloſis pro-
ſerpit, quorum geniculis ex breuioribus in-
teruallis ſolia bina oppoſita naſcuntur. Anagalli-
dis, rotundiora, & nonnihil criſpa, guſtu vehe-
menter citra morſum ſiccante, adſtingentēque:
ex quorum aliis flores plarumque bini, rariùs ter-
ni, Anagallidis luteæ, eodem quoque colore præ-
diti, ſed ſapore adſtringente, quinque ſolis con-
ſtantes, quæ totidem calyculi viridantia ſolia mi-
nora ſuſſinent: capitulum & ſemen Anagallidis
luteæ.

Huic herbæ nomen aliud imponere haud li-
cuit.



cuit, quam, quo vulgò hodie à plerisque appellari solet, Nummulariz, & Centimorbiz, vel Centummotbiz. Haud dubiè autem Cètum-morbia à Chirurgis qui illà quotidie vtuntur, à mitificà sua aduersus multos morbos, plurimæque vicia, medendi facultate & efficacia, dicta existimatur. Nummulariam verò



maiusculum, tubrum, Anagallidis phœnicez similem; floris infimum cingentibus foliis viridantibus acuminatis. Montspeli iuxta montem Calcaris collegit Gener Cherlerus.

An Anagallis puspuralcente floris. Clus. si?

à foliorum forma, quâ nummi similitudinem refert, nuncupatam credimus: Germani *Pfenningkraut* dicunt, Belgæ *Penningkrayt*. Quia porro serpentes vulnerati, hæc sibi mederi feruntur, Serpentariæ nomen quoque accepit, indeque Germani *Egelfraut* (Belgæ *Egelfruyt*) & Hinc *Naterfraut* vocant. Sic & Ruell. lib. 2. c. 12. Colubrorum herbam vocat. A nonnullis Hirundinaria, quòd passim terræ Hirundinis instar affixa sit, dicitur.

Nummulariz nomine sequentes, sed malè, donantur plantæ, Gramen Parnassi: Lunaria crassula dicta: Elatine: Helenium: Egyptium. Echios Plinii altera dicitur Gesn. de coll. 11. Anguillaræ verò Erestedanum Theophrasti, quod Gaza Rubiam vertit, & quod in Italia sub Dinariz vel Dinerariæ nomine notum ait. Fuchsius Herba agnos necans, *l'herbe qui tue les brebis*.

Iuxta scrobes & fluenta, aliaque rigua loca provenit, subinde & in humidis reperitur silvis. A Maio mense in multam ætatem floret.

Secundè aut terti ordinis exsiccantium esse herbam sapor eius gustu admodum adstringens ostendit: est verò & simul modicè refrigerans. Et hinc flores & folia trita & imposita, vulnera & quævis vlcera glutinare valent: eadem cum vino sumpta dysenterias, ventis imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanant. Conducunt & ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebricia, & ad omnia interaneorum vulnera & vlcera, potissimum pulmonis. Vinum in quo herbæ folia decocta, vlcerebus summè confert, si hoc lauentur & abstergantur. Folia cataplasmatibus ritu illita vlcera putredinosa iuuat, auctore Leonh. Fuchsi. Sed de succis quoque foliorum, seu & herba ipsa, illitu recentia vulnera glutinat. Præcipuam autem vim eius esse dixit Matthiæus, ad puriorum enterocelas, cum illita, tum in puluerem hausta.



NUMMULARIA RUBRA

Linguisculis tenellis ramulis coniugatim ex breuib; intervallis adnascuntur foliola; Chamælyces foliis paria, latiora ferè quàm longiora; mollia, glabra & quorum sinu pediculi procedunt tenues, longi, singulares, florem gerentes

ELATINE VETERIBVS ET IN GENERE

CAP. CXI.

Quæ Græcis *ἐλάτιν*, Latinis Elatine, Arabibus *Discor al: versâ lutiè* Athin dicitur, describitur à Diosc. *folia habere Helxines, at minora* Onibastamè *μακρότερα, maiora, pro μακρότερα legit, rotundioraque, & pilosa* [vel vt alii, dentata:] tenues & dodrantes *ramulos, quinis lentivæ à radice statim foliolis* [vel vt alii; tenues & dodrantes ramulos à radice prodeuntes, foliorum plenos:] gustu acerbis. Nasci in segetibus & cultis. *Folia cum polenta imposita, inflammatis, fluxioneque infestatis oculis auxiliari. Coddam verò herbam sorbitionis vtu dysenteriam sistere. Eadem Plinius lib. 27. cap. 9. habet. Elatinen modicè tum refrigerare tum adstringere prædixit Galenus 6. simplicium. Quænam verò hodie genuina Elatine sit, inter Herbarios controversia est.*

Quam enim Fuchsi & Matthiæus Veronicam fœminam faciunt, eam Lobelius Elatinen Dioscoridis esse asserit. Ego verò hanc Elatinen maiorem voco, folio subrotundo, flore cucullato. *Elatinem folio subrotundo.*

Quæ Elatine fœmina, siue cucullata altera, folio anguloso à nobis inscribitur, ea à Castore *ma fol. anagallidis* Græcorum, siue Athin Arabum asseri *angulosa* tur.

Elatines nomen quoque obtinere sequentes plantæ: Nummularia. Helxine semine triangulari. Hedera terrestris. Alfine folio Hederulæ. Auricula muris quorundam, &c. Auricularia. Echiura scorpioides minus. Cynoglossa minor. Pilosella. Sanguisorba minor. Rapistrum. Elatecium. Vicia. Alfine serrato folio glabro: Alfine serrato folio similis Elatine chamædrysolia: Alfine oblongo folio serrato, flore caeruleo. Et Alfine folio profundè secto, flore purpureo siue violaceo. *Aequinoctia*

ELATINE DUPLEX, MAS ET FOEMINA
flore cucullato.


CAP. CXII.

Mas ex radice parua, alba, lignosa, crebros Describitur
per tetram expandit *colicibus, vel nihil, vel*

Elatine mas folio subrotundo.



Elatine femina folio anguloso.



Descrip.

Synon.

ma, minoribus quam iam dixit Elatines, & magis acuminatis: flores conformes, sed minores.

Elatine prior siue mas folio subrotundo, flore cucullato, dicitur Anguill. epist. 13. itemque Fuchsio, qui sinuatim pinxit & male ad Veronicam rediit & Matth. passim in Diosc. lib. 3. tamenque Hist. germ. & Epit. Veronica femina: Gesn. hort. Veronica femina Fuchsij.

Sed recentiorum quidam, iidemque periti, & admodum in re botanica exercitati, melius veram ac legitimam antiquorum Elatinen viribus & figura consentientibus esse credunt. Ex horum numero est, Lob. qui Veronicam feminam Fuchsij & Matthioli, in Obs. pag. 249. & l. Plant. p. 470. Eatenus Dioscoridis inscribit, & Tabern. qui Elatinen appellauit. Sic etiam in phyt. C. Bauh. Elatinen i. siue folio subrotundo & ominant, & Dioscoridis Elatinen quoque constituit.

Malè tribus distinctis capitibus H. Lugd. Elatines maris eandem iconem sub duabus etiam nominibus proposuit. Veronicam enim feminam Matthioli p. 1050. (ubi eam in descriptione

nihil, vel minimum humore tollentes, tenues, villosos, & subinde nonnihil rubentes: folia quam Veronicam minus accuta, rotunda ferè, mollia, lanugineosa, sapore amaritate: ex quo non in vinctu- usque ala pedicellus tubescens, villosus, semuncialis & longior, enatus flore sustinet foliis viridibus hirsutus cor suum, Linariae quodammodo similem, calcar, labellumque ex herbido flauescente, superiorem aduersa lacinia bifida pulsa, sub qua latent apiculi, partim nigri: semina in vasculis rotundum conclusum.

Femina magis sessilis tota, humo non attollitur, viticulis longissimas spargens, filius Helxines C. Hampel sagittæ mucronis alati formam.

Ceterum, Elatine femina, dicitur Cast. Duranti Elatine: Tabern. Elat. secunda: Lob. in Icon. Plant. p. 470. Elatine altera: Elatine 2. siue folio acuminato C. Bauh. in phyt. Elatine Matthioli folio acuminato Thalia: Camer. hort. Elatine Matthioli longè glabrior in horto & laudis vires spontanea arueni: Horto Lut. Elatine Dioscoridis altera Tabernamontani.

Marem primò inter Scutgardiam & Tubingam in agro quodam obseruauit: Monspelij dein frequentem: Basileæ etiam abundantem in segetibus circa Leura: item in agris circa Gonteldingen, flores tem mense Augusto, ibidemque Octobri. Montbelgardi in planitie, quæ est inter Arbouans & Audincourt ac Vires crescere incipiebat Iulij principio, florere Augusto. Plurimam autem in segetibus Norbonæ Gallo-protinæ, Delphinatus, Germaniæ & Italiæ quiboldam locis, rarior in Belgio, & Angliæ comparere, testatur Lobel. Feminam vidi mense Octobri in agris cum precedenti: Montbelgardi spontè prouenientem, & Iulio florere incipientem.

Matth. haud considerans suam Veronicam feminam non diuersam genere à sua Elatine scribit illam viub. & facultate à Veronica mare minimè disterre, sed ad omnia umbecilliorum esse. Veronicam autem matrem, à qua femina hæc plurimam formam discrepat, ait calidam & siccam, gustu adstringentem & amaram, &c. Elatinæ verò [feminae] f. Dioscoridis vires adscribit.

ANAGALLIS SERPILLIFOLIA aquatica.

CAP. CXIII.



Herbula facie Glauca exiguæ Lobelij, sed longè diuersa, quæ pro natali habet vuidum & paludosum solum, fibris radicatur numerosis gracilibus, quas & ex coliculis geniculis subinde consuevit demittere longiusculas, sed filis instar tenues & capillares: coliculi stipiti per terram repunt palmares, aut

res, aut etiam dodrantales, interdum paullo longiores, strati, crebris geniculis intercepti, quorum singulis bina ex aduerso posita adnascuntur filia, Serpylli similia foliis, magnitudine quoque pari, nonnunquam tamen maiora, acutiora, & penè vncialia, pediculo sublongo ex angusta ceruice sensim dilatata, perque extremum rotunda, glabra, viridia, nonnunquam rubentia, nervo secundum longitudinem vnico donata: ex quorum alis cauli adnascuntur proximè totidem *stipulæ*, cærulei, sublongi, in medio apices quater-nos, flori penè concolores, continentes, singulique vasculum seminis Mili magnitudine relinquentes, in quo copiosum minutum rufi coloris; *semen*: sapor in hac planta nullus manifestus, nisi herbaceus, cum leui acrimonia.

Trago est Sii odorati genus: An Tabernamontano, Alfine fluitatilis foliis Serpylli, repens supra terram, *flußvogelkraut*: An Alfine aquatica altera C. Bauhino?

Florentem mensis Augusti principio obseruamus anno 1584. in paludosis prope Lutram urbem Principis Murbacensis. Eidem multi inuenta sub finem Augusti prope stagnum post Raupe versus Rotenbourg siue Rougemont inter Malmünster & Beffort.

GLAUX EXIGUA MARITIMA.

CAP. CXIV.

Pvillis & gracilibus est *coliculis*, subinde reptantibus, & sili instar tenuium fibrarum, & geniculis propagatione radicatis: *folia* per articulos, Herniariae, bina contrariò situ, ex quorum vniuersculque sinu *semen* perpulillum, nudum, fuscum.

In Adv. vocatur Glaux exigua Dod. effig. 38. in Obs. pag. 217. Glaux exigua marina: & sic & in Ic. Plant. pag. 415. ubi queritur an sit Glaux Dioscoridis. Camer. hort. Glaux; parvula herbula, ex falso lacu prope Isebiu: Doldio epist. ad me exarata, Glaux, parvula herbula, sub alba, foliis vtrinque Alfinis, flore luteo: C. Bauhinus phyt. Glaux maritima, Hamburgo missa, ibidemque proveniens: Dod. gall. *λαυξ ἡ ἁλὴς ἢ ἁλὴς*: Latine Glaux & Glax: Gyll. *Herbe au lait*: Germ. *Milchkraut*: Belg. *Melckfruyt*.

Zelandiæ & Angliæ plerisque mari conterminis salis lacustibus conuallibus reperitur, Lobelio: Sic & Dodonæus locis nasci maritimis & depressis, aquaticisque ad mare dixit, prope toto litore Zelandico: florere Iunio & Iulio. Nobis siccam communicavit Frater C. Bauhinus.

Vsurpata in cibis, & iusculis lactis copiam auget: quare nutritibus lactis penuriâ laborantibus vtilissimam esse Dodonæus perhibuit.

ANTHYLLIS DVPLEX VETERIBVS,
& in genere.

CAP. CXV.

Anthyllidem duum esse generum authot est Dioscorides: ait enim quandam foliis esse molibus, alioqui Lenticulæ (*φασὶν*) simillimis, & ramulis palmi altitudine, rectis: radice tenui & parua. Nasci in sabulosis [saluginosis legit Corn. v. mox patebit.] apricis, sub salum gustanti. At Tom. III.

teram esse foliis ramusculisque Chamæpythi similem, hirsutiorē tamen, breuiorē & asperiorē, flore purpureo, & odoris admodum gravis, radice Cichorii. Hanc drachmis quatuor bibitam, vrinæ difficultate laborantibus & nephriticis plurimum prodesse, Tuitas verò [ambarum radices] veteri inflammatione emolliat, cum rosaceo & lacte subdita, ac vulneribus quoque mederi. Quæ autem Chamæpythos similitudinem refert, præter alia etiam comitiales sanat cum aceto mulso pota.

Inter, nothas Dioscoridis appellationes, sunt qui Anthyllon, qui Anthemida, qui Eranthem. o, qui Leucanthemon, qui Soranthes, qui campe-strem Florem vocat: Romani quoque, vt legitur apud, nonnullos Salastrum vocant. Sed & Galeno Anthyllis duplex est. Ambæ, inquit, moderatè siccant, vt etiam vlcera glutinent. Verum altera quæ Chamæpythi similis est, magis tenuium partium est, quàm altera, ut etiam comitialibus conueniat. Maiorem quoque extergendi vim habet quàm altera.

Quænam hodie sint Anthyllides inter autores non conuenit. Ryfius in Diosc. Anthyllidis primum genus incognitum ait. Ruellius hoc possentatem Silistam vocare credidit, itemque Bacchanellus. Salsuginem vulgò appellari scripsit Harchius. Alterum genus, Antonius Musa Celi potius suspicatur: sed Anthyllid in alteram ne Kalt, nec eius speciem aliquam esse auctor est Dodonæus: Ryfius contra suam moscharam constituit. Ruellius Salsolæ nomine appellandam censuit. Qui porrò Kalt speciem faciunt, iustus vel ad Kali maius, vel ad Kali minus, vel tandem ad Kali Arabum, de quibus lib. 30. dicendū, referre coguntur.

Anthyllidis autem nomine sequentes donantur plantæ. Vermiculatis marina arborescens, Crithum marinum. Chamæpythys. Camphorata. Linaria. Vulneraria. Lotus siliquosa. Trifolium candidum. Medica marina. Paronychia. Tripolium. Aster attenuus. Tanacetum. Matricaria. Chamæmelum. Auricula muris. Alfine. Flores Anthyllid. s. lect. res reperiunt apud Apollinem Rad. i. quas ipsimet ad sua capita reducent si poterunt.

Cast. & Durantes duas Anthyllides describit, & vnam pingit, quam autem intelligat, alius discernendum relinquitur.

Anthyllis constans primum veluti Tricici granis, cacumine sibi insertis, salis locis, non procul à lacu saliscululo Statfuti nascens Cordi in Obs. silus quid? Quid & altera eiu'dem ibidem Anthyllis humi sparsa, minori Aizoo similis, salsa? Quid & Anthyllis lanusculis oblongisque foliis, falso gustu [quod Cordus Telephium salsum opinatur] ibidem? Quid tandem Anthyllis altera. Cordi in Diosc. lib. 3. cap. 15. Germ. *Salzfräut* à manifesto sapore, dicta? Notat Cordus Aristotelem atque Plinium, aitque eos minis rectè sensisse, quod scribant omnes sapes plantis inesse, præter salum. Securidaca quædam gracili solo nascens Cæcilipini lib. 6. cap. 33. quam quidam Anthyllidem primam putarunt, quid? Anthyllis lentifolia, Peplio effigie maritima Lobelii quid?

ANTHYLLIDIS SPECIES QVIBVS DAM
CAP. CXVI.

Dodrantalis aut altior est planta, propaginibus frequentibus brachiata, & ramorum

Viret

Appellatio
nei nobis.

Aequinoctia

Descriptio

R.



Anthyllis
lenticifolia
Clusii.

Synon.

Peplium.

Locus &
Tempus.

Descrip.

nam Clusij Placa *apud nos* vocabat, eamque ad primum genus Dioecordi scriptum referebat. Et si autem inter Anthyllides procul dubio recensendam admisit etiam Clusius, primam tamen esse negavit, utpote quæ rectis ramulis assurgat, hæc autem repentes habeat, totaque facie Chamæscen propemodum reserat.

Lobel. in Icon. Plant. huius plantæ duas imagines dedit, quarum melior ex Clusio (qualem & nos habemus) mutata extat p. 422. Anthyllidis Valentini Clusij & Placæ titulo. Peiorem dedit p. 768. pro Anthyllide marina Narbonensium altera [admodum salso-acida, interponitur in Aduer.] Chamæscia facie.

Dodon. de purg. & in fol. lat. pro Peplio siue Peplide, cuius descriptione non proponit, Anthyllidem hanc pingit. Sic Tabernamontanus pro Chamaeæce quam in H. st. describit, Anthyllidem hanc picturâ demonstrat. Casp. Bauh. in phyt. Anthyllidem siue maritimam, Chamæscia similem vocat. Is apud Matthioli. pro Chamæscia figura, quam à Matthiolo omissem, & à se appositam esse ait, Anthyllidem Valentini ex Tabern. proponit, quæ in re aperte hallucinati deprehenditur.

Gener. Cherlerus obseruauit in montis Ceti litoralibus, eique conficiendis arenosis: Clusius nusquam alibi conspexit, quàm ad fossas vrbis Valentini in Hispaniis. Florebat Aprilis mensis initio.

PARONYCHIA HISPANICA CLVSII,
siue Anthyllis niuea. CAP. CXVII.


Specu pulcherrima est planta, sparsis per terram dodrantalibus, aut vix palmarib. in adolescentiore herba caulibus iuncea, è quorum nodis alternatim prodeunt propagines viciales, glomeratis squammulis argenteis confertissimis odusta, præque glomerulorum densitate vix conspicua, emicantibus ex scandalarum commissura hinc inde raris foliis vitidantibus, Herniarie paribus: radix subest lignosa, alba, crassiuscula, longa, multifida.

Clusio nihil aliud est quàm Polygoni maris genus peculiare: Lobelius verd in Adu. vocat Polygonum montanum minimum, niueum & sericeum.

Polygonum 3. siue minus candicans (inquit C. Bauh. in Phyt.) est Paronychia Hispanica Clusij, siue Polygonum montanum niueum minimum

atque propaginum exortu nodoso, foliis minimis acervi in congestis circa nodos vestita, multo Serpylli foliis minoribus, per extremum latioribus & subrotundis: furculi lignosi sunt, firmi, teretes, repandi, humique sparsi, varique quaquaversum brachiatæ: radix singularis.

Anthyllidē hanc Valentini



Anpono H. Lugd. pag. 124. Polygonum montanum niueum. Peplæ bene separet à Polygoni Hispanici genere Clusij p. 125. ac idem cum Polygono Herniarie facie constituit, alijs diiudicandum proponimus.

Tabern. dicitur Bergweggras. Polygonum 4. montanum. In maritimis inter Bellicucas thermas & Agdam Gallie

Narbonensis oppidum obseruauit & collegit Iohan. Henr. Cherlerus Maio. Clusius nusquam abundantiis, quàm in collib. petrosis & siccis Salmaticæ vicinis, trans flum. è Thormim: item circa Valentini & Murcia obseruare meminit, ac etiam lapidoso illo cap. supra Arelaten, non procul à Diui Martini duertorio, quæ Massiliæ iter est, sed multo minorem, & viciam vix excedentem. Floret Maio & Iunio, & semen profert.

ANTHYLLIS LENTIFOLIA PEPLIOS
effigie maritima. CAP. CXVIII.

In Angliæ insulis Australibus, inquit, Lobelia præsertim quæ Portlandia vocatur, Intore Northmannie obuerso, plurima quam hæc, siue danus pusilla provenit in sabuletis & arenosis vadis depressis, & apricis: geniculis & ramulis palmatis viciis longis, argulosis, pallentibus, & foliis Lenticulæ, Alis è minorem, vel Peplin referentibus. Flosculi similes infunt ex buxæ herba-



cei, dentatim stectati. Sedi minoris, Iunio & Iulio: semen Tythymali in perexiguis Chamæscia triquetris thecis alit: prolixiore, exili, geniculata radice, sabulo altè in fossa Soldanelle modo: tota salia, gustanti amaricat & parum quiddam calfacientis indicat.

In Ic. Plant. p. 468. vocatur Anthyllis prior lentifolia Peplios effigie. In phyt. C. Bauh. Anthyllis 2 siue marina lentifolia.

DE POLYGONO SIVE CENTINODIA.
CAP. CXIX.

Ad multas stirpes, vocabuli vim si spectes, extendi posset Polygoni nomenclatura, ex ite-



ex geniculis solummodò exeunt, Olea foliorum figura, tenera, gustu viscido: *stolenti* secundum caulem ad nodos pusilli, colore ex albo purpureo: quibus *semina* succedunt nigricantia, triquetra, Lapathi familia.

Icon alia.



lam, qui à copia feminis Polycarpon, qui Carcinethron, qui Teuthaliden, qui Myrtopetalon, h.e. folium myrteum, qui Cnopodion, qui Pedalion, qui Stemphion, qui Muris vnguem, qui Proserpinacem vocent: Magi Herois sanguinem Ægyptii Thephin, Aphri Cuculum dicunt: Græci quidem à feminis copia, vel, vti dictum, geniculorum, quos habet, frequentia, cognoscere voverunt. Vtramque enim Polygoni vox significare potest. Si quidem genti illi *poly* genituram & semen sonat: *gon* verò genu, & diminutivum formæ, geniculus est. Et huc peruenit, quæ in nothis adiecta illi appellatum Polygonaton fuit, ab eadem geniculorum frequentia, & densitate facta. Nobis tamen, ceu & Marcello, in alteram partem magis inclinat animus, credimusque à copia feminis quondam sic appellatam fuisse. Plinius, qui lib. 27. cap. 17. Sanguinariam interpretatur, aliquot quoque ex his, quæ inter spurias recententur Dioscoridis appellationes, numeravit, addens vocari etiam Halmada, vt Marcellus

Tom. II.

ex frequentium geniculorum, aut, vt alii volunt, feminum multitudine deducta: quatin primis tamen meruit passim obuium in viis Polygonum gramen, ex radice dura, lignola, contorta, multis fibris capillata, viticulas suas emittentis cubitales, ramosas, teretes, striatas, frequentissimis geniculis interceptas: *folia*

Dioscoridi lib. 4. *polygonon* dicitur, hoc est, vt Martell. reddit, Sanguinalis mascula. Sunt qui in nothis Dioscoridis, Polygonaton, qui Cynochalen, qui Heraclian, id est, herculeam, qui Asphaltion, i.e. Trifolium bituminosum, qui Chilio-phylon, h.e. Millefolium, qui Clema, hoc est, Viucu-

quidem ex Apuleio Stopinacem, legens Proserpinacem.

Guidoni Tract. 3. cap. 1. Polygonum idem est, quod Virga p. Eidem Tract. 7. Virga pastoris frigida in tertio, sicca & temperata: Ex quibus male fultis, maleque inter se coherentibus, haud absuade quispiam nostro iudicio collegit, ignorasse Guidonem quid esset tum Polygonum, tum Virga pastoris.

Brünfels. Toim. 3. p. 18. in Coroll. Corrighola & Virga pastoris. Vigoni Lingua passerina: Arnoldo de villa noua, Polygonia, Virga pastoris, & Lingua passerina.

Cord. in Dioscor. lib. 4. cap. 4. Polygonum mas, Latine Sanguinalis mascula; & Proserpinaca, pharmaceopis Lingua passerina: Ruell. Polygonon Græcis: Latinis Sanguinaria, herba Sanguinalis & feminialis, quam Ætius Heliobota non h.e. Solis herbam vocat.

Matth. in Diosc. lib. 4. cap. 4. Polygonum mas Italibus vulgò *coreggiola* & *centinodia*, Proserpinaca Apuleio: Arab. Basaltahagi: Gallis *corregiole*. Idem in Dioscor. lib. 3. cap. 11. Virgam pastoris Serapioni & Auicennæ dictam, Polygonum esse asseuerat, Matthæumque Syriaticum cum Dipfaco confudisse. Eidem cap. 11. in post. comm. Ital. Virga pastoris est Centinodia vulgaris & Polygonum Dioscor. In Historiæ verò germ. libro 4. cap. 5. maius appellat Polygonum, Bohemiceque *trasfauec*.

Monachi id. Met. Dist. 8. cenf. 157. Pandecta. *Dipfaco* rium erroris meritò insimulant, quod Dipfaco

ca Apuleio: Arab. Basaltahagi: Gallis *corregiole*. Idem in Dioscor. lib. 3. cap. 11. Virgam pastoris Serapioni & Auicennæ dictam, Polygonum esse asseuerat, Matthæumque Syriaticum cum Dipfaco confudisse. Eidem cap. 11. in post. comm. Ital. Virga pastoris est Centinodia vulgaris & Polygonum Dioscor. In Historiæ verò germ. libro 4. cap. 5. maius appellat Polygonum, Bohemiceque *trasfauec*.

Polygonum etiam statuunt & Polygonum mas. & Polygonum maius. Apollo, Cæsalpinus, Fuchius, Cat. Stephanus, & Tabernamontanus. Camer. [quo nullus pulchriorem dedit figuram in Hist. germ. Matth. & Epist.] in horto vulgare Polygonum appellat. Anguillare epist. 17. dicitur Polygonum mas, Centinodia, Lingua passerina, & Corezola. Dod. gall. figuram dat, additis nominib. Polygoni & Polycarpi. Gall. *Renouée* & *corregiole*: Belg. *weg gras* *werfwegras* & *duysent knoop manneken* [Quibus addit in fol. Lat. vbi Polygoni maris nomine pingit] *frucpel gras*: It. *Polygono*: Angli *fnortgrasse*. Lob. & Penz. Adv. p. 179. Polygonum mas. Nec non Obs. pag. 229. quo loco figura est exhibitæ, quæ in Ic. Plant. p. 419. sub Polygoni maris vulgaris, Sanguinaria, Centinodia titulo habetur. Gerard. Polygonum mas vulgare. Thalin Harc. Turner. & H. Lugd. p. 113. Polygonum mas: C. Bauh. phyt. Polyg. 1. siue latifolium, mas Diosc. & Plinii. Fernellus m. m. l. 6. c. 1. & c. 12. receptum Polygoni nomen retinuit, vt & Fab. Columna p. 30. Bauder. l. i. sect. 2. Cast. Dur. pag. 368. [qui tamen & Polygonum maius vocat] Gels. de coll. stirp. cui de Hort. & in cat. pl. Polygonum mas herba quoque dicitur. Hort. Lus. Polygonum alterum vulgatius, *germin wegdrin/denngras*.

Sed alias præter Polygonum mas, siue Centinodiam, habemus stirpes, quibus ob nonnullam conuenientiam Polygoni nomen imposuimus, vt: Polygonum angustifolium duplex: Polygonum marinum: Polygonum tertium Dodonzi, siue tenuifolium: Polygonum masculum fruticosum: Polygonum pusillo vermiculato Serpilli folio: Polygonum Polonicum cocciferum: Polygonum paruum flore albo verticillato, & Polygonum Herniariz foliis & facie, peramplâ radice.

R. 2

Guido r. 2.

Corrigiola

Polygonum mas.

Dipfaco

Nominâ linguarum

Æquiuocæ

Locus &
Tempus.

Centinodia autem natales quod attinet, ubique locorum nobis obleruata Basileæ, Monspelij & Lugduni. Octobri in Muteto monte florens. Dodonæo prouenit locis incultis, vias ac fertitas late subinde occupat; non raro & iuxta riuiulos serpit: omni ferè anni tempore vires, Hieme excepta, ac semina facit.

Vires &
vires.

Quibuscunque porro ab auctoribus insigniatur nominibus Polygonum, haud tamen vulgaribus ab iisdem virum encomus celebratū innotuit; ut cuius succus epotus Dioscoridi spissat ac refrigerat: prod. st. cruenta excretioni, cholerae, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potum, contra serpentium morsus auxiliatur: datur in febris per horam ante significationes: sceminarum profluvia impositu sistit. Idem succus aurium doloribus, iisdemque purulentis instillatur: facit eximie ad genitalium vlcerum cum vino adiecto melle decoctus: stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, colle & ionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia instillantur. Polygonum, auctore Galeno de simpl. lib. 8. vt adstrictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aqueum frigidum, vt videlicet secundum sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodò in initio tertij. Proinde sanè quibus stomachus feruet æstu, fors frigidum illitum prodest: velut etiam erysipelata, & calidas phlegmas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit, & hac ratione videtur esse exsiccatum. Quare cum herpetum, tum vlcerum, aliorumque bonum est remedium: efficacissimum autem inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum vulnere glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest.

Plin diluci-
datur.

Succus Polygoni (inquit Plin.) infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum vino, cuiuslibet partis profluvium excretionisque cruentas inhibet. Quocunque hæc [Polygoni genera] modo se habeant, vis earum est spissare ac refrigerare. Semina aluum soluant, largis sumpta vrinam cient, rheumatismos cohibent [succus aluum sistit largis sumptus, vrinam ciet, rheumatismos cohibet, &c. non prodest, Diosc.] qui si non suere, non profunt. Stomachi feruori folia imponuntur, vesicæ dolori instillantur, & ignib. sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum dolori per se. Dabatur & in febris ante accessiones duobus cyathis in tertianis, quartanis (ve præcipue item cholericis, dyentericis, & in solutione stomachi.


Scribit Tragus calculos renum potenter pellere [frangere vt & Herniariam, H. Lugd.] Aquam distillatam seu succum herbæ auribus purulentis instillari, putrescentibus & gangrenosis gingiuis prodesse. Sed quandoquidem Galenus dubitat an vrinam moueat, maior inde exsurgit occasio dubitandi, an calculos frangat & pellat. Polygonum vulgare in fluxu sanguinis, vt Brassauola quoque annotauit propriâ experientia, efficacissimum Cameracius quoque expertus in Nobilissimo quodam viro, aliis remediis frustra adhibitis contra vomitum sanguineum cum paucis vino styptico hunc succum maximè profuisse. Illud scire gauderem quâ facultate Polygonum lumbricos interimere queat, id quod Mathiolus, scriptis prodidit. Aqua (inquit) utilis est aduersus lumbricos tam iuuenum, quam senum. Certum idem iacet experimentum, aduersus vomitum, profluvium alui & dyenteriam, quod multis pro-

fuisse affirmat. Accipit duos manipulos Polygoni, coquit in libra vna & semis aceti, linteum duplicatum madefacit in decocto, imponit super ventriculi regionem, & vmbilicum, ac supra posteriorem partem. Polygonum ab effectibus præstantia Sanguinaria nomen obtinuisse perhibet Fernellius, quod eo siue integro, siue tunso stillicidi parti inducto, sanguis coeat, & in grumos concrecat, vt non amplius effluat. De Polygoni cuiusque aqua plura si voles, Tabernamontanum leges.

Dioscoridem contra Galenum defendit Marantha, in eo quod Polygonum vrinae stillicidio prodesse is affirmat, quod vrinam apertè ciet: concludens tandem à quibusdā, seu Galeno, Dioscoridem non rectè in crimen vocari, quod præse nimis, angustæque, & nullâ adhibita distinctione simplicium facultates docuerit. Sed ad Polygoni historiam reuertamur. Car. Stephanus valde nocuam herbam ouibus, si ea vescantur, asserit. Ait enim totum earum ventrem inflari, calque humorem subtilem & valde fetidum excernere.

POLYGONVM ANGUSTIFOLIUM duplex.

CAP. CXX.



Polygonum vulgari per quâ simile duplex hoc Polygonum radiculis habet teneram albam, ramulos admodum multos longè latè quæ supra terrâ reptantes fundentem, folia quoque Centinodiae similia, sed minora, acutioraque, eademque nunc breuiora & latiora, nunc longiora & angustiora.

Polygoni angustifolij duplicem varietatem Tabernamontani vna tabella expressimus, alterius ramulorum duntaxat separatim pingentes.

Tabern. Polygonum 2. & 3. inscripsit: Caspar. Bauhinus phyt. Polygonum 2. siue oblongo angusto folio, Item Polygonum 3. siue breui angustoque folio. Gerard. Polygonum minus mag. Small common knot grass.

POLYGONVM MARINVM.

CAP. CXXI.

Polygonum marinum prolixas habet radices, lignosas, crassiusculas, contortas, nigras, viticulae supinae, crassiores quàm Polygoni vulgaris, sic.



ris, frequentioribus, brevioribusque internodiis intercepta, non tantum foliis vestita maioribus candidioribus, verum etiam squamis tenuibus pellucidis albicantibus: flores pulchri, numero & magnitudine vulgaris flor. vinctum: semen nigrum, triquetrum, Oxalidis semini simile.

Label. in Adu. dicitur Polygonum marinum maximum: itemque in Icon. Plant. p. 419. Camer. in Epit. & Hist. germ. Matth. Polygonum marinum. H. Lugd. pag. 1386. Polygonum marinum prius Dalechampii, gustu in maritimis salso; alioqui adstringente: Herbariorum quorundam Polygonum quartum. Et Aizoon marinum nonnullorum. Dod. lat. in fol. Polygonum propellitorum marina, veluti Adriatici maris, speciosius & amplioribus foliis. C. Bauh. phyt. Polygonum 5. siue maritimum latifolium. Maranthæ Polygonus marina.

& Florens apud mare vidi mense Septembri: Frater Iunio in littore maris ad montem Ceti. Abundare dixit Camerarius iuxta Adriaticum mare, ac etiam circa Narbonam.

POLYGONVM TERTIVM DODONÆI
siue tenuifolium.

CAP. CXXII.

Tota planta cinereo colore prædita, ex radice lignosa, fractuque contumaci, albicante, tubiculos complures emittens, partim supinos, partim erectos, palmates, filii instar tenues, hirsutos, propter terram aliquando paulum rubentes, crebris nodis geniculatos: ad quorum singulos folia plura apposita tenuissima, quorum longissimum vociam non æquat, flosculi numerosissimi, tum ex foliorum alis, tum in extremis coliculis, stellati, muscosi, quibus semina pusilla succedunt, dura, umbilicata, striata, medullam albam continentia: sapor plantæ est subamarus, & nonnihil tandem acris.

Io. Morhardo insigni Medico Hallensi in Indice plurimarum suarum plantarum dicitur Canaria seu Polygonum Tragi. Dod. gall. Polygoni tertia species, Polygonum 3. à Plinio descriptum. Et forte. Lat. in fol. Polygonum quoddam montanum minimum, sine icon. Tabern. Ic. & Hist. Polygonum minus Polycarpum, flein frucht per wegritte Polygonum 3. flore albo: Item, Polygonum minus alterum, flein wegritt. Sed cur Tabern. vel eius compilator Polygonum minus alterum separavit à Polyg. minore Polycarpo, cuius videtur tantum varietas.

Gerardus appellat Polygonum polycarpum Tom. III.

Tabernamontani, Polygonum 3. folioides, ac ineptè pro Anthyllide Valentina Clusii pingit iconem Tabern. Polygoni minoris alterius.

C. Bauh. phyt. Polygonum minds i. siue gramineo folio repens, Anglica faxifraga Aduers. Item Polygonum 2. siue gramineo folio maius erectum.

Passim in segetibus, Geneuz, Lugduni, & Môt. belg. occurrit: item Basileæ in agris, quâitur Bincampus. ze florens Iulio & adhuc Octobri. In hort. Ill. i. d. v. que aded vnicâ plantâ se propagavit, vt vix extirpari potuerit, Hiemen etiam ferens.

Eisdem vires & vsus, intus & extrâ usurpata possidet, quas Polygonum vulgare. Quoslibet ardores extinguit, fluxus ventris sistit, dysenterias & vteri proflutia, ac etiam hæmorrhagiam narium. Lapides pellit, calculum & vrinam ciet, Tabern.


POLYGONVM MASCVLVM
fruticosum.

CAP. CXXIII.

Radice tenui, multifidâ, lignosâ, fibrosa que, superuacanea: cauliculis tenuibus, brachiatis, lignosis: foliis multis, Hyperici minoris, sed multo tenerioribus, aut Serpilli tenuifolii. Flores eius non obleruavit author Thalius. Reperit aliquando non longè à Stolberga secus vias. Non est autem Polygonon alterum serpillifolium Anglorum. C. Bauh. phyt. vocat Polygonum 4. siue fruticans angustifolium.

POLYGONVM PVSSILLO VERMICVLATO
Serpilli foliolo.

CAP. CXXIV.



Arta & indicta hætenus planta nobis industria Iacobi Reinaudeti Massiliensis pharmacopœi primum innotuit, inquit Lobelius: Ramulis & cauliculis sarculosis, prolixis, gracilibus, Serpilli, humi sparsis luxurians, & geniculis folia pusilla, teretia, succulenta, Aizoi, vel Illecebræ, Thymo paruo nostrati qualia & similia.

Radix prælonga, lignosa, sapore amaricante, calidiusculo.

Lobel. in Aduers. ac etiam Ic. Plant. pag. 422. inscribit Polygonum alterum pusillo vermiculato Serpilli folio. Hist. Lugd. pag. 1124. Polygonum alterum Serpilli folio Penz. Casp. Bauh. phyt. Polyg. 5. siue minus foliolis Serpilli. Similem se accepisse ait, Herniariz ex Candia nomine, à Laurentio Rosenau industria pharmaco-

R. 3

pæo, radice tamen non lignosâ, sed tenui, inu-
tili, foliis non teretibus, sed Serpilli minori-
bus.

Locus In collibus maritimis Gallo-provinciæ, non le-
cus ac Herniaria multa luxuriat.

POLYGONVM POLONICVM
cociferum.

CAP. CXXV.

Descriptio




go Enamel dicto [Polygonum tertio Dodonzi, siue
tenuifolio] valde similem ait, & à Polonis, apud
quos in arenosis locis reperitur, Kosmaczek vo-
cari scribit. Hoc C. Bauh. phyt. Polygonum 7. si-
ne Polonicum cociferum nominavit.

POLYGONVM PARVVM FLORE
albo verticillato.

CAP. CXXVI.

Descriptio



tim in tenuissimas apiculas fastigiati: radicle exi-
gua fibrata. Siccæ sapor nullus manifestus, nec
eius vllus in medicina, quod sciam, vsus.

In scrobibus, fossis, & agrorum marginibus
luxuriat: vidi autem Bizantijs.

POLYGONVM HERNIARIÆ FOLIIS
& facie, peramplâ radice.

CAP. CXXVII.

Nec hæc despectui futura erit discendi cupi-
dis: Est enim perquam parvi nota, perpusil-
la quidem herbula & humi accumbens, cespiti se-
mimetra, ramulis creberrimè geniculatis: foliis
& seminulis albidis, prorsum Herniariæ: tota
incana quàm exiguâ, mulcoto flore. Radice am-
pliore quàm pro plantæ modo, durâ, furcu-
losâ, implexâ, & in se reticulatim conuolu-
ta, auctu difficilis, gustu præscisso, calidius-
cula.

Lob. in Adu. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 85. voca-
uit Polygonum Herniariæ foliis & facie, peram-
pla radice Astragaliti. H. Lugd. p. 124. iungit &
idem facit Polygonum hoc Herniariæ foliis cum
Paronychia Hispanica Clusij, an bene, conside-
randum.

In fuscissima Cretæ Salonensis Galloptouinciæ
planitie, media via inter Arelaten & Solonam
ad diuiclonum D. Martini à Lobelio reper-
tum.

HERNIARIA.

CAP. CXXVIII.

Herniaria glabra.



L Atè subie-
ctum solâ
opacat, luxurie
lxtâ complu-
rium ramulorū,
quos ex pusilla
radicula fun-
dit, hinc inde
sparsos, tere-
tes, creberrimis
geniculis
interceptos:
ad quorū sin-
gula, aduersa
foliola serpilli,
minora, ex vi-
ridi lutea, gu-
stu acris: eodēq;
locis erumpūt
mirum in mo-
dum numerosi
flosculi, ex api-
culis luteolis

compositi.

Camerarius hort. prior dicitur Herniaria:
H. Lugd. pag. 126. Herniaria siue Herba Turca,
quibuldam Lithontribon ab effectu, vt & Her-
niola vocata: Herniaria Gallorum Gesnero
hort. & apud Cordum in Histor. vbi figuram ad-
didit, & Herba cancri minor. Idem in ep. ad Io.
Caium Britannum Med. Veterum Elleborinen
esse iudicat, ac Theophrastum meliūs herbulam,
quàm Dioscoridem sequi: non paruum appellasse
concludit.

Lobel.

LIBER XXIX.

379

Herniaria hirsuta.



Lobel. in Adv. & Obs. pag. 230. ac Ic. Plant. pag. 421. Herba Turca siue Herniaria. Anguill. ep. 14. Epipactis, Turcarum Herba viperarum, dalle vepere, & Asphela Græcorum. Miror quid Tabernamontanum, vel eius succenturiatum mouerit, vt Herniariam gallico idiomate Boutonnet, quod non herbam, sed herbæ locum denotat,

cognominat.

Tragus, qui, si non fallor, Herniatiam plabram pingit, Empetron inscribit, quod *patronis* quoddam, & Galenum Praefidos appellare contendit. Sed & Lonic. græcè Empetron, Latine verò Calcifragam, gallicè Perforipetram, Rumpipetram, & quibusdam Cristam marinam vocari ait. At turpiter duas plantas confundit. Quis obsecro Herniatiam, cuius picturam dedit, Cristam marinam vocauit: conuenit hoc vocabulum Fœniculo marino, quod vulgò Crithmum dicitur.

Cordus in Hist. Millegranæ vocabulo describit: Matth. hist. germ. polygoni minoris.

Est Polygoni genus dicta herniaria vulgo herbariorum Clusio: polygonum minus Matthioli nona in Baldo: Cal. Bauhin. phyt. polygonum 5, siue minus, & Millegranæ maior.

Holerius lib. 1. de morb. intern. cap. 59. ad herniam hanc herbam commendat, sine nomine tamen proprio describit, appellans tantum Herbulam in sabulis nascentem. Et hinc ab aliis Herba Holerii, *holeriana*, *Fallopia*, & *herniola* dicta quoque est. Germani vocant *harnkraut*, *sternkraut*, *Hein wegetrie*, & *taüsentförner*: Galli *l'herbe au Turc*. Itali *centograna* & *Millegrana*.

Est mihi Montbelgardi in horto Ill. E. C. non longè à Bessfordia prope pagum Danientin circa solo arenoso collecta Herniaria: item prope pagum S. Susanæ dictum Montbelgardi. Obseruauit præterea Tiguri in Gesneri, Basilæ in Platei, & Patauii in Cortuli horto, semine turgentem mense Nouembri: Geneuz, Lugduni & Montpelii copiosè locis siccis mense Aprili, Maio, Augusto & Septembri: C. Bauh. Basilæ inter tegetes vidit: Camer. circa Norimbergam frequentè Augusto in locis sabulosis: In aruis, oliuetisque Narbonensibus ad rus Boutonet altero à Montpeho lapide Lobelii. Semel in hortis satæ quottannis periens restitibi semper fecunditate redit, auctore Gesnero.

Epipacti siue Millegranæ insignes tribuit facultates tres Anguilla. Succus, ait, potus, aut herba citata, vel etiam emplastri modo plagæ imposita, morbis à vipera auxiliatur. Secundo emplastrum ex ea herniam mirè restituit. Postremo iecori prodest & ictero: aqua enim distillata

ac pota curat intra octo dies. Camerarius aquam distillatam optimam prædicat in calculo. Polygoni Herniaræ appellati decoctum feliciter calculosis propinari refertur apud Clusium. Ipsum verò exsiccatum & in puluerem tritum, boum, & equorum vulneribus atque vlcibus inspersum, vermes in iis natos abigere & enecare: præter facultatem verò quâ calculosis prodest aduersus hernias etiam vtilem esse. De eorum vñ ad descensum intestini ex Hollerio dictum antè.

POLYGONI, VEL LINIFOLIA PER terram sparsa, flore Scorpioides.

CAP. CXXVII.



EX radice quæ Descriptio tenuis, singularis, interdum multifida, alba, folia emergunt Lini, vel Linariae, caules anteuertertia, at illi ubi prodierint, per terram sparguntur palmares aut etiam dodrantales, tamosi, foliis nullo ordine possitis vestiti, Polygoni, minores, casti coloris, sapore nullo euidenti: in extrimis ramulorum acutatum con-

gesti stesculi numerosissimi, Polygoni floribus similes, minores, extrinsecus purpureascentes, intus albi, caudam Heliotropii, vel Scorpioidis aquatici circumflexu imitantes: semina parua, albis, virentibusque striis variata.

Calp. Bauh. qui aliquando sine nomine nobis Synonymis, in phyt. Polygonum 7, siue minus, & Millegranam minorem vocant: Lobel. cuius icon in Ic. Plant. pag. 422. minus placet, Millegranam minorem.

Anno 1590. medio Septembri plantam reperi. Locustis spontaneam copiosè prouenientem in loco culto.

CAMPHORATA MONSPELIENSIVM.

CAP. CXXVIII.

CAMPHORATA radicem habet pollicaris ferè Descriptio crassitudinis multorum capitum, caules emittentem lignosos, crassiusculos, cubitales, aut breuiiores, ramosos, subhirsutos, albicantes, per quos videntur nodi alternatim positi, è quorum singulis confertissima prodeunt foliola, trientem vñcæ non excedentia, tenuia, pilosa, mediocriter rigida, odore aromatico, sapore aliquantum acri.

Lobel. in Adv. non admodum feliciter depingit, & faus adumbrare credidit Chamæpites, siue humilem Piccam Plinii, Camphoratam Monspelicam, vt vocat in. Obs. pag. 221. in f.



H. Lugd.
duo figura.

Locus

Selaginis, siue Camphorata inscriptione.
In lualidus & arenosis locis gignitur in via
Frontagnana, & Montbelgardi in horto Illustr.
E. C.

HYPERICVM VETERIBVS.

CAP. CXXIX.

Descriptio

Communes Hyperico, titiſque aliis deinceps numerandis & describendis plantis, Aſcyro, Androsamo, & Cori, notæ & partes aliquæ, congeneres & in aliquibus ſcriptoribus cognomines ſibi inuicem plantas eas omnes fecerunt, priuatimque huic, aut illi debitas appellationes aded miſcuerunt, vt non ſecus, quàm Roma quondam in adoptionibus, quibusdam factū eſt, vt ſeruato antiqui & proprii generis nomine, adoptione quaſitum alterum illud adiceretur: ſic ſeruata Hyperici appellatione, Hypericon Aſcyron, & Hypericon Androsamon aliquando congeneres illi hæ plantæ à quibusdam vocatæ fuerint. Nec aliter poſteriores Latini de his tradiderunt. Graeci tamen omnes, priuatimque Dioſcorides ſeorſum de ſingulis docuere, certiore diſciplinâ vſi, quàm, ſi vno capite, ſimilique de cunctis tradiſſent. Quod enim generum & ſpecies diſceſcit exiguum ſemper eſt: quod verò coniungit multum, docetque in his Profeſſores omnes natura exemplo vti, nec miſcere ſimul quæ diſcreta ea voluit eſſe. Quæ autem communia quatuor his plantis, quæ itidem propria ſingulis ſint, faciliè ratiocinari & colligere erit ex earum hiſtoriis mox ſeorſim tradendis.

Hypericum igitur alij Androsamon, alij Corion, alij, quod ſemen eius odore pineæ reſinæ ſit, Chamæpytin vocant: Frutex eſt ſurcuſcuſcus, dodrantalis, rubefcens, folia habens Ruta [μυρτιά] ſimilia [αειχμήνη]. Florem verò luteam [μυρτιά] Viola albæ ſimilem [vet. quidam totâ hæc periodo caret, vt & Orbaſ. vſque ad Androsam] qui quidem inter digitos contritus languinem ſuccum remittit: quæ ex cauſa etiam Androsamon appellatum eſt. Caliculi [αειχμήνη] pro qua vet. [μυρτιά] ſubſiſtunt: fructus in totum oblongos, Hordei magnitudine, in quibus ſemen nigrum & reſinoſi odoris. Gignitur locis culis & alperis. Vrinam cit, ſubditumque menſes trahit: ex

Vires.

Plant. pag. 405.
Tabern. vocauit germanicè Gamſſerfraut von Monpelier. An Angul. ep. 12. Chamæpeuce Plinij lib. 24. c. 15. An du Choul in deſcr. montis Pilati Herba deſerta?

H. Lugd. duas habet figuras & deſcriptiones. Harum prior eſt p. 119. ſub Chamæpeuces Plin. Champhorata minoris Dalechampii titulo: Altera pag. 120.

vino autem bibitur, à tertianis, quartanisque ſi herat. Medetur & ſemen iſchiadicis, quadraginta diebus hauſtum. Sed & ſoliis cum ſemine in poſitis ambuſta ſanantur. Et hanc legitimam Dioſcoridis lectionem eſſe credimus.

Eadem præſtat Hypericum, quam alij Chamæpityn, alij Corion, appellant, oleraceo frutice, tenui, cubitali, rubente: folio Ruta, odore acriſſimæ in ſiliqua nigro, matureſcente cum Hordeo. Natura ſemini ſpiſſandi. Aluum ſiſtit, vrinâ ciet. Ad calculos veſicæ cū vino bibitur. Et hæc Plinius lib. 26. c. 8. non omninò cōſonè cum Dioſcoride tradit, etiamſi de eadem herba agat, inquit Cornarius.

Galenus hypericum calefacit, & ſiccatur, tenuium partium eſſentiam habens, vt menſes & vrinæ prouocet. Ad hæc autem totum fructum capere oportet, non ſemen ſolum. Idem fructus viridis cum ſoliis impoſitus, ad cicatricem perducit vlcera, tum alia, tum ambuſta. Si verò ſiccatum conſuſum inſperſeris, humida & putredinoſa vlcera ſanabis. Quidam etiam iſchiadicis ipſum bibendum exhibent.

Hippocrates de morbis mul. in potu vterino, & colutione ad vlcera ſætidia vterini præſcribit.

Cordus in Dioſcoridem fatetur primam hyperici ſpeciem priuatim hypericum dictam, ſibi incognitam eſſe, pharmacopolaſque eius loco Aſcyro vti, quod altera eſt hyperici ſpecies.

Hyperici nomen ſequentes plantæ obtinuerunt. Hypericum vulgare, ſiue Perforata caule rotundo, foliis glabris.

Hypericum Aſcyron dictum, caule quadrangulo.

Hypericum Androsamon dictum.

Hypericum pulchrum Tragi, ſiue montis Baloni.

Hypericum elegantiffimum non reſoſum, folio lato.

Hypericum Syriacum & Alexandrinum.

Hypericum Aſcyron creticum.

Hypericum minimum ſupinum.

Hypericum montanum ſum.

Symphitum petraeum, Onobriſchis, & Ruta ſilueſtris hyperici nomina etiam inſigniuatur.

ASCYRON VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. CXXX.

Aſcyron ſiue Alcyroſiles, aliis Androsamon, Diætiæ hyperici genus eſt, magnitudine diſtans: ſiquidem ramos habet maiores [vet. αειχμήνη] ac ſcuticoſus eſt: foliis interim tenuibus, purpureo colore rubentibus: flores luteos proſert, & fructum hyperico ſimilem ac reſinoſi odoris: cuius attritu digiti veluti cruentantur: quæ de cauſa Androsamon [quæſi humanum ſanguinem dixeris] vocauere. Eſt & huius fructus ad iſchiadicos efficax potus in hydromelitis heminis duab. Nam biliôſa recementa, plurima aluo detrahit. Sed dari frequentius oportet, donec ſanitati reſtituti fuerint. Illinitur & ambuſtis efficaciter.

Aſcyron & Alcyroides ſimilia ſunt inter ſe, & hyperico. Sed maiores habet ramos quod Alcyroides vocatur, ſerulaceos, omninò rubentest, capitulis parvis luteis. Semen in calyculis puſillum, nigrum, reſiſt. m. Comæ trita velut cruentant. Quæ de cauſa quidem hæc Androsamon vocauerunt. Vius ſemini ad iſchiadicos per duab. drachmis in

drachmis in hydromelitis sextatio. Aluum soluit, bilem detrahit. Illinitur & ambustis.

Galenus Alcyri vt eiusdem cum Hyperico speciei, non meminit suo loco, sed de Androsæmo agens, vt mox sequenti capite adducemus. Paulus Hypericum duplex esse ait, alterū quod Androsæmum & Alcyron apellatur; alterum de quo capite præcedente egimus. Lonicerus in Diosc. Alcyron tertiam Ruta agrestis speciem esse ait. Harchius in Ench. Hypericum, Alcyron, & Androsæmum eiusdem generis statuit.

Alcyri nomenclaturam communem habent sequentes plantæ. Hypericon vulgare, siue Perforata caule rotundo, foliis glabris:

Hypericum Alcyron dictum, caule quadrangulo.

Hypericum Androsæmum dictum.

Hypericum pulchrum Tragi, siue montis Balon.

Hypericum Alcyron Creticum.

Hypericum Alcyron supinum in odore lanuginosum. Attractylis auctore Dioscoride.

ANDROSÆMVM VETERIBVS & ingere.

CAP. CXXXI.

Androsæmon, quod alii Dionysia, alii etiam Alcyron appellant, ab Hyperico & Alcyro differt auctore Dioscoride: frutex verò est ramulis gracilibus, furculosis, virgultis puniceo colore rubentibus, foliis triplid, quadruplòve (vet. delet) maioribus, quàm sint Ruta folia, quæque trita vinoso succo manant. habet autem alas in cacumine complures, vtrinque expansas pinnataque: circa quas flosculi pusilli lutei, & in calyculis semen Papaueris nigri, veluti punctis notulive distinctum. huius coma contrita resinofum odorem reddit. Sed & semen totum drachmis duabus potum, excrementa biliosa trahit: prodest verò maximè ischiadicis, verùm à purgatione aquam insuper sorbere oportet. Cæterum illita herba medetur ambustis, & sanguinem cohibet. Plinii verba declarant Dioscoridem, & præsertim vsum medicum diligenter & exactè exponunt.

Androsæmon, auctore Galeno, fruticosa planta est, duplex naturæ: Altera quæ Alcyron & Alcyroides nominatur, & hyperici species est: Altera quæ à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen ipsorum purgandi vi præditum. At foliorum facultas siccatur, & moderatè extergit, vt etiam ambusta sanare credatur. Cocta verò in vino austero, vinum efficit, vt magna vulnera glutinet.

Ab his non multum enariat Paulus. Quin & Pandectarium Moreti haud dissona habet, vocans Androsæmum alterum Alkita seu Alkaydes, & alterum Dionysia.

Monachorum in Mesuem scribentium [pace tamen eorum id dixerimus] ineptias detegit Mathiolus: quippe qui asserant nullam ferè esse differentiam inter Rutam siluestrem, & Androsæmum, siue hypericum, vt quæ in alterius locum substitui possint.

Ryffius in Diosc. ait officinas & gallicum vulgus Androsæmum cum hypericone confundere. Sed ipsemet Ryffius non demonstrat verum discrimen, nec figuræ, nec descriptione. Androsæmum enim hirsutum, Alcyron & Hypericum vulgare, non hirsuta sunt: Alcyro præterea cau-

lis quadratus, Androsæmo verò rotundus.

Plures hodie occurrunt herbæ quæ Androsæma vel cognominantur, vel appellantur, vt Hypericum Androsæmon hirsutum caule rotundo: Hypericum: Hypericum Alcyron. Hypericum tomentosum. Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato. Cicaliana. Alcea Veneta. Attractylis.

CORIS VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. CXXXII.

Coris, quod aliqui etiam Hypericum appellant, frutex est folio Ericæ, sed minore, pinguiore, & rubente, dodrantalis, origratus, acris & odoratus. Huius semen potum vrinæ mensisque ciet. Est & auxilio ex vino potum à phalangio demoritis, ischiadicis & opisthotonicis: itemque tigoribus addito Piperis. Sed & eo vtiliter opisthotonici cum oleo perunguntur. [Sequentia habet Ald. cod. in notis: eadè Gaupylus in vtroque vetusto codice reperit in capitis calce.] Radix in vino decocta, potaque resolutis egregiè opulari creditur: sed laborantem inter potandum bene circumquaque operici decet: siquidem corpore toto sudorem ciet, quæ ex re agilitas pristina recuperatur.

Plinius de hyperico agens lib. 26. cap. 8. hzc de Plinio: Cori habet. Est aliud, inquit Plinius Hypericon, quod alii, ita etiam Paulus Carin appellant, folio Tamaricis (Ericæ Diosc.) & sub ea nascitur, sed pinguioribus foliis, & minus rubentibus (& minoribus ac rubentibus, vet.) odoratum, palmo altius [non altius Diosc.] leniter suauis, aculeatum (acutum Dioscor.) Vis semini calidioris, & idè inflationem facit enterocelis: sed stomacho non inutile, præcipuum ad stranguriam, si exulcerata non sit vesica. Medetur & pleuriticis ex vino potum. Idem cap. 11. Semen hyperici, quod Coris [Caros, vet.] hydropicos sanat. Hactenus Plinius, ex cuius confusione [quod Tamaricis folio dixit, pro Ericæ folio] factum est, vt quidam Erycam & Myricam confundant, vtramque Tamaricem appellantas.

Galenus Corin sub hyperico comprehensam omisit.

Pro Coride autem variæ exhibentur plantæ: nempe Coris Cretica Belli. Coris hypericoide quorundam. hyper. minimum supinum. hyp. Alcyron Creticum. Coris Montepell. Coris lutea. Kali paruum. Erica baccifera Matthioli Chamæpitys

HYPERICVM VVLGARE SIVE PERFORATA caule rotundo, foliis glabris.

CAP. CXXXIII.

Ex radice lignosa, multifariam diuisa, buxo cortice interiecta, virgula surgunt complures, rigide, lignosæ, rotundæ, subrubentes, in ramos diuisæ, cubitum vnum, aut etiam duos alta: folia Maiorana, glabra, vel Centaurii minoris Lobelio, neruis per longum excurrentibus donata, innumeris foraminulis soli obiecta pertusa esse videntur, sapore sicco & adstringente cum aliquo amaro: flores in extremis ramulis copiosi, lutei, ex quinque radiatis foliis compositi, apicibus multis concoloribus: semen paruum ex nigro rufum, pingue, in capitulis oblongis, granum Hordei imitantibus, sapore resinoso, Lobelio amaro & ingrato: atque tam flores, quàm capitula femine grauida sanguineum succum reddunt.

S f

Idemica
Rubra
Hypericum

Vt *Crucis* dicitur, sic quoque *Hypericum* Latins & *Perforata* dicitur vel *Millefora*, quod folia obuerfa Soli, innumeris fere poris, ac quasi traiectis, aciem tum nostram tum Solis transmittat radios: itemque *Fuga demonum*, quod plurimi in ea sunt opinione, vt afferant, eam demones fugare, non aliter atque veneno alexiterium aliquod resistat. E: hac superstitione vetula mulierculæ fascinatæ, versiculos subscriptas patriâ linguâ recitare consueverunt.

Desi, hartham/ vnd weisse heide/

Thus dem Teuffel vil leidt: Hoc est, Origanum, *Hypericum*, & *Erica*, multum demonibus aduerlantur. Ex quibus sanè versiculis satis apparet, quid maiores nostri cum adhuc gentiles essent, de his plantis senserint, & ad quos illas vsus adhibuerint. Sed relictis superstitionibus, ad linguarum nominatodeamus. Arabi *Serapio Resfrum*: Auic. *Albarib* & *Vnam demonis*; Auerth. *neusericon*, *Nesfricon*, *Mellifgon* & *Cerdial* nominat: Hebraei *Alarif*: Germani. S. *Johans* *frant*, hoc est. *Herbam sancti Iohannis*, *Hartham*/ *waldorhoff*/ & *Unser frauen heitiro*: Belgæ S. *Jans* *Cruyt*: Galli *Mille pertuis*: It. *Hyperico*, & *herba rossa*: Hsp. *Coravencillo*: Angli S. *Johans* *worte*: Boh. *Zwoüerz czertouey*: Hung. *Chen-go verág*/ hoc est. Sonantem florem.

Idemica

Locus

Tempus.

Vires &
vires.
Apoplexia
Febres ter-
tiana &
quartana.
Semen.

Oleum.

Vbiq; vulgarissima & vsu tritissima Medico & Chirurgo *Hypericū* dicta, margines satorum, areas destitit, & ruinosa sectans, et amque latiora loca. Montpelij obseruauit florens Maio: Basilæ inter portam *Stein* & *Eschen* Iulio & Augusto: in *Marchionatu* circa *Bingen* Octobri: *Geneuz* virens adhuc Decembri.

Quidam referente Trago, *Hyperici* aquam distillatam contra apoplexiam & morbum comitialem bibendam exhibent. *Hypericum* decoctum & potum febri tertianæ & quartanæ medetur, excretionem sanguinis finit, vulnerib. & erosionibus internis auxiliatur. Semen in pericarpis ad vulneraria ballama nulli secundum, multo Chirurgorum peritissimorum *Montpelienisium* experimento, vbi etiam oleum vernaculè de *Trefe-lan* vocatum, quotannis paratur longè optimum, ad hunc modum: Accipiunt summitatum *Hyperici* & olei communis singulorum libras duas. *Myrrhæ* & *Gummi Elemi* an. Vnc. duas: *Terebinthinæ* Vnc. quatuor: *Aloes* Vnc. vnam: *Thuris* & *Mastiches* an. Vnc. semis. Infundantur, bulliantque in diplomate ex arte. Ad iterum etiam & calculum vilitas conspicua.

HYPERICVM ASCYRON DICTVM, caule quadrangulo.

CAP. CXXXIII.

Descriptio

Ascyron dictum ex radice reptante, fibrata, rubente, caules emittit *Hyperico* vulgari pares, quadratos, rubescentes, ramosos: filia ortu & magnitudine foliis respondent iam dicti *Hyperici*, utcumq; tamen latiora, & nervosiora, nullis poris pertusa (Lobelio verò pūctim poros pertusos habet) odore illo *Hyperici* resinoso, quo & flores lutei, eius floribus pares & con similes, præditi sunt, sanguineum succum digitorum attritu reddentes, quibus similia quoque succedunt femine pusillo prægnantia vascula: figura *Fuchsi*ana, quam hic ponimus, displicet. Hanc autem eandem habere quadratum, foliaque paucis for-

Idemica

minibus pertusa obseruauit *Turner*, quod in *Hyperico* non animaduertit.



Ascyron dicitur Graecè, *Ascyron* Lobel. in Obs. p. 216. Ic. Plat. p. 399. & *Turnero* latinè nominatur: *Ascyron* *Fuchsi*, Matth. in Epit. & *Hist. germ.* cum addit. *Camerarij*, *Lonicero* (quorum figuræ non respondent) & *Horto Lusitano*: *Hypericum* 2. & *Ascyron* notissimum Lob. in Adu. *Hypericum* in dumetis nascens Trago: Cordo in *Diole. d. d. g. m. p. 100* & *Donnellade* caule quadrato: gulo.

An Geln. in cat. *Ascyroides*, S. *Johans* *trauf mit grossen bletern*, h. e. *Herba S. Iohannis* *lirs magnis*?

Officinis ignotum. Germ. *Gartheto*, i. e. *durum* *Fœnum* appellatur. Gallicè *Fuchsi* *Trucheron* dicitur: veteribus autem Gallis *launette* dicta est. Graeci à contrario, huic herbæ nonneti imposuisse videntur: *andros* enim illis asperitatem significat. Pulchrè igitur ad græcam appellationem germanica alludere videtur. Anglicè vocari potest, *great S. Johans* *grasse*, vel *hure*.

Ascyron notissimum amnum, & rigorum, ti- uulorumque præteritum amans valde. In viuetio Sionis sæpè *Turner* obseruauit: Ego *Montpelij*, *Basilæ* & *Geneuz*: *Montbelgardi* frequens eundo ad *Vites* maximum loco humido inter frutices. Floret Iulio & Augusto.

Ascyron haud disparis cum *Hyperico* sed in frequentioris vsus est, autore *Lobelio*.

HYPERICVM ANDROSÆVM DICTVM CAP. CXXXIV.



*D*ros altitudine superat *Androsæmi* dicti *caulis*, rigidus, teres, lanuginosus, cuiusmodi sunt & *scilla*, aded vt inferiori parte canescant, *Ascyri* foliis proxima, quippe ætuoia, sed longiora, & *Hyperici* instar foraminulenta, posita sunt autem ex aduerso, ad caulis articulos, ex quorum alis ramulis enascuntur.

anascuntur: caulis circa fastigium in crebros furculos facessit, in quibus flores Hyperici vulgaris consimilibus succedentibus vasculis, semen continetibus resinofum: radix recta non angulata, sed in latus, frequentibus fibris donata.

Figura apposita ex Fuchsiis non multum placet. Nec aridet Androsami Matthioli in Epit. & H. lt. germ. cum addit. Camerarii, quia angulosa picta. Imago quoque apud Lonicerum pro Androsamo vulgari ex pressa non conuenit, est enim Hyperici parui.

Lobel. in Obs. p. 217 & in Icon. Plant. p. 399. Androsamon. Fuchsin Hist. 2. spec. athen. quod geran. fūnratū vocat, & gall. Mithe-pertuis large, vel Trachoran large depingit & describit: verum nec figura nec descriptione, rite eam exprimit. Idem Epit. Hsp. vocat Androsamon è specie de Ternia de Sant Iuan. Gesn. de coll. Androsamon caule rotundo, & Androsamon Fuchsi: & sic quoque Horto Lusit. dicitur. Anguill. epit. 13. Androsamon.

Montbelgardi abundat in vicinis collibus, florens Iulio & Augusto: sic etiam in monte Rofsberg prope Masmünster obseruati, itemque Basileæ circa Dornacium, & in monte Leutach, Geneuæ, & Montspeli.

HYPERICVM PVLCHRVM TRAGI.

CAP. CXXXV.



QVod Hyperici pulchri nomine pingit Tragus radice nititur lignosa, rubescēte: caulibus distantibus, & maioribus, teretibus, glabris inā pite rubentibus, ramosis, non tamen per se teretibus: folia ex geniculis gemina aduerso situ posita, solidiora, rotundiora & minora quam in vulgari, non minus crebris

tamen foraminulis punctata, glabra, aucta parte nonnihil interdum purpurascētia, valde concinna, & caulem conuersu suo veluti completentia: flores lutei consimiles, sed pauci, breuibus haerent pediculis, binis, plerumque aduersis, è foliorum sinu ortis.

Hoc genus Hyperici reperi in cacumine montis Balon Augusti.

HYPERICVM ELEGANTISSIMVM NON
ramosum folio lato.

CAP. CXXXVI.

EX radice lignosa, multifida, fibrata, tortuosaque caules duo, tresue pullulant cubitales & altiores. Tom. III.




res; teretes, glabri: per quos ex interuallis, inferius quidem breuibus, paulò vincta maioribus, superius longis, palmaribus & amphoribus, bina semper filia ex aduerso posita adnascuntur, ita vt inferior coniugatio cum proxima superiore decussatam crucem deformet: folia infima quidem Hyperici vul-

garis foliis paria, superiora verò, sensim crescente semper cum loco magnitudine, duplò maiora, oblonga, acuminata, nullis foraminulis (vt Hyperici vulgaris) puncta; membranacea, glabra, à nervo medio in mucronem excurrente productis, sinuatis in acum verulis: per margines punctula apparent rubra: flores vmbellæ simulachrum efficiunt, summum caulis fastigium occupantes, cum in ramos Hyperici modo notum findatur, alioqui Hyperici floribus, similes, quibus nondum explicatis punctula rubra aspersa comparent.

In horto Tossani ex montibus Geneuensis Locus, & allatum floret Iunio. Virens inueni in monte Tempus. Rofsberg: prope Masmünster mense Octobri: Montbelgardi in colle versus Aulincourt & in monte la Chau. Basileæ in siluis obseruauit Frater.

HYPERICVM SYRIACVM ET
Alexandrinum.

CAP. CXXXVII.



QVadruplò Descriptio
minora

quam nostri Europæi, quæ summis cultualibus virgulis confertim tanquam in verticillis exeunt, profert filia: flores luteos notati per similes.

Lobelius in Synonyma Obs. pag. 216. & Ic. Plant. pag. 398. dicitur Hypericum Syriacum & Alexandrinum. Tabern. Hypericum Alexandrinum. C. Bauh. phyt. Hypericum 6. siue folio breuiore.

HYPERICVM MINIMVM SPINVM.

CAP. CXXXVIII.

Descriptio.



rentes, numero autem rariores, capitulorum non ab similibus forma.

Lobelius in Obfer. & Icon. plant. Hypericum minimum spinum Septentrionale infcribit. Hypericum 3. minimum spinum Clufius Hiftor. post.

Locus.

Reperitur in filua Montbaldgardenfi le Chef- nois, è regione vrbs; florens Augufto.

HYPERICVM TOMENTOSVM.

CAP. CXXXIX.

Descriptio.



Synon.

p. 218 & Ic. plant. p. 466. Hypericum tomentosum: tale etiam defcribit Cluf. cuius Ic. melior noftra quæ est Lob. Taber. vocauit Hypericum tomentosum Aldriglender Hartshew, h. e. humi iacens durum Fœnum: Cäſpar. Bauhin. phyt. Hypericum 8. fiue ſupinum tomentosum. Dale- lech amplius Androzemon canum appellabat.

HYPERICOIDES CORIS QVORVNDAM & Coris legitima Cretica.

CAP. CXL.



A Mercè eſt plantula Matt. putata Coris, nullidum, vrat- bitramur, de- ſcripta, lignoſis Ericæ ramulis Thymi magni- tudine fruticat, vel potiùs Co- rios Monſpeſſi- lantz, tenuiorib. erectis, in mul- tas alas brachi- tis, teretib. ſub- rubentib: ſiliis ex breuib. inter- uallis, veluti ad articulor, ternâ radiata, Ericæ ar- boreſcētis: cau-

ſium ſaſtigia in ramulos ſubinde abeuntia, longiſculos flores gerunt planè Hyperici, luteos, quinis radiatis foliis conſtantes, numeroſorum croceorum apicem circiſ medium obſidentib. totî verò ſori foliola puſilla viridantia ad baſin ſubiectâ.

Florentem menſe Maio collegit Patauij in hor- to Bembi gener Io. Henricus Chérleſus.

Bellon. lib. 1. Obſ. c. 17. tribuit Cori radicem in- grauiſſimi ſaporis, quòd minime verum eſt. Co- rin Italici Cori dici ſcribit Matthioliùs, quòd mi- ratur & reprehendit Lobel. in Aduerſ. Legitima autem Coris vocatur ὀρνιθόχορδον. Herba Hor- pilum. Pona in Baldo iconem præponit Coris le- gitimæ Dioſc. Bellonij titulo.

SICILIANA ALIIS CICIΛIANA vel Androzemon.

CAP. CXLI.



R Adice niti- tur lon- gâ, lignoſâ, perenni; gultu reſinoſo: vimi- na cubitalia, ſeſquicubitalia & bicubitalia; rubentia, pin- nulis membra- neis alata: ſilia bina ex aduer- ſo ſita, Perſycli- meni, quæ ta- men cauſis nō tranſadigit, ſu- pernè atro-vi- reſtia, infernè candicantia: flores Hyperici ſpecioſi,

LIBER XXIX

speciosi, maiores, lutei, stellati; quinque foliis constant, quibus totidem vidualia subiecta, apicibus numerosis luteis: capitula per maturitatem nigra, *senec* continent pusillum sulcum, gustu, vt & folia, resinosa.

Bellonius Sicilianam, vel Cæssianam Italiam vulgè dictam, Androsæmon interpretatur, sponte natum in Ponto sibi visum scribens. Androsæmon Veterum Fuchsi quoque videtur itemque Fab. Columnæ. Sed & C. Bauh. in phyt. Androsæmon statuit, & maximum scutellens cognominat, ac Centetiam Theophrasti suspicatur.

Lobel. cum Dodonæo Androsæmon negat, & in Aduert. itemque Obi. pag. 457. & Icon. Plant. pag. 631. Clymenon Italorum inscribit. Arguill. epit. 5. non per S sed per C. C. lanam scribit, & Clymenum Plinii, non verò Dioscoridis, interpretatur. Et huius sententiæ est quodque Camer. hort. qui Androsæmon maius vocat. Quæ Dioscoridi est Androsæmon, & Pharmacopœis Anglicanis Agnus castus, Turneri sententiâ est *Toufîn*, hoc est, Tota sana, quod omnia sanet, dicta: differens ab Hyperico & Aicyro, quod ramis multos habeat, &c.

Gelnero Anguillæ opinio non placet, nec fortè etiam Fuchsi, quamvis de hort. Androsæmon quoque nomen. Galli vocant: *Touze saine*.

Primum vidi Ellingæ in horto Voltarii, baccas habentem mense Septembri. In Anglia abundare dixit Turnerus: in Illa insula Camerarius. Montbelgardi in horto Illust. æ. c. semen maturat Iunio, Iulio, Augusto & Septembri, ac baccas etiam Decembri: Hiemem perfert.

TRAGIUM PRIMVM ET SECVNDVM
Veteribus & in genere.

CAP. CXLIII.

TRAGIUM [7943] in Creta tantum nasci dixit Dioscorides, Lentisco simile, foliis semine ac ramis, singulis tamen minoribus. Liqueorem vero profertre gummi similem.

Folia, semen, & lachrymam impositione ex vino spicula omniaque corpori impacta euocare, Pota eadem drachmæ vnius pondere stranguriæ mederi, calculos vesicæ comminueret, & menses trahere. Dicit & siluestres capras sagittis ictas huius herbe pabulo spicula excutere. Alterum [7943] folia Scolopendri habere, & radicem tenuem, candidam, siluestris Raphani similem. Hanc seu crudam, seu coctam comestam, dysentericis esse auxilio. Cæterum folia per Autumnum hircini virus odorem emittere, vnde & herbam Tragii nomen obtinuisse. Prouenire (hec ex Ald. codicis nothis huc transferre visam est, Sarrac. in montibus & præcipitiis.

Tragium alterum in nothis Dioscoridis aliqui Tragon, alii Tragoceratè vocant, alii Scorpiu alii Garganon. Latini Cornulacæ seu Bituensis: Daci Saliam: Egyptii Sophet: Aphri Achiosim. Galenus 8. si. npl. Tragium hoc Lentisco itidem simile facit. Tragii, inquit, folia, fructus, lachrymaque, trahentis digerentisque sunt facultatis. Est verò & tenuium partium, & facultate in principio tertii iam quoquo modo ordinis calida: spicites & hærentia corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, drachmæ pondere

Tom. III.

potum. Porro in Creta sola nascitur, Lentisco adsimile. Cæterum alterum Tragium hoc minus multum in locis prouenit.

Plinius parum sibi constat, dum lib. 13. cap. 21. Tragium, quod alias Tragonin vocat, fruticem esse scribit foliis Cretæ insulæ Terebintho similem, & semine, quod contra figitarum ictus efficacissimum tradunt. Libro verò 27. cap. 13. eundem ipsum Iunipero similem facit. (quod reprehendit Gelsnerus tum quia Iuniperus multum absimilis Lentisco, cui Dioscorides Tragium comparat, tum quia Tragium nihil nisi herba est vt docent Helychius & Varinus, & semine, & folio, & ramis. Trachinia, ait [Trachynia Dal. Gelsnerus autem legit Tragonia] herba qualis sit, non traditur. Credo & falsum esse promissum Democriti. Portentosum enim est, adalligatam triduo absumere henes, &c.

Cæterum, hinc fortè aliquis Tragion dictum coniciat, quod hircis & capris siluestribus inedeatur.

Tragii autem nomine sequentes donantur plantæ. Ruta hypericoides. Poterion. Tragacantha. Selschi Ethiopicum. Fraxinella. Dipsacum album. Saxifr. hircina. Sanguisorba. Lunar. botrytis. Succudus. Parmica quorundam. AttiPLEX scetida.

RUTA HYPERICOIDES QVIBVS DAM
Sicilianæ affinis siue Tragium.

CAP. CXLIII.



Hoc nomine plantam donauit Sprengerus Sepplianus caule tereti, laui, resinoso, foliis ad articulos aduersis, duplè Hyperici maiusculis, glabris, nequitiam percutis, scindis, sapore [vt nobis videtur] acidulo floribus magnis, Sicilianæ proximis, luteis, densa cirrhorum luteorum, tenuissimorum, longorumque in tortis apiculis

Descriptio

sagete, medium occupante, capitulo sequente & cuius summo emicant stamina longa.

Androsæmon minus Camerario: Androsæmon secundum C. Bauhino phyt. Sicilianæ congener Fabricio Columnæ: An Tragium Græcumi Anguillæ?

Basileæ in horto Io. Heitzman copiosè Iunio mense florentem obseruavi, perfertreque Hiemem etiam non repositam. Reposita, in horto Ill. Princ. Sturgardæ, & Durlaci in horto Ill. Princ. Georgii Friderici Marchionis Baderis florebat Augusto. Camerario autem licet hybernæ frigus difficulter ferat, copiosè tamen le ex semine propagat.

Locus & tempus

HISTORIAE PLANTARVM.

PHYTEUMA.
CAP. CXLIV.

POLYGALON MVLTIS.
CAP. CXLVI.

Descrip.



Montpe-
lij Phyt-
euma voca-
bant plan-
tam, cui ra-
dis singularis,
nullis, aut
perpaucis fi-
bris donata,
satis crassa, li-
gnosa, alba:
caules emittit
plures peda-
les, in ramos
multos fissos,
partim re-
ctos, partim
reclinatos:
per quos folia
oblonga, per
extremū ob-
tusa, subinde

fissa, mollia, quanquam inferiora nullam agnos-
cant divisionem, quatuor vnciarum circiter
longitudine: flores per ramos crebri, al-
bi, è meris staminibus compositi, quibus radiata
folia viridantia subiecta: *stigma* turgidula, se-
menciam longæ, striatæ, superiore parte perfor-
atæ, *semen* diuidunt copiosum, nigrum.

Releda co-
gnata.

Gelnero hort. Releda [d] qua nos libro se-
quenti cognata videtur hæc planta, quam Mon-
spelij Phyteuma nominant. C. Bauh. phyt. Re-
leda affinem quoque dixit, & Reledam tertiam,
variantem folijs, vt & Reledam, cuius nomine
apud H. Lugd. pag. 1198. duas icones haberi notar.
Lobel. in Obs. p. 415. Leon. Plant. p. 11. Phyteuma
Montpel. ensium intulit: in Ada. Phyteumatis
Norbonensium nomine donauit, non tamen ve-
rum affirmavit.

Locus &
Tempus.

Montpelij provenit mense Aprilis, Maio & Se-
ptembri. Geneva in horto florens habebam Ma-
io, se sine ramosiorem & lilio mense.

ONOBRYCHIS LUTEA DALECHAMPII.
CAP. CXLV.

Locus
Descriptio



Synon.

brychis 4. H. Lugd. pag. 491. lutea Dalechampi.

In nivos
luræ montis
cacuminibus
prospicit, radice
crassa, ligno-
sa, breui, radi-
cantes: caulicu-
lis perquam
multis, peda-
libus: folio Li-
ni angustiore,
longiore, in-
quali posito è
cauliculis pro-
deunte: flo-
re luteo, co-
pioso, par-
uo, in summis
cauliculis ni-
tente. Herba
rara & vix al-
bi visa, Ono-



Perenni ra-
dis semi-
palmarum aut
palmarum, inter-
dum vnciam lō-
gā, lignosā, al-
bā, vel nonni-
hil viridi, pur-
putante, gu-
stu subamaro,
dōnihil aro-
matico: cau-
les profert
multos, alios
surrectos, a-
lios repandos,
tenuis, palmar-
res, & spitha-
mos, in viridi
rōnihil rube-
scentes, folio-

los, spicam sustinentes si *fulcrum* minorum non
vnā vice sese pandentium, colore dilute caruleo;
labello exiguo, & in fibras tenuissimas digitato:
galea è duobus foliis alternatim subcunctib. &
incumbentibus: latera claudunt alia gemina pal-
sa, latiuscule in obtusum mucronem desinentes
virescente lineolā per longum signata: in rēu
latent apices minuti croci: basin florē excipiūt
tria foliola tenuissima, oblonga, vtrum galea in-
cumbens: duo labello substant, quæ omninquam
diducta, cruscula imitantur: folia humi sparsa &
in caulibus numerosa, illa subrotunda, hæc ob-
longa & acuta, carnosa, gustu vehementer a-
maro.

Icon 11.



Quidā Po-
lygalon eam
esse volunt,
inquit Corna-
rius, quā no-
stri Creuz-
blum vocant:
Sed quum hæc
trium generū
sit, iuxta tri-
plicem florē,
Polygalon esse
volūt eam
quæ albū flo-
rē habet. Re-
liqua duo ge-
nera, & pur-
pureum florē
habens, & ca-
ruleū ad Glau-
ca referunt: ego
nihil pro-
nuncio.

Tragus in-
trepidè huius speciem flore albo Polygalon Dio-
scordis esse pronunciat. Flores, ait, Polygali di-
uersi sunt coloris. Nam alij sunt nivi, alij Ber-
lici, alij carulei, conspiciuntur. Omnium vero ge-
neribus idem solum, idem caulis, eademque de-
nique radix, nimirum lignosa. Ego illam Poly-
galon

galon Dioscoridis esse contio, maxime eamque candidos fert flores, namque purpureo & ceruleo emicat, eam ad Glucem refero, quam Plinius ab abundantia lactis, quam facere ait, Eugalation nominat. Sed fallitur Tragus, de alio Plinius loquitur.

Ab opinione Cornarii & Tragi aliena est Dodonzi lat. in fol. dicentis: Nomen accepit apud Germanos Ransel & Creuzblum. i. e. Anbarualis flos: appellari autem sic contingit, quod festis Anbarualium diebus precipue vigeant, ac rustici virgines, ex his, plerisque locis, tunc coronas sibi neant. Anbarualia autem festa sunt, quae Romana Ecclesia dies appellat Rogationum: Germanis Creutztagen: tunc enim arua & sacerdotibus & populo lustrantur. Hieronimus Tragus Polygalon esse existimat: nec fuimus quandoque solim in Hist. gall. ab hac sententia alieni: sed cum apud Dioscoridem & Plinium breuissima haec extet descriptio, quid affirmandum? praefertim cum ad lactis abundantiam facere haec non constet.

Lohel. in Aduers. vocat Polygalam recentiorum floribus purpureis, pallidis & interdum albidis. In Obf. pag. 228. Polygalam Recentiorum coloris purpurei, sanguineus, diluti paniceus. 2. Albi. 3. Violacei. 4. Albi rubore confusi: Onobrychis veram Dioscoridis. In Ic. Plant. p. 416. Polygala recentiorum: p. 417. Polygala rubeis floribus.

H. Lugdunenensis, meo iudicio, duas habet figuras & descriptiones vnius plantae: p. 491. Onobrychis tertia purpurea Dalechampi.

Camer. hort. insinuat Polygalon Tragi: Thal. & Pona in Baldo Polygalam Tragi: Clus. Polygalam plerumque recentiorum: Lonic. Polygalam Graecorum & Latinorum: Gesn. in duab. epist. ad Bened. Aret. Amarellam: C. Bauh. Polygalam 2. siue vulgarem floribus ceruleis, purpureis dilutionibus seu albis, raris siueis.

An est Cordo in Diosc. Glauz? An Calalp. ut suspicamus platia, quam lib. 9. cap. 14. sic describit: Quidam fruticulus in collibus saxosis nascitur, arido solo & inculto ramulos tres aut quatuor ab radice spargens, simplices, dodrante longiores, humi procumbentes: in quibus pauca folia, ceu Lini, breuia, colore aliquando viridi, 2. Aliquando ex rubro nigrescente: supra folia pendunt flores ex vno tantum latere usque ad cacumina, spectantes ad terram, purpurei, vel pallescentes; ex rotundis foliis regentibus: fructum compressum & rotundum, qui in summo scissus est: semine in utroque latere oblongo, gustu subamaro: Non abhorret ab hac Olyris Diosc. sed quoniam apud Plinium coloris mutatio non foliis tribuitur, sed fructui, idcirco aliam ostendo Olyridem.

Multis in locis à me reperta est: ut passim Montebardi etiam in horto Ill. E. C. quod transili minore albam collectam inter Mismunster, & S. Germain. Geneuz in pratis Maio flrens; vires circa montem Salene Februarii principio: Basslez propè Leutach Augusti itemque in monte Mutens. Montpelii, Tubingae & in Italia flore purpureo & albo. Flore luteo siccam plantam demonstrant Fuchsius. Flore minuto, dilute ceruleo inueni florentem mense Aprilis satis copiose ad pontem Dubis. In siccioribus Austriae & Pannoniae pratis tribus florum coloribus discretam, sepe passim obuam perhibet Clusius. In

collibus herbosis, ut refert Dodonaeus, qui nec aratro profunduntur, nec pedibus atteruntur, in pluribus Germaniae ac Belgii regionibus lato ac mediocri solo sponte gignitur. Maio mense precipue cum flore reperitur.

Polygalon Tragi à sapore à Gesneto Amarella vocata cerulea praefertim, pramara est. Si verò manipulus eius per noctem in vino maceretur, idque bibatur, bilem per alium mirè deicit, nullo periculo quidem: experientia Gesneti.

POLYGALA VULGARIS MAIOR duplex.

CAP. CXLVII.



EX eadem in- Descriptio
terdum ra-
dice prodeunt
quinque aut sex
virgulae durissimae,
pedales;
graciles; lentae
& obsequiosae;
filiis nullo ordine dispositis
obscure, angustae,
flosculi tinctorii,
aut vulgari
Hystropi angustifolii & minoris,
quod ab Hispanis Yggipillo vocatur, foliorum & mulis
flosculi conferti
& spicati natescentes, summas
virgulas occupant.

Fumitearum floribus non multum ab similes, longiores tamen, & dilutioris purpurei coloris elegantissimi, siue dilutioris rubore pulcherrimamente: his succedunt penduli loculi plani: Bursa pastoris valvulae sepe similes, quos membracea quaedam velut alae integunt, semina bina plerumque continentes, nigrescentes, longiuscula, quae aperientibus sese ad latera maturitate burfalis, decidunt: radix crassiuscula, brevis, dura, lignosa, viua, aliquot fibris donata est: tota planta amaricat.

Clus. descriptionis author vocat in Pannon. Polygalam p. 314. & 315. Polygalam vulgarem maiorem purpurei coloris, variantem albo & ceruleo: In post. Hist. Polygalam vulg. maiorem. Item, Polyg. vulg. maiorem secundam: variantem etiam quibusdam umbrosis & humidioribus locis, floris colore aut ceruleo, aut albo, non secus ac minor vulgaris, & perinde assurgentem ut modò descripta, sed minus venustam. Ponit autem pro secunda iconem à Lobelio pro Polygala albis floribus demonstratam.

Pro suo more frustra Compil. Tabern. tres figuras exhibet solo colore differentes, nec ullam trium laudabilem: Polygala 1. maior alba, Großweiß Creuzblumen: Polygala 2. maior cerulea, Großblau Creuzblumen: Polygala 3. maior purpurea, Großpurpur Creuzblumen.

C. Bauh. phyt. Polygala 1. siue maior, flore varians:

Compil. Tabern. uol. 1. p. 100

Locus

Frequens est ad nodum in Leyrenberg supra Mandelstorf, circa Medelnig, totaque illa montium sine, quæ à Cilenberg Dinubio supra Viennam imminenti ad Austraciam usque Alpes excurrit. Næquam non occurrit similiter per Pannoniam, etiam interamnem, ultra Drauum flumen. Floret Maio & Junio. Aliquoties illam ob florum venustatem Clusus in hortum transtulit, & curare voluit, sed operam lusit.

Tempus

POLYGALA VULGARIS COLORIS

obsoleti, foliis angustissimis.

CAP. CXLVIII.

Descriptio



que flosculi coloris obsoleti, & post hos vascula

PAUCIS aliquot adfurgit ciliolis, aliquando etiam singularib. pediculis, altioribus, magna parte nudis: circa ima ferè foliis vestitis quam in reliquis Polygalæ speciebus angustioribus, acuminatis, prope terram tamen existentibus latiusculis & brevioribus. Ramorum extremis quo-

membrana, binis foliis lucentibus obductis, hincque virentibus notata hærent, sed rariore stipato, eaque serie, ut alterum post alterum rectè positum esse videatur. Tota spica palmum ferè adæquat: radícula simplex, duriuscula, alba, nullis penè fibris prædita. Facies plantulæ, hæc est, partium figura & color, faciliè eam à reliquis Polygalæ speciebus distinguunt.

In Gallia Narbonensis locis saxosis, collibus præsertim sterilibus propter Monspelium Æstate primùm prorumpente. n. obseruauit Gener Cherlerus, qui inde attulit: sat alioqui frequens loco suo natalitio, qui tamen rariùs occurrit: Fit enim ut unico quodam loco frequens obuenerit, multà postmodum ab ea distantia nuspiam amplius appareat.

POLYGALA VULGARIS LUTEA.

CAP. CXLIX.

Polygala 1. sine lutea C. Bauhin. in phyt. foliis est circa radicem rotundioribus, flore luteo, per reliqua similis vulgaris, quæ prope Aquapendentem intra Florentiam & Romam prouenit. Gener Cherlerus attulit nobis collectam prope litus Maris Adriatici, in qua nullum discrimen apparebat, præter colorem floris luteum: in vulgaribus enim folia etiam eum primùm exoriuntur, rotundiora obseruantur. Cur Polygalam Anguillaræ negemus, colligere est ex capite de Polygalæ quorundam. Pona in Baldo vocat Polygalam Tragi floribus luteis à Iacobo Zvingero inuentam.

FINIS LIBRI VIGESIMI NONI.





HISTORIÆ VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXX.

CORONARIÆ ETIAM PLERÆQUE, VT PAPAVERA, ANEMONES,
GERANIA, RANUNCULI, VERBASCA ET AFFINES: ADHÆC SCROPHULARIÆ: SI-
deritides: Anthirrhina: Melampyra: Vitiæ: Cannabis: Lini & Linariæ species variz.

VIDES quam à lasciviâ Natura in Coronariorum societatem vel floriz, vel foliorum, vel faciei tantum
similitudine asciuerit eas, quas nihil minus, quam Coronarias dicas, & quas utique Cato in hortos, se-
rere non precepit. Deinceps dicendas plerasque etiam Coronarias aut certe non multum alienas uno agmine
cõprehendimus, ne librorũ magnitudo, vel multitudo in immensum propemodum excreseat. Nam & compendio
interdum sindendum, ubi multisitudine obruimur, ut naturam tantopere luxuriantem arte quadã cõterere auius.

PAPAVER STATIVVM ET SILVESTRE VETERIBVS.

CAPVT I.

NON sentiebat quondam rusti-
ca plebs, quantum facto totis
agris Papauere segetibus suis,
& futuræ annoz officeret: Sed
religiosis fortunæque Cereris
rustici numinis ignara, quæ ce-
reale à Poëtis suis vocari aliquod Papauer audie-
rat, gestarèque manu Deam Papauer in templis
quotidie videret, facile credidit propitium sibi
rusticum fore numen, si quod coli & ornari Dea
posset, copiosum sibi in aruis cresceret. Eamque
ob causam nullâ fruge magis quam Papaueris
confitos agros & hortos suos habuit Antiquitas.
Nec prius desit in tam multis vitæ vius malam
frugem serere, seminèque eius in cunctis ferè
secundæ mensæ dulcissimi vti, quin rusticæ rei
perita frugis eius maleficium cognouerit, &
poëtam nostrum ex meliore totis disciplina in-
clamantem omnibus audierit.

Vtrum lethæo perfusâ Papauera somno.

Hicque non ad cibum, sed ad leuandum som-
no pro omiffa sibi dolorem. Deam vñam fuisse: &
in luctus fortunæ suæ memoriam mortalib. sem-
per ea subinde ostendere. Poëtam verò non in hoc
tâdem, sed totius naturæ peritissimum hominem,
lethargici somni vim illis & potestatem assigna-
se. Neque enim lethæos obliuiosos simpliciter,
aut ab inferis repetitos potestate Papaueris fa-
Tom. III.

ctos somnos vocasse eum credimus: sed quod in
plerisque aliis idem fecerat concionâ breuitate,
quæ fiat à liquore Papaueris, malam quietem si-
gnificasse. Nos primum de Papaueris generibus,
eo umq; viribus & facultatibus dicturi sumus,
quàm de liquore verba fecerimus. Dioscorides
itaque quatuor Papaueris genera proposuit.
Μηκρον ῥιζον, Papauer erraticum, à flore protinus
deciduo, flore puniceo, interdum albo: de hoc
πολλυανθον ῥιζον, Papauer sativum, quod semine
candido est, & θυλακίτης vocatur: huius alterum
genus silvestre nigro semine quod ῥιθίτης nomi-
natur: quibuldâ poëtis, quoniam eius scapo lacteus
succus emanat: huius & tertium maius silvestre
& ad medicinas valentius. De his in præsentia
agimus, idèoque eius verba adiungimus.

Papauer [*μικρον*] quoddam sativum [*ῥιζον*] est
hortense [*πολλυανθον*] cuius semen in sanorum vñum
ad panes adhibetur: eo etiam ex melle pro selsa-
ma vtuntur: Thylacitin [*θυλακίτην*] quasi follicu-
losum vocant. Capitulum id habet oblongum, &
semen candidum. Alterum & silvestre papaueris
genus, sessili caliculo, & semine nigro [*oblongo*
ver.] Nonnullis & ipsum Rhœas [*ῥιζον*] ex eo di-
citur, quod ab eoliquor emanet: Quod ριθίτης
quasi doliare nominatur. Est & tertium agrestius,
ac medicatius, hisque longius [Dodon. legit, mi-
nus] oblongo capitulo: omnibus in commune
vis est refrigerandi: proinde, si folia cum capitib.
ipsis in aquâ decocta fuerint, somnum tota con-

Diosc. 4. 26.
papaueri gē-
nera.

Sativum i.

Tertium a-
grestius, sed
medicatus

T

cilant : bibitur & decoctum contra vigilias. Calyces verò trii. & cum polenta cataplasmati admitti, inflammationibus ac erysipelatis profunt. Verum ex ipsis dum adhuc virent rufi fangi trochiscos oportet, eosque fsecatos ad vltum recondi. Ex iisdem quoque calycibus per se in aquâ decoctis ad dimidias, iterumque deinde cum melle ad iustam spissitudinem percoctis, eclegma conficitur, quod in rufis, arteriæ fluxionibus, cæliacifque affectibus doloris leuamentum præstat. Efficiacius tamen redditur, additis Hypocistidis succo & Acaciâ. Papaueris autem nigri semen tritum cû vino vix potui datur contra fluxionē alui floremque multibrem. At in perungiliis fronti temporibusque ex aqua imponitur. *Additur & 3. μίσηλον κρηταιτίς οἱ ὃ ἀγλαῖον*, Papauer corniculatum, à calyculo in corniculorum modum inflexo, aut maritimum. 4. *μύνηλον ἀγλαῖον*, Papauer spumeum, quia tota herba est spumæa, quibusdam *ἡράκλειον* Heracleum. De his suo loco.

Theophr.

Theo. hraltus Papaueris sativi i. hist. 14. & 18. & 19. & lib. 9. cap. 8. meminit: Siluestris verò genera 9. hist. 13. plura notauit: quoddam enim Corniculatum, quoddam Nigrum, aliud Erraticum flore ruffo, aliud Herculanum nuncupatum folio Struthii. De satiuo autem loquens inquit: succus inest lacteus: è capite lactifuccato fieri solet, quod huic soli est peculiare.

Plinius.

Plinius lib. 19. c. 8. tum nigrum, tum candidum inter sacra numerat: Papaueris satiuaria genera inquit, *Candidum* cuius semen tostum [Coccutum id bellarium vocat Festus & Tertullianus contra Valent.] in secunda mensa cum melle apud antiquos dabatur, (ebedatur, M.) Hoc & panis rustici crustæ inpergitur (inspergunt, Dalech.) affuso ovo inhaerens, ubi inferiorem crustam [que fusum nam attingit] Apium Githque cereali lapore coniunt. *Alterum* genus est Papauer nigrum, cuius leapo inciso lactus succus excipitur. *Tertium* genus Rheum vocant Græci, id est erraticum, &c. Plinius hæc non satis distinctis, ut capite de Pap. uete erratico a notauimus. Idè rursus lib. 20. cap. 18. *Situi, albi, & nigri* n. emittit, ac c. 19. inter satiuaria & siluestria medium genus constituit, Rheum siue erraticum: Syluestrium vnum genus ceratitum vocant, inquit, nigrum, quidam Glaucium, alii *Tandulium* vocant, inter dum è siluestribus, Heracleum vocatur, ab aliis Aphron, Tertium genus est Tithymalon, Mecona vocant, alij Paraton.

Quæ Galenus de Papauere scripsit, legantur postea inter vires. Fuisse Papauera in honore apud Romanos semper, sunt indicio. 1. Tarquinius superbus qui legatis à filio missis decutiendo Papauera in hortu altissima, sanguinariū illud responsum [nempe principum virorum Gabiano rum capita] re idenda esse quò vnus eius tyrannus stabiliretur] hac f. & i. ambage reddidit, Plinio lib. 19. c. 8. teste. 2. Pausanias qui com. emorat in Corinthiacis extate Veneris simulachrum altera manu tenens Papauerum capita. 3. Præq. à quibus celebrata fuisse comperimus. Papauer enim illis dictum scimus. Cereale, Lethæum, Vesicum, Soporiferum, Focundum, Grauidum, Plenum sapore, Agreste, Frigidum, Medicatum, Luteum, Candidum, Purpureum, Capiosum, & Grauiserum, ut ex variis colligi poterit. *uonibus.*

Notia appellationes.

Mecona potius latium, sunt qui Chamæscen, qui Pap. uer theuæda, qui Oxygonon dicunt: sed Ægypti Nami, & Romani latium Papauer vo-

cant. *Nidæon* autem à *νῆδον*, non ministrando; quòd vefcentes suis manibus fungi non possint, dictum legitur.

Papaueris hodie genus multiplex. Est enim satiuū, quod ipsum aut album, flore vel simplici, vel pleno amplissimo: item semine luteo, cum vngue rubro: & capitulis apertis semine cinereo: Aut purpureum flore vel simplici, vel pleno maximo. Ambo rufus, album sc. & purpureum flore fimbriato: Aut rubrum: Aut nigrum: Aut denique flore multiplicato duetorum colorum. *De his max. dicturi sumus.*

Est & siluestre Rheas nominatum, maius, flore pleno, & albo, itemque minus, Argemone exigua Tragi. Papauer erraticum alterum Matth. de quibus postea. Papaueris erratici speciem existimat Tiagus Anemonem tenuifoliam: Est & Papauer corniculatum luteum, & phœniceum alterum, ac tertium violaceum. Papaueris etiam nomen è insigniuntur. Glaucium Diosc. Hypocœum Clu. in. Melanth. flore maiore. Ficus infernalis Papauer spumeum. Cyanus Columnæ. Papau. spumeum Cæsalp. Mucipula altera. Been album officinarum. Saponaria. Lychnis silv. Gratiola. Tithymalus minimus angustifolius. Peplum. Centaurium maius. Malus punica. P. per album. Melanth. flore minore. Nymphaea lutea. Sunt tandem qui Legumen esse velint Papauer, sed in eo errant, cum Papauer non habeat grana in siliquis.

PAPAVER SATI VVM.

P Papauer quod in hortis seritur, digitali crassiusculum, cuius radice habet amaro lacte, si-

Papauer album



triosa magis, magisve oblonga, aliàs pugno paria, aliàs iuglandi, bellato operculo interda, septis men braneis, semen nunc atrum, nunc fulcum, nunc album. disclusum continet a: odorem spirat vires planta vitofum & *καρπία* ex. drat hæc in genere, lyceies enim ex synonymis facile est elicere.

Fuchsius Papaueris satiu duplex genus, album vid. licet, cui florem & semen candidum adscribit. Et nigrum quod semine nigro consistat ait, v-

Papaver fimbriatum flore purpureo & albo.



nâ picturâ comp-
lectitur. Ca-
stor albus &
nigrum pingit.
Acosta Ital. de
Aromat. memo-
rat opium fieri
ex lacrymis ma-
ximorum capi-
tum incisorum
Papaveris albi
in India, rarissi-
mè ex nigro :
Meconium ve-
rò ex succo to-
tius plantæ :
Hier. Brunch.
meminit Pa-
paveris nigri,
quod *Rœmis-
chen Magot*,
& communis
semine cinereo,
quod *veiss-
grauv Magot*
appellat.

Tragus Papaveris sativi septem genera, herbâ
quidem, caule, radice & succo admodum similia,
at flore & semine satis differentia prodidit. I.
Vulgatissimum flore supernè candido, infernè
verò purpureis maculis notato, semine incano,
capitibus apertis. II. Flore planè candido, ca-
pite oblongiori, & ut in sequentibus quinque,
clauso, semine tridem candido. III. Flore simi-
liter candido, infernè rubris maculis infecto, se-
mine fluo. IIII. Flore prostrata rubeo, semine
præguans fusco. V. Flore rosco, purpureis in-
fernè punctis maculato, semine præditum nigro.
VI. Floribus candidis, usque per ambitum su-
pernè incisis, semine albo. VII. & vltimum
floribus rubeis, ac ijs quoque per orbem supernè
dissectis, semine fusco.

Lobel. in Aduers. citat admodum cognitionis
omne Papaveris genus esse ait, sed difficilis ab
Amenone [cui tanta similitudine Rhœas constan-
gi scribit, ut planè eadem iudicio multitudinis
côstitueretur] digressionis. *Papaveris verò sativi has
differentias assignat.* I. Papaver album. II. Pa-
paver fimbriatum [aut cristatum, addit in ap-
pend.] album, capitibus corollâ radiolis argutiori-
bus & dentatim crenato ambitu donatâ. III. Pa-
paver nigrum sativum, flore Malot hortensis, aut
Pæoniæ, sanguineo saturo, semine nigro. IV. Sa-
tium nigrum cristatum in append. Papaver fim-
briatum aut cristatum nigrum. V. & VI. Pa-
paver patulum album & rubrum, officinis etiam
notum, nec vlla in re à superiore albo & rubro
vulgari discrepans, nisi foraminulis in superna
capitis parte patulis. VII. & VIII. Papaver
spontaneum hortense & sylvestre semine interd-
um nigro, aliàs albo, floribus dilutè rubentibus,
obsoleto aspectu, capitulis triplo minoribus,
quandoque huiusmodi osculis, quandoque ocellulis.

Dodonæus de Pargant. Sativa Papavera tria
agnovit, album, & nigrum, ac vtrumque magnum,
& minus tertium. Duorum autem priorum
quandoque florum folia pluribus inciluris dis-
secta scribit. In bis foliis, his plura addere vi-
deretur: quatuor facere, quæ Veterum spectibus
etiam accommodare conatur.

Tom. III.

Papavera sativa hæc enumerat Gesner. hort. Pa-
paver minus nigro semine, nigrum, vel commu-
ne in hortis abundans, de quo alicubi agri obse-
runtur, quodque alicubi silvestre nascitur. Pa-
paver album sativum flore & semine candidis.
Huius & altera species, florum folijs dissectis.
Papaver rubrum, capitibus Dodonæo rotun-
dioribus, &c. Huius species folijs crenatis, &c.
Item in append. hort. Papaver Memphyticum
floribus magnis multifidis, album & purpu-
reum, & medijs coloris : quod idem cum eo pu-
tat Gesnerus, quod aliqui recentiores Papaver
Opij vocant, semine coloris albi, ad roseum ver-
gentis. Papaver nigrum dissectis floribus, albis,
roseis & rubris. Papaver flore multiplici. *Ita
cat. plant.* Papaver sativum, *μικρον κηραδον*, *Garten
Magot*, du *Pavot blanc*. Papaver nigrum [yn-
de Meconium expressione, & Opium volubere
sunt] *μικρον η μηκεαυα*, *schwarzer Magot*, du
Pavot noir.

Tabern. frustra novem figuras ponit: has enar-
rans species. Papaver sativum siue hortense. Pa-
paver flore niuceo. Papaver polyanthes. I. Pa-
paver polyanthes. 2. Papaver Polyanthes 3. Pa-
paver polyanthes 4. Papaver album polyan-
thes minus : Papaver multiflorum niuceum : Et
Papaver multiflorum purpureum.

Hort. Luf. hæc sunt Papaveris sativi differentie,
Papaver sativum album. Papaver spontaneum:
Papaver nigrum sativum flore Pæoniæ simpli-
ci : Papaver fimbriatum rubrum : Papaver mul-
tiforme niuceum : Papaver fimbriatum carnei co-
loris flore : Papaver multiflorum rubrum : Pa-
paver Polyanthes purpureum.

Casp. Bauh. in phyt. hæc recenset : Papaver
I. siue hortense semine albo, sativum, Dioscori-
dis, album plinij : II. siue hortense nigro semi-
ne, silvestre Dioscoridis, nigrum plinij : III. siue
vulgare, capitulis foraminibus hiancibus, semine
incano, *αυκωπτερον* & *καρνακωπτερον* Dioscoridis:
IV. siue flore rubro, semine fusco : V. siue cri-
stum album floribus & semine. VI. siue crista-
tum, floribus rubris, semine nigro. VII. siue
polyanthes nigrum.

Camer. in horto papaveris sativi varias diffe-
rentias comprobat, inter has autem potissimum
papaver flore pleno elegantissimi coloris, albi,
rubri, purpurei, & ex his mixti.

Cæsalp. papaveris sativi species tres constituit
præcipuas. Sativum scilicet, cui capitulum est
longum & semen candidum : silvestre, quod ca-
put habet depressum & semen nigrum : & silve-
strius, quod albo constat semine, multò illis lon-
gius, productiorèque capitulo, ut habet Diosco-
rides. Cætera verò silvestria, inquit idem Cæsal-
pinus, nominavit Dioscorides, non quòd spontè,
& per se nascantur [feruntur enim omnia] sed
quòd asperiora, his furioraque proveniant, tum
caule, tum capitibus, tum etiam folijs: quòd præ-
terea nigrum, asperumque proferant semen : quòd
denique ferantur iò campestribus segetum & le-
guminum modo. Rem autem se ita habere tes-
tari videtur plinius lib. 19. cap. 8.

Græcis *μικρον*: Lat. papaver: nonnullis *μικρον*: Nomina
Geth. *Magot* & *Olmag*, Belg. *huel* & *Man-
cop*: Gallis *Pavot*: Italis *Papavero domestico*: Hisp.
Dormideras & *casalp*: Anglis *Poppy* aut *Cheshou-
le*: Boh. *Mak*.

Vere feruntur papavera in hortis, ac etiam
non rarò in ipsis arvis : frequentissimum tamen
illud, quod caule, folijsque, floribus item & capi-

tulo minus est, cuiusque flos è cæruleo ac purpureo obsoleto & diluto quendam colorem refert, quod crebrè non solum pluribus quoque reperitur locis, præsertim tamen in hortis. Album viret ex semine deciduo, mense Ianuario in horto meo Genevæ, vbi hyemem pertulit, floruitque Iunio. Papaver flore albo densissimo & amplissimo folio, suffulto, spectatu pulcherrimū, vt sambucus roseus, floruit in horto Illust. E. C. mensis Maij principio, & Iunio. Diverforum colorum densò & suffulto flore primū vidi in horto Canonici D. du Tatre florens Iunio Stæ. Hippolitæ. Montbelgardi in horto Principis flore suffulto subcæruleo: item rubro, phœniceo & cinereo, vugibus albis ornato, calycibus oblongis: semine albo punctis rubentibus asperso. Nigrum siue vulgare, Montpelij, Genevæ, & Lugduni florēt Maio. Genevæ Papaveris floribus dissectis aliquot species observavimus, quarum meminit Dodonæus: Hyemem pertulerunt plantæ ex semine deciduo, vna flore albo in inferiore parte, in superiore incarnato: alia flore purpureo infra, supra rubro: florent mense Iunio. Papavere candido passim abundat Hetruria. Virisque verò nigris scætet vniuersa Insulbrum tellus: sed præcipue apud gentes quæ Tridentinas incolunt valles, vbi Papavera hæc copiose feruntur in campis, & inter legumina: præsertim inter Fabas.

Vires & Vius.

Seminis papaveris albi vires & vsum in cibis ex Dioscoride antè diximus: Opij & Meconij vires postea perstringemus: Quæ verò Plinius & Galenus de papaveris viribus prodiderunt, legenda postea ex ijs cap. de Opio. Addeamus hæc tantum: Plutarchum memoriz proditum esse narrare spiritum à papavere defluentem non caute observatum ab ijs qui succum colligunt, subvertit homines. Omnia verò papaveris genera frigida & sicca esse ad quartum gradum, vt auctor est Dodonæus: atque ex Aliano, animalia apibus nocua, viridi papavere locum antè alios siccando, depelli.

Spiritus à Papavere defluens caute observandus.

OPIVM ET MECONIVM.

CAP. II.

Papaveris liquoris virtus & usus.

Papaveris liquor refrigerat magis [quàm papaveris nigri semen] incassat exsiccatque. Sumptus Erui magnitudine, dolores sedat, somnum conciliat, & concoctionem adiuvat: tussi castiacorumque affectibus auxiliatur. Verum si copiosior hauriatur, accersito lethargo etiam mortifer est. Est & ad capitis dolores efficax, si cum rosaceo inrigetur: vii & ad aurium dolores, si cum Amigdalino, Myrrha, & Croco infillitur. Oculorum inflammationibus cum oui lacteo tosto & Croco proficit: erysipelatis ac vulneribus, cum aceto: podagris, cum lacte muliebri & Croco: denique sedi pro balano subditus somnum facit. In eo liquoris genere præstantissimus censetur qui densus & gravis est. Lacuna legit ex vet. cod. ὁ σικκινώτατος ὁ βαρύντατος] odoratu soporifero, gustu amarus, quique facili aqua diluitur, lævis, candidus, neque asper, neque grumosus, quique inter colandum non vii cera coit densaturus, sed Soli expostus diffunditur, & ad lucernam accensus, minime atrā obscurā lucet flammā: qui denique, postquàm extinctus fuerit, suam odoris vim etiamnum conservat. Ipsum

porrò admixto Glaucio, aut Gummi, aut siluestris Lactucæ succo adulterant. Verumtamen qui Glaucio fucatus est, dum diluitur colorem Croci reddit, qui verò agrestis Lactucæ succo, exili & euanido est odore, asperiorque spectatur: qui denique Gummi vitiatum est, inualidus est, inodorus, atque pellucisus [Addit Lacuna ex vet. cod. ὁ ἀνοσμήν.] Nec desunt qui ed dementiæ deucenerint, vt & adipem illi admiscerent. Porrò ad oculorum medicamenta scitili nouo torretur, dum mollior, fuluiorque appareat. At Erasistratus, Diagoram testatur illius vsum damnassem in aurium doloribus & oculorum lippitudinibus, quoniam & visus aciem hebetaret & soporifer esset. Addidit Andreas protinus excæcatum iri qui eo illineretur, nisi adulteraretur. Moesidemus præterea duntaxat vsum olfactandi probavit ad conciliandum somnium, aliqui seu noxium damnat. Quæ quidem omnia commentitia esse experimento deprehenditur, siquidem effectus virtum huiusce medicamenti fidem facit. Quare non abs re fuerit liquoris illius excipiendo rationem subtexere. Nonnulli capita foliæ ipsius tendunt & prælo expriment, mox terentes in mortario, pastillos effingunt: id Meconium vocatur, multum Opio ignauius.

Porrò Opij facienda ratio hæc est: Cum ros exaruerit, stellulam [quæ in summo capite Papaveris visitur] cultello intra scarificare oportet, vt nè penitus intro adigatur, & à capitis lateribus per directum summam cutem incidere, & erumpentem lachrymam digito in conchulam abstergere, ac non ita multò post eo redire: tum enim rursum & alia densata reperitur, atque etiam postero die. Tandem in pilasteri & in pastillos coacta reponi debet. Verumtamen interea dum inciditur, retrocedendum est, vt ne liquor vestium affricu deradatur.

Papaverum & Opij vires Galenus pluribus locis exposuit, libro sexto, simplicium medicamentorum, sic inquit. Papaver alterum Rheas nuncupatur, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & altera duæ sunt præter has species siluestres Papaveris: alterum velut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quàm illud calycem obtinens, totum autem procerius, ac squalidius Ab hoc succus defluit, atque hinc est, quod hanc speciem quidam Rheas nominent. Porrò omnium facultas refrigeratoriæ est. Cæterum sativi semen, quod & Thulacite cognominant, mediocriter somnum conciliat, visu candidum: proinde panem ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At eius quod primo loco recensuimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, validius semen refrigerat, ita vt nequaquam eo quis innoxie solo vii possit, siue sativum siue domesticum melli admiscens. Admodum verò si ita sumptum sit, somnum conciliat. Cæterum, pusillum eius inspergunt ijs, quæ ex melle conficiuntur, bellarijs, ac placentis, panibusque. Porrò tertio loco dicti semen atrum, etiam medicamentosum est: admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnium medicatissimum, tum in semine, tum in calyculis, tum in folijs, tum in succo. Valide enim frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto & ultimo refrigerantium ordine. Porrò quo pacto maxime ex methodo mitionem facere oporteat, non est præsentis tractationis proprium. Et lib. 2. de compositione medicamentorum secundum locos, de dolore capitis agens citra manifestas causas

festas causas oborto, ita de Opio differit. Rarò, inquit, cogimur Pharmacis ex Opio uti, cum videlicet præ doloris vehementia homo de vita periclitatur. Quamquam & tunc solidæ partes ex eius usu offendantur, adèd ut post hæc correctione opus habeant. Sic & ex Opio collyria multis detrimenta fuerunt, adèd ut debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem, ambliopiam Græcis appellatam, induxerint: velut etiam auditus gravitatem inducunt quæcunque ad vehementem aurium dolorem ex Papaveris succo sunt composita: at verò ob capitis dolorem vehementem nemo inquam animi deliquio comprehensus mortuus est, neque se ipsum occidit.

Ex quibus sanè omnibus admoniti debent esse Medici, ne temerè, aut inconsultè ad usum Opij se conferant. Sed ratio quæ id corrigendum, administrandumque sit, ex ipso Galeno colligi potest lib. 8. de compositione pharmacorum secundum locos, ubi scripsit Calefacientia misceri, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possunt, Castoreum, Piper &c.

Atius de viribus tractat lib. 1. ferm. 1. verum cum omnia iam sint dicta ex Galeno de simplicibus hic non repetimus.

Plinius lib. 20. cap. 18. hæc de Papauere & Opio memoriæ prodidit: Papaveris latini diximus genera: & spontè nascentis alia promissimus. Sed latini albi calix ipse testatur, & è vino bibitur somni causa. Semine Elephantiasii medetur. E nigro Papauere [è nigro porius, quam albo Papauere, Opium fieri nulquam Dioscorides scribit. Valerius à nigro verisimile est, imbecillius ex albo.]

læc sapor [saporis vocabulo πικρὸν χυλὸν Græcorum Plinius voluit exprimere, duplici errore: altero, quod liquoris οὐκ ἔστι, id est, manans spontè lachryma, non autem χυλὸν, id est, succus herbæ citrà expressus: altero quòd ad id papaveris albi, non nigri scapus inciditur] gignitur scapo inciso, ut Diagoras suadet, cum turgescit [gradescit & ad florè properat] ut lollas, cum deflorescit horà diei serenus, hoc est, (circa meridiem) cum ros in eo exaruerit. Incidi iubent sub capite & calyce (sub capite ante florem, sub calice post florem) Nec in alio genere ipsū inciditur caput. Succus & hic, & herbæ cuiuscunque, lana excipitur: aut si exiguus est, vngue pollicis, ut Lactucis, Constantinus legit, aut conchis, in dictione πικρὸν. Ego nihil muto. Glancio enim & siluestribus Lactucis succum detrahi solum Dioscorides prodit, quo verum Opium adulteraretur, & postero die magis quod inaruit. Papaveris verò laevis densatur, & in pastillos tritus in umbra siccat, non vi soporifera modo, verum si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: Opion vocant. Sic scimus interemptum Licinij Cæcinæ prætorij viri patrem in Hispania Bauili, cum valetudo impatibilis odium vitæ fecisset, quoniam plerique alios.

Qua de causa magna concertatio existit. Diagoras & Erasistratus in totum damnare, ut mortiferum, infundi vetantes. præterea quoniam virus noceret. Addidit Andreas, idèd non prorsus excæcari eos, quoniam adulteraretur Alexandriæ. Sed postea usus eius non improbatum est medicamentum nobili, quod Diacodion vocant. Semine quoque eius trito in pastillos è lacte vntur ad somnum: item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum hoc & aurium dolori instillatur. podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & foliis ipsis vntur. Item ad sacros ignes & vulnera

Tom. 111.

ex aceto. Ego tamen damnauerim collyriis addi: multoque magis quas vocant leixpyretas, quasque pepticas & cæliacas. Nigrum tamen cæliacis in vino datur. Satiuum omne magis rotundat capita. At siluestri longum & pusillum & ad omnes effectus valentius. Decoquitur & bibitur contra vigilias, eadèmq; aqua fouent ora. Optimum in fœcis, & ubi rarò pluit. Cum capita ipsa & folia decoquuntur, succus Meconium vocatur, multum Opio ignauior. Experimentum Opij est primum odore: sincerum enim perpeti non est, mox in lucernis, ut puta luceat flamma, aut extinctum demum oleat: quæ in fucato non eueniunt. Accenditur quoque difficilior, & crebrò extinguitur. Est sinceri experimentum & in aqua, quia nebula innatat: fictum in pustulas coit. Sed maximè mirum, æstiuo solo deprehendi. Sincerum enim sudat, & se diluit, donec succo recenti simile fiat. Mucosus optime seruari putat Hicof. yami semine adiecto: talij in Faba. Idem, ubi lib. 20. c. 29. locutus fuit de Papauere ceratite, addidit sequentia. Alterum è siluestribus genus Herachion vocatur, ab alijs Aphron, folijs si procul intuearis, speciem passerum præsentantibus, radice in summa terræ cute, semine spumoso. Ex hoc lina splendorem trahunt. Aestate. Tunditur in pila comitalibus morbis, acetabuli mensura in vino albo vomitiones enim facit, &c.

Prodest Papauer, Trago referente, & iis qui vertigine laborant, experientia hoc testat, quietem inducit, somnumque conciliat, tam inuenibus quam senibus, quoque modo assumere libeat, Quin & infansibus, quado iniqui & insomniis laborauerint, in lacte vel pulste concoctum exhiberi potest hoc semen. Omne Papaveris genus, tam sylvestre quam satiuum, & non solum herbæ eius expressusque succus, sed & Aqua distillata Phreneticis, & his qui insomniis laborant, vtilissima sunt, emplastri modo fronti vel temporibus imposita. Si Erithion in succo herbæ Papaveris intrinsectum naubus indas, somnum quamprimum induces. Aqua in quâ capita papauerum decocta fuerint, easque facultates obtinet, sacris etiam ignibus imposita, opitulatur. Aurium dolori cum oleo Amygdalino vtiliter instillatur. Aqua ex herbæ floribus & capitibus papauerum distillata ad eadem omnia efficax est. Oleum papaveris circum circa tempora linitum allicit somnum, ut Clem. Clementinus perhibet.

Gentes, quæ Tridentinas incolant valles, teste Matthiolo, papaveris semine vescuntur, misto placentalis quas ex pasta foliosa multiplici inuolucro conficiunt. Comedunt illi quidem hæc placentas ad saturitatem vsque: nec ob id tamen inquam (quod mitum alicui fortè videbitur) diuturniore somno capiuntur, neque veterosi fiunt, Quia nec illi etiam, qui Stiriam, superioremque Austriam incolunt in veterum incurunt: testis oleum è nigri papaveris semine expressum in cibis continud assumant, Oliuarum olei vice. Ea denuò experientia fecit, ut intrepidè quandoque ausus sim papaveris seminis cremorem, Hordei decocto expressum in ardentissimis febris ad sitim extinguendam, somnumque conciliandum etiam longius exhibere. Hinc præterea factum est, ut eum metum excusserim, & deposuerim, quæ mihi olim præceptorum meorum graues admonitiones incoollerant & ingesserant. Hæc Matth. addit in hist. Germ. Sciendum, inquit, Germanicū papauer, non ita refrigerare ut Veteres de suo scripserunt, id in causa proculdubio regionis &

Affernis.

Herachion.

Ex Trago.

Aqua è Papauere.

Oleum.

Placentalis semen misceant.

Papauer germanicum non ita refrigerat.

aëris proprietas. Deinde in commentariis suis de Opio hæc dicit. Quamvis Opium quarto excessu frigidum statuatur: tamen si ex sapore, & affectu rerum temperamenta & qualitates cognoscuntur, Opium nostri vsus [quantum equidem deprehendere potui] non modò gustui amatum percipitur, sed etiam acre, adèd vt paululum in ore detentum linguam & palatum exulceret. Vnde haud dubiè colligi posse putauerim, calidissimas illi inesse qualitates. Cuius rei fidem augere potest, quæ ex eo prodit odoris grauitas. Veruntamen ne impudentis, atque arrogantis nomen subeam, quòd in hoc omnium ferè medicorum sententiam destruere velim, eorum iudicio rem hanc æstimandam relinquam qui ante nos Opium qualitates, tum facultates diligentissimè expenderunt. Sed fortè ea acris, amaraque facultas in Opium faciliè inuehitur ex Glauicii adulteratione, quod illi sæpius admiscet, vt Dioscorides aurotat. Illudque argumento esse potest, quòd aqua colligatum croceum colorem reddat. Adde quod Opium quod hodie ad nos conuehitur non est illud verum & legitimu è lachryma, quæ ex inciso Papaueris capite exierat, conuersum: sed potius hoc è foliorum & capitum contritorum succo confectum est: idque Meconium vocatum erit, Opio longè deterius. Hæc Matth. Sic etiam Amarum, Quod ex Apulia hodie Venetias afferunt, inquit, reuera Meconiu potius, quàm Opium appellari meretur.

Hispanicum Opium nonnulli aliis præstare existimant: inquit Cornarius, Aëcius aliquando Asianum, aliquoties etiam Achaicum probat. Alii Thebaicum præferunt. Scribonius Opium laudat quod ex lacte ipso siluatici Papaueris capitum fit, & non ex succo foliorum eius, vt pigmentarii insitiores eius rei compendii causâ faciunt. Illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur. Quod ipsum etiam Plinius l. 20. cap. 18. dixit his verbis. Quum capita ipsa & folia decoquantur, succus Meconium vocatur, multum Opio ignauior, &c. Nam eadem Diosc. etiam lib. 4. tradit. Galenus tamen & authores qui ab ipso in his libris citantur, indifferenter modò *unum* modò *utrumque* dicere videntur, & nos *utrumque* succum Papaueris, *utrumque* item, vt Græci, Opium reddidimus. Officinæ nostræ vno ore Thebaicum prædicant, emuntque Anruerpia & Francofurti, sed ubi paratum sit, prorsus ignorant. Dicitur verò indifferenter Opium, succus, lac, & lachryma: si quis autem vulgare nostrum ratione atque experimento [quæ firma sint artis nostræ, ac veritatis præsidia] agnoscere laborat, merè adulteratum reperiet. Addendum hic quæ obseruauit Bellonius Obser. 3. cap. 15. Opium nunc fit in Turchia, maximè in Achara, Carachara, Spartada, Emetelinda, & aliis vrbibus vicinis Paphlagoniæ, Cappadociæ, & Ciliciæ. Conferunt agros Papauere albo vt nos Tritico. Serendo obseruant vt vniquisque rusticus tantum ferat, quantum putat se habiturum homines qui colligant, ubi Papauer capita produxit, leuiter dissecant, vnde effluunt aliquæ lactis guttæ, quas concrecere sinunt: nullus autem est Turca qui non coëmat, etiam pauper, & secum circumferat, tum tempore pacis, tum belli. Mercator quidam Iudæus ex Natolia, cerò nobis affirmauit nullum elabi annum quin efficerentur ex Paphlagonia, Cappadocia, Galatia, & Cilicia onera quinquaginta Camelonum, vt transferrentur in Persiam, Indiam, & Eu-

ropam, & in alias regiones longinquas, ac etiam in vniuersum dominium Magni Turcæ. Quod vix credidissimus nisi particulatim recensuissem quid possit eff. tri ex vno quoque pagorum vicinorum Caracharæ, & aliis vrbibus Paphlagoniæ, Cappadociæ, Armeniæ minoris, & Gallograciæ. Dicebat præterea maiori in vsu esse adhuc apud Persas, quàm Turcas. Semel experiri volumus quâ dosi exhiberi posset vnâ vice sine nocumèto, inuenimus quendam consuetum quotidie comedere, qui nobis præsentibus comedit pondus drachmæ dimidiæ, sequenti die dedimus ei comedere vnâ vice drachmam vnâ, nec vllum ei detrimentum euenit, nisi quod quasi ebrius videretur. Turcæ commendant, qui sibi persuadent se magis strenuos & minùs timidos periculis belli reddi, ita vt Turcæ exercitum colligente ita consumatur, vt regio vacua eo remaneat. Solent interdum se mutuò conuinciri dicentes: *Opium comeditis*, sicuti nos dicimus ebrius es. Americus Christianus apud què diu viximus, nobis præteritis sæpius vellebat.

Nos Opium experti sumus, verum nullum symptoma animaduertimus, nisi quod excalfaceret pectus, & nonnihil caput turbaret, & insomnia pareret. Credissem quod si in Europa, vt Gallia, Germania, & Italia ea diligentia adhibeatur in colligendo, quam adhibent, posset etiam fieri sicuti in Asia. Natoliæ clima est æquè frigidum atque Gallia. Eadè a. ratione fit, quâ authores scripsere. Ac si habemus in Europa, fortè permixtū Mercatores enim multiplicat priusquam ad prouincias distribuatur. Quum animaduertissemus quibus noris sit dignoscendū hic subiiciemus. Opium valdè amarum est; gustu calidum, ita vt os inflammer. Coloris est lutei, inclinantis in colorem pilorum Leonis, simul coaceruatum, massa veluti ex multis paruis granis diuersi coloris Odor grauis est & vehemens: licet tribuatur ei vis refrigerandi, nihilominus os accendit. Opium in ipsa Natolia compingitur in massas non excedentes pondus vnciarum quatuor, aut ad summum semilibræ: Verum mercatores vt plus lucrentur, multiplicat dimidium addentes, ita vt massæ quæ Venetias effertur ponderent ferè libram vnâ. Hæc Belonius.

Antidota Opium recipientia & narcotica sunt hæc, Theriaca, Diacodium Galeni quod Quercetanus in pharmac. non improbat, Diacodium compositum Actuarij: Diacodium Montagnanæ, quod laudat: pilulæ Cynoglossæ Nicol. præpositi apud Quercetanus: Reques Nicolai, apud eundem: Philonium Tharsense Galeni, Philonium Romanum Nicolai, philonium persicum, Philonium Mesuzi Quercetani qui descriptionem ponit, & Laudana siue Nepenthes.

Luminare maius descriptioni emplastri contra rupturam adiungit Opium, quam multi sequuntur, & cæcus cæcum ducit. Opij autem Alexipharmacum dicebat Rondeletius esse vinum. Adreas Baccius verò Balneum aquæ temperatæ. Opium autem in colica non conuenire ostendit retrus de Abano.

OPIVM OFFICINARVM.

C A P. III.

Papauerum lachryma quam scarificata capita plorant, vt ad nos adfertur atque in officinis auferuatur, placentis constat mutuo incumbenti-

bus, non pœnitens vnciam crassius, interiectis folijs, forte Papauerinis: substantiâ illi compacta sed ductilis, ponderosa, colore fusco vel è fusco rubente. Communium dentibus adhærescit, saporemque amarum representat. Odore est viroso καυκαριος, & candelæ admodum in lucentulam flammam exardet.

De Opii qualitatibus contrarias acutissimorum nostri seculi viroorum sententias, huc referre non est animus: cum & integri super hac materia scripti fuerint libri, & ex antè dictis satis superque ea elucescere videatur.

Addemus tantum nos non posse animaduertere quomodo præparatio Opii vel Meconij apud Quercetanum melior sit Veterum præparationibus, nisi quatenus minori quantitate exhiberi possit miseris ægris, qui pauca deglutire possunt: præparatione suâ an tollat fœtorem considerandum, Veteres vi & ille mixtione aromatum minuunt, sed non tollunt: suâ præparatione non præstant ut minus nocens sit venenum: tantum hoc agit, ut facilius sumi possit: si exhibeat eâ quantitate suum præparatum Opium vel Meconium quo Turcæ suam non præparatum assument, profectò peribit is qui eius Opium vel Meconium præparatum assimet: eius igitur præparatio non facit ut nocentissimum venenum, ut ait, æstimatum, non maneat tale, vel transformetur in vtilissimum & saluberrimum remedium, idem fecerunt veteres quod ille. Digestiones itaque Meconij minuire aut tollere malignitatem aut separare nunquam concessimus, corrigi quidem accessione aliorum medicamentorum non negamus: præterea etiam intendi illius vires facilius existimamus, nec terrestres partes quæ separantur, minuunt venenatam aut fœtoriferam qualitatem. Per Hyacinthos, Corallia, terram sigillatam, Puluerem Bezoardicum, & Vnicornu, non censemus minui Opii magnam qualitatem: Probamus tamen in magnis doloribus cum flore aliquo magno, non item in colico dolore à causa frigida à flatibus & obstructione alui.

PAPAVER ERRATICVM VETERIBVS.

CAP. IV.

Papauer erraticum Rhœas nominatum est Græcis [inquit Diosc.] eò quod florem breui abiciis. Nascitur in aruis Vere, quando etiam colligitur: *Folia* similia sunt Origani, aut Erucæ, aut Cichorii, aut Thymo, filia, sed longiora & aspera: *caulem* habet tuncum, rectum, alperum, cubitalem: *florem* Punicum, quandoque etiam album, similem siluestri Anemone [Fragus legit Argemone,] caput est oblongum, minus tamen quam Anemones: *semen* solum, *radix* oblonga, subalbida, parui digiti crassitudinem habens, amara. Huius capita quæ aut sex, cum vini cyathis tribus cocta vt ad duos denentiant, bibenda præbe ijs quibus somnum inducere voles. At semen acetabuli mensura cum aquâ multa potum, aluum leuiter mollit. Ad idem præstandum mellitis placeatulis, & dulciarijs libis admisceatur. Cæterum, folia cum capitulo calycibus imposita, inflammationibus profunt, Sed & decocto [αλμα Βαλ. cod. αφεχμα vet. cod. Lat.] spiorum si quis per furdatur, omnium inducit.

Sciendum autem est in hoc Dioscoridis con-
Tom. III.


textu improvidè comparari huius Rhœadis Papaueris folia Origani & Thymi folijs, non posset dissimilior esse horum proportio. Habet enim Rhœas Erucæ siue Cichorii modo incisa folia, à qua similitudine longissimè recedunt folia Thymi & Origani. Abundant igitur, & ab aliquo male adiecta sunt vocabula ista.

Plin. pro Rhœada Rhœam dixit, ait enim l. 19. c. 8. Tertium [Papaueris genus] Rhœam vocant id nostri erraticum. Spontè quidem sed in aruis cum Hordeo maximè nascitur, Erucæ simile, cubitali altitudine, flore rubro, & protinus deciduo. Vnde & nomen à Græcis accepit. Idem lib. 20. c. 18. & 19. Inter sativa & sylvestria medium genus, quoniam in aruis spontè nasceretur, sed Rhœam vocauimus & erraticum. Quidam id decerptum cum toro protinus calyce mandunt. Aluum exinaniant capita quinque decocta in tribus vini heminis pota somnum faciunt. Hoc & Dioscorides habet, sed cum vini cyathis tribus, falsò vt opinatur Cornar. voce καυκαριος pro καυκαριος supposita: x vtriusque scripturæ decurtatione.

Galeno quoque Rhœas hoc genus Papaueris appellatum est, qui semen ipsius vehementius frigesacere dicit, vt quis ipso solo vt non possit citra læsionem, sed melle admixto: quo modo acceptum somnum inducit. Quare modicum ex ipso placitis ex melle, & libis, & panibus inspergunt. Sic Plinij verba dicentis mandi Papauer erraticum solum contrariantur Galeno qui eo solo nequaquam vt posse prodidit.

Theophr. lib. 9. Histor. Rhœada Cichorio sylvestri affimilem dicit, vnde etiam edatur. Nasci verò in aruis, maximè inter Hordeum. Habere florem rubrum: calycem vel caput, vnguis digiti magnitudine. Colligante Hordei mellisem, sed adhuc viridiorem. Purgare aluum deorsum.

Vehementer tandem errant, qui hoc Papauer, cornutum Papauer, & Memithen, i.e. Glaucium esse putant. Est enim quælibet illarum ab alijs diuersa & proprii generis herba, teste Cordo in Dioscoridem.

PAPAVER ERRATICVM RVBRVM
campestre.

Toto vultu Descriptio.

Papauer exprimit, in eadem familiam accensendum ac eo argumeto Fluidum nuncupatum, quodd flos postquam è bivalui viridanti hirsutòque inuolucto perquam caduco se explicuit, & ipse quoque, punico colore insignis, vnguibus arborubentibus, quadrifolijs, nõ ita multò post decidit, relicto capitulo Papaueraceo, stellato umbilico, quod stamina circum-

ueraceo, stellato umbilico, quod stamina circum-

stant purpurea, centia, apertibus ochrea colore, semine continens minutum fuscum aut nigrum: pedem verò & sesquipedem longus est caulis, hirsutus, cui folia apposita Boræ pactoria modo incisa, nec multo latiora, succum fundentia lacteum, Papaueraceum, parileque odorem virosum: radix exigua est. Dodonæus Papauer erraticum duplex agnovit, & sic descripsit: Erratico Papaueri cauliculi & folia nigriora hirsutioraque; folia utrinque altis incisuris, instar Cichorii, aut Erucæ divisa: flores è fastigijs cauliculorum pulchro ac rubente phœniceo emicant colore, itaminibus nigricantibus capitulum medium ambientibus: quod adultum minus est, sed tamen oblongioris formæ quàm ætjii faciat: semen exiguum nigricat. Huius & alia minor species, folijs minoribus, oblongis, non Erucæ per margines divisa, sed tantummodò serratis, reliquis priori similis.

Synonyma
eius nomi-
nibus lin-
guarum

Dioscoridi est *ῥιζομαχία*: Lat. Papauer rhœas, siue erraticum: Gazæ Papauer fluidum: Wirlong, & officinis Papauer rubrum, siue ruheum, itemque Lolium: Germanis *Clapper Rosen*, *Korn Rosen*, *feldmaß samen*, *hirsfehal*, *ovulder Mañfeldt*, *Mah*, *Ketschen*, *Schmaßblumen*. Roter *Magfolt*, *Roter korblumen*, & *Rindmagen*: Belg. *roden huet*, *wilden huet*, *Colletblumen*: Gallis *Pauot sauvage*, *Coquelicos*. Confansons & Poëan Tabern. Burgundis *Rose nu ladre*: Ital. *Papauero siluatico* & *Rosolaccio*: Hisp. *Amapolas Rosella*. & *Papoula*: Angl. *wild rode papyr*, Boh. *Makvulez*.

Locis &
Tempus.

Papauer Rhœas obseruauit Monspelij florens mense Martio & Aprilis: Lugduni Maio: Geneuz virens mense Februarii principio, florens Iunio: Basileæ Maio, Iunio & Iulio: Montebelgardii frequens in agris, florens Augusto. Vnà cum Tritico, inquit Dodonæus, Zea, Secali, Hordeo, Avena, reliquisque frugibus in agris erraticum gignitur Papauer: non raro quoque inter olera, ac fecus margines hortorum. Bellè colorati flores Maio & Iunio pulchritudo latus venustatisque quandam gratiam acutis conciliant.

Vires &
Vfus.

Vires Papaueris erratici ex veteribus antè posuimus. Tradunt Recentiores sacro igni mederi. Masticum me esse, in profluvia compescere: sanguinem è naribus fluentem iccori impositum sistere. Lingua decocto eius lorà, ardorem faucium sanare. Podendorum tumores per id deumescere. Temporibus illiū phreiticis somnum conciliare: calidos oculorum dolores linteo impositum mitigare: ac Pleuritidi: Febri ardenti, & dysenteria conferre.

ARGEMONE VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. V.

Argemone in totum Papaneri silvestri similis est, inquit Diosc. Folium autem Anemone simile habet fistum: florem puniceum: caput simile Papaveri Rhœadi: sed oblongius & latum circa supernas partes: radicem rotundam. Succum autem remittit crocei coloris, acrem. Pargant argemæ & nubeculas, & inflammationes mitigant folia imposita.

Galenus.

Galenus Argemonem vnam nouit, cuius herba vis est, ut ait, exterioria ac discussoria. Nec in veteribus Græcis & Latinis codicibus reperiri alteram Argemonem plerique asserunt. Itaque & altera Argemone, ubi quædam de priore leguntur, inter supposita semouenda fuerit.

Plinius l. 25. cap. 9. de Argemonia sic habet, ex veteris codicis fide. Folia, inquit habet qualia Anemone, diuisa Apij modo, caput in cauliculo Papaueris silvestris: item radicem. Succum Croci

colore acrem & acutum. Nascitur & in arnis apud nos. Tria eius genera faciunt, & id demum probant, cuius radix thus redolest.

Argemonen & Argemida dictam putat Hermodorus à Diosc. ubi de Anemone loquitur. Pandect. verò varias plantas Argemonia nomine commiscet. Cornario, Trago, Rob. Stephano, Theoph. Golio in Onom. Rhegino, Matthiolo, Feischlino & alijs, Argemone est quam cum multis Papauer erraticum appellauimus.

Argemones nomine donantur etiam: Pap. corn. rubrum & violaceum. Glaucium. Chamamelum Eranthemum. Alcea foliæqua. Pontentilla. Argemone rad. thus olente. Agrimonia, Tagetes Indicus & Lunaria.

ARGEMONE CAPITVLO BREVIORE hispido.



Papaueracetis generis haud absurdè quis existima- uerit Argemonem Recentioribus prodita, folio Adonidis aut Papaueris corniculati violacei, tenuiter dissecto, piloso: caulibus ex radice simpliciter gracilibus & maioribus, tenuibus, hirsutis racemosis: flores sunt puniceos, valde caduci, paulò

Adonidis florib. maiores, formâ Papaueraceæ, capsula turbinata, nucleo Auellaneæ paria, rigidulis spinulis vndiquaque, denticulatâ stellâ operculata, semine sarcta copioso, minutissimo, rotundo, nigro. Capsula in icone nostra minùs bene expressa. Monspelij & Heidelbergæ obseruati.

ARGEMONE CAPITVLO LONGIORE spinoso.



Foliorū diuisio minuta Nigellæ citrinæ, pilis asperis oblitum, tum per caules, tum per ramos asperos hirsutulosque nascentiū, flores admodum caduci, purpurei, decuplò minores quàm Papaueris Rhœadis: capsula verò post se relinquunt breuibus confertis spinulis mitiusculis hispida, oblonga, canulata, stellato operculo te-

cta. Radix longiuscula, simplex. Circa Möspel. & Nemausiū colligit Cherlerus.

GLAUCIUM VETERIBVS ET NEOTERICIS in genere.

CAP. VI.

Glaucium Dioscoridi succus est herbæ ad Hierapolim Syriæ nascentis: cui *folia cornu- u Papaueris* similia sunt, sed pinguiora (μακροτέρα) & humilia (χαμηλότερα) siue in terram sparsa, graucolentia [βαρυκόλντα] seu tetto odore, ac gustu amariora [πικρότερα]. Marcello simpliciter anara] quæque crocei coloris succum copiosum [χυλόν πολλόν] habent. Incolæ folia in ollam [sicile] coniecta, semisfrigidis clibanis calefaciunt vsquedum succescant [in furnis non adeo calentibus vsque dum calore inarescant] deinde contusis succum exprimunt. Est porro eius vsus ad oculorum affectus circa principia: quippe quod refrigerandi vim habeat: vel vt Corn. legit, vsus huius est ad medicamenta ocularia, vt quini principio refrigeret.

Galenus Glaucium cum iniucunditate quadam adstringere ait, & adeo manifestè refrigerare vt solum lapidè ignes sacros, non ita vehemencaret. Esse verò temperamentum in ipsius compositum ex aquola & terrea essentia: quæ ambæ frigida sunt, non tamen summe, sed uia vt fontana aqua.

Sunt Plinio & Dioscoridi in Glaucii medicina & historia eadè ferè omnia, vt ex hæcenus dictis colligere licet. Sed quod hic foliū pinguius dixit, ille sordidius magno discrimine pronuntiavit. Diuersitatis autem ea potuit esse causa quòd quod nunc legitur μακρότερα certa pinguedinis significatione: tunc μικρότερα 1. sordidiora legeretur, facillimo & lubrico in vnius literæ figura, & sensu ad contrariam & adulteratam significationem lapsu.

Porro quod Plinius dixit, lactis quoque vberitas, &c. Dioscorides de Glauce prodidit. Quare Glaucium cum Glauce confundit.

Glauci nomine sequentes insigniuntur Plantæ. Papauer spinosum. Papauer erraticum. Papauer corniculatum luteum. Papauer corniculatum flore Phœniceo. Papauer corniculatum violaceum. Papauer erraticum Germanis Fornosen dictum. Chelidonium maius, sed malè. Mala aurea, perperam etiam. Citysus. Sadethz Turcicum: itidem malè vt monet Matthiolus. Si Lobel. quandoque optaret tutum & vtile αμφοτεροειδών in iustis fluxionum, malitè Soncho, siue Cicerbita, aut Chondrillus succum elicere, & impermixtum admoere, ad ea quæ Dioscorides Glaucio sanat, non minori, sed, vt inquit, certiori commodo.

PAPAVER SPINOSVM.

CAP. VII.

Ex omnibus Papaueris generibus, nullum est cui aptius spinosum compares, quàm corniculatum: siquidem *folia*, consimiliter lacinia sunt, succo luteo pregnantia, palmum aut sesquipalmum longa, vtrinque glabra, mollia, & laciniarum mucrones in flauentes spinas exeunt acutas, parte supina folii virorem intercepti, vt in Carduo Mariano, maculæ lacteæ, postica parte neutiquam conficiendæ, vbi tamè nervi acutis spinulis horrent, sicuti & costa, quæ supinè parte innocens, *can-*

Tom. III



tem verius nihil rubescit; inde ad mucronem vsquo albet: *caulis* vnicus minacibus spinis armatus, dodrantalis, eundem illum succum luteum virosum è vulnere reddès, capitula sustinet aliquot Papaueracea, fenticosa, in tria cornicula aculeata desinèntia, quæ dehiscentia flores ostentant Papaueris corniculati luteos,

concoloribus fibris de more medium occupantibus, quos *vascula* excipiunt vndique aculeis armata, oblonga, canaliculata, semine repleta, supra vulgarem sortem magno, nigro, rotundo.

Cæterùm, Papaueris huius spinosi plantam in Italiam fuisse delatam nomine *Rigo del inferno*, hoc est, Fici infernalis, author est Ferd. Imperatus. Gerard. Anglus vocat Carduum Chrysanthemum Peruanū, The Golden thistle of Peru.

Ex semine Noribergà à D. Ioachimo Camerario seniore missū, excreuit mihi in horto Ill. E.C. qui Montbelgardii colitur, planta eà formà quam iconè & descriptione delineatam exhibemus, florens Augusto: semine deciuo sequenti anno prouenit.

Papauer spinosum. Ficus infernalis

Locus & Tempus

DE PAPAVERE CORNICVLATO EX Veteribus & Recentioribus in genere.

CAP. VIII

Corniculatū Papauer [κνικυλον κεραιωδες] quod Galii Paralium [παράλιον] alii marinum βαλιδάριον] quasi in maritimis nascens, & alii agreste vocant, Aphri Simacha, Romani Fabiolum marinū,

folia habet alba, hirsuta (hirta Sarrac.) Verbasco (φλέγω) similia, serrata in ambitu, silvestris Papaueris modo, & *caulem* non dissimilem, *florem* pallidum (ex luteo pallefcentem, Sarrac.) *Fruitum* [siliquam Sarrac.] longum (ita legunt Cordus, Corn. & Sarrac. μικρόν breuem Marcell. & Basil. codex) in corniculi modum inflexum, ceu Fœnugræci (τμήλας. Ald τμήλας) vnde & nomen habet: *semen* exile, nigrum, simile Papaueris semini: *radicem* per summa cespitum nascentem; nigram, crassam. Gignitur in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt decocta in aqua ad dimidias coxendicum & iecinoris vitia potu sanet, iisque profit qui crassa & araneola quædam cum lotio reddunt. Semen acetabuli mensura ex aqua mulsa potum, leniter aluum purgat. Illita ex oleo folia, floresque, crustas emarginant: argemas & nubeculas iumentorum inunctione depurgant. Cæterùm non desunt qui ex hoc Papaueris genere facitari Glaucium fieri putarunt, ob similitudinem foliorum, inquit Dioscorides.

Galeno Papauer corniculatum est à fructu

V u

Vires

breuem cūritatē habente, quemadmodum Fœnum græcum, vt bouis cornu similis sit. Appellatur ab aliquibus Paralium: quoniam plerunque prope mare nascitur. Vim habet secandi & extergendi. Quare radix herbæ in aqua ad dimidias, hepaticis affectionibus prodest. Folia & flores sordida valdè & maligna vlcera repurgat. Sed vbi vlcera pura facta sunt, ab ipsorum vsu desistere oportet, in tantum enim extergent, vt etiam de ipsa pura carne quid absumat. Ob hanc certè vim non solum sordes, sed etiam crustas ab vlceribus auferunt.

Affectus hepatici. Cautio.

Theophr.

Porro, vnus satis Theophrastus est, vt cornicularis Papaueris historiam & tot nominum eius in Græcis rationē intelligamus. Huius, inquit, folium nigro Verbalco simile, minus tamen nigrum est. Cautis altitudo cubitalis. Radix brevis & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia vocant, similis. Carpitur per messem. Aluum purgat. Pecoris albugines folium exterit. Nascitur ad mare petrosi locis. Ex his dubitauerit meritò, quæ sit etiam aliquis, Ceratitē hoc Papauer à cornuum figura simplici, vt Diosc. & Galenus voluerunt. An, vt in Theophrasto auditur, à Ceratiis quas Latini Siliquas dixerunt, quæ & ipsæ inflexæ sunt, & cornuum figurā per longitudinem incuruantur. Multi facienda Dioscoridis auctoritas, aliorumque omnium, qui, eum secuti, corniculis fructum eius comparauerunt. Non spernendus etiam Theophrastus grauis auctor, in cuius sententiā nos ter inclinat animus, etsi nullum in re discernere sit. Nec si cornibus, aut Ceratiis comparauerit Papaueris huius fructum aliquis, diuersam rem ostenderit. Ambo enim cornua sc. & Ceratia in longitudinem producta inflectuntur: nec siliquæ illæ aliunde quàm à cornibus Ceratia à Græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis etiam, agreste Papauer hoc rectè dici, communi tantum agrestibus aliis appellatione. In eorum enim censu est. Nec minus quàm ad mare nascitur Paralium: id enim ea vox significat. Et hanc naturæ nataliumque eius notam secuti Latini Fabulum marinum vocauerunt, quoniam ad mare nasceretur, fabaceis que siliquis in longitudine similia vascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia λευκά i.e. candida. Hermolaus verdè quasi λευκὰ legeret, tenuia dixit. Nescio ego [inquit Marcell.] an ex fororum codicum lectione sic verterit: an potius à Plinio in ea re monitus candorem ad tenuitatem transtulerit. Ego communem omnium quotquot vidi, Græcorum codicum fidem secutus, candido colore folia eius esse dixi &c.

Dubitum de nomine Papauer. Ceratit.

Ceratia.

Papauer agreste.

Paralium.

Fabulum marinum. Hermol. notatur.

Papauer corniculatum triplex.

Cæterum nos triplex Papauer corniculatum, luteum sc. phœniceum, & violaceum agnoscimus. De his autem nunc dicturi sumus.

PAPAVER CORNICVLATVM LVTEVM.

Descriptio.

Digiti crassitudine est radix, longa, nigricans, luteo succo, sicut & tota planta, eo que viroso prægnans, & amaro: folia crassa & hirsuta, spithamam longa, digitos verdè quatuor lata, Verbalci Monipeliensis foliis similia, per ambitum serrata, & profundius incisa & sinuata, ac veluti crispa, glauca, & pinguis. Humi autem procumbunt, & Hiemis iniuriam contumaciter perferunt, quæque ad radicem oriuntur crassos pediculos habent, potissimum primo anno cum caule destituitur, quem sequenti æstate



primum fert robustum, solidum, glabrum, geniculatū, & in multos ramos diuisum, foliis è geniculis prodeuntibus prædictis minoribus, & parcius incisis, quò summitati propiora sunt, aliqua hederaceorum similitudine: è cuiusque autem sinu bina plerumque erumpunt germina, vnum induidum, florem

fructumque ferēs, alterum iuxta alterius folii sinu rursus in bina prædicto modo diuiditur: eaque diuisio vsque ad summitatem ramulorum ab hac herba seruatur: minora igitur & indiuidua germina seu pediculi singulos ferunt flores, colore luteos, Papaueris satini floribus equales, quatuor latis tenuissimisque foliis cōstantes: in quorum medio eiusdem coloris numerosa stamina capitulum constituunt, ex quo deinde incurua, gracilis, corniculatæ siliquæ, tangenti asperæ, digitali longitudine erumpit, Fœnugraci siliquæ æqualis, non tamen ad eam acumen desinens, & in summitate nigricans, capitulum alata sagittæ quandam similitudinem præ se ferens habet, sed obtusa acumine siliqua vtrinque lineæ profundam ceu incisam per longitudinem habet, quæ commissuræ eius sunt, quibus matura aperitur: semina intus continentur Papaueri similia, colore admodum nigro.

Est hæc *μυκωρίς* *μυκωρίς* Græcorū, *μαράριον* Aetii Sy & Oribasii: Papauer cornutum Cordi in Diosc. & Hist. Dodon. gall. Lonic. H. Lugd. Tabern. & Camerarii: Papauer corniculatum Matth. Cast. Lobelin Adu. & Obs. p. 141. & Icon. Plant. p. 270. Cæsalp. & Lacunæ: Papauer corniculatum luteum Fuchl. Turn. & C. Bauhini: Papauer cornutū & corniculatum flore luteo Gesn. hort. & Monachorum, quibus & Papauer corniculatum flore croceo dicitur. Papauer vulgare corniculatē flauo flore vocat Clusius: Tragos Papauer siluestre corniculatum: Papauer luteum Catulus: Plinius Papaueris syluestris genus, Ceratit vocatum: Quidam Papauer siluestre, h.e. *μυκωρίς* *μυκωρίς*: Alii Papauer marinum, i.e. *μαράριον*, & Plinio teste, Glaucion & Paralium: nonnulli porro Fabulum marinum: alii Sisimacem Trago: olim Officinæ Memitham: Serapio verdè Alnucharam appellabat. Ger. gehornter Nagfamen/wilber gehornter Nagfamen/& geel: Magen: Belg. geelen huel: Itali Papauero cornuto: Galli Papau cornu: Hisp. Dormidera marina: Angli horne Poppie: Bohemi Nafingfo Rway.

Nisi verdè monuisset Dioscorides quosdam deceptos foliorum similitudine ex isto Papauere fieri Glaucium putasse, putassem & ego [inquit Lob.] è Papauerum hoc genere esse Glaucium, quod Plinius congener Rheadi seu citratico fecit, eorum fortè persuasus lectione, quos Dioscorides hallucinatos dixerat. Nec absurdè Verbalco nigro

nigro comparantur folia à Theoph. & Plinio, nam adulta nigriora redduntur, quæ initio candida sunt, vt Diosc. testatur.

Primâ, quâ feritur, Æstivæ, neque caulem, neque florem, neque fructum producit, sed tantum folia: quotannis regerminat: apud nos [Nürnberg] feritur in hortis: in calidioribus verò regionibus sponte in asperis maritimis exit: ac in multos annos durat, inquit Cordus. Observavi ego Montpelii sponte provenire prope Castelnov & Nemausum, ibidemque florere mensibus Aprilis, Maio & Junio. In hortis si feratur in Autumno, provenit Vere, floretque Junio & Julio, siliquas verò maturat Augusto. Idem etiam in variis Germaniæ & Italiæ locis idem observavi.

Par fuit vires ex Dioscoride, Plinio, Galeno & Theophrasto antè in genere recensuisse: siquidem & sequens Papaver cornutum à quibusdam pro veterum genuino Papavere obtrudatur. Calium autem & sicum esse vique ad tertium gradum, ex sapore & facultatibus fortè non ineptè colligitur. Siliquas huius nullo modo efsculentas esse Scaligerum habemus auctorem.

PAPAVER CORNICVLATVM PHOENICEUM, folio hirsuto..

Aliterum corniculati Papaveris genus caules ramosos priori pares habet, repandos in humum, teneros: folia minora, alcionibus laciniis incisa, hirsuta: flores multò minores quoque, colore punicante, vnguibz intentius rubentibus: corniculatæ siliquæ, longè præpilatæ semen claudunt nigrum: radix crassiuscula, oblonga.



Tragus huius meminit nomine Papaveris corniculati flore rubeo. Clusius describit & de pingit Papaveris corniculati (alterius in Hist. post. 1.) rubro flore inscriptione, atque hanc plantam minime croceo succo turgere, vt quidam falsò crediderint. Lobelius qui eandem cum

Clusio figuram habet, inscribit in Adu. itemque Obs. p. 141. & Ic. Plant. p. 271. Papaver cornutum flore phœniceo. Papaveris corniculati rubri titulo Dodon. de purg.

Gesn. hort. vocat Glaucium Papaveri corniculato similem, radice succo luteo prægnanti: In Append. Glaucium Basileense Theod. Zvingeri.

C. Bauh. phyt. Papaver. 12. siue corniculatum phœniceum hirsutum, varians colore floris, interdum intensè rubeo, interdum languido, nonnunquam pallido.

Matth. Papaver corniculatum alterum foliis Tom. III.

mundis asperis, atque minoribus, flore rubeo.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine misso, terræque mandato, floruit & siliquas produxit Augusto & Septembri, eodem quo satum anno, semine decido quotannis se propagans. In Moravia & Bohemia copiosum etiam observavit Matthiolus: in agro verò Salmanticensi & in Belgica Clusius. Qui etiam Papaver corniculatum Phœniceum folio glabro describit: pallidescit scilicet flore, & quod Lobelo Papaver corniculatum phœniceum alterum: Casp. Bauhino verò Papaver 13. siue corniculatum phœniceum glabrum dicitur: quodque à priori siue hirsuto non nisi senio differt, ætate enim flos languidior pallidiorque euadit, ac ramis & caulibus gravior redditur.

Locus & tempus.

PAPAVER CORNICVLATVM VIOLEACEUM.

Clusius sic describit: Papaveri corniculato cæruleo, siue violaceo flore, folia sunt multò minora, teneriora, valde minutum dissecta non candicantia, sed viridia: cauliculi tenelli, subhirsuti: flos superiote non minor, quatuor etiam foliis constans, coloris ex purpureo cærulei exsaturati, & nigra Violæ præne æmuli, fugax admodum, & qui laxissimè aurâ excutitur: huic succedunt cornicula digitali duntaxat longitudine prædita, plerumque etiam breviora, exilia, duriuscula, rigidioreque hirsuti prædita, in quibus continetur semen valde exile, coloris ex cineraceo nigricantis: radix tenuis est, & inutilis, nec supra annum spatium perdurat.

Describitur: Papaver corniculatum cæruleo siue violaceo flore. Clus.



Lobel. in Aduers. dicitur Narbonensis Anemone maior corniculata: sed perperam, vt in Obs. p. 141. fatetur, ideoque Papaver corniculatum violaceum cum Dodonæo inscribit. Florem etiam in Adu. minus benè expressum ait.

Castellani, authore Clusio, Rosetam vocant: nonnullis verò Amapolas Moradas, i.e. Papaver flore purpureo, à succi Mororum colore, dicitur. Idem testis est Montpelianus quondam inter Anemones genera retulisse.

Gesn. hort. est Papaver cornutum purpureo flore: Item Papaver corniculatum minus flore violaceo Morachorum, à Dodonæo exhibitum. An eidem, Glaucium floribus purpureis?

C. Bauh. phyt. Papaver 14. siue corniculatum violaceum, floribus cæruleis & nigra Violæ æmulum.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. ab aurora ad vesperam vique floruit, siliquasque Augusto & tempus, Va 2

Locus & tempus.

Septembri mense produxit. Inuenitur, inquit Clusius, multis Hispaniæ locis, sed non nisi inter segetes: Maio mense floret: Apud Belgas satum, multo fertius. Meminit etiam olim Clusius colligere agro Narbonensi in agris aeuena consitis.

PAPAUER SPVMEVM IN GENERE.

CAP. IX.

Pap. Hera-
clium

Heraclium vocari Papauer Theophrastus in Histor. testatus est. Ignoratur autem ab Herculene sic vocatum fuerit, an ex tam multis, quæ toto Orbe aliquando fuerunt vrbes, Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alii à candore & raritate spumæ, quas habet notas, spumeum nominauerunt.

Theoph.

Theophrasti historia de eo hæc est. Aliud verò Papauer Heraclium [*ἡρακλίου ἰσχυρὰ*] vocatur, folium habens Strutho [Lanariz Marcell.] quo linteæ dealbantur [quo splendorem linteis tribuunt, Cæsalp.] simile: radicem candidam [*λευκὴν*] omittit Cæsalp. in superficie terræ: fructum item candidum. Purgare per superna radix eius nata est: non desunt qui ad comitalem morbum eâ in aqua mullâ [vino mulso, Cæsalp.] vtuntur.

Vires

Dioscoridi Papauer spumeum [*ἡρακλίου ἀφρόδης*] caule est dodrantali, foliis admodum paruis, Struthio [*σπυρίδι*], Lanariz Marcell. Radicula Sarraç. vet. inferit [*πυρίδι*], similibus: fructum [*καρπὸν*]. Semen Sarraç. inter ea habens album, atque spumeum: ita vetus legit, [*ἀφρόδης*]. Sed & herbula tota candida est atque spumæ [his vet. caret] radice alba in summa terra nascente. Legitur Ætate fructus [semen Cæsalp.] cū integrè adoleuerit, andumque deciderit. Acetabuli mensura sumptum in aqua mullâ [*σὺν μέλιτι*] vomitione purgat, priuatimque huiusmodi purgatio comitialibus prodest.

Galen.

Papauer Herculeum, inquit Galenus, vocatur & Aphrodes, h. e. spumofum: eò quòd totum candidum est & spumofum: exile autem semen habet pituitam expurgans.

Plin.

Plinius, vbi libro 20. cap. 19. de Papauere Ce ratite loquutus fuit, sequentia de spumæ hoc tradit. Alterum ait, è siluestribus genus Heraclion vocatur, ab alius Aphron, foliis [si procul intuearis] speciem passerum præsentantibus, radice in summa terræ cute, semine spumæ. Ex hoc Lina splendorem trahunt Ætate. Tunditur in pila comitialibus morbis, acetabuli mensura in vino albo, vomitiones enim facit. Medicamento quod Diacodion & Arteriacæ, vocatur vtilissimum. Fit autem (ex) huius Papaueris aut cuiuscunque filia. capitibus centum, &c. Reliqua lege inter vires Opii.

Plin. ex
vtr. triplic

Gordus in Diosc. ait ignotam esse omnibu herbam, nec Plinium ipsi cognouisse, vt qui duplicem errorem commiserit: Primum quòd Struthon verterit passerem: Alterum verò quòd dixerit Papauere lina candorem trahere. Arteriacæque porro mox sequentis lectionem corruptam esse apud Plinium, Cornarius primò n, quòd sciam obseruauit: eumque locum ita legendum esse monuit, vt vox copulatiua (&) omitteretur, sicque restitueretur. Medicamento quod Diacodion & arteriacæ vocatur.

Æquiuoca

Genesius in suis annotationibus Been album siluestre Papauer spumeum esse suspicatur. In-

ANEMONE IN GENERE.

CAP. X.

Anemones genera duo fecit Dioscorides, vnum siluestre alterum satiuum: Huius rursum plures agnouit species. Ant. &c. [*ἀνέμων*] m]dum est generum, inquit, Siluestris quidem vna, satiuæ altera. Et in satiuæ quidem genere est quæ phœniceos flores habeat, altera quæ candidantes, aut lacteos, aut purpureos. Harum filia Cortiandro similia, sed proximè tertiam scilla tenuis, Cauliculi lanuginosi tenues, in quibus flores Papaueris, & in medio capitula nigra aut cærulea: radix longa Oliuæ magnitudine, aut maior, veluti geniculis distincta. At siluestris [hæc & sequentia vique ad vires vet. non legit] amplitudo prorsus maior, quàm satiuæ, foliisque ciliatioribus ac durioribus: capite oblongiore, flore phœniceo. tenuibus ac pluribus radiculis. Est & quædam foliis nigris, quæ quidem acrior est. Vis vtiuisque: acris: quæ de causa ipsius radicis succus naribus insusus valet ad purgandum caput. Commanducata verò radix, pituitam trahit. Decocta autem in passlo & ximposita, medetur oculorum inflammationibus: sed & cicatrices eorundem ac hebetudines emendat, sordidaque vlcera expurgat. Cæterum, folia & caules, si cum pusilla decoquantur, & in cibo sumantur lactis fecunditatem præstant: subdita autem in pello menstrua ciunt. Illa quoque lepras eximunt. Sunt [vetus quidam putat hæc ad finem vsque illegitimè ascripta, & expositionem quandam esse] qui nescientes ab Anemone siluestri distinguere Argemonem dictam, & Papauer rhœas, propter florum in puniceo colore conuenientiam, Euphorum errore ducti Argemoniam appellant. Veruntamen tum Argemone, tum & Rhœas minis saturato puriceo colore videntur, & vtræque feris floret. Quin etiam Argemone croceum, gustuque admodum acrem liquorè reddat: Rhœas verò candidiorè & acrem. Insup. vtrique intermedia sunt capitula stylacistris Papaueris similia, nisi quod Argemones quidem capitulum supernè latiusculum est, Rhœadis autem aliquantò angustius. At Anemones genera neque capitula, calceæ, sed velut Alparagi cacumen. Denique & in aruis cultis illa plerumque nascuntur.

Anemone vti qui agreste Papauer appellent non minus tamen spurio nomine, quàm qui nigrum Papauer, qui à colore Phœniceida, qui à vento Anemion, qui Meconion i. e. Papauer culum, qui Tragocerota, qui Gosparimen, qui Barbica vocant. Osthanes Benlion, Pythagoras Atractylida, Magi grestem Cnicum, Aphri Cusfit, Romani Oratunicam dicunt.

Anemones Dioscoridi sunt dicta ἀνέμων ἀνέμων ἀνέμων ἀνέμων, autore Plinio lib. 21. cap. 23. Duo, inquit is, eius genera. Syluestris prima, Altera in cultis nascens, vtræque sabulosis. Huiusque plures species: Aut enim phœniceum florè habet, quæ & copiosissima est, aut purpureum, aut lacteam. &c. Profunt Anemonæ capitis doloribus, & inflammationi-

mationibus, vuluis mulierum, lacti quoque. Et menstrua crient cum pituita sumpta, ac vellere apposita. Radix commanducata pituitam trahit, dentes sanat: decocta oculorum epiphoras & cicatrices: phoenicea radix contita expurgandis vlcibus adhibetur. Magi multam quiddam his tribuere, quamprimum aspiciantur eo anno tolli iubentes, dicique colligi eas tertianis & quartanis remedio.

Galenus testatur omnes Anemonas acrem, exterforiam, attrahentem, ac aperientem uim habere, indeque radicem commanducatam pituitam prouocare, & succum ex naribus purgare, & cicatrices in oculis attenuare. Sordida etiam vlcera Anemonas purgare, & lepras remouere, appositaeque menses prouocare, & lac attrahere.

Ouidius Adonidis florem describens Anemonem videtur adumbare lib. 10. Metamorph. ubi hæc.

Sic fat a crnore

Nectare odorato sparsit, qui ractis ab illo
Innumis sicut fuluo perlucida calo
Surgere bulla solet: nec plena longior hora
Falsa mora est, cum flos de sanguine concolor
ortus &c.

Bion Smyrneus Poeta vetus in Adonidis epitaphio. Anemonem ait natam ex lachrymis Veneris Adonidem desinentis.

Coronariam autem plantam apud veteres fuisse ex Athenzi Dipnosoph. Hist. lib. 15. apparet. Nicander enim lib. 1. Georg. flores coronarios apud eum recensens, Anemonidis meminit, his verbis.

Et Anemonides fulgentes ipse, antea quam con-
trellentur.

Et Cratinus in Effeminatis, apud eundem,

Chamamelis omni generis ornatur michi caput,
Liliis, Rosis, Liris, Cossusandalis, Violis, Si-
ymbriis,

Anemonarum vernis calicibus, Serpillo, Croco,
Hyacintho.

Quin & Theocritus in bucolicis de lachrymis Veneris Adonidem lugentis produisse finxit, eique Epitaphium hoc dicauit:

Quotque crnoris agit guttas hic casus Adonis
Tot Venus effundit lachrymas, qua singula flo-
res
Cessite demittunt: lachryma pariunt Anemo-
nem:

Sed crnor ille Rosam creat.

Nicander contra Anemonem ex Adonidis cruore hatam prodit.

Vagum itaque communeque multis & plantis & floribus Anemonas fuit quondam nomen ac bifariam ab Antiquioribus diuidebatur totum hoc genus, in coronarias sc. & medicas Anemonas. Dictaque nonnullis Anemone Limonia: aliis Othona: aliis sed perperam, Papauer rubrum: aliis Orcutunica: aliis Phanion: aliis Freminium, aliis Anemolialis Adraetilis: aliis Anemochorta.

Germani vocant Anemone Roselin & Windt Roslin: Belgæ Anemone Roffens Ruellio sc. ste, Galli Coquelourdes, Coeles, & Pisse fleurs appellent. Scit autem etiam Clusius postrema duo nomina Papauer erratico nonnullis Gallie locis tribui. Idem Coquelourdes vocem Pusatilla, quæ siluestris Anemonas genus est conuenire suspicatur. Non desunt tamen, qui simili appellatione Pseudonarcissum pallido flore donent. Italis Anemone dicitur, Hispania vieno: Boh. Mägg polsty: Hung. Anemone siluestris Bekerchen/ Tom. III

Seyer veragiu/ Biselitti fui.

Omnia porro Anemonidum genera, singulares caules, interdum duos, aut tres vel etiam plures, prout magnæ & amplæ vel vetuitæ sunt radices, proferre solent, & nullis ramis præditos: non candidè igitur agunt, qui eas multifido & ramofo caule expressas præponunt. Non tamen inficias ibit Clusius, quin interdum naturæ luxuriantis lusu cõtingere possit, vt vnus ramulus, interdum & alter, inter superna illa folia summum caulem amplectentia enascatur, vt aliquoties obseruauit. Flos tandem Anemonas, vt est pulcherrimus, sic leui ventorum imperu, aut Solis calore languescit & decidit, eiusque semen pariter facile in pappos abit.

Omnia porro Neoteritorum specificis differentis, Anemonas nobis cognitas tempestiuum est vt oratione prosequamur.

ANEMONE TRAGI HORTENSIS.

CAP. XI.

EX radice recta, laui, & digitum minimum crassa, caulem habet teretem, & instar Been albi [vt vulgò vocant] geniculatum, foliis herbaceis coloris, usque plurius dissectis, instar Chamomilla vulgaris seu Cotula, ad fastigium usque, quod flore rutilo, & quasi aureo, formam Argemonem planè referente, vestitum.

In horto quodam fortè fortuna repertam vidit Tragus, qui Anemonem inscribit, & Anemonas genus esse existimat, quod à Dioscoride describitur. Turnero tamen non videtur Anemone Dioscoridis, sed Papaueris erratici species.

Tabern. est Argemone tertia: C. Bauh. phyt. Synon. Adonis i. siue hortensis, & [vt etiam H. Lugd. p. 844.] Anemone hortensis Tragi: Apud Matth. Anemonem alteram vocat & Anemonem 5. Matthioli in edit. secunda, in aliis verò editionibus Anemonem hortensem Tragi.

ANEMONE LATIFOLIA FLORE FLAVO, i. Clusii.

CAP. XII.



Statis amplis Defec.
foliis circi-
natæ ferè ro-
tunditatis, per
ambitum ter-
ratis, duris &
firmis, longó-
que pediculo
sulis, supernè
intensius virè-
tibus, infernè
verò plerum-
que purpural-
centibus, vt
Cyclaminis flo-
re odorato fo-
lia propemo-
dum, teruidis-
simi gustus: ru-
berolâ, & ob-
longiuscula,
Tormentilla

vulgaris æmula, sibi aliquot dependentibus, foris nigra, intus alba, solida, ingrati admodum saporis, quæque nauseam mouens quodammodo strangulet, deinde linguam aliquantulum vellicet.

Synon.

H. Lugd. p. 846. dicitur *Anemone latifolia* prima Clusii: Et sic in Obs. p. 147. & Ic. Plant. p. 279. In Lobelii vero Obs. figura est transposita. Gerardo & Tabern. in Icon. *Anemone latifolia* Clusii: Eidem Hist. *Anemone* 8. latifolia siue Lusitanica, Portugalesch *Anemone* Rôglin: Angl. *Brande* Casfed winde flower. C. Bauh. phyt. *Anemone* 16. siue latifolia foliis serratis.

Iocus & Tempus

Lapidosis quibuldam Lusitaniz collibus iuxta Tagum, atque etiam inter vepres eruebat Decembri anno 1564. Clusius, & in sequente Ianuario, qualis in Hisp. expressa est, & nos depinximus, nullum enim florem tum temporis ipsi obseruare licuit. Sed multos deinde post annos semine è Lusitania delato, similem apud Hollandos natam monebat Ioannes Moutonius, siccumque cum caule & foliis florem è Bataua acceptum communicabat Clusio, qualem in Hist. post. exprimi curauit.

Is autem plurimas id genus alias proponit & describit, quas breuitati studentes, hic tantum notabimus, amplio rem delineatione ex eiusdem Clusii Huiusmodi petendam relinquentes.

Anemone latifolia duplo flore flauo, 2. Clusii.

Tempus.



Hæc Clusio serius aliis *Anemones* generibus & germinabat & florebat, semen verò Iunio maturabat.

Anemone Italica latiusculis spinosis foliis, 3. Clusii.

Clusius in Hisp. describit pro *Anemone latifolia* altera, foliis inferiore parte nonnihil purpurascentibus, flore dilato rubore purpureo. In Hist. post. pro *Anemone hortensi latifolia* 3. simplici flore, eamque Herbariorum vulgus apud Belgas *Anemonem stellatam* siue stelligeram nunc cognominare scribit, miraturque nonnullos pro *Geranio* primo reponere non veritos.

Synon.

Dodon. de Florib. in Epilogo, & Hist. in fol. lat. vocat *Anemonem primam*: Camer. ad Hist. Math. germ. & Epit. *Anemonem secundam*:



C. Bauh. phyt. *Anem.* 10. siue *Ranunculi rotundo folio purpurascens.* Lobel. in Icon. Plant. p. 279. inscribit rad. *Anemonem tuberosam.* Bulbocastani radice: Et sic etiam in Obs. p. 247. vbi florem dilata purpurâ rubere, nonnunquam candicere, ait: quæritque an sit *Anemone lutea* Gallorum. Sed

typographico errore mutata figura, quæ proin occasio suspicandi Luteam Galeni. Non video hanc ferre luteum florem, nec vllus, quod sciam, affirmavit. Ad Aduersariorum paginam 114. hanc curreferat Lobel. in Obs. nondum percipio. Si quidem huius *Anemones* nulla fit mentio in Aduers. Negligentiz ergo accusandus quod eo loci non descripserit. Præterea in Aduers. de germanica in Obs. de exotica scribit.

Tabern. dicitur in Iconib. *Anemone stellata purpurea*, & alba, Stern winde Rôglin: In Hist. *Anemone* tertia: Item Ic. *Anemone papaueracea*, Non winde Rôglin: Hist. *Anemone* 12. flore purpureo, sex foliis magnitudinis *Papaueris* filii conspicuo. *Dua figura* planè similes sub diuersis titulis: descriptio præterea 12. non respondet iconi: quam verò intelligat, diuinare haud possumus.

Gerardo *Anemone* 5. Bulbocastani radice, Ches stur winde flower: Item, *Anemone* 10. papaueracea, Poppe winde flower. Eisdem cum Tabern. icones ponit: sed descriptiones alias.

H. Lugd. *Anemones* 1. Dodonæi p. 845. Flos cum superiorib. foliis infra p. 1036. rursus pingitur *Ranunculi purpurei* nomine. Sed eadem repetitur p. 1175. sub *Geranio* 1. quorundam Dalachampii: ac sic vnius plantæ tres icones.

Obseruavi florentem Aprili & Maio in hortis Patauinis, Veronenfibus, & Bononiz, vbi etiam in montibus copiosè habetur. Eam quibuldam Germaniz locis secundum Rhenum, inter Moguntiam & Andernacum inter vepres in aprico florentem Martio conspiciebat Clusius.

Anemone latifolia, ex purpura diluore albicante flore, 4. Clusii.

Clusius in Hisp. *Anemonem latifoliam* alteram inscripsit, eique præcedentis effigiem apposuit: In H. post. iconem illam priuauit, vocauitque *Anemonem hort. latifol.* 4. simplici flore: eam autem paulò serius priore florere tradit.

Anemone latifolia flore ad carneum colorem tendente, albicantibus vnguib. 5. Clusii.

Clusius in Pannon. ni fallimur, est *Anemone latifolia* Byzantina carneo flore: In Hist. post. *Anem.*

Anem. hort. latifol. 5. simplici flore : C. Bauh. phyt. Anemone 14. Eam autem folia ante hycinē proferre tradit idem Clusius.

Anemone latifolia purpurei ferē coloris
Vnguibus albicantibus, Byzantina,
6. Clusii.



A Nemones latifoliae simplici carneo flore genus hoc, Anemone sc. hortensem latifol. 6. simplici flore, habuit generosa Domina de Heusenstain Byzantio allatam, quae Aprilis & Maio anni 1584. ipsi, referente Clusio, primum flores protulit : foliorum formā, colore, radice, à superiore parum differens.

Anemone colore saturatius ex purpureo rubens, oris coccineis, vnguibus albis, magnis, Byzantina, 7. Clusii.

Hoc Anem. genus etiam habuit Clus. Constantinopoli emptum Anno 1587, quod inde Francofurtum ad Moenum delatum florem tulit cum reliquis Anemonibus generibus sub Maii initium. Eius autem duas varietates à se observatas tradit & describit.

Anemone latifol. flore coloris purpurei saturi, vnguibus magnis, albis, infima parte purpureis : 8. Clusii.

Inter latifolias, quae purpureum florem habent imittebat ad Clusium N. V. Ioh. Boissot genus quoddam, ipsi semine natum, cuius flos ipso referente elegans esset, sed Clusio biennio dantat post florem dedit. Florebat cum aliis Anemonum generibus extremo Aprilis & Maio.

Anemone latifol. flore ex purpurea violaceo, ad umbilicum albicante orbe, 9. Clusii.

Florebat Anemone haec hortensis latifol. 9. simplici flore, Clusio auctore cum aliis Aprilis.

Anemone latifol. violacea, maculis albis notata : 10. Clusii.

Decimum hoc Anemones latifoliae genus à Clusio observatum, licet tota quodammodo facie nouo simile esset, & floris folia coloris essent etiam violacei : internā tamen parte notis quibusdam erant discreta, nam albis maculis erant insignita. Et certe initio Anemonem hanc hort. latifol. 10. simplici flore, vitium aliquod contraxisse existimabat Clusius, cuius causā maculae illae in flore apparerent. Sed quum radicem in-

corruptam offendisset, & sequente anno flores similibus maculis notati conspicerentur, diuersum genus esse recte censuit.

Anemone latifol. flore violaceo, vnguibus magnis, candidis Byzantina : 11. Clusii.

Flores violaceos paullo saturatioris coloris, 11. Defect. habebat genus, non cedens elegantia ei, cuius vngues maiores magisque candidi erant, propius quodammodo ad octauum generis flores accedentes. Illud Constantinopoli allatum Clusioque ab Illustris Viri Davidis Vagnad vxore communicatum. Anemonem hort. latifoliam 11. simplici flore appellauit.

Anemone latifol. violacea, vnguibus argenteis 12. Clusii.

A Nemonidi huic, inquit Clusius, hortensi latifol. 12. simplici flore, non valde dissimilis erat ea, quae semine nata Porreto, primum florem tulit anno 1600. Hae florebat Maii initio.

Anemone latifol. flore ampliore, duodenis foliis, violaceo-purpureis, vnguibus albis : 13. Clusii.

A nemone hort. latifol. 13. simplici flore, Clusius Porreto semine natam esse dicit ac florere Maio. C. Bauh. phyt. est Anemone 11. siue violacea rotundo folio. An potius sit Anemone latifol. flore simplici violaceo magno Camerarii hort. dubitamus, licet Frater id allerat.

Anemone latifol. flore veluti carneo, vnguibus albis : 14. Clusii.

Iam dictis Anemonibus, adicit Clusius eas latifolias, quae flores quidem purpureo colore praditos habent, sed multo dilutioris & veluti carneo. Omnes autem, radicis & foliorum formā, non sunt dissimiles superioribus, praesertim tertiarum : caules etiam habent teretes, & breui lanugine obritos, atque ex viridi purpurascens, vt illius, ad quorum fastigium nascuntur vncialis longitudinis folia, quorum vnum, vt plurimum, paucis laciniis sectum, inter quae exilit triuncialis pediculus, ex viridi etiam purpurascens, sustinens florem octo plerumque foliis constantem, quorum externa pars non nihil purpurascit, interna coloris est ferē carnei, eiusque vel saturatoris, vel dilutioris, vnguibus item vel amplioribus, vel minoribus, omnium tamen albis, & capitellū medium obtinentibus nigrum & villosū, quod ambiunt multa albicantia stamina apicibus caeruleis praedita. Flores autem sunt vel maiores, vel minores pro terrae ratione & vbertate.

Florent omnes eodem tempore, quo superiores, aut interdum paullo feritils, pro loci, in quo repositae, situ. Quaedam florem habent nonnihil odoratum, aliae minime. Haec Clusius, quibus particulariter Anemonem hortensem latifol. 14. flore simplici delineauit.

Anemone latifol. colore Orengens dicto : 15. Clusii.

A nemonem hort. latifol. 15. simplici flore habuit inquit Clusius munere Io. Boissot. Aliud eius genus etiam imittebat, 16. descriptum.

Tempus

per omnia minus, eam foliis, tum caulibus, & flore, cuius color licet ferè idem, mihi tamen paulò dilutior videtur, in vitroque tamen nulla odoris gratia. Floret utrumque genus cum superioribus: & pro soli, in quo reposita, vbertate, ampliores, vel minores flores proferunt. Non dubium est, quin plantæ earum semine nate, etiam interdum variant, & flores proferant, vel saturatioris, vel dilutioris coloris.

Anemone latifol. flore coccineo: itemque unguibus: 16. Clusii.

Dilectus



mo coccineo internâ parte nitens, similes etiam ungues pallecente orbe illos ambiente, externâ autem quâdam lanugine pubescens: medium florem occupabat capitellum villosum cinctum staminibus purpureis, quorum apices nigricant.

Anemone latifol. coccinea sine unguibus Byzantina: 17. Clusii.

Locus:

Tempus



riori erat, foliis paulò tamen rudioribus, &c.

Anemone latifol. ex coccineo phœnicei coloris, unguibus parvis, subpallidis: 18. Clusii.

Anno 1600. observabam, inquit Clusius, apud N. V.A. vander Duyn elegantem hanc

Anemone hort. latifol. 18. simplici flore. Flo-



rebat duntaxat

Maio, quia is annus valde serotinus fuit, propter præcedentem asperitatem Hiemem qualis totis 35. annis non fuerat conspecta.

Clus. in Pan- non. p. 394. vocat Anemone latifoliam Byzantinam coccineo flore: C. Bauh. phyt. Anemone 13.

ANEMONE LATIFOL. FLORE PLENO
variegato.
CAP. XII



Nihil in hac Anemone flore speciosius, qui Rosæ magnæ par, densissima foliorum sætura, Pæoniz ferè modo luxuriat, foliis oblongis, acutis, tubentibus striatis: exterioribus verd quadruplò, quintuplòve lationibus, rubro, viridique confusis, variegatis.

Clus. in stirp. Hispanicarum Synon.

appendice Anemones latifoliz flore multiplici titulo pingit & describit p. 523. Lobel. in Obs. p. 146. Ic. Pl. p. 278. dicitur Anemone maxima polyanthos Chalcedonica. Figura, ut Clusio, duplex: vna radice, altera floribus. Malè apud H. Lugd. p. 847. in Anemones latifoliz flore multiplici Clusii figura, flos adaptatur radici.

Tabern. in Icon. est Anemone Chalcedonica maior: In Hist. Anemone 7. Chalcedonica: Camer. hort. Anem. latifol. flore pleno rubro elegantissimo: C. Bauh. phyt. Anemone 15. sine rotundifol. maxima: Gerardo, Anem. max. Chalc. polyanthos, The great Double Winde flower of Bithinia. Germanis Anemone Kößlin Von Constantinopel. Constantinopoli allata fuit. Aprilis vel paulò etiam feridis florem expandit. Flos in Germania rarissimè ad frugem pervenit, frequenter enim, antequam se explicet, vitium contrahit. Certè licet multis annis aluerit Clusius, ultra ternos aut quaternos eius flores explica-

explicatos videre non meminit: Cassellis autem in horto Ill. Poite. Hassie Landgravi, maximum & affice ussi nam protulerat. Nobis Venetis attulit Cherlerus, ac Argentine ostendit Meierus.

ANEMONE LATIFOL. PLENO FLORE,
coccineo, sine Pau. maior 1. & 2. Clusii.

CAP. XIII.



Nomine Ranunculi Constantino-politani gener Cherlerus secum ex Italiae Patavio ab Ill. Pinello, nobili Genuens accepit, attulit pulcherrimum rarissimumque Anemones genus. Ramis e-rar dodrantalis, vnico folio circa medium donatus, quod sine pediculo caulem amplectebatur, circumscriptione ferè circinata

diuisurâ profundâ & crebrâ superiorum quorundam foliorum Ranunculi auricom: supra quod ramus nudus paulatim attenuatur, summo fastigio florem gestans Anemones multiplex flori parem, secundâ foliorum festurâ luxuriantem, vt nullus planè compareat umbilicus, saturatâ purpura tinctum: extrema cuius folia vacuâ longiora, semunciatâ latiora, obtusa, venosa, interiorum alia dimidium, alia ne quadrantem quidem eius magnitudinis attingunt. Est hic flos, ni fallor, idem cum Clusii Anemone hortensi latifolia 2. pleno flore, vt & cum eiusdem Anemone hortensi latif. Pauone maiore 1. atque etiam cum eiusdem Anemone hortensi latif. Pauone maiore 2.

In Belgicis hortis inquit Clusius, Aprili vel paulò etiam seriùs florem expandunt. Earum etiam radices, perinde ac latifoliarum simplici flore, præsertim quæ crassæ & globosæ sunt, temporis diuturnitate plerumque cariosæ fiunt, & vitio deinde ad extremos nodos serpente, tandem penitus corrumpunt, nisi æternis ad minimâ annis, in fragmenta diuisæ, tellurique commissæ pangantur.

ANEMONE GERANIFOLIÂ.

CAP. XIV.

Multa habet folia nouo Vere, quum prodire incipiunt purpurea sententia, deinde ex viridi pallentia, multifida, Coriandri referentia, vel Limonis potius Anemonidis foliis similia, trigemina plerûq; simul pediculis cõnexa, hirsuta, & in tetram, vt Dioscorides rectè ait, inclinantia: inter quæ caulis exilit nudus quidem, sed quem terna foliola, trifariam profundius incisa, media parte amplectuntur, quæ aliquamdiu florem



occultat, donec Solis calore ex his sese explicas & emergens, expandatur in quatuordecim aut quindè foliola mucroata, minora quàm in latifoliarum generibus, coloris vel cernlei vel albi, vel utroque mixti h. e. ex ternâ parte subcerulei, internâ albi, staminulis albis, quorum apices pallidi, medium florè occupantibus:

decussis flore, apparet capirellum penè Ranunculi, conflatum ex seminibus eius seminibus: non tomentosum vt in latifolia Anemonide: radix digitalis plerumque longitudinis & crassitudinis, in aliquot ramos diuisa, & tuberculis obfita, fibras quasdam hic illic spargens, foris nigra, intus alba, quæ similiter fragmentis feri & pangi potest.

A Clusio nominatur in Hisp. Anemone tenuifolia 3. In Hist. post. Anem. hort. tenuifolia, simplici flore: A Dod. in sol. lat. Anemone 2. A Lobel. in Obs. p. 148. In Ic. Plant. p. 280. Anemone tuberosa geranifolia: A Tabern. Anemone Rupertiana. C. Bauh. phyt. Anem. 6. siue Geranii Rupertiani folio: Schvvenckf. Anem. Rupertiana flore nunc albo, modò czeruleo, Klein blaw. sechste windt roßlin. Gerardo Anemone Geranii folia, Storckes winde flower: H. Lugd. p. 845. Anem. 2. Dodonzi, tenuifolia 3. Clusii, siue Geranifolia Lobelii.

Hanc primùm ex Italia habuerunt Belgici hortis, in quibus Vere floret: semen Maio maturascit, aut paulò seriùs. Radicis fragmentis seritur ac pangitur.

ANEMONE ITALICA TENVIFOLIA

purpurea, foliis floris orbiculatis

CAP. XV.

Anemone Italica tenuifolia radicè nitebatur Defect: subrotunda, capillarium fibrarum non ex parte: foliis Coriandri foliis similibus, multum diuils, haud secus ferè quàm Apii hortensis, sed crebrius incisis, pediculis dodrantalibus appensis statim à radice orientibus, infirmo & tenui principio pediculi, crassiori in aduolitionibus: inter folia surrigebatur caulis tenuis, cubitalis, non nihil hirsutus, citra cuius fastigium, aliquot digitis sub flore erant folia sine pediculis caulem ambientia, minutim dissecta. Cauli iri fidebat flos vnus, magnus, purpureus, quinque foliis constans, latis, rotundis, in acumen desinentibus, exterius multum hirsutis: umbilicum floris occupabant apices multi.

An Anemone prima Matthioli? Camer. hort. de hac ait: Anemone tenuifolia flore purpureo frequens in Italia circa Romam & Neapolim atque in Hetruria. Hac tantum potest regio vt



gio, vt flores quarto anno pro purpureis, albos proferat. Apud Matth. in Epit. & Hist. germ. vocat Anemonem 4. foliis frequenter laciniatis, floribus purpureis, &c.

Montbelgardi in horto, ni fallor, Maio florbat, sed tunc eam depingere neglexi.

Camerarius author est, acrem esse plantam, eiusque succum naribus infusum

plurimum cerebrum expurgare.

Anemone tenuifolia species varia.

Eleganter pingit & graphicè describit Clusius tamen Hispan. tamen post. hist. plurimas Anemonas tenuifoliae species, quas breuitati studentes; vt in latifoliis factū, hic tantū notabimus, pleniorē earum historiam ex ipsius Clusii scriptis petendam relinquentes, additis tamen præcipuarum nonnullarum iconibus. Considerandę igitur veniunt præter iam descriptas Anemonas.

I. Anemone tenuifolia purpurea, foliis floribus in acutū desinentibus 2. Clusii: cuius hic traditur icon.

II. Anemone tenuifolia coccinea, vnguibus ex pallido fulco & albo coloribus mixtis: tenuifolia 3. Clusii.

III. Anemone tenuifolia coccinea, vnguibus 'albis': 4. Clusii.

Florem sustinebat amplum [præter istius generis Anemonidum mo-

rem] foliis constantem coloris interiore platte coccinei elegantissimi, vnguibus albis, exteriore quidem etiam coccineis, sed tenui lanugine pubescentibus & splendentibus: umbilicum occupante villosa nigricante capite, multis staminibus cincto, quorum apices ex nigro purpureascebant.

IV. Anemone tenuifolia flore magno coccineo, vnguibus albis orbiculatis: 5. Clusii: cuius icon in hac pagina tertio loca postea est.

V. Anemone tenuifolia flore amplo [foliis florū in cuspidem ferè desinentibus] sanguineo, vnguibus albis magnis: 6. Clusii: cuius hic traditur icon.



VI. Anemone tenuifolia flore minore coccineo vnguibus exalbidis, purpureis venis distinctis: 7. Clusii.

VII. Anemone tenuifolia coloris sanguinei coccineo permixti, vnguibus eiusdem ferè coloris: 8. Clusii.

VIII. Anemone tenuifolia flore pluribus foliis constante carnei quasi coloris, 9. Clusii.



IX. Anemone tenuifolia duplex: Vna ex albidore virescens, vnguibus albis: Altera prorsus ferè alba, vnguibus & venis ex albo paululūm virescentibus, 10. & 11. Clusii.

Clusius in Pann. p. 395. priorem tradit sub Anemonidis tenuifoliae carnei flore nomine, siue Byzantinæ secundæ.

Et hæc est quam Anemonidis hort. tenuifoliae 11. simplici flore titulo describit.

C. Bauh. phyt. vocat Anemonem 4. siue angustifolia



X. Anemone tenuifolia candida, exceptis vnguibus, externâ parte nonnihil virecentibus, 12. Clusii

XI. Anemone tenuifol. prorsus niuea præter vngues, in quibus aliquid carnei coloris, 13. Clusii.



XII. Anemone tenuifolia exalbida, venis carnei coloris, 14. Clusii.

XIII. Anemone tenuifolia præcedenti candidior, 15. Clusii.

XIV. Anemone sanguinea, vnguibus venis albicanibus distinctis, foliis floribus orbiculato mucrone, 16. Clusii.

XV. Anemone tenuifolia Kermesina, 17. Clusii.

XVI. Anemone tenuifolia coloris coccinei valde diluti, vnguibus amplis & albis, 18. Clusii.

XVII. Anemone tenuifol. cochinnilla, vnguibus magnis albis, foliis florum extrema parte orbiculatis, 19. Clusii.

XVIII. Anemone tenuifol. sanguinea albicantibus vnguibus, 20. Clusii.

Et illæ sunt Clusio Anemonidis tenuifoliae florem simplici foliorum serie gerentis species: qui non dubitant quin plures alix aliis fortè innotuerint: confidens etiam quotidie deinceps plures exorituræ, vel foliorum numero, vel aliis notis flores discretos habituras.

Tom. III

stifoliam tertiam.

An est Tabern. in Hist. Anemone 11. siue rapacea propter radicem, flore ex purpureo albicante.



XIX. Anemone tenuifolia, flore polyphylo coccineo.

ANEMONE FOLIO ACONITI, RADICE

Rapunculi, flore ex purpura albicante: Et Altera folio Coriandri, radice Oliuæ flore purpureo.

Tabern.

CAP. XVI

Radice prior est longa, Rapunculi, crassitudine mediocrius digiti, fibris donata pluribus, odoris actis: foliis profundè dissectis, instar Aconiti: caule spithameo, & longiori, crassiusculo, tomentoso, canaliculato, recto, intus cano: flore ex purpura albicante.

Alterâ radicem habet Oliuæ, rotundam, odoris actis & vehementis: folia Coriandri, profundius tamen & magis incisa: caulem pilosum, tenue, canaliculatum: florem sex foliis constantem, purpureum, papaueraceum: capitulum in medio foliorum nigrum.

Ambæ [11. sc. siue rapacea, & 12. siue papaueracea] abundant Vascouiz montibus planis, Soli expositis.

An aliquis meminerit Anemonis radice Rapunculi nondum occurrat. Quæ verò sit Anemone papaueracea Non Windt Rôsslin foliis & flore magnitudine Papaueris nobis non satis constat. Icon sanè quæ pro hac proponitur à Tabern. non respondet descriptioni. Videtur autem nobis haud diuersa, ab eius Anemone, quam nominamus Italicam latiusculis foliis spinosis.

ANEMONE FOLIO MVLTIPlicATO,

hirsuto, flore quadrifolio, rubro, albo cæruleo.

CAP. XVII.

Habemus [inquit Anguill. ep. 12.] Anemonem Athenæ in montibus altis, foliis multifidis, & lanuginosis, cuius flos quatuor duntaxat foliis constat, Papaueris modo, aut ruber, aut albus, aut cæruleus. Reperitur in Italia, in siluis altorum montium supra Castellum in Maris dictum Piscina, & montibus Sclauoniæ, siue Illyriæ, & Moræ.

Clusio dicitur Anemone Anguillæ: C. Bauh. phyt. Anemone siue lanuginosa foliis

Xx 2

flore albo, rubro, ceruleo. Sed quæ sint hæc Anemones prænominati non explicant. Nec quis è genere Pulsatillæ eas esse contenderit. Habent enim Pulsatillæ plura quam quatuor in flore folia.

ANEMONE ANGVILLARÆ LVTEA,
quadrifolia, foliis multifidis.

*Anem. lutea
Galenii
Anguill.*

Refert idem Anguillara epist. II. in Apulia Anemonidis genus illud reperiri, quod Galen. lib. de comp. med. sec. loc. floris colore luteo esse scribit, atque illic notissimum esse, & à cæteris figura non differre, sed colore. An autem Anguillata de Pulsatilla lutea scribat considerandum. Dubium in eo consistit, quod non sit quadrifolia. Clusius dubitat an non sit latifolia Anemones gentis illud, quod secundo loco descripsit. Sed quomodo possit ea esse Anemone Anguillaræ, quæ quatuor tantum floris foliis constat, cum latifolia Clusii magno sit floris foliorum numero. C. Bauh. phyt. vocat Anemonem 12. siue luteam. Nec plura.

ANEMONE LVTEA RAVVOLFFII.

CAP. XVIII.

Locus

Sakaick

*Sakaick
affar.*

Commemoratur hæc cum aliis à Rauvvolfio Itinerarii sui part. I. cap. 9. Circa Halepum occurrunt aliquæ Anemones species, plurimum colorum, rubri, purpurei, lutei, &c. quas omnes communiter nomine *Sakaick* appellant, cognomine addites *Sakaick achmar, Sakaick alsar, Sakaick aserach*, i. e. Anemone rubra, lutea, purpurea. Luteam verò pingit parte 4. numero 14. titulo pulchre. At emones roseæ, floribus luteis, Anemones luteæ *Sakaick affar* Arabibus dicuntur.

H. Lugd. append. p. 26. Anemones genera *Arab. Sakaick*. C. Bauh. phyt. Anemone 17. siue varia peregrina, radice fibrosa.

ANEMONÆ MATTHIOLINÆ.

CAP. XIX.

*Anemoni-
des legiti-
ma Diosc.*

*Matth.
redarg.*

Legitimam utriusque generis Anemonem se legitime gloriatur Matthiolus in Diosc. in anni 1559. editione, idque in Ananienfi agro, quæ ut arbitratur, Dioscoridis descriptioni nihil prorsus reclamant. Postea verò Venetiis in horto Medicij Maphei à Mapheo conspexisse. Sed si collegit, cur non descripsit? cur præterea falsas exhibuit figuras, ad descriptionem factas, maleque intellectas. Appingit enim vascula, & calyces Papaueris, quorum non recordatur Dioscorides. Cur non monet suas icones non respondere visis plantis, si nouit? Si veras proposuit imagines in prioribus comm. cur in postremis eas mutauit, nec falsas fuisse priores admonuit?

*Anemi
genera 5.
Matth. in
comm. post.*

Anemones [inquit in comm. It. cum mag. fig. impressis anno 1568. & Lat. impressis anno 1583.] quinque genera obseruauit: Horum primum folio prouenit Cortiandro simili, sed frequentius incisuris, caulibus lanuginosis, tenuibus, striatis, in quibus tenuiora per intervalla sunt folia, flo-

ribus siluestris Papaueris magnitudine, senis circum distinctis foliis, purpureiscentibus, capitulo umbilico tenui emergente, nigro colore, nigrisque capillamentis stipato, petinde ac in Papauere. Radix illi Oleæ magnitudine, subrotunda fibrataque & lapore acri. Secundum foliis assurgit minoribus, & frequentius laciniatis, cynosconi Aconitii modo, caulibus alteri similibus, sed aliquantò crassioribus inanibus, & in rectum spectantibus, quibus flores insunt, dilutiore purpurâ nitelcentes, capitulo circūquaque comato: petinde. ac alterum. Radicem habet breuiem, Rapunculi ferè figura, fibris adnatis multis, ac etiam gustu. Tertium foliis crescit Ranunculo primo æmulis, caulibus tenuibus, sesquipalmari- bus: rotundis, in quorum cacumine flores excut albi, quinque tantum foliis distincti, Rosarum magnitudine, & nonnunquam tenui quadam purpurâ respersi, inferiore præsertim sede. Radicem habet fibratam ac tenuem: Nascuntur in collibus. Habentur quoque Anemonis, genera alia duo, foliis laciniatis, & floribus in altero purpureis, in altero aureis. Omnia genera Maio mense florent. Non desunt, qui credant Anemonem, & siluestre Papauer idem esse: sin minus, Tempus saltem eiusdem esse generis. Sed ii, meâ quidem sententiâ, falluntur, & prorsus aberrant à Diosc. proposito. Quandoquidem si hoc idem sensisset Dioscorides, alterum ab altero diuersis capitibus non distinguisset, neque, ut legitur in eius capitibus calce, differre Anemonem à siluestri Papauere tradidisset. Verum ut non diu nec multum in Matthioli erroribus retegendis laboremus, rem Camerario commitimus, qui apud Matth. in eius Hist. germ. dicit se coniectari haud posse, quænam sint Anemones à Matthiolo in suo herbario pictæ, quandoquidem de iis nullus scribat, nisi de tertia. Ipse etiam se ramosam vidisse negat, & alias descriptionibus Matthioli respondentes effigies habere affirmat quas tradit.

Tabern. in Icon. Anemones ramosæ purpureæ; Et, Anemones ramosæ luteæ titulo, ambas Matthioli fictas imagines habet, & eum imitatus cudit descriptiones. In Hist. Anemonem 13. & 14. inscripsit.

Matthiolum autem in commentar. prioribus duo proposuisse Anemones genera, quæ nec in Germania, neque Anglia, nec etiam in Italia proueniunt, testis est Turnerus, qui nunquam illa videre meminit.

A partibus verò Anemonarum Matthioli stat Frater C. Bauh. Matthiolus, inquit, quinque proposuit Anemones, cuius figuras mutare non volo.

H. Lugd. p. 842. & sequentibus Anemones Matthioli quinque proponit, nec quales sint, indicat. Anemones autem secundæ Matthioli in titulo pingit Ranunculum flore globoso, ut fusi- lius hoc titulo dicemus,

ANEMONE RANUNCULI FACIE LVTEA.

CAP. XX.

Foliis prouenit Ranunculi ferè, sed tenaciori- bus, floribus aureis, radice parue Fabæ magnitudine, inquit Camerar. qui in Epit. & Hist. Matth. germ. Anemonem quintam inscribit. Sed in Epitomes eadem tabella pinguntur icones duarum plantarum: in utraque autem est radix maior



maior Fabæ 7.
Quæ potè sub
numero 1. pro-
ponitur, est
quæ hoc capite
describitur.
Quæ verò nu-
mero 2. nota-
tur, ea accede-
re videtur ad
Ranunculum,
cui flos in me-
dio folio. In H.
germ. nudam
proponit opo-
nem sine de-
scriptione.



capita inter-
dum dimidiata,
perius ex reli-
quis marcido-
rum foliorum
comata, sapore
nonnihil acri-
orescente, &
tandem acrimo-
niam linguâ
vellicante.

Duas figu-
ras proponi-
mus, nò quod
sint duæ tantum
speciem sed
quod si quid
in vna requi-
ratur, ex alterâ
fortè supplea-
tur: ni factas

Defecti

Icones

PULSATILLA PURPUREA, CÆ.
rulaeum.

CAP. XXI.

Tenuia folia sic satis Pastinacæ sylvestris foliis
similia sunt, nisi ab his magnitudine vince-
rentur, tenui diuisurâ pilisque respondentia, ex
pediculo longiore, palmarum circiter, admodum
villosa & propter terram subrubente, appensa;
caulis teres, cauis, densâ lanugine obductus, do-
drantalibus, delapso flore pedalis & maior, nullis
vel ramis, vel foliis donatus, vniq; excepto fo-
lio, quod paullo infra florem nascitur, denso,
molliq; tomento comatum, circum circa labri



instar, aut ac-
tabuli profun-
diusculi cau-
lem augens, si-
bique inferio-
re parte con-
tinuum, quod
mox in laci-
nas numero-
sas tenuesque
sinditur: caulis
summo fasti-
gio flos sedet
vnicus, ma-
gnus, è sex fo-
liis acuminatis
compositus,
purpurea scens,
foris hirsutus,
intus glaber,
leuem sed luan-
tem odorem
aspirans: me-

dium obsidet ex oblongo rotundum capitulum
fibris apicibusque luteis cirrhatum: postquam
autem delapsus est flos, caulibus supra folium
supra dictum, quintuplo, aut altius excreuit,
proque flore succedit comosum capitulum fla-
minum holericeorum mollitie, argenteis plen-
dens: appenso vniq;que staminibus ob-
longo, tereti: delapsis potè caducis seminibus
vnâ cum staminibus appensis caput relinquitur
rotundum: radix crassa, longa, nigra, in plura

Tom. III.

emissus, meliorem dedissemus.

Tragus Herbam ventî intitulat, incognitam
que ait & quasi peregrinam: Mulierculas verò
Argentinenfes herbarias fûchen schell vocare,
vel fûschell, q. e. si interpretentis, Campanula vel
Nota culinæ, sine culinaria: Campanula vacceæ,
aut vaccaria. Videtur autem ipsi Ranunculi ge-
nus Sardonium, de quo Dioscorides lib. 2. scrip-
sit, quamvis non desint qui Oreoselinon esse
contendant.

Cordus in Hist. pro Decima Ranunculi specie
describit, ac leptophyllon & comatum cognom-
inari posse concedit.

Gesnerus hic figuram ex Trago posuit. Idem
de hort. vocat Pulsatillam vulgi Italorum, Cau-
dam vulpinam Amati, Ranunculi Dioscoridis
secundam speciem, Herbam Sardoam, & Helue-
tiorum Birsûrz, Item Anemone Aretii, flori-
bus caruleis, maioribus tamen, pallidioribus, &
& nonnullorum das wilden mans fraut.

Turnero pingitur the common Anemone ti-
tulo.

Dod. gall. inscripsit Herbam Sardoam & A-
pium risus, delineauitque pro Ranunculi auri-
comi (Ranunculi dulcis folio rotundo) specie
altera, floribus purpureis. Hanc incognitam
scribit, ac postea inter nomenclaturas ita appel-
landam censet: Herbam sc. Sardoam, Apium sil-
uestre, Apium rusticum, Apiastrum, & Apium
risus, vt quo nomine in aliquibus officinis co-
gnita sit, vt in aliis Pulsatillæ Gallicæ Passifleur,
Belgicæ Enckenselle: Sed aliter sentit Dodon.
in fol. lat. vbi Pulsatillam vocat. A nonnullis, in-
quit, Apium risus dicitur. Non est tamen Herba
Sardoæ, quæ propriè Apium risus videtur ap-
pellanda. Non est etiam Ranunculi, neque
etiam Anemones species: vtrisque tamen & pre-
sertim facultatibus accedit. Colore est plurimum
Violæ nigrae purpureo, quandoque candido, a-
liis luteo, rariis rubente. Belgæ in hortis habent:
apud Germanos satis frequens locis asperis &
lapidosis, & subinde in ipsis rupibus, & quidem
flore purpurei ex caruleo coloris: qui pro loco-
rum ratione aut intensior, aut remissior. In silvis
siquidem ac vmbrosis dilutiore colore quasi in-
albicat flos in apricis coloratior est. Albidi floris
Auerniæ & Narbonensis Gallia montes sup-
peditant: lutei Tamienses Allobrogum: rubri
floris ex Alep. Syria vbi habetur.

Herba
Genis
TragoRanunculi
Species
CordaPulsatilla
Italor.
Cauda
VulpisHerba sar-
doæ & A-
pium risus
Dod gall.Nec Apium
risus
nec Ra-
nunculus
etiam A-
nemone est

Xx 3

Pulsatilla
Gulig.
Lob.

Lobel. in Obs. p. 149. & in Ic. Plant. p. 281. vocatur Pulsatilla vulgaris. Qui Ritus Apium Diolecoridis autumant, rism potius quam responsum merentur.

Pulsat.
Matth.

A Matthiolo in Epit. & Hist. & germ. cum addit. Camerarii, ac etiam passim in comm. in Diof. Pulsatilla titulo pingitur, dicente: Fuchsius in libello imaginum Anemones purpureæ (sylvestris) loco, pingit herbam quæ plerisque Pulsatilla cognominatur, et si nullam habeat cum Anemone cognationem. Scribit Ruellius Anemonem in Gallia nasci, eamque esse, quam Herbam venti vocant Herbarii: sed me latet quid Ruellius per Herbam venti intelligere voluerit. Bohemi vocant Fonicflec, Saxones propter semen Bocksbart. i.e. Barbam hirci.

Pulsatilla
Gulig.
duo genera
Clus.

Pulsatilla vulgaris Clusius duo genera passim in Austria & vicinarum regionum locis editioribus & vento perfatis inueniuntur: vnum præcæsius crassiore folio, ampliore flore, quod ab Vngaris lo kevkevvrchin. i.e. equi kevkevvrchin, siue equina Pulsatilla: alterum, non adeo præcox, folio tenuius inciso, floræque minore, & purpurei coloris, adeo saturi, ut niger videatur, Vngaris Lean kevkevvrchin, h. e. virginis kevkevvrchin, siue virginea Pulsatilla, appellata. Is verò titulo Pulsatilla vulgaris dilutioris flore iconem habet à Lobelio propositam pro Pulsatilla vulgari: Et titulo Pulsatilla vulgaris saturioris flore, quæ Lobelio dicitur Pulsatilla flore clauso cæruleo.

Synon.

H. Lugd. p. 849. vocat Pulsatillam Matthioli. Tabern. in Ic. & H. flor. nominatur Pulsatilla 1. flore purpureo & cæruleo; item Cauda vulpis: Gerardus Pulsatillam vulgare vocat Purple passed flower: Schvvenckf. Pulsatillam purpureo flore, Thalius Anemones speciem Pulsatillam vocat: C. Bauh. phyt. Pulsatillam 1. siue vulgarem, foliis florum nonnunquam reflexis, colore ut plurimum Violæ nigre purpureo, & etiam obsoleto.

Locus & Tempus

Montepelii Martio mense floret in montibus ceu & Lugduni, vbi copiose prouenit. Frater C. B. circa Heluetiorum Badenses thermas purpuream collegit. Szpids in hortum transtuli, sed frustra. Copiose tandem circa Bonam in Germania nascitur, & circa Oxoniam in Anglia, ut Turnero Falconerus retulit.

Vires & Virus.

Ab Empiricis id compertum habet Brunfelsius, quod vulneraria sit herba. Quod folia non sine acore quodam secantur, ita ut oculos, quemadmodum Allium aut Cæpæ feriant. Quod illa per Alembicum distillata, aquam vulneribus mûdicandis curandisque præstent vtilissimam, quæ & putridam carnem erodat. Folia, caules, & flores [inquit Matth.] cum acerrimo sint gustu, excalfaciunt & siccant ordine quarto: incidunt: attenuant, attrahunt, digerunt, expurgant, & exulcerant. Radix verò cum subdulcis sit, non longè aberit à temperatis. Sunt qui eam maximè præferant, contra pestilentie contagia & pota venena, & virulentorum animalium ictus, si cum vino bibatur, drachmarum duarum pondere, quare in Antidotis additur. Aqua è foliis distillata, vulnera sanat, & pota sudorem prouocat. Trago Herba venti calida est & sicca, debetque magis externis quàm internis corporis partibus adhiberi. Commendatur ad calculos, gangrænam, putrida vulnera, vngues scaldos, papulas, mariscas, verrucas, & maculas. Radix siccata stentumenta ciet: cruda verò manu pituitam elicit.

Indorum
mones
quæ.

PVLSATILLA FLORE CLAVSO CÆ. Defect.

IN Pulsatilla flore cæruleo perpetuo clauso conspicuum differentiam vident copiam fecit Lobelio Coldenbergii hortus. Cæteroquin cum superiori re ipsa vna, nisi folio esset superuicenti.

Lobel. Obs. p. 150. dicitur Pulsatilla varietas. Ic. Synon. Plant. p. 283. Pulsatilla flore clauso. Dod. in fol. lat. Pulsatilla altera icon. H. Lugd. p. 850. Pulsatilla altera Dodonzi. Clus. in Hist. post. [vbi icon eadem quæ Lobelio, sed diuersa descriptio, quam antè tradimus] Pulsatilla saturioris flore. Tabern. Pulsatilla 5. siue cærulea minor. C. Bauh. phyt. Pulsatilla 4. siue foliis florum reflexis.

PVLSATILLA RVBRA.

Differt à vulgari non solum floris colore, sed Defect. etiam formâ foliorum, quæ tenuius diuisa: florum item foliis, quæ in priori acuta, in hac obtusa.

Hæc sine dubio est illa Pulsatilla rubra Obs. Synon. p. 149. Icon. Plant. p. 282. quam ex Alepo Syria vrbem se habuisse Pena & Lobelius referunt, quanque Clusio videre nunquam contigit.

Inscribitur hæc apud H. Lugd. p. 850. Pulsatilla rubra Lobelii. Tabern. in Icon. & Hist. itemque Gerardum, Pulsatilla 2. rubra. C. Bauh. phyt. Pulsatilla 2. siue flore rubro: apud Matth. Pulsatilla rubra.

PVLSATILLA ALBA.



Pulsatilla alba, foliis est multo amplioribus, quàm reliquarum villa, nec ita etiam minutim concisis, & ad Myrrhidis fil. foliorum diuisuram quodammodo accedentibus, & nonnihil hirsutis: caulem qui cubito longior nonnunquam, medium cingit consimilia quoque folia: cæterum, flos qui summo cauli hæret vnicus,

lacteo est candore, quem villosum capitulum cristatumque aliarum more consequitur: radix itidem crassa.

An hæc est Bened. Aretio in descr. montis Stockhornii apud Gesn. de hort. altera illa species Bismurgen flore albo, quam Ranunculum aliquem montanum aut Anemones speciem esse haud negauerit?

Gesnerus de hort. nominat Anemonem flore albo, quam gracè ἀνέμωνας dicendam præcipit. Item, Pulsatillam Italorum, Anemonem albo. In descr. montis Fracti, in lib. de Lunar. Anemonem alpinam,

alpinam, radice nigra &c.

Fortè Lobelii Pulsatilla alba pallens in Advers. non eadem est cum nostra, quam in Obs. p. 149. Icon. Plant. p. 281. Pulsatillam albam inscribit.

Tabern. in Ic. & Hist. habet Pulsatillam albam luteam, quam Leon Feitichin Hungaricè, h.e. Virginis Pulsatillam vocat. Habet & in Hist. Pulsatillam 4. flore albo prouidentem in montibus Lotharingiam separatibus ab Alsatia, potissimum inter Espinal & Fontenoi inter rupes, unde quoddam difficile enestatur, Pulsatillam petram, vocandam existimat.

Gerardo dicitur Pulsatilla flore albo white Passiflower : Schvenck. Puls. niuea alpina. Puls. petraea, Schneblumen Schneebenlin / & wild Mausfraß. C. Bauh. phyt. Pulsatilla 3. sue flore albo. Clus. in Pann. p. 482. Anemone silu. 2. montana Pulsatilla folio.

Genex mense Iulio in monte Thuri copiose floret. Crescit in uersoribus Etscher & Durrenstein Stuzia ingis, inter scopulos tonni & leui terrâ tectos: plerumque verò in ipsis scopulorum fissuris & commissuris adeo altè radices agit, vt summâ difficultate, & vix vnquam, nisi auallus terreo instrumento scopulorum fragmentis integras Clusio eruerè licuerit. Floret autem istic Iulio, interdum etiam duntaxat Augusto, pro aestatis maturis aut seridis incipientis natura, solutis videlicet niuib: nam è primis floribus est. Semen plerumque maturitatem acquirit sub extremum Augustum. Difficuler cicurari posse tradit idem Clusius.

PULSATILLA LUTEA.

Pulsatilla lutea palmaris erat planta, radice crassa, foliis caruleis modo diuisis, sed segmentis latioribus, valde hirsutis: caulis singularis, vnicum humo fastigio sustinens florem colore luteo præditum, foris hirsutum, intus glabrum, obfidente medium apicum magno numero.

Camerarius ait florem luteum subrubentem, & subsequi semen papposum barbaturque: figura autem quam proponit facta est ad plantam meam siccam Gesnero missam.

An Anemone siluestris tertia Clusii? An Gesn. hort. huius meminit, Anemones & Pulsatilla flore luteo nomine: Pulsatillam luteam vocat Camer. in Matthioli. Galle Bignoniæ, h.e. Radicem contra morsus venenatos luteam: in eiusdem verò hist. Gels. Fuchsenschel. i.e. Campanulam, siue Nolam culinariam luteam. Commemorat Pulsatillam luteam Lobel. in Adv. & Pulsatillam lutei floris Dodon. in fol. lat. Qui an nostram intelligant, ambigimus. Siquidem eam à vulgari colore tantum distinguunt. Pulsatillam luteam sibi è Pedemontio siccam missam ait Tabern. indeque Pulsatillam Pedemontiam cognominat.

Dalechampius apud H. Lugd. tria Pulsatilla genera luteo flore conspiciua produxit. vnde autem inscripsit p. 850. Pulsatillam 1. Alpinam Dalechampii, radice crassa nigra, exesa, foliis Apii modo dissectis, inter hæc tria genera latissimis, hispidis.

C. Bauh. phyt. vocat Pulsatillam 5. siue luteo flore: Pulsatillam autem Camerarii: Pulsatillam verò 6. siue luteam Apii folio, primam Dalechampii. Sed cur Dalechampii Pulsatillam lu-

team 7. separet à lutea Camerarii non vident.

Reperiit florentem Iulio in Rhegii monte Braulii, Gener Cherlerus sub finem Iunii in monte Gotthardi.

Locus & tempus

PULSATILLA LUTEA APPI HORTENSIS
folio 2 & 3. Dalech.

Pulsatilla 1. alpina Dalechampii siue lutea 2. genus apud H. Lugd. p. 851. radice est tenuiore, brevior, minus atra, foliis hortensi Apio limilibus, paulò latioribus, hirsutis, radicem ambiculis, multis in caule dodrantali, lanuginoso, mediâ sui parte villosa glomo pubescente equo prodit foris aurei pediculis.

Pulsat. 2. alpina Dalech. descr.

Pulsatilla 3. alpina Dalechampii, siue lutea tertium genus, radice est, quam in superioribus graciliore, folio Pastinacæ siluestris, apicibus in medio flore coacturatis luteis, quos in feminis conceptaculum tandem formatos spissa lanugo vestit. hæc tria genera, inquit, in monte Muræ, Allobrogum oppidulo vicino, reperiuntur.

Pulsat. 3. alpina Dalech. descr.

C. Bauh. phyt. vocat Pulsatillam 7. siue luteam Apii hortensis folio, Puls. 2. Alp. Dalechampii: Tertiam verò Puls. 8. siue luteam Pastinacæ silu. folio. Pulsatilla lutea secundum genus vidi apud Fratrem. Quod sit tertium nos latet. Icon nobis quidem inepta & falsa videtur: nec putamus reperiri Pulsatillam ramosam, nisi fortè monstrosum, qualem hactenus non vidimus.

ANEMONE MAGNA ALBA PLVRIMA
parte anni florens.

Radix minimi digiti est crassitie, plurimis fibris donata, multum se multiplicans, Hellebori nigri vulgaris modo, sapore subamaro: Caulis dodrantalis, tenuis, rigidus, densâ lanugine canescens, subinde circa summitatem rubescens, concauus: flos, in singulorum caulium summitate priusquam dehiscat, hirsutus, postea magnus, nonnihil odoratus, quinis, senis, septenis siue constans, cuspidè orbiculatâ, internâ parte pepitidis albis & glabris, externâ verò hirsutis, vnguibus purpureiscentibus: in medio, staminum croceorum corona ambit capitulum tuberosum, serè herbidum, quod maturo semine, paruo, plano, intus lanuginem albam resoluitur: folia Ranunculi serè, triplici diuisura profunda ad pediculi usque extremitatem, inferius hirsuta & albicantia, superne glabra, saturo virore tineta: que horum quidem alia incerto numero radix statim emittit, pediculis palmaribus & bipalmaribus: terna verò in caule pediculis vincta:

Deseri:



bipalmaribus: terna verò in caule pediculis vincta:

ibus, & sesquiuncialibus caulem amplectuntur.

Folia Clusio ingrati initio saporis, postea acris: Flos vnicus, rarissimè binis: Radix ingrati & acris saporis

An Cocles, Cocleourdes ou Coquelourdes blanches Ruellio?

Ranunculi
species
Cordo.

A Cordo in hist. describitur pro Ranunculi 2. specie. A Matthiolo verò exhibetur in post. comm. It. & Lat. cum mag. fig. & hist. germ. Anemones tertix nomine, licet pictor, etiam Clusio teste, iconem negligentius expresse. Pingitur à Dod. in fol. lat. pro Anemone Pannonica. A Lobel in Obs. p. 43. in Ic. Plant. p. 280. pro Anem. Matthioli flore albo. A Gerardo pro Anemone Matthioli. A Clusio in Pannon. p. 38. pro Anemone filu. Ranunculi folio prima: In hist. post. pro Anemone filu. prima. Ab hist. Lugd. p. 343. pro Anemone 3. Matthioli.

Camer. hort. dicitur Anemone filu. flore candido. Thilio Anemone fil. candido, amplo, foliofo, palmari, foliis hispida, latè expansis, varièque dissectis. Schvvenckf. Anemone maior alba, *Äpfelein*. Theophrasti, *weisse wind Rösslin*: Angl. *white wind flower*.

Tabern. in Ic. & hist. Anemone maior alba, vrgibus interdum veluti purpurascens. Gress. *weiss Inemone Rösslin*. Item, in hist. Anemone 15. Anem. filu. alba. Et, Anemone 16. folio flore purpureo à precedenti varians: Anem. filu. purpura.

Hort. Lus. Anemone siluestris flore grandi, foliis Ranunculi durioribus tamen, locis montanis inter Ericas proveniens. Item, Anem. 3. Matthioli, siluestris, Ranunculi folio, prima Clusio. Considerandum quæ sit illa Anemone grandi flore horti Lusitæ, an solo flore à Matthioli differat.

C. Bauh. phyt. Anemone 18. siue alba, radice fibrosa, Matth. Ic. 356. Anemone 3. Apud Matth. præterea, Anem. alpina Gelsneri in monte Fracto, Aconito cognata. Diximus nos Anemonem Gelsneri non posse esse eandem cum Matth. Anem. 3. Gelsneri enim Anemone lanuginem habet instar Vitis siluestris caulicæ, lanugo autem Anemones 3. Matthioli plurimum differt: melius in phyt. p. 317. ponitur pro Pulsatilla 3. flore albo. Planta tandem, quam Gelsn. hort. Aconito cognatam affirmat, videtur nobis Ranunculus montanus, albus, hirsutus.

C. B. aut.

Locus &
Tempus

Primo Vere, & Estate, ac etiam Autumno floret, multumque radice se propagat, culta quidem in horto Ill. E. C. spontanea verò ad Rhenum in Brisgouia inter Bücken & Offenbürg, ut etiam circa Heidelbergam, & in Bohemiæ collibus, ac copiosè quoque ad loca montana quatuor miliaribus à Norimbergæ, vicinisque Francofurti ad Mœnum pratis. Quin & Brockenbergi cacumini familiaris, Sed & vicinis vrbi Viennæ pratis, & plerisque Austriæ, Pannoniæ superioris & inferioris, tum inter amnis vltra Drauum flumen, montanis locis nascitur.

ANEMONE TRIFOLIA FLORE ALBO

CAP. XXII.

Defert:

Properat huc & alia quædam, tametsi foliis differens. Neque hæc enim Coriandro, aut Ranunculo folia gerit similia: sed instar Trifolii



in propagines quasdam extuberat, non abique capillamentis fibrosis subnatis.

Dodon. qui in fol. lat. pro 7. Anemone dicto modo descripsit, Anem. trifoliz titulo pinxit. n. Lugd. p. 847. Anemonem trifoliam Dodonæi inscripsit. Gerard. Anemonem trifoliam, *Three leaved wind flower*. Tabern. in Ic. Anem. trifoliam *Hee wind Rösslin*: In hist. Anem. 9. trifoliam. C. Bauh. phyt. Anem. 19. siue trifoliam. Lobel in Obs. p. 150. Icon. Plant. p. 281. Alabastritem siue Dentariam albam D. Brancionis.

Cæterum, Lobel. tam ignotas vires perhibet, quam raram plantam ait, minusque obuiam, nec nisi in vireto D. Brancionis ipsi visam.

RANUNCVLVS PHRAGMITES, ALBVS
& purpureus vernus.

CAP. XXIII.



lulus tenuis, molliorque, purpurascens, sesquipalmaris & maior, citra cuius fastigium vno & eodem loco nascitur folia terna Ranunculi ex semencibus rubellis pediculis, hirsuta, nunc virentia, nunc

potius: cohererent siquidem terna non magna, laeta, acuminata, indiuisa, margine tantummodò crenato: cauliculus palmum altus, cui flos indidet candidus, aut ex albedo purpurascens, formâ Ranunculi florum amulatus, qui marcescens nonnihil purpurei coloris contrahit: radix etiam obliqua,

Ranunculus Defert
phragmites vernus radicem habet crassiusculam, longam, obliquam, proserpentem, foris purpuream, aut fuscam, intus albam, sapore cam leui adstrictione acre, nescio quid empyreumatis ecu spinarum pilcium crematorum resipientem, à qua fibræ capillares demittuntur: surrigitur collicu-

nunc purpurascens: colicula summo flos insidet vnicus lacteus, alias cum vnguibus colore carneo, rarius totus purpureus, foliis constans senis, nunc oblongis, nunc brevibus & subrotundis, in medio stamina plurima crocea.

Ruellio Ranunculus 4. flore lacteo quem rugallica semel n. qu. si Santiculam vocant. Brun. feli. Santicula altera species agrestis. Cordo in Hist. l. 2. cap. i. (vbi Gesnerus figuram Tragi addit, ac insuper monet huius Ranunculi flores esse vel albos, vel roseos, vel luteos) sub Ranunculi quarta specie, cognata tertiè describitur. Vocatur autem eodem lib. cap. 184. Ranunculus Chelidonium. A Fuchio pingitur in Hist. pro Ranunc. 4. specie, sed non describitur. In lib. 10. pro Ranunculi 4. Dioscoridis specie lactea: quin & Dodon. gall. sub titulo Ranunculi 4. generis eam pingit ex Fuch.

Trago dicitur Ranunc. siue candidus cum rubore, vti Aprilen blümen: Gesn. hort. Ranunc. phragmites fl. lacteo. Mergen blümen Ranunc. phrag. fl. albo, vel roseo, Anemonis adnumerandus: In cat. pl. (vbi verba Ruellii allegat) Ran. 4. de coll. stirp. Ranunculi genus 4. Fuchii, quod vulgò vocat Martios flores, albos & purpureos. Lob. in Advers. Ranunc. nemorosus fl. albo: in Obl. p. 84. & 10. Plant. Nemorosus Ranunculus. Hort. Lusit. Ranunc. nemorosus albus, vti in aldi benlein: nō, Ranunc. nemorosus, purpureus, licet rot v. aldi benlein. C. Bauh. phyt. Ranunc. siue nemorosus albus, flore communiter candido, aut ex purpura rubente, sed modò dilu-
tiori, modò intensiori colore, vel carneo, imò & roseo, & duplis floribus. Est & qui in dorso frequenter punctulis protuberantibus exasperatur. Est maior, media, & maior species. Hinc Thalus in sua Hareynia Ranunc. tertij quinque genera enarrat.

Tabern. in Icon. cur tres figuras, Ranunculi nemorosi albi, purpurei, & ex rubro purpurei 2. nomine, ponit, quum colore tantum differre videantur. Ranunc. octauus [inquit in Hist.] est Dioscoridis 4. tus lacteus, quem Germani quidam Ziegen mürg vocant. Nonus & decimus sunt etiam species Ranunculi quarum Dioscoridis, quia florum duntaxat colore differunt.

Turpiter H. Lugd. duas historias & duas icones eiusdem plantæ duentis libris & capitibus ponit p. 347. Anemonem 5. Dodonæi, Ranunculum nemoros. 4. Fuchii: p. 1030. Ranunculum lacteum Fuchii, Ranunc. album nemorensem Dodonæi.

Schvvenckf. vocat Ranunc. præcocem candidum. Ranunc. præcocem purpureum. Torn. Ranunc. album silvis & umbrosis gaudentem, aut Aprilis florentem. Dodon. lat. Anemon 5. Sunt inquit qui, Ranunculum phragmitem vocitent. Flores eius aut lutei, aut candidi, aut purpurei.

De Ranunculo phragmite albo & purpureo verno, hæc Clusius scribit: Vulgares sunt in Pannonia & Austria silvis illis stirpes, quæ toti Germani, & multis aliis Provinciis communes, à nonnullis Silvarum Ranunculi nuncupantur, Anemones tenuifoliae cæruleo flore pænè foliis, & inter siluestres Anemonoides procul dubio numerandæ: imò à quibusdam siluestribus Anemone, Theophrasto *anemone* dicta, æstimatæ. Solent autem illæ nouo Vere florem proferre, cumque aut lactei prorsus candoris, aut purpurascens.

aut cui in candore leniter aspersa sit diluitor purpura, siue carneus [liceat mihi hoc vocabulo vti] color. Est etiam quæ flauum habeat: &c.



Ille autem Ranunculum silvarum inscribit: variæque alias Ranunculi nemorosi tradit & describit species verbi gratia Ranunculi nemorosi genus I. Anemone nemorosa peregrinâ I. ipsi dictum. Ranunculi nemorosi genus alterum, Anemone nemorosa peregrinâ I. ipsi dictum. Ranunculi nemorosi genus alterum, Anemone nemorosa peregrinâ I. ipsi dictum. Ranunculi nemorosi genus alterum, Anemone nemorosa peregrinâ I. ipsi dictum.

rascente cuius hæc iconem damus.

Reperitur Lugduni flore lacteo mente Martio au bois de la bonne Alemagne: Geneva albis Tempus & carneis, vt & Montbelgardi, in silvis & dumetis flor. ns adhuc etiam Aprilis. P. mo Vere in Silesia silvis fugidusculis montolis vbi etiam cum flore luxurat, Schvvenckf.

RANUNCVLVS PHRAGMITES LVTEVS 1. mor. sus.

Vtei nunc phrag. mitæ Ranunculi radix præcedenti vulgari albo & purpureo formâ, colore, sapore, sibiisque per similes, colicula item & foliorum numero conuenit, sed filia vigentiora, longiora, breuioribusque pediculis, ita vtiis quasi destituta, concursu suo quasi cotylam purpurantem efficiant, in cuius medio præter duo folia oblonga minimeque dissecta, crenataque, coliculi scapus nonnihil pilosus, florem sustinet nonnunquam singularem, aliàs geminum. Ranunculi, aureum, quinque foliis, latiusculis & obtusis constantem: in cuius medio *floemula* crocata plurima.

Tabern. flos minor est quàm albi: herba tota sapore acri & virente.

Huius Ranunculi Thalys genera duo facit. Alterum cuius flores deprehendere nunquam potuit: alterum verò cuius flores sint citrini & species duæ.

Clus. in Pann. p. 385. vocat Anemonas silue. Synon.

Aris genus totum luteum, plerumque aliis minus & præcocius: In hist. post. Ranunculum silvarum flauum, foliis ab albo & purpureo nonnihil differentem, plerumque humiliorem & præcociorem. Lobel. in Icon. Plant. p. 674. Nemorosum Ranunculum luteum. C. Bauh. phyt. Ranunc. siue nemorosum luteum, flore communiter vnicò, aliquando duobus, aut tribus. Tabern. in Icon. Ranunc. nemor. luteum. Geel Wald Bânlein: in hist. Ranunculum 7. Dioscoridis tertium, & Batrachium Diosc. tertium, Ranunc. phragmitem luteum, *Ranunculo saluatico* giallo Itatorum, *Yellow Wood Crowfoot* An-

giorum Gele. bosh. Saneioet Belgar. Schvv. Ranunculi præcoccem luteum, gelbe waid Weilchen. Dod. gall. Ranunculi 4. genus. Grenouille de bois, Ranunc. paruum: Idem de purg. p. 302. & in fol. lat. Anemonem sextam, foliis tantummodo, floreque minorem, eoque luteo. Fuchsin hist. Ranunculi quartam speciem luteam: in Icon. Ranunculi apud Diosc. speciem tertiam. Tragus [qui portionem huius alteri adhaerentem pingit] Ranunculum tertium. Cord. in hist. Ranunculi tertiam speciem. Gesn. hort. [cui Anemonibus adnumeratus cum albo videtur] Ranunc. phragmitem flore luteo.

Genex florentem Martio reperi. Basilez in Munchensiem observavit C. Bauhinus. Montbelgardi in silva Chesnoi occurrit.

Rem.
phrag. lute.
Locus &
tempus.

RANUNCULVS CVM FLORE IN MEDIO folio, radice tuberosa.

CAP. XXIV.

Deser.



nullis capillata: [Cæsalpino radices sunt candidæ, breues, multæ, acervatæ, similes minori Chelidonio] vel, ut ait Camer. pluribus tuberculis aut granis composita, pediculus aliquot promit, palmates, vel etiam dodrantes, teretes, cauos, nudos, præterquam quod extremum in umbilicum inferitur folii, quod pediculo singulare insidet, rotundum ferè, sed ad pediculi vsque commissionem multifidum, in radios stellatos subdivisos sectum, glabrum, splendidum, saturo virore tinctum: Camer. folia explicat rotunda, in rotæ modum: C. Bauh. folium rotundum circumscriptiōe vnicum quidem, sed in plures partes Geranii Columbinii, aut Napelli figura, in profundiores minusque profundas lacinias diuisum: è cuius medio sessilis, sine pediculo floris vnicus emicat, Ranunculi, luteo auri fulgore, vel ad virorem declinante, Vel, ut ait Camer. si minor fuerit, flauior est, sin maior, aut longiusculus, obscurior est flauedinis, senis longiusculis foliis constans, medium obsidentibus numerosis fibris apicibusque luteis: horum delapsum excipiunt corniculatæ filiquæ Aconiti, vel Hellebori nigri, quatuor, aut quinque erectæ: C. Bauh. semen inclusum filiquis, rotundum, compressum, flauescens, Milii instar Cæsalp.

Dodon. in Hist. purg. & in fol. lat. pinxit Aconiti lutei minoris titulo, descripsitque pro Aconito Lycoctono luteo minore, hæc de eo subdens verba: In Belgii hortis non rarò ipso Ianuario floret, præsertim vbi clementior Hyems est. Ethinc Aconitum hyemale, siue hybernum dici cepit. Aconiti autem speciem esse, & formâ foliorum, filiquarumque, tum & ipsa perniciofa herbarum facultas ostendit. Ad Theophrasti autem Aconitum multum accedit, quod ab ipso lib. 9. c. 16. describitur: &c.

Lobel. in Aduerb. vocauit Ranunculum bulbosum vni folium batrachoidem, Elleboraceam herbulam. Sed in Obl. p. 386. [vbi Aconitum hyemale Belgarum, Ranunculum monophyllum, & Anemonem Bononiensem vocat, & p. 385. etiam inscripsit] hæc titulum corrigendum præcipit, legendumque voluit esse Bulbosam vni foliam, batrachoidem elleboraceam plantulam. In Icon. Plant. p. 676. Aconiti hyemalis Belgarum, Aconiti batrachoidis elleboracei titulo, habentur duæ effigies, sc. Observatum quod erat retinenda, & aduersariorum, quæ ut imperfecta erat repudianda.

Cæsalp. Elleborinæ nomine describit, ac Elleborinam Theophrasti esse, & Epipactim Dioscoridis & Plinii, statuit. Ponz in Baldo dicitur Aconitum Lycoctonum batrachoides Lobelii. C. Bauh. phyt. Aconitum siue vni folium luteum bulbosum: apud Matthiolum suspicatur esse Aconitum Theophrasti.

Si planta, de qua hinc nobis sermo est, Compilatori H. Lugdunensis fuisset nota, eius aut non tres figuras dedisset, aut saltem diuersorum librorum capitibus, titulisque non se iunxisset, ponendo p. 1505. Bulbum paruum vni folium Ponz: p. 1742. Aconitum lycoctonum luteum minus Dodonæ: Item, Aconitum aliud Dalechampi.

Euganeis in montibus inter montem Gemulam & Vidam Februario mense florentem reperi: Bononiæ in agris & montibus Apenninis semine maturo, Aprilis. Montbelgardi ferens Hieme in horto Ill. E. C. fl. ore Februario.

Radice cum magna prudentia exhibitam purgare perhibet Camerarius: sin verò non rite, aut nimia quantitate vsurpetur, esse valde nocuam.

RANUNCULVS FOLIO RVTACEO.

CAP. XXV.

Aliquot, inquit Clusius, à radice (singulari, crassiuscula, producit folia multifida, Rutæ foliis non valde dissimilia, molliora tamen & magis viridia: flores autem habet atroplos, ante ipsa folia emergentes, forinsecus dum initio emergunt, ad suæ rubentem colorem tendentes, internè candidos, duodentæ aut pluribus foliis constantes, vmbilicum occupante capitulo viridi, vt in reliquis Ranunculis, cincto multis albicantibus staminibus quæ flauos apices habent, sine odore: hos sustinet cauliculus teres & initio purpureus, deinde ex viridi pallescens, quem ambit vnicum plerumque folium [rarò plura] exiguum duabus aut tribus lacinis diuisum, latè basi cauliculum amplectens: floribus deciduis succrescit illud capitulum, & in semina crassiuscula euadit, Thoræ Valdensium, siue Ranunculi grumosa radice tertiæ, semini parè similia.

Clusius.

Clus. verò dicitur Ranunculus præcox. Rutæ folio : C. Bauh. phyt. Ranunc. 4. folio rutæco. Ponz in Baldo Ranunc. alpinus Coriandri folio, flore sex foliis composito, albis, subpurpurealcentibus, ac venulis sanguineo colore percurrentibus.

Nascitur in inferioribus Sneberg iugis, & vicinis montibus, inquit Clusius : nos verò Aprilis florentem Heidelbergæ apud Sprengerum observauimus.

RANUNCULI EX ANTIQVORVM ET Recentiorum sententia in genere.

CAP. XXV.

Dioscorides Ranunculi plures proponit species, sed vim vnam, acrem, & valde exulcerantem. Habet, inquit, una ex ipsiis, folia similia Coriandro, sed latiora, subalbida, & pinguiora : florem luteum, quandoque purpureum (περσικόν) caulem non crassum, sed cubitum altum : radicem paruum albam, amaram, quæ propages Veratri modo habet. Nascitur iuxta fluenta. Est & altera species lanuginosior & longior caule, quæ plures habet foliorum incisuras, & plurima in Sardinia nascitur, acerrima, quam sanæ & siluestre Apium vocant. Tertia species valde parua, & gravis odoris est, flos eius similis auro. Est quarta huic similis, flore lactei coloris.

Eandem etiam quatuor Ranunculi species facit Plinius : totidemque Galenus.

Veterum, præsertim verò Galeni, Ranunculos nostris accommodat Cordus : quod etiam facere annititur Cæsalpinus : Ranunculos appellans plantas, aut in aquis, aut prope aquas nascentes.

Marantha decem Ranunculi genera obseruauit, floribus, radice, foliis, acrimonia; Ranunculorum naturam præ se ferentia, licet aliud ab alio differat, quod acius sit. Artificiose Maranthæ distinctione, si Diis placet, ab acrimonia Ranunculorum desumpta.

Ranunculos posterioris obseruationis in duo prima diducit genera Dodonæus, ita ut vnus sit hortensis : reliqui autem siluestres. Horum autem nonnulli vulgares, alii verò externi.

Nos Ranunculorum differentiam petimus eum à radice. ita ut vnus dicatur Ranunc. tuberosus, racemosa & grumosa radice. Alium à caule & foliis cognominamus rectum, repentem, laxum & hirsutum : Item, tenuifolium, latifolium, rotundifolium. Diuersitas & in flore est. Est enim Ranunc. flore simplici & pleno : rursus luteo, albo, & phæniceo. Ludunt & natales. Et hinc obseruatur hortensis, arvensis, palustris, siluaticus, siue montanus & alpinus. Alius vulgaris. Exoticus alius, Asiaticus, Constantinopolitanus, Lusitanicus, &c. Tempore quoque variant, Hiemalis, Vernus, & Autumnalis.

Ranunculus in genere Græcis dicitur Βατράχιον, σέλινον άχρειον, σέλινον άδίκιον, Βάτραχος, & γελότοπος, σελήτιον, κατὰ σέλινα, & κρυπτή, κλάον, & πρῶτον, & σελήτιον, σελήτιον σέλινον, & Epigram. λυκόποτος. Latinis etiam Batrachium, Batrachis, Clonium, Hephæstium, Rhufelinum, Lycopus, ac etiam ut antiqua Apulei exemplaria legunt, Herba scelerata, Clorophis, Phæxium, Rhufelinum, Apiastrum, Dentaria, Tom III.

Mileum, siue Nileum, & Auricomum : Plinio Herba strumea : ab uerberariis appellatur Herba vulneraria, Herba caustica, Apium raninum, Vulcania, Herba Vulcani, Herba ranina : Arnaldo Villanouano, Ranunculus lupinus : Vulgo Herbariorum Pes corui & Pes galli, sed perperam. Ab aliis, eodem tamen lapsu, Pes cotinus, & Pes gallinaceus : A nonnullis Apium siluestre, Apium rusticum, & Apium aquaticum. Hermolaus hæc nomina subdit : Apiastrum, Strumen, Polyanthemus : Horatio Sarda herba : Apuleio Gelotophye : Coriannon, Corion, Synecthon, Carcadana, Nemecon, Apium risus. Ab Arabibus præsertim Serapione lib. de simpl. cap. 296. nominatur Βατράχιον, quod dubio procul nomen à græca Batrachii voce derivatum est. Ab Halli Abbate Verdelheeb, Verdelheeb, Quengeum & Q. egeum, & passim Kebikong, Lelelach, Madafin, Masarus, Nodafar, Rebieheg, Mischeh, & Kimisli. Germanis Hanenfuß / huerenfuß, froßschraut, froßschpesser / Rappensfuß, Schmalzblum, Brennender hanenfuß / Gleyßblum, Butterblum, Blatterfraut, Brennfraut, Bubenfraut, Spiegelblum, & alicubi in Suecia Glizerpsanlein. Belg. Hancnuet, & Borerbloem. Gallis Bassinet, Batinet, & Grenille. It. Ranuncolo, Ranunculo, Piccorino, & Apio risi. Hispanis Yerna belida & Herna belida. Anglis Crofoot. Bohem. Drysßgruut. Hung. Betsa flu. Egypt. Synecthon & Carcadana. Et hæc sunt nomina Ranunculi in genere Linguarum nominatarum.

Cæterum, miserabili maledicto inter gentes quondam infamis Ranunculus ille fuit, qui in Sardinia nasci dicebatur, idemque Sardonis & Sardonis. Poëtis & aliis vocabatur. Ea siquidem in cibo herba potuque sumpta mentis alienationem & cum laborum contractione eiusmodi conuulsionem facit, ut risus speciem præbeant. A quo deinde affectu tristi & amaro nimis Sardonius risus inter homines dictio iactabatur. Huius Cicero meminuit dicens : Sed heus tu τό γὰρ ὡς αὐγῆς ἰδὲν rideamus : Et Poëta cecinit.

Immo ego Sardonis videar tibi amarior herbis.

Hoc porro versu, & saporem, quem radix habet, acinfelix & lamentabile mortis genus vñ amaritudinis notâ descripsit.

Apuleium sceleratam herbam Ranunculum *Herba scelerata* appellasse credit Marcellus, quoniam nimis male euentu constat risum ab eo fieri, comestumque noxium esse. Dalechampio autem magis aridet fidei eam esse, quia validi sceleratique mendicantes sibi crura ac lacertos dilaniant, quod possint impudentius stipem extorquere, atque hac imposturâ pectiniolam aucupari.

Nostris herbariis, inquit Plinius. Strumeam vocant, quoniam strumis & panis medeatur : vel ideo forsitan quod strumosa conspiciatur radice. Sunt qui Apium agreste seu Apiastrum, quod *Apium agreste* folio Apium æmuletur vocent. Alii quod prope aquas nascatur, Apium aquaticum cognominant. Marcellus ex antiquorum codicum fide

Chelidoniam i.e. Harundinariam herbam appellandam censet, quod illi similis sit, & Dioscorides in Harundinaria dicat eam Ranunculo similia folia habere : esse autem similitudinem naturam, ut similitudinem suam inuicem communicent. Dicitur Ranunculus, quod limitibus humidis, opacisque marginibus, ranarum more lateat. Aut quod aquis, ubi ranæ degunt, potissimum gaudeat : Aut quia inter eius frutices ranæ frequenter

*Grenuillet-
te
Bastine*

*Vires in
genere*

*Lepra
Alopecia*

*Sivuma
Fabula*

Temper.

Describe.

Synon.

*Ranunc.
Tabern.
et Ran.
silu.*

quenter inveniuntur. Eadem de caula *Grenuillet-
te* à Gallis nominatur: *Bastinet* verò à floribus, quod vasis zneis tonstrinarum, in quibus barbas emolliunt, similes videantur colore ac figura. Vulgus Herbariorum Apium rufus vocat, ab effectione quam inducit.

Vim habent Ranunculi folia & caules teneri impositi exulcerandi, & crustam cum dolore inducendi. Vnde & scabros vngues & Scabiem remouent, & stigmata & puncta delent, fornicarias item ac peniles verrucas & alopecias ad breue tempus imposita tollunt. Foliorum verò decocto tepido pernioles persunduntur. At radix arida trita naribus admota, sternutamenta mouet: & adalligata dentium dolores leuat: frangit tamen ipsos auctore Dioscoride. Ranunculus omnibus [ita Plinius vertit] vis caustica, si cruda folia imponuntur, pustulasque, vt ignis, faciunt. Idem ad lepras his vtuntur, & ad tollenda stigmata, causticisque omnibus miscent. Alopecias imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore manducata diutius, tumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternutamentum facit. Nostri Herbarii *Sivumcā* vocant: quoniam medetur strumis & panis, parte in fumo suspensa, creduntque eā rursus sata, rebellare quæ curauit vitia.

Quatuor habet speciatim Ranunculus differentias, inquit Galenus. Sed omnes vehementer acrem facultatem possident, adeo vt cum dolore exulcerent &c. Oranium tum radicem, tum vniuersam plantam vehementer calidam & siccam esse testatur quoque Fuchsius. Primi tamen generis siluestris lutei (Ranunculi rotundifolii) non perinde ac reliquorum acris admodum esse facultatis.

RANUNCVLVS RECTVS, NON REPENS
flore simplici luteo.



luteus, eumque subsequens echinatum *feminum capitulum.*

Lobelii Aduers. pratenfis Ranunculi varietas: in Obs. p. 379. figuram ex Dodonzo habet, surrectis cauliculis pratenfis Ranunculi titulo.

Tabern. in Hist. vocat Ranunculum 1. *Gemetzen* *Ganensfuß*: Item, Ranunc. 2. siluestem: in Icon. Ranunc. siluestem. Vna figura, duæ descriptiones.

Gerardus pro Ranunculo surrectis cauliculis ponit iconem, quod non placet, à Tabern. pro Ranunculo dulci exhibitam: Pro Ranunculo verò batrachoides, Ranunculum siluestem Tabernamontani. Scvvenckf. est Ranunculus vulgaris pratenfis causticus: 2. Matthioli: 1. Tabern. Ranunc. siluestris pratenfis surrectis cauliculis.

C. Bauh. phyt. Ranunc. 6. siue pratenfis erectus luteus: Item, Ranunc. 7. siue pratenfis erectus maculato folio, Calchæ alterum genus Tragi; Chrysanthemum Fuchsi.

An Anguillaræ Ranunculus Sardonicus?

Genevæ sponte prouenit & Montbelgardi in pratis: Basileæ in syluis: In valle Griesbachiana copiosè prouenit foliis nigris maculis notatis: In Kirchen Dukatús Vvitt. foliis magnis ad Aconitum accedentibus. In Silesiæ pratis plūs quā notissimus, vt cuius flores sæpe integra prata operiunt.

Hoc Ranunculo se aliquoties vsum pro vescatorio asserbat D. Rentzius Med. Fontis ad mirabilis.

RANUNCVLVS RECTVS NON REPENS
pleno flore.

Ranunculo recto præcedenti cetera similis, attonubente rigido caule ramofo præditus: folia iam dicto proxima, maiora, crebrius incisa, acutiora: flori paruis auricomis, non, vt illius, simplex, sed quod fortassis culturæ mangonio debetur, denso foliorū stipatu multiplex.

Dodon. gall. vocat Polyanthemum multiplex, *Bastineti* *double*, simplici planè simile. Brunfels. tom. 1. Rhap. 23. Cruris galli speciem domesticam & hortulanam foliatis & repletis floribus: Camer. hort. Ranunc. tertium flore pleno erectum, Bauarorum *Hein. Zuch. herzu*, Misnensiū *gelb. tau. seneschön*. C. Bauh. phyt. Ranunc. 8. siue hortensis erectus multiplex, Pes corui flore pleno Brunfels. tom. 1. Rhap. 23. Coronopus eidem in 4. p. 32.

An est Trago Ranunc. 1. multiplex, *gesfülte* *Ganensfuß*. An Geln. Ran. sardonius flore multiplici? An Cordo quod figuram atinet, quæ eadem cum nostra, Ranunc. multiplex? An Lobel. in Aduers. Polyanthemus multiflorus siue holeraceus?

C. Bauh. in Pinace, Ranunc. luteus vel 3. flore multiplici Tragi, Ranunc. multiplex Fuchsi. tertius Turn. quartus Lonic. Ranunculi 7. species coronaria Cordi Hist. Ranunc. silu. 2. Dod. Lugd. Ran. polyanthemus Lob. polyanth. 3. erectus Camer. at 2. epit. Ran. erectus hortensis flore pleno luteo Eyf. Maior & minor habetur: & ille dicitur Ran. multi florus Tabern. Ran. max. multiplex Gerardo. Flores Bellidum plenarum orbiculos imitantur, sæpius geminatim combinantur, ac quandoque sobolem aliam ex se mittunt.

**RANUNCVLVS TENVIFOLIVS MON-
tanus luteus.**

CAP. XXVI.

Peculiaris hæc Ranunculi species est. Radix ex capitulo denso tenuium fibrarum longam



rum nigrican-
tium agmine
constat. Ex
qua imstatim
folia singularia
longis pedicu-
lis oriuntur,
Geranii grui-
nalis, siue
quarti Fuchsi,
tripartita, sed
minutius dis-
secta parte sin-
gula in mino-
res diuisuras.
Cauliculi plu-
res, sesquipal-
mares, graciles
quibus adha-
rent folia sine
pediculis, sed
in angustiores

quàm priora multò partes diuisa & verè digita-
ta. In quorù sumo flores singulares, lutei, splen-
dentes, quinquefolii: Quorù media numerosi a-
pices concolores, sed obsoletiores occupant: in-
ter quæ crassus quidam globulus futurorum *se-*
minum, vt in reliquis Ranunculis, rudimentum.

An aliquis eius meminerit, nondum mihi
constat. Obseruatus Geneuæ in montis Iuræ præ-
alta parte Thuiri.

RANUNCULVS MAGNVS VALDE HIR- sutus, flore luteo.



EX radice o-
blonga ex
qua veluti ca-
pillamenta lur-
sum feruntur
ad modum
Dauci alterius
Fuchsi, caules
prodeunt cubi-
tales, striati, ca-
ni, hirsutæ al-
peri, & ex ruffo
flauescentes,
qui in ramos
brachiantur: fo-
liis quintis fe-
nisius palmari-
bus & sesqui-
palmaribus pe-
diculis [caulis
formâ & colo-
re] radice pro-

deuntibus, quæ densa sunt, lata, in ternas pro-
fundas lacinias diuisa, quæ denuò incisa sunt, per
ambitum serrata, colore ex viridi nigricante, vel
potius rufescente, quæ propter lanuginem & hir-
sutiem splendent: in caule folia parua & quidem
breuioribus pediculis habentur: in summis cau-
libus flores parui, aliorum Ranuncolorum more
quinque foliis donati, pallidè lutei: semen in capi-
tula congestum succedit.

C. Bauh. phyt. vocat Ranunculum 15. siue mon-
tanum latifolium hirsutum alterum. An Thalic-
Ranunculus Cordi sextus, seu Fammula.

Tom. III

Prouenit in monte Basileensi Apollineo, Mu-
teto dicto, locis ymbrosis, vbi vt plurimùm repe-
ritur Iunio florens: eundem etiam in Rößberg
monte prope Tubingam collegit descriptionis
author C. Bauhinus.

RANUNCULVS RECTVS FOLII PAL- lidioribus hirsutis.

Radicibus figitur multis, fibrosis, albis, nequa-
quam reptantibus: vnde caules pullulant, complures
pedales vel cubitales, caui, molles
hirsuti, in varios ramulos diuisi, quorum extre-
ma flores sustinent paruos, luteos, quinque foliis,
raro pluribus constantes, apicibus medium occu-
pantibus, crebris luteis: quibus succedunt capi-
tula alpera, vt in plerisque Ranunc. folia multò
minora quàm in Reptante, vel Recto, hirsuta,
longis nixa pediculis quoque, in tria primaria
segmenta diuisa, quorum vnumquodque dein-
ceps in profundas lacinias subsecatur, quorum

Defect.



color subpalli-
dus minutique
virens quàm
in reliquis Ra-
nunculi specie-
bus: At verò,
priora nec præ-
fundè, nec in
tot lacinias di-
uisa sunt, vt
supremi, figurâ
etiam sunt ro-
rundiore. In
gultu nullam
percepimus a-
crimoniâ ma-
nifestam.

An Ranun-
culus 19. Cosp:
Bauh.

Circa Mör-
belgardum &
Bessfordiam, lo-
cis potissimùm humidioribus & luteolis abudat:

floretque Maio, Iunio & Iulio.

RANUNCULVS TUBEROSVS MAIOR CAP. XXVII.



QVemad- Defect.
modū in-
ter vulgares
Ranunc. hunc
quoque est re-
petire, ita quo-
que folia is ha-
bet similia, simi-
literque subse-
cta, pilosa, ma-
culis albescen-
tibus notata:
flore aureo, cau-
leque hirsuto,
vulgari Ranū-
culo respon-
det, radix subest
alba, bulbosa,
Faba vulgaris
mediocritas ma-
gnitudine, quæ

Y y 3

facile separari potest, multis fibris circumdata. Et talem reperi in Italia: Genevæ observavi in Ranunculo simili hirsuto bulbū dependentem, vt Matthioli pingit.

Atinoria

Iam descripto accedit Ranunculus parvus, si non idem, à me sæpius observatus, verticillato tubere non admodum altè actō donatus [qui non facile separatur à caule & foliorum pediculis] fibras latis crassas demittente ex inferiore bulbi parte, quique caulem erigit subhirsutum, floribus vulgaris Ranunculi recti simplicibus, quos excipit similiter capitulum, Fraxis, vel Pentaphyllo simile: cui succedunt semina parva compressa, duplici pelliculā vnaqueque inuoluta: folia non admodum magna, in tria segmenta pouissimum dissecta, hirsuta, Hic Ranunculus interdum valde parvus cum caule singulari, vix dodrantali, interdum maiore, ramo. lo.

Icon.

Crus galli.
Coronopus
sila.

Figura ex Eucharis appolita non in omnibus satis facit. Beur selis figura, Tom. I. chap. 13. Crus galli, des Fleinen hancsfuß? & Coronopi siue tris tielo domita, et p. adet Ranunculo tuberoso minori hic descripto.

Ran. minor
Ranunculi
q. per
Ran. x. ext.
g. m. idem.
que scilicet
vatis.

Fuchsin Hist. (vbi de scribere neglexit) & Icon. dicitur Ranunculus minor. Cordo Hist. Ranunculus, treccis, cognomento rotund. germ. S. S. S. S. S. Cum Batrachio p. d. à Matthioli, & à n. c. p. tore loco descripto conuenit descriptio Trag. Ranunculi primi exigui eiusdemque sceleratissimi folio nigricante, leuiterque hirsuto, parte sui auersa ranam videri referente.

Batrachs
Apulei
Ran. tub.
refus

Dod. gall. vocat Batrachion Apuleii, Belgarum Sint Auphénis racp. In Hist. purg. & latin fol. inferoic Ranunculum tuberosum: at autem Diolcondem huius non meminisse: Apuleium verò ab aliis separasse, seorsumque de isto egisse & peculiariter Batrachion app. Haste: & hinc Apuleii Batrachion dici, vulgoque Rapum D. Antonii nominari. Figura Dod. gallici erat eadem quæ Fuchsi: Latin: alia est, qualis apud Lobelium.

Rapum D.
Antonii.

Bulbosum Ranunculum Lobelii in Icon. Plant. p. 667. fuisse malè in Aduers. ab hirsuto muticato semine denominatum, mox et in Obi p. 380. Ranunc. bulbosus, siue quintus Matth. in Diosc. & Hist. germ. respondet Ranunculo priori descripto.

H. Lugd. duas habet figuras: Ranunculum 5. Matthioli. p. 1029 Ranunc. tuberosum p. 1034.

Lonic. dicitur Ranunc. 5. Officinarum Pes columbinus, Taubenstee/ quod nomen non placet. Came. hort. Ranunc. radice bulbosa vel tuberosa potius, flore simplici. Thal. Ranunc. bulbosus Apuleii à Dod. ascriptus. Cesalp. Ranunc. aliud genus, tum foliis tum caulibus lanuginosum, radicem ferens Verticilli modo rotundam, priuatim Pes coruinus vocatum. Tabern. in Ic. Ran. minor: in Hist. Ran. 4. minor, Ran. rotundus, Ranunculus Vulcani, & D. Antonii, Flammula minor, rotunda Vulcani, Brenfraut/ Ruzbenhanensius. Gerard. Ran. bulbosus, Roond soored. Cromfoote.

Ran. bulb.
radice etc.

Varietas

C. Bauh. phyt. Ranunc. 12: siue bulbosus radice verticilli modo rotunda. In siluestribus flore est simplici, in hortis translatus non modò flores multiplicat, sed ex vno & alterum promitt. Reperitur etiam locis arenosis & saxosis ita parvus, vt vix trium vnciarum sit. Item, Ranunc. 13. siue minimus laxatilis hirsutus, cauliculo triu vnciarum, hirsuto,

In montibus Bononiensibus observati flore. re Aprilis, nec non inter Veronam & Castelfranco: Genevæ cum tubere ex tenui folio pendente videntem mensis Februarii principio. Minor Ranunculus, cui fibræ à tubere dependent abundat Montbelgard loco valde sicco ad Meridiem sito in Vitium monte, talis etiam in monte arcis B. ffordianæ.]

Vitæ
vita.

Scribit Tragus Batrachium exiguum adurere & exulcerare efficacissimè, non secus atque ea, quæ corrosiua vocant, nec nisi externis corporis partibus adhiberi debere, pustulas excitare, quare erodendis & exulcerandis duris tumonibus mirificè conducere, verrucas formicantes & peniles, & id genus vitia, citra incisionem, seu adustionem, succum illitu tollere. Radix, vt ait Matthioli, tuberosa pendens nucis Juglandis magnitudine, acris & exulcerans, per Hiemem, arefcentibus iam foliis, à quibusdam, vbi exulcerare partem aliquam volunt, vsurpatur. Herbam Batrachion tusa cū sua radice mixto aceto impones, authore Apuleio, his qui habent cicatrices nigras: exedit enim eas & similem corpori reliquo reddit colorem. Camerarius de Ranunculi bulbosi flore pleno & simplici facultatibus hæc subdit: Radix bulbi in situ rotunda, si recens sit caustica est, ac admodum vrit: exiccata verò post vnum mensem dulcis efficitur: vitumur hac radice tusa, & emplastri modo imposita tempore pestis ad rumpendos abscessus. Nebulones mendici quidam, quò facilius nobis imponant, eâ sanguine Draconis macerata luras aut femora illinunt.

Radix
vita.
caustica
succum

RANUNCVLVS MAXIMO TVBERE, flore magno pleno.



Iucundi spectaculi oblectamento, omnium Ranunculorum primas, ameno florum incremento: qui colore aureo non tantum denso foliorum stipata luxuriant, sed & medio flore alius assurgit minor, hirsutis suis foliis quinis non minus quam inferior obulatus, numerosaque foliorum

congestione multiplex, pediculo inferiorem transadigente: folia rugosiora quam pratensis, siue surrecti, siue repentis, maiora, rotundiora, inque minis acutos angulos diuisa: radix subest tuberosa verticillata, Cyclamini magnitudine.

Et hic vocatur à Lob. in Adu. Ranunculus polyanthemos Anglorum: in Ic. Pl. p. 666. Ran. magnus Anglicus polyanthos. A Dod. de purg. Ran. tuberosus flores multiplicans: in fol. lat. Ran. tub. flore

flore multiplici. A Camer. hort. Ran. radice bulbosa, vel tuberosa potius flore pleno. A C. Bauh. phyt. Ran. n. siue radice tuberosa pleno fl. habetur & simpliciter: in Pin. Ran. hort. flore pleno quintus, siue Ran. rad. tuberosa fl. pleno & profuso, Ran. 3. Camerarii in Epitome. Solum florem appictum habet. A Tabern. in Hist. Ran. 24. omnino similis quarto minori tuberoso, radice & foliis, nisi quod maior est, & flores pleni: Ran. tuberosus aut bulbosus multiflorus, Germ. *gesült Strümpf* / & *gesült kleiner hanensfüßes*: Item, Ranunc. 25. prædicto similis: sed flos duplex, aut triplex.

Montbelgardi cuius Ranunculum amplissimo flore pleno, radice valde tuberosa, plurimum se multiplicanem. In Belgii hortis reperitur, eod primū ex Anglia delatus, & tandem in Germaniam.

RANUNCULVS FLORE GLOBOZO, quibusdam Trollius flos.

CAP. XXVIII.



Ranunc. flore globoso dictus, radice nigram, fibrosamque Helleb. emulam habet, folia ferè Aconiti, in quinque segmenta diuisa, idque ad ipsum usque pediculum dorante longiore, nisi quod folia in caule, nullo pediculo cauli adnascuntur, cō. similiter tamē diuisa: caulis sequecubitalis

levis, inanis, ramosus, flores sustinet vulgari Ranunculo forte maiores, iis tamen concoloribus, sed minus micantes, densis, aut videntis foliis constantes, intrō modicè reflexis, vt sessilem globum imitentur: [qui minus bene nostrā figurā exprimitur] fibræ luteæ, medium occupant.

Ranunculi huius Clusius duo in Austriacarum Stiriacarumque Alpium pratis obseruabat genera: Maius vnum, ampliore flore, & quasi aureo: Alterum, humilius, flore paulō mitiore, & colore, vt plurimum, ex viridi pallescente: aliās, foliorum formā, capitulis, semine nigro, & radice inter se conueniebant hi duo Ranunculi glomerato flore, vt in post. Hist. auctor vocat, vel vt in Pannon. p. 372. Trollius flos.

Matthioli Aconitis adnumerat hunc Ranunculum, licet ad Aconiti genera non pertineat. Lacuna in Diosc. Aconiti tertiū inscriptione foliam iconem ponit: nam in annot. vbi Aconiti tertiū meminit, hoc non intelligit. Thallio dicitur Aconitum 3. Matth. flore Ranunculi luteo magno.

Tabern. in Icon. Ran. alp. luteus: in Hist. Ran. n. montanus luteus. Item in Ic. & Hist. [vbi] quintum] Aconitum Matthioli primum. Ha duo

figuræ non sunt diuersarum diuersarum plantarum sed vnius, quod Compil. nō animaduertit.

Peius apud H. Lugd. triplex imago ponitur. H. Lugd. p. 1029. Ranunculus 6. Matthioli: p. 1033. Ranunc. flore globoso: p. 739. Aconitum lycoctonum 3. Matthioli. Priori & posteriori loco non describitur.

Gefn. hort. Trollius flos, Anemone montana Synon. luteo & in globum collecto flore, & Ran. montanus. Dodon. Ran. externus quintus, Ran. fl. globoso, & sic etiā Eyst. Lob. in Obs. p. 385. Ic. pl. p. 675. Ran. mont. Alp. glomeratus. Gerardo Ran. globosus. Schvv. Ran. Alp. luteus globosus. C. Bauh. phyt. Ran. 4. siue montanus globoso flore luteo, & [secundū Tabern. qu. Ranunculum 12. Alp. albus nominat] albo: Eidem in Pin. Ran. mont. 9. siue Aconiti folio, illo globoso, Ran. 7. mont. alter folio altiore quasi Napelli, Catalpini.

Proferunt hunc alti montes Hircinix & Helueticorum Alpes: itemque Silesiæ vallis Gigantum ad Oupā cataractam, florentem Iulio: Geneuenses, vt mons Thuir, copiosum etiam Iunio: Non diu durat in hortis, nisi loco ymbroso & frigidulo plantetur.

Notandum Matthiolum tribuere suo Aconito flore Ranunculi, vñ & vires lycoctoni quas nostro inesse Ranunculo globoso flore vix credimus. Potest tamen in animalibus fieri periculum. Schvv. quidem ceteris Ranunculis hunc minus acrem ait, ac propterea minus calefacere & siccare.

Locus & tempus.

ACONITVM 5. MATTHIOLI EFFIGIE alicuius Ranunculi vel Anemones.

CAP. XXIX.

Cuius plantæ icon à Matthioli in Epit. anni 1577. pro Aconito quinto floribus purpureis sit proposita, hactenus præsentire non licuit, quia nullam addidit descriptionem: folia quidem referunt Ranunculi genus aliquod, sed caules ita picti, vt singulares & non ramosi videantur, flores autem quinquefolii. An potius ad Anemone aliquam sit referendum, fatemur nos ignorare. Camer. in Epit. sic describit: Aconito quinto flores insunt crocei, folia vitigineis aut fuscis accedunt magnitudine ac figurā seu diuisione, maculis verò albis & lucentibus venis deformantur, radix nigra. Eius autem inuenitur copia in monte Baldo.

Acon. 5. fl. purpureis Matth. quid

RANUNCULVS REPENS, FLORE LUTEO simplici.

CAP. XXX.

Fibrosa radice reptante, quæ non bene exprimitur figura appositā ex Fuchsiā, albidæque nititur, ex qua caules oriuntur aliquot fistulosi, purpureo & viridi, instar Serpentinæ, versicolores, non nihil hirsuti, brachiati, supini, humi sparsi, quam attingentes fibræ productis denud radices agunt: folia atrouirentia, subinde maculis nonnullis albis notata, hirsuta, Apii diuisurā quodammodò sapore herbaceo: flores aurei, quinque foliolis splendentibus compositi: fibræ & apices crocei, capitulum echinatum.

Descriptio

À Trago pro Ranunculo prætenfi primo, siue

Ran. dalei seu prætenfi su Trago



At Fuchsi Chrysanthemum, germ. *Wassers hanensfuß*:

Polyanthemum
simpl. Dod.
gall.

Dodor. g. II. vocat Polyanthemum simplex à Plinio lib. 27. cap. 12. desertum, minus calidum & siccum Ranunculo, ut quod, teste Trago, cibis admisceatur. Breuiter & ambigue describit, nec signat in omnibus respondentem, Fuchsi solueret, assumpsit. Ea autem, quam in purg. aust. & lat. in fol. Ranunculi hortensis primum exhibuit, nobis satisfacit. Ranunculi porro speciem esse, non modò florum, verùm & ipsa totius herbae facie, & facultate ostendi posse credidi.

Synon.
nonnulla

Lobel. in Adu. vocat Ranunculi differentiam & varietatem vulgariissimam ubique pratensem à Babantes esse Butterblum (quasi Florem butyri) vocatam, ut quā tenerā floribusque ocellata multum pasta vacca, quum ad mulctum veniunt, venis lac dant. In Obs. p. 375. l. Pl. p. 664. Ran. pratensem etiamque hortensem reprobate cauliculo. Gesn. hori. Ranunculi genus per terram magis repens, & acrimonia carens, Coronopodem quorundam, & Ranunculi speciem similem luteam flore simplici: Idem de coll. stirp. Ranunculum plumbum habentem, & interea serperem, floribus maioribus, iuxta semitas. Czsalp. Ranunculi genus humi serpens non mordens. Turn. Ran. tertium, vulgari similem per omnia, sed dulcem, Monguntinensibus Schmalzwort Süss hanensfuß nuncupatum. Hort. Lus. Ran. vinealem repentem meingarten hanensfuß: Item, Ran. dulcem pratensem, Süsssen wiesen hanensfuß. Tabern. in Icon. R. nunc. dulcem, Batrachium saluterum: Item, Ran. holeraceum maiorem, grossen süßen hanensfuß, Butterblum: Et, Ran. vinealem, Batrachium vineale, meingarten hanensfuß: In Hist. de his ait: Ranunculum dulcem quidam docti imprudenter miscunt cum Coronopo Dioscoridis: dicitur grece *Batrachion ranuncos*, Batrachium dulce, aut saluterum, Ran. dulcis pratensis, vulgò herbarius holeraceus, quibusdam saluterus, Süss hanensfuß: dimittit cauliculos repentes. Fragant modo Ran. dulcis 3. siue holeraceus maior, aut pratensis maior, germ. groß Schmalzwort/ groß Butterblum: folia habet priori dulci similia, maiora, minus laciniata, caulem maiorem, ac etiam flores maiores. Ran. dulcis 6. doctis *saluteris*, Icinopodium, Lat. dictus Pes milui-

nus, Batrachium vineale, Ran. repens dulcis & vinealis prior (dulci) solis similis foret, nisi crassiora & obscurius viridia essent, caules item crassiusculi & fulci: repit & se renouat. Descriptio Ranunc. 1. dulcis Tabern. conuenit cum nostro Ranunculo, non item icon, quæ non respondet descriptioni, ut in qua nulli caules reijcitur. An 3. dulcis sit repens non indicat Tabern. nec iconne demonstrat. Ranunculi 6. icon facta videtur ad iconem Lobelii.

Geraudus pro Ranunculo pratensi etiamque hortensi, Lommon Cromfoote proponit iconem Ran. repentis dulcis sexi Tabern. Item, pro Ran. auncimo, golde harre Cromfoote eadem Ran. duicem tertium.

Ranunculum dulcem Schwenckf. Tabernomontani quæcunq, triplicem constituit: Ran. dulcem pratensem, oleraceum: Ran. dul. prat. maiorem: & Ran. dul. prat. maculosum, serpentem.

An Ranunculus secundus Matthioli?

H floriam centè Lugd. præter Ranunculum secundum Matthioli, quem p. 1028. exhibet, pro repente alium Ranunculum, hortensem priorum Dodonæi p. 1031. demonstrat. Et hunc nostrum pulchre exprimere dicimus, quamvis alterius sit opinionis Dalechamp. qui eum ad quartum Matthioli accedere suspicatur.

An Brunfels. Coronopus & Crus gilli filii. An est Anguill. epist. Ranunc. tertia species? Thalo est Ranunc. polyanthemus 1. Dodonæi, Ranunc. pratensis 1. Anglorum, Ranunculi 8. species Cordi: Item, Ran. auricomus, seu 1. Ran. species Dod. gallici, Ran. dulcis siue pratensis Tragi. Ego Ran. octauum Cordi huc non refero, sed ad Ran. sursectum acem, licet Thalo assentiat C. Bauhin phyt. ubi ei est Ranunc. 9. siue pratensis repens hirsutus simplici flore.

Basileæ in pratis florentem adhuc Octobri obseruati, & Genevæ Nouembri & Marti principio, April Montpelii, ac passim Montbelgardi. Locis umbratis, & non nihil humidentibus, non proliis aridis, secus vias & in locis hortorum incultis sponte exit: in pratis quoque, & non raro iuxta agrorum margines occurrit. Nec enim quod in hortis tantummodò gignatur, Dodonæo hortensis dicitur, sed quia sæpe præ cæteris hortis sit familiarior, atque in his creberrimè gramine permixtus reperiatur. Maio ac deinde seris multo vigent flores.

Ranunculum maiorem siue pratensem dulcem minimè acem perhibet Trages, ac propterea citra periculum & noxam vrinque corpori adhiberi posse ait: folia quidem quacunque in corporis parte ortos tumores imposita discutite ac resoluit. Refert Lobelius, herbam teneram, floribusque onustam, nec non semen, minus vrente gustu, nec insuauis odore lactis copiam impetire credi: pasci enim hanc præ cæteris armæ, æn gratiorè, & pratis pinguioribus vique cunctis copiosissimam. Tabern. scribit Ranunculum 1. dulcem April & Maio collectum in pulvis oleraceis esse valde gratum, sicuti & dulcem tertium Maio collectum, ac eum insuper cum sexto bobus & vaccis gratum & salubre pabulum præbere, iisque lac augere.

RANUNCVLVS REPENS FLORE pleno.

ET huic quoque fistulosi caules, maculosi, sub. Detra. hirsuti, humi fusi, qui vbi terram attingunt demissis fibris eam denuò subeunt: folia Repen-

Reliquam Ranuncularum Historiam petat lector lex huius tom. Appendic. pag. 841. & sequ.

SCROPHULARIA VULGARIS
& major.

CAP. XXXI.



Foetidi odoris tota est. Radix obliquè agitur, alba, crassiuscula, & tuberculis inaequalibus strumosa: caulis firmus, rectus, quadratus, caucis, purpureus, ad binos cubitos excrefcit, in alas diuisus: folia Galeopfis, maiora, acuta, serrata, x caulis geniculis aduersa, atrovirentia: flores

ex hirsutis pediculis, caulicibus quinque-foliis infident, Antirrhini minimi, hians oris instar habentes, suprema lacinia intus atropurpurea, extrà nonnihil virescente, lateralibus duabus cum infima extroisum reflexa magis ex viridi pallescentibus, prominulo è rictu sulco virescente, altè reconditis tortuosis staminibus cum apicibus ochreis.

Passim Scrophulariam vocant, cognomento maiorem, ad differentiam minoris, quæ Fabarola & Chelidonium minus quoque nuncupatur. Appellant verò & Millemorbiam, Ficariam, Ferrariam & Castrangulam: Germani Braunnwurz / Saunwurz / Scunwurz / Feigwargenfraut / Feigwurzgenfraut / & groß feigwargenfraut: Belgæ groot speenkruyt / siculfruyt & helmcruyt: Galli Scapulaire: Ital. Scrofolaria: Angli water betonye / broune wort: Hung. Scrofulariam appellant Corogusfui: Sefete, bozza, h. e. nigrum Ebulum.

Radix in empta sculpta figura minus placet: tubera enim inaequalia strumosa non satis exprimit.

Fuchf. Cordus, & Dod. gall. itémque Gese. in cat. pl. Scrophulariam hic à nobis traditam pro Galeopside demonstrant, & describunt. Quorum sententiam reprobant Matth. & Dod. lat. in fol. In Scrophularia vulgari grauem odorem, quo Galeopsum præditam esse volunt, frustra desiderantes: Vnde odoratus sensum eos [præsertim verò Matthiolum] perdidisse faciliè quis crediderit.

Galeopsum esse non posse dicimus, inquit Marantha, quod præter alia, tota planta foetidi & grauis sit odoris, licet omnino nullam contritionis violentiam sit perpessa: Galeopsum autem folia non nisi trita odorem grauem reddant.

Cæcitant & illi, qui cum Trago Ocymastrum faciunt. Nec minus aberrant qui cum Rob. Constant. Clymenum Plinij esse contendunt. Quidam herbam Chrysippeam Plinij esse putant, quæ cum Ficis strumis medetur. Sed in tanta verborum Plinij breuitate, quod concludam

Tom. III.

non occurrat. Tigurenses vocant Schwärze Nachtschat, i. e. Solanum nigrum, improprie tamen: nec desunt qui wurmfraut / hoc est, Vermium herbam, aut Vermiculariè vocitent, sed quam ob causam, nondum patet. Gese. in cat. pl. cur Agripalmam cognominari, haud video. Geneue vocant L'herbe du siege, à parte cui remedio est. Summo enim emolumento radice vtuntur, in hæmorrhoidibus abigendis.

Cæterum, Matth. passim in comm. suis, Hist. Synoth. germ. & Epit. etiam cum add. Camerarij, Lac. & Dod. lat. in fol. vocant Scrophulariam: Brunfels. Cast. Dur. Gese. quadr. Lon. Turn. Lobel. in Adv. Obs. p. 289. Icon. Plant. p. 533. Thal. Camer. & Tabern. Scrophulariam maiorem: H. Lugd. pag. Scroph. maiorem Matthioli: C. Bauh. phyt. Scrophulariam 1. [2. apud Matth.] siue nodosam foetidam. Gese. hort. Scrophulariam maiorem: Item, Clymenum nodos seu scrophulas in radice habens, & Clymenum marem: Cæsalp. Scrophulariam maiorem recentiorum Medicorum. Galeopsum Fuchf. Cord. & Dodon. gall. itémque Gese. in cat. pl. Galeopsum minorem Fuchf. in Icon.

Scrophulariam vulgarem maiorem obseruat Basileæ Octobri ad fluvium Birsæ extra & intra urbem: item florentem extra portam Basileæ minoris Riemerthor, mense Iunio: Genæ passim: Lugduni quoque, & in Italia inter Veronam & Castellum Franc. Secus agrorum margines, in scrobibus siccis non raro prouenit, acin syluis. Iulio ac Augusto cum flore viget; semen inde maturefcit.

Cæterum, quamuis satis sit, Scrophulariam non esse Galeopsum: tamen viribus pollet non contemnendis, namque eius radix strumas, & hæmorrhoidas sanat. In quem vltum radix effoditur autumnali tempore, & repurgata tunditur cum recenti butiro, operculatòque sicili in vliginoso loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liquefit, & percolatum asseruatur, quo prædicti morbi itémque scabies, vtilissimè illinuntur, referente Matthiolo, Solenandro cons. med. 20. sectio. 4. & Dodonæo. Scrophularia radicem habet tuberosam (inquit Porta phyt. lib. 5. cap. 25. vbi figura) vlcibus strumosis caernosis, carcinomati, aut depalcentibus siceratis, satis opportunam: tuberculis item ab humore frigido glaciatis emolliendo opitulantem: Facultate autem calida & sicca est, & propterea desiccatur, extenuatur, discutit, abstergit: est enim gustu amara, & subtilum partium. Et hinc ad duos glandularum tumores quos Græci γαστρίδες, Latini strumas, & vulgò Scrophulas appellant, & hæmorrhoidum cum dolore tumores prodesse fertur. Nonnulli vel collo appensam, vel aliàs gestatam ad sanitatem conferre temerè prædicant. Sicce radicis pulvis impositus hæmorrhoidas siccatur: Idem drachmæ pondere potus, lumbricos ventris pellic. Aqua è radicibus distillata, faciei ruborem illita tollit.

Locis
tempus.Vires
vltus.

Superfluit

SCROPHULARIA MAXIMA
radice fibrosa.

CAP. XXXII.

Quadratis caulibus ad cubitos aliquot altis excrefcit: per quod folia Scrophulariæ

Zz



vulgaris, vel
Betonica, ferra-
ta, nigricantia,
fœtida: flores
& vascula ad
maioris vulga-
ræ Scrophulariæ
accedunt: ve-
rùm radix non,
ut illi, strumosa,
sed ex innume-
ris fibris con-
textæ.

Hoc est Oc-
mastrum illud
maius Tragi,
quod Ocyma-
stro minore
[Scrophularia
vulgaris] caule
& foliis viridio-
ribus esse per-
hibet, & ad pro-

ceritatem sepe viri assurgere.

Eandem plantam cum Trago fortè intelligit
Cornarius per Ocimum in aquis nascens,
quod Hepaticus pro Ereno Dioscoridis, & Ereno
herba Plinii agnoscere ait, & Germanos pro
wasser Basiliens. Hoc non desinibit, & fortè no-
men germanicum fingit.

An Ocimum aquaticum Gesnero?

Lobel. in Obs. Scrophulariam maximam sub
sequentibus nominibus pingit pag. 288. Betonica
aquatica Septentrionalium an Clymenum Dios-
coridis? Galeopsis siue Scrophularia altera Do-
donæi veteraculæ editionis [g. llicæ, intelligo.]
Clymenon Turneri [eius verba præc. cap. ad-
scripsi:] Scifamores minus fortè Solimano. Ter-
pentaria D. I. Dulci à Terebinthinæ dote simili.
Ocymastrum alterum Tragi. Belg. Beest Scijm
& cruyt / S. Antuenis crijt. In Icon. Plant.
p. 533. intulavit Betoniam aquaticam Sep-
tentrionalium: Dodonæus Lat. Betoniam a-
quaticam. Camer. apud Matth. vocat Scrophu-
liam fœminam, & vulgo germ. weissen Nach-
schaffen / hoc est, Solarum album.

C. Bauh. phyt. Scrophulariam 2. siue palustrem
non fœtidam. Item, Scrophulariam 3. siue aqua-
ticam folio Betonice: Ocymastrum maius Tra-
go: Beton. aquat. Septentrionalium Lobelio. A-
pud Matth. Scrophulariam palustrem radicibus
fibrosis, caule & foliis prostratis viridibus, in pala-
stris Basileensibus minimè fœtulentem. Se-
cundam & tertiam Fratris Scrophulariam non-
dum separauerim.

Varis in locis provenit Montbelgardi. Mont-
pelii floret mense Maio & Iunio ad fossas aqua-
rum. Iuxta aquas profluentes emicat, inquit
Dod. ac secus scrobium ripas: in aridis vix repe-
ritur. Iulio ac Augusto cum flore viget, semen in-
de maturefcit.

C. B. nor.

Locus &
Tempus

Vires &
Vilus.

Facultate calida & sicca est: folia absterforia
vi prædita, ad prava, & fœtida ulcera pluri-
mum prodesse fiuntur: & cum melle suc-
cus horum decoctus. Curant autem
ulcera & contusa, si manè & serò
continuis diebus in foco cale-
facta & contrita alia impo-
nuntur.

SCROPHULARIA FLORE RUBRO Camerarii.

C. A. P. XXXII.



Scrophula-
ria altera
sine scrophu-
lis siue tuber-
culis, cuius
flosculos &
folia Scrophu-
larie vulgaris
maioris ele-
gantiora esse
ait author Ca-
merarius, in
cæteris fermè
conuenire,
nescit an ab
alijs descrip-
ta, nisi sit Ga-
leopsis An-
guillæ. Se-
mine quotan-
nis sua sponte
propagatur.

Huius ico-
nem quadragesimo tertio loco, Scrophularia
peregrinæ titulo pictam dedit. In hac autem
imagine flosculi è suo conceptaculo eculsi, par-
te anteriore & posteriore, & vnus eidem adhuc
inhærens, denique semen cum suo vasculo di-
stinctè notari possunt. Sculptor noster malè ca-
pitulorum apices ademit, & ea nimis rotunda re-
praesentant.

C. Bauhinus, cui à Doldio ex horto Camerarij
transmissa, vocavit in phyt. Scrophulariam
quartam, siue flore rubro. An est Clusio Scro-
phularia Cretica 2. cuius delineationem insi à ead-
em inscriptione dabimus?

SCROPHULARIA LUTEA MAGNA am. lis foliis.

C. A. P. XXXIII.



Caules De-
profert
plutes bicu-
bitales circi-
ter, quadra-
tos, nonnihil
pilosos: folia
superiora a-
cuminata, ner-
uosa, profun-
dè per ambi-
tum serrata,
infima qui-
dem quatuor
vncias longa,
cotidem lata,
pediculo qua-
ternis vncijs
longiore:
quæ his su-
periora sunt;
per caulem veluti ad genicula opposito situ
nascuntur

nascentur. alia trium, alia duarum unciarum & semuncialibus tandem pediculis harent, decrefcente pariter foliorum magnitudine: ex vniuscuiusque ferè folij sinu pediculus emergit palmatis circiter, cuius circa fastigium foliola bina exigua conspiciuntur, supra quæ extremo pediculi cacumine flores harent complures, lutei, Pisi minimi magnitudine, concavi, hiantes, apicibus itidem intus luteis, quos extrinsecus amplectuntur foliola quædam lutea: subsequuntur seminum conceptacula turbinate, capitulis hyperici similia. Nullum mihi manifestum odorem halat planta. Sapor autem tam florum, quam foliorum non nihil dulcis mihi videtur.

Lamium Pannonicum a. sue exoticum Clusio. Montbelgardii in horto Ill. E. C. pluribus annis durat se quotannis semine renouans, Aprilis & Maio florens. Clusius florentem obseruauit primum Viennæ Austriæ in hortulo suo ad patrem suum, nescit quo semine. Eam subsequens Hiems auferrebar quidem, sed decido semine prognata sunt in sequente anno alio quoque plura, quæ demum altero Vere flores protulere. Floret Maio, semen Iunio maturum est: deinde tota planta radicatus perit: nonnunquam tamen ex radice etiam repullulat.

SCROPHULARIA INDICA CAPITVLIS maximis, & de Creticis Syliij Scrophularijs.

CAP. XXXIV.

Scrophulariæ Indicæ nomine accepi seminem quoddam, cuius calyces sunt ex breuib. inæqualis lōgitudinis pediculis quinque simul iunctis, formæ ferè & magnitudinis Cicetis arietini rotundi, qui bipartiti in acumē desinunt, quos folia ambiunt breuia: semē in capitulis, siue cal. ab. minutū, nigrum. Hanc Caspar. Bauh. in

phyt. vocat Scrophulariam 6. siue Indicam capitulis aliquot iunctis, sed quadruplō quàm in alijs maioribus.


Scrophulariæ autem Creticæ genera duo tradit & describit Clusius: 1. quidem quod Francofurti natum ex semine Cretæ accepto, Ruta siluestris appellatione: ac 2. quod folio vitiæ esse dicit, & de quo merito quæri & dubitari possit, utrū sit Scrophularia peregrina Camerarij necne.

SCROPHULARIA TERTIA DODONÆO tenuifolia, Ruta canina quibusdam vocata.

CAP. XXXV.

Scrophulariæ tertiæ nomine exhibitæ à Dodonæo planta, radicem habet longam, simplicem, Tom. III.

mediocriter crassam: caules cubitales striatos, teretes, ferè nigricantes, medullâ fungosâ plenos, ramosos, per quos folia oblonga, angusta, profundè laciniata, grauitet odorata: flores eo ordine dispositi quo in Scrophularia maiore vulgari, copiosiores, parui, nigri, quos vasculâ excipiunt Scrophulariæ minores, acuminatæ in duas carinas dehiscentia.



Scrophulariæ scroph. 3. suæ tertiæ speciem Dod. gall. pro Galeopieos specie sumi posse admittit. Lob. l. in A. uerf. huius melior ē sicut nomine Ruta canina [sic in Obs. ser. pag. 58. & l. Plāt. Tom. 1. pag. 55. quoque inscribitur.] & suspicatur Hypericum esse. Clus. in Hist. post. vocat Scrophulariam, siue Rutam caninam primam.


Ad Sideritidem reducitur à Casalpino & Camerario. Gesnerus tradit in pede montis circa Glatonam locis saxosis nasci, Montpelij Rutam caninam vocatam.

An Cordo Herba folijs Pyrethri? An Herba Mora Italarum H. Lugdunens.

Montbelgardii in horto Ill. E. C. per multos annos floruit adhuc Octobri, radice perenni. Eam autem primum obseruauit Esslingæ in horto cultiss. Ioan. Volmarij, qui Sesamoides nominabat: dein Montpelij & Lugduni, itēque Buisaci ad Rhenum.

CHAMÆROPS.

CAP. XXXVI.



Chamærops Plinij hac videtur esse Hist. Lugdunens. pagina 139. quæ in siluestris gignitur, radice crassâ & multiplici, caulibus multis & cubitalib., foliis Myrti circa caulem geminis: flore copioso; è foliorum sinibus nascente, semine in oblongis vasculis.

Eisdem verò effectus Z. z.

lateris doloribus habet Chamærops, inquit lib. 26. cap. 7. Plinius, myrtos circa caulem geminis foliis, capitulis Græculæ rosæ ex vino pota. Quisquis ille fuerit apud H. Lugdunensem, qui Chamæropem Plinii ita ieiunè delineavit, nec natalè adscripserit, auctoritati suæ non consuluit. Meritò cum Casp. Bauhino, quænam hæc sit, aliquis petierit.

H. Lugd.
not.

DE SIDERITIDE IN GENERE, ET particulatim de Heraclea.

CAP. XXXVII.

Sideritidis
Eryman.

Sideritis Gr. Latinis quoque Sideritis dicitur *ἡ σιδερίτις*, à ferro, quasi Ferruminatrix, quòd vulneribus ferro factis periculis sit, vel quoniam glutinandis vulneribus apta, præcipuè in bello habeat usum, quod sæpè ab eo metallo in græcis scriptoribus indicatur. Sed cum permultæ sint plantæ, ducti etiam generis, exque inlingnes, quæ ferro sauciatis partibus, vel vulneribus quovis modo acceptis, opem polliceantur, ac ob id Sideritides nuncupentur, haud inmeritò hic eæ commemorandæ veniunt. Sed cum studiosis bene consultum fore speramus, si eæ, quæ à veteribus, & maxime à Dioscoride, descriptæ sunt, illis primò innotescent.

Sideritidis
tria genera
Diosc. lectis
illustratur.

Dioscorides itaque tria facit Sideritidis genera, quorum primum est Sideritis, quam aliqui Heracleam vocant [hanc solum describit Byzant. cod. Sarrac.] herba folia habens parva multa & tenuia, similia Marrubio [*ἡ ἡρακλεαία*]. Vet. *ἡ ἡρακλεαία* πρὸς τὰ τὰ δρυὶς. sed oblongiora [*ἡ ἡρακλεαία*]. ad Saluæ [*ἡ ἡρακλεαία*] aut Quercus [*ἡ δρυὶς*] folia accedentia, minora quidem & aspera. Caules verò edit quadratos, pedales [dodrantales, Sarrac. *ἡ ἡρακλεαία* græc. cod. *ἡ ἡρακλεαία*]. & maiores, non iniucundi gustus [*ἡ ἡρακλεαία*]. Dal. *ἡ ἡρακλεαία* vet.] & quodammodo leuiter fastu ingentis, in quibus ex intervallo verticilli spectantur rotundi, vt in Marrubio, & in his fermen nigrum. In locis sub quibus petra latent, nascitur. Folia imposita vim habent glutinandi vulnera, & ab inflammatione vindicandi. Sideritis altera ramos habet binum cubitorum, exiles: folia longis herentia pediculis, ceu Filicis, in extrema sui parte incisuris diuisa, vtrinque numerosa: è superioribus autem alarum cauis nouos erumpentes furculos longos, tenues, capitulis in cacumine globosis & asperis, in quibus semen continetur, ceu Betæ, verum aliquantò rotundius atque durius. Huius etiam foliorum vis vulneribus utilis est. Traditur & tertia Sideritis, quam etiam Crateuas Heracleam vocat. In maceris vineisque nascitur, foliis ab vna radice multis. Cortandro similibus, circa cauliculos dodrantales, leues, teneros, cum rubore candicantes: floribus puniceis, parvis, gustu amaris & lentis. Huius etiam imposita ea vis est, vt cruenta recentiaque vulnera glutinet.

Ranæc
Heraclæa.
Millefolia.

Panaceum Heracleam, alii Sideritium, & apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quàm Feeniculi foliis vestitam ab imo. Alii fatentur quidem illam vulneribus vitilem, sed veram Achilleam esse scapo caruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Alii quadrato caule, capitibus Marrubii, folio Quercus. Hanc etiam præcisos nervos glutinare ferunt. Alii Sideritium

in maceris nascentem, eam teritur, sædi odoris: Etiam num aliam similem huic, sed candidioribus foliis & pinguioribus, tenerioribus cauliculis, in vineis nascentem. Aliam verò binum cubitorum, ramulis exilibus, triangulis, folio Filicis, pediculo longo, Betæ femine, omnes vulneribus præcipuas. Nostri eam quæ est latissimo folio, Scopas regias vocant. Medetur anginis suum.

Achilleas seu Sideritides lex statuit & describit Plinius, ac satis quidem indistin&ta tamen vt agnosci & intelligi possit [inquit Dalech.] primam Achilleon eius, Dioscoridis Achilleam esse: secundam, Achilleon veram, scapo caruleo, &c. esse Myriophyllum Dioscoridis. Tertiam quadrato caule, &c. esse Sideritin Heracleam Dioscoridis primam. Quartam in maceris nascentem, &c. esse Heracleam Crateuas, apud Dioscoridem. Quintam superiori similem, sed foliis candidioribus, &c. esse tertiam Sideritin Dioscoridis. Sextam, Dioscoridis Sideritin secundam.

Galenus vsus duntaxat Sideritidis meminit. Sideritis [inquit & simpl.] habet quidem etiam abstergendi facultatem quandam, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: pauca verò inest adstrictio, quare phlegmonem sedat & glutinat.

Claudianus vno eodemque capite veterum codicum lectione & fide per Marcellum moniti, tres ab aliis seorsum tractatas Sideritides, nec satis certâ à veteribus etiam historiâ descriptas. Quominus miretur aliquis nostra ætate incertas earum notas: & inter similes herbas & eiusdem potestatis vagos Medicorum vsus, miscantibus earum genera Herbariis, & inuicem commutantibus. Factum hoc iam pridem est, quodque Plinii ætate incertum erat, ignorari seculo nostro nullus mirabitur. Nos quidem ingenuè fateamur in tanta veterum & iuniorum diuersitate nihil habere, quod pro comperto tradere valeamus.

Sideritis nomine sequentes insiguntur plantæ. Sideritis hirsuta vulgaris. Sider. Clus. capitato flore. Sider. Monipessul. Sider. hisp. hirsuta Clusio. Sideritis flouculis vix ex vasculis prominentibus fuscis. Sideritis quarta Clusii ramulis procumbentibus. Sideritis folio rotundiore. Sideritis glabra arvensis. Sideritis Valerandi Dourez breui pica. Sideritis lignosa. Sideritis glabra angustifolia spectosis verticillis. Sideritis cruciata. Sideritidis genus spinosis verticillis. Sideritis spinosa. Sider. foliolis Oleæ. Ladanum legetum flore albo. Ladanum legetum flore rubro. Cannabis siluestris quorundam. Cardiaca. Marrubium Tragi palustre. Marrubium Pannonicum. Marrub. album angustum. Herba venti. Melissophyllon Fuchsi. Galeopsis angustifolia foetida. Galeopsis, latifolia foetida. Gallitrichum siluestre. Gallitrichum latium. Gallitricho affine Maru. Galeopsis lutea. Ternionaria. Coris lutea Monipessulana. Euphrasia a. Dod. purpurea. Botrys altera. Chamæpitys. Senecio hirsutus foetidus. Parietaria. Millefolium stratiotes. Achillea. Fumaria minor. Geranium sanguineum. Geranium Robertianum. Scrophularia tertia Dodonzi. Sanicula vulgaris. Sanguisorba minor. Barbarea. Filix floribus insignis. Tanacetum album. Verbena supina. Pulmonaria gallica. Virga aurea. Erice. Erium.

SIDERITIS

SIDERITIS VULGARIS HIRSVTA.

CAP. XXXVIII.



Ex lignosa radice caules emittit pedales & bipedales, quadratos, hirsutos, ex albedo virore flavescentes: ad quorum genicula folia exant aduersa, rugula hirsuta, vncialia aut sextantali longitudine, semunciam circiter lata, in ambitu crenata, spore exsiccante & adstingente cum calore aliquo: flores

verticillati genicula amplectuntur, galericulati, ex albedo lutei. labro sanguineis punctis guttato, ex calyculis hirsutis in quinque mucronata segmenta abeuntibus: relinquunt post se singuli flores quaterni femina.

Clusius de sua dicit, folia grauitur odorata, gustus amaricantis & acrisculi: flores galeatos aliquantulum, candidos, odoratos, hiatum, siue ritum sanguineis notis conspersum habentes: semen in pentagonis vasculis inaequale, nigrum.

Lob. sic describit. Vagultis pedibus, iam surrectis iam depressis, quadratis, duriculis, ternis, aut quaternis, verticillis crebribus donatis, pungentibus, floribus albicantibus ex diluta parpura. Iuxta quos & subter, folia sunt longiora, angustiora, incana, & vt totus caulis, scabra, & crispa, ambitu laciniato, vt Chamædrys, aliquando laciniosa diuifiori oblectuus apparet in quibusdam foliis, quæ causi sunt, vt Dioscorides iam quædam frondi, iam Saluæ & Marrubio contulerit. Radix lignosa Marrubij, minus fibrosa.

Sideritum appellat Ruellius: Sider. Heracleam. Euch. Roell. & Lobelius: Sider. heracleam Dioscor. Tabern. Sideritidem primam Fuchsi. Sideritum i. Dioscoridis Turn. Sideritum Fuchsi Cord. in Hist. & Camer. Hort. Sideritum i. Dodonæi Gall. & Fuchsi Hort. Lusit. & Thalius. Sideritum i. Fuchsi Gesn. hort. Sideritum i. Marrubij folio in catapl. Siderit. florib. albis de coll. stirp. Sideritum vulgare Camer. in Hist. germ. & Epit. Matthioli. Sideritidem quartam Lonic. Sideritum Pannonicam spicato flore Clus. in Pannon. Hist. Siderit. vulgare in Hist. post. Siderit. siue vulgare hirsutum C. Bauh. phyt. Aliqui veram Achilleam cognominant. S. d & Alysson Galeni vocat Presburger. Recentiores Herbarij & officina nonnullæ Iudaicam herbam, & Tetrabit aut Tetrabit barbaro nomine inscribunt: Germani runderfrant. i. e. herbam vulnerariam, & glüedfrant. h. e. Artum 2, & Seisfrant. Galli espece de Tetrabit, Fuchsi. & Lob. Hung. Tizatos seu, h. e. Nobilem herbam. Migna officinarum pars, ac nonnulli recentiorum pro Chamæpity veterum ostendunt, eaque non sine errore, vt bene docet

Tom. III.

Fuchsius Sideritidem r. inscribens pro Chamæpity vultur. Fuchsi in eo aduersatur Matthioli, à cuius è contraria stat. partib. in adu. Lob. Vocabulo, inquit, quod ferro sauciat partib. c. p. promittit, nobilitat ut primi mortales complures plantas, Sideritidesq; vocarunt, potius vitium confimiles effectiones sequuti, quam vultuum affinitates, genericæ ve differentias. Quare Sideritidem hanc Herachiam, siue Ferruminatricem Herculeam, docti Barbari illam multo experimento competam & vocatam Tetrabit, siue Iudaicam esse sanxerunt: non modò propter vires efficacissimas, & planè Her. uleas, sed etiam quia quàm proximè delineationem Dioscoridis, si quæ alia, repræsentat. Quo magis docti peritis & candidis plantarum aibitis, Commentatorem Senensem eò securitatis ignauæ pro g. ellum, vt cum quædam esset, vel Italici Iudaici Iudaica herba, se nescire quæreretur, quam scitè vt sepe omnia Ruellius, & ex eo Fuchsius expressisset, tamen in vtrumque inscitia calumniam impegit, & sensu studio planè deprauato plausum è trivio captari. Huicque herbæ de sua classe pullæ, sibi missas, vt semper iactat, nec tamen nisi mutilè descriptas, aliis suffecerit, sc. Marrubium aquaticum vulgi. Hæc Lobel. in Aduers. vbi plantam minus felici picturæ expressit. Eandem imaginem in Ic. Plant. p. 523. pro Sideritide siue Ferruminatrice, & Sideritide Herculea Diosc. Cordo, Clusio & Herbarijs dedit: Itè quæ ibidem aliam pro Tetrabit Herbariorum pinxit. Is autem in Obf. p. 182. pro Tetrabit Aduersariorum, siue Heraclea Sideritide Dioscoridis Cordi & Clusij, aut pro Sideritidis vulgaris figura, ponit iconem Clusij Sideritidis Hispanicæ, quasi putarit eandem cum vulgari Fuchsi. Libro etiam Iconum, plantæ, quam exhibuerat pro vulgari hæc Sideritide, titulum iam scriptum adaptauit, ibidemque iconem Clusij à vulgari non separauit. Et hæc occasio vt Lobel. j. descriptionem nostræ subiecerimus: Clusij autem Sideritis Hispanicæ capite proprio.

Lobel. nos.

Sed & H. Lugd. primam Dioscoridis Sideritidem Tetrabit esse pronunciat. Ait autem inter cetera Matthioli Ruellium & Fuchsi erroris insinuat, quod primam Sideritidem dixerint herbam esse, quæ hodie nostris herbarijs & officinis barbaro nomine Tetrabit, aliis herba Iudaica nominatur. At periti & exercitati Herbarij, tum Ruellio, Fuchsi quæ ætate superiores, tum inferiores multis rationibus inducti Tetrabit siue Iudaicam herbam, primam, siue Heracleam Sideritidem esse censuerunt: &c. Eadem verò historia huius plantæ duas proponit figuras p. 119. Vnam quidem habet hoc titulo: Tetrabit. Herba Iudaica, Sideritis prima Fuchsi: alteri titulum fecit, Tetrabit, Sideritis Heraclea Dioscoridis. Et hanc Clusius & Lobelius quoque pictam dederunt, quæ meo iudicio eiusdem plantæ cum Sideritide prima Fuchsi: nec meminit Historia duarum discrepantium Herbariorum Dioscoridis Tetrabit.

Matth. nos. talior.

Camerarius in Epit. & Hist. germ. Matth. ait se apposuisse Sideritidem vulgarem, propter vires celebrem, tamen plabram & serratis folijs piræ, quæ non respondere videtur vulgari, sed potius nostræ Sideritidis cruciatæ, de qua pauld post.

Camer. nos. talior.

Montepelii florentem obseruari mense Iunio, ac etiam Genæ & Basileæ quædam Moutets, & Tempus, inter portam cineræam & lapideam, circa castrum

Locus de

lum Hermet: Item extra portam Ræmerhor.
Iunio & Octobr. Montbelgardi copiosè proue-
nit. Clusius passim in Gallia, Germania, Panno-
nia, & Aethia siccioribus agrorum & Olivarum
calearum marginibus obuiam perhibet. Colli-
apricis & meridiano Soli obiectis, in promon-
toris præcipuè circa Ilfeldam, Vvenergerodam:
versus Northulm oblerauit Thalius. Lobe-
lius in maritimis, & montosis Italia, Insulæ, &
ad Apenninos montes, Venetiis ad Lio, inque
Gallia Narbonensi & Lugdunensi reptantem,
singulasque vel sabulosa arida perpetuò aman-
tem, inque Autumnum perdurantem: Iulio &
Iulio florentem.

Vires &
Vius

Iam diu valde magno emolumento cognita
prædictis quibuldam Iudeis & Maranis custon-
ibus, qui hæc enterocelas & alba menstrua cu-
rant. Vehementer exsiccant, nonnihil odora ad-
strictione insigni, nec ingrato sapore, ad vulnera
nata & prorsum tanto Herois nomine digna.
Hinc in vsum desiccata aduertunt rhizotomæ
mulierculæ: Nam præterquam quod aduersus
capitis dolorem, quem Sani fuses petr appellant
[vnde herbæ nomen, inquit Clus.] ipsum deco-
cto illius lavam vtile essent, ab aliquo indocto
empirico edoctæ: earundem etiam decocto pe-
des & alios artus defatigatos, aut alioqui rigen-
tes, vtiliter foueri prædicant. Quidam ad cru-
rum Erysipelata [Beige de roose/Gem. die Rôte
appellant] curanda, recens collectæ & adhuc vi-
rentis decocto, non sine felici successu vti sunt,
crura fouendo, aut decocti fumo leniendo.

SIDERITIS SECUNDA CLVSIO, capitato flore.

Descriptio

Humilior priore, neque pedalem excedit al-
titudinem, in ramos diuisa ramulos, foliis
priori similibus, mollioribus tamen: flores am-
pliores, albi, pallescente labro, & paucis rubris
punctis asperso, verticillatim in verticulis caulem
supremisque ramulos ambientes, breviorum
quàm in iam dicta, & quasi mutilatam spicam
conferunt, ut in Præcella vulgò dicta, auctore
Clusio qui Sideritum secundam Pannonicam ca-
pitato flore in Hist. Pann. vocat, & Sideritum 2. in
post.

Locus.

Nusquam non occurrit in agris, & inter sege-
tes in multis Pannonia & Austria locis: circa
tribusindæ autem frequentissima. Floret Iu-
lio.

SIDERITIS MONSPESSVLANA.

CAP. XXXIX.

Descriptio.

Sideritidi Monspeßulanæ radix subest crassius-
cula lignosa, raris fibris donata: caules à radi-
ce mox plures, subinde ramosi, dodrantales, val-
de hirsuti, albicantes: folia breviora, rotundio-
ra, magisque hirsuta, quàm Sideritidis vulgaris,
serrata, anara: flores verticillati, forma quidem
& magnitudine similes, sed coloris ex luteo al-
bescentis, odore est graui. Amariante exsiccant-
teque gustu præditi sunt flosculi, inquit Lobe-
lius, ac nonnihil aromatici suauisque balant,
quod Chamædryn aut Betonicam referat.

Synonyma

Lobel. dicitur in Adv. Sideritis Monspeßica
Scordiodides, siue Scordii folio. In Obl. pag. 283.



uit Monspeßianum Schola.

SIDERITIS CLVSIO HISPANICA
hirsuta.

CAP. XL.

Longiore est folio quàm Martubium, satis ad Dese-
Saluz solum accedente, minore tamen,
querni ferè foli diuisa, scabro, villis quibus-
dam præditi, nec iniucundi gustus, nec odoris:
caules surdit quadrangulos, palmum vt pluri-
mum excedentes, interdum procumbentes, du-
ros, hirtos, candicantes, quorum summities
per interualla verticillati orbes coronant, vt in
vulgari Sidentide, orbes vasculis constant, in
quibus flos prioris par, ex candido nonnunquam
purpurascens, quo evanescente, sem en in vacu-
lis nigricans reperitur: radix dura, lignosa, viuax,
auctore descriptore Clusio.

Lobelius in Obl. & in Icon. pl. assumpta Icone
Sideritis Hispanica Clusii, eandem fecit cum vul-
gari, vt iam antè annotauimus. Dodonæus
etiam proponit iconem Sideritidis Hispanica
Clusii, quàm à vulgari non distinguit. An verò
Sideritis vulgaris sit, de qua scribit, iudicent le-
ctores.

C. Bauh. phyt. ait Sideritism suam, siue hirsu-
tam alteram esse Sidentim heracleam Clusii
nisp. & Tetrabit herbariorum Lobelii, differre-
que à vulgari, quod illa altior: hæc caules ha-
beat procumbentes, magisque hirsutis candicet.
Ego autem ferè dicerem Sideritum hispanicum
Clusii eandem esse cum Monspeßianis, nisi Lobe-
lius & C. Bauh. eam ab illa separarent. Poster-
i hanc rem diligentius perquirent.

An Siderit s. i. Schvvenckfeld?

Nusquam ferè non occurrit hæc arido & pe-
trolo solo per hispaniam, Galliam, Germaniam,
floretque Aetate, & quibusdam etiam locis in
Autumnum vique florens spectatur, vt refert
Clus. in hisp. Idem in hist. post. ait frequentem
occurrere aridis & petrosis Castellæ veteris lo-
cis, Aetate florentem, quibusdam etiam lo-
cis in Autumnum vique floribus onustam
conspici.

SIDERITIS

SIDERITIS FLOSCVLIS VIX EX VAS-
culis pro minenibus fuscis.

CAP. XLII.



Cvitalis est
plūs minus
planta, caule
quadrato, hirsu-
to, foliis dona-
to ad articulos
vt in Sideritide
vulgarī, aduersis
nequaquam per
marginem fer-
ratis (in planta
quā habemus)
vicialibus & se-
cuncialibus hir-
sutis: rami in
quos diuiditur
oppositum ha-
bent situm: per
quos longā se-
rie flores verti-
cillati, pusilli, in-
tra ipsos calyces

propemodum occultati, fusco colore intra. n. n. an-
fissa, calycibus admodum hystatis, in quinque a-
cetas in spinulam desinentes sectiones diuisi:
porro vnicuique verticillo bina subiunguntur ad-
uersa folia, multo inferioribus minora, magis to-
mentosa, neruis secundum longitudinem dona-
ta, & quabili marginum circumscriptione ad Ser-
pillum accedentia.

Iconem nostram ex sicca pictor minus feliciter delineauit.

Clus. in Pannon. p. 600. dicitur Sider. Pann. 3.
In Hist. post. Siderit. 6. Pannon. C. Bauh. phyt.
Sid. 4. siue hirsuta Pannon. Rhizotomis Viēnēfib.
mulierculis fuscis peer frauit.

Ex plantis Agerij habui Sideritidē Pannonicā
hanc antē nō vīlam. Frequentissima autem est in
Pannoniā Austriacque inferioris aruis & inter fe-
getes, macro & sterili solo. Floret Iunio & Iulio,
semen subinde maturum etiam Iulio.

Huius vires adscriptæ sunt ex Clusio capite de
Sideritide vulgari.

SIDERITIS QVARTA CLVSII,

ramulis procumbentibus.

CAP. XLIII.

Aliquot habet ramos procumbentes, qua-
drangulos, tenues, villis quibusdā obfisos,
quos per intervalla contrario semper situ bina
cingit folia, vulgari, ferē similia, paulō tamen mi-
nora, à medio ad extremū ferrata, nonnihil etiam
villosa: summās ramos verticillatim ambiunt
vascula in quibus flores, prioribus formā similes,
quātum ex delineatione colligere potuit author
Clus. propterea nihil de colore pronunciat, ne-
que de semine, quod superiorum semini par esse
verisimile est: radix non videtur viuax, sed eo
anno, quo plantā flores protulit, perire.

SIDERITIS FOLIO ROTVNDIORE.

CAP. XLIV.


Medium caulem habet sursum, quadran-
gulum: deinde, statim à radice, multos in
latera spargit ramos, humi fufos, quadrangulares,
quibusdā villis pubescentes, geniculatos; quos

bina semper inter se opposita, ad singulos nodos,
amplectuntur folia, præcedentis folii penē simi-
lia, minus tamen ferrata, inter quæ, ab imo ad su-
mum vique, verticillorum ritu nascuntur in
vasculis flores; superioribus etiam formā similes,
(quorum color, ni fallitur author Clusius, nam in
aruis Belgicæ illam olim obseruasse putar.) albus:
nec huius radix viuax esse videtur: Iconē ad Clus.
mittebat lac. Plateau, elegantè expressam.

An Thalo Sideritis Cordi?

SIDERITIS GLABRA ARVENSIS.

CAP. XLV.



Sideritum vul-
gare refero. Descriptio
tum caule qua-
drato, tū foliorū
cōsimili positū,
erratis, verūm
tum ille, tū hæc
glabra sunt & a-
uro virore splen-
dentia, folia etā
latiora: florum
verticilli spicam
effigiem patu-
lo nictu, subiecta
habent singuli
bina: flores ipsi
maiores viden-
tur, candoris ni-
uei, subinde pi-
lofi, veluti & ca-
lyx: radix sim-
plex, gracilis,

Hæc est illa stirps, quam Tabern. in Hist. Alyf-
sum maius: C. Bauh. phyt. Sider. 6. siue arvensem
glabram, flore pallido. Non est autem Sideritis
altera Matth. vt alicui facili concesserit C. Bauh. **Locus**
Montbelgardi obseruauī in aruis inter Ar- **Tempus**
bouans pagum & Audincourt, & eundo ad vi-
tes, florentem Iunio & Iulio ac Augusto: Basileæ
etiam frequentem.

SIDERITIS VALERANDI DOVREZ

breui spicā.

CAP. XLVI.



Minimum Descriptio
digitum
crassitudine
fermē æquat
radix, lignosa,
non sine adna-
tis fibris, Lo-
belio flexuosa,
pulla, amaricā-
te gustu, præ-
ficca, nec in-
grata: quæ ex se
innumeras
promit virgās
lignescentes,
dodrantales,
oppositis ra-
mis paulō su-
pra radicē bra-
chiatas, hirsu-
tas, per quas
folia ad jun-

Curas bina oblonga, angusta, per extremum nonnihil ferrata, minora quam Sideritis Fuchsiæ: desinunt autem singuli ramuli in spicas Bertonice, vel Phalaridis spicorum æmulas, vinctam aut selesciam ferè longas, pulchris calycibus in quinas aculeos desinentibus, maioribus quam vel Fuchsiæ, vel Montpellieranæ Sideritis, minusque hirsutis dense stipatis, adiacentibus foliis barbatis at ferè spinosis: florum color quis fuerit, non dixim certò, præsertim cum iam olim à Valerando Doulez repocita plantæ quam habeo, propemodum exoleuerit.

Sideritis montana
Lobel.

Sideritis montanam (ita namque vocat Lobel. in Adversariis Icon. Plant. pag. 525. pel. simam exhibens effigiem) satis bellè quadrare arbitretur Heracleæ Sideritidis, si folia angustiora multò essent, vique efficaciorè carerent. H. Lug. pag. 1122. inscribit Sideritis montanam Penæ: Calp. Bauh. phyt. Sideritis 9. siue montanam.

SIDERITIS GENVS SPINOSIS verticillis.

CAP. XXVI.

Descriptio



tem verticillo, ab imo ramo ad summum vique fastigium, duo sunt subiecta ex aduerso orta folia, modicè hirsutè obfita, serrata vt Teucrii, sed nonnihil oblongiora, angustiora. Hanc Cherlerus collegit prope Romam.

SIDERITIS SPINOSA.

CAP. XXVII.

Descriptio

Montbelgardii in horto Ill. E. C. nobis prouenit ex semine, si bene recordor, Cretico, plantæ, cui nomen dedimus Sideritis spinosæ, propter quandam cum vulgari Sideritide similitudinem. Est autem hæc vulgaris foliis vncè longioribus, in acumen desinentibus, hirsutis, candicantibus, sibi què oppositis: caulibus aliquot dodrantalibus, ramis itidem contrario naturæ vinculo ornatis, in spinas desinentibus non

admodum rigidas, etiam hirsutis: plantæ nouellæ radix pedalis, simplex, exiguis fibris conspicua.

Ad Gaidarothymo Belli in epistola ad Clusium? An Clus. Stachys spinosæ?

PRVNELLA FLORE MINORE, vulgaris.

CAP. XXVIII.



EX repticiu Del

cenfurit & hæc, quæ subinde à caulibus anguloflorum, subhirsutiorum, purpureascentiumque geniculis, demissis fibris radicatorum folia ferè bina, ad articulos opposita, nonnihil rubentia, hirsuta, Origani vulgaris, lapore nonnihil viscido, subdulci, subamaro: flores verticillati, duobus semper hirsutis

rubentibus subiectis foliis, spicam deformant; quorum singuli colore ex cæruleo purpureascente. Lami floribus non absimiles, ex calyce hirsuto purpureascente procedunt eucullati.

Ex Solidaginum genere Brunellam esse autem est Brunellius, vnam ex primis herbis verno tempore germinantium, foliis Ozimo similibus, coloris herbacei, cum quodam acumine: flore quadrantenus Stachadis Arabicæ, coloris violacei. Hæc ille qui suâ figurâ non laudabili & descriptione denotat Prunellam, de qua hic agimus, verum dum vernam facit plantam, cum ea confundere videtur Consolidam mediam.

Hallucinatur Matthioli indicio, qui Symphytum petrum putant hanc esse plantam, quam is cum effinis Consolidam & Solidaginem minorem vocat, & Prunellam, germanico nomine (vt ait in Hist. germ.) ex latino deriuato, vel à morbo lingue, dicto Breinc, vt à floribus colore Trifolii. Camer. apud Matthiolum refert herbam hanc describi in lib. de Dynamidibus, falsò Galero adscripto: Quin & Herb. ant. Io. Cubæ de Prunella citat Hippocratem & Dioscoridem, neuter tamen indicat quomodo nomenarint.

C. Bauh. phyt. vocat Brunellam siue maiorem folio non dissecto, flore communiter purpureo, vel cæruleo punicante: aliquando ex diluto albo: caule glabro alio, alio ac rectius hirsuto: foliis etiam aliquando integris, aliquando leuiter crenatis. Clusius Prunellam vulgarem foliis subrotundis. Trég. Prunellam 6. flore minore. Prunellam vulgarem. Lobel. in Adv. Prunellam & Consolidam minorem: In Obs. p. 251. Brunellam, Symphytum petrum: In Icon. Plant. p. 474. Symphytum petrum & Consolidam minorem Matth. C. st. Duizent. Cor solidæ min. nam. Quæ Polycnemus Dioscoridis: Valer. Doulez Parisiense præpositu: Guiland. Britannicam.

Cæterum

Caterum vulgus Medicorum & Herbariorum, Prunellam aut Brunellam: Germ. Braunellin/ & Gotscheil ab efficacia insigni: nobilis enim est vulnerum Belg. Bruynelle: Galii. Herbe au Charpentier: Itali Consolida minore, Morellam, & Herbam Moram: Boh. Egernehlawek: Hung. Teusz fit.

Prunellam flore minore purpureo Argentina & Basilea, quâ itur Moutets, florentem obseruamus Octobris ad fluium Birsâ intra urbem, & circa montem propè Krentzach, & in monte Leurach, itémque Montbelgardi passim in pratis Iunio, Iulio & Augusto; Lugd. & Monspelij Maio: Geneva sparâ virentem Februarij principio.

Brunellam more reliquarum Solidaginum, omnibus serè cognitam aut Brunfelsidque ob extimam eius virtutem: esse incommotis faucibus & linguae atque gutturis accommodatissimam, ardorem eorum extinguendo, quem Germani die Brunen vocant, si ex illius decocto, aut aqua distillata collatur & gargazentur: Aquam [siccum alij], eius aceto & oleo rosato mixtam, vehementes capitis dolores sedare, si ex ea tempora inungantur: Huic mixtura autem posse & aquam rosatam addi. Aphthas & oris vlcera sanare, fauciumque vitia succum eiusdem, addit Fuchsius, qui herbam calidam & siccam esse ex gustu concludit: Laudatur Prunella ad vulnera sclopetorum in potione & lotionibus: fucus cum vino sumptus ad morius venenatorum. Sal eius vt fiat, docet Querc. in pharm. rest.

Prunella flore magno, folio non laciniato.



Habet caulem quadrangulû moliter hirsutum, geniculatum: folia in singulis geniculis bina, ex aduerso sita, nonnihil villosa, vulgaris Prunellæ folijs semè respondentia, gustu amariante: capitula in summis caulibus crassiora, quâ in vulgaris: flores illius floribus forma

quidem similes, sed longè maiores, nec ingrati odoris, ventre laxiore, glicæque saturatius plerumque purpurascens, tamen inueniuntur aliquando diluiores, & quasi ex albidis, interdum etiam subcinerei coloris: semina in singulis vasculis, vt plurimum quaternis: radicem nigram: multis crassiusculis & candidioribus fibris præditam, nouisque propaginibus sese, annis singulis, augentem.

Quamvis Fuchsiana nostra figura videatur differre à Clusij Prunellâ, siue non vulgari, eiusdem tamen plantæ existimus ac propè rea eius descriptioni hic adiunximus. Nec etiam à Clusiana iconè separatam Prunellam vocant Tabernamontani, quamvis eius compilator suo more nihil distictè scribat.

Eadem quoque est Prunella 6. Tragi, siue vocant.

Tom. III.

ra, pulcherrimo, magno & purpureo flore, folijs Menthastrum imitantibus.

Tempus

Eam primùm in Vngaria & Austria, deinde etiam multis aliis Europæ prouinciis nascentem inueniebat Clusius, editionibus & gramineis locis, minus tamen vberem & luxuriantem, quàm quæ in Austria crescit. Floret Iunio, Iulio & Augusto, & subinde semen profert. Circa Montbelgardum copiosè luxuriat.

Prunella flore magno albo, folio laciniato.

Tota planta vix quatuor digitos excedit, folijs superioribus admodum dissectis, hirsutis, flore magno albo, alioquin vulgari similis. C. Bauh. phyt. Prunella 5. siue minima alba, An Prunella 7. siue candida altera Tragi: Montbelgardi prope Arbouans & in planitie provenit quâ itur Adincourt, in agtis ad Dubim: Geneva circa Rhodanum versus la Bassie.

Prunella laciniata, flore magno purpureo.

Descriptio




Caulis est palmari, hirsuto, cuius singulas iuncturas ornant bina ex aduerso posita folia, inferiora quidè vncialis pediculo nixa, superiora pro portione minor, tandem etiâ nullo, vnciam & scellâ ferè longa, subhirsuta, in aduersas laciniâ dissecta: flores inter spicæ vncialis squamata folia

subrubentia, emicant magni, tres vncie quadrantes æquant, hiati patulo stamina emittentes, purpurascens.

Obseruata Prunella hæc, folio etiam non laciniato, flore maiori purpureo, Montbelgardi iuxta hortum M. E. C. florens Iulio & Augusto: item à la Chan vbi Vites, & inter pontem Vauiaucourt à Dampierre.

Prunella flore albo paruo, folio laciniato.

Varietas
Locus &
tempus.



Offerenda nobis à D. Thoma Platero, Medico insigni, elegantiq. Et folia erant multa à radice fibrosa, ex longis pediculis, quædâ palmaria, oblonga, vnciâ digiti angustiora, pilosa, vltra medium caulis pedalis duo, magnis laciniâ dissecta, cornu ceruinum representantia, tæq.

A a a

alia duo iuxta florum caput vnciam & semis lor gummatum vnam, paucioribus lacinis præditæ: flores inter squamas conspiciuntur hiantes, albi, & nonnunquam rubelli, mediocriter eminentes.

Synon.

Lobel. in Obs. p. 251. in Ic. Plant. p. 475. effigiem nostrâ pinxit pro Symphyto petræo: Dod. lat. in fol. pro Brunellæ altera icone. Quamvis autem nostra descriptio non in omnibus conueniat cum figura hac nostra ex Lobelio desumpta, eandem tamen plantam putamus, quam cùm pingendam curauimus, non erat nobis ad manum Plateriana.

Comptator Tabern. Prunellæ suæ albæ secundæ ineptam descriptionem subnectit in Historia. Casp. Bauh. phyt. dicitur Prunella 3. siue minor folio laciniato, aliquando non solum superior, sed & inferiori. Clusio dicitur Prunella 2. non vulgaris.

Gaudere autem herbosis & gramineis locis, itemque aliis, quæ à fluminibus nonnunquam mundantur, saxosis, testis est idem Clusius. Floret maturis Prunellæ flore magno, nempe Maio, tamen etiam Iunio. Obseruauimus autem Montepeli & Geneur.

PRUNELLA ANGVSTIFOLIA.

CAP. L.

Descriptio



forma & magnitudine Prunellæ vulgaris. Talis est quæ à Genere nostro Cherlero nobis delata ex Gallia Narbonensi: quæ verò à D. Thoma Platero communicata angust. folia etiam, minor fuit, quatuor & quinque vnciarum, satis aspera & rigida, sapore nullo insigni: radice fibrosâ, crassiuscula, nonnihil amarescens: floribus maiusculis.

C. Bauh. in phyt. vocat Brunellam 2. siue minorem folio rigido integro: floribus obscurè purpurascentibus. Huic figuram Prunellæ albæ 2. apud Tabern. satis cōuenire diceret, si folia essent media parte angustiora, & etiam longiora.

PRUNELLA ITALICA.

CAP. LI.

Descriptio

Plantula hæc palmatis, caule rotundo, striato, leuiter hirsuto, foliis paucis profundè in


aliquot lacinias diuisis cincto; quorum inferiora minora, & in ternas lacinias diuisa sunt, flores habet in summo, tanquam ex spica [quam foliola etiam laciniata cingunt] prodeuntes galericulatos, ex purpura nigricantes, rariùs enim infra spicam flores profert: radix exilis, nigricans.

Casp. Bauh. descriptionis author vocat in phyt. Brunellam 6. siue Italicam, testaturque Vlysses Adroandum Bononiensem Botanicum Euphrasie (peciem) facere.

Roma in monte Testaceo & etiam in via Romana reperiri scribit author.

CONSOLIDA MEDIA, QVIBVS DAM Bugula.

CAP. LII.



QVadrato, inani, hirsuto, & aliquantulum cyaneo assurgit caule: foliis Anagallidis aquaticæ maioris, nonnihil serratis, binis oppositis, per internalla nascentibus, colore vel violaceo, vel purpurascente, vel virente, sapore primo occursum subdulci, mox amarescente & adstringente, inferioribus ex satis longis pediculis, ad Bellidem accedentibus: clematibus longè se spargentibus: flores ex foliorum alis calyci insident sessili, breui, hirsuto, cyaneo, quinquepartito, cærulei variati, labello Orchidis alicuius similes, in quatuor segmenta, duo lateralia productiora, inferiora totidem, minus alta, sed

magis lata, abeuntes, nullâ galeâ, alisue vt Orchides & Lamia: apicibus & stylo cyaneis: sapore melleo, si caudicellam, qua calyci hæret, iuxeris: radix tenuis, fibrosa, maiore adstrictione, quàm folia, gustum mouet.

Duas has Fuchsianas icones exhibemus non quòd eiusdem plantæ esse ignoremus, sed quòd huius herbæ frequentem demonstrant varietatem.

tem & naturæ lufum.

Prunellam vocat Tragus, eiaque, aliquot recenset & describit species. C. Bauh. phyt. vocat consolidam mediam 1. 5. & apud Matth. siue cæruleam pratensem, Confol. mediam Brunfels. fol. p. 95. Tom. 1. Rhaph. 14. & in 4. p. 153. cæruleam vel priorem Tragi sine iconē, Chamæciffon spicatam Plinij, eundemque Anonymon aliorum: flore communiter cæruleo, aliquando albo, cinereo: foliis vel solum leuiter incisilis, vel sinuatis, latioribus, angustioribus: Item Consolidam mediam tertiam siue purpuream pratensem; Brunellam purpuream vel 4. Tragi, Confol. med. purp. Fuchsij. Consolidam mediam i. e. Symphytum, inquit, in Adu. Lobel. Chirurgi vocant, seu Solidaginem & Bugulam. Is verò in Obseru. & Ic. Plant. Prunellam & Herbam sacram Cordi vocat.

Dod. gall. & lat. 1. fol. pingit & describit sub Bugula. Inter appellatas, ait, Solidagines siue Consolidas à recentioribus numeratur: Consolidam media à quibusdam horum dicitur, officinis nostratibus Bugula. Ruellius Buglum nominari à Gallis refert. Sunt qui existimant Symphyti illud genus esse, quod à Dioscoride *μαργαρίτης* cognominatur. Verùm hi non parum falluntur. Symphytum quidem petrarum ramulos tenues habet Origani simile: capitula verò veluti Thymij, & totum lignosum & odoratum est, at talis quidem non est Bugula, quæ nec lignosa, nec odorata, & caules promit differentes ab Origani, & capitula nequaquam habet Thymij æmula. Hæc Dodonæus, qui eius duntaxat Bugulæ meminit, quæ floribus est cæruleis.

Haud statendum censet etiam Matthiolum Symphytum petrarum eam esse herbam, cuius folia auersâ parte purpurascunt, quæ ab Herbartis vulgò Consolidam media nuncupatur, ab aliquibus verò Laurentina, & à Senenfibz Morandula. Cæterùm, rectius fortè Prunellam à Germanis dici posse putat à foliorum colore, indictam Græcis & Mauritanis. Is olim in prior. comm. contentus fuit solâ figurâ minus exactâ, sed in postedit. breuem addidit delineationem, in qua non meminit saporis, nec clematum, quæ nostræ duæ figuræ vitus plantæ expriment, quarum vna sufficisset, si non plantæ huius lufum aliquem naturæ ob oculos poneret.

Camerarius etiam ad hanc Hist. germ. & Epit. Matthioli longè diuersam posuit iconem sine clematibus: Quin & Tabern. huius Consolidæ mediz duas effigies dedit; quarum prima flore cæruleo, sine clematibus non placet: secundâ, quam priori similem ait, sed foliis maioribus, hirsutioribus, minùs serratis. Verba scò maiori similibz, an bona sit, te iudicem expectamus.

Quam cum alijs, etiam Fuchf. Cast. Durantes & Thalus Consolidam mediam dicunt, Lonic. Prunellam & Symphytum medium vocat, Anguill. epist. 13. Arteticam Pandectarum, H. Lugd. p. 1309. Chamæciffon quorundam, Cæsalp. Chamæciffi alterum genus, Gesn. in cat. pl. Verbenacam supinam, Herbam sacram, & *les Gurdym*: German. Guntzel / gulden Guntzell / Belg. Senizgroen / Ingroen / Galli *Consolida*, quidam *Engle moyenne*: Quercetanus in Schopet. *Consyre moyenne*, & cum nonnullis *Sophie*: Itali, vt antè diximus, Morandula, Consolida Mexicana, & Herba, Lorenza & Laurentina: Boh. Sualuyf prostrudug.

Tom. III.

Saxosis, non rarò quoque humidioribz. pratis: apricis & apertis vineis, quàm opacis locis gignitur: translata ad hortos luxuat i compluribus regionibus familiaris, Aprili, sed copiosè Maio ac posteris florens. Patuij virentem memini in quodam horto Ianuario: Basileæ in vineis propè Moutets ad montè flore purpureo Orobri: Montbelgardi flore albo in horto Illust. E. C.

Aquam Prunellæ scribit Tragus (sic enim Bugulam vocat, vñ cum ea quæ alijs vulgò Brunella dicitur) internis corporis affectionibus mederi, dolensque ex calida intemperie profectos sedare: eadem omnia tam inueterata quàm recetia vulnera mundari & sanari comodè posse, maximè tum quando ardor siue inflammatio aliqua illis accesserit. Eandem hodie ardori gulæ & exulcerationi oris, laciùmque vitij, quam Germani diè *breuche* appellant, duntaxat adhiberi remedio sanè præstantissimo; si gargarizetur, adiecto paulillo mellis rosati: flores, vel folia, vino, vel melle decocta (pro ratione & acritudinis) oris & faucium commoratis vitij subuenire. Hæc ille tam de Prunella vulgò dicta, quàm de Bugula, de qua sermo, coniungim. Fuchsij verò priuatim Bugulæ has vires attribuit: Vulnera glutinat, sanguinis grumos ex casu, vel cõfusionibz coactos in corpore dissicit & dissoluit, præcens remedium est aphthis & vlcerebus in ore serpentibus, decoctum huius tumoribus illitum, eos dissipat: vsus etiam eius ad intertrigines, & ad vlcera pudendori & intestinorū exulcerationes prædest. At *Marthiolus*, tametsi nec hanc, nec Prunellam recentioribus dictam, veteribus siue Græcis, siue Mauritanis cognitam fuisse existimet, eas tamen refert mitum in modum existimari viles distruptis, fractis & internis, & externis corporis partibus: idcirco vtiliter dari potandas ab alto deuolutis, ac etiam iis, qui interna intestinæ vulnera acceperint: namque illa, mirificè sanare tradidit nonnulli, qui rerum experimenta profitentur, Consolidam mediam vocatam petu sanguinis grumos in ventriculo, vel in alia corporis parte concretos dissicere & dissoluere: illita verò folia, vel eorū succum efficax medicamentum esse prædicant vlcerebus in ore manantibus exedentibusque, ac etiam testium, pudendo rûmque virilium & muliebrium. Addit *Camerarius* contra icterum prodesse, & infarctus icteris & lienis expedire, vrinâs mouere, succum ad aphthas & putrescentia oris vlcera vtrpari: quibus subscribit *Lobelius*, nisi quoddam morbo & ictero nigro mederi docet, vesicâ felleâ, hepate & liene ab obstructione liberis. Camerario tamen adscripulatut *Dodonæus* ad iocinoris languores scribens mederi, nam præterquam quoddam obstructiones aperiat, viscera etiam ipsa roborare. Calidi verò temperamenti admodum exigui particeps est: reficcat manifestè cum nonnulla adstrictione. Quare commendatur ad distrupta, fracta, conuulsa, cæcæque: idcirco & potionibus vulnerarijs additur, in quibus tanta eius facultas commendatur, vt sanguinem concretum soluere ac discutere valeat. *Ruellius* tandem in Gallia vulgò dici refert, eum vulnerario Medico, aut Chirurghi operâ non egere, qui Bugulam & Saniculam habuerit: nec enim sumptam tantummodò vulneribus mederi, sed & ipsis foris impositam.

Aaa 1

Consolida media Genevensis.

Descriptio.



Locus & Tempus.

Genevæ virebant Martio, vbi etiam quedam floruerant & Aprilis alba quidem rarior, circa Nosodochium in prato dictum la coul.

Consolida media corulea Alpina.

Descriptio



angusti sunt, trium transversorum digitorum longi, per ambitum incisii, leuiter hirsuti, sursum spectantes, cingunt: flores galericulati, cerulei (in caulibus summitate flores tanquam in spica cerulei, in phyt.) è quorum medio filamenta quaedam prodeunt, in cacumine quasi spica congesti sunt, inquit descriptionis author Casp. Bauhinus, qui Consolida media [secundam in phyt. sextam apud Matth.] siue coruleam alpinam vocat. Ceterum, figura à Camerario apud Matthiolum in Hist. germ. & Epit. exhibita, similia quaedam habet cum Consolida hac à Fratre C. Bauhino hic proposita: nos damus effigiem à Fratre pictam, & iuxta eam, quæ ab eo nobis communicata. Videtur autem frater Consolida in eo à Genevensi differre, quod minus hirsuta, & folia pter caules longiora, & magis, ordinatiusque serrata.

In monte Italia Baldo prouenit.

EUPHRASIA.

CAP. LI.



PAlmaris plantula est terrens, subhirsuta, vix gulis superius folia, latiora, & simpliciora maiora, crispata & serrata, parte hirsuta, bina ex aduerso posita, sapore pingui & subamaro: ex quorum alis flosculi emicant pulchelli, lactei, purpurantibus striis picti, aspersa nonnulla flavo.

uedine, labello in tres bifidas lacinias diuiso, superiore folio sursum reflexo, tripartito: radix tenuis, lignosa.

Cum Euphrasia hac eandem statuo, quam Syri Tragus Euphrasiam tuulo pingit, quamque Euphrasiam alteram, nobilem, & Argentinensem cogominat, licet illi diuersam à vulgari faciat, semperque omnium præstat. uis, nam indicet.

Lobatus huius effigiem exhibet sub inscriptione in Obs. pag. 261. Euphrasia Adeerf. pag. 270. In Ic. Plant. pag. 496. pro Euphrasia, siue Euphrasie oculari. Brunfels. Eufragia alba: Schv. Euphrasia candida: Casp. Bauh. phyt. Euphrasia siue officinarum: H. Lugd. pag. 167. Eufrafia Matthioli.

Ceterum, Euphrasia nomen græcam sapit originem, inquit Dalechampius: videtur namque *Euphrasia* appellata fuisse, quia oculos iuuat & delectat, quam vocem imperiti lingue græcæ deprauantes, in Euphrasiam vetterunt, eamque sic corruptam officinæ & plurimi alii retinuerunt. Alii quoque Eufrafiam & Eufragiam. Eufrafia autem græco & eleganti donata fuisse videtur Dalechampio hac herbula nomine, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres Græcos & Latinos, nempe Dioscoridem, Galenum & Plinium, addere etiam apud recentiores, Aetium Paulum, & Aduarium scriptum reperitur: sed à ducentis tantum vel paulo plus annis posteritati Euphrasie nomine innotuit, ad oculorum caliginem & morbos pituitosos perueniat commendationis. Unde Germanis Augentrost, hoc est, Oculorum solamen, siue solarium, ab effectu, dicta fuit, nonnullis hæc quoque ratione motis, Ocularis, Ocularia, Ophthalmica [*Opthalmica*] Oculorum lumen, *Euphrasia* & Anguill. teste Luminella, Germ. Augendiens, wisse leuchte, tagleuchte, & weisse genleuchte. Belx Coghen trost: Galli Eufrafie, & Eufrafie: It. & Hisp. Eufragia, & Eufrafina: Angli Eychricht: Boh. Ambrosia: Hung. Eufrafia. Non est igitur quod posteriores *Euphrasia*, Euphrasien nominent. Aliud siquidem est *Euphrasia*, ipsum videlicet Buglossum. Eur. Cordus putat esse Adhil Arabum, de qua tamen Neoterici variis

varias habent sententias; aliis Euphrasiam Cassi-
laginem esse putantibus, aliis Herbam Verulam
interpretantibus. Vide Nicol. & Manliū de confect.

Nascitur locis herbosis, non omnino aridis,
sed nonnihil humentibus & pinguibus, sed in-
cultis, ut pratis, secus agrorum marginis & vias,
nec raro in ipsis quoque viis passim, ut vel hac
ratione facile agnosci queat. Floret autem Estate
& Autumno: colligitur Augusto ac Septem-
bri potissimum, totaque resiccata deinde reponi-
tur.

Euphrasia inflammationibus, & caligini ocu-
lorum adhibetur, teste ac inposita, aut succo
eius oculis indito: praestat tamen aqua ex illis di-
stillata aduersus affectiones praedictas vii. Ego
certè, inquit Tragus, Argentinensem Euphra-
siam morbo arquato viliissimam comperi, vino
decoctam, ac calidam recto propinatam. Memo-
riam etiam, teste Fuchio, oculorumque aciem
reducta in puluerem, & in vino albo pota, miri-
ficè roborat, amissamque reparat. Dicit ad praedi-
ctos affectus commodissimè scribit Dodonaeus
in puluerem tritam: addique non raro Foeniculi
semen pari pondere & nonnihil Macis, & saccha-
ri tantum, quantum est omnium simul pondus:
huus mixtura cochlear aut per se, vel cum exiguo
vino exhiberi manè corpore jejuno, & quidem
per continuos non modò dies, sed & mentes
quandoque posse & solam, & quouis modo as-
sumptam, videndi potentiam conferuare, adau-
gere, debilem ac deprauatam restituere. Euphrasiam
per se sola non masticando, & in ore tenendo, ac
postea deglutendo expertus est Arnoldus mira-
bile iuramentum. Idem auctor est fieri & ex Eu-
phrasia vinum vindemiae tempore, cuius vsu senum
etiam oculi reiuuenerunt feruntur, auferrique
omne oculorum impedimentum, visusque defe-
ctionem, praesertim pituita, crudisque humo-
ribus redundantibus. Dum autem effusaescit mu-
stam, Euphrasiam jecenda. Calida autem & sicca
est herba, sed tamen magis sicca quam calida.

EUPHRASIA PARVA PURPUREA.

Tota palmarem non assequitur altitudinem,
coliculis multis singulari, tereti, hirsuto, aliàs à
radice statim duobus minoribus (picà vnciali aut
longiore summo orante, flosculis stipata pur-
pureiscentibus, alternante cum foliis imbricatis
sitis, cuiusmodi & alia foliola circa immum caulem
conspiciuntur, sed superius litora summo tenuis,
ferratim secta, pro radicebus sunt multitudine; du-
misticulae, pili instar tenues fibræ: secundam Do-
donaeus fecit, inquit Lobelius in Obs. pag. 22. qui
postea p. 261. eam pro Euphrasia 2. Dodonaei (sic
etiam in Icon. Plant. pag. 496. inscripsit) sine Cra-
tægono altero quocundam pinxit.

Describitur bis apud H. Lugd. binisque iconi-
bus exprimitur, priori p. 121. pro Sideritide prae-
tensis rubra: posteriori p. 167. pro Euphrasia secun-
da Dodonaei, quae icon melior.

C. Bauh. phyt. vocat Euphrasia 2. sine praten-
sem rubram: Thal. Ericoides rubrum, vulgò Tri-
ticum leporinum.

Montebelgardi abundat in agris florens Iulio,
Augusto, & Septembri. Huius varietatem flore
niuco, totamque candidiorem reperi Septembri
inter Villarsuxel & Grammont in Burgundia.

De temperamento, aut facultatibus aliis nihil
attulit Dodonaeus.

CORIS MONSPESSVLANA LVTEA.

CAP. LIV.



Simplex & Descrip:
Sigmoides est
radix caulis
singularis cu-
bitalis, ligno-
sus, teretes, ramis
aduersis diui-
sus; duris, li-
gnosus: folia
inferiora qui-
dem Hystopi
foliis similia,
vtrunque an-
gustiora, acu-
minata, caduca;
superiora verò
tenuia; Ericae
arborescentis.
æmula: ramuli
longas gestant
spicas hiantium
flosculorum

Inteorum, cum multis apicibus, flosculis singulis
subiectum foliolum, sapor acris cum amarore:
Folia & caules interdum omnino rubent.

An Celsipino. Cuius altera ad Euphrasiam
reducenda? An Lobel. in Adu. Sideritis odora
pusilla? Thallio dicitur Ericoides lutea pro Cori
ostensum: H. Lugd. pag. 121. Sideritis praten-
sis lutea: Camer. hort. Euphrasia flore luteo, à
Lobelio descripta item apud Thal. Euphrasia lu-
tea Dodonaei: C. Bauh. phyt. Euphrasia, sine
pratenfis lutea.

Monspessuli mense Augusto floret in monte
prope Castelneuf loco secco & saxoso, tota rubel-
la: Basileae lutea in monte Marchionatus prope
Leurach Augusto: Frater etiam in pratis proue-
nire ait.

Locus
Tempus

SYMPHYTUM PETRÆVM
veteribus.

CAP. LV.

Symphytum petræum nascitur in petris: ramu-
los habet Origano similes, tenues, capitula
veluti Thymus [καρπία δὲ καὶ ὁμοία ὀρίανθῳ, λέπτει,
συμπίπτα καὶ ἀλμυρὰ δὲ ὁμοία: & ita legit Orib. itaq;
vulg. Sed Sarr. ex Ald. addit post λέπτει, vocè, ὀνόμα
cod. v. l. c. t. i. o. s. i. t. ramulos Origano similes, tenuia
folia, capitula verò, &c. Matth. cōtra legēdū suspi-
catur, καρπία δὲ καὶ ὀνόμα ὁμοία, hoc est, capita &
folia Thymi: Anguill. tandem legendū vult;
ὀνόμα καὶ καρπία: nos communem sequimur, quam
etiam Ruell. & Marcell. approbant. Totum verò
lignosum, odoratū, & gustu dulce est, saluamque
ciens [πύλον ἀντισηκλῆται. Sic & Plin. & Apuleius.
Et hac certè ratione ἀντισηκλῆται esse crediderit Sarrac.
attamen pro iis vocibus apud Orib. legitur τὸ
πύλον, quæ lectio Matthiolo in prior. comm. pro-
batur, in post. tamen lectionem Dioscoridis, non
Oribasii retinet:] radice nititur longā, subfiliā
[ἀντισηκλῆται, Orib. ἀντισηκλῆται, Plin. ruilam descri-
bit, Apuleius fuluam:] digitali ferè crassitudine.
Decoctum in aqua multa & potum, quæ pulmonis

Diose lectio
Sarrac. illa
fratid.

harent excrementa repurgant: sanguinem reu-
cientibus ac nephriticis cum aqua exhibetur. Bi-
bitur & ad dysenteriam, rubentemque fluorem
mulebre in vino decoctum, uti ad conuulsa,
ruptaque cum aceto mulso. Quin & comman-
ducatum suum sedat: faucibus alpeis subuenit,
illitum recentia vulnera glutinat, & enterocelas
cohibet. Quin & carnes, dum coquantur, con-
glutinat additum.

*Symphyton
petraeum co-
riscum Gal-
leno.*

Symphyton petraeum ex contrariis constare
viribus lib. 8. simpl. d. xit Galenus: habet siqui-
dem siccandi vim quampiam, quā collectum in
thorace pulmoneque pus expurgare potest: ha-
betque etiam quandam contrahendi vim, quā
ejecionibus sanguinis auxiliatur: & tertia insu-
per ineti humiditas quaedam non immodicē ca-
lida, per quam gustatibus dulce apparet, & odo-
ratu iucundum. Mustum sicut extinguit, & arte-
riae asperitates sanat.

Hermol. coroll. 618. proponit descriptionem
Symphyti petrae ex Plinio, quasi propria esset:
addens Venetos Cotoneam appellare ex Plinio:
rosae radices, alibi albae, alibi nigrae. Hic notan-
dum Hermolaum in prima edit. Ital. & in Colo-
niensi legere, rosae, ubi Plinius noster habet
tarax.

Cornarius, qui & ipse tarax legit, in comm.
med. in Galeni librum 1. caput 5. τὸν κατὰ τόπον,
ab ipso scriptis per Cydoniam herbam Alum &
Symphytum petraeum intelligit, eod quod Plinius
Cotoneam appellare Venetos Alum prodit-
dit.

Ceterum, Symphyti, Solidaginis & Consolidae
nomina plurimae habent plantae. Symphyti pe-
traeum Matth. Coris caerulea Monspessulana.
Coris lutea Monspessulana. Gypsophyton.
Saxifragia maior Matth. Symph. petraeum Cor-
di. Trachelium minus. Trachel. album. Hyl-
sop. vulgare. Polium vulgare montanum. Sa-
nicula. Purnella. Consol. media. Virga
aurea. Centaurium. Flos Solis. Bellis maior.
Symphytum magnum: Radice tuberosa. Pa-
rallum repens. Pulmon. Italica. Coralloides.
Helenium. Nicotiana. Tragus verus. Gly-
cyrrhiza.

CORIS MONSPESSVLANA, purpurea.

C A P. LVI.

Descriptio

Monspessulanis Coris appellatur concinna
planta, quae ex radice crassa, lignosa, nigri-
cante, quamplurimas per terram sparsas emittit
virgulas, ut vix utraque manu coactas omnes
possis interdum complecti, palmares aut bipal-
mares, tenues, rubentes: per quas folia den-
sissima, Thymi foliis quodammodo similia, sed
longiora, aequabili vsque latitudine, & Thymi
foliis minus nigra, summae virgulae spicas susti-
nent vncias circiter duas longas, Thymi vulgaris
vel Serpylli, crassiores, confertissimis floribus sti-
patas, immortali purpurā caeruleoue arideis, hian-
tibus, de quatuor foliis compositis, bifidis
omnibus: quibus succedunt calyces parui, in
aculeos exeuntes, semen continentes paruum,
nigrum: nullum ego in vlla parte plantae, siue
odorem siue saporem manifestum sentio.

Coridis huius Monspeliensis figuram de meis



plantis siccis
Gefnero com-
municatam,
apposuit Ca-
merarius in E-
pit. capiti
Symphyti pe-
trae Matthio-
li, itemque a-
pud Matth. in
Hist. germ. v-
bi Symphyti
petraeum, Cō-
solidam pe-
traeam, & Alū
Plinii cogno-
minat, germ.
Etingūnsel.
Mompellia-
ni referente
Clusio Corim
hanc quorun-
dam, Gallois

sc. & Hispanorum [sic namque is inscribit] eam
esse existimabant quam Graeci κατὰ τόπον, ap-
pellant, cuius sanē descriptioni multis nouis re-
pondere credit.

Lobelius [qui in Obs. pag. 220. itemque Ic.
Plant. p. 402. figuram clusii habet, ac aliam ex Ad-
uerfariis] Corim suam Monspeliacam, nisi apissi-
mē quadraret, Eucam minorem putasset, aut mo-
diū cuiusdam inter Hypericum & Augam na-
turae. Iam non aliò quàm ad Corim ietheri arbi-
tratur, posseque nos adducere ad Symphyti per-
fussionem, verum meritis non omnia penitus
quadrare videri. An autem Coris Dioscoridis sit,
ut voluit Lobelius, affirmare nondum ausim, nec
etiam Symphytum petraeum asseruerim.


Coridem Monspeliacam, ut Tabern. quoque
inscribit, vocat gerum. Erdasser von Mompelher:
C. Bauh. phyt. Corim 3, siue caeruleam maritimam
cum Symphyto petraeo Matthioli, excepta radice
lignosiore, optimē conuenientem. Apud Mat-
thiolum Frater longē alterius est opinionis: ait
enim Symphytum Matthioli minimē cum Co-
ride caerulea maritima confundendum esse, siqui-
dem Coris amara sit: flores purpureo caerulei ra-
rius purpurei. Coridis quin potius à Dioscoride
& Plinio propositae notas plures habere credi-
dit.

Florentem copiosē vidi Monspelij apud littus Ioco-
maris, Vere, itēque Venetiis: C. Bauh. ad mon. Tem-
tus Cetiradices, Maio. Floret Maio, inquit Clu-
sius, nonnunquam etiam Martio mense, siccis
quibusdam circa Salmanticam & Mompelium
locis maritimis, item Valentinae & Galliae Nar-
bonensis, ubi tota maior, crassior & succulentior
nascitur, ut ferē solent omnes maritimae stirpes, si
cum eis, quae macro & arido solo proueniunt,
comparentur.

GRATIOLA.

C A P. LVII.

Vertim luxuriant huius radices, petrae anse. Des-
crinā crassitudine, oblique reptantes, albae,
crebris geniculis nodosae, à quibus plurimae de-
mittuntur fibrae, albae: caules plures dodrantales
surgunt, teretes, propter terrā rubentes, superius
ex albedo



sex albedo vire.
f. ètes, creber-
rimis genicu-
lis distincti, ad
quorum sin-
gula folia bina
sponaria mi-
nora, nonnihil
in ambitu cre-
nata, nascun-
tur, & ex eorū
alis, modò sur-
culi foliis Hys-
sopi minimè
crenatis dona-
t, modò flores
singulares,
striati, oblon-
gi, colore quā
pediculo se-
munciali & lō-
giori commit-

tuntur subflavo, per reliqua albo, excepto folio,
ex quatuor quæ habet, supremo sursum reflexo,
quod interna parte lanuginem luteam ostentat,
insidet autem totus fl. is calyculo quinque parti-
to, cui bina foliola Hyssoi apposita: portò autē
pericarpium ex rotundo oblongum est, semen
contingens minutum: Tota planta insigniter a-
mara est, & inodora, quadam cum obscura adstri-
ctione.

Mathiolus, si Ruellium intellexisset, facilè ex
eius Gratia Dei descriptione collegisset, cum de
planta à nostra aliena, Elaphobolco scil. scribere.
Crediderant nonnulli [inquit Commentator]
herbam hanc quæ vulgò ab aliquibus Gratiola
vocatur, ab aliis Gratia Dei, quibuldam etiam, vt
à Foroiulienfibus, *Stanca caualla*, quodd equi eius
pabulo mirè defatigetur, esse Hysopum illud
montanum, de quo Mesues in suis scriptis men-
tionem fecit. Sed ij omnium ferè iudicio, eu-
identius hallucinati sunt, quàm pleribus demon-
strare sit opus. Qui verò [cum Quercet. & Cor-
do] Mesues Eupatorium esse contendunt, omni-
nò cæcutiunt. Sed & Ruellij sententiam explo-
dendam putauerim, si per Gratiam Dei, eam plan-
tam intelligit, de qua differimus. Hæc Matth.
passim gratiolam vocat: Nos dicimus Ruellium
Elaphobolcum per suam Gratiam Dei intellige-
re. Et hæc occasio est, cur Amatus in Diosc. in Ita-
lia longè aliam herbam, quàm in Gallia pro gratia
Dei indicari dicat.

Cordus plantam nostram Limnesij siue Cen-
tauridis titulo describit in Hist. vbi pulchra figura
à gesnero addita. Dodonæo videtur species Cen-
taurij minoris. Anguill. epist. 14. proponit discuti-
endum, an gratiola, Semen vomituum hodie
in Syria dictum, sit Papauer spumeum: Gilbe-
nech Auicennæ eius nuncupans semen.

Label. in Aduers. & Obs. p. 238. itemque Ic.
Plant. pag. 425. Gesn. hort. Gerard. & Tabern. vo-
cant gratiolam, germ. wild. *Zurin*, begde hyssope:

C. Bauh. phyt. gratiolam centauroidem, varian-
tem flore purpurascens, albo, rariùs futeo: foliis
aliquando integris, frequentius tamen crenatis.
An frater hanc floris varietatem, itémque folio-
rum ipsemet obseruauit, suo tempore monebit.
Matth. sanè florem in purpura albicantem perhi-
bet. Dod. verò albam.

Ego flore subcæruleo copiosam inueni Gene-
uæ secus viā, & in prato inter Bourdigni & Thuri-

florètem Iulio: abundantem in prato watvillien-
& Bostvillien. Nascitur Ebroduni in locis humi-
dis, præc. pue in pratis palustribus, lumio, Iulio &
Augusto florens. Prouenit quoque spontè vlg-
nosus & palustribus locis Germaniæ, nec non Ita-
liæ: Belgis hortensis est, eodémque tempore cum
flore reperitur.

Excalfacit, siccit, incidit, attenuat, aperit, dei-
cit, abstergit, aluum vehementer purgat, tam re-
cens, quàm sicca sumpta, bilem pituitamque tra-
hit: vulneribus celeriter medetur, ea glutinando,
trita & imposita, authore Matthiolo. Est autem,
vt amarissima, ita etiam temperie excalfactoria &
essiccans, eximiam simul expurgandi, cum per
superiorem, tum per inferiorem ventrem poteri-
tiam obtinens, teste Dodonæo: Educt verò non
modò lentam pituitam, verum & crassam flauam
bilem. Prodest aduersus diutinos coxendicis do-
lores, & aduersus inueteratas febres, siue tertia-
nas, siue erroneas: iecur & liénem expuigat, ab
obstructionibus liberat, ventris lumbricos pellit;
putredinibus aduersatur: Dosis macerata aut de-
cocta est à drachma vna, vel una & semis, ad duas
vel amplius paulò.

Bovius ad quartanæ febris curationem mirè
extollit eius decoctum. Gesnerus Gratiolæ suc-
cum *lousinæ*, vt elaterio futurum arbitratus est.
Herbæ verò trita scrupulum vnum & scrup. i. &
semis cum Rob. acinorum Sambuci post horas
quinque, copiosè suprà infraque, mirè phlegma
& aquas detrahare retulit, sed non sine molestia:
Et hinc pilulis cum Zingibere, sale gemmæ, &
Cinnamomo; vt citius agat, & minis offerdat
ventriculum, Gratiolam propinandam suadet.
Rulandus ad ilchuriam pro potu exhibet deco-
ctum eius. Cordus affirmat eam purgare egre-
giè bilem & pituitam, nihil interanea lædentem:
quoniam horribili isto ac ingrato odore, quo cæ-
tera purgantia medicamēta prædita sunt, careat.
Recitat Bouius in Flagello / historiam de pane,
quo multorum alui commotio, quia fornax repur-
gatus & mundatus Gratiolæ fasciculo fuerat, & in
eo combustus. Medicus quidam haud vulgaris,
non contemnendum consilio, loco pulueris Gra-
tiolæ, eiusdémque decocti, salem extrahendum
consulit, eoque prædictis in morbis vitendum.

Vires
Vius

GRATIOLA ALPINA.

C A P. LVII.

Vix sefciunciam excedit coliculus, qui singu-
latis, superiō parte vbi aliquot flosculi, bifidi,
per quem folia, duo aut tria oblonga, inferiora
latiuscula, vnciam circiter longa, sapore nullo e-
uidente, multis tenuibus fibris raditur. Floren-
tem inuenimus mense Iulio in monte Braulio
Rhætorum.

TERTIONARIA ALIIS LYSIMACHIA galericulata.

C A P. LVIII.

EX Lysimachiarum classe, vt voluerunt qui-
dam, earum magnitudinem vix vnquam alle-
quitur, contractionibus caulibus breuioribusque,
quadratis, rigidulis, articulatis, in crebras alas di-
uisis: folia ad genicula ortum habent, gemina
aduersa, Betonice æmula, minora, petio-
de rugosa, rariùs per ambitum serrata, sapo-
re insigniter amaro: ex quorum alis flores terè

Descriptio



Tertianaria nomen
Sinde adp-
ta.

attulit à se ibi collectam) in officinis ob eius v-
sam ad tertianas usurpatam, Tertianariam co-
gnominari.

Nos eandem planè credimus cum *Lyfimachia galericulata* Lobellii in Icon. Plant. p. 344. & Obs. p. 186. de qua ait. Riuulorum & fluminum ripas & de pressis agrorum margines Londinensis & Antuerpiani agri sequitur hinc: plures emittit quadratos sesquipediales & bicubitales geniculatos pediculos: in quibus folia *Lyfimachia* purpurea similia, Scordii æmulatione atro-virentia, ex geniculis gemina, è quibus instar galeculæ flores caruleo-punicantes: radice variè diuaticata repit, vt nullidum hætenus descripta aut depicta, sic vñ neglecta, aut incognita. Hæc ille, qui *Lyfimachiam* suam galeculatam caruleo-purpuream ad Aduersariorum paginam 144. refert, sic tibi nihil penitus legatur, quod ei conueniat. Huius demum *Lobeliana* galeculatæ *Lyfimachia* bini flores ex foliorum contrario situ in cauleculis quadrangulis nascentium, sinibus prodeuntes, semper in anteriorem partem præpendentes æqualiter, & contigui, vt ex eodem sinu orti videantur, quod pictor in eius icone teste Clusio, in vnico duntaxat nodo & geniculo obseruauit, plantam delineando.

Lyfim. ca-
raucagaler-
C. Bauh.
Terzella.
Locus &
scampus,

C. Bauh. phyt. vocauit *Lyfimachiam* is. siue *caeruleam*. Reform. Worm. *Tertianariam*, *Terzollam*, siue *Terzellam*, sieberfräut.

Tertianariam obseruauimus prope Montbelgardum cundo *Souchaut* loco humido prouenientem cum Scordio, & florentem Iunio mense. Ea enim aquis & palustribus plurimum gaudet. Nec minus feliciter in hortum Montbelg. translata floruit Iunio Iulioque, vbi tandem æptatu suo Hortulano valde odiosa facta, difficulter extirpata fuit. C. Bauh. collegit non longè à Basilea Michelfeldenib. humidis locis. Clusius nasci ait copiosè in Vngaria, Austria Stiria, Moravia, Bohemiaque, secundum riuos & montibus defluentes.

CRISTA GALLI MAS ET FOEMINA.

G. A. P. LIX.

Descriptio.

Crista galli Herbariis dicta, duplex mihi obseruata, mas radice est exili, caule pedali & sesquipedali & recto, tenui, quadrato, inani, in

coningi surrecto rubulo emicant, ex violaceo in pallidum languente, labellis punctulis saturationibus picto, galeculata fibras argenteas occultante, ex calyculo breui, gibboso: radix tenuis serpit, adeoque & caulis ex geniculis demissis fibris denud indicari solitus.

Turnerus insignis Medicus nobis coram affirmavit, Heidebergæ (vnde

Crista galli mas.



Crista Galli feminas.



ramos: aliquot dimisso, quos aduerso sita posita bina semper ambit filia sine pediculo, ad exortum latiuscula, sensim in mucronem desinentia, altius crenata, galli cristam æmulantia, circum plantæ summum tatem magis quam in lacinia albicantia, sapore nullo insigni: in summo ramorum aut caulibus, ex foliorum alis flores vñ cū folliculo compresso hinc & lacinato, è quo prominent, pallidam gloriem inebant, & que exprimit: quorum superius solum caput galleaceū deformatuteū, rostro caruleo, in quo occultantur apices hirsuti quatuor, duab. lacinis excauati: inferius verò intensius croceū in tres lacinias abit stigmatibus nigris guttatis: v-

triculi foliacei modicè protuberantes, hirsuti, vascula continent membranea, lucida, in quibus semen rotundum, compressum, sinuatum, cum membraneo margine, colore fulco, sapore nullo effatu digno.

Fœmina humilior est, caule minùs robusto, foliis angustioribus, floribus multò minoribus, summitatibus minùs albescens, vtriusque glabris.

Figura nostra Fuchiana minùs acurata, mater potissimum exhibet: altera verò ad plantam virentem delineata fœminam demonstrat.

C. Bauhino excepto haud dum aliquem scio, qui *Crista galli* aut sexum, aut varietatem saltem obseruauit. Pedicularis 4. siue *pratensis lutea* (inquit in phyt.) variat magnitudine & latitudine foliorum: item caulium numero: altera enim est pluribus caulibus donata & angustioribus foliis, quæ rarior. Floribus est luteis, rariùs candidis: semen nigrum aut subluteum.

Vtramque Cristam, marem & fœminam exprimere videtur Lobelius in Obs. p. 285. itemque Icon. Plant.

Plant. p. 529: per Cristam galli Herbariorum, de qua in Aduers. quaerit, num sit *Αλεκτορολογος* Plinii? annum potius *Alliaria* recentiorum?

Tabern. in Icon. & Hist. Pedicularis lutea picta. Aurâ maris Gallinae cristâ proponit. Tragus pro Pediculari campestri secunda describit, eamque modò pecori nociuam, modò innocuam ait, non sine hallucinatione. Schvvenkf. Fistulariam luteam vocat.

Ruellio (& post eum Anguill. & Tabern.) Crista gallinaea propius ad Plinianam Alektorolophi picturam accedere videtur. Haud quoque dubitat Clusius quin Alektorolophi genus sit ea planta, cui Cristâ gallinae nomen indiderunt recentiores. Alektorolopho, inquit Dodonaeus, similior, quàm Mimulo, Crista galli nostra videtur.

Germani *Reetodel* aut *lenzkyant* nominant: Belgæ *Ratelen* & *geele Ratelen*, & plerique *hancamnekens*: Itali referente Anguill. *Crista di gallo* & *Centro galli*.

An porro Ruell. lib. 3. cap. 55. dicitur Cannabis rustica Herbariorum? An Cristarum genera duo in montium pratis Casalp.?

Exit passim in aruis, & non rarò in pratis etiam siccioribus, utrobique inutilis & vitiosa; plurima Aetatis parte floret, Dod. & Clusio testibus. Nos in valle Griesbachiana, ubi fontes acidi, vtramq; obseruauimus.

Quâ autem Crista galli facultate aut potentiâ prædita sit, nulli adhuc curâ fuit, cognoscere, cum inutilis vel Dod. dictatore habeatur. Dementius tamen Pedicularis granatiria cribrata, tribus carnis adiectis partibus accipitri dat per quadraginta dies, ut nunquam destillatione laboret, neque gestatus, neque inclusus.

CRISTÆ GALLI AFFINIS PLANTA Romana, siue Crista galli maior Italica.

CAP. LX.

Geniculis
per caulem
ramosque hirsu-
tos bina adnascuntur ex aduer-
so sita folia,
Sideritidis aut
Cristæ galli, longi-
tudine fescun-
ciali, latitudine
semuciali, hirsu-
ta in acumen de-
sinentia, serrata,
longis nervis di-
stincta, à quibus
in diuisurarum
lacunas venule
excurrunt: ex v-
niufcuiusque fo-
lij sinu flor exit
vnus luteus, pa-
tulo recto stami-

na proferens hirsutis apiculis donata, è calyce longo, vnciali ferè, striato, hirsuto, per extremam oram laciniato.

Circa Romam secus vias copiosam obseruauit I. H. Cherlerus Maio florentino, cuius ramum secum attulit.

Tom. III.

ANTIRRHINVM ALBUM SERRATO folio.

CAP. LXI.

Hæc planta, quam Antirrhinum album serrato folio vocare libuit, donec vel melius nomen occurrat, vel apud aliquem autorem eius mentionem inueniatur, vnico, recto, ad cubitum,



nascuntur, prouenit, Vere florens.

interdum duos
alto caule allur-
git, in quo folia
eo ferè ordine
quo Lini dispo-
sita cernuntur,
satis dura & as-
pera, pulchrè
serrata, longa
satis & angusta:
flores albi ferè
similes sunt ma-
iori Antirrhino,
satis magni
proportione
plantæ: calycib.
vituli narium
æmulis succe-
dentibus.

Montspelij in
prato quodam,
in quo species
duæ Narcissi

PEDICULARIS, QVIBVSDAM CRISTA galli, flore rubro, & albo.

CAP. LXII.



Habet hæc
planta in
florum forma
aliquid cum
Crista galli vul-
gò dicta simile:
emicant enim
ut in illa ex ve-
niculis laxis
glabris, verùm
non ita com-
pressis, canali-
cularis, tantillâ
cum multo vi-
rore rubescen-
tib.: colore sunt
rubro, aut car-
neo, aut albo,
folio superiore
rostrato, apices
luteos quatuor
binâ cavitare,

ut in Crista galli vulgari flaua insculptos, stilumque purpurascentem sinu suo occultante: infiore in tres lacinias circinatas profundè inciso: folia cum Filipendula nonnihil habent simile, at longè minora, minutiusque incisa, colore viridi, vel spadiceo, in caulibus angulosis, concavis, palmaribus, dodrantalibus & cubitalibus: radix, nonnihil amaricat, alba, rugosa, forma radicis

Bbb

Pterofolini vulgò dicti, minimi digiti crassitudine vix attingens, in crassiusculas fibras diuisa. Ex summa porro radice folia exoriuntur lata, crassa, in mucronem desinentia, per ambitu serrata, ex quorum sinu reliqua folia cum caule emergunt. Sic & primogenitæ plantæ folia prima Dryopteris æmula formâ & laciniis, vt etiam aliquos fallere possit. Ceterum in semen fœcundum, rotundum, in valculis magnis falcatis, in rostra desinentibus.

Pedicularis
Lob. Ped.
Alectorolophi
phos.

Lobel. in Icon. Plant. pag. 748. Pedicularem inscribit, in Obs. verò pag. 431. Pedicularem Alectorolophon, eam in Aduert. Pliniano Alectorolopho minus quadrare, repetit: & inter Filipendulas, aut Millefolium reddendam censuit.

Quod porro Pedicularē vocari ait, quod facultatibus sit virosis, pratis infesta, & pediculis hectis, à Dodonæo dissentit, qui hanc pediculos generare tradit. Fistulariam (inquit in Histor. frum. & Lat. in fol.) Germanorum plerique *braun Rodel*, alii *Leufz kraut*, *Braun leufz kraut*, *Gwæc ebs piep*, Latine Pedicularem ab effectu nominat, quod pecori ac iumentis, quæ in pratis vbi hanc prouenit, pascuntur, pediculorum copiam gignat: Belgæ *Roode Ratelen* appellant: Et hæc Dod. qui in Hist. gall. Alectorolophon inscripsit, ac gallice *herbe aux pouls* appellauit.

Pedicularis
campestris
Trago.

Tragus Pediculariæ campēstris titulo pinxit, ac prioris cognomento delineauit: H. Lugd. pag. 1074. Cristæ galli alterius, seu Phthirii. Gesn. in desc. mont. Fracti lib. de Lunar. Pediculariam Tragi vocauit. Cluſius in Hist. post. Alectorolophon 3. & tertii genus alterum inscribit, ac Fistulariam à caulis cavitare vocari opinatur. Casp. Bauhin. Pedicularia. siue pratensis purpurea.

Locus &
Tempus.

Genevæ flore albo sed crebrius purpureo obseruauit, pedalem, altiore & ramosam, florentem Maio iuxta *Arne*. Prouenit quoque in Michelsfelden, inter Montbelgardum & Basileam aliquibus in locis, in valle Griesbach & aliis pluribus locis aquis circa Montbelgardum, semine maturo Iunio nascitur, inquit Dodonæus, in viginosis pratis: herba non solum parum vilis, sed & noxia, ac pratorum ipsorum vitium: Maio ac Iunio mensibus cum flore ac valculis reperitur.

Vires
Vilus.

Creditur, eodem Dod. referente, ad fistulas & sinuosa vlcera vilis esse, nec non menses & aliunde profluentem sanguinem, in viho austero decocta potaque sistere. Quis autem Medicus propter virosam facultatem intus sumendâ præsentibus, suauioribus medicamentis suaderet.

PEDICVLARIS MAIOR DAlechampi.

Descriptio

Plantam siccam ab ipso Dalechampio habemus, quam sic descripsit. Filipendulæ Alpinae affinis est: radice foris nigra. Napi modo gracilescens, rugosa, nonnihil furculosa: caule ferè cubitali, virgato, vnicò foliis Filicis in longo pediculo, ordine collocatis, per ambitum crenatis, exeunte per caulem alternatim vnoquoque foliorum pediculo: flore pallido, spicacim in summo caule congesto: semine copioso, in latis corticosis valculis concluso, Alyssi modo.

Pedicul.
pro ior alpi-
na.

Inscribitur apud H. Lugd. pag. 1138. Pedicularis maior Alpina: apud C. Bauh. in phyt. Pedicularis 2. siue Alpina maior folio Filicis. An Alectorolophi Alterum genus Clusio.



PEDICVLARIS VBLBOSA.



Complures emittit caules, pedales, concauos, in quorum cacumine flores multi aceruatim cõgesti, cucullati, Pedicularis, maiores: folia palmatibus nixa pediculis, pinnatis, Filipendulæ diuisurâ, statim ex radice prodeunt, qualia per caules, pauca, præterquam in summate vbi strom spica incipit, quo loco satis sunt frequentia: radices capillari-bus fibris intertextæ, multæ, principio angustæ, sensim extruberantes, multum Filipendulæ radicibus cedentes: vestigia veterum caulium demonstrant non esse annuum stirpem.

Lobel. Ic. plant. pag. 730. Oenanthe siue Filipendula altera montana.

H. autem Lugd. huius plantæ duas & descriptiones & figuras deasse credimus. Et earum quidem primam p. 784. pro Oenante siue Filipendula altera montana Penæ: Alteram p. 786. pro Oenante alia Myconi, quam Filipendulæ genus esse iudicat ex foliorum & radicum similitudine, eodemque lapore.

Clusio Alectorolophus Alpinus maior siue 1.

An Gesnero Herba foliis Aspleno similis?

In altissimorum montium verticibus vt Norbonæ ad Veganum. in Dci paradiso vocato Calcar contermino eruta à Lobelio. Iulio florentem in Gothardo euulsit gener Cherlerus. Clusius vtrumque genus in summis Alpibus Durrenstain, Etscher, aliisque celis & herbosis iugis nasci obseruauit: posterius etiam in inferioribus viginosisque pratis. Meminit & in Flandriæ pratis humidioribus, etiam Gentilly pag. 6 vicinis, non procul Latetiâ Parisiorum.

PEDICVLARIS

PEDICVLARIS ALPINA FLORE
luteo, radice nigra.

Hæret radi-
ce crassâ,
nigrâ, multifidâ,
folia ex radice
profert longo
pediculo nixa,
quæ foliolis
multis constant,
toto ambitu mi-
nutissimè inci-
sis, ex aduerso
sitis, vt in Fili-
pendula, quæ
caulâ nominis
fuit: *caulis* pe-
de altior flores
luteos spicatim
ferè corgestos
in vertice susti-
net, quibus di-
latis valcula
succedunt ob-

longa, Anthrini oculis similia, minuto *semine* plena.

Apud Hist. Lugdunensem pag. 1158. Filipendula Alpina titulo habetur. C. Bauh. phyt. Oenanthe n. siue Filipendula similem alpinam luteam cognominat.

Eam gignit summa Alpium iuga, pascuis pratis, & vberissimo fœni prouentu greges innumeros atque armenta saginantia, indeque rusticos ditantia.

MELAMPYRVM VETERIVS ET
in genere.


CAP. LIII.

DE Melampyro veteres obiter duntaxat & obsecrè nimis egerunt. In genere Frumentorum (inquit Theophr. lib. 8. cap. 5.) Siculum satis purum, & præcipuè Agrigentinum siue Lolio exit. Siculo autem, quod priuatim Melampyrum vocant, proprium datur, quoddam innocuum sit, nec sicut Loliū graue & capitis dolores faciens: Idem c. 8. Loliū ex Tritico & Hordeo corruptis nascitur: Vel si id minus, nasci quidem inter Triticum solitum esse, nulli dubio est: vt etiam Ponticum illud, Triticum atrum [*melampyrum*] cognominatum.

Sed & Galenus simile quid de Melampyro memoriz prodidit, ita vt à Theophrasto sua mutasse deprehendatur. Sic namque Alim. 2. ait: Ex Tritici mutatione nascitur Melampyron, vt ex melino nigrum fiat, & tamen tale, multò minus malignitatis quàm folium habeat. Item Alim. 1. cap. vlt. Melampyron dictum, sit ex mutatione Frumenti, sed prauitate quàm plurimū à Lolio relinquatur.

A Melampyro hoc Theophrasti & Galeni diuersum dicimus Melampyrum quorūdam, quod Dioscorides Myagrum appellauit. Sed fortè illo loco cum Paulo legendum Melampycon. Melampyron etiam de quo hic agimus, Strephuros Plinij quibūdam esse videtur lib. 21. cap. 16. Aliis eiusdem Alopecuros lib. 21. cap. 17. sed malè, Tom. 111.

referente etiam Casp. Bauhino. Hic autem eius Aeram lib. 18. cap. 17. esse credit, quamuis hoc nomen Lolio melius fortè tribuatur. Melampyrum multis hodie videtur esse Triticum vaccinum, de quo iam iam sermo instituendus.

MELAMPYRVM MVLTIS, SIVE
Triticum vaccinum.

Lignosâ est Descriptio
& exigua
radiculâ, ali-
quot consimili-
bus fibris do-
natâ: ex qua
surgit *caulis* sin-
gularis, quadra-
tus, hirsutus,
purpurascens,
multis alis con-
cauus: *folia* ex
interuallis. ex
aduerso posita,
Linariæ alia, a-
lia lata & pro-
fundè laciniata,
aspera, atro-vi-
rentia, at quæ
in supremo
thyrsio sūt, cre-
briora existunt,

brevia, latiora, digitata, hilari purpurâ tincta: ex quorum alis galeati flores exeunt subhirturi, casside purpuratè, labello luteo rubore confuso, ceruice penitè luteâ, reliquo tubulo purpurascente: quibus succedunt in capsella oblonga turgida, tegmine membranæ in aristas desinente breuifusculas obuolutâ *semina* duo aut tria triticeis minora, nigriora.

Triticum vaccinum siue bouinum flore purpureo, candido interdum, sed rariissimè, conspiciendum se præbere legitur apud Triagum, qui narrat femina purpureo colore tincta, Tritico, vel Speltæ admixta (quod apud M. diomartices, frequenter solet) panem reddere purpureum. Agricolas verò *kyrweizen* à semine Tritici re-
ferente, vocare: quomodo verò in Dioscoride
appelletur, sibi non constare.

Gesl. de coll. stirp. Triticum vaccinum à Tra-
go descriptum inutile perhibet Medicine, vocat-
que Vitiū Tritici, germ. Brand: non deunt ta-
men qui *Braunsfleischblumen* & *Mohren weizen*
appellent: Belg. *Peertz bloemen*: Galli *Blé noir*,
Blé de vache, *Blé de bœuf* & *rouge herbe*, Atreba-
tib. h. e. Herba rubra, à comæ colore.

Triticum vaccinum vocat Dodon. gall. lib. 2.
cap. 14. eius figuram quoque habenti lib. 4. cap.
16. Melampyri titulo) & lat. de frum. & in fol. &
Hist. Lugd. p. 419 itemque Cordus. Melampy-
rum Lob. in Adu. Obs. p. 23. & Ic. Plant. p. 37.
ac etiam Tabern. Melampyrum i. siue purpu-
rascens comâ, Melampyron Galeni & Theophr.
ac etiam Aeram Plinii, Casp. Bauh. in phyt. Me-
lampyrum Belgarum & *στύλινος* Plinii Lobel. in
Aduers. dicens: Melampyrum Dodonij cogno-
minauit Camer. hort. & Thalius, qui varias pas-
sim eius obseruari species prodidit. Quæse non
nominato ex eo sic recenset C. Bauh. Variat
floris colore, flos enim infernè candidus, super-
Bbb 2

Tritic. lib. 2
n. m. flos
re albo.

Tritic. vms.
c. m.

Tritic. vms.
c. m.

Herba rub.
bra.

Melampyri

Melampyri

Melampyri

Melampyri

Melampyri

nè luteas: sic ex albo viridique mixtis: item floribus luteis, in summo albicantibus: sic infernè puniceus, superne luteus, foliis minoribus, & tandem flos infernè supernèque puniceus, medio candicans, folisque lacinia-
 tus.

Clus. in Pannon. p. 603. appellauit Parietariam siluestrem purpurantem comâ: In Hist. post. Parietariam silv. tertiam. Quo autem nomine veteri donari debeat, se ignorare fatetur. Trifolium maius dicitur Brunfels. tom. i. Rhaph. 14. pag. 47. Et tom. 2. Rhaph. 16. pag. 59. *Braunsfelschlym*, quam vocem Casp. Bauh. Trifolium purpureum reddidit, quàm rectè tu videris. Schvvenckf. Melampyrum purpureum, & Parietaria silv. comâ dilutè rubescente, Germ. *Vachtel vuentzen*.

Locus & Tempus. Genevæ, & Montbelgardi, ac in Asia inter segetes provenit, læto potissimum, pingui, ac restibili agro, cum frugibus florens & ad maturitatem perueniens in omnibus ferè provinciis: negligi ma-
 uult quàm in hortis coli. Si tamen alicubi experatur ob floris elegantiam, Autumno feri necesse fuerit: annua est planta, quæ maturo semine petire solet.

Vires & Vitis. Nullum quod sciamus in medicina vsum obtinuit, sed plerumque negligi solet. Scribit Clusius eam in Occidentali Fria seu Flandriæ parte [vbi copiosissimam ait] panem vitare & arriorem reddere: quinimò eos, qui eo vescuntur, plerumque capitis grauedine tentari solere, non secus ac si Lolio victitassent. *Ego semine* huius sæpius quidem panem tinctum obseruavi, sed nullum prauum saporem ei adferre deprehendi, nec insalubriorem à rusticis idè haberi animaduerti, nec eam vllò modo separare stident. Quin & Tabern. qui admodum lapidum panem ait, se sine vllò no-
 cumento sæpe comedis-
 se testatur. Gratus pastus bobus & vaccis faginandis, vt non incongruè forsan Pabulum bouinum aut vaccinum quis nuncupare possit.

MELAMPYRO AFFINIS, PARIETARIA cærulea quorundam.

Descriptio



pediculum laciniarum, molli-
 que lanugine pubescentium, coloris purpurei, nunc dilu-
 tioris, modo saturatiore elegantissimi & violacei: inter quæ bini semper inter se oppositi flores nas-

cuntur, longiores, concaui, aliquantulum hiantes, superiore labro nonnihil reflexo & villoso, inferiore latiusculo & deorsum propendente, coloris initidè lutei, deinde omnino aurei, omnes tamen, licet alternis contrario situ nascentes antrosus exortecti & spectantes, quod pector in hac Clusii icone delineanda tunc non obseruauit: *radix* candicans, quam subsequens Hiems corrumpit.

Clus. in Pannon. vocat Parietariam siluestrem primam cæruleâ comâ: In Hist. post. Parietariam siluestrem (quorundam, addit ad descr.) primam.

Camer. hort. Parietariam siluestrem vulgè vocari, quod miratur Clusius, refert, elegantissimam herbam hanc, foliorum comâ cæruleâ, vel dilutè rubescente, vel penitus candidâ: flosculis quâ parte suo conceptaculo tenentur, sanguineis, priore verò flauis.

C. Bauh. phyt. nominat Melampyrum 2. siue cæruleâ comâ, Parietariam Lipsien-
 sium Tragi. An verò sit Parietaria tertia Tragi, quam à Lipsiensibus Medicis veram Parietariam existimari tradit, dubitamus.

Schvvenckf. Melampyrum purpureo-violaceum, Triticum vaccinū 2. *Blangeel tag vnd nacht*, & *Ringelscheis* vulgè corruptè, cum potius dicendum *Rinder vuer*.

Agerius obtulit in Austriæ pratis collectam nomine Parietariæ silv. comâ cæruleâ. In Siliciæ silvis & aggeribus montosis Iunio & Iulio stans. Cre-
 scit etiam in Hungariæ, Austriæ, Morauie, Bohemiæ, ac quoque Germaniæ sepibus & siluarum marginibus, vmbrosisque locis. Ob insignem elegantiam & colorum varietatē hortis inferendam censet Camerarius, sed locis fructuosis, & circa sepes. Non vult enim in areis coli. Semen maturè colligendum, antequam exiliat è vasculis & statim reddendum telluri, vt spontè excidat. Nudum enim si contrectetur fecunditatem perdere existimatur.

Quidam vulnera sanare & liuores discutere arbitrantur. Sapore est subdulci, & nonnihil acri, simulque astrictionis alicuius particeps.

MELAMPYRVM CRISTATVM FLORE albo & purpureo.



pè incondita, oblonga, angusta, acu-

T Ortuosa nititur radice, parum altè demissa, lignosa, aliàs simplici aliàs apophyibus adnatis multífida: caulis singularis, pedalis & procerior, aliàs teres, aliàs angulosus, potissimum parte superiore, in ramos plurimum aduersos, inæquali interdum ortu, diuisus: folia plerumque opposita sæpè in-
 condita, oblonga, angusta, acu-

minata, Melampyri vulgaris: flores hiantes, eiusdem floribus respondent, coloris vel albi cum rictu luteo, vel purpurei, quos complectuntur duo folia latiuscula, figurâ Lunæ falcata, arcu minutis denticellis concinnè crenato cristatâque.

An Melampyrum 4. siue luteum angustifolium Casp. Bauhini in phyt?

Illud, cui flos albus cum rictu luteo, Iulio mentis florens inueni inter Schorndorff & fluvium & Fils, versus Forndorff. Alterum eodem mense florens inter Balneum admirabile & Nurtin-gam.

MELAMPYRVM SYLVATICVM

flore luteo, siue Satureia lutea siluestris.

Melampyri vulgarioris segetum radices habet, strigosus plerumque, coliculus dodratalibus, & cubitalibus, quadratis, subhirsutis, in frequentes ramos coniugatis diuisis: folia geniculis adnectuntur bina opposita, atro-purpureo colore maculosa, interdum culmum lata, interdum duplo latiora, vncias duas plus minus longa (ingrati & aliquantum acris saporis, Clut.) quorum quæ suprema floribus apposita sunt, vulgarioris Melampyri segetum modo lacinia existunt: cæteri ùm tubuli formâ flores hiantes alterius Melampyri, toti lutei sunt, conspectiores, bini & in vnâ ferè partem vergentes: quib, compressa succedunt rostro adunco pericarpia, semina tria, alterius non dissimilia, oblonga, comprehendunt. In hac planta obseruatur interdum colorem cæruleum, vel dilotè rubentem.

In Cratægoni Lobelij figura, quæ extat in Obs. p. 22. in Icon. verò Plant. pag. 36. flores requiruntur.

Clus. in Pannon. dicitur Parietaria silu. flore luteo: In Hist. post. Parietaria silu. (quorundam, addit in marg.) secunda, Cratægonum.

C. Bauh. phyt. Melampyrum 3. siue luteum latifolium, Cratægonū Diolecoridis. Schvvenckf. Melampyron luteum, Triticum vaccinum 3. flore nonnunquam candido, sapore acri ac vehemēti: vult sag vndt Nachr.

H. Lugdun. huius plantæ, ni multum fallimur, duas descriptiones habet & duas figuras: Cratægoni scil. 420. & Satureiæ luteæ Dalechampij p. 299. Et Hylopi nemorensis & luteæ p. 936. descriptionem tertiam siue figura: quod etiam animaduertit Frater: qui tamen etiam perperam apud Matthiolum duas figuras solo colore differentes tradit. Nec placet apud Tabern. in Icon. itemque Hist. Milij siluatici, siue Alinæ siluaticæ (huius sc. plantæ) duas poni figuras, colore tantum distinctas.

Crescit in sepibus, & siluarum marginibus, vmbrosisque locis Vngariæ, Austriæ, Moraviæ, Bohemiæ, atque etiam Germaniæ: floret Maio & Iunio, annua planta, Clusio. In siluosis collibus & dumetis, vmbrosis, Norbonæ, Angliæ, & Sabaudie, Pedemontis que passim multa Æstæ fruticantem obseruauit Lobelius. Abundat circa Montbelgardum in siluis: Geneuæ in colle la Bastie floret Iunio, & Tiguri, ac Basileæ in segetibus.

Milium vaccinum censuit calidum vsque ad 4. gradū Tabern. Quæ si hoc temperamento pollet, existimari haud temerè eam vsurpandam.

Tom. III.

Semen in folliculo exiguo Milio non dispari, cuius odor & sapor acris nonnihil testantur, vti & folia siccata. Ac tamen ortum in loco lacunoso & hiantes, tamen semen in pollinem pulueremque ductum, esse Veneris iugentium, & seminis genitalis quasi fermentum quoddam & ceterum non abs re retur Lobelius.

PERISTEREON, VERBENA, ET HIEROBOTANE, siue Herba sacra ex veteribus & in genere.

CAP. LXIV.

Quamuis *Ἐριφύων*, h. e. Verbenaca recta, & Descripti: *ἱερὰ βοτάνη*, h. e. Herba sacra, seu Verbenaca supina, passim ab auctoribus figurâ, viribus, & nomenclaturâ discernatur, tamen quia Plinius diuersum videtur innuere, & breuitatis studio vtramque vnâ inuolucere, visum nobis fuit ambas vno capite comprehendere. Verbenaca recta (*Ἐριφύων*) in aquosis nascitur: nomen autem grecum ex eo duxisse videtur, quod libenter circa eam [*ἡ Ἐριφύων ἐν αὐτῇ* pro quib. vet. *ἐν Ἐριφύων αὐτῇ*, in ipsa] columbæ commorentur. Herba est palmi altitudine, aut etiam maior, foliis incisis, subalbidis, è caule prodeuntibus: singulari plerumque ramo [*μονήλωνος τὸ πᾶν*, vet. *μονήλωνος*, Symb. *μονήλωνος*] & radice vnâ reperitur. Folia cum Rosaceo, aut adipe suillo recenti subdita, vuluæ dolori è adimere creduntur. Ipsa quoque herba imposita cum aceto erysipelata reprimat, putridaque vlcera cohibet: vulnera etiamnum glutinat, veteraque cum melle ad cicatricem perducunt a thore D. o. coride.

Sunt autem qui existereona rectum, qui *Peristereon*, qui *Ti gonion*, qui *Bunion*, qui *Sacram recta* *ἱερὰ βοτάνη*, herbam, qui *Philotrotem* vocet: *Ægyptij* *Pem-psempre*: *Magi* *Iunonis lacrymam*, siue *Multulæ sanguinem*, aut *Mercurij indem sanguinem*: *Romani* *Cristam gallinaceam*, *Feriam*, *Trixalim*, *Exuperam*, & *Herbam sagminalem*.

Sed & Herba sacra [*ἱερὰ βοτάνη*] quam etiam *Herba sacra* nonnulli *Peristereona* vocarunt, ramulos emittit cubitales, aut etiam maiores & angulosos, circa quos folia sunt ex interuallis, quernis similia, sed angustiora, minoraque [*καὶ ἡ ἱερὰ* vet. caret] diuisus incisa per ambitū, & colore aliquatenus glauco: radicem longiusculam & gracilem, flores purpureos ac tenues. Huius folia cum radice ex Vires vino, illitæ, aduersus serpentes [*πρὸς ἱερὰ*, Lac. *Diof. lib*] legit ex antiq. exempl. *πρὸς ἱερὰς καὶ ἱεροῦ αὐτῆς ἡ ἱερὰ βοτάνη*. [pollent: eadem illa [*ῥύλλα*] contra morbum regium drachmæ vnus pondere ex vini veteris & calidi hemina vna quaternis diebus ieiuno ventriculo bibuntur. Sed & ordemata diuturna, inflammationesque imposita mitigant, sordidaque vlcera purgant. Tota verò herba in vino decocta, contillarum crustas abrumpt, & oris nomas gargarizatu cohibet. Aunt si aquâ spargatur trichinium, quâ maderit, lætiores, hilarioresque conuiui fieri. Datur & potandum tertianâ laborantibus, tertium à tertia geniculum vnâ cum foliis circumdantibus, vti & quartanâ, quartum. Cæterum [vet. caret sequentibus] *Sacram* herbam idè vocant, quod in expiationibus sit ad amuleta perutilis.

Porro capiti huic, de Hierobotane [*ἱερὰ βοτάνη*] Goupili vterque codex huc titulum, *ἱερὰ βοτάνη* habet: Antiquus, verò manu scriptus codex *ἱερὰ* legit. Sunt etiam qui *Periste-*

B b b

reona supinum nomen inter nothas appellationes: sunt qui & Eriogenion, qui Charaleucon, qui Sideritum, qui Cicutum, qui Persephonion, qui Iouis Colum, qui Dichromon, qui Callesim, qui Ciparission, & qui Demetriada appellant: Ægyptii Pemphtemph. ham, Pythagoras Erylsceptum, Romani Cincinnalem herbam dicunt.

*Sagmina-
lis.*

Sagminalis appellationis [quæ vox inter suppositicia Dioscoridis habetur] ratio, ex Plinio manifestè declaratur, ubi lib. 22. cap. 2. ita legitur. Sagmina in remediis publicis fuisse, & in sacris, legationibusque Verbenæ. Certo utroque nomine idem significatur, hoc est, gramen ex arce cum sua terra euulsum: ac semper & legati cum ad hostes clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clarè repetitum, vnus utique Verbenarius vocabatur. Nulla tamen (pergit idem lib. 25. c. 9.) Romanæ nobilitatis plus habet, quàm Hierobotane. Aliqui Peristereon, nostri Verbenacam vocant. Hæc est, quam legatos ferre ad hostes indicauimus. Hæc Iouis mensa verritur, domus purgantur, lustranturque. Genera eius duo sunt: foliolosa, quam fœminam putant: mas, rarioribus foliis. Ramuli vtriusque plures, tenues, cubrales, angulosi. Folia minora, quàm Quercus, angustioraque, diuisis maioribus, flos glaucus, radix longa, tenuis. Nascentur vbiq; in planis aquis. Quidam non distinguunt, sed vnum omnino genus faciunt, quoniam eisdem effectus habeat. Vtraque fortuntur Galli, & præcunt responsa. Sed Magi vtrique circa hanc insaniunt. Hæc perunctos impetare quæ velint, febres abigere, amicitias conciliare, nullique non morbo mederi. Colligi circa canis ortum debere, ita vt ne Luna aut Sol concipiat, favis autè & melle terræ ad piamentum datis. Circumscriptâ ferro effodi sinistra manu, & in sublimè tolli. Siccari in umbra, separatim folia, caulem, radicem. Aiuuntque, si aqua spargatur trichinium, quâ maduerit, letiores conuictus h. n. Aquæ ut serpentes coneritur ex vino. Idem & hæc sparsim habet. Verbenacum Plantagine in collo suspensa, comprimere dicitur strumas. Infanabilis Podagræ non est credendus morbus: quippe quoniam & sponte desit, & in pluribus curâ. Medetur Verbenacum cum axungia trita, & illita: aut si pedes macerentur in eius decocto. Iumentorum febribus in vino medetur: sed in tertianis à tertio geniculo incisa, quartanis à quarto. Fasciculis mandis plenæ decocta in aqua ad dimidias, hydropicos sanat. Morbo regio dysentericæ & calculis confert. Tandem radix eius ex aqua pota, ad omnia in partu & ex partu mala præstantissima est.

Galenus.

Peristereona non modò œdemata antiqua & tumores sistere, & mitigare, sed & tonsillarum crustas abrumpere & exsiccare, nimirum calfaciente vi, quâ etiam capitis dolores chronicos discutere ait, ex frigiditate & crassâ humoribus ortos, tradidit Galen. 2. de comp. med. sec. loca, his verbis: Omnium verò maximè discutit & perfectè corroborat Verbenacæ recta [τρεῖς ἑρμῶν ὀφθαλμοῖς] maximè viridis, imò & arida cum radicibus & simul cum Serpillo oleo incocta. Idem de simpl. Peristereon nominatus est, quod columbæ in ipsa versetur. Vim habet in tantum resiccantem, vt vulnera glutinet.

Verbenacæ, quæ & ultimâ detractâ syllabâ nunc communiter Verbenæ dicitur, inquit Humelbergius, historiam satis succinctè tradit A-

puleius. Quare copiosius de illa dicendum, præsertim quia nulla in toto herbarum censu Romanæ nobilitatis plus habet, vt pote quæ vna auctoribus Romani imperii, conditoribusque immensum quiddam dedit. Sunt autem duo ipsius genera, diuersis tamen notis, ceu fustis indicatum antè est, discretæ. Græci, vt Dioscorides, quem sequutus Apuleius, à plantæ habitu illam in rectam & supinam diuidentes, de iisdem diuersis capitibus agunt, qui mos & circa alias herbas non infrequens est Apuleio. Capite enim tertio sub Hieras botanæ & Verbenacæ nomine de supina cognominata agit: de recta verò dicta cap. 65. sub Peristerei titulo. Plinius porro cum Latinis in marem & fœminam distinguit. Cæterum quod nominis rationem concernit, Verbenacæ dicta est, quod sola & per se verbenas faceret. Præterea quæ illi adiecta sunt specierum discrimina, supina & recta, hanc rationem habent. Hæc quod recto caule riget: illa quod humilioribus, & deiectis in terram ramulis quasi iaceat. Adduntur autem ambabus per tempora & ex aliis causis alitè ab aliis gentibus appellationes. Hiera botanæ, id est, Sacra herba, enim vocatur autore Dioscoride, quod in lustrationibus suspensa, alligatæ, felicem habeat vsum: Vel autore Plinio, quod ad Iouis mensam verrendam, præparandamque ad sacrificium adhiberetur. Peristereona hyption, hoc est, Columbina supina quoque nuncupatur: ὑπὸ ἰος enim Græcè idem est, quod supinus Latine: ὑπερῖος verò Columba, à qua tum apud Latinos, tum apud Græcos nomen adepta est, eò quod, vt Apuleius ait, columbis esca sit admodum iucunda & familiaris: seu vt Dioscorides dicit, quod columbæ inter eam versentur. Plinius id nec ad cibum, nec ad conuersationem refert, sed simpliciter columbis familiarem esse ait, ideoque nomen id indeptâ. Dioscleatæ verò dicta quasi Iouis Colus. Διὸς enim idem est quod Iouis: & ὁ λανθάνων colus dicitur. Vocata est etiam Panchromon, quasi tota speciosa & nitida: πάν enim Gr. omne & totū significat: χρῶμα verò eisdem color est & nitor. Collectis dicitur quasi conglutinatrix ab effectu, quia vulnere sit conglutinativa, à verbo ἐλλάω, q. e. conglutino. Anistereon appellata est quasi glutinata vulnera firmans ac solidans, à verbo στερεῖν, quod est, firmo ac solido, & à dictione ἀν, quæ quamvis per se nihil significet, in compositione tamen aliis dictionibus addita, illis augmentum addit, & valde significat. Cyparissos dicta est, quod folia illi sint per ambitum secta, quemadmodum in Cyparisso. Demetrian, hoc est, Cerealem nonnulli appellant: δημήτηρ, id est, Demeter, enim Ceres est, à qua & nomen inuenit, quod vt Ceres inuento frumento & traditis legibus homines ferocis curauit, & mitiores ciuilioreque reddidit: ita, ceu Magorum vanitas perhibet, & Plinius refert, hæc perunctos amicitias conciliare, nullique non morbo mederi, & si aqua eius spargatur in trichinium, lætiores conuiui fieri credidit esse. Siue quod in agro iuxta fruges quas Ceres inuenit, ac etiam quarum Dea habita est, lubens etiam ac frequens nascitur. Æsclepij nomen ab Æsculapio vetustissimo medicinæ inuentore, ac plurimorum valetudini hominum vtilium autore, adinuenit, propter multiplicem vsum & virtutem. Sic & Alceæ, id est, Medicæ, & contra morborum iniurias validam & efficacem auxiliatricem

hiaticem dixerunt, *ἄλυσ* enim vis est & efficacia, auxilium & remedium : vnde & hæc herba præ aliis nomen hoc sibi alciuit. Erysipteron appellata est à calathis & virgis. Nam Græci *ἔρυσσιπτον* calathum vocant & sportam : *ἐρυσσιπτον* verò sceptrum & virgam. Sicque dicta est, eò quòd caulis & virgæ ipsius virides lentore suo in calathos, sportas, tegetes, & id genus alia, texti & in nexus circumagi possint, quemadmodum & Cypertus & Aspalathus [quib. Erysipteri nomē etiam commune & peculiare est] & Tilia & vilia alia textēdis calathis, & corbibus, siccisliſque sunt idonea. Quæ ratio etiam fecit ut Licinia dicta sit Latinis, à verbo Licio, quod est implico, vel à nomine Licium, quod est filum, quo textrices stamen in tela implicant. Nisi Lucinia legere, quis maluerit, eò quod oculorum luci & viui proſit, à Lucina quæ Iuno est. Heras dactyon, i. e. Iunonis lachrymam sunt qui nuncupent. *Ἡρα*, i. e. Hera enim Iuno dicitur; *δάκρυον* verò lacryma : sicque fortassis dici potuit, quòd oculos & visum iuuet, illorūque illachrymationibus destillationibūque proſit. Iuno enim à iuuando dicta est, & quia oculis lucēque præest, Lucina vocata est. Lustrago dicitur, quòd lustrationibus adhiberetur. Nam, quòd Plinius testatur, hac domus purgabantur, lustrabanturque. Lustrare autem expiare, purgare & purificare est, sic dictum à lundo, i. e. soluendo & liberando. Et inde lustratio, i. e. expiatio, purgatio, solutio, & liberatio purificatiōque. Militaris vocata est, quòd hæc coronati faciales ad hostes legati mitterentur ad bellam indicendum, pacem componendam, clarigatūque repetendum. Siue quòd herbæ Achilleæ, quæ Militaris etiam appellatur foliorum formā sit alioquo modo similis. Verripedium dicta est, quòd virgis eius domus & pauimenta verterentur, purgarenturque. Verrere enim trahere est & munda- re, quòd fordes trahendo mundaentur : Pedum verò pastoralis baculus est & virga. Crista gallinacea nuncupata est, quòd folia illa sunt serrata & incisuris diuisa, ceu cristatus galli apex. Trygonion, i. e. Turturina, quasi Columbina, à turture, quæ græcè *τρογών* dicitur, è genere columbino, dicta est, & eadem ratione quā Peristereò & Columbina, vt pote quòd turtures sicut & columbæ libenter inter eam versentur, aut ipsæ vescantur. Chamelygos dicta est à caulis & virgarum ramulorūque in terram deiectione, & eorundem ad ligandum aptitudine, de qua in Erysipteri nomine iam dictum est : *χαμαι* siquidem humile & humi depressum ; *λύγος* verò vimē significat. Dicta etiam est Sideritis, hoc est, Ferraria, à foliorum forma & similitudine quadam cum Sideritide herba, cui peculiare & proprium hoc nomen est. Siue à ferro, quod Græcis *σίδηρος* est, quòd glutinandis vulneribus ferro factis in bello vsum præberet, vnde etiam teutonice *Isenkrout*, h. e. Ferraria nuncupata videtur. Ad eundem modum & Curitis, quasi Hastaris, ab hasta, quæ Salinorum lingua curis vocatur, appellari potuit. Humelbergius tamen nomen hoc inuenisse narrat ab eo, quòd quemadmodum olim hasta, quam sceptrum Græci dixerunt, regij fastigij insigne diadematis loco fuit : sic etiam herba hæc, quæ multum laudis ac plurimum Romanæ nobilitatis habuit, & quæ semper legati ad hostes missi coronabantur & ornabantur. Nominata est & Phersephonion ab infernali numine Proserpina, quæ græcè Phersephone dicitur. Nominis autem causa est, quòd cōtra ipsius veneficiorū maleficia

Tom. III.

vim habeat & amuletum sit. Credebatur enim antiquitus Phersephone pueris & aliis veneficiis suis nocere. Hæbam sagminalera dixerunt, quòd inter sagmina primum hæc honorem haberet. Et hæc de nomenclaturis Hieras botanes, h. e. Herbæ sacræ, siue Verbenæ lupinæ.

Peristereon orthion, i. e. Columbina recta, etiā Trigonion, quasi Turturina nuncupatur, quorum nomen, vt & Hieras botanes, Heras dactyos, Crista gallinacea, Columbina & Ferraria, ratio reddita est iam antè. Alij etiam Herculaniam, Egyptij Thiophenges, Hæmagales alij, i. e. sanguinem mustelæ, alij Hæma herma, h. e. sanguinem Mercurij, Punici Zimicum, alij Azirgozol vocauerunt : nonnulli Bunion, si non potius legendum sit Bomion, à dictione *βρωμις*, quæ aram significat, cuius nominis ratio fuisse potuit, quòd herba hac Iouis menla & ara ad sacrificiū crebatur. Philtradores appellata quoque est, quoniam lustrationibus adhibebatur feliciter, & philtris amolendis erat accommoda. Exupera matricalis etiā dicitur. Exupera quidem, quòd omnes alias dignitate antecellit. Nulla enim quæ Romanæ nobilitatis plus habeat quàm ista : Matricalis autem quòd muliebrium locorum & matricis indolentiam faciat appolita : siue ad discrimen Heracleæ Sideritidis, quæ Exupera etiam dicitur, sed cum adiuncto matricalis, vt Apuleius tradit c. 72. cui & hæc nonnihil folio assimilatur : quæ ratio & causa etiam fuit, vt Herculeana sit dicta. Plura nomina inter Dioscoridis nothas appellatiōes antè adscripsimus. Sunt tandem qui Petonomon à volucrum pastu nomen. Item Ferrariam, non Feriam, vt malè inter nothas Dioscoridis legitur, teste Herimolao.

Verbenæ tandem, siue Verbenæ, Peristereon. Equinoen, Hierobotanes, siue Herbæ sacræ nomine sequentes plantæ donatæ sunt. Verbenæ vulgaris. Verbenæ lupina. Verbenæ odiflora. Verb. Peruana. Euphrasia purpurea Dod. Verbesina flore minus speciosa. Chamædryos falsa species, Erysimum Tragi. Senetio. Scabiosa. Consolida media. Gallitrichum. Marrubium palustre Tragi.

VERBENA VULGARIS. CAP. LXV.



Vulgaris Descriptio
Verbenæ pluribus ab vna radice minimo digito tenuiore, fibrosa & subanarâ caulibus cubito longioribus assurgit, quadratis, subhirsutis & subinde purpureascentibus. folia ferè opposita, oblonga, incisurâ quodammodo foliorum Quer- cūs, infima duabus incisura-

ris profundioribus : sunt utem æquales.

Varia no-
mina.

Romanorū
Cincinnati
Blattaria
Plinii.

hirsuta, sed colore saturatiore superius quam inferius virescunt : *stoculi* in thyrfulis exigui, quinquepartiti ex pallido purpureo centes.

Περὶ σπινθὸς & *ἰσὺς ὁρμῶν* vocatur græcè. Verbenaca, Verberna, Columbaris seu Columbina, Herba sagminalis & Ferraria, quorum nominum rationem, præcedenti capite ex Humelbergio adscriptimus. Verbenaca supina Dioscoridis, & Cincinnalis fœmina Plinii, Romanorumq; Cicinale : Blattaria Plinii, Columbaris, Lucinia, Lustrago, Militaria, Petonomos, Panchramos & Vermenaca Hermolai. Tragus vocat Verbenam, & Verbenam 1. siue rectam : Brunfels. Verbenam masculam, Corn. Verbenam officinarum : Verbenam vulgarem Cæsalp. Verbenam 1. siue communem, flore cæruleo & albo C. Bauhin. phyt. Verbenam communem, Clus. Verbenam communem siue sacram 1. proceriorem rectam Lob. in Aduers. Verbenam Gesner. hort. Idem de coll. stirp. Verbenam albam in locis umbrosis : Item Verbenam rariorem, pulchriorem & maioribus floribus è Prouincia Verbenacam Matth. Lac. & Cast. Verbenacam rectam, & Verb. matrem Tab. Verbenacam rectam Dodon. gall. & lat. in fol. Verbenacam rectam Dodon. Hist. Lugd. p. 136. Verbenacam rectam, siue Peristereon Dioscoridis & Verbenacam matrem Plinii Corn. Verbenacam supinam, siue fœminam Fuchsius : Hierobotanem siue Herbam facram Dioscoridis, eiusdemque Peristereon supinum quorundam, & Verbenacam fœminam Plinii Cæsalp. Herbam sacram Anguill. & Turn.

Nom. ling. Germ. *Eisenkraut*, *Eisenhart*, & *Eiserich*, h. e. Ferrariam, a ferri duntia appellant : itemque *raubenkraut* h. e. Columbinam, pro qua voce malè Apollinaris *raubenkraut* legit, quæ Fumariz propriè debetur : Belgæ *Isercruyt*, & *Iserhart* : Galii *Pervaine* : It. *Vermnacula*, *Berberna* & *Berbenaca* : Hisp. *Verberna*, *Vergebaom*, *uerberna*.

Communem Verbenam vbique secus pagorum vicinque margines & vrbium areas, ac non ratò in ipsis etiam rudibus nascentem, florentemque mensibus nunc æstiuis, nunc autumnalibus, ac quandoque Nouembri, viretque incipientem vidi mensis Februarii principio. Locis incultis, inquit Dodonæus, sed tamen decliuibus ac humidioribus, in vtraque Germania, Gallia, alibiue iuxta sepes, semitas, & scrobes frequenter reperitur : Iulio ac Augusto floret. Sunt alii qui ad hydropem puluerem foliorum exhibeant felicissimo successu, Cæsalpinus. Cæterum, validè desiccantem facultatem habet, adest & adstringendi ac refrigerandi mediocri vis : Commendant Recentiorum plerique teste Dodonæo eius decoctum vel succum ad pestem : puluerem verò ad hydropem.

VERBENACA SUPINA.

CAP. LXVI.

Descript.

Hic quaterni aut quini sunt *cauliculi*, anguloli siue quadranguli, vti in vulgari Verbenaca, tenuiores tamen (& complures Dodon.) supini & in terram procumbentes : folia quoque ex vitidi cæsa, vulgari similia, sed magis incisa & multifida, Dodon. profundiori-



bus incisuris diuisa : *flor* in summis virgis vulgari similis, ex cæruleo purpureus, minor tamen : Dodon. *stoculi* in summis alis parvulus, eodemque modo ac ordine digestus : *semen* idem : *radix* tenuis (oblonga, Dodon.) & vulgari similis, auctore Clusio, cui *ἰσὺς ὁρμῶν*, i. e. Sacra herba

& *Περὶ σπινθὸς*, i. e. Verbenaca supina dicitur.

Clusii iconem & descriptionem habet Hist. Synonym. Lugd. p. 137. hoc titulo : Verbenaca supina & tenuifolia Clusii : Lobel. in Oberu. pag. 290. in Icon. Plant. p. 535. inscripsit Sacram Verbenam Hispanicam minorem : C. Bauh. phyt. Verbenam 2. siue tenuifoliam Hispanicam. Dod. lat. in fol. Verbenacam 2. & supinam.

Agro Salmanticensi frequens, florens Iulio & Locis Augusto : Belgis ac reliquis Germanis hortensis Temp. est : & quidem Hispano lata semine.

Eiusdem est cum vulgari temperamenti, quare Vires. ad eadem vtilis, & aliquantò efficacior.

VERBENACA NODIFLORA.

CAP. LXVII.



micant ramo extremo hærenti.

Verbenaceæ nodifloræ nomine ad fratrem meum C. Bauh. ex Italia missa planta, quam supra terram spargi existimamus, foliis est Agerati, ex aduerso sitis, vncialibus & breuioribus, paulà quadrante vncie latioribus : *stoculi* perpusilli, acervatim congesti & glomere ce-

VERBENA PERVANA PERPETVO
virens.

CAP. LXVIII.

Scripsit Nicolao Monardo nobilis quidam vir Loc. ex Peru, secundum flumina è montibus eorum regno;

regnorum delabentia plurimam Verb. crescere, **Q**ui quæ in Hispania nascitur similem, perpetuò virentem, quæ Indi in multis morbis, curandis vrantur, præsertim ad omnis generis venena, & in his, qui in cibis toxicum, aut simile aliquid hauserint. Sed & nobilis quædam matrona ex Peru rediens eidem Manardo asseruit, sed multis annis ægram fuisse, cumque plurimorum Medicorum operâ vsa fuisset, Indum tandem quandam accessisse, qui in plantarum scientia celebris habebatur, quique inter Indos Medicum agebat; Verbenæ succum depuratum illi propinasse, seq; ab eius vsu post paucos dies lumbricum eiecit (scilicet ipsa nuncupabat) hirsutum, pede longiorem, crassum, caudâ bifidâ, deinde omnino conualuisse: Ipsam porro Nobili cuidam viro in Peru, qui continuè ægrotabat, singulis dieb. manè eundem succum saccharo permixtum vt sumeret, persuasisse [ita enim ipsa hauserat ab amaritudine] illum deinde plurimos lumbricos reiecit, longos, tenues, atque inter cæteros, vnum albi cinguli instar, longissimum, & tum demum integram valerudinem recepit. Id postea consilium plurimis aliis, qui male affecti erant, & quos lumbricos habere suspiciebat, se dedisse, ac omnes sumpto Verbenæ succo, multas ventris tineas eiecit, & sanatos fuisse. Illud porro remedium aded certum affirmabat, vt vnum è suis famulis ostenderet, qui ob morbi gravitatem philturum aut medicata pecula hausisse diceretur, quique epero Verbenæ succo, vomitu multa variis coloribus distincta ex ventriculo reiecit, quæ medicata pharmaca esse asserbant, deinde conualuisse, &c. de quib. prolixius Hist. Lugd. Clusio etiam duo miri Verbenæ effectus exempla refert, quæ hic breuitati studet prætermittimus.

C. Bauh. phyt. vocat Verbenam 3. siue Peruanam, Hispanicæ similem.

VERTICA ROMANA SIVE MAS cum globulis.

CAP. LXIX.



Primæ inter Vrticas commendationis est, quam Romanam à feminis prærogatiua indicant, quod in vtriculis glomeratim conjunctis mordacibus reclusum continetur, quod & compressâ laterum formâ & lubricâ superficie semen Lini æmulatur, flosculi præcedentibus fibrosis luteolo puluisculo plenis, pediculo

vinciali aut longiore appendis: radix non alia quam Vrticæ vulgaris: caulis verò rigidioribus pungentibus spinulis, pro vrida vulgatæ lanugine, donatur, perinde vt & folia, quæ quàm in illa altius multò incisa sunt: tota planta hominis altitudinem interdum multum superat.

Hæc est illa Dioscoridis Vrtica, aliis Cnide dicta. Tom. II.

ita, & quidem agrestior (ἀγροτέρα; ἀγρία vêt.) asperior, latior, nigriorque foliis, semine Lini, at minore.

Plin. Vrticam siluestrem fœminam facit, & mitoriorem esse refert. Tragus vocat Vrticam Romanam quartam, peregrinam, & elegantissimam: Fuchs. Vrt. græcam siue romanam, & asperam Diosc. Bayrus. Dod. gal. & Lob. in Adu. (vbi & romanam officinarum, semine Lini.) Vrticam siluestre. Idè in Obf. & Ic. Plan. Pl. Vrt. Romanâ & Vrt. siluestre semine Lini: & sic etiam inscribit Taber. Matth. Vrticam primam: H. Lugd. p. 124.3. Vrticâ 1. Matthioli: Doc. lat. in fol. Vrticam viretem priorem: Vrticarum vrentium maiorum primam: Vrt. marem nonnullorum: Vrt. silu. asperiorum Diosc. & Vrt. silu. fœminam mitoriorem Plin. C. Bauh. phyt. Vrt. 4. siue pilulas rotundas ferentem.

Acad. ap. auctore Athenæo lib. 3. Deign. dicta est Vrtica vrentis cōmunitia nominâ. bono omine per antiphrafin, neque enim tactu suavis & mollis, sed aspera & iniucunda: Vel quod iniucundo sit tactu, puriginem cient. Kydy autem quod lanugine noxiâ vellicet, pungat, & suo morsu sensum lacesset, à verbo κνίζω, quod pungere & vellicare significat. Vrtica ab vrento, quod pruritur, postulasque igni similes excitet; vnde, & Macer ait:

... Nec immerito nomen sumpsisse videtur;

Tacta quod exurit digitos Vrtica tenetur.

Præter iam dicta vrentium Vrticarum generum Nomina rica nomina, sunt & hæ linguarum appellationes: germanica Nissel: Belg. Nevelen: Gall. Orrie: Italicum. Ortica: Hispan. Hortiga. Angl. Netrel: Boh. kopri- vva: Egyptia Selepho, vel Selephion: Arab. Humure vrait, Dacica Dyn.

Particulariter verò Vrticam præsentem Germani vocant Vrtelch Nisselen, Italicam Vrticam, & Romsch Nissel Vrticam Romanam: Belgæ etiam Roomsche Nevelen: Galli Orrie Græcæ: quod rarior sit, neque vbiq; occurrat, at semine aliunde misto, subinde spectaculi causâ, in hortis feratur; vnde & hortensem cognominavit Tragus.

In densis siluis nō raro apud Belgas reperitur. Locis & Aestate vigens, & semen Iulio & Augusto maturans, Dod. Ego Vrticam globulis celebrem Montspelij passim in sepib. obseruavi, florentem & semina ferentem menlib. April, Maio & Junio. Basileæ in pratis, Geneuæ & Montbelgardis in hortis meo proueniebat, sed Hiemem non perferebat.

VRTICA VULGARIS MAIOR.



Vrtica maior, vrida lanugine, quæ caules quadrati cubitales, foliaque acuminata serrataque atro-virentia aut sublauescentia obsita sunt, notissima; rubentibus, nonnihil radicibus nititur: flores racematim in ligulis ex foliorum alis profertens, lanuginis incanæ instar; semen perquam minutum.

Ccc

Tragus duas habet figuras, non tamen duas, sed vnam hanc Vrticam denotantes, Vrticarum vrentium vulgarium inscriptione: prior florentem & vigentem, posterior verò iam declinantem desflorescentemque demonstrat: non est itaque verum, quod quidam ineptiunt, cum duas figuras solo foliorum, nunc spadiceorum, nunc nigriorum, colore variantes exhibuisse. Ipsemet enim duas has Vrticas, quas magnas & vrentes appellat, vnius generis esse scripsit.

C. Bant.
not.

Eius frustra duas figuras expressit Tragus vtpote solo colore differentes: quod non monuit Frater, nec forte animaduertit. An etiam hæc sit Diosc. altera illa *ακαλὴ*, quam Cniphon vocant, Romani verò Vrticam mollem, minuto semine [fructu, Ald.] non æquè aspera, vt vult frater, aliis diiudicandum relinquimus. Fuchsius refert eam se nunquam videre potuisse: nostram autem Vrticæ maioris titulo pingit, ac passim in Germaniæ dumeris ac sepibus gigni scribit. Lobel. in Adu. Obs. pag. 281. & Ic. Plant. pag. 521. appellandam duxit Vrticam siluestrem asperiorem, siue Vrticam communem, siue maiorem, aut Vrticam fœminam. Pro Vrtica pingitur ab Apollinari: pro Vrt. maiore à Brunfels. & Dod. gall. ad differentiam minoris: pro Vrtica vrente altera à Dod. lat. in fol. qui vulgò fœminam cognominari refert. Germanis dicitur *Gemein Nessel*, *gemein brennend Nessel*, *groß Nessel*, *gras brennend Nessel*, & *heyster Nessel*: Belg. *Groote Neesen*: Gall. *Ortie commune*: Angl. *Nettel*.

Locus & tempus. Exit locus incultis: frequentior autem est iuxta sepes, dumos, veteresque parietes spontè nascitur quandoque etiam neglectim in hortis, odiosa nimis suo reptatu, & viuida radice. Viget præsertim Aestate: semen Iulio & Augusto maturum legi potest.

VRTICA MINOR annua.

Descript.



eius verbis colligere quilibet potest. Tertia vulgaris Vrtica, inquit, quam *heyster Nessel*, hoc est, causticam, siue ardentio rem Vrticam, Germani dicunt, admodum exiguæ quantitatis est, rarò enim ad altitudinem trium palmorum assurgit, caulis eius rotundus, radix brevior, folia angustiora, semen verò maius. Vrtica

est aliofa, hyemis impatiens: quare singulis annis, ex semine deciduo repullulascit, hortorum omnium singularis pestis. Hæc ille. Tu vero ex his colliges, tertiam hanc suam vulgarem Vrticam, minorem inscribi debere, præsertim quòd rarò ad altitudinem trium palmorum assurgat, prior verò colore foliorum ludens ad trium cubitorum altitudinem excrescat.

Fusch. Cord. Tabern. Dod. gall. & Lob. in Syn. Ady. (vbi tamen & Caniam Plinij acriorem vocat) itemque Brunfels. Vrticam minorem appellant. Lobel. in Obs. pag. 522. Vrticam minorem acriorem: H. Lugd. pag. 1244. Vrticam 3. Matthioli: C. Bauh. phyt. Vrt. 3. siue vrentem minorem. Dod. lat. in fol. Vrticam vrentem minimam, & Vrt. vrentem tertiam: Tragus Vrticam maiorem inscribit, sed falsò, vt ex descriptione constat. Germani *heyster Nessel*: Belgæ *heyster Neesen*: vtrique à mordaci eius contactu appellant. Illi etiam *Haber Nesselen*, quod nimirum in Avena nasci multùm amet. Galli *Ortie grasse*. Siue autem hæc, quam Plinius Caniam nominat, vel potiùs prior, studiosi obseruent: Est in siluestri, inquit, quæ Cania, acrior, caule quoque mordaci, sumbratiis foliis.

Vrtica hæc minor annua quanquam à maioris natalibus haud abhorreat, tamen & ad hortos, & humidiora arua descendit: eodem tempore quo illa & viget & florèt, & etiam alibi, vt Geneuæ, citius.

Quælibet vrentium Vrticarum innatam malitiam infinitis commodis & vtilitatibus pensat. Vtriusque (Vrticæ asperioris, & mitioris) enim folia imposita cum sale canis morsus sanant, inquit Dioscorides, gægrænas, carcinomata, ac fordida vlcera, & cacoethes: item luxata, tubercula, parotidas, panos, abscessus. Eadem lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt & ad sanguinis è naribus eruptiones folia cum succo trita indita. Menses cient trita cum Myrrha subdita. Vterum prolapsum restitunt folia recentia admota. Semen ex passo potum ad venetem concitat, & vterum aperit. Idem cum melle delinctum Orthopnœæ, pleuritidi & peripneumoniz prodest. Educit & quæ in thorace hærent. Admiscetur quoque erodentibus medicamentis: at folia cum conchis cocta aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutiunt, verum cum ptisana cocta, quæ in thorace hærent, educit. Decoctum foliorum cum modica Myrrha menses mouet. Succus gargarizatus vulgum inflammatam reprimat [malè exprimit vertit Ruellius].

Plinius Vrticæ vires & vsum medicum exponit planè ex Dioscoridis sententia, sed fusiùs, vt Dioscoridi intelligendo non parum lucis adferat. Vrtica, inquit, quid esse inuisus potest? At illa præter oleum, quod in Agypto ex ea fit, vel plurimis scatet remediis, &c.

Galenus euidentius & vires & effectus Vrticæ tradit, tanquam de vno genere loquens. Vrticæ herbæ & semen & folia [nam hæc porissimùm sunt vsui] admodum digereptis sunt facultatis, adeò vt & phymata, & parotidas sanent. Sed & quiddam statuosum obtinent, quo & venerem extimulent, maxime si cum passo semen bibatur. Porro quod non vehementer excalfaciatur, sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore, pulmonequeeductio, cum quod partes quas contigerit, pruriant. Porro statuosum eius, cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur.

uniorum
ognata.

Semen.

Temper.
Dod.

Urtica frigida.

Cæterum, Verricis bene confusis, emplastri vi-
ce ventri impositis, neque citò inde dimotis, se-
maticem & retrahere, & redu&am vsque conti-
nere, quidam certo experimento jactant, vt vi-
Tomus III.

CANNABIS MAS ET FOEMINA.

C A P. LXX.

Cannabim fatiuam marem Dioscorides fo- Cannabis
lia Fraxini [τῆς μελίας, pro qua voce malè inter- satius
pretatus est Maicellus τῆς μελίας, Mali:] gerere Dioscor.

scripsit, sed foedi odoris, caules procēros, inanes.

Cannabis foetida.



quit, virgas fert Althææ virgis similes, sed tri-
gones, asperiores, & minores, cubiti altitudi-
nis: folia triana similia, asperiora tamen & tri-
gona: flores subrubicundus, Lychnidi similes:
semen & radicem Althææ similia. Radix coti-
da & impolita vim habet inflammationes miti-
gandi, & tumores discutiendi, & tophos in arti-
culis dissolvendi. Sed & ex hac cortex est idone-
us ad funes texendos. Et hanc Dioscoridis
Cannabim filicetrem nobis adhuc ignotam
ingenue fatearur. Illud nobis liquido constat
quosdam Virica in eam asinem plantam fecisse:
alios verò Clinopodij alterius Matthioli genus
album constituisse. Sed nec de esse, quij Alceam
vulgaris maiorem credant, reperiri tandem
nonnullos, quij Alceam Pennaphylli folio esse si-
bi persuadent. Et hæc de Cannabæ filicetris hic
nobis dicta sunt.

Siluestrem Cannabim, Fildrastiram & Terminalem cognominamus. nos non habemus, inquit Tragus? nisi per illam subintellegerit vnam fariaue speciem Dioscorides, aut certe, quod puto, caput illud reducens: Nam syluestrem Cannabem primo cœtra consuetudine suam ponit locis, deinde sativam. Sed & Plinius tria Cannabis genera describentē, quartū primam & optimam Melam, Melleam alteram, tertiam Roseam nūcupat, de fœqua dūtaxat Cannabe loqui, vel hinc liquet, quòd siluestris nusquam mentionem faciat. In libro quidem 20. cap. 20. rem paucissimam attingit verbis. Sed de nostra vulgari intelligi ea verba commodè possunt.

Sed relicta Cannabe siluestri, ad sativæ historiam redeamus. Duorum itaque nascitur generum ex vno eodemque semine, Mas & femina, quæ utraque pingitur apud H. Lugd. p. 495. Mare inscribit Lobel. in Obs. p. 248., in Ic. Plant. pag. 326. Cannabem 2. siue maiorem, femem ferentem, mafculam, & Cannabem Dioscoridis : Dod. lat. fol. Cannabem secundam, flore non conspicuo : C. Bauh. phyt. Cannabem 3. siue sativam : Feminam Lobel. modò citatis locis, Cannabem eriticam paludosam siluestrem, sed falso titulo : Tragus Cannabem sativam inscri-

pfit,ac primâ siue fœmellam, tenuem,& fœmine
deflucitum vocauit : Dod. in fol. lat. Cannabem
sterilem, flores inutilis & vaneſcentes proferre-
tem: Caf. Bauh. phyt. Cannabem 2.ſiue errati-
cam: Miror autem Fratrem non meminiffe Can-
nabis fœminæ, quâ ſuo falſo titulo Lobelius ex-
hibuit. Vtramque etiam vnâ icone Cannabis
inſcriptione cur comprehendat Tabern. rationem
non video:is ſapientis ſolo colore diſſerētē
iconibus ſeparat. Sed & Camer. apud Marthio-
lium iconem nouam ex mare & fœmina compo-
ſitam, Cannabis titulo dedit. Cord. Corn. &
Brunſel non diſtinguunt.

Καννάβις, καννάβις, α τσιπς, & σπορόνιες πορ, a te-
xendis ex ea funibus, Graecis dicitur : Hebraeis
fex Thalmuditis graecam vocem imitantibus,
teste Elia in Nomencl. *Kannabis* vocatur: Arabi-
bus *Canab* & *Spheedenegi* appellatur. Medici ta-
men differentiam cōstituit inter *Scchedenegi*
quod est femina Cannabis, & inter *Sccedenegi*,
qui est Amaris lapis, qui sanguine silit, &
inter *Sccheteregi*, qui est Fumus terræ, vide Aui-
celib. lib. cap. 174. & 605. Latini *Cannabi* dicunt:
occinae nomina retinent : Sunt autem Graecis
καλλιπύκνιον, & σφαιρακίον, scaturigines, quibus
locis cum libano ipellē & fata luxuriet, viderit
nominis Lobelia indepta: Germani
Bampf Belg. *kemp*: Gallis *Chanure* & *Chenene*: Ital.
Canute : Hispan. *Carmano* : Angl. *Bump* &
Beyp.

Porro ambæ Cannabes, ex vno, vt diximus, semine procreantur, sed quâ ratione hoc intra terâ periciatur, vt altera ex illis fructifera, altera verò sterilis sit, nemo est qui scire possit, id eoq; cum alia multa, etiâ hoc ipsû naturæ esse miraculum necesse est vt dicamus. Vtraque autem quotannis Vere passim in agris & hortis plantari consuevit, nec vnquâ sua sponte siluestrem obscurare nobis conigit, & pluribus aliis luxuriantem, qualem Dodonæus commemorat.

Solum, vt Columella scribit, pingue, stercora-
tumque & rignuū, vel planum atque humidum
& altē subactum depocit. In quadratum pece-
serunt grana sex eius seminis Arcturo exor-
iente, quod est vltimo mense Februario circa
textum aut quintum Calendas Martias. Nec ta-
men vique in Equinoctium verum, si pluu-
ii celi itatus, improbē leretur. Fœmina prior ma-
turefcit, meliorque ac prestantior est ad pannos
conficiendos: mas vciō apta ad sui generis con-
seruationē. Fœmina matura Iulio vellitur. Ma-
ris semen fine Augusti, vel Septembri mense,
maturum legitur.

Cannabis plantam in vita admodum vilem pronuntiavit Dioscorides, ad robustissimos funes tendens: Semen verò fit copiosius edatur, extinguere genituram: succum è viridi semine expressi ad aurium dolores commodè instillari. Cannabis autem semen olim in cibo homini fuisse, docet Galenus 1. Alim. his verbis: Non quemadmodum plāta ipsa Cannabis Vitici quodammodo est similis, ita semen semini facultate est simile, sed plurimum ab eo dissidet, vt quod concoctū sit difficile, stomachoque ac capiti noceat, prauique sit succi. Sunt tamen qui eo quoque fixo cū alijs tragematibus veltentur. Tragemata autem voca ea quæ post cenam voluptatē inter bibendum excitandæ gratia manduntur. Multum autem calcasit, ideoque sumptum paulò

Мир не
науке.

Locus.

Vires de
vifus.

paulò largiùs caput ferit, vaporem fursum ad ipsū mittens calidum simul ac medicamento- sum. Semen (addit γ. simpl.) status extinguit, adeoque dissipat, vt si pluscūlum edatur, geni- turam exsiccat. Sunt qui ex eo viridi succum exprimentes, ad aurium dolores, ab obstructio- ne, vt opinor natos, vtantur.

Non est silentio prætereundum, quod de se- mine Cannabis Simeon Sethi prodidit. Come- stum, inquit, idem nocumentum quod Corian- drum affert: immodicè enim si estur, vt illud de- lirium facit: folia verò arida in potu sumpta fa- rinæ modo, ebrietatem quam dam hospitem & innoxiam faciunt, quæ ab hauriente non senti- tur. Apud Arabas pinisur, subigiturque pro vi- no, & inebriat. Desiccatur verò semen genitale, vt Caphura.

In Francia Orientali, referente Trago, aliisque nonnullis regionibus semen Cannabis quotidie inter cæteros cibos decoquitur, non aliter quam Hordeum, sed reuera qui continuò huiusmodi semine in cibo vsus fuerit, non parum læde- tur, namque semen Cannabis stomachum frigi- dum & debile reddit, & genituram extin- git. Idem semen laë decoctum & calidum po- tum, aridam calidamque tuſim emendat & ex- pellit.

Cannabis semen in gallinis contrarium, ac in nobis, eiſcere, tradit Matthiolus, siquidem gal- linas ouorum feraciores reddit, experientiæque sese comperisse ait, gallinas, quæ Hieme ſequi- ènt, quo tempore oua rariùs parit, Cannabis seme- ne pascantur, oua frequentius multò ponere. Cannabis recentis decoctū expreſſa validè her- bā, terreſtrium lubricorum cauernulis inſper- ſum, ſtatim eos euocare idem affirmat, quod pi- ſcatoribus acceptum referendū eſt, qui hac arte vermiculos capiunt ſuis hamis aſſigendos, vt re- ctè ſcripſerit ſuccum ejus vermiculos ex auri- b. ejicere. Ex his etiam colligi poteſt, ejus vires ad interaneorum vermes haud imbecilles fore. E- quorum etiam ſedi hærentes tæniæ, ſuccus aut decoctum ejicit. Sunt etiam qui foliorum pulue- rem dyſentericis propinent. Quod Plinius de radice dixit ambuſtis ſæpiùs admo- uenda, & a- mouenda, commodiùs præſtabitur, ſi recens in mortario tundatur, cum recente butyro & ſubinde applicetur.

Ruſſici Belgæ apud H. Lugdunensè, ſeminis contuſi medullam liquore aliquo expreſſam i- ſtero laborantibus initio ipſius mali exhibent, & ſæpe non ſine ſuccellu, ſi quando ex ſola ob- ſtructione & citra febrem exoritur. Aperit enim fellis meatum, & bilis per corpus digeſtionem promouet. Empirici quidam aſſerunt ſanguinè ex quacunque parte corporis fluentem ſiſti, ſi quæxit ſanguis cum foliis Cannabis minutim conciſis, frigatur, & ægro pro cibo detur.

Cunctis populis denique Lobelio teſte, pe- nuriam Lanæ, Lini, Xilique reſarcit, ad veſtium ſtragula, velorum, papyrum, quamlibet denique ſupplectilem. Mas robuſtior rudentibus & ca- piſtris torquedis nata habetur, mulierculis ada- gio iocantibus dicentibusque eſſe ſeminam po- tiorem mari. Hujus autem ſemen eſt non parum ad multa proficuum: ex eodem oleum preſſum tumoribus & ſcirrhis opitulatur, lucernis alit lychnia & lucem. Lac etiam vel pulres ejusdem macerati, aut juſculis decocti, fluxiones ſiſtit diu- turnas, dolores, repentinòſque ſtatuum vortices, & humorum fluctuationem compellit: ſomnum

Tom. III.

conciat. Vsus tamè nimius moleſto ſopore per- fundit, tritum capiti, vel pedib. imis admotum, haud abs re iſteri humores, vaporèſque tenues à centro auertere & euocare putatur. Radices podagricis tophis proficuæ. Odorem grauem & nonnihil viroſum eruat, & vel capitis in co- decubitu remulentos facit. Succus verò folio- rum certa perniciès inſectis interaneis, & vul- nerum putridorum alumnis: non quā facultate idem foliorum Perficæ, aur luglandium putami- nis ſuccamentum efficit: ſed vapo- , tetroque ſitu, odore & exſiccandi vi, quā alimentum præ- ripit illis & populatur excrementis diſſipatis: multum alimonie ſuggerit gallinis, cortalibus- que: ſed Hyeme ſecundiores, poſtea ſteriles, & quali pinguedinis mole obrutas reddit. Auicu- lis etiam cibus eſt, ac tantum ſagina adfert, vt aut enecet, aut cantillandi adimat alacritatem & facultatem, vt carduelibus, linottiis. Lacunis aut ſcrobibus aquæ plenis merguntur vtriuſq; ſexūs faſces & manipuli, vbi macerantur, eluun- turque multum & diu: deinde ſiccantur in So- le, vt tundantur, ac demum cortices ſtaminei tundendo velluntur, vt Lino fit ad ſilum & tel- las. Sed lacuſtris aqua, cui intabuerit, tantopere viru nocet, vt epota præſentiſſimo ſit ſitientibus exitio, cuique antidotiſ præſtantiſſimis, tempe- ſtiue etiam datis, occurrì non poſſit.

Noxæ,

BANGVE CANNABI SIMILE.

CAP. LXXI.

Bangue planta eſt Cannabi haud abſimilis, Deſcript. Garcia Semen. niſi quòd hujus ſemen cânabino minus eſt, nec ita cædicans vt illud: deinde hujus ſtolones lignoſi, nullo ferè cortice veſtiti, contrā quàm cannabini, auctore Garcîa, qui ab Acoſta in qui- buſdam diſcrepat: Banguè ſimile ferè eſt, ait hic, Cannabi: caulem habet quinque palmorum al- titudine, quadrangulum, colore dilutiùs viren- te, fractu contumacem, nec adeò concauum, vt cannabinus caulis, cujus cortex non minùs quàm illius in ſila diduci poteſt: folia cannabina ſuperne virentia, infernè in canā lanugine pu- beſcentia, guſtu terreſtri & inſipido. Nos à Tho- ma Platero ſemen accepimus nomine Banguè, quod ad Stramonie primæ ſemen aliquate- nus accedit, tuſum, ac ferè ſpadiceum, compref- ſum, acuminatum.

Nonnulli in ea opinione fuerunt, vt Banguè Nomina. Indorum, auctore Garcîa, ab Opio diſſerre non putarent. Acoſta ramen dici reſert Arabibus A- xis, Turcis Aſarath, Perſis, Decan, plurimarum aliarum regionum incolis Banguè, quod pluri- mam aſſinitatem habere videtur Cluſio cum Turcarum Conſtantinopoli degentium Maſſac, quo ad varios affectus vtuntur, nonnulli etiam veſcuntur excitandæ veneris gratiâ. Dubitat tandem Fragoſus, an herba hæc ab In- do allata, illa ſit, cujus meminit Theoph. lib. 9. cap. 20. pl. Hiſt. ſed quàm aptè, neſcit ipſe Clu- ſius. H. Lugd. pag. 1914. Banguè inſcribit: C. Bauh. phyt. Cannabem 3. ſive Cannabi ſimilem exoticam. Huc autem reducitur propter folio- rum cum Cannabi, & corticis in ſila ductilis ſi- militudinem, alijs enim auctores contrarias fa- cultates huic tribuunt, videlicet, quod genitale ſemen multum iuuat.

Indi, inquit Acoſta, ſemine & foliis veſcuntur. Vires, & cum vt validiores in re venerea ſiant, tum ad Vſus.

excitandam cibi appetentiam. Fit ex hoc Banguē compositio vulgaris admodum vsūs, in ijs regionibus, ad varios effectus: etenim magnates & militū præfecti, vt laborum obliui securius & liberius dormiant, seminis & foliorum in puluerem redactorum, quantum videtur, sumunt, illique addunt Arecam, siue Auellanam Indicam viderem, & Opij nonnihil pro arbitrio: omnia saccharo excepta deuorant: si verò in somno varias rerum species sibi obuersari cupiunt, addunt selectissimam Camphoram, Caryophyllos, Nucem moschatam & Macis: si verò hilares esse volunt & facili, & præsertim in venerem procliuiores, Ambaro & Muscho additis saccharo excipiunt, & electuariū faciunt. Multi autem affirmant, huius semen & folia ad libidinem ciendam mirè esse efficacē: vnde colligere licet, nihil affinitatis habere cum Cannabī, licet illi admodum similis sit: quoadquidem auctore Dioscoride, Cannabis calida & sicca est, & genituram extinguit.

TOCCON, HERBA BRASILIANA,
cortice cannabinō.

CAP. LXXII.

Descriptio.

BRasilianorum herba Toccon cortex, Canabīs modo detrahitur, cannabinō fortior, filo, cui spinam subiungant ad pitcaudum, parando accommodus. Ex eodem arcuum funes fiunt, qui licet tenues sunt, equis tamen ad sua pondera vehenda, fortitudine suffiunt, Leri auctore, cap. 12. & 14.

CARBASVS VETERIBVS.

CAP. LXXIII.

At nequam de Lino verba faciamus, Laconicam de Carbusa tractationem instituere placuit. Et Hispania ceterior habet (inquit Plin. lib. 19. cap. 11.) splendorem Lini præcipuum, torrens in quo posita natura, qui alluit Tarracōnem. Et tenuitas mira [magna M.] ibi primum Carbasī reperitur.

Lini genus.

Carbasum autem esse Lini genus mirè tenuitatis palam fit: ex jam relatis Plinij verbis. Quin & Dalechampio Carbasus est Lini genus quo terebatur vestis magni pretij, antiquis in delitijs habita. Et confirmatur hoc autoritate plurimorum scriptorum. Carbasina enim vela prius in Amphitheatrum duxisse traditur Lentulus Spinther in Apollinarijs ludis, mox Cæsar Dictator, teste Plinio. Verres, vt Cicero perhibet, Astarte summā tabernacula carbaseis intenta velis in lictore collocari iussit, vt totos dies cum impudicis mulieribus perpolaret. Virg. 11. Æneid.

--- tum croceam chlamydemq; sinusque crepantes.
Carbaseos fuluo sn nodum collegerat antro.

Item 8. Æneid.

--- cum tenues glauco velabat amictu,

Carbasus, & crines vmbrosa tegebat arundo.

Lucanus lib. 3.

Fluxa coloratis astringunt Carbasā gemmis.

Properties.

Exhibuit viuos Carbasus alba fcos.

Ex quibus locis, atque etiam ex Quinto Curtio lib. 8. de Indis loquente, intelligi potest, hoc quoque virile esse vestimentum. Sed & muliebre esse satis constat ex Val. Maximo, loquente de Emilia virgine Vestali lib. 1. cap. 1. quā adorante,

cum Carbasum, quam optimam habebat, foculo imposuisset, subito ignis emicuit.

Nunc & Linum candidissimum ex Ægypto, Xylon Cottonem nonnulli & Carbasum per conjecturam vocant, &c. Vide Xylon, siue Gossypium.

Carbasum quidam id genus linei panni esse purant, quod Telam Baptiliz, & Telam Holandicam, & Telam Cameracensem vocant. Hæc postrema aduehitur ex Hispania.

Carbasus est pallium, quo quis amicitur opulentia causa, vt ex Serico, aut tenui Lino. Vide Andr. Tiraquellum comm. de leg. connubialibus leg. 1. gl. 1. part. 3.

Carbasus tandem de velo, instrumento nautico, habetur, vt ex locis hic annexendis colligitur. Virg. 3. Æneid.

Vela vocant, sumdoque inflatur Carbasus Austro, Item 4. Æneid.

--- vocat iam Carbasus auras:

Puppibus & latè nauta imposuere coronas.
Ouid. 11. Metam. totaque malo.

Carbasa deducit.

Item 13. Metam. Mota se, unde statum sonant Carbasa. E ilt. Præter uentis Carbasa.

Fili 3 Torro subducit e carbasa Lino.

Satius 4. Silu. Aua ventilantur Carbasa,

Martialis lib. 1. epig. 29.

Festinant crepidi substrigere Carbasa, nauta.

Carbasus Carbasi penultimā correptū est feminini generis secundum Priscianum: masculini secundum Phacem. Probis verò & Caper dicunt esse masculini & feminini in singulari: in plurali verò neutrum. Graecè dicitur, ἀπλωος καὶ ἀπλωον, ὡς, τὸ, velum.

LINVM.

CAP. LXXIV.



Vlgo notum. Descriptio.

num reat, radiculā, nititur, caule, ceteri, plurimū similia, inani, cubitum, aut sesquicubitum alto, alis circa sumum diuiso: folia, acuminate, culmum lata, vinctas duas plus minus longa, alternatim caulī apposita: flores, caerulei, quinque partiti, stamini, quos capitula, excipiunt rotunda, in quibus, semen fuscum, lubricum, latum.

Ab ijs, Graeci vocant, Linonē Latini & officinae: Synchronum germanicum Tragis: Linum satium vulgare caruleum Lobel. in Adu. & Ic. Plant. p. 41. In Obs. pag. 125. Linum Aduersariorum: C. Bauh. phyt. Linum 1. siue satium. In Dioscor. Annon, Pænis, & Zeraphoes cognominatur. Quemadmodum

Quemadmodum autem lingua latinâ & græca Teia linea, & ipsa Lini herba communi nomine *lin* & Linum dicitur, ita apud nos Germanos Linum siue in agro, siue domi ad texturam, & telam apparatus commune nomen retinet *flachs*. Tamen non desunt, qui Linum nondum euulsum, Linum agreste, & Linocalamum; contra verò telam ex Lino textam, Linum domesticum seu vrbani vocent. Belgæ nominant *Vlachs*; Galli *Lin*, It. *Lino*, Hisp. *Lino*, Angli *flax*, Bohemi *Len*, & vt Hungari. Arabes feminis tantum meminere, vocantes illud *Bizchichem*, seu vt Serap. placet, *Bazarichichen*: Hebræi *Pislab*, Chaldæi *Chisna*: Exod. 9. Onkeli: Græci *linu cotpma* & *λησασμα*: Germani *flachs* *Linamen*.

A Lino varia ducuntur adagia, v.g. *Linum lino connectis*, cuius duplicem apud Græcos interpretes sensum inueniri perhibet Erasim. Roterodamus: Horum alter est: infirmis infirma copulas, friuola friuolis. Alter eadem non isdem rationibus facis, aut dicis. *Vltra Linum* dixit Lucianus in Iouer darguro, pro eo, quod est extra decretum fatale. Est & tertium prouerbum *Candidum Linum lucri causa duci*, quod in eum quadrat, qui dotis causa ducit vel deformem, vel animum. Est & quartum: *Qui canem alit externum præter Linum nihil habet*, i.e. præter funiculum ei nihil sit reliqui. Qui beneficium collocat in ingratum, perdit operam. Nam canis alienus relicto fune, quo alligatur, pristinum dominum repetit.

Theophrasto visum fuit, Linum degener factum, in Lolium abire. Nostros coloni sibi visum pernegant, aut auditum.

Pinguissimum, vt Columella ait, locum & modicè humidum poscit. Aliqui, inquit Palladius macro solo spissum ferunt, atque ita assequuntur, vt Linum subtile nascatur. Plinius scribit seri fabulosis, maxime vno sulco, nec magis festinare aliud, vrerèque agrum, & deteriorem ipsum facere, quod & Virgilius in Georg. attestatur:

Vrit Lini campum, sages, vrit Avena,

Vrunt lethæa per fusa Papauer somno.

Seritur linum Vere: Maio & Iunio mensibus floret. Linum (inquit Crescent.) desiderata ærem temperatum, & terram solutam & pinguem, & quanto pinguior fuerit, tantò ipsius stappa erit grossior, quantò verò macrior, tantò eius stappa subtilior erit. Sed ex eo parum & breue in tali terra nascetur. Huius autem seminatione terram satis macrari & lædi creditur, ideoque auxilio leguminis eget, si tale semen recipere assuescit. Eius terra ante Hiemem debet arari, vt glebæ propter gelu sequentis Hyemis in puluerem reducantur: deinde post Hiemem, cum primum poterit, secundà vice arabitur, deinde aspergatur & iterum aratur quinque vel sex vicibus, in tantum vt in puluerem redigatur, ita tamen quod primà vice profundius aratur, secundà minus profundè, & sic semper profundatio vsque ad vicem vltimam minuatur: deinde à medio Aprilis vsque ad finem eius satio ipsius est optima, satioque in summo terræ sit minus vno palmo, terrâ super semen aratro reuolutâ.

Tres corbes huius feminis, vel parum plus sufficiunt iugero, cui multum proderit si talis ager expexerit postquam fuerit seminatus, quod si tempus fuerit magnæ siccitatis, ei valdè proderit, si poterit irrigari. Potest etiam seri ante Hyemem in locis calidis, in quibus Linum natum frigore non læditur, & tunc melius prouenit in

Tom. III.

terra mediocriter cretosa, quàm nimis soluta, nec est necesse quod sit pinguis, & quod vltra duas vices aratur, dummodo terra pulueriferetur, & cum fuerit seminatum, melius est quod cum expexe solummodo de quibusdam spinis facto semen operiatur, melius etiam est quod homo vnus cum fove trahat expexem, quàm boues, propter nocumentum, & hoc est cuiuslibet homini facile.

Hæc verba bis mundanda est cum maxime suffocetur, ideoque extirpandum est noxium antequam circa Linum inuoluatur, licet per ipsum ambulando lædatur cum magnum est, & ideo mundatur, & debet ante se manibus aperire, & ire per eum optimè eleuatis pannis. Sed cum primà vice mundatur, quia tunc paruum est, & conculcatum releuatur, non læditur ambulando per eum.

Colligitur autem cum maturo colore flauescit, & eodem die ne rore tangatur, sub testâ ponatur in fascibus, deinde malleolis ligneis excutiantur semina, & ipsum Linum ad maturandum in aqua ponitur, in qua quatuor vel quinque diebus, si putrida sit, sterillè sufficiat, si autem aqua non sit corrupta, vsque ad septem dies stare in eadem oportet, vt putrefcat caro herbalis, & cortex ex quo fit stappa.

Erit autem signum temperatæ maturationis, quando maceratur in aqua, cum tactu mollescit, adeo quod omnem rigiditatem amiserit, cognoscitur etiam si ex eo aliquid extrahatur de aqua & siccatum probetur, si caro herbalis a stappa facile separatur. Veruntamen si minus, quam expedit, maceretur, erit stappa fortior & albior, sed non perfectè separabitur caro herbalis, & erit diuor ad hlandum.

Deinde optimè lauatur & in aqua excutitur, concutitur malleolis ligneis, vt eius caro rumpatur, & deinde ad Solem calidum ponitur, & cum fuerit calefactum in pannis calidis in domo simul ponitur, & cum per aliquas horas sic steterit, gramolatur, hoc enim modo mundatur optimè, nec stappa rumpitur gramando, quod fieret si itatum gramarentur cum eleuantur de Sole. Quod si tempus fuerit humidum cum multis pannis madefactis ad ignem præparatur gramen, deinde spatulis eius mundificatio completur, deinde perçinatur, & filatur.

Lini semen, inquit Dioscorides, eandem vim habet, quam Fœnum græcum, discutiens ac molliens omnem internam & externam inflammationem, cum melle & oleo & modica aqua coctum: aut cocto melle exceptum. Tollit maculas solares crudum, & varos cum nitro & Ficubus positum. Cum lixiuio verò parotidas, iuxta aures abscessus, & duritias discutit. Herpetas, & duritias discutit. Herpetas, atque vlcera, cum vino coctum expurgat. Scabros quoque vngues remouet, cum pari Nasturtio & melle. Eadem *Plin.* etiam ea quæ in thorace hærent, cum melle eclegmatis vice acceptum, & uisles mirigat. Stimulat item ad venerem, si mixtum melli & Piperi placente modo largius sumatur. Sed & decoctum ipsius infunditur ad intestinorum & vteri resiones, & excrementa educenda. Commodum est etiam ad insellus, quemadmodum Fœnum græcum, ad vteri inflammationes.

Velorum ex Lino in nauibus vsus in mari, velut admirans Plinius, decimi noni libri principio ait: Atque vt à confectis ordiantur vultu

ratibus, quæque non solum terras omnes, verum etiam maria repleuere, feritur, ac dici neque inter fruges, neque inter hortensia potest Linum. Sed in qua non occurrit vitæ parte? quodve miraculi maius, herbam esse quæ Gades Herculis columnas septimo die Ostiam afferat, & citeriorem Hispaniam quanto, Prouinciam Narbonensem tertio, Africam altero. Audax vita, scelus plena, aliquid feri ut ventos procellasque recipiat: & parum esse fluctibus solis vehi. Denique tam paruo semine nasci, quod orbem terrarum vltro citroque portet, tam gracili auenâ, tam non altè à terra tolli: neque id viribus suis necti, sed passum, rufumque, & in molliem lanæ coactam, iniuria naturæ, ac summa audacia, & quò peruenire nulla execratio sufficit, contra inuentorem dictum suo loco à nobis. Cui non satis fuit hominem in terra mori, nisi perierit & insepultus. At nos priore libro imbres & status cauendos, frugum causâ fructusque præmonebamus, ecce feritur hominis manu, meritis eiusdem hominis ingenio, quod ventos in mari opret. Præterea ut sciamus fauile pœnas, nihil gignitur facilius: ut sentiamus nolente id fieri naturâ, vrit agrum, deterioremq; ipsum facit. Hæc Plinius.

*Vtilitates
Lini.*

At quanta censenda est velorum ex Lino utilitas, si ad reliquum Lini vsura per omnem vitam conferatur? Hoc loti detergemur, hoc fordidi defricamur. Ex hoc factâ veste totum corpus extrinsecus ad cutem integente omnes interdiu vestimur: noctu stragulis inde factis incubamus ac integimur. Rusticana gens vtriusque sexûs pallia, & tunicas ex ipso gestat: & mundus muliebris magna ex parte ex hoc constat. Sed omnes has necessarias vitæ utilitates facile superat Linum chartarum dono. Hæc ex ipso penitus detricto & nullius amplius vsû: reiticulo sunt, tot hodie vbique officinis, ut multa hominum millia ex præparandi chartas opera, in papyraceis, ut vocant, molendinis, se nutriant. His chartis & literarum notis, omnes bonæ artes, leges, tota Philosophia, & vitæ piæ ac rectæ degendæ rationes excipiuntur, habentur, conseruantur. His chartis hanc materiam medicam, & totius ferè naturæ plantas descriptas commendamus orbi. Harum utilitatem vix à nimo quis concipere possit, nedum pro dignitate explicare, quantumvis longâ institutâ oratione.

Galenus.

Verum Galenus i. de Alim. Quidam, inquit, vrantur semine Lini tosto, velut obsonio cum Garo. Vtuntur etiam melle ammixto. Aliqui etiam panibus inspergunt. Sed stomacho incommodum est, & ægrè concoquitur, & modicum alimentum corpori præbet. Ad ventris autem egestionem neque laudari, neque vituperari meretur. Exiguum tamen quid habet de ciendi vrinam facultate, id quod magis manifestum fit, vbi tostum editur. Tunc autem sistit quodammodo magis aluum. Idem 7. simpl. Semen Lini, si editur, flatuosum est, etiam si tostum fuerit. Ita superflua humiditate refertum est. Calidum est, ordine primo: verum inter humiditatem & siccitatem medium obtinet. Pinus lib. 20. cap. 22. seminis Lini vsum medicum longius describit, & multa Dioscoridis declarat.

*Linum
calidum
& hu-
midum.*

Linum, apud Tragum, communi Medicorum consensu calidum & humidum esse traditur. Semen autem rufum ac in puluerem redactum adiecto modico mellis, & Piperis, ita ut eclegma ex

his fiat, & per diem quantitate Nucis moschate sumptum, tussim mitigat & venerem stimulat. Qui internis inflammationibus infestantur, his semen Lini aqua decoctum, admixto melle, in potu exhiberi potest, & foris emplatri instar imponi, quæ medicina plurimum prodest, & quousvis finit dolores. Ad emolliendas vulgæ & interaneorum propter lentam humiditatem obstructions, in colica etiam passione prodest, corpus oleo Lini inungere, aut semen decoctum calidum foris imponere, aut ex iure seminis decocti & oleo clysteres iniicere, prout vnicuique visum fuerit. Semet Lini, necnon oleum eius illitum & impositum ambustis conducit. Quotopere porro flatuosum & recrementitiâ humiditate plenum semen Lini sit, paucis ab hinc annis Middelburgi in Zelandiis animaduerti potuit, cum propter frumenti aliarumque frugum inopiam, plerique ex ciuibus pane & cibis ex hoc coctis vescerentur. Distenta enim his valde citò hypochondria fuerunt, & facies aliæque partes tumidæ factæ, quorum non pauci sic affecti, etiam mortui sunt. Neque enim aliunde hæc symptomata, quam ex recrementitiâ seminis humiditate, quæ flatulentiam parit.

Oleum quod ex semine eius exprimitur, multiplex vsus habet, nec enim à pictoribus, aut statuariis, alijsve artibus expetitur solum, vel ad lucernas tantum vile est, sed etiam medico vsui seruit. Nam & duritias omnes mollit: nervorum tensiones contractionesque laxat, dolores illitum sopit. Sunt etiam qui bibendum exhibeant lateris aut coli dolore laborantibus, verum recens sit oportet, rancidum enim factum & nauisam excitat, & plus, quam par est, calefacit.

LINVM SILVESTRE, SATIVVM planè referens.

Linum silvestre, sativum planè refert formâ, nisi quod caules habet & folliculos crassiores, & maiores, & in summo furculis multis brachiatis. Et maxima inter hæc duo Lini genera in eo consistit differentia, quod folliculi silvestris Lini calore Solis non aperiuntur, perinde ut alterius, nam quamprimum exsiccati Sole fuerint, excutere semen ut aliarum frugum oportet, auctore Trago, qui Linum 2. & silvestre vocat: C. Bauh. phyt. Linum 2. siue alterum folliculis crassioribus.

Apud Mediomasitres hoc sylvestri Lino ad Locum uentante Æstate integri agri conferuntur, & in Tempore uenitur etiam quandoque inter fegetes Auenæ.

LINVM SILVESTRE ANGVSTIFOLIVM, flore quasi cinereo, capitulis magnis.

CAP. LXXV.

Mtram in Lino silvestri conspici varietatem satis ex Clusii Hispanicarum, Pannonicarumque stirpium historia patet: Cum verò Linum silvestre dicit, Linariam non intelligit, quæ aliquibus etiam hoc nomine appellatur, sed plantam floribus Lini similibus, eodemque modo fugacibus, nonnunquam etiam Lini folia habentem.

Linum igitur silvestre angustifolium flore cinereo, Lino silvestri angustifolio albo cum purpureis lineis omnino simile est cauliculis & foliorum

foliorum gracilitate, tenuitate, *foliorumque* formâ & *radice*: in florum duntaxat colore est differentia, qui niuei non sunt, sed cærulei in candidum languescentes, & quasi cineracei: capitula etiam floribus succedunt longè ampliora, nec minora quàm in satiuo.

Lini siluestris quinti, angustifolij secundi varietas hæc in Austriacis Alpibus præsertim verò Sneberg inuenitur: Floret verò isthic sub finem Iunij, semen extremo Iulio & Augusto maturum.

LINVM SILV. ANGUSTIFOLIUM.



DVram lignosamque possidet radicem, satis crassam, ex qua germinant multi simul caules tenues, qui ad cubitalem altitudinē ascēdunt, *folijs* stipati cōfertissimis, tenuissimis, lōgitudine ferè Lini satiuū: ex calycibus lōgiusculis flores extremis ramulorum breuium nascuntur, magni, albi, vel quasi

cinerei, fortuitis cæruleis striis sublucentib., tam caduci ut vix attingi possint, quin delabantur, vascula minora quàm Lini satiuū, quadripartita, *femine* Leni, minore, Figura Fuchiana non satisfaciunt.

Camer. hort. dicitur Linum silv. tenuifolium, flore albo, cæruleo intensè, & dilatè purpureo. Et aliud pusillum candicantibus floribus spontè vbiq̃ue occurrens, circa vineta Franconiz. Gerard. Linum silv. tenuifol. 1. & 2.

An Clus. Hispan. Linum silv. 2. siue angustifolium?

An Trago Linaria species quarta?

Caſpar. Bauhinus phyt. Linaria 14. siue folijs capillaceis, tenuifolia H. Lugdunenſis. Item, Linum 7. siue silv. angustifolium, flore minore primum.

Variis circa Viennam Austriæ locis spontè nascitur, præsertim in gramineis accliuatibus, & iuxta vias. Floret Maio & Iunio, interdum etiam tota æstate: semen verò maturum est Iulio.

LINVM FRVTESCENS FLORE omninò candido.

CAP. LXXXVI.

FRuticosum atque dodrantalibus pedali- bus, quæ ferè ramulis semper virentibus præditum est, quos numerosa *folia* exornant, mediæ inter Thymi & Pſyllij magnitudinis, subalbida, flores deinde superiori paulò maiores, quinque folijs vi illi constantes, omninò niuei, sum-

Tom. III.

mis ramulis insident, quibus succedunt capitula *femine* plena: *radix* dura & lignosa est.


Clusio descriptionis authori dicitur in Hispan. Linum 3. siue silv. fruticans: In Hist. post. Linum silv. 7. fruticosum.

Exit desertis quibusdam Hispaniæ locis, Sole illustratis: floret Iunio & Iulio, atque subinde semen profert. In Belgio satum, tertio duntaxat à satu anno serius floruit, nec semen cult.

Locus & Tempus.

LINVM SILV. ANGUSTIFOL. ALBVM, lineis in vmbilico purpureis.

CAP. LXXVII.



DOdranta- Descriptio. les, nunquam etiã pedales habet cauliculos, graciles, firmos, rectos: *folia* satiuū Lini, angustiora, dura, mucronata, virentia, amaricantia: *flores* in summis cauliculis multos, magnos, quinque folijs albis præditos, circa vmbilicū quinque purpureis lineis distinctos, totidem staminibus, &

quinque separatis apicibus ex medio vmbilico prodeuntibus, odoratos: *femen* in rotundis vasculis planum, nigricans, splendens, satiuo Lino simile: *radicem* candicantem, duram, aliquot fibris donatam, perennem, & singulis annis novos cauliculos proferentem, authore Clusio, qui in Pannon. p. 303. & 304. Linum silv. 4. siue angustifolium flore albo cognominat: In Hist. post. Linum silv. 5. angustifolium secundum: flore ex diluta putpura candicante, & quasi carneo.

Synon:

Linum silv. florens obseruauit Monspessulensi mense Aprili & Septembri: Basileæ prope Krenzach Octobri: prope Leurach in monte Augusto: Linum silv. 6. angustifolium Clus. in Hist. post. primum obseruatum in anteriore Madritianæ silvæ parte, quæ secundo ab vrbe Lutetia lapide distat, inter gramina, loco aperto, & nullis arboribus obſito, florens Iulio, maturum semen profertens Augusto: deinde agro Viennensi aridioribus gramineis locis.

LINVM SILVESTRE LATI- folium hirsutum flore cæruleo.

CAP. LXXVIII.

RAmus nobis datus Argentinæ anno millesimo-quinquagesimo-nonagesimo quinto, ex plantis Agenij, cubitalis, satis crassus, firmus, hirsutus, in quo *folia*, semunciam circiter lata, paulò longiora, acuminata, pilosa,

D d d

venosa: flores extremis ramulorum, in quos superiore parte caulis diuiditur, hærent simul multi, Alceæ floribus pares, coloris cærulei, aut ex cæruleo palliscentis, quorum imum obuoluit foliaceus calix hirsutus: supremæ partes Heliotropii modo flectuntur. Anno 1600. nobis dati alii rami singulares, cubitum excedentes, sub inscriptione Lini siluestris latifolii floribus rubentibus, foliis & caule viscosis ex Sumano monte prope Bassanum oppidum & circa Bononiam. Huic Lino caules & folia hirsutiora, vnciam longiora, acutiora: flores magni quidem, sed minores, purpurascens, saturationibus lineis insculpti: in foliis sapor nullus manifestus.

Synon.

Clusio Pannon. pag. 298. Linum silv. latifolium flore cæruleo: item pag. 299. ad figuram Linum silv. 1. In Hist. post. Linum silv. 1. latifolium: Lobel. Obs. pag. 226. Linum latifolium, foliis hirsutis, Tithymali Heliotropii paribus: Num autem hæc eadem sit planta cum Latifolio Clusii siluestris Lino Alcyri folio, affirmare dubitat. Icon. Plant. pag. 414. Linum silv. latifolium. C. Bauh. phyt. Linum 4. siue silv. latifol. flore cæruleo magno.

Locus.

Frequens est multis Pannoniæ superioris & Austriæ inferioris locis editioribus & siccioribus, graminis tamen. Floret Iunio & Iulio: semen maturum Augusto. Rantzius, qui Lini latifolii alpini purpurei titulo portionem nobis communicauit, in Baldo provenire retulit.

Linum silv. latifolium lanuginosum: flore candido, purpureis lineis striato.

Descriptio

P Edales, graciles, lanuginosus, ternos, aut quaternos ab una radice promit caules, in quibus Lini latifolia folia trinerua, ad Alcyri formam ferè accedentia, nec multum à prioris foliis discrepantia, lanuginosa: extremi cauliculis in binos, aut ternos ramulos diuisi, & Heliotropii maioris quodammodò instar circumflexi, pleni sunt floribus, qui ab imo aperti incipiunt, Lini florum diuisurâ, sed maioribus, superiori æqualibus, candidis, quos multa purpureæ venæ interfasciunt: semen & capitula Lini similia radice perennis est, crassiuscula, longa, candicans raris fibris septa.

Synon.

Clusio, descriptionis auctori, est in Hist. Pannon. pag. 295. Linum silv. 1. Hispanicum. Hist. post. Linum silv. latifol. secundum, sine icone.

Locus & Tempus.

Apud Colibriam Lusitaniam urbem hanc stirpem duntaxat obseruare meminit Clusius, ad desertum quoddam & solitarium templum mense Nouembri repullantem, è cuius cauliculis semen collectum in Belgicam attulit, quo terræ commisso, vnica planta nata est, cubitalem excedens altitudinem, & latioribus natali solo foliis, quæ singulis annis sub Æstatis finem quidem floruit, sed nullum semen præbuit.

LINVM LATIFOLIUM luteum.

CAP. LXXIX.

Descriptio

Linum latifolium luteum caulibus adolefcit angulosis, firmis, cubitum altis, pluribus ex una radice ortis, & superius in ramos breues diuisis, quos folia vestiunt alternata, glabra, vnciam

longiora, semunciam lata, in obtusum mucronem desinentia, sapore amaro prædita: flores numerosi extremis ramulis innascuntur, magni, è quinque foliis compositi, lutei coloris, quinque staminibus, toridemque villis luteis, medium obfidentibus: semen, teste Clusio, in capitulis compressioribus,



reliquis paulò minus, nigricans quidem, sed non splendens, quemadmodum illorum: radix satis crassa, contorta, albicans, aliquot fibris donata, singulis annis repullulans, nouosq; caules producens.

Clusio in Pannon.

non. pag. 300.

vocat Linum

silv. latifolium

flore luteo:

pag. 301. Li-

num silv. 2. In Hist. post. Linum silv. 3. latifolium.


Tabern. Icon. & Hist. (vbi primum) Linum silv. Pannonicum: C. Bauh. phyt. Linum, siue silv. latifolium flore luteo magno.

Gerardus ineptè pro Lino satiuo posuit iconem Lini silv. Pannonici Tabern.

Exit abundè in monte Badcibus Austriæ thermis imminenti, locis graminis secundum fepes, & plerisque aliis in montium illa serie ad Danubium vsque excurrente, locis: ad siluulam item Lachn. pago vicinam: Floret Iunio & Iulio: semen maturat Augusto.

LINVM LVTEVM NARBONENSE.

CAP. LXXX.



AB una radice caules surgunt plures, cubitales, qui superius in ramos diuiduntur, per quos folia mollicella, latiuscula, breuiora quam Lini satiu, insipida: flores extremis hærent ramulis, Lini, sed coloris lutei, amaricantes, quibus succedunt capitula minora quam Lini satiu, satis amara, semen continentia.

Monspelij

Montpelij iam descriptum Linum à nobis obseruatum, florens Septembri. Verum ibidem in maritimis Autumno aliud longè maius obseruauimus, ad duos cubitos excrefcens & vltra, ramis crassioribus, firmioribus: folijs longioribus & latioribus, salu faporis: floribus luteis, facillè deciduentibus: capitulis amaris, sine salugine.

Simile nobis prouenit Montbelgardi in horro Ill.E.C. excedens duos cubitos. Qui stirpium diligentes indagatores haberi volunt, Montpelij obseruent, an sit differentia aliqua, vel varietas tantùm ratione loci.

Matthiolo in post. comm. vti existimo, est Linum siluestre. Sed & Dod. lat. in fol. Linum appellat siluestre, quòd non sciam, sed spontè exeat, & Marinum Linum, quòd maritimis gaudet, in staminibus diduci & istud posse creditur. Lobelio in Adu. dicitur Linum marinũ luteum, quibus in Obs. pag. 225 & Icon. Plant. pag. 312. vox Narbonense additur. Casp. B. in phyt. Linum 3. siue matitimum luteum. Camer. hort. Linum silu. Matthioli latifolium flore luteo, in agro Bononiensi vbique proueniens. Haud procul à mari (inquit Dod.) in pratis ac herbosis locis, in nonnullis regionibus gignitur, veluti in Narbonensi Gallia.

LINUM PYMILVM FOLijs SEMPER
bina, albo flore, vel luteo
pallente.

CAP. LXXXI.



Exili, rotundo, do-
drantalique,
aut paulò ma-
iore assurgit
cauliculo, quem
aduerso situ,
vt in Hyperico,
bina semper
amplectuntur
foliola, Lini
latiui folijs
ferè paria:
supremus cauliculus in aliquot
ramulos diuiditur, qui in oblongis
pediculis exiguis flosculos,
quinque fo-

liolis albis constantes, proferunt, luteis
intus staminibus: flosculis succedunt parua
capitula, Lini vasculis non absimilia, minora
tamen, in quibus semen: radix tenuis, aliquot
exilibus fibris donatur, sed an perennis & rediuiua
ignoratur à descriptore Clus. qui in Pann. p. 305
& 306. Linum silu. 5. siue Chamælinum Pannon.
vocat, & in Hist. post. Linum silu. 8. Chamælinum,
& silu. 8. angustifolium. Lobel. in Icon. Plât.
pagina 413. nomine Chamælini eandem cum
Clusio habet iconem, quæ occasio, vt non separe-
mus, quamuis in Obseru. pag. 227. ei alium colo-
rem adscribat.

C. Bauh. phyt. Linum 9. siue silu. minimum flore
& candido & luteo vidit.

& Prouenit in herbosis collibus & montanis Aus-
trix atque Pannoniz: floret verò Iunio &
Tom. III.

Iulio. Similem aliquando ad Clusium Machliniam, è Tornacenti vrbe Ioannes Moutonus milit.

ALSINE VERNA GLABRA. FLOSCVLIS
albis, vel potius Linum minimum.
CAP. LXXXII.



Ex radice
tenui, sed
rigida, ex-
pansis, sed mul-
tis filis capil-
lata, coliculos
mittit non-
nihil reptan-
tes, mox hu-
ius ad palmũ,
aut altius sese
attollentes, fa-
tigio sursum
raro, n-
tante, teretes,
tenuis, geni-
cularos, pro-
pter terram
rubefcentes:
foliola infima
Alines mino-
ris, ferè rotun-

Descript.
Radix.
Cauliculi.

data superiora, quæ in caulibus bina opposita ad
articulos nascuntur, paulò longiora, sapore sub-
amaro & subacri: flosculi candidi, è quinque fo-
liolis compositi, apicibus intus luteis: vascula
succedunt Lini, parua, canaliculata, in quibus se-
men luteum & lubricum, Lini, compressum &
oblongum.

An Linocarpus Thelio: Camer. Linum silu.
exiguum in hortorum areolis sæpè prorumpens.
H. Lugd. pag. 1234 Aline verna: C. Bauh. phyt.
Aline 20. siue pratensis glabra. & Belvedere quo-
rundam.

Aline verna Dalechampii circa Geneuam in Locus &
segetibus floret mense Martio: Montbelgardi in Tempus,
prato sicco vbi olim fuerunt horti ferarum, ante
pontem & passim Maio, Iunio, Iulio & Augusto.

PASSERINA LOBELII.
CAP. LXXXIII.



Folius est Descript.
per caulem
dodrantalem
confertis, Lini
similibus, viri-
dantibus, acu-
minatis, vn-
cialibus, circa
superiora ra-
rioribus: flo-
ribus in sum-
mis ramulis
brevibus, a-
ceruatim con-
gestis, luteis,
quos excipiunt
vascula exi-
gua, turbina-
ta, Lini, dimi-
did, aut triplò
minora, fo-
liolis quibus-
D d d 2

dam acutis vudique obuoluta, *semine* plena lubrico, lucido, fusco, multò Lini seminibus minore : radix satis longa, tortuola, alba, lignosa.

Synon.

Lobel. in Icon. Plant. pag. 411. vocat Passerinam Linariæ folio, & sic etiam in Obseru. pagina 224. vbi & Chrysocomen alteram Muto-
ni.

C. Bauh. phyt. Lithospermum - & Passerinam alteram Monspeliacam, non semper vno caule exurgentem.

Locus.

Basilæ anno 1594. vidi plantam siccam apud C. Bauhinum, quæ ei missa fuerat per D. Paschalem. Gener. Io. Henr. Cherlerus attulit Monspelio. Meminit Dom. Schvartz Passerinæ cuiusdam arborescentis Candix cuius semen ei missum per Casabonam. Nos nondum vidimus.

PASSERINA TRAGI.

CAP. LXXXIV.

Descript.



Lingux passerinæ nomen fecerunt *foliola* acuminata auiculæ iam dictæ linguam imitantia, alternatim, rariis aduersa, *cauli* dodrantali & altiori recto, tereti, sæpè simplici, interdum ramoso, sine pediculis adnata, sapore viscido prædita, ex quorum alis *stipiculi* plures pusilli oriuntur, calathis formâ, ex herbaceo

fluascentes, oris in quatuor lacinias diuisis : *semina* parua, turbinata, nigra, Lithospermi seminibus multò minora.

Passerina Tragi.

Tragus Passerinæ nomine depingit & describit, ac tertium Lithospermi, vel Mihj Solis genus facit, indeque germanicè *zuiden Meerbirs* vocat, & Dyospyron Theophrasti esse somniat.

Lobel. in Adv. Passerinam Herbariorum appellauit: Camer. hort. Passerinam Tragi: H. Lugd. pag. 1152. Passerinam, Linariæ folio Lobelij. Tabern. Icon. & Hist. linguam passerinam *Spitzen zung* : Dodon. gall. Lithospermum minimum Tragi, *Gremil sauage fort petit* : Casp. Bauh. Lithospermum 6. hæc minimum Passerina dictum.

Locus & Tempus.

Prouenit Montbelgardi in agris, Augusto semine maturo : item inter Taillecourt & Audincourt, versusque Matchai castellum. Inter segetes Basilienses obseruauit Casp. Bauhinus : In agris Franconiæ inter Herbigolim & Francofurtum copiosè Camerarius : Inter oppidum *Alzeim*, & montem tonitru post messem in agris frumentariis Tragus.

LINARIA LVIEA VVLGARIS.

CAP. LXXXV.



Primoquam *floribus* pro-
ducatur Linaria,
adèd Tichy-
malum cypa-
rissiam menti-
tur, vt nisi lac-
dessest Tichy-
ma, difficile fu-
turum esset iu-
dicium : tan-
ta est foliorum
similitudo : at *flo-
res* in thyclum
digesti, vt vel
primo intuitu
ab errore pro-
hibeant, qui
huic posticâ par-
te corniculum
Consolidæ re-
giæ proferentes,

anticâ parte Anthirini tictum imitantur, colore luteo præditi, apiculis concoloribus : reperitur interdum flore albo : *semen* in capitulis rotundis latum : *radix* lignosa, dura, alba : varias hinc inde fibras emittit, ac suo reptatu in hortis odiosa sapor plantæ amaricat.

Linariæ herbæ plura sunt genera, quæ singula seorsim recensenda. Vulgarissimam autem hanc Linariam à vulgari exigua *Esula*, cui plurimum propinqua, vel sequens discernit vericulus :

Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Existimatur a multis esse *Olyris* : sed *Olyris* ab hac differens est stirps, ex qua videlicet *nephura*, *h. e.* scopas hac ætate, in Italia componunt : vt & olim Galeni seculo : quam vulgò Itali *Belvedere* nuncupant.

Tragus *Olyridis* & Linariæ titulo eam donauit, & primo loco pro vulgari Linaria descripsit. Videtur autem ei hæc planta rectius *Cynocapha* vel dici posse, quæ in *Ægypto* (vt prodidit Apion Grammaticus) *Olyrites* cognominatur, & aduersus veneficia à Magis vsurpatur.

Sed & Lobelius, qui in Ic. Plant. pag. 406. *Olyridem*, Linariam & Vrinariam (vt & in Obs. pag. 222. vbi etiam Chrysocomè Gesneri Dalech. vocat) inscribit, in Adu. Plinii Antirrhinum facit. Dodonæo etiam gall. & lat. Antirrhini species videtur, licet in Hist. gall. eam *Olyridis* : & in lat. Linariæ primæ titulo pingat. Fuchsi quoque constans est opinio Linariam esse *Olyridem* Hunc tandem Adrian. Spieg. Isag. lib. 1. cap. 23. sequitur : itemque Eur. Cordus, cui *Herba vinalis* est hæc ipsa Linaria, contra vulgares Herbarios, qui has quasi duas distinguunt.

Cusio dicitur Linaria vulgò nota, & omnibus ferè prouinciis familiaris : Camerario hort. Linaria vulgaris. Hist. Lugd. pagina 1151. Linaria vulgaris flore subluteo : Casp. Bauhino phyt. Linar. 1. siue vulgaris lutea flore maiore : varians floris colore, luteo-pallido, magis luteo, aliquando albo.

Ponit

l.no. Ponit Compiler Tabern. tam in Icon. quàm Hist. figuras duas, Olyridis maioris vnam, alteram minoris, nullo appposito discrimine, quàm magnitudinis.

l. la. Gerard. ambas assumpsit, sed præter rationem exhibet pro Linaria Valentiz, eam quam Tabern. pro Olyride minore ostendit.

l. v. Dorst. Olyrim, Linariam, quam Esulam aduterinam vocat, & Herbam vrinalem confundit, & commiscet. Non probamus autem eum p. 149. ponere duas icones pro Herba vrinali & Olyride: & postea p. 173. eadem locare pro Linaria & Olyride, vbi etiam non bene germanicè, *wild wulffs milch*, hoc est, Esulam filu. & *Scheffkraut*, hoc est, Cacariam vocat, siquidem non purgat.

l. k. Linariam Germani appellant *lynkraut*, *flachkraut*, *wald*. & *wild flachs*, h.e. Linum siluestre, vel etiam Pseudo-Linum: *harnkraut*, i. e. Vrinalem, quæ vox magis propriè aliis plantis debetur. *Ufer fravven flachs*, vel *harrs*, e. v. Pannoniæ mulierculas rhizotomas interpretemur, Diuæ Virginis Linum, vel capillū. *Nabelkraut* Herbam vmbilicis, aut vmbilicalem. Multi *Gal Ritter sporen*, h. e. Consolidā regalem luteam *krotten flachs*, h. e. Linum bufonum. Belgæ *wilt vulas*. Galli *Linatre* & *Lin saunage*. Angli *rode flar*. Boh. *len mirky bozi*. Hung. *Vad len* & *Vad fravv*, Itali & Hispani Linaria.

Linariam autem dixerunt recentiores à foliis quæ Lini faciem referre videntur.

l. & Nascitur passim in Germania ac Belgio secus agrorum margines, & aliis locis. Floret Iulio ac Augusto, ac etiam seriùs, vt Septembri & Octobri.

l. v. Vulgaris Linaria, alui turbatrix est, inquit Tragus. temperamenti humidi & calidi. Extrinsecus maiorem habet vsum, in iis quæ refrigerationem potius, quàm calefactionem requirunt. Aqua enim in linteolis imposita id præstat. Aquæ quantum vitrum exiguū capit, admixta drachma corticis ebuli in puluerem redactis sumpra portio, vrinam potenter cit, quare hydropicis tantum medicamenti exhibendum erit. Eadem aqua distillata ac pota, aluum laxat, morbum discutit regium, aduersus quem herba ipsa vino decocta ac pota inprimis facit, sicut & iecur obstructionibus liberat. Aqua distillata aut succus oculis inditus, inflammationes eorum & ruborem tollit. Linaria, aqua eius, & succus, quæuis vlcera mundant, cuiusmodi sunt cancer, & fistulæ, linteolis imposita, & si cum aqua loci affecti colluantur. Succus idem maculas & vitia faciei emendat, quare superbis mulierculis, quæ puram & immaculatam faciem affectant, conuenit. Fuchsius vehementer errare eos scribit, qui Linariam frigidā & humidam esse asserunt. Et certè vel hoc vno argumento erronem illorum sententiam confutare omnium maximè licebit. Cum etenim Linariæ vrinam mouendi facultatem inesse scribant vulgares etiam herbarij, colligitur illam non esse frigidam & humidam: quādo Galeno lib. 5. simpl. c. 12. attestante, omnia quæ vrinam ducunt ex acurium arque adeo calidorū & siccorum sint genere. Est igitur Linaria calida quidem & aliquantulum sicca temperie, & apertendi potentia prædita, teste Dodonæo. Quod verò multi regio morbo laborantibus eam prodesse dicant, id ab Olyride huc transfatutum esse perhibet.

* *

Tom. III.

Linaria vulg. lutea flore minore.

Alterum hoc Linariæ genus, tam descripto per Descript. omnia simile est, nisi quod flores habet multò & Synop. minores, subluceos, autore Trago. Et hinc C. Bauh. in phyt. nominauit eam Linariam 2. siue vulgarem luteam flore minore.

Hæc in agro VVormaticensi è regione oppidi Altrzen inuenitur.

LINARIA LVTEA PARVA SERPENS.

CAP. LXXXVI.

P Almaribus exit virgulis, frequentibus, humi (parlis, quas vestiunt folia vulgaris foliis familia: extremos ramulos occupant multi flores flauis, vulgari minores, veluti in spicam congesti, quibus succedunt capitula minorā quàm in vulgari, exiguo femine nigro plena: radix tenuis est & candida, vulgaris modo serpens.

Clusius, cuius descriptionem assumpsimus, in Synop. Hisp. nuncupat Linariam pumilam: In Hist. post. Linariam Hispanicam quintam. Hanc, quia valde amara est, & plerumque cum Chamepiti nascens reperitur, adeoque pumila est, Salmanticenses Chamepityos genus esse censebant. Lobel. p. 223. vocat Linariam pumilam Clusij minorem, sed non abfimilem: In Icon. Plant. p. 410. Olyridem flauam siluestrem: C. Bauh. phyt. Linariam 3. siue luteam pur illam supinam.

Salmanticensi agro, aridis locis hoc genus pumilum inuentum ab authore, vbi tota terè ætate florebat.

Descript.
Virgula.
folia.
Flore.L. v. &
Tempus

LINARIA LVTEA PARVA ANNUA.

CAP. LXXXVII.



M Agnitudine varia mihi creuit, aliàs setquipedalari, aliàs plusquam drantali, ex radicibus paruis, albicantibus, pluribus: sunt autem caules, qui tenues & numerosi existunt, & folia quæ teneriora, angustiora, crassioraque quàm in vulgari Linaria, colore glauco, terna, vel quaternaria, aut quinaria, ex certis intervallis, aliàs verò incondita, subamaro sapore: *stoculi* in ramulorum fastigiis, Linariæ forma, crocei, sed quadruplò minores, odore nullo, quos excipiunt globuli oblongi *semen* continentes paruum, orbiculatum, compressum: radix tenuis est & annua.

Clusius vocat Linariam Pannoniæ & vicinam regionum secundam, & Morauicam primam.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. provenit ex semine.

D d d 3

Descriptio
Rad. &
Caulis.
Folia.Linaria
MorauicæLocus &
tempus.

mine Heidelbergæ in horto Sprengeri, vbi decido quorannis se propagat, collecto. Lutetia extra portam Honorii in aruorum marginibus & colliculis collegit Gener Cherlerus Iulio; Clusius verò in variis Moravia collum accliuatibus: Floret quasi tota Æstate, etiam in Autumnum vsque.

LINARIA PANNONICA FLORE LVTEO
minore quàm in vulgari.

CAP. LXXXVIII.

Descript.

Syaon.



EX plâtis ab Agerio missis ex Pannonia mihi delata pulchra hæc species floribus aureis, minorib. quàm in vulgari: foliis quinque ab illa differentibus, latioribus & brevioribus.

Clusio, qui describit, est in Pannon. & Hist. post. Linaria Pannonica 1. (sic etiam Tabern. in Icon. & Hist. inscribit) siue maior. Gerardus ineptè Tabern.

iconem Linariæ Pannonicæ 1. quæ lutea est, pro Linaria purpurea altera pingit. C. Bauh. phyt. vocat Linariam 7. siue pallidam minore flore.

xxv.

Crescit in montium decliuius secundum publicas vias, & gramine nudis locis, supra Poseniũ ad Danubium, Gum postkirchen, Leytenberg, atque etiam in Moravia. Floret Iunio & Iulio, ac interdum etiam Augusto, & lubinde semen profert.

LINARIA MAXIMA FOLIIS LAVRI
Dalmatica.

CAP. LXXXIX.

Descript.



Folia maxima hæc profert, & ad foliorum formam accedentia, vncias duas, aut etiam tres longiora, vnciam quædam ferè lata, in summitate cauliũ semper breviora & angustiora, omnia autem in utrumque deficiente: caules multos, cubitales ac bicubitales, ramosos: flores luteos: magnitudine Anthirini maius.

C. Bauh. phyt. Linaria 19. siue Americana. An Camer. hort. Linaria altera flore maiore & magis luteo?

Montbelgardi in horto Ill. E.C. & meo ex f. Loc. mine mihi prouenit.

LINARIA TRIFOLIA.

CAP. XC.



Nihil mihi Delinaria folia habet, quæ per ramos pedales & longiores, crassiusculos, succulentos teretes, inferiore parte rubescentes superius viridates, ex certis intervallis pulchrè disposita, ex eodem loco terna caulem amplexantia, potissimum parte inferiore, circa fastigium enim sparsim nullo ordine

digeruntur: accedunt ea verò nonnihil ad Fabæ inuertsæ folia, quibus minus crassa, succulenta, minime tamen per ambitum incisa, circa exortum latiuscula, in obtusum definentia, pari ferè latitudine cum longitudine, sinuatis nervis, ad modum ferè Plantaginis, posticâ parte minime apparentibus, donata, acetabuli instar concava, caulemque aquam exceptam continentia, sapore amaricante: Verum flores serie longâ dispositi, Linariæ vulgaris similes sunt, lutei, tinctori tamen labello & necti lanuginoso, corniculo purpureo extra folia visdantia, quæ floribus batinantur, porrecto: floribus succedunt capitula rotunda, in quibus semen, quod nobis videre non contigit: radix subest singularis, crassiuscula, caules plures emittens.

Clus. in Hist. inscripsit Linariam Valentiam: In Hist. post. Linariam Hispanicam 1. Lobel. in Obs. p. 213. & Icon. Plant. p. 408. Linariam Valentiam Clusii.

Casp. Bauhini in phyt. Linariam 4. siue luteam folio Centaurii, & Linariam 5. siue luteam latifolia peregrinam, Linariæ latifoliæ Valentiniæ Clusii nomine à Doldio missam: duas non facio distinctas, sed vnam, culturâ tamen variantem.

Circa Valentiam Hispania: in pratis & locis umbrosis Martio florentem obseruauit Clusius. Montbelgardi verò in horto Ill. E.C. VV. prouenit, florens Iulio & Augusto, semen verò maturans Septembri.

Linariæ nomen huic idem indidit, non à foliorum similitudine, quæ non conueniunt, sed quia eius flores vulgari formâ similes, & eiusdem ferè temperamenti sunt, nam commanducata manifestam acrimoniam, cum quadam amaritudine coniunctam exerit ipsa plantata.

LINARIA

LINARIA ODORATA
Monspessulana.

CAP. XCI.



R Edtis & rigidis stat *caulibus*, bicubitalibus, iuxta terram rubescentibus, quos Linariæ vulgaris *folia* angustiora, denso stipatu ornant, sapore amaricante: summum caulis fastigium in furculis aliquot abis, qui flores sustinent eodem quo in Linaria vulgaris dispositos ordine, calcari longè brevioribus, & parum apparentibus, quæ in re differunt à planta Linariæ aliquatenus simili, sicuti & in eo quod flores sunt maiores, odore gratissimo, superiore folio pallido, purpureiscentibus striis variegato, inferiore in tres lacinias albas diuiso, rectu lacinioso, amethystino croceoque colore picto: *femina* parua in vasculis subrotundis, herbarum Linariæ iam dictæ similibus, sed maioribus, sapore, ut mihi videtur, adstringente: *radix* viua in latus serpit, colore candida. *Flores* in figura hic exhibitæ minùs bene expressi sunt.

Camer. in horto vocat Linariam flore albicante, & ob odorem, quem spirat, Caryophyllatam, atque radicibus admodum se propagare, & diu durare in hortis.

H. Lugd. pagina 1151. Linariam odoratam vocat flore ex cæruleo albicante, suauissimè olentem.

Clus. in Hisp. & Hist. post. Linariæ odorata nomine pingit, & describit tantùm flores: cætera sunt alterius plantæ, nempe Linariæ folio Bellidis: miror eum in Hist. post. non emendasse errorem illum, & veram Linariæ odoratæ figuram posuisse.

Ex semine à Zvingero misso Linariæ albæ nomine prouenit Montbelgardii in horto Ill. E. C. insigniter repens: reposita Hiemem perfert, floréque Iulio, Augusto, & Septembri: minùs verò odorata est, quàm Monspelij proueniens.

LINARIA ALBA, VEL ALBICANS
INODORA.

CAP. XCII.

O Syridis albæ, ut Lobel. in Icon. Plant. p. 408. inscribit, descriptionem nullam adscribitur: quia eam nondum apud quemquam reperimus, nec ipsi etiam plantam, quantum recordamur, obseruauimus. C. Bauh. phyt. vocat Linariam 6. sue albo flore. An Camerar. hort. Linaria flore albicante, inodoro, sed eleganti, & penè æqualis magnitudinis, &c. vide antè.

LINARIÆ ALIQVATENVS SIMILIS,
folio Bellidis.

CAP. XCIII.



Ex vasculorū & superiorū foliorū argumento in Linariarū classem refero: *radix* subest crassiuscula, lignosa, alba, contorta, simplex, interdum multifida: ex qua germinant multa per tertiam spatia *folia*, ferè Bellidis maioris aut Agerati, profundè in ambitu serrata, glabra, cætera, reliqua per ramos tenuia, angustissima, longiuscula: *caules* ex radice statim plures oriuntur, cubitales, teretes, multum ramosi: quos ferè totos vnâ cum ramis ornant longâ serie *flores* ex foliorum sinu prodeuntes, exigui admodum & quodammodò hiantes, partim cærulei, partim albi, nullo calcari donati: *vascula* delapsis floribus succedunt, multa, parua, subrotunda, & veluti bipartita, quibus *femen* clauditur copiosum, minimum, subrotundum, amarum.

Compiler Tabern. non contentus assu- mere figuram Oxyridis odoratæ purpureæ, *vol. notatur.* riebend purpur harnkraut, composuit ex duabus plantis, confudit cum tertia. Gerardus quoque imitatus Tabern. habet figuram falsam ex duabus compositam, confundens cum duabus plantis etiam tertiam.

Descriptio Clusij Linariæ odoratæ conueniret Clus. *ve?* plantæ à nobis descriptæ, si non diceret florem habere hamulum incuruum: sed & flores in calcaribus non conueniunt, nec etiam titulus odoris. Quare existimo vnâ descriptione & vno titulo duas plantas esse ab ipso traditas. Miror autem, eum in Hist. post. meliorem iconem non exhibuisse.

Vnius nostræ plantæ H. Lugd. duas habet figuras, quarum vnâ extrat pag. 1151. Linariæ cæruleæ Dalechampiij titulo, cui folia adscribit proximè radicem Bursæ pastoris, caulem verò vestitum foliis Linariæ similibus, angustioribus, florem ex cæruleo albicantem. Alteram ibidem inscripsit Linariam odoratam Dodonæi, cui folia Bellidis. Hæc autem figura ex duabus diuersis composita est: folia enim inferiora Bellidis forma rectè pinguntur, superiora verò non item, quæ oblonga esse debent, angusta, Lino similia, ut in descriptione nostra habetur: flores etiam in viua planta corniculis destituuntur: quare ex planta viua Monspelij collecta nouam figuram damus. Et hic error à Clusio prius commissus à me obseruatus, quod indicare debebat Frater in Animadu. suis in H. Lugdunensem: Is eius in phyt. non meminit: nec etiam ostendit Linariam cæruleâ Dalechampiij esse summitem Linariæ odoratæ Dodonæi: & vicissim, Linariam odoratam Dodonæi esse in-

seniorem partem Linariæ cæruleæ Dalechampii, sed malè duas diuersas plantas constituit. Linariam odoratam Clusii, siue Dodonæi vocat Linariam 8. siue purpuream Bellidis folio: Linariam cæruleam Dalechampii, Linariam 13. siue cæruleam angustifoliam. Frater igitur qui secutus est meam opinionem, non animaduertit in H. Lugd. vnus plantæ duas dari icones.

*Lobel. 167
preh.*

Lobel. in Icon. Plant. p. 407. inscribit Linariam purpuream odoratam. Miror autem eum hanc figuram incommodam assumpsisse: præterea purpuream odoratam cognominare, ac in Obs. p. 222. ad Aduersaria referre, cum ibi non fiat vlla mentio Linariæ odoratæ: & Clusius loco proximè citato addat, in calidis regionibus aliquantulum duntaxat esse odoratam, in Germania verò & Belgicis hortis inodoram, & Linariæ purpureæ florem non nihil emulati: Selamoides maius Salmanticenses nuncupare, quamuis descriptioni non conveniat.

*Locus &
Tempus.*

Montepelluli florentem & semina matura fentem reperi mense Octobri in montibus circa Elperon & Gangen. Eadem mense Iulio mihi occurrit in agris inter Valentiam & Lugdunum. Gigni in aridis, squallentibus & apricis: florere Maio desicente in H. Lugd. perhibetur.

Refertur apud eandem H. Lugd. vlcera sordida purgare, lumbricos interficere, obstructions expedire.

LINARIA PURPUREA MAGNA.

CAP. XCIV.

Descrip.



tes, colore purpureo præditi, minores multò quàm Linariæ luteæ: semen in vasculis parvis bifidis continetur.

*Linaria
al. n.
Dod.*

Dodon. in Hist. lat. Linariæ alterius nomine describit, dicens in lib. de Florib. flores habere in cæruleo purpureos: in fol. verò lat. purpureos: viderique sibi speciem Antirrhini: sed nullibi depingit. Lobel. in Adv. Linaria purpurea, vt fruticosior sic elegantior multò & rarior. Eidem in Obs. p. 223. & Icon. Plant. p. 407. Linariæ purpureæ varietas.

C. Bauh. phyt. vocat Linariam 9. siue purpuream maiorem, Oxyridem alteram Dodonæi, & Linariæ purpureæ varietatem Lobelii, variantem

flosculis purpureis, purpureo-violaceis, albis & cæruleis: foliis item latioribus & angustioribus: Item, Linariam 13. siue cæruleam angustifoliam, & cæruleam Dalechampii. An verò Dalechampii separanda sit à Lobeliana considerandum. An Camer. hort. est Linaria flore cæruleo?

Geneux florebat in horto meo Iunio, Montebelgardii Iulio: Stutgardiae in horto Ill. C. Linaria violacea magna Iunio.

LINARIA PURPUREA PARVA. CAP. XCV.



Subest radix tortuosa cū fibris longiusculis: caules cōplures, palmares & maiores, in terram reclinati, ramosi, foliis amicti veluti ex geniculis, modò singularibus, modò ternis aut quaternis, vix quadrantem vncie æquantibus angustis: extremis ramis flores multi congestiherent Linariæ vulgaris, minores, longis calcari-

bus præditi, cæruleo-purpurei, folio superiore bifido, apicibus in rictu luteis, concolori etiam labelli portunculâ penitiore: succedunt vascula penè rotunda, calyce ex quinque foliolis excepta, quæ continent semina longiuscula compressa; qualia sunt Alyssi Dodonæi.

Clus. in Pannon. pag. 307. & 309. vocat Linariam Pannonicam 2. siue Alpinam pumilam: In Hist. post. Linariam 3. Stiriacam. Tabern. Linariam Pannonicam. 2. Vngersich Linkyaut. Gerard. Oxyridem albam vultu toue flaxe. An verò iconem Tabern. legitimè albam faciat, considerent lectores. Imago apud H. Lugd. pag. 151. Linariæ minoris Dalechampii, quod folia inferiora attinet, non in omnibus placet: C. Bauhin. phyt. est Linaria 10. siue pumila ex violaceo purpureo. An Gesn. hort. Linaria Alpina minor? An Camer. hort. Linaria flore cæruleo, in aruis reperta, semè Antirrhino minimo similis, & vt existimat, tantùm annua?

Geneux circa fluvium Arve floret mense Maio: in monte Thairi loco arenoso & decliu ad meridiem sito, mense Iunio. Reperi eandem in Narbonensi Gallia apud tres pontes inter Nemausum & Auinionum. Clusius inter saxa & præcipitia montium Austriæ collegit, ac in horto coluit.

LINARIA PARVA PURPUREA, foliis sine ordine dispositis.

CAP. XCVI.

Tenuis & humi diffusos habet cauciculos, valdè frequentibus, angustioribus, sine ordine

dine dispositis, crassiusculis, & coloris cæsi foliis obfutos, in plures alas nonnunquam diuifos, quarum fastigium occupant multi, spicæ instar conferim nascentes, flosculi, colore superiori fere similes, sed multo minores: quibus succedunt parua capitula semine plena, de cuius forma & colore nihil asserit Clusius, quandoquidem florentem, & capitulorum rudimenta duntaxat præbentem in Morauia collibus inueniebat: *radix* multis fibris constat, & perennis apparet.

Clusius, cuius descriptionem damus, intitulat Linariam 4. & Moraicam secundam. Lobel. in Adu. & Icon. Plant. p. 410. Ofyridem purpureo-cæruleam repentem. C. Bauh. phyt. Linariam 11. seu purpureo-violeaceam repentem.

Meminit idem Clusius Linariæ tenellæ ex purpura nigricantis, vt & Linariæ parvæ carnosæ foliis, floribus cæruleis ad cinereum tendentibus.

Linariam Hispanicam quartam Clusii, siue Linariæ Hispanicæ quartum genus Clusio primò videre contigit anno 1590. in cultiss. hort. Illust. Principis Cattorum Vilhelmi: semine peregrè misso natum Cassellis, Augusto mense suo flore onustum, & maturum semen in valculis continens: Semine inde accepto authori data sequenti anno, totâ Estate & Autumno floruit, & maturum semen tulit.

LINARIA CÆRULEA, CALCARIBVS longis.

CAP. XCVII.



Radix tortuosa, dura, alba, fibrata: caulis singularis, simplex, pedalis, glaber, teres, gracilis: folia alia aduersa, alia alternata, vncialia, angusta, acuminata, læuia: flores per summum scapum eo ordine quo in Linaria vulgari, eademque formâ, dimidio minores, calcariferè longiore, cærulei, quinque, her-

bacei coloris, angustis, longisque foliis basin suffulcientibus. *vascula* minora, quam Lini vulgaris.

Gener Chertlerus attulit collectam in Italia in viis prope Viterbam.

LINARIA ODORATA MONSPES- sulana minor cærulea.

CAP. XCVIII.

Dodrantalibus & breuioribus ex radícula fibrosa mox ortis caulis, tenuibus, rigidis, quos folia vestiunt rara, alternatim ex longis interuallis, sili instar tenuia, semiciliâ longiora, flores in cacumine serie quadâ sibi iniuncti succedunt, Linn. Tom. III.

Linaria odorata maioris, cærulei, calcaris longo præditi. Icon est in præcedenti tabula.

LINARIÆ SIMILIS.

CAP. XCIX.



Radice nixa lignosâ, satis crassâ, modò simplex, modò in capita plura diuisa: caules statim è radice plures emittit, palmares, aut etiam cubito longiores, ramosos, & non ramosos, angulosos: per quos folia Lini, glauca, longa, angusta: ex quorum sinu in ramulorû summitate flosculi emergunt parui, quos sequitur *vascula* parua.

Huic similis admodum est, si non eadem, Anonymos Lini folio Clusii, quam sic describit: Pedales habet ramulos, duos, ex viridi pallescentes, & in his multa folia temerè sparsa, nulloque ordine disposita, dura, angusta, longiuscula, Lini



Anonymos
Lini folio
Clusii, &c.
scriptio.

ni foliorum æmula, eiusdè cum ramulis coloris, qualis in Ruta montana elucet, h. e. ex viridi pallescente, gustu nonnihil acido primùm, deinde amaricante: extremi cauliculi in multos ramulos siue pediculos diuiduntur, qui flosculos albicantes sustinent, quinque foliolis stellatim deussatis, constantes, cum aliquot interioribus staminulis, qui tandem in singularia semina efformantur, pentagona, duro corio siue putamine medullam albam continentia: *radix* candicans, multifida, perennis & viuax, annuatim nouos ramulos, siue virgulas producens: nonnunquam etiam serpens, Linariæ repentis instar.

H. Lugd. p. 1150. figuram proponit plantæ, quâ intitulat Anthyllidem montanam, quæ multa habet communia cum nostra planta.

Caspar. Bauhinus phyt. Anonymon linifolium Clusii, Linariam 15. siue montanam flosculis albicantibus cognominauit, & eandem cum Anthyllide montana Historiz Lugdunensis fecit, qua de re nihil certè pronunciamus, sicut neque

E e e

an eadem sint cum nostra Linariæ simili.

An Tabern. in Icon. & Hist. dicitur Linaria adulterina, sed non habet. An Gerardo Linofyris nuperorum *Dact. recte place.*

Locus &
Tempus.

Linariæ similem variis in locis obseruavi, vt pote Geneuæ, Basileæ, in monte prope Birseck, & Montbelgardi. Anonymos Lini folio Clafsi copiosè nascitur editioribus herbosisque locis agri Viennensis: tum etiam herbosis collibus Posonio vicinis, in accliuitate Hamburgensis montis, quâ Altenburgum spectat, aliisque præterea plurimis Austriæ & Pannoniæ montibus, etiam inter amnis ultra Drauum. Floret Maio. Meminit & Clafius Madritianâ filuâ, secundo ab vrbe Lutetiana miliari colligere, sed longè exiliorem.

LINARIA BELVIDERE DICTA.

CAP. C.

MVLtūm fibrosam radicem habet, & perquam furculosa planta, rigidula, sed fragilis: folia

Descriptio.



Iconis.

Belvedere altera icon.



nula nihil omnino habet similitudinis. In fol. lat. pingit & describit Olyridis titulo, eamque à Linaria, quam multi Olyridem faciunt,

distinguit, vt ex qua videlicet *nophuara*, hoc est, scopæ hac ætate in Italia componantur, ceu & olim Galeni seculo. Apud Italos *Belvedere*: in Græcia modò *δελβερ* dicitur, voce corruptâ, teste Anguillarâ: nam olim *δελβερ*: Latinis quoque Olyris nominabatur.

Hanc, quam Dodonæus Olyrim esse existimat, Geslhort. *Belvedere Ital.* & *Belvedere Italorū* vocat: item Scopariam aliquorum, ac aliorum Herbarum studio forum.

Lobel. in Adv. cap. de Olyride, ostendit descriptioni Olyridis minùs conuenire Scopariam, *Belvedere Italorum* [ita in Adv. proprio capite, inque Obs. p. 223 inscribit.] in Icon. Plant. p. 409. Scopariam & Olyridem Græcorum Dodonæi inscribit: Tabern. in Ic. & Hist. Herbarum studio forum, *Studentenfraut*: C. Bauh. phyt. Linariam 18 siue Scopariam: Gerard. Scopariam siue Olyridem Græcorum: Item Hyssopum albis floribus. Quamuis autem Gerardus aliquam in floris colore differentiam assignet, tamen Linariam *Belvedere* repræsentat. Tabern. quoque licet pro *Satureia Romana*, eam iconem dederit, tamen nec vlli Hyssopo, nec vlli *Satureiæ* competit.

An Linaria *Belvedere* effigies 3?



Geneuæ in L. horto ex semine deciduo prorumpit Aprilis, vegeta Maio. Lugduni & Montbelgardi Iunio & Iulio in vigore. Plerisque Græciæ locis spontè gigni: Ætate virere ac vigere: sub Autumno semen maturare, author est Dodon. Non perinde bellulam hanc aut speciosâ, atq; Italico nomine, propter raritatem exoticam apud Italos in

hortis & pensilibus figulinis vasis ali solitam, hodie perquam vulgatam pronunciat Lobelius.

Belvedere in arborem formatur altitudinis hominis, cuius pulchritudini iungitur gratus color viridis: folia similia Hyssopo: ex India retulerunt: propagatur semine & radice: à frigore facillè lèditur, ideo serenda ad meridiè, vt tuta sit ab Aquilonio vento, & tutius in vasis terreis, aut cistis. Et hæc in Theatro Agr. de Serres scripta reperitur. Ego tamè haud crediderim radicib. posse propagari: annua siquidem herba est, quæ ad radicem nullos oculos habet ad propagationem apto: itaque potius ex solo semine deciduo se propagat, vt etiam Montbelgardi experti sumus.

ANTIRRHINVM VVLGARE.

CAP. CI.

NVllam ferè humum spernit Antirrhinū, & ex parietinis siccisque macetiis in cultius solū descendens, & hinc illuc translatū, de fructu ditate haudquaquā remittēs: radice lignosâ, albâ: caulibus



Icon. 2.



Anthirrhinum si-
ne Anarrhino-
ne, quod aliqui etiam
Lychnida silue-
stem vocauerunt,
Dioscoridi herba
est caule, foliisq[ue]
Anagallidis simi-
lis: floribus Leu-
coj, minoribus
tamen, purpu-
reis, ideo etiam
siluestris Lychnis
nominata est.
Fructum verò ge-
nit vultu narium
similem, aspectu
ruffum.

Antirrhinon
vocat (inquit
Plin.lib.27.c.10.)
fue Anarthonis
aue Lychnis a-
gria, fimilis Li-
no, radice nullâ
(minimâ,Gaza-
pud Theoph.19.
nift.cap.21.)flore
Hyacinthi,feme-
ne vitulinarium.
Dioforidi &
Plinio dictû Ant-
tirrhinû, Theo-
phr.loco proxi-
me citato, Antir-
rhizum nomi-
nata, vitilis herba
ad gloriam com-
parâdam,Apari-
ne fimilis:radice
nullâ,fructû in-
funt tâquâ nares
vituli, quo perû-
et grati vitæq;

Tom. III.

Plinio cōuenit in nomine, ita ille in descriptione, discentis tū à Plin. tū etiam à Theophrasto. Plini namq; tribuit Anthirrh. folia Lini, rectoriis similitudine, quàm Diosc. Anthirrh. folia & caules Anagallidi comparat. Hermolaus autē corruptè apud Plinium pro Aparine, Linum eo loco scribi putat. At verò quæ affinitas Anagallidi, vt Dioscorides comparat, cum Aparine, aut Lino?

Quod à Plin. describitur copiosè in Anglia, au-
thore Turnero, nascitur in segetib. primo apectu
Lolio simile est, quoad florè, partim etià folij co-
lore accedit, quod maius & longius est Lini foliis,
formà tamen non ita abimile. Hæc herba posset
Anglici Calfs Swoyfe. Antirrhinò autem à
Dioscor. descriptū in Anglia non prouenit, quod
quidè Turnerus viderit, nec vllā adhuc plantāse
vidisse ait cui Diosc. descriptio cōueniat, nullāq;
etiā qd rheophr. descriptio possit accomodari.

Gracis igitur ἀντίρριον, ἀντίρριον, si non viti-
tiosū Theophr. exemplar, & ἀντίρριον dicitur Lati-
nis similiter Antirrhinum. Auctore Galeno etiā
βυκράνιον, & Lychnis agria siue siluestris, λυχνίς α-
γρία nominatur. Apulcius etiā αὐανθίσκος, σιδικόρος,
κυκκορόλιον, Canis cerebrū, Herbam Siminiani,
Venulā minorem, & Opalim grātā appellari re-
fert. Creditur quoque esse Lio herba, quem inter
flores Columella lib. 10. refert, si scribens:

Narcissique comas, & hiantis saua Leonis

Ora feri. Item & infra: *Oscitat & Leo.* O, *leonis.*

Et huius sententiæ videtur fuisse Cæſalpinus, qui *Cæſalp.*

Antirrhinū, Os leonis vulgò, appellari prodidit,
herbam foliis Linariæ, florib. capitulis effigie can-
inis capitis, in membris Florentia: copiofam: Et
quandā in præruptis scopulis, foliis breviorib. la-
tiusculis, tubifloris, florib. pallentibus. Aliam
in montib. humiliorē Linariæ, recticaulē, flore ca-
ruleo: In vineis quoq; recticaulē, & fosculis pur-
pureis. Et has omnes Pliniū intelligere credit, ap-
pellantē herbā Cynocephaliā, quā canini ca-
put, quā in Ægypto Osyritem vocari dicit, diuinā
herbā, vñ Apion Grāmaticus assereret, & contra
omnia veneficia: Meminisse & Canini capitis in
Plyllio. Diotcoridē eam quæ rōscō flore constat,
Chamæpucionē appellare quā humilem Laricem,
quō in loco deprauari quidam codices le-
gunt Chamaleucen: Plinium tamen Chamæpu-
cen quoq; legere. Effigie quidā Antirrhinon has
refert, quod à Plinio tribuantur folia Lini An-
tirrhinon: Osyritem dictā videri apud Ægyptios:
quia ob similitudinem capitis vitulini dicata sic
eorum Deo, vt bos.

Gefnerus contrā, Leonem Columellæ, Aquileiam esse exfinitam, quæ ex ea caufa Leon-
toſium punctipat: ſed hoc nomine Antir-
rhino maiori (cui de hort. flores luteos, albos, ru-
bros & roſeos adſcribit) magis conuenire, quàm
Aquileiæ. Dodonæo videtur. Nam Antirrhini-
hians flos, leonis rictum citius, quàm Aquileiæ
refert. Eſt vèrò & alius Leo, qui *λεωνορίδις* & legu-
minum Leo dicitur, alio nomine Orobanchæ:
de quo ſuo loco egimus. Eſt & alia Amethyſtos
herba, cuius Plutarchus meminit, *λεωνορίδις* vidi-
cet: de qua alio loco agetur.

Antirrhinum quod à floribus dictum vitulinum vel Leonini oris æmulantibus, potius Leon-
tomis nominandum censuit Maritima, Ger-
mani Secretarunt / *Bradenhaupte* : hederis
fopff hoc est, caput canis, *falschfopff* id est, Ca-
put vituli, *falschsaß* Nasum, vel Nares vituli,
löwenmaul Os leonis. & *Drant* cum Bel-
gis appellant, quam aptè consule *Turnerum* :
Ecc 2

Anihirvhi-
nam Pliny
Turner.

Bucranium?
Lychmis filis
Amorystom
Pothuon.

L10.

Les Colonne
le est Aqu
him Gesner.

Nomina
Leontopodium
Saxifraga
Saxifraga
Nasus vitæ
li.

Galli *Mouron violet*, & *Oeil de chat*. Itali *Antirrhino*: Hisp. *Veserra yelua*, & *Cabrza detenera*: Angli *Calfes* *linaria* / vel *Snay dragon*: Bohemi *Nedpf*.

Synon.

Lobel. in Icon. Plant. vocat p. 404. Antirrhinum, vulgò Caput canis, & Caput vituli Apulei, Cynocephalin: Item Anthirrhinum floribus luteis. Horr. Luf. Antirrhinum maius purpureum satium, Schvvenkf. Antirrh. maius, & *visippus* or Dioscoridis flore varians, incarnato, candido, luteo.

Icones.

Figuræ Fuchsianæ quas posuimus non multum placent, verum iam sculptæ emptæ erant. Matth. in post. comm. & Hist. germ. picturas duas Antirrhini exhibet, nempe primi & secundi, quæ qua in re differant ab invicem, ex figuris colligere non possum, nec etiam ex eius verbis, cum omnia Antirrhinorum suorum genera distinguat tantum coloribus.

Camer. in Matthioli Hist. germ. & Epit. duas habet Anthirrhini figuras, nomine primi & secundi, cui flores ex purpura albicantes, seu incarnatos, & rictum luteum adscribit. Idem in Horr. vocat Antirrh. maius flore roseo, in agro Montpellierensi & Nemaufensi. Item Antirrh. flore incarnato, luteo, candido: Ad hæc, Antirrh. pulcherrimum flore luteo grandi, sponte inter Saonam & Genuam.

Lobel. in Adv. Antirrh. florib. purpureis, ex rubro violaceis, vel roseis & albis: Item Antirrh. luteum foliis latiorib. brevioribus.

M. Lugd. 3. icones.

H. Lugd. pag. 1340. huius plantæ figuram habet sub titulo Antirrhini: Matthioli. Alteram pag. 1341. sub inscriptione Antirrhini magni Dodonæi. Et tertiam pag. 330. pro Cynocephalo Plinij.

Tabern. 3. icones. Antirrh. ignotum.

Tabern. in Icon. & Hist. Antirrhinum: Item, Antirrh. album: Et Antirrh. luteum.

Antirrhinon quid sit, fateor se ignorare Baccanellus, Sed & Anguillara Antirrh. Diosc. non novit: Theophrasti verò & Plinii in Italia nomine *Caryogalli* passim notum affirmat. Quamvis autem vnius tantum meminisse videantur Veteres, Recentioribus tamen plures sunt differentie.

C. Bauhin. not.

C. verò Bauhini in phyt. Antirrhinum 1. siue maius rotundiore folio: Et Antirrh. 2. siue maius alterum folio longiore, quod flore roseo haberi ait, rubente, aliquando maculato, ex candido dilute purpurascete, & candido: Itemque Antirrh. 3. siue luteo flore: ad vnum hoc vulgare Antirrhinum referimus.

Cæterum inter Antirrhina numerantur, & Antirrhini nomine sequentes insigniuntur plantæ. Antirrh. angustifol. silvestre. Antirrh. minimum. Antirrh. fol. ferrato. Linaria. Linar. purp. maior. Linar. odorata. Linar. Valentina. Lutea. Alfine fol. ferrato. Hypoglossum. Cyanus. Hippuris.

Antirrhina vulgaris locum & semina.

Cæterum, planta quæ solet Antirrhinum vocari copiosè provenit in via quæ itur ad sylvum Aigremont, & aliis in locis: Basileæ in horto D. Plateri & patris mei florit Augusto, & Septembri semen maturat. In horto Ill. E. C. mihi provenit purpureo, vel roseo, albo, & luteo, ac etiam mixto colore. Ex his purpureum Antirrh. occupavit muros, & Hiemem perfert: præterea deciduo semine, quamvis non annua herba sit, se propagat, florens Iunio & Augusto. In arvis & collibus Matthiolus reperit: Camer. in Italiis & Galliis, præsertim Prouinciis & Narbonensi inter

Oliueta. In hortis, inquit Dodonæus, apud Belgas, Italos, Græcos & alibi feritur, & Maio mensis, quod Hiemem superavit, & reliqua deinde Æstate, floret: serius verò & sub Ætatis finem, eiusdem anni Vere satum. Hiemem autem nisi clemens admodum fuerit, aut in cellis viniis repositum, absque iniuria in Belgio non sustinet, Dodonæus.

Antirrhini semen inutile in medicina, ut Galenus ait, est: herba verò ipsa assimilis cum Bubonio facultatis, sed multò minoris: ex qua de hac coniciendum, quod in Dioscoridis libro fortè perierit. Apuleius radicis in aqua decoctum, fotu epiphoras oculorum, celeriter lenire refert. Narrat, inquit Dioscorides, appensum veneficiis aduersari: & gratiam conciliare, si quis eo perunctus sit, cum oleo Liliorum, aut cyprino. Tradunt alij huius semine perunctos ex oleo venustiores fieri, nec vilo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit. Quinetiam Principum gratiam sibi conciliari posse putant, hoc tantum amuleto.

ANTIRRHINVM ANGVSTIFOLIVM sylvestre.

CAP. CII.



Legatula est plantula, tenui albicanteque radice: cauliculis palmatis, aut cubitalibus, teretibus, hirsutis, quos alternatim ornât folia Hyssopi paria, simul plura, insectis nonnunquam rubescētia, pingua & nonnihil acris, subamara: strobili ex foliorum alis bicolores, partim albi, partim purpureascentes, Antirrhini ma-

ioris, sed multis numeris minores, quorum basin obuallant quinque, vel septem folia viridantia, hirsuta, quædam longa, quædam breuia: pericarpium caluariam catelli egregiè refert, ac oculorum fossas, nareque corniculo inductas, in quo semen.

Nonnullis hanc plantam Pliniano Antirrhino eandem esse visum fuit. Agricola autem eandem cum Cynocephalia esse suspicatus fuit. Matthiolus contra istud Antirrhinon pro legitimo olim exhibuit. Habet autem Antirrhini figuram fictam, quod flores attinet: folia etiam videntur nimis ad Linum accedere. In post. comm. cum mag. fig. & Hist. germ. priorem effigiem omisit, & meritò aliam substituit, sub titulo Antirrhini quarti, quod non describit, nec ostendit quæ in re cæteris suis Antirrhinis differat. Neque mirum si in prioribus comm. de Antirrhino, eiusque foliis dubitauerit, siquidem tunc non nisi vna tantum Antirrhini planta ad manus ipsi fuit, ut in epistola ad Heroldum perscripsit.

Lacuna

cap. p. obiter meminisse, & Luteum appellasse tradit: Vitruvium verò lib. 7. Luteum: sed Virgilium in Bucolicis Æloga 4. Lutum nominasse;

*Ipsè sed in pratis aries iam suauè rubens
Murice, iam croceo mutabit vellerè Luto.*

A Luto autem luteus color & Lutea dicuntur, veluti à Croco crocea, & à purpura purpurea. Belgæ hanc vulgò *yonwe* nuncupant.

Marcell. Virgilius Vitruuij libri 7. locum inferius allegandum omnino mutilum adducit, existimans eandem cum Ifatide Lutum, siue Luteum herbam esse, atque eâ cæreuleum tingi: in quo à vero recessit: Differt siquidem Lutum herba ab Ifatide, & nequaquam cæreuleo, sed luteo, aut viridi colore, vrdicemus, inficit.

Lobelius, qui in Icon. plant. p. 353. & Obf. p. 190. [vbi Gallobelgis *maude*, & Germanis, quod nomen tamen non conuenit, *Merspermen* vocari ait.] Luteolam pingit, & in Aduers. tertiam Glasti speciem rectè constitui posse putat. Sed quæ Luteolæ cum Glasto intercedit similitudo?

Lobelij lap.
fus.

Camerarius in Hort. vocat Luteam Plinij, & *μαυρο* Græcorum modernorum. Ad Epit. Matthioli. eiusdemque Hist. germ. posuit figuram, quæ aridet, cui adscribit *ετρε*, rasil, Pseudo-Struthium [aut Lanariam] nominant, sed non conuenit cum Theophrasti lib. 6. cap. 3. de Hist. plant. Struthio, nec etiam cum Plinij: quidam Theriacariam vocant: vt rectè annotat Matthiolus. Præterea Struthion non esse ac multò minùs Ptarmicem manifestius est quæ vt referri debeat: Folia siquidem huius magnitudine Oleæ folia superant: at Ptarmice à Dioscoride, & Struthion à Theophrasto Oleæ similia folia habere traduntur.

Tragus re-
preh.

Tragus lib. 1. cap. 118. haud rectè Antirrhini nomine pingit ac describit: vnde Thallio dicitur Antirrhinum Tragi. Alij Phyteuma esse contendunt. Herbarum icones Egenolphi p. 69. in edit. 1551. & Lonic. in Dioscor. vocant Catanancem.

Sed & Tabern. in Ic. inscribit Catanancem, Artopodiū & Leuteolā *ετρε* rasil, *ετρε* rasil Errant (inquit in Hist.) qui Antirrhinum volunt: A solo Dioscoride & Plinio describitur & græcè dicitur *καταναν*, *δαμασκην*, alijs Louis radius, Datiska & Crepula: Vitruvio Luteum, Plinio Lutea, & lib. 27. cap. 8. Catanance, Herbarijs Luteola, Vnguis miluinus, & Vnguimilua: It. *Vnge de Gatto herba*. Hisp. & Port. *Vnha de Gato yerna*, Sclauon. *Carophitta*. Anglicè *dicwede*.

Basilæ copiosè floret mense Iunio: Monspelij & Lugduni Maio: Geneæ viret Ianuario. In Belgio magna copia, tametsi alijs etiam plerisque locis Galliæ & Angliæ rudetibus & similibus occurrit, Lobelius. Seritur pingui ac restibili gleba, pluribus in Belgio locis nascitur, & spontè non modò in Belgio, verum & in Pannonia, Bohemia, tum & alibi. Maio mense floret: semen deinde adfert: postea collecta herba siccatur in vsum tinctorium, Dodonæus.

Vfus.

Hoc apud nos Mediomaticis (inquit Tragus) non nisi linamentis lectorum luteo colore tingendis vsurpatur, & siquid indico, calidæ & humidæ temperaturæ est. In exterioribus tantum corporis partibus vsum suum hodie habet. Et paulò post: Mulierculæ hanc herbam siue sicca sit, siue recens, in aqua cum alumine decoquant, tingendis linamentis. Magno vsui & emolumento, Lobelio in Adv. assentiente, est Luteola,

recentioribus tantum cognita, ad colorem fuluū aureūve pannis conciliandum valdè experta, præsertim in Belgio, vbi magna copia. Inficiuntur [pergit Dodon.] hac Luto herbâ panni linei, aliæque ex lana opera, & lineæ telæ colore luteo & virenti: luteo quidem candida, & nullo alio prius imbuta: virenti verò cæreuleo antè tincta: Nam Luti herbæ color cæreuleo superinductus viridem efficit: Id quod & Vitruuius cognitum habuit lib. 7. de architect. cap. 14. Qui nō possunt air, Chrysocoliā propter caritatem vti, herbâ quæ Luteum [aut potius Lutum] appellatur, cæreuleū inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. *Camerario* apud Matthiolum referente, aduersus venena & morsus venenatos præstantissima creditur, inde quibusdam Theriacaria dicta: verum nihil certi habet, cum eius nullum fecerit periculum, acerradici sapor arguit calfacere, rarefacere, dissipare, aperire, vrinas & sudores citare. Lanarum porrò insectoribus vsus magni esse testatur quotidiana praxis: rudes enim & albas cum alumine decocta, colore luteo tingit: cæreuleas autem viridi, idque magis minulve intensq, quò saturatior dilutiorue fuerit color cæreuleus. Ita panni bicolores vno eodemque tempore, vno eodemque decocto ex eadem cortina extrahuntur.

LVTEA MAXIMA CRETICA HONORII Bello.

CAP. CV.



Luteam Creticam maximam à Cl. D. Honorio Bello, vito tum in arte medica, cuius nomine in Candia clarus excellit Medicus, tum in omnibus disciplinis, potissimum verò in studio Botanico versatus, cum alijs multis creticis ad nos misit, adiunctâ hac descriptione, in data ad nos epistola. *Lutea Cretica maxima:*

planta pulcherrima est: neminique cognita: ea namque vnicò tantum loco inuenitur, qui vocatur *δρακονομα* tertio ab vrbe Cydonia lapide inter montes. Nascitur in aquis & locis humectibus: ibi enim riuulus quidam è fonte scaturit, qui per angustam vallem discurret in quo inuenitur, & etiam iuxta eius ripas: an alibi nascatur, ignoro. Radicem maximam proferit, lignosam, in multas diuisam, crasso & lento cortice vestitam. Stolones plures ab vna radice nascuntur, brachiali crassitudine, qui ad quinque, sex, atque etiam ad decem vsque cubita attolluntur, qui Hieme exsiccantur. Folia fert magna, pinnata, ex multis folijs magnis constantia, longis, serratis, vt Cannabis, alterno positu harentia, sine tamen ordine certo. Flores minimi ex viridi palescunt. Trunci

Trunci pars superior in marinam spicam fastigiatur, duos & amplius cubitos longam, ex vasculis quibusdam longis & angustis, densisque conflata, similibus eis, quæ Reseda vulgaris gerit, semine plenius ad rufum tendente. Procul intuentibus Cannabis esse videtur. Tota herba & radix ita amara est, ut Aloem etiam & Colocyntidem ipsam, meo iudicio, superet. Colore luteo inficitur. Autumno, ideoque Lutea vocatur. Antiquis ignotam puto, & nemini cognitam, quam Siluero Todeschini Fundano Cydonia Pharmacopæo, viro in cognitione stirpium exercitissimo, vestrique nominis studiosissimo, qui primus his diebus inuenit, mihi que ostendit. Huius tam rare stirpis eiconem à me delineatam mitto, ut vestra historia generali [si lubet] adnectere possitis. Hæc Bellus. Nos huius plantæ semina terræ concedimus Montbelgardi in horto Ill. E. C. verum non proveniunt.

RESEDA LVTEA.

CAP. CVI.

Tenuem quidem, sed longam satis radicem habet Reseda nuperis dicta, lignosam, notabili acimonia præditam: à qua caules procedunt fistulosi, scilicet cubitales, striati, subhirsuti, ramo-



si: folia Cakilis Serapionis diuisurâ profundâ, inordinata, crispâ seu undulata, sapore oleraceo: flores in thyrsulum spicamve digesti longam, lutei seu herbidi, foliolis ex umbilici oris extantibus, in tria segmenta (quorum duo lateralia latiora mediû fili instar tenuæ & breuius vtrinque

stipant) partitis, intra quorum septa apices multi sessiles, luteoli, & stilus triceps: capsulæ seminum effigie vireoili inferius hiant, semen continentes parum, nigrum.

Reseda, à sedandis doloribus dicta censetur: collectiones namque & inflammationes omnes discutere ipsam Resedam scribit Plinius.

Lobel. in Icon. Plant. p. 222. Resedæ maximæ titulo pingit, itemque in Obs. p. 110. An verò eam ab alba rectè distinguat, videat alii. Lucas Ghinus, Gesnero de hort. teste, Sesamoides maius nuncupat: Resedam luteam Dalechampius: Resedam Plinii, & Erucam peregrinâ, welschen Nauffen, Schvveckf. quem miratur hanc inter hortenses recensere: Reseda C. Bauh. Erucis subiecit, propter saporem Erucæ similem, deinde etiam eò quòd à quibusdam Erucæ dicantur, & ex Erucarum siluestrium genere censeantur. An Reseda latifolia Tabernamontano?

Genevæ in muris florentem maio vidi, itemque in horto meo Wiemem etiam perferentem.

Tom. III.

RESEDA ALBA,

CAP. CVII.

Minus frequens est Reseda alba, cetera Lutetæ frequentiori similis, nisi maior paullo videretur, id quod fortè culturæ tamen imputes: verum florum thyrsi albicant, quorum singuli quinis fimbriatis foliolis candidis contexti, apices tamen luteolos possident.

An Lobel. in Icon. Plant. p. 222. Reseda Plinii Neoteritorum: Fuchsius Sesamoides maius factum vocabat: Resedam candidam Dalechampius: Resedam 1. siue albam C. Bauh. phyt. ubi reperiri narrat foliis simplicioribus, & in vnoquoque pediculo. An Tabern. in Icon. & Hist. Reseda tenuifolia, Eruca Cantabrica, & pampisiber. Nauffen.

Mense Iulio Basileæ in horto D. Jac. Zvyngeri florebat, & semine deciduo se propagabat. Ego colui Montbelgardi in horto Illustr. E. C. sed plerumque perit, semine ad maturitatem non perueniente.

Descriptio.

Flores.

An Reseda Plinii Noster. Lobel.

Locus & Tempus.

CHELIDONIUM MINVS VETERIBVS, & in genere.

CAP. CVIII.

Chelidonium igitur minor, quæ siluestre Triticum nigrum: & p. p. [Ald. v. p. p. p.]. Aliqui nuncuparunt, ex Dioscoridis autoritate, herbula est pediculis ab radice pendens, sine caule, foliis hedere figurâ, sed multò rotundioribus ac minoribus, mollibus & subpinguibus circumdata. Radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum acuatim congestas, quarum tamen tres quatuorve in longitudinem protenduntur. Cæterum, iuxta aquas palustris que loca nascitur. Vim acrem obtinet, & Anemones modo [Limonii modo, alius] summam cutem exulcerat: psoras item & scabros vngues eximit. Succus verò radicibus expressus, addito melle ad purgandum caput naribus vtiliter infunditur. Similiter & huius decoctum cum melgargarizatum, strenuè caput, cunctaque pectoris vitia purgat.

Descriptio. Tritici p. p.

Locus, Vires.

Chelidonium paruum maiore actius Aëtius tradit. Et hinc in cataplasmate impositum cutem exulcerare ait, & vngues leprosos exterere: succum eius per nares fortiter purgare: esse enim quarti ordinis calefacientium ac siccantium. Vbi porrò in frigida hepatis intemperie, calefacientibus, ac siccitatē addentibus vtendum est, Capnium, quam & Chelidonium herbam circa sepes enatam appellat, probat.

Aëtius.

Luxatam autem esse Plinii lectionem (in Chelidonia minore) quis facile deprehendet, cum majori Chelidonia reddatur color albicans, flos luteus: minori folia Hedere, rotundiora, minus candida, succus Croci, mordax, semen Papaveris: cū hæc duo postrema de maiore tradantur à Dioscoride. Namque minor acrem possidet succum, non tamen villo pacto luteum, nec Papaveris semen, imò florem putat Ruellius hinc semine proferre, radicibus potius quam semine nasci. Sic

Plinii testis Lucan.

ergo in sedem restituetur luxata pars : Maiori colos albicans, flos luteus, succus Croci mordax, semen Papaucriis, nisi quis ea quæ breuiter de minori Chelidonio scribuntur, parentesi censcat interiecta.

Plinius no-
satur.

Plinius [inquit Corn.] Chelidonio minori succum & semen attribuit, quæ Dioscorides maiori adscripsit. Quin & rota Chelidonii parui descriptio conuenire videtur herbæ, quam officinæ hodie Scrophulariam vocant. Nostri varia induunt nomina. Nam & *fägwärränsfraut*, i.e. Herbam hæmorrhoidum vocant, & *Scharlachfraut*. & *Nasshöden*, *Bibernösten*, h.e. Castorei testes vocat, à radicum similitudine. At verò quod herbulam pediculis absolutam reddidi, in græcis legitur *Βοτρίον ἐξ ἑνὸς ὅλῳ ἢ ἀποτομήν*. Significat autē *ἀπομήν*, abfoluo, perficio, ita vt tota herba ferè ex pediculis constet, quum nullum caulem habeat, quod ipsum voce *ἀποτομήν* significatur. Geranium Robertianum dici de Chelidonio minore, infra patebit. Sed & de Geranio Batrachoidæ habetur.

SCROPHULARIA MINOR, SIVE
Chelidonium minus vulgò dictum.

CAP. CIX.

Descriptio.



Chelidoniū minus, plātula est vt plurimū palmatis, alijs paulò maior, minörve, quæ teste Trago quotannis nouā radicē, folijs, & flore, sicut Satyrionēs & Aron, reuiuiscit, ea nobis insipida est, partim bulbulis aliquot, modò pyriformibus, modò longis, ferè teretibus, aut ventris, vtrinque acutis, modò

rotundis : Trago, torosæ sunt, ac instar grani Hordei olongæ, plerumquē ternæ, aut quaternæ, acervatim multis capillamentis, quibus humi hærent, fibratæ: foris pallidis, intus albis, partim fibris multis candicantibus, constantes: vnde ex surgit *coliculus*, secundum terram albicans, supernè dilutè purpurascens, circa medium ferè aut paulò inferiùs, geniculo donatus, ex quo oriuntur folia bina, opposita, longis pediculis, ex lato principio coloris carnei, sensim in angustum virelens desinentibus, aliquatenus hederacea, sed molliora, minora, rotundioraque, nervosa, glabra, splendentia (sicuti & bina illa, quæ statim à radice exoriuntur) indidemque ex alis foliola minora, magis angulosa, simili colore & splendore nitentia, Trago herbaceo, viridique colore conspicua, reliqui caulis folia profundius incisa, Hederæ helicis repentis folijs proxima, alterno, plerumquē situ, breuioribus pedicellis virentibus appenā : summo fastigio insidet flos unus,

Ranunculi æmulus, ex octo aut nouem foliolis aureo fulgore radiantibus, vnguibus chloris cōpositus, in medio habens staminula multa crocea ex tenui latescentia, auersâ parte sulcata: succedit capitulum Ranunculi echinatum, ex viridi luteolum, *femine* stipatum : Dodon. capitulum veluti Ranunculi, exiguum, ex feminibus cōgestum, verum minus. Floris & foliorum sapor herbaceus.

Chelidonium minus à nullis ostensum esse suo tempore vel Herbarijs, vel Medicis, demitatus est Ruellius, præsertim cum nulla verno tempore frequentior occurrat, præcipuè Hirundinū aduentu. Demitatus est, quòd longè dissidenti nomine, (proprio ignorato) officine Scrophulariæ, quòd multis granorum frumenti grumis radix coaluisse videatur, vocauerint, putantes inditum fuisse appellationem, quòd strumis [quas vocant græcâ imitatione, non latinâ, scrophulas] medeatur: Nou audiendos esse Arabicæ factionis auctores testatur, qui Glancium putant esse, quod ipsi Memichen vocant. Si quidem horum error apertior sit, quàm vt refutari desideret.

Cordus in Diosc. eadem cum Amello Virgilio Geor. 4. descripto facit, ac aurei splendoris flore, & folijs purpureis maculis, quas Dioscorides descripsit, insignito.

Fuch. Chelidonium ideo hanc herbam vocatâ esse pronunciat, quòd, vt habet Theoph. l. 7. c. 14. hirundinum aduentu florem excitet. Videtur ipsi Dioscoridis delineatio Chelidonii minoris herbæ huic, quam Scrophulariam minorem vulgò nominant, prorsus conuenire. Descriptioni subscribere ait locum, tempus, vires, & alia, quæ singula ad amussim quadrant, vt nemo hanc Chelidonium minus esse, inficias ire, sine magna impudentia, possit.

Dioscoridi autem *χελιδόνιον* parvum dici testatur quoque, licet non desint qui exiguum quoddam Scrophulariæ genus esse statuunt.

Omnes ferè rei herbariæ periti Chelidonium minus appellant. Hetruscis eam vulgò vocari *Fauoscello* putauerim (inquit Marth.) quòd Fabarum modo folia subpinguia proferat. Verum an hæc sit Chelidonium minus, cuius meminere Dioscorides & Galenus, non parua videtur esse dubitatio: quòd nullam prorsus nec folijs, nec radicibus præ se ferat acrimoniam, cum tamen acerrima & mordax esse deberet, longèque magis quàm Chelidonium maius: quandoquidem, Galeno teste, Chelidonium minus cutem exulcerat, & excalfacit ordine quarto. Id quod satis manifestè ostendere posset hanc non esse Chelidonium minus: nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aro scriptum reliquit Galenus lib. 2. de aliment. facult. Nam facillè contingere potest, quòd quæ admodum Arum Cyrenis minimùm medicamentosi, minimùmque acrimoniæ possidet, ad eò vt in cibus vel Rapis vilis habeatur: In Italia verò, ac minori Asia contrà ad eò acre, vt medicamentis dūtaxat expetatur: ita & Chelidoniū minus, quod in Italia nascitur, minimū acrimoniæ sortitur: quod verò in Græcia provenit, acre admodum sentiat. Siquidem, exceptâ acrimoniâ tantum, nostratū nihil præterea deesse videtur, quin legitimum Chelidonium minus dici queat. Ex quo facillè adductus sum, vt credam, quòd quamvis in Italico desideretur acrimoniâ, non tamen id esse Chelidonium minus diffidentum est: tametsi inficias ire non liceat, nostrum Chelidonium

Chelidonium minus, quod omnino acrimonia sit expertus, his morbis haudquaquam conuenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides & Galenus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, ut & vires, quæ illam consequuntur, deficient & pereant. Hinc igitur fit, ut non possim ego subscribere iudicio Fuchsi, qui in lib. de compos. med. quem auctum secundò excudit, Chelidonium minus censet alteram Malacocissi speciem. Quinimò eius opinio mihi refellenda videtur, quod planta illa nullis ferè notis aliquam mollem Hederam referat. Ea quidem foliis Hederam quodammodò æmulatur, sed quod magis attendendum erat, viticulis nò pro ferè, quibus humi repacit quod Hederae cuique naturæ tributum est. Quidam nugator contendere nobiscum non erubuit hanc plantam non esse Chelidonium minus, sed Vigiij Amellum. Hacisque Matthiolas. Lobelius in Aduers. nimis morosus ait, qui Chelidonium minus ob igneam acrimoniam rejciunt.

Dioscoridis esse *χελιδόνιον μικρόν* aut *πρόιον* excludit etiam C. Bauh. licet vires non respondeant. Hanc enim diuersitate ratione soli obuenire, nostro iudicio, non malè suspicatur. Plinij lib. 25. c. 17. Scutumean censi refert, quo loco de Ranunculis agit. Huius folia aiqua lo purpurea maculâ notari, flore esse luteo simplici, aliquando & pleno reperiiri.

Χελιδόνιον μικρόν græcè dicitur, latine Trago-Mathiol. Fuch. Hist. Dod. Anguill. epit. 11. Cordo in Diosc. & Hill. Geln. hort. Torn. Lac. Lonic. Guiland. Lobel. in Ada. Obf. p. 323. Ic. Plant. p. 593. H. Lugd. p. 1048. [an eide p. 1036. Ran. latifol.] Cast. Thal. Tabern. Ger. & Eyst. Chelidonium minus: Casp. Bauhin. Plin. Chelidonia 2. f. uoc. [ut etiam in phyt.] rotundifolia minor: offic. Chelidonia minor & Hirsutaria minor: B. unself. Ficaria & Scrophularia minor, & secunda: Malacocissus minor Fuch. Leon. Testiculos sacerdotis Sytiatico, Fauguello Celsalp. Germ. *schwarzenkraut* / *stein Schollkraut* / *Schorbockskraut* / *Edgarsten* / *Waternkraut* / *Wibschöden* / *Pfaffenbod* / *lein* / *Schwalben wurz* / *frigblattern* & *Eypich* / *Wienkraut*: Belg. *Sperckraut* / *kleyn Houw*: Gall. *Esclere*, ou petit *Basinet*, & *Couillons de prestre*: It. *Fauscello*, *Coglie di prete*: Hispan. *Celidonia menor*: Angl. *Wye woorte* / or *fig woorte*: *Celidonium minus*: Arab. *Memiten* & *Chilodemon*.

Hirundinum aduentu floret, nec longo post tempore marcescit, sic ut irrigui limites, qui largo foliorum, florumque stipatu pubescunt, confestim iis spoliati glabrescere videntur, quâ de causa Chelidonium, i.e. Hirundinariam dici, nullum est Ruellio dubium. Auctor est Tragus Martio mense profusile, sub finem Februarij erumpere ad humectos vinearum & pratorum quorundam colles: Maio marcescentem euanelcere, folia florêque amittentem, radicalis interim vique ad principia Februarij anni sequentis humilantibus. Marantha vidit inuente Febuario Scris protulisse, licet Dioscorides eam aduentu hirundinum [qui Martij mense esse f. let.]. xori scribat. Omnibus Italici locis, verno duntaxat tempore, frequè gignitur. Matthiolo, vliginosis, præsertim Solo, & in Scrobium fossarumque marginibus. Fuchsius in palustribus prope aquas & limitibus humidis, omnibûs; vliginosis ac horris passim gigni scripsit, Maio mense. Nascitur [in Tom. III.

quit Dod. in pratris, secus vias ac scrobes fossaque, locis rigulis ac humentibus passim vulgare: circa Martij Calêdas exit, paulò post floret, April deficere incipit, Maio integrè perit, post difficile fuerit, vel radiculam eius reperire, nisi locus, vbi prouenit, particularis notetur. Mon/pelij & Lugduni floret Febuario & Martio: Genevæ quoque Aprilis notatur.

Magnam præse ferre acrimoniam, gustumque acerbè vellicantem narrat Ruellius. Sed non existimo eum Chelidonium minus vnquam degustasse, nec obseruasse, quod subdit, argumento Galeni & sectatoris eius Pauli, pueros sæpius probasse, illam celeriter curim exulcerare. Sic quoque non placet Tragus in tradendis viribus non citare Dioscoridem, sed ex ipso non degustato suo minori Chelidonio, ei tribuere acrimoniam Ranunculi linguam vellicantis, quâ nostra planta destituit. Acrimoniâ autem deficiente caput non videtur posse purgare nec humorem trahere. Naturam habet, inquit, calidam cum acrimonia coniunctam, quare linguam, vti Ranunculus, vellicat, solêtque potius externis corporis partib. adhiberi, quàm intrò sumi. Herba Chelidonijs minoris vnâ cum radice in vino decocta, melle admixto, caput purgat, & glutinosos ac lètos humores trahit, gargarizata. Idem efficit succus radicis cum melle citris & naribus inditus. Proinde herba ipsa, radice, succo que, puluere, & aqua distillata, in exterdis siccib. maricisve, magnâ vtilitate & experientia Medici nostræ ætatis vtuntur, nam imposita, & inspersa, mirificè siccis & mariscis sanant, herba, aqua distillata, & puluis. Alia huius plantæ iuramenta & vires ex commemoratis animaduerti possunt. His addit Fuchsius: Chelidonium minus, Galeno teste, quarti ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando, idèq. magnam præse fert acrimoniam, gustum erodentem. Nostrum autem vique adeò acre non est, vt commanducando sæpè nullam prorsus sentias acrimoniam potissimum in eo quod in humido loco natum sit. In eo autem quod locis siccis provenit senties & amaritudinem & acrimoniâ. sensim tamen gustu erodentem. Cæterum, cum Matthiolo supra citato loco statuimus & nos Chelidonium minus Italicum, quod omnino acrimonia sit expertus, his morbis haudquaquam conuenire posse quibus quod in Græcia gignitur tradiderunt Diosc. & Galenus: calidis siquidem & siccis qualitatibus penitus destituitur. Licet autem etiam Turnerus non consulat vtendum hac pro Chelidonio minori Dioscoridis, ad ea vt tamen licebit, ad quæ recentiores experti sunt. Dodonæus quidem non videtur degustasse Scrophulariam minorem. Ranunculis enim potentia proximam esse scribit, ac posteriorem ætatem ad hæmorrhoides radicibus vnâ cum adherentib. granulis vi, vt quæ huius succo cum vino aut laborantis vrina permixto sæpius ablutæ contrahantur, ac dolore sopito resiccentur. Lobelius vt refutet opinionem eorum qui Scrophulariam rejciunt ob defectum acrimoniae ignauam, tribuit in Aduers. acrimoniam, quinimò in Obf. acris maiore ait. Sed hac parte sibi contrarius nobis videtur, ei modò ignauam acrimoniam concedendo, modò verò acris maiore Chelidonio tradendo.

Ego adhuc adolescens, inquit Solenander, vidi Tarquinium Schnellenbergium Medicum Empiricum, omne vitium hæmorrhoidum curantem Chelidonio minore. Is fecerè herbam integram, siccata, in manipulos collectam, injec-

Vires & V-lus.

Acrimoniâ nulla.

Solenander

Hæmorrhoides.

etiamque cerentisæ macerabat, eamque propinabat. Et aquam eius exstillatam, adhibebat lotionem & fotu exterius per linimenta. Postea illâ herbâ ego multis modis ad hunc affectum feliciter usus sum. Succus frequenter illius expeditus id facit, quâ aqua. Herba rufa appolita medetur. Noui, qui sanarunt, quos nimium profluuium ferè confecerat, ut hydriopis periculum adesse videretur, exhibuâ huius herbæ aquâ destillata: sed quia acris est admodum, libentius vior herbâ ista, ut antè dixi, cereuisia, vel etiam vino suo loco, macerata. In pila rosæ radices incoquantur oleo, eiusque est ad tumentes & dolentes hæmorrhoides usus. Flores quidam, alij herbam commiscunt oui vitello, coquunt, & in placentula manè edunt. Huius herbâ ego ad hæmorrhoidum vitium mirabilem efficaciam tribuo. Nam naturæ characterem in radice, cum exuberantibus hæmorrhoidibus habet. Sed illud diligentius examinabunt pectus, quomodo verisimile sit, aquam Chelidonij minoris acrem admodum esse, quandoquidem hæc planta, teste Matthiolo omnino acrimonie experta sit.

CHAMÆLEUCE ET CHAMÆPEUCE ex veteribus.

CAP. CXI.

*Diuerstas
synonymi
ho. capite.*

MALè & infelicitè cum Chamæleuces plantæ historia ex multo tēpore actum est. Vix enim è græcis Dioscoridis codicibus duo saltem concordēs reperiuntur. Nam Chamæleuce alijs tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucen habet: in alijs nullum est hoc caput: in quibusdam cum Buglosso miscetur. Et præter id alij breuissimè rem in hunc modum absolunt: Chamæpeuce [*χάμαριον* & [*χάμαριον*] lumborum doloribus propria est, si trita ex aqua bibatur. Quod longius eius historiam referunt, ista quæ sequuntur ad finem vsque ex Aldi codicis nothis cum Sarraceno adiungunt. Est autem herba tota viridis, herbaceæ coloris, foliolis, tam multis, quæ in cuneis, floribus rosaceis.

*Plin. inter
Chamæleu-
cem & Cha-
mæpeucem di-
stinguit.*

Galenus & Paulus [*χάμαριον*] itidem mentionem faciunt. At Plinius seorsim Chamæleuces & Chamæpeuces meminit: & Chamæpeuce quidem eadem tribuit, quæ Dioscorides Chamæleuce. Chamæleucen verò eam esse tradit, quæ alio nomine Farranum seu Faffigium, alàs Bechion: nominetur: ut reuera & inter Bechij synonyma in Dioscoridis nothis vox illa reperitur.

Porro, quid in tam confuso intellectu, & rei instantia reddendum esset, Marcellus diu dubitauit: Accessit tandem anxio Plinius, monuitque in ancipiti Chamæpeucen potius legendum esse, quàm Chamæleucen: quoniam quod Dioscorides ait [*μακρὸς ὁ ἴσχυος ἀλγὺν ἔχει*], & in alijs [*μακρὸς ὁ ἴσχυος ἀλγὺν ἔχει*], Plinius dixerit lumborum & spinæ doloribus propria est, eodem rei sensu & verborum ductu. Verisimile quæ est ex his quæ Plinius eadem Dioscorides reddidit hanc Chamæpeucem: hanc, & hanc fuisse eius ætate capitis huius lectionem. Chamæleuces enim alæ vires & alia remedia sunt, describitque Plinius Chamæpeucen Laticulis folio. Suspensit animo Marcellum tamen Egineta & Aëtius, qui, nullibi tractatâ Chamæpeuce, Chamæleucen describunt. Vnde fit, ut pro comperto constiteret aliquid audeat. Multis enim, iisdemque magis iudiciis & auctoribus pugnat, itaque in tanta varietate id elegit,

quo Latini scriptoris, deficiente Græcorum, auctoritate se tueretur. Non videtur autem ipsi esse integrum hoc Dioscoridis caput. Chamæpeucen autem potius, quàm Chamæleucen, Valerij Cordi exemplo quoque legendum existimat, ut qui ita in emendationibus quibusdam Dioscoridis codicibus scriptum reperisse se asserit. Hoc & illud accedit, quod cum herbam hanc Dioscorides [*ἀλγὺν ἔχει*] esse profiteatur, ei minùs apud conuenit [*χάμαριον*] appellatio: quippe quæ indubitanter humilem Populum designet: Populi verò albæ folia aliternus incanâ laugine vestiri, nedum [*ἀλγὺν ἔχει*] conspici, vnicuique constet.

Quæ Plinius de Chamæleuce scripsit, ea Hist. Lugd. de Chamæleuce Dioscoridis intelligi posse haud censet, sed potius secundum alios, quæ is de Chamæpeuce scripsit, ad Dioscoridis Chamæleucen pertinere contendit. Sunt tamen qui breuiem apud Dioscoridem Chamæleuces descriptionem in totum rejiciendam sentiant, & Galeni Chamæleucen diuersam à Bechio statuunt. Quidam enim esse Bechion (inquit Plin. lib. 26. c. 6.) & alio nomine Chamæleucen putant, &c.

Amatus de Chamæleuce scribens, ait Latine dici Chamæpeucen: promiscuè legi caput hoc de Chamæleuce, vel Chamæpeuce, Plinium tamè ut differentium memnisse. Sed quæro ex Amato (inquit Turn.) ex quo veteri scriptore, legatur caput hoc de Chamæleuce, promiscuè de Chamæleuce & Chamæpeuce? Quod si nullus veterum id facit, quis tandem ex recentioribus ita legit, qui Plinio non debeat cedere, Chamæleucen & Chamæpeucen distinguenti, &c.

Nunc reliquum est, ut Chamæleuces & Chamæpeuces æquiuocationes inquiramus. Chamæleuce igitur Cordo eadem est herba cum Bechio, id est, Tussilagine. Chamæleuce etiam dicitur Petasites, Cæsalpino. Caltha palustris, Turnero. Hedera terrestris, Trago. Rosm. siluestre, Cordo. Anthrithinum, Cæsalpino. Pinus Mugho, Donzoo. Camphor. Monspeliensium, Lobelio in Aduers. Muscus terrestris, sed perperam Cordo. Chamæpitys. Rosmar. silu. Gesbero. Erica altera Math. Alparag. marinus Clusio.

CALTHA PALVSTRIS.

CAP. CXII.



Minori Chelidoniz similis, per omnia tamen maior, minùs rubert huius coliculi: folia item profundiore circa pediculum firmo constant, & purpureis maculis careant: est etiam ista differentia, quod minoris Chelidoniz coliculi sine ramulis nascantur: hoc verò circa singula in coliculo folia binos emittit ramulos, cum in minore

ore Chelidonia bina semper folia singulares colliculos vestiant. Flores in summitatibus singulorum colliculorum singulos producit luteos, paucioribus tamen, eorum dioribus, multaque maiorebus foliis, quam illius, constantes: in quorum medio stamina eiusdem coloris visuntur: radices vero subsunt minori Chelidoniz dissimiles, Helledi radici cum fibris similes, foris nigre, intus candidæ, longæ, graciles & insipidæ: folia, floræque similem minori Chelidonio saporem habent: capitulum femininum est echinatum.

Valerius Cordus, descriptionis author Chelidoniam palustrem nominat. Sed Tragus Caltham vocari posse putat, cuius in Alexi meminit Virgilius. Ionic, ait græcè vocari Chrysanthemum, sed toto celo aberrat: Dioscoridis Chrysanthemum descriptioni minime respondet. Gesn. hort. refert aliquos Ferrariam vocare, fortè quòd folium ferream equi solem videatur referre.

De Caltha palustri hæc Dodonæus scribit: Flores hic rarior, vel nunquam apparent, quam obre Epimedium esse aliquando visum fuit, sed temerè. Non est autem Chamæleuce aut Tussilaginis species aliqua. Inepit quoque; Farfugium & Farranum habetur. Chamæleuce squidem, quam à Plinio Farfugium ac Farranum dici perhibetur, à similitudine foliorum *ad æne*, i.e. Populi albæ, appellationem accepit. Virent autem Luceas folia superius quidem, at inferius tenui candidaq; lanugine incanescunt. Calthæ verò huius neutrà in albe scunt partes nec formâ eorum respondent. Hæc ille, qui Calthæ palustris, & alteram effugiem dedit, sc. absque flore in aquis prouenientis.

Caltha palust. is recentiorum (inquit Lob. in Adv.) non est Chamæleuce Plinij folio Populi, siue humilis incana. Est *Dotterbloemen* Belgarum, & Farfugium Recentiorum quam *Cas. Balsus* ex Geoponicis Malacocylum maiorem vocat, & Matthioli ex suo cerebro Tussilaginem alteram facit, coniunctas tamen, & descriptionem ex Dodonæo, & aliis recentioribus scriptoribus emendatam, inculcando, suppressis nominibus, & mutatis classibus, quasi scopas dissolutas: hæc enim multò magis Chelidonium ipso toto vultu, & affectu, nisi quòd vntuera maiori: Flores neutri jam apposi, quinimò diu admodum & particula in flore, aut eis Ranunculi, aut Chelidoni minoris floribus neque; folia ortu, vt Tussilago, antevertunt, & Nymphaeæ luteæ colore, vel Chelidoni minoris nitore fulgent, & similes sunt, sed in Angliæ vdis, vbi vberima, sæpè pro Nymphaeâ minore Pharmacopœi & Clinici mulierculæ mihi atulei, & ostentant. Folia non subter incana, non angulosa, non caulis tomentosus, sed potius atro vitore polito, vt Asarum, Nymphaea. Radix fibrata quidem capillamentis, acris gustu est, sed moderatè. Nunc si Nymphaea inde sit dicta, quia Lymphis, Nymphisve est confidit & accola, potuerunt Serapione antiquiores Caltham palustrem dictam Nymphaeæ congenerem fecisse: natales quippe, folia, & flores affinitate hanc vulgaris, etiamnum persuadent idem quibuldam pharmacopœis, qui nostris medicamentis non semel subdiderunt hanc, illarum [Nymphaeæ vtriusque] loco, vocabantque Nymphaeam luteam. Quin mihi forent nate Nymphaeæ, certe hanc legitimam Nymphaeam agnoscerem, quoribus potiores vel rationes, vel plantæ accommodatioris me deficerent. Et hæc Lohe in *alibi*: Chamæleuce siue Populus pumila quamam sit, vix nisi de nomine coniectari licet, Tom. III.

ad id ignotis notis proditi: cum Dioscor. id. &c.

Contrà, plantam hanc circa riuos aquatum & vliginosis pratis nascentem, quæ Chelidonia palustrem vulgarem, & nonnullorū Chelidoniam aquaticam nominat, Anguilla Opiniorū lib. 12. Chamæleucen P. in esse existimat, idemq; ad huc nominibus cognitam dicit Parauino agro, quibus Plinius eam donat, nempe Frani [Plin. Farnan] & Farfugij, cuius opinioni Matthioli assentitur, assensuatur & alij.

Apud H. Lugd. p. 1049. Caltha palustris describitur: verum repetitur descriptio aliquibus mutatis sub altera Tussilagine Matthioli p. 1052. Sed nulla apponitur figura. Meminit eadem Calthæ palustris p. 1051. sub alia Nymphaeum specie Serapionis.

Hier. Brunsch. in edit. anni 1650. ineptam figuram ponit, *Sechtmunen*, h.e. Nymphaeæ nomine.

Maré & semina facit Gesn. de coll. stirp. *Maré Brunsch.* in ramulis rubentioribus flore magis tinctorum: *faminâ* mihi accepta figura.

noré albiore, ramulis, & flore min⁹ tinctorum, tradēs. *Mai & se-*

Tabern. & Gerar. l. maiore & minorem agnomina. scunt. Et hinc apud Tabern. nomine Populaginis maioris & minoris designantur figuræ, apud Ger. verò nomine Calthæ palustris maioris & minoris.

C. Bach. phyt. (vbi prius Chamæleucen Plin. vocat, item quorundam Caltham Pécariū, & Boutomon Constantin.) & Plin. [vbi Chamæleucen Angl. ill. & Turneri statuit, Epimedium Dodonæi, Thal, & Amellum Virgilij putatum e. iisdem appellat, & Farfugium Cast.] dicitur Caltha, siue palustris flore simplici.

Germ. nuncupatur *Dotterblum*, Flos vitellinus, *reel wittenblum*, Flos prat. luteus, *Mossblum*, Flos pratensis aureus, *Schmalblum*, Flos butyri, *trabblum*, & *Geel*, *Sechtmunen*, luteus german. Maij flos.

Humidis palustribus locis, veluti riguis pratis gardet, subinde ab insulis aquis exirentis folia supereminetia longioribus, nuntur pediculis, quæ alias bicoloribus, insillat flores huic raro, vel nunquā apparent. Illa vñ cum Ranunculis Vere florēt, & feruēt, subinde quoque; *Assate*: toto autem anno *Loeus & ipsa viret herba*: *Lugduni* observati *florēt* *Tempus*. Martio, Genæ Aprilis, & Maio siliquas ferēt: item prope *passerfat* *florēt* *em* Augusto.

CALTHA PALVSTRIS FLORE multiplicato.



Multa habet folia, Descripti circinatæ seu è rotunditatis, succulentæ, venosæ, in ambitu nonnihil, vulgaris foliorum instar, serratæ: prodeunt inter illa palmarum caules, interdum enā [si videri] pinguet. Solo nalcatur] pedales & maiores, oblique in aliis morales dimisi, quæ vepum & vulgaris more, ex humo genitæ & pro-

fetum fl. et, vncialibus petiolis innitentes, multiplici foliorum textura constantes. coloris plañe autem, quorum quina inferiora, reliqua veluti funtenta, & amplectentia, maluscula sunt: radix non minus quam vulgaris, multis candidis, crassiusculisque fibris prædita est, auctore Clasio, in Hist. post.

Synon. Auctori & Camer. dicitur *Caltha palustris* flore pleno: Gel. hort. *Caltha palustris* floribus densis. Ita, de coluturp. Chamaeence Ruellij hortensis, floribus foliis multiplicibus: *Populago multiflora* Tabern. *Caltha palustris* multiplex Ger. flore multiplici Eyst. C. Bauh. pin. *Caltha* 10. [9. in phyt.] tunc *palustris* fl. pleno.

Locus. In Anglia sponte & plenis & odoratis floribus reperitur, Camerario auctore. Ex Salzburgerisibus pratis (in quibus copiose nascitur) primum Viennam Austria delata: Nobilibus Matronis cepti esse in delictis, cum itic viueret Clofius: postea etiam ex Augusta Vindelicorum accersitave- rum non adeo elegans ut prima, sed paulo hemi- hori: eius nem folia minus vegeta, & quasi pallescentia: flores etiam dilutior, & magis pollens. Augottianæ frè similes plantæ, pæce tam inuen- te (nem) rans quibusdam virginibus, Rancu- futo ad Mœnum vicinis, anno 1591. flore quidẽ pleno, sed raro: non lo in eadem, eque in hortu illa- ta, sequente anno, simplici florum textura pædi- tos tute in flores, in ita vulgaris: ite quam Lugdu- num Bæzorum de tota, ut tunc etiam obferuare liceret, simpliciorem florem semper præbuit. Nobis Montbelgard. in hortu floret Vere & Autumno.

GERANIVM IN GENERE EX VETÈ- ribus & Neotericis.

CAP. CXIII.

Gerania
duo Diosc.

DVas Geranij species describit Dioscorides. Geranium, inquit, folium habet Anemone- rum, incisuris diuisum, at longius: radicem sub- rotundam, *descriptio* su o: Orib. *spec. Geran.*) dulcẽ & esul aptam. Hæc drachmæ pondere in vino pota, veteris flatones discutit. Vocatur & anō- nullis alterum Geranium, habens cauliculos te- nues, lanuginosos, duorum palmorum altitudine: folia verò Maluæ similia, & in summis alis qual- dam sursum spectantes eminentias, veluti gruum capita cum suis rostris, aut dentes caninos. Hu- ius in re medica nullus est vsus.

Sunt autem qui prius Geranium Dioscoridis Pelonitum, qui Tican, qui Geranogerontem vo- cent. Aph. i. Iesce, Romani Echinastrum appel- lant: Posterius quidam Oxyphyllon, aliqui Mer- tiyga, nonnulli Myr. h. da, pleriq; Cardamomon, aut Origanon vocant. Magi Hierobricas, Aphri- Iec, Romani Palmoniam, Cicutariam, & Gni- nam heibam appellant.

Genera duo
Plinio. Plinius duo quoque genera Geranij describit: Et primò vnum iuxta Latinorum quorundã tra- ditionem. Deinde ambo iuxta Dioscoridem. Ga- lenus in Simplicium censu Geranion omisit. Sed Paulus sequitur Dioscoridem, vtrumque Geranion commemorat, eadem quæ Dioscorides tri- buendo.

Nomina
linguarũ. Commune harum & similium stirpium no- men græcum est, *geranion*, latinum Geranium. Ap- pellatum autem est Geranium, à gruin capitis imagine, quæ summo eius plantæ capitulo inest, aptissimã similitudine. Sic recentioribus à cico-

nia rostri effigie, Rostrum ciconiæ nominatum est. Germ. *Geranion* *Geranion* & *Geranion* *Geranion*: Belg. *Synares* *Geranion*: Gall. *Bec de Cigogne*: Ital. *Geranio*: H. sp. *Pico de cigoma*: Angl. *Geranion*: Boh. *Geranion*: Hung. *Geranion* *Geranion*: h. c. Cornicis pes.

GERANII SPECIES VARIÆ.

CAP. CXIV.

GERANIVM MALVACEVM.



Alteri Ge-
ranio folia
sunt Maluæ
magnitudine,
colore & molli-
tie proxima,
nōnihil oblon-
ga, subhi-
suta, in ambitu ferra-
ta, pediculis ap-
pen-
ta, tres dual-
ve vocas lōgis,
interdum ferẽ
dodram alibus:
cantes ex eadem
radice, solo læ-
tore & fime-
tis multi hirsuti,
mediocriter
crassi, dodrantẽ
aut cubitũ alti:

ẽ foliorum sinu pediculus exit duas trẽve vncias longus, multifidus, cẽi flores insident multi ceru- lei, quinque foliolis constantes: quibus deciden- tibus rostra oriuntur vnciam aut lescunciam lon- ga. Hæc planta aliquando vix trientris est, foliis ovatis, crenatis & Beronicæ ferẽ similibus, quã- le nos habemus in Herbario nostro sicco, lectam, nĩ fallimus, in agro Narbonensi.

Sub Geranio secundo, siue altero quibusdam dicto hoc intelligit Dioscorides, dum ei gruum rostra tribuit. Est Geranium foliis Maluæ paulo candidioribus Plinio.

Matth. in edit. comm. anno 1599. hoc intelligit, cum ait: Geranij plantam vidi in pluribus hortis, ac viridatis satam, foliis rotundis secundi [Robertiani] Geranij modo per ambitum laciniatis, Maluam magnitudine æquantibus, fructu gruinis cap- titulis simili. Hanc Herbariorum nonnulli, Mo- mordicam nuncupant, quemadmodum & Balsami- nam alij eodem nomine vocant: eamque cæ- teris præferunt in potionibus ad interna vulnera gluunanda. Hæc, meã quidem sententiã, magis responder alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ to- li is ad Maluam propius accedat. Quare & hanc magis eandem esse cum illo putauimus. Verumta- men haud eam inficias, quin Pes columbinus di- ctus, idem sit Geranium: sed eum quis rectius fortẽ Geranium minus dixerit. Eadem repetit in comm. cum mag. fig. lat. & Italicis. Sed non existi- mo Mathiolo benẽ perspectum fuisse hoc Ge- ranium. Siquidem modò Momordicam ab ali- quibus appellari credit modò verò, pro Geranio tertio, Veronã à Calzolario misso, siue sexto de- plingit, & vtroque describit. Quinimò mihi per- suadeo, terriò eam pro Malua altera à Calzolario Veronã missa in lat. comm. cum mag. fig. sine de- scriptione tradidit comm. verò Ital. pro qua tamen Epir. pro hederacea siue montana.

Memin-
it

Meminit huius Amatus sub secundi generis
Geranij Plinij folio Maluæ altera specie, à mul-
tâ Momordica dicta. Verum non deferibit, nec fe-
cis explicat. Apollo Rad. 10. p. 193 facit Geranij
Dioscoridis secundam speciem primam, à quibus-
dam Momordicam veram nuncupatam. Lobel.
in Icp. 662. & Obsp. 378. Geranium Malacoides
inferbit.

Tabern. Ic. Geranium Mompeliacum siue Mal-
uaceū, Papel. Schnabelfranc. Hist. Geran. 9. 31.
pavon uar. accedre. Geranio lucundo Dioscoridis
iungendum præcipit, quæ uals à veteribus nō de-
scrip. um putet, quæ in re multum fallit. Est
enim ipsum Dioscori his Geranium secundum.

Geranium secundum aliud Matth.oli describitur apud H. Lug. 4. p. 176. linea vltima: ægura habetur p. 128.0. f. 16. Geranio loco Matthioli, ex quo denuo describitur. Illud à vero alienum est, quod ibidem dicitur, Matthiolium Momordicam pro secundo Geranio pinxisse. Exitum huius nominis & descriptionem & iconem Maluæ maioris tertius Matthiolus in scriptione pag. 586. apud Hist. Geranij extare.

Gerardus Geranium Malacoides, spurium
Creticum, Bastard Candie Crauesbill appel-
lat. Dodonæus in fol. lar. dicitur Geranium, Ma-
thioli à Calceolario miffum, ad Pedem columbi-
num referendum, Calt. Geran. Matthioli. Cam-
mer. hort. Geran. altherodes, Matthioli 6. vel viti-
mum. Cæfalp. Pedis columbini vulgò appellati
tettia pedes t. h. Althæx.

C. Bauhini *Geranium* 2. in phyt. 9. apud Matthioli. 5. in Pin. folio Alphææ, & Maluæ 3. phyt. 5. siue montanum apud Matth. 4. in Pin. folio hederaceo, vnam non duas itauo plantas. *Nec separo* ab his eius in Pin. *Geranium Maluæ folio* quartum, siue malacoides minus, quod 1. in ipsius Prodomo.

In hortis Brabantiae & German. colitur : flor
mentis Martio & Septembri. Montpelij abundat :
item prope Florentiam & in montibus ad Arque.

GERANIVM FOLIO ROTVNDQ, MVLT-
tũ ferrato, siue Columbinum.

Vitculis
mulcis, ru-
bentibus, paũ
ereclis, genicu-
laris donatur:
folia Maluæ ro-
cunda, nunc
magis, nunc
minus incisa:
flores quoque
magnitudine
variant, purpu-
rei, quinq; foli-
olis aliorum
more constan-
tes: quibus acus
succedant Ro-
bertianij *radix* re-
nnis, sed longa,
rubeicens, sa-
pore adstringe-
gente.

Duplex est genus Thal. & C. Bauhino, maius
Tom. III.

sc. & minus: maiorē sunt caules maiores, & folia paulo molliora: & i orti omnia minora, & folia asperiora. Sic folia modō in profundiorē, modō in breviorē & laras laciniata sunt: floris etiam magnitudine differunt: flore triplicē maiore & cærulei elegantioris coloris ex horto Dei habuit Frater.

Quem vulgò Eur. Cord. Ruell. Hermol. Tag-
gault. Brunftom. 2. p. 290. (habet descriptionem
Manlij) Fuchf. Corin. Trach. Matth. Turn. Amar.
Lonie. Lac. Calt. Cronemb. Apollo. Lobin. Adu.
Obfp. 376. Ic. Plant. p. 658 Cæfalp. Tabern. Ger.
Thal. Camer. hort. & Clufius Pedem Columbinum
vocat, iidem omnes [excepto Eur. Cordo, qui
Herbam Ruperianam malè quidem, & Grunæ
herbæ speciem cognominat, Brunfels. & Camer-
ario, qui etiam Geranium Maluaceum fivè Bal-
famum appellat] Geranium alterum (*gerani* *her*
triper) folio Malvæ Dioscoridis [& Plinij, addit
Amar.] affe. Ruvum.

Geln.hort. Gerani; species folio Malæ: Cron-
nemb. Gerani; altera species Fuchsi: Dod. Ta-
bern. & Ger. (cui & Pulmonia, & Gruina) Ge-
ran. columbinum: C. Bauh. h. hyr. Geran. i. sue fol.
Maluz, Eid. in Pin. Geran. Malæ folio rotundo,
primum. Math. ol. Hiflor. german. Geran. ter-
cium.

Sunt qui [Scorpionis interprete decepti] ab-
errantes, maximo errore Amomum (secundum *rundam*.
verò Tabern. Cardamomum) esse existant, &
in Amomi locum substituant, nullum de his hi-
storiam inquirentes.

Nec melius *Barbarus* Herbam *Roberti* nuncupat. Fallitur & *Brassavolus* affersens nullo modo iis esse assensitibus, qui *Pedem columbinum* vocarum, *Geranium* esse contendunt, quòd *Geranium* foliis exeat maioribus, *Aucumones* incursus. Sed is ignoralis videretur, quòd secundum *Geranij* genus, non autem primo generi à *Dioscoride* assignatum, est illud, quod *Pes columbinus* censitur. Vel fortasse dñus hac scriberet, alterum genus *Geranij* non animadvertit in *Dioscoride*.

Secundam hanc Geranii speciem, Pedem columbinum vocamus, verum non esse, Apolline rad. non esse, non fine lapsu tradidit Cardanus in lib. de malo medendi viii, pro columbino milinum forte, vel coriunum accipiens Ranunculi genus, excolerans scilicet, & veficus excitans, vel deceptus, quia in Geranii specie foliis Ranunculo similibus, in quinta specie, à Fuchfio numeratur secunda hæc minoribus foliis.

Gerin. tautclufij: Pes columbæ, & fcharten: Nomina
 Franc. Belg. Durnmenpoet: Gall. Pied de pigeon: Ital.
 Geranio columbino: Cast. Pico de ciguenna: Portug.
 Pied de geyro: Angl. Dovesfoot & Cransbill:
 Poll. Coteptia noza: Hung. Golya feröme:
 h.e. Cloniz vnguis, h.e. Storcken clauwe.

Floret tota ferè Æstate: prouenit fecus vias, in
agris incultis, in cœmeteriis, & hortis: quotannis **Locus &**
se renouat semine deciduo: Hiemem enim non **Tempus.**
perfert.

Pedem columbinum præſcribit Rondeletius in enemate ad Hydropem. Experimentâ conſtare ait Tabernamontanum eſſe herbam valdè vulnerariam potius additam, aut etiam in pulvere ſumptam. Eidem uſui inferuire & aquam diſtillatam. Herbam vino vel aquâ decoctam, purgare vulnera. Idem præſta & emplatris, balanis & vnguentis quous modo additum. Fotu quoſlibet articulos adoleſcere.

Synon.

Alius
Brassau. la-
psus.

Non est ve-
nenum con-
tra Card.

Nomina
linguar.

Locus &
Tempus.

Vires 82
Vfus.

1: ff 3

GERANIVM TVBEROSVM MINIMVM.

Descript.

Est folio, flosculo, & totâ facie vulgaris Maluaceæ, siue Balsamini, aut Pedis columbini, attamen multò minus: radice Auellane magnitudinis, rotundâ, tuberosâ, quâlibet acis, sed v. laci acetabulis, aut osculis ex parietibus alimentum hau-riens. Ex murorum umbris, in quibus nascitur, in hortum translaturum, Geranium tuberosum minimum penitus contabuit.

Synon.

C. Bauh. phyt. Geranium 13. siue tuberosum minus folio maluaceo: Eid. Pyn. Geranium Anemones folio rotundo 10. siue Ger. tuberosum minus Camerarij.

GERANIVM GRVINALE, FOLIO tenui et diueto.

Descript.



Radice nititur singulati, parua, in- tus forisque ru- bente: caules ad- modum nume- rosi, plurimum supini, dodran- tales, interdum bicubitalis, ra- mosi, sanguineo ri bore perf. si, hirsuti, genicu- lati: folia Pedis columbini, ro- tunda, sed te- nuiter dissecta, subhirsuta, & nonnihil subin- de rubentia: flo- res Geranij Ro- bertiani, paulò

maiores, purpurei, folliculo laxiore, minusque rubente obsidi: semina tostrata, quam Robertia- no habitiora.

Cæsalp. Geranium 3. & Collum gruis, fraz- nichobalt Germanorum Fuchf. Lonic. [cui & Gruiua] Lac. Dodon. [cui & Gruiualis, & Geran. gruinale] Geran. quartum: Lobellio in Adv. ni fallor, Geran. Robertianum 2. siue Robertia- na secunda: Camerario hort. Geran. supinum paruum siue volgacius, & maius, non ita passim obulm & notum: H. Lugd. pag. 1178. Gruiualis Dodonæi: Casp. Bauh. phyt. Geran. 18. siue Robert. secundum: apud Matth. Geran. Robert. 2. Matth. 4. Tabern. violaceum: Eid. Pin. Geran. Anemones fol. rotundo 7. siue batra- choides, Collum gruis dictum. Sed Matthioli quintum non est gruinale, vt eo capite demon- stratum: Geranium quoque violaceum Taber- næ montani esse non potest, si vel solum figuram confideres, quæ eadem cum ipsius Geranio Ru- pertiano.

Locus & Tempus.

Montepelii & Genevæ observati virens Fe- bruarij principio, Montbelgardi etiam in hor- to Ill. E. C. spontè florens Iulio & Augusto: circa fontem admirabilem in ducatu Witemb. sine caulibus O&obri.

GERANIVM ARGENTEVM

moudu Baldi.



Geranium argenteum palmâ altius paulò: ex radice crassiuscula ru- bente, medio- cris longitudinis folia exeunt lon- gis ac trium quatuorve vn- ciarum pedicu- lis hærentia, parua, & quæ ollicis articulo tegas, in quin- q; acinias præci- puas, singulas rufus diuissas, profundè ad vs- que pediculum fissâ, pilis infra subulque albis, luculentibus vt

In Hepaphyllo montano, lanuginosa, ad Ger- anij gruinale formam accedentia: caulis tenuis, palmaris, in ramos abit, quorum singulis insidet flos purpureus, quantum sicca demonstrat, in me- dio staminulis longiusculis, quem calyx excipit magnus foliaceus, e quo tandem emergit rostrum gruinum, vnciam plus minus longum: perennis herba est, vt ex reliquis plurimorum foliorum veterum, quæ radicem quasi squammatam fa- ciant, colligere est.

Hoc C. Bauh. in phyt. videtur intelligere per Geranium 8. siue argenteum, & cum Geranio sa- xatili Thalij & Camerarij, quod idem est cū meo lucido, siue eius decimo, turpi-er confundere. In Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 14. siue argenteum alpinum.

Nascitur alpinis rupibus maioris montis Baldi (ex quo petiitum, mihi Bechius misit) Orientem aspicientibus, ac ibi passim Floret initio Iulij, se- men Kalendis Augusti perficitur. Perennis est planta. Radix amariufcula, ac quadam subadstri- ctione donata.

GERANIVM TVBEROSVM.



Grubero ū dictum, nomen inuenit à ra- die tuberosa, sublinida, insi- pida: cuius so- lita, semipalmari & palmari subhirsuto pe- diculo dona- ta, lata sunt, di- uisurâ octonâ, nouerave ad ipsum vsque pediculum, sin- gulis segmen- tis minutis dissectis, colo- re ex viridi ca- nescente: flo- res in

res in petiollis teretibus subrubrisque ac hisfuris, pulchri, purpurascetes, ex quinque foliis in summa diuisis aliquantulum, interiore purpura striatis, & circa inum marginem nonnihil hisfuris, fibris purpurantibus: circumiecta autem sunt flori quina idem folia acuminata, intus nonnihil rubefcentia, glabra, foris virefcentia, & lanuginosa. Floribus decidentibus succedunt rostra.

Dioscoridis est *γεράνιον* foliis Anemones, diuisionibus longioribus, radice subrotunda, dulci. Plinij Geranium alterum Græcorum. Pauli Geranium folia habens Anemonæ similia.

A Dioscoride autem primo loco descriptum esse testatur inter alios Matthioli, qui in p. 10. rib. comm. pro Geranio i. pingit, & in post. pro eo etiam describit. Mirum proinde eum in Hist. germ. Geranium quintum statuere.

Pro Geranio primo, scil. Dioscoridis recipitur quoque ab Anguill. Lob. in Adu. & Obl. Cam. hort. Tabern. Cast. Gerardo, & Cæsalpino: cui & Pancefeolus dicitur. Pancefeolus, inquit is, vulgo appellatur in montibus nomine conficito ex pane & caseo, quorum vicem in cibis explet radix: Geranium Dioscorides vocat, & Plinius similiter.

Gesh. hort. dicitur Geranium subrotundâ radice Dioscoridis, ab Anguillara allatum. Lob. in Ada. Obs. p. 337. Ic. Plant. p. 66. Geranium bulbosum. Cam. hort. Geran. tuberosum maius, admodum viua & copiosè se propagans. Gerardo Geran. tuberosum. C. Bauh. phyt. Geran. n. siue tuber. maius: Ed. Pin. Geran. Anemones folio rotundo nonum, siue tuber. maius.

H. Lugd. p. 1275. Geran. i. Matthioli: Et p. 1276. Geranium tuberosum Dodonæi. Vtrique figura est Geranij bulbosi: sed prima id proponit, vt Matthioli expresse: secunda Dodonæi, quæ melior, sufficiebat.

Tabern. Ic. Geran. tuberosum siue Illyricum, *stündich schnabelkraut*. & Geran. bulbosum Matthioli, *türkisch schnabelkraut*: Hi s. Geran. septimum, Pelonici: Geranogeron. Trica, *Herba guina*, *Echinastrum*, *Vchinastrum*, *Pulmonia*, *Rostrom guinum*, *Rostrom ciconia*, & *Petimonia*: Arab. *Geramon*. Ic. Geranio, *Acro de pastoris*, Hispan. *Bico de ciguena*, Gall. *Bec de cicoigne*, Afric. *Ysa*, Hüg. *Darnulab*, Boh. *Carpinuss*, Angl. *Storckes bill of Albia*, Belg. *knobelachtig*, *Cranebeck*, Germ. *Schlovoinsch Schnabelkraut*, *Schlaonischer Storck*, *u. schnabelvri*, *ndischer storck*, *tschischabel*: Item, Geranium decimum, primo Dioscoridis annumerandum, *γεράνιον βοτρυόδες*, Geran. bulbosum, & rotundum à radice nūcupatum, Geran. Byzantinum, Geran. Turcicū, German. *Zwibel schnabelkraut*, *Constantinopolitanischer Storcken schnabel*, & *türkischer storcktschischabel*: quia primò Constantinopoli in Germaniam delatū. Has duas non separamus, quin potius easdem esse statuimus.

Montbelgardi Solum commodè perfert, florens in horto Illust. E. C. Iunio & Iulio. Vires ex Veteribus lege antè.

in ambitu inæqualiter incisæ sunt: è singulis juncturis, iuxta foliorum exoriorum quinque folia mucronata exoriorunt: flores in summis ramulis conjugatim paruis pediculis insistentes rosei, ex quinque foliolis constantes, colore ex purpureo rubelcentes, Geranij cæruleis floribus similes, sed paulò minores.

Clasius descriptionis author facit in Pannon. Synon. p. 419. Geranium 3. in Hist. post 4. cognominatque Geran. bulbosum Pennæi. Dicit autem foliorum similitudine secundum Geran. Batrachoides aliud folio Aconiti nitente [referre. C. Bauh. in phyt. est Geran. 12. siue radice ex multis bulbis constante: Eidem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 11. siue radice grumosa.

In Dania prouenit agro Hafniensi, vnde Turnerus Clasio attulit & dono dedit.

GERANIVM BATRACHOIDES.

Radix pollicari est crassitudine, fortis rubra, Descriptio. Rintus buxæ, multis fibris donata, sapore vehementer adstringente: caules cubitum aut sesquicubitum æquant, tenuis, fungosi, subhirsuti:



flores speciosi, magni, cærulei, quinque foliis purpura striatis constant, in quorum medio apices atropurpurei: folia Aconiti, magna, rugosa, profundè incisa, & quasi in orbem nonnūquam acta.

Camer. hort. & C. Bauh. duplex est: grandius floribus cæruleis, aut albis, & quidem eodem loco: minus rubris.

Trag. vocat Geran. 4. ordine postremum, *Sanguinarie radice* speciem: Corn. & Matthioli in post. comm. & Hist. germ. Geran. quartum: quintum Fuch. Lac. & Lonic. qui malè quoque Chelidonium minus appellat: sextum Turn. Dod. gall. ac etiam cum lat. in fol. Geranium Batrachoides à Ranunculi similitudine, vnde & vulgò Ranunculum cæruleum appellant. Lat. præterea & alterum Geran. batrachoides pingit, aliam Geranij Batrachoidis speciem nūcupans & describens.

H. Lugd. p. 1280. & Cast. Geranium 4. Matthioli: Gerardo Geranium batrachoides: Clus. in Pan. sine icone pag. 419. Geran. batrach. primum, Geran. batrach. cæruleo flore Belgicum, Hist. post. Geran. 3. *batrachoides* maius. Thal. Geran. *batrachoides* Dodonæi si. purpureo magno. Camerat. hort. Geran. batrachoides maius & minus. Lobel. Adn. Geran. batrachoides, siue magnum, cæruleum odoratum, Obl. pag. 376. Geran. batrach. siue gratia Dei, Ic. Pl. p. 659. gratia Dei Germanorum. Cronemb. gratia Dei, Geranij 5. species Fuchij, Tabern. Ic. Geranium siue Batrachii cæruleum, *blauw storchschischabel*. Hist. Geranium sextum, Ranunculus cæruleus, gratia Dei cærulea. Hoc

GERANIVM ASPHODELI RADICE.

Radixem habet ex multis paruis & longis bulbis constantem, versus summum fibratam: caule cubitale genicularum, iuxta radicem & genicula parum rubentem: è singulis geniculis duo folia longiusculis pediculis nitentia, in quinque præcipuas partes dissecta, quarum singulae

quamvis neque à Dioscoride , neque ab aliis Græcis describatur, tamen ad primum Dioscoridis refecti posse putat.

C.Bauh.phyt. Geran.3. siue (ceu etiam apud Matth. vbi figuram Geranij sanguinei Tabern. assumpsit) Geran. batrachoides. Eidem in Pin. Geranium Anemones fol.rotundo 3. siue batrachoides , Ger. sanguinarium Tabern. maius Eyftert.

An Geran.alterum, Geran.maiori Aconiti folio simile Gesn.?

An Balsamina vulgò Cæsalp.?

Genevæ quidem mihi florebat in horto mensæ Maio ex proximis montibus allatum. In Belgicis hortis quosdam aluisse etiam observavit Clusius: sc spontè provenire variis in Germaniæ, Bohemiæ, & Austriæ partibus.

GERANIVM BATRACHOIDES ALBVM
& ex albo cum cæruleo colore varium.

Descript.



foliis est similibus Batrachoidis vulgaris, aut cæré vix notabili differenti: à variantibus, quorum pediculi cubitum longitudine excedunt. Totaplanta lanugine quadam albicante oblecta. Caudex sunt bicubitales. Flores albi lineis cæruleis striati, quidam etiam medio-cærulei, sex foliolis constantes. Calyx hirsutus, quinque constat foliis, è quo, flore decedente, rostrum emergit notabili hirsutie donatum, vnciam plus minus longum, desinens in apicem tenuem, qui in extremitate per siccatem in tenuissima quædam filamenta capreolorum instar contorquetur. Tandem dissiliens rostrum semina ostendit quina, imis rostri costis hærentia, & in folliculo membranæ contenta, oblonga, sinuata, colore pullo, exterius viridi, sapore dulci, grato. In foliis autem nullus sapor effatu dignus.

Cerardus pro Geranio 2. Batrachoides albo assumpsit iconem à Tabern. propositam pro Geranio 13. siue sanguineo, quod non displicet: figura enim Tabern. non convenit cum sanguinei descriptione. C.Bauh. Pin. vocat Geranium Anemones fol.rotundo 6. siue Batrachoides flore variegato, Anglicum variegatum Eyftert.

Ex semine Argentinæ collecto in horto Frid. Meieri provenit nobis Montbelgardi: secundo anno floret & semine deciduo se propagat.

GERANIVM BATRACHOIDES ALIVD
folio Aconiti nirente Clusij.

Descriptio.

Prodeuntibus è radice frequentibus longoque pediculo nitentibus foliis præditum est,



Ranunculi platyphylli, aut Aconiti lycoctoni pallido flore, folio respondētibus ferè, rugosis, subhirsutis, in aliquot profundas lacinias diuisis, deinde in ambitu serratis, quæ gustata inuitò adstringere, & linguam exsiccare, deinde nonnihil calfacere deprehenditur: caule cubitali

ut plurimum, firmo, rotundo, geniculato, in multas alas diuiso, quibus supernascuntur folia superioribus minora, paucioribusque lacinis diuisa, perinde tamen in ambitu serrata: summi rami in oblongis pediculis flores gestant quinque foliis constantes, Geranij batrachoidis quod in Belgicis hortis alitur, floribus formâ pares, paulò tamen minores, nec, ut illi, cæruleos, verùm ex purpura rubentes, decem staminibus cum stilo ex umbilico floris prodeuntibus: deinde oblonga, erectaque rostra, non inflexa, aut inclinata, quinis utriculis ad eorum basim turgentibus, & semen continentibus, quod maturitate exilit, aliorum Geraniorum more: radix superiori [Geranio phæzo siue pullo flore] ferè respondet, & summâ tellure in plura crassa, interneque rubentia capita, exuberat, quæ fibras etiam agentia, singulis annis augentur.

Author Clus. in Pannon. pag. 417. & Hist. post. describit, Geranij batrachoidis alterius titulo: inscribit verò ibi pag. 418. Geranium secundum: hæc autem Geran. 2. Batrachoides minus.

C.Bauh.phyt. Geran. 6. siue batrachoides maximum, Batrachij speciem tertiam Gesn. hort. & Geranium Batrachoides alterum, vel montanum primum Clusij videtur appellare. Cur autem maximum cognominat, cum Clusius minus esse scribat? Ei est in Pin. Geranium Anemones folio rotundo 1. siue batrachoides folio Aconiti, Geranij species tertia Gesn. hort. Geranij maioris species prima. Eid. app. Geran. batrachoides Gerardi. Variat, inquit, flore cæruleo, albo, lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplè majore, & dicitur Geranium batrachoides cæruleum, & Geran. batrachoides flore albo, Eyftert.

Crescit in Pannonicis, Stiriacisque Alpibus, nusquam tamen abundantius, quam supra Gamiogam, in illo ascensu ex Herren-alben iugo ad sublimes scopulos Durrenstein, in quibus floret Iulio & Augusto: in hortis autem Maio.

GERANIVM

horto Illust. Princ. vnde Montbelgardum in hortum Illust. E. C. transfusi, in quo se circa sua & repente radice multum propbat, ac diu perennat.

GERANIVM PHÆVM FLORE
reflexo.



Speciosum est
Sapprimè hoc
Geranii genus,
foliis ampliorib.
quàm Batrachoidis, in octo
plùs minùs seg-
menta, angus-
ta, sed lata, divi-
sa, subhirsuta,
nigricantib. mac-
culis aspersa, per
ambitum latius-
culis crenis cõ-
spicua, nullo o-
dore prædita.
Flor. summitati-
bus infidet pur-
pureus & penè
fulcus, satis ma-
gnus, accedens
ad florem Gera-
nii folio odorato, qui inuersè contorquetur at-
que reflectitur, in medio apices, floribus deci-
dentibus *rostra* oriuntur vnciam longa.

Description.

Lobel. in Obs. pag. 377. Icon. Plant. p. 660. Geranium fuscum intitulat. Tabern. Ic. Geran. maculatù stercorib. nabeltraut. Hist. Geran. phyt. Geran. g. siue montanum fuscum, Eidem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 8. siue montanum fuscum, Geran. mont. Dodon. Geran. fuscum Lobelii, Lugd. & Eystett.

Synon.

Colitur in Germaniæ hortis, vt Frid. Meieri Argentinensis florens Maio, & Ill. C. Wirt. Sturgardiæ florens Iunio.

Locus.

Geranium phœo siue pullo flore Clusii.



Author Clusius vocat
in Pann. p. 419.
Geranium mon-
tanum 1. siue
Geran. *caesp.*, aut
pullo flore. Hist.
stor. post. Geran.
1. pullo flore, Ge-
ranium folia ha-
bens Lycocro-
no flore luteo
non dissimilia.
C. Bauh. phyt.
Geran. g. siue Ba-
trachoides hir-
sutù flore atro-
rubente, Geran.
mont. 1. Clusii,
Geranii maioris
species secunda,
Geiberti in Ap-
pendice.

Description.

pendice.

Ego, vt verù fatear, facillè crediderim, Geraniū
G g g

GERANIVM BATRACHOIDES.
maximū m. minimū laci niatum,
folio Aconiti.

Est ex eadē Batrachoidis Geranii familia aliud, eomay, foliis ad Aconiti lutei folia accedentibus, ea verò quinque lacinii incisā, usq; latioribus, quàm in primo Batrachoidē, & per extrema serrata, hirsuta: *caules* magni, hirsuti, geniculati, in ramos divaricati, in longos desinentes pediculos bifidos, qui sustinent magnos *flores* duos, ex purpureo rubentes, quos excipiunt *rostra* breuia.

De hoc ait Gesner. hort. Geranii tertia species ferè similis montanæ (i.e. Ischemo) maioribus & latioribus foliis, quibus Aconitum luteum representat, flore rubente. Item, Append. Geranii maioris species foliis magnis, figurā ferè & magnitudine Aconiti lutei, hirsutis, asperis.

An Clus. Pannon. pag. 422. & Hist. post. Geranium *caespitose* & alterum?

Nascitur in humidioribus pratis in quibus ferè Bistorta, In hortum Ill. E. C. Montb. ex monte Balon transfatum diu durat.

GERANIVM BATRACHOIDES LONGIUS
radicatum, odoratum.



Spectabili *storum* amœnitate nulli Geranio cedit, qui ex calyce globofo, striato, rubente hirsutoque, odorati emicant purpureo-violacei, è quinque foliis compositi, surrecto staminum purpurascensium altiore cinnino, in *caulibus* geniculatis, dodrantalibus, cubito altioribus interdum, & hirsutis: *folia* diuisurā quodam-

modò Saniculæ, ex virore incana, pilosa, odorem spirant non ingratum. *Radix* obliquè acta serpit, longa, minimi digiti crassitudine, fibris & geniculatis tuberibus donata, foris rubens, intus alba cum adstrictione valida, nescio quid aromatici gustui offerens.

Lobel. in Obs. p. 376. Ic. Plant. p. 661. vocat Geranium Batrachoides alterum longius radicatum. Camer. hort. Geranium macrorhizon, Galorum Banaticam, grauissimi odoris; Staticè quarundam, septem floribus roseis, ventrem sistentem à Plinio descriptam. H. Lugd. p. 1280. Geran. Batrach. alterum long. radicatum Lobelii. Casp. Bauh. phyt. Geran. 6. siue Batrachoides odoratū: Idem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 1. siue Batr. odoratum, Geran. montanum Gesn. coll. Geran. Batr. alterum Dod. Ger. macrorhizō. Eystett. Pedem columb. in siluis nascentem alterum Casalpinii.

Frater mihi retulit nomine Momordicæ ex horto Parauiño. Obseruauit ego Sturgardiæ in Tom. III.

phæum a nobis descriptum & Lobelii fuscum, ac hoc Clusii pullo flore, easdem plantas esse, aut saltem valde similes. Hoc tamen diuersitatem forsitan demonstrat, aut naturæ lusum, quod Clusius scribit florum folia laciniata esse, quod non demonstrat tamen icon. Neque nos florum foliorum laciniis vnquam obseruauimus. Si non in post. Hist. folia adhuc laciniata scripsisset, suspicaremur legendum esse folia reflexa, aut tale quid simile, & hac in parte errorem esse commissum.

Inuenitur in Stiria Alpibus, vbi sylvæ desinere solent: & floret Iunio: in hortis verò, in quibus felicissimè prouenit & luxuriat, Maio.

Locus & Tempus.

GERANIVM MAGNVM FOLIO trifido.

Descriptio.



Elegans Geranium, cuius aliquot ramos habemus cubitales, brachiatos, glabros, quibus folia per ramos ex dodrantali plus minus distantia, & non multo brevioribus pediculis, hærent tripartita, principio tamen quo pediculo hærent, vnciali latitudine integra, nonnihil hirsuta, per ambitum serrata, plurimis fibris se mutuo

contingentibus & intersecantibus intertexta. Summa flores occupant purpurascens.

A Doldio nobis missum est pro Geranio montano, neque descripto, neque depicto. An Pes columbinus in siluis nascens &c. Cæsalp.

Icon. Icon nostra desumpta est ex Clusii Geranio quinto nodoso I. Plateau, & ramo Geranii 6. ruberiferi eiusdem. Hæc enim duo Clusii Gerania vnum sunt, & à nostro non differunt.

C. Bauh. notauit.

C. Bauh. in Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 12. Geranium nodosum, quæritq; an sit Geran. cæruleum Tabern. & Batrachoides Gerardi, sed frustra, concluderat enim antè eorum Geranium esse Geran. Anemones folio rot. primum, siue Batrachoides folio Aconiti.

GERANIVM SANGVINEVM SIVE hæmatodes crassâ radice.

Descriptio.

Crassâ hæret radice, multis longis crassiusculis appendicibus auctâ, rubrâ, gustu admodum adstringente: caules emittit plures, cubitum altos, rubentes, hirsutos, geniculatos, in multas alas diuisos: ad singulas iuncturas bina nascuntur folia, circumscriptione rotunda, sed in quinque laciniis, trifidas plurimum, profundè ad pediculum ferè dissecta, hirsuta, supernè virentia, subtus canescentia, sicco & adstringente sapore prædita: flos pediculis singulatibus ex superio-

rum foliorum sinu pronatis vnicus infidet, Rosulæ æqualis, coloris purpurei, quinque magnis



foliis contans pulchrè explicatis, quæ toridem nervosis, hirsutis, viridantibus foliis subtus natis suffulciuntur, mediu verò occupant stamina: rosæ suboritur quinque thorulis seu granis firmata, quibus diffilientibus acus rostrorum reflectitur.

Trago hoc Geranium minime ignotum fuit, sed ab eo Geranium tertium

vocatum, & Sanguinarie radice titulo pictum. Fuch. Lonic. Lac. & Turnero dicitur Geran. sextum: Corn. & Dod. gall. quintum: Gesn. hort. Geranii altera species maior montana, & Ischæmon: Dod. gall. Camer. hort. Thal. H. Lugd. pag. 1279. & Clut. ran. p. 4. 1. [p. 49. quatum.] Geran. hæmatodes: Hist. post. Geran. 7. a. var. d. c. Lob. in Adv. pag. 256. Geranii Robertiani varietatem tertiam constituit.

Gerardo Geran. sanguinarium pseudiss. Crænes hist. Ceterum Geranii sanguinari titulo due habentur apud Tabern. icones & descriptiones: posterior autem figura in Ic. p. 774. in Hist. part. 2. p. 449. melius placet priore, quæ in Ic. est pag. 61. in H. part. 1. p. 191. quam C. Bauh. apud Matthiolum melius Geranio 7. siue Batrachoidi accommodauit. Hic vocauit in phyt. Geran. 7. siue sanguineum maximo flore: In Pin. Geran. Anemones fol. rot. 3. sanguin. max. flore sanguinar. Eyslett. Compiler potior Tabernamentani imperitiam suam, siupium summan detegit, eandem herbam bis tradendo, etiam quidem vulgò notam. Geranium tandem hæmatodes, siue sanguineum dicitur tum à radicis sanguineo intus & foris colore, tum à mirifica eius in sistendo sanguine facultate.

Tollanus Carolus anno 1590. mense Iulio mihi transmisit ex Champagnole Burgundiæ nomine Geranii alpinis, inibi in iugis altissimorum montium collectum. Monspelii floret Aprili: Geneue Maio: Basileæ iuxta Leurach Iulio & Augusto. Nascitur in omnibus Pannoniæ & Austriæ infra Onalum cædis montanis siluis, editioribusque gramineis locis. Mons præterea arcj Greben imminens vltra Drauum in Pannonia Interamni, totus ferè eo Geranii genere confusus, qua parte Occidentem spectat. Silux etiam Francofurti ad Mœnum vicinè eo abundant. Floret Maio & plerumque totâ subsequente Æstate.

Sclauonica mulieres huius decoctum ex profluente aqua, mixticè commendant in capitis grauedine, si scilicet vbi dolor est, eo ablatus, deinde herba decocta superimponatur: postremò, (quod superstitione non caret) in profluentem, vnde aqua hausta, abijciatur. Ad sanguinem vndique manantem compescendum in primis commendatur.

GERANIVM

GERANIVM MOSCHATVM FOLIO AD

Myrrhidem accedente maius & minus.

Geran. moschatum minus.



Spinosplum
stimum cau-
les proferet, eoq;
plures, & fati-
crassos, nodo-
sos, teretes, &
pilis hirtos, per
terram lupinos:
folia ē genicu-
lis vtrinque ex-
eunt, palmum
plūs minus lon-
ga, & pluri-
bus foliolis ad
costam rube-
scētem hirsu-
tāmq; adnēxis
composita, quo-
rum singularia
ad Chamædrios
folia accedunt,
diuisa pro-
fundiore sapore

infuavi & subaftringente: ex foliorum alis pediculi fingulares oriuntur quadrantales & trian- gulares, rennes, rigidi, villofi, rubentes, qui in pedicel- los minores quatuor, quinque aut fex fifsi, *floribus* in umbella geftant. Pedis columbini diēdi Geranij ex cæruleo purpurafcentes, quibus roftat- rum femen fuccedit: *radix* fimplex craffifcula, fibrata, alba, fapore. eodem cum foliis.

Huic affinis & illa species, inuentu rarior, tota maior, odore Moschi, foliis non ita altè incis, & nonnunquam tantùm serratis.

Eft Geranium quod aliqui Myrrhin, alij Mer-
thyrida apud Plinium appellant. Ruell. vocat
Acum pistoris Herbariorum, fufpicaturque effe
Geranium primum folio Anemones apud Dio-
scoridem & Plinium. An Cord. Hift. Geran. fu-
pinum majus?

Brunfel.tom.2.thap.ii.pingit sub titulo Her-
bæ Roberti, vocatæ Geran. Rostrum ciconiæ.
Robertianam, Gratiam Dei. Quomodo autem
describat, certò mihi non constât, nisi id faciat
quarto loco. De hoc Geranium pauca admodum
Brunsch.in.priore editione(vbi nulla figura)no-
mine Gratiæ Dei: in edit.aurem anni 1750. em-
pingit. Tragus Geranium primum [f.c.Dioscor.
facit.& pro minore pingit, fed pictura non mul-
tum valet, Apollinaris Geranium genera non
distinguit: pingit tamen. sed satis ineptè, Ger-
anium quod Rostrum ciconiæ dicitur & moscha-
tum.

Matth. non dubitandum existimat, quin Geranium Plinij, Myrrhis & Myrrhida dictum, illa sit herba quam quidam Rostum cum gruis, tum cicconie appellant, quidam verò cum officinis Aicum moschatam. Ruellium hallucinatum credit, quòd Aicum moschatam dictam, quam ipse Herbariis etiam Aicum pastoris appellari ait. primi generis Geranium Dioscoridis esse opinetur. Ex quibus patet eum in prior. comm. malè Geraniū primum insertuisse, ac propterea in post. melius Geranii tertii nomine pinxisse. Quin & Amatus, licet huius figuram Geranii primi titulo exhibeat, falsò Ruellium primum Geranii genus apud Dioscoridem putasse refert.

Geranium primum vocant Cornar. Dodon.
Tom. III.

gall, Turn. Lonic. Cast. Fuchf. & Lacuna. Anguill.
verò ep. 13. describit pro Herba muscata, Gruaria,
Herba Ruberti & Acu muscata.

Cronemb. supra empl. Gratia Dei, deprehenditur contraria scribere. Nunc enim Ruellium idē deprehendendum ait, quod Rostrum gruis primam Dioscoridis speciem putarit: Nunc verò Geranium Dioscoridis primum, Roberti cognominē assignet. Per Ruberti autem herbam hoc ciconiae Rostrum intelligit. & passim Acum molchatam vocari ait, quod ipsum haud placet.

Lob. indicatamir Diolc. vocatq; Myrrhidam
 Plinii in Adu. Obs. p. 376. Icon. Plant. p. 68 vbi &
 Geranium moschatum. Item pag. 69. Myrrhi-
 da Plinii, & Rostrum ciconiæ inodorum, vul-
 gatam. Cæsalp. Acum moschatam folio Pimpin-
 nellæ; & Peckinem Venetis Plinii. H. Lugd. p.
 127. Geranium tertium Plinii. Camer. hort. Ger-
 an. moschatum.

Tabern. Ic. p. 57. vocat Gerani, minus. Geran. ar-
uense. [Clem. p. 17. Gerani. [alterum flore al-
bo. Item, p. 8. Geran. myrrinum. Hist. Geran.
3. inodoro. Geran. Schenat. rous. Affir. Schna-
bet. Frani. Geran. 4. ruense album: Geran. quintu.
Geranii primi speciem Dioscoridis, Geran. cucu-
tarium, Rostrum gruinum, Gruinam, Gruarim,
Herbam gruinam hie guariam, & Acum pasto-
ris similem precedentes, maiorem, odoris grati.
Frusta Tabern. ponit duas icones Geranii mino-
ris quandoquidem solo colore differunt.

Geran. Geran. moscatū, Myrthidam Plinii: Item
Geran. moschatum inodorum, Plinii Myrthidam
inodoram, Insaurie musc. & Craeco bss. Et,
Geran. inodorum albū, sicut flower vinct nec-
ess. *Cmfr.* Ger. separavit album à priore cæruleo
purpurascens? cur quodq; prius & posterius
non reliquit vno & eodem capite?

C. Bauh. phyt. Geran. 14. *Cicutæ folio mof-*
chatum & primum Plinii. Item; Geran. 15. *flue* Ci-
cute folio inodorum. Geran. *lupini minus* Cordi;
Et; Geran. 16. *flue Cicutæ folio lupinum*. Idem in
Pin. Geran. *Cicutæ fol. 1. mofchatum & inodorū,*
Acum mofchatam Columæ. Et; *πεπνυμένο φυλόν*
Thal. & *mofchatum* Elytæ. Item, Geran. *Cicutæ*
folio 4. flue minus & lupinum. Geran. 7. *flue* grui-
num Bōd. *mofchatum inodorum* Elytæ. Flos
communiter *Brefilici coloris* : aliquando albus
eft: hinc duæ figuræ apud Tabern.

Geran. molchatum minus Mompellii observa-
ui: Basileæ floret Octobri in itinere Moutensi:
Geneuz passim *au plain palus* virens mensis Fe-
bruarii principio & Martio: Patavij *Gerans* me-
dio Febuario. Maius hortense est. Maius, in-
quit Tabern. solet provenire in agris cultis, are-
nosis Tabern. autem locis macris & arenosis, &
ruderibus.

Cronin
14X4145

Indica
Dose.

Gerard. not.

Locus &
Tempus.

Description.

Vire &
Virus.

GERANIVM SPECIOSVM ANNIVM,
longissimis rostris, Creticum.

Latè terram obumbrat *ramulorum* hirsutorū,
 nodosorū cogerit, *foliis* præditorum longis,
 hirsutis, nonnihil rubentibus, *stipulis* & serratis,
 sapore acido & adstringente: *flores* cærulei amari,
 quinquefolii, quos circumstant calycis dehiscens
 folia quina, è striatis filis mea membru-
 lula pellucida alba commixtis composita : *arbor*
 pluriquam palmari longitudine ad basin crassius-
 culæ.

An Lobel. Obs. p. 377. Geranium Creticum an
Ggg 2



acu. Nobis aliunde missum est titulo Herbæ Roberti Hispanensis.

Locus & Tempus

Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Iulio & Augusto, Septembri verò maturat semen: se ipsum seminat & Hiemem perfert. Mompeliano agro, Clusio teste, sponte provenit.

GERANIV M ROBERTIANVM murale.

Descriptio.



uisurâ, segmentis primariis duntaxat tribus, odore vbi teruntur Pastinacæ, sapore adstringente, per oras aliquantum rubentia, interdum tota: flores purpurei, dilutiore purpura striati, foliis quinis constantes è calyce hirsuto, atrorubente, quinquepartito emicant, apicibus in medio croceis: succedunt rostra mucronata semen appendum habentia.

Flor. can.
dido
Sicav. 3.
Ruell.

Geranium Robertianum candidissimo flore in monte Wasserfall non rarò occurrit.

Ruell. ni fallor, vocat Sideritidem tertiam: Dioscoridis. & vulgò ait vocari Acum pastoris, dicit esse Myrrhin Cicutæ foliis, & inde à nonnullis Cicutariam dici. Tragus pro altero Chelidonii genere describit, ac Gratia Dei titulo pingit: eorum autem opinionè planè improbat

num; Ic. Plant. Geran. Cret. annum hamato- des. Camer. hort. Geran. Creticum longissimis rostris à Lobelio descriptum. Clus. Gerar. & Tabern. Ic. Geraniū Creticum: Tabern. Hist. Geran. 8. Candiacum, Veteribus indictum. Cas. Bauh. phyt. Geran. 19. siue maximum latissimum longissima acu. Eidem in Pin. Geran. folio Cicutæ 7. siue latifol. longiss.

qui Pedem columbinum vocatam hanc plantam velint: Chelidonium minus esse statuens: Eius autem opinionem reprehendit Cronenburgius, cuius verba paulò post adscribemus.

Apud Marth. Figura in priorib. comm. sub Geranii alterius inscriptione designans Geranium, Robertianū, melior est, deterior in post. comm. tituli etiam diuersi: descriptio nulla bona: Camerarius pro ea ponit Geranii Robertiani nouam imaginem: C. Bauh. pro tertio pingit Geran. Robertianū ex Tabernamontano, ac præterea inep- tam addit Marth. picturam, quam præter nostrā sententiam, ac etiam, vt suspicamur, Marth. facit Geranium 4. Fuchsi, siue guinale. Porro, Matthiolus in prior. comm. Sideritidem postremam Diosc. eam planè refert plantam scripsit, quam vulgus Herbariorum Rubertā appellat. Sed præsentia verba silentio præterit in comm. cū magnitudinis. Quemadmodum tandem non descriptis Geraniū, ita solā picturā passim in comm. suis & Hist. germ. exhibet Sideritidem tertiam. Quam autem figura Marth. nonnihil representet Geraniū, & ipse olim dixerit Sideritidem Rupertam refert: existimo figuram esse partim ad descriptionem, partim ex Geranio effictam. Hinc fortè in comm. post. omisit verba, de Ruperta in prior. tradita, vt suum tueretur figmentū. Et hæc fortassis quoque occasio fuit, vt Camer. in Hist. Matt. germ. & Epit. eius iconem quoque neglexerit: C. Bauh. meam ante multos annos annotatam sententiam amplexus est. Sideritis quartæ figura inquit, videtur voluisse Geranium aliquod exprimere Matt. quoad folia maxime cum Geranium Rupertianū Sideritis nomine donetur: flores verò nō Geranio, sed Alchimilla conueniunt. Inscribitur hæc à Lugd. Sideritis quarta à Cast. & Tabern. tertia, à C. Bauh. quinta.

An Cronenburgius hoc Geranium à Moschatore itè distinguat, ex his eius verbis percipies. Tragus Chelidonium minus appellare voluit, herbam vulgò dictam Cetto gnad. h. e. Gratia Dei, improbens eos qui Geranium, qui Roberti herbam, qui Acum moschatam, qui Pedem columbinum esse contendunt: in quorum tamen catalogo habentur quotquot simplicis Medicinæ artem tradunt doctissimi. Notandus Ruellius quod Myrrhin Dioscoridis statuit herbam Roberti, sicut & Io. Tagault. de pot. vulnerariis.

Lonic suo more omnia confundens pingit Lon. pro Geranio tertio, ac secundo pro Chelidonio minore, pluribus plantis eadem nomina tribuens priori loco.

Si Valeriolæ de peste, Herba Roberti est eadem cum aliorum, non placet adiunctum Rostris ciconiæ nomen: id etiam perpendendum fuerit, an in carbunculis pestiferis vsus eius conueniat.

Scio Lobel. aliò refert Panacem Heracleum Sideritidem Anguillaræ, quem epist. s. eundem cū Sideritide Crateæ & tertia Dioscoridis facit. Verum melius placet Tabernamontani opinio.

Tabern. Ic. & Hist. vocat Geran. Rupertianum, & Geran. primum, ac ait Tragum non sine errore Chelidoniā minorem vocare: esse Dioscoridi Sideritidem Heracleam Crateæ: Anguillaræ existimare esse Panacem Heracleon Diosc. sed longè aberrare: Doctos vocare geranium Rupertianum, muschatum, & vulnerarium, item Gratiam Dei, Herbam rubeam, Rubeam muschatam, Robertianam, Rupertianā, Herbam Roberti aut Rupertii, aut diui Rupertii, & Rubertā: & has nomenclaturas ferè omnes à rubro caule & foliis rubris

ei impositas esse: appellat alijs etiam Acū muschata. It. Aco muschata & Rubera: Gall. *herbe Robert*: & *Bec de cigogne* sentant le muse: Angl. *hierb Roberts*, Belg. *Nobrechts fruyt* / *Roberts fruyt* / & *Dynaers beek die nader de Muscus reet*: Ger. man. *Ruprechts frucht* / *S. Ruprechts frucht* / *Sicht frucht* / *Wortes gnad* / *Nortlauff frucht* / *q erysipelatibus medetur*, *Hein Schölz urys*, & *Hein Schwalben frucht* / quod cum Chelidonio, aut aduentu hirundinum floreant, & hinc Turnetum Geranium Chelidonium, & Geran. hirundinatum nominasse. Item, Geran. violaceum, Ger. duodecimum, Geran. batrachoides minus, & gratiam Dei minore.

H. Lugd. pag. 1276. Geran. 2. Dioscoridis, 3. Matthioli, Pes columbinus: p. 1276. *Herbæ Roberti*, Geranii quarti genus Matthioli. *Cur eandem figuram ponit duobus locis*, sub duarum titulis, quorum prior non convenit.

Apud Hler. Brunsch. in edit. anni 1505. bene pingitur figura *Herbæ Ruperi*, & melius quidem quam in poster. anni 1550. ubi alterius generis icon exhibetur.

Dorst. habet iconem Geranii Robertiani sive muralis pag. 147. quod à cæteris minus diligenter distinguit.

Fuchs. Dodon. gall. Brunfels. Lac. Turn. & Thallio dicitur Geranium tertium: Lob. in Adu. (ubi & Sideritis Achilleadon, aut congener) Obfero. p. 375. Ic. Plant. p. 657. & Camer. hort. Geran. Robertianum: Robertiana velgè Cæsalpino.

C. Bauh. phyt. Geran. 17. sive Robertianum primum: Apud Matth. Geran. Robert. primum item, Geran. 4. Matthioli. *Cur autem Geranium Matthioli diuersum facit à Robertiano?* Eldem Pin. Geran. folio Cicute 5. sive Robert. 1. Duplex est: alia omnino vitidis, quam feminam faciunt: alia rubens, quæ præfertur, teste Camerario.

Soler provenire in veteribus muris, in cæsis arboribus, locis frigidis, humidis & umbratis: Aprilis flores & tota penè Æstate, teste Tabern.

Fuchs. vim adstringendi & siccandi tribuit. Tragus videtur ei Chelidonijs minoris vires adscribere. Rarè, inquit, intrò sumitur propter nimiam quam obinet frigiditatem: efficacissimè erysipelatis imponitur herbatifis: succus & aqua distillata quibusvis exulcerationibus oris, mammillarum & pudendorum, tam muliebrum, quam virilium medetur. Succus matifcas mundificat, sanaturque tumores deprimit, duritias mammillarum, aliorumque membrorum, si forte conquassata fuerint, discutit. Ioannis de monte experimentum parvi facimus, qui multos oculorum morbos, appensâ nudo collo radice, cetero anni tempore collectâ, Nicolai quædam Magistru curasse scribit. Geranium Robertianum, alijs Sanguinariam dictam, rubens præferunt pastores, aquæ incoquentes & potui dantes pecori, armentisve cruentam mingentibus.

GERANIUM LUCIDVM.

Geranium nostrum lucidum folia habet Mordicæ sive Geranii batrachoidis longius radicati formâ, sed minorâ quàm illa, Geranii columbini, in quatuor profundas lacinas fere semper tripartitis diuisa, ex virore obscuro pulchrè lucentia, nonnihil hirsuta, pediculis hęcencia, palmaribus aut vnciâ distaxat longioribus: caulibus multi sunt, lucidi, rubentes, in varios ramos diuisi, interdum ferè cubitales: flores Geranii

Tom. III.

Robertiani floribus similes & pares: rostra breuiata.

Cur C. Bauh. in phyt. Geranium suum 8. sive argenteum, Geran. laxatile Camer. hort. Geran. lax. *ὀρθόκωλον* Thal. à Geranio suo decimo, siue lucido nostro separauit. *Si diuersa sunt*, cur in



in Pinace vnum fecit Vocat Geran. Anemones folio rotundo 15. siue lucidum laxat. rotundifolium Colum.

Genevæ copiose abundat ad lacum extra portâ de Rive in muris Item inter Lugdunum & Genevâ à Chastillon florens Maio. Ex semine provenit Montbelgard in horto meo, postea perit.

Synonyma.

Locus & Tempus.

CHELIDONIUM MAIVS VETERVM.

C. A. P. CXVI.

Quam apud Theophrastum Gaza Hirundinariam interpretatus est, eam Dioscorides sic delineavit. Chelidonium magnum [*χελιδόνιον*] cattle, & producit cubitalem, aut etiâ maiorem, gracilem, qui propagines habet folijs plenas. Folia similia sunt Ranunculi, teneriora tamen, & colore subglauca. Iuxta singula verò folia flos est, velut Viola alba. Succus autem croceus, acris, mordax, aliquo modo subamarus, & graueolens. Radix supernè quidem vna est, infernè verò plures. Fructus est velut Papauis cornuti, tenuis, longus velut Pinæ nucis conus, in quo sunt semina Papauis maiora. Huius succus melli admixtus, & in æreo vase ad prunas coctus, ad acendum visum commodus est. Exprimatur autem succus è folijs, & radice, & fructu, sub initium Æstatis, siccatique & in pastillos efformatur. At radix pota cum Aniso ex vino albo, morbum regium curat. Herpetas item cum vino imposita. Et dentium dolores sedat commaducata. Videtur autem Chelidonium nomen reperisse, quod simul atque hirundines, quæ Chelidones vocantur, apparent, è terra prodeat, earumque discessu emarcescat, vel quod si quis pullus hirundinum excæcet, matres ipsorum herbam illis exhibere narrentur, & cæcitati ipsorum mederi.

Chelidonium inter spuria quidam Pæoniam [*παωνία*] vocant, alij Cisteam [*κυσταία*] quasitægis pollentem viribus, alij Aubion [*αὐβιον*] alij Glaucion [*γλαύκιον*] alij Pandionis radicem [*πανδίωνος ῥίζη*] alij Philomedion [*φιλομήδιον*] alij Orthonion [*ὀρθόνιον*] Romani Fabium [*φάβιον*] Galii Thona [*θωνά*] & Egyptij Verticilli [*κεφάλαι*]. Daci Crustanen, h. e. *κρυσταίνων*.

Chelidonium inquit Plin. lib. 8. cap. 18. visum saluberrimam hirundines monstrante, vexatis pullorum oculis illâ medentes. Et rursus lib. 25.

Ggg 3

Hirundinaria Theoph.

Hirundo avis

Appellat North. pini.

cap. 8. Animalia quoque inuenire herbas, in primisque Chelidonium. Hac enim hirundines oculis pullorum in nido restitunt visum, vt quidam volunt (hoc rider Cels. lib. 6. Aristoteles verò cap. 6. lib. 4. de ortu animalium causam reddit: nempe eos renasci si pungantur ac euellantur, cum adhuc fiunt, non autem vbi perfecti fuerint) etiam erutis oculis. Genera eius duo: Maior fruticosa caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudie duum cubitorum. Color albi-cans, flos latens. Minori folia Hederae rotundiora, minus candida. Succus Croci mordax, semen Papaueris. Florent aduentu hirundinum, discessu marcescunt. Florentibus succus exprimitur, & in æreo vase cum melle Attico leniter cinere feruēti decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellantur ab ea. Et hæc de duplici Chelidoniæ genere Plinius, quæ cum inuicem commisceat, atque confundat, alibi de iis agere non placuit, licet figurâ multum differant.

Plin. not.

Galen.

Galeno 8. simpl. med. Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est, sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, vti que in quibus crassum quiddam in pupillis colligitur digestionem atque discussionem indigens. Vti sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione jecoris proficicentem, in vino eam albo potui exhibentes. Similiter manfa confert dentium doloribus. Porro, Chelidonium minus, cum acrius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, vnguesque scabros exterit. Succus eius per nares purgat, vtpote admodum acer. Itaque hæc herba quarti ordiais fuerit (calfaciendum incipientis). Majus autem Chelidonium tertii est ordinis) absoluti iam, idque tum in calfaciendo, tum in succando. Aëtius, qui eundem visum Chelidonio magno adscribit, extensoriam & calidam vim abunde possidere ait.

Chelidonii nominis appellationem quod attinet, duplicem eius rationem cum Diosc. tradit Marcellus: reliquis verò dicit non satis certum habere intellectum. Fuchsius Chelidonio auem hirundinem nomen indidisse perhibet, vel quod primum hanc inuenerit, vel quod eius aduentu floreat, discessuue commarcescat, id quod de minore verè dici putat. Sed Chelidonium minus longè ante discessum hirundinum marcescit. Dictum verò scribit Dodonæus Chelidonium maius non quod aduentu *χελιδόνος*, i.e. hirundinum proueniat, aut abeuntibus illis pereat, cum toto anno reperitur, sed quia excæcatis pullis hac herba matres restituere visum in opinione sit. Hanc tamen opinionem ceu vanam & à veritate alienam, auctore Celso, tanquam fabulam, ad græcas ablegat calendas.

Fuchf. refutatur.

Æquiuoca.

Chelidonii nomine sequentes plantæ passim ab authoribus donantur: Chelid. maius. Chel. fol. laciniato. Cucurta, de qualib. 19. Fumaria Split. Fumaria bulbosa. Aquilegia. Clymenum.

Chelidonium verò minus, Scrophulariæ minoris, vnanimis ferè authorum consensus, competere ait. Chelidonium minus dicitur etiam de Geranio batrachoides, quàm bene autem facile iudicabunt lectores. Nec melius Chelidonii speciem minorem Geranium Robertianum esse contendunt. Geln. in a. sc. Diosc. Chelidonium micron Fumariam appellari refert. Scrophulariam flore pleno Camer. hort. cognominat Che-

lidonium minus flore pleno. Chelidonium minus palustre Gordi, est nobis Caltha aquatica. Lonic. in Diosc. lib. 2. cap. 167. Ranunculum & Chelidonium turpi errore confundit. Chelidonium dici de Anagallide ostendunt ex Dioscoride Tragus, Lonic. & Gesnerus. Idem Gesnerus in ascript. Diosc. refert dici Chelidonium de Vite alba, siue Bryonia de qua libro 15. Sunt Chelidonia Ficus *ισχάδες χελιδόνιος*, Atticæ scilicet quæ & Chelidones vocantur: Pollux. Commendantur eadem ab Athenæo lib. 14. De purpureis Chelidoniis Columella inter Ficus. Nouissima sub Hieme maturatur Chelidonia Ficus, inquit Plinius. Eas Grammatici quidam à Chelidoniis populis in Britannia dictas coniuncti, nescio quàm rectè.

CHELIDONIA.

CAP. CXVI.



Passim in parietinis & maceris occurrit Chelidonium maius, cuius radix minimo digito crassior, fibrosa rubra, rubrum croceumve succum, vt & folia cauleque fundit: aliquid caules producit, teretes, hirsutos, propter radicem & genicula tuberosos, vt in eaplanta quâ

Noli me tangere vocant, rufum mordacemque in ingratum illum succum fractos remittentes: folia cum Aquilegiæ foliis similitudinem aliquâ habent, vtcunque tamen maiora, longiora (Lobel. ait tota facie ad Plinianum Capnum, vel Aquilegiam, comparatam, foliis cæsiis) numeroque plura, ad costam ex interuallis adnexa, vt plurimum sena, septimo alam claudente: singularia folia Quercinorum æmulam diuisuram habent, Trago tenera, colore herbaceo, altera verò parte ex cæsis viridi. Flores crocei quatuor foliis constant, multisque staminibus coloribus: siliqua oblongæ ceu corniculati Papaueris semen pallidum recludunt: folia, caules, & flores croceum stillant lac, in primis radix, quæ & ipsa aureo planè prædita est colore, succo simili, lento, gustu amaro, grauissimique odoris: Lobel. succo croceo fuluio, viciore quàm Papaueris cornuti.

Χελιδόνιος μέγας Græci: Latini, vt Ruell. Synonymum cum nibus guarum. Trago, Fuchf. Cordo in Dioscorid. & Histor. Matth. Lac. Cast. Dod. Lob. Ad. Obf. & Ic. Plant. Geln. hort. Cæsalp. Thal. Tabern. & Gerardo, Chelidonium maius: Brunfels, Chelidonia. Anguill. Chelidonia maior: Turn. hirudinaria: Lob. Ad. hirudinaria maior: C. Bauh. phyt. Chelid. siue mai, vulg. in Pin. & Clus. in hist. Apuleio

Apuleio Hirundinina, aliis etiam Herba lucis, Herba imperiginaria, Herba hirundinis: offic. Celidonium, & Celidonia, etiam vulgo in Hetruria. At ab imperitis, præsertim Chymistis, qui multorum stultitiâ Poëtas facile imitantur, quod græci nominis vim ignorent, quod latine nil aliud quam Hirundinariam significat, *Cals donum* corruptè nominatur. Serap. de simpl. cap. 296. *Kawroch, Circuma, & Chelimentoma*: Bellunenſi *Chalidunum & Memran*: Glossographo Anicênæ *Aiguiduene, Hawroch, Hawro, Chuidomon, & Memireſis*: Apud Auic. cap. 199. *Cauchum, Aluadachale, Aluadachule, & Alxardahune*. Germ. *Schellwurz* / *Schellraut* / *Schwalbenraut* / *Voldi waz* & *Gubiraun*. Bel. *Schellwurms* / *Schellwurtel* / *groote Houwe*, / *inſende Oion ve*. Gall. *Eſclere ou Eſclaire* (quoddam caligantibus oculis aciem videndi reſtituat.) *Chelidone, & Felogone*: Ital. *Chelidonia maggiore, Herba donna, & Cedroigna*: Hiſp. *Chelidonia*, *Terna de las golondrinas* aut *golondrynas*, *Celiduenas*, & *Celiduenha*: Angl. *Celandine*: Boh. *Cetdonny & Celondoniweſſy*: Hung. *Cynadoma* & *ſeſſeſſe*.

Lobel indagandum proponit, num sit Virga tinctorum Auicennæ: Est Alberto Magno Herba quarta, à Chaldeis Aquilaris dicta quoddam tempore quo Aquilæ suos nidos faciunt, nascatur, à Græcis Valis, à Lat. Chelidonia.

Locus gignitur incultus, in vepribus, propter sepes, inter cætera herbarum vitia, inter iudera, in scrobium ripis, in verustis citius, quam in apricis. Toto anno viret; ab Aprili mense in multam ætatem floret, siquæ interea perficiuntur, seminæque maturantur.

Vires quas tribuant Chelidonio suo Diosc. Plin. Galen. & Aëtius, itémque fabulæ per Celsum reiectæ, videre licet antè. Radix Chelidonijs maioris, quantum eius manus capere possit, purgata, in sextario [quem Germani in herbis massæ exponunt] rosacei acetæ decocta, ita ut deinceps percoletur, decoctioque adiciatur theatriacæ Vicia cum dimidia, cyathique vulgaris mensura exhibita, à peste correptos (attestante id certâ experientiâ, inquit Trag.) liberabit, si postquam biberunt in lectum se composuerint, & sudauerint. Aqua eius distillata oculis indita: claritatem iis adfert, maculas eorum rubras emendat, sicut & faciei si inde colluantur: eodem modo anthracæ pestilentes sanant: serofi humoris ad articulos vulneratos decurrentis fluxum sistit, quem Germani *gât* vocant. Aqua distillata per aliquot dies pota, obstructos meatus hepatis aperit morboque regio medetur. Herba cum radice tusa ac vmbilico [cum oleo chamæmelino feruifacta] imposita torminibus & vteri doloribus opitulatur. Eius puluis vlcera & vulnera purgat, sanâque inspersus. Chelidonium tritum cum axungia verrucas absumere refert Rondeletius. Lobel. rariùs intrò fumendam censet, sed commodiùs foris vtendam ad imperiginas & psoras puerorum, necnon metallorum chymicas medicationes. Succus Chelidoniæ [inquit Paracels.] colore suo imponit oculis, ac si daturum esset auro: verum Chymista, qui animam vel quintam essentiam, vnde coagulantem ac pennutantem tincturam efficerent, venati sunt, nihil præter factum errorem assecuti sunt. Chymista [addit Matth.] Cæli donum appellant, quâ nominis præstantiâ freti, ex hac herba quandam quintam essentiam fieri prædicant, non modò suis vanis alchymicis imaginationibus ac-

T. III.

commodatissimam, sed ad tuendam etiam salutem hominum, morboque quam plurimum profligandos vtilem. Herba in calcis dicta si nudis pedibus teratur, ictericos sanare creditur: eadem mensum abundantiam sistit, mammas mulierum admota. Succus cauis dentibus inditus eos frangit & eiicit. Hanc herbam, si Alberto credimus, si quis cum corde talpæ habuerit deuincet omnes hostes, omnes causas, & omnes lites amouebit. Et si prædicta ponantur super caput infirmi, si debet mori statim cantabit altâ voce, si nò, lachrymabit. Sed mittamus aniles fabulas, vndèque digressi sumus, redeamus. Succus ad oculorum maculas, argemas, nubeculas, & cicatrices plurimùm commendatur. Verùm cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi iis additis, quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi dicitur esse lac muliebre.

CHELIDONIVM FOLIO LACINIATO.



Quius illud Chelidonium maius nouit, facile oblatam hanc eius varietatē discet: cætera similia, folia minora, cocciniùs crebriùsque incisa: *florum* itidè folia aliquib⁹ incisus secta, & veluti simbricata, accedentia ad flores plantæ, quæ quibusdam dicitur Cuminū filiquosum & Hipocoum

Description.

Clusj.

Dicitur Spreng. horr. Chelidonia maior folijs *Synon.* & floribus incis: Clus. Hist. post. Chelidonium maius laciniato flore, siue maius multifido folio. C. Bauh. apud Matth. Chelid. maius alterum: Eadem in phyt. & Pin. Chelidonium 2. siue maius folijs quernis.

Vidi primò Heidelbergæ in horro Sprengeri Locus spontè natam. Ex seminibus ab illo oblatis à pluribus annis Montbelgardii coluimus in horto. Ill. E. C. vbi ex deciduo semine quotannis repullulat.

AQUILEGIA IN GENERE.

C. A. P. CXVII.

Aquilegiâ subijcimus, cum quibusdâ Chelidonia siluestris dicatur, & folijs aliquomodo conueniat, nisi quòd sint paulò rotundiora & molliora. Videtur autem dicta quasi Aquilina, ob florum mucrones aduncos, ut sunt aquilini vngues. Veteribusne fuerit nota, ambigitur. Costæus quidem & Aldroandus Pothon [Desiderium Gazæ] veterum, Theophrastus, esse contendunt: Cæsalpius verò eundem Theophrastionem credit: Dalechampio contrà apud A-

Description.

Iovis flos.

Leo herba

Angelica.
Amor per-
filius.Locus &
Tempus.

thenæum Theophrasti *ῥιζὴ ἀγροῦ* est, Iovis flos: Gesnero tamen Leontostomon Theoph. dicitur, & Leo Columellæ; Leo herba Dodonæo. Alii *Ægilopa* Græcorum credunt, omnesque facultates eidem tribuunt, sed non parum aberrant. Tragus Centaureum Germanicum siue maius esse autumat, eiusque illi vires, sed temerè & citra omnè rationem tribuit. Sunt etiam, referente Matthiolo (qui flori inter alios colores aureum adscribit, qualem nos nunquam observavimus) qui Chelidonium maius nuncupent. Gesner. in cat. pl. Cantabricam opinatur; Ruell. cæruleas Violas, aut quæ sint se nescire fatetur. Sed eis minus convenire deprehenditur. Dodon. in gall. hist. antiquis incognitam ait. Fabius Columna eam Aquileiam quæ simplici flore est, *ἰστροπύρον* Dioscoridis esse ceter, cuius iudicium Clusio valde probatur. Lobelius tamen Columnæ opinionem Aquilegiæ pro *Isoptero* Dioscoridis ponentis in suis plantarum illustrationibus rejicit atque damnat.

Gesnerus de Aquila annotat, aliquos herbam hanc, quam plerique Aquilegiæ, aut cum Matthiolo Aquilinam nominant, Angelicam, & Amorem perfectum vocare: Germ. *Wibbelsteyn* / *Wibbelsteyn*, & *Wibbelsteyn*; Galli *Ancholie*: Itali *Aquileia*, & *Celidonia saluatica*: Angli *Columbina*.

Aquilegia flore simplici in montium pratis luxuriat, ea scilicet quæ cæruleo est flore: fertur etiam in hortis: caulescit mense Iunio. In hortis quidem diversorum colorum conspicitur: itemque multiplex.

AQVILEGIA FLORE SIMPLICI.

Figura tres Fuchf.

Descriptio.



corniculis rostratis compositos, ut passis alis columbam (si cum lateribus alternatim interjectis foliis vnum ex corniculis exemeris) egregio naturæ artificio deformant: atque hi quidem vel silvestres, vix alterius coloris, quam puniceæ, vel hortenses, colore cæruleo, rubro, candido, carneo, herbaceo, varicolori, infinitam pariunt varietatem: omnibus tamen semen *Consolidæ* regalis, nigrum, lubricum, in corniculis surrectis Aconitorum continetur.



lina rubra Lob. Icon. p. 761. Aquilina Cast. alba Tabern. Ic. & Hist. quoad iconem, quoad ordinem 1. 2. 3. & 7. siue niuea, purpurea & rubra.

Aquilegia montana magno flore C. Bauh.

Aquilegia montana magno flore, 3. in Pin. in Aquilegiæ vulgaris altitudine excrevit quidem, sed foliis primùm differt, cum in lacinias tenuiores, easque non obtusas, ut in aliis, sed acutius diuidantur, & folia penè subrotunda sint: sic & floribus est cæruleis, vulgari similibus, sed multo maioribus. In monte prope Thermas Fabrias copiosè provenit.

Aquilegia montana parvo flore, Thalictri folio.

Ex radice parua, folia Thalictri formæ, sed exigua, pallide virentia, prodeunt: inter quæ cauliculus tenuis, palmo minor, duobus, tribusve foliolis brevibus, oblongis, minimè diuisis, exsurgit, florem vni cum cæruleum sustinens, formæ quidem vulgari similem, sed quicquid minorem.

In Helvetiorum Alpibus reperitur: in Moravia prope urbem Trebis, sub arce Smilo, in pratis vernali tempore copiosissimè reperi relatum est C.

Aquilegia silvestris dicitur, Aquilegia simpliciter Trago, Fuchf. H. Lugd. p. 820. Lonic. Cæsalpin. & Gerardo: Aquileia Fuchf. Gesner. hort. & Dod. sylvestris Thalictrio: Aquileia simplex Cammer. Aquilina Matth. Lobel. Adv. Obs. p. 440. Ic. Plât. 761. Cast. & Tabern. Aquilegia 1. siue simpliciter Trago, Fuchf. H. Lugdun. pag. 820. Lonic. Cæsalp. & Gerardo: Aquileia Fuchfio, Gesner. hort. & Dod. sylvestris Thalictrio: Aquileia simplex Cammer. Aquilina Matth. Lobel. Adv. Obs. p. 440. Ic. Plât. 761. Cast. & Tabern. Aquilegia 1. siue simplex silvestris. Aquilegia hortensis, simplex secunda C. Bauh. Aquilina rubra Lob. Icon. p. 761. Aquilina Cast. alba Tabern. Ic. & Hist. quoad iconem, quoad ordinem 1. 2. 3. & 7. siue niuea, purpurea & rubra.

est C. Bauhino, qui in Prod. secundam facit, & in Pin. quattam.

AQVILEGIA FLORE PLENO, sive multiplici.

O B floris elegantia in hortis culta hæc stirps modò pluribus, densioribus, & nitidioribus corniculis observatur: floribus etiam vberiore sæturâ multiplicibus, qui vel carulei prædunt sunt, vel violacei, vel cinerei, vel blandè rubentes, vel saturè rubri, vel albi, vel ex albo & caruleo, violaceo & multifariâ commixti, vel alterius coloris, quis enim omnes enumeret? cætera similia.

Aquilegia multiplex Hort. Lus. flore pleno cæruleo, albo, incarnato, purpureo, rubro, sive 1. 2. 3. 4. & 5. Eyll. multiflora variegata Lob. Ic. p. 762. (ibidem & Aquilegia multiplex vario colore flore.) Aquileia multiplex Gerard. multiplici flore Dod. Aquilina multiplex Tabern. Ic. & Hist. quoad iconem; quoad ordinem 4. 5. 6. & 8. sive cærulea, alba, purpurea & variegata. Aquilina pleno flore Clusij hist.

C. Bauh. phyt. Aquilegia 3. sive hortensis multiplex: Pin. Aquilegia pleno flore 1. sive hortensis multiplex flore magno, Aquilegia flore rubro 5. Eyll. fl. variegato duplici Syver. Aquileia 6. sive variegata Bry. Aquilina 1. rubro Bry. Syver. Item, Aquilegia pleno flore 2. sive hort. multiplex fl. parvo.

AQVILEGIA FLORE PLENO INVERSO.

N On rarum sæturâ vberiore hi multiplices flores & colore diversitatem pariù multifariam, sed & figurâ discrepare iidem quotidie deprehenduntur, & diversas interdum sortiri facies, sive naturæ lusu, sive artificio quodam, ut inuerti flores propemodum videantur.

Clus. hist. Aquilina pleno inuerso flore. Lobel. Ic. p. 763. (ibidem & Aquilina inuersa multiplex albo colore) Aquilina plenis multiplicibus floribus: Obf. p. 440. Aquilina plenis & multiplicibus aspectu suauissimis floribus inuerti cum hortensis multiplici eadem: Tabern. Hist. Aquilina 9. proflus alba flore magno & lato fursum reflexo: H. Lugd. pag. 821. Aquilina plenis & multiplicibus floribus Lobel: Aquilina carulei coloris Bry. Aquilegia inuersa Camer. C. Bauh. phyt. Aquilegia 4. sive hortensis multiplex inuerti floribus. Pin. Aquileg. pl. flore 3. sive hort. multiplex flor. inuerti, Aquileg. cærulea inuerti flore, Eyll.

AQVILEGIA FLORE SIMPLICI ET pleno, non corniculato.

A Quilegiam floribus non corniculatis, sed nigellæ citrinæ instar foliosis, vocamus, quâ Clusius pro Aquilina roseo flore pleno pingit, & describit.

C. Bauh. pin. Aquilegia pleno flore 3. sive flore roseo multiplex, colore communiter cæruleo, natus albo, rarissimè carneo, sive blandè rubente: vel albo nigris punctis asperso: hinc Aquilegia stellata flore purpureo, rubescente, violaceo, & albo minutissimis nigris punctis ornato, sive 1. 2. 3. & 4. Eyll. Aquilegia stellata cæruleo-violacea Syverij.

Tom. III.

AQVILEGIA DEGENER.

CAP. CXVIII.

I Ta nonnunquam degenerat Aquilegia, ut scilicet pusillæ flores proferat strigoliosos, & tum quidem aut colore languidiore, & quasi dilutione apparent, aut proflus vireorem induunt, Camer.

Descriptio:



Aquilinam Aquilina de-
degenerem eo-
gener.

spicere meminit Clusius e-
xigua Roseæ formam amulan-
tantes flores ferentem, co-
loris vel omni-
nò viridis, vel
ex viridi pur-
purascentis,
mutatâ videli-
cet pristinâ
formâ, sive po-
tius vitio con-
tracto, ex stir-
pium intem-
pestiua ex vno
loco in alium
translatione.

Lobel Icon. Synon:

pag. 674. & Hort. Lusar. Aquilegia degener. C. Bauh. phyt. Aquileg. 5. in Pin. fl. pleno sive degener virecens: Aquilina 10. herbacea rubro variegata Tabern. Hist. Aquilina degener Bry: Aquilegia stellata rosea Syver.

Aquilegiæ semen solum ac pondere drachmæ Vires &
cum croco nummi pondere è vino bibitum, præ-
stantissimum est medicamentum aduersus mor-
bum regionis expeditur, certâ id attestante Trag.]
si postquam sumptis, in lectum te composueris,
probe contentum, ac sudorem eliceris: eodem
modo vitæ parum meatu iecinoris obstructos,
vnde multæ ægriitudines oriuntur, aperit. Aqua
florum Aquilegiæ distillata, pota eadem efficit,
præstatque lenamentum aduersus syncopen. Ab-
scessus proinde internos discutit, venenum quod-
uis expellit, ac tormina mitigat.

Ceterum, quæ de Aquilinæ facultatibus Clu-
sius accipiebat à Rapardo, libet hic subscribere:
nimirum Aquilinæ vulgaris semen tenuissimè
contusum, & ex vino propinatum, mulieribus in
pariù difficultate cum optimo successu exhibe-
ri: si prior tamen haustus minis fuerit efficax, a-
lium similem propinandum esse.

THALICTRVM VETERIBVS.

CAP. CXIX.

E Scit in hac herba vnus literæ ambiguae simi-
lilitudo, ut authorum exemplaria parum Tha-
lictrum, Thalictyon, partim Thalictyon Thalict-
rum legent, pro ut pro x apud Græcos, apud La-
tinos verò postea & pro c litera fuit agnita.

Thalicttrum.

Thalicttrum.

Sunt autem Plinio & Dioscoridi, paucis excep-
tis, de Thalictro eadem omnia. Thalicttrum, Diof.
ait hic libro quarto, folia Coriandri habet, at
pinguora, cauliculum Roræ crassitudine, in
quo folia, quæ trita imposita, vlcera diuturna

H h h

ad cicatricem perducunt, nascitur præcipue in campestribus. Ille lib. 27. cap. vii. Thaliætrum folia Coriandri habet, pinguiora paulò, caulē Papaueris. (Sed Coriandri legit quoque Galenus sequutus Dioscoridem. Et fieri potest, ut Plinius græcâ lectione deceptus *παννύκος* pro *ανυακος* legerit) nascitur ubique in campestribus: medentur viceribus folia cum melle. *Ægineta* cum Galeno siccandi vim sine erosione habere ait.

Annotat Goupylus in veteribus Dioscoridis exemplaribus hoc loco caput esse de Typha. Sed de Typha priori libro tertio egit.

Æquiuoca.

Thaliætri nomen sequentes adepræ sunt plantæ. Thaliætrum nigrum caule & semine striato. Thaliætrum folio saturatius virente, cauliculo nõ striato. Thaliætrum speciosissimum glaucum, semine & caule striato. Thaliætrum montanum album Clusij. Thaliætrum maius folliculis angustissimum C. Bauhini Clusij. Thaliætrum præten- se angustissimum folio C. Bauhini. Thaliætrum minus, siue Rutæ præten- sis genus minus, semine striato. Thaliætrum minimum feridissimum. Aquilegia ab Heroldo, sed malè. Pimp. saxifi- minor Rondel. iiij. à Lobelio & H. Lingd. Seriphium germ. Chamæmel. sc. id. à Gesnero. Potentilla à Ruellio, sed falsò. Consol. regalis Trag., sed etiam falsò. Phelandr. Plinij à nonnullis, sed magno errore.

THALIÆTRVM NIGRIVS CAULE ET semine striato.

Descripti.



Pluribus foliis, licet saturatius cinctis, splendentibus tamen, longis, angulosis donatur: caules rigidi, striati, inæ- ues, virescunt, & ad viri- tudinem & maiorem aliquan- do exercecent: *flosculi* per- quam exigui, mufcoli, herbi- di, obtusum fe- rè in orbem gomeratis fla- minulis herbi- dis, aut ex her- baceo flares.

centibus constant: *radix* fibrosa buxi coloris, ingrati amaricantis saporis.

Cordus in Diosc. verum Thaliætrum facit, ac germ. *hepftlat*, hoc est, folium sanum appellat, quod à rustici Saxones hæc maxima cureg vulne- ra, sine aliquo adiutore medico: ait tamen ali- quos *ividerthen* vocare, sed hoc vocabulum latè patere. In Hist. verò Thaliætri nigri nomine de- scribit.

Gesn. hort. Saxifragam luteam appellat à co- lore florum vel radice luteo, ac Rutæ præten- si cognatam ait: alibi Barbam caprinam minorem vocat.

Dod. gall. ad Barbam capri refert, ac pro secun-

la siue minore specie describit, & pro Pigano pingit. Ignaros pharmacopœos pro sylvestri Ru- ta, non sine magno errore ut scribit, & mulier- culas Belgicas Rhabarbarum spurium vocare? Doctorem quorundam opinionem, Thaliætrum existimantium, veritati haud consentaneam vi- deri. Icon quidem à Dodonæo proposita respon- det huic nostro Thaliætro nigriori. Sed parui fol- liculi, quorum in descriptione meminit, siliqua- rum instar, conueniunt Thaliætro, nobis à folli- culis defeminato. Quas verò radices nigras tri- buit, Tragus Barbæ caprinæ vulgari adscriptis, qualem ipse pro prima specie pingit: nobis igitur videtur Dodonæus diuersas plantas confun- dere.

Lobel. in Adv. author est industrius quosdam Thaliætrum Dioscoridis opinari, Saxifragiam præ- tensam, quam Rutam feridam siue luteam, & post Rutam præten- sem Herbariorum, commo- diore vocabulo appellat, ac etiam in Icon. Plant. tom. 2. pag. 56. & Obs. pag. 108. eodem titulo do- nat.

Icon Tabernæmontani Rutæ præten- sis maiori- convenit cum nostro Thaliætro ni- griore. Verùm in descriptione non conueniunt quæ scribit de triangularibus folliculis. Rutam præten- sem maiorem primam, contra doctos ne- gat esse Thaliætrum Dioscoridis, concludens esse Phelandrium Plinij, agnominans Rutam vul- nerariam, & Rhabarbarum adulterinum, germ. *ividerthen*, & *hepftlat* *ividerthen*.

Schwenckfeldius plura Thaliætra inuicem confundit: videtur autem eius Thaliætrum præ- tensæ, Thaliætrum maius folliculis angu- losis: Eius verò luteum, nostrum nigrum: ad quod etiam referendum censemus Alpinum.

Clusij in Pann. p. 180. & Hist. post. vocat Thaliæ- trum γ , siue præten- se elatius, longioribus & magis atris foliis, & quodammodo splendentibus. C. Bauh. Pin. Thaliætrum i. siue maius si- liqua angulosâ aut striatâ, Thaliætrum nigrum Thaliæ, secundum siue lausol. germanicum Ca- merarij, Ru am siue luteum Cæsalpini: Et autem adscribit florum mufcola flamina è pallido can- didantia, ratiùs purpurascencia. Quæ occasio ut huc etiam referat Thaliætrum flore incarnato, & albo, Eyttet.

Abundat in collum pratis itinere Monbel- gardensi quâ itur *lyse* & Vesontium, in multis etiam Germaniæ locis, ut inter Electorales vrbes *Opperheym* & *Weyen*, in campis.

Dodonæo Thaliætra maiora temperatè calida v- ac vna resiccantia apparent: Folia eorum cler- bus admixta, alium nonnihil commouent: Ra- dicis decoctum idem potius præstat. In Hist. gall. plures vires tribuebat quas in l. omisit. Lutetiani nonnulli ad calculum laudabant Lo- belio. Thaliætris quibusdam in locis in Italia, te- ste Cameratio, vtuntur contra pestem: in Saxonia contra icteritiam. Non autem placet Dodonæum & alios, cum Tabernæaldem vires omnibus Thaliætronum generibus adscribere, quum ipsis non fuerint bene nota.

THALIÆTRVM SPECIOSISSIMVM glaucum, semine & caule striato.

Hominis interdum proceri staturam adæ- quat, vel etiam superat, *radice* flaua, multas fibras



fibras à latere obliquas citum maque spargente, sapore amaro: caulibus autem rectis, singularis, nullis alis, ramisve brachiatus, purpureascens, inanis, crassitudinis digitali, perquam longis internodiis interceptus: *Folia* ex articulis nascentur, quos vaginæ amplectuntur, Thalictri maioris vigeris latiora,

si singularia spectes, colore utrinque subcaeruleo, vel glauco, sapore amaro, & acris odore graui: summum caulis fastigium in furculos, aliquot abis, quibus flores insident muscoli, ex meris fibrillis luteis compositi: *semen* regitur tunica tenui, non anguloso folliculo.

Dodon. in purg. append. & Hist. fol. lat. Thalictrum maius tertium facit, Camer. hort. Thalictrum 1. Italicum vulgò. Casp. Bauh. Pin. Thalictrum 3. siue minus flauum, staminibus luteis, vel glaucifolio, Thalictrum maius Ger. Thalictrū in Hetruria vulgò *Verdemacum* Casalp. Clusius Pann. pag. 380. & Hist. post. Thalictrum 1. siue Hispanicum. Lobel. Obs. p. 109. Ruta pratensis siue Thalictrum longè maius & muldò speciosissimū. Tabern. Ruta pratensis maior quarta, Phelandrium Hispanicum, (Hres. wipfen Jauch) Sparsich heylbat: An Pes milui Anguillae?

Ex Hispaniis in Belgium venit, & deinde operā Clusij Pannonicis Austriacisque prouinciis vulgare factum est. Nobis ex S. Lupo Burgundie missa planta fuit nomine Ruta caprariz. Excreuit in hor. o III. E. C. ad altitudinem hominis flores Junio & Iulio.

THALICTRVM MAIUS FOLLICVLIS angulosis caule laui.



Quod D. Gesnerus Thalictrū maius appellare solitus est, in cubitalem, vel sesquicubitalem altitudinem excreuit, ramosis, rigidis, politis, lauibusque & concauis caulibus donatū: *folia* Aquilegiae, lauia eiusdem penè coloris, & fermè inodora, amaricantia cū acrimonia: *flores* ceu mulcaria, cōferta, ex-

radiatis staminibus in orbem actis, dilutam Violæ nigrae purpuram referentibus, apicibus tamen obsoleto colore luteo præditis, compacti. *Radiæ* fibrosæ, multiplices, tenues, externæ nigricantes, internæ albæ, sapore non ingratae, quatuor veluti costis constant: *semen* in folliculis angulosis tenue, longum, fuscum.

Lobel. Adu. Ruta triangulo pericarpio: Tabern. Synon. Hist. sine icone, Ruta pratensis maior tertia. Dodon. Thalictrum magnum quartum: Clus. Pann. pag. 380. Thalictrum 4. siue montanum 3. à priorē [montano albo 1. & 2.] solo floris colore differens. Thalictrum 5. flore purpureo Camer. hort.

In monte Saleuz Geneuz obseruauit flores **Locus & Tempus** Junio & Iulio semine maturo; in Sabaudia florens Autumno: Montbelgard ad Dubim itinere versus *L'Isle* inter dumeta Junio. Ex semine in horto prouenit.

Thalictrum pratense angustifolium.

Clusio est in Pann. p. 380. & Hist. post. Thalictrum sextum, siue pratense secundum, humiliss, **Synon:** flore candicante: Thalictr. 3. angustifolium Camer. Thalictr. 4. siue pratense angustifolium C. Bauh. Pin. Ruta pratensis maior 5. Tabern. in Hist. sine icone.

THALICTRVM MINVS, SIVE RVTÆ pratensis genus minus, semine striato.



Thalictro maiori cum **Descripti:** folliculis similis, non ea tamen ut plurimum huic proceritas: *caules* tenuiores, non minus tamen rigidi: *folia* confimilia, crassiuscula, sed minora, siue sit spontanea siue culta, situ & dispositione eadem: *radix* tenuis, fibrosa, lutea, repens: *flores* ex radiatis staminibus componuntur, capitulis minoribus, colore ex fusco ad luteum

vergente: *semen* idem responderet.

Dodon. gall. Barba caprar tertia species, forte **Synon:** Hypocum Dioscoridis, quod etiam *Ungueon*: Eadem in Purg. app. & Hist. Thalictrum paruum, Thalictri quintum genus minimum, Thalictrum minus, ut etiam Gerardo: Thalictrum 4. parvū Camer. hort. Thalictrum tenuifol. Cordo hist. Thalictrum Cordi tenuifolium Lobel. in Ada. & Ic. Plant. p. 16. tom. 2. & Obs. p. 108. Clusio Thalictrum 7. siue omnium minimum, foliis minoribus, cineracei coloris, pallido floris colore: *radice* omnium maximè flaua & serpente, subindeque noua germina producente: Thalictr. 8. siue minus C. Bauh. Pin.

Hypocotum H. Lugd. pag. 1082. *Cæsalp.* Ruta pratenfis alia minor, *Cicuta Athenienfium* quorundam. Ruta pratenf. minor *Tabernæmont.* In campeftribus maritimis locis apud Belgas reperitur, alibi etiam in montofis, vti in Baldo Italiae monte provenire fertur.

Locus.

Thalictrum minimum fetidiffimum C. Bauhini.

Descript.

Caulis est pedalis, rotundo, in ramulos diffusos foliis pluribus in tres lacinias divisis, anterioribus duabus incisuris denticulatis, superne atro-nitentibus, inferne paleiscentibus: in ramulorum fastigiis flosculi parvi, muscoli, ex plurimis staminibus cōpositi, quibus succedunt exiguae valvulae, oblongae, senae, septenae, striatae, apice incurvato donatae, tibique iuvicem iunctae, capillaceo oblongo pediculo insidentes, semen exiguum includentes. Tota planta odorem foetidissimum spirat: in Valsia reperitur.

BARBA CAPRI.

CAP. CXX.

Descript.



Radicem sortita est mœdo ter crassa, fibrosam, cortice medullam crassiusculo, ad rufum fedinem declinante, cui subest lignosa substantia cum copiosa medulla alba, fatua: caules, duos, tres cubitos alti, & maiores, multis alis concavi, laeves, teretes, medullosi, ac tubo (qui in alio nullus est) perforati: folia Castaneae oblonga, acuminata,

ferrata, plura ad costam alligata, nullis intercedentibus minoribus foliis ut in Vlmaria, à qua & flores huius plurimum differunt, in ligulis videlicet racematim collocati, perpusilli, candidi.

Acetarium eius.

Hermolaum in Dioscor. hanc per Acetarium o-lus, quam quidam *Tragopogon* falsò esse volunt, & vulgò *Barbam petrae*, & in Gallia *Cispadana* *Barbulam* hircinam vocant, intelligere puto.

Tragus Barbulam caprae inscribit, proque *Barba caprina* 2. siue *yluestri* delineat, ac cum *Vlmaria* ad *Pycnocomon* *Dioscoridis* refert. Sed hanc opinionem improbat *Fuchs.* *Patauij* alibi que in Italia *Christophoriana* (*Crossosauaria* *Anguill.* epistol. 14.) æquius vocari ait: *Gefnerus*, qui quondam *Asparagum sylvestrem* vocabat.

C. Bauh. Pin. *Barba caprae* 1. siue floribus oblongis. *Melandryon* *Plinij*, *Barba capri* *Fuch.* *Dodon.* gall. caprae *H. Lugd. Eyst.* caprina altera *Lonc.* *Potentilla* 2. *Anguill.* *Drymopogon* 1. *Tab.* Nobis quidem iudicibus *H. Lugd. p. 1081.* pingit *Barbam caprae*, verum in descriptione cum ea confundit *Vlmariam*.

Locus.

Generae copiose provenit in monticulo la Bassie; Bassie ad Rhenum prope domum ru-

ram. Alunt *Vngarie*, *Austriæ*, *Stiriae*, vicinarumque provinciarum montanae silvae *Barbam caprinam* *Fuchij* & *Tragi*, ab *Vlmaria* diuersam, referente *Closio*.

VLMARIA.

CAP. CXXI.



Caulis rectus, anguloso, rubente, concavo, firmo, ad duos aut tres cubitos adolescit, folia lato virore nitentia, quina aut septena, ad costam connexa, in ercedentibus complusculis minoribus: singulorum folia, segmentum folij Imperatoriae referunt, serrata & nonnihil sinuata: interdum verò crispo contextu plicatam

ad *Vlmi* folia accedunt; sapore citra morsum strene è siccante: flores suavescentes positi & formâ *Filipendulae* vulgariae, albi, quinque foliis constanti, apicibus crebris similiter albis, aut in laetum vergentibus: succedunt capitula parva acuminata ex contortis oblongis seminulis composita: radix digitalis, infinitis fibris rubentibus capillata. Trago, longa, fibrisque multis capillata, foris nigra, intus subfusca, grauissimi odoris, amari simul & adstringentis, non aliter quam glandes.

Cord. *Hist.* *Medefussium*, *Argentilla* maior quorundam, rampfieurpal. *Tragus* descr. hic pro *Barba caprae* prima, refertque cum secunda ad *Pycnocomon* *Plinij* & *Dioscoridis*. Nobis autem opinio *Tragi* planè displicet, nec vlla nota nobis cōuenire videtur cum *Pycnocomo*. *Quin* *Corvulus* cum *Patauij* effemus, *Chrylocomen* faciebat. *Gefner.* verò nobis *Apum* herbam, *Ulmaria* barbant, denominabat, quia ea apes summo perè delectantur, si aluearia illinantur. *Rupellæ* in Gallia vocant *Vignette*. *Anguill.* epistol. 17. dicitur *Potentilla* libro de dynamis *Galen* laudata. *Barba caprina* 1. *Lon.* itemque *Dod. gall.* quoad descriptionem: figura enim non responderet, ideòque eam in foliar. mutauit, depinxitque sub titulo *Reginae prati*, vocauitque germ. *Witshbart* Belg. *Acenette*, Gall. *Barbe de chevre*. Cum *Rhoderia* *Plinij* similitudinis aliquid oblinere ait. Sed tamen eandem esse, affirmandum, contra *C. Bauhinum*, haud censet.

Geln. hort. *Christophoriana*, *Barba capri* maior, *Regina prati* (sic dicitur etiam *Gerardo*) & *Vlmaria* quorundam. *Barbicapra* & *Vlmaria* vulgi *Lob.* in *Ad.* & *Obf.* p. 209. *H. Belg.* p. 869. *Icon. Plant.* pag. 711. *Vlmaria* *Car. Steph.* *Hord.* p. 66. *H. Lugd.* p. 1081. *Geln. cat.* *Camer. hort.* & *Tabern.*

C. Bauh. Pin. *Barba caprae* altera, siue floribus com-

paëtis, Potentilla r. Anguill. Argentilla maior Thalij.

Alunt Vngarie, Austrie, Stiria, vicinarumque provinciarum pratâ humidiora, & torrentium ripâ, Vlmariam ab vlmaceis foliis dictam, temperamento, atque etiam odore Pimpinellæ maiori Italica quodammodo respondentem, referente Clusio. Non ratò in vlginosis pratis, sæpè etiam inter spinas, & in collibus quibusdam, quotannis novos caules emittit, florèque Iunio mense, aucthore Trago. Montbelgardi passim circa aquarum riuos abundat; Basilæ in itinere, quo itur Leirach, & Geheuz in pratis vltra Arue florens Malo & Iunio, copiosè Iulio inter Durlacum & Essingen.

Calidam & siccam iudicat Tragus. Mulierculantem verno tempore tenera folia legunt, oleibûs; suis adiungunt. Si in vino rubro & quasi nigro decoquatur radix & bibatur, disentericè vtilis est. Eadem verò vino & melle decocta & pota aluum soluit, bilem extrahit. Semen in cibo commanducatum, capiti noxam adfert. Herba cum farina tusa & impolita, tumores discutit, furculos præterea extrahit, cuspidis & tela, tusa & impolita. Folia aduolutoria pustulas excitant, quemadmodum Ranunculus. Ego contra Tragum, iudico hanc plantam potius frigidam, quam calidam, & posteriores vires, quas ponit Tragus (quæ potiss. Pycnonocomi Dioscoridis) non conuenire sed planè contrarias esse iis, quas ex eo primo loco recensemas. Præterea Dioscorides ait Pycnonocomon constare Eruce foliis acrioribus, non tamen pustulas Ranunculi modo excitare scribit. Tragus in sua descriptione nullius acrimoniæ meminit, sed tantum amari & attingentis saporis. Rupelleus Renatus dicit hydromeliter ex eius flore conciliari gratum odorem, & ita parati ut æmuletur vinum Creticum quod Maluacum vocant: se etiam vidisse qui Lucetæ aduersus pestem commendarent.

LEONTOPETALON IN GENERE EX antiquis & recentioribus.

CAP. CXXII.

Leonpetalon caulem proferit dodrantalem [*δρακτῆμαλον* vet.] aut etiam altiore, plurimis alis concavum, in quarum scaminibus filiquæ sunt cicerum modo [quidam carent his vocibus, *ἀκροί* [*ἀκ. ἀκροί*] *ἰσπερὶ βοτ.*] acin his duo triæve minuta semina, flores punice, Anemonæ similes, folia Brassicæ, Papaueris foliorum diuisura: radix nigra, Rapo similis [*ῥίζα μὲν ὡς ῥαπο* 207. 208. hæc ut parenthesi includit. Jquæ eminentias seu nodos quosdam habet. Nascitur in aruis, ac inter segetes. Radix ex vino pota commotis à serpente auxiliatur, dolorem omnem celeriter eximens. Miscetur & ischiadicorum clysteribus, Diosc.

Sunt qui inter spuria Leontopodion, qui Leontion, qui Leontion, qui Dorida, qui Doridenda, qui Lychnidem agrestem, qui Pardalium, qui Therybetum, qui Rapeium, qui Papauer cornutum, qui Anemonem vocant. Romani Papauerculum, aut Semen leoninum dicunt. Ex quibus constat nomen à ferocissimo & generosissimo omnium animali quondam inuenisse. Quid autem illi cum leone conueniat, non satis certum est. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit, annotante Marcello, quam leonis folium. Sed quæ leonis partem, v. rbi caula, pedem, aurem, linguam, a-

Tom. III.

lâmve huiusmodi, folium referat, non satis pro comperto est, præsertim variantibus appellationibus, Leontio, Leontopodio, & Leonino semine, quæ quidem omnes à leone causam nominis, sed non eodem modo habent: Siquidem Leontion leonculus est, Leontopodion autem leonis pedè significat, & Leoninum semen causam nominis in semine non in folio esse ostendit. Cur autem agrestis Lychnis diceretur, floris figura in causa est, quæ Anemonem & siluestre Papauer dici etiâ Leontopetalon fecit, Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaque figurâ similes, aut saltem non multum dissimiles inter se sunt.

Descripsit Leontopetalon lib. 27. c. 11. Plinius iisdem verbis: Rhapaeion aliis vocari dicens, folio Brassicæ, caule semper calidis multis, semine in cacumine in filiquis Ciceris modo, radice Rapo simili, grandi & nigra: nasci eam in aruis: & omnium generum serpentibus in vino potam radicem aduersari, nec quicquam celerius perficere: dari & ischiadicis.

Maximè autem, aucthore Galeno, radice vitmur, quæ discutendi vim habet, siccataque & calefacit in tertio ordine.

Leontopetalon quidam eam herbam esse vocant, quam sequenti capite describemus. Alij Fumariam bulbosam Leontopetalum genus esse existimant. Alij, teste Gesnero, Helleborem nigrum. Garyophyllitam aquaticam Tragus, Alchimillâ Cornarius, sed non sine magno errore.

LEONTOPETALON QVORVNDAM.

Radix pugnum implet, rotunda, tuberibus multis inæqualis, cortice cinereo, pulpa vi-

Descriptione



luteolis umbilicem circumstantibus, quibus marcescentibus prolongantur pediculi in palmarem longitudinem, in extremo vitruum venosum Halicacabi sustinentes: semen nigrum Cannæ ludicæ semini per simile.

Leontopetalum Mat. h. Gesn. horr. & Camer. synon. Leontopetalon Lobel. in Adu. Obs. pag. 391. ic. Plant. p. 685. Cat. Lond. Rauv. v. 1. L. C. Galp. & H. Lug. p. 1608.

Fhh

Leontopetalum hoc quod ex Græcia adfertur descriptioni Dioscoridis nec foliis, nec flore respondere ait Anguillara epist. 11. ac propterea an verum sit, aliis diiudicandum proponit.

Ex semine quidem Cameratio prodit foliis binis oblongis, crispatis oris, sed ad frugem non peruenit, & quidem quoad radicem & fructum conuenit descriptioni Dioscoridis, sed folia & flores planè discrepant. Incolæ Orientalium regionum circa Alepum, vbi Rauuolff. reperit, suâ linguâ *Astab* vocant, atque radicem maiorem puluere vestes fricant, & hâc ratione maculas delent.

Hanc plantam, elusq; nigram extuberantemque radicem Rapti instar vidisse se ait Marchiolus non modò Venetiis, & Patavij in quibusdam hortis, verùm etiam in Hetruriz aruis, aliisque Italianæ locis, nascique frequenter in Apulia.

PEONIA VETERIBVS ET Neotericis.

CAP. CXXIII.

Theoph.

Theophrasto cognita fuit. Sic enim libr. 9. Hist. pl. cap. 9. de ea dissolvit. At illud veluti aduertiunt, & elonginquo petiit videtur, quod sc. Pæoniam [Castam reddit Gaza] quam alij Glycyfidam [*γλυκύσιδω*], Gaza Dulcisfidam,] vocant, noctu effodiendam præcipiunt sibi imaginantes, si interdum quispiam eruat, & à pico martio conspiciatur, eum fructum qui lem legere, sed oculis periclitari radicem autem secant, sedè procidere.

Pæonia siue Glycyde [*παιονία ἢ γλυκύσιδω*] quibusdam Pentorobon. Sic Apuleius à numero granorum Ervo similium vocat, quin & Sarracum Galeno sic legere maualt, græcè tamen legitur *πεντοροβον* habui dicitur.

In nothis vocatur Pæonia mas Orobælium [*ὀροβελιον*], à granis Ervo similibus:] aliis Orobox [*ὀροβαξ*], aliis, quod menstruum sanguinem educat, Hæmagogum [*αιμαγωγον*], aliis Pæta Je, [*παιταγι*], aliis Aglaophotida [*αγλαοφωτίδα*], quibusdam quasi Diuum donum, Theodonium [*θεοδονιον*], aliis, quasi Lunaris, Selenion [*σεληνιον*], Prophetis, quasi Lunæ genitura, Selnogonum [*σεληνογονον*], aliis Phthifis [*φθισις*], Romanis Casta. Sunt qui Idæos dactylos [*ιδαιος δακτύλος*] radicem Pæoniæ vocent.

Descript.

Caulis ferè in duorum dodrantum altitudinem adolefcit, inquit Dioscorides, adnascente numerosâ sobole comitatus: ac mari quidem folia sunt, qualia Iuglandis [*βασιλική καρύνα*]: Plinio qualia Ifatis, pinguiora, rotundiora que & minora. Sed Sarracen. pro Ifatis, Iuglandis reponendum esse suspicatur. Fœminæ verò incisuris Smyrni modò diuisa [*φύλλα ἡμισυ σμυρνης*]. Plinio fœminæ folia Myrrham redolent, & densiora sunt: ex quo patet, *ἀντὶ τοῦ σμυρνης* semper legisse, manifesto errore: quamvis & Smyrnum à Myrrhæ odore sapore, quem refert, ita dictum est. Sarrac. Summo caule fert utraque filiquas qualdam, veluti Græcas nuces [*ἀμυγδαλοειδεις*] quibus dehiscitibus grana multa rubentia, parua, acinis Panicorū [*πόσειδες*] similia iuveniuntur, & inter hæc media quinque aut sex, nigra, purpurea. Radix maris digitali ferè est crassitudine & palmi longitudine, gustu adstringens, candida [*λευκή* ver. caret] fœminæ verò radicibus ceuglandes septem o&ôve adherent, quales Haitulæ regiz [*ἡμισυ ἀρσποδίνος*] radicibus

adnascentur. Idem in aliquibus exemplatibus posteaquam de fœminæ radicibus egit: Mas, inquit, plures habet, quoniam non unâ radice nixus est, palmi altitudine, candidaque. Sed Sarrac. ita potius legendum censet: Mas plures non habet, sed unâ radice nixus est.

Antiqua autem pariter & honesta siue Pæonia, siue Glycyfidem eam voces, plantæ hulus appellatio est. Habet enim altera auctorem antiquæ medicinæ peritissimum Pæonem, cuius in vera & fabulosa historia egregium nomen & æterna laus adhuc est: Altera à dulcedine, quàm solo nomine indicat, non paruum illi dignitatem & gratiam illi acquirit. Accedit his quòd nihil non sanari Pæoniâ superstitionis credidit antiquitas, nec corporis tantum morbis, sed animi affectionibus pariter mederi: adhuc imperare tempestatibus, arcere grandines, disicere faorum rubiginem, & ne in huiuscemodi longiores simus, Lemuribus etiam aduersari. Quod non aliunde in plebs animos irrepit, quàm ex his quæ Theophrastus, & Theophrastum sequutus Plinius, pluresque alij de legenda Pæonia ridicula magis, quàm superstitionis, tradiderunt, & ex his quæ à Dioscoridē de ephialtis naturæ virtutibus, non deorum irâ, præcepta sunt, adicientibus continè imperitis ex superstitione sua, deorumque metu, quæ nullam haberent naturæ rationem, religionem quæ medicinz turpissimè miscen-tibus. Ex quibus factum est, vt tam multis nominibus vna censeretur Pæonia, quorum aliqua nullam, nisi ex humana superstitione causam & originem habent, qualia sunt Menion, Selenionq; Lunarem herbam significantia: qualia itidem Idæi dactyli, qui in Creta nutriti Iouem dicti fuerunt in veteri superstitione quotidianis precibus exorati, quibus potestate Pæonia comparabatur. Nisi forè, quod magis verisimile est, prima huius nominis origo à radicibus eius facta fuerit, quas Dioscorides ait in fœminâ glandium quantitate, & Asphodeli figura esse, & à digitali longitudine, quam habent, dactyli primum vocata ex eo herba fuerit, mox accedente superstitione ad Idæos dactylos transfulerint homines, & quæ sîmpliciter dactyli herba nominabatur, religiosè Idæi dactyli vocari inciperit, mox Theodonion, quod diuinam opem & auxilium pollicetur. Tum Aglaophotis quod lucis splendorem ostendit, postremoque Casta herba, modò antiqua Romanorum ea appellatio sit. Ex eodem genere reliquæ sunt præterea, quæ ad numerum folliculorum, & seminum figuram in ea pertinent, qualia sunt Pentarobon quasi quinquetrum, Orobation, & Orobox, omnia ab Ervo notissima frugè facta, cui Pæoniæ semen quantitate in cunctis, colore autem in quinque aut sex tantum par est. Sola Hæmagogos vox à ducendo sanguine facta fuit, pertinetq; ad vires eius, quibus puerperis à partu se non purgantibus prodest.

Ceterum, Pæoniam marem Tragus maximo cum errore existimat esse Fraxinellam, siue officinis falsò Dictamnem dictum.

Infulsam perhibet Tragus Sciolorum distinctionem, qui Pæoniam vulgatam illam, Germanis Benedictum Rosen vocatam, Lapatham esse statuunt. Eodem auctore apud Dioscoridem Pæoniæ nomenclatura Chelidonio quoque tribuitur.

Laudata multum antiquis & neotericis ob vires varias & multas vilitates Pæonia est. Radix (in-vius quit

quit Diofcor.) ſceminis à partu non purgatis exhibetur: ciet quoque menſes nucis græcæ magnitudine pota: ventis etiam doloribus in vino bibita auxiliatur. Prodeſt argumatis, & iis qui renum aut veſicæ cruciatibus inſeſtantur. Eadem decocta in vino pota quæ aluum ſilit. Seminis autem grana decem, duodecimve rubentia in vino nigro & auſtero pota, languinolentum fluorem muliebrem [*ἰσὶν ἰσχυρὸν δὴ* ad differentiam τῆς ἀλκον]. Enimvero *ἰσχυρὸν γυναικείον* etiam ipſi Dioſcoridi pro coloris varietate duplex fuit, alius *ἀλκός*, hoc eſt, albus, alius *ἰσχυρὸς*, i. e. rubens. Hunc porro Sarac. Scritbonſo Largo fluorem languinolentum vertit: Plinius rubentes menſes reddidit: ſilunt: ſtomachicique, qui eroſiones ventriculi ſentiunt, comæſta opitulantur. Quin & à puerilis pota eſt àtve initia calculi eximant. Quæ verò nigra ſunt grana, ſuppreſſionibꝫ nocturnis, quas ephialtas [*Incuborum ſuffocationibus*, Faunotum in quiete ludibris, Plin. vocant, vulgoque ſtrangulationibus, ac vteri doloribus, numero quindecim, in aqua muſſa aut vino pota auxiliantur. Cæterum [*hæc Goupylus in antiquo vtroque codice ſini capitis adſcripta repetit, quæ Ald. codex ad noſta reiecit*] naſcitur Pæonia in aliſſimis montibus, eorumque verticibus.

Ad eadem commendat libri 25. cap. 15. & libri 27. c. 10. Plinius: & melancholiæ, & contra ſerpentes.

Ex authoritate Galeni, Radix Pæoniæ menſes cit, ex muſſa Amygdalæ quantitate pota. Expurgat etiam iecur obſtructis & renes. Sed hæc effecere nata eſt, quæ acris & ſubamara eſt, quæ verò quiddam etiam adſtriſtorium obtinet, fluxiones ventris ſiſtit. Oportet autem tunc in auſterorum vinorum quopiam eam decoctam bibere. Eſt omnino reſicatoria vehementer, vt non deſperauerim eam ex collo pueris ſuſpenſam, meritò comitialem morbum ſanare. Equidem vidi, inquit, puellum quandoque octo toris menſibus morbo comitiali liberum, ex eo quo geſtabat radicem tempore. Vbi autem forte fortunà quod à collo ſuſpenſum erat, decidifſet, protinus morbo correptus eſt: ruſuſque ſuſpenſo in illius locum allo, inculpatè poſtea ſe habuit. Viſum verò eſt mihi fatiſ eſſe denuò id certioris experientie gratia detrahere: id quum feciſſem, ac puer iterum eſſet conuulſus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius ſuſpendimus: ac deinceps proſum ſanus effectus eſt puer, nec poſtea conuulſus. Sic ſuccus Cyrenaicæ Columellam phlegmone affectam iuauit: Sic Nigella friſta ac odorata deſtillationes & grauedines deſiccant. *Addit Lemm. Lemnius lib. 8. cap. 3. de occult. nat. miraculis:*

Pæonia Galeno nō miuſ decantatur, quàm Brafſica Catoni, non ſolū à qualitate elementari, ſed totius ſubſtantie vi ac proprietate ſpecifica hunc morbum ſeplepſiam. Jexpugnat. Pueros autem in quibus vis morbi minùs valida, etiam à collo geſtata hoc morbo collapſos erigit. Diſcunt enim, conſumit que humorem pituiſoſum, qui huius morbi eſt ſeminarium. Intus verò exhibitæ eius baccæ etiam in adultis efficacius id præſtant. Siquidem flatuoſum, imbutumque veneno humorem abſorbent, ac corpus ad temperamentum calidius, ſiccioſumque perducunt. Hoc autem ſemen præſtantiſſimum nonnulli aſſerunt, quod à Pæoniæ, quam maſculi nomine designant, prima ſæctura emergit: Diu enim ſtolones, h. e. inutiles frutices, culmoſque effectos ac ſemine deſtitutos proſert. Vbi verò perfectè adoleuit, ſilquis dehi-

ſcentibus, hinc baccas atro colore politas, hinc acinos, coccineo, ſagrantique robore nitidos, offedunt, nigricans ſemen in vium referendum, non tamen eà vanitate, ac ſuperſtitione, vt ſequentis anni ſemen credatur inefficax, cū à decimo partu etiam qui emerſit ſocius, præſentaneam vim habeat, modò ne carioſus ſit & euanidus. In conſeſſo eſt (inquit Montuus lib. 1. cap. 8. Halofeos febrium) Pæoniæ radicem de collo pendentem,

epilepſiam arcere, quod manifeſtauit *Galenus minime omnium mendax*. Egoque ſubinde expertus ſum ad ſonticos & lunaticos plurimum valere. Pæoniæ maſculam infantium collo ſubnexam, comitialem morbum ſanare, veniſſimum eſſe comperit Fernelius. Quin & Apollonius Menabenus libello de Alce cap. 7. Pæoniæ maris radicem decreſcente Lunâ collectam, & recentem collo appenſam, puerum epilepticum, illico ſanitati reſtituiſſe, nonnullis expetimentis in Suecia vidit: Fæminam autem hoc præſtare non ſolere, multorum experimento comperit eſſe reſtatur. Nonnulli Sole Leonem occupante, die item & horâ ſolaribus, decreſcente etiam Lunâ colligendam præcipiunt. Biſariam cuiſmodi ſanatio contingere poteſt, vel deſiccatione, vel è totius ſubſtantie proprietate. Cæterum, quacunque tandem ratione iſta contingant, ſucceſſus huius ſpe fruſtratur (verba ſunt Iulij Alexandrini à Neuſtain in ſuis Galeni de ſimplicium medic. ſaccul. librum notis) hodie. Vel igitur tam efficit non eſt noſtra hæc Pæonia, quàm aliarum fortaiſe regionum aliquarum: vel leuiores erant illius temporis mala hæc, quàm noſtri huius ſint, ob immutatam in deterius, fortè victus rationem. Quam ego aſſerre hoc loco cauſam non dubito, quum videam eiufdem rationis allatam à Galeno alibi ſuper aliis morbis quibuſdam, Hippocratiſ temporis victus rationem multò magis commendante quàm ſui.

Mirari ſubit Tragum, illam ex Plinio fabulam de Lemuribus & Faunis, quaſi planta hæc malignis ſpiritibus aduerſetur, approbare, & non potius ex Dioſcoride ad ephialtas, qui morbus naturalis eſt, facere, ſcribere.

Fachſius Pæoniæ radicem tribuit leuiter adſtringentē, cum quadam dulcedine. Si verò pluſculum dentibus mandatur, acrimoniæ quampiam ſubamaram percipi ait, in radice præſertim noſtratis Pæoniæ, quam ſceminam eſſe dicit. Pæoniæ verò in vniuerſum temperamentum tenuium eſſe partium, exiccatorium, haud tamen inſigniter calidum, ſed aut ſymmetrum, aut paulò calidius.

Aquam ſtillatitam ſic parat Wirt. Empiricus: Pæoniam floribus abundantem eruit, in tenues particulas conſcindit, in cantharo benè obturato & lutato in cellam frigidam ſupra fundum reponit, biſque per quatuordecim dies relinquit, ac poſt ditillat. Hanc autem aquam caput valdè imbecille corroborare aſſerit, ſi æget, quum in ſtilla. phis fuerit, aut caput lauerit. ſtillatitium liquorem tepeſactum capiti aſſuderit, manūque à parte anteriore ad poſteriorē deductā, aſſerit. Idem quum ab Epilepſia timeret, arreptas Pæoniæ radices abluit, in tenues rotulas conſcindit, quarum drachmas duas in vino albo macerat, de eo per biddum bibit, & epoto aliud aſſundit. Altero quoque die nouas immittit radices, per quatuordecim dies creſcente Lunâ in continuando. Siderum ſibi valdè metuat, manie per biddum aut triduum ipſius radicis duas aut tres rotulas co-

Montuus.


Tragum nota: tur.

Temperam.

Caput imbi: cilla.

**PÆONIA MAS, VNA PRÆCOCIOR,
& altera tardior.**

Descriptio.



Pæonia mas præcocior ut rarior, ita notabili foliorum & radicis differentiâ à fœmina dilpescitur. Ea siquidem, quàm fœmina, videtur alius adfurgere, ad selquibitalem, aut bicubitalem altitudinem, pluribus caulis, nonnihil tubentibus, in aliquot ramos diuisis, foliis vestitis Nucis Inglandis ferè

posito & figura, sed lartioribus, crassioribus, lanugine quadam aversa parte pubescentibus, ternis, quaternis, quinis, rarius septenis, saturè virentibus, glaucoque obductis, caulium extremis ad commissuras parte interna tuitis, ex longis rubescentibus pediculis pendentibus. Flores supremis insident fastigiis singulares, paruli, quos cæcinata quedam folia sustinent, similes ferè floribus Pæoniæ fœminæ, sed dilutiores, non sine purpureæ tinctura, necnis reliqua floribus parte saturationibus, in quorum medio stamina purpurantia apices croceos sustinent. Succedunt cornicula alba, villosa in principio, atque lucente lanugine pubescentia, rarius terna, sæpius quatuor aut circiter, cristæ sanguinea incurua superne donata, iuxta cornicula stamina rutila, apicibus loreis farinaceis constituta. Cornicula verò quæ terna, quaterna, quina, rarius plura hirsuta, incana iam grandiora reddita, atque per maturitatem dehiscens, recurvantur, elegantissimamque granorum ostentant feriem vtrinque ordine positam, primum acinis Granati colore similia, mox atro-cæruleo, tandemque nigro, rotundiorum, crassiorumque quàm in fœmina colore & substantia aliquo similia, quemadmodum & sapore. Huius flores Maij initio explicantur, moxque decidunt. Radix ceu palus altè depangitur, recta, nonnunquam in adnata pauca diuiscata.

Eadem huic quæ prior proceritas, idem foliorum situs, sed numerosiora sunt, quippe quina aut septena impari aliquando bifido : dilutius quoque virent & aversa parte cum prædicta foliis collata pallent, quæ & alba quadam lanugine donata sunt. Non caulium modò extrema, sed ipsæ quoque foliorum costæ ex puniceo interna seu aduersa parte rutilant. Floris corniculorumque eadem forma & ratio quæ præcedentis. Sed tardius erumpunt, nec citius quàm prioris decidunt. Radix tum huius tum præcedentis pollicari crassitudine aliquot diuisuris constant rectis, aliisque depactis, foris rufis, intus candidis,

gusto à granorum sapore haud notabili diuersitate prædito. Flore hæc sub finem communiter Maij.

Lob. Obs. p. 390. Ic. Plant. 684. Pæonia mas: Item, p. 685. Pæonia mas cum semine. H. Lugd. p. 856. Pæonia mas Matthioli, & Pæonia mas Dalechampi. Duas figuras vnius plantæ habent.

Pæonia mas Cordo in Diof. March. Anguill. Lob. in Adu. Dod. Cæsalp. Tabern. & Gerardo Pæonia pulchrior, siue nobilior, vel. 2. Trago Pæonia mas foliis Nucis Gelin. hort. Pæonia siue folio nigricante splendido, mas C.B. phyt. & pin. vb. ait: Variat floribus colore purpureo, incarnato : & huius herbæ folia latiora segmenta habent, quæ subus exalbida, hinc Eyst. Pæonia mas fl. purpureo : item Pæon. mas fl. incarnato: Et, Pæon. mas maior: itemque Pæon. mas maior fl. incarnato. Floris amplitudine reliquas superat: & herbæ folia in latiores & pauciores vitelcentes particulas diuiduntur.

Generis in Generoso dicto Heluetiæ monte reperiri audierat. Nos non nisi in hortis cultam obseruauimus. Si feminetur Vere, ut plurimum per annum latitat, & post singulis annis foliorum diuisurâ augetur. Non se multiplicat ut alba, vel fœmina, vel ea quæ pleno flore est: radix enim lubet crassa, profundè descendens. Pæon & a. tem effodiendè communodissimum tempus est Lubet, iusto Caniculae sydere.

PÆONIA FŒMINA VVLGIATIOR.



Vlgaris nectitæ est hæc Pæoniæ fœminæ species, omnibusque hortis familiarissima, quæ Radix, glandulosa, fibris quibusdam intercepas habet, ut Asphodelus, à quibus denudè & aliæ nonnunquam propagantur simili modo glandulosæ: caulis viridis, vix, nisi ad pediculi foliorum exortum, rubedinem vllam ostentat: folia variè & inordinè dillecta, modò trifida, modò bifida, (de singularibus foliis intellige) aliàs etiam integra, superne virentia, inferne albicantia aliquantum, & nonnihil hirsuta: flos qualis in mascula cum staminibus & apicibus consimilibus: petinde ut & filiquæ: ac semen oblongum, per maturitatem nigrum.

Hanc Latini, inquit Tragus, Pæoniam, & Hæstam regiam nuncupant. Ego verò Pæoniam fœminam Dioscoridis esse existimo: quam ille nomenclaturis inter notha relatis, & de quibus antè, seferat.

Pæonia fœmina Dod. gall. Altera in fol. lat. ubi Pæoniam marem Plinij & Dioscoridis suspicatur. Huius inquit, Plinius folia Myrrham redolere

redolere ait: Sed evidens est suspicio *avri* & *suav-*
is, *suav* a eum legisse, & pro *suaviss*, Myrtham
aprum rochè reddidisse.

Græcis *Παonia* & *γλυκερὸν*: Latinis similiter,
Pæonia & *Dulcisida* dicitur: Officinis *Pæonia*:
Germ. *Pæonia blum* / *Pæonia Rosen* / *Wach-*
stern / *Funigsblumen* / *Wiegä Rosen* / &
Süßsam Rosen: Belgis ferè *Vioenen*: Flandris
tamen *Wassbloemen*: Gallis *Pionne*: Italis *Peo-*
nia: Hisp. *Rosa del monte*. Angl. *Deanyce*: Boh.
Pionita: Hung. *Wasi rosa*. Præter autem iam
recensitas tum legitimas tum nothas appellatio-
nes, dicitur etiam *Rosa asinorum*, *Rosa fatuina*:
Herba calta, vt & *Aglaophotis*. i. e. lucide splen-
dens, a granis scilicet cocci colore splendentibus.
Aglaophotis autem duc, apud *Ælium* lib. 14.
descriptæ reperiuntur: vna marina cap. 24. altera
terrestris cap. 17. *Marina*, fuci species est, quæ in
profundis nascitur petris, magnitudine *Myrica*,
fructu *Papaveris*, qui æstiuo Solstitio dehiscens,
noctu igneum quendam, & veluti scintillantem
splendorem emittit.

Terrestis, quæ alio nomine *Cynospastus* dicitur,
per diem ait idè inter ceteras herbas delitescere,
nec vilo modo agnoscì: nocte verò stellæ instar
lucentem, & igneo splendore coruscantem, facili-
tè in conspectum venire. Et hæc quidem terre-
stris *Aglaophotis*, siue *Cynospastus*, *Pæonia* est.
Pæoniæ enim grana rubentia, *Apuleius* ait, no-
ctu lucere tanquam lucernam: & plurimum no-
ctu à pastribus inueniri ac colligi. Præcipitiam
vt *Pæonia* noctu colligatur, *Theophrastus* & *Pli-*
nus referunt. Quæ de *Aglaophotide* *Ælianus*
quoque affirmat. Appellatur verò terrestris hæc
Aglaophotis à *Iosepho belli Iudaici* scriptore l. 7.
cap. 25. *Baaras*, à loco in quo reperitur de qua
ante.

Cæterum, dicitur *Pæonia Trago*, *Turn.* &
Conicero: *Pæonia* femina *Brinfell.* *Fuchsio*
Anguill. *Cordo* in *Dioscor.* & *Histior.* (vbi *Tragi*
pictura addita) *Gesner.* hort. *Lobel.* in *Adu.*
Obf. p. 389. *ic. Plant.* p. 682. & *Camer.* hort. *Eidem*
apud *Math.* in *Epit.* & *Hist. germ.* *Pæonia mas.*
H. Lugd. p. 83. *Pæonia* femina altera *Dodonæi*.
Clus. *Hist.* *Pæonia* vulg. femina. *C. Bauh. phyt.*
& *Pin.* *Pæonia* 2. siue communis: *Eyst.* *Pæonia ru-*
bra flore simplici.

Hæc ætate passim in hortis habetur: flores
mense Maio: semen Iulio ad maturitatem per-
uenit: multumque se repetat multiplicat.

PÆONIA PROMISCUA STRICTIORE FOLIO.

Multa tam cum mascula, quam cum femina
vulgari *Pæonia*, communia habet. *Radix*
glandulosa vt femina: vulgaris, sed crassioribus
glandibus: ac folia propius ad masculæ folia ac-
cedunt, magis tamen incondita, singulariæque
longiora & strictiora, supernè vt masculæ satu-
rè vircentia, infernè verò magis albicantia, minùs
tamen quam feminae vulgaris, quibus etiam a-
uersâ parte multò minùs sunt pilosa: flores satu-
ratiùs sanguineo coccineo colore rubent, sep-
tem, aut nouem foliis constantes: apices, &
stamina, ac siliquæ vt in aliis.

Est *Pæonia* femina *Marth.* *Lac.* *Cast.* & *Ca-*
merario: *Pæonia* femina prior *Dod.* *Pæonia*
promiscua seu neutra *Lobel.* in *Adu.* *Obseru.* pa-
gina 390. *Icon.* pag. 679. *Pæon.* altera, vel femina
Tom. III.

Dioscoridis, Cæsalp. *Pæonia* 3. siue femina al-
tera *C. Bauh.*

PÆONIA PROMISCUA VORMARII folio latiore.



Vlchre hæc Description.
I variat à re-
liquis *Pæoniæ*
speciebus. *Folia*
siquidem, quæ
inimis ramis ha-
rent, latiora
sunt, quam cæ-
terarum, recti-
dioræque, auer-
sâ parte glauca,
hirsuta, aduer-
sâ saturatiùs vi-
rentia, itidem-
que pilis obita,
sed paucio-
ribus quam in
opposita *Foliâ*
in terna aut
quaterna, aut
etiâ quina leg-
menta diuisum
est, nullâ diui-

sione certa, sed temerè variante. *Flos* à reliqua-
rum flore haud abhimsilis. *Siliqua* verò retorta
hirsutie albâ totâ connecte.

Floruit *Esslingæ* in horto *D. Sebast. Volmarij*
Iunij sine, cùm reliquarum siliquæ iam grandio-
res essent.

Locus &
Tempus.

PÆONIA FLORE PLENO RVBR O.

Omnium *Pæoniæ* specierum longè pulcher-
rima est polyanthes, specioso floribus sangui-
nei saturi incremento, tam densò foliorum sti-
patu luxuriantis vt fidem ferè numero superet,
sementisque spem plerumque ferè omnem præ-
ripiat. *Folia* sanè floris sunt plurima, magnitudi-
ne & formâ inter se discrepantia, diuersaq; *Extre-*
ma. n. caulem proximè amplectentia reliquis om-
nibus maiora sunt, & ad instar reliquarum *Rosa-*
rum odoratarum circinatæ rotundatis, reliqua
interiùs sita mirè variant: sunt enim quedam illo-
rum graminea ferè, oblonga nempe & angusta,
intèrque hæc aliquando colore albo tincta con-
spiciuntur, cum leui rubore, quedam verò fistulo-
sa inferiùs, & quasi tubulosa, arcu satisperuia
meatu, quedam paulò maiora, & ad latera vtraq;
mirâ varietate, modò magis minùsque profundè
incisa, dissecta, & aliubi serrata, quedam adhuc
maiora latioræque, maioribus quoque incisuris
dissecta, quedâ etiâ, & quod obseruatu dignu, re-
ferunt suâ secturâ & forma ea omnia folia, quæ vi-
ridia sūt. In medio floris duo assurgunt *calyces*, albi,
hirsuti, oblongi, inferiùs latiores, in medio ven-
triosi, in summo denique acuminati, cum inflexa
quasi galli cristam referente substantia rubra, se-
minum futurorum rudimenta intra se continen-
te. *Folia* multum similia promiscuæ *Lobelij* foli-
is, breuiora tamen, & vtrunque latiora, nec vel
tenui illa promiscuæ lanugine prona parte do-

Synonyma

nata, sed instar masculæ glabra & virentia.

Pæonia femina multiplici flore Geln. hort. Tabern. & Gerardo: *Pæon. form. polyanthos* Lobelij (in Obs. p. 391. Ic. Plant. p. 684.) H. Lugd. pag. 85. *Pæonia* femina multiplex flos Dod. in fol. lat. *Pæon. flore pleno* 1. sue femina flore pleno rubro maiore C. Bauh. pin. polyanthos fl. rubro Eyst. πολυφύλλος Clus. Hist. post. cuius varietates aliquot observauit.

Pæonia flore pleno rubro, minor.

Pæon. pleno rubro flore minor.

Pæonia inuenitur, cuius folia alterius foliis haud absimilia, superne viridia & splendentia, inferne cæsi quodammodò coloris, & lanuginis expertia: flos alterius flore minor, nec adeò plenus, illi pænè qui carnei coloris plenus est, par, non minùs tamen saturi rubri coloris quàm maioris, sed cuius folia interiora venis quibusdam nigricantibus aspersa conspiciuntur: medium florem occupant cornicula nullis staminibus obfita.


Synon.

Clus. *Pæonia pleno rubro flore minor*: Camer. hort. *Pæonia altera fl. pleno dilutiore* & minore: C. Bauh. Pin. *Pæon. fl. pleno* 2. sue fl. pleno rubro minore.

PÆONIA ALBO FLORE PLENO, SIVE
polyanthos alba femina.

ATQVE DE NONNVLIS ALIIS PÆONIAE SPECIEBUS.

Synonyma.



Quam Tabern. in Ic. & Hist. *Pæoniae* feminae polyanthos flore albo, utrisq; fustibus compositis, inferne inscriptio pingit, & C. Bauh. in Pin. *Pæoniam* flore pleno tertiam facit, ac feminae flore albo pleno cognominat, eam vidimus Bauh. in horto D. Fel. Plateri anno 1605. Iulij principio florentem, & folia v-

trinque glabra ferentem, seminumque capita hirsuta, dum apparere incipiebant.

Præter autem huc usque recensitas *Pæoniae* species nonnullæ & aliæ traduntur: verbi gratia, *Pæonia* Byzantina prior Clusij quam C. Bauhinus *Pæoniam* 9. vocat, siue peregrinam flore saturè rubente. Byzantinam maiorem Eystet. *Pæonia* altera Clusij, C. Bauhino *Pæonia* 10. siue peregrina flore saturè rubente. Byzantinam maiorem Eystet. *Pæonia* altera Clusij, C. Bauhino *Pæonia* 10. siue peregrina flore dilutè rubente dicta. *Pæonia* foliis per oras nonnihil crispis, cineracei ferè coloris, quæ tertia Clus. inscribitur: & à C. Bauh. Pin. *Pæonia* 7. siue *Pomi Arantij*

colore: Eystettero verò peregrina flore coccineo. *Pæonia* foliis Aquilegiæ, superne virentibus, inferne pubescentibus Clus. quæ C. Bauh. *Pæonia* 6. siue Aquilinae foliis inscribitur. *Pæonia* flore variegato: quæ *Pæonia* 7. Clusio: C. verò Bauhino octaua est, siue flore variegato. *Pæonia* simplex, niueo flore, vel Cretica Clusij C. Bauhino. *Pæonia* simplici flore cum aliquo rubore. *Pæonia* alba promiscua Cretica, eidem C. Bauhino 5. dicta. Et *Pæonia* exalbida plena minor & major, quæ 6. siue exalbida plena Clusij inscribitur: flore pleno incarnato Eystet.

FRAXINELLA, OFFICINIS DICTAMNVS.

C A P. CXXIV.



Notissima sunt officinis *Fraxinellæ* radices, Dictamni albi nomine: candidæ enim sunt, variòque implexu multindæ: scapi aliquot sequecubito proceriores, hirsuti, rubescèntes, medullâ multâ farcti, thyrsum sustinent longum florum pulcherrimorum exintuallis positum odore graui, foliis

quinque ex albo purpurascèntibus, striis saturatioribus notatis, anersaque parte nonnihil hirtis constantium, fibris longis recuruis, denis numero, purpurascèntibus, subque apicibus luteolis ex purpureo herbidis, minutis micantibus granulis atro-purpureis resperis, medium obsidentibus: vna cum stylo pentagono pericarpio insidente. Semen in siliquis nigrum, lucidum, paulò maius quàm Milij Solis. Folia septena, vndena ad costam ligata Fraxini more, superne atro-virentia, inferne dilutiùs splendentia, laurinis æqualia, crenata. In officinis radicum cortices prostant graciliores candidiorèsque quàm radices siue Mandragoræ, siue Capparis, quibus sunt similes sapore amaricante.

Ruell. vocat *Dictamnus* tertium, atque hunc Virgilium 12. suæ *Æneidos* expressisse. Verùm decipitur Ruellius. Virgilius enim suis senariolis haud tertiam *Dictamni* faciem designat, sed primam. Fallitur & Syluius dum *Pseudo-dictamnū* Dioscoridis esse contendit. Nunc quis non Tragionem damnabit opinionem, concludentis esse veram *Peoniam* aut *Pioniam* Dioscoridis? Quin & ij meritò à Matthiolo refutantur, qui *Tragium* primum Dioscoridis esse putant.

Non solum porro apertissimè constat, veram non esse *Dictamnus*, & non sine manifesto errore *Dictamnus* vocari, sed eius etiam radice pro *Dictamno* pharmacopæos quosdam abusus esse, non absque ægotantium incommodo. Nullum autem Cretensium *Dictamni* genus repræsentare,

tare, sed ab omnibus tribus diuersam esse testatur Cornarius, & Tragus.

Pinsit Botan. Hæc. Eggenolphi p. 101. Fraxinellam sub inscriptione *Steuchij liliifera*, wild *lilifera*, & *perchel* reut.

Dioscoridum nesciuisse quid seiberet, id demonstrare videtur, quod iuxta nomen Dictamni, *Apenninæ* (sic *tuuræ* & *Widstadii* posuerit Fraxinellam, & ab altera parte Polygonatum: ex descriptione, quam habet, apparet eum nomina prædicta confundere. Si præterea cauimus, ut ipse ait, germana Dictamno, quis docuit ipsum tempus colligendi ad distillationem? In Germania, Gallia, & Italia, non prouenit vera seu germana Dictamnus, quæ distillari possit.

Apud Hieron. Brunschweig in edit. anni 1505. male Polygonatum pingitur sub his nominibus, *Widstadii*, *gicæ* Batis aut *Diptamnus*, germ. *Diptamn*, aut *Widstadii* nomine falso *Schwarz*. *Diptamn* (apud *Widstadii* nomen ad, vel potius *Widstadii*, ut habet impressio anni 1505. in qua melius Fraxinella exprimitur. Quin & Apollinaris in vna editione Polygonatum, & in altera Fraxinellam prædictam propoluit.

An natrix Plinij Anguillare?

Dictamnus p. tatus est Brunnfelsio. Dictamnus vulgaris dicitur Trago, Gelsner, hort. (cui & Fraxinella italorum, & Rupe dijs Chamæmelis, h. e. Fraxinus pumila, & Tragium Goldenbergij.) Camer. Lonc. [cui & Peonia mascula] & Officinis. Dictamnus nostra Cordo in Diosc. Dictamnus albus Matth. Lac. Cæf. & Castori Diptamnium album Bello. Tragium Dodon. gall. Tragium Creicum, Guil. theone. Polemonium Tabern. Fraxinella Cordo hist. Dod. lar. H. fl. Lugd. p. 872. Clus. Pan. p. 34. & Hist. Ger. & Egit.

In Italia ac Germaniæ montibus ac collibus lutofo ac saxoso reperitur folio. Illius passim in Pannoniæ siluis, salubritate Viennenfibus inueniuntur duo genera. Apud Belgas hortensis est. Floret Iunio: post semen prouenit.

Iisdem cum vulgari Peonia polleere viribus, Tragi auctoritate concludimus. Venenis omnibus aduersatur. Radix, inquit Matthiolus, cuius visus est, amara est: valet aduersus venena, & venenosorum animalium ietus. Necar interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra frigidos vteri morbos, nam & menses & vrinas mouet, partus adiuuat, secūdas & emortuum foetum educit, tum supposita, tum cum Pulegio suffusa, tum ex vino metaco duarum drachmarum pondere pota. Valet quoque adalui torsiones, & ad eiciendos renum calculos. Additur quoque vtiliter in potionibus interiorum vulnerum. Datur comitalibus, & in alijs cerebri affectibus. Præstat contra pestilentia contagia, quoquo modo fumatur. In summa ad mul. a radix villis est: Siliquæ & flores contactu pruritum faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant. Dodonæo radix exsiccatur, & siccat ordine secundo, digerentis, attenuantis & aperientis est facultatis: confectio & stomachis & anhelosis fertur, & aduersus lethalia medicamenta antidotis vtiliter permiscetur.

PRIMULA VERIS ODORATA FLORE luteo simplici. CAP. CXXV.

Primula Veris hæc odorata è radice mollicè crassa, inæquali, rubente, sapore sub-

astringente, odore suauis, aromatico, fibris albis longis donata: folia profert per terram sparsa, oblonga, subrotunda, rugosa instar Betonicæ, sed maiora: in quorum medio caulis surrigitur palmatis aut dodrantalis, vnus pluresve, leuiter hissutus, teres, folijs nudus, in cuius fastigio flores quinque, septeni, aut etiam duodeni ex oblongis calycibus in viciis flauis, latei, odorati, simplices, in quinque lacinijs diuisi, vel multiplices aliquando, in quorum medio apices crocei, ac stylus viridis: quibus marcescentibus succedunt semina, quæ Tabernemontano parua & nigra dicuntur.

Ruellio est Arthritica prior, à floribus primo Vere statim emicantibus, officinis Primula Veris dicta. Ruri Cuculi brachula aut Primuerio. Luteæ Volæ genus quoddam esse credit, suspensumque est esse Violam Tuscanam, quod ea cum cælum filer, & tempus serenat, exitu Hiemis necdum exactis frigoribus, erumpat, & vt prima vernas texat corollas, ita confeitum fugax euascentens, vt in medium Ver viæ decorem suum prorogat: Vix ei complurimum mensura, nec reme ad summum sequeuimense excedit. Necdant quæ Phlomis coronarias esse contendunt, sed notæ iam memoratæ non consentiant.

Brunfelsius multa subinde apud autores de Paralyti herba [sic enim vocatrom. i. Rhap. 15.] se vestigasse iactat, & plurima cum Herbariis contulisse, verum nec quicquam comperisse, quod ad stomachum fecerit suum. Nomen ignotum Veteribus ait, & Barbaros tam incitè, tam inepre, confusæque omnia miscuisse, vt maius etiam negotium fecerint, &c.

Quod in Dioscoride & Plinio, Herba paralytis nomen habeat, Trago non constat. An verò Britannica sit Plinij, aut Britannica Auicennæ doctoribus discutiendum relinquit, ab illis enim eruditè de veritate caput. Apud Phisium Chelidion, Taxiflon: Opiperam, Chelidium, & Germanicæ voce faßentblumen, h. e. Quadragesimalem florem nominari refert.

Et quamuis sint qui putent, vt Ruellio, Fuchsio, & recentiorum alijs placet, hanc vulgaris notitiæ plantam, quæ in quibusdam Biacha cuculi, officinis Primula veris, Germanis Clauis sancti Petri appellatur, esse Dioscoridis Phlomidem, eorum tamen sententiæ hanc quaquam ad stipulandum censet Matthiolus: Siquidem huic folia non insunt hisfata, nec etiam rotunda, sed rugosa & oblonga. Addendum putat quoddam florem, quos hæc proferat, nusquam meminerit Dioscorides, neque è Veteribus alius. Id quod, eius quidem iudicio, silentio inuoluendum non fuerat. Matthiolus eadem hæc de Primula Veris caulifera, pallido flore inodoro intelligit, quam infra describemus.

Sed cum in eos inuehitur, qui inter Verbasci, species numerant duas illas plantas (Primulam Veris odoratam & inodoram) colore florum differentes, quæ primæ omnium Vere florent: quæque Hebræ paralytis vulgò vocantur: non reâ reprehensione vt Maranthæ videtur iuritur, dum inquit, si Verbasci essent species, eius flores essent omnino à Dioscoride descripti, quamvis [vt Maranthæ in hac re sententiam prof. ramus] in alijs notis eorum placitum non ex omni parte acceptandum existimet.

Neoterici prima Phlomidum genera Dioscoridis, censent eam herbam (inquit Spreng. Hæg. III 2

Arthritica
prior Ruell.
Cuculi brachula
Primuerio
Viola Tusca.

Herba Paralyti
Bris Brunfelsij

Met. b. 164
darguitur.

lib. x. cap. 15.) quæ Paralytica & Arthetica vulgò dicitur, cuius multæ sunt species. Verùm non videntur Dioscoridem his folia tribuisse hirsuta, quæ in nostra Paralyti desiderantur. Sunt enim aut lævia, aut crispâ Lactuce modo, hinc Lactuca silv. in regione Pataulna vocatur.

Dorffh. error.

Dorffhenius grani errore, deceptus vt puto lectione Brunfelsij, Margaritæ nomen adscribit Herbz paralyti, licet postea dicat Margaritam esse Bellidem.

Dod. taxa. Tur.

Dodonæus, vt nobis videtur, minùs distinctè scribit de Primulis Veris: oportebat eum inter alia indicare eam quæ flore eleganter est luteo, jucundè odorato cuius iconem omisit. Primulas, cum Matthiolo & Spiegelio, non hirsutas ait, contrarium tamen asserit Lobel. & quædam hirsutas esse pronunciat. Nominantur, inquit, arthetica, & Herbz paralyti, quòd ad aituum & nervorum dolores conferre existimantur. Quæ maior est, à nonnullis Herba S. Petri dicitur. Altera Primula Veris minor appellari consuevit. Ad præcedens, Latinis Verbascula dicta, à plerisque referuntur, sed cum folia eius nec hirsuta, nec rotunda, agrè eò pertrahuntur, &c.

Synon.

Cæterùm, dicitur Herba paralyti Brunfels. Cast. descr. Herba paralyti vulgaris Trago, altera Cæsalp. Primula Veris Matth. H. Lugdi p. 834. Tabern. hortensis Thal. Primula Veris maior filiceis odoratis Dod. Primula Veris flauo flore elatior Clus. Pann. & Hist. polt. Primula Veris flore luteo Eyst. Primula pratensis Lob. in Obl. p. 305. Ic. Plant. p. 567. odora lutea in Aduer. Gerardo. Verbasculum odoratum Facht. Dod. gall. Verbasculum flore simplici. siue pratense odoratum. Arthetica Gesn. hort. simplex luteo flore Camer. hort. Alisma pratorum Columellæ. Dodæcantheon Anguill.

Locus & Tempus.

Voique in pratis vliginosis & riguis, præsertim regionum minùs calidarum, vt Sabaudia, Flandria, Gallia, Northmannia & Angliæ primo Veris tempore florent, referente Lobelio. In Austriæ Stiria, Pannonia quæ pratis & herbosis montanisque locis atque siluis Primulæ Veris Herbariorum genera nascuntur, elatior vtrique atque humilior, auctore Clusio. Basilea, Geneuz, & Lugduni floret Martio & Aprili.

Vires & visus.

Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicæ renumque obstructions solvuntur. Ius herbz propinatur & illinitur aduersus tupa, luxata, & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaveris, amara & modicè acris sunt: vt hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem, quam illis Galenus adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis Herbarij calida & sicca esse statunt. Et mulieres formæ stantes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quòd maculas, rugasque, & alia eiusdem vitæ mixticè detergeant. Folia gustu non ingrato, in oleo, placentalis & acetatis, admodum vtilia capiti, reuicis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, eoque vulnerata habetur. Esse Primulas Veris facultate quædam reuicantes, sed calidas exiguum, aut nihil, prodidit Dodonæus.

PRIMVLA VERIS CAVLIFERA PROLIFERA odorata.

Locus

Argentina in horto Frid. Meieri Primula Veris flores in caule geminos aut trigemi,

nos proferebat, altero alteri innato: folia infestior parte erant valdè hirsuta.



Tabern. Pd. Synon. Tabern.

mula Veris, plifera: Schüssel blumit mit ne ben blumit. quasi sticium ignarus separat à Primulis Veris & alio capite reponit.

Lobel. in Ic. p. 264. flore gemino altero alteri innato.

C. Bauh. Pin. Verbasculum 4. (7. phyt.) flore multiplici, siue proliferum, Primula Veris flore geminato Ger. Eyst. H.

Lugd. pag. 835. figuram Lobelij habet priori loco sub Siluarum Primulæ Veris flore multiplici inscriptione.

PRIMVLA VERIS CAVLIFERA, FLORE luteo pleno, odorato.

DE hac Gesnerus hort. scribit: Primulæ Vere species magis colorata & odorata, quæ Vere floret: cuius genus dasypodium seu densifolium habeo, inquit, quod semen non profert.

Tabern. in Icon. & Hist. pingit eam sub titulo Primulæ Veris multifloræ, gesn. Schüssel blumit.

C. Bauh. Pin. Verbasculum, flore multiplici 1. (7. phyt.) siue hortense multiplex, Primula hortensis Anglica Lobelij. Hanc nos aliam statumus.

Frequens in variis Germaniæ hortis occurrit: La floret maio. Flore maiore obferuant Argentinæ magis luteo & odorato apud D. Frid. Meierum.

PRIMVLA VERIS CAVLIFERA PALLIDO flore, inodoro, aut vix odoro: Et alia maxima flore pleno.



& loculamenta, vt in illa.

Primula flore pallido radice conuenit cum eam in initio descripsimus, vt & caule: at folia aliquando maiora: flores laciniati, pallidi, nullo odore commendabiles, similes floribus Primulæ Veris odoratæ cum singulis pediculis, colore, & magnitudine: semen

Herba

Herba paralyſis alba, Brunſel. com. t. chap. 15. Secunda & ſylueſtris, Trago: Verbaſculum non odoratū ſive alterum, 10150 Schuſſelſtumen/terij hincſchluſſel. Fuchſio. Verbaſculum album, Dod. gall. Primula Veris maior, floribus pallidis ac diſtinctis coloratis, quaſi albidis Doſ. lar. Ant. d. ximus Doſ. t. xam. minus diſtincte ſcribere de hac Primula Veris caſus iconem exhibet, qualem Lobel. habet, vel etiam iconem eius quæ pleno flore eſt. Arthritica, Primula Veris, Herba ad paralyſim, Herba Petri Nic. Myreſſi, in fine Hiemis erumpens, pallidior & minus odorata, Geſn. hort. Primula Veris, Herba Paralyſis elatior pallido flore, Cluſ. Pan. & Hult. Primula Veris floribus pallidibus & foliis grandioribus, odoris nullius Lob. in Adu. Primula pratensis luteo pallida inodora in Obſ. pag. 305. Ic. Pl. p. 568. Primula ſilu. 3. vel 1 in ordine 5. Tabern. Primula Veris, Paralyſis ſilu. Thal. Alſinatis ſive Damoſonij genus alterum Plinij: ſecunda ſpecies Fab. Col. Verbaſculum flore ſimplici 2. ſive pratensis inodorum C. Bauh. phyt. & P. nce.

Primulæ Veris ſus multiplex, Dod. Primula veris elatior polyphyllus ex Anglia in Belgium allata, Cluſ. Primula Veris pallida in hortis Anglicis & Northmannicis culta, ſorum malorum procreta & ſæpe u. multiplici, triplo aut quadruplo omnium Primulæ magnitudine & elegantia prima, Lobel. in Adu. Primula hortensis Anglica omnium maxima & ſerotina floribus plenius, Obſ. p. 305. Ic. Plant. pag. 567. Primula Veris multiflora ſylueſtris, Primula 3. vel ſilu. Tabern. Arthritica pleno flore, Camer. Primula hortensis Anglica Lobelij, H. Lugd. p. 84. Prim. Veris Anglicana ſilpenſi, Eyt. C. Bauh. in Pin. Monitus ante nos diſſidere à Caſp. Bauhino in eo quod putet Primulam Anglicanam Lobelij eandem eſſe cum odorata Plin. pleno: Belgæ & Angli diſcedunt.

Idem ſerè locis quibus lutea odora pronenit pallens inodorata. In pratis circa Tigurum abundat. In Auſtria, Stiria, Pannonia & in pratis reperit Cluſius. Montbelgardi in dumetis & ſiluolis ſloret. Aprilii.

PRIMULA VERIS FLORIBUS EX SINGVLARIBUS PALLIDIS MAIORIBUS SIMPLICIBUS & plenius. Item alia flore albo.

Radix longa, fibroſa guſtu adſtringente, Aniſum redolente, promit multos pedunculos, hirtulos, teretes, exalbidos, radicem verſus leuiter purpurantes, ſemipalmates & palmates, quorum ſaltigio inſident è calyculo oblongo pentagono, angulis hirtulis prædito, colore herbaceo, quinquepartito diuiſo, flores ex languſcente luteo palliduli, vnguibz croceis, quinque foliis cordatis conſtantes, odore ſerè euanido, in quorum medio reconduntur altè ſtaminula lutea, piſtillo herbaceo capitulo viride proferente: In ſingulis pediculis ſinguli flores, ſimiles Primulæ Veris inodoratæ, cui etiam ſimilia folia rugoſa, nervis hirtulis pronam partem percurrentibus, oblonga, obruſa, ſupinâ parte gabra, ſapore non adeo adſtringente atque radix.

Ludere in hortu Ill. E. C. Montbelg. obſeruauit ſlorem duodecim foliis cordatis ſtipatum. Ex eodem etiam calyce prodiit ſlos geminus, ſuo quicque corniculo nixus: vni quidem folia ſeptena, alteri quina: ipſe quæ adeo calyx totidem conſta-

Tom. III.

bar pinnatis cæſuris, quot ſimul vterque ſlos foliis. Flore etiam pleno accepti Argentia.

Trago dicitur Herba paralyſis ſylueſtris. Geſn. hort. Primula Veris, ſive Herba ad paralyſim, circa Curiam Rhætorum naſcens, peculiatis, flore ſingulari, non in corymbis: Eidem in ep. ad Fab. Cur. Arthritica ſpecies rara, floribus ſingularis, non in corymbis: Item, Arthritica ſpecies, ſingulos flores ſingulis periolis ſuſtinentes: In epit. ad Zyving. Arthritica hyberna: Dod. gall. Verbaſculum minus, officinarum Primula Veris minor: lar. Primula veris minor, floribus pallidè luteis, pediculis tenuibus.

Primulam Veris, Herbam paralyſis humilem flore pallido, ſive *deuſhor*, Vngaris *ſartha verag*, hoc eſt, pulſis ex Panico & Milio cōfectæ [quam illi Kacha vocant] ſlorem dictum, Cluſius in Anglia flore omnino niteo conſpexit.

Syluarum primula [Lobel. in Obſ. pag. 305. & Ic. Plant. pag. 368. inſcribitur.] Tabern. vocat Primulam ſilu. 2. Columna, Alſinatis ſive Damoſonij genus alterum Plinij.

C. Bauh. phyt. & Pin. Verbaſculum 3. ſive ſiluarum minus ſingulari flore, Primulam Veris ſilu. ſtrem flore pallido. Eyt. Herbam paralyſis Cæſalp. Arthriticam caule exiguo, vel nullo, Camerarij. Eidem in Pin. Verbaſculum flore multiplici 2. [6. in phyt.] ſive ſylueſtre magno plenoque flore, Primula Veris ſyluarum fl. pleno ſpecioſo Eyt. flore multiplici H. Lugd. Primula Veris multiflora ſilu. Tabern. Prim. Veris fl. pleno Ger.

Circa Curiam Rhætorum tota Hyeme ſloret, Loc. & ſi nix ſinar. Maxima copia in Vngaria cædulis ſilu. & in Anglia flore albo etiam in cædulis ſilu. abundè lactei candoris obſeruabat Cluſius & in Belgium mittebat. Lubentius hæc nemoroſa, vmbroſaſque conualles ſectatur: vt in Anglia, Delphinatu & Sabaudia, Flandris & Gallis hortensis. Bononiæ, Veronæ, Ferrariæ, & Patruij paſſim ſloret in hortis meſe Februario, Martio, & Aprilii.

PRIMULA VERIS FLORIBUS PLENIS ex ſingularibus pediculis.

DE hac ante mentionem fecimus ſub hoc titulo: Primula Veris floribus ex ſingularibus pediculis, &c. Hanc pingit Lobel. in Icon. Pl. p. 265. tom. 2. pro ſyluarum Primula Veris flore pleno ſpecioſo.



In hortu Ill. E. C. dono D. Frider. Meieri habui, qui Argentinae aliam oſtendit flore, albo pleno, vnguibz luteis, quæ deſloruerat Menſis Maij 14. die.

PRIMULA VERIS FLORIBVS OBSCVRE
virentibus fimbriatis.

Descriptio



Silicium P. d. fimbriatis floribus, rugosis p. platis, & coloris obscurè virentis. Lodi- ni heros frequēs, alioqui affinis ceteris a: horel. obelio Adv. qui in Obs. p. 306. Ic. Plant. p. 469. titulo p. q. poito donavit. Tabern. dicitur in Ic. & Hist. Primula filu. flore viridi, Primula sexta: Gesn. hort. Arthetica gen^o odoratum flore virenti: Dod. lar. Primula Ve-

ris minoris species floribus herbaceis, obscure- que virentibus, & quandoque foliis multiplicatis. Icon quæ proponitur à Lob. & Tabern. pro Primula Veris floribus obscure virentibus flores habet plenos. Quare mirari subit L. belium non annotasse plenos esse. Ea icon optinè repræsentat Primulam Veris cum floribus plenis ex singularibus pediculis: veretur ne Lobelius viderit siccos flores, in quibus color facile deperditur, alio successu temporis apparente, si in sic- candis non summa diligentia adhibeatur. Summa fuit opera Clusij in annotandis Primulæ Veris differentiis, verum viddium colore non me- minit. C. Bauh. phyt. Verbasculum 4. huc sil- uarum minus flore singulari, quandoque multi- plici: Pin. Verbasculum flore multiplici 3.

Lobel. net.


PRIMULA VERIS MINOR
purpurea.

Descriptio.



Fibrosis Pri- mulæ vulga- ris radibus hæ- ret, & quarum capite folia pul- lulant numero- sa teræ incumb- entia, sex åtoli- lógitud. ne, lati- tudine vnciali- cit: cū circa terra- ta, subter inca- na & neruorum viddium dif- cursu, virgata, superius viren- tia: inter hæc caules surgunt plures dodian- tales & brevio- res, nudæ, eno- des, in quorum

Icon alia.



caumine vm- bella sedet flo- rum numero- forum semun- cialibus pedi- culis herentiu, floribus Auri- culæ vrsi re- spōdentiu, co- loris purpura- scentis.

Huc per om- nia similis mi- nor species, caule trium, quatuorve vnciarum, foliis penè A sinces vulgaris & etiā dimidio mino- ribus, vix ap- parē ibus cren- nis: floribus paucis, vno sc- duobus, vel tri- bus.

Cū autem in figura **O**stra Fuchiana flores minū, benè exprimentur: paruum plantam ex nostris curauimus piogendam, simulque maio- rem ex Clusio assumptimus.

Coronarij puniceæ quæ flores, foliis ad peren- nem radicem oblongis, inferius candicantibus, Cordo in Obs. filua. Arthetica, Primula Veris minor cæruleis flosculis, Gesn. hort. Paral- ytica alpina, Sanicula angustifolia maior, flori- bus rubore & candore confusis: primula Veris foliis Gnaphalij mentian longioribus: floribus purpureantibus, aut ex roseo & albo confusis micantibus, Viennæ Austriae à Clusio missa: Item, Sanicula alpina minor, siue media, folio minore tantillum crenato, floribus non dispari- bus, Lobel. Obs. pag. 307. Icon. Plant. pag. 570.

Complator Tabern. Primulam Alpinam me- diam, siue secundam: itemque Primulam Alpi- nam angustifoliam, siue tertiam, confusè ponit cum Auricula vrsi.

C. Bauh. phyt. Verbasculum 8. siue caruleum umbellatum: Item, Verbasculum 9. siue Alpi- num angustifolium maius: Et, Verbasculum 10. siue Alpinum angustifol. minus: Eadem in Pin. Verbasculum Alp. siue umbellatum Alp. minus Muele, Cord. Obs. Arthetica vñse Gesneri, monente Cameratio: Verbasculum Alp. siue cæ- ruleum H. Lugd. pag. 126. Sanicula Alp. minor siue media Lobelij H. Lugd. Primula Veris flo- re rubro, Gerardi: Arthetica flore purpureo, Camerarij: Primula Veris angustifolia rubra & alba, Eyst. Item: Verbasculum alp. siue um- bellatum maius: Gesneri Simleri: Paralytica Al- pina, Sanicula angustifolia maior Lobelij H. Lugd. Primula Veris albo flore Gerardi, va- rians floris colore, albo, rubro, & rubore & can- dore confuso.

Clusio videtur Gesneri Resperstij: & Cæsar, inter herbas aut Regulus: Austriacum thizo- toma: vñstia aer. & siam pot. vñstia aer. nio: Rusticorum Anglorum: Quidam: hoc est, Aulium oculi, teste Pennzo.

Spontè magna copia prouenit in vliginosis & humidis

midis pratis. Floret verò sub finem Aprilis & toto febr. Maio. Habuit etiam in horto Clusius: in hortis tamen breui euaneſcit.

Quantùm ex guſtu deprehendere licuit Cluſio, iſdem facultatibus eſſe præditam collegit, quibus aliæ Primulæ Veris pollent.

CORTVSA.

CAP. CXXVI.



Cortusæ folia pediculis à radice mox natis hærent, sextantali quoquoerſus latitudine, aut maiore, circumſcriptioneque rotundâ, æqualitatem intercipientibus profundiusculis caſuris: *caules nudi & e-nodes foliacei in cacumine gerunt caulem ex quo ſeni aut plures prodeunt pediculi, ſeminales, ſinguli florem vnum*

gerentes Auriculæ vñs floribus respondentem, quinque purpureis conſtante foliis, umbilicum obſidentibus luteis apicibus, è quo etiam ſtylus longiuſculus extra florem prominet: *radix ſub-eſt à fibris numerofiſ contexta.*

Hanc in Pin. demum agnouitſe videtur Caſp. Bauh. reponēs eā inter Saniculas Alpinas, cognomināſque Saniculam rotundifoliam i. ſive mōtanam latifoliam laciniatam; Cortuſam Matth. Caſt. H. Lugd. & Camerarij, Caryophyllatam Veronēſium ſ. Saniculæ Viſinæ Lobeli in Ada. & Obſ. p. 397. 1c. Plant. p. 699. Saniculam montanam Cluſij Hiſt. alteram in Pann. Saniculam Alpinam Tabern. & Gerardi. Duplex, inquit, ſigura apud Cluſium, Tabern. & Gerardum i. Sanicula montana Cluſ. Hiſt. Sanicula alpina Cluſij II. Cortuſa Matthioli, Cluſ. Hiſt. & cur. poſt. Saniculæ alpinæ icon verior, Tabern. Cortusæ rarior icon, Gerardo: In ſigura Saniculæ Cluſij, qui fuſe deſcribit, malè auerſa parte puncta al-perfa ſunt. Hæc ille.

De Cortuſa hæc ſcribit Matthiolus. Sed de Caryophyllatis hæc ſenſus. Quarum gratiſſimus odor aliam mihi plantam reuocauit in mentem non minoribus fortalſe viribus inſignitam. Cortuſam hanc appellare libuit, quod à Cortuſo Viro optimū primum hæc planta reperta ſit. Prouenit hæc foliis ferè vitigineis, ſed longè minoribus, ſubrotundis atque ſubſperis, ſtringenti quadatenus ſapore, & longis nitentibus pediculis. Caules e-dit tenues, rectos, foliis nullis reſertos, ſed qui in cacumine magno naturæ artificio flores gerant, extrema parte purpureos, intima verò aureo ſul-gore ſplendentes, aureſque ſtaminibus intus reſertos. Radicibus nititur numeroſis tenuibus ac prolixis. Eſt etiam quæ violaceos, & quæ candi-

Tom. III.

dos flores gerat, ſed prima frequentior. Naſcitur locis vmbroſis nunquam à ſole illuſtratis, creta- Locus. ceo & albicante ſolo. Nuſquam hæc plania ab eius inventore Cortuſo viſa eſt, præter quàm in agro Vicentino, in eo tantùm tractu, quem vulgò appellant *Valle-ſagna*. Tota plena dum recens eſt gratiſſimo ſpirat odore, melleis ſauisferè ſimili, ſed longè admodum gratiori ac vehementiori. Sed in ſicca euaneſcit. Expertum eſt valere hanc plantam ad mulcendum neruorum & articulorum cruciatus à quacunque cauſa exortos. Nam ipſius floribus in amygdalino oleo recenter preſſo & roſaceo. quod completum vocant, pari pondere commiſtis. diu inſolatis, ſit ad hoc medicamentum preſtantiſſimum. vbi egelidum illinatur. Nec ambigo quin tota planta adſtringere ac roborare, & vulnera, vlceràque ſanare valeat. Eà recentiores vñtur porà ad thoracis interna vulnera. Quin & eius ſuccum, admiſtâ erugine cuniculoſis, contumaciſque vlceribus vtiliter iniiciunt. Eadem olfactu ſpiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. Epota prodeſt cæliaciis. dyſentericiſ, ſeminarum profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus ſumpta. quàm foris illita enterocelis auxilio eſt. Temperamentum ei excaſciens & exiccans. vt maniſeſto ſunt indicio eius radices: quippe quæ guſtu odoratæ, adſtringentſque deprehendantur. Quibus qualitatibus, non modò attenuare, diſcutere, & adſtringere valent, ſed etiam roborare.

Odor. Vires.

AVRICVLA VRſI FLORE LVTEO.
CAP. CXXVII.

Maior eſt Descriptio, quàm rubra: foliis per terrā ſparſis, non paulò maiorib, palmariſque, ſextante latiorib, craſſis. per extremum rotundis, modò leuiter ſerratis, modò minimè, ſaporenō nihil amaro: *caules ſeſquipalmares, ſtores in cacumine gerunt poſitu & figurâ Auriculæ vñs rubræ, ſed colore*

luteo inſignes: *radix* craſſitudine digitalis, ſibras longas multàſque è lateribus proſert.

Non dubium eſt, inquit Cluſius, qui Auriculæ Cluſ. deſcri. vñs primæ inſcriptione pictam & deſcriptam exhibuit, quin ad Primularum claſſem referenda ſit venuſta hæc planta, adeò ſimiles ſunt & formæ, & temperamento.

Matth. in Dioſc. Saniculæ genus Germanorum, *Sanicula* & aliquorum Herbariorum Auricula vñs. Geſn. hort. Arthritica genus alpinum, Sabaudis quibuſdam Lunaria nominatum. Eid hort. Lunaria arthritica. Item de Lunar. p. 21. & 24. vbi figura, herba Iuliana, Sabaudis dicta. Circa Bergamum in Italia Folium montanum: quibuſdam mōtium

Bavarie incolis, Morfus Diaboli. De coll. stirp. Arthritica montana, quam aliqui Lunariam, aut Folium montanum vocant. Arthritica Alpina lutea. Arthritica montana saxatilis: Arthritica montana petrea.

Paralyticam Alpinam, [ita in Icon. Plant. pag. 569. & in Obl. p. 306. vbi etiam Saniculam Alpinam, & Auriculam vrsi luteam vocat,] interdum frequentiore & maiorem vidit Lobelius, foliis, cauliculo, & flore, qui tamen non purpureus, sed luteus, aut albus, & fuscedine pullus est. In montibus arduis calidarum regionum cauliculos & folia emittit maiora, & interdum longè minoras: specie tamen aut parura non diuersa. Luteo pallentis Saniculæ eadem ratio maioris & minoris, inquit ille in Obl. vbi Britannicam Anguillaræ esse contendit, absque tamen sufficienti ratione.

Tabern. Icon. & Hist. Primula alpina latifolia (floribus sc. purpureis) aros alp. Schlüsselfl. Men. Et Ic. Auricula vrsi floribus pallidis, Hest. berg. Sanicel. Hist. Auricula secunda. Item, Ic. & Hist. Auricula floribus, luteis, qrsberg. & Sanicel. Rursus Ic. & Hist. Auricula vrsi floribus aureis, qst. ge. beer. Sam. Fel. Tandem, Ic. Auricula vrsi Beer. Sanicel. Hist. Auricula vrsi 7. flore luteo. Compilatore Tabernemontani oportet stirpium penitus ignarum fuisse, vt qui vnam eandem plantam tribus diuersis tradit capitibus, interpositis aliis plantis. Præterea quam vocat Primulam Alpinam, est figura Matthioli, cui tribuit flores purpureos. Poneit quinque figuras non differentes.

Auriculam vrsi, flosculos ferentem plerique locis luteos, aut albidos, alibi purpureos, aut dilutè rubentes, ad Primulas Veris pertinere testatur Dodonæus. Recentiores tamen in Solidaginum numerum adscribunt.

Columna Alisma atque Damasonium Dioscoridis & Plinii facit, sicque cognominat à vi propullandi venena, & non vt Lobelius, à voce ἀλίσμα, maris allisionem sonante. Alceam præterea nuncupari refert, floresque ex albo lutescentes habere, haud multum odoriferos. Rectius autem Neoterici à forma foliorum Auriculam vrsi vocant. Columnæ tamen Auriculas vrsi ad Alisma siue Damasonium Dioscoridis, referentis sententia valdè acquiescit Clusius. Austriacarum Striacarumque Alpium incolis Erassivater trahit & Schwiedel rait ab effectu dicitur. Comendant enim eius radices vsum, ad roborandum caput, ne vertigine in præcipitiis tentetur,

cuius rei causa, caprearum & ibicum venatoriibus non minùs familiaris quàm Dorowici radix. Medlingenses apud quos copiosè nascitur, vros schmedend. Schlüsselfl. i. e. Primulam odoratam appellant.

H. Lugd. pag. 316. Primula Veris pachyphyllus. Synonym. Cæsalp. Auricula vrsi seu lupi. Cast. Auricula vrsi. Camer. & Eyst. Auricula vrsi floribus luteis: C. Bauh. phyt. & pin. Sanicula Alpina i. siue lutea, Sanicula Alp. foliis serratis.

Copiosè nascitur in agro Goritienfi monte Saluatino, vt & in variarum Austriæ & Stiriacæ alpium iugis, vbi obseruauit Clusius florentem Iunio, interdum Iulio & Augusto duntaxat, videlicet statim post solutas, in iis iugis, vbi crescit, niues, nonnunquam etiam sub ipsa quasi niue, & concamerata niuis indurata crusta, reliquæ, quæ subter erat, Solis radiorum rupes ferientium repercussione soluta. In hœtos verò translata Aprilis floret, & aliquando iterum Autumno, si aura sit temperatior, illis exceptis, quæ vel contabuerunt, vel nullâ diligentia, aut cultura ad florem ferendum induci potuerunt.

Cæteris Saniculis præfertur ad enterocelas, & thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia vulnera, tam intus sumpta, quàm exterius illita: Frigida & sicca est & adstringit, teste Matthiolo & Dodonæo. Gesnerus libro de Lunariis herbis, radicem vinum suo odore commendare scribit, manducatam verò, dentium dolores, præsertim à frigida defluxione obortos iuuare, capiti frigido & partibus nervosis prodesse, putrida vlcera emendare, scissuras in cute hiantes, ventorum, frigoris, aut alia quapiam iniuriæ, succum eius instillatum brevissimè sanare. Istic vbi nascitur, Soli, vt dixit Clusius, montani venatores eius radice ad corroborandum caput, ne vertigine tententur, vtuntur: à reliquis negligitur, præterquam mulierculis, quæ ex eius floribus sarta & corollas conficiunt. Columna huic nostræ plantæ, vites Primulæ Veris & Alismatis Dioscoridis adscribit.

Supererat aliquot Auriculæ Vrsi species, nonnullæ alia capita, quæ pro Instituti nostri ratione superioribus in hocce Libro subnectenda erant, quæ cum lapsu quodam typographico loci huius esse non possint, in Appendicem huius Tomi relegantur: Inibi igitur habebit Lector Reliquas Auriculæ Vrsi species, vt & Chamaejasmes Alpina: Saniculaque iidem Alpina minima pilosa C. Bauhini, necnon Verbascorum & Blattiarum ac Chrysogonorum historiam.

Compil. not.

Alisma ac
Damasonium
Plantæ
Diosc. Co-
lumnæ.

FINIS LIBRI TRIGESIMI.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXXI.

NERVIFOLIA, VT PLANTAGINES, GENTIANÆ,
POLYGONATA, HISQVE NONNIHIL SIMILES.

Petræla sanè magna ex parte Coronariarum natura est. quarum ineffabiles varietates non minùs ostendendo nos placuisse speramus, quam naturam eas præbendo, cum hunc genium nobis largitus sit D. O. Max. ut à se largitas indagaremus curiosius ipsi, ut ostenderemus aliis. Nunc aliò gressus dirigendus. Est vbi ex fructu, est vbi ex flore, est etiam vbi ex radice stipitum classes melius asimes: nunc ad folia maximè respicere lubet. Ergo, hercle, has nunc perlostreremus, quarum folia cœu parallelis costis atque nervis nobiliter instructa sunt, & his affinitate proxima. Quanquam si & aliò respicere lubeat, est ut speciatim aut caudæ culminis similitudinem in plerisque contempleris.

PLANTAGO VETERIBVS.

CAPVT I.



HEOPHRASTVS simpliciter Arnoglossum vocat, aliquando Stelephuron, vtrumque verbum à Theodoro Plantago vertitur. De Arnoglossò inquit: Ab radice tantum foliata est: proterogatos suos prouentus ex sin-

gulis floribus: alibi Stelephuros, inquit, spicosa, quæ Agnina lingua à quibusdam vocata est, & ab aliis Coturnix (Conturnix Cæl.) similis caudæ vulpinæ, nisi quòd florem non particulatim edit, sed per totam spicam, Tritici modicos lanuginis, ut Frumenti: Genere autem conuenit cum Oculo canis, & Bibinella, & Cauda vulpina, quæ spicam gerunt, non acutam, neque aristatam totâ formâ cum Tritico similia, sed latiore folio.

Plinius scorsum de Plantaginis & Stelephuro agit: nam Stelephuros, inquit, proxima est Caudæ vulpinæ, nisi quòd illa particulatim floret. Alibi duo genera Plantaginis tradit, minorem & maiorem. Verba eius lib. 25. cap. 8. sunt hæc: Celebrauit & Themison Medicus vulgarem herbam Plantaginem, tanquam inuentor, volumine de ea edito. Duo eius genera, minor angustioribus foliis & nigrioribus, lingue pecorum simillimis, caule anguloso, in terram inclinato in pratibus nascens. Altera maior, foliis laterum modo inclusa: quæ quia septena sunt, quidam eam Heptapleuron [ἑπτάπλευρον, h. e. Septineruiam] vocauerunt. Huius & caulis cubitalis est & angulosus. Nascitur in humidis multò efficacior. Vis mira siccat.

Tom. III.

do densandoque corpore, cauterij vicem obtinens. Nulla res æquè sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Ita habet vetus Plinij codex, qui Dioscoridem, miras huius herbæ facultates tradentem variis aliis in locis sequitur & declarat.

Cæterum, caput Dioscoridis [quod nonnulli codices ἀπὸ ἀρχαίων ἐπὶ ἀνθούριον inscribunt, alius verò codex ἀνθούριον] sic habet. Plantago (ἀνθούριον). Orib. ἡ ἐν τῇ κυνέουσι ἡ ἀνθούριον) duum est generum: minor enim vna est, maior altera. Ac minor quidem foliis prædita est angustioribus, minoribus, mollioribus: cauliculus verò angulosus, ad terram inclinatus: floribus autem pallidis, ac semine summis caulibus emicante. At maior (τὸ ἡ μέγας). Sunt antigrapha, in quibus perodus à τὸ ἡ μέγας, vsque ad γένεσιν, h. e. nascitur, deest: sed teste Sarraceno, retinenda sunt omnia: & amplior lætiorque est, & latifolia, in oleis vsus apta [λαχνηώδης: Ald. λαχνηώδης: Caulis huic angulosus, subrubus, cubiti altitudine, à medio ad verticem tenui semine circumdatus. Radices subiacent teneræ, hirsutæ, candidæ, digitali crassitudine. Nascitur in paludibus, sepibus, ac locis vliginosis. Maior (μέγας ver.) porro efficacior est. Vim habent folia exsiccatoriam & adstringentem. Quare omnibus malignis, elephantiam comitantibus, fluxioni opportunis, sordidisque vlcibus illa conueniunt. Cohibent & sanguinis eruptiones, nomas: carbunculos, herpetas, & epimictidas, vetera quoque & inæqualia vlcera cicatrice obducunt.

K k k

Chironia sanant & sinus agglutinant. Moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, parotidibus, panis ac strumis quoque & ægilopiis cum sale imposita profunt. Coctum verò olus cum sale & aceto sumptum, dysentericis, cæliacisque subuenit. Datur & in locum Betæ (*βέτα*) & c. Hæc usque ad *βέτα* & *βέτα*, h.e. & suspensio datâ, in veteri margine reperuntur, Sarrac.) cum Lenticula (*λεντικὴ*) decoctum. Exhibetur & herba decocta ad aquam intercutem, cui Leucophlegmarie nomen est, post sciciorum alimentorum esum, ita tamen ut media cibis interueniat. Comitibus quoque & suspensio datâ proficit. Foliorum succus oris vlcera repurgat, si lubinde collatur. Cum cimolia aut cerussa erysipelatis medetur: fistulis infusus auxilio est: prodest & ad aurium dolores atque ophthalmias, seu instillatus, seu in collyria additus. Sanguinantibus sanguine putrescentibus, Plin.] quoque gingiuis, & sanguinem supernè reicientibus potu confert: clystere verò dysentericis (vet. addit phthiricis & dys.) infunditur. Contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ subditur in velle: re: quemadmodum & si vulua rheumatismo laboret. Semen ex vino potum alui profluuiâ & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix seu collata, seu commanducata, dentium dolores sedat. Eadem cum foliis ad vesicæ renūque vlcera in passo datur. Caterum, ferunt ternas radices cum vini ternis cyathis & aquæ pari modo tertianis febribus, itémque quaternas quaternis auxiliari. Sunt & qui radice vinculo è collo suspensa amuleti instar vtantur ad strumas discutiendas. Syri huius (leguntur hæc ad capitis calcem inter notha) & Calaminthæ jussulum cum melle producit mederi paralyticis [febris? Corn.] si secundâ & quartâ parasceues, i.e. Veneris die exhibeatur. Hoc autem velut arcanum accipito: est enim verissimum & experientiâ comprobatur.

Causa.

Temperam.

Macri Poësis.

Etymon.

Temperam.

Vulnera.

Nomina.

linguarum.

Plantago.

Vernum.

hinc.

At ut eas vires habeat plantago, quas Dioscorides & Plinius ipsi attribuunt, temperamentum eius mixtum facit: habet enim (ut Gal. 6. simpl. pharm. ait) aquosum quiddam frigidum, habet & quid austeri, quod terreum est, & siccum ac frigidum, ut refrigeret simulque siccet: & secundum ambo fecundi est à mediis abcessus.

De Plantaginis virtutibus elegantissima est Macri Poësis, quæ sic habet:

Herbam, quæ nostra lingua Plantago vocatur, Hanc à *πλανόχορ* Græcis vocat, est quia lingue Agninae similis foliis. Plantaginis huius Sum gemina species, & maior prima vocatur. Altera verò minor, quam vulgò lanceolatam Dicunt, quod foliis, ut lancea, surgat acutis. Huius inflammationis, deficiendique videtur Tertiū esse gradus: maiorem vim tamen esse Maiori dicunt: nimis humida vulnera siccant, &c.

Ceterum, à *πλανόχορ* Græcis dicitur & Latinis, quod folia eius agninae lingue simillima sint: Nonnulli tamen Arnion (*ἀρνίον*), quasi agninam, alii Probation (*πρόβητος*), quasi ouillam alii Cynoglosson (*κυνόγλωσσος*), quasi canis linguam, alii Heptapleuron (*ἑπτάπλευρον*), quod septem fibris seu costis in dorso distincta sit: alij Polyneuron (*πολύνευρον*), quasi multineuriam, appellant. Magi Caudam ichneuionis, Aegyptij Alchar, Romani Plantaginem, ducto à planta vocabulo.

Germani ab agni lingua *Eschaffungen* sed vulgò *in gett*: Belgæ *wechbre* vocant: Galli *Plantain*, & ut inter notha legitur, Turbidolpion: Itali *Plantagine*, & *Plantagine*: Hisp. *Lhantenu* *Tamehagin*: & voce spuria *Thefaricam*: Parni A-

sirocon. Angli *Plantayne*, Bohemi *Platay*: Hungari, *Plat* sūt, h.e. Viarum herbam. Neque aliæ maioris Plantaginis extant appellationes, nisi quod quandoque Rubra cognominatur.

Minor Plantago *μετὰνόςος*, sine Quinqueneruia, & Lanceola, sine Lanceolata: Germanis *Spitziger wegrich*: Gall. *Lanceole*: Belgis *houits ribbe*: i.e. Costa canina: Anglis, *Ribwortte*: Hung. *Hozzu* uti suū, appellatur.

Paucis, vnaqueque Plantago suum hodie retinet nomen.

Est enim Plantago maior folio glabro.

Plantago Rosca.

Plantago maior panicula sparsa.

Plantago marina magna.

Plantago rosea exotica.

Plantago maior hirsuta & media.

Plantago quinqueneruia cum globulis albis pilosis.

Plantago incana & lanuginosa minor.

Plantago lanceolata foliis lanuginosis, & longis pilis hirsutis.

Plantaginis lanceolatæ species minima.

Plantago latifolia minor.

Plantago angustifolia maior, caulium summitate foliosa, & alia spicata.

Plantago angustifolia minor, spicâ hirsutâ albâ, foliis ex atro virentibus valdè villosis.

Plantago angustifolia alpina.

Plantago umbilicata.

Plantago Indica, Payco acris.

Plantago maritima à Dodonæo exhibita, quæ depingitur à nobis Coronopi marini nomine.

Plantago aquatica, cuius varias species trademus lib. 38.

Qualis sit Fistula pastoris, Plantago Italica, Damafonium, Alisma, vel *sch weari*, Eucharis Roslin pronunciare nondum queo. Barba siluana à recentioribus Medicis inter Plantagines aquaticas reponitur. Nos Sagittam vocamus. Sunt qui Bifolium maius Plantaginem palustre appellant lib. 38. Alii verò qui Plantaginem alpinam quorundam vocent Alisma.

PLANTAGO MAIOR FOLIO GLABRO, non laciniato, ut plurimum.



Digitali crassitudine radix est, lateratim, ut Lobel. ait, fibrosa, candida, & in medio præcisa, siue mutilata, Morsus Diaboli ferme modo: folia rotundiora, sui medio latiora, glabra, septem nervis distincta, humi accumbentia, sapore, ut mihi videtur, aspero, cum aliqua acrimonia & amaritudine: caules pedales, lentes, thyrsum & veluti spicam florum stamineorum albi.

albicansium, Lobelio obscure purpureorum & pullorū, proferunt; semen sublongum, obsoleti coloris, Lob. Portulacæ pusillum fuscū aut ruginēū

Trago, Fuschl. Corn. Turn. Matth. Anguill. Dodon. gall. & lat. Lon. Camer. hort. Tabern. Schuuenkf. & Castori dicitur *Plantago maior*. Brunfels. & Trago *Plantago rubra*. *Plantago latifolia* Cordo in Diosc. & Gerardo. *Arnoglossa* & *Plantago maior latifol.* Lob. *Plantago vulgō* Cæsar. *Plantago maior* in Diosc. *Plantago maior seu rubra*, Thallio. *Plantago latifol. maxima sinuata* C. Bauh. phyt. Eidem Pin. *Plantago latifol.* 2. siue sinuata. Schuuenkf. *aprylæuros* Dioscoridis. Ab omni memoria peruagata notiois, ex utilitate & feracitate vbius gentium penē immensa. Plurima humectis locis, in aruis, hortis, secus itinera, & sepes. Iunio floret, semen Augusto dat. Mistæ est temperaturæ, inquit Schuuenkfeldius. Habet enim quiddam aqueum frigidū, quiddam verò & austerrum, quod terreneum & siccum. Refrigerat & desiccant ordine secundo. Olus coctum estur. Dysentericis & celiacis benefacit. Comiciales & asthmaticos iuuat. Cum Lente Alicæue forbitione stomachū roborat, & hydropticis, qui leucophlegmatia laborant prodest. Vulneria est herba, vlcera & fistulas sanat. Succus aurium doloribus, & lippitudinibus oculorum vtilissimè instillatur. Gingiuis sanguinolentis, & sanguinem reicientibus potus confert, phthisicis & tabidis salubris. *Radix* crassiorum est partium, minus refrigerat, siccant & nonnihil abstergit. Dentium dolores mulcet collusione. Iocinoris obstructions tollit. Ronum & vesicæ vlcera sanat. Semen siccioris est facultatis & minus frigida, subtiliusque partium. Alui fluxus, dysenterias & vteri hæmorrhagiam sistit. Liqueor stillatitius calidas podagras in primo impetu mitificè lenit: Hydropicis vtiliter bibitur.

PLANTAGO ROSEA.



Plusquam pollicari *radice* perennat: *folia* per terram spargens *Plantaginis latifolia*, pilosa & nervosa inter quæ *caules* surrigit litiis crassos, hirsutos, in quorum fastigio *folia* crebra, inferioribus dimidio minora, interiore orbita. Alifines, admodum parua, vilescentia, Rosam deformant.

Cæsalp. vocavit *Plantaginem foliato caule*, frequentem in Germania. Dod. *Plantaginē cum spica Rosea* instar. *Plantaginē roseam spicata*. Ger. & Eysl. *Plantaginē multiplicem* Tabern. Ic. & Hist. *Plantaginē roseam* Lob. in Adu. *Plantaginē roseam vulgarem*. sine icone & descrip. Clus. Hist. post. *Plant. roseam* Penz. H. Lugd. p. 1256. *Plantaginē 2. siue latifolia maxima rosea* Tom. III.

flore C.B. phyt. Idem Pin. *Plantaginē latifolia* siue roseam, floribus quasi in spica dispositis.

Basileæ Iunio mense florentem vidi in vase famam à Theod. Zvingero. In horto Ill. E. C. rosea nec Augusto.

PLANTAGO MAIOR PANNICVLA

sparsa.



Sola differētia Belgicis agris & hortis, in pannicula spicati sparsa, onusta innumerā herbaceorum flosculorum, racematim coherentium, fœturā.

Dicitur Lob. Obseru. p. 162. *Plantago rosea pannicula sparsa*: Sarathrodes & Corematophora, siue Scoparia Gemmæ: Roseæ *Plantaginis*

varietas. Ic. Plant. p. 305. *Plantago pannicula sparsa*. Dod. gall. *Plantaginis primæ siue maioris species alia*. Lat. in fol. *Plantago maior spica multiplici*. H. Lugd. p. 1256. *Plantago rosea* Lob. C.B. phyt. *Plantago 4. siue latifol. maior spica multiplici*. Eid. Pin. Pl. lat. 6. siue spica multip. sparsa.

Plantago marina magna.

Spithamæis pediculis nituntur *folia*, pari cum pediculis longitudine, palmum lata, acuminata, crassa, septem nervis donata, sapore cum *Plantagine septemneruia* terrestri eodem, nisi admixta esset falsedo quadam: *caules* cubitales, nudi, thyrsis longis *florum* insignes, quos *semina* sequuntur, iam dictæ *Plantaginis* similia: Hanc situs loci fortè diuersam facit videri à vulgari *Plantagine* maiore glabra.

Apud mare florentem vidi mense Maio, semenque proferentem Augusto.

PLANTAGO ROSEA, FLORE EXPANSO.



Huius *flo-* *rem* addidit Camerarius apud Matthiol. in Hist. germ. & Epit. *Plantaginis maioris*. In horto vocavit *Plantaginē roseam*. Sic quoque Lobel. in Icon. Plant. p. 304. appellauit, & Eysl. *Plantag. roseam exoticam* Gerard. Plant. la. *foliam 4. siue roseam*

h. k. a. 2.

C. Bauh.
1. et.


flore expanso C. Bauhin. in Pinace. *Apparet* C. Bauhinum loco citato non parum titubare, dum Plantaginem roseam Aduersariorum ad hanc refert: dumque rursus eandem [Plantaginem roseam Penz., H. Lugd. p. 1256.] ab hac nobiscum separat. Ipsum eadem Icon, eademque verba satis redarguunt.

Eandem cum prædicta, aut certe valde similem Clusius describit vocatq; Plantaginem 2. siue latifoliam exoticam, Plantaginem peregrinam latifoliam Gareti.

PLANTAGO MAIOR HIRSVTA, MEDIA
à nonnullis cognominata.

Icon. Guarin.

Descriptio



Icon Lobel.

Synonyma



Plantago
m. 1. et.

lia: Eid. Hist. germ. Plant. media vel alba, Dioscoridi & Plinio fortè non nota. Cordo in Dioscor. Plantago 3. latifolia similia habens folia multò tamen minora & leuiter hirsuta. Tab. Ic. & Hist. Plantago minor Dioscoridis: Plant. 4. Lingua ouina. Lobel. in Adu. & Ger. Plantago

incana. Lobel. in Obs. p. 162. Icon. Plant. p. 304. & Clus. hist. Plantago maior incana. Turn. Plant. minor. C. Bauh. phyt. Plantago 3. siue latifolia 3. siue incana: Eid. pin. Plant. latifolia 3. siue incana: Cynoglossa quorundam, Lugd.

Aplozhaucor puzi, Plantago quinqueneruia, mittel weacrich, weacbreut, weacrit (inquit Schyvenckf.) in hortis & secus vias, vt maior glabra, nascitur, eiusdem facultatis. In Germania abundè frequens. Æstatis tempore, vt cæteræ, conspicua, atque vnà cum spica reperitur: Hyeme quoque, vt aliarum, sola restat radix, haud facillè periens, teste Dodonæo.

Quum Plantagines refrigerent, repellant, adstringant, & glutinent, haud consulerim applicandam commoritis à cane rabido, aut à serpentinibus, licet multi Neoreticorum ad eos morsus commendent. Moribus canis [inquit Schyvenckf.] ambustis, inflammationibus, calidis podagris, folia conueniunt. Tusa addito salis modico luxatistis dolores & tumores tollunt.

PLANTAGO QVINQVENERVIA CVM
globulis albis pilosis.



Numerosa per terrâ spargit folia, quinqueneruia, hirsuta, coëuntibus pediculis in caput radices, ita vt propter tomentum coitus vix appareat: latitudo iis feminalis, longitudo sextantilis: caules multi, alij erecti, alij supini, palmares & spithamæ, capitula gestant, tomento albo villosa, iulos

Salicis imitata.

C. Bauhin. phyt. vocauit Plantaginem 8. siue Plantagini similem alteram. Pin. Plant. angustifoliam 8. siue panniculis Lagopi.

Floret mensè Aprili ad ripam lacus Aluenfis, montem Seti, & Balneum Baleructi, vbi obseruauit cum essem Monspeluli.

Plantago incana & lanuginosa minor.

Vulgari minor foliis incanis, multâque lanugine obductis, humi stratis, maxima anni parte caule vidua, & floris expers: inter multas tamen plantas, nonnullas animaduerteat Clusius Maio mensè ferentes exiguum spicam Plantaginis instar, minorem, plenam florum pallefcentium. eius radix tenuis, longa & nigra erat.

C. Bauhin. phyt. Plantago 6. siue Salmaticensis: Eid. pin. Plantago latifolia 10. siue villosa, seu incana lanuginosa.

In collibus Salmanticæ vicinis, aliis item Castellæ locis aridis obseruatur à Clusio.

PLANTAGO

PLANTAGO LANCEOLATA.

Plantago quinqueneruia longiuicula & fibrosam radicem demittit: caules Maiori pares, profundè striatos, lobhifutos: *florem* Maioris amulum: *folia* verò plurimùm differentia, lanceæ mucronem referentia, longis pediculis



appendis, oblonga, stricta, raris crenis leuiter ferrata, hirsuta, quinque neruis longitudinem folij percurrentibus, auersa parte conspicuè elatis: sapor subdulce quid mandenti offert, cum adstrictione. *Nomenclaturæ* græcè, Quinqueneruia latinè cognominare solent, eò quòd eius folia, fibris quinque tanquam neruis, distincta sunt:

Officinæ quoniam folium arctiùs definit in acumen, & veluti in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceolata; vulgus autem Lanceolam appellat. Germani *Flan oder Spissget wazgr. h* vocant, quia sc. acuminator & longior est: & ad equinæ costæ similitudinem *Ko, ripp*: Galli *Pe-sit Plantain*.

Brunfelsij figura Plantaginis minoris tom. 1. thapsi. non placet. Fuchsius pro minore medium pingit.

Dod. gall. & lat. Gefn. hort. Schvv. Lon. & Lac. Plantago minor. Cast. Plantago media. H. Lugd. p. 155. Plantago minor, longa Matthioli: Item, Plantago minor Dod. Corn. Lob. Adv. Obs. p. 163. Ic. Pl. p. 305. & Gerardo Plantago quinqueneruia. Cordo in Diosc. Plantago angustis oblongisque foliis. Trago, Plantago lanceolata, Plant. 1. vel minor, & Lanceola, Quineruia Manlij, Herlartum, Megehora & Herba Martis Phylsij, Matth. germ. Plantago longa, vulgò lanceolata, Anguill. Plantago altera dicta Lanciuola. Tab. 1c. Plant. Lanceolata: Eid. Hist. Lanceola & Lanceolata, Costa canina. C. Bauh. phyt. Plantago 9. siue angustifolia maior: Eid. pin. Plantago angustifolia 1. siue maior, Lanceola Maior Cæsalp.

Plantaginem *euclidior*, minorem, seu lanceolam, Thalius duplicem facit. Maior, inquit, folia profert bipalmata, sæpe duarum vnciarum latitudine ferè, quæ quandoque in ambitu vel pinnulis quibusdam paruis exornantur, vel omnino sine illis existunt. Altera minor folia breviora habet & strictiora. C. Bauhinus variare ait, spicis aliquando bifidis: aliquando loco spicarum, capitulis mirè variantibus.

Passim provenit locis & vis incultis. Floret initio Æstatis, semen Augusto legitur.

Siccior est & commendatior dote ad vulneratias potiones, vnguenta & hernias, etiam vulgi experimento. Ebrio datam copiosam in cra-

PLANTAGINIS LANCEOLATÆ species minima.

Radice prædita est parva, ad foliorum exortum valde villosa: *folia* gramineæ angustie. Descriptio.




duum aut triū vnciarum lōgitudine: caulium palmo longiorum cacumini capitulum breve & veluti glomeratum insidet.

Hanc esse æstimamus, quā Tabern. in Ic. & Hist. itemque Gerard: Plantaginem angustifoliam minorem inscribit: Cæsalp. Lanceolam minorem: C. B. phyt. Plantaginem 12. siue angustifoliam

minorè: Idem pin. Plantaginem angustifoliam 6. Facile crediderim à Lanceolata magnitudine tantum differre, idque ratione loci. Monspeßuli Septembri mente floret.

PLANTAGO LATIFOLIA MINOR.

Plantagini maiori in omnibus similem fecit Descriptio: Tabernamontanus, qui cum Gerardo Planta-



ginem latifoliam minorem inscribit. C. B. phyt. Plantaginem 6. siue latifol. minorem, & mediz genus minimū Thalii: Idem pin. Plantag. latifoliam 12. siue glabram minorem.

Dubium mihi est an Thalius & Tabern. de eadem Plantagine scribant. Tabern. suam C. B. nōd. refert ad rubrā, quam nos latifoliam glabram maiorem vocamus: Thalius verò suam videtur ad eam referre quam mediam Dodonæi vocat, et nos latifoliam hirsutam inscribimus.

PLANTAGO ANGUSTIFOLIA MAIOR, caulium summitate foliata: & alia spicata.

Anno 1612. Augusto mente Io Lannodus Delphinæ perquirent plantas horri ill. E. Kkk 3

C. Mont. reperit Plantaginem maiorem angustifoliam luxuriantem in dicti horti prato.

Icon Gerardi.

D. scriptio



Icon Clusij.



XX

stra quam descripsimus, in eo quod nostra tot foliola in supremo caule non habeat, & in eo quod ex foliolis prodeant duo cauliculi spicati. Quam ob rem Clusij Plantago exotica nostræ similior.

Quam C. Bauhinus in Phyt. Plantaginem 10. siue angustifoliam maiorem in caulem excrecentem vocat, eam in prod. & in Pin. Plantaginem 2. siue quinqueneruam caulium summitate foliosam cognominat, ac sic describit: à vulgari in eo differt, quod cauliculi spicam florum sustinentes, in caulem palmarem excrescunt, in cuius summitate, folia plura, eo modo quo ad radicem disposita: spicis non oblongis, sed rotundis, brevissimis pediculis lanuginosis insidentibus. In Pinace etiam vocat Plantag. angustifoliam tertiam siue proliferam.

Plantago angustifolia minor spica bifida alba, foliis ex auro virentibus valde villosis.

Radice est tenui, fibrosa, albicante: foliis aliquan-

do uncias quinque longis, strictissimis, atrouirentibus, tribus nervis distinctis, per marginem potissimum pediculis, pilosis: inter quæ cauliculi exurgunt, alij cubitales, alij pedales, alij palmares, aliquando triunciales, ad exortum aliquando villosi, glabri nonnunquam, quibus spicæ breues, oblongæ & subrotundæ insident.

Hanc descriptionis author, C. Bauhinus, facit in phyt. Plantaginem 11. siue angustifoliam alteram, vel minorem angustissimo folio. In prod. Plantaginem 3. siue trineruam angustifol. folio. Pin. Plantaginem angustifoliam 9. siue trineruam fol. angustissimo.

Sæpius hanc Plantaginem ad vias, maxime ad loca rudera author notauit.

PLANTAGO ANGUSTIFOLIA ALPINA



Radice cras. fuscula, longa, parum fibrata, circa caput crassescente, folia oriuntur ad lanceolata Plantaginis folia accidentia, sed multo angustiora, & circiter trientem uncie lata, sesquipalmaria, quinqueneruia, parum hirsuta, nigricantia, foliolis fuscula: caulibus ad radicem hirsuti, foliis longitudine æ-

quales, capita gerunt semuncialia, plantagineis nigriora.

An Gesn. hort. Lanceola montana. H. Lugd. Holosteum quorundam. C. Bauh. phyt. Holosteum 4. (3. Pin.) siue hirsutum nigricans. Genevæ in monte Thuri.

Plantago Indica, Payco acris.

Herba Payco nuncupata, Monardi ex Peru missa, tribuuntur (ex versione Clusij) folia Plantaginis foliis cum formâ, tum colore simillima, siccata quidem admodum tenuia, & gustata valde acris, calidæque.

H. Lugd. pag. 1919. meminit in Peru Payconis. C. Bauh. phyt. vocavit Plantaginem 7. siue Plantagini similem Peruvianam. In pin. Plantaginem latifoliam 7. siue Indicam.

Eius pulvis ex vino sumptus, nephriticum dolorem è flatibus, aut frigida causa provenientem tollit: ipsa verò planta cocta, & emplastri in modum dolenti loco imposita, eundem effectum præbet: quod certissimum esse ipsâ experientia didicisse Monardes testatur.

PLANTAGO VMBILICATA.

Radix ei Plantaginis vulgaris simillima, spithamum longa, creberrimè fibrata: è cuius nodulo

nodulo sine basi, digitalis crassitudinis, plantagineum, latum, vnicum, admirabili naturæ opificio, expansum *solum*, paulatim propagando in latum gyrum vmbilicatum excrescens, & Coclidis instar per circuitum ascendens, in spiras duas tantum, aut semiternas conuolutum, ac veluti ex pluribus coniunctis in vnum contiguisque Plantaginis maioris foliis conflatum, spichameæ, altitudinis aut pedalis ferè, cuius summum folium Plâtaginis latifoliæ seruat figuram, sinuosam tamen & rugosiorè, sapor illi prorsus plantagineus. E medio conuolutio sine vmbilicato, imò centro, foliorum quedam rudimenta conspiciuntur, è quibus caulem erumpere verisimile: De cæteris Lobelio qualificumque descriptionis auctori



nondum constabat: In Aduersantem vmblicum montanum Herbariorum vocat. C. Bauh. dicitur in Pin. Plantago latifolia 8. siue peregrina sinuosa.

Monspelio Londinum semine misso Lobelio à D. Casparo Pelliterio, in horto I. Nafmyth. Chirurgi & Archibotanicis mixtæ & raræ elegantie hæc orta planta.

PLANTAGINI ANGVSTIFOLIÆ similis Habbures.

Planta, quam Frater pro Habbures Camerarij misit, magnâ habet cum Holostio Monspeliensium similitudinem: *folia* sunt vncias tres circiter longa, angusta, in acumen desinentia, nervosa, hirsuta, sapore nullo insigni: *caules* a liquor eiusdem longitudinis cum foliis, rotundi, capitula plantaginea, longitudinis vnguis, latiuscula.

C. Bauhin. in phyt. vocat Holosteum 3. siue hirsutum albicans alterum, addens D. Camerarium ab Alpino nomine Gotne albi cathartici accepisse. In Pin. Holosteum 5. siue Creticum alterum, Leonopodium Creticum aliud Clusij hist. Dubitat an sit Plantagini similis planta H. Lugdunensis. Ex Oriente secum detulit D. Bern. Paludanus.

PLANTAGINI AFFINIS BIBINELLA Siciliæ herbula.

Thyallis Theophrasti & Plinij, Bibinella Theodori, auctore Cæsalpino, herbula est ex Sicilia habita, minor Lanceolâ ac viridior: *folium* medio quodam modo se habet, inter Lanceolam & Plantaginem: parvis circumquaque apicibus, vt Coronopo, frequentioribus: *obscuro* fert palmares, plenos *semine*, vt Plantago:

Herba assumitur inter olera.

Casp. Bauhin. pin. Coronopus 3. siue maritima maior, Plantago marina Dodon. gall. Lobel. in Adu. Obl. p. 163. ic. Plant. p. 326. Tabern. & Gerard. Plantago maritima Gelin. hort. & H. Lugdun. p. 1359. Plantago angustifolia Dod. & Coronopus marinus Camerarij.

Synonima

PLANTAGINI SIMILE ANTIPHARMACUM, siue Contrayerua.

Monardes de Ind. Occid. parte 2. in epist. Petri Olinae, meminit perniciosi cuiusdam toxicum, quo in bello & venationibus incolæ vtantur, cui aduersari dicitur planta *foliis* latis, Plantagini Hispanicæ haud ab similibus, si teratur & vulneribus imponatur. Sic enim venenum extinguere, & à Symptomatibus illis, quæ toxicum generare solet, liberare aiunt. Pro magno thesauro existimant Hispani, eam plantam se inuenisse: nascitur eadem regione, vbi Toxicum. Locus

Eandem esse cum iam dicta credimus, quam idem Monardes libro simpl. medicamentorum ex nouo Orbe delatorum, cap. 17. sequentibus delineauit.

Ex Charcis prouincia Peruana radices quædam venenis aduersantes aduehuntur, Iridis radicibus valde similes, sed minores, & ficulnei folij odore. Hispani Indias inhabitantes Contrayerua appellant, quasi dicas Alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum, cuiuscunque tandem sit generis, præsentissimum est remedium (vno sublimate excepto, quod solâ lactis potione extinguitur,) vomitione illud reicere faciens, aut sudores evacuant. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix, aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu.

Huc quoque referenda herba quædam (vt Gomara hist. gen. cap. 71. perhibet) indies nota, cuius radicis succus alexipharmacum est pestilenti & pernicioso toxico, quo ipsi sagittas illinunt.

C. Bauh. pin. dicitur Plantago latifolia 11. siue Plantagini Hispanicæ similis.

HOLOSTIVM VETERVM. CAP. II.

Holostium (*ὀλόστιον* ita editio Parisiensis, alij tamen *ὀλίστιον*, quasi totum esui aptum, teste Cæsalp.) Dioscoridi parua est herba, tribus aut quatuor digitis eminens supra terram, *foliis* & viticulis Coronopo aut Gramini proximis, gustu adstringentibus: *radice* prætenui, vsque in capillamenti speciem (pili instar alius. Ceterum, error hic notatur in Dioscoride, capillamenti similitudinem tribuenti radici, cum potius herbe conueniat, Cæsalp.) alba (vulgares codices habent *λευκὴ καὶ ὀδερή*, i. e. albam, fibrosam. H. Lugd.) Nascitur in editioris terre locis. Potest & ipsa si simul coquatur, carnes cogere & congelinare. Bibitur & adrupta cum vino.

Plinius non Holestium, sed Holosteon vocat, quasi totum osseum, ex aduerso tamen appellatam à Græcis herbam, quia sine duritia, sicut fel dulce [fortè Holostium ob duritiam fruticis dictum est, non vt Plinius statuit:] tenuis vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor di-

gitorum seu Gramen, foliis angustis, adstringens gustu. nascitur in collibus terrenis. Vius eius ad conuulsa [vulsa Corn.] rupta, in vino pota. Vulneta quoque conglutinat. Nam & carnes cogunt (quum coquantur, Corn.) addita.

Galenus siccantem cum adstringente vim Holosteo attribuit: unde adrupta commodè bibatur.

Caterum Holosteon Cornarius Graminis speciem esse arbitratur mollioris sc. illius, quale in editioribus locis nasci tradit. Ac Holostij nomine sequentes apud Authores donantur plantæ: Dens canis primus, seu Plinii Phalaris. Gramen Luzulæ. Holostium lunci foliis Matthioli. Myofuros quorundam. Filix saxatilis. Holostium Plantagini simile. Plant. angustifol. alp. Serpentina. Gramen Fuchij dictum, eique affine gramen. Tunica minima. Pilella maior Fuchij. Pilella minor eiusdem. Herniaria. Tragos Diosc.

HOLOSTIVM PLANTAGINI SIMILE.

Descriptio



Holostium Monspellanum.



maius Clusij: itémque in Icon. Plant. pag. 107. Ab Hist. Lugd. pag. 180. & Camer. hort. Holost. Salm. Clusij. A Gerar. Holost. Salmanticense

Holostij Monspelliani radix longa, crassa, nigricans, lignosa, plurimum capium: folia per terram sparsa, tota albida, hirsuta, & tomentosa, palmaria quædam, quædam multo minor, non tota semunciam lata, quinque nervis per longum distincta, gustu adstringente: excicata conuoluntur & in acumen desinunt: caules spithamei, aut breuiiores: repertiuntur etiam cubitales, similiter hirsuti, thyrsus gerunt longum, aliquot vnciarum, interdum vnius, Plantagini & Cornu ceruino floribus & seminibus similes.

Idem est cum Holostio Salmanticensi Clusij. quod ei duplex. Vocatur autem à Lobel. in Obs. p. 166. Holost. Salm.

Clusij: Tabern. Holost. maius: Camer. apud Matthioli. in Hist. ger. & Epit. Holostium & Holostium quorundam: C. Bauhin. phyt. & pin. Holostium r. siue hirsutum albicans maius, & Plantago angustifolia albida Dodonæi. Holostium Salmanticense alterum Clusij, vocat Holostium paruum Monspeliense. Ego diuersæne sint species, Holostium maius & minus Clusij, asserere non ausim.

Monspelii obseruatur florens Aprili & Maio: itémque Autumno in aridis Oliuetis & non procul ab arvis, viâque Boutoneti proximâ frequens. In hortis floret primo anno, sed raro semen maturat. Frigoris impatiens est.

CORONOPVS VETERIBVS.

CAP. III.

Dioscoridis Coronopus (κορωνόπος) oblonga herbula est, humi strata, folia habens incisuris diuisa [hirsuta, cap. de Psyllio. Plura vide cap. de Holostio.] atque hæc quidem oleris quoque modo cocta estur. Radicem porro habet tenuem, adstringentem, quæ cæliaci in cibo præclarè facit. Caterum, prouenit locis incultis, in aggeribus, & secus vias.

Meminit huius Plinius lib. 21. cap. 16. Aculeatarum [hanc vocem Plinius referre ait. Cæsalpinus ad præcedentes plantas, de quibus Plinius iam dicto capite prius locutus sit:] caules aliquarum, inquit, per terram serpunt, ut eius quam Coronopum vocant. Et rursus lib. 22. cap. 19. Coronopus oblonga herba est cum fissuris. Seritur interim, quoniam radix cæliaci præclarè facit in cinere tosta.

Et hunc vsum eius medicum etiam Galenus & Aëtius habet. Sed in Paulo καλὴς ἀφελαν legitur, pro κορωνόπος. Nec librarij est hic error, ex vocum affinitate decepti, sed ipsius authoris Pauli: qui quum alaudam colicis opitulati antea scripsisset, mox si biuixit, κορωνόπος ἢ ῥίζα αὐτῇ περὶ σεναι καλὴν ὥστε εἶναι ἐξορκιστήν.

Theophrastus lib. 7. cap. 9. inter ὑψηλοὺς θύλας, quæ folia à radice ad terram habent, κορωνόπον recenset. Alibi inter aculeatas & spontè nascentes herbas. Itémque lib. 2. cauf. cap. 7. inter amaras. Apud Theophrastum Gaza Silaginem & Selaginem vertit.

Inter reiectanea siue notha aliis dicitur Ammonos (ἀμμονός) aliis Astrion (ἀστρίον) Aphris Atisipite (ἀτισίπιτη) Romanis Caciatrice [κακιστρεν:] aliis Stilagine (στάλαγμα) aliis Sanguinaria, (αἱματώδης).

Coronopus autem cornicis pedem significat, & refert quoque, folijs ita fissis & dispositis, ut cornicis pedem representent. Nec ignota herba est, inquit Cornarius, & nostri nomine græcā vocem exprimente appellant.

Porro Manardus his ad stipulandum esse iudicauit, qui volunt Coronopum Dioscoridis eam esse herbam, quæ vulgò dicitur Herba stella. Nos Coronopum siue Cornu ceruinum vulgò, Spicā Plantaginis vocamus. Refert Cæsalpinus & alteram Herbam stellam, quam nos Coronopum serpentinam, alij verò siluestrem, cognominant. Est præterea Coronopus Massiliensis Lobelij, serpentinæ fortè varietas. Coronopus serpentina omnium minima. Coronopus maritima Rainaudeti. Coronopus maritima nostras. Coronopus Ruellij, siue repens: Eodem nomine etiam

etiam insigniuntur: *Plantago marina*. *Catanan-*
ce quo undam. *Ranunculus*. *Calcha aquatica*.
Gramen dictum *Dens canis*; *Capriola*, *San-*
guinaria. *Galiopsis maior*. *Atractylis*. *Carduus*
stellatus. *Cedrus lycia*.

CORONOPVS SIVE CORNV
ceruinum vulgò. spicà Plantaginis.
CAP. IV.

VT plurimum tenuis est radix, adultior ta-



vix vllò ex-
cellenti spo-
re, exceptà ad-
strictione: fo-
lia statim à ra-
dice, crebra,
longa, angu-
sta, hirsuta,
nervosa, in la-
cunas aliquot
laterales, ceu
ceruini cornu
ramos, vnde
nomen, dui-
sa, sapore non
nihil adstrin-
gente: inter
hec caules sur-
riguntur Plā-
taginis, rigi-
duli, tenues,
teretes, hirs-
uti, dodrantā-

les & cubitales, thyrsulum plantagineum susti-
nentes, flores & semen Plantaginis proferen-
tem.

Qui spontè provenit, folia per terram spar-
git numerosa, in orbem, Coronopi vulgatis mo-
do diffusuris, & lacinijs crebrioribus, longiori-
bus, rigidis pilis hirs, eoque nomine ferè inca-
na: in umbilico ad foliorum veluti radiorum in
centro concursum multa lanugo mollis candi-
da: caules complures palmares & dodrantales,
rigidi, asperi, hirs, spicam gerunt Coronopi vul-
gatis spicæ similem: radix singularis, fibrata,
crassiuscula, in mediocriter long., lignosâ matrice
fasciata.

Tabern. Icon. Coronopus, Pes cornicis &
Stella maris. Gesn. Hort. Coron. verus, Herba
Stella Italorum. Anguill. Coronop. in multis I-
taliz locis vocatus Herba Stella. Lob. in Adu.
Coronopus [sic etiam in Obs. p. 139. in le. Plant.
p. 437.] Cornu ceruinum. Cordo in Diosc. Coro-
nop vera: Eid. in Hist. Coronop. sativum.

Fuchsius Coronopus vocat, ac inter alia hæc
addit: *Koropos*, *ή άρεον* Græcis, Pes cornicis &
Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis inco-
gnita herba: Germanis commodè *Kraut*: aut
Rappenfues: Gallis *Capriole*, ou *Sanguina-*
re, ou *Dene au chien* appellari potest. Coronopus
autem non alia ratione dici cæpit, quàm quod
cornicis pedem effigie repræsentat. Sanguina-
ria verò, Sanguinalisue vocata est, quod à langu-
ni sistendo apta sit herba. Sunt qui Herbam stel-
læ nominant, alludentes haud dubie ad græcæ
appellationem Astrion. Nonnulli quod fo-
lium eius multipartitè confectum, in ceruini
cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu

Tom. III.

vocatunt. Ex Dioscoridis descriptione, etsi con-
cisa admodum, satis liquet, herbam hanc esse
Coronopum &c. In editione autem eius gallica
Lugdunensi annotatum legimus nomina *Ca-*
priole, *Sanguinaire*, ou *Dene au chien* ad hanc her-
bam non pertinere.

Dodonæus [qui in hist. gall. ob dissimilitudi-
nem veterum Coronopi, Pseudocoronopon vo-
cat, gall. *corne de cerf*, & quibusdam in locis, *her-
be de la cornisse*] Fuchsius cōtrariatur his verbis:
Herba stella, siue Cornu ceruinum ad Plantagi-
nes accedit, nasciturque locis incultis, aridis, a-
renosis, secus vias: In Italia, Germania vtraque,
Gallia, tum & alibi frequens reperitur quando-
que in hortis, vbi ampliter luxuriat. Spicæ eius
eodem, quo Plantaginis, tempore conspicuæ.
Herbam istellam non pauci nominant: sunt &
qui Stellariam nuncupent; stellaria tamen &
Alchymilla à recentioribus dicitur: est & Alter
Atricus stellaria. Dicitur verò à Bel. *Herzho-*
ren, & alibi *Graune* & *Graune crige*, i. e.
Comitille herba: H. sp. *Guibeltha*: Germ. *Cra-*
ysus, quod illi nomen à Leonharo Fuchsi-
putatur inditum, quod Coronopum Dioscori-
dis esse indicauerit, veluti & nonnulli post eum
alii. *Koropos* siquidem Cornicis pedem, i. e.
Crayensius sonat, non tamen hæc Dioscoridis
Koropos est: Neque enim oblonga herbula est, nec
vllò modo repit, viticulosi cauliculi destituta,
quibus serpat: folia tantummodò per terram
sternuntur. Coronopus autem herba exigua, or-
bilong: & serpens, vt Dioscorides & Plinius te-
statur. Atque hanc ob causam Herba stella ne-
quaquā pro Coronopo haberi poterit. Sunt ta-
men inter reiectaneas Coronopi appellationes,
quæ non perperam Herbæ stellæ conueniunt, vt
sunt *Apocynon*, siue *Arenaria*, quod arenosa amet
loca: *Descuria*, quod stellæ siue altri modo per ter-
ram spargatur: & *Sanguinaria*, quod arenosa ad-
uersus sanguinis quasdam profusiones perutilis
habeatur. Sed nomina hæc pluribus stirpibus
communia, qualia, præsertim inter nothas voces
Dioscoridi acscriptas, haud rarum est reperiri,
magis minime sunt faciendæ.

Manardus tamen is ad stipulandum iudicauit,
qui voluit Coronopum Dioscoridis esse hanc
herbam, quæ vulgò Herba stella dicitur. Quin
& Matthiolus huius opinionis sectatores non
solum, nihil falli existimauit, sed ed adductus
fuit, vt crediderit Coronopum tam Theophras-
to, quàm Dioscoridi idem esse; vocarique Ita-
licè *Coronopo*, quod tamen in comm. Ital. non
ait. Existimat præterea Coronopum speciem esse
Plantaginis. Non placet autem nomen galli-
cum *Capriole*, quod in Epitome cum Camera-
rij ad hitionibus adeptum, & repositum, *Corne*
de cerf ou *Sanguinaire*, quod ipsum postremum
non probat.

Camer. hort. vocat Coronopum sativum, in
acetarijs vtilem, *hirschenhorn Salat*. Turc. Co-
ronopum aut Coronopodium, Angl. *Crown*
foote Plantain, & Silaginem Gaze.

C. Bauh. phyt. & pin. Coronopum i. siue hor-
tensem, Coronopum Tragi, Anguill. Lac. Lon.
Tabern. & Eyketensis, sativum Celsalpini, Cor-
nu ceruinum Gerardi. Item phyt. Coronopum
2. siue sylvestrem, hirsutiorem, Coronopum sylu.
Coronopum sylu. Celsalpini, Coronopum Pto-
chyæ, Columnæ.

Castor huius Coronopi duas habet figuras
quarum vna malè posita est pro Coronopo syl-

LII.

Locus & Tempus

uestri, vt ipsemet Castor in fine libri annotauit.


Coronopum spontaneum Montpelij tantum obseruari, vbi passim prouenit. Lugduni in hortis feritur, florētq; Maio. Gener. Cherlerds circa Gramontium maritimi tractus collegit. Copiose nascitur circa Shene iuxta semitas & in aggeribus maritimis. Meus Dioscor. Græcus inquit Turn.) habet *Solusari*. Ruellius videtur legisse *χρῶμασι*, quod magis placet nunquam enim circa domos, sed in aggeribus, quos Græci vocant *χρῶμα*, frequentissime vidi. Seritur in hortis, & sponte nascitur in incultis & secus vias, teste Cæsalpino. Quæ autem seritur, angustiore folio constat, mollior, & rarioribus appendicibus gratio: syluestris hirsutior, folijs profundius laciniosis, Eruca similitudine.

Vires & Virtus

Quia folia sapore dulci & adstringente, ideo cruda in cibis recipiuntur. Modus autem apparandi, & post leuem coctionem in acetaria indendi, datur etiamnum in Gallia & quibusdam Angliæ locis. Prodest nephriticis in oleris, aut cibo sumpta: non tamen calculum attenuans aut expellens, sed renes debiliores roborans, caloremque eorum temperans: sanguinis vero ex his eruptiones cohibet etiam ac sistit. Cæterum, herba manifeste adstringens, frigida & sicca, Plantagini facultate accedit.

CORONOPVS SERPENTINA.

Descriptio



Insignis crassitudinis & longitudinis est radix, in capitula aliquot sub inde diuisa: ex qua foliorum seges magna pululat, longitudine Coronopi esculenti, sed latitudine trientem aut quadrantem non adæquatam: *caules* inter ea plures palmares & altiores, nudi, e-nodes, thyrso Coronopi insignes.

Icones

Quæ à nobis pingitur desumpta est ex planta Cherleriana. Variè autem videtur herba ludere, eiusque lusus exhibitos nostrâ ac Lobelij tabellâ, itemque Matthiolinâ.

Synonyma

Lobelio in Adu. pag. 17. Serpentina vernaculè vocata, Matthiolo Holostium putata, p. 156. Serpentina, nō Coronopus, sed potius Holostium. Est enim folijs gramineis aut Veronicæ siluestris humi procumbentibus: radix lignosa Veronicæ Caryophyllæ, femine & spica Holostij Montpeliaci, aut Coronopi vulgaris: prouenit in montibus Galloprovinciæ, Atruerniæ & passim in Italia. Huic altera, tota similis, nisi habitioribus folijs, stolisculis, cauliculis incanis & hirsutis foret: Apenninis montibus & in Delphicatu repertu facilis. *Hæc ille* qui mihi videtur obscurior. Cur ad Hplostium refert plantam p.

Lobel. v. prob.

187. quam pag. 17. cum Holostio non conueniente dixit. Cur etiam Serpentinam, ei plantæ, quam Coronopum vocat, demptis laciniosis, simillimam facit, posteaque longè disparem ait?

Matthiol. in prioribus comm. Serpentinam depingit, sed nō describit, in Epit. vero cum addit. Camerarij Coronopum siluestrem, & *Herba stella saluatica*, italicè nominauit. Dodonæus in fol. lat. figuram habet nomine Serpentine Matthioli, describitque præ Herba stella altera.

Gerardo Coronop. siluestris: Gesn. hort. Lob. Synon. in Obs. p. 240. Coronop. silu. Serpentina Tab. Coronop. silu. sue Serpentina H. Lugd. pag. 669. Coronop. silu. sue Serpentina Matthioli Lob. in Ic. p. 439. Coronop. in montibus nascens inter saxa: & altera in ædificijs, simplicior, Cæsalpino. C. Bauhin. phyt. & pin. Holostium 6. sue strictissimo folio maius.

Figuram fatiæ Coronopi Castor malè posuit *Castor* pro Coronopo siluestri, Herba stella syluatica, & Serpentina, quod ipsemet in fine Herbarij annotauit.

Matthiolo teste Serpentina prouenit in Goritensi agro diluto extenuatque solo, non longè à Sontij fluminis ripis, & alijs etiam in agris. Genex habet in orto delatam ex propinquis montibus, florentem Maio & Iunio. Frequens in Etruriæ *Montacuto*.

Matthiolus Coronopo suo eximiam tribuit vim contra ictus & morsus venenosos serpentum: dantur autem eius puluerati drachmæ 2. ex vino albo: hoc remedij genere multi euaserunt subito, ab eiusmodi virulentis animalibus vulnerati, quemadmodum ego ipse certò obseruauim. Eiusdem radix in vino albo decocta, hydropticis vtiliter propinatur, diebus aliquot continuis manet, & sudoribus postea vacandum: Semen ex vino aultero aut aqua Portulacæ haustum, omnem alui fluxum sistit ac hæmoptysin: consuevit etiam herba in vino rubro aut aceto coqui, & ius calidum in ore teneri, contra im-mensos dentium cruciatus.

CORONOPVS MASSILIENSIS LOBELII
Serpentine fortè varietas.

Denissimè sparsosq; foliorum stipatu luxuriat, Sedi minimi saxei montani, vel Pinaltri rita, positu, & rigiditate, innumera etiam sobole cauliculorum, dodrantalium, semè pusillum, Plantaginis aut Serpentine vulgaris, spicis includentium: Radix longiuscula, lignosa, crassior, gustu nonnihil calida, aromatica.


Coronopi & Sedi montani mediam plantam Massiliensium [vt vocat Lob. in Adu. p. 187. Obs. Belg. p. 525. Ic. Plant. p. 438.] nouam antiquis & neotericis

neotericis indicam, visum fuit subdere, cum propter nonnullam inter se similitudinem, tum propter eoldem natales maritimos. *Mibi sane videtur iconam ex Lobelio hic appositam esse lulum Coronopi Serpentinae, & non respondere descriptioni Lobelij, quæ videtur convenire nostro Coronopo maritimo.*

Tabern. Coronopus Massilioticus, *Marfilcher krabenwurz*. C. Bauh. phyt. & pin. Holosteum 8. siue Massiliense. Coronopus Massiliensium Hist. Lugd. Coronopus siue Serpentina minor Gerardo.

Collibus & cautibus Massiliæ vicinis ad maris alluviones, inter Tragacanthum passim luxuriat.

CORONOPVS SERPENTARIA omnium minima.



Coronop⁹, cuius figuram hic damus, factam ad plantam siccam, à nobis Iunio mense Burmij Rhætorum collectam, radice est crassa: caulibus verò & floribus Coronopi serpentinae: sed foliis latioribus. Representatur sanè figura Lobelij, in qua tamen non placent foliola cauliculis appicta quæ in nulla harum plantarum vidimus.

Serpentinam omnium minimam [ut vocat Lobel. in Obs. p. 240. in Ic. Plant. p. 439. nullatenus à superioribus distare ait, præterquam exilitate; coliculis enim vix vnciam æquare & sesquinciæ.

Tabern. dicitur Coronopus minor, Serpentina minor, *kleiner kraenwurz*, *klein schlangen-Grass*.

C. Bauh. phyt. & pin. Holosteum 7. siue strictissimo folio, Serpentina omnium minima Lobelij, Dodonæi & Lugd. Coronopus siue Serpentina minima Gerardi. Coronopus altera in ædificijs Cæsalpini. Quod verò Lugdunensis cenleat, inquit, nullatenus à Coronopo Serpentina distare præterquam exilitate, dubito: quod verò opinetur eam esse, quam Pena pingendam curauit, & quam Monspelienfes Holostium sine suspicari, omnino fallitur, cum tres distinctas plantas habeam. *Hæc frater* in phyt. Dubitamus nos ab tres plantas, quas figuris exhibet Lobelius, ab invicem sine distinguendæ, vel non potius varietates, Quæ de exilitate dicit Lugd. desumpta sunt ex Lobelio, nec ideo culpandos. An Cæsalpini eandem tradat cum Lobeliana, dubito: dicit enim lanuginosam, Lobelius verò hirsutam.

In celsis montium iugis sterilibus Seuenæ in Gallia Narbonensi copiose prouenit.

Tom. III.

CORONOPVS MARITIMVS Rainaudeti.



Coronopi Descriptio. maritimi nomine misit ex Prouinciæ Aix ad nos Rainaudetus Pharmacopæus plantam, cui radice sesquipalmaris, crassa, fusca, sicca, insipida: qua innumeræ oriuntur radiorum foliorum stellæ, tali verò fere dispositione, quam in Phyllo Dalechampii videmus,

vel Erica Matthioli, confertiorum, rependorum, semunciam breuiorum, angustiorum, quam Serpentinae Matthioli: radiorum umbilica totas villosus, Lupini latitudine, à quo coliculus exit vncialis, oculus, hirsutus, thyrulo fere totus obfusus.

Coronopus à nobis nunc descriptus optimè conuenit cum descriptione plantæ, quam Lobelius in Adu. pro Coronopi & Sedi montani media planta Massiliensium proposuit.

CORONOPVS MARITIMA NOSTRAS.



Radix breuis, nigricans, crassa, fibris aliquot donata: folia Descriptio. quàm in Coronopode vulgari strictiora sunt, longeque crassiora & succulentiora, interdum penè iuncea, quadrantalina, ac etiam palmaria, sapore falso: flos purpureus, spicatus, vulgaris, ut semen.

Cam. hort. Coronopus

marinus: Lobel. in Adu. Plantago marina: Dod. gall. Tabern. & Ger. Plantago maritima. Gesn. hort. & app. itemque H. Lugd. Plantago maritima. C. Bauh. phyt. Plantago 13. siue angustifolia maritima. Eid. pin. Coronopus 3. siue maritima maior: Babinella Cæsalp.

Monspelij iuxta mare mense augusto floret; inde verò delata Montbelgardum, floruit Iunio & Iulio: semen maturuit augusto. Terræ gaudet falsa, aggeribus & litoribus salis Zelandiæ & Bergis ad Zoom copiosa.

MYOSVROS.

CAP. V.

Descriptio

Floras numerosas pro radicebus habet, vnde folia germinant multa graminea, et riuum quatuorve vactarum, angusta admodum: *coliculis* vix altitudine folia excedunt, enodes, teretes, nudi, *flosculos* in cacumine gestantes, musculosos, herbacei coloris, paulatim sese explicantes, succedente claua duram triumve vincturam, tereti, mucronata, granulis multis compactili, caudam murinam affabre mentiente.

Synonyma.



Myosuros quorundam *Thalio*. Cauda muris *Dod. lat. Lob. Obs. pag. 241. Camer. & Gerardo. Holstium* v. *Botan. Francofurt. Holstium Dioscoridis, Denticula canis Ruellij, & Gramen molle Loniceri, Holstium Loniceri H. Lugd. p. 189. End. p. 128 Cauda muris.*

Nomina, linguar.

Petappositè aurem à recentioribus *μυρὸς οὐρα* ἢ *μυρὸς οὐρῆς* vocatur herba, Latine Cauda muris, vel murina: gero. *Mantzschovianzin, rausent-korn, & Mersig, all Belg. Muisenfeerikens. Gall. Queue de souris Anglis. Blod strange.*

Locus.

Pinguibus agris & pratis gaudet. Aprili mense floret: Maio semen maturum est.

Vires.

Refrigerat, nec multum à Plantagine viribus differt. Gustu Plantaginis esse scribit Pena, Lobelius legit gustu Hydropiperis.

CYNOPS, CONOPS, CVLIX HERBA Veteribus.

CAP. VI.

Thoph.

Oculus canis.
Canaria.
Conops.
Culix.

Cynops apud Theophrastum lib. 7. hist. c. 8. numeratur cum spicatis: germinat post æquinoctium primis imbribus. Theodorus modò Oculum canis vertit, modò Canariam. Hermolaus legendum esse suspicatur Conopa, & non Cynopa, vt intelligatur herba Culex appellata: nam Græcè Conops culicem significat, de qua herba reperitur apud rei rustice scriptores [Plinium l. 19. cap. 5. C. Siliam lib. 12. cap. 19. Hermolaum lib. 2. Coroll. 366. Orthonem Brunsfelt. in Onomast. med. Constantinum Lex. græco. Gels. in cat. pl. Idem lib. 1. Quadr. de cane agens per integrum frè folium tractat de Conopo Theophr. eumque Psyllion esse probat, plurimis adductis rationibus, contra secus sentientes:] Cucumeris

nasci sine semine, si farina eius herbae maceretur semina.

Apud Plinium quoque lib. 21. c. 15. & 17. inter *Cynops* eisdem spicatis *Cynopsis* mentio reperitur, Culex verò herba lib. 19. cap. 5.

Casalpini Culicem herbam censet Conizam, deriuato nomine à Conope, quoniam calices abigat, vt Dioscorides testatus sit.

PSYLLIVM VETERIBVS.

CAP. VII.

Psyllium [ὑψύλλιον vet. add. ἡ κύνουρα φάλλιον] Dioscoridi folio est Coronopidis, hirsuto, ac longiore [ὑψύλλιον: addendum hoc annotauit Gou- Descriptio] pylus ex vitroque antiquo, quod in vulgato exempl. desiderabatur:] ramulis dodrantalibus, totaque herbula fæni modo tenuis ac minutula. Coda verò ipsius à medio caule ducit initium, capitulis duobus tribusve [aut pluribus, addit vet.] conglobatis: in quibus semen pulicibus simile, nigro atque durum. Nascitur in aruis & incultis. Vis ei refrigerans: articularum morbis, paroidibus, tuberculis, oedematis, luxatiisque, & capitis dolori cum rosaceo, aut aceto aquaue impositum auxiliatur. Infantium quoque enterocelis ac eminenti umbilico illud ex aceto medetur. Acetabuli verò mensuram tritam in duabus aqua heminis materati oportet, ac vbi sese aqua densauerit, lentoremve contraxerit, illini. Siquidem vehementer refrigerat: sed & in feruentem aquam immissa calorem reprimat: denique & contra erysipela est efficax. Fama est, si vires herba domum importetur, pulices arceri. Tusa porò cum adipe, sordida malignaque vlcera repurgat. Succus fluxione infestatis ac vermiculosis auribus ex melle prodest: Idem de lethali- libus autor est porum totius corporis frigiditatem inducere, & torporem cum exolutione & mœore: contra hoc auxiliari omnia, quæ contra potum Coriandrum.

Psyllij semen maxime in vsu est, inquit Galenus, ex secundo ordine existens frigidorum. Verum in siccando & humectando medium quoddammodò est & moderatum.

Phyllion [referre Plinio lib. 25. cap. 11.] alij Cynoides, alij Cystallium, alij Sicelion, alij Cynomion appellant, radice tenui, superuacua, farnentolum, Fabæ granis in cacuminibus, folijs canino capiti non dissimilibus, semine autem pulici, vnde & nomen: hoc in bacis: ipsa herba in vineis inuenitur. Ei vis ad refrigerandum & discutendum [ita δεικνυσκινῆς δύναμις reddidisse videtur, id est vim repellendi: alioqui enim δεικνυσκινῆς, est vis discutiendi: & hæc per calida fit, i la per frigida [ingens: semen in vsu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura, sextatio aquæ densat ac contrahit. Tunc terere ac crassitudinem illinire oportet cuiusque dolori, & collectioni, inflammationique, tensesmo in aqua cum radicibus medetur. Omnibus articularum morbis salutare est huius semen madafactum in aqua, admixtis in heminam seminis duobus resinæ colophoniz cochlearibus, thuris vno.

Psyllium inter nothas Dioscoridis appellationes ab aliquibus Cataphysi [καταψύλλιον] ab alijs Cynocephaliis [κύνουρα φάλλιον, q. ali caninū caput:] alijs Chrysalis [χρυσάλλιον:] alijs Cynomysa [κύνουρα, quasi Canina mulca:] alijs Psylleris [ψύλλιον:] alijs Sicelioricon [σικελιωτικόν, quasi Sicu-

la herba] nuncupatur. A Siculis Conidiis] *conidi* *herba*:] Romanis Silbaciū *[σινδβακινυ]* seu Herba pulicaria, Aphris Vargugum appellatur. Crystallij porrò nomenclatura à viribus notisque eius facta est: quā indicaverunt, qui eā vñ suat, crassescendi denique vim, quam ea habet: Crystallum enim glaciem Græci vocant, quæ in lapidis duritiem concreta densa quæ frigore aqua est. Illi simile aliquid Pulicaris huius herbæ liquor habet, vt ex Dioscoride & Plinio patet.

PSYLLIVM MAIVS ERECTVM.

Multis fruticat ramis, hirsutis, teretibus, vārie diuicatis, per quos folia incondita, graminea, tomentosa, summus caulis ramorumque extrema crebros producit pediculos, ymbellam quodammodo mentientes, quorum singulis capitulum insidet imbricatum, Plantaginis, crassius, breuius, squamis maioribus, floribus similibus: semen lubricum, lucidum, nigrum, pulicis effigie, manu aut maceratione mucilaginem abundè rediens: radix exigua, fibrosa. Est exilius & habitius.

ψύλλιον Græcis, *Psyllium* Latinis, vt Trago, Math. Euchl. Turn. Cordo in Diosc. & Hist. [vbi annuam hanc speciem describit. Ei autem vt exilissimo, incurti typographi addita figura Conizæ: quam obrem quicquid scribat Lobelius, particulare *Psyllium* non habet hoc loco Cordus.] Dodon. Gesn. hort. Lob. in Adu. Obs. p. 239. Cast. & Gerardo. *Psyllium minus* Castalp. secundum Anguill. primum Tab. *Psyllium alterum* C. Bauh. phyt. Eid. pin. *Psyllium* 3. siue maius erectum. *Pulicaris herba* Lob. Ic. Plant. pag. 436. *Psyllium* Matthioli H.L. gd. p. 117. 2.

Germis Psyllæ kraus, flos samē oder kraut: item *stehsamenkraut*. Belgis *Vleycruyt*. Gallis *Herbe aux puces*, i. e. Herba pulicum siue Pulicaris herba. Italis *Psillo*. Hisp. *Zargaroni*. Angl. *fleecewort and fleeseede*. Boh. *Chmelyck*. Arab. Serap. Bazara chatona. Auerrh. Belscar cotton seu Bezercorhume. Egypt. *Cherum*.

Spontè Narbonensis & Gallo-prouinciæ vernaculæ prociis quæ arua operit & infestit: Ac etiam inter oliueta, sabulosa quæ crocos Monspeliani agri prouenit, exilioribus ramis: Littora verò sabulosa maritima libenter sectator marinum, habitiore sed non dissimili aspectu, referente Lobelio. In campis aut incultis locis subinde exire scribit, seti & quandoque semel satum facillè aliquot deinde annis recurrere: Pro loci natura non tardè latius, præsertim circa maritima, gigni, alibi minus. In Germania & Anglia obseruauit Turnerus, verum semper hortense. Monspelij florentem vidi in Autumno & Vere: in Italia inter Bononiam & Florentiam, itém quæ inter Vincentiam & Villanouam, Aprili. Genue abundat vigens Iunio, & virens adhuc Ianuario, & perferens Hiemem cum floribus. Lugduni cum semine Septembri & Octobri à *Ainay* & ad Rhodanum propædes. *Psyllium* copiosissimè prouenire in *Ægypto* auctor est Alpinus.

Psyllij semen vsui in medicamentis artèriacis, & bilem siue præparantibus, siue educantibus. Seminis & herbæ mucaginosus & lactei cremoris similis succus ad purgandam choleram etiamnum à Lobelio commendatus. Expertus sum ego mucaginem seminis in penem inieci, ardorem eius sedare. Aqua, inquit Dodonæus,

Tom. III.

in qua semen *Psyllij* quassatum, siue agitatū, maceratumque fuerit, donec lentorem contraxerit, omnes inflammationes sedat: ardentium febrium calores mitigat: sitim restinguit: & in ore detenta asperitates linguæ lenit: Interaneorum ex acrimonia humorum dolores tollit: dysentericis, & quibus intestina, aut vesica, exulcerantur, vtilis, vtilior verdè etiam ex semine antea tosto. Aluum & hæc mollit, clementerque subducit, præsertim Saccharo aut Iulepo ex violis addito, vel potius ex infusione frequenti dilutè rubentium Rosarum, quo modo in ardentissimis febribus vtiliter exhibetur. Verum non nimis crebrò hac mucagine vtendum admonet Serapio, & post eum Fallopius, stomachum siquidem offendit, frequentique ac nimio vsu subinde syncope aut enimi deliquium etiam succedit, vñ cum mortis periculo: quia nimium eius venenosum, vt ait, est: quo non modò Græci, sed & Auicennà testatur. Seminum apud *Ægyptios* vñ est, præsertimque mucilaginis ab ipsis paratæ cum aqua rosacea in omnibus febribus biliosis, ardentibus, inflammationibusque pectoris, vti in pleuritide, & peripneumonia, sed extrahunt cum aqua Ho. dei, & cum Saccharo candido exhibent: aqua rosacea extracta *Psyllij* mucilaginis ij vtuntur in biliosis diarrhæis & dysenteris, atque omnes externas inflammationes, emplastri aut fomenti modorum ex viridis plantæ folijs, cum ex seminibus *Psyllij*: tota planta vtuntur.

Psyllij mucilaginem commendat Gatinaria in dolore capitis calido, malè existimans exteriorem partem admodum frigidam, interiorem calidissimam & vesicatoriam. Cornarius itidem *Psyllij* substantiam medullæ interioris calidam & siccam in quarto gradu pronunciauit: itémque venenum esse. Sed quâ ratione sit venenum non docet. Arabes quidem ponunt in *Psyllio* duas substantias diuersas, vnam in cortice, alteram in medulla, sed de ea diuersa substantia nihil dicunt Græci, quamvis ipsi frequentet vsi sint & cortice & medulla.

PSYLLIVM MAIVS SVPINVM.



IDEM in Locis desertis, tractibus, sed marginibus & qualidibus Oliueterum incultis collibus, satmentosis lignosisque proluxa foliorum & furculorum caudata, comosaque sæturâ densissima implexa fruticat, & repando cæspitem ornat lætore aspectu, sed hirsutie ex viridi albi-

cante. Semine haud dissimili: sed maiore fuscòque, siue Castanæ corticis colore: radice ligno-

sâ durâ, fibrarum proceris proluxâ.

C. Bauh. phyt. Psyllium i. siue maius: Eid. pin. Psyllium 2. siue maius supinum: Psyllium alterum Matthioli. Cast. H. Lugd. p. 173. & Tabern. Psyllium perenne Gesn. hist. Obs. p. 239. l. c. Plant. p. 437. Psyllium 3. Anguillaræ, maius Cæsalp. Psyllium semper virens Gerardi.

Psyllium Indicum foliis crenatis.

Descriptio

Radice est oblonga, tenui, fibris capillata: caule circa radicem lignoso & rufescente, rotundo, subaspero, pedali, in frequentes ac foliosos ramulos diuiso, qui capitula plura, duodena, squamata sustinent, è quibus flosculi pusilli, pallide lutei, lanuginosi relucunt: semen nigricans, paruum, splendens, succedit: folia habet oblonga, angusta, acuta, crenata, instar foliorum Coronopi, nonnihil laciniata: hirsuta: ex semine Psyllij Indici nomine lato in horro aliquoties flores, enatum auctori C. Bauh. qui in prod. Psyllij primi nomine describit. In pin. vocat Psyllium i. Psyllium Dioscoridis, Psyll. Indicum crenatis foliis, & Psyllium primum Anguillaræ: *κρυοντα* Theophrasti: Oculum canis & Canariam Gazz.

PSYLLIO ACCEDENS GOTNE,

Rubrum quibusdam dictum.

CAP. VIII.

Descrip.



lla prædictis similia: capitula Psyllij, multò breuiora, imbricata. non tantum fastigio ramulorum insident, sed etiam in cõiun ramulorum sessilia, vt in Gnaphalio vulgari: *flosculis* ex apicib. luteis succedit *semen* paruum relucens. Annua est planta meo quidem iudicio: nam quo anno sata est, florer, vt ipse vidi, licet alij aliter sentiant.


Fratri C. Bauhino phyt. [vbi tertium facit] propter totius plantæ cum Psyllio similitudinem, Psyllium minus appellari placuit. Ei Zvingerus Gotne rubri & albi nomine misit. Is tamen differentiam statuere videtur inter Gotne album & rubrum. Siquidem Alpinus hoc Gotne rubri nomine ad Camerarium miserat: at nomine Gotne albi eam quam sub Holosteio tertio [Plantagini angustifolia simili] proposuit. Idem in prod. sentit & sub Psyllio secundo siue minore describit.

In pin. vocat Psyllium 4. siue minus, Gotne

Psyllium minus.
C. Bauh. not.
Gotne rubri
& album.

rubri & B. trij rubri nomine acceptum, quartumque an sit Kally tertium Alpini, minus rectè pictum? Cæterum, quam C. Bauhinus in prod. pro C. B. not. Psyllio minore pingit, descriptioni non respondet.

KALLI TERTIVM ALPINO.
CAP. IX.



*F*oliis con-
stat pau-
cis Aiuæ *fi-*
liis proximis,
longioribus
multò, *caule*
singulari, non
recto, ex quo
tres quatuor-
ue *cauliculi*
qui rectâ sur-
sum feruntur,
in singulorum
cacumine ca-
put ex quinque
aut pluribus
foliis Chamæ-
pity similib.
deorsum in-
clinantib., &
in arcum re-
curuatis: in

quorum medio *flosculi* multi, Rosarum flosculis similes. Herba salia, atque acri sapore linguam vellicante.

Descriptionis auctor vocat Kalli tertiam speciem, censere quæ reponendum sub Anthyllide secunda Dioscoridis.

Kalli tertium in Ægypto proueniens, vt aiunt Vices multi, in puluerem redactum, ac per os sumptum, phlegma atque bilis exustam purgat: idem ex foliis succus expressus facit. Ex hac primò & secundò exsiccata & combusta cineres parantur, qui ad vitra atque alia conficienda, conferunt, testibus iis, qui ex Ægypto Venetias conuehantur.

LEONTOPODION VETERIBVS

atque Ceros,
CAP. X.

*D*ioscoride auctore Leontopodion [αλεοντοποδιον] duorum digitorum herbula est, *foliis illius* habens atcta [sic] Vet. non legiti] robusta, quateri um ferè, aut etiam ternum digitorum longitudine, hirsuta, quæq; radici sunt proxima lanatiora [sic] Ald. odoratiora: *capitula* in summis caulib. quasi perforata [sic] Ald. & Marcell.] in quib. flores nigri [lutei vet.] Semè verò vsq; adeò spissa lanugine obuolutum. [cõuersu difficile] est, vt ægrè deprehendi possit. *Radix* subiacet parua: quam etiam tradunt amuleti ratione alligatam ad aratoria prodesse, tæberu aque discutere.

Leontopodion Plinius ait lib. 26. cap. 8. alios Leuceoron, alios Dorypetron, alios Thorybetron vocare: radice eius aluum sistere, bilèmq; purgare, in aqua mulla, addito pondere denario rum duum. Nasci in campetribus & gracili solo. Semen eius potum, lymphatica somnia facere dici. Cap. 12. Semen in aqua tritum cum polenta, omnia in fixa corpori extrahere. Cap. 14. Semen in aqua tritum & cum polenta illitum, spicula sagittarum extrahere. Libro verò 27. capite 8. silendam

filendam censet Cemon [Ecemon CH.] propter vanitates magicas. Hoc autem apud Plinium valde alienum Leontopodium bilem purgare & alium sistere. Miram & illud, quod historiam hujus plantæ à Dioscoride prolixè tractatam ne Plinius quidem attigerit. Cum Cornario & Saraceno Leontopodium Plinij multum discrepare à Leontopodio Dioscoridis existimavit Dalechampsius, idq; vtriusq; vires colatas ostendere. Placet & hæc opinio C. Bauh.

Galenus neque posteriores Medici Leontopodij meminerunt. Sed & quod Aetius & Apulejus Leontopodium nominant, non aliud quam Leontopetalon esse palam est.

Saracenus Cornarium secutus *λεοντοπώδιον* Dioscoridis, Cemon Plinij esse suspicatur, tum quia vox ea in Dioscoridis notis etiam inter Leontopodij synonyma reperitur, tum quia & Cemon ad amatoria prodesse innuit Plinius: quæ opinio etiam Marcello placet: non refragante Dalechampsio.

Leontopodium verum hæcenus non solum sibi, sed alijs quoque ignotum esse arbitratur Matthiolus. Sed ab omnibus in Italia ignorari falsò definit authore Guilandino.

Cæterum Leontopodij nomine sequentes donantur apud varios authores Plantæ. Pentaphyllon montanum. Pes leonis. Leontop. Candia. Gnaphal. Alpin. Gnaphal. aliud. Gnaphalio affinis. Gnaph. Fuchsi. Gnaph. virgatum. Pilella phlomod. Scorpoides aquat. Caltha. Leontopetalon. Cyclaminus. Aquilegia.

LEONTOPODIUM CANDIÆ

quorundam Psyllio affine.

CAP. XI.

Radix nigra est, duriuscula, fibrata: ex qua folia emergunt plucula, pedalia ferè, Plantaginis Alpinæ angustifoliæ, vel potiùs Sesamoidis minoris, sine tamen lacinijs tota villosa. Ad

radicem verò recurvis pediculis lignosis flores hærent villosi, quos capitula itidem sequuntur villosa, Psyllij similia, semen rotundum, oblongum, cinereum, Psyllio aliquantò majus continentia. Leontopodij 2. [vt vocat C. B.] phyt. & 3. inter icones, Creticum cognominatum, Holsteum 4. in



pin. accepit nomine Leontopodij ex Candia rari.

Leontopodium, quod tradimus, est Imperatoris plantæ Candie propria, quæ in omnibus responderet descriptioni Dioscoridis, inde Leontopodium legitimum inscripsit. Quidam Catanæcen existimant.

515
Bellus tamen in Epist. ad Clusium contrarium tenet. Cum arefcit, inquit, capitula in se contrahuntur ad speciem vnguim milui exanimati, vt in Catanance prima Dioscoridis: sed Catanance non est: nam folia Coronopi non sunt, neque semen Osobo simile habet. Si autem hæc duo haberet, legitima esset Catanance.

Dubitat Clusius an ad Plantaginis angustifoliæ, similitumque classem, hæc planta sit referenda, quam ex Italia Francofurti diuersâ appellatione insignitam accipiebat. Cortulus enim ipsi mittebat eam adhuc tenellam, vestigia tamen capitum adhuc retinentem, vñ cum iconè, ipsam stirpem satis scitè referente, addito Catanances nomine. Iosephus verò à Catana bona ipsam plantam maturam & aridam, ac recens è Creta delatam, Leontopodij appellatione. Clusius autem diligenter conferens vtramque cum Leontopodij & Catanances descriptione, animaduertit notas aliquot habere satis inter se conuenientes vt fusè enarrat.

Iconem ex virente planta in horro D. Iacobi Zvvingeri cum suis capitulis Septembri visa pingi curauimus.

Vtuntur hac vulgaritèr ad soluendos quos putant ex maleficio Venere vti non posse: nam herbâ super piunas posita, expectantem nudum per fumum transire faciunt, & totidem viabus indusium eius fumigant: & sine dubio liberum à maleficio fore prædicant: Bello referente.

ELLEBORINE, EPIPACTIS, ET

Damafonium in genere

CAP. XII.

Epipactis, quam alij Elleborinem [*ἐλλεβοριν*] & Botien vocant, frutescens est pusillus [*βακτηρινος* *μακρός*], pro quo vet. quidam [*μακρά*] perquam exigua foliola [*φυλλάκια*, Ald. *φύλλα*] habens. Contra venena & jocinoris vitia potest, authore Dioscoridè.

Peregrina Italix auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam lib. 10. cap. 20. numerauit.

Non satis autem descripta est, vt nostra ætate cognosci possit: nec cur Elleborinen vocauerit eam antiquitas, constat. Si nomen ipsum tamen expendatur, non abs re fuerit Elleboro similem aut congenerem credere.

Si contra, Theophrastum aliquis audiat lib. 9. hist. pro candido Veratro de ea sic tradentem: Miscetur autem in Ellebori poculo, vt vomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis, inquam, hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit, Elleborinen dici: sed quòd Ellebori vim augeat, conjunctaque illi faciliores vomitiones faciat. Vtramque enim ex Theophrasto colligi causam arbitratur Marcellus.

Cæterum, vbi Theophrastus Elleboro albo, Elleborinès herbule semen admisceri scribit, aliquam Saraceno suspicionem mouet, Theophrastum hoc loco per Elleborinem, Sesamoides intelligere.

Elleborinen suam Matthiolus non describit, sed tantum pingit, nec etiam Epipactidem aut Elleborinen astringit.

Gelnerus de Lunar. ait alios etià errare, qui aliam Ellebori nigri speciem [cui folia plerum-

que bifida aut trifida] Elleborinem appellant. Quibus quid intelligat, videant lectores. Elleborines nomine intelligi Elleborum nigrum siluestrem vulgarem putat idem de hortis. Idem rursus de Lunar. illos errare scribit, qui Consiliginem Elleborinem appellant.

Elleborinem quandam pingunt recentiores & Belgæ, quam Elleborinem Dodonæi inscribimus.

Inter Elleborines præterea consideranda veniunt: Damasonium alpinum siue Elleborines species floribus albis. Damasonium purpureum dilutum est Elleborine sexta Clusij. Damasonium alpinum floribus luteis. Elleborine ex albo sublutea. Elleborine siue Damasonium montanum quorundam angustifolium, flore violaceo. Elleborine ferruginea Dalechampij, quæ nobis est Damasonij species quorundam, siue Calceolus D. Mariæ.

Ac pro Elleborine à nonnullis traduntur sequentes plantæ: Bifolium. Gentianula. Buphtal. Dodon. Lunaria botrytes. Herniaria. Centaur. minus.

ELLEBORINES SPECIES VARLÆ. CAP. XIII.

ELLEBORINE DODONÆI.

Description.



Numerosis fibris radicatur, albidis, quàm Hellebori habitioribus, & ad Ruscii radices, accedentibus, sapore amaricante: caulis modò vnicus, modò plures pedales, aut etiam cubito altiores, nullis ramis donati, teretes, & farina quadam aspersi: quibus sine pediculo adnascuntur folia, Hellebori

albi instar neruosa, sed multis numeris minora, & vix ad foliorum Polygonati magnitudinem pertingentia, sapore itidem amaro: caulis à medio ferè ad summum usque fastigium per intervalla alternatim floribus ornatur, Orchidum floribus non multum dissimilibus, quos constituunt folia bina albida, terna, herbacea, vtraque expansa, quorum medio ceu exenteratum muscæ cadaverulum ex albo purpurascens conspicitur: flori subest canaliculatum capitulum pediculo inherens breui, quo aucto semen clauditur minutissimum & pulvisculi instar.


An Damasonium calliphylon Cord. in hist? Camer. apud Matth. germ. ponit figuram cum inscriptione Elleborines, dicens flores variare, & quosdam virentes esse, alios albicantes, alios rubellos, siue incarnatos, & rubentes, præsertim in Austria & Vngaria. In Epit. pingit sub titulo Epipactidis siue Elleborines. Quenam autem sit Helleborine Dioscoridis, difficile conjectu arbitratur.

Hæc herba appellata est à Dodon. gall. græcè *ἡλεβορίνη* quoddam Helleboro albo figurâ similis sit: latine Helleborine & Epipactis. Quidam existimant quoddam Helleborum sit herba quæ Helleboro viribus duntaxat assimilatur, & nò figurâ. Sed harum opinio falsa cognoscitur, quoddam huic nec vnicam vim Hellebori Dioscorides attribuit. Idem in sol. lat. Helleborinem inscribit, ac ait: Helleborinem non improprie dici ac nominari posse, ipsa cum Veratro albo similitudo testatur: &c.

C. Bauhin. phyt. & in pin. Helleborine i. siue latifolia montana: Helleborine Dodonæi H. Lugd. pag. 132. Helleborine recentiorum secunda, Clusij. Helleborine Gerardi. Epipactis latifolia, Eyst. Sigillum Salomonis, Cæsalpini: Foliorum amplitudine [& quod altera folijs oblongis acutis, altera verò subrotundis est] & floris colore euanis.

In montibus passim occurrit Augusto, Septembri, & Octobri mense florens. Clusio prodicit in opacis Galliæ, Germaniæ, Austriæ, & Vngariæ locis, etiam in Pannonia interamni inter Drauum & Sauum flumina. Præcocior est reliquis & Maio plerumque florere solet.

DAMASONIUM ALPINUM SIVE Elleborine. floribus albis.



Disimilis est Hellebori. Descriptio: radices fibrosæ, tenues: caulis modò dodrætalibus, modò maior, modò minor, gracilis, folijs alternatim amictus, Plantaginis lanceolatis, angustis, aliis etiam viciâ latioribus, sed Hellebori albi more striatis, nitidis: flores per caulis summa spicati & velut Orchidum modo dispositi:

è sinu foliorum exiguorum singulares, masculi, lactei, longi calyces capitulo impositi, tribus in ambitu folijs præditi, intra quæ duo alia minora, his verò oppositum tertium hians, & labellum luteum velut alis quibusdam munitum. Ex huius hiatus pistillus albus, nitidus, brevis, capitulum sustinet nitidissimum, tenerimum, oblongum, summa parte per longitud. hyl. impressione notatum.

C. Bauh. phyt. & pin. Helleborine siue flore albo, vel Damasonium montanum latifolium: Tabern. & Ger. Helleborine albo flore: Eyst. Epipactis angustis folijs: Cordo hist. Alisma cymbalanthemon.

Reperta mihi in montibus ad S. Vrsinū florēs Maio. Eademque etiam olim oblectuata Tiguri. Genero Cherlero in syluaticis & vmbrosis littoribus maris Adriatici frequentissima & speciosissima observata.

Damasonium purpureum dilutum, siue Elleborine iv. Clusij

Vbitali caule, rotundo, geniculato, quem in singulis geniculis alternatim ambiunt angusta-



sta folia, Secundi generis [Elleborines Dodonæi] foliis non dissimilia eruerememinit Clusius: cuius summus caulis definebat in spinam flex, octo, aut plurium intercedum florum, quinque foliis elegantissimi diluti; purpure coloris constantem, inter quæ latebat quedam veluti galeola muscarum proboscidi similis, labrum inferiore

parte adnexum habens, æqualis ferè cum foliis longitudinis, candicans, intus striatum: sustinebantur flores anguloso, tortili, hirsutoque nonnihil capitulo: radix illi fibrosa, sparsa, subrufescentis coloris.

C. Bauh. phyt. & Pin. Helleborine 7. siue montana angustifolia purpurea: Helleborine 5. Clusij pann. 6. eiusdem hist. Damasonium tenuifolium Cordi hist. Damasonium alpinum H. Lugd. p. 1058. Alisma tenuifolium Thalij, Sigillum S. Martij 3. Cæsalp. Helleborine angustifolia Tabern. & Gerardi. Nos Damasonium H. Lugd. huc non referimus, flores liquidem inter alia conueniunt.

In Paannoniæ quadam silua, magno miliari ab arce munitissima Nemethy vivar, aliisque Zolnok vicinis locis abundantissimè nascitur. Floret hoc genus Iunio, nonnunquam etiam Iulio.

DAMASONIVM ALPINVM floribus luteis.

Radix est nigra, modicè fibrata, altius descendent: folia oblongis, angustis, nervosis, lanceolata: siue Plantagini minori similibus, aliquantò longioribus, acuminatis: caulibus pedibus: flore luteo: seminibus oblongis, angulosis, quaternis simul sic conjunctis, ut hiant medio spatio fenestrata quædam meta appareat, apice nigro supereminente, elegantissimi figuræ, lateræ, quæ nondum cornu chartæ obducta est, clausæque simili, & hinc plantæ peculiari.

Damasonium

alpinum montanum Herbatij vocant: quidam Clymenum, folio Plantaginis minoris, folliculis Iridi similibus, seu et oblongo, circis polyporum non dissimili. Sed cur Damasonij nomen huic plantæ indiderint, haud constat. Quare liberum cuique aut id retinere, aut aliud verius sufficere: H. Lugd.

In Alpium vmbrosis conuallibus gignitur.

Elleborine ex albo sublutea.

Caulis surgit recto, sesquicubitali, phis minus. Folia vestitur pluribus, alterno situ positiss, perfoliatis, latioribus quàm Helleborine flore albo, venosis & striatis, ut Hellebori albi, sed multis numeris minoribus, saturè virentibus. Caulis summathyrsus occupat florum ex albo luteorum galea alba, labello luteo & subcroceo prædiorum: e quorum sinu pistillus firmus, crassius cum apiculis farinaceis: Ad quorum pediculos semunciam longos singula extrorsum conspiciuntur foliola parua, angusta, acuminata: Radix fibrata, ad Elleborum accedens, valde profundè radicata. Sapor amarus admodum in foliis & floribus.

An Damasonium alpinum H. Lugd. p. 1057. & 1058?

Obseruavi florentè mense Maio in limitibus Montbelgardensis ditionis versus Mathis arcem in vepribus, & in monte dicto Montbar.

Elleborine siue Damasonium montanum quorundam flore violaceo angustifolium

Damasonium hoc montanum, quod Dalechampi olim Clymenum denominabat, floribus est violaceis, ceteroqui Elleborine Dodonæi affinis planta, sed foliis angustioribus. Prope Geneuam in colle la Basine obseruauimus: item in monte Rolsberg prope Masinunster mense Octobri Helleborines flore violaceo meminit Lobel. in Obs.

Elleborine Corpuandæ seu Alisma racemosum.

Sesquidrandialis est planta, caule geniculis discreto, ex quibus continuo ordine folia sua exerit, Plantaginem maiorem ferè imitantia, sesquiciam lata: flores verò racematum quasi in longo recuruoque scapo dependent plurimi rubicundi.

Thalio descriptionis auctori dicitur Alisma Corpuandæ seu racemosum: C. Bauh. phyt. & pin. Helleborine 2. siue atro-rubente flore: variat foliorum amplitudine: florum colore atrorubente, rariùs candido.

Frequens est multis in locis, opacis tamen & montium jugis.

Damasonium flore herbaceo, intus non nihil candicante

Pari est cum Helleborine Dodonæi magnitudine, paulò latioribus foliis, minoribus floribus, qui etiam quinque foliis constant, & galeolam cum prominente labro amplectuntur, colorisque sunt herbacei, interius nonnihil candicantis, nullius odoris, quibus torosa contortaque capita subsunt: radix nominatè similis.

Clusij pann. Elleborine 2. Eid. hist. Helleborine recentiorum 3. C. Bauh. phyt. & pin. Helleborine 2. Minu.

Locus.

ne 3. angustifolia palustris siue pratensis.

Inuenitur in quibusdam Austriae & Pannoniæ ficioribus pratis, & in Norimbergensi silua virbi vicina ad Latomias.

Elleborine flore carneo.

Huic minor est altitudo, similia interdum folia, nonnunquam multò laciore: flores aut omnino purpurascens, aut omnino, aut propè carnei, Elleborines Dodonæi floribus potius similes: nec radix differt.

Synon.

Elleborine 3. Clus. pann. 4. Eid. hist. Helleborine 4. siue flore carneo C. Bauh. phyt. & pin. Sigillum S. Mariz alterum Czaspino.

Locus.

Crescit in montanis pratis & cædis siluis Austriae.

Elleborine montana angustifolia spicata.

Elleborine 4. Clus. p. nn. 5. Eid. hist. Helleborine 6. siue montana angustifolia spicata cubitalem altitudinem superat, & amplissima omnium sunt illi folia, atque oblonga purpurascens florum spica.

Locus.

Nascitur in multis Pannoniæ & Austriae siluis, & ad montanorum pratorum margines: sed nusquam frequentius, quàm in ea silua, in qua Damasonij species, Calceolus D. Mariz abundat.

Elleborine tenella, tribus in caule foliis prædita.

Descriptio.

Non inelegans est Elleborines recentiorum hoc tenellum genus, quod Gulielmus de Mera, Medicus ex I. alia rediens, obseruabat, & Clusio Francofurti donabat. Erat verò pedalis ferè altitudinis, gracili caule, tribus foliis prædita, Elleborines v. ligatis foliis formâ similibus, & quinque nervis per longitudinem eorum excurrentibus, sed longè minoribus, v. quæ circiter vnciam longa sunt dumtaxat, semunciam lata: summus caulis in spicam florum desinit Elleborines vulgaris flores imitantium, sed minorum: radix summa quasi tellure sparsa, crassiusculas succulentasque fibras egerat.

Elleborine 7. Clus. h. 8. C. Bauh. phyt. & pin.

**DAMASONII SPECIES QVIBVS DAM
siue Calceolus D. Mariz.**
CAP. XII.



Damasonij speciem faciunt quidam Helleborines affinem herbâ, foliis alternatim per caulem pedalem, illarum similibus, venosis, subhirsutis: flos summo cauli infidet plerumque singularis quatuor foliis atropurpureis decussatis acuminatis, vitem magnum ex luteo pallentem, lignipedum Franciscanorum ca-

lopodia imitatum, supernè aliquosque patulâ. Culinantibus: siliqua pulvisculo, v. in Helleborinis & Orchidibus plena succedit: radix obliqua sub terra agitur, numerosis fibris capillata, subinde caulium emaridorum vestigia impressa gerens.

Calceolus D. Mariz spuris Orchidibus cognatam plantam determinavit Clusius, Elleborines recentiorum primæ titulo, eam de cibus & depingens. Germani Marienschuch Passenschuch appellant: Hungari Czerech quoniam, i. e. Milles onam herbam, quasi *χρῆμα* dicas, Alii.

Gefnerus in epist. lib. 3. frequentem apud Helnetios inueniri tuberculis, lucumque florem illi tribuit, Cosmofandalonque Pausanias suspicatur, quod & Sâdali formam referat flos, & punctis ceu literis quibusdâ notetur, et Pausanias Hyacinthum esse coniecit, sed huic cum Sandalio nihil. Quidam vir doctus Lonchitum primam esse putat. Gefnerus verò de veteri nomine dubitat, & tamen ad Alismatis species refert. Fructus, inquit, semen, odor, sapor cum succo glutinoso & subacti, *ἡ δὲ ὅλη ὁμοιογενὴς* cognata esse arguunt, etsi radix reticulata non sit. De coll. stirp. vocat Calceolus luteam: item postea, Calceolus D. Mariz foliis Ellebori. De hort. Alismatis speciem quorundam, & Calceolus D. Virginis vulgò dictum. Similes & Arctius, Anten batten /) Damasonij aliquam speciem. Dod. hist. Flor. Damasonium nonnullis existimatum, Damasonium nothum: Lat. in fol. Calceolum marinum, cuius inscriptione duas exhibet figuras, & vulgò Calceolum sacerdotis, germ. *Der Passenschuch* & *Papen schoen* appellati refert: Existimari verò & à nonnullis Alisma siue Damasonium esse: sed minus quàm Saponariam cum eo conuenire. Folium quidem Plantaginis satis respondere: sed desiderati capitula thyrsoi florem tenuem, inalbicantem, & radices Veratri nigri similes.

De recentiorum Calceolo Mariz (vt vocat in Adu. & Obs. pag. 126.) siue Calceolo Mariz & Sacerdotis crepidam, Damasonio notho (vt in Ic. Plant. pag. 312. inscribit) hæc prodit Lobel. Priscis etiam præterita videtur illa floris larua perquam spectabilis, etiam plantagineis foliis, aut bifoliis, quam nonnulli Alisma opinati sunt, vulgus Septentrionalium *Wyer wroen* / *schoen* / vel *Papen schoen*, i. e. Virginis calceum, vel Sacerdotis crepidam vocat: à floris effigie, quæ quatuor costat foliis dilute purpurascens, & rubellis, sui è medio prominentibus vtriculo quendam purpureum, latus vacuum, rotundum, facit, aut alyonis cadaver, vel ynedonis caliculos florum nonnihil referens, sed supernè, aut late vno patulum, instar crep. & oræ patulæ, quæ inferitur pes: foliis Plantaginis, aut Alismatis in longitudinem venosis: radice transuersa, nec altè depacta, nec multum fibrosa.

Apud Amatum lib. 3. c. 18. ponitur ex figuris Dalechampij pro Lonchitide prima, quamuis Amatus scribat Lonchitidem vitamque sibi cognitam.

Camer. hort. Damasonium nothum Dodonæi: Thal. Alisma *ἀνδροειδὲς* aut *νοκάρδιον* H. Lugd. p. 1146. Elleborine ferrugine Dalechampij.

C. Bauhin. phyt. & pin. Helleborine 9. siue flore rotundo, siue Calceolus: Alismatis species flore ferrugineo Gefn. hort. Lonchitis prior Dalechamp. in Dioscor. Damasonium nothum Dod. gal. Pseudo Damasonium Clus. pann. Calceolus Mariz Eyss. Flore est luteo, & folia ad

Ha adiuncta ferruginea: reperi ut & albos, & vtriculo purpureo: apud Helæctios flore est duplō maiore, quā apud Nōtios.

Intellexi, inquit Clāsius, nō Hercinia silva, præterea circa Poldam, alijque Germaniæ siluosis locis copiose nasci. Ego Tiguri fluentem obseruauit Maior: in montibus Genææ propinquis lunio.

De Calceoli autem Mariani facultatibus licet nihil occurrat Dodonæo ad scribendum: vtpote non modō veteribus, sed nec recentioribus satis cogniti: Vulnerariam tamen herbam esse, plagæque recentē illatas sanare aiunt non pauci.

ALISMA TOSSANI CAROLI. CAP. XIII.



Caule surgit singulari, cubitali, anguloso, glabro, fusco: cuius scapus in alas aduersas atque hæc rursus in alias surrectas omnes & in thyrsam fastigiatas diuiduntur: flores singuli in sident stellati, quinque radiatis folijs [rarissimè quatuor] constantes, iisque acuminatis, interinde ex dilatiore

cæruleo in albidum pallefcentibus, strijs saturatioribus longitudinem peti: rentibus, quæ externa parte paululū admodum apparent, in herbaceum declinante: in medio flore surgit utrīcosus nonnihil stylus, & quina stamina, Violaleuter tincta, quæ nonnunquam repanda in foliorum interstitia sese insinuant: porro autem singulis florum folijs ad basim binæ ceu pusillæ verrucæ violaceæ adnascuntur: toti denique flori foliola viridantia radiata subijciuntur: folia per terram sparguntur, plantaginea, media inter Plantaginis maioris & Quinqueneruæ folia, alia caulī sine pediculo adnascuntur, angustiora, ex opposito sita, magisque acuminata, singulique adeo thyrsi diuisionibus folia, sed minora, subijciuntur, ex aduerso posita: sunt ea verò pinguiuscula, atrouerentia, glabra, per quorum longitudinem nervus decurrit rectus, aliis vtrinque sinuatis: sapor gustanti amarus.

C. Bauh. in phyt. eius meminit, ut apud nos viso, nomine Alismatis pimi, siue folio glabro. An autem eadem sit cum Gentiana Pennæ, flore punctato subcæruleo, ut idem voluit in Pinace, ambigimus.

Pulchram hanc plantam nobis jam descriptam ante annos plures ab insigni pharmacopœo Tossano Carolo accepimus, in Burgundæ Chaux pagnole locis aquis collatam, quæ in horum transita pluribus annis durauit, & quotannis floruit, & semen maturauit mense Augusto & Septembri.

Tom. III.

GENTIANA VETERIBUS. CAP. XIV.

Perisset tota Gentidis antiquissimi Illyriorum regis jam pridem cum nomine fama, nec esset regiæ eius fortunæ monumentum aliquid, nisi renascens quorannis Gentiana, gratā inter homines memoriā, honorem illi identidem augeret, amaræque hominem & laudare, posteros cogeret, qui ut generi humano proderet, in frigidissimis regionis suæ, ventosisque montibus, neglecto regiæ potestatis honore, herbas querere, & inuenias nobis indicare, veritus non fuerit. Tam innocenter sibi, vtiliter verò alijs, tunc reges imperia tractabant, gaudente, vtpar est, matre omnium tetra, augentibusque vires suas herbis, quæ regum manibus foderentur. Gaudente etiam Medicina, quæ reges haberet auctores, eorumque dignitate suam & ipsa honorem & gloriam augeret. Quandō Illyriorum regi honestius hoc in laudibus suis audire, quā Cæsari centum & nonaginta duo milia hominum occisa prælijs, qui maximas fortunæ & gloriæ eius cumulas est, in honorem suum fecisset. Et quos bello alij perdidissent, inuenit se Gentianæ remedijs ad salutem instruxisse.

Nota igitur omnibus semper Gentiana fuit. Et Dioscorides ab inuentore Gentio Illyriorum regi Gentianam appellatam scribit: folijs proximè radicem (ab radice, Cæsalp.) Iuglandi Plantaginisve similibus, subrubentibus, à medio autem caule, & maxitè circa cacumen paulū dissectis: caule inani [concauo] leui, digiti crassi utrinque, ac binū cubitorum altitudine, geniculis distincto, & maioribus ex intervallis folijs circumdato: semine in calycibus lato leui [sine pondere] aceroso (paleaceo) ad Spondylii semen accedente: radice longā, Aristolochiæ longæ simili, crassā & amara. Nascitur in cellidinis montium jugis, locis vmbrosis, aquisque. Vis radici excafcatoria & detergens. Cetera verò natarium bestiarum morsus duabus drachmis cum Pipere & Ruta ex vino pota auxiliatur. Extrañi succi drachma ad laterum dolores, & casus è sublimi, ac rupta & conuulsa prodest. Hepaticis quoque & stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita partus ejicit: imposita que ut lyctum vulneraria est, & conicula tum depascentibus vlceribus medetur, præcipue verò succo, qui quidē oculis etiam inflammatione laborantibus illinitur. Miscetur & succus acrioribus collyrijs pro meconio [hoc loco mē] (cum) pro [pro] legendum esse ipsa res monstrat. Non enim medicamenti frigidissimi loco substituitur, quod calidum & siccum est, H. Lugd. Sed & radix vitiligines, alphas dēctas, absterget. Porro extrahendi ratio hæc est: Contusa radix ad dies quinque aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum exierit, emineantque radices: ac ubi refluxit aqua, linteo excolatur, moxque discoquitur ad mellis crassitudinem, siccilliquæ vase reconditur. Hæcenus Dioscorides, in cuius notis aliqui Centauræam radicem, alij, Aloem gallicam, alij Narceam, alij Chironium, Dardani Aloetin, Romani Gentianam seu Cicendiam, alij Cyminalem vocant.

Plinius lib. 25, cap. 7. scribit Gentianam ubique nasci, in Illyrico tamen præstantissimam, folio Fraxini, sed magnitudine Læthææ: caule teretere, pollicis crassitudine, cauo & inani, ex inter-

Mus. 2.

vallis foliato, trinum aliquando cubitorum, radice lenatâ, subnigra, sine odore, aquosa, montibus subalpinis plurima. Vsum esse in radice & succo. Radicis naturam esse ex calidioriam, sed pregnantibus non bibendam. Hec hoc loco. Sed & reliqua à Dioscoride tradita, partim idem Plinius habet.

Galen.

Galenus omnem vim Gentianæ radici ex amaritudine attribuit. Gentianæ (inquit 6. simpl.) radix multum est efficax, cum opus extenuatione, abstersione, purgatione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, cum impensè amara sit. Hæc Galenus.

Aucenna.

Aucenna Gentianam calidam esse scribit ordine tertio, siccam verò secundo. Componitur ex hac apud Mesuem, & alios plerosque Medicos, theriaca diatessaron, sc. ex quatuor rebus, sc. addita Aristolochia rotunda, Myrrha, & bacis Lauri, æquali portione, quæ vicem explet Theriaca magnæ. Diosc. alio modo diatessaron facit, exhibens percussis à serpente radicis Gentianæ drachmas duas cum Piperis & Ruta & vino.


Cæcilius, Gentianam Centauro similem, Centauriam radicem aliqui nominauerunt, & ex eo Narceum, quoniam Narce Centaurium etiam dicitur. Fuere qui Aloëm gallicam nulla foliorum, sed radicis & rectitudinis & amaritudinis similitudine aliqua, quam utrumque genus amaram rectâ sub terram agit. Chironia à centauro Chirone dicta itidem est, quoniam & Centaurium ab eodem Chirone pariter nominetur. Credidit præterea Marcellus, quoniam Aloë diceretur Gentiana, à Dardanis Aloëm pariter nominaram fuisse.

Porro licet Veteres vnus duntaxat Gentianæ meminerint, recentiores tamen cognouerunt plures, & scriptis publicarunt. Et C. Bauhinus inter Notericos doctè inter Gentianas sic distinxit. Aliæ sunt radice perenni, aliæ fugacillæ, flore & semine prolixi, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, nona germina produunt: hæc verò, flore emarcido, & semine disperso Hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

GENTIANA VULGARIS MAIOR

Ellebori albi folio.

Descriptio.



Folia Ellebori albi foliis paria, circa radicem multa, per caules ex aduerso sita, eosdem pediculis connatis amplectentia, nerulis tribus aut quinque plantagineis distincta, glabra, polita, lucida, hisque notis ab Ellebori albi foliis distincta: caules cubitales, bicubitales, ac etiam interdum hominis altitudinem as-

sequentes, singulares, lene: ex foliorum superi-

orum minorum sinu flores verticulorum modo dispositi erumpant, calycibus inclusi primùm, postea intumescentes explicantur, qui singuli longiusculi & lutei: sequuntur vascula oblonga, in duas se partes aperientia, in quibus semen numerosum, leuiter rubens, ad Leucosij semen accedens, leuius: radix crassa, longa, multifida, inus flauescens, sapore insigniter amaro. Quæ cum sit fungosa, siccata insigniter corrugatur, & externè rufescit.

Fach. cum Cordo reprehensione dignus, quod folia per ambitum leuiter incisa Gentianæ attri-
buant, non obseruantes Dioscoridem esse corri-
gendum. Helleboro enim albo foliis aded proxima est vt minus exercitatum eminus eludat.

Theod. Dorst. ineptiam, nescimus cuius plantæ iconem exhibet, jam antè pro Galanga quoque positam.

Gentiana dicitur Brunfels. tom. 3. thapf. 77. Co do in Diosc. & Hist. Fachf. Anguill. Geln. hort. & de coll. stirp. Matthiöl. Each. Ræll. Corn. Harch. 10. Agric. Lon. Rob. Conf. Czfalp. H. Lugd. pag. 128. Lac. Dod. Turn. & Castor, qui germ. *Wetst. wurtz* vocat, quod nomen non conuenit. Gentiana magna floribus luteis Gesn. in descr. mont. fr. Gentiana maior florib. subcaeruleis, Gesn. in app. hort. Gentiana maior vulgata. Aret. in d. ser. mont. Stœck. Gentiana maior fl. luteo Came. hort. Gentiana maior. Lob. in Adu. Obf. p. 165. l. c. Plant. p. 308. Gentiana floribus luteis Simler de Alp. Gentiana magna fl. luteo veteribus desc. supra. Gentiana veterum Clus. pann. & H. fl. Gentiana alpina maior C. Bauhin. pin. & [vt etiam phyc.] Gentiana. siue maior lutea.

Turciæ Græcis, Latinis & officinis omnibus Gentiana. Mauritanis Gentiana, Gentiana lutea, seu Basatez: Sclauonibus & Turcis Serfenicha. Germ. *Gentian* / *Wetterwurz* / & in Alpihus H. loetiz *Wetlach*: Belg. & Angl. *felwortte* & Gentiane, vt & Gallis. Itali latinum nomen retinent, vt & Hispani.

In montium patris ac pascuis vasis in locis obseruauit, florem in Iunio ac semen maturantem Aug. sto. Copefium ait Turnerus in Alpihus inter Germaniam & Italiam: Matthiölus frequentissimam in excelsis Tridentinis montib. præter inque in Ananienfibus, in quorum cacuminibus effodi refert radices brachiali longitudine. Augusto & Septembri colligitur radix, & siccat in vimbra. Singulis annis regerminat: cum verò semine se propagat, raro altero & vix tertio anno caulem producit, nata in Sueuiz & Baiscoiz montibus, Cordo. In hortis difficulter vltra triennium durat: in iis quidem floret, sed facile postea perit, nec ex semine facile prouenit.

Commendatur radicis puluis ad canis rabidi mortuum. Hepaticis & stomachicis, qui cibum sumptum retinere non valent, Gentianæ radicis puluis è vino potandus exhiberi debet, quod qui fecerit, auctore Trago, auxilium præfens sentiet. Euporiston medicamentum in febribus, quod etiam testatur Horatius Augerius in suis epistolis. Simlerus in descriptione Alpium, refert pastores vt Gentianis ad vbera vaccarum si à muribus araneis aut aliis bestiis venenatis lædatur. Putredinis Gentiana hostis infestissima, & veneni mors, inquit Lobelius. Pesti aded remedium præfens, vt non modò homini, sed etiam brutis incolumitatem tueatur: & amissam restant.

restaures, eoque solita Heluetia istam cum flammula porcis, & olim Monachis propinare, ne anima in vino cadauere puteret. Gentiana aqua, perfectim quæ vase duplici balnei vapore, vitreis organis elicitur, febres (vt Matth. de sæpius expectum air) ab infarctu tum viscerum, tum vasorum excitatas mitificè pellit. Alui tinea necat maculaque in facie qualescunque detergit, si eâ frequentius maculae abluantur. Succum Gétianæ magnitudinis Castaneæ aut Nucis Iuglandis dimidium eius vno die, alterum post die, commendat deglutendum, contra febres, non solum tertianas longas & nothas, sed & quartanas.

GENTIANA MAGNA FLORE purpureo & albo.



A Vulgari maiore, luteo flore nihil formâ differt: etenim ampla habet folia, Ellebori albi folijs haud multum absimilia, sed teneriora, & saturatiora viriditate splendens: caules digitali aut pollicari interdum crassitudine præditos, rotundos, cubitales, nonnquam bicubitales, genicu-

latis, quos ambiunt similia folia, aliquantulum tamen angustiora, ex aduerso sibi opposita: extremos caules ambiunt binæ aut ternæ confertorum florum coronæ, qui non sunt lutei, aut stellati, vt in vulgari maiore, sed purpurei, maiores, concaui, in fenas aut plures lacinias obruas extremis oris secti, & purpureis quibusdam punctis, inferiore & interiore, quæ candidiores & dilutiores sunt, distincti, odoris expertes, totidem, quot sunt lacinie, staminibus longum & bifidum vasculum internè ambientibus, in quo cõtinetur copiosum semen, planum, paleaceum, minus quam in illa flaua maiore stellato flore, subrotundum: radix crassa, longa, foris plerumque flaua, intus alba, impenitè amara, digitalibus fibris subinde prædita est, singulis annis noua gemina (quemadmodum maior flaua) proferens, & multos caules ex eodem capite producens, præsertim cum adoleuit, sed qui alternis duntaxat annis, vt plurimum floriferi esse soleant, inter quos scente nimirum vno anno à partu matre. Aliud genus inuenitur nihil quidem à dicta aut formâ, aut magnitudine differens; sed cuius flores, qui in illo sunt purpurei, in hoc omnino laetæ coloris conspiciuntur, auctor Clusio.

Trago Gentianæ alterum genus, multò magis exiguum, vulgate per omnia referens, excepto flore subcæuleo, & gustu amarior. Geinet in monte fracto, Gentiana punicea, radice lutea, amarior: Eid. coll. stirp. Gentiana punicea, radice lutea, amarior: Eid. coll. stirp. Gentiana minor, alpina, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis, vel duorum. Simliero Gentiana altera minor floribus puniceis. March. Gentianæ

To n. 177.

species paulò maior, subcæuleo flore Ded. gall. Gentiana 2. siue flore cæruleo Tragi, maiori efficiaciâ. Camer. apud Marth. in hist. germ. Gentiana cærulea maior, in Heluetia frequens à Gesn. descripta. Eid. in Epit. Gentiana maior alla: Item hort. Gentiana maior flore purpureo. Et Gétianam Clus. pann. 277. & 278. itemque hist. cui & Gentiana Pannonicarum & Noricarum Alpium maxima, Gentiana maior albo flore. C. Bauh. phyt. & pin. Gentiana 2. siue maior purpurea Lobel. Obs. p. 165. Gentianam purpureis floribus à Clusio sibi transmissam memorat, iconem tamen non exhibet.

Purpuream Gentianam collegi Burmij Rhætorum florèntem Iunio. Gentiana maior purpureo flore exit spontè in Pannonicarum Noricarumque Alpium jugis abundè: Floret Augusto: semen Septembri maturefcit, novâ nunc in ea juga cadere incipiente. Varietas flore albo in Scitzæ superioris alpinis: Verum neque hoc genus, neque illud purpureo flore cicurare vnquâ potuit Clus. aut villâ diligentia & culturâ efficere vt in hortis permanere vellent, nêdum flores proferre. Quin culturæ beneficio deterior euadit.

Quoniam autem gustu amarior quam vulgaris, ideo in Medicina efficacior habetur, vehementiusque & soluere, & purgare creditur. Frequens huius vsus ad morsus animalium venenatorum. Hæc magnitudine & formâ dictæ planè similis, eius tamè flores paullo (vt ex sicca à Cromero missa plana, Clusio deprehendere licuit) minores, colorem habent pallidum suæ, vt Cromerus scribebat, ob solèrè luteum, quàm plurimis nigris maculis, intus & foris aspersum. Idem addebat, ab eo, qui ipsum in montana illa loca deduxisset, sibi retulatum, in alio quodam præalto monte, aliam formâ non dispari reperiit quæ cæruleo flore esset.

Synonym

Gentiana maior pallida punctis distincta & cærulea Clus. pann. p. 280. Eid. hist. Gentiana maior pallido flore punctis distincta: Et, Gentiana maior cæruleo flore. C. Bauh. phyt. Gentiana 3. siue maior pallida: Eid. pin. Gentiana 3. siue maior flore punctato.

In Silesiæ montibus eruit Achilles Cromerus Nissenfis.

GENTIANA FOLIO CONVOLVTO.

Planta est elegans radicibus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus, fibellis paucissimis adhaerentibus, vnde



caules exurgunt cubitales, rotundi, striati, glabri & albi, geniculis distincti, in terram reclinati, & concaui: circa quos folia viridia, glabra, subrotunda, nervosa, vncias duas lata, paulò longiora, rarius ex singulis geniculis bina, sed ex quolibet geniculo vnum tantum, nullo

Descriptio

Mmm 3

certo ordine vel numero enascitur, quod antequam expendatur, fistula instar caulem completur: flores in summo cauliculis, ex superiorum foliorum sinu, teneris pedicellis subnixi, ex cauliculis oblongis, nonnulli hispidis prodeunt, Saponaria vulgaris formæ ex quinque folijs per oras crenatis commissi, qui colore albi sunt, leni carneo colore asperso, in quorum medio staminula quædam exigua.

Gerardo Gentiana concava, Angl. hollow fesswoort or English Gentian. Sed improprie à Gerardo Gentianam folio cœvoluto vocari concavam scribit in epist. ex Anglia ad nos Lobelius. C. Bauhin. phyt. in prod. (cuius descriptionem asumpimus, ex missa ei iconè coniunctam) dicitur Saponaria concava Anglicæ item pin. vbi & Saponaria 2.

Locus & tempus.

Hæc ætate media floriet in Anglia, in Comitatus Northampton nemore quodam. Sipanie dicto, auctore Gerardo.

GENTIANA MINOR, SEV VVLGI Cruciatæ.



Descriptio

Reptant cum radice rami sesquipalmes, & dodrantales subrubentes: quos crebra ambiunt folia, bina semper aduersa, vel potius vnum contrarium ad genicula, tanquam vagina caulem inuoluens, cuius vtrinque exiit segmentum Gentianæ, sextuplò ferè minus, leue, pingue, amarum: flores in ramulis

extremis ex foliorum alis conferti, cærulei, quinquepartiti: semen copiosum, minutum, oblongum, sulcum, insipidum, vasculis continetur oblongis bipartentibus, folliculo membranæ obuolutis.

Synonyma

Bonselt. Herba fullonum. Cor. Gentianæ Herbariorum altera species. Angustellæ Cruciatæ in Apennino copiosa, nomine Gentianellæ. Gesnero horto: Gentiana cruciatæ. Camer. horto: Gentiana media, siue Cruciatæ, libentius horto assuescens. Eid. apud Matthiol. Gentiana minor. Et sic etiam ipsi Matthiol. Tabern. Gerardo, Lobel. Obs. pag. 166. Icon. Plant. pag. 109. & Ad. quibus & Cruciatæ recentiorum. H. Lugd. p. 1249. Cruciatæ siue Gentiana minor Matthioli. Cæst. p. 203. *γέντιανή μικρά*, non Pettimborsa, sed Pettimborsa vocanda. Et sic etiam pag. 154. Sed cur Durantes eandem plantam duobus locis tradit? Nonne hoc factum ignorantia sitipiæ? postremo enim loco sub titulo *γέντιανή μικρά*, Cruciatæ & Pettimborsæ malè pingit Cruciatam stellatam.

Cruciatæ Fuch. (cui & Gentianæ species) Matthiol. Lacun. Lion. & Eyit. Cruciatæ Gentianæ species. Harch. Cruciatæ gentianellæ Thalic. Vincetoxicum alterum Cæstip.

Hæc planta germanis vulgari vocabulo *Mee-*

delgheer & Treunburg, quasi Radix cruciatæ Nomi (*γέντιανή*) appellatur. Et hæc à radice ita dicitur. Etiam purant, sed folijs potius cruciatæ caulium in cumbentibus nominis eymon debetur. A radice amara Witterwurp. Radicem amaram, appellaris. Alij Saponariam & istam agriam, germ. Soffenraut, & wildweidkraut, sed per perâ vocant. Qu. Rhenum habet: Germani, S. Peterskraut, h.e. Hebam S. Petri: nonnulli propter voluera quæ sanare dicitur, Sperenssi h. nominat: Alij hestallenstaden, quasi Chliodynamin: Belgæ Modelgheer: Angli Grosse woort Gentian. Intelleximus à sagis gallicè nominari *l'herbe du cry*. Ital. Gentiana minore: Boh. Prostrelent foremp. Hieron. Braunsch. putat eam esse herbam, quæ Hebræis dicitur Borith.

Cruciatam d. etiam plantam, testimonio Matthioli, non parum cum Gentiana cogitationem habere confirmatur. Ananienſia rura Cruciatam vulgò vocant Pettimborsa, sed corrupta Italica voce, pro Metti in borsa, quod ingentibus viribus commendetur, ut perinde ac gemma, crumenis afferuari mereatur: aut quod tantum viribus excellat, ut Medici eam videntes ingentem argenti & auri copiam crumenis sint reposituri. Matthiolus in comm. lar. cum mag. fig. videtur nomen Pettimborsæ alteri Gentianæ tribuere. Ab Vngaris vocatur *gent 4 szlo/ Niralj szuc/* h.e. S. Ladislai Regis herba.

Potè Gentianæ tertiam vulgò Cruciatæ vocant (ut vocat) Clusius duas differentias obseruauit: vnam ramis humi procumbentibus & minorem: alteram firmis & erectis caulibus, eamque maiorem: flores item alterius magis cærulei spectantur, atque illarum altera radicem in foramina sectam minime habet.


C. Bauhin. qui in phyt. Gentianam quartam facit, & in pin. Gentianam pratensem 1. & Gentianam cruciatam vocat, triplicem differentiam constituit, Vnam procumbentem & minorem: alteram erectam & maiorem: Et tertiam radice non pertusâ.

Nascuntur verdè ex per vniuersam Pannoniam cum in collibus, montibusque apertis & gramineis, tum siccioribus pratis, & herbosis, secundum publicas vias, locis. Sed obseruatur etiam Viennæ Austriæ in pratis Dornacibus, siluæ adiacentibus. Item prope Wernigerodam. Locis non ita arduis, hæc Gentiana, multa & passi. n. oritur, vbi prope Basileam, & Maconium Burgundie Gallicæ, depressis collibus, Lobelio. In collibus & montibus, inquit Dodonæus, nec non in alijs incultis agris & asperis locis [& sic iterum, Trag.] reperitur, & in Germania quidem frequenter. Septembri quidè in Germaniæ agris, Iulio mense in Belgij hortis florēt. Ego vidi florentem Basileæ extra portam S. Albani in colle Iunio & Iulio: mense Augusto prope Leutach, & in montibus *Wass rfa/*. Genevæ mensis Februarij principio inveni in proximis montibus, vt Salevæ, cum reliquis foliorum & caulium præcedentis æstatis.

Huius Radices recentioribus magnis laudibus videri effertur contra pestilentiam & venenosorum animalium idus. Matthiolus quidem illud se experientia compertum habere scribit, quod radice usâ, & ventri emplastri modo imposita, vermes, qui in intestinis fuerint, procul dubio necentur: & ulceratæ strumæ sanentur, si ijs eodem modo con. usâ, quæ nuper effusa sit, vel sicca & in puluerem contrita adhibeatur. In summa non

non desunt, qui asserant, hanc ea omnia præstare posse, quæ Gentiana, Cæterum amara & foliis est & radice; temperiem calidam & siccam obtinet: præstat quæcumque amara possunt. Pastores pecorum apud Mediomarices miris superstitionibus hanc plantam, fœdant (inquit Tragus, qui hanc plantam *quidam* esse existimat) nam ubi pectus porcorum ingruerit, illius herham ac radicem minutim concisas cum aliis quibusdam pulueribus, in cibo ac potu exhibet, adiungit quibusdam preculis, planè sibi persuadentes quotquot huiusmodi efus degustauerint porci, eos à pestilentia tutos fore.

GENTIANA FOLIO ASCLEPIADIS vulgò creditur.



Caulis plures ex radice ad cubitum altos tollit, graciles, articulatos, quorum singulis iuncturis bina ex aduerso posita folia adnascuntur, Asclepiadis foliis formâ & magnitudine, respondentia, quinque secundam longi uerum uerum: è quorum singulorum sinu flos nascitur vnus, magnus,

oblongus, calathi formâ, quinque laciniis per extremum diuisus, cæruleus, totidem in medio staminibus: *Siliqua*, inquit Clusius subsequitur bicornis, quæ per maturitatem dehiscens, semen ostendit planum, paleaceum, colore cinereo, radix digitali crassitudine, læua, multas oblongas eiusdem coloris in latum spargit, singulis annis augescens, & noua germina proferens, gustu impense amaro. In nostra iconè malè picta radix.

Gesl. fr. Gentianæ species foliis ferè Asclepiadis [Hirundinariæ Smilæ de Alpib.] floribus cæruleis. Item, hort. Gentiana foliis Hirundinariæ seu Asclepiadis quorundam *Gustature* Schelmenfrant: quæ copiosa ubique apud Tigureses locis montanis circa semitas albiq̃ue apparer.

Aret. in deser. mont. Stockhornij & Nessi, *Disturbat* prior, cæruleos habens flores, Campanulæ figura: foliis Asclepiadem referens: caule tuberculato: radice bifida, luteâ, longâ, amarâ: semine compresso: Gentianæ species.

Dodon. lat. in fol. Cruciatæ siue Gentianæ minoris species Gesneri & Tragi, foliis Hirundinariæ, floribus confatis in Germania secus semitas. Velim Dodonæum indicasse, ubi Tragus Gentianæ folio Hirundinariæ meminisset. Gentianam porò eam in Germania secus semitas obseruare non memini, sed neque confatis flores obseruari. Vereor ne Dodonæus diuersas plantas confundat.

Tom. III.

C. Bauh. pin. Gentiana alpina maior 4. siue Asclepiadis folio (sic etiam cognominatur in phyto. ubi sexto loco ponitur) Gentiana 3. Tragi, & Dodon. gall. Gentiana 2. Clusij, Tabern. Gentiana minor altera Dodon. lat. Vincetoxicum primum Cæsalpini. *Quicquid* dicat C. Bauhinus, ex sententia etiam Clusij & Dodonæi, hanc apud Tragum non comperio. Est ea mihi alia.

Copiosè in Pannonia, Stiria, Austriaque inferio. **Locus.** re prouenit, ad montium radices, vmbrosis collibus, nusquam verò in summis & apertis iugis in Rhæticis montibus Schlickius Medicus eruit. Floret Augusto: semen maturescit Septembri. **Tempus** Fertilis hæc est, nec interquiescit, sed singulis annis, vetustior videlicet, multos caules floribus onustos producit. Peitinax autem est, & feriè mitiora loca respuit, interdum tamen curâ & diligentia effecit Clusius, vt in hortis comprehenderet, & singulis annis repullularet & flores ferret: attamen quasi natiuo aëre & pabulo priuata, atque tanquam compedibus vineta, lugere videbatur, ac pristini vigoris & elegantia plurimum amittere.

De Vincetoxico Matthæus Sylu. scribit valere contra venenum: ingredi in Theriacam Diatessaron, quasi hæc pro Gentiana accipiatur. Nam vt Cæsalpinus monet, apud Mesuem & reliquos authores non Vincetoxicum legitur, sed Gentiana. Celebrantur radices huius in febribus pestilentibus, & ad vermes enecandos singulari remedio. Sclauonici rustici, huius radices decoctum feliciter calculosis propinari, experimento se compertum habere affirmant. Aretius & Iohannes Stmli. tradunt eâ pastores vi ad vbera vacarum, si à mutibus, araneis, aut aliis venenatis bestis lædantur, curanda. Amara & hæc foliis & radice est; temperie calida & sicca.

GENTIANA ALPINA MAGNO FLORE.



Graciles habet radices, longissimas, plures coherentes, flauescens, **Descriptio.** propagines ex lateribus producentes. Folia humi fusa in orbem, crebra, duplè triplo Hippio maiora, vncis duabus interdum longiora, semunciam aut vnciam ferè lata, in acumen delincentia, crassiuscula.

vnico nonnunquam, aliàs tribus per lōgum necis donata, amara: pediculi vnciales, binis ex aduerso positis foliis ornati, ex calyce dimidio breuiore, quàm Hippio, florem emicantem sustinent magnum. Vix Mariæ patem, calathocidæ, daunt, trumve vnciarum longitu-

ne, unifolium per oras supremas in quinque la-
cinias diuisum, quarum spatia intercedit appen-
dix, auriculæ instar, continua: color foris ex
albo subcæruleus, laciniarum tamen spatia cæ-
rulea sunt: qui color vegetior & cyaneus hilaris
lacinias intrinsecus tingit, penitus autem si in-
rueat, stritis picturæ ad fundum vsque ex cæ-
ruleo purpureis, alperis, hinc inde eiusdem co-
loris punctulis: è fundo emergit turbinatus sty-
lus, angulosus, pulvisculo luteo circiter circum-
spersus, in summo tandem cacumine bifidus flo-
rem, teste Clusio, consequitur oblongum acu-
minatum capitulum, quod sese in duas æquales
partes aperiens, semen ostendit exiguum, striatum.
terrei coloris.

Synonyma

Trago Gentiana postrema, siue quarta. Gesn.
horto Gentianula, siue Gentianella alpina: Et
cat. Gentianella pumila. Arer. Gentiana 4. mini-
ma. Clus. Pann. p. 284. & 285. itemque in Hist.
post. Gentianella 5. siue Gentianella maior ver-
na. Lob. in Adu. pag. 110. Gentianella.

Amato addita est figura Dalechampi, in fine
posita pro Elleborine. An autem Amatus hanc
intellexerit, ignoro, quia à se visam in horto Ma-
gnifici Azaoli Ferraricenis, Epipactim non de-
scribit. Hist. Lugd. p. 828. inscribit Gentianellam
minimam latifoliam, atque quorundam esse
Helleborinem, siue Epipactim, posse verò &
Thylacitim maiorem dici: Allobroges Reperit
nominare.

C. Bauhin. Gentiana 11. siue Gentianella alpi-
na angustifolia magno flore: Item Gentiana
16. siue Gentianella Alpina latifolia magno flo-
re. Has diuersas esse plantas perperam statuit
Frater.

Locus &
Tempus.

Crescit in Schneeberg & Erscher abundantissi-
mè, aliisq; alpibus continuâ serie productis, per-
petuâque quasi niue obstitis: vbi Iunio & Iulio
h. c. primo istic Vere, floret: sub Iulij verò finem
& Augusto semen maturitatem adipiscitur: ac
mitioribus locis, in quibus authore Clusio, rariùs
inuenitur, atque in hortos translata, Aprili &
Maio. Inueni ego in monte Rhetorum Septi-
mo dicto florentem Iunio. In altissimis Diocæ-
sis Curialis alpibus in tractu prope Canobium
Thersera appellatum, quo loco thermæ sunt de-
cantatissimæ, primum Trago sese obtulit. Lobe-
lius in Patavinis collibus & decliuibus, vbi vipe-
ræ capi solitæ sunt, obseruauit. Hist. Lugd. cre-
scit in aridis, niuosis, perflatas, montosis: floret
mense Aprili.


Amarissimus est totius plantæ sapor, ideòque
focinoris vitii nempe regio morbo, & obstru-
ctionibus auxiliatur, pari cum Gentiana facul-
tate, cui amaritudine non cedit.

GENTIANÆ SPECIES, CALATHIANA quibusdam radice perpetua siue palustris.

Descriptio. V Dos amat pratorum margines, singulari, a-
liàs multiplici supra cubitalem altitudinē,
recto caule assurgens, per quem æqualibus spa-
ciis aduersa concidunt folia, palmari nonnun-
quam altitudine, culmum lata, superius atroui-
rentia, infernè dilatoria, è quorum sinu à medio
ferè caule, tummo tenuis flores in singulares, iam
duo, aut plures, cærulei, quinquepartiti, cala: hi
formâ, Gentianellæ Helueticæ pares, vel etiam
minores: radices plures longæ, luteæ, amare, quæ
non bene exprimuntur in nostra Fuchiana figu-
ra, quæ causa cor aliam pingi iusserimus.

Trago Gen-
tiane tertia spe-
cies radice lon-
ga & admo-
dum amara,
cauliculis ten-
uibus, tereti-
bùsq; foliis
acutis, angustis,
Campanulæ, o-
blongis, cæru-
leis.

Matthiolus
in prior. com-
meminit dua-
rum Gentia-
narum mino-
rum, quibus in
comm. It. cum
mag. fig. tri-
buit radices
albas, figuram
vnam tantum
exhibens, titu-
lo Gentianæ
minimæ. In
Lar. adscribit
caules humi
plerumque ac-
cubantes,
vocatque A-
nanienium
rurum genus
vltimum Pet-
timboria vul-
gò dictum. Con-
siderent autem
lectores an fue-
rit ritè nota
hæc Gentia-
nula Matthio-
lo, describen-
do radicibus
albis, & cauli-
bus humi ac-
cubantibus.



An in figura folia non sint penè maiora, quàm in
ipsa herba, licet graphicè descriptam dicant Ad-
uersaria. Figura Gesneri melius mihi placet. In
com. lat. cum mag. fig. circa nomen Pettimborsæ
sibi contradicere videtur: id enim nomen o-
lim Cruciatæ tribuebat.

Figuram habet Cast. Dur. p. 203. pro Gentiana
minima, Italicè Gentianella & Pettimborsæ vo-
cata, flore ex cæruleo purpureo, quæ represen-
tataliquatenus Violam Calathianam.

Dod. gall. lib. 2. cap. 21. Calathiana Viola, Cala-
thiana Plinij, & Viola autumnalis, *Violette d'An-
vers*, Belgis *blaw lufens*, & *Wijent schoon*.
Eid. lib. 3. ca. 12. Gentiana tertia, sine icone. Idem
de Flor. ait vulgò apud Belgas nomen non habe-
re, esse tamen qui cæruleum Liliū nuncupent.

Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis, ama-
ra, humidioribus pratis proveniens, profundio-
ribus radiculis, cærulei coloris saturati flore:
Gentianæ genus. Item, Gentianæ species pul-
chra, Pichris dicta Kreichio, fortè Plinij Cala-
thianæ species, Dodonæo propter floris figuram,
Calathiana vocata. Sed nec Gesnero, nec Dodonæo
assentiri possum, Gentianæ enim minori, quam
picturæ exhibet Dodon. & Gesnerus pro Pænu-
nomantis

monanthe, radices non sunt annuæ, quales dicit Cordus esse Pneumonanthes. An Gesh. coll. Calathiana, autumnales Violæ cæruleæ, ex quarum genere Petilium Florem Plinii dixerit, radicibus amarissimis? An cursus, Gentiana palustris, florens Augusti medio & fine?

Pneumonanthe [sic in Icon. Plant. Lobelius p. 59.] Cordi, Gentiana minoris species [Calathiana Viola Plinii Dodon. additur in Obs. pag. 166.] Germ. *Wimperblum*. Cruciatæ similis, aut eadem, quæ in pratis etiam montosis occurrit, foliis angustioribus, minoribus, flore cæruleo, Calathi modo, radice fibrosâ, nentiquam incisâ: à Matthiolo graphicè descripta. Vnam duntaxat, & huic similem sed floribus albis alit hortus pro fessoris in Academia Lomanensi Petri Baghæfii. iam antè diximus, Pneumonanthen Cordi differre à Matthioli Gentiana minore & à Calathiana Dodonæi. Præterea, tantam similitudinem haud animaduertimus cum Cruciatâ, quantum perhibet Lobelius.

Gentianæ quartæ siue angustifoliæ procul dubio genus est illa, quæ à Dodonæo Campanula autumnalis nominatur, & quod Augusto floreat atque Autumno, à Ruellio Calathiana Viola appellata est, à Cordo Pneumonanthe: *Miror* Clusium cum aliis eandem facere istam Calathianâ cum Pneumonanthe Cordi multum differente.

H. Lugd. huius plantæ tres figuras habet: p. 824. Calathiana Viola. Item, Campanula pratensis: pag. 159. Cruciatæ siue Gentiana minima Matthioli.

Gentianella palustris, de qua hoc loco agimus, proponitur à Gerardo & Tabern. pro Pneumonanthe. Thallio dicitur Viola Calathiana tertia.

C. Bauh. phyt. Gentiana 7. siue palustris: Apud Matth. Gentiana minima Matth. & Castoris, quoad descriptionem, non iconem, Viola Calathiana 2. Thalii, Pneumonanthe humerum ericetorum Lobelii. Non mihi verò videtur Violam Calathianam Thalii secundam cum hac conuenire. Pneumonanthen ericetorum Lobelii fupior esse Gentianellam quadrifolio flore. Eid. pin. Gentianella palustris 1. siue angustifolia, flore cæruleo, violaceo, & purpureo.

In Ducatus Vvrttembergici loco humido circa Aichelberg obseruavi florentem Septembri: Lob. in Pedemontanis pratis prope Susam & Rioli multam testatur. Reperit Dodonæus in pratis, frequenter in aliis incultis, & iisdem quibus Erica humidioribus locis. Clusio authore crescit in Austriæ pratis ad montium radices sitis. Floret Augusto. Aliquoties à Gesnero fuit plantata, paulò post tamen perit. Quamvis autem radix ei non simplex sit, locum tamen desiderat palustrem.

Viribus iisdem quibus Cruciatam præditam ait Matthioli. Dodonæus qualitate calidam statuit, Gentianæ facultate quodammodò simile, multò tamen imbecilliorum. Efficax à recentioribus aduersus pestilentes morbos habetur, & ad violentorum animalium morsus & ictus. Alii præclaras ei vires in fanodis pulmonum affectionibus ac hepatis adscribunt.

GENTIANVLA LANVGINE AD SINGV-
lorum foliorum floris lacinias donata,
flore quadrifolito.

Radix tenuis quali repens, albida, amari-
cant: caules sæpe singulares, aliquando plures,
Tom. III.

dodrantales & minores, quadranguli, in ramos aliquot diuisi: folia ex aduerso posita ad nodos oriuntur, inferiora quidem vniâ breviora, superiora verò longiora, culmum lata, nervo vni-
secundum lon-
gitudinem de-
currente: flos
in vniuscuius-
que ramuli ex-
tremo singula-
ris, calathi for-
mâ, longus,
colore cæru-
leo, in qua-
tuor partes
duntaxat pro-
fundas diui-
sus, non mu-
cronatas sed
rotundas mo-
dicè & cren-
atas, quarum
latera vtrin-
que barbitio
donata cæru-
leo, nec vllam



habeat ad imum lacinie intrinsecus lanuginem; medium occupant apices quatuor obsoletò minio tincti, staminibus albidis insidentes, nec non calycis vasculum longum quadrangulum in duos apices albicantes definens, in quo semen continetur minutissimum, pulverulentum, ad instar Orobanches, aut Helleborines: ex radice Autumno evulsa, præter floriferos caules, oculi in sequentis anni germinationem apparebant. In tota planta gustu nullum saporem percipio præter paucam amaritudinem in foliis.

An Dodon. in fol. lat. Campanula autumnalis, in ericactris tenuior ac minor? Thallius vocat Violam Calathianam seu autumnalem primam. Gesh. hort. Calathiana Viola autumnalis alia minor, flore dilutiori, radice inutili. An eid. coll. stirp. Gentiana pumila flosculo cæruleo, radiculis albis? An Camer. hort. Gentianella pratensis Bauarica minutissima, Autumno florens? An Lob. Obs. p. 166. Gentianella siue Pneumonâthes varietas, Arigiosior tora, humerium Brabantie ericetorum? An Clusio in Pann. p. 284. & Hist. post. Gentianæ quartæ, siue angustifoliæ varietas?

C. Bauh. phyt. Gentiana 8. siue angustifolia autumnalis, Pneumonanthe Cordi & Lob. Calathiana Viola autumnalis minor Gesh. flore cæruleo, dilutiore, nigro, rariùs albo. Apud Matthioli. Gentiana minor Matthioli, quoad descriptionem: Calathiana Viola Lugd. Dodon. in 8. Campanula autumnalis in fol. Viola Calathiana siue autumnalis Thal. Gentiana angustifolia 2. Clusio. Ego separo Gesner. Calathianam minorem à Pneumonâthe, nec ei tribuo colorem nigrum, ac miror neminem annotasse, flore esse quadrifolio tantum.

C. Bauh. pin. Gentiana pratensis 6. siue angustifolia autumnalis maior, Pneumonanthe Lob. Calathiana Viola autumnalis minor Gesh. hort. Calathiana autumnalis Gesner. cat. Campanula autumnalis Dodon. Eyf. Gentiana 4. siue angustifolia 2. Clus. Pannon. & Hist. flore cæruleo dilutiore: est nigro: rariùs albo. Item, Gentiana pratensis 7. siue angustifolia autumnalis minor Gesner. cat. l. tota pilosâ. Pneumonanthe Cordi Hist. def. Ad. Viola Calathiana Nam

Viola Calathiana Thal.

C. Bauhin.
notat.
Locus &
Tempus.

autumnalis prima, Thal. Gentianella autumnalis foliis Cetaureæ minoris flore cæruleo, Eysl. C. Bauhin. hic separat, quæ in phyt. coniunxerat. Gentianulam quadrifolio flore vidi eund. Montbelgardo à l'Isle, vbi ultra Montenoy iuxta dumeta florēt Octobri. Inter Vaulancourt & Dampierre supra fontem in colle Septembri. Itē prope Blaumontium, S. Hippolytū & Basileā, in monte Mouters in pratis descendendo ad sinistra versus Augustam. In Hausbergo lenæ creberrimè legit Thalius.

GENTIANA ANNUA CLVSII I. FLORE
ex cæruleo purpureo exiguo.

Descriptio.

Cybitem habet caulem, firmum, geniculatum: per quem ad singulos nodos sparsa sunt bina semper folia, sibi ex aduerso opposita, trineruia, latā sede & sine pediculo cauli inhaerentia: sensimque in longum mucronem deficientia: ab imo ferè caule ex foliorum alis nascuntur dodrantales & palmares ramuli, tenuous, minoribus foliis septi, quinos, septenos aut plures flores foliis cinctos, proferentes, in quinque mucronatas lacinias diuisos, exiguos pro plantæ magnitudine, purpurascens ex cæruleo coloris: iis succedunt longa & angusta vascula, tenui semine plena: radix singularis est, exigua, paucissimis fibris prædita.

Synonyma.

Clus. pann. & Hist. Gentiana fugax siue annua 1. vel Gentiana septima, & Tab.

C. Bauh. phyt. Gentiana 10 siue pratensis folio quasi triangulo: Eid. pin. Gentiana pratensis 2. siue autumnalis ramosa, Viola Calathiana altera siue polyanthemus Thalii, Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpurascens, Eysl. flore rariùs candido. Nos referimus Thalii Violā, ad Gentianam fugacem 2. Clusij.

Vires &
vltus.

Nascitur in pratis herbidiisque locis ad montium radices litis, montiumque clias, Iulio & Augusto flores proferens.

GENTIANELLÆ SPECIES QVIBVS DAM,
An Cordo Pneumonanthe, aut Gentiana
fugax altera Clusij?

Descriptio



Est vbi vnicò, est rutilum vbi pluribus donatur caulibus, vix vnciā altioribus, vel dodrantalibus, ac etiam interdum cubitalibus, angulosis, ex viridi saturatè rubentibus, fractu contumacibus & multum ramosis: folia, infima quidem ex angusto principio sensim dilatantur, superio-

ra verò latiore principio caulibus adnascuntur



que semunciales mucronatas lacinias abeunt, quarum singulis internā parte (non ad latera) pili, barbulae purpurascens adnatæ, quarum coitus tubulo inclusa quinque stamina cum stylo viridante occultat: sunt autem sapore luculentius amaro quàm folia, non sine acrimonia, calyx longus semen continet rotundum, Papaueris semine minus: radix subest lignosa, dura, modò vnica fibrata, modò plures. Annua est herba.

Faschius, cum Tubingæ degerem, vocabat Gentianam cæruleam quartam. An Cordo hist. Pneumonanthe, i. e. in gentium? An A. ret. Nalherfhis? An Clus. pann. pag. 289. & 290. itēque hist. Gentiana 8. siue fugax, aut annua altera?

Gesl. hort. Calathiana Viola autumnalis tertia, Gentianæ genus, radice inutili, calathis florum puniceis, multis, confarctisque: subacris.

Thal. Viola calathiana altera, seu *odoratissima*, floribus coloris ex pallidiorè cæruleo subrubentis veluti leniter, odoris nauseosi seu virosi. Rariùs flore prorsus candido.

C. Bauhin. phyt. Gentiana nona. Eid. pin. Gentiana pratensis 3. siue flore lanuginoso: Gentiana 8. siue fugax altera Clusij. Forè Frater non intelligit eandem, quam nos: quia Violam calathianam *odoratissima*, ad aliam Clusij refert, nempe fugacem primam.

In Alpibus Rheticis, & montibus Geneuz propinquis, itēque Basileæ in pratis, florēt Augusti & Septembri. Montbelgardi abundat supra la Crote, & circa Blaumontium, passim locis cliuosis sub Autumno.

Gentianella fugax tertia Clusij, flore virecente & subcæruleo, breviorè & maiore.

Pari ferè excrescit altitudine, nec minùs frequentibus ramis est prædita: caulis etiam quadrangulus, terni aut plures in singulis ramis flores superiori similes, sed breviores, ampliorèque virentis initio coloris, deinde subcærulei: quibus longa cornicula seu mucronata membranacea vascula semine plena, vt in superiore succedunt: folia in singulis nodis multò latiora, mucronata, trineruia, ex aduerso inter se sita, viridis saturi & quodammodò nigricantis coloris: radix superiori similis, inquit descriptionis author Clusius. qui Gentianam 9. siue fugacem aut annuam tertiam, impensè amaram cognominat.

C. Bauh. phyt. Gentianam 11. vocat. Idem pin. Gentianam

paullatimque in mucronem acutum faciesunt obscurè virentia, & in atrum nonnūquam vergentia, neruis aliquot secūdiū longitudinem donata, sapore subamaro, ortu opposito: flores ex foliorum alis, itēque in ramulorum extremis copiosi, purpurascens, calathi formā, seculum circiter longi, in quin-

*Gentianam prat. 4. siue flore breuiore & maiore. Obuia hæc est in omnibus pratis in sublimi-
sitis, & montium iugis, floretque Augusto.*

GENTIANELLA FVGAX QVARTA CLV.
si flore dilute purpurascente & cæ-
ruleo elegantissimo.

D Odrantem non superat, *cauliculis & ra-
mulis exilibus, minoribus etiam foliis, Cæ-
taurij minoris
flori penè pari-
ribus : flores
minores habet,
licèt formâ su-
perioribus non
absumilis, qui
aut dilute pur-
purascunt, aut
cærulei coloris
elegantissimi
sunt : cornicu-
la subflauo e-
xili femine ple-
na sunt : radix
licèt tenuior, à
duabus præce-
dentibus non
valdè differt,
autore Clusio,
cui dicitur Gæ-
tiana 10. siue
fugax aut an-*



nua quarta. Ei similis videtur, quam Lobelius
Gentianæ minimæ nomine describit.

An Lob. in Adu. Gentiana minima, omnium
speciosissima, in montibus arduis fruticans.

C. Bauh. phyt. Gentiana 17. Eid. pin. Gen-
tiana alpina minor 6. siue Gentianella breui fo-
lio : Gentiana minima Lob. Cost. cui & Vulne-
raria herba, in Icon. p. 481. Sed figura Lobelij
demonstrat non eandem, nec æmulam floribus.

Crescit iisdem quibus altera locis : meminit
Clusius & in Britannia obseruare, non procul
Douera, mense Septembri, partim dilutiore co-
lore florentem, partim femine prægnantem.

GENTIANELLA FVGAX QVINTA
Clusij flore cæruleo colore ele-
gantissimo.

L Ongè exi-
lior [quã
quarta fugax]
vix trium vn-
ciarum altitu-
dinem æquat,
licet multisa-
lis prædita :
foliola Cen-
taurij mino-
ris in singulis
geniculis, a-
liarum more
sita habet :
flores minori
Gentianellæ
vernæ persi-
miles venu-
stissimo cæra-
leo colore
præditos gor-



nicula qualia superior, admodum exili & ni-
gro femine plena : radicem quàm in superioribus
minorem, sed frequentioribus fibris donatam.
Impensè amara est.

Gentianam hanc suam 11. siue fugacem aut Synon.
annuam quintam, Clusius eam suspicatur, quam
Simlerus comm. de Alpibus, *himnelfstengel* ap-
pellat. In tabula proposita minor icon vide-
tur conuenire posse cum Gentiana dicta Clusij.
An autem sit Aretij *himnelfstengel*, pusilla her-
ba, floribus cæruleis, radice amara, ambigo.

C. Bauh. phyt. facit Gentianam 12. Idem pin.
Gentianam alpinam minorem 4. siue Gentianel-
lam alpinam æstiuam Centauræ minoris foliis,
Gentianam minorem Tab. Calathianam vernam
Dalechampiij, Hist. Lugd. pag. 825. quæ
nobis est diuersa.

Floret in Etſcheri iugis Augusti initio.

Locus.

GENTIANELLIS AFFINIS, CALATHIA-
na verna Dalechampiij, cum albis
staminibus.

R Adice donatur breui, gracili, candidâ, parum
fibratâ : caule singulari, palmum alto, no-
doso : foliis paucis, Centaurio minori similibus,
pauld longioribus, binis semper caulem ex ad-
uerso complectentibus, veluti cauo alarum sinu,
Anagallidis modo, ex interiore sinu pediculus
vnus, interdum geminus prodit, *florem* sustinens,
calathio, vel folliculo similem, è cæruleo purpu-
rascentem, albis intus staminibus.

Descriptio.

Ex Dalechampio Calathianam vernam voca-
uit H. Lugd. & Thylacitin à floribus figura, *Θύλακ-
τις*, i.e. saccum, culeum, folliculûmve referen-
te. Similitudinem autem aliquam habet cum
Gentianella fugace quinta Clusij

In pratis editissimorum iugorum Iuræ mon-
tis pronenit : floret Maio & Iunio mensibus.

Locus.

GENTIANVLA QVÆ HIPPION.
CAP. XV.



T Otum ob-
umbratæ
spitem pulchel-
la ista perennis
herba, fibris
hinc inde re-
prandibus for-
cunda, foliis per
terram sparsis,
interdum Len-
ticulæ non ma-
ioribus, inter-
dum semuncia-
libus aut lon-
gioribus, ner-
uosus : pediculi
surgunt vncie-
les aut pauld
maiores, vno
aut altero fo-
liolorum pari
vestiti, quorum

Descriptio.

vniqueque flos insidet vnus, vncialis aut sciscun-
dialis, calathio angusto è calyce pinnato exilien-
te, multo minore quam Gentianella Heluetica,
oris cæruleis amaris quinquepartitis. Semen
(inquit Clusius) exile, durum, rotundum.

Nann. 2

Hippion
Cordo. Cordo Obs. fil. Hippion i. e. Viola equina, Leucoio æquales flores habens in quadrantali pediculo, carulosos, pulcherrimos, profundo colore.

Calath.
Verna. Gesf. hort. Calathiana verna, Violæ genus equinum à Suevis cognominatum, Hippion Cordi, Gentianella dulcis. Item, Viola Hippion à Cordo cognominata, diuersi generis herba à Germaniana, carens amaritudine. Rursum, Viola equina Suevis dicta. Demum, de coll. Calathiana verna, Brendelblümle / Blau Zinckherbs blum.

Clus. pann. & Hist. Gentiana 6. siue (vt etiam in Hisp.) Gentianella verna minor. Lob. Obs. p. 67. Gentianella alpina, verna Clusij, Cantabrica quorundam (sic etiam in Icon. Plant. pag. 310. inscribitur) folio, ortu & gustu Centaurei lutei.

C. Bauhin.
not.

Tab. Gentianella. Ger. Gentianella alpina. C. Bauhin. phyt. Gentiana 13. Item, Gentiana 14. siue Gentianella alpina verna minor Clusij, & Gentiana angustifolia Hist. Lugdunensis. Nos vnam statuimus plantam cum Lugdunensi, & non duas cum Fratre, qui se diuersas habere ait, & Lugdunensis & Clusij figuræ respondentes. Correxerit autem in pin. errorem in phytopinace commissum.

Locus & Tempus.

Aliquot à Geneva miliaribus in monte Thuri iuueni florentem mense Iunio: in Rhætiæ verò monte Brailio, Iulio. Celsis montium iugis gaudere, & Vere florere perhibet Lobelius: Nasci in pratis inter Vlmam & Augustam, Cordus. Pratorum humidiorum herbarum annuam adstruit Gesnerus: in hortis facile nasci aut durare: cum cespite plantatam Vere per Æstatem manere. In Cantabris & Pyrenæis hanc primum obseruabat Clusius, ad angustias illius petiosi montis, quem Hispanorum vulgus D. Adriani portum nuncupat, initio Maij florentem, deinde prouenientem in celsissimis Schneeberg, Schnealben, Etlicher & Durrenstein iugis herbido solo, vbi sub Iunij finem floret: ar micioribus vicinis collibus & siccioribus pratis, Maio, semēque sub extremum Iunium profert. Omnem culturam respere videtur.

Vires.

Eadem huic vis & facultas, quæ Gentianæ alpinæ magno flore: ad colicos enim dolores, ad tormina, regium morbum, & cachexiam à rusticis laudatur.

Gentianella omnium minima C. Bauh.

Descriptio.

Ex radícula oblonga, tenui, albicante, foliola oblonga, angusta, viridia, plurima simul instar capituli coniuncta, prodeunt, inter quæ pedicellis brevissimis [tota enim planta, radice excepta ad vnciam non excedit] quibus singulis stoculus, pro plantulæ ratione magnus, pallidè cæruleis staminulis donatus, calyculo inclusus, insidet. Hæc Gentianella 2. siue omnium minima, vel, vt in pin. vocatur, Gentiana alpina minor 8. nisi summe amara esset, Muscus aliquis floridus censeretur, inquit author. In summis Alpium Helueticarum iugis reperitur.

Synonyma.

Locus.

GENTIANA PUNCTATO FLORE subcæruleo Pennæ. CAP. XVI.

Descriptio.

Caulis habet geniculatum, cubitalem, supra radicem aliquantulum rubentem, folia Gentianæ similia, ex intervalis bina, sed multo mi-

nora, venosa, quorum inferiora maiora sunt & longiora, pediculus rubentes habentia, superiora verò cauli sine pediculis adherent, eumque ferè amplectuntur: à medio penè caule è foliorum caulis oriuntur flores pentaphylli, striati, vtrinque tres, rarids bini, nisi circa limum caulem, quinque subcæruleis constantes, nigricantibusque punctis elegantissimè notati [vnde nomen] quinque staminibus, quorum apices lutei, præditi: staminibus succedunt vascula cum seminibus Gentianæ similia, sed minora: radix parua, multis fibris prædita, ex fusco lutea.

Tabern. Gentianam 7. Clusij vocat, non animaduertens apud Clusium errorem typographicum, numerum sc. septenarium (vii.) pro duodecimo (xii.) poni.

C. Bauhin. phyt. Gentiana 5. siue flore subcæruleo punctis nigris notato: Eid. pin. Gentiana 1. palustris 2. siue latifolia flore punctato, Aliqua folio glabro phytopinacis: floribus subcæruleis, purpureis, & violaceis, punctis asperis. An *Alisma* hoc hac sit referendum, dubitatur.

Prouenit copiosè in Bokemuto Suitensium monte: floret Augusti. Ex radicis pictura coniecturam fecit Clusius, semine maturo planè perire, eoque deciduo renasci

POLYGONATVM VETERIBVS. CAP. XVII.

Polygonatum (πολύγωνον) Dioscoridi in montibus nascitur, frutex cubito altior foliis Lauri latioribus & lenioribus, sapore quodammodo malum Cotonarum, aut Punicum redolentibus, siquidem gustanti astrictum saporem respiciunt: flores autem per singulos foliorum exortus promit candidos, folioli ipsi numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem verò habet albam, mollem, longam, crebris nodis ceu geniculis cinctam, densam, graueolentem, ac digitali crassitudine, quæ vulneribus efficaciter imponitur, ac maculas etiam in facie delet.

Galeno Polygonatum mixta facultatis & qualitatis. Habet enim quid adstrictionis, & acrimoniæ, & amaritudinis, & cuiusdam inexplicabilis iniucunditatis. Eapropter neque in multo usu est, sed eo solum quòd radicem quidam vulneribus imponunt. Sunt & qui maculas in facie per ipsum deterunt.

Inter Polygoni genera, quæ à Plinio plura, ex aliquorum historia numerantur, Polygonatos hæc refertur, Marcello tamen toto genere differre hæc ab illa videtur. Iacet enim (quod præcipuum inter eas discrimen est) & Graminis modo per terram spargitur Polygonum, Polygonatum autem cubitali & ferè semper proceriore caule erigitur. Quod quattuor Polygoni genus sylvestre Plinius facit, cum hoc Dioscoridis Polygonato nulla parte consentit, quàm quòd Mali Cotonæ saporem & spissandi naturam habet. Itaque aliud illud ab hoc fesse minimè dubitandum putat etiam Cornarius.

Licet autem Dioscor. vnus tantum Polygonatum meminerit, attamen Recentiores, sequentes differentes plantas eo nomine donarunt. Polygonatum Dioscoridis quod quidam esse dicunt Sigillum Salomonis: Sed nescit Tragus quo pacto esse possit, dubitare Anguillara. Polygonatum maius, vulgari simile. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis. Polygonatum cum singularibus floribus, prope Basileam.

Polygonatum

Polygonatum amplitudinis foliorum Ellebori albi. Polygonatum ramosum latifolium. Polygonatum angustifolium. Polygonatum ramosum angustifolium. Liliū conuallium (Heroldus & Alois.) Been album. Ocinoides [Tragus.]

POLYGONATVM, VVLGO SIGILLVM Salomonis.

CAP. XVIII.

Summo capite transuersa vagatur Polyg. radix, digiti crassitudine, pyxidata commissurâ inæqualis & tuberosa, cādote marmoreo, dēfo fibrarū agmine capillata, sapore subdulci: caules cubitales & sesquicubitales, teretes, odore si frangantur, dissecantūve, nausico: in quibus alternatim disposita sunt folia, Lilij conuallium, neruosa, superne in atro virore splendentia, inferne castia: ex quorum alis flores exeunt ex pediculo semunciali aut vnciali, in pedicellos breues subinde subdiviso, singulares, bini, terni, cylindracei, albidis, oris herbidis, in sena segmenta diuisis, quibus totidem adnascuntur apices crocei, stylo albo intus vnâ cum apicibus latentibus: hisce de-

dentibus bacce oriuntur virentes, mox glaucæ, corymbis heteraceis pares, aut paulo etiam maiores, tribus zonulis à summo ad imum pictæ, in quibus semina sena vel septena, dura, magnitudine Vicie.

Sigillum Salomonis dicitur Brunfels. tom. 3. rhaps. 32. & in 4. pag. 146. Ioan. Agricola & Eur. Cordo. Sigillum Salomonis latifolium Trago. Polygonatum Matth. Turn. Cordo in Diosc. & hist. Lonic. Lac. Cast. Lob. in obs. p. 361. Icon. Plant. p. 631. & Wirsung. Polygonatum vulgare Gefn. hort. & Camer. hort. Is ad Historiam Matthioli ger. & Epit. ponit duas figuras (1. Polygonati titulo, cui adscribit baccas rubentes & quandoque purpureas. Secundam inscribit Polygonatum vulgatius, baccis nigris,) quæ an diuersarum specierum, iudicent lectores, perpendantque an cultura & situs mutationem non faciant.

Polygonatum vulgare omnibus prouinciis familiare, Clusio. Polyg. maius Lob. in Aduers. Polygon. latifolium Fuch. Dodon. gall. & Tabern. Polygon. maius seu vulgare aut latifolium Thallio. C. Bauh. pin. Polygonatum 1. (3. phyt.) siue latifolium vulgare, Polygon. vulgatius Eyft. Polygon. 1. Gerard. Fraxinella Anguillar. & Cæsalpini. Variat baccis rubentibus, purpureis, quandoque nigris, vt Camer. in Epit. monet.

Græci *σάβυλας*, Latini similiter Polygonatum. III.

tum appellant, quod radix crebro geniculata sit. Officinæ vulgò Sigillum Salomonis, haud dubiè à vestigiis, radici sigilli instar impressis. Germani *weißwurz* / h. e. Albam radicem & *Stenckewurz*: Belgæ *Salomons seet*: Galli *Signet ou Seau de Salomon*: Itali *Ginocchio*: Hetrusci *Fraxinella* & *Fraxinella*: alij Geniculatam aut Genichellam: Angli *Scala cely* & *white wort*. Hung. *Salomon pösti*.

In syluis, locis vmbrosis & iuxta margines nascitur, nec modò in mōtosis, sed & in planis. Maio ac Iunio flores, Augusto fructus colligi possunt.

Hodie quoq; mulieres Sigillo Salomonis sibi faciem extergunt & fucant, vt planè nullum sit dubium, quin Polygonatum esse constanter credamus, inquit Fuchsius. Matthioli è Polygonati radicibus aquam elici refert, quâ ad faciem abstergendam mulieres Italæ vtantur. Quidam tamen radicem crematam facto lixiuiò ad eundem vsum exhibent. Agricola aquam distillatam concretum sanguinem inter cutim & carnè discutere asserit, si in ea intinctus pannus imponatur, siquæ nœui totius corporis ex ea lauentur, delere possit.

POLYGONATVM MAIVS VVLGARI simile.

Polygonatum vulgari planè simile, nisi quòd in duplò maiorem excreuit altitudinē, crassioresque habet radices & caules, ampliora folia, longè plures flores, maioresque baccas.

Clus. pann. p. 263. Polygonatum maius: Eid. Hist. Polygonatum latifolium primum. Camer. hort. Polygonatum Pannonicum. C. Bauh. pin. Polygonatum 2. (1. phyt.) siue latifolium maximum, Polyg. maius Eyft.

Spontè nascitur, vulgari permixtum, in quibusdam Austriae & Pannoniæ vmbrosis locis.

POLYGONATVM FLORIBVS EX SINGULARIBVS pediculis.



huic sunt caules striati, firmi, non valdè inflexi, sed recti ferme: folia vulgari similia, eodemque modo, h. e. alternatim, circa caulem disposita, breuioribus tamè quàm in illo spatiis, minora etiam, firmiora, ingratius gustus: ex singulis alarum finibus, duo aut tres exeunt flores, breuius, magnaue ex parte singularibus petiolis inhaerentes, vulgari cum formâ cum colore similes, verùm maiores, & odore (qui in vulgari Nna,

Descriptio.

Synonyma.

Locus.

Descriptio.

nullus est,) floribus spinæ Appendicis, siue Oxycanthæ vulgò creditæ: bacca deinde virides initio, & sphericæ, quemadmodum in vulgari, maiores tamen, postea nigricantes, semper continentes osseum, durum: radix longa, obliqua, geniculata, candida initio dum recens, eruta, deinde pallescens, nonnumquam etiam purpurea, præsertim circa germina, vulgaris radici ferè par, tãtèsi etiam aliquantulum tenuior inueniatur, interdum verò amplior, vbi videlicet pingue & bene subactum solum nata est.

Clus. pan. pag. 163. & 264. Polygonatum pannonicum 1. siue flore odorato. Eid. h. Polygonat. 2. latiore folio & Polygonat. latifolium secundum. Tabern. Polygonatum latifolium minus. Casp. Bauhin. phyt. & pin. Polygonatum 4. siue latifolium flore maiore odore, Polygonatum Gerardi, an angulosum Cordi hist.

Frequens est in nemorosis illis montibus, vulgò Leytenberg nuncupatis, supra Manderstorf, Brusterstorf, & in plerisque aliis Pannoniæ montibus trans Danubianis inter saxa, atque etiam ultra Dravum in Pannoniæ interamnis montibus, præsertim ad arcem Greben. Sed nuper admodum abundè nascens reperiebat Clusius in silva Quercubus confuta ad lavam Mœni fluvii, paulò infra vibem Imperialem Francofurtum: Floret Maio: bacca maturæ sunt Augusto: interdum etiam multâ Hieme, atque ipsa penè brumâ, è caule pendentibus conspicuuntur.

Polygonatum amplitudinis foliorum Ellebori albi.

Descriptio

Polygonato floribus ex singularibus pediculis similem habet caulem, eiusdemque vel maioris etiam altitudinis, nõ adèd tamen rectum, sed magis inflexum: folia duplò ampliora quàm reliquorum, ad Ellebori albi foliorum amplitudinè nonnumquam accedentia, dura, nervosa, laevia, dilutis virentia, neque subtus incana, nonnihil acidi gustus initio, deinde paululum acris: flores alteri similes, inodoros tamen, neque ex singularibus petiolis singulos, sed binos aut plures ex oblongiore pediculo dependentes, vt in vulgari, cui etiam similem fructum habet: radicem albam, longam, obliquam, geniculatam, dicto Polygonato magnitudine parem.

Synonima.

Clus. pan. pag. 65. Polygonatum pannonicum 1. latiore folio. C. Bauhin. pin. Polygonatum 1. (2. phyt.) siue latifolium foliis Ellebori albi, Polygonat. latifolium Dod. post.

Locus & Tempus

Crescit copiosè vmbrosis locis inter Brünam & Weyspach, aliisque vicinis montanis silvis supra Viennam Austriæ: floret Maio.

Polygonatum latifolium perfoliatum Brasiliæ.

Caule est bicubitali, striato, folia perfoliatæ modo transeunte: foliis pallidè virentibus, tenuibus, nervosis, vncias duas latis, quatuor longis: compo sito, qui ex longo, tenuissimo pediculo dependet.

* flore magno, albo, ex foliis quinq; angulis, binas vacias longis.

Polygonatum hoc C. Bauhine secum in pin. secundum in prod. siue latifolium perfoliatum Brasiliæ, auctori à Burseo communicatum, in Brasilia apud Toupinambaukios crevit.

POLYGONATVM LATIFOLIVM
ramosum.

Folia huic per caulem cubitalem ramòsq; Polygonati foliis similia, equaliaque, acutiora.



re mucrone, venosa, mollia, alternato posita, inâ parte perfoliatæ modo complèctuntur: è quorum vniuscuiusque sinu, longus exiit pediculus, vnicus, nutabundus, tenuis, cui inhaeret stipes masculus, Lilij conuallium, laciniosis oris extrorsum reflexis, quem inferiore parte scribit Clusius nigrican-

tibus quibusdam maculis aspersum, odore prope modum Oxycanthæ: fructus Polygonati minoris siue angustifolij fructui similis, trigonus initio & viridis, per maturitatem verò oblongior & rubescens, paruaque coria interdum æquans, in quo multa grana albicantia congesta sunt: radix à Polygonati vulgaris radice differt: nam neque crassa est, neque adèd candida, sed exilis & nodosa, siue in frequentes nodos extuberans, pluribus crassis fibris constat, vt Thallietri quadam genera.

Matthioli vocat Zappentraut, haueblat, Zussenblat & Kesttraut in Hist. germ. h. e. Idem Vuulariam, Bonifaciam, & Paganam, & linguam: In comm. Ital. Lauro Alessandrino: In Lat. Laurum Alexandrinum, xeram sc. & legitimam. Sed turpiter confundit Matthiolus Hippoglossum cum plantâ hac quam exhibet pro Lauro Alexandrina: malè etiam nomina germanica ei tribuit Hippoglossi. Soterius olim merito quidem Laurum Alexandrinum veterum, negabat, sed minùs rectè Perfoliatam ementiri annotabat, aut genus esse Lauri Alexandrinæ veteribus indicum. Nec melius Dalechampius quondam verum Hippoglossum suspicabatur.

Polygonati tertia species Clusij Obs. pann. (inquit Camerarius in Hist. germ. Matthioli lib. 4. cap. 6. non rectè missa Matthiolo pro Laureola Alexandrina, vt satis demonstrat descriptio. Idem cap. 151. repetit Laurum Alexandrinum à Matthiolo exhibitam esse extra omne dubium speciem misurari: ibidem novam iconem proponens. Sed nec ipsa Matthioli figura pro Polygonato ramoso displicet, quanquam illam taxet Clusius vt minime scite expressam & mutila descriptione adumbratam.

C. Bauh. phyt. pin. Polygonatum 7. (6. phyt.) siue latifolium ramosum: Laurus Alexandrina Matthioli. Dodon. gall. Camer. Hippoglossum Hist. Lugdun. pag. 207. Rusco affinis tertia Cæsp. pin. Polygonato affinis planta Lobel. Obs. pag. 362. Polygonatum latifolium 3. & 4. Tab. Polygonatum ramosum & acutum Gerardi.

Florentem vnam aut alteram huius generis plantam in vmbrosis montis Wechsel silvis, deinde in Durrenstein inter saxa & frutices mèsib. Iunio & Iulio anni 1576. inueniebat Clusius, quæ

quæ in hortum translata, fructum ad maturitatem perduxerunt: frequentiore biennio post magnamque, & in multas alas diuisam, vmbrosis quibusdam scrobibus inter filicis stirpes, in descensu Durrenstein, paulò supra mapalia à montanis pastoribus habitata æstiuus mensibus, florentem Augusto. Rami verò cum fructu ex Silesia vsque (vbi frequens nasci dicitur) Clusio prius communicabantur: deinde etiam aliquot radices illinc transmissæ. Perstitit in hortis, vmbroso loco reposita, florésque & semina suo tempore profert.

POLYGONATVM ANGUSTIFOLIUM.



Alba radicem geniculatam incedit haud secus ac prioris Polygonati: caules cubito altiores, similes: sed in his folia multis numeris angustiora, Rubiæ foliis patia, læuia, venosa, quaternaria, aut quina, radiatum ex caulium geniculis enascuntur, ceu & herbacei flo-

74 Polygonati vulgaris, succedentibus hæc minoribus: Clusio, fructu initio versicolore, qualis est Graminis Parnassi quorundam, sine V-nis folij fructus, deinde per maturitatem rubro.

Polygonatum angustifolium Fuchf. Dodon. gall. Turn. & Eyst. Polygonatum angustifolium Fuchf. Hist. Lugd. p. 163. Polygonatum minus Herbariorum Clus. Pann. p. 263. Polygonatum, angustifolium 1. Clus. Hist. & siccitiam Tabern. Polygonatum tenuifolium Cordo hist. & Camer. hort. Polygonatum tenuifolium maius Thelio. Polygon. erectum Gesn. hort. & de Lunæ. itenque apud Cordum. Polygon. alterum Dodon. in fol. lat. Polygonati genus erectum Simlero. Polygonato similis in alpidibus Cæsalp. Sigillum Salomonis angustifolium: Sigillum Salomonium alterum, putatq; cum Mutono esse Chamædaphnen Dioscoridis, quæ opinio non recipienda.

C. Bauh. pin. Polygonatum 8. (7. phyt.) siue angustifolium non ramosum, Polyg. minus foliis Rubiæ Lob. in Adæ. Ephemeron quorundam Diosc. & Plinij.

In montanis quibusdam Stiriz pratis, circa frutices & in vmbra abundè nascens obseruabat Clusius. In editis & montanis vmbrosis locis, veluti in Bohemiæ ac Morauizæ densis syluis reperiri testatur Dodonæus, ac Maio & Iunio flores; Augusto fructus colligi posse. In saltibus Harciniæ frequens Genevæ in monte prope Thuri copioso fructu mense Iulio, in Wallerthal autem Augusto obseruabam.

POLYGONATVM ANGUSTIFOLIUM
ramosum.

Habet caulem cubitalem, angulosum in multis tenues alas diuisum, quæ æqualiter ex singulis angulis exoriuntur, quaternæ interdum, nonnunquam & quinæ, pro angulorum, qui in caule, numero: ramuli tenues, longis & angustis foliis obfiti sunt, binis ternis aut quaternis, æqualiter in circuitu prodeuntibus, in quibus flores, Polygonato proximè descripto similes,

Descriptio.



paulò tamen minores, breui petiolo dependentes inter foliorum alas sparsi sūt: quibus succedit fructus rotundus, ruber pulpâ plenus, aliquot ossea grana continens: radix vulgaris similis est, candida, nodosa, propages ad latera fundens, & candicantibus fibris obfita.

Polygona- Synon:
tum 4. fluera-

mosum angustifolium Clus. Pann. p. 268. Polygonatum 6. angustifolium 1. Clus. hist. & sic Tabern. angustifolium Ger. Polygonatum tenuifolium minus Thal. Polygonatum 9. in pin. 8. phyt. siue angustifolium ramosum.

Clusio anno 1580. communicatum elegantissimè. Locum hoc Polygonati genus ab Achille Cromero Silesio, quod iidem quibus saxatilem Rubum locis eruisse assererat.

LILIVM CONVALLIVM VVLGO.

CAP. XIX.



Radice tenui & alba, fibratâ, summo cespite reptante, donatum colicolum profert palmarem circiter, angulosum, à cuius medio ad summum flores pulchri in vnam ferè partem vergentes per interualla penduli & nutantes in pediculis tenuibus curuisque nascuntur, par-

Descriptio

nae nolæ effigie, oris in sex lacinias dissectis, totidem staminibus ex herbido luteis, fundo adnatis, stylum triquetrum circumstantibus, odore suauissimo, sapore amaricante: quibus succedunt rubra *seminum* conceptacula globosa, vt in Asparagis: *folia* bina aut terna, oblonga, Orchidis foliis similia.

Oenanthe Athenat.

Euchf. nos.

Dalechampsius apud Athenarum interpretatur Oenanthen. Anguillara verò, Camerario apud Matthiolum referente, Theophrasti *videtur* esse scriptum relinquit. Euchsus pro Ephemerone lethali describit & depingit, dicens Iridem siluestrem cognominari. Ephemerum autem dictum fuisse, non quòd eadem die iugulet nullam enim ei vim mortiferam inesse ait sed quòd flos illius festinus marcescat, nec longius vno & altero die commoretur. Sed hoc argumento infinita non lethalia Ephemerata statuenda forent. Ac præterea, non sine errore Euchsus putat Liliū conuallium, Ephemerum Dioscoridis esse, cum nihil sit in Ephemeræ descriptione, quod huic nostro Lilio conuenire videatur.

Lil. conuallii & sil. sua Brunf.

Hemerocallis non est.

Brunfelsius, qui tom. 1. chapl. 36. & in 4. p. 8. Liliū conuallii, & Liliū siluestre vocat, Hemerocallida Dioscoridis esse putat. Quia verò Hemerocallis bulbosam radicem habere à Dioscoride traditur, non constat quo pacto Hemerocallis ad Liliū conuallium, quod serpente hinc inde habet radicem, referri queat. Sed vel inde eorum ex ore euidentissimè deprehendi posse arbitratur Matthiolum, qui Liliū conuallium vulgò dictam Hemerocallidem esse existimant. Si quidem illud foliis constat ferè Plantaginis, tenuioribus tamen, minisque striatis: cauliculis iuncibus, tenuibus, ac mollibus: in quibus cacumē versus plures prodeunt flores albicantes, Balaustrii, & Arbuti effigie, odore perquam incundo: Radices demittit laxas, longas, fibris capilla mētisque refertas, nullis adjacentibus bulbis. Hemerocallis verò, Dioscoride teste, folia & caulem profert Lilio similia: flores colore admodum pallido: radicem magnam bulbosamque: Quæ sanè notæ, si diligenter conferantur, manifestissimè indicabunt, eos hallucinari, qui Liliū Hemerocallidem esse contendunt.

Cacalia Lonic.

Lil. inter spinas. Lob. taxatur.

Lil. vernum.

Lil. vernum.

Damaconium nigrum Rlm.

Callionym.

Lonicerus in ea fuit opinione vt crediderit à Græcis Cacaliā & Lonicen vocari. Lobelius de Lilio Conuallii, vel verno Theophrasti (vt in Obs. p. 87. & Ic. Pl. p. 172. inscribit) ait in Ad. herbam esse antiquis Græcis indictam, putatque quosdam Liliū inter spinas in Salomone memoratum. Mirum autem in titulo eam addere nomen Theophrasti, & in textu dicere, herbam esse antiquis Græcis indictam.

Dod. gall. refert ad Liliū conuallium à Theophr. pro Lilio verni prima specie descriptum. Sed Latius videtur sententiam mutare, eam solum Liliū conuallium nostræ ætatis vocans. Tragus non primum, sed secundum Liliū Theophrasti Vere apparens Theophrasti facit.

Rob. Const. in Lex. prodidit quosdā existimare Damasconii alterum genus, à Plinio lib. 24. c. 10. descriptum, nigrum sc. esse herbam, quam vulgò *Muguet* vocant Galli, Germani *Nieybentstun*: h. e. Florem Maii. Belgæ *Nieybentstun*: Lacini vulgò Liliū conuallium, quòd in opacis & lucis nascatur.

Liliū conuallium vulgò dictum, si libet, Callionymum appellamus, iustiori ratione, auctore Gesn. hort. quā Anonymon olim quidā, ignotum ibi nomine, plantam vocitū, vel Cha-

mæcytinum: vulgò *Nieybentstun*. In cat. appellat Ephemerum, vulgò Liliū conuallii & Muschetum majus. C. Bauhin. phyt. Liliū 23. siue conuallium: Idem pin. Liliū conuallium 2. siue album.

Inter nymphas locum natalem sibi delegit. In siluis enim & locis vmbrosis sponte exit. Aprilis mense noua germina protrudit, gemina sc. folia, vnicò pediculo suffulta, in initio complicata, quæ ubi primum à se inuicem discedere cœperint, tum è medio illorum pediculus emergit, qui mox quinis aut senis globulis ornatur, qui Maio mense panduntur, inq; flosculos euadunt, quibus preuentibus Iulio mense appropinquante fructum profert rubrum. Monspelii floret Aprilis in hortis.

Calidæ & sicæ qualitatē flores & fructus participes esse statuit Dodonæus: Flores ex-calfacere, attenuare, digerere, & prouocare Matthiolum. Tragus autem quāuis dixerit flores calidi temperamenti esse, & laudet particulatim ad reuocandam anisiam vocem, commendatque aduersus morbos frigidos, nihilominus tamen ait aquam stillatitiam ex eo paratam, omnem oculorum calorem refrigerare. Apollinaris verò non solum refrigerare ait Liliū conuallii, sed & humectare secundo gradu. Vtra porro opinio de temperamento probabilior sit & amplexanda, iudicabis ex odore suauissimo, saporeque amaricante, quicunque Philosophiam Medicam vel primis labris degustasti.

Cæterum, inquit Euchsus, recentiores eius succum, aut decoctum, syncope, vertigine, morboque comitiali correptis, attonitis & phreneticis exhibent. Sunt etiam [addit Dodon.] qui veltint decocto aut succo, oculorum caligines discutit. Feruntur flores aduersus apoplexiam, nervorum resolutiones, ac alios cum cerebri frigida humiditate intemperie morbos, auxiliares esse. Sunt etiam qui velint flores istos cor roborare, ac cardiacis quoque modo assumptos prodesse. Incipienti porò elephantia, ne latius serpat & altius radices agat, viam præcludere scribunt. Quin & istis (pergit Matthiolum) seu commotis à venenosis animalibus præbent. Itē, ægrè parturientibus maximo esse auxilio prædicant. Magnus in summa Lilio conuallii apud Germanos in medicamentis est vsus, ad varios corporis morbos. Aiunt enim eo roborari omnes principes facultates. Conscientiam autem ex floribus per ætatem siccatis vinum vindemiariū tempore, ipsos calcatis vasis admiscentes, quo postea vtuntur ad prædicta. Sunt & qui recentiores flores vetere vino macerent, & in vitro vase diu insolēt, admittis Lauendulæ vocatæ, & Rorismarini floribus, additisque odoramentis nonnullis: deinde ex eis stillatitiam aquam in calentis aquæ balneo vitreis organis eliciunt, eaque aureis, argenteisque vasculis reponunt. Hanc aquam *auream* appellant: quā vtuntur ad omnes prædictos corporis affectus. Quinimò eam iam animam expirantis ori infundunt, rati ex eius assumptione homines morientes in vita retineri posse per plusculum temporis spatium. Sed quā vanā isti ferantur opinione, Matth. quidē sæpenuerò experimēto deprehensum est. Quod et si iis quoque irritum comperiat: ea tamen est huiusce aquæ apud omnes autoritas, vt plectique ab eius exhibitione abstinere nequeant, etiam in morbis calidissimis. Concludit tandem Came-

Camer. Radicis, inquit, quæ dulcis ac aromatica, odoratæque est pulvis naribus attractus pituitam elicit & sternutationes mouet sine vehementia. Floribus vas impletur bene obturatæ, & in acerum formicari reconditur per mensem. Liquor inde collectus instat olei sedandis doloribus podagricis & similibus affectibus exterius adhibitus perutilis.

Lilium conuallium latifolium.

Quod C. Bauhinus in pin. Lilium conuallium i. siue latifolium cognominauit, id in prod. sic descripsit. Radicibus est tenuibus, longis, repentibus: caule pedali, foliis ternis, viridibus, nervosis, subrotundis, læuibus, palmaribus, vncias quatuor latis, basi suâ caulem, fistulæ modo ambientibus: floribus magnis, albis, rotundis, hiantibus, reflexis, & odoratis, quibus fructus rotundus rubeus, semem durum continens, succedit. In hortis quibusdam colitur.

Lilium conuallium cum pluribus florum ordinibus.

Non alia huic folia, quam vulgari siluestriq; Lilio conuallium: at coliculus inter ea surgens, non tantum contentus est florum ordine, sed vtrinque producit flores, vncialibus & semuncialibus pediculis, pendulos & nubarundos, vulgari similes, quorum vnicuique ad exortum pediculo ligula albicans, paris cum eo longitudinis, apponitur.

Lilium conuallium magnum.

Foliorum dispositio fibrosa striatæque textura cum nitido virose, respondet foliis Lilij conuallium vulgaris: duplò tamen aut triplò maiora.

Hoc putamus esse, quod Camer. hort. Lilium conuallium alterum alpinum, flore maiore & odoratiore nominat, quòdque apud Matthiolum in montibus Tyrolensibus prouenire scribit.

An C. Bauh. phyt. Lilium 24. siue conuallium flore maiore. An eid. pin. Lilium conuallium 3. siue alpinum, Lilium conuallium flore albo, Eyst.

In horto Frid. Meyer Argentinz, mense Maio obseruauit.

LILIVM CONVALLIVM
Flore rubente.



Huius à flore petita est quædam differentia, cæteroqui Lilio conuallium albo vulgari per omnia respondens: flos solummodò ex albo rubet, colore pictus carneo.

Cæterum, hoc est illud, quod appellatum est à Lobelio in Obs. pag. 87. Lilium con-

uallum agri Louanienfis, propè Thepas Brabantorum urbem, floribus candore & rubore confusè mixtis, siluosis. Camer. in loc. p. 116. 1-3. Lilium conuallium floribus suauè rubentibus.

A Camer. hort. Lilium conuallium 3. rarum admodum, flore subrubro à Sebizio missum. A Tabern. Lilium conuallium rubrum. C. Bauh. Lilium 25. siue Lilium conuallium flore rubente: Eid. 4. in pin. & Lilium conuallium flore incarnato, Eyst. Montbelgardi in horto E. C. Vvirtemb.

BIFOLIUM MAIUS SIVE OPHRYS

maior quibusdam.

CAR. XX.



Quin ex Orchidæ Descriptio
fit familia Bifolium ambigi vix posset, nisi radices multiplices fibrosæque obstarent, siquidem flores elegantissimi thyrsis dispositi, quam proximè accedunt, herbarum, culicum ferè formam exprimente bino labello, galeâ lateraliibus foliolis incumbente, quibus in caule

singulari, tereti, modò vix sesquipedale alto, aliàs pedali, aut etiam cubitali, hirsuto, vtriculo succedunt, vt in Orchidibus puluiculo referri: folia verò duo solummodò habet, Plantaginis latifolia, opposita, altero ex alterius sinu prodeunte. Sapor radicis subamarus cum aliqua acrimonia, non sine visciditate: Caulis vero & foliorum sapor viscidus.

Tragus Bifolium cap. de Coryledone syluestri, secundo loco describit & depingit, atque vult Bifol. Trag. den durchwachts nonnullos, h. e. Perfoliatam siluestrem appellare, vt etiam Brunfelsius testatur reliquerit, sed plùs cum Satyrio affinitatis habere, quam cum Perfoliata. Esse qui wasser wegerich / h. e. Plantaginem palustrem nominent. Euricium Cordum in ea esse sententia, vt statuerit Alisina Dioscoridis esse. Hoc tamen verisimile ei non fieri.

Lobel. in Adu. Alisina negat, Ophryis; Plinij adstruere videtur. Obs. p. 161. Bifolium in scribit, eiusque titulo in Icon. Plant. duas imagines pingit, vnam p. 302. Alteram tom. 2. p. 261.

Math. Ophris recentiorum. Anguill. Ophris Plinii, à Fuchio & Matthiolo bene depicta. Angelus Gerar. insinuat Gramen Parnassi maius, sed Tabern. imitatus Bifolii minoris malam Matthioli iconem proponit.

Dodoneus Pseudorchis & Bifolii inscriptione pingit, & veram Plinii Ophrim, denticulato oleri similem esse posse negat, nec cum Alismate conuenire concedit, sed nouam aliquam stirpem esse & à veteribus præteritam asseruit.

Tab. Ic. & H. Ophris: item Ophris trifolia. Schvv. Bifolium maius, Ophris Plinij: item Bifolium 3. Ophris trifolia.

Ophris 1.
ph.

C. Bauhin. phyt. Ophris 1. siue vulgata & minor. Satirion 10. Tragi, siue icon: Item bifolium eiusdem, & Lobelij. Ophris 2. siue bifolia maior, Perfoliata mascula Brunfels. tom. 1. rhaps. 31. p. 182. & Perfoliata sylvestris mas eiusdem in 4. p. 101. siue tamen descriptione: foliis & floribus illâ duplò triploque maioribus, formâ priori respondentibus: caule minore. Et Ophris 3. siue trifolia maior, Perfoliata fœmina Brunfels. dicto tomo & rhaps. 183. & 1. trifoliata syl. fœmina in 4. p. 101. in eo solum à proxima, 2. sc. differens, quòd tribus donetur foliis: duobus quidem ex opposito sitis: tertio verò ex coitu foliorum duorum orto, non tamen pari magnitudine. Tandem, Ophris 4. siue trifolia minor, à priori differens, ut bifolia minor à maiore. Eid. pin. Ophris 1. siue bifolia, Perfol. sil. mas Brunf. Satyrium 10. & Bifolium Tragi, Alisma Cordi, Gesn. hort. & in cat. pl. Ophris Matth. Fuchs. Ang. Ges. cat. Cast. Tab. Cam. Cæs. Thal. Franco. Bifolium Dod. gal. Ad. Lob. Lon. Cam. Pseudoorchis seu Bifolium Dod. Ophris bifolia Gerardii: Maior & minor, tam in hac, quàm in trifolia. Item, Ophris 1. siue trifolia, Perfol. sil. fœmina Brunf. Ophris trifolia Tab. & Gerardii.

Locus &
Tempus

Fuchlio teste nascitur in montibus, & nullibi maiori copia, quàm Tubingæ in pede môtis Austriaci provenit: Maio & Iunio mense floret, quo tempore potissimum colligenda. Ego in monte Walsersal reperi florentem Augusto: in monte verò Saleuzæ prope Genèuâ in Silesiæ montib. & conuallibus, vdis & opacis locis collegit Schvv.

Vires & r-
sus

Gustanti hæc herba glutinosa esse apparet, & quodammodò dulcis, ideòque calidam & siccam esse coniecit Fuchsius: contrahendi porò constringendique facultate præditam esse non dubitat, hinc est quòd ad rupta & vulnera conglutinanda hæc herba commodè vti recentiores scribat, secundum Matthiolum, ad denigandos capillos. Schvvenc. tamen calidæ & humidæ esse naturæ prodit.

Vnifolium, siue Ophris vnifolia.

Descriptio.



odorati, quatuor foliis totidèmq; staminibus concoloribus cum stilo constant: bacce succedunt Lilij contrallium per maturitatem rubentes.

Tragus vnifolium [sic enim docendi gratiâ fingere vocabulum necesse duxit] Cotyledonis primi, siue siluestri siue nomine descriptis, censuitque Germani, & quidam vicia appellandam esse, quòd caulis eius folium ex parte penetraret: Et ab vnico folio, Ceratia, nisi radicem ad e-xiguum haberet. Sed hæc opinio non placet.

Apud Amatam in Diofc. pro Cyclamino vnico folio malè ponitur icon Vnifolij, quandoquidem eius non meminit.

Dodon. lat. in fol. eiusdem cum Lilio conuallium generis esse putat Vnifolium, vulgò Cynislat. græcè *μονοφυλλον*, nuncupatum, nec apud veteres nomen habere, nisi tertia Plinij sit Cyclaminos, cui similis videtur, si modò in exemplaribus error non est.

Gesn. in cat. pl. Folium herba: altera mas affe-
163290. altera fœmina *μονοφυλλον*: Item postea Maritica herba. Lobel. in Ad. Monophyllon recentiorum, & Obs. pag. 161. vbi & Gramen Parnassi Cordi & Leoniceri: Icon. Plant. pag. 303. Monophyllum, Vnifolium recentiorum. C. Bauh. phyt. Monophyllum Vnifolium dictum, eò quòd cum primò prodit, vnico sit folio, nam cum cauliculum acquirit, folia bina habet, rariùs tria, qualem Richerterus ex monte fracto atulit: propter similitudinem cum Lilio conuallium, Liliis subieci conuallium, ac ideò etiam [inquit in pin.] Lilium conuallium minus appellare lubuit: Sunt qui Cyclaminum tertium Plinij lib. 25. cap. 9. velint. Vnifolium Brunfelsius tom. 2. rhaps. 18. (cuius figura, vt & Camerarij apud Matthiolum nomine Graminis Parnassi, reliquorum melior est.) Dodon. Hist. Lugd. pag. 1260. & Eyst. Gramen Parnassi Hist. Lugd. p. 423. Gramen Parnassi maius Germ. Henophyllum vel Monophyllum Gesn. hort. Cyclaminum vnico folio Dalech. in Diofc. Monophyllum Lobel. Thal. Ger. Bifolium primum Lonic.

Montbelg in siluis, ac etiam in monte prope Clareual oppidum Ill. E. C. floret Maio & Iunio. In monte Salietæ solet cum Lilio conuallium provenire.

Vulnerariam esse plantam iudicat Tragus, vt vique recentibus vulneribus vtrinque adhiberi commodè possit.

BIFOLIUM MINIMUM.



Radice sub-
flauelcente fibrosa & Orchides redolente, cauliculus simplex trium, quatuorve vnciarum: sub foliolis prodit, cui foliola duo Ophris vulgaris modo apponuntur, quæ parua sunt, glabra, splendens, coloris Vnifolij & nonnihil in cordatam effigiem è rotundiuscula figurâ discedens, quibus

quibus cauliculi altera pars, similiter trium. quatuorve vincturum supereminet, cuius summi *flosculi* parvi herbacei insident, ab Ophris vulgaris floribus, exilitate solâ recedentes, quibus vascula exigua succedunt, teste C. Bauh. phyt. qui in prod. Ophris minimam vocavit, & in pin. quartam fecit.

AD. Furco Ophridii seu Bifolii Broccenbetgici minoris nomine accipit frater, qui iis in locis, opacis sc. muscosisque silvis Broccio & Offmannino vertici dicto, interuenientibus, vbi sponte prouenit, Iulio potissimum mense florere ait: at in hortos cum gleba foli natalitii translatam, citius.

PYROLA.
CAP. XXI.



PYROLA tenui rubetque serpente radice, subindeque ex caule demissis fibris radican-
tur. Vulgatio-
rior ea est quæ
quinque aut
sex folia humi
spargit subro-
tunda, Pyra-
ceis paria. cras-
sa, atrovi-
rentia glabra, ni-
tidique facie
supernâ, pedi-
culis palmaribus
ferè in-
hærentia: inter
quæ caulis nas-

citur dodrantalis, angulosus, parvis & acutis foliis aliquot donatus, nullam ramorum diuisionem agnoscens, thyrsum gerens amœ-
norum *fiorum*, quinque foliolis constantium, albidorum, Orchidum ferè modo, supernis duobus galeam, imo verò labellum bifidum referen-
tium, multis umbilicum obsidentibus apicibus croceis, ex quibus pistillis recuruis prodit & ima versus reflexus, & quandam velut proboscidem referens: Flores capitula sequuntur angu-
losa, puluisculo minuto plena. Sapor totius plan-
tæ amarus, non sine insigni adstrictione. Minus
fecit figura hæc facta est.

Fuchsius Limonium in scribit, ac latine Betam sylvestrem dici testatur, quod in siluis & locis muscosis, hortensi Betæ primùm erumpenti haud dissimilis prouenit, Tintinnabulum verò à floribus eius tintinnabulo similibus: Et, Pyrolam, quod eius folia arboris Pyri folio similia sint. Limonium quoque statuit cum Cornario Turne-
rus. Sed eorum sententiam haud esse approban-
dam, qui Pyrolam herbam, Limonium genus
faciunt, authorem habemus Matthiolum. Quare Tragus nobis magè satisfacit eam inscribere
Limonium silvestre, statuenque nihil aliud esse,
quàm Betam silvestrem quandam speciem.

Pyrolæ Dioscoridem non meminisse testatur
quoque Cordus in Dioscor. silvestris Betæ genus
eam cognominans.

Amato cap. de Limonio malè addita est figu-
Tom. III.

ra Pyrolæ quon de ea scribit

Fuchsius Pyrolam Limonium

manicè

Betam sylvestrem, nonniam

sed Limonium non in montibus ac siluis, sed in
pratris palustribus nascitur, nomenque ab ipsis
accepit, *verum* siquidem pratis
lant. Non defuerunt, teste Lobelio, qui Britan-
nicam dixerunt.

Pyrola Brunfels tom. 3 rhaps. 6. & in 4. pag.

92. Camer. apud Matth. Cast. H. Lug. p.

Gerat. & Eyit. Pyrola vulgò dicta G.

& coll. Pyrola alia campeltris Cæsalp. Pyro-

la vulgarior (vulgaris in Pann.) t. facis appli-

mollique folio. Clus. hist. Pyrola maior sive Be-

ta silu. Thal. Pyrola. vulgaris rotunda

Bauh. phyt. rotundifolia maior

pro Limonio dicta Anguill. Pyrola, Limonium

germanicum Lob. in Adu. Pyrola, Limonium

Cordi & Germanorum, Eid. in Obi. p. 177. Py-

rola à Pyri folio; in Ic. Plant. p. 294. Limonij

& Pyrolæ species altera Harch.

Est & altera Pyrola vulgaris, folio, vt inquit

Clusius, minore & duriore, Soldanellæ alpinae

minutiore folio, ferè æquali. Thal. Pyrola

minor foliis breuioribus, Pyri foliis responden-

tibus, vnde & vulgus ad differentiam prioris,

Pyrinam cognominat.

Germani *Winter* appellant, i. e. Viro-

rem Hiemis, aut Viride hiemale: Belgæ similiter

Winterroen: Bohemii

Locis gaudet montanis ac vmbrosis, in mul-

tis, per Germaniam, Bohemiam ac Morauiam

siluis occurrit, auctore Dodonæo: Cum flori-

bus autem Iunio ac Iulio viget: toto anno viret:

Hiemis & frigoris patiens. Aeterno virore pe-

nè atro aduersum Brumæ rigores perstat (inquit

Lob.) montosis, siluosis, & frigidis vdis, præ-

quibus tepidos hortorum recessus, locaque urba-

na & mitiora viridatâ spernit, inque illis quasi

inuita ægtotat, ac tandem emoritur.

Recentiores Medici nonnulli hanc herbam

in tertium gradum calidorum & siccorum, & vl-

tra locant. Brunfelsius verò Peruinæ naturæ si-

milem existimat: Decoctum eius, aut aqua di-

stillata. interna & externa vulnera sanat pota, &

vulneribus ex ea lotis. Similiter & fistulas cum

aliis malis vlcibus sanat. Ex tota plantæ sub-

stantia, cum Sanicula & Pedaleonis ex oleo vti-

le faciunt cataplasma. Huius vnguentum cum

flore ætis & Aristolochia longa, viridis euadit

coloris, carnemque malam exedit. Quod si al-

bum habere velis, Cerussam & cancri oculos

puluerisatos adde, cum lenit & sanat. Si rubrum

esse velis, Bolum adde, cum Sanguine Draconis,

tum refrigerat & sanat. Dodonæus Pyrolam re-

centem tulam & applicatam commendat vulne-

ribus, vlcibus & vitionibus, aut puluerem

inspersum. Costam cum pauco Symphito in

aqua plurimùm in purulentis renibus conferre

scribit Camerarius. Chirurgi prænominati prin-

cipem vnam è vulnerariis portionibus esse exi-

stimant. Pyrolæ folia & semen gustu vehemen-

ter adstringunt, quæ occasio vt quidam herbam

exsiccatam ac in puluerem redactam in ueteris

ac fluentibus vlcibus, quæ exsiccare intendunt,

aspergere soleant. Pyrolæ verò minori maiorem

efficaciam in glutinandis vulneribus & rupturis

attribuit vulgus, quàm maiori.

Varian.

Nom. ling.

Locus &
Tempus.

Vires &
vius.

Vnguentum

PYROLA FOLIO SERRATO.

Descriptio.



Tenerior est altera, radi-
ce repente, caule
breuiore, infir-
miore, foliis cir-
ca imum orna-
to dimidio mi-
noribus, tenuio-
ribus, oblon-
gis, acuminatis,
tætillum in am-
bitu crenatis:
flores per cau-
lem thyrsoides,
precedenti si-
miles, minores,
capicula relin-
quunt angulosa,
stylum ex vmbi-
lico proferentia.
Flores non pla-
cent in icone

nostra. quæ nobis ab (entibus facta ad imaginem Clusij.

Ambrosia.

Apud Amatium in edit. Lugd. malè ponitur hu-
ius plantæ figura nomine Ambrosiæ. Sed & H.
Lugd. eam Ambrosiæ montanæ titulo p. 1148. pi-
ctam dedit, eodem errore.

Synonyma.

Clus. Pann. p. 103. & h. Pyrola 2. tenuior. C.
Bauh. pin. Pyrola 3. 2. phyt.] siue folio mucrona-
to serrato, Pyrola minor Thelio, Pyrola Panno-
nica 2. Camer.

Locus & Tempus

Crescit in Alpium Austriacarum & Striaca-
rum iugis, loco vmbroso inter frutices, muscū-
que terrestrem, sed vberimè in silua illa acri
Entzeistorf vicina. Meminit etiam Clusius olim
colligere in iugis Lausannæ Allobrogum ad Le-
mannum lacum proximis. Floret Iunio & Iulio,
interdum etiam Augusto.

PYROLA FRUTICANS.

Descriptio.



Elegantissi-
mum pyro-
læ genus, in-
terdum quo-
dammodò fru-
ticans nam no-
uelli breuē que
ramuli, singu-
lis annis suc-
crescentes,
aliquot annos
firmi, viridē-
que permanēt,
& supra tellu-
rem eminent,
donec tandem
pondere suo
depressi, humi
procumbant,
& musco se cō-
dant, fibræque
interdum agāt:

folia vt plurimū ad singula internodia, vbi no-
ui ramuli succrescunt, bina, terna, aut quaterna
habet, carnosa, superne saturatiùs viridia, & splē-
dientia, Chamædaphnes (quam vulgus Laitreolā

vocat) foliis, formā, & magnitudine propè si-
milia, in ambitu tamen serrata, gustu admodum
exsiccante, deinde amaricante, vt reliquarum
Pyrolarum folia: ex horum medio solent Apri-
li noua germina prodire, quæ foliolis veluti
squamulis prædita, in virgulas tandem
desinunt, quibus terni, quaterni, interdum et-
iam quini insident flores, vulgaris Pyrolæ
floribus similes, paullo tamen maiores, ex
albo purpurascens: quibus excussis, succedunt
pentagona capicula, tenui semine instar scobis
plena, quæ cum suis virgulis Hieme exarescunt:
radix siue potius cauliculi sub musco latentes,
longè latè que summā tellure sparguntur, & sub-
inde fibras agunt.

Clus. Pann. pag. 105. & hist. Pyrola 3. fruticans:
Camer. hort. Pyrola Pannonica secunda. Casp. Syno.
Bauhin. phyt. Pyrola 3. fruticans: Eid. pin. Py-
rola 6. siue frutescens Arbuti folio.

Abundè prouenit in siluis Entzeistorf vicinis
aliisque, vulgari & primo permixtum interdum.
Camerario referente horti culturam altero anno
respuit.

PYROLA MINIMA ALPINA.



Minima
Pyrola
ex radice rep-
tante folia e-
mittit quatuor
aut quinque
vncialia ferè,
rotunda, in
ambitu serra-
ta: caulivnicus
nudus, palma-
ris, florem in
cacumine fert
vnicum ma-
iusculum, Py-
rolarum alia-
rum floribus
similem, suc-
cedente capi-
tulo maiore
anguloso, è
cuius medio

prodit stylus præpilatus.

Clusio in Obs. Pannon. 108. & Hist. post. est
Pyrola 4. minima: C. Bauhin. phyt. Pyrola 4.
siue minima flore vnico Graminis Parnassi: Eid.
pin. Pyrola 2. siue rotundifolia minor: Pyrola
minima Eyt.

Nascitur vmbrosis locis in Alpiis Sneberg,
Hochbergerin, Durrenstein, & aliis vicinis, cir-
ca radices summorum illorum iugorum. Floret
sub finem Iunij & Iulio: semen Augusto matu-
rum. Obseruatur in monte Pilati, vnico flore in-
carnato.

Non dubium autem est quin omnes hæ plan-
tæ similibus cum vulgari Pyrola facultatibus
sint prædite, quandoquidem, teste Clusio, easdem
qualitates habent.

HERBA TRIENTALIS.

Coliculo adsurgit simplici, tenello, gracili,
palmū plūs minùs alto, tereti, nudo, glabro,
qui summo tenus velut in umbella folia sustinet
ex breui pediculo sex, septemue pallidè virentia,
quæ

ouata, vincta vix longiora, latitudine proportionata ad figuram ouatam, quædam etiam minora, nonnulla maiorum vix mediam aut tertiam partem æquantia. E quorum costa venulæ eminentiores alterno positu exeunt ad ambitum. Sed & minimum quoddam vnum aut alterum Serpilli folij facie & magnitudine cauliculo adnascitur. Porro è medio foliorum exortu *pedicelli* communiter bini surguntur, fescunciales, aut duarum vinctarum, ac ferè capillares, subruffi, *foliosculos* sustinentes singulares, stellatos, albican-tes, quos foliola prædictis foliis concoloria, & stellam pulchrè positu exprimentia, ambiunt octona plus minus.

Cordo obs.

filu. Herba trientalis, foliis oblongis, veluti Neradij minoris, flore candido, stellatoque. Auctori horti Lulatiæ Herba pusilla trientalis cauliculo singulati. Thal. ἀντιόχου & ἀντιόχου. Camer. apud Thaliū Peculiaris quædam Pyrolæ species, folio Arbuti potius, quam Pyri. C. Bauh.



que *flos vnus* insidet, candidus, Leucoij bulbosi Theophrasti flori par. se & calathio calumpactis, foliis quinque cõstans, quæ liq̃ altiusculæ formâ exarant: medium obsidet conicum *capitellum*, purpurascens, quinque radiatis staminibus albis apicibusque concoloribus circumdatum, quibus toridem interiecta alternatim staminum flauescensium mulcariola: totum verò florem sustinent quinque folia viridantia: tandem conicum illud capitellum paulatim in Ciceris maiusculi

molem excre-
scit, quod in
quatuor cari-
nas dehiscens,
femen ostendit
copiosum, mi-
nutum, ruffu.

Cordo hist.

Hepatica alba.

Gelner. coll.

Enneadyna-

Synon.

mis Polono-

rum: Eid. hor.

Gramen Par-

nassi non ve-

rum. Lobel.

Obs. p. 330. &

Adu. Gramen

Parnassi hede-

raceum recen-

tiorum. Hist.

Lugd. p. 1005.

Gramen Par-

nassi Dodonæi. Clus. Pann. & Hist. Gramen Parnassi vulgò. Tabern. Icon. & hist. Gramen hederaceum, flos Hepaticus: Gramen Parnassi minus, Gerard. Gramen Parnassi i. siue albo simplici flore C. Bauh. phyt. & pin.

Nascitur macris & putridis pratis, quæ nun-
quam omninò siccantur: in quibus variis in lo-
cis obseruati.

Locus &
Tempus.

Roborat hepar & obstructions tollit cum
flore cocta in vino aut aqua: puluis in cibo aut
poru conducit hepati. Vtilis in alui fluoribus &
porionibus vulnerariis.

BRITANNICA VETERIBVS.

CAP. XXIV.

Britannica seu Veronica Dioscoridi herba *Britannica*
dest *folia* siluestris Lapathi [similibus, vet.] at *Dioscoridi*.

nigrioribus ac pilosioribus, gustu adstringenti-
bus: *caulem* verò promit non ita magnum: radi-
ce autem tenui, breuique nititur. Foliis expri-
mitur succus, qui Sole aut igne cogitur & inspif-
satur. Vim porro habet adstrictoriam, priuatim
oris ac tonsillarum depascentibus vlceribus ac-
commodatam. Valer etiam ad reliqua, quibus
adstrictione opus est.

Britannicam ex Oceani insulis extra terras
positus, rerum naturam ostendisse, ait libri 27.
initio Plinius: ac de eadem antea lib. 25. cap. 3.
differit. Galeno Britannicæ herbæ folia ad-
stringunt & vulnera glutinant, similia folijs La-
pathi siluestris, præterquam quòd nigriora &
hirsutiora apparent. Est autem & succus ex
ipsis similibus adstringens. Quare & coccum ip-
sum quidam reponunt, velut efficacissimum
stomaticum medicamentum. Videtur enim

(100)

GRAMEN PARNASSI DODONÆO, quibusdam Hepaticus flos, CAP. XXIII.

Gramen Parnassi hodie dictum, *radicem* ha-
bet modicè crassam, fibratam, ex albo ru-
bentem, cum vestigio leui caloris adstringen-
tem: vnde *folia* prodeunt satis frequentia, lon-
gis pediculis rubescentibus appensa, Hederaceis
non angulosis similia, multò minora, crassiuscu-
la, sinuatis à pediculo neruis excurrentibus, non
ignaua adstrictione prædita: inter hæc *caules*
surgunt angulosi, fescquipalmates, indivisi, in-
feriore parte rubentes, folio vt plurimum vni-
co, eoque amplexicauli donati: quorum vnicui-

fanare etiam iam putrescentia. Hermolaus Plinii simia eadem quæ ille habet. Ruellius verba Dioscoridis, Plinii & Hermolai repetit suo more pro suis.

Officinæ, inquit Cornarius Britannicam non nouere: nec Herbarii, nisi quod quidam de Bistorta appellata coniectant. Ac quanquam, ait Matthiolus, Ruellius tradat Britannicam esse plantam Italiæ cognitam, atque ibi vulgò *Piata mano* appellari: mihi tamen hæc nomen non solum nomen illud incompertum est, sed nullum etiam inuenire obtigit, qui Britannicam ostenderet.

Plin. Herbor. Errasse Plinium ait Goropius illo in loco, ubi citra hæitationem de nomine asseruerit Britannicam ex Oceani insulis, extra terras positis, afferri.

æqui-uoca Sed ad Britannicæ æqui-uocationes diligentius animaduertendum. Pro Britannica itaque Dioscoridis Ruellius perhibet plantam, Italici Piata-manæ dictâ. Quæ autem hæc sit, nec nobis hæcenus constat. Aliâs Britannica dicitur Bistorta. Consol. media. Prunella. Betonica. Herbaparysis. Auricula vris. Pulmonaria Italica. Aster luteus. Pyrola. Persicaria. Cochlearia. Damafonium. Beton. coron. Caryoph. marinus. Halimus. Eryngium marinum.

BISTORTA MAIOR RVGOSIORVGSIO- ribus foliis.

C A P. XXV.

Descriptio.



Connum quam altitudine superant Bistortæ caules, tenues, glabri, geniculati: in quorum fastigio spica florum coloris carnel, Persicariæ, quorum singuli explicati quinque foliis constat oblongis, apicibus in medio, flori concoloribus: quibus succedit semen rufum & ferè nigricans, triquetrum

Lapathorum modo. Folia Rumicis seu Lapathi acuti, minora, superne in atro virentia, inferne glauca, pediculo vtrinq; foliaceas appendices angustas largientia: Radix articulum digiti refert in se contortum, rubra, sapore adstringente strenuè.

Bistortam fuere, qui secundam Catanances speciem apud Dioscoridè esse putarent, sed, Agricola teste, repugnant radix & folia. Alii minorem Lappam, alii minorem Bardanam vocant. Etrant qui radicem Becen rubri putant. Quidam Astragalum existimant, sed erroneè. Qui Serpentinam putant, frigidum pro calido ponunt. Apollinaris pingit quidem Bistortam, verum adiciendis viribus nullus fidat, quas confundit

cum viribus Ari & Dracunculi maioris.

Britannica quo nomine vocetur sibi hanc 1 cō-
stare ait Cordus, nisi quis Bistortam seu Herb. 1 m
paralyseos eam esse dixerit quorum neutrum ne-
que affirmat, neque negat. Ruellius in errore quod Ruell.
Bistortam, alteram Catanancen esse crediderit, 107.
ait. Item Dracunculum magno errore Bistortam
esse hæcenus credidisse totam ferè Medicorum Medi-
& Pharmacopolarum multitudinem. Ab illa
in H. Bistorta doctè describitur.

Dodo, gall. figuram Fuchii Bistortæ maioris Bistort.
titulo exhibuit. Lat. in fol. aliam Bistortæ inscri-
ptione pingit, ac ait ab intortis & conuolutis ra-
dicibus nomen habere: Belgas *Worm*, mæc /
Germanos *Nater wurm*, Gallos *Bistorte*. Bohe-
mos *had yforten*. Colubrinam & Serpentinam
à germanica voce etiam dici, & à quibusdam
Dracunculum. Sed à Dioscoridis Dracontio
multum differre. Plinianorum autem Dracun-
colorum aliquam fortasse speciem asse, secundâ
scilicet. Esse tamen ex recentioribus, qui Bistort-
tam omnino aliam esse velint. Matthiolum qui-
dem in epist. medic. Behen rubrum esse scribere
Gesnerum ad Limonium referre. Aliis placere
Britannicam esse: sed omnes eos inualido niti
fundamento, vt fusè demonstrat.

Lobelius in Adv. eorum tuetur opinionem, *Bris*
qui Britannicam putant. Vocat autem Bistortam
majorem: In Obs. pag. 155. Icon. Plant. pag. 292
Bistortam Britannicam. Fracastorius de con-
tag. lib. 3. cap. 3. Bistortam Balapathon esse scribi-
catur. Bistorta loco, cornuum quid coralloi-
des Pet. Crescentius exhibet.

Fuch. Colubrinam & Serpentinam feminâ *Syn*
vocat. Tragus Colubrinam, ac Bistortam i. ma-
jorem. Anguillæ Bistorta magna. H. Luf.
Bistorta maior alpina. Gesn. hort. Limonium
Bistorta: Eid. coll. Bistorta maior rugosioribus
foliis: Et Limonium vulgò Bistorta. Brunfel.
in Herba. germ. pag. 72. Serpentinaria: p. 78. Her-
molaus Dioscoridis atamanæ.

C. Bauhinus Molybdenam Plinii lib. 25. cap. 13. Mo-
id est plumbaginè, quod plumbum (viti genus) *Plin*
ex oculo tollat, a. bitratur. Vocatur in phyt. &
pin. Bistorta i. sue maior, radice minus intortâ,
Colubrina & Dracunculus maior Brunf. Bif-
torta femina, Eiusd. Bistorta maior, Thal.
Tabern. Ger. & Clus. hist. Bistorta Matth. Cē-
talpin. Cast. & Hist. Lugd. pag. 128, ubi duæ fi-
guræ, Bistortæ Marchioli & Bistortæ maioris.
Non autem monet quanam harum sit.

Nobis est Britannica maior. Serpentinam
herbarii & officinæ appellant, quod ubi primum
è terra erumpit, linguæ serpentis tenui pelle
vestitæ formam obtrineat.

Reperitur Bistorta locis humentibus, in opa-
cis silvis, pingui ac lutofo solo. Matthiolus in
montibus exire refert. Adolefcit etiam feliciter
in hortis: perenni radice nititur. Monspeli-
lii reperi in montibus circa Gangem, Genevæ in
monte Thuri. Ad Austriacarum & Stiriacarum
Alpium iuga, accliuibus locis & circa scopulo-
rum radices spontè nascitur.

BISTORTA MEDIA FOLIO minus rugoso.

TRagus, qui Bistortam secundam facit &
pro Colubrina minore describit, non autem
depingit, restatur radicem habere capillatam,
non minus quam altera.

D-d.



Dod. gall.
Fecitq; magi-
nem inscribi.
Bistortam mi-
norem, facit
que secundā.
C. Bauhin.
phyt. & pin.
Bistorta 2. siue
maior radice
magis intorta:
Bistorta Lon-
minor Gesn.
hort. Lacun.
Lob. in Adu.
& Tabern.
media An-
guill. Latifo-
lia Gesn. ma-
ior Eysl. mas
Brunf. Colu-
brina & Dra-
cunculus mi-

nor, Eid.


A priori differt foliis minoribus & lauibis,
radicēque magis intorta. Rependo multum se
multiplicat. In monte Iura reperitur.

Bistorta Alpina maxima C. Bauhin.

Ex radice quadruplò quàm in vulgari maiore,
contorta, geniculata, fibris capillata, foris nigri-
cante, intus alba, caules bicubitales, nodosi,
striati, maiori ex parte nudi exurgunt, quorum
quilibet spicam florum subpurpureorum, vnciam
quatuor, sustinet: folia habet oblonga, in
acumen desinentia, venosa, supernè virentia,
infernè caesia, vel etiam incana: quorum quaedā
ad cubiti altitudinem accedunt, sed angusta, vn-
cias tres lata, inquit author, qui Bistortam ter-
tiam in pin. facit.

In altissimis Silesiorum montibus reperitur
vt in Sudetorum iugis, velut ad Gigantem, ac
ad Albis fontes Schneckgraben.

BISTORTA MINIMA.



Bistorta
minima
radicem polli-
cari habet
minorem, cō-
tortam, bre-
uem, exte-
rius albam,
fibris capilla-
tam: caulis
surgit dodra-
talis, vel pal-
mari paulò
maior, aut e-
tiam minor,
tanta est va-
rietas, foliis
vestitus pau-
cis angustis,
oblongis, a-
cutis, nullo
pediculo hæ-
rentibus, alia

verò ex radice orta folia, vncialia, aut sextan-

alia, vnciam plùs lata, infernè glauca, super-
nè viridantia, spica vnciam longitudine superat,
floribus comata albicantibus, sequente dem se-
mine, non triangulo, vt in primis duabus, sed
rotundo, ruffo.

Apud Gesn. hort. Aretius in descript. montis
Stockh. vocat Bistortam minimam: Lobel. in
Adu. Bistortam minorem & minimam, Britan-
nicæ speciem: Anguill. parum: C. Bauhin.
phyt. Bistortam 3. siue minorem, pin. Bistor-
tam 4. siue alpinam mediam, Limonij speciem
minorem Gesn. hort. Bistortam minorem seu
alpinam Camer. apud Matth.

Geneuz in monte Thuri floret Iunio & Ju-
lio.

Certū est iisdē facultatibus esse præditam cum
aliis quibus maior: de qua varia varij scripserūt.
Radix, inquit Tragus, in puluerem redacta, ac
drachmæ pondere in potu sumpta, veneno pe-
stilentie resistit, ac illud per sudores expellit.
Eisdem viribus pollet aqua distillata, & radi-
cis in vino decoctio ad eadem valet. Radix
Colubrinæ, nec non aqua distillata & radicis
decoctū sanguinis eruptiones, dysenterias, aliā-
que id genus fluxiones cohibet. Radix in pul-
uerem redacta, ac cum aqua distillata tempera-
ta, grumos sanguinis ex casu, contusione, aut
alia quavis causa concreti discutit, nec non mor-
bum quoque regium. Radix Colubrinæ, Pyre-
thrum & Alumen adustum, æquali pondere in
puluerem redacta, melle temperata, ac magni
tudine Pisi, cauis dentibus indita, fluxiones ac
destillationes à capite fluentes sedant, & caput
purgant: ad cancrum dorsi, polypos, & maligna
vlcera, quæ cacoethe vocant, aqua [è radice &
herba] & pulvis conducunt apprimē, si cum
aqua abluantur, & puluere aspergantur: pulvis
Pari ratione vsurpatus, sanguinem & vulneribus
abundanter manantem cohibet.

Herbarij compertum habent (scribit Matth.)
iisdem pollere facultatibus Bistortam & Tormē-
tillam. Quamobrem vtræque abortum prohi-
bent bibitæ, ac ventri, renibusque ex aceto illi-
tæ: vrinæ incontinentiam supprimunt, cum
succo Plantaginis potæ: sistant menses, si in ea-
rum decocto ad vmblicum vsque conseruerint
fœminæ: Idem præstant [de radicibus tamen
intellige] si tritæ, & ex melle atque Spica suba-
ctæ, ventri ac pubi illinantur. Sanguinem &
vulneribus manantem cohibent, superasperfo
earum puluere: qui item potus biliosas coerces
vomitiones, si ouorum albo exceptus super ficti-
li regulā inassetur, moxq; comedatur: aqua quæ
ex his duplici organo elicetur, siue è radicibus
decoctum, venenis omnibus remedio est: vtræ-
que dysentericos sanant, & vulnera glutinant,
præsertim quæ intestinis & visceribus fuerint il-
lata, non modò ipsis vulneribus illitæ, sed & in
portionibus haustæ. Pulvis radicis Bistortæ cū
conserua Rosarum assumptus egregiè compes-
cit sanguinis sputum, dysenteriam, aliāque flu-
xiones, menses nimios sistit: potest idem pul-
vis ex succo Cydoniorum bibi. Abortum pro-
hibet pulueris drachma semis, cum pari Succini
portione, ex ouo forbili, diebus aliquot conti-
nuis vsurpata. Præter quæ omnia, tonsillarum
(inquit Dod.) faucium & oris inflammationibus
succurrit: eandemque cū radice vim tribuit foliis
& feminibus, sed tamen minùs efficacem.

Synonymia.

Pyrolis om-
nes iisdem
facultatib.

Torm. facul-
tatibus.

LIMONIVM VETERIBVS.
CAP. XXVI.Limonium
Dios.

Limonium [*λεμονιον*] aliis Neurodes dictum, folia habet Betæ, verùm tenuiora, & minora (vulg. longiora) decem aut plura: *caulem* tenuem, rectum, Lilio æqualem, rubro *semine* refertum, quod gustu adstringit. Semen tritum & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis, cœliacisque prodest, ac rubentem fœminarum fluxum cohibet. Nascitur in pratis (*ἢ λεμονιον*) & palustribus, auctore Dioscoride.

Beta filu.
Plin.

Plinius Betam siluestrem vocari tradit. Est & Beta siluestris [inquit lib. 21. cap. 8.] quam Limonium vocant, alij Neurodes, multo minoribus, tenuioribusque ac densioribus foliis, vndecim sc̃pè caulium. Huius folia ambustis vtilia, guttatoria adstringunt. Semen acetabuli mensura dysentericis prodest. Aquâ & radice cocta, maculas vestium elui dicunt, itemque membranarum. Quod autem vulgati codices, *vndecim sc̃pè caulium* habent, ex veteris codicis vestigiis non est: nam, teste Cornario, voces, *vndecim sc̃pè*, ad folia præcedentia pertinent: & *caulium* vox ex caule Liliij corrupta est. Vtrumque ex Dioscoride clarum est, qui pro vndecim *δὲ καὶ πλεον* habet: καὶ πλεον ὡς πλεον addit.

Galen.

Limonij semē quod austerum est, inquit Galenus, cum vino dant cœliacis, & dysentericis, & hæmoptoicis. Prodest etiam ad fluxum muliebrem. Satis autem est dare acetabuli mensura.

Æquivoca.

Inter Limonia recensentur sequentia: Limonium Dioscoridis, nullis reclamantibus notis; auctore Matthiolo, Seplasis falsò Behen rubrū dicitur nobis: Limonium maius multorum. Li-

monium Marthiolinum, quod nec nouimus, nec scimus, an vsq̃ iam ipse viderit. Limonium Maranthæ cui filiquas Anticrhini attribuit. Limonium Narbonense siue Oleæ-foliū, quod Limonium minus inscribimus. Limonium rarum quorundam, Imperatus Cichorium globularem vocat. Limonium peregrinum aliud Clusij.

Eodem nomine insigniuntur etiam sequentes plantæ: Bistorta maior rugosiorib. foliis, à Gesnero. Ab Anguillara Plantago aquatica: lib. 38. Alisma Monsp. siue Doris. A Lobelio Sanguis Draconis. A multis Pyrola: quod non conuenit, licet non errarit qui eā pro Limonio vultus fuerit. Ab aliis Valeriana rubra latifolia, quæ tamen non responder. Ab aliis Dentellaria Rondeletij sed falsò. A Germanis quibusdam Trifolium palustre referente Cordo, de quo H. nostræ l. 17. Ab Aëtio Cynoglossum, de quo etiam H. n. l. 33. A Rondeletio Glastum siluestre. A Plinio Carduus siluestris, teste Dod. Ab aliis Carduus dictus Spina lutea. A Gesnero Inrybi (syluestris genus in pratis nascens [à quibus Limonium nomen] vt & Hieracium. A nonnullis Odontis teste Dodonæo: cui tamen non placet ea opinio. Gesn. hort. Limonij nomine videtur miscere duas plantas, nempe Polemonium Dodonæi, & Polemonium fruticem (Trifolium fruticans luteum, n. g. l. 11.) cuius meminit sub Ruta capraria Gallorum Monspelij. Tandem audiendi non sunt Medici illi, qui contendunt Limonium apud Æginetam esse fructum vulgò Limonem dictum, siue Citrium malum de quo lib. 1.

De Limonio plura & quidem speciatim in huius Tomi Appendice.

FINIS LIBRI TRIGESIMI PRIMI.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXXII.

ROTVNDIFOLIÆ ET COGNATÆ.

R Estant rotundifoliae atque his cognatae, vno fasciculo comprehendenda, quando aliò commodius referri hâ-
bitus non poterint.

DE I2, ID EST, VIOLA, VETERVM.

CAPVT I.



Vandoquidem variae circa *io* in Theophrasto, & circa Vi-
olam in Plinio, acceptiones oc-
currunt, maluimus omnes lo-
cos adducere, vt liberum ha-
beat iudicium Lectores. *Viola*
[*io*] nigra, flos odoratus; vsui
est, & naturâ magna ex parte suffruticea est,
sed annuâ non diuturnior. Hæc enim ramu-
lis caret, sed ab radice foliata constat, & perpe-
tuo viret: vtque aliqui ferunt, etiam florem
semper promere potest, si modo quodam cola-
tur. Ex floribus verò nulla parte discerni potest;
namq; differentiam nullam habere videtur, quâ-
quam albâ haberi concedatur: colorem eius va-
riari liquidò constat. Apud Cyrenam huius
floris odor syncerus præcipuè sentitur: semine
exit. Nam & ipsa, & eius radix ligno constat, au-
thore Theoph. lib. 6. hist. cap. 6. Florum prima
Viola alba se ostendit (ait cap. 7.) emicat enim
vbi cælum clementius statim, etiam nondum
Hieme exactâ, vbi verò immitus postea, Vere
sc. exit: & cum ea, quæ Viola flammea vocatur,
siluestris duntaxat. Hæc ceteris omnibus, qui-
bus coronarij vniuntur, longè præcurrunt, & in-
ter vernos flores tam siluestris, quàm vrbanos
plurimum durant. Vita Violæ albæ anni maxi-
mè tres, senescens diminuitur, candidioresque
assidue flores fert. Ad iucundam autem Viola-
rum olentiam solum cælumque accommodatum
plurimum confert. Videtur & annus [vt dictū] ad
bonam olentiam referre, cum sc. talis aut talis in-
cesserit: non imbrum squalorumque tantum
ratione, sed etiam quum tempus certum, & a-
quæ, & flatus, & in totum celi commodæ muta-
tiones accesserit. Montibus autem [vt & hoc
simplici transigam ratione] & Violæ, ceu & reli-
qui omnes flores, odore longè deteriore emer-
gunt. Hoc mirum, Viola florem, odorem sua-

uissimum reddere: cum eius nulla alia pars bene
oleat, vt lib. caus. 6. cap. 15. prodidit. Ceterum, e-
ius flores distantes odoratiores quàm proximi
sentiuntur, ibid. cap. 25. Sed nec locis admodum
siccitibus atque tenuibus *τὸ ἰσὺ τὸ λευκόν* odora-
tum est, nec vbi cælum vehementer feruidum æ-
stuosumque est. Quia supra modum resicca-
tur.

Plinius Violarum infra scriptis locis memi-
nit. Lib. 21. cap. 6. Violis honos [Lilio] proximus.
Earum plura genera. Purpureæ, luteæ, albæ:
plantis omnes (luteæ & albæ semine purpureæ
plantâ, Dal.) vt olus sata. Ex iis verò, quæ spon-
tè apricis & macris locis proueniunt purpureæ,
latiore folio statim ab radice carnosæ exeunt,
solæque græco nomine à cæteris discernuntur,
appellata la [*μαλάνια* Theoph. Dal.] vt ab his
lanthina vestis. Sed è satius maxima autoritas
luteis. Genera iis Tusculana, & quæ marina ap-
pellatur, folio aliquantò latiore, sed minùs o-
dorato. In totum verò sine odore, minutòque
folio, Calathiana, munus Autumni, cæteræ Ve-
ris. Eodem lib. cap. 11. Florum prima Ver nunt-
iantium Viola alba (*λευκόν* Theoph. nempe
bulbosum, Dal. 7. Tepidioribus verò locis
etiam Hieme emicat. Postea quæ appellatur
purpurea, proximè flammea, quæ & Phlox vo-
catur. Vita longissima Violæ albæ est bimatus.
Ab eo tempore degenerat.

Hippocrates agnouit Violæ duo tantum gê-
nera, nigrum & album: Nicander in Georg.
pallidum & luteum. Dioscorides Violam albam
à purpurea non tantum capite, sed & libro se-
parauit. Viola purpurea (*ἡ πορφύρεος*) inquit,
folium habet minus & tenuius quàm Hedera,
sed nigrius, & non dissimile: cauliculus medium
à radice, in quo flosculus est valdè odoratus,
purpureus. Nascitur in vmbrosis & asperis locis.

io inter spuria Dioscoridis vocatur *δ' αὖτε ἰο*.

Tom. III.

PPP

bus, sed numerofo foliorum agmine multiplicibus.

Camer. hort. Viola Martia pleno flore biflora, purpurea: quam [apud Matth.] non transplantatam loco calido simplicem euadere ait. Hist. Lugd. p. 797. Viola purpurea sativa, in hortos

translata: maxime loco aprico infolata, floréque sæpius vulso, alioque cultu, denso foliorum stipatu, globosa facta, ideoque duplex Gallis dicta, *Viola de Mars double*, olitoribus in delitiis habitata. Dodon. gallic. & lat. Viola cum purpurea, tum candida, hortensis utraque, florum foliola multi-



plicans. Gesn. hort. Viola simpliciter dicta, vel nigra, cognomine, *Dalypodium*, vel potius *Dalphyllum*, h. e. multiplici flore, cognominatum. Lob. in Adv. Viola duplex: in Obs. p. 334. Viola Martia purpurea, Tabern. multiplex.

C. Bauh. pin. Viola Martia rotundifolia 4. [2. phyt.] siue multiplici flore; Viola nigra flore pleno, Dod. Viola purpurea & alba multiplex Tabern. Ger. Eyst. Viola flore multiplici Dod. fl. pleno Cast. Cam. Viola cærulea floribus numerosis foliis constantibus Cæsalp. Variat floribus colore purpureo, rubello, candido, ex purpureo & albo variegato.

Non nisi hortensis à me fuit observata florens Montbelgardi mense Septembris; Geneuz Octobri.

Viola Martia intensè purpurea, flore minore pleno.

Radix prolixa, crassiuscula: clemata Violar Martia vulgaris: nec dissimilia folia: flores autem multiplici foliorum fœturâ pleni, minores, saturatioreque purpurâ tincti.

Nescio vnde illustri. Principissa nacta sit Violam hanc Martiam alibi non conspectam, flore multiplicato minore, colore intensè purpureo. Colitur in horto Ill. E. C.

Viola flore pleno maximo.

Hoc est illud Violar purpureæ genus, quod Costeus in suis comm. in Mesuem, Constantinopoli reperiri scribit, flore pleno, magnitudinis Rosæ paræ Moschatellinæ, odoris suavissimi, cuius flores duos ante cibum comestos alvum solvere narrat. Huius meminit Camerarius in Horto, & apud Matth. in Hist. germ.

Viola Martia, flore ex albo & cæruleo mixto, multiplicato, odoratissimo.

Serpit & hæc, & subinde clemata demissis fibris radicatur. folia non alia, quam vulgatiore Violar Tom. III.

floræ eodem modo pediculis longis nituntur, statim è radice ortis, odoratissimi, multiplici foliorum agmine fæcti, albo cæruleoque mistis vericillores.

Dodon. lat. Viola foliola multiplicans candida. Camer. apud Matth. germ. Viola alba & rubella. H. Lug. p. 797. Viola candida globosa. Tabern. Viola alba multiplex.

Hanc artuli Bisantio, & Clarevallii vidi florētē adhuc mense Septembris, & postea Aprilis.

Viola Martia flore albo odorato, & non odorato.

Longissimis serpit radicibus, & subinde novas demittit fibras: folia iuxta pediculum falcata, minora, quam Violar Martia purpureæ, magis hirsuta, concinnè crenata: flores formâ quidem & odore purpureæ persimiles, sed minores, coloris albi & planè niuci, odoratissimi, interdum calcaria purpurascunt.

Hæc aliquando foliis est gracilioribus, floribusque nullo aut languido odore donatis.

Sunt in Violarum genere non modò purpureæ (inquit Matth.) sed etiam candidæ, frigidis & viginosis locis nascentes, prorsus tamen inodoræ de quibus nihil, quod exter. memoriæ prodidit Dioscorides. Hæ numerosæ proueniunt in Ananiensi agro supra Tridentum, vbi mense Aprilis admodò copiosè florent, vt si longè prospiciantur, oculos fallant, & extensâ lintea videantur. In Hist. Germ. ait Violas albas non ita suauiter olere vt purpureas, quòd locis frigidis proueniunt.

Lob. in Adv. Flores albæ vbique vulgatiore, nullo, aut sanè languido odore. H. Lugd. p. 797. Violar albæ nullo aut languido odore. Trago, Viola candido flore & odorato. Viola alba vt nix: Eid. Viola candidis floribus. Gesn. hort. Viola Martia flore albo. Tabern. Viola Martia alba Monach. in Mes. Viola mamula alba in montibus prope Brixam.

C. Bauh. pin. Viola Martia rotundifolia 3. siue alba; Viola alba Brunfels. Condida Dod. Cef. flore albo Ger. Viola Martia cãdida Trago, alba Tab. Eyst. Viola silv. albo flore Gesn. Hor. Viola Martia alba hort. & campestris odora Lob. Ic. Plant. p. 608.

An Hermolao in Diosc. Violar loripedes siue sessiles, candidæ, vulgò Claudæ nominatæ, & Mauricè Semphigi?

Geneuz prope la Bassie florentem vidi mense Martio & Aprilis. Frater inuenit eam in silua circa Augustam Rauracorum, plerumque in dumetis prouenientem. In sepibus circa Valentiam & Decan in Delphinatu passim obseruatur copiosissima. Montbelgardi ex filuestribus translata in hortum Ill. E. C. acquirit calcaria purpurascencia.


VIOLA CÆRVLEA MARTIA

inodora filuatica, in cacumine semen ferens.

Radice est fermentosa, tenui, lignosa, & longâ, vario reptatu hinc inde penetrante, densâ & longâ fibrarum comâ per interualla præditâ: folia circinata fere rotunditatis, nisi in mucronem acutiorem desinerent, supinâ parte leuiter hirsuta, viridantia, pronâ verò glabra, dilutiùs virentia, & fere luteola, interdum subpurpurea, in ambitu ferrata, gustu vilcideo, *pedi-*

PPP 2

culis tenuibus, quadrantalibus: cauliculi pauci, quos ad alas inuolucra foliosa, acuta, in



ambitu hirsuta completuntur, *flosculos* in ramulorum summitate proferunt, *Viola Martia* odoratz similes, ex quinis foliis constantes, quorum supremum longius protensum reliquis, calcar deformat, purpuream utrinque secante fasciâ albâ, quâ ipsâ albedine reliquorum quatuor

foliorum saturatâ purpurâ tinctorum vngues colorantur, nullâ odoris gratiâ: in medio stammina lutea, cum stilo virente: *caules* subinde cubitalem nanciscuntur longitudinem, inque ramos diducti foliis vestiuntur: flores, vt mox diximus, gerentes, quos subsequuntur siliquæ longæ, in tres carinas dehiscences, *semine* farctâ copioso, ex rotunditate oblongo.

Icon.

Nostri figura minus accurata partes omnes non exprimit: quare eò accuratorem dedimus descriptionem.

Synonyma.

C. Bauh. pin. *Viola Martia rotundifolia* 2. siue *Viola Martia inodora silvestris*: Et sic in phyt. vbi tertia est. *Viola silvestris* Brunfels. in 4. p. 48. & Anguill. inodora Dodon. *Viola* 2. siue purpurea silvestris, *Viola* nigra alterum genus cæruleo & inodoro flore: & p. seq. 158. *Viola canina* seu silvestris, Trago. *Viola nigra silv.* species Gesn. hort. *Viola canina* Lon. & Tab. sylv. Ger. *Viola canina cærulea inodora silv.* ferotina Lob. Ic. Plant. p. 609. *Viola Martia silv.* Thal. *Martia canina*, Eyst.

Varietas.

Flos cæruleus, aliquando pallidus: duplex est, altera maior, foliis maioribus & rotundioribus: altera minor foliis mucronatis oblongis ac striatioribus: Gesn. in monte fracto meminit montanæ, quæ solum foliis minoribus & solidioribus à vulgari differat: est & *Viola Martia* flore rubro purpurascens, Eyst. Dalechampsius olim vocabat nostram plantam, *Martem Violarum*.

Locus.

Observatur passim ad macrorum & siccorum agrotum ac pratorum margines: item in dumetis & siluis, florens eodem tempore, quo purpurea vulgaris, sed multò diutius illâ perdurâs.

VIOLA MONTANA FOLIO multifido.

Descriptio.

Arum *Violæ* genus mihi in monte Nombres Rhetorum prope balneum Nymis inuentum, simplici fere radice hærebat: folia pediculis longiusculis nitebantur è radice statim ortis, in decem longiuscula & angusta segmenta [singula Linariæ tohum referentia, neruo secundum longitudinem decurrente] ad pediculum vsque



tes dissecto.

dissecta, gustu glutinoso, reliquarum *Violarum* more: *florem*, qui tum deciderat, non obseruauit, superstitibus adhuc siliquis in tres carinas hiantibus, quas pediculi breuiiores quàm foliorum sustinebant. C. Bauh. pin. *Viola Martia rotundifolia* 5. siue *Viola Alpina* folio in plures par-

VIOLA MONTANA PURPUREA, SOLIDIORE FOLIO.

Exit hæc in summi Sneeburg iugi vertice, perquam exiguis foliis, & quasi circinatæ rotunditatis, in ambitu leuiter serratis, crassiusculis, longiusculo pediculo inhaerentibus: *cauliculus* assurgit è medio foliorum, duas vncias longus, vnicum *florem* sustinens purpureum, vulgari similem, sed longè maiorem & inodorum: cui succedit triangula siliqua: *radix* nonnihil serpit, & aliquot fibris donata est. Floret sub finem Iunii. Hanc nonnulli Melanium [fortè restituendum Melanthium:] montanum appellare videntur, inquit author Clusius, qui in Pann. p. 356. *Viola* montanam 2. [ita quoque in hist.] siue montanam purpureo flore vocat. C. Bauh. pin. *Viola Martia rotundifolia* 6. siue *Viola Alpina* purpuream exiguis foliis.

VIOLA MARTIA LUTEA.

Modum fibrosa est *radix*: folia circinatæ rotunditatis fere, ad pediculum longum, rennem falcata, parua, cæterarum *Violarum* foliis delicatiora, tenuiora: *flores* pediculis è radice mox ortis insident, exigui, lutei.

Matth. *Viola* aureo colore. Monach. in Mef. *Viola* mamula lutea seu crocea. Gesn. hort. *Viola* flore luteo. Aret. *Viola lutea*, & Lob. Ic. p. 609. Eid. Obs. p. 33. *Viola Martia* cauliculis ramosis, floribus luteis. Clus. pann. p. 356. *Viola* 1. montana (sic etiam p. 357. & Hist.) flore luteo. Dalechampsius olim Paronychiam vocabat.

C. Bauh. phyt. *Viola* 4. Eid. pin. *Viola Martia rotundifolia* 7. siue *Viola alpina rotundifolia lutea*: *Viola luteola* minore flore Gesn. hort. *Viola lutea* Cæsalp. Cast. *Viola Martia lutea inodora alpina* Camer. Gramen Parnassi aliud H. Lugd. p. 1005.

Semina circa Geneuam in montibus collecta, terræque in horto Ill. E. C. mandata plantam dedere, quæ Aprilis & Martio florebat. Reperta quoque ultra citâque montem Gorthardi, & in Apennino, qui vulgò Cornea dicitur, inter Italiam & Prouinciam. Abundanter nascitur in omnibus Austriæ & Scitiæ Alpibus: Iunio atque Iulio

que Julio florens, in cultis autem Aprili. In Bo realis etiam Angliæ montibus inueniri intelligebat Clusius.

Cæterum Viola refrigerandi vim habet, Dioscoride auctore. Folia eius per se & cum polenta illita stomacho æstuanti, oculorum inflammationibus, sedisque procidentibus auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est, cum aqua potum angina correptis, & comitiali in pueris morbo mederi affirmant. Quam postremam sententiam quidam hinc excludunt, tanquam supposititiam, nec eam Ruellius conuertit, quod eadem capite de Asters legatur. Alij contra, Plinium & eos auctores, ex quibus illa descriptis, sequendos iudicant, idque de Viola purpurea rectè legi, & à Dioscoride scriptum esse censent, capicque de Asters Attico falsò adiecta, quòd neque Plinius neque Græcus aliquis auctor ea de Asters memorie prodiderit.

De Viola verò hæc Plinius. Viola siluestres sunt & sativæ. Purpureæ refrigerant, contra inflammationes illinuntur, stomacho ardenti imponuntur, & capiti in fronte. Oculorum priuatim epiphoris, & sede procidente, vulvae, & contra suppurationes. Crapulam & grauedines capitis impositis coronis olfactuæ discunt.



Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex iis, comitialibus medetur, maxime pueris in aqua potum. Semen Violæ scorpionibus aduersatur, contra flos albe suppurata aperit vel discunt. Hæc Plinius. Et sanè hoc ex Violis purpureis auxilium videtur non manifestis ipsarum

qualitatibus aut facultatibus, sed quædam & cæco esse & uanis & epilepsiæ mederi.

Violæ folia [inquit Galen. 6. simpl.] aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Quare tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuanti, & oculis.

Mesues multò accuratius Violæ vites declarat his verbis. Viola recens, frigida est & humida, siccata minus tum frigida, tum humida. In recente enim excrementola in superficie humiditas purgatrix lubricando, caliditate obtundit, ipsius perfectionis & formæ causam. Hæc cum siccando resoluta fuerit, caliditas primò obrupta, & ab ea sapor amarus, sicque purgatrix trahendo. Viola recens refrigerat, narcoticorum ritu dolores calidos sedat, inflammationes omnes extinguit, asperam arteriam & thoracem lenit, expurgat bilem flauam, & ab ea calorem extinguit, & cephalalgiam à causa calida: somniferæ sunt, conferunt uiræ, cynanchæ, præter cæteras verò pleuritidi, & cæteris tumoribus thoracis: phlegmonen

Tom. III.

hepatis, obstructionem eius siccata, icterum valde iuuant, & febres symptomáticas, seu inflammatorias: sitim sedant, sed coryzam excitant.

Melior est Viola matutina, cuius virtutem neque Solis calor resoluit, neque pluuia dissipauit. Succus Violarum & syrupus leniendo soluit. Violæ melle conditæ magis tergent, minus refrigerant, cum saccharo contra. Oleum sit omphacinum aut amygdalinum, in quo oleum Violarum fiet. Nec Violæ, nec harum succus multam coctionem sustinent. Acetum Violarum febrium ardorem mirè sedat. Dantur potu expresso ab Vnciis iij. ad Vncias viij. Succus ab Vncia vna, ad Vncias duas. Syrupus violaceus ab Vnciis duabus, vsque ad Vncias quatuor. Conditum Violarum ab Vncia vna & semisse ad Vncias tres. Hactenus Mesues. Flores Violarum bibiti cum aqua destillationis, vel decoctionis florum Violarum, conferte à proprietate Epilepsiæ puerorum, & propriè illi, quæ dicitur Mater puerorum, & in qua febris est acuta, legimus apud Bayrum.

Autem siccata humiditate, quæ in superficie continetur, gustu amaritudinemprehendi, à calido sc. prouenientem: & hinc fieri ut esciccatæ magis calidæ, minusque humidæ habeantur: Ego autem [inquit Matth.] nullam sanè amaritudinem, nec in siccis, nec in virentibus obseruavi: foliola quidem florum sunt ita acria, ut fauces vellicent: quamobrem Violas nec frigidas simpliciter nec narcoticas existimarim dicendas. Semen certè scrupuli pondere ex iure gallinæ sumptum, purgat. Aqua, oleum, & acetum violaceum cephalalgias ardentissimas vel per se, vel cum linteo impositæ compescunt. Nec minus calidæ hepatis intemperiei auxiliatur. Succus herbæ tumores calidos reprimat. Quæ oculorum dolores cum linteo inducta mitigat. Ad dysuriam præstans medicamentum est oleum violaceum umbilicali regioni illitum. Semen calculosis vtilissimum. E Violis igitur nigris seu purpureis, ut vocant, Acetum, Oleum, Conseruæ, Zulapia, & Serapia conficiuntur. Ad quasuis calidas affectiones adhibere, præsertim verò pueris, qui morbo comitiali & ardentibus febribus, non raro infestantur, commendat Tragus, iteratam violarum macerationem in aqua fontana factam addito saccharo propinans. Serapium Violarum, mensura duum, aut trium cochlearium sumptum, ardores febrium acutarum tollere idem testatur: laxam præterea aluum conseruare, emollire aposthemata, cor roborare: pleuritidi mederi breuiter omnibus calidis affectionibus summè conducere. Esse qui

Serapii
Viol. destil.

Serapium Violarum aqua fontana misceant, sitique restinguendæ exhibeant, quam sanè potione ægrotantibus gratam esse fateretur. Additque postmodò, id quod in medio residet Violæ luteum punctum, negligi non debere, sed diligenter asseruari, nam decoctum in aqua & potum anginae auxilio esse, & comitialibus maxime in pueris, iuxta Dioscoridis præceptum. Tandem Violarum oleum, aquam distillatam, & acetum, dolorem capitis sedandi vim habere illitu, nec non inflammationibus hepatis foris, imposito, opitulari. Hæc inter alia Tragus, quem miror, ut & Dodonæum eum sequutum, tribuere luteæ parti Violæ, quod Dioscorides & Plinius purpureæ.

Simeon Sethi ait prodesse ad intestinum dolores, cor verò offendere. Dolores capitis à

flauâ bile factos sopire, potas & odoratas: Ven-
triculum irritare, & flauam in eo inuentâ bilem
caput siccum humectare, calidumque refrigera-
re suo odoratu: Somnum inducere: humida
capita destillationibus obnoxia reddere.

PINGVICULA GESNERI.
CAP. III.

Hoc nomine appellabat Gesnerus foliorum
argumento, quæ per terre superficiem spar-
sa, quinque aut sex, & plura interdum, pinguius-
cula sunt & nitida, binas vncias longa, vnciam
circiter lata, per extremum nonnihil obtusa: in-



*Gesneria vi-
ciifolia.*

ter hæc sur-
gunt pediculi
aliquot, pal-
mares, aut al-
tiores, quo-
rum vnicui-
que in summo
fastigio hæret
flos vnus pur-
puroviolaceus
aut alb⁹,
hians, longo
calcare donat-
us, facile pe-
diculum re-
linquens: ra-
dix fibrosa.

Miror Ges-
nerum dicere
Pinguiculam
[vt vocat in
monte fracto,
& de hort. vbi
Liparium vo-

candam censet] solia Oleæ habere. Sanè ea si-
militudo videtur longè perita: multò enim latio-
ra sunt, nec dura, sed tenera & breui euane-
scentia: color quoque diuersus.

Pinguiculæ nomine depingitur & describitur
à Clusio in pann. & hist. placuit enim id illi relin-
quere quo à Gesnero donata est. An verò Lin-
gua, vel Lingulaca Plinii sit, quam lib. 24. cap. 19.
& lib. 27. cap. 1. c. c. c. fontes nasci tradit, non asse-
rit, sed inquirendi duntaxat causâ proponit.
Pinguiculam & Saniculam Eboracensem, h. e.
Vors hirc. Cam. n. nominat, Quibusdâ xpianis
Apuleii putatur. H. Lugd. p. 1106. Cuculatam
inscribere maluit.

Dodecatheon
Plinij
C. Bauh. phyt. dicitur Pinguicula Dodecatheon
Plinii quorundam: Eid. pin. Sanicula rotundifo-
lia, sine Sanicula montana flore calcarî dona-
to: Pinguicula vel *lunio* per, Viola humida & palu-
stris: Dodecatheon Plinii, Gesn. & Camerarii.
Sunt qui Oleosam appellant.

Varietates
& Loca
Quæ albo est flore spontè prouenit non mo-
dò in Schneeberg, Durrenstein, aliarumque Alpiu
iugis, in locis à solutâ recens niue adhuc maden-
tibus: sed etiam illa quæ purpureo est flore per-
mixta in omnibus ferè pratis vliginosis, in qui-
bus Maio floret, & Iunio semen profert: in Al-
pibus verò seriùs, Clusio auctore. Altissimis
autem & niuosis montibus gaudere, æque faxis
proflite, rivulo quopiâ præterfluente madenti-
bus, & florere Iunio etiam antequam niuib.
liquatis montium cacumina detecta appareant,
annotatum est in H. Lugdunensi. Obseruaui
ego in monte Thuri flore purpureo & albo, &
vltra Gotthardam ad radicem montis. Reperit

loh. Schvvab copiosam flore purpureo in Iuræ
montis tractu illo, non tam variis, quàm raris
stirpibus refertissimo, cui rupes & falcones Fal-
conum rupes nomen dedere. Referebant ei eius
loci pastores, se plagas sibi illatas feliciter curare,
foliis eius contusis & impositis: eiusque succo
pingui & butyroso fissuras in vaccarum vberi-
bus litu curare.

IACEA TRICOLOR SIVE TRINITA-
tis flos.
CAP. IV.



Pvlcherri-
mi flores,
eorumque
varietas effe-
cit vt in hor-
tos transla-
ta culta digna
iudicaretur:
quos quinque
folijs constan-
tes, delicias
suas aduersa
facie specta-
tori offerre
videas: modò
totos purpu-
reos, modò
luteos, coru-
leo, purpureo
variegatos: a-
litræque citâ
versicolores,

in pediculis longis, concauis, ex foliorum alis
quæ modò Hederæ terrestris instar rotunda,
modò oblonga, in ambitu ferrata, in caulibus re-
ptantibus, ramosis, ex radice tenui & fibrosâ
exortis: semen in pericarpis turgidulis, ferè trian-
gulis, minutum, splendidum, copiosum. Minus
bona est nostra figura ex Fuchianis. An hæc sit
Iacea illa, quam ad intestinorum ramices magni
faciunt recentiorum quidam, dubitat Matthio-
lus. In post. comm. addit quosdam vocare Her-
bam trinitatis, ac duas statuit species, minorem
& maiorem.

Camer. apud Matthiolum germ. demptâ fi-
gurâ Matthioli, alias duas exhibet [vni tricolus,
Iacea, Viola trinitatis: alteri, Iacea siluestris] qua-
rum vna sufficere posset.

Tragus Herbar. Trinitatis duo tradit genera,
satiuam & siluestrem. Hanc vitium frugum &
hortorum vocat. Porro ambas has Violas, eas
esse credit, quas Columella Sarranas nominat.
Nec dubitat quin per Flammeam & Phlogem,
eas intellexerit Plinius, ita vt Phlogion dicatur
satiua, Phlox verò siluestris. Tandem non sine
errore Herbarios Iaceam appellare sibi pertua-
det, & Iasmen potius dicendam arbitrat, &
cum nonnullis Violam Albelæ.

Viola hæc tricolor Dodonæo quoque conue-
nit videtur cum Phlogio Theophrasti, quam
Gaza Violam flammeam interpretatur. Sed hæc
opinione improbat Gesnerus.

Lobel in Adv. scribit errare Senensem, vt qui
Iacæa nigra facultates, Violæ flammeæ attribuat,
& hanc à scabiosis discernere nesciat: sed dece-
pisse illum nomenclaturam Iacæa vtrique com-
munem. Quare hanc tricolorem Iaceam mavult
dictam *dyo* & *is*, à Viola, vt etiamnum vocatur
quam

quàm quodd plurimùm humi iaceat, vt quidam autumant.

Violæ nigre persimilis flos (inquit Gesn.) quæ aliqui Trinitatis cognominant. A colorum numero septenario, vulgari nomenclaturâ Heptachrum nostri appellant: inodorus, solum colorum elegantia & varietate placet. Aliquinon rectè Antorum vocant.

Iacæa tricolori adscribit Dorsthenius caulem instar Lauendule, acutis & parvis foliis. Sed non video, quomodo conuenire possint; quæ scribit de caule & foliis. Videndum etiam an Ruellius alicubi Ocimoides nominauerit, & Tragus Polygalon Dioscoridis, quod vult Dorsthenius. Ruellius Violæ inodora genus esse dixit, quam vulgus gallicum Panseam vocat.

C. Bauh. phyt. Viola 8. siue tricolor hortensis, repens, *ολεξ* *α* *φ* *ο* *β* *η* *η* *ν*, i.e. Viola flamma & flamma (vtrouque enim modo Gaza vertit) Theophrasti. Eid. pin. Viola maritima foliis oblongis. an *ολεξ* Theophrasti: Herba Trinitatis Brunf. tom. 2. rhaps. 17. & in 4. p. 65. Fuchf. Lon. satia Trago: Iacæa maior, siue Viola tricolor Cast. Viola flamma Dod. gall. Celsalp. Viola tricolor Dod. Clus. Ger. Viola flamma colorata Lob. Obs. p. 335. Ic. Plant. p. 611. calida in Adu. Viola flamma seu tricolor maior H. Lugd. Viola Trinitatis 1. Tabern.

Flos colore & magnitudine variat: & flore purpureo & cæruleo: albo & luteo: cum pallido cæruleo, purpureo & luteo etiam permiscetur, quandoque lituris quibusdam notatur: rarò flore penitus albo reperitur, quæ est Viola Trinitatis 2. Tabern. Datur quæ duplò maiore flore est, coloris vnus, nigre purpureæ, & instar holoserici nitente, vel pallido, hinc Flos Trinitatis maior. Eyf.


Germanis *dreypastia* est (nomen frassum/ *freisantra*), & Rheni tractum incolentibus, *vin* *u* *g* *h* *o* *r* *a*: Belgis *dreypaldis* vocat bloemen: Gall. *de la Penée*: It. Iacæa: Angl. *hartys nase*: Zone idè Dames.

In Aruis pluribus locis exit: nascitur & in hortis, & crebrò quidem sua sponte, siluestri speciosior & elegantior. Vere vnà cum Viola nigra aut paulò post emicat, æstate dein tora, & maximà Autumnii parte ac subinde etiam Hieme, floret, vt Genevæ mense Octobri. Decembri, Ianuario, & Februario. Montbelgardi in agris obseruauit luteam inter Arbouans & Audincourt; in agris versus *La Chau* flore albicante & subluteo, à satia non diuersam, nisi minorem: eiusmodi etiam vidi in agris inter Malmûster & S. Germain, Septembri & Octobri.

Aqua distillata puerorum inflammationibus & torminibus ventris auxilio esse quandoque pota traditur: hodie apud mulieres in vsu est: eadem (vti testantur plerique apud Tragum) pus in pulmone & thorace collectum purgat, si continuò bibatur, eaque vinum miscetur. Herba anginae suum medetur: flores præcipuè virginum scutulis nati sunt. Quam verò acrimoniae ratione incidendi vim quampiam habeat, ideo (inquit Fuchf.) rectè recentiores asthmatis, pulmonisque inflammationibus prodesse tradunt: hæc ratione puerorum etiam comicialibus morbis auxilio esse solet: cæterum, non parum ad pruritum & scabiem confert, omniâque cutis vitia emendat, idque mediocris acrimoniae & siccitatis ratione: vlcera etiam, quia viscositatem

obtinere, glutinare potest. Ad calorem & siccitatem inclinare authorem habemus Matthiolum, qui multâ experientiâ compertum ait, aquam stillatitiam ex ea sudores potenter mouere. Matthiolum declarat Camerarius: Stillatitius liquor, inquit, ex herba, caulibus, & floribus exhibetur bibenda laborantibus lue venerea per nouem dies aut plures, & mouetur eis sudor. Qualitatem herba habet Dodonæo, frigidam quidem obscuram, sed humidam manifestiorem, lenti, glutinosique succi, vti Maluæ, particeps: emollientis ea de causâ quoque facultatis, verum minùs quàm illa.

IACEA TRICOLOR SVRRECTIS caulibus quibusdam arborea dicta.



Viola arborea quibusdam dicta, surrectis est caulibus, cubitum altis ac etiam altioribus, angulosis: folia priora vulgaris Violæ tricoloris similia, subrotunda, cætera longa ad uncias quinque, alia longiora, vel breuiora, angusta, quæ cultu variant, & latiora reddita Violæ Martiæ folia æmu-

Descriptio.

lantur, ad quorum genicula foliola alia emicant, modò parua, modò maiora, quædam etiam lacinia, & per ambitum serrata, colore Iacææ vulgaris: flores quoque dictæ Iacææ, quinque foliolis constantes in ambitu dilutè violaceis, longis insident pediculis, è foliorum sinu ortis, quorum folia duo lateralia interna parte albis villis obstructa, & cum imo pulchellis striis decorata. Quibus succedunt filiquæ longè in ternas carinas dehiscences, semen continentes album, paruum: radix tota fibrosa est ac perennis.

Tota planta sapore viscido est, & multa communia habet cum Viola siue Iacæa tricolori. Sed cur arboream dixerint nonnulli non video.

Arboremcentem Violam è Baldo monte allatam, odore perquam iucundo, sibi dono datam ait Matthiolum à Calzolario, floribus Consolidæ regalis persimilibus: plantam duorum cubitorum altitudine, pluribus ab vna radice sublatis caulibus. In post. comm. cum mag. fig. (vbi eadem verba allegat) huius figuram dedit Iacææ siue Floris trinitatis inscriptione: In hist. germ. Iacæa Violæ trinitatis titulo. Sed figuram hæc abstulit Camerarius in Hist. germ. Ea sanè non malè conuenit arboreæ multis dictæ quam nos hoc capite exhibentus.

Camer. apud Math. germ. [vbi Violam fruticosam inscribit] & in eiusdem Epit. [vbi Violam arboremcentem vocat] Violam erectam potius, quàm arboremcentem nuncupandam scribit, abundantem in monte Baldo, flore ex purpureo albescente, sine odore, in hortis ex semine deci-

duo multum se propagantem. Et licet alicui figum Camerarij Matthiolo appositum consideranti, ea diuersa videri possit, à Viola Martia surrectis caulibus, aliam tamen non existimo, sed naturæ lusum, cum semina profert.

An Lobel. in Obs. p. 334. Icon. verò Plant. p. 610. Viola Martia surrectis cauliculis?

Figura Matris Violarum Dalechampij, H. Lugd. p. 798. videtur Iacæ surrectis caulibus, quæ Matthiolo arborea dicitur, licet minus feliciter expressa, descriptio tamen non mihi videtur in omnibus competere: vereor ne confundantur duæ plantæ. Melior figura est, quæ pingitur p. 800. sub Viola flammeæ sue tricoloris maioris Matthioli inscriptione.

Violam arborecentem Matthioli, & Violam Martiam surrectis cauliculis Lobelij, C. Bauh. in phyt. sub vna, nempe Viola 7. siue tricolore erecta, quam Iouis florem Theophrasti arbitratur comprehensus est. At in pin. mutatâ sententiâ, à se inuicem distinxit. Viola Martia foliis oblongis 2. siue arborecens purpurea, est, inquit, Viola arborecens Matth. Cast. Tab. vel potius erecta Camerarij: Viola fruticosa Gefn. hort. Mater Violarum Dalech. Lugd. Viola elatior Clusij: Viola erecta flore cæruleo & albo Eyst. Flore est ex cæruleo purpurascens vel ex cyaneo absente. Viola Martia foliis oblongis 3. siue Viola tricolor erecta, an Iouis flos Theophrasti 6. hist. 6. Viola asurgens tricolor Dod. Ger. Viola purpurea varietas Lob. in Aduers. Viola Martia surrectis cauliculis in Obs. & Icon.

Spontanea occurrat inter vepres in limitibus Montbelgardenfibus, itinere versus Matthai arcem, florens Maio: eodem hoc mense florentem vidi Eslingæ in horto Volmarij, & Argentina Frid. Meieri, ac etiam Lutetia in horto Robini Augusto, & Stutgardia cum seminibus & foliis valde latis, quasi Violariæ Nouembri.

Locus &
Tempus.

Iacea tricoloris siue Floris orientalis genus flore luteo & purpureo magno, repens, non annuum.

Synon.

Clus. Pann. p. 358. Viola 3. siue tricolor odoratissima p. 359. Viola montana 3. siue tricolor 1. Eid. hist. Item pann. Violæ 3. siue tricoloris odoratissimæ alii genus, ei per omnia simile, floris colore excepto: Eid. hist. Viola montana tricolor 2. primæ per omnia similis floris colore excepto, omnino flauo, purpurascens radiis ex umbilico emicantibus: fertur & alia varietas coloris reperiri (flore sc. toto purpureo) quam seminio accidere putat Clusius.

Camer. apud Matth. Germ. Iacea flore maiori luteo valde odorato: alia huius generis flore purpureo.

C. Bauh. pin. Viola Martia foliis oblongis 4. siue Viola montana tricolor odoratissima (u. phyt.) Viola flammea maior violaceo colore mixta, Eist. Eid. Viola Martia foliis oblongis 7. siue Viola montana lutea grandi flore (12 phyt.) & Camer. Violæ nigre per similes montana lutea Gefn. hort. Viola flammea lutea H. Lugd. Viola Martia arborecens lutea Tabern. Viola flammea maior pallido colore mixta Eyst. Flore est luteo, sed magna ex parte lineis purpureis intermixtis, aliquando sine lituris: rarius flore albo reperitur.

In montibus Rheticis mediis in niuib. flore purpureo magno: floribus minus speciosis in cacuminemontis Roßberg. prope Masinunster.

Locus &
Tempus.

Luteo flore in diuersis hortis florens Aprili & Maio, at nisi transplantetur, facile perire solet. Spontè in Helueticis montibus nasci, penèque totâ Aestate florere fertur.

Iacea bicolor, Frugum & hortorum vitium Trago.

Herbam Trinitatis secundam, siue siluestrem De (vt vocat) quæ spontè in hortis & frumentis nascitur, Vitium frugum & hortorum meritò censuit Tragus, latius per omnia similem nisi quod flosculos magis exiguos procreat, candidos & luteos, interdum etiam cæruleos & luteos.

Iacea, siue Herba Trinitatis altera, cum Iacea tricolore vulgari iisdem pariter locis nascitur, & feritur in hortis, minoribus tamen ac breuioribus tum foliis, tum floribus, qui tamen non tribus, sed duobus tantum constant coloribus, candido videlicet, & lutescente, inquit Camerarius in Epit. Matth. vbi figura. Italis dicitur Iacea seu *Minuti persij minor*. Germ. wild frey, samer aut etiam interlin.

C. Bauh. pin. Viola Martia foliis oblongis 6. siue Viola bicolor arvensis (9. in phyt.) Iacea minor Cast. Violæ nigre similis arvensis minor, Gefn. hort. Viola siluestris Lob. Icon p. 61. Viola flammea minor Hist. Lugd. Viola Trinitatis minor petraea Tabern. Viola tricolor petraea Gerardi. *Hactenus* trium colorum non obseruui, sed candido & luteo, cæruleo & luteo, cæruleo & candido: aliquando tamen totus luteus vel totus albus occurrit: Alia est valde parua Augusto florens.

A S A R V M.

CAP. V.



Non immerito Nardis Asarum accensuit antiquitas, tanta est in radice tenui, reptatrice, fibratæque odoris affinitas: folia verò Cyclamini, circinatæ rotunditatis, lato virore supernâ parte splendent, rigida, infernâ autem magis alba, tenerâ lanugine pubescens, vtrinque, tamen infra quam supra: inter folia proximè terram, in breuib. pediculis hirsuti sexanguli cytini purpurascens hiosciamini, in tres lacinias diuisi, oriuntur, internè atro-purpureas, externè ex virore rubescens, medium occupantibus flaminibus purpureis: semen sex distinctis loculis comprehensum continetur, acinis vuarum simile quoad formam, extenam, tuniculâ fuscâ, quæ interiùs medullam albam continet, acriusculum est gustu.

Asarum

Asarum [ἀσάριον] quod alij Nardum filicestrem [ἀσάριον ὁ ἄσπριν] vocant, Dioscoridi hæc est odorata & coronaria [vt Pat. addit, πῶς ἰσώδης στεφανώσασκεν. Cat. pro πῶς habet βοτάνη.] folia habens Hederæ κισθίου. Quidam addit [ἡ ἀριστορχία] similia, sed densiora [πικρότερα. Pat. μικρότερα.] & multo rotundiora: florem inter folia iuxta radicem cæruleum [κυανέον. Pat. ἰσώδης, πορφυρὰ ἰσώδης. Cat. πορφυρὰ, λευκὰ ἰσώδης.] Hyoscyami cytinum referentem, in quo semen acini nucleo simile [Adidit hic alter codex, ἰσώδης καὶ λευκὰ ἰσώδης ὁ ἀσπριν.] at neque Oribasius, neque Serapio ita legerunt. Radices subiacent numerosæ, geniculatæ, tenues, obliques, Gramini similes, longè tamen graciliores & odoratæ, linguam exalfacientes, valdeque mordentes.

Vocatur inter notha, à Magis Sanguis Martis (αἷμα Ἀφροδῆς :) ab Osthane Thelam [Θέλας :] Agyptiis Cercera [κερκίρα :] Romanis Perpenfa, ab aliis Baccaris [βάκχαρ] Hætusculis Succinum [σὺκκινυμ :] aliis Nardus rustica (ἀσάριον ῥύστινυμ :) Gallis Baccar.

In Dioscoridis textu verba hæc πῶς ἰσώδης στεφανώσασκεν quidam relinquant, alij tollunt. Tagautius ea Bacchari potius, cui hanc naturâ, viribus & effectû proximam esse ait, conuenire putat. Baccharem, inquit, Plutarchus coronis esse dictam concedit, cuius sententiæ accedit & Virgilius, inquit:

Et Bacchare frontem.

Cingite, ne nocet vasi mala lingua futuro.

Itaque quod herba coronaria dicatur Asarum Dioscoridi, id errore cuiusdam scioli, docti putant accidisse, qui Baccharem Asaro commiscuit. His Tagautij rationibus, adde, Serapionem omnis esse coronariam esse, & Plinium dicere coronis addi.

Exemplaria autem Dioscoridea deprauata esse testatur Fuchsius, ita differens: Habent exemplaria πικρότερα vel μικρότερα, cum potius scribendum sit μελαγχρότερα; id quod partim Plinij testimonio, partim etiam iudice sensu ipso comprobari potest. Plinius habet molliora. Sensu iudice, Asari ceræ folia, neque densiora, neque minora Hederæ foliis sunt: sed maiora multo, & longè Hederæ molliora. Ego considerandum propono an non legi possit μικρότερα?

Plinius lib. 12. cap. 13. scribit Asarum, quod & ipsum aliqui Nardum syluestre appellant, Nardi vim habere, foliis Hederæ, rotundioribus, mollioribusque, flore purpureo, radice gallici Nardi: semine acinoso, saporis calidi ac virosi: Montibus in vmbrosis bis anno florere: Optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyria reperiri: fodi cum folia mittere incipit: & in Sole sicari, celeriter situm trahens ac senescens: Inuentam & in Thracia herbam esse, cuius folia nihil ab Indico Nardo differunt. Lib. 21. cap. 6. eorum errorem corrigendum effemonet, qui Bacchar Nardum rusticum appellauere. Esse enim aliam herbam sic cognominatam, quam Græci Asaron vocent, quoniam in coronis addatur.

Constant. in annor. in Amatam licet Baccar siue Baccarin Plinij lib. 21. c. 6. & 19. Item lib. 11. cap. 12. Asarum esse dicat, ac eo nomine à nonnullis Nardum falsò vocari, Baccarinum Dioscoridis aliam à Pliniana esse herbam, nomenque affinitate falli, quorquor rei herbarie recentes scriptores vnam faciunt: Ego tamen contrarium assero, dicoque cum Amato Plin.

Tom. III.

nium iis in locis de planta ab Asaro diuersa loqui.

Brassauolus [verba sunt Matthioli] immeritò in Plinium spiculum contorsit, vbi dicit, ipsum eo etiam in errore versari, vt Asarum Baccharim esse existimari. Plinius enim lib. 21. eos arguit, qui Baccharem & syluestrem Nardum idem esse contendunt. Id autem quod dicit libro 12. Baccharim vocari Nardum rusticum, non propterea ait idem esse, sed malè ita dici, etiam ita vocetur.

Si quis porro à me inquirat, quid de Bacchare sentiam, & an idem sit cum Asaro, vel diuersum, ei respondeo me non inuenire Dioscoridem sub nomine Baccharis vllam herbam agnouisse, sed caput illud in Dioscoride adulterinum esse, & ab aliis additum. Multæ autem sunt rationes, quæ ad id credendum me induxerunt. Et in primis videtur hæc vox Baccharis latina potius quàm græca. Nec inuenitur vllus author ex iis, qui Dioscoridem præcellerunt, vel eodem tempore vixerunt, aut post sequuti sunt, qui vllius plantæ sub hoc nomine meminissent, quemadmodum in Galeno & Aëtio videri potest, qui ne vnicò solùm verbo Baccharem nominauerunt. Nec refert appellasse Athenæum vocem Baccarin, siue Pancarin: non est enim planta, vt errantes quidam existimant, sed vnguentum. Si quis autem insisterit, in Aëgina & Oribasio inueniri caput de Bacchari separatum à capite de Asaro: incipias non ibo hæc duo capita apud Paulum reperiri. Verùm affirmabo satis longo tempore post Galenum venisse apud Græcos in lucem hoc nomen Baccharis. Cum igitur inueniam Paulum, qui de simplicibus Galeni scribit, agere de Bacchari, de qua nulla sit mentio in Galeno, necessariò sequitur vnum ex his duobus, vel deesse in Galeno, vel additum à Paulo, neutrum tamen credendum est, sed certò concludendum hoc additum in Paulo à librorum corruptore aliquo. Idem in Oribasio accidisse dico. His addo apparere totum caput de Bacchare in Dioscoride, excerptum esse à principio ad calcem ex capite Asari, senè de verbo ad verbum, vt animaduertit is, qui vtrumque conferet caput. Ideò nonnulli videntes fortè hæc duo capita similia esse, qui certò sibi persuadentes Dioscoridem scripsisse de Bacchari, cum Paulus & Oribasius de hac tractarent, nescientes qua ratione rem componerent, sibi imaginati sunt bonam partem capitis de Asaro (nempe eam quæ inserta capiti de Bacchari) spuriam esse, quam ideò vt abiectam ab aliis, abstulerunt à reliqua parte. Atqui error nimis magnus est, demere legitimo capiti, quod à Dioscoride totum ac integrum & non truncatum fuerit traditum, & defendere adulterinum. Dioscorides autem scribens de Asaro, desumit partem vnam ex capite Crateæ, qui minùs exactè, vt oportebat, de Asaro tractauit, & in suum inseruit, reliquum vt non necessarium omisit, subnectitque huius herbæ, tam suas, quàm Crateæ facultates, addens in fine capitis, Crateæ herbarium ita scribere ad verbum. Rem autem ita se habere testantur fragmenta variorum autorum Græcorum manu scriptorum, quæ apud me habeo in quibus omnia legantur, quæ Crateus de Asaro scripsit. Et hinc colligere licet totum caput de Asaro in Dioscoride legitimum esse. Et hæc æqui lectores consulant, & de nostra controuersia iudicent: collatis quidem iis, quæ

Αὐτοῦ
ορίσθη.

Q99

hac de difficultate, Matthiolus, Cordus, Dodonæus, Lobel. & Cæsalpinus præ cæteris memorie prodiderunt.

Ex quorum scriptis constat Matthiolum, Cordum, Dodonæum, Lobellum & Cæsalpinum præ cæteris Asarum & Baccharum ab invicem distinguere, nullum inter Baccharum Dioscoridis supposititiam, & Plinij genuinam, discrimen agnoscere.

Anguillara epist. ostendere conatur Dioscoridis caput de Bacchari esse spurium, ut & in Paulo & Oribasio: Item ex Dioscoridis capite de Asaro nihil demendum: Baccharis caput desumptum esse ex capite Asari: Baccharum verò Plinii differe à Dioscoridis existimat.

synon. C. Bauh. phyt. & pin. Asarum t. Asarum B unelsf. tom. 1. rhaps. 8. & in 4. pag. 6. Trago, Matth. Fench. Dod. Lac. Cordus in Diosc. & hist. Turc. Gesn. hort. Cæsalp. Cast. H Lugd. p. 913. Thal. Tabern. Lobel. Obs. p. 328. Ger. & Eysl. Asarum Baccharis sine Baccharis Lob. in Adu. & Ic. Plant. p. 601.

Varietas. Quidam Asari speciem diversam, vulgari nullo maiorem & odoratorem in Heluencijs Alpibus circa Eremum D. Virginis cum Cnidos reperiri aiunt, testibus Camerario & Gesnero qui quædam viderunt habere.

Nomina linguar. *Asaron* & *Asarum* Græcis, Asarum & Nardum in Hebræo, Nardus agelli Latine, Asaron Arab. Germanis *Asarum*, Belg. *Aselwortel* & *Wassersor*. Gall. *Cabaret*, Orville d'homme, & alio. O. *Asarum* Monsbelge di quibusdam Girard vocatur: & Belgicis nomen est *Romelle*. It. *Asaro*: Hisp. *Asara bacchara*: Angl. *foolfoote* (quod folium habeat rotundum, pulli equini pedi simile) *Asarum* tanc. Boh. *Asarum*: Hung. *Napatnoct*.

Locus. Asarum in omni spacia ac vniuersi Europæ, Scythiæque sub Coryliis, ut Cordus refert, inuenitur. Plurimum autem, auctore Dioscoride in Ponto nascitur, & Phrygia, & Illyrico, & Iustina Italiæ. Hæcense est Anglis. Germanis subinde spontaneum. Aspera maciæ & sicca loca amare, in siluis etiam nasci & sepibus, apud Fuchium prodium est. Perpetuè vitæ herba, noua tamen vna cum floribus folia Vere promittit: interdum tamen & Autumnio ex. Colligendum in fine Augusti, à die decimo quinto eius mensis, vbi eadem cum semine. In mentibus eam habent inuentus in hacis Alibiogum, in Andarum, Gilly prouincijs, & Pyrenæorum Lob.

Vires & vltus. Dioscoridis vim tribuit Asaro calefactoriam, & vrinam cientem, conuenientem hydropicis, & coxend cum morbo durmo. Scribit præterea menses cum aqua mullâ potas radices pondere drach. sex ducere, & velut Veratrum album purgare: misceri etiam vnguētis. Hoc cognitu dignum est, quod Galenus radicibus Asari similem vim attribuit, ei quam Acori radices habent, & magis etiam intensam, & proinde ea quæ de Acoro dixit, etiam ad Asarum referenda esse. Plinius Nardivim habere Asarum scribit. Mesues laudat radicem amplam, spissam, odore tenui, sapore acri & parum styptico. Asari radix, inquit, calida sicca ordine tertio, vel potius cum Dioscoride calida secundo sicca tertio [vbi hoc dixerit Dioscorides, nondum inuenio, tenuat, resoluat, obstructa aperit hepatis & lienis, & horum dritum soluit, & affectus alios inde natos, febres partidas & diuturnas, icterum, hydropem, præteritum vinum insatum. Purgat vomitum &

vrinis bilem, sed picuitam manifestius: etiam ex illibus, ischio, & calis articulis: ob id harum partium dolores mitigat, præsertim insutum, vel aliter exhibitum. Oleum Asari cum Ladano splenem illiūm fadoces mouet, & rigorem febrilem inhibet, vrinam mouet, semen augeat. Valentiū agit cum sero lactis, Spica & hydromelite. Mustum his radicibus conditum, post tertium mensem hydropes & splenem sanat. Mediocriter coqui & teri potest: & quod tenuius est tritum, ed magis vrinam mouet, minus autem alium ducit. Datur insuso ab aureis duobus ad drachmas quatuor: puluere autem à Drachma vna ad aureos duos.

De Asari virtutibus Æmilij Macri elegantissima Poësis extract:

*Est Asarum græcè, Vulgægo dicta Latine:
Hæc calida & sicca virtus dicitur esse,
Tertius est illi gradus, ut dicunt, in viroque:
Pronocat vrinam, potatque menses purgat,
Hocque modo icteri medicatur sumpta dolori.
Hydropicisque iuuat, schisis fugat hausta frequenter,
Et vultus morbus decoctio subuenit eius.
Dicitur ictericum potata repellere morbum,
Helleborique modo vomitu præcordia purgat,
Sed non est huius purgatio tam violenta.
Hæc metuenda quidem, si fiat taliter illa,
Etatem & vires eius circumspice primum,
Quem purgare voles, & tempus quale sit anni
Et si sit regio seruens, vel frigida valde,
Aut si temperiem mediâ tenet inter vitæque, &c.*

Fuchius liliolum, in quo Asarum decoctum est, si eo caput lauetur, cerebrum roborare refert, & memoriam: Siccum autem eius cum Pompholige, caliginantibus oculis conferte. Sylnius de comp. med. scribit Asarum valere, foliis flore & semine, sed efficacissimum esse radice. Subdit Tragus, Asari foliis carpo ad mortis vti mulierculas Argentoratenses ad febris ardorem depellendum, cum tamen tota planta aromatica sit, & gustu mordax, quod insignis caliditatis indicium est. Cæterum, cum folia adstringendæ naturam habeant, calorem ipsam febrilem sic admodum ad intentionem retrudant, atque ita morbum adaugent.

Asarum à semina ad integram consuetudinem propinari posse sibi imaginatur. Sed hoc consilium impugnat Rob. Constantinus, his verbis: Perniciosis consilium: siquidem experientia constat valentem esse vim Asari, etiam Dioscoride teste, cuius Vicia sumpta Amari suavitudo immixta ducit, inducet. Consultius igitur multò infra subsistere, quam ita temerè periclitari. Certum quidem Dioscoridem Asari drachmas senas exhibere: sed hæc etiam codex impressus corruptus est: nam in vetustissimo manuscripto, pro 9. legitur 5. quinarium nota. Adde quod vires nostræ ætatis hominum, antiquorum viribus nequaquam respondeant, ut innoxie ferre possit complurium pharmacorum præscriptum pondus à maioribus, quod quia in confesso est, existimamus multoties potius, quam multum vna vice, in purgando securius esse. Hæc Constantinus.

Matthiolus, qui vnciam semis in infusione non excedit, nec pulueris ultra drachmam dat, à Galeni sententia maximè dissentit. Cum nulla, inquit, in Acoro deiectionis sit facultas, & Asarum, vti Dioscorides ait, & Mesues fatetur, & mihi ex erimento compertum est, Veratrum modo expurgat, non adeo facit cur Acoro in omni huius facultate

suis facultatibus tam facile à Galeno comparari possit. Galenus autem non dicit omnibus facultatibus respondere, quinimò intensioribus esse præditum Asarum. Verissimè quidem ait radices Asari facultatibus Acoro similes : vix enim vllæ à Dioscoride attribuantur Acoro, quæ in Asaro reperire non liceat. Interea tamen non ita potest comparari Acorus Asaro, vt Asarum Acoro. Nec etiam ob id sequitur facultates non esse similes Acoro, etiam si plures habeat Asarum.

In hist. germ. commendat Matthioli rusticis ceu optimum in febribus (maximè quartanis, Camer.) medicamentum, si manipulum foliorum sumant, in vino aut aqua decoquant, & melle dulce reddant, bibântque per aliquot dies mane : hoc enim euacuare per alvum pituitam & bilem, ac etiam interdum per superiora : sed cum assumere volunt, iubet illos aliquid Macis, vel Cinnamomi, aut similibus aromata addere. Mulieribus autem gravidis non sine detrimento tum proprio, tum alieno, scilicet, exhiberi testatur. Rondeletius in coxendico dolore vitur Asari seminis vel radicis decocto ad vomitum ciendum, felici, vt ait, successu. Ad verrucas in facie Asarum temperat in aqua Rosarum per biduum, & illinit. Si Asarum absolute dicitur, Camerarius radicem fumendam intelligit.

Quod denique Asarum si tenuissimè teratur, potu lotium : si negligentiùs, alium & vomitum ducere asseritur, id sanè contingere putat Lobelius, quia tenuissimarum partium decoctum celerrimè per ventriculi fundum & duodenum transuehitur, ac illic in hepatis venas & mesaraicas rapitur vix dum collutis ductibus, aut leuissimâ impressione inibi relictâ : at subest ratio argutor : hydropotæ non pauci, præsertim splenerici, etiam referto cibis ventriculo, mox quàm frigidam hauserunt, rugitum, grauitatemque in splene præsentiant, nullo ventriculi aut hepatis percepto fastidio. Nempe venæ, quæ superiores mediâque stomachi partes à hene trahunt, suis ramis hauriunt illicd maximam liquoris copiam, rapiântque in splenis maiores venas, vnde flatus, grauitas, murmurill. Et hæc Lobelius.

ASARVM MVRI.



Tom. III.

A Sarum murale Herbarij vocant, quod Asarum foliis imitetur, & quod nusquam alibi, quàm in muris gignatur. Ex parietum fissuris proflit, radice crassiusculâ, nodosâ, è rufo nigrescente. Polipodij ferè colore, in plurimos villos diuisâ : filis paucis, Asaro similibus, venosis longo pe-

diculo subnixis : nec semen, nec florem se vidisse tradit author H. Lugdunensis p. 1. 34. ex qua cum iconè præcedentia desumpta sunt.

Temeraria autem valde est descriptio, non ostendens qualis planta, an glabra vel pilosa, aut quali sapore : nec monstrans quò loci in muris obseruetur, aut qui Herbarij Asarum muri vocent.

H. Lugd.
1681.

HERBÆ A SVE SIVE PORCO nominatæ. CAP. VI.

Non peniculus à proposito nostro nos declinatos speramus, si antequam vltius progrediamur, & ad Cyclaminum, (qui ipse apud Germanos & Gallos præsertim, à porco denominationem suam accepit) describendum nos accingamus, plantas à sue vocatas, hic nomine tenus solum, ceu propiore loco fusiùs quamlibet seorsim tractaturi, commemoremus. Sunt autem hæc, teste Gesnero de Quadr. Fungorum tertium genus, suillum Plinio dictum, Germanis fortè Wierthelen : Hg lib. 40. Hypochæris. Hyofitis Intubo similis, sed minor Plinio, Tiguresibus Södisch, Rostrum porcinum, aliis Dens canis, Helueticis Funtum dictum, Panis porcinus. Scinos. Astrabos, i.e. Pes porcinus, Adianthum, aliquibus Capillus porcinus. Milium Solis, i.e. Cauda porcina Syluatico. Peucedanum. Scrophularia, quæ alio nomine Milleborbia : vel Faba inuerla. Hyofcyamum, Trago germanicè Saphonen / dictum, i. e. Snilla Faba. Chenopus, german. Schweißed / i. e. Porcorum mors, & Ectoplag. Solanum siluaticum cui bacca nigra, germ. Schwauff.

CYCLAMINVS FOLIO rotundiore vulgarior. CAP. VII.



Orbiculatâ nititur radice Cyclaminus fibras circû circa emitteat, è cuius parte superiore capita exoriantur, quæ plura fundunt folia, palmaribus plus minus pediculis hærentia, rotunda ferè, aut ex rotundo aliquantùm oblonga, inque acumen delincentia, crassiuscula, superius atroviuentia, aspersis subinde maculis lacteis, inferius purpurascencia, nonnihil per margines sinuata : flores inter folia ferè latent violacei coloris, quinque foliis constantes sursum reflexis, producto ex umbilico stylo.

Cyclaminus Dioscorides folia tribuit Hederae similia, purpurea [et] v. caret. In his supradictis maculis albicantibus distincta, caulem vero

quaternum digitorum, inanem ac nudum: in cuius summo flores emicant Rosarum effigie purpurascetes. Radicem nigram, Rapo proximam, & aliquantulum latam.

Plin. forte
errat.

Cyclaminum folia habere minora [maiora forte legendum] quam Hedera, nigrioraque & tenuiora, sine angulis: in quibus albicant maculae: caulem vero exiguum inanem: flores purpureos: radicem latam, ut rapum videri possit, cortice nigro: nasci in vmbrosis, & à Romanis Tuber terræ vocari prodidit lib. 2. cap. 9. Plinius.

Barbaros, Arabes, & Mauritanos duas Cyclamini species, sc. Arthanitam, & Buthormarien confundere, refert Cornarius. Verum Rhafin cas tanquam diuersas ad insulum per Clysterem immittere. Appellatur, inquit, Cyclaminus, Latinis græcam vocem vsurpantibus, item Tuber terræ, & Rapum, & Vmbilicus terræ, officinæ vocant Cyclamen, & Panem porcinum, & Panem terræ, & Arthanitam, omnibus appellationibus à similitudine ductis. Verum Barbari, Arabes, ac Mauritani Medici vtramque Cyclamini speciem confundunt, Cyclamen, & Arthanitam, & Panem porcinum, & Buthormarien, eandem, priorem videlicet speciem appellantes quum Buthormarien proprie secunda species appelleretur, sc. Tuber Mariæ, quam postea officinæ Sigillum Mariæ dixerunt. Atque hæc distinctio recte facta æquum non prodita est à Ruellio. Rhafis tamē lib. 9. c. 1. & Buthormarien, & Arthanitā, tanquam diuersa, ad insulum per clysterem immitit. Cornarij opinionem improbat Matthiolum vnum & idem faciens contra Ruellium.

Anguillaræ Cyclamini varietates species forte referendæ sunt ad Cyclaminum angulosum, de quo suo capite. Est autem quædam florens Autumno, quædam flore odorato, quædam inodoro, quædam flore purpureo [rosso], alia albo, alia luteo, qualis videtur in regione Bosniæ: verum omnes habent folia Hedera, & radicem rotundam, Rapo similem, inquit epist. 11. Idem rursus ait Petilium florem Plinij, nihil aliud esse, quam Cyclaminū speciem florentem Autumno, flore odorato.

Petilius flor.

Radicem in
capitis ar
tu.

Cyclamini nostri speciem habet Coudenbergius, radice instar capitis arietis: Volmarius autem orbiculatam, nec oblongam, qualem Rhæticam ait Gesnerus.

Cordo in Diosc. Cyclaminus, & Panis porcinus: Dod lat. Cyclaminus orbicularis rotundifolius, floribus anguloso Cyclamino similibus, odoratioribus, radice aliquantulo minore.

Cyclam
odorato
flore 2.

Clus. Pann. p. 132. refert Cyclamini odorati, siue Cyclamini, non nisi Autumni initio flores suos producentis, & statim folia, quæ postquam tota Hyemē perfecerint, sub Aprilis finem, aut Maio euancescere solita, in Pannonicis prouinciis duas obseruari differentias. Primam in Hist. post. Cyclamini odorato purpureo flore titulo pingit: Alteram speciem vocat Cyclaminum odorato flore secundum, primo planè similem, pauciora tamen semper folia proferentem, eaque non purpurascens ut illius subtus coloris, sed albicantis quodammodo, aut pallascens, cui viridis mitius, ut in Afari aueris foliis.

Synonyma.

C. Bauh. phyt. & pin. Cyclamen 1. siue orbiculato folio infernè purpurascens: Cyclaminus minor, & vmbilicus terræ Trago: Cyclaminus, Matth. Dod. gall. Cordo in Diosc. & hist. Gesn. hort. Jac. Turn. Lon. & Tabern. Cyclaminus maior Calt. Cyclaminus rotunda Fuch. Cyclamen vulgare Eyll. officinarum orbiculato folio, Panis

porcinus & Arthanita Lob. Icon. p. 604. Cyclaminus flore odorato Clus. Pann. & Hist. Cyclaminus vulgaris & Cyclaminus prior cum icone Matth. & Lobelij H. Lugd. Cyclaminus æstiuus vulgaris Camer. Cyclamen orbiculato folio, Gerat. Cyclamen 2. siue orbiculato folio infernè ex viridi pallente Gesnero. Cyclamini odorati altera species Clus. Pann. Cyclamen odorato flore 2. Hist. Camer. in Hist. germ. vocat Cyclamen radice oblonga: Κυλάμιος μαρμαρίνος Eidem in Epitom. Matthioli.

C. Bauh. pin. Cyclamen 10. [5. phyt.] siue oblonga radice: Cyclaminus radice oblonga malo in sine adnexo Gesn. hort. Cyclaminus oblongus Eid. app. Cyclaminus longius radicans. Item pin. Cyclamen 3. [7. phyt. siue Cyclamini species radice instar capitis arietis Gesn.] radice maxima foliis infernè rubentibus, Cyclamen Romanum Eyll. An Cyclamen à Murogo, Clus. hist.

Nos Cyclamini longius radicati picturam hic damus, quamvis diuersam non statuamus, ab ea quæ orbiculato est folio siue Afari. In hoc enim Cyclamino nitam differentiam obseruamus, nisi quoddam caput longius excreseat, & in duo-



alia iterū partitur, quæ habere solet Cyclaminus Afari folio, modò breuia, modò longa, quæ minus benè in lingua nostra Fuchiana exprimuntur.

Nolim igitur cum Camerario apud Matthiolum particulari genus constituere, & ponere post Cyclaminum Hedera folio, sed potius post Cyclaminum folio

orbiculato, cum quo idem. Eiquamuis Camer. dicat esse Hedera folio, tamen effigies monstrat, Gesnerianum illud Cyclaminum fuisse folio non anguloso: variant etiam Hedera folia. Nolim quoque particularem facere speciem ex Cyclamino capitis arietis instar, quod intelligo de figura quodummodò arietis caput imitante, non de magnitudine. Nec difficile fuerit in ea radice tale quid sibi imaginari, quandoquidem non semper orbiculata existit, ac non raro supra tubum veluti cornua producit, quæ Herbarij radicis capita vocare consueverunt.


Κυλάμιος: Græci appellant: dicitur & Cissanthemon (κισσανθήμεον) aliis Cissanthellon (κισσανθελλον), ab hederaceis flore & folio: aliis Chelonion (χελωνιον): aliis Ichthyothera (ιχθυοθερα), quod sic venandis & inescandis piscibus aptū: Zoroastri Chelona (χελων): seu Triumphantia (τριუმφαντία): Oithani Aphro (οιθανι αφρο) Magis Mialpho (μαγισ μιαλφο): (Ægyptiis Theke (θεκε): ut inter notissimas voces reperitur: item Tuber terræ, & Rapum terræ, aut Vmbilicus terræ, à Marcello Orbicularis, ab Apuleio similiter Orbicularis, & Palatia: Rapum porcinum

porcinum. Terræ malum : in offic. Cyclamen,
Pani's porcinus, Anthanica : German. Schweine-
broet / Sombroet / Crotzschaden / water-
den / C'renriben / Erdmum : Belg's Dierckens
broet / sucaffen broet : Gallis Pain de porcæu : tralls
Pan porcinosi Hsp. Pan de puero & nonnullis Mazan
de porco : Angl. Sombroet : Boh. : worch
Schweinisch : Digno repa, quod porcinum
Rapum significat.

Generis copiosè provenit in Môte Salentis & in
Rheticis montibus Junio & Julio florens. Nulli
sunt in Pann. & Austria siluosi montes nulli sal-
tus aut in montium acclivitatibus vda prara, quæ
Cyclamino odorato Clusij non abundant, ubi
varietas magnitudinis radices circumstant, tantè inter-
dum, ut manum implere queant. Nasci in editis
montanis & stirpibus non fardis locis testatur
Cordus : solum item amare lutosum quemadmodum
Alatum. In Arduena silva ac vicinis locis
apud Belgas reperiri scribit Dodonæus.

CYCLAMINUS PARVA RADICE.

Nos hic pro-
ponimus i-
conè Cyclami-
ni cū parvâ ra-
dice, qualem in-
ter Fœchianas
sculptam emi-
simus, quam ne-
scimus an eadē
vel diversâ à no-
stra priore non
angulosa. Quæ
autem de Cyclamino parvâ ra-
dice dicuntur,
huic figure sub-
jicimus, donec
aprior placita, vel
à nobis, vel à te
pro Cyclamino
parvâ radice de-
mōstretur. Hūc



Mesues videtur intellexisse per Cyclaminum mi-
norem parvâ radice, magnitudine Nucis Avellanæ.
Clerumque. Matthiolum hunc se vidisse re-
fert solum in Tridentino agro, in vallis Ananiz
montibus copiosè nascentem. Anguillara eam
esse : exilitimar Cyclaminum Mesues, quæ in monte
S. Juliani Luce reperitur, radice omnium mini-
mâ, Matthio florens.

Reprehendit meritò Lobelius Senensem Do-
ctorem Matthiolum, ex Mesue maiorem Cyclami-
num referentem, dicentemque vno solum tra-
ctu se minorem vidisse : eam tamen neque verbo,
aut iconè docuisse : Docuisse tamen illum indi-
casse, quamnam ista esset radix, & an à Cyclamino
solum mucronato differret.

Κυλάμινος ἔτρα, siue exigua Cyclaminus, su-
periori per omnia responder, nisi quod non pre-
rinde acris est, & seruida ut illa. Nascitur & hæc
in vmbrosis silvis. Eam ego (inquit Trag. lib. 2.
cap. 134.) in Rhætia superiori non procul à Cu-
ria oppido primum vidi. Dicebatur mihi tum
Hermocladylum eam esse, sed falsò, nam Cy-
claminus exigue veræ species est.

C. Bauhin. pin. Cyclamen. 9. (phyt.) siue ra-
dice exigua : Cyclaminus exigua vete species H.
Lugd. Cyclaminus æthiuv Clus. hist. Cyclam.
Tom. III.

minore Castori.

Cyclaminus flore albo.

Anguill. Cyclaminus flore albo. Gesn. hort. Cy-
claminum folis subrotundis albo flore circa
Neocomum Sabaudia reperitum. Clusio scribe-
bat Iosephus Calabona è Candia. Cæcæ in ulte-
ribe se Novembri Cyclaminum albo flore ob-
servasse. Gallus quidam Rhyzotomus Galliam,
Italiam, Germaniam peragrat & solitus adfere-
bat in Bataviâ Cyclaminum radices, quas albos
flores dare referebat.

Cyclaminus vernus flore luteo.

Anguill. Cyclaminus flore luteo, folio Hederæ Locusi
in regione Boine : Luban Ad. Cyclaminus la-
teo flore : folio mucronato, verno tempore, in
Narbonæ montibus : Eid. hist. Belg. Cyclamen
flore luteo, in Lombardia circa Bouoniam. Cy-
claminum quem Lobelius apud Insubres flore
luteo observasse scribit, Clusio videte non con-
tingit.

C. Bauh. phyt. Cyclamen 8. siue luteo flore : Eid.
pin. Cyclamen 11. siue vernum luteum, Cyclam-
en luteo flore H. Lugd.

Cyclaminus folio anguloso.



Orbis huius
ut priori radice
folia sesquipal-
maribus nixa
pediculis, cras-
sa, superius
purpurea, albi-
dis maculis no-
rata, inferius
dilute virentia,
utiquetia, He-
deraceis simi-
lia, longiora
quàm latiora,
circumscissa : flo-
res alterius flori-
bus respondent,
inversi, colore
albo (in sicca
planta.)

Gesn. hort.
Cyclaminus

foliis angulosis cucumeraceis ferè, Cyclaminus
folio quadrato. Antè diximus huc fortè refe-
rendam Anguillara Cyclaminum flore odorato
& inodoro, folio Hederæ.

Clusij sequentes Cyclamini species ad hoc Cyclam. ordi-
caput referimus de quibus in Hist. hæc scribit : rari duplici
Cæterum, duas Cyclamini species se habere ad
me scribebat Jo. ab Hoghelande, ab ipsius fratre
Clusio.

Theobaldo in montibus quibusdam eruras dum
ex Italia rediret. Illos verò non Autumni ini-
cio sed ipso Solstitio æthiuv florere incipere
perseverareque ad autumnale usque Equino-
ctium : eius item semine natas plantas idem or-
tus sui tempus observare : eam ob causam ætti-
uum Cyclaminum potius dicendum, quàm au-
tumnalem : Priorem habere folia albis maculis
obscurè notata, aversâ parte rubentia, aliquan-
tulùm angulosa, flores saturatius purpurascen-
tes : Alteram folia promere aversâ parte virentia.

Q 99 3

Cyclaminus
Byzantinus.

ria, aduersâ maculis albis litque valde conspicuis
asperâ, rotundiora superioribus, & flores dilu-
tiores, utroque autem suauissimi odoris, nares
etiam procul ferientis. Vtique hoc peculiare,
quoddam vetera folia retineat, donec noua nascan-
tur. Anni portò 1581. Autumno, pergit, missæ
sunt Constantinopoli, J. de Huf. nitant aliquot
Cyclamini radices orbiculares, quas Castaneæ
magnitudinem non superasse, & valde tersum
expolitumque corticem habuisse aiebat, &c. Bi-
nis verò subsequentibus annis mul. d. maiores &
plani omnino bulbi Cyclamini missi sunt Byzan-
tio *Bubur mereni* & *Dohum* appellatione: &c. Vi-
dit postea idem Cyclaminus hederaceo
folio plantas, in quarum foliis magna conspice-
batur varietas: e Belgio, Britannia Galizæ, aliis-
que eius regni prouinciis, diuersisque Italiz locis
allatas.

De Cyclamino folio anguloso hæc scribunt
Aduersaria. Ex montibus Alpibus Rhæticis in
Italiam proficiscentibus, locis vdis & faxeis tri-
nentibus, obuia passim alia Cyclaminus, quæ non
folio cycinato vt Afari aut vulgari Cyclaminis
est, sed potius triplici mucrone distincto, Herbar
Trinitatis aut Hederæ helices modo. Eadem
etiam Norbontæ rugis inu. lib. 3 & horti cre-
bra. Eius radices quæ vetustiores magni. ud. ne
alterius sunt: quæ nouellæ admodum exiguæ, vt Aus-
lanzæ magnitudinem vix superent: flores pur-
purei, communis Cyclaminis profum similes,
interdum odorati, aliis non.

Cycl. fol.
Hederæ

Lobel. in Obs. p. 331. Cyclamen folio Hederæ:
Et sic etiam in Ic. Plant. p. 605. & Hist. Belg. p. 718.
Hic rursus Cyclamen Belgicum folio hederaceo
rotundiore: Item Cyclamen Romanum flore
breuiore.

Dod. lat. Cyclaminus orbicularis: Cyclamini
prima species, foliis latis, angulosis, Hederæ simi-
libus: floribus purpureo Violæ nigre colore, non
tamen intenso, odoris exigui.

C. Bauh.

C. Bauh. phyt. Cyclamen 4. siue Hederæ folio:
Eidem pin. Cyclamen 5. siue odoratum æstiuo
Sollitio florens, folio maculato: Cyclamini o-
dorati duplex varietas Clus. hist. Cyclamen 6.
siue Hederæ folio: & Adu. Lob. clus. pann. Cy-
clamini alia species Dod. gali. Cyclaminus orbi-
cularis Eid. orbicularis alter H. Lugd. Cyclami-
nus modico purpurascens flore, Cyclamen
Belgicum hederaceo folio Clus. hist. Cyclami-
nus æstiuus folio hederaceo Camer. Cyclamen
serotinum foliis hederaceis Eyst. Cyclamen 7.
siue folio hederaceo polyanthes, Cyclaminus
Byzantinus alter, tubere palmatis latitudinis
poluandis: tulit flores 10. 50. 100. Clus. hist. Cy-
clamen 8. siue radice Castaneæ magnitudinis,
Cyclaminum Constantinopolitanum, vel By-
zantinum Clus. pann. & hist.

Locus.

Cyclaminum folio anguloso obseruari Ve-
fontij in hort. D. à Bellesfontaine. Similem attulit
genex Cherlerus in Apenninis jugis collectam.

Vires

Huius vires communi pares, & vsus frequens
Norbontensibus ad veneream luem, auctore
Lobelio.

CYCLAMINVS FLORE RVBRO,
graciliori, & flore albo, vernus.Cyclamen
vernū
Lob.

Lobel. Obs. p. 331. Cyclamen vernum flo-
re rubro, Pancij, foliis Martio erumpentib.
Aprilis & Maio florens: semine maturans ini-
tio Iunii: Hist. Belg. pag. 718. Cyclamen ver-



num Pancij A-
prili folia pro-
frens, rotun-
diora quam in
Hederaceo,
p. lehræ macu-
lata, Maio flo-
ribus longis
ex pureo
rubris adu-
to carneo co-
lore.

De hoc Clus.
pann. p. 234. &
H. st. post. Ha-
bui etiam ali-
quādo Cyclami-
ni verno
tempore flo-
rentis paucas
plantas, semine
ex Belgica

mibi misso nacas, quæ tertio à sæu anno flores
p. oleret cœperunt, odoratissimos sanè, & vulga-
ri saturiores, paulò prægraciliores: folia aliis
minora in ambitu ferè cuspia & foliorum Hede-
ræ formam imitantia, teneiora tamen, supernâ
parte candicantibus maculis aspersa, angulosum
etiam mucronibus albicantibus, pronâ omni-
nò purpurascens, &c.

An Angull. Cyclaminus folio Hederæ Vere
florens? An Dod. lat. Cyclamini tertia species fo-
liis haud angulosis, sed ambitu eorum aliquan-
tulum crenatis, macularis, sed umbilico nigrore:
flore intensiore colore purpurascens, odoris
suauissim: radice quàm aliarum minore: Rarior
est, sed tamen Italiz non peregrina.

C. Bauh. pin. Cyclamen 4. (3. phyt.) siue folio
anguloso: Cyclamen foliis angulosis Gefn. hort.
Cyclamen vernum Lob. Ic. Camer. & Eyst. *Gef-
nerum* per Cyclaminum angulosum, diuersum à
verno Lobelij intelligere scimus.

Cyclamini Verni bulbos se à Venerio anno
1604. accepisse tradit Clusius qui verno tempore
flores albos protulerint: accepisse & alios, qui ex-
bulbis primo anno folia quidem habuerunt, flo-
res verò nullos.

C. Bauh. pin. Cyclamen 8. siue vernum albam:
flore albo Lob. Adu. part. alterâ. Clus. Hist. ap. Syn-
altauct. & cu. post.

Cyclaminus vernus spurium flore luteo.

Biennio antè miserat idem Venerius aliam plan-
tam in Pyrenæis montibus erutam, quàm flauos
flores proferte scribebat, & Cyclaminum vernū
spurium nominabat, quia eius radix diuersam
habebat formam à legitimi Cyclamini radice:
tuberosa quidem erat, sed cordis, vt vulgò pin-
gitur, formam quodammodo referebat, siue illo-
rum loculorum, quos tenuis fortunæ mulieres
apud Belgas gestare solent ad aciculas in eorum
ambitu excipiendum. Hoghelandio singulis an-
nis aliquot folia protulit: at hoc anno 1605. etiam
flosculos.

C. Bauh. pin. Cyclamen 13. siue foliis Violariæ,
radice cordis effigie.

Cæterum, teste Dioscoride, Cyclamini radix
cum melle pota pituitam aquamque derrahit, vi-
menses potè appositivè ciet: Tradunt, si præ-
gnans radicem transgrediat: abortum fieri
partum

partem appensa accelerat: contra venena præsertim leporis marini, ex vino bibitur: illa contra serpentium ictus, remedio est: immista vino inbibat: regium morbum discutit, tribus drachmis potamum passio aut diluto melle: sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contextum, loco calido, & à perfusionibus tuto, recumbere, quò facilius exsudet: electi autem dolores scelle colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad delicienda quoque alvi excrementa, in vellere sedis subijcitur: illito umbilico & imo ventre coxarum tenus, alium emolliet & abortum efficit: suffusionibus, & resuscitaculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admiscetur. Cum aceto illitis, procidam sedem restituit: exprimitur tussis radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat. Vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absumit, vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto laxata, podagras & capitis vasa, pernionesque foueri congruum est: ipsaque in oleo veteri refusa, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Canata radix oleo expletur, & cineri feruenti imponitur, ad lecto interdum Tyrhenicæ cere momento, vt strigenti crassitudinem vnguentum contrahat, cum primis vile pernionibus. Radix Scillæ modo concisa reponitur.

Varas habere vires ait Galenus: nam & absterget & ora venarum aperit, & attrahit, & digerit, clarum id est ex particularibus operibus: nam succus eius hæmorrhoidas refert, violenterque ad fecesum prouocat in crocidæ siue floccis appositus: sic etiam facultatibus phymata, strumas, aliasque durities digerentibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit: adhuc quoque per nares expurgat: adeò vehemens eius facultas est, vt ab domine illito ventrem subducatur, & forum intermar: nam & alioqui validum interrimendo festui medicamen est, in passio additus: tota autem radix succo imbecillior est, quamquam & ipsa vehemens sit, nam & menses siue epota, siue apposita euocat, & aurigini prodest, non modò ipsum viscum expurgans, sed etiam que in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem euiciens: proinde sanè post eius portionem omnibus modis sudoris adiuuanda prouocatio est, modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum mellicrato, siue cum passio. Cutem detergit cum in aliis, tum quòd alopecias, ephelidas, omniaque exanthemata siue efflorescentias curet: lienem quoque induratum iuuat emplastri modo illita tum recens, tum arida: Sunt qui radicem siccam asthmaticis & anhelantibus exhibeant.

Ilia Mesueus quoque in suum librum transtulit, cuius testimonio calidus, & siccus est initio tertij ordinis: pituitam lentam & crassam sumptus, & vicinis partibus illitus, purgat: obstructions viscum, præcipue splenis aperit, maximeque ex oxymelite: & sumptus & emplastri modo ad morus colicorum dolorem à pituita aut stercore suppresso sanat, caput & oculos insigniter expurgat, scilicet arthino ex ipso in nares recepto, præsertim post purgationem per hieram, aut theodoricon, aut cataportia fortida, aut similia: quapropter visui imbecillo, & aquis in ipsum quentibus, hemierania, cephalalgia, tortura, paralyti, & cæteris cerebri affectibus frigidis contert, arthino, vt dixi,

attrahit: sterum sanat experientia certè præsertim succo cum oxymelite, vel cenomelicæ sumptio, & operto deinde diligenter corpore: nam sic sudore longo materia etiam in vaporem versa, bilioso excremento exonerabitur: dato lienis confert quouis vtendi modo, & tumoribus aliis, vt etiam strumas iuget. Eius radix collo mulieris appensa, conceptum prohibere dicitur. Sedis procidentiam illitu sanat. Corrigitur vt Dracunculus & Bryonia. Vnguentum præterea est Alexandri ex Cyclamino, quod ventri, femorilibus inunctum, alium deiectione purgat: stomacho autem vomitu vacuat aquas letolas idoneum hydropicis, & à medicamento abhorrentibus: Vnguentum quoque alterum ex Cyclamino sic ad resoluendam duriciem splenis etiam lapidosam, & strumas.

Drachmæ duæ, auctore Matthiolo, succi cum pari portione mellis rosati, addito momento Nuclei Myrsitici, & Maltiches, assumptæ, alium solvunt, obstructions jecoris & lienis expediunt, eaque ratione conferunt hydropicis & ictericis: femori parientis alligata partem accelerat: Ad tinnitum & sibilum aurium singulare est remedium, quod recipit Cyclamini radicem lib. delibratarum & minutim incisarum, affuso Oleorum Chamæmelini, Rosati & Amygdalarum ana. lb. ꝑ. coquantur ad mediam, post per pannum colentur: huius olei tepentis quatuor aut sex guttule auri affectu infillantur, sub somni tempore: radix autem decocta calida toti auri imponitur, & ne excidat, fasciis ligatur: manè auferatur, & auri vino generoso eluitur, hoc remedio continuis decem diebus vtendum. Aliud ad aures expertum, r. radicis Cyclamini repurgati & concisi Vnc. ꝑ. Aquæ Vitæ Vnc. iij. Nuculeorum Persicorum & Amygdalarum ana n. iij. Contusi nuclei vnà cum radice, tribus diebus continuis in aqua vitæ macerentur: postea per pannum colata aqua, reseruetur: efficacissima est: sub tempore somni duæ aut tres guttule tepentes auri infillantur, quæ dein xylo occludenda: huius remedij per dies aliquot continuos vsus certò iuuat: posset etiam radix excuari, inque eam oleum Amygdalarum amarum infundi, occlusoque rufus foramine, in calidis cineribus torreti, post verò succus exprimi, & in calidis cineribus torreti, & in aurem, vt dictum, instillari. Succus radice per nares attractus sternutamenta eliet, caput repurgat, sed validum est remedium ideoque vehemenciam eius sunt qui addito lacte vaccino aut caprino temperent: idem cum pari mellis portione aphthas efficaciter curat, & linguæ vlcera: eodem remedio possunt dentes dolentes inungi. Succus cum aqua Prunellæ, gargarisatu ad faucium vlcera facit. Herniosis si non potest intromitti intestinum, vtiliter eo sæpè illinitur: aqua stillatida radicis in nares attracta, misce sanguinem sistit: id quod præstat hoc quoque, quod recipit, succi radice Cyclamini & Plantaginis ana partes æquales, adde parum Thuris, Aloës, Myrrhæ, in hanc miscellam turunda ex xylo aut bno tineta in nares indituriunt & anacollemata ex eadem mistura fronti applicanda.

Plinij verba quædam coronidis loco subscribere placuit. Cyclamini, inquit, in omnibus ferenda domibus, si verum est, vbi fata sit nihil nocere mala medicamenta (amuletum vocant) narranteque & ebrietatem representari, addita in vinum radice.

DE ARISTOLOCHII IN GENERE.

CAP. VIII.

Aristolochia [*ἀριστολόχια*] vocata est à Græcis, Theophrasto, Dioscoride, & Galeno: itemque Latinis, ut Plinio, qui tamen & Malum terræ, quod radicem habeat instar Mali rotundam, latius vocari testatur. Barbaris & officinis corrupto nomine Aristologia dicitur; aliis Adarhyza, aliis Melocarpon, aliis Ephesia, aliis Clematidis, aliis Pyxionos, aliis Dardanos, aliis Iontitis, aliis Tocites, aliis Teuxinos, aliis Chamæmelon, aliis Opetis, Ægyptiis Sopoe [alias Sophosph]. Italis Terræ malum, Dacis Absinthium rusticum, aliis Scordian, ut apud Apuleium cap. 19. scriptum habetur. Videtur autem diuersarum Aristolochiarum nomina confundere. Siquidem inter nothas Dioscoridis appellationes, longaduntaxat Aristolochia, Melocarpon, & Teuxionon nominatur: Clematidis verò, & Arariza, & Melecarpum, & Ephestios, & Lestitis, & Pyxionyx, & Dardanon, & Iontitis: Hanc Galli vocant Teximon, Ægyptij Sophosph, Siculi Chamæmelum, Itali terræ Malum, Daci Absinthium choricum. Arabibus porò in genere dicitur *Zarand Masinocr* seu *Zarand*. Germ. *Wierwur*, *Wierwur*, *Wierwur*, & non tamen sine errore, *Wierwur*: Belgæ *Saraphin* erup: Galli *Saraphin* & *Fortem*: Angli *Wierwur* vel *Wierwur*.

Krymon.

Cæterum, dicta est Aristolochia, quod puerperis egregè opituletur, & ut Dioscorides ait, quoniam esset *ἀρίστη τῶν λήκωνος* (*aristhês alij*) i.e. optima, non gravidis, ut malè interpretatus est Plinius, sed puerperis: *ἀρίστη* enim idem est quod optima: *λήκωνος* verò, seu *λῶκος*, sunt quæ jam pariunt, aut paulò antè pepererunt, & non gravidæ, quæ vterum gerunt: *λῶκος* verò sunt partus dolores, partus ipse, & post partum secunda, purgationesque alix omnes, quæ tunc fiunt. *Adariza* dicta est à radicis crassitudine, quasi crassi-radicis: *ἀρῖα* enim crassum, robustum, & magnum significat: *ῖα* verò radix est. *Aristolochia rotunda* (inquit Humelbergius) Melocarpon appellata est, à mali seu pomi quod Græcis *μήλον* dicitur forma globosa: Et quia sub terra latet, Latini etiam, præsertim Itali *Terra malum*, & Græci Chamæmelon vocant. Et *Opetis* quod in terræ caverna subleat, quæ Græcè *ὀπη* dicitur, *Ephestia* dicta est à Diana, quæ Ephesti colebatur, eò quod, quemadmodum Dea illa puerperis & parturientibus opulari credebatur, sic etiam herba hæc iisdem adiumento & auxilio esse soleat. *Clematidis*, i.e. Sarmentaria dicta est propitiæ tertia species, à sarmentis eius, quibus vnguentarij uti solent. *Pyxionos*, id est buxæ à colore buxæ, quem utriusque radix intrinsecus habet: *πύξος* enim Buxus est. *Dardanos* si herbæ appellatio est, ut omnia, quæ videre licuit, exemplaria prætendunt, à loco sic dicta est, eò quod illic forsitan copiosior, speciosior ac melior nasceretur. Iontitis, vel ut quædam habent exemplaria Iontes etiam dicta fuit, atque Teuxinos, seu potius vnà dempra litera Teuxinos, sic scilicet eadem ratione & causâ, quæ dicta est ab initio in dictione Aristolochiæ, quoniam parturientibus utilis sit, quod memoratos menses, hærentes secundas, & reliquias omnes à partu expellat. Iontitis verò à Viola, quæ *ῖον* dicitur, cui flos purpureo colore

Plinius.

Adariza.

Melocarpon.

Terra malum.

Chamæmelon.

Iontis.

Opetis.

similatur. Et hæc secundo generi conuenit appellatio. Aristolochiam Dactylitiam requirit Galenus libr. de comp. med. secundum locos 7; cap. 2.

Theophrastus lib. 9. Hist. cap. 13. scribit Aristolochiam esse olfactu suauem [*ὀσμήν*]: Jar gustatu valde amaram: colore verò nigram: nasci in montibus optimam: folium habere simile folio Alfinis, sed rotundius ad multa utilem. Capite verò 22. ubi eadem repetit folium ei simpliciter rotundum tribuit.

Porò quamvis Theophrastus inter Aristolochias non distinxerit. Dioscorides tamen & posteri Græci Aristolochiæ tria genera esse statuerunt. Vnam rotundam fœminam dictam: alteram longam, masculam: & tertiam Clematidiam appellatam. Plinius his tribus generibus quantum addit, ac Pistolochiam & polyrrhizon vocat.

Tria genera sic describit Dioscorides. Aristolochia ex eo nomen accepit, quod puerperis optimè auxiliari videretur. Est autem quædam rotunda fœmina appellata. Folia hæc habet: hederæ, odorata cum acrimonia, subrotunda, tenera iuxta multa germina, in vna radice: furculos [*καμάται*] autem oblongos: flores albos, veluti pileolos. Quod verò in ipsis rubicundum est, graueolens est. At longa Aristolochia mas vocatur. Eadem etiam Dactylitis folia habet oblongiora quàm rotunda: ramulos tenues magnitudine dodrantali: florem purpureum graueolentem, qui ubi de floruit, Pyro similis euadit. Radix autem rotundæ quidem globosa, Rapo similis: Longæ verò radix digiti crassitudinem habet, dodrantalis, aut etiam maior. Ambæ autem plerumque intus buxæ colore habent: suntque amaræ saporis ac virosi. Est & tertia quædam longa, quæ Clematidis vocatur. Ramulos habet hæc tenues, foliis subrotundis, paruo Semperuiuo similibus repletos: flores Ruræ similes: radices longiores, tenues, quæ corticem habent crassum & odoratum [*ἀρωματισμένη*] & priuatim commodè sunt ad spulanda vnguenta. Cæterum pro *ἀρίστη* utriusque, ut habent vulgata exemplaria, id est, Semperuiuo minori similis, legendum annotat Dodonæus, *ἀρῖα* *ῖον*, *μικρὰ*. id est, Alaro similis parvis.

De iisdem & Pistolochia sic scribit Plinius lib. 25. cap. 8. Inter nobilissimas Aristolochiæ nomen dedisse grauidæ videntur, quoniam est *ἀρίστη* *λῶκος*. Nostri Malum terræ vocant, & quatuor eius genera seruant. Vnum tuberibus radicum rotundis, foliis inter Maluam & Hederam nigrioribus mollioribusque. Alterum masculæ, radice longâ, quatuor digitorum longitudine, baculi crassitudine. Tertium longissimæ tenuitatis, Vitis nouellæ, cui sit præcipua vis, quæ Clematidis vocatur, ab aliis Cretica. Omnes colore buxæ, caulibus paruis, flore purpureo. Ferunt bacculas paruas ut Capparis. Valent radice tantum. Est & quæ Pistolochia vocatur, quarti generis, tenuior quàm proximè dicta, densis radicis capillamentis, lunc plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrrhizon cognominant. Odor omnium medicatus, sed oblongæ radici tenuiorique gratior. Carnosi enim est corticis, vnguentis quoque nadinis conueniens. Nascentur pinguis locis & campestribus. Effodere eas mēsius tempestiuum, ita desquamato terreno seruantur. Maximè ramen laudatur Pontica, & in quocunque genere ponderosissima quæque medicinis aptior. Rotunda contra, &c.

Dactyl.

Diversitatem vetustatis ratione in Plinij Pistolochia; quæ vberimè in Neapolitano tractu provenit) accidere possè, se observasse ait Marantha. Depingit, inquit, Pistolochiæ radicem Plinius tunc plenioris crassitudinæ: quod quidem in omnibus pulchrè quadrat; sed nonnullas digitum æquare adinueni, quod non aliunde effectum esse, quàm ex eius vetustate non leui coniecturâ credidi: erat enim in plantis illis cespes radicibus connatus, satis crassius, ex quo vicularum prope infinitus exortus, quæ in aliis non videbantur. Videmus & Aristolochiam longam in Germania, aliisque quibusdam regionibus frigidis multò tenuiorem esse eâ, quam Dioscorides describit; neque enim digiti crassitudinem æquat, quàm ob rem multi non obsecuti nominis virtutem duorum generum lōgam Aristolochiam statuere coacti sunt: alteram crassam, alteram tenuem appellantes: &c. *Marantham* autem miramur scribere Aristolochiam longam, veram scilicet in Germania provenire. Ea enim quæ in Germania reperitur, à vera longa plurimum differt. Sunt etiam plures Aristolochiæ, quàm numeret Marantha.

Ex verbis Dioscoridis Sole clariùs fieri, Aristolochiam rotundam officinarum, quam Germani *Rinde Holwurp* vocant, qua communiter omnes videntur, non esse eam quam Dioscorides atque alij veteres pingunt, contendit Fuchsius variis nec levis momenti rationibus, quæ hic longam foret recensere: is autem censet vulgarem Aristolochiam esse lōgam, non Clematidam.

Cùm Aristolochiæ secundæ vulgaris historiam abfoluisset Tragus, peruenit ad manus eius vera Aristolochia rotunda, quam omni ex parte Dioscoridis descriptioni respondere ait. Radix siquidem eius rotunda sit, rugata, pulla, ac vndique impressiones quasdam referens, in superiori parte, quæ caulem ex se mittit, in acumen quoddam turbinata, ita vt Rapulam marcidam repræsentet, gustu amara, sicut & longa Aristolochia, intus sabcrocea. Hanc in montanis Montis Pefulani provenire, ac Lugduni venditari refert Gênerus.

Aristolochiam tenuem, Cordus in Theriacam ait esse illam quæ longa cognominatur, cuiusque radices gracilitate sua & longitudine sarmenta vitium imitentur. Aristolochiam verò rotundam negat esse illam rad cem in Diateslato, quam Germani *Holwurp* vocat, sed aliam multò majorem, & tuberosam, intus solidam, colore Buxi flavo, odore & sapore similem Aristolochiæ longæ: Afferri ex Italia & Heluetia.

Aristolochiæ Clematidis longa radix nobis est (inquit Syll. de med. simpl. nar. lib. 1.) persequens, longa, raxa, Rotunda verò in agro Neomausensi plurima, etiam hic excrefcit. Effodienda est messibus, & desquamato terreno servanda. Legendam vitramque Plenilunio, vt alias prope omnes quidam contendunt: sic enim pleniores cùm sint, siccando minùs flavescent, alio tempore lectis magna sui parte siccando vaporantibus & marcescentibus. Eligenda vtraque benè habita, & si est sicca, minùs altè rugis striata, carne multa, firma, odore & sapore vegeto, non pulverulenta dum frangitur, nec fiti obruta, nec carie aut teredinibus exesa. Quæ bonitatis notæ reliquis propè plantarum partibus sunt communes. Pontica autem & Cretica est præstantior.

Tom. III.

De Aristolochia in genere hæc scribit Matthiolus: Aristolochiæ tria statuuntur genera, nempe rotunda, longa & Clematidis. Hæc rara admodum & paucis nota: illæ verò omnibus ferè herbarum studiosis notissimæ. Quæ rotunda vocatur, etsi non vbiq; in Italia proveniat: in agro tamen Gorticensi plurima, pulcherrimæque nascitur, præstanti odore, vtraque flores edit in toto ferè caule oblongos, & ex parvo capitulo in auriculæ modum desinentes, sublateo colore, & internè quadantenus ex atro purpurascentes, è quibus oriuntur fructus: qui in longa Pyri imaginem referunt, suntque luglandibus longè majores: in rotunda verò rotundiores, paulòque minores spectantur. Quæ in re non potui non maxime Plinium admirari, quòd lib. 8. c. 8. vtramque ferè baculas parvas veluti cappares tradiderit: nisi quis illud dixerit, quòd Plinio contigerit, Aristolochiæ vtriusque fructus vidisse, priusquam ad summum adoleuissent. Sed certè is eodem in loco exulari, meo iudicio, non potest, quin manifestè hallucinatus, & græci sermonis non admodum peritus deprehendatur, cùm Aristolochiæ nomen dedisse grauidas tradat, Quandoquidem non ab vtero gerentibus mulieribus, sed à puerperis Aristolochia [vt Dioscorides scribit] id nominis sibi comparavit. Cuius rei non modò indicium præbet nomen ipsum ἀρσολοχία, quod nihil denotat. quàm optima puerperis, non [vt Plinius] grauidis: sed etiam ipsius facultas, quæ ad remota puerperis à partu secundas, mensesque cientes, magnopere commendatur. Quæ propter fuerit hæc prægnantibus, proculdubio exitiale; potius, quàm salubre medicamentum, cùm ea sanè omnia quæ secundas & menses educunt, factum etiam trahant, & quandoque interficiant, præsertim amara, Aristolochiæ modo. Nec minùs præterea Leoniceum satis admirari possum quòd dum de Cyclamino, & Aristolochiis Plinium accusat, in eandem, in quam Plinius, foueam ceciderit, asserens cum Plinio Aristolochiam à prægnantibus sibi nomen adinuénisse. Quod ne sine auctore pronunciasse videretur, Dioscoridem quidem adducit, sed eius historiam quantum equidem sentio, corrumpit ac pervertit. Sunt & recentioribus Cordus, Lonicerus, & Monachi illi, qui in Melsu commentaria edidère, qui sibi certò persuadent, eam esse Dioscoridi Aristolochiam Clematidam, quæ officinis omnibus passim longa cognominatur: argumentum, quòd hæc radices proferat admodum longas, & sarmentorum modo prætenues. Quin & vt suam tueantur, ac magis roborent sententiam, hoc in loco Dioscoridis codicem omninò deprauatum esse contendunt: & vbi vulgata lectio habet κλωστή ἔχουσα λήληθ, πολλοὶ ὑποπροβύλοις ἀλγῶν μικρὴ ἐκόντι, hoc est ad verbum ramulos habens tenues foliis subrotundis Semperviuo paruo similibus, non ἀλγῶν μικρῶν: sed ἁσάρῃ μικρῶν, quod Alaro paruo similia sint folia legendum esse censent. Horum sanè sententiam nunquam probare potui, neque probandam arbitror, pluribus cùm rationibus, tum auctoritatibus adductis [eas ex ipsius Matthioli Commentariis petendas relinquimus.] Sunt præterea recentiorum quidam rei herbariæ & studiosi & periti, quibus persuasum est, non tamen sine aliqua ratione, quòd Aristolochiæ longæ præter Clematidem duo habeantur genera: quarum altera sit radice [vt Diosc. inquit] digiti crassitudine & Dodatis longitudine: altera verò tenui & lōgiore, quæ [vt

Alia opinio refutata.

Rtc

Aristol. te-
nus.

Andromacho & Galeno habende Aristolochiam tenuis, hoc est Aristolochia tenuis appellatur: quia & hanc esse tantum longam esse, cuius hinc imaginem exhibuimus, cuiusque passim est usus. Quo fit ut pro certo existiment haud esse eam Aristolochiam, quæ in Andromachi Theriacam addi debeat, Andromachi junioris & Democratis testimonio innixi, quod ij in Theriaces compositione huiusce tenuis tantum meminerint. Id quod (ut dicunt) prætere videtur, alterum etiamnum ipsius Aristolochiae longe genus esse præter Clematidum, radice constans tenuiore & longiore. Hoc autem comprobatum fuisse putant à Galeno libro antè citato, ubi docens quomodo nonnulla, quæ ab Andromacho seniori obsecrè tradita sunt, explicari debeant, ita scribit. Si quid adhuc aliud superest, quod minus dilucidè ab Andromacho seniori elegiacis versibus dictum, planum fiet Theriacam legentibus ab eius filio solu à oratione descriptam. Quod enim ille Cecropium mel obscurius appellat, id Atticam aperte nominat. Centaurium ille nullà adhibita distinctione in carmine pronuntiat, hic verò in oratione tenuis apponitur, quod Ialud quoque Centaurium extet, crallum appellatum. Idem & in Aristolochia fecit, ubi peritiam tenuis ita hinc dicitur, quæ eam peritiam, quæ ab Andromacho habetur, & tenuis certis, quæ rotundam. Hæc enim Galenus. Quibus nimirum verbis illi credant suam satis hinc inde sententiam. Sed ego, quæ non aliter sentio, ut qui patrem, Aristolochiam tenuem non aliam Andromachio Galeno fuisse, quam Clematidum cognominatam. Etenim, ut omittam, quod Dioscorides & Galenus non plura, quantum inuenimus, quam tria Aristolochiæ genera commemorant, nempe rotundam, longam, & Clematidum: Clematidis præsertim à Dioscoride Andromacho hinc longam fuisse notatam, quæ hinc id eius species conueniunt, ramulis tenuibus, radicibus eam tenuibus ac longioribus. Ut hinc facile nobis liceat conicere, Andromachum & Galenum, non aliud suarum dicto loco per tenuem Aristolochiam intellexisse, quam Clematidum. Adde quod si ad omnium qualitates & facultates spectes, sanè Clematidis dignior est, quæ in Theriacam recipiatur. Hæc enim radicem habet, Dioscoride testis, cuius odorato vestigium, vnguentorum spissamentum conuenientem. Plinius deinde libro 25, cap. 8. Clematidem ceteris prætulit ut veris. Tertium longissimæ tenuitatis, Vitæ novellæ, cui sit præcipua vis, quæ Clematidis vocatur, ab aliis Cretica. Et paulo post idem ait. Odor omnium medicatus, sed oblonga radice tenuior, quæ auctor hæc est. Quibus ut quæ ad stipulam videtur, etiam Gal. libro 6. Simp. med. ubi de Aristolochiarum vinibus differit, ut infra patebit in earum commentatione. Quare non est, meo quidem iudicio, asserendum, quod & ex soloyda & Andromacho & Galeno sit aliquod quartum Aristolochiæ genus ita vocatum: quandoquidem & hinc nullum facit per se genus: neque solum tenuem indicat, sed etiam vinctoremque cerè in longarum genere huiusmodi est Clematidis &c. Atque colligendam esse arbitror, quod Aristolochia tenuis dicta ab Andromacho, non sit genus distinctum ab aliis, sed eadem cum Clematide & quod sub Aristolochia & tenuis cum Clematide intellexerant Andromachum & Galenum &c.

Aristol. tenuis per se genus non facit.

Aristol. tenuis Andromachi non distinguitur à Clematide.

Clematidis idem Cretæ insulam scribit

Bellonius lib. 1. Obs. cap. 17. quartam speciem Aristolochiæ differentem à tribus aliis descriptis ab antiquis, arborescens ac opprimentem, ut Eshedram & Smilacem: interea foliis, floribus, semine, radice, sapore & odore cum Clematide conuenientem.

Androt. Florent. Aristolochiæ tria genera Dioscoridis agnovisse videtur. Rotunda, inquit, hodie notissima, radicem habet rotundam, Rapi modo, reliquæque notas, quas illi tribuit Dioscorides. Longa autem paucis adhuc cognita, quandoquidem ea quæ hodie pro longa exhibetur vulgo, quibusdā est tertia species Clematidis dicta, quod non habeat radices quaternos digitos longas, vel longas Dioscoridis, sed longissimas & graciles, quales Clematidis describuntur, tamen si Dioscoridis textus non est mendosus, ut aliqui existimant, folia semperui minoris non illi conveniant, itaque quæ am sit Aristolochia longa & Clematidis dubitatur. Cū verò rotunda sit omnium efficacissima, eius vis esse debet, quodcumque Aristolochiæ nomen absolute reperitur: imò etiam longe & Clematidis loco usurpari potest. Vulgaris lōga omnium imbecillima est.

Tragus corrigens Dioscoridem capite de Aristolochia longa, pro flore purpureo ponit candidum, quæ correctione non est opus: cū vera longa purpuream florem habeat, non candidum. Erat Tragus in ea opinione, in quæ Matthioli, scilicet vulgarem Aristolochiam esse longam, idè quæ pro longa desinixit & descripsit. Eiusdem etiam fuit opinio Cornarius. Tragus autem agnovit Rotundam causam & eam Aristolochiam, ut dicitur suo loco: verum cū exhibet rotundam, miror eum appingere capreolos, cū nullo ferat. Quæ autem de ea dicit ponitur proprio capite: de aliis Aristolochiis nihil ait. Radicem illam causam miror: Contrarium dicere esse rotundam, cū id iam ostensum fuisset manifestè à Trago & Fuchio. Hæc eandem longam cum Trago exhibet, & insuper Pistolochiam, quam merito rejicit Matthiolus.

Matthioli opinionem circa Aristolochiam præsertim verò Clematidem ut examinemus, imprimis eum dicit miror, longam suam Aristolochiam habere flores ex atropurpureiscentibus, quæ ea quam picturā exprimit, eiusmodi flores nunquam præferat, quod nunquam observare meminerim. Secundo, errorem in Plinio haud fuisse commissum animaduertit, id quod sibi persuadent Marcellas, Matthioli, & Hamelbergius. Nec enim asserit Aristolochiam [ut falsò etiam ab Aloisio Mundella accusatur] optimam esse grandis. Sed nec hoc affirmat, id significare Aristolochiæ vocabulum: Alii videri grandis nomen id dedisse, quoniam esset ἀγρία, id est optima puerperis. Itaque mulieres grandis videntes eam esse bonam &c. vocarunt Aristolochiam. Quæ in re haud contrariatur Dioscoridi. Perinde etiam est, siue dicas mulieres grandis nomen dedisse, quod sciebant eam utilem fore sibi puerperis, siue eam inde denominatam quod bona esset τὰς λαχούρας. Mæz, herclè, opinionis fuisse videtur Cornarius, qui Plinium erroris haud infimular, ait Plinium de appellatione idem quod Dioscoridem sentire scribit. Nunc Cordum errasse, ut Matthioli, non ausim asserere, siquidem Matthioli rationes non sufficentes videntur. Primum quod ad Oribasium attinet, concedere quis poterit fieri posse ut corruptum Dioscoridis ea

Aristol. arborescens.

De Aristol. Androt.

Clematidis longa.

Tragus.

Cornarius.

Matthioli.


dis exempla habuerit. Quod ad Scapionem & Auicennam, dico Matthiolum eos in sua lingua scriptos non legisse, & idem Matthiolum, Arabum interpretes secutum, Dioscoridis versione fuisse usum. Quod ad folia Asari attinet, quoniam est pro diuersitate locorum Asarum maxima habeat folia, vel parua, quid quæso in eo absurdum, si dicatur folia esse similia Asaro parua, & non magno? Flores porro similes sunt Rutæ, melius quippe, quamquam Plinius dicat omnes esse flore purpureo, quod à Dioscoride non affirmatur. De auctoritate ex Nicandro desumpta, conceditur quidem pro diuersitate locorum variari multa: sed necesse esse, ut in latitudinem & profunditatem latus ille locorum protendatur, quem non semel autopsia notauimus in suo nostræ stirpis genere: nec quoddam fortiaur transmutationem, ut ex breui, dodrantali, & cassâ, fiat longissimam, cubitum, & tenuissimam. Cortex tandem admodum crassus esse non potest, habet ratione radicem longiorum, vel longissimarum ac tenuium. Vltimo, quicquid dicat Matthiolum de odore, videtur mihi aromaticus & gravior. Et si id si conferatur cum reliquis Aristolochiis, ut laminam odoratiorem. Hac itaque videns, quod ad me attinet, donec mihi ostendatur Aristolochia, quæ melius conueniat descriptioni Clematidis, hanc pro ea retinebo. Si quidem à Bellonio visam insperem, inspectamque examinarem, iudicarem an melius de tempore præstaret. Nostræ spinosæ formam habemus Dodonæum, qui vulgarem depingit, & describit pro Clematide: Rotundæ eum figuram exhibet, a se inueniendam.

Aristolochiam vulgarem Theophrastus lib. 9. hist. cap. 14. annis quinque aut sex: anno autem in umbra secuti Plinius lib. 27. cap. 13. dixit. Nascitur, ut inter notha Dioscoridis habetur, in locis montanis, & calidis ac planis: aut asperis & petrosis: & cultis apud o. B. lib. 1. in Olib. lib. 1. cap. 66. longam in Thracia agros frequentem inueniri scribit: Dodonæus longam & rotundam testatur provenire in multis locis Italiæ: item in quibusdam Galliæ, ut in Provincia & Languedoc circa Monspelium, ubi & quartam abundare refert speciem, indeque adferri Antuerpiam rotundam vendendam: Tertiam lubenter provenire in vineis & multis locis Brabantie, circa elatos agros. Florent Aristolochia Maio & Iunio.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA.

Aristolochia rotunda multa fundit & radice samenta cubitalia, imbecilliora quam Clematidis vulgaris, quibus alternatim adnascuntur folia, admodum breui pediculo hærentia, caulibus suis penitus complexa, omnium maximè rotunda, mollia, pallescentia: ex quorum alia flores exeunt semunciali pediculo hærentes, tubulo ex iureo pallescente, in palam ex tubro nigricantem desinentes: viridius sequuntur turbinati, striati, qui in partes sex dehiscunt semen ostendunt nigrum, copiosum: radix tuberosa & rotunda, à cuius imo longæ dependent fibre colore pallido, tristi amatore gustum afficiens.

Figura Fuchsiana cum nihil valeat, aliam imaginem dare erat necessum. Proponit Eucherius Rosellus pro Aristolochia rotunda, Fumariam bulbosam, sed malè. Eundem errorem commisit E. Tom. I. II.



rium Her.

Bouche v. g.

& Dorel e.

quæ p. ceteris

summe in-

neptit, dicit

enim Aristol-

ochiam ro-

tundam voca-

ri habetur:

flores produ-

cere purpureos

aut candidos,

& radicem

habere con-

cauam: sed de-

terius & cras-

sâ nimis i-

gnorantiâ folia

elut Hos-

de & terre-

stris foliis cõ-

parat. Talia

enim folia sug-

iconi, que Fu-

marie bulbos-

ta est: haud

competunt.

Quin & Lo-

nicæ motus

nigerus pro & Trag.

Aristolochia

rotunda signa-

râ, signum

exhibet.

Sed & Tragus

istam ima-

ginem propo-

nit: siquidem

Aristolochia

rotunda nul-

los capreolos

prodit. Vi-

dit, ut existimo,

radicem

târam, & non

folia, flores &

fructus.

C Bauh. phyt. & pin. Aristolochia 1. siue rotunda, flore ex purpura nigro: Aristoloch. rotunda vera Trago, Lonic. Cam. Aristol. rotunda

Math. Dod. Anguill. Cordo in Diosc. Gesa.

h. Turn. Lac. Lobel. in Adu. Obs. p. 32. Ic. Plan-

tar. p. 606. Cast. & Eyst. Arist. rotunda 1. Clus.

hisp. & hist. Aristolochia 1. Cæsalp. Aristolo-

chia femina siue rotunda H. Lug. p. 977. Eid.

p. 978. Aristolochia rotunda Dodon. & Clusij.

Vnius herbe dua figura.

Monspelij frequens, fructum fetens Iunio. Locus &

Spontanæam repertam inter Mediolanum & Bar. Tampus.

laufone. Aristolochia rotunda 1. Clusij crescit

pingui solo, in pratis & humidioribus agrorum

marginibus Hispaniæ, Narbonensis Galliæ, &

etiam Italiæ. Floret calidioribus regionibus in-

eunte Vere: in Germania & Belgica non nisi

Maio & Iunio.

Aristolochia rotunda altera Clusij.

R Amulos seipalmitibus habet prioris, sed frequentiores & breuiores: sunt longæ qui-
Rit 2

Descriptio.

deformam & colorem æmulantia, sed major, longiorque pediculo quàm superioris falcata; flore ex albo purpurascens, interius falcum, longæ flori penè similem: eius fructus priore longior, pyri in modum turbinatus, graciliore quàm in illa metà: semen plantæ, minus priore & rufum: radix superiori similis, cortice tamen magis flavo.

Synon.

C. Bauh. phyt. & pin. Aristolochia 2. siue rotunda flore ex albo purpurascens: Aristolochia rotunda altera Clus. hisp. & hist.


Angulata plantæ species in ænili scribitur: verum hæc non solum colore floris, sed & fructu à priore differt.

Locus & Tempus.

Floret paulò maturius superiore, omnique semen ferè alio, cū quando prius maturescere incipit. Hanc non nisi æmpestribus, & inter segetes sponte nascentem conspiciebat Clusius. Superiori similior est & injuratum Hæmis toleranter.

ARISTOLOCHIA LONGA.

Descriptio.



Longæ sarmen-
ta per
talem fun-
duntur cubita-
li ceter longi-
tudine, qua-
rata, aliq̃te
multis conca-
ua: per quæ
folia nascuntur
falcata, acutiora
quàm rotunda,
longioribulque
pediculis hærentis;
ex quorum sinu
flores longi,
Rotundæ similes,
orientur, minus
flavi, fructu
lucido
scente pyris-
mi semine fatido, ut in Rotunda dictum: radix pol-
licari aut brachiali crassitie, pedem circiter longi-
tudinis & crassitie.

Synon.

C. Bauh. phyt. & pin. Aristolochia 3. siue longa vera: & Ang. ill. & Camer. Aristolochia longa Dod. Cordia Diosc. Gein. herb. Lob. Obs. & c. Plant. pag. 606 & Clus. hisp. & hist. Aristolochia longa Fuchsij. Cæsalp. Aristolochia altera radice pollicis crassitudine.

Locus & Tempus.

Provenit campestribus locis inter segetes, & quibusdam vineis in Narbonensi Gallia: meminit & Clusius nouo Vere florentem cruere in insula mediis in stagnis sita, vbi templum Magalona nuncupatum, olim Episcopi Mompellianj sedes, circa oppidulum Villa noua nominatum secundo à Mompelio militari.

Aristolochia longa altera Clusij.

Aristol. longa
differencia:

Quædam etiam differentia in Aristolochia longa notatur: nam illius, quam in Hispania Clusius obseruabat (tametsi Gallicæ ferè per omnia similem) flos à diligentius inspicientibus nonnihil differe deprehenditur, quippe cuius extrema plus inætiore parte purpurei coloris sit, qui in aliis herbaceis: Hispanicæ item radix

extima parte non est gracilis in nouellis plantis, ut altera, sed plerumque obtusior, & ipsa radix & reuor.

Aristolochia 4. siue longa Hispanica C. Bauh. Synon. phyt. & pin. Aristolochia longa altera, Clus. hisp. & hist.

Nascitur in Hispaniis inter Vites, regno Valentino frequentissima, vbi Martio florentem, Tenet & jam semen perficere incipientem eruebat Clusius: Veraque autem cū in Germania, tum in Belgica frigoris est impatiens, & diligenti curâ adseruari debet. Al quoties Viennæ periculum facere voluit author, an Hiemem in horto ferre posset, etiam Abietis frondibus testâ, ut reliquæ, quas hac ratione conseruare solebat, plantæ: sed operâ luserit, & semper corruptæ sunt. Itaque accepto damno prudenter factus, in vasis fictilibus postea temperauit.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS
vulgaris.

Tenui radi-
ce, multiq̃
fibris capillata,
odore non in-
grato, sapore a-
maro, adeoque
tenuium par-
tium ut statim
gustata fauces
eo imbuar, ser-
pit: viticula pe-
dales, infirmæ,
stuita, gonicu-
lata: folia ex pe-
niculis singulis
singula, Hæde-
racea, rugosa
quâ pediculo
longo annecti-
tur, anchoræ in
formâ curuata:
ex eorumdēque

alis oriuntur flores oblongi, lutei, palæ effigiatæ, canali intus lanuginoso, cui pro basi subijcitur orbiculatum, capitulum in quo semi sessiles apices colore herbaceo: fructus pyrisformis triarius, longitudo magnitudine.

Angul. Aristolochia vsualis Italica, Aristolochia Italica cōmunis, Aristolochia vulgaris longa, fortè Clematitis. Cordia in Diosc. Aristolochia Clematitis, simpliciter longa vocata. Trago [qui f. ultra textum Dioscoridis mutat, ut hanc suam longæ accommodet] Aristolochia longa, mascula, Dactylitis: Et sic etiam Lonicero dicitur.


Dorsth. pro Aristolochia longa malè exhibet eam cui flores lutei, & radices longissimæ.

C. Bauh. pin. Aristolochia 5. siue Clematitis recta (i. phyt. pro recta.) Aristolochia Brunfels. in 4. p. 73. longa Trago, Matth. Fuchs. Turn. Lac. Lon. & Castori. Aristolochia longa altera, & Clematitis veterum Cordia in Diosc. Aristolochia longa vulgaris, Ang. Cam. ep. & hort. Eyt. Aristolochia Clematitis Dodon. gall. Ang. Gein. hort. Lob. Obs. p. 332. & c. Plant. p. 606. Tab. & Gerardo. Aristolochia Clematitis 1. Clus. hisp. Clematitis vulgarior, Eid. hist. Aristolochia Clematitis, siue longa vulgaris, Farkas alma, hoc est, Lupinum malum seu pomum. Eid. in stirp. nomencl.

menclat. pannonico. Aristolochia Saracenicā Dod. in fol. lat. Aristolochia altera radice tenui Cæfalp. Aristolochia longa Marthioli, Clematidis Penz & Lob. H. Lugd. p. 977. Aristolochia Saracenicā Dodonæi, Clematidis prior Clusij Eid. p. 979. Eiusdem figuræ duæ imagines.

Obferuatur in variis hortis, in quibus fuo re-
putatu valde moleſta: Monſpelij ſpontanea cre-
ſcit. Paſſim in agris Auftriæ infra Onaſum ad
Morauiam ſitis prouenit: ac plerique aliis Gal-
liæ, Hiſpaniæ, Vngariæ, Germaniæ ſuperioris &
inferioris locis. Floret cum reliquis.

ARISTOLOCHIA CLEMATIDIS NON vulgaris.



Hæc longa,
ramoſa,
tenuia, ſtriata,
que habet ſar-
menta, quibus
vicinas ſepes,
& interdum ar-
buſculas ſupe-
rat, iis ſe con-
uoluens & im-
plicans Conuol-
uuli aut Lu-
puli modo. Fo-
lia illi reliquatū
Aristolochia-
rum foliis ſimi-
lia, ſeu potiùs
generis illius
Apocyni, quod
in maritimis
nafcens, Mom-
peliani Scam-

noneam olim appellabant, extremo mucrone
acuminato, ſuperne læuia & viridia, inferne ex
purpurea albiſſantia, longo pediculo innixa: ſas
Aristolochiæ longæ incuruus, oblongus, ex pur-
pura nigricans, intus tenui lanugine plenus, lon-
giſſimo omnium pediculo inſiſdens: fructus, vt ex
illius rudimento Claſſo colligere licuit, reliqua-
rum Aristolochiarum ſuctui ſimilis, tale etiam
eſſe ſemen, ex eo quod Simon de Tour ei mi-
ſerat, obſeruauit, fructus verò æquè magnus, ac
in Clematide vulgata, & à pediculo dehiſcens:
radix prælonga, ſarmentitia, ſimilacis aſperæ in-
ſtat (cum cuius craſſioribus fibris magnam habet
aſſinitatem) nunc per ſumma ſerpens, mox altè
ſub terra ſe condens, pallidi coloris, non ingrati
ſaporis, guſtata enim, aliquantulum adſtringens
deprehenditur, & manifeſtæ acrimoniæ. Tota
planta odorata eſt.

Huius neminem facere mentionem ſcripſit
Cluſius, cum Hiſpanicarum quarundam ſtipi-
um hiſtoriam publici iuris faceret, præter vnum
Bellonium, qui eam Obſ. lib. 1. cap. 17. in Creta ſe
obſeruariſſe ſcribit. Idem in hiſt. denudò aſſerit: nec
ipſum mouet, quod quæ generalem illam plan-
tarum Hiſtoriam Rouilianis typis Lugduni ex-
preſſit, ſcribat, Dodonæum eandem Clematidi-
dis nomine depinxiſſe. Fatetur imò Cluſius eam
Dodonæum iconè dediſſe, ſed à ſe acceptam, &
tamen ad eò Aristolochiarum hiſtoriam, cum Pur-
gantium hiſtoriam meditaretur Dodonæus, ipſi
liberaliter [vt & pleraque alia] communicariſſe
ait.

Dicitur Aristolochia Clematidis Dod. in fol. lat.

Tom. III.

& Caſt. deſcribenti. Aristolochia Clematidis
altera Hiſpanica Lobel. Obſ. p. 333. Icon Plant. p.
608. Aristolochia Clematidis Dodonæi H. Lug-
p. 980. Aristolochia 6. ſiue Clematidis [altera
interponitur in phyt.] ſerpens.

Circa Hiſpalim itinere Olyſſiponenſi, pluri-
mis Beticæ locis, ac etiam circa Cordubam, pin-
gui ſolo, in dumetis, vepribus, & vetuſtis qui-
buldam Oleis ſpontè naſcens Aristolochiæ hoc
genus obſeruabat Cluſius.

Locus.

ARISTOLOCHIA POLYRRHIZOS.

Aristolochia polyrrhizos ex radicis argu-
mento nomen inuenit, quæ ex plurimis
longis iuncæ tenuitatis, buxi coloris, radicu-
lis in vnum tandem caput coeuntibus eſt com-
poſita: viticula dodrantes, graciles, ramoſæ:
folia longæ foliis ſimilia, longioribus hærent pe-
diculis, minora, fortuitò per margines ſinuata:
flores ex earum alis pronati, aliarum ſimiles, her-
bacei aut per extremum ex herbaceo nigricantes:
fructus turgidus, ſemine plenus, vt in prioribus
diximus.

Lobel. in Adu. Aristolochia polyrrhizon, ſiue
Piſtolochia Plinii, gratiore odore multò & aro-
maticitate:

Etymon.



ſpargens Cæſalp. Aristolochia 7. ſiue Piſtolochia
dicta C. Bauh. phyt. & pin.

H. Lugd. p. 980. Piſtolochia Cluſii: item, Pi-
ſtolochia Dodonæi: Dux vnus herbæ effigies.
Adrianus Spieg. Hſag. lib. 1. cap. 9. perperam Fu-
mariam bulbolaſam vocat Piſtolochiam.

Hiſt. Lugd.
1. figura.

Oritur in oliuetis, & petroſis Hiſpaniæ, Gal-
liæque Narbonenſis locis. Serius floret reliquis
Aristolochiarum generibus: ac hoc peculiare
eius fructus habet, vt, dum maturuit, eâ, qua pe-
diculo adhæret, parte, dehiſcat, vt in Bætica Cle-
matide: longæ verò, & reliquarum, ab extrema.

Locus &
Tempus.

Ceterum, Aristolochia iam olim Theophra-
ſto multiplici vſu excellere videbatur. Sic enim
lib. 9. hiſt. cap. 13. ſcriptum reliquit. Vſum eius ad
multa commendant. Sed optima ad capitis eru-
ptiones & ad reliqua tamen vlcera ſatis valet: &
contra ſerpentum morſus, & ad ſomnum, & ad
ſecundas modo paſſi, partim aquâ ſubacta & il-
lita, partim in melle, oleoque deſa: Sed contra
ſerpentes è vino acceſcente pota, & vulneri [mor-
ſo Gaza, qui non Aristolochiam, ſed Malum

Vires &
Vſus.

terre interpretatur] inaspera. Ad somnū v. in vino nigro aulero trita. At si valua pederint, ex aqua collinere conueniet. Idem antea c. 73. Aristolochia [Malum terre, Gaza.] Iosfacta odorata, gustata vehementer amara: peruril sal caput, & reliqua viscera, & ad serpentes, & ad somnum, & ad alia multa: vlcenbus capitis alibere præcipiunt in in aqua subactam, reliquis ratam in melle & oleo: contra ictus serpentum ex vino acido bibi debet, atque inspergi morsui: ad somnum in vino nigro aulero per trita datur. Si valua prociderit decocto abluisse iuuabit.

Theophr. nos. Ex illis constat Theophrastum his eadem de Aristolochia scribere, ut inter illam distinguere, contrā quā Dionysiorides faciat. Rotunda, inquit, ad alia quidem venena facit: sed aduersus serpentes & lethalia medicamina, longa drachmæ pondere bibitur cum vino, & imponitur. Eadem pota cum Piper & Myrrha, omnia in vtero consistentia parvis purgamenta, & menses, & fetus ejicit. Sed & in pello apposita eadem facit. At rotunda ad eadem quidem non facit, sed ex abundantia auxilia: ut anhelationi, singultui rigori, spleni, rupis, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua. Educit etiam aculeos & spicula. Et ossium squamas in cataplasmate imposita remouet: & putrefacta circumscribit, & vlcera sordida repurgat, & caua [aspici] Lac. ex vet. cod.] explet cum lacte & melle. Extergit etiam gingiuas & dentes. Paratur & Clematidis ad eadem facere, vbi in viribus inferor est prædictis.

Clematidis. De Aristolochia Galienus in 6. in 1. med. hæc prodicit. Aristolochiæ radix multo est ad medicaciones utilissima, amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda: aliarum verò darum quæ Clematidis appellatur vnguentarij: sed itaque eā ad vnguentum videntur vnguentarij: sed ad sanationes infirmior. At longeminitis quidem remittitis obtinet quā rotunda, sed nec ipsa inefficax est, verum abstergendi atque exaltandi potentia possit, minus quā rotunda: abstergens & digerens, sed non minus calfaciens, imo forsitan plus quoque. Ita in quibus visus est modicæ absterfionis, commodior est longa putata in vlcetibus in carne explendis, & fomentationibus vteri. At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic visus est rotunda. Proinde dolores ab infarctu aut crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotunda & spicula extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera expurgat, dentes & gingiuas candidas efficit. Auxilio est & Asthmaticis, singultientibus, comitialibus & podagricis, si cum aqua bibatur: tum rupis & conuulsis, vbi si quod aliud medicamentum, auxilio est.

Demonia fugat. Apuleius quoque testatur Aristolochiam herbam pisatam & cum mero potui datam vim veneni vincere: siccam verò suffumigatam febricitantem hilariorem facere: fugare & demonia: Radicem fistulis insertam celeriter expurgare & ad sanitatem perducere: Medicos quoque sine ea nihil felici ter curare posse: Herbam ex oleo vsque ad calefactionem in frigore exustis vim habere cum porcina: Radicem pondere denarij vini in vini hemina sæpius bibitam serpentium & hominum morsum venena discutere: Herbā suffumigatam in fantem, si contristatus fuerit, fugato demonio, hilarem fieri & conualescere: eandem cum Cypero & Dracontez semine tritam & cum melle impositam, canceromata, quæ in matibus nascuntur, emendare. Plinius lib. 25. cap. 8.

Radice. Aristolochias radice valere tantum scripsit: rotundam omniam esse medicamentum, sed oblongæ radicem tenuiorque graviorem, vnguentis nardinis conuenientem. Maximè tamen laudat Ponticam: & in quocunque genere ponderosissimam quæque medicinis aptiorem. Rotundam contra serpentes. Oblongam tamen in summa gloria esse, si modò à conceptu ad mota vuluis in carne bubula, mares figatur, vt traditur: Reliqua quæ sparsim habet cum ex aliis hic recensentur studio prætermittimus: Is verò tandem lib. 4. conclusit plurimis modis Aristolochiā prodesse: nam & menses & secundas ceteras vulvas quoque; procidentis inhibere foto, vel subiectam maximè tenuem.

Tempor. Asthma. Melius omnes quidem calidas esse concedit: in principio ordinis tertij, siccas secundo: longam tamen calidiorem iudicat, quamvis terreæ in ea substantiæ plus sit, quā in rotunda, quæ ob id tenuioris est substantiæ, & ad omnia efficacior. Vtraque tamen obstructions aperit, resoluit, atrahit, spinas extrahit, & lignorum fragmenta carni infixa, tenuat: sed hæc omnia rotunda magis ob dictam prius causam: pituitam purgat, & quorundam sententia etiam bilem, milturacem quoque & pulmones pituita etiam putri expurgat insigniter: quæ propter usum hominæ & asthmatis etiam antiquo maximè prodest quouis vsu modo, vt etiam si usui & Astolochia quoque, præsertim rotunda, cerebrum expurgat, ob id epilepsie confert: stomachum etiam eadem iuuat, singultu à flatibus constitutum. Hos enim non modò à stomacho, sed & aliis visceribus dissipat, horumque obstructions liberat, & natos inde dolores sedat, præsertim cum oxymelite radicato. Omnis autem Aristolochia vterum à partu expurgat, menses mouet, abortum facit. Rotunda præter hæc vlcera maligna, fistulas mirè iuuat, quia terget, & carne implet. Podagram quoque & musculos contusos cum melle & pauco sale emplatri modo adnota, iuuat: cum hydromelite verò curat aurium vlcera & auditum roborat. Accutum denique cui incocta est, gingiuas adstringit, & putredinem ab his auferit: dentes quoque conficatu deterget. Rigori etiam febrili remedium est singulare. Purgatio non nocet, sed visceribus confert. Quod ad alia attinet, vt Dracunculus corrigenda. Coqui terique plurimum potest. Datur à drachma vna ad aureum vnum.

Vinum in quo decocta fuerit Aristolochia, mundificat vlcera putrida & sordida præsertim genitalia, si ex illa decoctione colluantur, quod vt felicius exequatur, radicem in puluerem redactam inspergere oportet. Idem vinum admixto modico mellis, calidum auribus inditum, parotidas earum sanat, dolorémque mitigat, inquit Tragus. De electuario Aristolochiæ vide Clementinum de med. met. cap. 6.

Radice. Rotundæ radix (addit Lobel.) jam valde nota Italiæ & Galliæ Narbonensi: sed non perinde in usum deducta, ac potius Chirurget, quā Medicis, magno sanè dedecore artis, & incommodo ægrotum: iis enim maximè commendantur Indiciæ merces, plerumque tempore vitæ, aut carioles: hæc autem nostratitia recentissima ignorare non pudent. Tam efficaces quippe sunt longa, & polytrichon præsertim, vt radices vtriusque parti momento, partim intro datæ, partim in pessario admotæ, elicerint forum, jam seculidie frustra etumpere conatum, scetusque inuoluta lacerata, ac enixam puerperam, tridui cruciatibus penè enecatam: eoque multus omnium vsus apud Mon-

pelles fer. Polytrix quidem Aristolochia, indicat Dioscoridi, & incognita Commentatori, radices, in vsum Rondeletius reuocatur, propter plantæ ignorationem iamdiu defunctum, & tamen præferendam reliquis duabus, tum sua aromacitate, tum medica efficiacore facultate, cuius causâ meritò Andromachi & Galtheriacis aptiorem præ rotunda & longa præceperant: at vtrumque de odore & sapore exploranti, multò ignauior comperitur Clematidis, quàm falsò reuonem apud antiquos Theriacæ scriptores, vocatam putabant Itali.

Ex Macri poëti de Aristolochiæ vitibus liceat etiam coronidis loco hic aliquid addere.

Aristolochia species tres dicimus esse:
Longa prior, radix est cuius longior auctor:
Ditâ Rotunda sequens, quid sit radice rotundâ:
Tertia Clematidis græco sermone vocatur:
Viribus hæc penè par dicitur esse rotunda.
Omnes vim calidam, sicamque leguntur habere.

In primo vix sicca gradus, feruensque secundo est:
Pelliferos morsus cum vino sumpta rotunda:
Curat, & assumptus prodest sic hausta venenis:
Hocque modo tardas educit sumpta secundas,
Cum pipere & Myrrha putredine mundat ab omni: &c. que supra in aliorum tum Veterum tum Recentiorum soluta oratione factæ & profusa.

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA altera.




Multâ æsumo radicâ capite proferre scitabat in ob. Plateus qui anno 1600. illius aliquot ramulos cum icone ipsius manu delineata, additis quibusdâ notis, descriptionis huius authoris Clusio mittere: tenuia sarmata pedem aut plus vel minus longa, angulosa, striata, ramosa lenta, fractu contumacia, humi parua, & ex atro virentia, in qui-

bus incondito ordine nascuntur folia necuosa superiori similia, magis tamen mucronata, & ad Simlacis asperæ foliorum formam quodammodo accedentia, minora, atrâque & immarcescibili viriditate prædita, oblongis pediculis nirentia, è quorum sinu nascuntur longi cauique flores, Aristolochiæ longæ floribus formâ similes, saturâ tamen rubedine foris magis distincti, interne verò aliquantulum flanescentes, oblongisque pediculis inherentes: his succedit fructus Aristolochiæ longæ fructui non dissimilis, sed minor: numerosas autem hoc genus habet radices, nitar præcedentis [Pistolochiæ, sine Polytrix] vel Simlacis atque viciu graci ore, & abus quibusdam tenuibus donatas, odoratas. Flores profert monebat Iulio & Augusto.

C. Bauh. pin. Aristolochia Siliqua. C. Bauh. pin. Cretica: Pistolochia altera. C. Bauh. pin. hist. ap. 1. Cretico semine nata.

ARISTOLOCHIS SIMILIS RHASVI & Rhumigi Maurorum.

Aliquem spirat odorem sed ingratum. Ex Descriptio radice feruili prodeunt plantæ quatuor albicantes, filli modo tenues ad radicem, ex quibus parte supernâ hærent foliola vtrinque septem aut octo, cinerea; oppositâ verò magnitudine, & situ folis Ficus Romæ respondentia: nisi quod vixit imò auita sint ad instar Saluæ minoris. Inter quorum ima, & perior, bes magis aliquantò inter se distantia, flores hærent Aristolochiæ similes, parvè maiores, colore magis fuscâ, longioreque pediculo. Radix aliè depacta, est qualitate sicca calidâque, vt amaritudinem eius doce-



reputat Rauholfius in I. in. part. 1. cap. 9. vbi ait incolas Halepi vocare Rhasut & Rhumigi: Item part. 4. icon. N°. 121. Peregrina incognita herba, Maurit. Rhasut & Rhumigi. Hist. Lugd. p. 29. append. Maurorum Rhasut & Rhumigi non incommode ad Aristolochias referri posse existimat. C. Bauh. phyt. Synon.

Aristolochia 8. siue Aristolochiæ similis: Eid. pin. Aristolochia 9. siue Maurorum: Aristolochia peregrina Rauvvolfii. Clus. hist.

TVSSILAGO. CAP. IX.



Dioscorides Tussilagini (Eid. Descript. xlv) folia tribuit Hederae [xlv: pistolochiæ], hederaceis vet. similia, maiuscula, fenna, septenâue, à radice prodeuntia, inferiè subalbida superiè verò virentia, pluribus angulis prædita: caulem palmi altitudine: florem ex luteo alio colore, qui verno tē.

pore prodit, at quæprimūmnā cum caule amittitur. Ex quo factum ut nonnulli herbam hanc sine caule ac sine flore esse existimauerint. Radicem tenuem, nec superuacuum. Natales circa scaturigines aquarum, & rigua loca.

Plinius.

Tussis sedat Bechion [inquit Plin. lib. 26. cap. 6.] quæ & Tussilago dicitur. Quo eius genera. Siluestris ubi nascitur, subesse æque credunt: & hoc habet signum aquileges. Folia sunt majuscula, quàm Hedera, quinque aut septem, subalbida à terra, supernè pallida, sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. Quidam eandem esse Bechion [Arcion M. & CH.] & alio nomine Chamæleucen putant. Huius aridæ cum radice fumus per arundinem haustus & deuoratus, veterem sanare dicitur tussim: sed in singulos haustus passim gustandum est. Altera à quibuldam Salvia (Quidā volunt hinc describi Sphacelon Theoph. quidam Stachium vulgarem: alij Horminum vulgare: quidam, Æthiopia pectoris morbis vtilissimam, Dalech.) appellatur similis Verbasco: coniecitur ea, & colata calescit, aqua ita ad tussim lateilique dolores bibitur: contra scorpiones eadem & Diacones marinos efficax. Contra serpentes quoque ex oleo perungi ea prodest.

Hermol. n. s. ut Plinius.

Hermol. Coroll. 55. Bechion siue Bechicon quoque duo genera habere ait, & siluestre Plinium aliter, quàm Dioscoridem describere folia eius tradendo supernè pallida, subalbida à terra, sine flore, sine semine. Alteram à quibuldam Saluiam dictam, à Dioscoride Verbascum siluestre dici parat. Priorem verò quosdam Arcion, & alio nomine Chamæleucen ab Italis Farsugium appellatum, folio Populi, sed ampliori, nascens juxta fluuios, vnde ab iisdem Populago dicta sit. Sed hanc & Farsariam vocari, Dioscoridem testem esse, à fluuiis fortasse Farsaro, quem Virgilius in Sabinis Fabarum appellat. Plautus, dissipabo, inquit, te vi folia Farsari.

Ruell.

De Bechio Ruellius hæc scripsit: Latins Tussilago, aliis Farsaria, nonnullis Populago dicitur: florem verè pallidum sustinet, breui cum suo caule deciduum: atque hinc data credentibus occasio, sine caule atque flore hanc herbam nasci. Quare obseruandum diligenter, caulem & flores Tussilaginis esse fugacissimos, iisque enatis breui vigor vitæque durat, longissimæque mora biduum: post quod illud tempus flaccescentes euanescent, & caduci marcent. Quare non nisi iis, qui medio Vere sese fortunâ ferunt obuiam, & fls & caulis cernitur: namque die vno locum vniuersam caule & floribus pube-scere videre licet, postridie prorsus eos contabuisse, frondæque solâ virelere, quapropter sine caule & floribus nasci plerisque, qui tam citam caulis iacturam non conspexerunt, creditum est [imprudenter naturæ negantibus quod obseruatum non fuerat, inquit Marcellus.] Plinius porrò duo Tussilaginis, siue Bechij genera facit siluestre sc. & alterum Salvia dictam, quod à Dioscoride Verbascum siluestre dici puto. Dioscorides autem vno Tussilaginis tantum genere contentus est. Tussilago herbaris & officinis Vngula caballina dicitur, vulgò Para equina, à foliorum cum vngula caballina similitudine. Hallucinatur itaque [ait cap. 123.] qui Vngulam caballinam vulgò dictam Arcion esse sentiunt, Ruellium sequuntur Ryff. Dodon. & H. Lugdunensis.

Arcion non est.

Porrò aicidè Marcellus, corruptè legi credo in nothis appellationibus Richion [sic] & pro elegendum Bechicon [sic] ab eadem tussi faa

cto nomine. Sunt & alie Appellationes nothæ quarum nondū reddita ratio. Sunt enim qui Petrinam seu Petrinè [πετρινή] qui Pegano [πέγανος] h. e. Rutam qui Pithion [πίθιον] qui Pagonathon [παγονάθων] qui Procheton [πρόχητον] qui Acrophyllo [ἀκροφύλλον] Sarac. vocat. Ægyptiis Saatha (σααθα), Saatha legit Marcell. Romanis Tussilago (τυσσιλάγω) seu Farsaria (φάρσαρη) aut Pustulago (πυσταλάγω): suspicatur legendum Populago, Sarac. Bessis Asa [sic] licitur.

Humelbergius videtur Tussilaginem [Roff. höff vocat] Arcion facere, ibidemque obscurè omnia tradere, ut fusiū in capite de Personatia dicitur.

Sibi contradicendo hallucinari deprehenditur Brunfelsius. Ait enim tom. 1. rhaps. 4. Personatiam & Lappam, vocari Vngulam caballinam. Postea verò dicit lanensem & Pandectarum scriptorem ignorasse Vngulam caballinam, & impossum illis à Plinio: quoniam alicubi Lappam vocet Personatiam. Addit se opinari illos non legisse quodnam esset Arcion apud Dioscoridem: Hoc ad vnguem prorsus quadrate descriptioni Vngulæ caballinæ: ac secum habere Barbarum.

Cornarius scribit Plinium esse ex eorum numero, quos Dioscorides redarguit, tum hoc de Bechio capite, tum in totius operis præfatione, ut qui falsò opinatus sit, Bechion sine caule, sine flore, sine semine esse. Addit præterea in Dioscoride errorem subesse, esse manifestissimum: Et pro hisce λεινὴ ἄχνη, legendum esse ἄχνηος. Cuius correptionis assecram habere Fuchsum. Bechion notam esse & officinis & vulgo, non tamen græco Bechij, nec latino Tussilaginis nomine, sed Vngulæ caballinæ appellatione.

Tussilaginem Petasiti quoad folia in initio ad ed similem asserit Tragus, vt discerni vix possint, nisi quis diligenter animaduertat, & consideret flores, & substantiam vtriusque, quæ ex vtrius descriptione petenda. Germani, addit, hanc plantam Brandt satti, h. quasi ambustorum Lactucam, quod ambustis & inflammationibus quibusvis medetur: & Roffhuth, hoc est Vngulam equinam, à foliorum cum vngula equi similitudine: & nonnulli Brandtschsch, h. e. Arcion, & Personatiam (sed quàm rectè ipsi viderint) appellant. Plinius Tussilaginem, Cacaliam, Farranum, & Farsugium cognominat, quibus vocibus maxime duobus posterioribus errorem subesse puto, rectius enim Farsarus legeretur. Vides igitur vnam & eandem herbam quamplurimas obtinere nomenclaturas, &c.

Bechium & Chamæleucen diuersas esse plantas, Turnerus sic ostendere conatur, Chamæleuce, dicta etiam Populago, Farsugium, & Farranum, non eadè est planta Arcio & Diosc. Videtur enim Arcius Chamæleucen Bechio eandem facere: ita reme iis enim contra tussim, eandem tribuit vires Chamæleucæ, quas Dioscorides Tussilagini seu Bechio: cumque Galenus & Paulus duobus distinctis locis de Bechio & Chamæleuce scribant, Arcius Bechij penitus non meminit, sub Chamæleuce, vt mihi videtur, complexus. Plinius quoque suo tempore ait, fuisse qui Chamæleucen & Tussilaginem pro vna eademque haberent. Et in spuris Dioscoridis, Tussilago Chamæleuce dicitur, etsi apud Dioscoridem duæ diuersæ sint plantæ, agit enim de iis, duobus distinctis libris & capitulis. Chamæleuce quidem folia tribuit ini de reflexa, atque ramis esse prædictam: Tussilaginem autem folia habere plana & recta

alp. 2. glabro folio cognominat. Et hæc, illo i plomet teste, à Tussilaginalp. 1. flore aperto in hist. (2. in Pann.) folio glabro, ceu & altera flore euano (1. in Pann.) haud parum differt. Quæ occasio vt vnicam demus imaginem, ex plantis Tussilaginis tomentosæ, quas habemus.

*Lob. duar
habet unico
titulo.*

*Cetera syno-
nyma.*

C. B. not.

*Locus &
Tempus*

Lobel. etiam in Ic. Plant. p. 190. pingit vtramque Tussilaginem alpinam Clusii in hist. hoc est, primam & secundam: siue folio canescente, & glabro: siue cauliferam & caule viduam, vnâ folia, Tussilaginis sc. motanæ minime, inscriptione. Quæ caulibus destituitur, dicitur à Lobelio in Obl. p. 311. Tussilago montana minima foliis Soldanellæ alpinæ, auersâ parte tomentosa. H. Lugd. p. 1052. Tussilago montana minima Lobelij. C. Bauh. pin. Tussilago 2. siue alpina rotundifolia (serè addit in phyt. vbi quartam facit) glabra. Caulifera vocatur apud H. Lugdunenlem p. 1052. Tussilago altera alpina Clusii (sic & Cam. hort.) in Pann. quippe Observationibus. Est enim ei in hist. Tussilago alpina 1. vna flore aperto, & altera euano, & non candido, vt legit C. Bauh. in pin. vbi vocat Tussilaginem 3. (5. in phyt.) siue alpinam rotundifoliam canescentem, Tussilaginem diuersam à vulgari, foliis minoribus, & solidioribus, Gesn. fr.

Tussilago alpina canescere folio Clusij oritur in summis Austriæ & Stiria iugis, & totos interdum cespites occupat. Sub Iunij finem vt plurimum floret, interdum verò tantum Augusto mense, pro æcis ratione & constitutione, in hortis maturius, Aprili videlicet, in quibus etiam cauliculus magis adolefcit. Tussilago alpina glabro folio inuenitur in superiore collis parte post monasterium Neuberg ad radices cellissini iugis eiusdem nominis. Obseruatur etiam in inferioribus iugis aliarum Alpium, gramineis locis. Maio floret in hortos translata & Aprili, vbi formam non immutat, quemadmodum nec superior. Huius autem cauliculus paulò longior est superiore. Ego in Rhætia monte Braulio adolefcens inueni florentem mense Iulio: postea Geneuæ in Allobrogum monte Thuri Iunio. Ibidem in hortum translata folia producebat Martio, & florem Maio. Iunio semen in pappos abibat.

Clusius tribuit vires Tussilaginis.

ASARINA MATTHIOLI FLORE AN- themidis, tribecentia Tussilagini alpinæ

CAP. X.

Descriptio.



Si planta in Bohemiam montibus nascens, quam Asarinam vocare libuit Matthiolo, quod Asaro congener videatur: Repit hæc humi folio Asaro rotundiore ac scabriore, leuiter circum serrato: cauliculus pilosis: floribus melinis Anthemidis modo, sed longè minoribus, haud

inodoris: radicibus tenuibus, longisque, summâ tellure repentibus, acuto gustu, quadam cum leuicula amaritudine.

Miror Marthiolum passim in comm. non clariùs indicare, quales sint flores: ait quidem esse melinos Anthemidis, sed non indicat, an in totum, vel solo disco, quod cuperem intelligere ab Herbario perito.

Ceterum, dicitur Asarina Matth. Cast. Taber. & Gerardo: Asarina Matthioli H. Lugd. p. 916, & Clus. pan. & hist. Asarum 2. siue Asarina foliis Afari C. Bauh. phyt. apud Matth. & pin.

PETASITES VULGARIS RVBENS rotundiori folio.

CAP. XI.



Caulis primò omnium erumpunt dodrantales plùs minùs, concaui lanuginosi: foliis angustis, acuminatis vestiti, qui in thyrsum fastigiantur florum purpureascentium, in pappos tandem euanescentium, quorum delapsui succedunt marcescente caule folia Petasitis magnitudine, ad pe-

diculum falcata, rotunda serè, & in ambitu duntaxat serrata, non angulosa vt Petasitis alba: infernè lanugine incanâ pubescentia, supernè obscurè viridia, nec penitus tomenti expertia: radix crassa amarescit.

Hermolaum hallucinari manifestè colligitur ex iis quæ sequuntur. Arcion [inquit Coroll. 711.] siue Prosopites, Personaciam quidem in latino sonat. Sed pro Petasite capitur à Plinio, dicente: folio Personatæ nullum est latius, grandes lappas ferentis: quas non in Arcio, sed in Petasite cernimus. Petasitem interpretor, quam vulgò Bardanam & Lappam maiorem vocant: Arcion, quam Vngulam caballinam dicunt. Plinius differentiam in nomine tenuis constituit, Petasitem, Personatam; Arcion, Perfolatam appellando: &c. Animaduertis, credo, Hermolao non probè perspectam fuisse differentiam inter Petasitem vocatam plantam, & Personatam, quæ Lappa maior dicitur.

Tragus refert hanc herbã Germanos Kospay-pel, h. e. Malvam equinã, vocare propter amplitudinem foliorum, & Vesilcats wurtz, h. e. Pestilentialium radicem, propterea quod experientia comprobatur sic misicè pestilentialibus febribus conferre: Latinis posse Galeritam dici. Is si foliorum amplitudinem intuetur, & Aristoteli quidem Dioscoridis esse suspicatur. Sed cum vires & odorem exactius considerat, Costi genus esse affirmat. At hanc Tragi opinionem Cordus in Diosc. omnino improbandam censet.

Matthio-

Matthiolus pigrit in prioribus comm. libro 4. cap. 102. Personatæ alterius inscriptione, sine caule tamen. Fuchiumque & nonnullos alios Recentiores reprehendit qui Petasitem esse hoc Personatæ genus existimant: Ipse Persolatam Plinij esse volens. In post. comm. Ital. lib. 4. cap. 109. mutavit omnino sententiam Matthiolus, nec hanc amplius Plinij Persolatam facit. Cap. verò 110. Petasitem [vri & olim] negat, dicens vanam eiusmodi opinionem, à se demonstratam tom. 1. epist. Et repetit tom. 3. Petasitem hanc esse Plinij Personatam, ac maiorem Tussilaginem potius existimat, ibidemque apud Dioscoridis existimare videtur. Lib. 3. in Dioscorid. cap. 120, in com. Ital. picturam exhibet cum flore & descriptis, vocans Tussilaginem maiorem. In histor. germ. inscribit Tussilaginem maiorem, Petasitem vulgò dictam non Dioscoridis appellandam, sed Tussilaginem magnam, imò maximam.

Camer. ad Hist. Matthioli germ. pulchram habet figuram. Eidem in horro dicitur, Petasites flore purpureo, & odorato, quem matrem vocant.

Patrocinium Ruellij contra Matthiolum suscipit Turnerus. Matthiolus, inquit, abique omni ratione de hac plâta caput Ruellium & Fuchium. Amatus Lusitanus Matthioli simia, in doctis & mendacius ipso Matthiolo scribit in hunc modum. Quid Petasites sit ignoramus, nisi fungi genus sit. Ruellius in Gallia nasci refert, &c. Non novit Amarus Petasitem, nisi fungi genus sit, & tamen germanicè vocat *Petasites* *Wirtz*, perinde ac si nosset. Scilicet, dignus qui in Dioscoridem commentetur. Fuchius pro Petasite non proponit Lappam maiorem, vt falsò ei imponit Amatus. Proposuerat enim *apuley* verum, seu Personatam, vocans *Großletten*, multisque modis à Petasite distinguit. Probet Matthiolus, & qui eum sequitur Amarus, Dioscoridem duo facere Personatæ genera. Quod si nequeunt, quemadmodum certò scio minime posse, irrita quæcunque contra Fuchium declamant. Citat Plinium Matthiolum, vt probe duo esse Personatæ genera. Sic ita. Non sequitur tamen Petasitem Fuchij esse Personatam alteram Plinij, neque etiam Dioscoridem duo facere Petasitis genera: Sæpe enim Plinius plura facit herbarum genera quàm Dioscorides. Porro quàm iniuste duo faciat Arcij genera, non solum Leoniceus, sed etiam omnes viri docti vident, ac nullam eiusmodi causam ei à Dioscoride præbitam. Quàm redè Plinius à Matthiolo contra Leoniceum defendatur, facile perspicitur quicunque sine affectu iudicabunt, quàm parum honestè & prudenter faciat Matthiolus. Sed esto, age, duo sunt Atoij genera. Primum non potest esse Petasites Fuchij, quia lappas habet in cacumine, culusmodi non habet Petasites Fuchij, cum Arcion Plinij, vt in eo perspicue videre est, maiora habeat folia, quàm Cucurbita: at Petasites Fuchij longè habet candidiora folia, præsertim parte inferiore. Petasites ergo Fuchij [quæ vera est Petasites Dioscorid.] Ruellij, Dodonæi, & mea, non est Arcion alterum Plinij, quicquid blateant Matthiolus & Amatus.

Sed & vtiq; similes sui negotium ex negotio ferunt studiosis, auctore Lobelio: Qui Tussilaginem asserunt, Petasitem negant, plantam illam in pratis palustribus primo Vere crescentem, atque nondum foliis ortis

Tom. III.

caulem exigentem. Commenratori silentium indixeris, qui dom nihil habet quod illinat paginis, in minutis istis obtrepit bonis viris, nec quid quouè modo scribat, de facultatibus nostris certioribus quicquam pensi habet. Leniusculo argumento deceptus fuit, qui rebatur propter communia natalicia & florum anò foliorum egressum esse eandem Petasitem & Tussilaginem, quasi non idem contingat Trifolio hederaceo, Cicco sylvestri, Ephemero, & aliis.

Hermolaum per Vngulam caballinam Petasitem accipere testatur Cæsalpinus, qui Chamæ-*Chamæleucen* leucen Plinij, sine Farsugium à Tussilagine haud *est Tussilago* differre scribit, suspica utque esse Nenufarum apud Auicennam, cuius flos similis Eupatorio ab eodem traditur. Sed Eupatorium Auicennæ habet flores luteos vt Nymphaea, Petasites autem hæc floribus conspicitur purpureiscentibus. Illos præterea cum Turnero *esse statuere* videtur, qui Petasitem cum Persolata Plinij, siue Græcorum Arcio, eandem significari voluit, vt pote herbam ab utroque Arcio longè diuersam.

C.B. Chamæleucen Plinij & Petasitem Dioscorid. ad hoc caput reduxit. *Malo tamen ego cum Her- C.B. not* mol. Trago, Cordo, Geinero, Lob. & Cæsalpino Chamæleucen Plinij ad Tussilaginem referre, cui folia simil ora Populo, qualia requirit Plinius, quàm Petasiti. An verò cum Petasite Dioscoridis eadem sit, jam non asserim.

Petasites vulgò credita planta, inquit Clusius, doctiorum omnium iudicio, inter Tussilagines referenda, & à foliorum amplitudine Tussilago maior nominanda. Eam alio flore variantem aliquando videre memini.

Lobel. Obs. p. 321. Petasites, Tussilago maior Matthioli; Et, Petasites sine flore. Ic. Plant. pag. synon. 591. & Dodon. Petasites, Et Petasites sine flore. Tabern. Petasites: Tussilago maior, Icesu, Petasites cum flore. C. Bauh. phyt. Petasites 1. siue flore punicante: Bid p. in Petasites 1. siue maior vulgaris: Petasites Trago, Fuch. Ang. Turn. Dod. Cordo hist. Gesn. hort. Lac. Lon. Cæf. Lugd. [H. Lugd. p. 1053. Petasites magnus, perperam Tussilago maior Matth.] Tab. Ger. Clus. hist. Petasites flore punicante Thal. mas Cam. Tussilago maior, Matth. Cast.

Veraciter ab amplitudine folij, *et* *et* siue gal-*Nomia* lerum referente, vnde & Galerita. Germanis *Pes* *linguat* *stilen* *vurp*, quod, vt dictum, eius radix præsentaneum sit contra febres pestilentes remedium: Belg. *Soefbladern*. Pestilence wort: teln: Gall. *Herbe aux tigneux*, & *Espec de Naples*: Ital. *Cappella*: Hisp. *Sembrera*: Angl. *Büttel* *bürre*.

Cæsalpino referente, Petasites in alpinis nascitur, locis rignis, copiosa in vallè vmbrosa *Locus de* *Tempus* *He* *truriz*, quæ pratum magnum vocatur. Abundè in Pannonia, Austria & Soria spontè nascentem reperit Clusius: In humidis propè flumorum ripas, juxta lacuum & stagnorum margines ac vicinos aggeres Dodonæus. Circa Calendas Aprilis spica cum floribus viger, sequuntur inde folia in Hyemem vsque permansura, nouis subinde subnascentibus. Lugduni etiam Februatio, & vt quoque Geneæ, Martio florebat.

Petasites albus Anguloso folio.

Petasites leucanthemus radicem habet vili-*Descript.* dam, crassitudine pollicari aut maiore, lon-

gam, proserpentem, geniculatam, nonnihil ad calami officinarum radices accedentem, cortice rubro rectam, cui alius subest lignosus, & in medio cartilaginea matrix alba, gustu calido, aro-



instar caulem fouentia: in summo caule flores ante folia multi simul congesti, albi, quorum singuli componuntur ex floribus plurimis quin queparitis, in medio fibrillâ pallidâ donatis, multis foliis viridantibus circumdantibus: folia angulosa, infernè densiore lanugine quàm superne tecta, albioraque, ex pediculis longis lanuginosis, albis, statim à radice exortis appenda.

Hunc quem Petasitem 2. siue minorem flore albo vocat in pin. nescimus cur Casp. Bauh. in phy. contra Camerarii sententiam inodorum vocet. Est Petasitis flore candido Clou. hist. & Thal. Petasitis odorati flos, H. Lugd. p. 1054. Hæc videtur nobis in app. p. 16. sub titulo Aconiti Pardalichæ prius desubere Petasiten album, ac flores folia præuolentes figuræ Martioli appingere, in qua folia Doronici & radix fictitia.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. se multiplicat rependo: flos Martio & Aprili.

Radix Petasidis dubio procul sicco & calido est temperamento, ideoque aduersus omne venenum vniuersum est, potius partibus adh. beri efficaciter potest. Hæc verò posse, amaritudo eius euidentissimè demonstrat: siuis enim saporis amari est abstergere, sicuti Galenus lib. 4. de simpl. facult. cap. 17. fusiùs docet. Pestilentialis radix dicitur, propterea quòd experientia comprobatur si radicem hanc mitificè conferte pestilentialibus febribus, quòd sordorem vehementer moueat, si in puluerem redacta in vino (vt decet) fumatur. Nec minori efficià bibitur à mulieribus, quas vteri tormina & præfocationes exerceant. Facit & ad latos ventris vermes, qui femina Cucurbitarum referunt, ex vino decocta & pota: succurrit is qui spiritus difficultate laborant: vrinam & menses ciet. Radix siccata in puluerem redacta, efficax est ad quæuis fluentia & præhumida vlneta: Oleum ex hac radice confectum, si illo inungantur febricitantes ante accessionem febris, apprimè conducit. Idem & ad reliquas cutis feditates facit & perfrictionibus nequiorum & membrorum vincè prodest. Non desunt etiam veterinarum quidam, qui eius-

modi radice vtuntur aduersus vermes, qui equos molestant, & alios ipsorum, tam interiores quàm exteriores morbos.

Petasitis Indica.

Tamet si Petasidem adumbret, ortu & ambitu exactè circinato, vargrandis foliis galerum ferè æquantis: nihilominus cespice radialis amplexo, multa sobole lateratim repallulante, & caules fundente, aut potiùs fol. pediculos bicubitales, culmosos, medullosos, singulis singulo folio he- rente, anfractuoso, lunarium sinum pediculus fulcit, vt in Bardana: fungoso cespice, carioso, & superne densè circum caules, vt Meum comante, maximam Osmundam æquante, lorulis vilmineis subtus late fufis, gustu sicco adstringente: auulsam hanc ex annosa arbore, ni fallat memoria, dicebant Lobelius & Pena.

CACALIA SIVE LEONTICE VETERI- bus & in genere.

CAP. XII.

Cacalia siue Leontice κακαλία οἱ ἡ λεοντική Diosc. folia proferit candida, prægrandiaq: è quorum medio caulis emicat rectus, albus: florem ferè Beionia similem [scilicet], quæ vox in antiquo non legitur, Lac. Quin & vulg. exempli pro spuma leguntur & πῦρ ἰακία. Nascitur in montibus. Huius radix in vino macerata ceu Tragacantha, & delincta, commanducatur per se, tussi & arteriæ scabritiei medetur. Grana verò quæ post excussum florem subnascuntur trita & cerato excepta illitq:, extendunt cutem in facie, eamque à rugis vindicant, id tradente Diosc.

Aliter hæc Plinius recitat quàm Dioscorides. Cacalia [inquit lib. 21. cap. 11.] siue Leontice vocatur: semen Margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferè. Huius grana xv. in oleo macerantur, atq: ita aduerso capillo caput vngitur. Radix [addit lib. 26. cap. 6.] Cacaliæ commanducatur, & in vino madefacta, non tussi tantum, sed & faucibus prodest. Cap. 17. Cacaliæ grana mista ceræ liquida, extendere cutem in facie, erugacæque scribit. Et hæc magna ex parte consona sunt his, quæ Dioscorides habet.

Galenus Cacalliam non habet, sed Cacanum eandem appellare videtur, Cacaliæ voce suppressâ, quod mirum est, quum aliâ vnam atque alteram appellationem, teste Cornario, libenter adiciat. Quòd autem Cacanum legendum sit in Galeno, & non Cacanum, velut exemplaria vulgata habent: & quòd Cacalia eadem sit, quæ Cacanum, ex Paulo patet, qui apertè habet Cacanum vocem, & Cacalliam expresse dicit: quum tamen eandem esse dicere debuisset, siquidem eandem Galenus facit, in eo, quòd eadem de Cacanum, quæ Dioscorides de Cacalia prodit, nisi locus sit mendosus. Galeni verba hæc sunt: Cacanum radix vim habet mordacitatis is exortem, & moderatè siccatem: substantiam verò crassarum partium meatus abducentem. Vnde in vino macerata, velut Tragacantha, & delincta, arteriæ asperitates sanant. Nec minùs etiam si quis manducet ipsam: defluens ab ipsa luccus arteriæ similiter velut Glycyrrhizæ succus prodest. Quòd porro Bacani vox, pro Cacanum supposita sit, aliquot locis apud Paulum & Aëtiū lib. 3. cap. 46. Dolabella- rum in Paulum abundè ostendit Cornarius. Et tamen neque sic satis constat de Cacalia, siue Ca-

H. Lug. not.

Iocus &
Tempus
Vires &
vius

Vermes &
quorum.

eano, quæ sit hodie herba censenda, quæ vsum illum exhibeat.

Galenom & Paulum de eadem planta, diuersis locis, sub diuersis nominibus, Cacaliæ sc. & Canoni pettractasse, perhibet Guilandinus in Theone. Quin & Eur. Cordus Cacaliam eandem cum Cancano statuit, & non diuersam vt Æginetam putasset.

Ceterum, quæ Atacali, de qua lib. 12. H. n. actum est, conueniunt, Cacaliæ Plinium tribuisse, falsò sibi persuader Amatos. Cacaliæ Licholpermium nigrum malè statuit Tragus: Liliæ conuallium Lonic. & Reginus. Perfoliatam alij perperam, teste Anguillio. Perperam etiam alij Agrostis Carni, teste Cord. in Diosc. Cacaliæ dici de Tussilagine apud Plinium, author est Tragus. Rob. Constantinus in Lexico, κακάλιον inieciatur Narcissum. H. n. lib. 19. Galenum de Cacalia sub Cancano tradidisse refert Amatus. Sed non demonstrat quam per Cacaliæ intelligat.

CACALIA QVIBVSDAM.



Vulgò Cacaliæ vocant in summis montibus iugis, & ad eorum torrentes nasci solitam plantam, caule cubitali, & bicubitali, in ramos circa cacumen aliquot diuiso, striato, hirsuto, meduloso: flores summis ramulis confertim coherentes in mucosum modum, purpureascentes, quæ raris foliolis constantes, stilo longiusculo prominentes, qui in pappos

abeunt, semine appenso paruo, oblongo: folia plerumque multò minora, quàm Pentalidis, interdum ferè paria, non multum tamen abumilia, ad pediculi insertionem fuscata, circumscriptione rotunda, serrata, sed & angulosa, infra tomentosa, candicantia, suprà verò glabra: radix minimo digito suppar plurius capiti fibris longis capillata.

Alterum Cacaliæ genus, læuorem tollit caulem, folia similia, sed vtrinque vtriusque, nec villo tomento obfusa: flores iidem ferè, ni diluore purpurâ niterent.

Apud Amatum lib. 4. cap. 124. Cacalia pingitur, & in fine operis eadem figura ponitur ex Dalechampij figuris. Amatus tamen Cacaliæ hanc non tradidit, annotante propriâ manu Casp. Bauhino.

Anguill. est Pentalis montana, in monte Baldoproueniens: Vnde etiam se habere ait C. Bauh.

De hac Clusius in pann. & hist. Ad Tussilaginis genera haud dubiè referenda est planta illa, quæ à nonnullis Cacalia appellatur, cuius duo genera obseruantur, sc. Cacalia, v. l. aris incano folio, l. aporis ingratis, amantia cul. & calidi, flo-

Tom. III.

ris odore admodum tenui, sed non ingrato. Cacalia 2. glabro folio, magis cutaneo & duriore, superiè saturatius virescente, nec subtus incano, nec anteriore parte simul coërente, vt in p. ori, pediculòve striato innitente, sed rotundo & læui, non minus tamen venoso, & in ambi. u. serrato. Obseruabam & aliam quandam plantam in montanis pratis nascentem, secundum viliatum statuta, cuius folia postremæ Cacaliæ foliis valde erant similia: neque radix etiam erat dissimilis. Verum dæuor illam semper deprehendi: nec vnquam ab illis montanis hominibus intelligere potui, florè mne ferat, an non. Tameris porò dubitari possit, an quæ Cacaliæ nomine vulgò agnoscitur, cum Cacalia Dioscoridi descripta, & Pliniana conueniat: facultates tamen vtriusque Cacaliæ tribuit, à Tussilaginis (cuius haud dubiè hæc Cacalia genus est) facultatibus non alienas. Hætenus ille, qui duas icones habet Cacaliæ incano folio & Cacaliæ glabro folio.

H. Lugd. p. 1052. iconem proponit cum hac inscriptione: Tussilago alpina, siue montana Dalechampij, addens alios herbarios duo à Tussilaginis genera facere, & à natalibus Tussilagines alpinas vocare.

Cacaliæ [vt vocat Lobel. in Ic. Plant. p. 592.] multum Pentalidis assimilari, & his præterea, eamque etiam odore quadantenus imitari, dixit Lobelius. An verò Cacaliæ, amb. g.

Io. du Choul. deser. mont. Pilati p. 71. Cacaliæ species; & p. 87. Cacalia Ghini passim in nemore Pilatino, foliis laciniatis, aerea parte candicantibus.

An sit Cacalia veterum quærere & dubitat C. Bauhinus: atque Cacaliæ tres facere videtur species: Cacaliæ scilicet tomentosam, Cacaliæ hirsutam, Cacaliæ glabram, & Cacaliæ congenerem plantam Clus. Pann. & hist. Rectè autem in pin. Tussilaginem alpinam Dalechampij, Cacaliæ iunxit, & à Tussilagine, quod in phyt. non fecerat, separauit.

In omnibus Austriacis, Stiriacisque iugis ad siluatum margines, inter frutices & vmbrosos locis obuia Cacaliæ genera Clusij. Cacaliæ Lobelius in Galliæ Narbonensis cello monte Calcaris nuncupato primum vidit, prope illius montis verticem, qui D. E. paradisi à plebè vocatur. In Delphinatus & Allobrogum finibus montes, qui Pilati monumento è regione visuntur, istam habent. Geneuæ, ex vicinis montibus petita, & plantata, in horto meo florebat mense Maio, & Iulio ac Augusto semen mutabat.

Locus & tempus.

ARCION VETERIBVS.

CAP. XIII.

Arcion, quod alij Prosopida, aut Prosopion, quasi Pentalis [ἀπεντορ, si ἡ προσοπίδα, si Diosc. ἡ προσοπίων] vocant, folia habet Cucurbitæ, maiora tamen, duriora, nigriorque & hirsuta: caulem albicantem [ista non habet nisi inter northa Ald. codex: vt neque vetus manuscriptus & Oribas.] quanquam & interdum herba hæc vilius quidem alba, foris verò nigra, Hæc drachmæ vnus pondere pota cum pineis nucleis, cruenta expuentibus, purulentaque excreantibus auxiliatur. Trita quoque articolorum dolores ex contorsionibus contraxos illita sedat. Folia

denique antiquis viceribus vilius imponuntur auctore Dioscoride.

Plinius

Quidam Arction Personatam vocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Huius radicem decoctam ex aceto dant potui. Ita Plinius lib. 25. cap. 9. Et non longè inferius: Personata (vulgata tamen exemplaria falsè Personata habent, inquit Corn.) quam nemo ignorat, Græci Arction vocant, folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraque & crassiora: radicem albam & grandem. Hæc ex vino bibitur denariorum duorum pondere.

Arction alterum Galeno.

Galenus hanc non Arction, sed Arction akerum vocat, & Prosopida, cuius folia Cucurbitæ foliis similia sunt, nisi quod maiora & duriora: atque discutiendi & succandi vim habere. Habere etiam quid quod moderatè adstringat, & propterea folia eius antiqua vlcera sanare. Plura sequi capite.

ARCTION VETERIBVS.

CAP. XIV.

Describe.

Lesio varia.

Arction, inquit Diosc. aliqui Arcturum vocant, folia habet Verbasco similia, nisi quod hirsutiora, totundioraque sunt: radicem teneram, dulcem, & albam: caulem mollem, longum: semen Cumino paruo simile] vel καυλὸν μαλακὸν, σπέρμα κρινὸν ὅμοιον κρινὸν, hoc est, caulem mollem, paruum: fructum verò Cumino similem, paruum. Radix cum semine in vino decocta dentium dolores mulcet, si quidem ore decoctum contineatur. Ambusta, pernionisque eodem fouentur. Bibitur & propter ischiada, vlnæque difficultatem è vino, vt Dioscorides nobis author est.

Diosc. sententiam planè reddit Plinius lib. 26. c. 12. & lib. 27. c. 5. Tenuis partium esse tradit Galenus, & propterea sicantem & moderatè ex-tergentem esse, cætera quæ habet eadem sunt cum iis quæ Diosc. & Plinius.

Marcell. MARCELL.

Animadueneris, locum quæ jam pridem Leoniceum, Plinium viciniam nominis deceptum Arction cum Arctio miscuisse, Personatamque appellasse, refert Marcellus: cum tamen Arctij, non Arctij propria sit Personatæ appellatio, id quod ex Dioscoridis historia nouisse facillimè omnes possunt. Diverse enim plantæ sunt diuersis notis & viribus descriptæ. Ideoque Græcorum Medici & Herbarij omnes præuicem, eorumque vitamque descripserunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbasco similem fecerunt. Vocabant autem Arctio siue Personatæ quondam ad personas in tota Græcia & Italia gentes omnes, quoties in theatris, aliisue locis, qui cognosci populo nolent, egisse quidpiam volebant, facili, sed non toto anno (hyeme enim non suppetebat) ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparatu. Causa quæ hæc est cur Græci etiam ab eodem eorum vii Prosopida & Prosopion vocauerint: neque enim voces illæ aliud quàm Personam indicant. Neque immerito Dioscorides Cucurbitæ: foliis comparauit. Figura enim illis respondent, & si pinguiore loco nascantur, magnitudine etiam superant. Fuerunt præterea qui Arction in Græcis Aparinen, in Latinis verò Lappam vocauerint. Sed, teste Marantha, stupida est credere Personatam esse Aparinem.

Arctij nomen vti.

Demam, Arctij & Arcturij, ab Vrba, Viscæque custole nomina esse ducta, à similitudine forsan ad quæ foliorum suspicatur Lonicerus.

Lappæ siue Arctij, inquit C. Bauhinus, genera duo Galeno 6. simpl. Primum Verbasco simile, quod Dioscorides Ἀρτίον καὶ Ἀρτίον vocat, & Plinio lib. 27. cap. 5. Arction dicitur. Alteram, foliis Cucurbitæ, quod Dioscorides est Ἀρτίον, siue Ἀρτίον, aut Ἀρτίον (i.e. Personata quasi Larua) & Plinij Personata, & etiam Personata. At vulgò alla est maior, quæ Arcium & Arctium est Dioscoridis: alia minor, quæ Dioscoridis Ἀρτίον [quod flauos capillos reddat dicitur &] Ἀρτίον, quasi strumarum pernices: hinc quibusdam Strumaria nominatur.

Cornarius ait officinas Arction Lappam minorem vocare. Sed quid vult, non intelligo: Suspicar eum Xanthium tradere, nisi hoc alibi Fabam inuicem vocaret. Lappa minor dicitur de Xanthio, vt apparebit suo capite.

Ryffius in Diosc. Ἀρτίον, Græcum vocat Prosopion minus, vel Arcturum, officinarum Lappam siue Bardanam maiorem, germ. Retti Retti, gall. petite Bardane & Gletzeron. Videtur autem is ignorasse quid scriberet, & confundere diuersarum plantarum nomina. Nomen germanicum & gallicum sunt qui Xanthio adscribunt. Verum id postea exhibet. Cætera competunt plantæ, quam pro Personata proponit.

Arctij Ἀρτίον, ac etiam Arctij nomine insignitur etiam Sequentes plantæ: Personata, Persal-tera, Tussilago, Person. hirsuta, Arction capitulis mollibus hirsutis, Xanthium, Conyza major, Acanth. siue Brancha vrsina, Bauion

PERSONATA SIVE LAPPA MAIOR,

aut Bardana.

CAP. XV.



Duos cubitos alta & procerior aliquando, radice longâ, crassâ, foris nigra, iotus alba, sapore subdulci: caules recti, striati, lanuginosi, rubentes, ramuli: folia Verbasci aut Helenij, breuiora, rotundiora, superne atro-virentia, inferne canâ lanugine pubescentia: capitula echinata recuruis ad obuias vestes & similia pertinaciter adherescentibus vncis horrida, flores sustinent purpurascens, singulares: stilum è vaginula atro-purpurea emittit colore carneo prædum.

Nisi reprehensio quædam Trago timenda foret, affirmare non dubitaret, Lappam maiorem, primo & secundo anno, antequam excaulescit, seu Lappas suas proferat, Germanis non Retti, sed Grosstetchen, Personatam, de qua Dioscorides lib. 4. egit, vocandam: rursus eandem cum caules & fructus produxerit, Germanis non amplius Tettschen, sed Retti, i.e. Lappam appellari, & ad Xanthion Dioscoridis pertinere.

Gortzæus statuit Lappam maiorem esse herbam palustrem, sed quàm verè, demonstrant naturales

nales. Ryffius, ceuiam monui, & eum sequutus Rheginus, Lappam hanc maiorem à minore non rite distinguit. Toxites quoque in Onom. philoph. p. 27. Arcij titulo distinctas confundit plātas. Videtur Amatus lib. 4. cap. 107. & seq. eandem plantam tradere, in qua re aberrasse deprehenditur. Duplicet autem, Amato Dalecham-pij figuram appositam esse, quum Amatus de ea stirpe non loquatur.

Leoniceus de error. med. apud Brunfels. tom. 1. rhaps. 4. vbi pro Arctio apud Plinium lib. 25. errore cedicis Echion legi arbitratur, itemque pro Personacia, viciosè Perfolata, de Bardana seu Lappa hac maiore, loquitur. Tomo verò 2. p. 193. Plinium in suo libello notandum putauit, quod lib. 25. eodem capite, bis Personaciam descripserit, altero tamen loco Personatiam, & altero Perfolatam dici insinauerit. Sed Leoniceus inquit Pandolph. Collinutius] Plinium taxat, quòd duplicem Personatam esse crediderit. Nulla ratione Echion pro Arctio positum dicit. Non ideo duplicem Personatam esse credidit Plinius, quia quosdam Echion Personatam dicere & ex aceto radicem dare scripsit. Arction Græci duplicem esse tradiderunt, quorum 1. Plinius 27. & alterum 25. pinxit, ego ambas Personatam & Lappam voco.

Non placet Agricola, Lappam maiorem Vngula speciem constituere. Euch. Roessl. Bardana maioris plura assignat genera, quæ aut eiudem ferè naturæ, calida & sicca tertio gradu: vni adscribens acuta folia, quam meliorem facit; alteri verò rotunda, quæ non æquè bona; tertiaz lata & magna quam eius inutilem scribit: Quartam vocat Lapatium acutum, quam Acetolam vocant multi. Sed quid obsecro commune habet Acetosa cum Lappis & Bardana, vel forma, vel viribus. Bardana picturam habet, verum non indicat, quæ ea sit ex suis Lappis.

C. Bauh. phyt. & pin. Lappa 1. siue maior, Arcium Dioscoridis: Lappa maior Brunfels. Trago, Turn. & Cæsalp. Personata Lac. Lon. Lob. Obs. p. 318. Ic. Plant. p. 88. & Lugd. p. 1055. Personata maior Matth. Cast. Personacia Fuchs. & Fracast. Bardana siue Lappa maior Dod. Arcium Anguill. Dodon. gall. Cordo in Diosc. Arction Personata, Thelio.

Germanis dicitur Groosf Hletten: Belg. Grootte Glesser. Gall. Glesseron ou Napoliere. It. Lapolla maggiore. Hisp. Bardana, Pagamacera mayer. Angl. Great burr: Hung. Zelos lappu.

Quæ Dioscorides & Plinius atque Galenus de Personatæ facultatibus memoria prodiderunt antè annotauimus. Personatæ herbæ succus vino veteri in potionem datus, omnes morbus serpentum misericè sanat. Eiusdem foliis cingit febricitantem Apuleius, & statim febrem mitigat, caloremque sanat. Vulnus, etiam si cancer sit, cū aqua decoctionis foliorum eius fouet: deinde ipsum cum nitro & axungia cum aceto terit & panno inducit & imponit. Ad canum rabidiorum morbus, radicem cum modico sale tritam morfui indit & statim ægrum liberat: succum foliorum cum melle propinat, ad vrinam prouocandam, & vesicæ dolorem tollendum. Pulverem seminis eius cum vino optimo per quadraginta dies dat, & ischiadicis mirabiliter sanat. Foliis tritis cum albumine oui & ischiadicis misericè curat. Holerius in pleuritide, radicis Lappæ siccæ, quæ purpureum florem gerit: aut floris eius drach. duas è mulsâ propinat. Bardana

na maioris folium summo capite gestatum, matricem solum tollere, sub planta verò pedis deorsum, memorat Mizaldus. Et hoc remedium præstantissimum habetur aduersus suffocationes, præcipitationes, ac dislocationes matricis. Folia capiti imposita, eius dolorem mitigare scribit Virtembergicus. Personatæ caules, primo Verre erumpentes, derafo cortice, crudi coctique prima mensa mandi cæpere: aliis ex solo sale, aliis ex oleo, acetoque placet: in tantum receptâ gratiâ, vt largissime à quibusdam manducetur, errore manifesto (si Brayero credimus,) quem refellere interest vitæ. Est enim [vt cætera olera agrestia] succi improbi. Aiunt calculis renum prodesse, vrinaque ciendâ idoneam.

PERSONATA ALTERA CVM capitulis villosis.



Vix aliud inter hanc & Descriptiō priorem vulgatiorem discriminē animaduerto, quàm in echinis, quorum spinæ aduncæ lanugine incanæ ceu araneatum telis intertextæ sunt: ceteroqui flos huic quoque purpureus: folia item non absimilia.

C. Bauh. phyt. Synonyma. Lappa 2. siue maior lanuginosis capitulis, quam mihi siccam acceptam refert, & à Lappa sua 3. siue

maiore montana, Arctio Dioscoridis, vt vocat, & Personata altera Matthioli, Arctione montano seu Lappa minore Galeni Lobelij, separat, quam opinionem probare non possum donec diuersæ demonstrentur plantæ.

Beffordiz extra portam superiorem obseruauit.

ARCTION CAPITVLIS MOLLIBVS hirsutis. CAP. XVI.



Hæc forma Arction in vetusto Cæsareæ bibliothecæ codice, auctore Dodonæo, foliis videlicet latis, in ambitu crenatis: caule tenero erecto: capitulis aliquot in fastigio mollibus ac lanuginosis, vt primi Cymini siluestris.

Arction ex codice Cæsareo [vt inscribitur apud Dod. & H. Lugd. p. 1307.] si-

ue Arction quintum, C. B. phyt. & pin. quidi-

Locus:

Descriptio:

Description.



quodammodò aromatico: quâ foliorum pediculis est ortus, plura simul capitula se promunt bulbata, *stipulos* stamineos emittentia, quibus delapsis *echini* succrescunt lappacei, vestibus adherentes, oblongi, in duos acutos rigidosque mucrones desinentes, qui duobus distinctis loculis rotidem grana condunt, hordeacea: *radix* parua multas vndique fibras profert.

Diosc.

Xanthium Dioscoridi caule est cubitali, pingui, anguloso, & prodeuntibus ex eo alis compluribus: folia verò habet Atriplicis incisuras habentia, Nasturtium odore imitantia: fructum teretem, grandis Oliuæ instar, & Platani pilularum modo spinosum, qui quidem contactu vestibus adhærescit.

Appellationes
noipa Cæ
radolesthen.

Hanc aliqui Phasganon seu Phasganion, alij Antichesion, alij Chalcanon, alij Cheradolethron, quasi Strumarum pernitiem, alij & Aparinen vocant, & Philantropon, addit Paulus. Et sanè (inquit Corn.) Philantropi appellatio, rectius Aparinæ conveniret. Nam de hac scribit Dioscorides quòd axungia trita excepta strumas discutit. Hoc autem significat ~~radix~~ ceradolethron strumarum nimirum pernitiem. Videtur

itaque & Xanthium ex Lapparum genere esse, velut etiam Aparinæ: officinæ Lappam inuenerunt vocant. Xanthium quidem nomen ab effecta inditum esse concludit Ryffius, quòd ruffet capillum. Phasganon porro dici, i.e. enseni, à similitudine aliqua caulis & foliorum: *χάννα* verò ab hiatu foliorum: Aparinen denique & Lappam à formæ quadam imagine qua nonnihil huic cum Aparinæ & Lappa convenit. Ceterum qui cum Ruellio credunt Arction hanc esse plantam, quam vulgus Lappam seu Bardanam minorem vocat, falluntur. Aliud non est quàm Xanthium testibus inter alios Trago, Fuchf. Matth. Dod. Lob. Lac. Amato, C. Bauh. & Apollinel. Dorsthenius ignoranter Lapathum minus *flum. fl. et. et.* vocat, & cum Lapatho confundit. Plinius huius non meminit.

Lappa minor Brunfels. tom. 3. Rhapf. 16. Trago [qui & Tribulum terrestrum nuncupat], Eric. Cordo, Euch. Rôl. C. Bauh. phyt. & pin. cui & Lappa sexta. Xanthium Matth. Anguill. Dod. Fuchf. Turn. Cordo in Diosc. & hist. Gesn. hor. Lac. Lon. Thal. Cef. Cast. Tabern. Lobel. Obs. p. 119. Ic. Plant. p. 188. & Hist. Lugd. p. 1056. Xanthium siue Strumaria Lob. in Adu. Bardana minor Gerardo. Arction vel Arcturus Gesn. cat.

χάννα & *χάννα* Græcis, Germ. *Bettlers* *küpf.* *fl. et. et.* & *Syn. fl. et. et.* Belg. *fl. et. et.* *Clusien.* Gall. *petit Gletteron.* It. *Lappola minore.* Hisp. *Lappa*, seu *Bardana menor*: Angl. *Joint* *butte* *deffer.* *butte.*

Læto & pingui solo; ac in scrobibus & lacubus ubi exaruerunt, facile gignitur: Iulio & Augusto vigent Xanthij lappæ: seminibus prægnantes mente Octobri.

Fructus antè collectus quàm perfectè siccescat, deinde rufus & siccili vafe reconditus, flauos facit capillosi quidem, cum vsus exigit, eius sextarii semissem aquâ tepidâ diluas, moxque eo caput, nitro ante perfrictum, illinas. Sunt & qui in vino tundant, itaque asservent. Ceterum, commodè quoque cedematis imponitur. Plura addit Aëcius: fructus, inquit, discutiendi vim habet: decoctum verò corticis potum, lienes consumit: & dentes motos firmat eiusdem decoctum ex vino collutum. Cum autem discutiendi vires habeat, facile colligitur, ait Ryffius, temperamento esse calido & sicco præditum, id quod ex sapore etiam, qui amarus est & subacris, deprehendi potest.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXIII.

ECHIA, BVGLOSSA, CYNOGLOSSÆ, HELIOTROPIA, ET SIMILES.

Proxima nunc cura habenda earum, quas nec ipsas temerè miscens aliis, aut à se inimicem diuellas. Eß- que precipua affinitatis nota in semine, et quod folia pleraque habeant aspera, pilisque hirta.

BVGLOSSVM VETERIBVS.

CAPVT I.



BVGLOSSVM Verbasco (βύβλος-
σον φλόω) simile est, folio in
terra sparso, verum aspero, ni-
griore, bubulæ linguæ simili,
quod vino inditum animi vo-
luptates augere, hilaritatemq;
offerre creditur [εὐφροσύνην δό-
ναι] pro quo Co lex vet. δοκίμην δὲναις φλοιῶν
ἔστιν ὡς ἐκείνην ποτὶ. Videtur calidum esse:
cortex radicis facit ad Ichthoriam] inquit Diosco-
rides: Qui antè Buglossum Circio folijs simile
esse scribit. modicè hirsutus, & longioribus [μα-
κρότερος. Vet. μακρότερα] minoribus. Idem rorsus
cum Symphyti secundis folijs comparat, cùm ait.
Symphyto secundo, quod aliqui Perron vocant,
circa caulem ex intervallis haud ita magnis folia
exegunt hirsuta, angusta [Vet. σιθαγούστα & sub-
exigua] longiuscula, ad Buglossi foliorum simili-
tudinem.

Buglosson in vinum iniectum aiunt voluptates
augere, quod perhibent quoque Galenus, Paulus,
Plinius, Simeon Serbi, Apuleius, Serapio, Avi-
cenna, & Quintus Serenus. Galenus quidem sic
scribit. Buglossum humidè calidūq; temperet
est. Itaque vinis iniectum læticiæ ac hilaritatis
causa esse creditur. Sed & ijs qui ob gutturis
asperitatem tussi int, coctum in melicrato conue-
nit. Et Paulus his verbis, Buglossum humidum est
& calidum temperamento, quamobrem vino im-
missum læticiam ac animi voluptates efficere di-
citur. *fungitur*, inquit l. 4. c. 8. Plinius huic [Plan-
tagini] Buglossos, boum linguæ similis, [similitu-
dinem hanc ad figuram pariter & asperitatem re-
fert Gelsnerus] cui præcipuum, quod in vinum
adiecta animi voluptates augeat, & vocatur Eu-
phronsyon. Et lib. 26. cap. 11. Buglossio inarescen-
te si quis medullam è caule extimat, dicatque ad
Tem. III.

quem liberandum febre id faciat, & alliget ei
septem folia antè accessionem, aiunt è f. bre li-
berari. Buglossum vrinam, inquit Simeon Serbi,
& sitim sedat. Canles eius cocti, & crudi comesti,
iecoris affectibus prosunt. A viatoribus ex eo
conficitur Zulapion, & est vtile.

Nascitur, inquit Apuleius locis cultis & saby-
losis. Buglossa dicta est eò quod folia aspera in
modum linguæ bubulæ habeat. Folia habet aspe-
ra, obscura terrestria. Hæc in vino mixta hilari-
tatem conuiuiis facit: in cibum etiam cocta pro
olere sumitur, vel trita pro condimento. Herbæ
Buglossæ quæ treis thyrsos seminis mittit [Ea-
dem hæc Dioscorides Buglossio: Plinius verò lo-
co suprà primò citato Cynoglossio tribuit] radi-
cem totam cuth aqua decoque, ipsam aquam de-
coctam potui dato, remediabis tertianas: quæ
autem quatuor thyrsos habet, faciet ad quarta-
nas, dabis autem vt suprà. Alia item herba simi-
lis est ei, quæ folia Lataphi fert minuta, eius ra-
dis potata ex aqua, ranis & serpentibus aduersa-
tur. Herbæ Buglossæ succum cum melle dabis
bibere, miserabiliter suspirium tollit. Herbam
cum melle & pape contritam vice malagmatis
impones, mitificè rumpit apostema.

Lingua Bouis, inquit Avicenna lib. 2. Canon.
tract. 2. cap. 136. Lingua Bouis quid est? Herba
lata, habens folia sicut Almaru & aspera ad ta-
ctum, & rami eius asperi sunt sicut pedes locu-
starum: & color eius est ex viridi & Citrino. O-
porteret vt administraret illa quæ est Corasceni,
grossa habens folia, super quorum faciem sunt
puncta, quæ sunt radices spinarum & pilorum
exerunt ab ea. Quæ autem in hac terra repe-
ritur, & quæ videntur medici, plurimum eius est
genus Almaru, & non est lingua Bouis, & ne-
que confert vt iquamentum illius est. Proxima
T c c

*Etyman vñ
res ad Hila-
ritatem.*

Superstitio.

Temper.

est æqualitati in calore: ad caliditatem enim declinat paruum, & est in fine primi in humiditate: & quæ sicca est, est minoris humiditatis. Et dixerunt aliqui, quod est frigida & humida in fine secundæ: id illud est longinquam. Virtus eius quæ adusta est, remouet alcoli quæ sunt in infantibus. Et sedat inflammationes, & similiter ipsamet: sed ipsa est debilior. Est lætificatiua, confortatiua cordis, bona melancholiæ ex solitudine, & tremori cordis, in vino, & dispositionibus melancholicis: & quidam in potu eam tribuunt ad tremorem cordis, cum luti Armeni ponderi 2. drach. & confert tussi & asperitati canar, & propterea cum coquitur cum hydromelle & Zuccaro. Idem de med. cor. tract. 2. Lingua Bonis calida est & humida in primo: cuius proprietas est lætificare, & confortare ipsum magnificæ, & adiuuat ipsum illud quod in ea est de solutione melancholiæ subtilis. Quare per illam mundificatur sanguis cordis, & substantia spiritus. Melior tamen est quæ de regione Corasceni affertur, habens spissum folium, velatum plurius in uirgine: quod, inquam, post exsiccationem nec contrahitur, nec est siccum: quæ autem in his partibus reperitur est ex genere Mara, & uisitur pro lingua Bouis, propter similitudinem illius ad illam, cum tamen non sit illa. Et iam aggregatur in hac medicina uictus proprietatis cum natura propinqua temperamento, quare non eligatur alia super eam.

Serapioni *Lifen Althaur* dicitur, & est Planta quæ assimilatur herbæ quæ dicitur Caromas: uires uero quod attinet, in pleraque ex varijs tradit quæ supra ex Auicenna retulimus.

Cæterum Buglossi hæc recensentur species, Buglossique nomine sequentes donantur plantæ: *Borrage*. *Borrage siluestris tenuifolia*. Buglossum folio *Borraginis Hispanicum* siue semper uirens. Buglossum vulgare maius flore purpureo & albo, cultum & spontaneum, Buglossum angustiore folio & flore minore, purpureo & albo. Buglossus minor annua. Buglossus rubra. Buglossi siluestre, *Echium multis*. Buglossi silu. pharmacopolarum. Bugl. silu. Pulmonaria dictum. Buglossum peregrinum radice multica, Pulmonaria Penæ & Lobel. Aduers. pag. 24.7. & Lob. Observation. Buglossæ siluestris species Thallio, quæ nobis est *Cynoglossa topiaria* fortè Plinij. *Cynoglossum* quod à Plinio aliusq; nonnullis cum Buglossis confunditur. Buglossum *Echioides* Anglorum Penæ & Lob. Aduers. p. 24. de quo H. n. g. l. 24. hoc titulo, *Hieracium capitulis Cardui benedicti*. *Boragion pæda*, de quo l. H. nostr. lib. 26. Buglossum magnum siue *Carduus Pratenfis* Tragi, de quo lib. 26. Buglossum Antarcticum quibuidam, Petum Teueti H. Lugd. 18. cap. 128.

Cæterum, quia *Borrage* à quamplurimis Buglossum censetur, sciendum est ipsiusmet etiam *Borragini* vocabulo plures & diuersas plantas inueniri, ut: *Borrage vulgaris* trium quatuorue colorum. *Borrage siluestris tenuifolia*. *Borrage hiemalis* siue Buglossum folio *Borraginis Hispanicum*. *Borraginis siluestris species* Buglossi *Simoni Genuensi*, Buglossum vulgare maiori & minori flore. *Borrage siluestris* quorundam, siue *Echium Fuchsij*, secundum nostram inscriptionem. *Borrage minima* herbariorum siue *Symphitum pumilum*. *Borrage montana* flore flauo de qua *Gesnerus* de collat. stirp. pag. 63. quæ qualis adhuc nos latet.

Borrage deficiente s. mit *Chichorium* *Tractatus* qui pro quo. *Borrage* etiam *substitui* potest, secundum eundem tractatum qui pro quo, *Scariola*.

BORRAGO FLORIBVS CÆRVLEIS & albis.

CAP. II.



Infima est planta, & quæ ægrè se humo tollat: radix alba, digitalis crassitudine, mansu viscida: filia lata, subrotunda, aspera: rugosa ac plicata, per terram sparsa, eminentibus pullis tenuissimisque aculeis: caulis hispidus, teres, inanis, cubitalis, ramis brachiatus: flores amœni, stellati, radiati quinque foliorum

acuminatarum setie explicati, umbone medio, in quo stamina, circumposito, facile à quinque foliorum hirsutorum calyce cui insident, cedentes, colore cæruleo purpurascēte, vel albo. Semen illi nigrum, striatum: [Anchusæ aut Lycopis Lobel.]

Simon Genuensis in lit. B. *Borraginem* vocat, ac notam ait, aptamque medicinæ & flore & folio, & semine: Buglossamque dici speciem eius siluestem: se uero non reperire aliquem autem authenticum facientem capitulum de utraque: si scribat de vna non scribere de altera. *Pandectarius* tamen cap. 2. Scribit alterum de *Borrage*, in quo allegat *Dioscoridem*: Et alterum de Buglossa, in quo citat *Serapionem*, ex eiusdem *Dioscoridis* auctoritate de Buglossa loquentem.

Borraginem cum Buglossis *Hermolaum* miscere, parebit infra, ubi de Buglossis agitur. Is porro videtur *Cirsion* statuere. Sed audiendi non sunt, inquit *Ruellius*, qui esse putant *Cirsion* herbam quam *Borraginem* oliores vocant. Quam Buglossam, linguam Bouis Romani appellant, ea est quæ hodie officinis *Borrage* dicitur. Sed ipse quoque *Ruellius* Buglossum & *Borraginem* inter se confundit.

Leonicus de err. med. *Borraginem* veterum Buglossum esse concludit. Descriptio, inquit, Buglossi apud *Diosc.* potius *Borragini* conuenit &c. In *Borrage* capitula cærulea non purpurea conspiciuntur. In autore de simplici medicina leguntur hæc uerba: Buglossum Romani Linguam Bubulam, Lucani Corago, nascitur locis cultis & sabulosis. Fortè autem pro *Borrage* verbo Corago vitiosè scribitur, aut nomen *Coraginis* vna litera variatà est in *Borraginem* versum. *Pandectarius* quoque si qua est huius hominis auctoritas in litera L. *Lifen althaur*, quod nomen apud Arabes significat Linguam Bouis

Bouis, ipse Borriginem interpretatur. Quare forte melius fuerit cum Buglossam de qua Dioscorides, Galenus, & Authores Arabes utrumque allegantes ad usum medicum adhibemus, Borriginem potius quam illam quæ passim Buglossa nuncupatur recipere. Atque ita falsum erit quod Mōcagnana existimauit, Auicennam nihil de Borriginem dixisse. Nam nisi me fallit opinio, caput de Buglossa, seu Lingua Bouis, apud Auicennam est caput de Borriginem, sicuti etiam apud Serapionem. Falsum etiam erit, id quod Simon scribit, qui putauit neminem autorem de utraque herba simul scripsisse. Negari non potest quin Borrigo sit alterum duorum apud Dioscoridē, aut Cirsiū, Buglossum magnum dictum, aut Buglossum, ab iis præsertim qui Borriginem Buglossæ, vel Buglossam Borriginis speciem confitentur: Si Borrigo sit Cirsiū apud Græcos, verum erit quod à Montagnana scribitur, tam multa de Borriginem à iunioribus medicis temerè prædicari. Nam Dioscorides hoc tantum de Cirsiō retulit &c. Quare medici iuniores utrum velint acceptent, aut quod Borrigo sit vera Buglossa, ut nos opinamur, aut quod eius herbæ usus non sit ad omnia illa utilis ad quæ ipsi arbitrantur.

Marcellus Virgilius lib. 4. cap. 110. in Dioscoridē innuit ad imitationem Leonici Borriginem esse Buglossum Veterum, idque pluribus rationibus conendit. Et huic sententiæ addi-pulatur Monardes lib. 4. epist. Syluius de comp. med. lib. 1. Cordus in Dioscor. lib. 4. cap. 128. & 129. Item Hist. lib. 2. cap. 75. vbi 78. Brunfels, in Herbario germ. Fuchs, Hist. cap. 41. & de error. Med. errore 6. Cornin Dioscor. lib. 4. cap. 110. Euchar. Rostlin. Ryff. in Dioscor. cap. 112. Matthioli in Dioscor. cap. 125. Leonici. l. 5. c. 157. Io. Agric. Medic. Herbar. Humelbelg. in Apocicum cap. 41. Lacune in Dioscor. cap. 128. Amatus cap. 129. Calt. Durantes, qui flore cæruleo tradit & albo. Textor lib. 1. cap. 70. de peste, Apollo rad. Rhegin in exerc. Rob. Const. in Lex. & apud Amst. Gesnerus in cat. pl. Dōd. gall. & Lat. Lobel. Io. Bapt. Port. Villæ lib. 10. & phyt. lib. 4. cap. 16. Hist. Lugd. lib. 5. cap. 19. atque alii rei herbarie periti.

Qui diligenter Buglossi historiam expendant, inquit Matthioli, omnes herbam Borriginem vulgò vocatam, in horto alii quæ locis nascētem, potius legitimum Buglossum esse censent, quam illam, quæ Buglossa vulgò nominatur, cuius in officinis communis est usus. Quorum e quidem iudicio non dubitauerim subscribere: siquidem Borrigo dicta foliis est in vniuersum verbasco similibus, nigrioribus tamen, & asperioribus: quibus etiam hæc symphytum alterum æmulatur, quod folia Buglossi proxima ferre alibi prodidit Dioscorides. Adde præterea quòd folia Borriginis in terram procumbant, & bubulas linguas, tum forma, tum asperitate imitentur. Contrà quæ Buglossi nomen sibi falsò vendicauit, folia habet longa, echio similia, non vsque aded lata, ut bubulas referant linguas, minùque humi depressa, quæ potius à toto ferè cespite sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte verba scum aut symphytum alterum representant. Quod insuper Borrigo sit facillè legitimum Buglossum, Auicennæ testimonio comprobari potest, qui lib. 2. sui canonis ita scribit. Lingua bouis herba est lata, habens folia sicut Almaru, & ad tactum aspera, & rami eius asperi, sicut pedes locustarum. Operteret autem, ut illa administraretur, quæ est in Corasconi, crassa habens folia, super quorum fa-

Tom. III.

ciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum & pilorum exeuntium ab ea. Quibus notis aded nostram Borriginem expressit Auicenna, ut nemo non intelligat esse Linguam bubulam. Eam præter morem descripsit Auicenna, quòd suo quoque tempore non deessent, qui veri Buglossi loco aliam quandam substituerent plantam, ut apertè eius verba declarant, dum subdit. Quæ autem in hac terra reperitur, & qua videntur medici plurimum eius est genus Almaru, & non est lingua bouis, & neque confert, ut iuuamentum illius est. His omnibus illud denique accedit, quòd apud Apuleium in eo libello, qui de herbarum medicaminibus inscribitur, inuenio Buglossum Lucanis Corraginem nuncupari, prioris tantum literæ mutatione, quòd cordis affectibus quam maxime opietur. Quæ sanè omnia, ni fallor, clarissimè ostendunt, Borriginem esse verum ac legitimum Buglossum.

Et hinc merito ait Hist. Lugdunensis, Rei herbarie periti, Buglossum Veterum, eam procul dubio herbam esse putant quam Borriginem vocamus, non illam quæ vulgò Buglossa nominatur, & cuius in officinis communis est usus, nec id temerè, ac sine iudicio. Descriptio etiam Buglossi à Dioscoride tradita Borriginem ita conuenit, ut nulla prorsus nota ab illa discrepet. Buglossum, inquit, Verbasco simile est, folium in terra parum, nigrius, asperum bubulas imitans linguas. Quis nisi planè amens ex ipsa inspectione non iudicet Borriginem foliis esse Verbasco similibus, nigrioribus tamen, & asperioribus? Cum igitur euidenter demonstratum sit Borriginem nostram Veterum esse Buglossum, in posterum medici pharmacopœique sibi Buglossum ab antiquis in medicamentorum compositiones adhibitum legerint, Borriginem nostram, non vulgare Buglossum vsurpent: &c.

Sic Theod. Dorst. Quæ ab Empyricis & Herbariis iam Buglossum appellatur, inquit, Borrigo est, & Clusius de plant. Hist. Maru siue Almaru Auicennæ lib. 2. tractatu 2. præsertim tercia, eius species, nihil aliud mihi videtur quam vulgare nostrum Buglossum aut Borrigo. Ac etiam Raimundus à Vinario de peste ex correct. Delechampii lib. 2. pag. 1. Buglossum nominat, ibidemque Borriginem intelligit, licet postea sui obliuio Buglossum diuersum faciat à Borriginem, cum ait: Borrigo, Buglossæ, &c.

An Borrigo sit Buglossum dubitat Cæsar. p. lib. 11. cap. 3. Borrigo inquit, vulgò appellatur oculus, quod in hortis feritur: putant recentiores huic plantæ potius conuenire Buglossi descriptionem quam suprà dicta (Buglossæ vulgari) cum tamen neque spontè oriatur in sabulosis, neque folia longa & angusta sint, ut in Symphiro Dioscorides tradit, & ut ostendit similitudine lingue cuius neque thyrsi tres vel quatuor insint. Tandem Buglossa tota cum radice & semine colligi præcipitur mense Iulio: At Borriginis radix per se eto semine exarefcit, neque collecta seruari potest incorrupta. Sed forte Auicenna hanc intelligit, cum describit herbam latam habentem folia Almaru & aspera ad tactum. Existimo autem Borriginem in Italia quondam fuisse peregrinam, cum de ea nulla fiat mentio ab antiquis inter olera.

Videtur sibi contraria scribere Anguillara & modò Borriginem Buglossum asserere modò negare. Sic enim epistola quinta ait: Quidam volunt confectum fuisse Nepentem Homeri ex radice Borriginis, eamque Galenum per Enopii

Nepenthes:

tradidisse, cui attribuit easdem vires quas Homerus Nepenthe. Intellexissem autem Gale-
num Borriginem non mihi manifestum, quan-
doquidem earum plantarum separatim meminit.
Fuerit itaque Borrigo, Buglossa optimè nota.
Epist. verò 14. dicit: veram Buglossam esse Bor-
riginem non ausim affirmare, in Græcia tam
etiam Borriginem vocant.

Borriginem esse Buglossum Antiquorum ne-
gant Monachi dist. 6. cens. 146. in Mesu. Quid
certè sit Borrigo vulgò dicta, à nemine prisco-
rum describitur. Iuniorum autem plurimi fir-
missimè tenent esse Buglossum antiquorum. Nos
autem (aiunt illi) diligenter examinatis omni-
um descriptionibus, Buglossum antiquorum
non esse Borriginem statimus.

Apollo quid sibi velit cum suo Buglossa His-
panico, quod pluribus hortis familiarissimum
esse ait, & omnibus notis legi imum referre scri-
bit, ac propterea Borriginem nostram esse sta-
tuit, confiderent lectores. Monachi separant
Buglossum Hispanicum à Borragine & à vulgari
Buglossa. Monachis se opponit Turnerus, licet
interim ei inclinet animus Borriginem nostram
esse Cirsum. Guilandinus in Thecone Borra-
ginem à Dioscoride Echion vocari augurat, ac
contemnent à penitis coniecturà. Non desunt
tandem qui Borriginem Homericam Nepen-
then esse statuunt. Cuius se succo Homerus vi-
no immisso tristitiam discutit, ac malorum omni-
um obliuionem induci scriptum reliquit.

Buglossum siue Borrigo dicitur omnibus iis
quibus Borriginem hanc flore cæruleo & albo
Buglossum Veterum esse diximus. Buglossum
verum Dodon. gall. & Cordo. in Diosc. Eidem
in Hist. Buglossa urbana. Lobel. Buglossum La-
tifolium. Tabern. & Gesner. hort. Borrigo flo-
ribus cæruleis & albis: In append. Borrigo
albis floribus. Hort. Lusitano Borrigo cæru-
leis floribus, & Borrigo albis floribus. Gerard.
Borrigo hortensis. C. Bauh. apud Matth. &
phyt. Buglossa siue latifolia, Borrigo dicta flo-
re cæruleo, aliquando candido: sic & expalle-
scente roseo. Amarus nomine Buglossi quod
Borriginem facit, falsam habet iconem. Har-
chius cui Italicè Buglossa dicitur, Gallicè *Bruy-
naga* aut *Borage* [quæ quidem nomina ubi inue-
nerit nescio:] videtur Historiam eius confunde-
re cum Buglossa. Ollionis Borrigo dicitur:
Germanis *Burrausch*, Italis *Borrachine*. Hi p.
Borraces, Bohemis *Boract*, Hungaris *Dinye za-
gusum* à nonnullis Porrigo: Veterum est βό-
ρῖνον, quod Latine Lingua bubula, Lingua
bouis, Buglossus & Libanum dicitur, Apuleio
& Corago: vnde fortassis Borriginis nomen C
in B mutatum nisi apud Apuleium Borrigo pro
Corago legendum sit. A Plinio verò ἐφρασίον
siue Euphrosinum quoddam hilaritatē excitet: quod
& antiquus vericulus testatur.

Dicit Borrigo gaudia semper ago

Borriginis radix, Si Lonicerò lib. 5. cap. 157. non
sit fides deneganda, dulcis est, Rapo accedens:
flores stellati, cærulei, canini, & pallidi: cæ-
rulei vino impositi ob eius acrimoniam reddun-
tur ex rubro purpurei: semen nigrum, dulce,
nota herba in hortis & in culina, vltus foliorum
est viridum non siccorum. Eandem floris per-
mutationem refert etiam Io. Bapt. Porta villæ l.
20. dicens: Dioscoridis βόρῖνον, Plinij Eu-
phrosinum & buglossam, Latini bubulam Lin-
guam, Neapolitani Borriginem vocant, quasi

Borriginem dicas, versa ac perversa voce ex
buglossa. Flos cæruleus in Apulia in purpureū
& rubrum vertitur nimii caloris vi, quod idem
evenit, si in acetariis aliquantisper immortatum
fuerit.

Dioscorides campestribus & sabulosis locis
nasci scripsit inquit Porta. Nos pingue, subactum,
humidū solū in hortis damus, & in vineaū hor-
torumque torulis plantamus, quibus semel fata
importuna fecunditate luxuriat, & ex se-
ipla seritur. Riguis in toto anno feri potest.
Semine seritur Aprili & Maio, vt æstate fruamur.
Vel Augusto & Septembri pro hieme. Trans-
plantatur quum quinque foliorum esse cōperit,
aut melius Octobri ac Novembri. Semina ne
decidant, colligantur immatura, ac triduo in
fascies colligata resiccantur Sole, ubi maturue-
rint, substratis lateis decurantur: bienniō se-
men asseruatur: ne hieme gelu adurantur, latea-
men aspergatur, hoc monumento aduersus fri-
gora se tuerunt, Borrigo hiemis frigora mini-
mè ferre potest additur ex Trago nisi ea quæ non
ita pridem è terra enata fuerit, nullumque adhuc
fructum procreauerit, deinde vt summo studio
contegatur necesse est. Quæ caules emisit pla-
nè alioa est, cum ætate enim in qua excau-
lescere cœpit, perit, neque alteram attingere
potest. Iunio mense floret. E semine deciduo
quotannis repullulascit, ita vt cum semel occu-
parit locum, non facile in posterum deferat, ne-
que enim extirpari se vnquam patitur. Potest
autè semel humi per hiemem illæsum delitescere,
nisi à muribus deuoretur, qui propter dulce-
dinem, quam cum radice & floribus commu-
nem possidet, illo plurimūm delectantur. Borrigo
Montepelii floret tota hieme, basilæ vidi flo-
rentem Octobri, Lugduni Maio, Genevæ flo-
rentem Maio & Aprili, habui flore albo in hor-
to meo Novembri, vt etiam Patavii. Mont-
belg. prouenit & sæpe hiemem perfert: in orto
E. C. h. beumus flore cæruleo & albo.

Vires & virtutes Veterum de buglossa antè
annotatæ sunt. Aquæ distillatæ, necnon & con-
seruæ ex stoculis tribuunt vim roborandi cor-
(apud Tragam recentiores) hypophysiam re-
mouendi, lætitiā melancholicis excitandi, ac
sanguinem purgandi, breuiter in omnibus fe-
brium caloribus & animi deliquis, tam aqua di-
stillata quam flores saccharo conditi vsurpari
t. à possunt: Semen tatum ac in vino potum,
mulieribus lactis copiam restituit: mihi aqua
distillata & flores saccharo conditi probantur
in omnibus febribus & vtiles: Humidi euiden-
ter est temperamenti Borrigo (authore Dodo-
næo) calidi non item: Sec in calore frigoreque
mediū esse apparet: Nostra ætas non modò her-
bam, sed præcipuè flores subinde in vinum con-
iicit, vel acerbis aspergit, lætitiæ ac hilarita-
tis excitandæ causa: conduntur & in hunc vsum
cum saccharo flores: vni & alia ex iis parantur,
quibus ab cordis corroboracionem, tristitiam
pellendam, & animi lætitiā augendam Medi-
ci passim vtuntur, folia cum aliis oleribus deco-
cta ad altum molliendam nonnihil cōferunt,
Herba radix, & semen, per se singula, aut si-
mul omnia in vino cocta, potaque venenū à cor-
de arceat (inquit Matthioli.) sanguinemque mun-
dum reddit. Semen contritum ex vino sumptum
lac mulieribus reuocat: herba elixa comesta ad
hepatis imbecillitatem facit. Eius etiam com-
bustæ

Buglossa.

Borrigo.
Buglossum.
Libanum.
Corago.

Bugl. vern.

Bugl. sila.

Locus
Temper.Vires
Vitus.

Temper.


bustis cinis, cum melle rosato mixus in oris collutiones vtiliter assumitur contra lingue inflammationem, faucium excoriationes, nec non lingue ac gingivarum: Demoris aut pūctis à serpentibus aliisque animalibus succurrit Buglossi succus aut liquor stillaritis potus, eodémque locus affectus eluitur, superpositis foliis. Aquà Borraginis madens linteum oculis impositum rubentibus & calentibus, dolorem sedat & ardorem extinguit: herba, radix, & semen simul omnia, aut quæ haberi possint, contusa in vino cocta, tepida coxæ superdata, dolorem ischiadicum mitigant. Radix cum oleo oliuarum & hordeacea farina in cataplasmi formam cocta spaciolum corrigit & herpetem esthiomenum (Germanis est *Kaiter brand und wild feuer* dictam.)

Si collegeris (inquit Ioan. Heller D. Iuris Ven. lib. pūc. cap. 8.) in mense Iunio Buglossum herbam, & radicem redegetis in puluerem & miscueris cum paucis succo Nepetæ, manus illiniueris & picaueris, ad tuas manus venient pisces. Aut, Accipe Buglossum & calcem non extinctam, pisces morientur. A Ioan. Porta, cibo gratissimo flos acetariis spargitur & folium tenerum, quod proprium odorem subleat, vestustiora verò folia in quotidianis obsoniis peculiarem habent gratiam. Condituram Buglossi tradit P. Platina Cremonensis lib. 4. de tuenda valetudine & popinæ scientia. Hoffer. de morb. intern. lib. 1. cap. 54 ad promotionem mēstruorum, secretum esse dicit quarundam mulierum, vti confusà Borraginis, dissoluta in vino albo tenui. Borraginem calidam dicit Lonicerus in principio primigradus. Herbam eius cum Blito decoctam deuorantemque notabilem esse corroboracionem debiliū infirmorum, si interim de floribus bibant. Herbam in cinerem redactam, cum aqua nulla contemperatam, salutarem esse medicinam contra omnis generis affectus, oris & lingue, si sæpius eo lauentur. Borraginem cum Buglossis eandem habere virtutem, vnam pro altera vsurpari, ac earum nomina inter se confundi. Herbam in vino decoctam & bibitam bonum sanguinem facere. Succum cum saccharo mixtum propinatūque vertiginem depellere. Syrupum de Succo Borraginis cum saccharo & puluere ossis cordis Cerei tremori cordis auxiliari. Succum cum Syrupo de Sena commixtum, haustumque mane & vespere, rationem augere, melancholiāque depellere. Florem crudum mansum sanguinem bonum generare, & tremorem cordis emendare. Ictero Syrupum mederi itemque cor & spiritus vitales secretare. Aquam florem, seu etiam herbæ & radicis in finē mēstris Mail distillatam mane & vespere Vnciæ pondere propinatam, ad eadem omnia prodelle.

BORRAGO SYLVESTRIS TENVIFOLIA.

Borragines siluestres præcipuam habent differentiam in foliis: quæ vel angustiora sunt, quam in latius, vel Tabernamontano auctore à quo planta hic à nobis propōita tam in Icon. quàm in Hist. vocatur Borrago siluestris floribus albis. *Wilder Borres.* Item Borrago tenuifolia *Burresch mit schmalen Blättern.*

Gerardo Angl. Lycopsis Anglica, *Vipers Bugloss* & *vual Bugloss*. Item Borrago flore albo, *vvhite fleuven Borrage*. Is ponit iconem



BVGLOSSVM FOLIO BORRAGINIS
Hispanicum.



Buglossi Hispanica bicubrales & altiores attollit caules, fistulosos, angulosos, hispido, asperisque, nec in ramos diuisos: folia Borraginis, rugosa & aspera, spinis mollioribus quàm in Borragine & Buglossis, interdum longo, alia nullo pediculo donata, acuta, præsertim in caulibus, quæ verò propter terram infima sunt, magis rotunda existunt, albisque punctis maculata: multò latiora & non ita breuia vt in Buglossis vulgaris maiori, ex quorū alis pediculi hirsuti sextantes aut quadrantes surgunt, duobus foliis circa fastigium donati, inter quæ flores emicant cærulei, Buglossi annuli, sed calyce breuiore & veluti sessili non vnde se explicantes, quinque partiti. Radix crassa, adnatis donata, cortice nigro densiusculo obiecta, intus alba, sapore lento & viscido.

De Buglossis à nobis hic descripto loquuntur Monachi in Mesuem Dist. 6. cen. 48. cum dicunt. Buglossam Dioscoridis indubiè tenemus quam in Hispaniis inuenimus. Flores producit lanugineos, paruos, floribus nostræ Buglossæ penè similes &c. Hanc etiamnum pro domestica Buglossa accipiendam esse non dubitamus.

An Matthiolus in Dioscoridem huius meminerit sub nomine Buglossi Hispanici perpendant lectores, non describit nec depingit, tantum mentionem facit.

Lobelius in aduersariis pag. 247. & Icon. Plant. pagin. 575. Buglossum semper virens appellat.

Tabern. Borraginis tenuifolia, quàm bene iudicare poterunt lectores.

Lycopsis.

Cam. horti etiam Buglossum semperuirens. Cæsalp. lib. 11. cap. 4. Buglossa Hispana, cui conuenire di: it descriptionem Lycopsis apud Dioscoridem. Hist. Lugd. Buglossæ genus quod hodie ex Hispania allatum in hortis feritur. Tabern. Icon. & Hist. Buglossum Hispanicum, *Spanisch Ochsenzunge*. Non placet icon ex aduersariis Penæ & Lobeli desumpta. Catal. Franc. Buglossum Hispanicum, Borrugo hiemalis. Dodonæo latino in fol. Anchusa prior, *ὀνύχουσα* appellata: à nonnullis *αλόε*: à nonnullis in Belgio Buglossa Hispanica.

Locus & Tempus.

Buglossi Hispanici nomine ex horto Patauino attulit mihi Frater, vidi etiam Argentinz in horto Frederici Meier vnde habui semina, nunc Montbelgardi se non parum multiplicat semine deciduo, tota hieme viret, nec annua est planta: in horto E.C. tota æstate florere ac etiam autumno.

Vires & Vfus.

Cæ erum Anchusæ Onocliæ radix refrigerat & rescat, auctore Galeno (vt refert Dodonæus) & vna adstringit: & quia tubamata biliosos etiam extergit humores: folia imbecilliora, adstringunt tamen quoque & resiccant. Dioscorides ad ambusta & vetera vlcera ex oleo & cerato efficacem radicem ait: erysipelatis cum polenta medendi: lepris & virginitatibus cū aceto imponi pariter extrahere genitali impolitis: decoctum ex hiberni licticis, nephriticis, & splenicis: febricitantibus cum melicrator: ad vnguentorum spissamenta à pigmentariis vsurpari: folia in vino pota aluum sistere.

BVGLOSSVM VVLGARE MAIUS ET MINUS, flore vtrumque duplici.

Descriptio.



ferri, Borruginis floribus dimidio minores, colore dilutiore, cærulei interdū & albo, in quinque laciniis ebullas abeunt, quarum singulis ad basim sinibus adnata villosa ex purpura albescentes, totidemque subiecti apices nigricantes, in floribus tubulo longiusculo, quem quinque ambiunt acuminata & hispida folia [Trago flores radiati instar rotulæ, partim candidi, partim purpurantes ante solis ortum, qui si radiis suis violas percussit, pulchre cæruleo inficiuntur colore.] Floribus decussis in vasculis tria vel quatuor semina coniunctim posita, oblonga, ru-

gosa, veluti semen Confoliæ maioris at maiora, sapore Amygdalino prædita: radix Symphyti instar, foris nigra, intus albet, gustu lento. (Trago quandoque cubitum longa, recta, pulla foris.) Magnitudine verò differt altera huius speciei illa, foliis similiter longis, hispidis, sed contractioribus, floribus minoribus albis vel purpureiscentibus, interim caulis altitudine parum aut nihil cedit interdum. Trago breuior, angustior, acuminatior, ac quoad omnia magis exigua est, semine præsertim, quod & magis nigricat, flores similes, iique nonnulli cærulei, alij planè purpurei perpetui.

In tanta authorum de Buglossis discrepantia operæ prædium nos aduersos æstimamus si separatim cuiuslibet opinionem adscribamus, nec enim facili negotio discordes eorum mentes quis conciliabit.

Simoni itaque Genuesi, Buglossa dicitur nonaginta species syluestris. Syluio de comp. med. lib. 1. Buglossum magnum, Cirsium Dioscoridis dictum Buglossus vulgaris videtur: notas tamen Dioscoridis quædam tradit desiderari. Hemmolaus lib. 4. coroll. 33 Cirsion potius quam vt quidam [Leoniceus] Cirsion legendum testatur, huicque herbæ similem esse Hircinam linguam vulgò dictam. Sed caule rotundo non anguloso vt Cirsion.

Marcus Virgilius in Dioscor. lib. 4. cap. 120. Buglossum omnibus notum ait non tamen Antiquorum. Contra ait Guil. in Theone. Non videre satis queo, quæ causa sit. Cur vulgare officinarum Buglossum antiquorum esse Buglossum non possit. Ego profecto subulam præcæ ætatis linguam, Græciæ, Italiæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, & in summa omnium gentium vnanimi consensu, vulgare Buglossum esse defendo.

Ruellius lib. 3. cap. 126. ait: Cirsium alii Buglossum magnum, Romani Spinam mollem nominant &c. Cirsion herba est quam rusticis, simul & officinæ, nec non Herbarii vocant linguæ bouis vel Buglossum. An verò de minore vel de maiore loquatur Ruellius dubito, crediderim ramè de maiore loqui, quicquid ad eū dicat Cordus qui eius verba de minori Buglossis intellexit.

Considerandum de quibus Buglossis hæc tradat Corn. in Diosc. Officinæ Anchusam Onocliam, Buglossum subrum appellant, & perinde nostri *Rote Ochsenzunge*. Idem lib. 4. cap. 101. Cirsion & officinæ & vulgus herbariorum Buglossum vocant. Nostri *Ochsenzunge*. An etiam Apollinari. 2. nomine *Ochsenzunge* maiorem intelligat vel minorem asserere non possum.

Brunk. in horti Gerio. pag. 41. *Uyld Ochsenzunge*: pag. 42. videtur tradere pro Buglossis vulgari. Textor de peste lib. 1. cap. 4. Buglossum filu. & cap. 7. Buglossum vulgare vocat. Helsticus in nomencl. cap. 21 his nominibus Buglossum, Borrugo, *Ochsenzunge*, *Burreisch*, *Βούροισον*: *Bugloss*, *Bourrache*, duæ tantum plantarum nomina permiscet.

Herbarium antiq. Cubæ cap. 54. pro Buglossa, *Ochsenzunge*, ineptam habet iconem eam non demonstrantem.

Tragus lib. 1. cap. 77. pingit hoc titulo, Buglossa Italica, *Welsch Ochsenzunge*: describit verò nomine Buglossæ domesticæ maioris: Cæterum apud eum secunda figura Buglossæ maioris superflua videtur, aut titulus mutandus, nec apud eum inuenimus figuram quæ bene exprimat minorem Buglossam siue angustifoliam.

Fuchsius

Fuchsius Icon. p. 150. Echium Italicum (spino-
sum, *Vvelsch Ochsenzung*. Item pag. 151. Echium
lanuginosum primum *Gemein Ochsenzung*. Quam
autem Fuchsius in Hist. cap. 51. de bugloio [Bor-
ragine sc.] buglossam vulgi vocat, de ea cap. 130.
hulce agit. *κίχινος* Græcè, spina mollis, buglossum
magnum, Officinæ necnon Herbarii buglossum
& Linguam Bouis vocant. Germ. *Ochsenzung*, nos
duo damus genera, quorum vnum Germanicum,
alterum verò Italicum est, in quo omnia sunt
maiora: Præd. Gallis *Buglosse saunage* aut *Langue de Bœuf*: alterum *Langue de bœuf*, officinis
Barba Hircina nuncupatur.

Matth. in Diosc. l. 4. c. 123. figuram habet Bu-
glossi maioris, hoc titulo Buglossum vulgare,
deinde dicit. Buglossum vulg. & c. Buglossi nomen
sibi falsò vendicauit. Non tamen negare ausim
quod vulgare Buglossum in campetibus nascens
isdem cum Borragine polleat viribus &c. Atque
facie non multum dissidere ea inuenias, si illud
genus spectes, quod hodie in hortis seruit ex
Hispaniis allatum &c. Non desunt qui asserant
vulgare Buglossum Echij genus esse. Alij Cirsium
existimant. Idem cap. 114. Credidi re recentiores
quamplurimi rei herbarie periti, nil aliud esse
Cirsium quam vulgare Buglossum. Sed mihi planè
hæc Sententia, pace eorum dicere, infelle-
nda potius, quam probanda videtur: quòd Buglos-
so caulis triangular non insit, sed rotundus: quòd
ab imo foliola per ambitum auleata rosæ spe-
ciem non referant, sed longa & continua pro-
deant: quòd denique Buglosso flores non euane-
scent in pappos, sed lauescentes integri decidan-
t, relicto in folliculis semine. Cirsij autem,
nisi quam quod legerim, meminerunt in simpli-
cium censu Gelenus & Paulus.

Anguill. epit. 14. Licet opis nihil aliud esse quàm
vulgaris nostra Buglosa, quam posita ait hodie
in Græcia etiam Buglossam dici.

Lacuna in Dioscoridi libro 4. capite 129. statuit
officinas pro Bugloso exhibere plantam quæ
non sit Buglossum, non negat tamen quin defi-
ciente Borragine possimus uti hoc vulgari Bu-
glossum quod exitum aut Echij periciet.

Amatus in Dioscor. lib. 4. enarr. 29. capite de
Echio vocat buglossum vulgare, ibi ut appoluit
figuram, sed malè nomine Echij syluestris in im-
pressione Lugd. Idem lib. 1. cap. 27. Cirsium siue
Buglossam nominat. Et rursus lib. 4. cap. 120. offi-
cinarum Buglossum & vulgare in annot. Roberti
Constantini. Idem lib. 1. cap. 27. per *κίχινος*
Homeri quoddam Cirsium Buglossum intelligere
dicit. Et l. 4. cap. 120. Cirsium nostræ vulgare
Buglosse respondet vt fatendum sit eandem her-
bam esse. Ruellius quoque patrocinator & me-
ritò. Matthiolus mirò bene Cirsium aliam plan-
tam in Buglosa esse contendit. Contrà Robertus
Constantinus apud Amatum ait. Officinarum
Buglossum species est Echij, etiam Fuchsius teste.
Nimis pertinenter Lusitanus Matthiolo & ra-
tioni resistit agatur dum Ruellium sequitur.

Castor Durantes vocat buglossam & buglos-
sum vulgare, traditque hortensè & sylvestre, ma-
ius & minus.

Gesl. in append. dicitur Buglossus albis flori-
bus. De hort. Buglossus minor vel communis,
& Italica vel Gallica maior. De Collectione
stirp. Buglossus maior. Item Buglossus vulgò di-
cta minor, quam alij Cirsium esse coniciunt, Bu-
glossus Italica.

Confusè Occo Buglossam, *κίχινος* vocat E-
chium.

Ponit Euch. Ræss. in herb. buglossum angustio-
folio, cum hoc titulo, *Groß zam Ochsenzung*: al-
teram verò vulgarem, latiore folio, hoc, *zam*
Vvelsch Ochsenzung: Cur autem *Vvelsch* dicat
nescio, in agris Germaniæ prouenientem læpè
vidi.

Ruffius in Dioscor. lib. 4. cap. 22. Echium. Bu-
glossa vulgaris *Gemein Ochsenzung*. Hac, inquit,
Officinæ ferè omnes pro vera Veterum buglossa
vtuntur.

Theophrast. Golio buglossa dicitur. Harchio
in Ench. Buglossum quo hætenus vix sunt offici-
næ, Cirsium Dioscoridis quibusdam. Rheginio
in exerc. pag. 49. Buglossum magnum Cirsium
dictum.

Lacuna lib. 4. cap. 120. in Dioscor. ait quoddam
sibi persuadere ferè vulgarem buglossam aut
Linguam bouis esse Cirsium, sed ratione carere
eorum opinionem.

Lonic. lib. 5. cap. 151. *Gemein oder grasß zam*
Ochsenzung. Græcis Echion, Lat. Alcabacum
offic. Buglossum, Gallis *langue de bœuf*, Pharmac.
assumunt pro Buglosso, folia sunt angusta & acu-
ta, flores ex æruleo purpurei: prouenit iuxta
vias & aspera loca. *Lonicerus* iconem habet bu-
glosse folio angustio, flore minore: verum facile
est videre ex ei adsc. iptis cum diuersas plantas
confundere, nec scire quid scribat, magnum &
domesticum Buglossum esse folijs angustis vbi-
nam prouenit iuxta vias, & in asperis locis Bu-
glossum quod pingit? Præterea proponit alte-
ram iconem sub titulo, *die andere wild Ochsen-*
zung, id est, Buglossum alterum si u. quæ videtur
esse Buglosi angustifolij flore minori: nec id be-
nè distinguit ab Echio vulgari eodem capite po-
sito. Dicto l. cap. 155. addit *die grasß Vvelsch Och-*
senzung, id est, magnum Italicum Buglossum di-
citur apud Dioscor. Cirsium & Cirsium. *Latinis Buglossum*
Buglossum Italicum &c. Sic Cirsij descriptio-
nem cum Buglosso latiore folio & flore maiore
confundens. Is tandem iam dicto lib. cap. 157.
non absque graui errore Borraginem esse ait le-
gitimum buglossum: vulgare autem hoc buglos-
sum siue Echion (vt ait) officinas malè nominare
buglossum scribit. Sed rursus malè buglossum
cum Echio confundit.

Nos, aiunt Monachi dist. 6. cens. 148. negamus
Cirsium vel Cirsion esse communem atque vul-
gare buglossum. Item buglossum Dioscoridis
non esse buglossam nostram firmissimè asserimus.
Pro sylu. buglosa Mesie accipienda quam com-
muniter vocamus buglossam.

Maxima ac manifesta, inquit Cron. de comp.
med. non videre extremæ inciriæ est: ægrè tamen
diu consultam de buglosa opinionem deserunt
quidam Herbarii, sed ij dicant eam Dioscoridis
Cirsium esse, attestantibus Ruellio, Hermolao,
Leoniceo, Monardo, Syluio, Fuchio, viris sum-
mis & rei herbarie peritissimis. Vos tamen
Hyerconimus Tragus cap. 77. lib. 1. Nicandri ac
Dioscoridis auctoritati confidens, Echion deter-
nit, quamuis plerique syluestrem buglossam eo
nomine verissimè intelligant. Reuera indecorum
est, & detrimentosum tamen ad hæc vsque tem-
pora extritis buglosi ac Borraginis ignorantiam,
quam Medicinæ iniuriæ, haud sine pudore & dis-
pendio negligere possunt. Nam quâ facie, quòve
prætextu, artem medicâ proficerebunt, si res tam
necessarias ignorare conuincuntur? Nisi turpe
non sit alicui, id profiteri quod nesciat. Floribus
præcipua venustas ac gratia, qui hoc loco Zac-

Cirsium.

Cirsium negm.

Buglossum
Italicum.

Non Cirsium.

charo condiri debent: Herba autem uicō & singulari dono prædita creditur, ad animi lætitiā augendam, & subolent nescio quid iucundi folia. Hæc Cronemburg, qui lib. 2. Nepeanthen fieri & Buglossa multis ita suspicantibus notis existimat.

Robert. quoque Steph. de arb. p. 19 Buglossum siue Buglossam nostram vulgarem esse Cirsiū Dioscoridis credit.

Quæ, inquit, Apollo Rad. prim. Buglossi nomen falsò sibi vendicauit, siluestre, seu erraticum Buglossum appellari poterit, quidam Echij genus putarunt, alij perperam Lycopsum cum Anguillario: verum Herbariorum bona pars, vt etiam Lessenius cum Fuchsio Cirsiō: obstat tamen caulis rotundus, qui in Cirsiō triangularis est: sicut nec foliola, ab imo rosarum specie, spinosis angulis producit, verum longa & contrita, obstat & capitulorum [etiam itidem purpureorum] forma &c.

Dodon gall. duas habet figuras, dicitque Buglossa aut Lingua Bonis officinarum. Gall. Buglossa aut langue de bœuf. Germ. Ochsenzunge. Belgicè Buglosse & Offenzyng, quamuis non sit verum Buglossum. Prima species *lycopis*, Latine Lycopis, officinis huius regionis Buglossa & Buglossa domestica maior. Secunda species est Anchusæ genus, videtur *anchusa*, *alysidion* & *eyoxides*, Latine Anchusa, Alcibiadion, Onocheles. Lat. in fol. Buglossa vulgaris, Posterior ætas Buglossam & Buglossam vulgarem appellat, ac pro vero Buglossa in vsum recepit. Hæc autem veteribus Lycopis est dicta quam Galenus inter Anchusæ species numerat: à quo Dioscorides quoque haud alienus est, Lycopis à nonnullis Anchusam vocari referens. Nec temerè inter Anchusas habetur, cum omnibus partib. ipsas referat. Esse hanc Lycopis veterum, dubitare non poterit, qui ipsam cum huius descriptione contere voluerit &c. Audiendi minime sunt illi, qui Buglossam vulgarem Cirsiū esse existimant: Cirsiū siquidem ex Carduorum est generibus cuius flos in pappo abit, in Buglossa neutiquam.

Aduersar. p. 246. Buglossum vulgare angustifolium. Hæc planta diuersa à Buglossa minus vera retinuit non en Buglossæ. Huius radix foris nigra, perennis, proluxa, glutinosa, edendo medendūque vti Borrigo nata, & flores concolores, Primulæ veris modo aut Anchusæ, sed en maius quàm Borriginis, minus nigrum, folia longiora, angustiora, Echio aut Lycopis toto habitū, tam propè accedentia, vt ei desuisset rubellus radici color Lycopis domesticam facturi fuissimus, qui quia nigricat potius Echium indicat, aut vtriusque anceps natura. Lobel. icon. pl. pag. 176. obs. p. 110. Figuram habet hoc titulo, Buglossum angustifolium Aduers. 246. Cirsiū italicum Fuchsio. Germ. *Vvelsch Ochsenzung*: deinde dicit Buglossi vulgaris varietas. Altera folio habiliore, flore cæruleo, rariùs albo. Altera strigosior, folio angusto, flore purpureo rubello, hortensis.

Camer. horto Buglossum Italicum vel Hispanicum grande, cæruleis, & interdum albis, interdum variegatis floribus. Cæsalp. lib. 11. cap. 2. Buglossa floribus cæruleis aut purpureiscentibus: Buglossum Dioscoridis in can. pestribus nascens, Euphrosinon Plinij. Idem c. 3. hanc veram adstruit Buglossam à similitudine Symphiti: Aui cennam de Buglossa agere scribit, quando dicat:

putate se esse linguam Bonis Persicæ, cuius proprietates sit lætificare & tristitiam remouere.

Hort. Lusit. Buglossum vulgare floribus rubris *Ochsenzung mir roten blumen*. Item Buglossum vulgare floribus cæruleis. *Ochsenzung mit blauen blumen*. Thal. Buglossa siluestris nigra, florem nigrum obtinens vulgaris Buglossæ, sed minorem.

Georg. Pict. apud Macrum in annot. vocat *Ochsenzungen*, & Dioscor. *Βυλῶσσος*, pro quo figuram apposuit ineptam potius Carthophilatam experimentem.

Tabern. icon. & hist. Buglossa vulgaris, *Ochsenzung*: & Buglossa Italica mas. *Vvelsch Ochsenzung Manlein*. Item Buglossa Italica femina: *Vvelsch Ochsenzung Vweblein*. An Tabern. Buglossa vulgaris est Buglossa angustifolia? An eiusdem Italica eadem cum Buglossa maiore latifolia, quæ eadem in Germania spontè provenit vt obseruauit sæpiùs, abundat sanè in agris Bolvil ad Brisflac: femina forte illa est.

Maior domestica Buglossus in quibusdam regionibus, vt in Lotharingia in agris optimis, provenit, authore Tragō, alias in hortis plantari consuevit, folia mente Aptili profert, Maio mense caules emittit. Floret vt refert Dodon. à Maio aut Iunio vsq; in æstatis finem, folia hieme pereūt, vere verd noua erūpunt. Montbelgardi in horto E. C. mihi provenit Buglossū maiori folio & maiori flore cæruleo: obseruauit propè Montpeliū & prope Frontignan spontè provenientem, necnon in Rhætia: & Lugduni in agris florentemq; Maio, in Alsatia etiam in agris inter Brisflacum & Entlesheimiam: Basileæ in hortis florentem Maio & Iunio: Parauij in hortis. In Burgundia in Abatia trium regum vnde transiit in hortum E. C. & meum: Geneuæ in pratis florens Maio. Eiusdem generis aliud crevit in horto E. C. flore albo, cum aliqua rubedine: Idem vidi Sturgardiæ in horto Ducis & folio & flore maiore. Tubingæ cum essem Clarissimus meus præceptor Fuchsius in horto habebat duo genera Buglossi parua: vnum vocabat Echium album ob flores: alterum Echium lanuginosum purpureum. Hæc eadem habeo in horto E. C. voco Buglossum angustioris folio flore minore. Vnum est purpureum colore violæ aut Anchusæ: Alterum est flore albo. Buglossum angustifolium vidi Viennæ in cænobio S. Dominici à l'Angeli. Buglossum flore minore albo & purpureo Gæppingæ in horto Ill. E. C. & in *Vvessensberg* in horto ill. Com.

Qui sibi persuadent Buglossam vulgarem esse verum Buglossum, legant antè vires attributas ei ab antiquis, nos facillè concedimus ad Ischuriam facere, & ad asperitatem gutturis. Si Cirsiū est vt alij existimant, videant caput de Cirsiō: concedimus Buglossæ vulgaris radicem posse conuenire ad sedandos dolores varios. Lobelius & Pena tribuunt Buglossæ vulgaris similitudinem in viribus Borriginis. Errare Medicos ait Ferrer. cum Buglossi radicem, crasso, tenaci, lentoque succo præditam, apozematibus aperientibus inferant. Buglossum autem cum sit viscidissimum, vt succus extrahatur, consulum debet in pelui sensim calciferi: sic enim stum spontè fundit succum, cum expressio frustra aliàs tentaretur.

* *

ECHIVM

ECHIVM FVCHSII SIVE BORRAGO
filuestris.

Digitali radice donata est, longiuscula, raris filamentis fibrata: ex cuius capite plures prodeunt *caules* dodrantes & cubitales aut etiam altiores, hirsuti, asperi, ramosi, fragiles: *folia* Echij, magis hispida, sinuosa, sapore fatuo: ad Borraginem accedentes: flores purpureo-violacei, Buglosii minores, quinquepartiti, ex calice rotidem folijs constante, *semina* quatuor Echij continente.



Fuchij hist. cap. 103. huius figuram Echij titulo habet, quo nomine etiam describit. Tragus sylvestre Borraginis genus facit: Dod. Gall. figurâ Fuchij proponens Lycopsum filuestre nominat. Latino in fol. dicitur. Buglossa sylvestris, Brugglosse mino is: species, folijs asperis ac oblongis, sed multo minoribus: flosculis quo-

que cæruleis sed exiguis: radice tenui & albida, quæ Lycopsis quadam minor est, aut potius Anchusæ quoddam sparium genus, vulgò Buglossa filuestris nuncupata.

Pen. & Lobel. Adnerf. pag. 247. Erraticum Buglossum asperum Echiodes. Est & hæc perquam similis qualibet sui parte superiori, & penè par, macilentis & sabuletis Antuerpiæ vicinis passim spontè, ut etiam in hortis prouigens: Utunturque Buglosii penuriâ Pharmacopœi, quibus filuestre Buglossum creditur: admodum horrent, hispidaque sunt folia, seracis pilis rigidis & pulvis prominulis, tamùmque & simili differt modo à superiore, quantum Labrum Veneris à Diplacò hortensî. Radix gracilio, lignosa.

Reperitur in hortis inter oleta, frequenter etiam in agris frumentum ferentibus, astutius mēsis vigens. Echium Fuchij Montpelij provenit. Montbelgardi inveni flores in segetibus prope Courfelle, mense Iulio: transibit in hortum E. C. ubi quotannis se renouat, semine deciduo, florens Iunio & Iulio. Genera in hortis à regione domus Senatoriæ cum flore Maio: Limitibus agrorum Scotiæ luxuriat, non parum segeti damnosum, refertente Gargillo.

Tragus hac Borragine filuestri, pro sativa, ubi id necessitas postulabat læpeneretò vñus est.

ANCHUSÆ VETERIBVS IN GENERE.
CAP. III.

Dioscorides tres Anchusæ species tradit, his verbis: Anchusa, quam nonnulli calycem [*καλυκας*]: alij onocleam [*ονοκλειαν*] appellant, *folia* habet Lactucæ: quæ folio vitur acuto pro-

Tom. III.

xima, hirsuta, aspera, nigra, numerosa, vnde cumque [*σπινθηριον*] ab radice velut affixa, spinosa: Radix illi est digitali crassitudine, colore quodammodo sanguineo: quæ ætate vel eo agnoscitur, quòd manus inficiat: Læto solo prouenit. Radix vis astrictoria, ad ambusta veteraque vlcera efficax, si in oleo addita cera decoquatur. Erysipelatis cum polenta imposita medetur: itémque vitiligni & lepris ex aceto illita. Vulvæ quoque subdita, parius extrahit. Datur & eius decoctum bile suffusus, nephriticis ac splenicis, si febris sit ex aqua mulsæ. Folia verò sicut alium in vino pota. Utuntur & vnguentatij radice ad vnguentorum spissamenta.

Altera quam aliqui alcibiadion seu onochiles [*ονοκλειον* & *ονοκλειον*] vocauerunt, à priore distat, quòd minora habeat *folia*, quanquam simili modo aspera, & ramulos tenues, in quibus *flor* purpureus in puniceum [*Orib. η φανικον*] vergens: *radices* autem rubras, prælongas, quæ mellibus sanguineo succo turgent. [*V. αγγουα αιματωδης*]. In sabulosis nascitur. Tum ipsa radix, tum & folia contra venenatarum bestiarum, maximèque viperarum, morsus efficaciter auxiliantur siue cibos, siue potus, siue etiam amuleto. Quin & si quis iis commanducatis ad venenatæ bestie os expuerit, eam enecabit.

Hanc in nothis aliqui Cathanchusam vocant, spuria Diosc. alij Lybicam, alij Archibellion, alij Alcibiadion, alij Onophyllon, alij Phorphyrida, alij Myddusan, alij Salycem, alij Nontam, alij Buinesach.

Est & alia tertia, huic similis [videlicet secundæ] ac minore semine eoque puniceo, quo commanducato si in serpentis os inspuatur ea morietur. Radix autem acetabuli mensura cum Hyssopo & Nasturtio pota latus ventris tinea pellit.

Hippocrate lib. 1. De morbis mulieribus [*χερσιδαι την ιασην* & *χερσιδαι την μενσιν*] habet, quam Galenus in Glossis [*την εγχυσαν*] exponit, atque sic etiam appellari dicit: lib. verò 6. inter vteros purgantia Anchusæ [*Ανχουσης*] folia ad pugillos duos in vino, pari aqua temperato, bibendum præcipit.

Paulus lib. 3. cap. 42. Anchusam quæ spinosum, & larum, & nigrum folium habet [*χοιροσπινθηρον*] appellari dicit: & lib. 7. c. 17. in emplastro ex herbis, Anchusam chærospelethron, Onocleam esse ipse exponit. Significat autem hæc vox Iugum porcinum. Meminit eius etiam lib. 7. doli bellarum suarum in Paulum Cornarius.

Theophrast. lib. 7. hist. plant. cap. 9. Proxime quidem terram foliatam esse [*εγχυσαν*] Anchusam tradit. Scalig. verò in hunc locum, se in Anchusæ stipite foliola animaduertisse notat.

Anchusam commemorat Plinius. Et quidem lib. 22. cap. 20. ait. Et Anchusæ radix in vñu est, digitali crassitudine. Finditur papyri modo, manūque inficit sanguineo colore, præparat lanas prætiosis coloribus. Sanat vlcera in cerato, præcipuè lenum, itém adusta. Liquari non potest in aqua, oleo dissoluitur, idque syncera experimentum est. Datur & ad renum dolores drachma eius potui in vino: aut si febris sit in decocto Balani. Itero Iecinorum vitij, & Lienis, & bile suffusus, Lepris & Lentiginis illinitur ex aceto: Folia trita cum melle & farina luxatis imponuntur. Et pota drachmis duobus in mulsò alium sistunt. Pulices necare radix in aqua decocta traditur. Capite verò sequenti 21. eiusdem libri, de altera Anchusa sic tradit. Est & alia herba proprio nomine onochiles [onochilion Ch.] quam

Vuu

Onochils

Archelion.

Alcibiad.
Echson.

Eng 1014/18.

ANCHUSA MINOR SIGNOSIOR.



An Lobel. in Adu. p. 248. & Icon. Plant. pag.
578. *Anchusa lignosior angustifolia*? H. Lugd.

pag. 1102. Anchusa lignosior Penz. C. Bauhin. phyt. Anchusa 9. hinc Angustifolia seu Pseud-Anchusa. Dicit C. Bauh. in animadu. in H. Lugdunensem, Anchusam Lignosior Penz. Hist. Lugdunensi pag. 1102. in eadem hist. ante pag. 889. sub Tragorigano nobis Dalechampi haberi, ac utrobique describi. Ego quidem quænam sit Anchusa lignosior Penz. nondum asserere possum. Color floris à Gesnero observatus dubium mihi mouet, cætera videntur satis conuenire & potiss. locus: quicquid tamen sit non potest esse eadem planta cum Tragorigano nobis Dalechampi fruticosa lignosa, interdum bicubitali, qui pauca habet quæ conuenire possint Anchusis, flos speciosus purp. Dalechampi Anchusæ verò Adu. pusilli flores carulei. Icon quam proponimus est ex Pachtianis nec in his cuius plantæ, quodammodò exprimit Anchusam nostram minorem.

ANCHUSA LVTEA.



Succo plenâ habet radicem perinde ut Onochiles, caulem hispidum, pedalem vel etiam maiorem, tenuiorem, folia per ramos breviora, pari tamen latitudine, flores in cacumine congestos & spicam ferè imitatos, concavos, Symphiti maioris, exiliores, luteos: semen Echii simile, nitidum, cinereum, punctulis nigris notatum, ferè triangulum & mucronatum, rostellum auiculæ formâ.

Lobel in Aduers. pag. 2. 8. Lutea Anchusa: rarior & elegantior. Dodonæus lat. in fol. vocat Anchusam quartam, foliis asperis hirsutis ac pungentibus, ac non rardè humi orbiculariter procumbentibus: Eam etiam illam esse posse putat quæ à Plinio lib. 21. cap. 10. Pseudo-anchusa appellatur: & à quibusdam Enchusa ac Doris.

Matthiol. Anchusam tertiam: Item H. Germ. & Epit. Ochsenzung. Anchusa tertia, cuius figura non displicet: placet etiam Camerarii ad nostram plantam olim fricta & appositâ: h. Germanicæ & Epit. Matthioli. C. Bauhin. phyt. Anchusa 2. siue maior luteis floribus: Anchusa Gesn. hort. An Lonicæ. Anchusa tertia?

Anchusam quartam luteam non rardè in Bohemiâ occurrere scribit Dodonæus. Ego Anchusam luteam florentem vidi mensis Iunio inter Viennam & Lugdunum, nec non Lugduni & in montibus Euganeis, ex quibus locis etiam Frater se accepisse refert.

Anchusa lutea minor.

Anchusam luteam minimam Monspel. ager spontè dat, sed rariùs multò. Floribus luteis in pusillis pediculis in se conuolutis Echii ritu caui. Tom. III.

dam Scorpionis aliquantulum æmulantibus: cuiusmodi scitè meminisse industrium pharmacopœum Franciscum Penninum Antwerp. testatur Lob. in Obs. pag. 312.

Anchusa C. Bauhino phyt. Anchusa quarta siue minor Patavina, quam Anchusam minorem Galeni, & Anchusam quartam Dioscoridis Guilandinam nominasse refert, quàmque Cameraarium in Epit. Matthiol. pag. 736. Anchusæ tertiæ (Anchusæ luteæ) nomine exprimere putat.

ANCHUSA FLORE ALBO AVT pallido Clusij.

NVtrorsum huic sunt folia, palmaris longitudinis, valde angusta, & pungente lanugine hirsuta: è quorû medio caulis assurgit secundo ano (primo enim ancau-
lor est) pedalis, interdum etiam cubitalis, crassiusculus, firmus, hirtosus, in multos ramos diuisus, in quibus breviora multò, hispidaque folia: extremis ramis prodeunt, è vaginulis hirsutis, & asperis flores Symphiti maioris floribus, quodammodò similes albi aut ex albo nonni-

Defectio



hil pallescentes, siue *α' χαλκωρα*, in angulos quinque diuisi, quibus discussis, semen vaginulis conspicitur viperino capiti aut Echii semini simile: radix minimi digiti crassitudinem æquat, nigraque cute tecta est, qua sublata, omnino rubet, & elegantissimo colore inficit: aded autem carnosissima est, ut radicem Buglossi vulgaris instar condiri possit, dulcis tamen & insipida.

Clusio Pannonico & hist. post. Anchusa exalbido flore. Casp. Bauhini phyt. Anchusæ secundæ siue maioris varietas, floris colore albo, aut ex albo pallescente. An Lobel. Obser. pag. 312. Anchusa latifolia Buglossio angustifolio par, radice cruento inficiente & flore albo? An Lonicæ lib. 5. cap. 153. *Rot Ochsenzung*, Anchusa prima copiosa arenosis locis propè Mogun-
tiam, &c?

Nascitur arido & salebroso solo, ut in monte Badenfib. thermis imminente, & aliis vicinis, apud Carnuntum præterea, Pannoniæ olim amplissimam vibem, nunc autem vile oppidulum, Patronella vocatum, maximâ copiâ, tum plerisque aliis Pannoniæ, Austriæque siccis ac aridis locis. Floret Maio & semen Iunio profert: deinde perire arbitror: ut Echii genera.

Anchusa maxima Gallia & Angliâ, floribus Echii non dissimilibus, ceruleis ad puniceum vergentibus.

Traditur hæc à Lobelio in Aduers. cum dicit: Quæ Calys seu Onocleia vocatur, maxima, fre-

Locus.

quentissima, Galliz, & Angliz aruis latis, sed glareosis, vel argillofis. Radix intus ligneo cortulo, libro corticæque crassiore amicta, sanguineo succo sandalinove digitos inficiente: digitum æquat, sesquipalmum longa, gustu Buglossæ. Folia copiosa Echii aut Buglossi angustifolij, lanugine spinosa, incana, celsipiti incumbencia: Caulis plurimum singularis, rotundus, squaber, cubitalis, trifolius florum cæruleis ad puniceum vergentibus, Echii non dissimilibus: semen exiguum, oblongum, pullum.

C. Bauh. phyt. Anchusa prima. siue foliis floribus Echii: Anchusa Adu. pag. 247. sine icone.

An Turnero part. 1. pag. 39. (43.) Anchusa prima Diosc. in multis Germaniæ locis nascens, aded Buglossi hortensii similis, vt non facile quis alterum ab altero possit distinguere, excepta solâ radice intensè foris rubente, non autem intrinsecus. Posset Anglis nominari, Gallico nomine, *Orchanet*, aut *Rede Buglossi*.

ANCHUSA MONSPELIANA.

Descriptio



Anchusa Monspeliaca crassam longamque habet radicem, lignosam, rubram, roseo colore tingentem: caules dostrantales, hirti, per quos folia Echii, rigidis pilis oblita, vnciam vnam aut alteram longa: flores extremis hærent ramulis, conferti, purpurascetes, longiusculi: semen lequ-

tut sublongum, cinereum.

Alcibiadien.
Onochilos.
Locus.

Anchusa minor seu Alcibiadien vel Onochilos. Notissima hæc & copiosissima in Niobrigum agro, vnde Pharmacopei Monspelienses & Lugdunenses Log. vnam ad nundinas quotannis accersunt: nos & vineis & sabulosis aridisque collibus Gramineæ syluæ, propè doctoris Assutij prædium, euendam curabamus, prolixioramque & carnosior pleniorque est radice cæteris. Cæterâ tota minor, angustiora folia, multo numerosiora, viridantia, Buglossi. Cor plures fundit canaliculos teneros, graciles, floribus minoribus, Buglossi minoris angustifolij, puniceis. Semen cinereum, oblongum, paruum, sapor Buglossi, non ingratus, acrior tamen & siccior. Hæc Lob. in Ade. qui eam pingit in Icon. Plant. p. 178. hoc titulo, Anchusa parua Ad. 248.

An Dodon. H. stor. latin. lib. 1. cap. 11. Anchusa tertia foliis quàm Alcibiadien minoribus, angustioribus, nihilominus asperis & hirsutis: flosculi in alis cærulei. Galli cum hanc tum aliam *Orchanette* appellant, Hispani *Soagem*, Itali *Anchuse*. Quam Dod. intelligit vt verum fatear ignoro, appingit enim iconem Buglossi vulgaris angustiori folio. An Lonicæ. Anchusa secunda. Alcibiadien Onochelos, & Onochelis à quibus eam nuncupata? C. Bauhin. phyt. Anchusa ter-

tia siue altera puniceis floribus.

Anchusa altera siue Alcibiadien siue Onochilos, depingitur à Marthiolo quæ cum satis sit descripta tum à Diosc. tum à Matth. plura de ea non dicam. Florentem vidi mense Martio & Aprili, dum floret minus tingit. Prouenit non longè à Monspelio loco satis secco.

LYCOPSIS VETERIBVS.

CAP. IV.

Lycopis quàm & ipsam aliqui Anchusam vocauerunt, hoc perhibente Dioscoride, folia habet Lactucæ. [βύδακτι] similia, at longiora, crassiora [μακρότερα & παχύτερα, pro quo vulgar: Exempl. μακρότερα & τραχύτερα, asperiora legunt:] latioraque, aspera, & circa radice caput ad terram decidua: caulem longam, rectum, scabrum, adnatis multis cubitalibus, & asperis, in quibus flores parui purpurascetes: radix rubra est & adstringendi vi prædita. Nascitur in campetribus. Radix cum oleo imposita, vulneribus medetur, & cum polenta, erysipelatis illinitur.

Priuatim licet (eorsumque à reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac egerit, nihil tamen illi tribuit quod à Dioscoride acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit; post Anchusam Lycopsidem, cum plerisque aliis numerans. Antiquiores autem Græci Anchusæ congenerem fecerunt: Secundamque in eo censu numerabant. Dioscorides vltimam docuit licetque Anchusam esse non dicat sed ab aliquibus vocari: Historiæ tamen ordo & quæ illi tribuuntur notæ Anchusis aliis congenerem merito faciunt.

Lycopseos Equiuoca hæc recensentur: Echium nostrum vulgare. Echium Germanicum siue Borrage sylu. Borrage. Buglossum vulg. maius. Buglossum Hispan. Pulmonaria Italorum non maculata. Cardaca. Amaranthus. Cynoglossum vulg. Lycopsis Rauuolfij.

LYCOPSIS DIOSC. QVIBVS DAM.



Lycopsis Diosc. ap. primè similis planta, radice nititur rubra, ex qua caulis surgit rectus cubitalis: Ex cuius parte ima plurima prodeunt folia rugosa, rigidissima, Buglossi sylvestris, nulli ordine in ambitu extensa, quæ summa versus minora sensim euadunt in cacumen usque. In viginti aut plures diuiduntur ramulos, quibus minora rursus adhaerent foliola vt in Echio. Ex quorum sinu flosculi

Descriptio

flores emergunt tenelli, purpurei, inferiori parte integri, in ambitu verò in sex angusta foliola Gariophyllorum sylvestrium instar diffusi.

Rauvolfii Itin. parte 1. cap. 9. Lycophi Diosc. omnino similis. Item parte quarta. Icon. N^o. 20. *Ochsenzung* seu Buglossi species quæ vera Dioscoridis Lycophis existimanda.

H. Lugd. append. pag. 28. Lycophis Dioscor. Planta rara Cynoglossi genus; & vt arbitror vera Lycophis Dioscoridis.

ECHIVM VETERIBVS IN GENERE.

CAP. V.

EChion, vt testatur Dioscorides, aliqui Dorida [si q. *asidas* Paulus vocat] scribit] Romanum Alcibiadum seu Alcibiadion (Alcibion legendum putat Sacra eius, vt sit ea quam Plinius apud authores non reperit] scribit] appellant; *folia* habet oblonga, aspera, aliquantulum tenuia [ὀπίσθητα: subalbida, ὑπέρυα. Cæsalp. ex Orisatio.] Anchusæ proxima, aut minora & pingua [sunt qui addant hoc loco, ὑπέρυα. rubra, *Salsæ*] tenui spinosâ lanugine vestita [hæc ver. deler:] *cauliculus* graciles numerosos, vtrinque verò minutata folia expansa, pinnatæque, nigra, ac minora quidem proportionem quò summo cauli propiora sunt: *flores* autem secundum folia purpureos, in quibus & *semen* viperæ capitulo simile. *Radix* est tenerior digito [ἡντοτόρη. *Saxifraga* vet. *δακτύλιος ἀμύγδαλος*] & subnigra: quæ quidem non modo demorsis à serpentibus in vino pota auxiliatur, sed & eos à quibus præbita fuerit à serpentibus feriri minimè patitur. Folia & semen idem ipsum præstant. Sed & radix lumborum dolore sedat, lactisq. vberitatem facit: in vino aut forbitione sumpta.

Echii itaque vini duntaxat meminit Dioscorides, Plin. verò duorum eius generum his verbis. Echios vtriusque generis: pulegio similis, folijs coronata, drachmis duabus ex vini cyathis quatuor datur. Item altera quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt: Echium verò prius lib. 17. cap. 5. etiam Alcibiū vocat; inquit: Alcibiū [Alcibiadion legit Corn.] qualis esset Herba apud authores non reperi. Sed radicem eius & folia trita ad serpentis morsus imponi & bibi iubent: folia quantum manus capiat trita cuq. vini meri cyathis tribus: aut radicem drachmarum trium pondere, cum vini eadem mensura.

Cornarius tandem Pseudo-anchusam Plinij lib. 22. cap. 20. non aliam, quam Echion esse putat, de qua ita tradit. Est & alia similis, Pseudo-anchusa ob id appellata, à quibuldam verò Echion aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior & minus pinguis, tenuioribus folijs & languidioribus. Radix in oleum non fundit rubentem succum: & ab hoc Anchusa discernitur. Contra serpentes efficacissima potu foliorum, vel feminis. Folia ictibus imponuntur. Virus ferpentes fugat. Bibitur & propter spinam. Hæc est veteris codicis lectio, & recta mea quidem sententia, inquit Cornarius. Quod itaque dicit, radicem in Oleum nō fundere rubentem succum, eius contrarium antea de vera Anchusa protulerat, sanguineum videlicet fundere succum, & oleo dissoluta aqua verò non posse liquari. Quod verò ait, virus serpentes fugat, hoc ego de odore

Tom. III.

eius dam suffitur accipio. Sed quod dicit, Bibitur & propter spinam, videtur id esse quod Dioscorides ait, Sedat item lumborum dolorem, hoc est *trahit* ἡ δὲ φύσις ἀλγυα. Porro quid Alcibiadion seu Alcibion eadem sit, quæ Echion & Echis, Nicander in Theriacis testatur. Galenus in Simplicium censu præterijt. Sed Paulus ex Dioscor. vt apparet, hoc de ipso prodidit. Echion aliqui Dorida, alij etiam hanc Alcibiadion vocant, spinosa herba est, quæ non solum commorsis à reptili bestia, cum vino pota auxiliatur, sed etiam præputa: commorsos illæfos conseruat. Quum autem & Paulus & Plinius Dorida vocati Echion testentur, haud dubiè in Dioscor. *ἀσidas* vox corrupta, in *δωδισα* commutanda est. Decantata hæc apud Nicandrum qui posthac nobis, & vt credo legentibus, certior in Echio dux erit, quam tot seculis fuerit Plinius: Qui longius tractata Echij historia, paulò post, Alcibion qualis herba esset apud authores non reperisse se dixit. Cum non Dioscor. tantum sed omnium apertissimè Nicander, eandem duobus nominibus dictam fuisse quondam ostendant: Altero à viperis quas Græci Echis vocant, aut quia earum morsibus medetur, aut quia femina viperinis capitib. similia habet: Altero ab inuentore primòq. remedij huius ex ea auctore: quem Nicander aliq. Alcibion vocant: scribentes fuisse quendam nomine Alcibiū, qui secus aream dormiens à vipera dente sub genu ictus fuerit: excitatumque à somno ex herba hac succum commanducando expressisse, expressumq. bibisse, mox quod reliquum erat expressæ herbæ vulneri imposuisse contra dolorem. Quod posteriores græci latiniq. in Nicandro Dionysioq. accipientes Echion à viperis quibus medetur & à remedij auctore possessus forma Alcibiadum, & diminutiva Alcibiadion pariter dixerunt. Aggeremus de his longius nisi multò antè hæc tempora Nicolaus Leoniceus inter cætera errata hoc etiam numerasset: qui in nominibus magis quam rebus occupatus, Quæ in diuersis scriptoribus diuersis nominibus alioquin eadem legebantur diuersa credens, multa in medicæ matris disciplina miscuit. Nihil autem Nicander in hac re historia certius audiri potest. Nunc ages radices dicam [inquit in Theriac.] Serpenticus adiutrices. Tum duo Echia [ἑχέια] recensibo. Hoc quidem alibi Anchusæ [Ἀνχυσæ] assimile videtur spinoso folio, paucos siquidem alicubi paruosque & in terra fundum, id est radicem, extendit. Altera verò folijs, & in calycibus flos sublimis, paucos verò circum purpurascit flore. Germine sicut viperæ, hirsutum verò supernè capit. Ab his quidem parrem proficiens, aut cauato in ligno, aut mortatio, aut lapideâ pile scil. contunde: &c.

Cæterum, Echios, vti dictum, duplex est Plin. *Æquiuocatio*. Prior quidem Folijs Pulegij quæ à nobis inscribitur Numularia libro 29. Echium dicitur de Ocimoide: Et nobis Echium vulgare quod Alcibiadum & siluestre Buglossum quibuldam dicitur. Echium flore albo vulgare. Echium flore albo maius. Echium tenuifolium. Echium flore pullo. Echium flore rubro. Echium Candia flore pulchriè rubente. Echium Germanicum Fuchij seu Borrage sylvestris. Buglossi. fl. minore angustifolium. Buglossum minimum, cum folliculo. Buglossum latiore folio &c. Anchusa Monspessulana. Lythospermum. Lythosperm. sylvestr. Dod. Pulmonaria. Borrage. Alopecuros montana quibuldam. Echium scorpioides seu palustre. Chamæpitrys folijs non

incis. Personata. Scropularia maior. Stachys Matthioli.

ONOSMA VETERIBVS.

CAP. VI.

Onosma, teste Dioscorid. alij Osmadem, alij Phlonitum, alij denique Ononin vocant: folia habet ad similitudinem Anchuse, oblonga, mollia, quatuor digitorum longitudine & vijus latitudine, in terra iacentia, denique Anchuse foliis quam simillima. Est autem sine caule, sine semine, sine flore. Radicula verò subest longiuscula, infima, tenuis, ac modicè tubescens. Cognitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahunt. Sed & prægnans si herbam (scilicet Lactuca legit in ver. cod. p. 120) eam supergradiatur, abortum facere creditur.

Phlonitis.
Ononin.

Galenus lib. 8. de simpl. tradit [& ex eo Paulus] Onosma vel Osmada, vel Phlonitin, vel Ononin, ex acri & amara constare substantia: proinde quoque credi fetus necare & ejicere, foliis eius in vino potis.

Plinius lib. 27. cap. 12. Onosmati longa folia tribuit ferè a tres [quatuor Diosc.] digitos in terra iacentia, tria, ad similitudinem Anchuse incisa, sine caule, sine flore, sine semine. Prægnans, inquit, si edat eam, aut supergradiatur, abortum facere dicitur. Notat tamen Dalechamp. in Diosc. hist. nec tria legi, nec incisa. Hippocratem eam *πικρά* vocare. Galenum in voc. obfol. explicatione eam describere, & habere tria folia tradere, non animaduertent eandem esse cum Onosmate. Dioscoridem vocari etiam *δρακονόσμη*, & *δρακονίτιον*, non, ut vulgò legitur, *δρακονίτιον* au: horem esse.

Anch. simi-
les.

Rhiza Hip.

Phlonitis

Eadem Guilandinus suis in Diosc. Græcum manuscriptis annotationibus habet. Prædictum Galenilapsum etiam annotavit Robertus Constantinus, cui subscribit Lobelius in Advers. pag. 177. dicens: Plantam Onosma, Radicem abolutè Hippocrates: ùm vocasset, & descripsisset, magnus ille interpres Pergamenus nec Onosma esse suspicatus est, sed eorundem duobus in locis, quasi duo fuissent, unam eandem bis, & eisdem planè verbis, de Hippocrate mutatis, describit plantam, sine caule An. h. isæ similem.

Id Amatus in Dioscoridem videtur sequentibus delineasse *δρακονόσμη*. G. æ. 2. Onosma Latine. Nascitur plerumque inter Rapunculos sua sponte tu aruis nascentes, ita illis similis, ut sæpè (interdum parva est) pro illis eradicetur, postquam verò adulta est, & illi folia maiora facta, hirsuta aliquatulum apparent, quam nos Fer. ariz in horro magnifici Azzioli Scholasticis indicavimus, humi enim serpit, nec aliud propter folia emittit.

Onosma autem existimant nonnulli esse Buglossum sylvestrem siue Echium, de quo mox agemus.

ECHII SPECIES VARIE.

CAP. VII.

ECHIVM VULGARE.

Passim obuium est Echium, caulibus interdum celsicubito altioribus, hirsutis, punctis nigris notatis, ab imo vique ad summum ferè fastigium floribus onustis, atque iis, pulchrè cæruleis

Descriptio



vel ex cæruleo purpurascētib⁹, vel carneo, interdū albo colore præditis, staminib⁹ & apicib⁹ cæcolosib⁹: *filia* aspera, hirsutaque, oblonga, angusta, fatua: Radix longa pollicari crassitudine, lignosa, gustu nullo eximio.

Echium vulgare Hemol. in Diosc. coll. 733. Hircinam lingua

vulgi vocat ac Cirtio simile facit, caule tamē esse rotundo ait, non anguloso ut Cirtion. Caule etiā rotundo effertur ad Ruelliu ita longè eos hallucinari qui Cirtion abutuntur esse.

Cordus in Diosc. lib. 4. cap. 26. dicit Lycopsin à florum figura dictam esse, qui [scilicet flores] hiantes suo rictu parulas luporum fauces imitantur. Et idè malè hanc ab aliquibus Cynoglossam appellari. Cap. verò 120. vocat etiam asperam Anchusam quam similiter malè Cynoglossum vocari ait.

Lycopsin

Cynoglossam malè.

Brunfels. tom. 1. Rhap. 17. habet figuram sub titulo Buglossæ sylvestris, *Wild Ochsenzung*. Sed & Tragus lib. 1. cap. 77. hist. German. *Wild Ochsenzung* vocat, quam cum cap. Dioscoridis de Lycopsin conferendam putat. Ille autem eius figuram non habet hoc capite, sed fortè mala eius figura posita pro Cynoglossi cap. 76. Sic quoque Hist. Latina lib. 4. cap. 77. hanc vocat sylvestrem Buglossam & Lycopsin, eiusque descriptionem tantū ponit, figura enim quæ apponitur alterius est plantæ: fortè transposita est, videturque esse cap. 76. malè sub titulo Cynoglossi *Hundszung*: Hæc fortè occasio ut Fuchsius olim in historia confuderit duas plantas: Echii enim titulo cap. 103. pingit Bormaginem sylvestrem, Cynoglossi verò cap. 156. Echium hoc vulgare, quod ibidem Cynoglossum officinarum vocat, & *κυνόγλωσσον* Græce, Latine Linguam caninam, Germanicè *hundszung*. Gallicè *Langue de chien ou espee d'archanette*. Ast ut dictum confundit Fuchsius Cynoglossum vulgare cum Echio vulgari, ut satis apparet ex descriptione & figura, quæ eadem cum Tragi, quam Echium vulgare aliquatenus exprimit: idè Fuchsius errorem fortè agnoscens in iconibus pag. 264. eam figuram Lycopleos nomine donavit. ac Germ. *falsch hundszung* appellavit.

Hircinus fortè in Enchiridio Echium Buglossam sylvestrem vocat viperinam, Gallis *herbe aux Vipères*, Brabant. *Wilde Bugloss*: Germ. *Walde Ochsenzung*: Iudicent lectores: Nomen Germanicum non convenit ex titulo fortè figuræ malè adaptatæ in Trago ut exultimo.

An Marth. in Diosc. lib. 3. pro Dioscoridis Onosmate, Echium exhibet, quod quidem pingit sine caule, quale primo anno prouenit. Planta, inquit, quædam ex collibus, quos variis herbis reftitos

refertur circa Goritiam natura collocavit, in asperis nata iam pridem ad me allata est, quæ folia habet minoris Anchusæ, radices verò eius ita rubescunt vt quasi rubræ videantur. Ex his notis, quæ quidem pulchrè Onosmati respondent, non potui non adduci, vt eam verum onosma non putarem. Sed certè, vt verum fatear, mihi adhuc incomperitum est, an hæc caulem, flores & semen proferat: siquidem eam hæcenus non nisi caule, & reliquis viduam videre mihi licuit.

Sed & Echij titulo eandem (sed annosam,) pingit lib. 4. ac dicit: Echion à viperis omnino nomen adiunxit (vipera enim Græcis ἰχίον dicitur) vel quòd semen proferat capitis viperinis simile, vel quòd viperarum moribus præstantissimum sit medicamentum &c. Ignorasse Plinium Alcibion & Echium esse, satis manifestum est, quòd scilicet Plinius non satis accuratè Nicandrum legerit. Gatenam non inuenio vllam Echij mentionem fecisse in libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus edidit. Paulus tamen eius vires describit Dioscoridem securus libro 6. *Hæc Matthioli*, qui passim Echij titulo solum dar iconem sine propria descriptione more solito. Quam enim hoc loco ponit ex Dioscoride de simplicibus. Sed & tertio Echij imaginem proponere crediderim Matthiolum eodem lib. 4. pro Cynoglossio Dioscoridis, quod à vulgari distinguit. Facile, inquam, crediderim Cynoglossum legitimum depictum à Matthiolo esse Echij nostratis, priusquam caules producat, figuram, licet de scriptio Matthioli non respondeat. Nec quis miretur folia esse latiora, quàm in figura Onosmatis: sæpe enim in nostro Echio hanc varietatem obseruauimus.

Amarus testatur Echium multos Syluestrem Buglossum appellare: Et inter hos Brunfelsium graphicè eam pro siluestri Buglossio depingere. Echion eandem esse herbam cum Alcibiatio idque ex Dioscor. percipis, quanquam Plinium hoc ignorasse satis patet.

Lonicer. lib. 5. c. 152. titulo *wild Ochsenzung*, (id est Buglossi siluestris) Iconem exhibet non demonstrans quomodo differat à Buglossio suo vulgari quod Echium dicit: nec etiam qua in re diuersum sit à Buglossio quod alterum silu. dicit: ex eius iconè tamen differentia manifesta est, quia in Buglossio siluestri eius flores hiant. Idem rursus c. 156. vocat *Falsch hundszung* [Cynoglossum falsum, quòd diuersum ab aliis sit:] esseque tertium genus Cynoglossi dicit, cui folia similia vulgari Buglossio flore purpureo. Mala icon, qualis Tragi, quæ repræsentat Echium quod ante exhibuit pro Buglossio siluestri.

Dod. Gall. lib. 1. cap. 4. describit satis commodè, figuramque addit, ac vocat ἰχίον & ἀλκισία. ἰχίον, Latine Alcibiaticum, atque Apuleium nominare *θηεσδεζον*, ἰχίον Græcè viperinam & Serpentariam Latine. *Mirror* autem Dod. in Hist. gall. ca. 5. Viupasse Tragi & Fuchij figuram pro Cynoglossio altera Plin. à Cynoglossio tribuere caulem asperum: perpendant lectores an non confuderit cum Cynoglossio vulgari Echium vulgare, Fuchium imitatus: Habet igitur Dodonæus duas figuras Echij vulgaris non multum probandas. In Hist. lat. pro Echio iconem habet Matthioli, quemadmodum & Lobelius: præterea pro Echij altera specie, iconem quæ à Lobelio ponitur pro Lycopis altera Anglica.

vel Lycaphis, degener Anchusæ Æginetæ, Matth. Cynoglossum, de qua ait. Nihil hæc habet Anchusæ, præterquam radiceis fuscum ex purpureo colorem: à quo Lycopis derivata fuit, id est, fuscedo obscuritatis quæ sub crepusculum, quibusdam, inter canem & lupum dictum, visitur: nisi sit ab hispida caulis, foliorum, & florum, impexaque histutie, pedem imitata lupinum &c. Dicitur & ἰχίον, Echium, Buglossum agreste eidem Lobel. Germ. *wilde Ochsenzung*. Gallis *Buglosse sauvage*. Belg. *wild Offe tonghe*. Angl. *wild Buglossie better*. Is in Obseruat. p. 32. duas habet figuras: Vni hunc titulum fecit: Lycopis altera Anglica, perperam Cynoglossum Matthioli. Alteram, quæ est Matthioli, ita inscripsit: Echium floribus purpurantibus rubellis. In Icon. Plantin. pag. 598. eandem habet figuras, sed alteram Echium huc Buglossum siluestre inscripsit. *Figura* ambæ nostrum Echium vulgare referunt: quæ quidem Echij nomine proponitur similis est Echio Matthioli. Et à Dodonæo exhibetur pro Echio. Prior autem à Lobel. posita pro Lycopis altera Anglica, dicitur Dodonæo Echij altera species.

C. Bauh. phyt. Echium 1. siue vulgare. Anchusæ species quibusdam: Echium colore floris ex purpura rubente: Et Onosma Matthioli. Lac. Cast. Lonic. Hist. Lugd. pag. 1107. Et Tab. Hos vnam & eandem figuram habere ait. Esse autem Lycopis cognatam: Plantam autem se non vidisse fatetur. Item Lycopis prima: Cynoglossum Dioscoridis Matthioli: Lycopis altera Anglica. Hanc aliquando caule carere scribit, vt Matthioli. pingit, aliquando verò caulem habere, quemadmodum vtrumque Lobel. sua figurâ expresserit. *Nobis non res sed vna eademque planta videtur Echium vulgare, Onosma Matthioli, & Cynoglossum Dioscor. Matthioli, vt pluribus ante monuimus, & posthac dicemus.*

Sic Echium Matthioli Historiæ Lugd. p. 1107. Itemque Onosma Matthioli pag. 1107. Et Cynoglossum Matthioli. pag. 1261. eandem plantam statuimus.

An Turner. Anchusæ 2. Dioscoridis in Anglia alicubi vocata *Cattess tagles*, aliàs *wild buglosse*? An Casalpino Echion passim iuxta semitas nascens locis aridis, candidior Anchusæ & lanuginosior &c?

Passim prouenit Echium Montpelij: Montbelgardi etiam prouenit & viret tota hieme priusquam caulem ferat, perit enim postquam altero anno protulit: floret Iunio & Iulio passim in muris, etiam in horto E. C. Patauij vidi & Lugduni, ac Genæ florens mense Maio passim in viis & muris. Frater annotauit Guilandino dici Anchusam primam Dioscoridis. Fuchius cum Tubingæ apud illum essem vocabat Lycopis Germanicam purpuream. Obseruauimus Basilæ florentem Octobri itinere versus Montet, ad Ruum Birsle intra urbem, ad Pottam Stein & Tollenberg, & quæ itur *Krentzsch* cum flore Iunio: flore albo Montbelgardi supra murum vidi. Secus viam & semitas, necnon agrorum margines, ac in desertis agris prouenit. Latum pingueque solum amat: Locis gaudet apricis, totaque æstare floriferum est. Semen interea maturatur: hieme folia restant, vt author est Dodonæus.

Disquis talibus, non ducimus esse necessarium multis prosequi vires & vsus, tam Echij quàm Onosmatis. Hæc annotasse breuiter sufficit.

Lobel. in Aduers. pag. 249. dicitur Lycopis,

Locus & Tempus

Echium inquit [Ioh. Fabr. de providentia Dei contempl.] habere semen instar viperini capitis, maculosum præterea caulem instar cutis serpentinae: ex floribus autem serpentinae linguae modo, seu lingulas multifidas porrigere, ideoque ad viperarum morsus valere. De Buglossæ (Echij intelligo) radice experimento constare indubitato scribit Ioh. Agricola, quod si animali fuerit appensa, cuius vlcus aliquod vermibus scateat, per se & sua sponte vermiculos illos detriduos furoratos atque vlcus relicturos. Vidi ego in Lutrensi dioecesi versus Belfort mulierem, Echium (quod *Rebonam* vocabat) colligentem, ut pedi equi applicaret ad extrahendam spinam. Virtem ad Epilepsiam & ferriorem Echij [*wild Ochsenzungen*] radicem suendam præcipit, sicandam & in puluerem redigendam, pulueremque drachmæ semis pondere cum vino aut Cereuisia propinandum. Sylvestris Buglossa, quam Lycopsum appellari Trag. diximus, recentibus vulneribus morsu vel percussione ortis medetur. Radix cum farina hordeacea trita, oleo que decocta, & emplastri modo imposita, factis ignibus auxiliatur.

ECHIUM ALBO FLORE MAIUS.



Anch. lutea.

C. Bauh. phyt. Echium flore albo maius & asperius: Echij primi siue vulgaris varietas, cuius caulis aliquando duorum trinumve transversorum digitorum latus inuenitur.

ECHIUM TENUIFOLIUM.

Descriptio. Dens *ramis* præditum est, tenuissimis illis quidem, & Satureiæ ramulos crassitudine vix superantibus, multo tamen hispidiorebus, Echij vulgaris, hoc est, & longioribus & rigidioribus, & crebrioribus, veluti spinulis horrentibus: *folia* Satureiæ foliis paria, multa etiam tenuiora, asperitate maiore quam Echij nostratis: *flores*



ECHIUM PULLO FLORE.



recurvis ramulorum seapis haerentes, satis magni, patuli, carulei: dedit Dominus Doctor Rázius collectum apud Volmam in foro Iulio.

Descriptio. P Edalem habet caulem, striatum, villosum, foliis Echij, aut Buglossi sylvestris, molli lanugine præditis, & inæquali situ ipsum ambientibus ornatum, superiore parte in multas alas diuisum, quæ deinde in breues ramulos sepe findentes, multis *flosculis* concavis, extrema parte in quinque cre-

nalas diuisis, coloréque ex atro purpurascente præditis, onustæ sunt, qui è vasculis molli lanugine hirsutis & inter folia latentibus prodeunt: *femen* ut in eiusmodi generis plantis, viperino capiti simile: *radix* oblonga, minimi digiti crassitudinem æquat interdum, foris fusca, paucisque tenuibus fibris prædita, capita vnde caulibus prodic exuberante, & præcedentis anni caulibus vestigia seruante: præmansa folia, nullum initio manifestum saporem peculiarem præbent: sed postea non nihil actimonie habere videntur.

Clusius Pann. pag. 679. & Hist. post. Echium *Synonymum* primum & Echium pullo flore. C. Bauh. phyt. Echium 3. siue sylvestre lanuginosum.

Crescit multis locis Viennæ vicinis, tota etiam inferiore Aultrix & Pannoniæ parte, siccioribus pratis, & gramineis locis ad Collum radices, atque in ipsi collibus nudis & tenui duntaxat gramine obstitis.

Floret Maio.

ECHIUM

ECHIVM RVBRO FLORE.

O Blonga & augusta habet folia, villosa, vulgaris Echij ferè similia; paulò tamen latiora, humi strata: caulem modò pedalem, aliquatò cubitalem, firmum, striatum, lanuginosum, ma. u. lisque purpureis conspersum: quem incondito ordine multa ambiunt folia, internis breviora & angustiora, non minus tamen hirsuta: summum caulem exornant multi breues ramuli in se veluti conuoluti, atque S orpiuri instar inflexi, pleni florum. vulgaris Echij floribus similitum,



sed colore rubro eleganti præfuit, qui proximè caule primùm aperti incipiunt: excusso flore, semen ut in aliis Echij generibus apparet in caliculis nigra, v. perino capiti simile, sed minus: radix satis longa, dura, & lignosa, nigro cortice tecta su. mo capite multos interdum caules promens, sed maxima ex

parte duntaxat vnicum.

Clas. Pennon. pag. 680. & 681. & Hist. post. lib. 5. cap. 50. Echium rubro flore; Echium secundum C. Bauh. phyt. Echium 4. siue siluestre secundum maculatum, colore floris nunc intensiore, nunc dilutius.

Abundè admodum siccis pratis suprà & infra Sopronium Vngar. videntur, usquam verò alibi, hanc plantam obseruabam, Maio florentem, nunc saturatè rubentem, modò dilutius colore prædiam.

Echium Candia, flore pulchrè rubente.

Anno 1595 dedit mihi Dom. Sprengerus Heidelbergæ plantam siccam nomine Echij Candia, eadem mihi prouenit Montbelg. in horto E. C. Montbelgardi ex semine misso Stutgardiam per Casabonam sub titulo, Anchusa rubra Cretica. Tota planta candidior erat Echio vulgari, magis ramola, flores forma similes nempe hiantes: sed colore diuerso polchro, scilicet tubeate: florebat Iulio & Augusto.

C. Bauh. phyt. Echium 2. siue rubrum Creticum: Echio vulgari minus, sed ramosius, paucioribus floribus, eleganter rubentibus: tota facie Lycopium alteram Anglicam Lobelij [Echium vulgare] plurimùm referens. An Clusio h. post. Echium 1. Echium Creticum primum: Echium Candia, flore dilutè rubente.

ECHIVM SCORPIOIDES SOLISEQVVM,
flore minore, & aliud maiore, cæruleo & albo.

Ex radice nigra fibrosa, cauliculi tenues hirsuti aliquot assurgunt, ramosi, dodrantales, qui Tom. III.

bus sine pediculis adnascuntur folia vnciam circiter longa, trientem pollicis lata, in obtusum mucronem desinentia, hirsuta, murinis auriculis similia, sapore saturo, florum series agminatim instar caudæ Scorpionis se contorquet, minimorum, cæruleorum, fundo luteolo, in quinque lacinias diuisorum.

Congener superiori & hæc species, ex ea quoque cognoscenda: folia longiora, multò minùs hirsuta, ut ferè glabra esse videantur, ut & caulis: flores paulò maiores, cærulei vel albi, eodem

modo se contorquent, umbilico croceo, sed plusquàm triplo maiores, æqua superficie se explicantes, radiato stellæ positu.

Buo. f. silius Tom. 1. R. p. 10. dia 28. Cynoglossam minorè Klein bundzung vocat plantam à nobis primo loco descriptam.

An Tragœ Auricula muris minor?

Hanc Apollinaris l. 2.

vergiss mein nit & Gamedern vocat. Figura autem eius, respondet priori nomini, non item Chamædri, cuius tamen vires recitat, ita ut duas plantas confundere videatur: in alia tamen editione alia est figura nempe Chamædrios adulterina.

Mathiolo in Dioscor. lib. 4. capit. 186. est forte Heliotropium minus quod in Tridentino agro in palustribus quibusdam locis legit: non quidem quod pinxit, picturam enim existimo ad descriptionem Dioscor. factam, & nunquam visam ut pictam melius alioqui descripsisset. In post. com. cum magnis figuris eandem figuram retinet.

Lonic. lib. 4. cap. 335. pingit ac vocat Vergiss mein nit. Item Frayven bist uer huffi quam dicit Græcis Leontopodium Latinis pedem leonis: Item Cemos Græcis & Rhapeion Plinij Ruelio: qui vocari refert Gallis Cruciatam. Lonicæ autem non mihi videtur intellexisse Ruelium, cuius Cruciatæ & Leontopodium alia planta videtur: nec descriptio à Lonicero posita respondet figuræ quam ponit, nec plantæ quæ dicitur Vergiss mein nit.

Gesl. hort. nominat Scorpioides aquaticum, Vergiss mein nit, atque: Huius generis marem & feminam Dodo: xum lib. 1. iconum pinxisse, quæ passim ab herbariis Scorpioides appellabantur.

Humelb. apud Apul. cap. 96. Alteram Cynoglossam appellat sine caule, uti Diosc. tradiderit, hancque Teutonice Vergiss mein nit vocari putat. Ast hæc herba habet caules.

An Lobel. in Aduers. pag. 193. Myositis hirsuta reptans? An hanc in Obs. pag. 245. pingit dicens: Myositis hirsuta reptans Adu. pag. 193. An Elatine Dioscoridis quibusdam? An ei dicitur in Icon. Plant. pag. 461. Alsiue Myositis siue Auricula

Xxx

muris. Item p. 462. Myosotis Scorpioides partim repens, partim erecta.

H. Lugd. p. 1360. Heliotropium alterum Matthioli. Item Heliotropium minus Matthioli: Quod histor. pro primo exhibet: quid sit nescio. nisi forte Echium Scorpioides, non bene pictum: minus Heliotropium est signum Matthioli.

C. Bauh. phyt. Echium Scorpioides 1. siue arvense magnitudine varians. Trago Auricula muris 3. & Euphrasia 4. Euphrasia caerulea Cynoglossa minor Brunk in 4. p. 83. Lobel. icon. Myolotis, Echium Scorpioides 2. siue palustre.

Locus &
Tempus

Echium minus quibusdam alijs Scorpioides minus, herba est gaudens locis aquosis, cuius folia hirsuta mollia. Flores parvi inrotqueuntur ut solent Echia & Heliotropium magnum. Flore Aprilis & Maio ad ripam fluminis Montepessuli prope Castelnouf. Basileæ vidi florens Maio & Junio, & circa montem Krentzak. Lugduni, ut & Genevæ in monte Thuiri pulcherrimo flore copioso. Montbelgardi passim abundanti florens Junio & Julio: ut & in horto illustr. E. C. Fuchs cum apud illum esset Tubingæ vocabatur Echium Scorpioidem flore rubello.

CYNOGLOSSA FORTE TOPIARIA

Plinio, siue Echium Lepulatum quibusdam.



ANNO 1561. mense Junio, in Rhætia Burmi prope Balneum ad fontem aquæ dulcis inuenta mihi planta hæc bicubitalibus cauliculis, culturâ etiam longè altioribus, angulosis brachiatis, concavis, vncinulis rigidis, asperis, ad vestes adherentibus, per terram se spargentibus, nisi in propinquo sit quod scan-

dant: folijs binis, aut ternis, duas uncias longis, utrinque reductis & angustis, quorum infima superioribus obusiora, subrotunda, sifouli ex viola purpurascens ex foliorum alis breuibus pediculis donati, parui, quinquepartiti, corollam in medio ex foliorum appendiculis deformantes, sub qua oculantur apices lutei, quibus succedunt iidem inclusa semina folca selamoides paulò maiora: radix recta, minimi ferè digiti crassitudine, fibris aliquot donata, odor & sapor totius plantæ qui Bortagini.

Lobelio obseru. p. 466. Alysson Germanicum Echiodes. Hist. Lugd. pag. 1143. Alysson Germanicum Echiodes Lob. C. Bauh. phyt. Cynoglossum 7. Cynoglossa topiaria seu repens: quibusdam Aparine Plinij lib. 27. cap. 5. alijs eiusdem lib. 22. cap. 7. Parthenium, cui potius Cynoglossos topiarijs operibus gratissima eiusdem.

Primum vidi in Rhætia ut dictum: Habui Ge-

neuz in horto. Vidi etiam Basileæ florentem & semina habentem matura mense Iulio. Habebam etiam Lugduni in horto. Montbelgardi, in horto illustr. E. C. mihi provenit sæpius & abundè.

LYTHOSPERMVM SIVE MILIVM SOLIS.

CAP. VII.



POLLICARI crassitudine est radix, lignosa, fibras aliquot à latere fundens: à qua surgunt caules complures, partim erecti, partim procidui, albidis, tactu asperi, in alas diuisi: folia modò alterna, modò opposita, longa, stricta, hirsuta, sapore vix alio quam herbaceo: fo-

sculi albi, parui, quinquefolij, in calycibus oblongis, hispids, quibus semen succedit cinereum, inuictæ duritiæ, leuitatis eximie.

Lithospermon auctore Dioscor. propter seminis duritiâ: à qua & Lithospermi nomen accepit folijs est oleæ, longioribus tamen, latioribus atque mollioribus, & ijs quidem quæ in imò à terra exiliunt humi iacentibus; ramulis rectis, tenuibus, acuti iunci crassitudine, firmis, lignosis Euraidn [Orib. xuraidn] in quorum acumine bifida propago cauliculorum speciem exhibet, folijs longis [μακρὰ]. Lacuna legit in vet. cod. μακρὰ Sic & Orib.] inter quæ semen [vet. addit ὠρόλεον] Lapidea duritiæ, rotundum, candicans [λευκόν] Sic etiam Orib. & vet. codex. Lacun. verò λευκόν, vulgata exemp. μικρὸν ὠρόλεον] cuius parui magnitudine. Nascitur in asperis & editis locis. Vini habet semen cum vino albo potum calculos frangendi, vrinasque pellendi. Inter omnes herbas inquit lib. 27. cap. 11. Plinius, Aliqui Agonychon vocant, alij Diospyron, alij Heracleos. Herba quincuncialis [quinque caulibus M.] ferè, folijs duplò maioribus quàm Ruræ [oleæ Diosc.] ramulis surculosis, crassitudine iunci: gerit iuxta folia singulas veluti barbulas, & eorum in cacuminibus lapillos candore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritiâ verò lapidea. Ipsi quæ pediculis adherent [Hæc postrema verba Herbarius Anglus intellegenda putat de Lithospermo arundineo, quod lachrimam Iobi officinæ vocant] cauernulas habent, & intus semen. Nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta. Nec quicquam inter herbas maiore quidem miraculo aspexi. Tantus est decor, velut aurificum [aurum emicans, M. fortassis, auro emicante, & alternis] arte, alternis inter folia candicantibus margaritis: tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis, lacere atque humi serpente auctores tradunt [Lithospermon secundum describi hic voluit]

Ego

Ego vulsam, non hærentem vidi. Iis lapillis drachmæ pondere potis in vino albo calculos frangi, pellique constat, & stranguriam discuti. Neque in alia herbarum fides est visus [v]isus] ita-
tum, ad quam medicinam nata sit. Est autem eius species, vt etiam sine auctore visu statim nosci possit.

Galenus & Aëtius Lithospermon in simplicium censu omiserunt. Lithospermon, inquit Paulus, quod alij Liosporon, alij Heraclium vocant, herbæ Aëtonychi dictæ semen est. Lapidosum, album hoc in vino albo potum, calculos atterit, & vrinas ducit.

Sunt præterea, inquit Marcellus, qui Leontion, vel Leonticam herbam, qui Tantalum vocent. Daci vero Gonolitam, Romani Columbam appellant: quæ appellationes suo quæque modo indicant Lithospermi seminis duritiam.

Nostrium Lithospermon, inquit Fuchsius, multo minus quam Dioscor. & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diuersitati acceptum referendum erit.

Tragus pro milio Solis describit & depingit, dicitque tantâ diligentia historiam illius persequutum esse Dioscoridem, vt vel cæcus Milium Solis solo tactu agnoscere posse videatur. Plinium semen ipsius Ciceri conferre, & rectè quidem quantum ad figuram attingat, at si magnitudinem spectes non item. Nam milium Solis non multo maius esse milio satiuo, quod inter fruges & legaria refertur. Eius porro iudicio, hæc herba rectè Saxifragum album [h. e. *weiss Steinbrech*] diceretur, licet Officinæ Milium Solis, Granum Solis, Semen lapideum & lapidosum vocantur, alij verò præter hæcenus recensita nomina, etiam Leonium lapideum, Dioplyton, Heraclium & Vaghem aquilinum appellarint. Mauritanii *Kulb* [Serapio] semen ita vocauit, herbam verò Aftonchon, Trag.] *Culb*, *Colt*, seu *Cult*. *Calt*, *Calab*: Hebræi *Dachan*, Chaldæi *Armel* teste Frisio, nuncuparint. Germani *Meer* & *Stein* *fa-* *men*. Belgæ *Perleincruys* & *Steinsæet*: Galli *Gemilet*, *Herbe aux perles*. Ital. *Lithospermo* & *Milium Solis*: Hisp. *Mio del Sol*, *hierua Mulbart*. Angl. *Gromell*. Boh. *vraby*.

Quod itaque Græci *λεοντιχον*, Latini quoque Lithospermon vocant, hoste Sepalsarij & omnes ferè medici Barbaros secuti Milium Solis nominant. Licet rectius fortasse, teste Lobelio & Matthiolo, Mauritanorum imitatione, *Milium Soler* vocaretur. Quandoquidem [vt scribit Serapio] frequens nascitur in montibus Soler: vnde illi aptius fortè à loco, quam Sole cognomen imponeretur.

Videtur porro Amatus Lithospermon vocare Lachrimam, Lachrimam Mariæ: vulgò Lachrymam simentem, & Germanicè *Marienthenn*. Negatis & pertinaciter quidem Milium Solis esse Lithospermon, quod Phalaridem esse concludit, magno errore.

Fuchsius quoque Lithospermon Dioscoridis non cognouisse arbitratr Matthiolus, quod pro vero Lithospermo Milium Solis minus officinis appellatum depinxerit. Verum ipsemet Matthiolus non nouit, ceu & Amatus, qui Lithospermon nigrum [de quo mox] quod maius cognominat, genuinum credit, sed fidens suæ figuræ falsæ Lithospermi maioris immeritò reprehendit Fuchsiū.

Turn. part. Lithospermon Herbarijs vulgò & off. Milium: Germ. *Steinsamen*, Gall. *Gromel*. Angl. Tom. II.

vocari debet *Graymil* [i. milium griseum] non vt vulgò fit *Grummel*. Putat Matthiolus Fuchsius ignotum Lithospermò verum Dioscoridis, quod [ait] Milium Solis minus pro Lithospermo proponat. Debebat tamen Matthiolus ex Dioscoridis descriptione probare Milium Solis Fuchsi non esse Lithospermon verum, tum demum potuisset Fuchsiū erroris insimulare. Verum meo quidem iudicio minus notum est Lithospermon Matthiolo ipsi, quam Fuchsius. Nam quod ille proponit Lithospermon, nec Plinij nec Dioscoridis descriptioni respondet: &c.

Planta à nobis depicta & descripta dicitur *Synonyma*.
Milium Solis, Milium Solis primū, siue satium Trago. Lithospermon minus Matth. Dod. gall. Geln. de hort. Lacun. Lobel. Castor. Lugd. Lithospermon Fuch. fol. Cord. in Dioscorid. & hist. Lonj. Lithospermon satium Fuch. icon. Lithospermon legitimum Clus. Pann. Lithospermon aruense, Tab. Lithospermon vulgare minus, Cam. Saxifraga terria, Brunfels. Saxifraga alba & Cauda porcina. Eech. Roëlin. Lithospermon minus Camer. in Epit. & H. Mat. Matthiol. germ. Græcis *λεοντιχον* & *λεοντιχον*. *Lithospermo minore*, *Miglio saluatico*, seu *Milium Solis*. Germ. *klein Meerbusse* seu *Steinsamen*.

H. Lugd. duas habet figuras vnius plantæ. *V. H. Lugdun.*
nam pag. 176. cui titulus est, Lithospermon minus Matthioli: alteram pag. 176. quam sic adscriptis, Lithospermon Fuchsi: minus Dodonzi. Apud Dorstheniam pro Milio Solis malè ponitur icon Polemonij petrae Gesneri.

An Thalia [quod affirmat C. Bauh.] Lithospermon alterum fruticosum in Harciniæ vicinis quidem montibus non infrequens versus meridiem sitis: in ipsis vero Harciniis nondum visum.

C. Bauhin. apud Matthiolum [vbi hocce Lithospermon 2. siue maius erectum vocat] promittit sex Lithospermi genera. Est, inquit, maius, minus, & minimum, illud vel foliis oleæ, vel arundinaceis: minus vel latifolium, vel angustifolium: minimum Passerina dictum, quod vel Germanicum, vel Monspelicum. *Sic hic quinque* fol. modo d. clarat, sextumque tanquam sibi ignotum silentio inuoluit. In Phyt. [vbi septem quoque genera statuit, licet primum & secundum malè separet] Lithospermon hoc quarto loco recenset. *Puto* eum parum considerasse quæ scripserit.

Ex semine mihi provenit in hort. E. C. In varijs locis provenit spontè, vt circa Arbouans pagum Montbelgardensem, & non longè à Lepiosorum Domo, Genex iuxta monticulum *la Bastie*. Lugdun. vidi florens Maio, Basileæ cum semine Oëtobri inter Bisam & S. Iacobum, & in itinere versus montes, copiosè etiam inter Basileam & Ormazum: Prope Patauium in Italia & inter Veronam & Castellum. Passim pluribus Italiæ Galliæ, Germaniæ, ac etiam Britanniæ locis exir. A Solitio æstiuo ad Autumnum vsque floret: interea & semèn perficit.

Semen cum vino albo potum, calculos frangit & vrinam ducit, auctore Dioscoride. Ego quidem non existimo nec hoc semen, nec vllum remedium calculos frangere. Pituitam vel crassos humores ac viscidos arenulas vel calculos glutinantes dissolui & pelli hoc semine non dubito. Datur id vtiliter potandum diebus pluribus, qui drachmæ pōdere, addita Asplenii semidrachma, & succini scrupulis duobus ex succo plantaginis.

ginis aut portulacæ aut lactucæ ad gônorrhœam cohibendam: peculiariter autem iuuat feminas ægrè parturientes, si feminis drachmæ duæ in puluerem contriti ex humano lacte propinentur.

LYTHOSPERMVM NIGRVM
quibusdam flore albo, semine
Echij.

Lithospermum nigrum radicem habet lignosam rubentem, mediocris crassitudinis, ex qua plures surgunt caules, pedales & longiores, hispidi, ramosi, folijs vestiti, ad milij Solis vulgaris folia accedentibus, mollioribus, minoribus, asperis, nigricantibus, de quorû magnitudine quò superiorem locum obtinent, eò plus decedit: per ramos longa serie ex intervallis flores cernuntur Milij Solis, parvi, albi, quibus subiecta sunt folia oblonga, angusta: semina succedunt terna vel quaternaria coniuncta, nigra, Echij aut Buglossi vulgaris feminibus similia.

Tragus plantam à nobis descriptam vocat Milium Solis secundum, & Lithospermum silvestre, *uvilden Meerbusch*. Cacaliam Plinij esse præterea existimat, at ita describit. Silvestre Milij Solis genus, in quibusdam hortis apud Mediomatritices reperi, folio, caule, flosculo & semine iam dicto per omnia simile, nisi quod semen profert, non adeò læve & glabrum, sed rugosum aliquantulum, ad vulgarem Buglossam eatenus propè accedens. Semen huius similiter Iulio mense maturum conspicitur.

Dodon. gall. Camerarij hort. Epit. & Hist. Germ. Matth. Lithospermum silvestre, arvense vel nigrum, Græcis λιθοσπεριον ἄγρον, Germ. *uvilder Meerbusch*.

Gesn. de hort. vocat Lithospermon minus Wortelli. Id nimirum quod à Matthiolo pingitur & in arvis spontè exit: quod ipsum etiam in hortulo Tiguri in fine Iunij serè desloruit. Idem verò in append. pro Echio maiore describit.

Hanc eandem de quadrup. [oi fallor] facit Lithospermi alterum genus, parva & inutili radice folijs & granis minoribus, locis culis nascentis in arvis.

Lob. in Icon. Plant. pag. 459. Anchusa degener facie Milij solis, semine Buglossi aut lux rotundiore, radice rubra.

Tnatio in H. r. dicitur Anchusa arvensis alba. Echium minus Gesn. in Append. Lithospermum styli. Tragi. Anchusis autem annumerat propter radicem A. cho. modo rubentem. Hort. Lusit. Anchusa silvestris arvensis alba. C. Bauh. phyt. Matthiol. Lithospermum, siue arvense, radice rubra. Lithospermon silvestre Trag. Fuch. Dodon. gall. Camer. in Matth. Lithospermum tertium, Dodon. fol. Lithosp. nigrum, Lugd. Anchusa degener facie Milij Solis, Lob. Anchusa tercia Lithospermo similis, Cæsalp. Anchusa arvensis minor facie Milij solis, Tabern.

An est Anchusa minima Cordi in Hist. lib. 1. cap. 23. An Matth. Lithospermum maius, legitimum, omnibus propè, excepto Fuchio, nunc compertum? An Amato in Diosc. lib. 7. cap. 155. Lithospermum maius? Huic qui figuram apposuerunt faciunt ei iniuriam quia eius non meminit in contextu. Fortè vnius plantæ duas habet figuras, ac duas plantas confundit. Gerardo Lithospermum secundum minus, Smil.

Lithosper.

Brothell. An eadem quoque Lithospermum primum maius? videtur enim imitatus Tabernamontanum diuersas confundere plantas. An Anguillaræ epist. 13. Lithospermum alterum? An R. Const. in Lex. Melampyri semine verticillato, tribus vel sæpidis quatuor granis? An Cæsalp. lib. 11. cap. 8. Anchusa alia, Anchusa tertia [minorem intelligimus] similis, iisdem locis nascentis, fruticosa, feminibus non scabris, sed lævibus, initio subrubentibus, postea albescens, specie Lithospermi.

Sæpius habui in hortis E. C. Montbelgardi ex semine quotannis se propagantem. Floret Montspelij verè: Burmij in Rhætia cum peregrinaremur Gesnerus & ego invenimus in segetibus, cum apud illum essem habebat Tiguri in horto & Echij faciebat speciem. Dalechampius verò Myagrum, quod placebat. Genevæ provent in segetibus, habebam verò in horto ubi ex semine deciduo tota serè hieme florebat & virebat. Basileæ inveni mense Octobri in itinere versus Kirsach ultra Renum, & Maio florens in segetibus. Patauij etiam vidi, & Veronæ in Theatro, ac inter Veronam & Villanovam Florens Maio.

LYTHOSPERMVM MAIUS DODONEI
flore purpureo, semine Anchusæ.



Sproculis pluribus donatum est, pedalis & cubitalibus, tenuibus, nigricantibus, hispidis, quos folia vestiunt vncias duas circiter longa, semunciam lata, in acumine desinentia, ex saturo vitore nigricantia, hirtiora, alpestra: flores extremis herent ramulis conferti, maiores

quàm Anchusæ alterius, violacei: semina Anchusarum vel Echiorum, albicantia, rugosa: radix longa, crassa, lignescens, tortuosa, nigra.

Dodon. gall. & lat. Lithospermum maius, Grand Gremis, vocat. Hoc quidem in Italia, sed laudatissimum in Creta nasci ait: reperiri verò & spontè natum in Narbonensi Galliarum Germ. hortense, est officinis incognitum esse.

Lob. in Adn. p. 192. Lithosp. maius Dod. Epit. 339. Miror hanc referri ad Lithosp. quum potius semina habet Anchusarum vel Echiorum feminibus, similia, vix etiam maiora quàm in Milio foliis, vti nec folia, nisi fortè cultura reddatur maius: quam obrem nec mihi placet quod maius dicitur ab Aduersarijs. Hoc Lob. in Obs. p. 245. in Ic. Plant. p. 458. pingit, vocans Lithosp. maius. An verò id quod Lob. dictus in locis exhibet pro Lithosp. Anchusæ facie non sit idè alius iudicandum relinquo. Lithosp. vulg. maius florib. cæruleis. An Thallio in Harc. Lithosp. virgarum repens florib. in cæruleo eleganter purpurascensibus? Clus. in Pân. pag.

pag. 684. & scémque in Hist. post. Lithospermum repens maius vulgò vocatum. Hist. Lugd. p. 1177. Lithospermum maius Dodonæi. Item pag. 1178. Lithospermum Anchusæ facie Lobelij. Ad hæc pag. 1528. Pulmonaria minor Dalechampi, Alius Echium primum Plinij. *Habet* ni multum fallor Hist. Lugd. tres figuras vnius plantæ. Geln. hort. in append. Cynoglossus minor, nōnullitur, appellanda planta.

C. Bauhin. phyt. Lithospermum primum sine minus repens: flore partim rubente, partim caeruleo. Ad Echium, vel ad Anchusæ referri potest. Hoc Lithospermum Dioscor. & Plinij esse aliqui volunt. Lithospermum Anchusæ facie Lobelij. Multum cum primo convenit, discrepat tamen in eo, quod non ut prius repit cauliculis, sed erigitur. *Nobis non duæ videntur Plantæ, sed una, varians solum colore naturali.* Lithospermum verò secundum, sine minus erectum videtur apud Matth. C. Bauhinus Lithospermum fuscicens angustifolium non uti pae.

Lithospermum maius Dodonæi copiosè provenit circa montem virtutis dictum la Chau in dumetis, iuxta meas vires. Frater Casparus Bauhinus invenit Basilæ in sylva eundo Dornacum. Genesæ florens observavi mense Maio in Colle iuxta Arne fluvium, quæ iter in Champen, iuxta caractam aquæ um: Cùm essem Monipelij repertum florentem Vere circa Castellum inter dumeta, non longè à montibus.

SYMPHYTUM MAIUS VETERIBVS. CAP. IX.


Dioscorides de Symphyto altero inquit: Symphytum alterum, quod aliqui *Teeton* vocant, caulem emittit bicubitalem [Ver. legit hirsutum, bicubitalem] aut etiam altiore, lævem, crassum, angulosum, & seu Sonchi inanem: (V. caret & Orb. circa quem ex interuallis haud ita magnis *filia* exerunt hirsuta, angusta, [V. subnigula & subexigua] longiuscula, ad Buglossi foliorum similitudinem habet verò caulis eminentias quasdam secundum angulos portantes. [Al. extensas, alius tenias ad litem cuiusque alæ] [Apul. adnationes secundum genicul.] adiacentibus ac velut annexis foliis tenuibus [Ald. foliū tenue] quæ è singulis prodeunt alarum sinibus: sunt insuper flores lutei [huius florē nigrum perperam dixit Apuleius, pro *phyllos* legens *phyllos*: Ald. addit in nothis, rotundi ut Rutæ] & semen circa caulem seu Verbaſci. Torus autem caulis [V. semen] ac filia quoque ipsa subaspera lanugine horrent [V. addit, subalba] actūque procerum excitant. Radices demittuntur f. ris nigrae, intus candidæ glutinosæ, quarum etiam est vili [V. epit. ex contrariis constat facultatibus.] Trunc & poræ sanguinem excreantib. ruptisq; proficiunt, & recentia vulnera impostæ glutinant: Catinum quoque frusta quibuscum coquuntur coquant, ita ut coalescant. Cæterum inflammationibus præteritque sedis, cum senecionis foliis vtiliter illinuntur.

Galenus 8. simpl. ait Symphyrum magnum, siue Symphytum alterum, similem dicto [sc. petræo] vim habere: non tamen gustantibus dulce esse, nec odorantibus odoratum. Sed his sanè à modo scripto diversum. Cæterum quatenus viscositatem quandam & mordacitatem obinet, scillæ simile esse, vti que ad omnia, ad quæ petrum.

Symphyti maioris Plinius pluribus in locis meminit. Ait de hoc lib. 26. cap. 7. Symphyti radix illita Enterocelas cohibet. Idem lib. eodem cap. 15. Symphytum ad cicatricem celerrimè perducit cap. 15. Symphytum tritum in vino nigro euoca [reuoat Dal.] inenses.

Illi etiam has vires tribuit Apuleius: Herbae Confolide puluerem mollissimè contritum potui dabis in vino, mox restringet profluuium. Radicem in cinere tepido coquito, & ex melle ieiuno dabis ut conuulsus & intus raptus edat, sanabitur: & thoracem totum purgabit. Herbam si cum Oxygyno edat, magnū beneficium sentiet stomachi dolore vexatus. Ad Tussim radices in Caldaria de oves cum melle & pipere & Castoreo ad quartas, & in vino vetere ieiuno dato in potu. Hæc herba hoc [virtutis & naturæ suæ rationem & probationem] argumento habet, ut carne bubuli concisâ & in Cicabum misâ, eius radices si immiseris diachmas duas, cocta caro in vnum coherabit.

SYMPHYTUM MAGNUM.



Symphytum Descriptio

Symphytum lato solo satis obuium radices furculosas & crassas demittit, foris nigras, intus albas, sapore fatuo sed magnopere viscido & lento: caules cubitales, crassi satis, inanes, hirsuti, aperti & membranis foliorum alatis appendicibus, adnatis inæquales: folia Trago Helenij foliorum formam penè imitantur, acuta, rugosa, hispida: flores simul multi penduli, nolarum instar, purpurei aut ferruginei, albi, ex calyce hirsuto concolori, quadripartiti, in 3. locinias acutius diuisi, quibus tandem in penito flore adnatæ ligule herbide, rotundæque apices albi appoliti, nullo floribus concolori [Flores Trago veluti Herbae paralyſis, partim ex pallido & luteo candicantes, partim caeruleo, quibus decidentibus, semine in herbariis vasculis clausum relinquunt.] Dioscorides licet Symphyti maioris flores luteos esse statuerit, ego tamen [inquit Marantha lib. 1. cap. 9.] & candidos & purpureos vidi.

Cordus in Hist. tria Symphyti genera tribus distinctis capitibus describit, quæ colore tantum florum differunt. Vnum vocat Symphytum maius, candidis floribus: alterum Symphytum maius rubrum: tertium Symphytum maius purpureum. Figuram appoluit Geln. ex Trago. Symphytum alterum, inquit Matthioli id ita vocas, quod secundo loco reddidit Dioscorides, nulli debium est, quin ea sit herba, quæ hodie passim Confolida maior nominatur, quam etiam nonnulli herbariorum Alum falso appellant. Quip-

pe quoddam eius notæ singulæ Dioscoridis historiæ ad vnguem hæc deprehendantur. Hæc frequentissima nascitur in pratis, floribus non modò luteis, vt Dioscorides inquit: sed & candidis & purpureis, eadem sæpe facie, ac forma.

Dicitur Symphytum maius Castori. Ioh. Agricola. Eur. Cordo, & Camer. in Epit. & Hist. M. thiol. Germ. jremque hort. vbi floris, meminit purpurei & albi. Symphytum alterum Anguill. Lacuna. Cord. in Diot. & Turnero. Symphytum Lombero, qui etiam consolidam, Vnctuosam, Inulam rusticam, & Alum Gallicum cognominat. Symphytum Alem & Alus Lob. in aduer. pag. 151. (vbi duplex tra. h. a. arem floribus purpureis, foeminam floribus albis) Obs. pag. 115. Icon. Plant. p. 583. Consolida maior Bunnel. Trage. Camer. hort. Lob. Thalia & Cord. in Diot. oi. qui præterea vo. at Symphytum alterum Dioscor. & Symphytum magnum Galeni, quod Plinium ignorasse scribit. Consolida, celsus magnus in palustrib. naues Cæ. al. o. Consolida magna vulgò. Solidago maior Ioh. Agricola, & Eur. Cordo.

Tab. 101.

Tabern. icon. & hist. Symphytum maius: flore albo: Consolida maior *Pueri vvalvuriz*. Item Symphytum minus: flore purpureo, *Braun vvalvuriz*; *Fr. lra* propositi duas icones plantæ colore tantum differentis.

Symphytum
maius & fe-
minus.

C. Bauhino phyt. Symphytum, seu Consolida maior 1. mas vel foemina, illud ex purpureo cæruleum, hoc ex pallido & luteo candicans. Repertur & luteo flore. Item apud Matth. Symphytum tertium siue Consolida maior. Symphytum magnum Dioscor. *Συμφυτον αλλο* siue *πικτόν* Germ. *vvalvuriz*, *schvvarizvuriz*, *schmer-vuriz*. Gall. *Consyre* & *Oreille d'Asne*, l. *Consolida maggiore*. Hisp. *suelda masore*. Anglicè *Comfrey*. Obs. Consolida maior. Boh. *Svvalvuriz* *vveisy*. Hung. *Fekete nadal*. Croatis verò, qui eius radicem ad cõsua & rupta feliciter vultur, *Ganez*.

Locus &
Temper.

Altero demum anno fructus edit. Floret Iunio & Iulio mensibus, gaudet palustribus & humectis, graninosis hortis & littoribus ac ripis, neque facile vix semel radices eg. tir propulsari potest, nam vel minima radices portio humi infixæ continuò in herbam emergit. Symphytum flore luteo florens mense Maio Montpessuli, Lugduni flore albo, Maio. Basileæ flore purpureo & albo copiosè in pratis. Patauij vidi in hortu Iesuitarum. Montbelgardi abundat, flore albo & purpureo. Bononiæ in hortu *di S. Saluator al burgo di Santa Catharina* flore luteo mense Aprilij. Genevæ in pratis versus Cologni flore albo, mense Maio. Sata semel in hortis vix postea extirpari potest, quia utraque particula radices facile crescit.

Vires

Vires ex veteribus legantur antè. Radix vt videre est apud Tragum in medicina maiorem habet usum quàm herba, estque illa temperaturæ calidæ & humidæ vulneribus & rupturis internis commodissima. Mundata in vino decocta & pota exulcerationibus pulmonis, & vitis thoracis expugnandis prodest. Non desunt qui ex radice aquam distillant ad suprâ dictas affectiones: Solent Chirurghi emplastris suis adungere. Omnis generis vulneribus, rupturis & contractionibus ossium commodissima est, quotidianâ id attestante experientâ. Ego radice Symphyti nolim vti in omnibus viriis ex thorace expurgandis: tantum in iis quæ eueniunt à tenui subtili & calida materia. Flores in vino rubro coctos, hisque

in die sumptos in cruenta viua optimos scribit Carrearius. Radicem cum albumine oui applicatam sedare immodicas hæmorrhoides.

SYMPHYTVM TVBEROSVM.



Cæsalpi-
nus ita
describit: Co-
solida minor
siue altera in
collibus nas-
cens, locis em-
brofis, præci-
puè sub olea;
& cultis locis:
folio Borragi-
nis, minore, ac
minus aspero:
cauliculis do-
drantilib. ant
paulò altiorib.
fl. re pallescen-
te: radicibus in
obliquo spar-
sis, quibus ro-
tunda tuber-
cula insunt,

Descriptio

colore candido, mollia, sapore non ingrato: viuit radice diutius.

An Heremolao Symphytum minus, radice intus & foris albâ ferè Bulbi effigie, rotunda?

Camer. in Hist. Marth. germ. dicitur Symphytum tuberosum *Gelbe Knadiche vvalvuriz*; in Epit. Symphytum radice tuberosâ, flore luteo: De hort. Symphytum maius flore subluce tuberosâ radice.

Anguillara epist. 14. Symphytum aliud, foliis Borraginis, flore luteo, radice tuberis [tartufo] simili: Consolida minor vocata.

Symphytum hoc luteis floribus obseruauit etiam Lobelius quoddam putaret esse Borraginem, nisi radix subceller tuberosa, vt fatetur in Adu. pag. 251. ac idem in obs. pag. 115. [Item Icon. Plant. p. 584.] vocat Symphytum tuberosum.

Dodon. in sol. vocat Symphytum tuberosum, faci que Symphyti alteram speciem, radice exterius nigra, intus candida, Symphyti maioris instar, sed tuberosâ: foliis quoque minoribus, caulibusque breuioribus; floribus subinde luteis. Hist. Lugd. pag. 1074. Symphytum tuberosum Lobelij. Cæsalp. Consolidam minorem flore pallente. C. Bauhin. phyt. Symphytum 2. [4. apud Matthiolum, vbi in figurâ hirsutius est neglecta] seu maius tuberosa radice.

Symphytum cuius meminit Anguillara vidi circa Patauium & in montibus Euganeis. Est mihi in hortu Ill. E. C. delata Basileâ ex hortu D. D. Martini Schmeletzij. Vulgarissimum in Italia, sub olea, & locis cultis, mense Martio flore luteo prodit in hortis: spontè etiam circa sepes. Inuenitur auctore Clusio in omnibus Pannoniæ & Austriæ syluis umbrato loco, præsertim verò sub frutibus.

Miraculosam ad consolidationem & conjunctionem carnum & ossium tradit Anguillara.

PVLMONARIA ITALORVM AD
Buglossum accedens.

Itolonem Pulmonaria dodrantali & maiore altitudine herba: radice nictur alba, fibrosa, Hel-lebori, sed fibris rarioribus, & quibusdam cras-sioribus, gustu admodum lento & viscido: *caulis angulosus, purpureas, hirsutus, vnus interdum*

luriceus, reliquis primū germi-nantibus, aliis flores vt in Buglossis: folia alia statim à radice ex-orta, conferta, per terram sparsa, alia caulem inæquali sito sine pediculo amplectentia, oblonga, vnciam lata, neruo medio per longum donata, in acuminatum mucronem desinentia, lanugine su-



per à inf. aque & in ambitu molli pubescentia, at adulto verè folia insignem acquirunt magnitudinem, præsertim infima, quippe quæ latitudine palmum superent, longitudine sesquipalmum, teneraque illa lanugine rigescente hispida redduntur: summi autem caulibus insident *flosculi* ex pediculis seminalibus & breuibus multi simul functi, interdum reflexi caudam scorpionis æmulantes; vt Echij, ex calycibus oblongis, striatis, hirsutis, colore modo purpureo, modo violaceo, aliis mixto purpureo-violaceo, idque in vno eodemque ramo, in sex lacinias diuisi: in calycis fundo succedunt semina quaternis, Buglossi seminibus similia.

Cord. Hist. lib. 2. cap. 32. Pulmonariam Italorum describit sine maculis pro Symphyto sylu. cui addidit figuram Gefnerus, titulo Pulmonariæ Plinij, quæ placet.

Tragus lib. 2. cap. 79. Histor. getm. vocat *klein vvalvurtz*, Symphytum syluestre.

Dubitat autem, an sit Symphytum petraeum primum Dioscoridis: sed male, cum vt ipsemet fateatur, descriptio non conveniat. Miror præterea apud Tragum huius figuram esse positam capite 77. libri dicti, pro *vvald Ochsenzung*, Buglossa syluestri, quam postea cap. 79. Consolida maiorem syluestrem in sylvis prouenientem vocat. Sed magis adhuc miror, hunc errorem nec dum in Hist. Latina esse animaduersum & correctum, sed figuram abique descriptione conuenienter correspondente cap. 77. pro Buglossa syluestri reliquisse, capite autem 79. pro Consolida tertia, seu Consolida maiore [minorem vocat inter nomenclaturas] syluestri atque imagine descripsisse.

An Lonicero lib. 3. cap. 154. *vvalden Ochsenzung*, (species Buglossi syluestris, quæ Græcis Lycopis dicitur, quibusdam Germanis *scharpf Ochsenzung* & *scharpfungen*: Videndum an sit etiam Lonicero esp. 158. Symphytum syluestre, quod Tragi verbis describit.

Matthiol. in Dioscor. Pulmonariæ [Pulmonariæ alterius in post. comment. cum magn. fig.] titulo plantam à nobis delineatam exhibet. in H. Germ. cum addit. Camerarij (vbi Boh. *Plieuit* vocatur:) Irémque Epit. (vbi Ital. nominatur Pulmonaria, Germanicè *Lügenkraut, fleckenkraut, & klein vvalvurtz*, G. li. *herbe aux poulmons*) etiam Pulmonariam alteram appellat: Censura verò 91. in Amatum, Pulmonariam seplasiurum, ibidemque negat esse Potamogeton, id quod vult Amarus: dicens: Potamogeton, vt ego opinor, ea est herba quam officinæ Pulmonariam appellat, sed forsitan quia pulmonis vitiiis opituletur: quæ folio constat Betæ hirsutæ, notis albis maculato, & propè fontes & aquosos locos nascitur, vnde Fontinalis nomen traxit, de qua Gal. lib. 8. *Fontinalis*

Hæc ille: Rectius autem Rob. Cosit. Pulmonariam herbariorum duplicem ait, hæncque alteram vocat Cirsij siue Borraginis speciem albicantibus notulis maculatam, lotis opacis prouenientem, non autem aquosis. Ità vt vel hinc appareat non admittendam Amati opinionem, apud quem posita Icon quæ non est plantæ quam Potamogeton præter rationem vocat.

Turnerus Baccharin, Saluiam Hierosolymitanam, & Pulmonariam officinarum vocat. Fracastorius lib. 1. cap. 8. de cont. Pulmonariam, Pulmonariam officinarum & Herbariorum Belgarum, Pulmonalem Latinorum, Picardorum *Herbe de cœur* [Herbam Cordis] Belgarum *Onfer Brownen Spin*, Gail. *Herbe au lait de nostre Dame*, h. e. latine S. Mariz lac, quod folia maculis albis plena appareant ac si lacte conspersa essent. Lat. in fol. Symphytum maculosum aut maculatum. Non autem vocandum putat Symphytum syluestre, quod & aliud syluestre sua natura sit: rectè etiam non parum diffire ait, à Pulmonaria, de qua inter Mulci genera agemus.

Lobelin Aduers. pag. 252. Pulmonariam maculosam folio Borraginis floribus primulæ veris, purpureis: item pag. 121. Pulmonariam recentiorum, Britannicam putaram. In Oberu. pag. 317. Maculosam pulmonariam (ac ita etiam in Icon. Plant. p. 586.) quam in horto Moutoni floribus albis variare tradit.

Gesn. hort. de hac loquitur cum ait. Pulmonaria Plinij. Italici horti: quæ vulgò sic dicta, sine maculis apud nos reperitur. Illa verò cuius Plinius meminit foliis maculosis, in Italia frequentior, est omnino Symphyto seu Consolidæ maiori dictæ cognata herba. In Catalogo pliphi Auncula mutis vt & Syluio dicitur.

Pulmonariæ maris & femina: *hirschmangolt manlein hirschmangolt vvelblein* superfluum figuram habet Tab. quæ propter colorem tantum posita: tolerabile fuisset si maculosam & non maculosam pinxisset.

C. Bauhin. phyt. Symphytum 4. siue maculosum, seu Pulmonaria latifolia.

Pulmonariam (siue vt audio vocatam à Fuchsio Buglossum Teophrasti) Florentem vidi mense Februario inter Patavium & Balneum Apennense, ac inter idem Balneum & Aqua, necnon in horto Priuli Patavij obseruavi. Genæ passim florentem mense Martio & April. Basilicæ in horto D. Plateri, Lugduni *au bois de la bonne Allemande*. Montbelgardi non maculata frequens in colle è regione pontis, florens Martio & April. in horto E. C. Patavij florentem vidi Martio in horto Laiturum: Veronæ in horto D. Serrati Medici, Ferrariæ in Monasterio S. Dominici à l'Angeli, & Florentiæ in horto Ni olai Ferrarienti. Pulmonaria, inquit Clusius, quæ

culis insignita, copiosè multis Pannoniæ & Austriæ siluis spontè nascitur. Reperitur & in collibus vmbrosis, opacis locis, & riguis tractibus: Et in Bohemia quidem foliis haud maculatis: In hortis faciliè adolefcit. Primo vere erumpit: mox florifera est: pereunt Autumno folia, radix perennat.

Tempera.

Hanc herbam licet in medicina non habere peculiarem vsum, nisi quod in cibis & placentis & ouis verbasculorum modo, quibus temperamentum accedat, vsuperetur, in Hist. gall. scripserit Dodonæus. In Hist. tamen latina ait. Ceterum facultate hoc Symphytum priori responderet, si radix huius viscosa: Verum quandoquidem dura ac lignosa, siccior huius qualitas & magis adstringens. Foliorum in oleribus vsus est, putantur verò & ad pulmonis vitia ac vlcera huius quoque radices conferre, & idem quod maioris Symphyti posse. Superat autem in Symphyti radice frigida temperies, sed tamen exigua adest humiditas viscosa, ac glutinans: Hæc nequaquam pruritum excitat, nec gustu acris aut mordax, sed æquæ siue exqualis, & qualitatis gustabilis expers; tantum abest vt cum Scillæ acris visciditate huius humiditas lenta ac glutinosa confertur queat. Folia pruritum excitare possunt, non caliditate aut acrimonia, sed asperitate sua, vt iam scripsimus, minus tamen quam Vrticæ. Ad multa radix villis est: vulnera & enterocelas recentes imposita sanat: ad sanguinis cum tussi spurationem ac profusionem, & contra pulmonis vlcera multum prodest. paratur in hunc vsum & ex ea Serapium, quod sanguinis fluores sistit: recentia pulmonis vlcera consolidat: tussim sedat: febrium calores contemperat: humorum defluentium acrimoniam retundit; descriptio hæc est. \mathcal{R} Radicum Symphyti maioris vncias duas, dulcis radicis vnciam vnam, foliorum tussilaginis vnâ cum radicibus manipulos duos, nucleorum nucum pinearum sesquiuinciam, Ziziphaæo. seminis maluæ drachmas duas, capitum papaueris drachmam vnam, fiat decoctio in aqua quantum satis est ad libram vnam: Colato addantur sacchari & mellis albißimorum singulorum vnciæ sex, & fiat Serapium perfecte decoctum. Eadem quoque radix renum vlcera etiam diuturnæ cauat, & prolientem ex his sanguinem sistunt & superfluentes quoque muliebres purgationes suppressit, si vel decoctum eius bibatur, vel ipsa cum saccharo, aut melle condita, singulis continuis aliquot diebus assumatur. Ad omniolum quoque reliquorum viscerum, ac internarum partium læsiones, & ad rupta vnicè commendatur. Tanta autem consolidandi huius vis est, vt vnâ cum catribus crudis in partes concisis cocta, eas simul cogat ac vniat. Aduersus etiam sedis inflammationes conducit, & nimium profluentes hæmorrhoides imposita reprimat. Huic plantæ rei herbariæ periti non contemnendas vires tribuunt, ad pulmonis vlcera sananda. Qua in re, itémque in sanguinis reiectione mirabili successu se eam exhibuisse mihi (inquit Matth.) sæpius retulit Iulianus à Marostica Teruifensis medicus: Idem in Epit. Camerarij addit, Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit, præfertur ad pulmonis cum vlcera, tum cæteris infectionibus, & ad sanguinis reiectiones: Datur totius plantæ decoctum ad suprà scripta, magno auxilio, cum saccharo pluribus diebus: Idem cum maiori quoque successu præstat foliorum succus potus. Pulmonariæ maculosæ Lobelij folia iusculis mulierculæ miscetur, aut tusa ex ouis in placenta du-

cunt, adque pulmonis effectus & cordis vires conferre prædicant. Fallax admodum expertum, vt nobis videtur, de Pulmonaria vulgaris herba (quam intelligat non monstrat) tale adscribit Io. Agric. Vulg. Pulmonibus, inquit, egregiè opitulatur, & robur ipsorum conseruat, exaugèscit. Quemadmodum experiri licet in pulmone animalis decocto cum hac herba, & non marcescente, neque eliquato, quanquam igni aliquandiu supposito, & quantum satis est accenso.

PVLMONARIA ANGVSTIFOLIA Ceruleo flore.



Pulmonaria angustifolia sunt angusta & villis obsita. Buglossi filio. Echii aut Anchusæ foliis non assimilata, molliora tamen, neque tam aspera villo hirsuta, nullo pediculo prædita, sed mediū caulem amplectentia, qui paulatim succrescens, angulosus & hirsutus, interdū nonnihil purpureus, in


Defectus

pedalem tandem altitudinem excrefcit, in cuius fistigio multi pentagoni caliculi, in quinque purpureascentes lacinias diuisi, & subhirsuti nascuntur, continentes oblongos, concauos flores, Buglossi hortensis, aut Pulmonariæ vulgaris floribus formâ similes, qui per oras in quinque orbiculares ferè lacinias diuisi, colore, autè quâ aperiantur, ex purpura rubete, deinde quando explicati sunt, ceruleo adeo eleganti nitent, vt Genianellæ vernæ floris venustatem si non superare, attamen proximè æmulari videantur, odore autem nullo grati: immaturi decidunt integri, quemadmodum Buglossi hortensis & similibus flores atque caliculū inanem cum stilo, & quatuor seminum rudimento relinquunt, quod maturitate nigrum euadit, Echij aut Buglossi vulgaris semini respondens. Adnascuntur deinde secundum caulis pedem, alia hirsuta folia angusta, palmatis aut amplioris longitudinis, Echij aut Anchusæ foliis latiora, mollioraque, inter quæ (licet sicca sint) subsequente vere prodit caulis suis venustis floribus onustus: radix crassius carnosiusque fibris prædita est, vt Pulmonaria maculosa folio, initio candicantibus, deinde vetustate foris nigricantibus, dulci sapore.

Clusio in Pannon. dicitur Pulmonaria a. [in hist. post.] siue angustifolia ceruleo flore. Taber. icon. & hist. Pulmonaria angustifolia. C. Bauh. phyt. pag. 501. Symphytum g. siue Pulmonaria angustifolia: flore antequam aperiantur ex purpura rubente, explicato eleganter ceruleo.

Nascitur passim per Pannoniam & Austriam. Locis inferioriorem in montanis & caduis siluis. Exilit nouo vete. florumque congestorum thyrsum ferè ante folia promittit, diutissimèque floret.

PVLMO-

PVLMONARIA RVBRO FLORE,
folijs Echij.

Inuenitur, inquit Clusius, & quibuldam Pannoniæ locis alia rubro flore [Pulmonaria 3. quoad descriptionem, Icon enim Lichen exprimit, cuius figura hoc loco errore Typographi pro Pulmonaria tertia Clusij exhibetur in Hist. Pannon. 4. in post. sine icone] superiori fecit similibus, nisi crassorem maioremque caulem

ac latiora folia haberet, & flores similiter, non ut illa cæruleos, sed pulcherrimè rubentes: alioqui & radice & temperamento conueniunt.

Huic omnino respondens cum formato amplitudine alia [Pulmonariæ 3. species altera in H. Pann. Pulmonaria 5. Pannonica seu Pulmonaria rubente cæruleo flore in Hist. Post.] est, cuius flores primùm rubent, ut in priore Pulmonaria: deinde cærulei saturationis coloris fiunt.

Tabern. icon. & hist. Pulmonaria 4. Plinij angustifolia. Cur compilator imitatus Clusium hanc priori angustifoliæ non subnectit: C. Bauh. phyt. Symphytum seu Pulmonaria angustifolia altera.

Pulmonaria alba exotica.

Post Pulmonariam maculosam meritò & hæc referenda quam teste Lobel. in Oberu. pag. 317. alebat Petrus Goldemburgius, folijs Britannicæ aut Alismatis humi prostratis, floribus Solano proximis, exilloribus, muscosis.

SYMPHYTVM PVMLVLM REPENS
sive Borrage minima herbariorum.

Symphyti pumili ramulum munere Fratris Shabed, cui paulò circa cacumen bina folia, alterum vnciale, alterum etiam minus, acuminatum utrumque: flores in sacculis extremis, suo quisque pediculo nixi, complures, quorum qui nondum explicati sunt Heliotropij in modum deorsum inflectuntur: qui autem expansi sunt, ij Pulmonariæ Italorū flores magnitudine æquant, vni folij quidem, sed in quinque lacinias diuisi.

Hoc est illud Symphytum pumilum repens, Borrageinis facie Borrage minima Herbariorum Lobelio [in Obs. pag. 311. in Icon. Plant. pag. 577.] de qua ait. Speciosam hanc plantam alunt Ill. Princeps de Chymay, D. Car. de Croÿ, ceterique peritiores stirpium exploratores Belgij, folijs Borrageinis aut Pulmonariæ minoribus flosculis cæruleo-purpureis Borrageinis, sed radix pulla Vlmariæ aut Cariophyllatæ fibris implexa. Floret Tom. III.

hieme in pensilibus hortis, Vere etiāque Augusto in hortis. Gstanti cum muscositate nõnnulla acrimoniā exhibet, quod Borrageini aut Buglosso negatū est. Quænam sit hæc antiquis adhuc ignotamus.



tibus omnino rara est paucisque cognita. Hist. Lugd. pag. 881. inscribit Borrageinam minimam herbariorum. C. Bauh. phyt. Symphytum 7. siue repens Borrageinis facie.

CYNOGLOSSVM VETERIBVS:

CAP. X.

Post Buglossum Dioscorides, Cynoglossum tradit. *caule* carens. Cynoglosson, inquit, *folia* latifolia Plantaginis habet, at angustiora & minora, lanuginosa. *Caule* vacat, humique sternitur. Prouenit in salubetis. Folia cum sullo adipe veteti trita, canum moribus, alopecij ambustique medentur. Ipsius verò herbe decoctum, ex vino potum, aluum emollit.

Cynoglosson in nothis aliqui Phytom, alij Caballion [Caballiarium Marcellus,] alij Splenion, alij Scolimon, Romani Linguam canis aut caninam appellant.

Buglosso quoque Cynoglosson subdit Plinius, rectè Gesneri iudicio ei caulem tribuens, quem Dioscor. negauit, dicens: lungitur & Cynoglossos, caninas imitans linguas, topiarijs operibus gratissima. Aiuntque tres thyrsos seminis emitat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesset: quæ quatuor ad quartanas [Hic omnia quæ Dioscorides scripsit *est de dyonysio* Plinius transtulit ad Cynoglossum: vnde meritò ea, ut supposita, à Plinij textu asserit Cornarius, eam, inquit, Cynoglossos adscribat quæ Diosc. Buglosso.] Est alia similis ei, quæ ferat lappas [folia Lapathi minuta Humelberg.] minutas. Eius radix pota ex aqua ranis & serpentibus aduersatur.

Galenus, Paulus, & Aëtius in simplicium censu, teste eodem Cornario, Cynoglossum omiserunt, fortè quod de Atroglossos, i. e. Plantagine, dicta, etiam de illo intelligi voluerunt.

Nomina & virtutes herbe Cynoglossæ hunc in modum prosequitur Apuleius. Græci Cynoglosson alij Phrygiam [alij pyrgiam,] alij Hemionion, alij splenion, alij caballion, alij scolimon, alij pygion, alij leucrion [fortè legendum Teucrion] Aegyptij zenis, Itali linguam canis, alij sub-

Y y

labium, alij linguam Macedonicam. Ad morsum serpentis Herba Cynoglossa contrita & ex vino sumpta veneno resistit. Quæ folia quatuor habet, pisata, & ex aqua potui data, prodest quartanis Succum ex passio & oleo repositum in aurem stillatum mirè sanat eos qui minus audiunt.

Litem inter Dioscoridē & Plinium de caule Cynoglossi ad propositum dirimere videtur Marantha lib. 2. cap. 4. his verbis. Scribit Dioscorides Cynoglossum caulem nullum proferre: quod ita est, multisque qui verum Cynoglossum cognoscunt, hoc obseruauerunt. Verum cum anno abhinc tertio nos Garganum montem Maio mense peteremus, in itinere largus Cynoglossi campus sese nobis obtulit: ex quibus multa caule vacare vidimus: multa tamen caules habere è medio frondium nascentes, nudos, dodrantis, aut amplius altitudine, in summitate scabrosos, vt sua umbra vniue sum frondium ambitum, quas humi sparsa iacebant, superarent: flores in illis subpurpurei, anthesæ æmuli: atque in vniuersum tota planta pulcherrima. Hanc rem nos ac tentius consi lerauimus doximus. Atque ad illud vnum laborauimus, vt an diuersæ essent Plantæ, certiores redderemur: tandemque nullam in frondibus, radice, saporeque dissimilitudinem inuenientes, eandem esse coacti sumus affirmare: anticipatæque rei nouitas nos reddidit, an plantam illam pro Cynoglossio admitteremus donec Medicus quidam Germanus, materis medicæ studiosus, qui per multos annos Parauij artibus operam dederat, se Cynoglossum in Patauino horto consitam vidiisse, quæ post tertium annum caulem edidisset, mihi asseruit. Vnde priorem meam sententiam nihil mutans, hanc diuersitatem vetustatis ratione euenisse arbitratus sum, hocque Dioscoridi, sicuti & multa alia, iocumpertum fuisse.

Cum itaque olim ne veteres quidem in huius plantæ delineatione sibi consentent [Dioscorides siquidem ei caulem ademit quem Plinius tamen ei tribuit,] non mirum est si magna adhuc hodie inter recentiores herbarios contentio perseueret, quamam ex aliquot plantis, verum sit & facie & viribus Cynoglossum. Hi siquidem ad vires attentis, & ad effectus quos Cataportia de Cynoglossa inscripta pollicentur, aliud atque aliud Cynoglossum ostendunt.

Æquiuoca

Cynoglossi sequentes agnoscuntur species, eodemque nomine quæ sequuntur donantur plantæ: scilicet. Cynoglossum vulgare. Cynoglossum Monspessolanum. Cynoglossi vulgaris minor species & candidior. Cynoglossum minus. Cynoglossa folio virenti. Cynoglossum siluestre Thalij. Echium. Anchusa. Lithospermum maius. Echium Scorpoides, aquaticum Gesn. Cerinthe quorundam. Plantago. Narcissus. Cynoglossam etiam de Plantagine dici à Recentioribus tam verum, quam verum est Arnoglossum & Cynoglossum Plinium & Apuleium inter se confudisse.

GYNOGLOSSVM VLGARE.

Descriptio

Nigra foris radix, intus alba, tota crassa, Rapiam exiguum representans foris coloris pulli, odore magis graui quam sapore, qui dulcedinem nonnullam faruam linguæ offert: caules circiter bicubitales in ramos multos diuisi, vetu-



state concaui, multâ lanugine obiti: folia longa & latiuscula primo anno, secundo vbi caulem fert, stricta, acuminata, incana, mollia, lanuginosa, odore graui, flores Buglossi officinarum, colore sordido rubente, quos folia quater-na aut quina hirsuta incana amplexantur: quibus succedunt Lap-

pula quatuor conis suis ad stilum in medio prominulum concurrentes, nonnihil compressæ, spinulis hispide, quæ pertinaciter vestibus adherescunt, cauitate vicia donatæ, in qua itidem semen vnicum.

In his regionibus, inquit Cordus in Dioscoridē asperam Anchusam [Echium vulgare] quam Lycopsum esse diximus Cynoglosson vocant. Veram autem Cynoglossam omnes alie Germanie gentes *hundszungen* id est, Caninam linguam vocant: quam etiam pharmacopolia habent. Dioscorides ei caulem negat: & nos etiam sine caule eam nasci vbique videmus, quibuldam tamen temporibus eadem caulem, purpureos flores, & post hos minutas lappas producit, quas Plinius etiam illi tribuit. Ergo imprudenter Ruellius scribit, non esse Cynoglossum quod in officinis habeatur, quoniam caules & lappas ferat. Multis enim nos annis obseruauimus Cynoglossam interdum primo anno, interdum & secundo sine caule nasci, vt Dioscorides eam depingit, reuera tamen caulem fert. Duplex inuenitur Cynoglossum maior. De qua dicitur paulo post.

Vocatur hæc, inquit Tragus lib. 7. c. 76. *uuel halszungen* Græcis, Cynoglossa & lingua canina Latinis, *hundszung* Germanis dicitur. Posset & eadem lingua *hundszung*, id est, Herba canina: *hundszung*, id est, radix canina, appellari, cum tota sua substantia scetore canino grauiter oleat. Hæc alij [teste Dioscorido] Phiton, alij Cabassatum, alij Sphneron, alij S. olimon. Romani linguam canis aut caninam appellant. Apuleius c. 97. Phrygiam, Hemionion, Splenion, Caballion, Scolymos, Pyrgin, Leucrion, Zenis, Sublabium, & linguam Macedonicam vocat. Manlius sup. pill. rheumat. Melue. Cynoglossam ait à quibusdam Kaliber, Censken, Alchaaber, Cabeachar. appellari. Folia autem Cynoglossi vulgaris nobis non videntur strata, vt scribit Tragus: licet etiam eius non est bona, sed potius est Echij. Fuchsiana etiâ nostram quam iam culptâ emimus non bene exprimit Cynoglossum.

Fuchsiv. detur confundere hoc Cynoglossum sine lingua caninâ officinarum cum Echio vulgari, quod apparet ex fig. & descript. deceptus fortè fig. Trag.

Cornar. in Dioscoridē, Notum est Cynoglossum & vulgè & officinis suâ Græcâ appellatione. Nostri illam sequentes *hundszung* dicunt. Nec aduersatur huic quod Dioscor. caulem non habere

bere & pet̃ terram sterum esse dixit. Tale enim reuera primo ortus sui anno conspicitur. At vbi per hiemem durauit, sequenti anno affurgit, & caules producit quos thyrsos Plinius appellauit: ni minimè dubium sic vulgare officinarum Cynoglossum reuera id. s̃s quod Plinius descripsit. Hæc Cornutus qui [v. Tragus] per terram sterni Cynoglossum vulgare asserit, nimirum secus suam sententiam proponens.

Cynoglossum vulgare Buglossæ vulgò vocatæ adeo similem ait Humelberg, apud Apul. vt ab ea non nisi odore [qui in Cynoglossa grauis est] discerni possit. An autem tanta sit similitudo iudicent lectores.

Lonic.lib.5. cap. 156. *bundzung*: Cynoglossum: Lingua canis: eius duo Genera, maius & minus: maius est verum Cynoglossum Diosc. Dicitur etiam *leim de bundzung*: Paruum est Cynoglossum officinarum aut vulgare. Duas icones proponit Lonicerus, primam in qua caulis malè apicatus: altera icon est eiusdem plantæ quam amissis priora folia: ignarus botanicus ex consideratione iconum ex vna planta duas facit.

Ruellium repetebat. Amatius quoddam falsò aliorum iudicio, Lyopsium eam non esse herbam contendat, quam vulgares Italici Pharmac. Cynoglossum appellant, cum reuera inter se maxime differant.

Anguilla epist. 12. demonstrat satis se hanc herbam non agnoscere pro Cynoglossa. Gesu. hort. vo. 2. Cynoglossum italicum: In catal. plant. Lycopsum & quantum genus Anchusæ, cui Ruellium Lingua canis hodie vulgò dicitur nomen attribuit refert.

Dod. in fol. p. 53. duas habet Icones quas Planinus exhibet: Cynoglossum absque flore: Cynoglossum cum flore, & describit. Græcis κυνόγλωσσον dicitur: Larinis Lingua canis. Germanis est *bundzung*, Belgis *honte tonghe*: Hispanis *Lingua del perro*: Italis *Lingua di cane*: Gallicis *Langue de chien*: Anglis *bovvedes tunghe*: B. hemis p. 77. 227.

Ætius lib. 1. & Tetraboli tertij l. 2. Limonium & Cynoglossum Candum eandem stirpem sentite videntur. Rondeletius Gladium sylvestre esse voluit, sed lyvestre Gladium à satiuo perquam differens est.

Lobel. in Obseru. pag. 313. (Itemque icon Pl. p. 580.) duas picturas exhibet sub his titulis: Cynoglossum vulgare sine flore, Lycopsis Lacunæ: Item Cynoglossum vulgare cum flore. Addit præterea Cynoglossum maximum occurrere in hortis Belgicis, folijs scilicet, floribus, semine, omni que sua parte duplèque maius vulgari. Quod verò pingit in Aduers. credimus esse Cynoglossi vulgaris speciem minorem & candidiorem.

Per hiemem folia illa dura: appetente Iunio mense caulem emittit, auctor Trago. Nascitur in parietinis & montis iuxta sepes, quod omnis generis sordes conici plerumque solent, fabulosæ & in cultis denique locis Cynoglossum vulgare seu Lingua canis provenit Patauij, Lugduni copiosè versus la porte Neufve, florens Maio: Bassilæ passim. Montbelgardi inter portam des Grans & Castellum extra urbem: & alibi vt in horto E. C. Genevæ cum flore & lappis Iunio mense: Monspelij provenit & præterea alia species.

Cynoglossa frigida & sicca temperatam obtinet inueteratis & malignis vlcibus. & Mariscis præsertim sanandis efficacissima. Radix Cynoglossæ vino decocta, vesperiq; mane bibita, alium emollit. Eadè fermento obducta, ac pau-

latim in calido cinere tosta, & assata, postea abiecto fermento locis affectis Balani instat indita, calorem & dolorem internarum mariscarum protinus aufert, vtque citò curentur efficit, experientia id attestante, neque multis hoc genus curationis notum est. Aqua Cynoglossæ, succus & pulvis eius mariscis vtilissima sunt, collutione & inspersu. Aqua distillata alia quoque sanat vulnera, præsertim genitalium, Lintcolis in ea madefactis ac impositis. Herba rufa, & cum Adipe suillo in sagragine tosta, moribus rabiosi canis medetur & ambustis. Caluis illitu capillos reductit. Aduersus inueterata mala pustularum, fistularum, & aliorum abscessuum tumidorum, vnguentum è Cynoglossæ succo confectum illitu efficax est. Confectio verò sic se habet: Succum Cynoglossæ cum melle rosarum æquis portionibus paulatim, quoad succus absorbitur, decoque, post Terebentinam admisce, & fiet vnguentum Cræsti nissimum. Hæc Tragus qui vires tribuit p. ynoglossæ Diolcondis, quæ an conueniant vulgari huic nescimus: nec etiam ea vti velimus ad emolliendam alium, nec ad morsum canis rabidi. Apollinaris ait conferre applicatum moribus canis & caluitem reparare. Dubitamus an consultum sit hac planta in prædictis morbis vti, nos nolumus experiri: nimirum frigida est.

Porrò Matthiolus de eius facultatibus hæc prodidit. Radix sicca in puluerem trita, ex vino rubro pota dysenteriam sanat: vtilis admodum ijs quos gonorrhæa habet: item ad Catharos & grauedinem. Radix vulneraria est, vtilis sistendo languini & omnis generis vlcera & vulnera curat, in primis autem aphthas & maligna oris vlcera, ex lue venerea orta: nec non hæmorrhoides, si radicis decocto colluantur. & pulvis eiusdem inspergatur. Succus & aquæ stillatitæ f. cultas eadem. Ambustis scribunt auctores Aduersatiorum opitulari, vel mulierculæ sciunt, refrigerandi scilicet manifesta qualitate, exsiccante, doloremque leniente, & maiorem fluxum prohibente, præsertim axungia alliquefacta feruida: que instillata: item alopecij de acri & erodente humore capillis defluentibus, confert: nec non emollit alium: citius vis malactica & mucaginea vino incocta, & frigore rectulo: radix odore est penè soporifero, maximi hodie vtilis: & acres & tenues fluxiones, magis tamen incrassat.

CYNOGLOSSI VLGARIS MINOR species & candidior.




Cynoglossi speciem habeo siccam, Descriptio nescio vnde nisi ex Valerandi Dourez herbis fortè: dodrantem non excedit radice nigra vt in vulgari: à qua plures caules, tres in planta quam siccam habeo, in quibus folia duas vncias longa, tomento candidantia, vti & caules. Semina lappularum æmula, aspera, Yyy 2

quatuor simul iuncta, non minora quam in vulgari Cynoglossa.

An. y. og. ollum pulillum Narbonense Lob. in Advers. & H. Lugdun? An Catpuri Bauhini phyt. Cynoglossum f. sue medium, Cynoglossa minor Cordet?

CYNOGLOSSVM MINVS.

Descriptio



rubentibus succedunt *semina* lappacea, pulchra, quaterna, vestibus adhaerentia, multo vulgari minora.

An Cordo in Diosc. Cynoglossa minor, quam Dioscoridi incognitam fuisse scribit.

Tragus libro i. c. 64. pingens & describens vocat Elatinem. Eius autem figura minus placet. In ea siquidem desunt folia longa inferiora. Melior habetur apud Tabern. hac inscriptione. *Histiotropium minus tertium, Blauu Scorpion. kran*: Fuchsius in historia sua manuscripta Cynoglossum minus vocat. Clusius in Pancon. pag. 603. Cynoglossum pumilem. In H. post. Cynoglossum tertium, Cynoglossum pumilem sine A. stricte determinat. H. Lugd. pag. 1240. Lappula minor a. Casp. Bauh. phyt. Cynoglossum tertium sue minus.

Locus & Tempus.

Cynoglossum Tubingæ & Genevæ olim à me visum. Montbelgardi in orto Ill. Principis à me satum florebat Augusto. Cynoglossum pumilem Clusij crescit ad viarum & agrorum margines circa vibem Viennam in nudis & salebrosis iugis huic vibi vicinis, atque alibi. Floret verò Maio & Iunio.

Elatine, inquit Tragus, refrigerandi, exsiccandi, & sanandi vim obtinet, eoque nomine tenerimis membris utrinque utiliter adhibetur. Elatine herba in vino rubro decocta, ac pota intestinorum erosionibus à dysenteria medetur, dysenteriam sistit, dolorumque mitigat per aliquot dies continuos pota. Herba vino decocta, & gargarisata exulcerationes oris & colli persanat. Quin & itula superstitione nonnulli persuasi, quorum supra mentionem fecimus, ab oris viceribus, quæ Græcis Aphræ appellantur, eos liberari credunt, qui hanc herbam saltem secum gestauerint, testanturque id experientia comprobatum. Elatine viridis adhuc, rufa ac fronti imposita, oculorum inflammationibus & fluxionibus auxiliatur. Alia verò iuuenta quotidie

inueniri, ex iis quæ annotauimus colligi poterunt.

CYNOGLOSSA FOLIO VIRENTI Ioh. Bauhini.



Aules a- Clusius ex Descript. radice pollicari, nigra foris, intus alba, lignosa, sapore viscido & ingrato, erigit bicubita, es, rectos, hirsutos, in alas diuisos, adulescentes, inanes; folia forma quidem sunt Cynogl. vulgaris, superne læto virore splendentia, glabra, & tactu mollia, allicubi etiam molli lanugine hirsuta, inferne albida, hirsuta, & aspera. odore nullo, sapore saturo: *flores* vt in vulgari, ferruginei rubentesque, parui, in quinque lacinas diu si. apicibus toridem paruis & rubentibus, è calyce hirsuto, quinquifolio, in atro virente purpurantibus: *lappula* quales vulgari: sculptor autem ineptius corruptit bonam fig. C. Bauh. phyt. Cynogl. semper virens: Cynoglossum folio viridi Ioh. Bauhino. Sed cur dicit semper virens, cum vix vltra annum duret?

Cynoglossum hoc ante aliquot annos repperim in monte prope Malmunster plantarum in Locu. horro Ill. E. C. sæpius ex semine deciduo se renouat: floret autem Aprilis & Maio: semen maturat Iulio, deinde perit planta.

CYNOGLOSSVM CRETICVM PRIMVM Clusij.



*M*eminis Clusius in Descript. post. Hist. præter hæc duorum Cynoglossi Cretici generum, quorum historiam, qua potuit perspicuitate & facilitate ita prosequitur. Proferit Cynoglossum Creticum primum à summo radice capite multa folia, longa, vulgaris foliis multo angustiora, venis aliquot secundum longitudinem excurrentibus prædita, ex viriditate canescentia: inter quæ nascitur caulis inæqualis, minimi digiti crassitudinem non attingens, per quem, inordinato

nato fitu, nascuntur folia, iis quæ à radice prodeunt breuiora & angustiora ipsum quodammodo amplectentia, ex quorum alis circa summum caulem nascuntur ramuli aliquot caulis *flosculis*, in quinque laciniis per extremas oras diuisis, onustis, vulgaris quidem floribus forma similibus, sed minoribus & dilutioris coloris, in quorum medio quinque staminosa saturè rubentia: singulis floribus succedunt, quemadmodum in vulgari, quatuor rugosa & aspera semina simul coniuncta (prominulo ex illorum medio stilo) vulgaris tamen seminibus minoribus, sed non minus quàm illa, vestibus attingentium inhaerentia: radix est longa, singularis, candicans, crassa, & succulento cortice obducta, summa tamen cute subfusca, minimi digiti crassitudine, si actu contumax, raris tenuibus fibris per totam longitudinem prædita.

Hoc natali loco crescens nunquam vidit, sed in quorundam hortis semine natum duntaxat, quod ipsum etiam sæpius in suo aloit, ac primum in Belgica semine ex Italia misso Cynoglossi Cretici nomine, deinde spontè deciduo conseruatum: florebat Maio atque etiam Iunio, quo finiliter mense maturecebat.

CYNOGLOSSVM CRETICVM secundum Clusij.



Primo anno ex radice longa, inf. a digiti minimi crassitudinem consistente, rarisque fibris per longitudinè sparsis prædita, crassiusculòque cortice foris fulco amicta, multa promit folia, palmi aut amplius longa, vnicam lata, humi fusa, mollia, & tenui bre. l. que lanugine tecta, nervo latis crassiuscula per longi. J. em æ-

qualiter secante: inter quæ altero anno prodiit caulis cubitalis aut amplior, striatus, firmus, rectus, molli lanugine obsitus, quem confuso ordine vestiunt folia rã dictis similia, sed quæ breuiora sunt, quo propius ad summum caulem accedunt, ex viridi pallascentia: summus caulis in multos graciles ramos diuiditur summo fastigio Scorpiuri aut Heliotropij maioris instar indixos, in quibus plurimi caliculi quinque laciniis constantes, vnde flores emergunt primi floribus breuiores, illis tamen ampliores, in quinque laciniis orbiculares diuisi, candicantis injitò coloris, sed multis tenuibus purpureiscentibus venis [quæ veritate in cæruleum colorem transeunt] ornati: defluentibus floribus, conspiciuntur in caliculis quatuor semina coniuncta, vt in priore Cynoglossio Cretico, rugosa & aspera, è quo iunio modo prodiit stilus.

Cynoglossa topiaria forit Plinij.

E radice geniculatis, bicubitalib. caulisculis, aspe-

ris, Aparinesitu vicina quævis arripit: filia binæ & terna, atrouirentia, Echij modo hispida, Rabiæ paria, & alis quando maiora.



Flosculi purpurei, violacei, Echij minores, verticillatim Cruciatim modo, à medio caule sumo tenuis: semen inuolucris foliaceis, sinuosis, Sefamo simile aut Thlaspi, fuscum, gultanti dulce clauditur, cuiusmodi primi Lobelio imperitius peritus Muttonius Neruensis. Vniuersa planta gustu Echij æmularit.

Lobel. in Obseru. p. 466. vocat

Alifson Germanicum, Echiodes (ita quoque Icon. Plant. p. 804.) siue facie Molluginis Herbariorum: Aparine Plinij putatum. Alifson Germanicum Echiodes Lobelij H. Lugd. pag. 144. Aparinem maiorem Plinij Tabern. Cynoglossam 7. siue topiariam seu repentem C. Bauh. phyt. cui potius Cynoglossos topiariis operibus gratissima Plinij, quàm vel eiusdem Aparinel. 27. cap. 5. vel etiam Parthenium lib. 22. c. 17. Alyssum Germanicum Echiodes. Aparinem maiorem Tabernæmonteni, *Gesf. & de Kauis*, Hort. Lusit.

CERINTHE VETERIBVS.

CAP. IX.

Aluetiorum & apum causâ Cerinthen ferere oportere prodidit Plin. lib. 21. cap. 12. Est autem, inquit, Cerinthe folio candido, incuruo, cubitalis, capite concavo, nectis succum habente. Fluius florum acidissimæ sunt. Theophr. *apud* inter æstiuos flores annuerat hist. lib. 6. c. 7. De hac Columella lib. 9. cap. 8. de comparandis apibus ait. Sunt qui per initia veris Aptastum atque [vt Vates ait] trita Melyphylla & Cerinthæ ignobile gramen. al. que colligant similes herbas, quibus id genus animalium delectatur, & ita aluos perficiunt, vt odor & succus vasi inhaerent, quæ deinde mundata exiguo melle reipergant: &c. Vates ille est Virgilius, qui Georg. 4. sic cecinit:

... huc in vifcos asperge saporis

Trita Melyphylla & Cerinthe ignobile gramen. Ignobile gramen Seruius & Paulus Manutius dicunt vile ob copiam, quod ubique nascatur.

Pio Cerinthe Plinij quatuor plantæ congenere à quibusdam proponuntur. Harum prima est Cerinthe quorundam maior versicolore flore. Secunda Cerinthe quorundam maior, spinoso folio, flauo flore. Tertia Cerinthe quorundam maior flore ex rubro purpureascente. Vltima Cerinthe quorundam, sed minore flore flauo.

Cerinthes etiam appellatione donantur & he plantæ. Gramen ignobile. Liliū fuluū Theophrasti Constantino: Liliū tertium genus Gesnèro in OEcon. Pasquera Ruellio.

Æquiuoca

CERINTHE QVORVNDAM MAIOR
versicolore flore.

Descriptio

Quatuor aut quinque ramos siue caules habet primū, à summo radice capite prodeuntes, rotundos, succulentos, interdum cubitales: quos amplectuntur numerosa folia, oblonga, circa pediculum latiora, mucrone obtuso, colore ex viridi ad cæroleū quasi tendente, candidis maculis aspersa, nonnihil villosa: foliorum sinu nascuntur alij ramuli, Heliotropij maioris ramulorum instar sese incoquentes, plenius secundum ramulorum longitudinem dispositorum, longiusculorum, concavorum, à medio in extimam partem flauorum, altera quæ caliculis inhaerent, ex rubro purpureorum quibus apes valde delectantur: his decidentib. bina plerumq; in eodem caliculo semina conspiciuntur, nigra, Erui magnitudine, seminis Echij, aut Ciceris arietini forma: radix alba: vbi sponte nascentem obseruauerim ignoro.

Crescit autem nonnullis Lustraniz locis, sed copiosè per totam Baticam. Floret nouo vere & Martio. Apud belgas in hortis rara multò seuius, videlicet sub æstatis fine, & subinde floribus scæter in hiemem vsque, tum perit, & deciduo semine singulis annis renascitur.

Memitha.
Maru.

Quidam Cerinthen esse volunt, ea ratione nifallor ducti quod apibus grata sit, quod de Cerinthe & testantur Virgilius & Plinius. Vulgus herbariorum etiam Memitham magno errore vocauit. Non desunt qui Maru siue Almaru Auicennæ L. tract. 2. descriptum putent, præsertim tertiam eius speciem: quæ, vt verum fatear, nihil videtur Auicenna aliud describere quàm vulgarem nostrum angustissimū, aut porriginem, quib. hanc nostram temperamento proximam existimo. Hæc Clusius in Hisp. de ea etiam agens in hist. rar. plant. Cæterum iconem proposuit Maru maioris Dodonæi: nomina verò subuertit, quæ etiam minori Cerinthe de qua postea dicemus conueniunt. In lætis & vmbrosis collibus

Locus &
Tempus

exit, inquit Dodonæus: tum & secus vias ac agrorum margines in bohemia, Rhætia, Vindelicia, Norico, Pannonia, ac vltra citràque Danubium locis complurimis. Floret ac viget à Maio ad multam ætatem. Recentior ætas Maru appellat. Meminit autem Maru herbæ Auicenna c. 464. quinque eius species enumerans: quarum prima & secunda odoratæ calidæque: quarta similiter calida, sicca & attenuans: Tertia verò temperata, quæ exulturari dicitur. angustissimū: quinta refrigerans Mischebar dicta: Cum qua Cerinthen (si cum aliqua) conuenire censemus. Videtur verò & Cerinthe eadem stirps esse, de qua Plinius l. 21. cap. 12. his verbis egit. Nec abhorret enim Maru ab eius descriptione: albicantibus siquidem maculis folia candicant; deorsum quoque flexa incuruantur; cæcitalis stirps est; capitulum siue fistigium caulibus concavos stiloculos promittit: è quibus apes mel legunt. Theophrastus Knysibov inter æstiuos flores l. 6. enumerat; inter quos & Maru herbæ flos habendus. Meminit Virg. Georg. 4. vbi ipsam appellat ignobile graminen: quibus verbis, aut Graminis nomine Poëta (quod verisimile) abutitur, aut aliam vult intelligere Cerintheū, quæ graminis sit species. Exstat verò & apud Plinium Leucographidis herbæ nomen lib. 27. cap. 11. quæ qualis esset scriptum se non reperisse refert. Quod si verò non tamen nomina stirpibus indita hæc non abs re


Cerinthe
Theophrasti.
Cer. Virg.

Leucograp.

Leucographis dicitur, folia etenim albis maculis inscripta habet [quin, inquit Aetius, cum subuirdis appareat, si ad eodem affricetur aut ad asperius pallium, locum inalbat.] Potest verò, teste Dodonæo, & Leucographis eadem cum Cerinthe esse dici. Manifestus autem est Plinij error qui de herba scribit quæ lapidi Galactiti tribui debent. Non raro siquidem eadem stirps sub diuersis nominibus locis separatis occurrit: Non esse autem hanc Memitham, quæ Græcis λευκον, adeò palam est, vt refutatione opus non habeat. Cæterum facultate hæc Maru species frigida apparet atque adstringens: & talis quoque Leucographis est Plinio auctore.

Lobel. obs. p. 215. (Icon. Plant. pag. 197.) Cerinthe maior floris sese expandentis colore purpureo-luteo.

C. Bauh. phyt. Cynoglossum 8. siue montanum maius seu Cerinthe flore purpureo-luteo.

CERINTHE QVORVNDAM MAIOR,
spinofo folio, flauo flore.

Descriptio

FOELiciter nobis adolef. it Cerinthe maior cubitum vnum aut duos alta, radice recta, simplice: caulibus digitalit crassitudine, rotundis, læuib. exalbidis, in ramos plures diuisis: folia glasti satua linguam ætulantia, falcatis appendicibus ramos & caules amplectitur, ex viridi glauca, plagel-

lis candicantibus hic illic sparsis maculosa, spinul. q; tam lupina quàm prona parte asperata, in ambitu aequè crenatâ, sapore fœ. è herbaceo: flores ex ramulorum fistigiis deperdent plures tunc. lutei, oblongi, in calathi formam, oris læuissimè diductis: quorum singulis insunt occultata quina stamina lutea mucronibus attris præpilata, extrinsecus verò obuallant quinque folia angusta, oblonga, concinnè per ambitum crenata: semina vnicuique flori succedunt bina, Orobi ferè magnitudine, nigra foris, pulpam intus albam continentia.

Semen ex Italia misit D. Io. Henricus Cherlerus gener, vnde enata floruit mihi in horto Ill. E. C. sub initium Iunij. Provenit copiosè in agro Romano idem oculatus est testis, sicut per totam ferè Hetruriam in agrorum & viarum marginibus. Spontè nascentem obseruabam Valentino regno, & florentem Martio, arque Aprilis initio. Semine tamen ex Italia misso nata in belgicis hortis, nonnisi Iunio & Iulio atque etiam seriùs florebat, & subinde in hiemem vique.

Lobel obs. p. 216. Cerinthe maioris è floris sese pandentis colore lateo differentia.

C. Bauh. phyt. Cynoglossi 8. seu montani maioris, seu Cerinthe flore luteo varietas.

*Cerinthæ quorundam maior flore ex rubro
purpurea scens.*

Cerinthæ certium genus neque sponte nascens, neque in hortis cultum conspexit Clusius, sed I. Plateau Tornacensis Cuius, in cuius orto cultissimo crevit, iconem misit: feri addens Februarius, Martius & Aprilis, pro ætate verni temperie: humido solo delectari, propterea, cum æstivi dies incipiunt, & arcescit solum, crebris rigationibus indigere, ut augmentum sumat: atque ut plurimum Autumno duntaxat flores promere, cum videlicet de cælo crebri imbres cadere incipiunt. Antquam verò esse plantam.

Lobel. Obseru. pag. 116. Cerinthæ maioris è flore purpureo & folio fusco glauco differentia. C. Bauh. phyt. Cynoglossi 8. siue montani maioris: seu Cerinthæ varietas, flore purpureo.

Cerinthæ quorundam minor, flore flauo.

Cerithe dicta Plinij herbariis, *caule*: plures à recta radice funditis, teretes, læues, in alas diuisos, cubitales: partim erectos, partim humum versus reflexos, *folia* oblonga, subrotunda, perfoliata: siliquosæ quodammodo formæ: caulem pinnis rotundis productionibus amplectentia, colore superne in atro virente vel cæso, & creberrimis ceu poris impressis, non tamen ut in Hyperico peruiis, obiectu lacis apparentia punctata, inferne magis glauca & veluti undulata: *flores* inter alarum folia condit simul multos, caducos, luteos, sublongos, profundè crenatos de quibus totidem adnascuntur *flamina* Ochreæ colore, stilo solo tenui albedo extra flores calathum prominente: ex calyce quinquefolio, cui bina innascuntur femina, foris nigra, intus alba. & medullofa.

Clus. in Hist. vocat Cerinthem aliam: in Hist. rar. Cerinthem quartam: siue Cerinthem quorundam minorem flore flauo. Alebatur, inquit ille, etiam in Belgicis hortis, quando Viennam euocatus sum: nec ante sponte nascentem hanc plantam conspexeram, quam in Austriam venierem, in cuius agris atque etiam Syriæ copiose crevit, interdum etiam hieme in sua viriditate permanens. Huic Clusius in Hist. rar. particularem tribuit iconem: nomina autem ei communia cum priore Cerinthe. Eadem etiam illi nomina, & loci assignantur à Dodonæo quæ priori.

Gesf. hort. Cynoglossus montana à quibusdam, Telephium nonnullis eruditis existimatum: quæ Romæ in monte Palatino frequens nascitur ac à Græcis editur. Lobel. in Adu. pag. 172. Cerinthæ Plinij. In Obs. pag. 216. Cerinthæ minor.


H. Lugdunensis imperfectam dat iconem si intelligat eandem plantam quam nos: nescimus etiam cor apud eam dicantur folia villosa.

C. Bauhin. phyt. Cynoglossum 9. siue montanum minus.

Cerinthæ quorundam Montbelgardi in horro Ill. C. W. ex femine deciduo quotannis nouis plantis se propagat: eius semen ex Burgundia nomine Maru mihi misit Tossanus Carolus. Olim habui Genezæ in orto florentem Iunio, & virentem adhuc Autumno: si frigore tandem consumpta femine se propagauit deciduo. Lugd. florentem habui Maio. Obseruati etiam Basileæ in orto D. Plateri: Tiguri in orto Gesneri: Bononiæ sponte in agris prouenientem, ut & Florentiæ.

ISATIS SIUE GLASTVM MONTANVM Dalechampi.

CAP. XII.



Glastum Montanum Descriptio

in nigris verticibus. montium gignitur, radice crassa, nigra, fibris multis capillata: foliis circa radicem multis, longo crassoque pediculo subnatis, venosis, Glasto similibus, sed in summo magis obtusis: caulibus multis, pede altioribus, in quibus folia supradictis angustiora & acutiora: flos copiosus in caulium vertice luteus niter, oblongi vasculi figura, superne in cuspidem diuisus, prominente in eius medio sinu, tenui pilo.

Vellem locum particularem annotatum ubi reperitur Glastum montanum hoc Dalechampi, quod Hist. Lugd. p. 1104. pingit: non multum forte differt à Cerinthe. C. Bauh. phyt. Isatis 3. siue montana vocatur.

HELIOTROPIVM VETERIBVS

& in genere.

CAP. XIII.

Heliotropia duo sunt Dioscoridi: Maius vnum alterum minus, de quibus ita scriptum reliquit. Heliotropium magnum, quod aliqui Scopiuron vocauerunt à floris figura, verum Heliotropium [addit quidam, *niytrau*] ab eo quoddam folia vna cum Solis inclinatione circumaguntur: folia habet Ocimo similia, sed hirsutiora, nigriora [*neubryga* vet. quam lectionem secutus est Marcellus.] & maiora: ramulos à radice tres, aut quatuor, aut quinque: & ex his alas multas: in cacuminibus florem album, suffuluum [ira vulg. ex. alt. Sarrac. *namboquys*, purpurea. entem] incuruum, velut scorpionis cauda. Radix est tenuis & inutilis. Nascitur in asperis locis. Huius herbæ fasciculus cum aqua coctus & potus, pituitam & bilem per aluum ducit. Comoda est & ictis à scorpione, cum vino pota & imposita. Ad alligatur eadem ut amuletum prohibens conceptionem. Tradunt seminis grana quatuor cum vino pota, vna hora ante accessionem, febres quartanas sedare [finire Sarrac. Jertia, tertianas. At impositum semen, fornicarias ac peniles verrucas, & thymos, & epinyctidas resiccant: folia verò podagris, & luxatis, & pueris strisci, ac partium circa cerebrum & membranas eius inflammatione affectis, vtiliter imponuntur. Mouent eadem menses, & foetus ducunt, trita apposita. Caterum Heliotropium paruum [quod & alio nomine Scopiuros vocatur] nascitur in locis palustribus, & iuxta stagna, folia habens similia prædicto, sed rotundiora: semen rotundum,

semen rotundum, dependens vt penfiles verruce. Potest herba cum semine, addito Nitro, hyssopo, & Nasturtio, ex aqua pota, latum & rotundum lumbricum expellere. Tollit & penfiles verrucas cum sale imposta.

Sed & Plin. Heliotropij duo genera assignat. Heliotropij miraculum sæpius diximus, inquit, cum Sole se circum agentis, etiam núbulo die: tantus syderis amor est. Noctu velut desiderio contrahit cæruleum florem [de Cichorij flore, quæ etiam solem semper aspicit, hoc audiendum. Heliotropij flos, vel candidus est, vel subfultus Dioscorid. Dalech.] Genera eius duo tricoecum: (paruum) & helioscopium [magnum.] Is præterea foliis tribuit ad terram vergere, quod Dioscorid. fructui: præterea similitudinem caudæ Scorpionis semini adscribit quam notam Dioscorides Scorpionidi assignat, de qua suo diximus loco. Dicendum igitur videtur Scorpionidem congenerem esse cum Scorpuro Dioscoridis, cum quo Diosc. illam coniunxerit, perfectam eius descriptionem subiiciendo; & Plinius pro eadem planta acceperit; Quod autem apud Plinium semen comparatur caudæ Scorpionis accipitur pro cauliculo reflexo, in quo primò flos, deinde semen dispositum est. Plinius itaque Heliotropium tricoecum [minus] cum maiore Heliotropio Diosc. confundere videtur, tribuens vni, quod Dioscorides ad alterum refert. Dioscorides verò omisum Tricoecum videtur sub Heliotropio minore comprehendisse.

Duo igitur est Heliotropia Varro quoque testatur. Nec minùs ad mirandum, inquit, quod sit, floribus, quos vocant Heliotropia. Idem & Paulus lib. 7. confirmat, seorsum priuatimque de utroque agens. Heliotropium maius, quod & Scorpionum vocant, calidam, siccam, & abstergentem vim præ se fert, cuius decoctum potu ejicit pituitam, bilémque: applicatum verò semen ipsius myrmecias & huius notæ vitia perficit. Minus autem Heliotropium, & hæc abolet & larys tinea interimit, si cum semine suo, adiecto nitro, hyssopo, & Nasturtio bibatur. Hæc ille, quibus notis inter se differant satis docet: nec minùs quibus etiam viribus discrepent. Galenus Heliotropium in simplicium medicamentorum catalogo præterit. Cæterum Heliotropium maius, seu vt vocat Marcellus, herbam Solarem maiorem, sunt qui Heliotropion, qui Dionon, qui Helioyon, qui Scorpiononon, qui Scellamum agrestes, & qui Scorpj caudam dicant. Minus verò, qui Scorpionum, qui Solarem minorem. Circumagitur verò cum Sole Heliotropium, non vt fabulosè quondam in transformationibus suis Natio cecinit vt priusquam in florem muraretur Syderis illius lucem & formam viuens homo amauerat: mutata etiam continuè contempleretur: sed vt hoc etiam habeant rustici horarium, quod núbulo cælo diurna illis horarum spatia ostendat. Qualia pleraque alia humano generi consulens natura dedit, & adhuc dare potest: si in cognoscenda maiestate eius diligentiores fuerimus. Neque enim æter nos beneficiorum suorum thesauros quotidianæ liberalitate ea exhaustit, nec mutato consilio [quin voluptas illi est benefacere] quod semel animalium generi & homini dedit, indignata aliquando aufert. A nobis illi hæc inuidia est, cogimusque nos malè audire eam, quæ nunquam satis laudabitur, quum grauius quicquam obijcere illi non audemus defatigatam, exhaustam, effectam & ingratam appellantes, non aliter quam

qui commensationibus ludique suis parum faciles patres, anaros, inuites, delirioque ingrati filij appellant. Beneficia præsertim homini natura est, propter quem fecisse omnia videri potest. Tam multa nobis in cunctis eius partibus inferunt, ideòque non contenti in Heliotropij flore diei spatia, & horas homini indicasse, radice, foliis, semineque medicinam etiam instruxit: Sciendumque illud Heliotropium, Heliotropion, & Helioyon plantæ florisque huius veluti congeneres appellationes à Sole omnes factas esse, significat: réque priores duas quod ad Solem se vertit: tertiam verò quod Solem aspicit. Scorpionum mox & Scorpj cauda à floribus, vel vt nos certius dici credimus, feminis inflexione, quæ Scorpionum caudæ vt Dioscorides ait speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scorpiononon autem quia Scorpiones enecet. Fuerunt præterea qui Verrucariam vocauerint eò quod tam multis Verrucarum generibus medetur.

Etsi multæ sint stirpes quæ Heliotropiæ & Helioscopiæ meritis dici possint, quod ad Solem semper conuertantur, & cum eo circumagantur, tamen hic particulatim de Diosc. Heliotropio agitur: Id autem Græcis *ἡλιότροιον* & *εὐκροπιδιον*, ita Latinis Heliotropium & verrucaria nominatur, Gaza Solaris, Recentioribus Herba cancri, quod aduersus Carcinomata præfens sit: Ital. *Girasole*, Hisp. *Tornasol*: Gallis *Tournesol*, & *l'herbe au Chacire*: Germanis *kyebiblumen*, & *Sonnenwvibel*: Belgis *Sonnev vende*, *kancker*: & *kyebcruyt*: Anglis *Scorpions taylor*.

Plantæ tandem Heliotropia vocatæ, hæ nobis notæ sunt.

Heliotropium maius flore albo, quod Heliotropium maius Diosc. esse dicimus.

Heliotropium minus quorundam siue supinum, Heliotropij maioris proculdubio genus.

Heliotropium tricoecum, Heliotropium minus Dioscoridis, cum quo existimamus idem esse Heliotrop. alterum Matth.

Heliotropium minus tertium Tabernamont, quod est Cynoglossa minor.

Præterea inter Heliotropia etiam recensentur: Echium Scorpionides minus. Ocimastrum verrucosum à Gesnero. Cichorium. Calendula siue Caltha, sed magno errore: Herba maxima, de qua lib. 25. Malua apud Græcos, teste Ruellio, & Guilandino. Lupinus eodem Ruellio teste. Lorus apud eosdem Græcos eodem teste vt & Guilandino. Ricinus, Monachis testib. Melissa, vt vult A. à Bodenhein. Elatine mas, teste Dodongo.

Heliotropij defectu sumitur semen Rapæ, Fuchio in autball. scriptore.

HELIOTROPIVM MAIUS flore albo.

MAjus Heliotropium duarum aut trium vnciarum est planta, alias dodrantalis & major, radice simplice lignosa: caulibus fungosâ medullâ plenus, fortis ex viridi incanus, tomentosus, multis alis concavus: foliis ad ramulorum exortum & per ipsos ramos disposita, Ocymifoliis paria ex rotundo oblonga, nervosa, cauli concoloria, hirsuta: flores ramosi, albi, parui, foliolis lanuginosis obstiti: cæterum racemus ille spicatus cacumen in se Scorpionis caudæ insit, contorquet: semina succedunt triangola, breuia, cinereo, quaternis iuncta, acuminibus coëuntibus globos-

Globosum capitulum efficiant.

Plantam à nobis hic iconē & descriptione propositam Heliotropium maius Dioscor. esse concludimus. Hæc aptem, inquit Matthiolus, apud veteres officinis Verrucaria appellatur, quod verrucas, myrmecias, & thymos afflicta valenter adimat. Quare mihi, ut Ruellio quoque doctissimo, plurimum errare videntur, qui censent Calendulam officinis dictam, quæ & neotericis Caltha existimatur, esse Heliotropium maius: nam omnes prorsus illius notæ huic reclamare deprehenduntur. Neque eorum opinioni illud quicquam addit, quod huius Calthæ semen quodammodo Scorpionum candidulas refert, quoniam Dioscor. id Heliotropij flos, non semen, Scorpionis caudæ effigiem representat. Porro

Ruellius Heliotropium hoc vocari ait herbam cancri, quod eius flores in caudæ cancri [qui nobis affatus esse putatur] similitudinem imitatur. Verum hæc nominis ratio à Ruellio assignata, mihi non plane satisfaciunt, quod Scorpionum & afflictorum caudæ forma inter se maxime differant. Unde potius credimus



rem, hoc Heliotropium herbæ cancri appellationem traxisse, quod efficacissimum sit adversus carcinomata, & vlcera gangrenosa. Quod autem huius Heliotropij mentionem fecerit Galenus, non inuenio in simplicium medicamentorum censu. Paulus tamen meminit, sed non plura de hoc radicitus, quam quæ Dioscoridi accepta referte potest.

Dicitur Heliotropium maius Ruell. Matth. Turn. Licuaz. Gesn. hort. [cui & Scorpioides album, & non alterum ut C. Bauhin. legit.] Dod. fol. lat. Castori. Camerac. hort. & apud Matthiolum, Cæsalp. [cui & Verrucaria vulgò] Tabern. Clus. & Lobel. Obs. pag. lxx. & Icon. Plant. p. 260. [vbi & herbæ cancri] In adu. pag. 101. Heliotropium maius. Solani foliis flore E. hij aduncis, caudato Scorpioidis. H. Lugd. p. 140. Heliotropium maius Matthioli. C. Bauh. phyt. Heliotropium primum siue maius Dioscoridis. apud Matthiolum Heliotropium vel erectum, vel repens.

Florat Heliotropium hoc Æstate & Autumno passim circa Monipellum, sicuti circa Dubium inter Audincours pagum Monbelgardensem & Portem de Roide copiose in agris, cum etiam quibudam in locis circa Basileam. In Alsatia Heliotropium maiore ita refertur sunt agri ut videantur eo consiti: Lugduni florat mense Septembris & Octobri: Patavij circa muros in vrbis: Genevæ à la petite Grange Iunio & Julio. Et licet hoc in alperis nati Dioscoridestantum prodident, tamen in Heretura, & in Gorizia, vbi frequentissimum visitur, passim ferè provenit; in campis, Tom. III.

secus vias, in oppidorum plateis, & circa ædificiorum areas, aridis item & sabulosis locis. Vbi que Lugdunensis & Narbonensis Galliarum cultis & incultis marginibus aridis obuium tradit Lobelius, nec non in Italia & Pedemonte, ut & Angliæ & Franciæ in hortis.

Verrucas & Myrmecias & thymos afflicta herba valenter adimit. Efficacissima est adversus carcinomata & vlcera gangrenosa, ad quæ magno admodum successu eo videntur chirurgi, qui plantam & eius vires competas habent. Heliotropio herba formicæ maxime necantur, obturatis eorum foraminibus. Si Scorpionis caernula [ut quidam memoriæ prodiderunt] Heliotropij surculo circumferibatur, nunquam is foras egredietur: imposita verò herba protinus illum emori aiunt. Folia ex rosaceo illita capitis dolorem mulcent. Epotum foliorum decoctum vna cum cumino renim calculos pellit & frangit, & interitum animi lia necat. Veluti autem Matthiolus totam plantam: ita Lobelius semen ad tumores strumosos, verrucas & vlcera phagedenica magni esse experimenti docet. Vires ex veteribus vide antè.

Vires & vsus

HELIOTROP. VM MINVS QVORVN- dam, siue lupinum.

Simplice & lignosa radice nititur, caules plures ramulos emittente, eoque palmares & p. d.ales, hirsutos, humiliteratos: per quos filia Heliotropij maioris, dimidio minora, incanapilosa, nervosa: florum alborum racemi caudam innotuunt, relictis capitulis oblongis, turbinatis, hirsutis, in quorum singulis vnicum semen plerumque.

Descriptio

Clus. not.

Hoc inquit Clusius, qui describit, proculdubio Heliotropij maioris genus est, licet nonnulli cerebrosius asserere malint Heliotropium minus esse: minus quidem est altero, sed aliud minus proximo capite dibimus, Græci *σκαρπιον* quod iamuli cum floribus Scorpionum caudæ modo inflectantur, & *σκαρπιον*, quod eius folia cum sole circum agantur, appellant. Plinius etiam Helioscopium & Verrucariam vocat: mihi Heliotropium supinum erit, hæcenus Clusius.

Il l. g. unguis huius plantæ, duas descriptiones & figuras habet. Primæ hunc titulum fecit pag. 1. Verrucaria alia minor: Alteri hunc pag. 140. Heliotropium humile sparsum Clusij.

H. Lugd. not.

An Matthiolo Heliotropium minus, quod se vidisse ac sepe h. g. se in Tridentino agro in palustribus quibusdam locis, idque compluribus ostendisse, refert, ut quod picturæ satis respondere ipsi videbatur? Sed si vidit Heliotropium quod pingit, Cur quæso non describit? Ego plane mihi persuadeo figuram factam à Matthiolo ad descriptionem Dioscoridis: fortè quod vidit, erat Echium Scorpioides aquaticum.

Matth. not.

Lobelius qui prædictum Matthioli lapsus etiam in Aduers. notat, non valde dissimile Maiore Heliotropio describit, & tamen malè pro minore recipit. Is præterea in Iconibus Plant. pag. 111. Heliotropium minus, non amplius repens facit.

C. Bauh. phyt. Heliotropium 2. siue repens: Heliotropium supinum Clusio. Item Heliotropium 4. siue minus alterum: Heliotropium minus

Zzz

Lob. in Adu. & Icon. Plant. Adhæc Heliotropium 5. siue alterum Matthioli. Hoc enim quoad figuram falsam Matthioli relinquo sub minore: quod verba attinet, referenda ea puto ad Echium Scorpioides Solis equum. Præterea Heliotropium Clusij quod secundum facit reperire non obseruauit, nec separo à Lobeliano, quod quarto loco recenset.

Locus &
Tempus.

Accepi semē missum à Casabona Sturgardiam cum inscriptione Heliotropij supini Candiz: seminaui hoc Montbelgardi in horto E. C. anno 1594. Heliotropium supinum Clusius ad quorundam agrorum margines, æsertim vbi Melopepones feri solent, Salmanticæ reperiebat: Florebat sub finem Iulij & Augusto, quo mense, & interdum Septembri, semen ejus ad maturitatem perducit solet. Lobelius in quibusdam Monspeliciæ siluæ paludosis scrobibus obseruauit.

Vires & v.
sus.

Cæterum, vt ejusdem cum maiore est temperamenti, ita iidem etiam viribus pollere verisimile est, inquit Clusius.

HELIOTROPIVM TRICOCCVM.

Descriptio




Heliotropio tricoeco radix subest lignosa, simplex, paucis apophysis fibrata, caulis cubitalis, rectus, in cauo tomento obtus, sicuti & stipes, Heliotropij maioris similia, maiora, sinuata, nervosa, flores racematim in priuatis pedicellis coherere, exigui, luteoli, nullum post se semen relin-

quentes, Siliqua enim nullo præcedente flore nascuntur, tricoeca, cinerei coloris, aspera superficie & verrucosa, quibus dehiscens semina exilit cinereum. Figura nostra ex Fuchsianis non placet, quare bonam ex Clusio parari curauimus, qui sic describit.

Descriptio

Minus Heliotropium vnico assurgit caule pedali, ramoso, illius folia superiorum folijs dissimilia, nonnihil ad Xanthij, plurimum verò ad Solani somniferi folia accedunt, mollia & candidantia: Flor pusillus, racematim congestus, luteolus, inutilis, quippe qui sine semine perit, veluti hos Ricini & quarundam aliarum stirpium, quæ sua semina è floribus non producant: ex aliarum tamen cauis dependent ex longis petiolis, sub folijs quasi occultata, sine flore enata siliqua triangulari, quales Tithymalorum, sed asperiusculæ, scabræ, nigricantes, in quibus semen cineracei

coloris, quod dehiscens siliquulis exilit, quemadmodum Tithymalorum & Ricini semina: Hæc capita siue siliquæ panais affricatæ, florido viridi colore eos inficiunt, qui temporis momento in cæruleum, eumque elegantem, mutatur: radix inutilis, nec viuax, vt quæ singulis annis, vt priores, pereat, ita vt nouæ plantæ semine deciduo renascantur.



Ἡλιοτρόπιον μικρὸν Græcis dicitur, Heliotropium minus Latinis, vt Gesn. hort. Camer. in Hist. Matthiol. germ. & Epit. itemque de hort. vbi etiam Herba Clytiæ vocatur, quod in hanc murata fingatur à Poëtis, vnde hi versus.

Herba velut Clytiæ semper petit obuia Soli.

Sic pia mens Christum quod prece spectet habet. Plinio qui ejus historiam cum Scorpiode Dioscoridis confundit, Heliotropium tricoecum: Clusio Heliotropium minus tricoecum: Lobel. in Adu. pag. 101. Heliotropium vulgare. Tornesij Gallorum, siue Plinij tricoecum, quod Dioscoridem præterisse, aut cum minore in vnam Historiam contraxisse, scribit, quamvis immeritè, siquidem ipsemet in obt. p. 133. itemque Icon. Pl. p. 161. Heliotropium paruum Dioscoridis vocet Heliotropium minus Clusij & tricoecon Plinij Aduersariorum, H. Lugd. pag. 1351. Heliotropium tricoecum Clusij. C. Bauh. phyt. Heliotropium 3. siue minus tricoecum.

Germani klein krebsblum vocant: Itali Heliotropio minore, & si Clusio credimus, Castellani Tornasol: Narbonenses Tornesol, quæ quidem voces à Græco nomine deductæ videntur: Monspelienfes apud quos copiose prouenit, Verrucariam. Huius herbæ Baccas, vt Camer. scriptum reliquit, in Gallia Narbonensi infectores lanarum vocant la Morella.

Monspelij femine prægnans vidi mense Augusto: Geneuæ in horto meo semen proferebat, vt & Lugduni mense Junio. Clusius inquit Salmaticensi agro frequentissimam. Lobelius in Gallia Narbonensi. Magno quæstu colligunt rustici Lunellæ, Narbonæ, aliisque vicinis locis matura semina Septembri, quæ distrahunt, infectoribus, & Chirurgis nonnullis, huius plantæ vires ad medica præidia supra quàm dici potest effertentibus.

FINIS LIBRI TRIGESIMI TERTII.

HISTORIÆ



HISTORIÆ VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXIV.

PLANTÆ MALIGNÆ ET VENENATÆ: VT SOLANA, ELLEBORI
Aconita, Tithymali, & affines.

Quæ stirpium diuinitas omnigenas ostendere professi, tacite aut luscis oculis pretereunt eas, quarum non gustatus modus, sed & odoratus, & ipse quoque intempestiuus contactus nocere possunt: tam à scopo suo nobis abesse videntur, ut ipsam etiam suæ professionis dignitatem, estimationemque in periculum trahant. Qui ergo dixerimus herbas & florum imagines, ac pleræque huius natura non vulgata tantum, sed & rara ac difficilia, iidem tacebimus quid in ipsis hortis nocere possit homini, ceterisque malignarum herbarum naturas, inter ceteras nascentium: cum presertim nisi noscenti eas, ipsa possessio penam sit, aut esse possit? Minime verò. Quin omnem infumemus operam licet fistidij, sed & noxa periculum urgeat: quando ita decretum est, minorem gratia aut voluptatis nostræ, quam utilitatem vitæ respectum habere. Quapropter & minus tutas homini, & perniciosissimas quasque herbarum indagabimus. Quamquam nec ista quidem medicinis caveant, sacra illa parente rerum omnium nusquam non remedia ponente homini, ut medicina ferens etiam venena ipsa. Incipimus autem à Solanis, earum promiscuo visu immensum statim periculum minitante.

SOLANVM, STRYCHNOS VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT I.

SOLANVM, *σπύχρον* Græci vocant, quod Vitem vel actuum, aut tale quid signat. Theophrastus lib. 19. hist. cap. 12. 14. & 21. duo Solanorum [Vesciariarum Gaza] genera tradit: Somniferum scilicet & furiosum: at Dioscorides lib. 4. genera quatuor recenset: 1. est Solanum hortense, *σπύχρον κηκεῖος*: Alterum, quod peculiari nomine Solanum Halicacabum, *σπύχρον ἡλικακῆον*, vocant. 3. Solanum somniferum, *σπύχρον ὀπιωπτικόν*: 4. & vltimum, Solanum manicum seu fursale, *σπύχρον ὑαννικόν*.

Solanum autem Græcos Strychnon vocare testatur lib. 12. cap. 11. Plinius, qui antè lib. 21. c. 31. Strychni etiam quatuor genera enumerat.

Apuleius omnia Solani genera vno capite complexus nomina eorum inter se sedè permiscuit.

Gesnerus de aub. itemque de Lupo pro Cauli, vt habetur apud Syllaum, legit Cuculum, exponitque Solanum.

Cæterum, Solani vox hodie de pluribus stirpibus prædicatur. Est enim Solanum vulgare, quod Dioscoridis hortense statuimus, fructu nigro & subviridi. Solanum vesciariarum vulgare, Halicacabum Dioscoridis. Solanum siue Halicaca-

bum Indicum. Solanum verticillatum, quod nobis non videretur multum differre à Solano somnifero Diosc. Solanum manicum multis sine *Bella donna*. Solanum tetraphyllum quod Gesnerus Herbam Paris esse contendit. Solanum arborecens, vel fruticosum, siue Strychnodendros, vulgò Itatorum Amomum Plinij putatum. Solanum Hierichunteum Cast. Durantis. Solanum manicum ex Guinea, de quo egimus H. n. l. 3. cap. de Daruta. Solanum scandens siue *κακισκερυν*, nobis Amara dulcis. Solanum tuberosum esculentum, Pappas appellatum. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli, quod Mala aurea inferibimus. Solanum pomiferum fructu striato duro rotundo C. Bauh. Solanum peregrinum fructu rotundo, Hyosciamus peregrinus Dalechampij, H. Lugd. C. Bauh. Nobis Solani species ex Apennino quorundam. Solanum pomiferum fructu oblongo, albo, purpureo, & luteo, Mala insana nuncupatum. Solanum pomiferum fructu incuruo, flauo, cinereo, & purpureo, de Melantzana. Solanum pomiferum fructu spinoso, longo, rotundo, atro, subnigro: Melantzana nigra. Solanum spinosum fructu rotundo, Pomum Hierochonticum Imperari C. Bauh. Solanum pomiferum folio rotundo tenui, Cachos Indorum Monardis, de quo

lani dicens: proprietate oculi discutere humorem cancri. Seuerinus Gobelus in suo de Succino commentario tradit ex putredine huius herbae vermes virides maculas luteis intermixtis crescere, in quorum capite cornu apparet interdum femine digiti longitudine.

SOLANVM HALICACABVM VVLGARE.



Respicitur *Kadsiscus* fertilitate, licet ei parua, affatim lepro-pagis, colicis, tenuibus, subrubentibus & subhirsutis foliis, Solani hortensis, maiora, leuiter hirsuta, saepe bina, sed in didem orta, ex quorum alis penduli emicant flores exalidi,

in quinque lacinias diuisi, apicibus concoloribus, pediculo vincti: quibus succedunt utriculi hirsidi, per maturitatem rubentes, in quorum singulis fructus Cerasi magni udine, colore, & forma, cum pulpa semina continens Strychnodendry, orbiculata, compressa: sapor fructui acidus cum paucis amarore. Mitthiolo. baccæ vino-fusco refertæ, ipsæque rubentes. Rusci baccis persimiles, sapore austero simul & amaro.

Dioscoridi est alterum Solanum, quod peculiari nomine Halicacabum vocant, alij Physalida, i.e. Vesicariam, foliis autem dicto similibus, velum latoribus: huius caules posteaquam adoleuerint, proni terram spectant: est autem fructus intra folliculos orbiculares vesicæ similes saluus, rotundus ac levis ceterum vix acinus.

Plinio Strychni dicitur alterum genus, cui acini coccinei, granulosi in folliculis: Halicacabum vocant, alij Gallion: nostri autem Vesicariam, quoniam Vesicæ & calculis prodest.

C. Bauh. phyt. & pin. Solanum bacciferum 2. siue vesicarium: Solanum halicacabum Trago, Matthioli. Lat. Lobel. Aduerf. Obs. pag. 114. Ic. Plant. pag. 162. H. Lugd. Solanum vesicarium Gesn. hort. & Dodon. Halicacabum Anguill. & Cast. Halicacabum vulgare Fuchs. Turn. & Eyst. Halicacabum vesicarium Camer. Halicacabum, siue Vesicaria, Cordo h. & Gesn. hort. Vesicaria Cordo in Dioscor. Gesn. hort. & Cæsalp. Vesicaria vulgaris Dod. gall. prima Cast. Alk. kengi, Lonic.

Græcis *εὐχρύς ἀλικάβας* & *φύσκα* Dioscor. Germ. *Inde kersen*, quasi dicens Cerasi Iudaica, *Indenbeutlin*, *Indendacklin*, *Schlutten*, *Boberellen*, *Teuffelskirchen*, *Pfaffen-schlott*, *Pfaffenhölein*, *Rottnacht schauten*, hoc est, Solarum rubrum, *Gross: oder Rotsteinbrech*, vt Brunfels. Saxifraga rubra. Belg. *Kriechen ouer zee*. Gall. *Ba guenaudes*. Ital. *Alchakengi*, *Halicacabo*. Hisp. *Desiga de perro*. Angl. *winier cherye*. Hung. *Pap*

manya, hoc est, Testiculus sacerdotis.

Nascitur in parietinis, locis vmbrosis, aliquantulum humentibus quandoque prope vliginosas sepes, & circa agrorum margines. Sub Autumno fructus maturefcunt: flores autem apparent scilicet Maio, Iunio & Iulio.

Vim, auctore Dioscoride, vsumque obtinet horrentis Solani, nisi quod in cibis minimè recipitur. Valet autem fructus epotus ad expurgandum morbum regium, quæ præditus est vitiæ ciendæ facultate. Cæterum, ex vtriusque Solani herba succus elicitur, qui siccatus in vmbra reconditur, & ad eadem illa pollet. Arnoldus de Villa noua tria Alkekengi grana cum bono vino albo terit, potiusque dat ad euacuandam vrinam in hydropicis. Baccarum vis [addit Matthioli.] habetur non solum præstantissima ad renum vitiæ, & ciendam vrinam, sed ad eius quoque acredinem retundendam: bibitur namque earum succus ad ea omnia vtiliter cum Papaue-
ris albi cremore, aut seminum Melopeponum, aut Cucurbitæ, Cucumæ siue. Alpidibus autem aduersissimum est Halicacabum, vt admotâ propius eius radice, sapore inepugnabili necentur. Refrigerat autem & adstringit ordinem secundo, præceptore Galeno.

Locus & Tempus.

Vires & vici

Morb. vegin.

Vrinam emul-
uat.
Hydrops

SOLANVM SIVE HALICACABVM Indicum.



Causis Descriptio

Chuiç Solano cubitalis, crassiusculus, in crebros ramos diductus: per quos folia Solani vulgaris, laciniata, atro-virentia, venulis ex medio nervo obliquis in lacinias expositis, pediculo duum, triumve vnciarum: flores è ramorum diuaticatione, solitorum-

que sinu prodeunt, lutei, Solani halicacabi similes, ex vnicò folio in quinque angulos exacuto: vesicæ Halicacabo pares sequuntur, virentes, quas acinus replet magnus, semine Halicacabi repletus, in siliis.

C. Bauhin. phyt. & pin. Solanum bacciferum 3. siue Vesicarium Indicum: Camer. hort. & Ic. itémque Eyst. Halicacabum siue Solanum Indicum.

An de hoc Olinus in Musæum Calceolarij? Et planta vocata Concordia aliunde deuecta, neque ira nobis familiaris & domestica, quæ flos nobis dicitur, Solanum vesicarium. Hic flos veluti tenebras hortelcens, nocte clauditur, die verò Sole aduentante, diducitur, & folia cum floribus panduntur.

Apud Germanos non nisi in hortis quibusdam colitur, vt Möitelgardii, Basileæ, & Lutetia.

Solanum somniferum Veteribus.

Solanorum (Vesicarium reddit Gaza) gene-

Locus

Zzz 3

HISTORIÆ PLANTARVM.

610

ra duo videre licet, inquit Theophrastus Plant. l. 9. cap. 12. Alterum somnificum radice rubrâ, sanguinis modo, sed candida cum siccescit, fructu rubriore, quam Coccus (grano iligneo, Gaza) folio Tithymali [Lactaria, Gaza] simili, aut Malo dulci, sed piloso: huius corticem radicis tudentes admodum & in vino meraculo madefacientes dant, atque ita dormire faciunt: nascitur rupibus & faucibus atque sepulchris.

Locus

Disic. var. folio.

Solanum somniferum aliquos Halicacabum vocare testatur Dioscorides, qui sequentia de eo scribit. Frutex est numerosis præditus ramis, densis, caudicosis, fractu contumacib. pinguium foliorum, Coroneque mali similium plenis flore rubro, prægrandi [ἐν πύρρῳ, vet. caret.] fructu in folliculis [ἐν πυρρῷ, vet. drachmæ mæris] Croci colorem æmulante: Radice denique grandi, cortice subrubro vestita. Nascitur in petrosis locis (ἐν πετρώδεις τόποις. Ald. ἐν πύρρῳ.) non procul à mari (ἐν πύρρῳ θαλάσσης, vet. caret.) Radicis cortex drachmæ pondere in vino potius, somniferam vim habet, quam opium mitior: et fructus autem potenter vinum cit: atque adeo corymbi duodecim hydropicis exhibentur: quod si plures numero propinentur, mentem è sua sede & ita tu dimouent. Sed remedium est aqua multa copiosa potui data. Pastillis etiam, ac doloris leuamentum præbentibus medicamentis succus eius admiscetur. Idem decoctus in vino, si ore contineatur, dolorib. denarium succurrit. Cæterum, radicis succus cum melle inunctus, oculorum hebetudines tollit.

Plinius

Morion. Moly.

De hoc Solano superiori historiz hæc addit Plinius. Quin & alterum Solanum, quod Halicacabum vocant, somniferum est, atq; etiam Opio velocius ad mortem, ab aliis Morion, ab aliis Moly appellatum. Laudatum verò à Diole & Euenore &c. Et paulo post: Halicacabi radicem bibunt, qui sunt vaticinandi callentes, quod furere ad confirmandas superstitiones aspiçi se volunt. Remedio est aqua copiosa multa calida potui data.

Solanum somniferum Galeno.

Galenus Solani somniferi radicis corticem cum vino potum drachmæ pondere, somniferum esse ait: & ad alia Papaueris succo similem, sed in tantum debiliorem, ut tertij ordinis sit frægeficientium, illo in quarto locato. Semen eius vim cendi vinam habere, sed insaniam inducere, si plures quam duodecim corymbi bibantur.

SOLANVM VERTICILLATVM.

Descriptio



Solanum verticillatum cubitalem & maiorem altitudinem assequitur, caule recto, tereti, hirsuto, per quem alternata folia, Priapeæ folus proxima, minoræ ut mihi videtur, ex rotundo leuiter in acumen desinentia, hirsuta, pediculis vincta breuioribus hærentia: è quorum sinu flores caulem proximè verti-

cillatim oriuntur, Solani vulgaris pares, ex luteo pallefcentes, ex quinque foliis compositi, apicibus aliquot in medio: succedunt vascula maiuscula semen continentia, vtriusculis hirsutis fimbriatis obuoluta.

Marth. in prior. comm. depingit nomine Solani somniferi diceus tertium Solanum esse, sibi que Pisis à Ghino missum, omnibus planè notis legitimo respondens. Id autem non describit. In post. comm. & Hist. germ. ceu etiam in Epitome (vbi verba Dioscoridis ponit) tradit florem habere rubrum, qualem etiam suo Solano somnifico, semel tantum, ut ait, ad ripas Belgici maris viso, adscribit Amatus. Dodonæus tamen flosculos subrubentes, suo Solano somnifero attribuit. Ego autem ex luteo pallidos tantum obferuauit.

Solanum hoc utpote somniferum, Theoph. Dioscoridis, Plinij, & Galeni, negat in Adu. Lobelius, ut quod verticillatis florib. aliisq; quam plurimis indicis, quideis potius quam Solanum exprimat, nec vinibus alioquin respondeat. Sed debilem suam, nimisque insolentem opinionem argumentis haud comprobant. Litem discernere ij tandem poterunt, qui aliorum hac de sententiam cum antiquorum decretis conferent, & sine passione dijudicabunt.

Et rectè, meo quidem iudicio, appellarunt Matthiol. Guill. Gesn. hort. Lac. Clus. hisp. & bist. Dodon. Lob. in obs. p. 135. in Icon. Plant. p. 263. Cast. H. Lugd. Camer. & Cæsalpinus, Solanum somniferum. C. Bauh. pin. Solanum baciferum 7. siue somniferum verticillatum: Et phyt. Solanum 10. acinis in folliculis hirsutis per maturitatem, nunc rubris, nunc ex rubro croceis.

Dioscoridi ἐν πύρρῳ ἐν πύρρῳ dicitur; Theophrasto verò ἐν πύρρῳ ἐν πύρρῳ; ab aliis ἡδύμαν, & ἀλκμαίων; Plinio Halicacabon & Morion: ab aliis Latinis Solanum somniferum: à plerisque etiam Solanum manicum, Apollinaris minor, Vlicana herba, Obiagio: Mal. censibus Oruale, Clus. & Dodonæo: Lob. verò Hisp. yerva mora que secearea locura.

Spontanèam vidit Clusius in Hispania in arce inferiore vrbis Malaga vulgò dictæ: apud Belgas verò & in Germ. hyemem non ferre, sed singulis annis ferendam scribit: vidi autem Basileæ in hort. o. D. Felici. Plateri florentem Octobri; Montebaldi Septembri in hort. Ill. E. C.

An Solanum somniferum Alpini, Cuius foliis contusis emplastri modo ad calidas inflammationes vtuntur, atque illitis ex ipsorum succo fronte, temporibus, ac aliis eo poris partib. in quibus pulsus sentiuntur: vel iisdem contusis, emplastri modo apposis, ad somnum familiarissimè vtuntur, non minusque ad exustiones?

DE SOLANO FVRIOSO ex Veteribus.

Solanorum, inquit Theophrast. (Vesicariarum, Def. Gaza vertit. alterum genus, furiosum sc. [ἐν πύρρῳ] quod alij Thyroron [ἡδύμαν] Gazæ legit [ἡδύμαν, Briorem] vocant, alij Periton (Perillon, Gaza) candidam, longamque & concavam cubiti ferè longitudine radicem habet. Datur bibenda drachmæ pondere, si quis per jocum efficere voluerit, ut pulcherrimus videatur, qui biberit. Si verò furere adhuc magis hominem, visâque aliqua animo eius obseruari, duarum drachmarum: & ne furor desinat, tritum: & vt

& ut aiunt, Centaurium admiscere: Et postremo si hominem perimere, quatuor. Folio Erucæ est simile, sed maiore. Caulem altitudine quantum protensa utrinque brachia ab altero summo medio digito ad alterum traiecit per pectus longitudine patent, ut vix longitudo: caput Gethyo simile, crassius, Plantani fructui par.

Manicum siue furiosum Solanum, ut Dioscorides ait, Erucæ [δελουπ] similia folia habet, attamen maiora, & ad Acanthi, quem Paderota vocant, accedentia: caules producit à radice proceros [παραφύει] decem aut duodecim, Orgyz [ὄργυζ] autem mensura est Helychio, quanta est amborum manuum extensio] altitudinem habentes: caput verò in fastigio emicans, uti Oliva, sed hirsutius, instar Plant. ni pilulæ: grandius tamen ac latius: flos niger: post hunc fructus racemosus, rotundus, niger, acinos decem aut duodecim, veluti Hederæ habens corymbos: sed vix modo molles: radix tubest candida, crassa, concava, cubitalis. Nascitur in montanis & vento expositis, ac πλαταγώσι, h. e. locis latis, magnisque, mari vicinis.


De hoc Solano Plinius sequentia prodit. Tertio folia sunt Ocyimi, minime diligenter demonstranda, remedia non venena tractantibus: qui sepe insaniam facit paruo quoque succo. Quamquam & Græci autores in iocum vertit. Drachmæ enim pondere lufum gigni dixerunt, species vanas, imaginisque conspicuas obuiari demonstrantes. Duplicationem hunc modum, legitimum insaniam facere. Quicquid verò addiciatur ponderi representare mortem. Hoc est venenum, quod innocentissimi autores Dorycnion appellauit, ab eo quòd cuspidis in præliis tingeretur, illo passim nascente. Qui parcius spectauerant, Manicon cognominauit. Qui nequiter occultabant, Erythron, aut Neurida: ut nonnulli Perisphon: ne cauendi quidem causa curiosius dicendum. Ita Plinij verus codex, in quo nulla pudoris vox, aut vestigium saltem eius habetur. Patet autem ex Theophrasto in Plinij vulgaris exemplaribus falsò lulum pudoris legi.

Galeno Solanum furiosum inutile est ad internas medelas. Si enim quatuor drachmæ fuerint acceptæ, mortem inducunt: si puriores insaniam: Vna innoxia est, sed neque ipsa vtile quid habet. Extrà corporei impositione, viscera maligna proferendo que depascientia curat. Ad hoc optimus est radicis cortex, siccans secundo ordine iam completo, & tertij initio. Frigefaciens initio secundi.

Σπύχρον appellatur [μακρόν] à nonnullis [αίσιον], [αίσιον], item & [μακρόν], ab aliis [δύον], aut potius ut Theophrastus habet, [δύον], vel [δύον]. Dicitur & [δύον], [δύον], [δύον], [δύον]. Dioscor. l. 6. de lerbilib. med. Dorycnion etiam à nonnullis Solanum manicum appellari ait.

SOLANVM MANICVM MVLTI, siue Bella donna.

OTum puluillum opacat pernicioso Solani Bellæ donnæ dictæ luxuries: namque ex radice crassa trib. cubitis altiores caules eligit, pollicis crassiores, hirsutos, qui in tuber crassescunt, in multos ramos indidem ferè exortos brachiantur: filia Solani hortensis formâ, non sinuata, & plûsqvam duplò, triplòque maiora, utrinque pilosa, superne atro-virentia, inferne ferè her-



bida: flores striati ex foliorum alis concavi, Campanularum instar, in quinque lacinias diuisi, colore intus quidem lurido purpureo, fundo luteo versicolore, extrà verò tantillum ex herbido rubescentes, subhirsuti: oculi autem fibræ quinas ad exortum hirsutæ, qualis & fundus est, apicibus albidis: stylus verò procerior extra floris oras promittitur capitulo viridante: decedentibus floribus insident hirsuti quinque-partito calyci baccæ nitidæ Herbæ Parisidis. Et hæc descriptio primæ debetur iconi, de qua hæc apud autores scripta inuenimus.

Apud Dod.

Solanum lethale Dod.
lat. vulgò Solanum lethale, siue Solatrum lethale appellatur: Italis ac Venetis Bella donna: German. Dollenkraut, Dollkraut, Secukraut, & Schlafbeeren: Belgis Groote Nascaye & Dulle besen. Sunt qui putent Fabam inuersam dici. Ad Mandragoram Theophrasti (qui distet à Dioscoridis

Mandragora plurimum accedit: si non ipsissimum est. Theophrastus hunc caulem habere ait, & fructum ferè nigrum [παρὰ δὲ τὴν αἰσθητικὴν τὴν χυμώδη, i. e. acino vix similem, & succo vinosum. Respondent quoque facultates.

Camerarius, cui Solanum maius dicitur, Bellam donnam Italici vocari ait, quod succo illius mulieres faciem decorent. Clusius verò qui Solanum lethale & Bellam donnam inscribit, non ineptè Theophrasti Mandragoras esse quosdam censuisse suspicatur. Id autem duorum generum esse testatur. Vnum amplioribus foliis, brevioris pediculo pendentibus, flore maiore. Alterum minoribus foliis & magis arsis, longiorisque pediculo fultis, minore flore.

Dicitur C. Bauh. phyt. Solanum 4. siue baccâ nigra Cerasi simili, Solanum Dioscoridis, fructu vix specie, & Solanum fructu nigro Theophrasti, Cacabulum Plinij, quod alij Scrumum appellant, græcè Strychnon. *Eidem pin.* Solanum bacciferum 4. siue *μελανοκίρατον*. Solanum hortense nigrum Tragi, Mandragora Theophrasti Dodon. gall. Ang. Guiland. Morion Fuchf. Icon. Lon. tertia species Cordi in Diosc. Solanum maius Matth. Cast. Casalp. & Camerarij. Solanum somniferum Fuchf. Turn. Lob. obs. p. 134. Icon. Plant. p. 263. H. Lugd. p. 1721. Solanum lethale Dodon. & Clus. hist. Solanum sylvaticum Gesn. hort. Sylvestre siue lethale Thalij, & Bella donna Clus. pann.

Icon. 2.

Solan. hort.
Dioscorid.

Ceruo des-
cleratum.

Mandrag.
Theophrast.

Solan. som-
nif. Fuchf.

Tragus, Dodon. gall. & Fuchsius pingunt effigiem secundo loco positam quam Solani somnifici alterius Matthioli titulo describit H. Lugd. p. 1720. Hoc Solanum, inquit Tragus, apud Dioscoridem *ερυχινος κινπαις*, i. e. Solanum hortense Solanum latium, vel nigrum vocatur. Alij Scabulum, alij Allelo, Alstrimurum, & Cacabulum appellant. Sunt qui radicem huius Solani pro Mandragora vendant, est enim Narcotica radix.

Idem lib. 3. cap. 2. 4. Solanum hortense Ceruum magno desiderio inquirere didici. Hoc mirari sibi solere hanc stirpem eodem plerumque situm cum Sambuco silvestri [racemosa,] occupare. Hacce ceruus vitæ delectatur, folia eius non baccas decerpens, vnde intelligi potest, fructus huiusce frigidioris esse qualitatis, ac feris, ne dum aliis iumentis & hominibus, minus salubres, id quod natura bestias docet. Præterea, quod non minus admiratione dignum censeo, observavi ceruum solum foliis huius plantæ vesci, non autem ceruam, nisi ea præguans fuerit, & ceruum in vitro gestauerit, tum enim & ipsa huius stirpis desiderio teneret, & illius folia degustare solet, aliàs nunquam. Solanum hoc hortense, ut obiter dicam, Mandragora mihi videtur, quam Theoph. lib. 6. cap. 2. describit. Id autem frigide naturæ esse iudico, ita quidem ut pro Sambuco silvestri [rosæ] si illa desit, usurpari queat. Verum enimvero quia Solanum hoc suis confere aduersus arduas febres docui, quemadmodum & rei veritas habet, nonnulli in malam interpretantur partem, quod iumentorum & pecorum, & quo pacto morbis illorum subuenire possimus, mentionem faciam. At suis sua quoque remedia à Deo proposita sunt. Præterea video Caronem, Varronem, & Columellam remedia quibus pecorum morbis mederi conueniat, quàm diligentissimè descripsisse. Dissimulandum verò non est, baccas Solani hortensis somnum inducere, quod ipse tribus aut quatuor ex eo genere degustatis acinis expertus sum. Admonendi sunt ergo omnes ut à nimio eorum usu abstineant.

Fuchsius Solanum somniferum intulit, ab effectu, ut ait. Esse tamen qui Solatrum dormitorium, vel marinum dicant, quod rupibus non

longè mari inueniatur: gall. *Morelle maritime*. Aliqui Solanum hortense non sine maximo errore esse putant, plurimumque suis conferre, ac eadem à lethalibus morbis præseruareasserunt. Ego tamen non laboro magnopere quomodo suis [hic suggillatur Tragus] succurrit, sed quid in homine possit magis confidero, quum constet pleraque aliis animantibus esse cibum, quæ homini venenum sunt. Experientiâ verò cognitum est, geminos pueros statim ex elu acinorum huius generis Solani mortuos esse. Quod sane exemplum me mouet, ut somniferum esse credam, potissimum cum in vniuersum ferè illi descriptio quadret, vno hoc dempto, quod semen non habet in filiquis croceum. Sunt autem notæ quedam in hortensis etiam delineatione, quæ illi non conueniunt. Neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborescens: neque etiam florem candidum, sed spadiceum obtinet.

A Fuchsio dissentit Matthiolus, nec eam plantam quam Herbariorum vulgus Solatrum maius nominat, Veneti verò vulgò *Herba bella donna*, Solanum somnificum Dioscoridis esse existimat. Siquidem id facie distet, & fructum non proferat in folliculis croceum, tametsi eius baccæ largius sumptæ interficiant, (facto in expugnabili somno, ut quandoque acciderit pueris, qui discriminis ignari eas vix vice deuorant) & viribus iidem, quibus Solanum somniferum, polleant. Et hinc factum est præterea, ut eandem vlla Mandragoræ specie comprehendere posse negarit, sed Solani quintam speciem esse antiquis incognitam putarit.

Cæterum, cum Matthiolus, Solanum maius, suæ gentis hominibus Bella donna appellatum, *Matth.* Strychni generibus annumerat, atque antiquis scriptoribus, silentio omisissimum decernit, Theophrastum sibi nunquam lectum, clarè exponit. Ille si Mandragoram eius auctoris, disseire à Bella donna ostenderit concederet Guilandinus sanè lectum ipsi Theophrastum, sed minime intellectum. Porro autem in Solani somniferi agnitione, vel ipsum, vel certè Dioscoridem falli necesse ait. Etenim quod ille expressa icone proponat plantam, & floribus, & radicibus candidis parvisque constantem; contra quod Dioscoridi describatur, flores habeat magnos, rubrosque, radice item prægrandi, rursaque viuat. In Solano denique matrico Matthiolum sum ignorantiæ accusare testatur, quod quia ei notum non sit, protinus ab omnibus in Italia ignorari falsò definat. *Guilandino subscribet Apollo.*

Porro, Solanum manicum, quod secundo loco pictum proponimus, C. Bauh. in phyt. non agnouit. Collocauit autem id in pin. loco quinto, vocans Solanum somniferum bacciferum, Solanum somniferum alterum Matth. Gesn. hort. H. Lugd. pag. 1720. & Camerarij, Solani lethalis aliud genus Dodonæi, Solanum somniferum Lonic. & Solanum de Hietico Castoris. Solanum autem eius nonum in phytopinace, siue somniferum alterum Vvieri Camerarij hort. Diemarj & Vvestphalis contra morbum *die Varen*, magni existimatum, à *Bella donna* Italorum non separo.

Buchananus lib. 7. suæ hist. Scotticæ exponit, quo pacto huius Solani succo vina & ceruissiam Scoti infecerint, vnde Danos hostes suos ita demerunt, & in profundum somnum induxerunt, ut eorum Ducem Senonem cum toto exercitu deleuerint.

Circa silvas, iuxta parietes, sepimentaque agrotum, aliisque parum cultis ac desertis reperiri locis: umbrosa amare: Augusto aridare maturas baccas: flores & ante, & eodem reperiri tempore auctor est Dod. Obseruauit Monspelij & Tiguri in silua, florentem mense Maio: itemque Montbelgardi in umbrosis circa Becham ad Dubim: spontanea quoque inter Geneuam & Lugdunum. Quin & in hortis meis passim alui. Hæc ubi in siluis depasta reperitur, indicio esse solet venatoribus ceruus adesse.

HERBA PARIS.



Herba Paris dicta radicem habet tenuem, geniculatam, repentem: caulem mediocriter crassum, teretem, palmos duos circiter altum, ubentibus maculis, ut Serpentaria maior variatum: folia vno aut duobus cirs summam caulē digitis quaternā, rarius quina (tenere, ante quam hactam producat, test-

na sunt) ex angusto principio lata, in acumen desinentia, rugosa & nervosa, infernē splendentia, superne non item: flos in hastula singularis, ex quatuor latiusculis acuminatis viridantibus foliis: inter quorum vno quodque, foliolum tenuissimum, acutissimumque eiusdem coloris intercedit: filamenta pro foliorum numero octo vna, longa, acuta, viridia, additamentis coccis circa medium acuta, infra parte atro purpurea: in medio sessilis baccula, futuri fructus rudimentum, quadrangula, atro-purpurea, ex cuius umbilico quaternā filamenta, eiusdem cum ea coloris emicant. Matthiol. in medio purpureus, vno usque globulus, acinæ Voz similis, in quo semen conclusum album, minutum, copiosumque, Haliacabi modo.

Cordo in Diosc. dicitur Aconitum pardalianches, quod ait Theophrastum alibi Telyphonon, alibi *μυόγονον*, alibi etiam Scorpionem vocare. Idem in Hist. describit nomine Aconiti seu Pardalianches monococci. Annotat tamen apud eum Gesnerus Cordum falli, & Solani, non Aconiti, generibus adnumerari debere, Solani quippe syluaticum quoddam esse. Quæ occasio cur in epist. ad Platerum [ubi laudat Antidotum Saxonicum, Herbam Paris recipiētem, Tigurenſibus *Krietzkrut* & *Platerkrut* vocatam, aduersus venena & pestem] Fuchſium ineptè Aconitum facere scribat: cum reuera Solani cognata sit herba. Cur autem Fuchſius Solanum syluaticum tetraphyllum inter Aconita recenseat, nullam aliam rationem reddit, quam quod Dioscorides non solum calidi, sed & frigidi Aconiti, quod Scorpis torporem inferat, mentionē faciat. Fuchſij opinionem sequutus est Cordus: hinc senten-

Tom. III.

tiz fauet & Hugo Solerius. Sed occurrerunt insuper, quæ Fuchſium adduxerunt, ut existimaret Herbam Paris, Dioscorideæ Pardalianches speciem esse. Et inter alia radix, quam refert talem esse, qualem in Pardalianche exigit Plinius. Idem etiam in epist. ad Aretium negat constanter contra Fuchſium esse Aconitum verum.

Sed & Matthiolus Fuchſium aberrare testatur, *Fuchſ. error*, utpote qui Herbam Paris, primi generis Aconitum, h. e. Pardalianches esse censet. Semini siquidem nulla deleteria vis inſit. An autem Herba Paris folia habeat Sanguineæ virgæ similis, ut affirmau. Matthiolus, iudicent qui utramque plantam norunt, dicantque an ex icone Matthioli, id quisquam possit colligere.

Cæ. etiam, Cordi & Fuchſij opinionem refutant, reiciūque etiam Tagus, Dodonæus, Hist. Lugd. & Lobelius. Sequuntur, verò recipiuntque, malè tamen, Lonic. Basil. Faber. [qui *Augenkraut*, & *vuolſſvunwiz* vocari testatur] & Cornarius. Turnerus an Aconitum Herba Paris sit dubitat.

Dicitur autem *Aster non atticus* Trago: *Herba Paris* Matthiol. Aug. Dod. Cast. Cæsalpio. Hist. Lugdon pag. 133, Thal. Ger. & Eyst. *Paris* Herba Camer. *Aconitum saluiferum* Tabern. *Solanum tetraphyllum*, Gelsn. hort. Lobel. in Aduerſ. Obs. pag. 137. & Ic. Plant. pag. 267, *Solanum* nom. 10. [7. in phyt.] sive quadrifolium bacciferum C. Bauhin. pin. folijs communiter quatuor, aliquando tribus quinque, & sex.

Germanis inter alias appellationes dicitur *Einbeer*: Belgis *vuolſſen*, & *Spinneoppen*, id est, Aranea: ab e mentia videlicet aranæ forma: quam bacca vna cum reflexis exiguis alabastris per maturitatem exprimit. Gallis *Raisin de renard*, *Eſtrangle* Lomp. Hispanis, ut quidam aiunt, (*enſiba* Anglis *One berry*).

In montium, sylvarum, conuallium & frutetorum opacis ac perinde aliis umbrosis, pingui ac laxo reperi ut solo. Copiose crescit apud Morpeth in Northumbria, in silua Cortingensi. April. flore exire: baccam Maio maturitatem assequi, auctor est Dodonæus. Ego Montbelgardi pluribus in locis semen maturum colligi Augusto. Genevæ vidi prorumpentem mense Martio, & cum baccis Iuno & Iulio.

multi in ea sunt opinione, ut credant herbam hanc inguiui impositam, dolorem finire: nec desunt, qui alleiant acinos Voz lopinæ deuotatos soporem inducere. Sed Tragus illos nequam degustare vult, ne forte proſus obdormiat. Ex Herbæ Paris acino semen colligitur, non modò nulla deleteria vis inest, inquit Matthiolus: sed etiam contra veneficia præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, quorum aliqui morborum diuturnitate, alij verò veneficiis semi-stulti facti erant, hoc tantum Paris herbæ semine ad vigesimū vsque diem in puluerem hausto dragmæ pondere, pristinæ sanitati omnino restitutos esse. Nos contra pronunciamus, eos semi-stultos, vel planè stultos esse, qui credunt veneficia à sagis illata (si tamen inuulerint) tolli per herbas, verba, aut eiusmodi præſtigia, quinimò si semi-stulti, pituitosi, & torpidi putamus huius plantæ vsu stultiores reddi: nolimus tamen improbare [si ea vera sunt, quæ narrat Matthiolus de sua notitia] in stultis, phreneticis & maniacis, qui insomnes sunt. Camerarius ad Hist. Germanicam Matthioli sequentia addit: Ex Herbæ Paris bac-

cis paratur oleum aduersus magnos dolores, *Matthioli*

dragoris propter bonum odorem delectatam, nec conceptionem medicinali herba, sed precibus à Deo impetrasse. Quare attulit illi Ruben filius ramulos de Dudaim [id est Mandragora] aut fructus eius qui sunt sicut mala, & sunt bene odorati. Sed radicem, quæ habet effigiem capitis & manum non attulit, de ea nempe dicunt aliqui quod conceptionem iuuet, quod tamen ego in nullis Medicorum scriptis vnumquam legi. Hæc ille. Paulus post recitat idem Nehemianides sententiam quorundam, qui dicunt Dudaim, id est Mandragoras, herbas esse quæ venerem stimulent, & ad amorem mulierum incitent, unde hi Dudaim, à voce Hebræa Dodim, quæ significat amores decitari: Sic ille, citante Trago, de Mandragoris. Levin. Lemnius Mandragoram inter herbas biblicas reponit. Gulielm. verò Succul. 3. antiquit. conuual. cap. 8. de Mandragora eleganter & doctè disserit ex sententia sacrarum & propheticarum literarum, ita ut nihil ferè in hoc genere desiderari queat: Eum lege.

Ceterum agyrtæ & impostores Circumforanei qui quotidie Mandragoram circumferunt, iactantque tanto periculo effodi, humanam formam ignare plebi eam ostendentes, ex vno Pythagoræ nomine eius Antropomorphos, ut credimus, mendacij sui occasionem arripuerunt. Neque enim, ut diximus, vox illa aliud, quam humanæ formæ plantam significat. Accessit & Pythagoræ Columellæ testimonium, qui & ipse, tum vulgi opinione suæ auctor, tum nominis superstitiosâ ostentatione moris, sic cecinit:

*Quamvis semi hominis vefano gramine fata
Mandragora pariat flores mœstosq; Cicutam.*

Fictitas quidem esse agyrtarum imagines manumque ex aliarum stirpium radicibus adhuc recentibus efformatas, certò constat. Solent namque isti, exempli gratia, Altheæ, Arundinis, aliarumque plantarum, & præsertim Brionæ radicibus nuper euulsis humanam viriûque sexus effigiem insculpere, inseris in ea loca, in quibus pilos exoriri vult natura, Hordei & Milij granis. Deinde eas, factâ scrobem, vni fabulo obstruit, calidèque conseruiant, ut sic aliquandiu detentæ, grana illa radicales emittant, ipsæque imagines contabescant, & ac aliam arte faciem induant. Et euenit, ut viginti summum dierum spatio, è terra ita enatæ appareant. Tum eruant, & radicales ex granis natas acutissimo cultello concidunt, itaque aptant, ut capillum, barbam, & cæterarum corporis partium pilos referant. Hoc pacto miseri, & imprudens homines decepti, Bryoniæ, plantarumque aliarum radices pro Mandragora emunt. Sed imposturæ huius finis nondum est. Has sub crucibus & rotis ex vrina supplicij affectorum enatas persudant, monstruosque earum usus pollicentur. Nec nisi magno vitæ periculo effodi posse nugantur, cane, qui effodiat, radicibus adalligato, & auribus pice obturatis, ne radices clamorem exaudiant effodientes, ut quo audito illis periculum sit. Cuius quidem imposturæ ac mendacij origo ex Veterum superstitione fluxisse videtur. Non enim defuerunt olim, in iactanda, cum foditur Mandragoras, religione Theophrastus in Græcis: in Latinis verò Plinius. Hos, inquam, non pudit, in tanta rerum, quas scribebant, gravitate, ne quid contra communem sensum dixisse viderentur, populares, & sine ratione ritus huiuscemodi, posteris tradere. Theophrastus enim de effodienda Mandragora hæc scripsit. Circumscriptib; & Mā-

Tom. III.

dragoram gladio ter, secantque ad occasum spectantes. Iubent & alium saltantem tripudio circumagi, multaque de venetis usu & re dicere. A Theophrasto parùm euariat Plinius. Cauent, inquit, effossuri contrarium ventum, & tribus circulis, antè gladio circumscribunt: postea fodiunt ad occasum spectantes. His igitur auctoribus, & quasi per manus transita huiuscemodi superstitione, verisimile est, vanis periculis, religionisque, & humanæ formæ, mendacijs, etiamnum Mandragoram celebrari: cum tamen id potius querendum fuerit, cur à sapiente illo Samio honestiore hominis nomine indicata fuerit. Neque enim verisimile putat Marcellus quia binâ radice, & hominis crura imitante nitatur, sic dictam ab eo fuisse.

Porrò, Matthiolus fabulam illam, quæ ignaris Mandragoræ radices effodere volentibus tantopere minatur, ex Flauo Iosepho natam putat, qui etiam de alio radices genere scripsit, ea tamen facile ab impostoribus ad Mandragoræ radices, detorqueri potuerunt. Hæc sunt illius de Bello Iud. lib. 7. cap. 23. verba: Vallis, qua ciuitas à parte Septentrionali cingitur, quidam lacus Baaras appellatur, ubi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidem assimilis est colore, circa vesperam verò veluti iubat fulgurans. Accedentibus, eamque euellere cupientibus facilis non est, sed tam diu refugit, nec prius manet, quam si quis vrinam muliebrem, vel menstruum sanguinem super eam fuderit. Quin etiam tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortè illam ipsam radicem ferat de manu pendentem. Capitulum quoque modo sine periculo. Totam eam circumfodiunt, ita ut minimum ex radice terra sit conditum, deinde canem ad eam religant, illoque sequi eum à quo religatus est, cupiente, radix quidem faciliè euellitur, canis verò continuo moritur, tanquam eius vice à quo tollenda erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Hæc Iosephus. Et his, quæ de Mandragoræ anthropomorphosi, eiusque sub patibulo nascentis periculosa euulsionem agyrtæ & circumforanei impostores fabulantur, haud duntaxat ignauum vulgus, fidem adhibet, sed nec literati homines, talibus magis seridè se opponunt, easque medio tollere cūant. Quin, deplorandum est eum in mundo hodie summo loco haberi: qui alijs arte quadam imponere nouerit, ut rectè ille dixerit; *Mundus vult decipi. Darnmb sein vvir bie*, Proinde sciant omnes Mandragoras agyrtarum nihil aliud esse, quam meras imposturas.

Mandragoras namque veterum, licet humano corpori quadatenus similis esse appareat, maxime si inferiores partes radices spectes, tamen totâ suâ substantiâ, Mandragoræ agyrtarum fictitiæ, prorsus non respondet, id quod ex veterum descriptionibus faciliè colligitur.

A Dioscoride quidem, qui duo eius genera assignat, & tertium ex aliorum opinione tradit, his verbis exprimitur. Mandragoras niger, qui fecmina existimatur, Thridacias appellatus, folia habet angustiora & longiora [vulg. exempl. *μικρὰ*, quidam vet. *πικρὰ*] quàm Lactucæ, virolo [*δυσώδης*] ac graueolentis, in terram sparsa: atque inter ipsa, mala gerit Sorbis similia [vet. *καὶ οὖτος ὁ δὲν ἐμπερὶ*] ex luteo pallida [vet. *ἀσχερὲς δὲ*]; nec malè nisi Dioscorides sibi contrarius esse velit, Samb. odorata, & in his semen ceu Pyrorum. Radices ei sunt pygrandes, duæ aut tres, innicem implicatæ, nigra foris, intus alba, & [Ald. *φλοιὸς δὲ*] crasso cortice vestitæ: cau-

lem autem non producit. *Alterius* verò maris, seu candidi, quem aliqui Morion [vet. *τοριον*] vocant, folia sunt magna, alba, lata, læuis, ceu Betæ: poma quàm prioris duplè maiora [Ald. *τρεῖς φορές*] colore in Crocum inclinante, iucundè cum gravitate quadam olentia: quæque si mandantur à pastoribus, ij quodammodo soporantur: radix autè dictæ similis, at maior, atque candidior: orbata & hæc caule. Porro & alium tradunt esse Mandragoram, qui Morion etiam nominetur [hunc multi veteres, itemque Plinius non tradunt] nascaturq; in opacis & iuxta specus, folijs albi Mandragoræ, at minoribus, penè dodrantibus, candidis, radicem ambientibus: quæ quidem tenera est, candidaque, paulò maior palmo, pollicemque crassitudine æquat.

His consentanea sunt magna ex parte, quæ Plinius lib. 25. cap. 13. tradidit. Mandragoram, inquit, alij Circeium vocant. Duo eius genera, candidus, qui mas, & niger, quæ fœmina existimatur, angustioribus folijs quàm Lactucæ hirsutis, & caulibus [legendum, hirsutis, æqualibus, non & caulibus: vtrique enim Mandragoræ caules defunt. Præterea hirsuta malè dixit, quasi *δασύς* legisset: neutrius enim folia hirsuta sunt, vt ex Dioscoride liquet] radicibus binis, ternisve, rufulis, intus albis, carnosiss, tenerisque, penè cubitalibus. Ferunt mala Auellana nunc magnitudine, & in ijs semen, ceu Pyrorum. Album hoc alij Arsen, alij Morion, alij Hypophlomon vocant. Huius folia alba quàm alterius latiora, vt Lapathi latius.

Quæ Mandragoræ nigri poma Dioscorides etiam *οὐοῖς* & achradibus comparat: quorum prius ad magnitudinem & formam, posterius ad figuram tantum referendum videtur. Marcellus, *οὐοῖς* *ἐμπερὶν* legit, i. e. ouorum vitellis. vt ipse interpretatur, similia. Sed & *οὐοῖς* malè legit, & hæc vox, oua, non ouorum vitellos significat. Præterea omnes probari codices & Oribasius *οὐοῖς* habent. Serapio Mespilum interpretatus est, quod vitium non Scrapioni, sed ipsius interpreti adscribendum. Plinius hæc mala Nucum Auellana magnitudine esse scribit. Idem Mandragoræ fœminæ caules tribuit, cum vtrumque Dioscorides *ἀκαυλόν* esse dicat. Quare Cornarius in Plinio hirsutis, ex caulibus, legendum esse crederet, nisi rursus sequeretur: Succus fit & ex malis, & ex caule, &c. vt Plinius caulem ipsi omnino attribuat. Nam quæ de Mandragora tradidit, partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto transcripsit, qui etiam in Mandragora caulem agnoscit. *ἥ δὲ ἄλλω*, inquit, *τῇ μὲν ἐμπερὶν τοῦτο τὸν καυλὸν ἔχει, καὶ δὲ τὸ μανδραγόρας, ὃ μὴ καυλὸν ἔχει*, h. e. Reliquorum autem quædam sim. liorem huic [Ferulæ] caulem habent, veluti Mandragoras, & Cicuta. At Theophrasti Mandragoras a Dioscoridis Mandragora plurimum distat. Quod cum Plinius non animaduertisset, ex utroque transcribens, vtriusque Mandragoram confudit. Maximam autem vtriusque Mandragoræ differentiam hæc perspicuè demonstrant. Dioscorides Mandragoræ nigri fructus Serbi magnitudine, & pallidos esse dixit: alibi verò fructus, siue mala duplè maiora, & colore in Crocum inclinante depinxit, ac vtrumque sine caule. Theophrastus apertè Mandragoram caulem habere scripsit, vt ostendimus.

Quisnam autem sit Theophrasti Mandragoras ab Herbarijs ambigitur. Cordus quidem tertiam Mandragoræ speciem, quæ priuatim Morio

dicatur Theophrasti Mandragoram esse censet. Delineat autem is hoc nomine Solanum nauicum Italici *Bella donna* dictum. Dodonæus eam Theophrasti Mandragoram esse censet, sed à Mandragora Morio Dioscoridis distinguit, quam Dioscorides non vidit. Fuchsius Solanum mortiferum esse suspicatus fuit.

Cardanus porro duo Mandragoræ genera agnouisse videtur. Est, inquit, pomum croceum, quod bene olet, scilicet Mandragoræ, sed leuiter. Aliud huic persimile, quod malè olet, & ipsum tamen parum plantam non vidi, quæ cum frigiditè peramenti sit, non è genere Solani, quippe fructus eius sunt rotundi, plantæ magnitudine & forma à pomorum sanguineorum, sed Peponum instar, parum profundis canalibus diuisa. Quibus quid sibi velit Cardanus, non percipio: Pomum eius alterum fortè erat Malum aureum siue Lycopersicum. Verum cur negat esse è genere Solani, quod frigiditè sit temperamenti?

Omnes Mandragoræ partes ad magnos in medicina vsus adhibet Diosc. Succus, inquit fit, & cortice recentis radicis tuso, & prælo subiecto, qui insolatus vbi concreuit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantè ignauior. Delibratur radix & traiectus lino cortex ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defecatum ius seruant. Cyathoque vno vtuntur in perurgilijs, & dolotibus, & ante sectiones, vitionesque, ne sentiantur: Succus duobus obolis ex mulso potus [*ὃ δὲ ὀπὲρ σθεσὶς αὐτὴ μελεράται*, i. e. lachryma, siue liquor cum melicrato potus: *ὀπὲρ* spontè defluit, succus *χολή* tundendo exprimitur] vt Veratrum per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: femiboli pondere inditus per se menses & partus expellit: subditas sedi pro balano somnificus est. Radix ebur emollit quod senis horis cum eo decoctū sit, & ad accipiedam, quæ effingere optaueris, formâ ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus & collectionibus quas vlcera excitant, cum polenta illinantur: duritias omnes, suppuraciones, strumas, & tubercula discutit: stigmata siue exulcerationes delent, si quis sensive diebus sensim perscrictur. Folia seruantur in murijs eisdem ad vsus, Tertia radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium iectibus ex melle aut oleo medetur: strumas atque tubercula cum aqua dissipat: articulus cruciatus cum polenta sedat. Fit citra coctionem vinum è cortice radicis ad hunc modum: Ternæ minz in vini dulcis meretam coniciuntur. Datur ex eo tertii cyathi ijs qui leuati, aut vri debent: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterano quodam pressi torpescunt [*ὅτι τὸ κατὰ φύσιν*, quod alto somno opprimantur.] Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex ijs succus nimio tamen dolore percussus obtumescunt. Semen malorum potum vulvas purgat, appositum que cum sulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluua sistit. Scarificata, punctisque multifariam apertâ radice erumpens lachryma cauo vase recipitur. Liquamentum autem suco lacteo præstantius est. Sed non vbiq; vt experientia docet, radices lactu succum delachrymant. Vt tertiam Mandragoræ speciem non nouisse videtur Dioscorides, nec eius vires certas tradere. Aiunt, inquit, eam in

Kell. Plinij
corrigitur.

Orib. expli-
catur.

Plin. not.

Mandrag.
Diosc. differt
à Theophrasti.

Cardanus
Vires &
sus.

Vinum
corticis

Diosc. nouit
tertiam
Mandragoram

pañe, offa, obfoniõe, drachmz pondere detor-
ratam vñm rationis interciperè: obdormicit
enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus
impos, ternis quaternive ex quo data est horis.
Hoc Medici vñuntur, cum feindendi vñdi que
necessitas adeft. Antidotum esse aiunt radicem
cum Solano manico potam.

Theophrastus Mandragoræ folia vicerib. cum
farina vtilia esse scribit, radicem rasam, & ex ace-
to subactam ad erysipelata, ad podagricos dõ-
lores, ad somnum, & ad amores: dant. a. inquit, in
vino & aceto. Secant orbiculos velut ex Raphano,
quos filo transmissis in multo suspendunt su-
per fumum. Quæ fortasse Plinius [qui sua ex
Theophrasto & Dioscoride mutuatus est] expri-
mere voluit, cum dixit. Concisa quoque in or-
biculos feruatur in vino. Quæ tamen alio in lo-
co dilucidius expressit. Sed is in publicis exem-
plaribus valdè corruptus est. Igni sacro medetur
Mandragoræ radix. Siccat in aëre, vt Cucumis,
&c. Quem ex vetere codice sic restituit Corna-
rius. Igni sacro medetur Mandragoræ radix: se-
catur hæc in asces, vt Cucumis, primumque super
multum suspenditur, mox in fumo. Dein iundi-
tur in vino & aceto.

Mandragoras, auctore Galeno, vincentem ha-
bet qualitatem refrigerantem, adeò vt tertij sit
ordinis refrigerantium. Verumtamen nonnihil
etiam caloris inest, & in pomis humiditatis. Qua-
re soporem & conciliandi vim habent. Radicis
cortex cum sit valentissimus, non tantum refri-
gerat, sed & desiccatur, reliquum quod intus est im-
becillimum est. Est autem Mandragoras pharma-
cum alioqui corpus nostrum corrumpere pote,
sine quantitate tamen incommodare nequit.

Quod potè voluit Dioscorides, sumprà Man-
dragoræ, oleum rosatum cum aceto capiti infun-
di: Matthiolus, referente Turnero, contra ratio-
nem esse contendit frigida adhibere, cum cau-
sa morbi frigida sit: similiter quoque Galenum
taxat, quòd lethargicorum capiti oleum rosa-
tum cum aceto insillet. Atque vt Galenum
refellat, citat Aëtium, Paulum, Trallianum, non
admitentes oleum solum & acetum, sed calidiora
postulantes, vt Chamæpitum, Serpillum, Pule-
gium, Castoreum, & similia addi. Galeni defen-
sionem in aliud tempus differimus. Quod ad Dio-
scoridem, respondemus. Quòd sit res Galeno re-
centiores auctores, satis ei consuetudo essent, toti-
dem pari pacto satis sint, ad Dioscoridem ab eo
errore, quem impingit Matthiolus, vindicandum.
Sed duo ex iisdem testibus, quos ad Galenum
confutandum profert, nempe Aëtius & Paulus,
& cum iis è recentioribus quoque Græcis, vir do-
ctus Actuarius, consulunt eorum [qui nimium
assumpserunt Mandragoræ] capiti oleum rosa-
tum & acetum infundere. Imò Matthiolus ipse
paulò post, eodem capite tanquam sui immemor,
& accusationis in Dioscoridem & Galenum in-
tentatæ, fatetur magno ardore corripì, qui im-
matura Mandragoræ poma comederunt, multò
maturis frigidiora: quàm igitur iustè paulò antè
accusatus fuerit ab eodem Dioscorides, iubens
caput eorum qui nimium Mandragoræ bibissent,
oleo rosato & aceto perfundi: Ac an ab homine
tam obliuiofo tantà confidentia censendi taxan-
dique sunt veteres, quod sæpenumerò facit, pe-
nes viros doctos & prudentes iudicium esto.

Prodiderunt Serapio & Auicēna, semen Man-
dragoræ potum vteros purgare, idemque multos
annos antea scripserat Dioscorides: ex quo etiam

quis meritò dicat, Rachelem ante hosce omnes
facultatis pomorum Mandragoræ consciam, ob
id poma Mandragoræ experiri uelle, vt purgato vte-
ro aptior ad concipiendum redderetur, liberòs-
que, non minùs ac Lia foror & ancilla Silpha
procrearet.

Accipitrem aucupari nolentem quidam Man-
dragoræ radice fumigant, & confestim prom-
ptum ad aucupandum reddunt, Demetrio hoc at-
testante. And. verò Bacciùs Mandragoræ, aliorum-
que medicamentorum deleteriorum ebibitis suc-
cis, per lauaciones in dulcibus succurrit.

MANDRAGORAS MAS.



Antropo- Descriptio
Amorphon
dixere Mandra-
goræ radicem,
crassam, longâ,
bifidam, fibris
hinc inde pro-
deuntib. velut
hispidâ, inco-
xantem homi-
nem, vt sibi
persuadent, re-
ferentem: è cui-
us capite, mar-
s quidem folia
exerunt circiter
cubitalia, ses-
quipalmum fe-
rè lata, princi-
pio & mucrone
angustis, atro
viore prædita,

fortida: inter hæc à radice quoque nullum enim
profert caulem] pediculi exerunt crebri, duarum
vnciarum, aut palmares etiam: florem singuli su-
stinentes albidum, at nonnihil purpurascens,
modicè hirsutum, Campanulæ ferè forma, quinque
segmentis, è calyce foliato, laciniato, itidè quæ
villosa, odore fastido: pomum sequitur rotundû,
parui Mespili magnitudine, ex luteo viride. Radix
cum in off. prostant solùmmodò cortices, maris an
femine, an vtriusque promiscuè, nobis non con-
stat, insigniter autem crassam restantur radicem:
quo nomine distinguas licet à Fraxinellæ & Cap-
parum corticib. adde colo: è foris ex albo ferrugi-
neum, substantiam mansu lentam: amaror idem.

Mandragora mas Trago, Fuchf. Matthiol. *Synon.*
Dod. Lac. Cordo in Diosc. Lob. in Adu. Obs.
pag. 138. Ic. Pl. p. 267. H. bugd. pag. 1726. Camer.
Mâculus Turnero: Mandragora Anguillaræ.
Mandragoras Gesn. hort. Cæsalp. Mandragoras
albus seu mâculus Cordo hist. Mandragoras
mas vel alba Camerario. Lobelius quidem &
Dodonæus pro vtraque Mandragora vnam pro-
ponunt iconem, ad latera tamen pomum maris
pingunt rotundum, femineæ pyriforme.

Germanis *Alyraun Manlein*: Belg. *Mandra-
gora manneken*: It. *Mandragora mâchio*: Gall.
Mandragore ou *Mandegloire*: Lob. sed fortè le-
gendum *main de gloire*.

In Italiæ, Prouinciæ; Narbonæ, & Hispaniæ
hortis florem mâlæque maturat, semine aut ra-
dicibus ex Candia & Cycladibus insulis adue-
ctis, vt scribit Lobelius. In reliqua Galliâ non
periunde, tametsi quandoque florem pomique

apprimè matura dedit Briffioræ Oeciduo Angliæ
aprico & repidiuculo hortu.

MANDRAGORA FOEMINA.

Missum semen Florentiâ pro Mandragora
Cretica femina, valde paruum non maius
Melanzanæ femine: negleximus autem descri-
bere plantam, quia consumpra Hieme alperiore.

Mandrag.
femina de-
script. Clus. Clusius Mandragoræ feminae folia adscribit
angustiora, minorâ, & nigriora quàm mari, ma-
gis etiam rugosa, crispâque, virola & graueolea-
tia, & humi expansa: inter quæ longi pediculi exi-
liunt, per terram strati, quibus insident flores,
Melo-peponum floribus formâ ferè similes, co-
loris ex cæruleo purpurascens: quibus succe-
dunt fructus, non turbinati instar Pyri, sed rotun-
di, Vesicariæ fructu triplid maiores, initio yiri-
des, maturitate pallescentem ex luteo colorem
adquirentes, odorati, succi pleni, femine abundan-
tes plano vt maris fructus, sed minore, nigrioré-
que: radix pedalem aut ampliorem longitudinem
æquat, interdum bifida, intus albâ, foris verò fu-
sca, cui aliquot fibræ adnascuntur. Hæc ita Clu-
sius, cui græcè *Mandragorâ* *phânus* dicitur, & *her-
sanius* à foliorum Lactucæ similitudine: Latine
etiam Mandragoras niger & femina.

Synon.

C. Bauh. phyt. & pin. Mandragora 2. siue fru-
ctu Pyri: Mandragoras femina Tragi, Mat-
thiol. Cordi in Dioscor. Lac. Lob. Obs. 138. Ic.
Plant. 267. Dod. H. Lugd. p. 1726. Cæspalp. & Ca-
merarij, *Eid. phyt.* Mandragora 3. siue flore cæru-
leo: pin. Mandragora 3. siue flore sub. æruleo pur-
purascens: Mandragora femina Clusij hisp. &
hist. Cast. & Eyst. Mandragora Lonic. altera
Cæspalpi.

Matthiolus pingit in sua icone fructum tur-
binatum, ad Sorbum accedentem, nudum, sine
foliis: ea icon non placet. Lobel. & Dodon.
folia addunt, an ex ipso fructu, nescimus. Camer.
in Epit. Matthiol. propriam iconem habet, pin-
hens fructum rotundum cum foliis. An porro
C. Bauh. not. C. Bauhinus duas faciat Mandragoras indicent
alii: scilicet illud non placet, eum vnam Trago
adscribere, cum tamen Tragus scripserit Man-
dragoram sibi nunquam vitam.

Locus

Matthiolus perhibet copiosam in Gargano
Apuliæ & aliis montibus haberi. Supra Gades
itinere Hispanensi, non procul ab vrbe Xerez de
la Frontera dicta, ad aruorum margines, quæ se-
cundum flumina sita sunt, & quibudam aliis Ba-
ticæ locis vlginosis florentem obseruabat Clu-
sius initio Februarij anno 1565. & paulo post, eo-
dem videlicet mense fructum maturum collige-
bat inter Calpen & Malacam, nimirum toto illo
maritimo tractu supra fretum Herculeum ad me-
ridiem conuerso, & valde aprico, propter mon-
tes, vno aut altero militari à mari distantes, qui in
mediterraneis, vsque ad fretum continu à serie
producentur. In Belgio nunquam videre memi-
nit, nec de femine quidem, quod ex Hispaniis
deferebat, germinare vnquam voluit: vt nec in
Austria, quod aliquoties ex Italia postea acci-
piebat.

MELONGENA VETERIBVS.

Æquiuoca

MElongena in Arabum codicibus primùm
celebrata fuit. Hanc quidam suspicantur

esse Solanum pomiferum fructu rotundo. Alij
Solanum pomiferum fructu incuruo. Nonnulli
verò Solanum pomiferum fructu nigro spinoso.
De his autem deinceps ordine dicturi sumus.

Melongena vetus, Auicenna libro quarto cap.
455. auctori, noxia est, recens melior. In ea cali-
dam temperiem superare, & siccam esse ordine
secundo, ex amarore & acrimonia colligitur.
Melancholiam gignit, cancrum, lepram, hæmor-
rhoidas, panos, dolorem capitis, & fetorem oris.
Obstructiones hepatis & lienis efficit, nisi cum
aceto cocta fuerit, colorem corporis sædum,
atrum & citrium, vt mirum sit Auerrhoem Ma-
la infana libro quinto Collec. cap. 201. com-
mendasse suo quodam modo parata.

SOLANVM POMIFERVM
fructu rotundo.

Fibrosas pa-
rum altè,
defigit radices,
caule vnico pe-
dali, crassius-
culo, firmo,
subpurpureo,
hirtuto: foliis
palmaribus, &
selequialmar-
ibus, palmum
ferè latis, per
ambitum si-
nuatis obiter,
infra supra-
que pilosis:
flores breuib.
satis pediculis
hærent, albi-
cantes aut
subpurpurei,
in stellæ modū:

quibus succedunt poma, oui, vel Cucumeris cir-
citer magnitudine, & figurâ ferè, ex rotundo sub-
longa, colore purpureo, virecente, læui corti-
ce, succosa albicanteque intus pulpa: in qua co-
piosa femina, albicantis, compressa, Pipeis sili-
quæstri æmula.

Asinia cum essent Mandragoris hæc cæruleo-
purpurea poma, Melongena vel Mala infana,
exotica, ex fusco violacea, effigie oui oblon-
gi, quidam Recentiorum suspicati sunt marem
Theophrasti Mandragoram, eoque esu lethalem
rati, infana mala vocarunt. Sed apud Theo-
phrastum multa lectionis labe, ferè non dis-
tincta stirpium delineatio, ne dicatur farrago
omnium congenerum, è quibus hæc eximenda
est, & Cucumerum familiæ, aut potius Mandra-
goris vel Hyocyamis adscribenda, vt Lobel. in
Adu. statuit.

Apud Cordum in histor. vb. Melongenæ fi-
gura addita, quidam annotauit Simeonem Se-
thi fortè Mazinzaniam vocare. Sed Ruellius,
qui Melansana vulgò vocari ait, quasi Mala in-
fana, de hac nihil à veteribus fuisse scriptum,
prodit. Non desunt tamen attestante Trago qui
tertiam Mandragoræ speciem quam Morion
vocat esse, suspicentur. Quæ opinio Fuchsi di-
splicet.

Prassaculus autem itémque *Fuchius* *Hermolaus* immesitò, meo quidem iudicio, inquit *Marthiolus*, damnant, quòd in ea sententia cum fuisse velint, ut putaret Mala illa, quæ Italis corrupto nomine *Melanxana* vocantur, *Liguribus* *Melenxana*, *Hetruscis* *Petranciani*, *Hispanis* *Verangenes*, *Germanis* *Melanxanæ*, & *Dollepfel*, hoc est, *Poma furoris*, *Gallis* autem *Pommes d'amour*, hoc est, *Poma amoris*, esse tertiz *Mandragoræ* fructus: certa ac firma *Hermolai* sententia, ex ipsius verbis sufficienter constat. *Ceterum*, cur *Poma amoris* appellantur à *Gallis*, haud scio, inquit *Ruellius*, nisi quòd fortassis elegantia & pulchritud. placeant, & ita digna quæ amentur. Sunt tamen & alia *Poma amoris*, de quibus infra dicetur. *Melanxanas* mala insana minùs sano iudicio vocat *Hermolaus*, inquit *Scaliger*: esicata namque nullos excitant furores: quippe iis in bellariis vtuntur *Genuefcs*. *Solanum pomiferum* *Gesl. hort.* potius dixerit. Neque repugnarit idem in cat. pl. si quis *Hippomanes* hunc fructum esse dicat, qui *Poma Melanxana* vulgò dicta & amoris *Poma* producit.

Mala insana *Trago*, *Fuchf.* *Dod.* *Lac.* *Lon. Tab.* & *Gerardo*: *Malum insanum* *Gesner. hort.* *Melongena* *Matth. Cord. hist.* *Lob. in Aduers.* *Obs.* p. 158. *1c. Plant.* pag. 268. *Cast. H. Lugd.* p. 617. *Camer. cui & Verengena* *Toletanorum*: *Melanxana* fructu pallido *Eyft.* *Solanum hortense & Pyra insana* *Cæsalp.* *Solanum* 15. *C. Bauh. phyt. Eid. pin.* *Solanum pomiferum* 4. siue fructu oblongo: Et videtur *Strychnon hortense* *Dioscoridis*, vrbani *Theophrasti*, esculentum *Galen.*, & tertium *Genus* *Plinij*. Variare ait flore purpureo, albo: fructu albo purpureo, luteo: figurà quandoque oblongà, aliquando instar mali rotundà. An *Malinathalla* *Theophrasti* *Belonio*?

Basilæ in horto *D. Cælij* florebat & fructum ferebat mense Augusto, quem tamen vt plurimum difficulter maturabat: in vasis fictilibus, viridiorum voluptati & gulonum auditati colitur.

Helluones interdum hosce fructus vti *Cucumeres* in acetariis helluantur, vt *Roma*; *Genue*, *Neapoli*, maiore voluptate quam utilitate: deterior enim succus vel quolibet *Peponis* aut *Cucumeris* est. Sont ex *Italis*, qui horum pomorum esu venerem concitari potest: quod forsan idè præstant, quòd flatus gignant. Adhuc frequenter manducati, febres generant diuturnas, & habitum totius corporis malam. *Ceterum*, qui *Melongenas* esse credunt *Arabum*, easdem cum illis vires huic adscribunt, de quibus consule caput præcedens decimum-sextum.

SOLANVM POMIFERVM fructu incuruo.

DE hoc *Rauvvolfius* in *Itiner. partis primæ* capite 4. *Halepi* reperiuntur tria genera *Melanzanorum*, *Arabibus* etiam *Melongena* & *Bedengiam* dicta, cinerea, lutea & rubella, longitudine & curvitate eadem longis *Cucubitis* similia.

Hist. Lugdun. pag. 13. in append. *Melanzana*, *Arabum* *Melongena*: *Caspar Bauhinus* *phyt. Solanum* 16. *Eid. pin.* *Solanum pomiferum* 5. siue



SOLANVM POMIFERVM fructu spinoso.



nigro, cortice lævi, & procul intuenti splendido, salubrior est coctus, vt inquit *Auerhoes*, quàm crudus.

Camer. ad *hist. germ.* *Marthiol.* *Malorum insana* *Synonyma* *norum* species valdè spinosis foliis & caulibus, floribus maioribus. *C. Bauhin. phyt. Solanum* 17. *Eid. pin.* *Solanum pomiferum* fructu spinoso, primum, *Melanxana nigra*, *Bathleshaia æthiopica* *Rauvvolf.* *Lugd.*

POMVM DE HIERICHO, Melongenis congener.

PMuto *Hiericho* *Ferd. Imperati*, peregrina *Descriptio* *Italiæ* plantæ, nec aliis descripta, folia producit candicantia, simillima foliis *Melagianæ* *Italis* dictæ, sed paulò minora. *Caulis* & foliorum costæ spinosæ sunt: flores cærulei, instar florum *Buglossi*: fructus rotundi pomi instar [in modo di *Melo*:] quorum color antequam maturefcant vitidis, maturorum flauus: sapore insipido, & aliquantum odorato.

C. Bauh. pin. *Solanum pomiferum* fructu spi-

fructu incuruo, varians colore fructus, qui flauus, cinereus & purpureus.

Sunt præterea *Ganata* *duo* *Sica*, eodem *Rauvvolf.*

Rauvvolfius auctore, *Melanzanorum* alia duo genera, *Arabibus* *Bathleschain* nuncupata, longa & rotunda, quæ maiora, colore nigra, læuia, ita lucida vt splendeant. *Melanzana nigra*, vt in *Hist. Lugd.* in app. p. 23. inscribitur, fructus longus, altus, aliis rotundus, colore nunc atro, nunc sub-



nolo 1. Solanum spinosum fructu rotundo: Pomum Hiericonicum Imperati.

SOLANVM POMIFERVM, fructu rotundo striato duro.

Descriptio

Cault est singulari Solanum pomiferum digitum, crassitudine digitali, cubitum alto aut maiori, glabro, latè virenti, medulla albicante pleno, spinis subinde donato, in ramos plures diuiso: filia melanzane foliis paria, sinuata, atro-virentia, vndique glabra, spinis fortuitis aversa parte horrentia: flores Solani vulgaris, albi, cono luteo, poma sequuntur rotunda, torulis caliculata, siue striata, dura.

Mala Aethiopica Dod.

Dodonæus nobis auctor est, non parum à malis insanis differre, quæ nostra ætate Aethiopica cognominat, quodd ex Aethiopia in Hispaniam primum inuecta existimantur. Veteribus autem cognita fuisse difficile esse affirmare. Cum malinathalla verò Theophrasti nequaquam conuenire.

Solan. pom. herm. Lobel.

Lobel. qui Solanum pomiferum herbariorum in Ob. pag. 135. [vbi Piper Guynæ vulgò appellari refert, quamvis minimè viat] & Icon. Plant. p. 264. inscribit. Solano verticillato simile facit, sed fructu siue poma phœniceo, iucundissimo spectaculo. Amoris poma dicto ferè pari: folio Hyoscyami lutei: flosculis Solani horrentis: æstiuam item esse plantam, Hispano semine natam.

M. Lugd. acon. bina

Hist. Lugd. p. 632. Capsicum rotundum Dalechampi, fructu rotundo, rimis profundioribus fillo, rubro, pusillis granis sacro, subflauis, gustu acrivicibus iisdem pollet, quibus & cætera Capsica. Eid. p. 730. mala Aethiopica Dodonæi. Lugdunensis duas figuras vnius plantæ exhibet, dicitque prioris fructum esse gustu acti, quod non placet.

Solan. pom.

C. Bauh. in phyt. Solanum 14. Eid. pin. Solanum pomiferum 2. siue fructu rotundo striato duro: Solanum pomiferum Tab. Eyst. & Gerar. cui & mala Aethiopica: foliis magis mirè v sinuosis: in caule aliquando, vt & in foliis, modò infumè, modo superne, paruis aculeis.

Locus & Tempus

Satum monteigardi, Iunij principio florum vestigia proditcebat, sed fructum non maturabat. Tardè admodum quoque ad perfectionem Coloniz venit.

Vires & sus

Feruntur verò hæc mala in pinguium carniū iure cum sale ac Pipere cocta inferri ac edi: &

minùs mali succi esse, quàm Infana aut Auræa: propterea videlicet, quòd duriora, diutiusque aservuari queant, nec ita faciliè vt illa corrumpan- tur. Sunt tamen nec hæc Aethiopica boni succi, & alimenti non multum corpori adferunt.

LYCOPERSICVM VETERIBVS. & in genere.

Lycopersici meminit Galenus 4. simpl. med. cap. 18. titulo, quod sapores acres omnium sint calidissimi, his verbis: multa ipso statim odore aliena sunt, planèque pugnantiam cum homine indicant, velut & hæc ipsa quæ nunc dicta sunt, & Cicutæ, Papaveris, Mandragoræ, & Hyoscyami succus. Quin & nuper quoque herbam quandam conspeximus [hæc verba non bene trita in græco textu sic leguntur: *ἰδὲν διὰ τὴν ἰσχυρὰν ὀσφύδα*, i. e. contemplati sumus nuper herbæ [succum] quam Centurio quidam ex Barbarica circa Ægyptum regione comporta- uerat, odore adèd graui, adèdque inamœno, vt ne gustare quidem auderem, sed lethalem esse conicerem: utebatur autem ad vrgentes articu- lorum dolores: atque ipsi etiam laborantibus refrigerandi pollere facultate est visa. Est autem colore subflauo, odore tam graui, quàm Cicutæ: nisi quòd leuem quandam instar aromatum odoris adferat gratiam. Nomen herbæ ex qua succus hic exprimitur, Lycopersicum esse dicebat.

Ab ignaua Galeni timiditate, qui Lycopersicum herbam, quòd grauiùs oleret, ne gustare quidem ausus est, procul abest Gesnerus: qui Lycopersicum Galeni non aliud existimat quam Stramoniam dictam, vel fortè Cardiacam: Pomum verò auri opinantur Anguill. & Cam. alij verò teste Iulio Alexandrino Tagetem Indicum.

MALA AVREA ODORE FOETIDO, quibusdam Lycopersion.



Tota plā- ta virosū & καρπασκόν ferè vt Garyophyllorū Indicorum, inquit Cam. spirat odore, caule cubita li, & ad altitudinē quandoque humani corporis, minimi digiti ferè crassitudine, hirtu- to, ramos late ipargente: filia tenella, pinnata, hirtu- ta, ex viridi amelcen- tia, ex tribus quatuorve singularium foliorum oblongorum, sinuatorum coniugationibus, quas pusilla quadam foliola intercedunt, composita: flores Solani vulgaris forma, in luteo languescunt, lenis sunt foliis costatæ, quorū mediū rōndè ob- sidet stamina saturatius flore tincta: succedunt rā- dem

dem multa *poma*, non multum Arantii minora, scissilia, torulis ad oppositam vsque partem canaliculata, laeuore eximio, colore vel aureo, vel ochreo, vel purpurascente, vel denique versicolore: *semine* intus copioso, circinato, compresso, & veluti membranco, hirsuto: *radix* summâ ferè terra hæret, longis sed numerosis fibris vberim capillata.

Mala insana, vt vocat, Cæsalpinus ad Solani furiosi genera pertinere existimat. Anguillar. epist. 12. Lycopersicum Galeni: Poma amoris Dod. gall. Lob. in Adv. & Obs. pag. 140. Camer. epit. Tabern. & Gerardo. Pomum amoris Cam. hort. & Pomum Indum Mediolanensium, nomine externo *Tumate* dictum: Eid. apud Matthioli germ. & Hist. Logd. pag. 618. Poma aurea. Gesn. hort. Pomum aureum, Pomum amoris, Pomum de altero mundo, Pomum Solanis cognatum, Solanum pomiferum alterum, & Solani pomif. ri genus aliud. Lob. Obs. p. 137. Glucium putatum, Pomum amoris: Eid. Ic. plant. pag. 270. Poma amoris. Ly. operitum. Dod. lat. & Cast. aurea mala. Guill. pap. Tumate Americanorum. C. Bauh. phyt. Solanum 20. End. pin. Solanum pomiferum i. siue fructu rotundo striato molli, communiter luteo, aurico colore, aliquando pulchrè rubente: rarius albo: est & surrectus cubitalibus cauliculis, quod per omnia minus est. Poma amoris fructu luteo, & Poma amoris fructu rubro, & Mala Peruiiana. Bytt.

Germanis *Goljete*, *ffel*, *lieb*, *epffel*. Belg. *Gulden*, *appelen*. Gall. *Pommes d'or*, & *Pommes d'amour*. Ital. *Pomi d'oro*, alijs *Pomi del Peru*. Chinus Amatum vocatur.

Habetur in hortis locisque humidis & solo pingui, vel etiam rigatione gaudet. Iulio & Augusto mensibus florèt: Autumno fructus perficitur.

Succus valdè quàm opportunus incipièti epithoræ fluxionibù ue oculorum feruidis glaucoma facturis, si per initia admoueat. Non modò ut uentis: nam humoris insuleum compescit, sed etiam calorem moderatur sæpius periculo à recentioribus f. èto. Quia etiam crispelatus, ignibusque facris vehementer obducitur. Falsis nonnullis escantur poma cum Pipere, sale & oleo præparata, non secus atque Cucumeres. Sed eduntur & coctæ: est quædam halit vniuersa plantæ reter spiritus, paruo emolumento & parum tuto in cibos venire facis prodit. Præbent autem mala corpori alim entum quidem perexiguum, & hoc ipsum tamen prauum ac vitiosum: refrigerant enim, sed aliquandò minùs, quàm Mandragora. In oleo aut. em coctæ, ad scabiem sunt efficacia. Eadem arte chymicâ oleum subministrant contra partes igne, vel alia re candente, vltas curandas percommo dum. Hoc oleo temporibus & carps inu. èto somnus conciliatur. Retulit olim mihi Textor vir doctus, Medicus Paterniacensis in Heluetia, se phrengeticum omnia rumpentem visitasse, qui, cum ei manibus Aurea malacemenda dedisset, eique clam aliquot subiecisset, paullo post obdormierit.

PYCNOCOMVM IN GÈNERE, EX veteribus & Neotericis.

PYcnocomon *folia* habet, vt scribit Dioscorid. Erucæ similia [Hic interpositi Lac. ex vet. cod. *uicet* *uicet*] sed aspera, crassa, acrioraque: *caulem* quadrangulum: *florem* Ocyti: *fructum* Tom. III.

καρπὸν: *semen* alij.] Marrubij [*καρπὸν* habent vulgata exemplaria: *απαρὸν* e. Poti, sicuti & Oribasius legit, & Lacuna ex vet. codice] *radicem* nigram, rotundam [Ald. *uicet* *uicet*] intus pallidam, exigui Mali figurâ terram olentem. Nascitur in saxosis locis. Semeo tumultuosa, grauiorque somnia facit, vnâ drachmâ potum. Discutit & cedemata, impositum cum polenta: nec non & spicula, & adactos corporis aculeos extrahit. Imposita quoque folia, tubercula, furunculôsq; discutunt. Cæterum radix eius in aqua molla drachmarum duarum pondere, alium soluit, & bilem exinanit.

Eadem Plinius lib. 26. cap. 8. & cap. 14. tradit. *Plinius.* Habet autem denarios duos [10. 11.] pro duabus drachmis Dioscoridis, non ita magno discrimine, quum in vicia denarij septem drachmæ verò octo habeatur. Suspicator Cornarius hic obolorum voc. è deesse, vt 10. non pro denarij ponderis nota acciperetur, sed simpliciter pro denarij numeri nota, vt ita legretur: radix eius in aquâ molla 12. obolorum pondere.

Galeno authore Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia digerendi, atrahendique habent facultatem, vt pote quæ & gustu sunt acria: folia itaque phymata, & tumores discutiunt, fructus valentior est: & hæc quidem efficere potest milus alicui d. gentium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur: palos & alia id genus infixa ad extimam cutem elicit. Porro radix ad suprâ dicta quidem deterior est & infirmior, cæterum bilem fluxum expungit.

D. Lechamps nullum ex rei herbariæ scriptoribus, aut se audiuisse, aut legisse facetor, qui Pycnocomum verum nouerit. Ignorant quoque sibi scribit Cornarius. Omnibus etiam in Ital. a Ignorant scribit Matthioli, in quo eum carpit Guilandinus in Theone, falsò id asseri scribit.

Sunt qui suspicentur Pappas Americanum *Equino* Pycnocomon esse. Quorum quidem opinionem nunc probare non possumus. Fabius Columna voluit Succiam esse Pycnocomum. Pycnocomon Trago & Lenicero est Vlmaria. Apud Bruserium ponitur icon Angelicæ pro Pycnocomo: non tamen existimamus, eam ab illo intelligi, sed potius cum Trago & Lenicero Vlmariam. Pycnocomum quidam dixerunt de Barba capræ rursus, quam opinionem meritò reiecit Fuchsius. Pycnocomum Aiguillæ est quorundam R. sed a luteis, sed perperam, vt rectè iudicant Lob. & Camer.

PAPAS AMERICANVM.

Caulis bicubitalis & tricubitalis, ac etiam *Descriptio* litor, crassus, scelus succulentus, subrotundus, hirsutus, lobatus, vitidis, è crebris punctis rubenibus maculosus, inanis, ramosus, æqualis propter eas quas habet inde vsque à foliorum pediculis adnatas membræ eas alas, atropurpureas, nonnunquam crispas: *filia* selquipalmaria ex tribus foliorum coniugationibus componitur, quibus impar vnum, reliquis malus ferè, alam claudit: sunt autem singularia folia hirsuta, ortu quidem inæquali, non adè tamen quàm alam quoquo modo deformet, altero tantò longiora quàm lator, arrouirentia & splendensia luperne, inferne abest & splendor, & virore intentio: coniugationes singulas intercedunt

Bbb b



alia foliola rotundata, Lenti aut Lupino ferè paria, oitu & positu pèrinde inæquali: rami in plures pediculos abeunt, atque hi rursus in alios numerosos, hirsutos, geniculo vno donatos, vnde cum parte reliqua pediculi cedunt facillè vel sua spontè flores: quorum singuli ex calyce viridanti quin

quepartito, floribus Maluæ siluestris procerioris magnitudine pares, foris palliduli & subhirsuti sunt, intus verò ex pallido purpurascunt, interdum albescent, tori integri, cum quinque apicibus obtusis in ambitu, cæterum à stilo viridante quem circumstant quinque fibræ crocæ, in vnumquemque apicem excurrit radius vitæfens: obseruavi quoque ex eadem regione suboriri folia quædam minora, flori concoloria, quæ multiplicem florem meditantis naturæ videri possent rudimenta: succedunt poma floribus numero paria, Castaneæ circiter magnitudine, sed forma orbiculata, atroviuentia, subhirsuta, in iis femina plurima, parua, plana, Solanis similia. Radix bulbosa, crassa, palmari longitudine & selquipalmari, ac etiam multò minor, foris acro rubens, intus ex albedine pallens: vnus bulbus multos profert ramos, multasque emittit fibras, è quibus dependent bulbi multi, magni & parui, insipidi. Serpiu & se propagat insigniter hæc planta.

Расте Перу-
напит.
Орешник.

Est, inquit Benzo, apud Peruanos radicis genus [Pape vocant] tuberum specie, exigui laporis. De eodem sic Thom. Henriotus, Openauk radices Virginicæ insulæ rotundæ, nodorum instar coherentes, coctæ esui aptæ. Sic verò Pet. Cieca, Papas radices coctæ teneram, instar Castanearum elixarum, pulpam habentes, sole siccata Chumno vocatæ.

Чумно.

In Colla, inquit H. Card. lib. 1. de rer. var. cap. 3. regione Peru, Papas est tuberis genus, quo pro pane vtiuntur: gignitur in terra: ita natura prouidit sapienter vbique, siccantur vocanturque Cuono: factique quidam sunt diuites hæc sola merce, quam in prouinciam Potossi deducebant. Fert, ut dicunt, radix hæc herbam Argenome similem: forma est Castaneæ, sed foauior gustu, ediditque coctæ, vel in farinam redacta. Inuenitur etiam apud alias gentes eiusdem Cherionesi, velut apud accolæ prouinciæ Quiti.

Vnde primum, inquit Clouius, qui huius historiam fusè & accuratè prosequitur, nacti sint Itali, ignorant: certum autem est, vel ex Hispanijs, vel ex America habuisse. Mirari autem subit, cum tam vulgaris & frequens esset in quibusdam, ut aiunt, locis Italiæ, ut eius tuberibus cum veruicina carne coctis, non secus ac Rapis, & Pastinacæ radicibus vescerentur, imò etiam suis in pabulum cederent, huius stirpis no-

titiam tam ferè ad nos peruenisse: illud autem magis mirum, Pataginz scholæ fuisse ignotam, ante quàm amicis, qui Patanijs Medicæ arti operam dabant, Francofurto eius tubera mitterem. Nunc verò plerisque Germaniæ hortis satis vulgaris est planta facta, quandoquidem adèd fecunda est. Ceterum, dubium non est, quin sit ea planta, quam Petrus Ciega cap. 40. primæ partis Chronici sui sic describit. Locis Quito vicinis, præter Mayzum, habent incolæ stirpis genus, quo magna ex parte vitam sustentant, Papas videlicet, radices tuberibus ferè similes, nullo putamine, aut officulo tectas, quæ coctæ, teneram instar Castanearum elixarum habent pulpam: Sole siccata Chumo vocantur, & in vsum seruantur. Producit hic fructus stirpem Papaueri [condonanda est hæc comparatio militi] similem. Papas etiam mentionem faciunt Augusi. Carate atque Gomara in sua generali Historia Indiarum. Quibus non valde abssimiles videntur eæ radices, quas Virginienses Openauk nominant. An verò Veteribus cognita fuerit hæc planta dubitat Clouius, nec multum abest quin credat esse Atachidnam Theophrasti, quæ cum hac pebellè conuenire ipsi videtur, præsertim radicis historia.

Flotere hanc Basileæ Iunio, scribit C. Bauhinus & sæpe ad Autumnum vsque & à primis pruinis offendi. Hanc ex insula Virginica primum in Angliam, inde in Galliam, aliisque regiones delatam esse. Huius radices in Virginea Openauk dici: Acoctæ verò in Hist. Indiæ, Papas: hinc Papas Indorum vel Hispanorum vocari, Italis Tarruffoli, quo nomine, & tubera nominare solent. Germanis Grublingbaum, id est Tuberum arborem dici. Se anno 1590. huius plantæ iconem suis coloribus delineatam, à D. Scholzio Papas Hispanorum nomine accepisse, & à nemine descriptam inuenisse, ac adèd in phyt. sub Solano tuberoso efculento, figurâ additâ, descripsisse, eiusque iconem Clouio transmisisse. Solanum quidem se appellasse, propter formam aliquam foliorum, cum Malis aureis: florum, cum Malis insanis: fructuum, cum bacis Solani vulgaris: seminum, cum Solanis penè omnibus, denique propter totius plantæ odorem, quem cum Solanis commune habere ait. Pycnocomon Dioscoridis Cortusum censere, motum exemplari D'ortod. manuscripto, cui similis figura adpicta. Et sanè notas florum ac radicis Pycnocomi Dioscoridis, huic Solano conuenire: floris & seminis non item. Tandem relatum sibi ait apud Burgundos [qui ex ramis in terram reclinatis, teriisque testis propagabant, quòd plura Tubera acquirerent] harum radicem vsum interdicitum, ut quibus persuasum sit, earum esum lepram causare: & Artiscokosi Indicos vocari. Hæstius ille. In cuius pin. vocatur Solanum bacciferum 13. Pycnocomum Dioscoridis, Cortusi: & Papas Peruanorum, Eyst. Papas Acoctæ lib. 3. cap. 20. & lib. 4. cap. 17. Non autem metetur hæc herba nomen Grublingbaum, siue Tuberum arboris. Non enim caules profert arboris erectos, qui per se se sustinere possint: sed in terram reclinantes, radicisque nouas, eam semel apprehensos, agentes: quorannis etiam pereunt caules. An porro hæc planta mereatur nomen Solani, ob odorem & aliquam similitudinem à fructu petitam, repugnantibus viribus & cæteris, indicent alij. Nos huic eduli plantæ malimus suum relinquere nomen. Non sunt huic

Locus
Temper.

Openauk
Papas

C. Bauh.
lap. 1.

huic folia Erucæ: nec radix nigra: neque sapor, neque vires denique cum Pycnocomo veterum conueniunt, vt patet ex ijs, quæ antè cap. 23. propofita funt: Præterea planta illa, quam Burgundus Artificorum Indicum vocare refert, à Pappa Americano, fiue Solano eius tuberofo efculento, plurimum differt.

Indi, Acofta referente, radicibus panis loco vtuntur quem *Chunno* vocant. Quin & aliud edulium eodem *Chunno* nomine nuncupatum admodum diu durans, ex eiusmodi radicibus, Sole ficcatis, inque partes diffractis, conficiunt. Sed & viridem, vel coctam, vel affatam manducant. Ex alio autem Pappæ genere, in calidioribus fudis plantato, fercula *Loero* appellata, parant. Sic in infula Virginea, apud quos in humidis & paludofis locis nascitur, radicibus in aqua aut aliter coctis vtuntur. His Caftanearum, aut Pafinacæ in modum paratis, nonnulli vefcuntur ad debiles vires firmandas. Noftates, inquit Cæfp. Bauhinus, aliquando Tubercum modo fub cineribus affant, & coricula ablata, cum Pipere comedunt: alij affatas & mandatas, in taleolas difsecant, & ius pingue cum Pipere affundunt & comedunt, ad Venerem excitandam, feménque augendum: alij & tabidis quoque viles effe volunt, quòd bonum alimentum præbeant, & nō minùs quàm Caftanæ & Pafinacæ alant, & flatulentæ funt. Clufius elixas, deinde, epidemide verius, quæ cure purgatas [facillimè enim cedit] & inter binas lances, Naporum, aut Raporum pinguiore veruecis iufculo maceratas deguftabat, & fanè non minùs fapidas & palato gratas deprehendebat, ipfis Napis. Crudas vero, nimis afperas & flatulentas effe æftimat.

SOLANVM RACEMOSVM CERASORUM FORMÀ C. Bauhini.

EX radice fibrofa caules exurgunt bicubitales, angulofos, aliquantulum hifcunt, in multos ramos late fe fpargentes diuifi, qui infirmi funt, & nifi ridica fuflineantur, in terram procumbunt, fucci pleni: ex caulibus late *pedicellatæ* res, quatuorve uncias longi, hifpidi, flores fuflineantes, produunt. *Folia* habet in multis laciofas acutas, impari femper numero, Agrimonie foliorum infat diuifa, & per marginem incifa, alijs folijs minoribus interiectis, pallide virentia, afpera, & grauem odorem fpirantia. *Flores* plures, quorum finguli fingulis pedicellis infident, luteoli, ex quique folijs acutis compofiti, à calice viridi quinquefolio fufcentati, in quorum medio capitulum paruum rufefcens, apicibus donatum: quibus *fructus* fuccedunt, quafi in racemo difpofiti, Ceraforum forma & magnitudine; virides primum, dein per maturitatem rubentes, in quibus, non fecus quàm in Pomo amoris, copiofa humida medulla, & femina minutum albicans, & planum continetur.

Solanum hoc bacciferum 14. [vt vocat in pin. vel vt in prod.] Solanum 2. fiue racemosum Ceraforum forma: vel Cerafa amoris racemofa rubra, planta annua eft, & fingulis annis ferenda. Aliquando tamen etiam ex deciduo femine nascitur.

NUX METHEL VETERIBVS.

NVx Methel [Ieuc Methel] ex autoritate Auicennæ Serapionis eft fructus fimilis Nux.

Tom. III.

civomica, & femina eius fimile femini Mandragoræ [ita quoque legit Matthiol. & u. Lugd. Sed Iahi Ebenalbaranich Arabs Citri fimile dixit:] cortex afper: fapor eius delectabilis & vñtuoſus. Virtus eius frigida in quarto gradu. Si detur ex ea in potu vnum Kirath cum vino inebriat fortiter: ſi dentur duo aurei occidit ſtatim. Item: Nucis metellæ arbor, Vomica arbori non diffimilis fructum gerit Mandragoræ, oleolum, hifuto cortice, ſapore non iniucundo, Nucem Methel his ferè verbis deſcribit Andreas Bellunenſis. Nux Methel ex ſententia omnium Phyſicorum Syriorum & Agyptiorum fuſtus eſt cuiuſdam plantæ magnitudine & folijs Melonginæ ſimilis: vnde & à quibuſdam Arabibus Berben-gine nominatur, i. e. Melonginæ ſimilis. Flos huic eſt albus, magnus oblongus. Fructus nux Methel nuncupatus, eſt veluti nux afpera, cortice ſpiñoſo, intus ſemina habens Pomi Mandragoræ ſeminibus ſimilia, dulcia, pinguiora.

Nux Methel
Bellunenſis.

Berber-gine.

Monachi in Meſcenſis diſt. 3. dicunt, Nucem Methel eſſe fructum ſpinolum, plantæ cuiuſdam, Solatrū ſpinolum vulgò vocatæ, aſiūque Nucem Methel, ſiue Mo. hil, cum nuce Methel multum conuenire. Sed tamen in rei veritate Nux Mochil aliud eſt à nuce Methel. Quæ de re fuſius h. n. l. 3.

Bellon. Obſ. lib. 3. cap. 50. de variarum rerum experimentis apud Turcas, ſcribit eos ſingulare medicamentum inueniſſe, cognomento *Tatoula*, quod illi, qui vigilijs torquentur, quieſcere quæ non valet, dimidijs aſpri pretio exhibent, ſtatimque ſomnum conciliant. *Tatoula* autem nihil aliud eſſe quàm nucem Methel Arabibus dictam, Grecis Solanum ſomniferum, quam ſpontè nactentem in planis hiericuntis apud Melitæi fontem ſe reperiſſe ſcripto prodidit. Diſpiciendum tamen proponit Cluſius an *Tatoula* non ſit Garciz & Acoſtæ *Datura*, quæ Columnæ Solanum manicum.

Miratur verò Matthiolos quæ ratione ductus *Fuchſ. not.* Fuchſius vltimo libello, vbi tantum ſtirpium imagines in exigua formam contraxit, dixerit, Noces Metellas hiſpidos eſſe fructus peregrinæ illius plantæ, quàm antea magno volumine *Stramoniam* vocauerat. Idem prius reclamare ſuſpicatur Mauritanorum ſententiæ, à quibus harum hiſtoriarum prodantur.

Idem demum tam officinas, quàm Medicorum vulgus, plerumque legitimas Vomicas Metellarum loco uſurpare, & contra Metellas nonnunquam Vomicarum vice ſupponere, magnòque errore inuicem confundere teſtatur. At de horum lapſu fuſius alibi actum eſt.

Nux Methel, Rhafis teſtimonio lib. 3. cap. 30. facit ſtuporem, & quandoque pernicioſa exiſtes, inebriat, & nauſeam ac vomitum inferit. Item lib. 8. cap. 21. Narcotica eſt, ſedat, opilat, facit enomere. Si ex ea drachma ſemis detur, inebriat fortiter: ſi multum detur, occidit. His eadem ſunt, quæ Auicenna habet. *Srupefacit*, inquit, cerebro noxia eſt, cordi aduerſatur, carum adfert: drachmæ ſexta pars ſumpta inebriat, drachma vna eadem die interimit. *Ea nuxes*, inquit Matthiolus, cum intus in corpus ſumuntur, vertigines, & faciei ruborem inducunt: quin & oculorum caligines, temulentiam, inexpugnabilemque ſomnum: poſtremo oboritur frigidiſſus ſudor, vicinæ mortis præſagium. Auxiliatur noxæ excitatus pluries vomitus aquâ calidâ & oleo: poſt vomitum datur conuenientiſſimè butyrum & vinum metacum copioſum, additis Pipere, Pyre-

Bbb b 2

thro, Lauribaccis, Cinnamomo & Castoreo. Prodest & ægrotantium extremas corporis partes, nempe manus & pedes calidâ aquâ fouere, ac inde frictionibus rudi hiteamine factis calorem in vniuersum corpus excitare: cum eo tamen, aut subinde balanino, aut costino oleo perungantur affecti. Præstat idem exercitatio, proinde ad celerem gressum cogendi sunt, ut vniuersum corpus incalcescat: & pinguibus postea cibis dulcique vino refocillandi. In summa & his ea maximè conuenient curatio, quam epotum requirit opium.

STRAMONIA MVLTIS DICTA, SIVE
Pomum spinosum.

Descriptio



Cultior est, radice multifidâ, lignescen-
te: folia per
caulem longis
appensa pedi-
culis, ampla,
sinuata, graue
odorem spiran-
tia: flores, ex
longa tuba ca-
lathoides, am-
pli, candidi,
margine an-
gulofo, quina
in medio sta-
mina cum lon-
gis apicibus
occultat: quo-
rum vnum-
quemque se-
quitur pon-
tic orbiculatum,
iuglâdis puta-
mine callofo
adhu: involu-
ta magnitudi-
ne, bullatum,
breuitus que
spinis aspera-
tum, semine
compressio, ci-
nereo.

Gesn. lapsus



Gesn. hort.
Nux methel
Aucennæ,
Stramonium Fuch-
sij, Turcarum
Tatoula Bel-
lonij, vna ead-
emque est
planta. Ego au-
tem Tatoulam

Belionij, à Stramonio Fuchsij se-
paro. Ibidem
ponum verius quàm nucem dici autumat. Man-
dragoris adhuc annuerandam æstimat, aut po-
tius (si generis plantam, quàm Solanis inseren-
dam. Vel denique Lycopersicum Galeni, vel
Dioscoridis Pharicum constituerit. Sed quæ-
nam ex tot, tamque varijs opinionibus, firma &
positema Gesneri assertio? Tragus propter for-
mam Strichinis & Mandragoris accensendam iu-
dicauit.

Gesn. taxat.

Stramonium siue Pomum spinosum dicitur Tra-
go: Stramonium Fuchsio. Dodon. Gesner. hort.
Lac. Hist. Lugd. pag. 619. Camer. & Eyll. Stra-
monium peregrinum Lobel. in Adu. obs. p. 136.
[vbi & Lycopersicum Galeni] Icon. Plant. pag.
264. & Gerardo: Nux methella Math. Cast.
Acost. & Camer. Nux methel Aucennæ An-
guillar. Fusch. Gesner. hort. Nux methella
officinarum, Columnæ: Hyocyamus Perruina-
nus Cordo hist. Tatula Turcarum, Guiland.
pap. Hippomantes Cratæ Anguil. Gesner.
hort. Paracoccalon siue Barycocalon [*παρυ-
κόκκαλον*, aut potius *βαρυκόκκαλον*] Græcis recen-
tioribus: Melospianus Venetis: Malus Peruviana
Gall. Malum spinosum, Cæf. Corona regia qui-
busdam: Solanum Romanum Monspeliensibus
& Guilandino: Solani pomiferi 3. genus Cæf.
& Gesn hort. Solanum spinosum, Tab. Solan-
um 12. C. Bauh. phyt. Eid pin. Solanum pomi-
ferum fructu spinoso 4. siue pomo spinoso ro-
tundo, longo flore.

German. *Siechappfel*, *Kauchappfel*: Belg. *do* Nömi-
renappfel: Gallis *Pomme de Peru*, & *Pomme esps*. lingua.
neuse: accepimus nos Trojæ Gallorum nomi-
ne *Nesple d'Inde*, h. e. Mespili Indicæ. Italis
Pomo spinoso.

Cultur in hortis Germaniæ florens Augusto,
in quibus fructum difficulter maturat. Locus & Tempus

Fructus ipse ac etiam tota planta soporiferæ
sunt facultatis. Oliuus refert Thraces nucibus
Methellis velsi, vti Nucibus Iuglandibus Italos.
Stramonium fructu pharmacopæi & Physici O-
rientales ad stupefaciendum vtuntur, & Nucem
Methel esse affirmant, quia facultatibus ijs præ-
ditus sit, quas Nuci Methel Aucenna tribuit.
Eisdem autem effectus habere, experientia
comprobari testatur Dalechampius.

STRAMONIA ALTERA MAIOR,
siue Tatura quibusdam.



Est vbi hu-
manâ pro-
cetitatem adæ-
quet, ramis
patulis bra-
chiata, caule
crasso, subhi-
ruto: folia si-
nuata, Pedis
anserini voca-
ri foliorum in-
star, sed qua-
druplò, aut
quintuplò ma-
iora, abominā-
do putore na-
res ferientia:
flores ad ramo-
rum diuatica-
tionem ferè,
niveo candore
in-fignes, ex tu-
bulo pentagono in longum latumque calathum
explicantur continuum, per marginem quinos
mucrone totidem fissuris interceptos habentes,
odore grato, sed obfcuriore: in quibus lateat *sta-
mina* quinque longa herbida, apicibus ochris li-
nea alba variatis, vnaque pistillum albidum. Cæ-
terum floris tubulum obuoluit laxior folli-
culus

Descriptio

culus quinquagularis, totidem laciniis, totidemque mucronibus alternis, per oram diuisus: *fructus* succedit altero tanto maior quam luglans suo callo adhuc obdura, oblongus turbinatus, pungentibus spinis vndique senticosus, qui per maturitatem in quatuor partes aequales dehiscit, dissipamento membrarum, quibus *semen* copiosum adheret nigrum, compressum, medulla alba, sapore ingrato, distillans *radix* subest ex numerosis fibris compacta.

Notæ, quas *Garcias* *Daturæ* ascribit, non videntur omnes conuenire *Stramoniz* nostræ secundæ, quamvis nomen & vires quadrent. Foliis enim esse ait amplis, *Acanthi* similibus, minoribus tamen, in ambitu crenatis, gustu non nihil amaro, odorque *Raphani* folia aliquantum æmulantibus: floribus in extremis ramis colore *Rosmarini*, magna ex parte rotundis. Sed inepta proflus floris est comparatio, quandoquidem, monente *Clusio*, tum formâ, tum colore, cum *Stramoniz* aut *Conuoluuli* flore verius conferebuntur.

Acostia tria *Daturæ* genera describit: addens, Nomen huic plantæ esse in *Malabar* *Unmata caya*, in *Canara* *Dairo*, apud Arabes *Marana*, apud Lusitanos *Datura* & *la Burladora*, h. e. facta: apud Persas & Turcos, *Tatula*. Cæterum, *Stramoniz* fructum per omnia fructui *Daturæ* similem pronuntiat: atque si non nihil ab eo differt, id locorum varietati adscribendum censet. Primum, verò *Acostæ* *Daturæ* genus *Clusio* idem videtur esse cum *Turcorum*, qui *Constantinopoli* viuunt, *Tatula*, cuius usus illis perquam familiaris est. Nec abluere ab eo videtur *Stramonia* maior quam *Columna* *Solanum* manicum *Dioscoridis* censet. Figura autem *Clusij* apud *Acostam* minus concinna satis respondet nostræ *Stramoniz* alteri.

Bellon. Obs. *Tatula* *Turcarum*, *Nux methel* *Arabum*, *Solanum* (omniferum) *Græcorum*. *Cammer. hort.* *Tatula*, *Stramoniz* (species maxima: *Eid.* apud *Matth.* germ. *Stramoniz* alterum genus, *Stramonia* altera. *Ige kolben, fachelnus:* *Eid.* *Epit.* *Nuci metellæ* congener planta.

C. Bauh. phyt. *Solanum* 13. huc fecit dum pomo spinoso, semine nigro: *Eid. pin.* *Solanum* pomiferum fructu spinoso 5. huc fecit dum pomo spinoso oblongo: *Datura Acostæ* *Hist. Lugd.* p. 1912. & 1913. *Datura* 1. cast. *Datura* *Turcarum* *Eysl.* *Stramonium* spinosum *Gerardi:* *Dutroa* *Linschotani*, & *Datura* *Paludani*: variat floribus colore: est enim vulgari flos albus magnus: alterius flauus: tertij, *Hyosiam* floribus accedit: quare tres *Daturæ* *Costæ*; inquit *C. Bauhinus*: nunc & purpureo habetur. Nos *Dutroam* *Linschotani* & *Daculam* *Paludani*, diuersas a nostra *Stramonia* altera existimamus.

Nascitur in *Malauar*, auctore *Garcia*, vmbrosis locis, & secundum aquas, addit *Acosta*. In hortis verò *Germaniæ* semina supra sumum lata sæpè plantas produciunt, flores proferunt, & semina marurant.

De viribus, usu, & noxis dicendum restat. Inicitur, inquit *Garcias*, à floribus *Daturæ* flos aut eius semen, in cibos eorum quos deperdari volunt: mente enim quodammodo alienantur, quorquor id medicamentum sumunt, & in risum soluntur, magnâ cum libertate sinentes quod lubitum est deperdari. Durat verò hæc mentis alienatio viginti quatuor horarum spatio. Prima cura esto, vomitum cientia exhibere, ut quidquid in stomacho remansit, vnâ cum cibo reiciatur:

deinde euacuare & diuertere. Oportet validis clysteribus, & forti brachiorum cuiusque paulo supra pedem confricatione, ac fortibus ligaturis: interdum etiam cucurbitulas applicare: quæ si non iuuent, venam secare in maiore pedis articulo necesse est. Horum remedium vsum, nemo ex meis vnquam periclitatus est: sed omnes Dei beneficio intra viginti quatuor horarum spatium curati. Propinatur à plerisque hoc medicamentum ridendi & relaxandi animi gratia, cum vident eos, qui id sumperunt, velut amantes & ebrios ferri. Attamen non placet huiusmodi: & ne in seruis quidem experiri velim. *Ha- Temper. A. costæ.*

Genus Garcias. Quibus subdere lubet, quæ *Acostæ* habet. Literati plerique, inquit, atque etiam maxima pars medicorum in *Malabar* & *Canara*: itemque apud Arabes, Persas, Turcos, & Lusitanos, legitimâ *Nucem Methel* esse censent, frigidâque ex celsu tertio, & siccam secundi fine constituunt. Primo autem *Daturæ* genere *Datura* 1.

frequentius videntur: eius enim adeo vulgaris est visus, ut pauca sint meretrices: quæ inter sua requirit illud non recondant. Mala ergo inualuit consuetudo hæc apud impudicas solum mulieres, ut huius seminis in puluerem triti dimidiam drachmam ex vino, aut alia, quæ magis aridet, materiâ, præbeant: miser qui eum hausit, diu velut mente alienatus remanet, aut ridens, aut etulans, aut dormiens, plerumque etiam alteri colloquens & respondens, ut interdum etiam sanâ mente esse credas, tamen si mentis non sit compos, neque eum agnoscat, cum quo sermones confert, & colloquij habiti planè sit immemor, postquam ad se rediit. Sunt verò nonnullæ adeo exercitate in hoc medicamento exhibendo, idque sic temperare norunt, ut ad certâ, eâque quot velint horas, quibus id propinant: mentem adimant. Nonnulli tamén ad prouocandas vrinas ex medicis Gentilibus videntur. Porro si ad eorum, qui hoc semen hanterunt, curam euocentur Hispani Medici, medicamenta vomitum cientia exhibent, ut quicquid in ventriculo hæret, reiciant: acres deinde clysteres iniiciunt ad euacuandum, fortisque ligaturas adhibent ad diuertendum, tum etiam cucurbitulas adponunt, & venam secant. Gentiles verò Medici & Christiani indigenæ cum à cucurbitulis & ventosectione abhorreant, nihil aliud quam vomitum prouocant, fortisque ligaturas & fricationes adhibent: quæ si non sufficiant, balnea ex aqua castissima duo lida præscribunt ad eliciendum sudorem: Cæterum, neutro ex postremis duobus videntur, nisi ad necem inferendam. Nihilominus tamè *Brachmenes* Medici ex secundi semine [quod floribus est flauis] cataporia faciunt, granorum pipetis magnitudine, & magnæ sanè efficaciz ad sistenda alui profluvia, quibus adiuncta sit febris ardens: atque etiam in dysenterijs &c.

DVROA HERBA SOPORIFERA.

Considerandum an cum *Datura* iam descripta eadem sit *Dutroa*, de qua *Io. Linschotanus* sequentia scribit. Est herba in *Indiæ* *Goa*, *Dutroa*: quam *Dutroa* vocant, efficaci virtute ad somnum & stolidum saporem, si potui aut cibo inspergatur. Hanc maritis præbent, iisque turpi somno victis, ac velut mente captis, adulterino coitu illudunt. Inde veneficia, paratæ in maritorum caput insidiæ, & noxia potio, mortis in certum tempus, euentu nunquam irrita, destinata & prorogata. Et pariter feminis ab irato marito certa mors.

HYOSCYAMI VETERVM IN
genere.

CAP. III.

Hyoscyami
etia gener.
Diosc.

HYOSCYAMUS frutex est caules emittens cra-
sos [Orib. πολλοὺς,] folia lata, oblonga, diui-
sa, nigra, hirsuta: secundum verò caulem, conti-
nuâ quasi serie flores prodeunt [Matthiolus non
floribus sed filiquis ista tribui debere censuit,
Sarracen.] tanquam Punicorum cytini, scutulis
septi seminum plenis, ceu Papaueris. Tria por-
tò sunt eius genera, inquit Dioscorides. Vnum
siquidem flores profert penè purpureos, folia
Smilaci proxima, semen nigrum, ac cytinis præ-
duros & spinulos: alterum flores habet luteos,
folia & filiquas molliores, teneriorêque, & se-
men sublauium, Irionis semini simile. Ambo in-
faniam gignunt & soporem, idèq; vix in com-
munem vltm recipiuntur. Tertium genus quod
mitissimum est, adeoque ad medicinam vtile,
pingue, molle, & lanuginosum: candidis floribus
ac semine. In maritunis rudèribusque nascitur.
Albo itaque vtendum est: idque si desit, fla-
uum vsurpari oportet. Nigrum enim ceu deter-
ritum improbat. *Recentis seminis*, foliis cau-
libusque tulis succus exprimitur, qui ad Solem
exsiccat. Vltus autem eius ad annum dontaxat
protogatur quia facilè corruptionem sentit. Eli-
citur & separatim succus ex semine, cum inaruit
assus aqua calidâ, rufo & expresso. Est autem ex-
pressus eiusmodi succus liquore seu lacte eius-
dem succo præstantior, leniendisque doloribus
accommodatior. Ipsa verò herba vitens con-
tusa, farina è Tritico trimestri additâ in pastil-
los conformatur & reconditur [in antiquo Lac-
codice legit *πυραίνῃ ἀλῶν ἢ πηλῶν*, hoc est, fa-
rinâ Selami aut Rutæ. *Αἰδ. αἰτιαὶ ἀλῶν ἢ πηλῶν*
ῖν.] Potrò prius succi genus, & quod è secco se-
mine exprimitur, collyriis sensum doloris auge-
rentibus vtiliter inferuntur: prolunt & contra
acres calidâsque fluxiones, aurium dolores ac
vulvæ mala. Cum farina autem polentaue, con-
tra oculorum, pedum cæterorûque partium in-
flammationes. Semen eadem præstat, præterea-
que ad tussim, destillationem, oculorum fluxio-
nes, dolorêque efficax, itémque contra fluorem
muliebrem, alâsq; sanguinis eruptiones, si oboli
pondere cum Papaueris semine ex aqua multa
bibatur. Subuenit & podagris, testibus inflam-
matis, mammisq; à partu tumentibus. Deni-
que & aliis cataplasmatibus, quæ doloribus leua-
mentum præstant, vtiliter admiscetur. Quin &
in pastillos digesta folia medicamentis omni-
bus dolores sedantibus tum per se, tum etiam ex
polenta vtiliter imponuntur. At recentia fo-
lia [additur in vet. cod. Lac. *λεῖα*.] illita, ad mi-
tigandos omnis generis dolores apprime sunt ido-
nea. Eadem terna, quaternâve cum vino pota,
febres epialas depellunt. Cocta verò olerum in-
star, & tryblj mensura elitata, mediocrem men-
tis alienationem faciunt. Aiunt & idem efficere
si cui in colo vltus sentienti infundantur. Cæ-
terùm, radice in aceto decocta dentes vtiliter in
dolore collouuntur.

Plinius quatuor recenset genera, cum tamen
secundum & quartum vnum & idem sint.
Breuius sic Galenus. Hyoscyamus, cui semen
atrum est, infaniam ac soporem adfert: is cui se-
men mediocriter flauum est, propinquam ei fa-
cultatem habet, Verum utriusque fugiendi sunt,

vt inariles ac deleterij. Cæterùm cuius semen
ac flos candidus est, ad sanationes maximè ido-
neus est, ex tertio quodammodò ordine refrige-
rantium.

Hyoscyami epoti noxæ auxiliatur aqua mul-
sa copiosè data, auctore Dioscoride, lacq; præ-
sertim asininum: si desit, caprillum, vel bubulcū,
vel aridarum Ficuum decoctum. Faciunt etiam
ad id nuclei pinei: item Veticæ semen, Intubus
erraticus, Sinapi, Nasturtium, Cæpa, Allium, &
hæc singula cum vino sumuntur. Postea sinendi
quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt,
vt excoquant. Et hisce Dioscorides remediis con-
tra Hyoscyami maleficium pugnavit. Et sanè
non malè damnavit aliquis naturam eius, quæ
adèò humanæ menti noxia, vt in furorem homi-
nes agat. Nec minùs etiam demirabitur Gentes,
quæ non tam multis, quàm honestis appellatio-
nibus optabilem ignaris & admirabilem fece-
runt plantam, quæ alioquin ob eam, quam dixi-
mus causam, ableganda vltra Sauromatas fuerat
& glaciale Oceanum, vt aliofio locis illic na-
scens ante maturum semen tota aliquando periret.
Nisi fortè contra vota hæc nostra intulerit
aliquis tam grauem noxam non minore bono
eam rependere, optandamque in orbe nostro
plantam quæ tam efficaci remedio contra dolo-
res, quibus tota aliquando perire vita, hominis
pugnet. Nec quia menti noceat, idèò doloris li-
nimenta, quæ habet, abicienda. Partum sapienter
enim quia malo coniunctum sit bonum ex altero
vtrumque damnatur: cum liceat distrahis in di-
uersa contrariis malo prudenter carere, bono
autem foeliciter vti. Quod in Apollinari herba
præsertim faciendum, quam Græci *ἰσοκλῆμον*, hoc
est, *sum Fabam* idèò vocauerunt, quòd, vt in hi-
storia sua retulit Helianus, pasta eius conuellan-
tur sues præfenti mortis periculo, nisi copiosâ
aqua statim se foris & intus proluerint. Alij, vt
fit in desiderio salutis, & suauiore voluptatis sen-
su, cum ope eius à dolore ad indolentiam quasi
diuino quodam beneficio restituti fuissent, non
amplius Hyoscyamum à suisbus, sed à loue *Dyo-
seyamum* [*Ἰσοκλῆμον*, hoc est, *Louis Fabam*] dixe-
runt. Eadem nominis ratione illi etiam vñ sunt,
qui à medicinz auctore Deo Apolline, *Apollina-
rem* herbam, & *Pythionem* eam dixerunt. Fue-
runt contra qui à maleficio eius *Emmanes*, id est,
furiam, siue in infaniam & furorem agentem
eam nominauerint, & à lomo, quem facit, *Hypo-
noticon*: Superstitiosè ac incertis nominibus,
alij *Adamantem*, alij *Adamenion*, alij *Aromon*,
alij *Auginon*, alij *Dichyambion* dixerunt. *Py-
thagoras* & *Othanes* *Xyleona* vocauerunt: *Zo-
roastres* *Typhonion*: Latini *Infanam* ac *Denta-
riam* [pro his fortè malè *Trag. Inananoentia-
riam*] *Prophetæ* *Rhopoticum*: *Ægyptij* *Saphtho*:
Hetrosci *Fabulum* vel *Fabuloniam*: Galli *Beli-
nuntiam*: *Daci* *Dieliem*. *Apuleio* dicitur etiam
Augmon, *Alterculum*, *Calicularis*, *Ginga*, *Remen-
tia*, & *Ligea*. *Serapioni* *Bengi*, *Anerthi* *Elloc*.
Matthæus Syluaticus plura alia Hyoscyamo no-
mina tribuit, videlicet, *Dens caballinus*, *equinus*,
Cassilago, *Papienses Medicos* *Hyoscyamum*,
Herbam pinulam, aliòsque *Canicularem* & *Ca-
niculatam* appellare testis est *Iacobus Manlius*.
Sunt denique & inter Latinos scriptores, qui
Symphoniacam herbam etiam vocauerint, *Pal-
ladius* scilicet *Octobri* mense cap. 12. & *Apuleius*,
inquit *Marcellus*, nonnullarum illarum nomen-
clationum rationem reddens.

Cæterùm

Cæterum, Hyoscyami nomenclaturam sequentes obtinere stirpes. Hyoscyamus vulgaris niger. Hyoscyamus albus. Hyoscyamus albus minor. Hyoscyamus luteus, Creticus. Hyoscyamus Creticus alter. Hyoscyamus peculiaris flore purpurascens. Hyoscyamus Syriacus. Hyoscyamus terribis vel potius quartus Matthioli in Epit. Camerarii, Hyoscyamus luteus Dodonæi, nobis Priapæ, quibusdam Nicotiana minor dictus. Hyoscyami tertia species Gesneri, Nicotiana maior dicta. Hyoscyamus peregrinus Dalechampi, nobis Solani species ex Apennino dictus, de quo antè.

HYOSCYAMVS VVLGARIS.



Ore fœdulo fici le se prodiit Hyoscyamus niger, nufquā non obuius, foliis Spinæ albe, nollibus, lanuginosis, incanis, copiosis, nullo ordine in caulibus, crassius, densa lanugine obfusus: flores confertum e-nascentur, calathi effigie, lutei, purpurascensium linterarum crebro discursu

versicolores, foris hirsuti, purpurantibus apicibus, stiloque medium occupantibus: pericarpium hirsutum, oblongum, stile. Glandis instar, quinque-partitis acuminatis oris seminis pusillum nigrum continet. Radix subest crassa, rugosa, foris fusca, intus alba, miris olitis quā foia.

Hyoscyamus Bunselii. Turn. Matthioli. Lac. H. Lugd. pag. 176. & Cæsalpino: Hyoscyamus vulgaris Gesn. hort. Thol. & Eyst. Hyoscyamus 1. Anguill. & Tabern. Secundus Gesn. Trago: Hyoscyamus niger Dodon. Lon. Lobel. n. Adu. Obs. pag. 139. Icon. Plant. p. 268. Cast. & Gerardo: Hyoscyamus flautus Eublio: Hyoscyamus niger vulgaris Cluthii. Alciacus Falsip. de vuln. Apollinaris Cordo in Dioscor.

C. Bauhin. phyt. & pin. Hyoscyamus 1 sine vulgaris vel niger foliis modò integris, modò dissectis, modò in ambitu in lacinias acutas diuisis.

German. Bilsenfaenen, Bilsenkraut, Schlasakraut, Döllerkraut, Seebenen. & Tr. J. J. Auger: Item Ziegenkraut: & Rindsvornitzel: Belg. Bilsen & Bilsenkraut: Gallis de la Hanebane, quibuldam de l'herbe aux tignes: nonnullis Insularum & Endormie. Italis Insquam: Hispan. Yelenho. Yelenno & Meunendo: Angl. Henbane: Vng. Belenda, quæ vox Hispaniæ valde offinis.

Hyoscyamorum familiarissimus calidis & frigidis campetribus vbiuis Europæorum niger: floribus mense Augusto feminam pizidula succedunt, Lobelio. Secus vias vbiq; ferè gignitur in sabulosis, & locis haud coltis.

Hyoscyamus omnis refrigerat, soporifer est,

& dolores sedat: aduersus acres calidasque defluxiones oculorum, aliarumque partium prodest: sanguinis eruptiones & muliebria profusua compellit, & ad testium aliarumque partium inflammationes adhibetur. Pictones ac Andegauenses aduersus pruriginem commendant, indeque vernaculo sermone l'herbe aux tignes vocant: solent enim illarum provinciarum rustici istam plantam, iam maturam & semine onustam, in camino suspendere, deinde Hieme cum illis manus frigore tument, citinos eius carbonibus inspergere, fumumque exhalantem manibus excipere: isto enim vapore non modò tollitur manuum tumor, sed etiam prurigo illa molesta, frigore contracta: Clusium docuit Iosephus Scaliger. Nobis indicatum per nobilem feminam Alaticam vapore semine Hyoscyamo excitato in stuphis torporem & soporem in loci lauantibus: idem accidere gallinis ex eius suffragio in gallinario. Si per tria quartana paroxysmorum principia singulis vicibus si. si. Fel. Plat. seminum Hyoscyami optimè cum vino generoso detur, ægum sine subio liberari promittit Timor. Roslinus. Ex eodem Oleum ad arthritidem conficiens: neutrum autem probamus. D. Hyoscyami præparatione ad Laudanum vide Quercetani Pharmaciam restant.

HYOCYAMVS ALBVS.



Hyocymus albus, non tantum flore alterius parialbo est, sed & albatris striatis multo candidioribus magi que hirsutis, vasculū obuolueribus semine albedo refertum: adde filia hirsutiora, albiora, quæ tamen Nigri foliis magnitudine cœsunt, laciniata: caulis quoq; eadem

illâ densiore lanugine est obfusus, quem vt celeri ortu, eodem quo satius est anno protrudit, florèmq; & semine perficit, ita perennitate vincitur, vt qui non nisi semel sit vitæ. In nostra erupta imagine flores potissimum displacent.

Hyoscyamus candidus Trago [qui iestine describit] & Dod. gall. Hyoscyamus albus Matthioli. Dod. lat. Gesn. hort. Turn. Lac. Lob. Obsp. 139. Icon. Plant. p. 269. Lon. Cast. Hist. Lugd. pag. 177. Camer. Ger. & Eyst. Hyoscyamus albus mitior, hirsutior in Adu. Hyoscyamus 2. Tabern. Hyoscyami alterum genus in matutinis Cæsalp. Hyoscyamus albus admodum à cæmuni figura differens, Alpino. Apollinaris 3. Cordo in Dioscor. Hyoscyamus 2. sine albus maior, vel 3. Diosc. & 4. Plinij.

In Norbonæ ad Aurantium siue Auracum & inferius, eis, transque Rhodani ostia, variis sa-

Synonyma

Locus

torum & vernaculorum fecus vias marginibus sponte adolescit. Belgio, Angliæ & Franciæ in hortis feritur & moritur quotannis. Cayri prope pyrides nascitur.

Vites &
vitis

Dolor Den-
tium.

Hyoscyami albi rufa planta fictili vasi inditur, cui subtus foramina sunt facta, cui alterum vas apponitur, & in terram omnia reconduntur tam diu donec liquor exstillet. In doloribus dentium & aliis topici loco non contemnendum remedium, si teste Cam. à perito Medico adhibeatur. Sic molis effractum semen, & pressum, oleum reddit ad idem vtile. Aliter sic præparatur. Semen Hyoscyami album siccum ac recens accipitur, & contusum cum aqua calida, velut de amygdalino dicitur, subigitur. Et dum insolatur, partes ipsius quæ sub manu resiccantur, ad totam massam ammiscuntur, & idem hoc donec nigrescat, ac grauiter oleat, repetitur. Dein excolatum & expressum reponitur. Facit ad aurium dolores, & in pestos ammiscetur, vt quod molliendi vim habeat. Hyoscyami albi mitior & tutior multo vus. In Cayro non secus quam Stramonio vtatur.

HYOSCYAMVS ALBVS MINOR.

Synon.

Locus



diorib. mollioribusq; Nigro foliis, nec ita lacinia-
tis, sed potius quod tammodo in vasis, breuiorib.
fatis crassius, longiore pediculo fultis: floribus al-
bis, minoribus; calicibus læuoribus.

Hyoscyamus. Creticus luteus minor.

Descriptio



Floris est fe-
minore, circū-
scriptio pæ-
nè rotunda, la-
cinato, & ve-
luti circum-
roso, hirsuto,
pediculo vn-
ciali: caulis cu-
bitalem & ses-
quicubitalem
assequitur pro-
ceritatem, ra-
mosus, albedo
villos obductas:
flores vncialib.
hærent pedi-
culis, è longo;
hirsuto, striato,
calyce profu-

lientes, lutei, fundo purpurascens: semen min-
imum, rubescens.

Clusio Hyoscyamus albus Creticus, siue quar-
tos. C. Bauh. pin. Hyosc. 4. siue Creticus luteus
minor.

Ex semine Sturgardiam per Casabonam Hyo- Loc.
scyami lutei Candix nomine misso, Montbel. Tempu-
gardi floruit mense Iunio & adhuc Augusto.

Hyoscyamus Creticus luteus alium etiam
tradit & describit Clusius, qui ipsi maior inscri-
bitur: C. Bauhin. verd pin. hyoscyamus 5. siue
ue Creticus luteus maior: pro quinto in phyt.
prod. & Matthiolo descriptus & picto.


HYOSCYAMVS PECVLIARIS FLORE purpurascens.



HYOSCYA-
mus pec-
uliaris, vetu-
sto quodam
semine subal-
bido, siue ci-
nereo, Came-
hort. natus,
flore per ini-
tia pallidi co-
loris, elegan-
tioris tamen,
quam qui in
vulgari habe-
tur, postea
purpurascen-
te & incuruo,
non æquali-
ter patulo, vt
reliquorum,
sed altera par-
te aliquan-
tulum, repando: foliis alterius Hyosc. [Priapæe.]
sed lætius videntibus & multo minoribus. Planta
vltra cubitum non assurgit. Conuenit autem
cum Beze à D. Paludano ex Syria delato, à quo
sola foliorum latitudine discepat.

A. C. Bauh. in pin. sub Hyoscyamo sexto com-
prehenditur.

HYOSCYAMVS SYRIACVS.



BEZE plan-
tia rara à De-
paludano ex
Syria delata
prosum cum
præcedente
conuenit, solâ
foliorum lati-
tudine discre-
pans. Dicitur
& Beze: Germ.
Syrischer Bil-
sen: Gall. Ha-
nebenede Syrie.
Cæterum, Ca-
merario au-
thores ipsa plâ-
ta plerumque
huius iconis
quantitatem
quinquies in
se con-

se continere deprehenditur. Describitur à Clusio in pann. p. 520. Hyoscyami peregrini rubello flore : & in post. hist. Hyoscyami Ægyptij siue 2. flore rubello intusulatione.

Is fortè est, cuius Bellonius cap. 75. & 88. lib. 2. Obs. meminit, & in Ægypto frequentem esse asserit: quem etiam apud Halepam se observasse scribit Rauwolfius lib. 1. cap. 9. sui Hodæporici.

C. Bauhin. pin. Hyoscyamus 6. siue rubello flore : Hyoscyamus peregrinus rubello flore Clus. pann. Hyoscyamus Syriacus Camerarij. Cur quoque separat Hyoscyamum Ægyptiacum Clusij h. ab eisdem Hyoscyamo peregrino in pann. Nuncquid utriusque eadem descriptio? Cursinquam, in pin. septimum facit & cauliculis spinosissimis esse ait. Clusius equidem in Hyosc. Ægyptio spinarum non meminit. Hac de re igitur indagandum erit.

NICOTIANA MAIOR, SIVE

Tabacum majus.

CAP. IV.



Haud ita ludū nostro cœlo soloque affuenit Nicotiana siue Petum Indorū, tanta nobis æstiva, caule tres aut quinq. vel plures cubitos alto, pollice crassior, teretis, hirsuto, copiosā mellis albicante pleno: huic folia ampla, Helenio vel Hippolapatho maiora, nullo pediculo, latis appendicib. cau-

li adnata, hirsuta, modicè in acumen desinentia, à medio nervo longitudinem percurrente transectis, nonnihilque sinuatis productis venis, crassis, alternatim dispositis, sapore acido & feruido, sed euanido: mallicata & contrita, colore luteo inficientia: color tum cauli, tum folijs ex herbido in luteum pallescens, utriusque ad tactum glutinosi: caulis fastigium in furculos aliquot ducitur, ad quorum diuaticationes foliola longiuscula, quorum singulis flos in fides tres circiter viciis longus, rubulo hirsuto herbæque concolori, paulatim laxiore reddito, tandemque in cala hum explicato purpurascens, indursum, cuius margines tamen in argulos quinque accuntur: flore continentur cum pistillo stamina, quorum apices cinerula aspecti sunt grisea: floris autem imum obuallat utriculus in quinque laciniis diuisus: semen copiosum, minutum, rufescens, minus quàm in Pipapæ, vasculis clauditor conicis, Auellane vulgaris oblonge minoribus. Radix alba, fibrosa admodum, insigni acrimonia est prædita. Tota planta odorem habet satis grauem.

Nicotiana [à Legati nomine] Lon. & Hist. Lugd. p. 1895. Nicotiana maior Tabern. Nicotiana 1. siue maior latifolia C. Bauhin. phyt. & Tom. III.

pin. Tubac & Tubacka part. 5. Ind. or. & part. 6. & 8. Tabacum, Tabaco & Tabacca part. 8. & 9. Ind. Occid. Tabacum [nomine ab Hi panis imposito, ab insula, in qua abundat] Monardi: Tabacum latifolium Cam. Eyst. Petum Theueto [cui & Herba memoriam tollens] Camer. ad Matthiol. germ. Petum latifolium Clus. ad Monardem: Sana sancta Indorum, Lob. in Adu. Obs. pag. 316. Ic. Plant. p. 589. & Gerardo: Herba sancta Clus. ad Mon. Herba sanctæ crucis femina, Castori: He. ba reginæ, Clus. ad Monard. & Camer. horr. Herba panacea, Ægid. Eueratio: Herba Legari, Portugalesibus: Vulnetaria Indica Camer. horr. Pontiana Geln. ad Arer. Hyoscyamus Peruvianus Dod. Camer. ad Matthiol. & Clus. hist. Eid. ad Monard. Hyoscyamus niger: Hyoscyami tertia species Gesl. hort. Tornabona [quia à Tornabonio missa] Cæalp. Peribacenne, Ouedo: Pucelt, Indis: Yppóvvoc, Virginæ indigenis: Arbutum, cuius folia exsiccant, & quorum accesorum fumo inebriantur, Benzoni lib. 1. cap. 13.

Cæterum, Galli, quod Ioannes Nicotius regius Nicotiana: aliquando in Lusitaniam Orator, eius semen prius ad Reginam Regis Galliarum matrem detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herbam Reginæ nuncuparunt. Alij verò Herbam sanctam ob admirandas eius virtutes. Alij Buglossum antarcticum.

Ægid. Eueratius, qui Herbam panaceam [vix dictum] vocat, & Herbam Medicam, Herbam Prioris, & Herbam sanctæ crucis, cum habitu ipsorum facultatibus, Consolidam in tantum referte dixit, ut speciem eius quandam suspicari non absurdè liceat, potius, quàm hyoscyami lutei, vix usum nonnullis fuerit. Nec, quod fumo ebrietatem quandam accersat, proinde hyoscyami speciem constituerit, cū eam tum folijs ac calicibus, tum vultu ac semine satis referat, &c. Nos autem iustam tantam similitudinem agnoscimus cum Consolida, ut habitu referre eam possit, & species eius quedam dici queat: folia alia, caulis, flores, & semina plurimum differunt, ac etiam ipsæ facultates quicquid dicat Ægidius. Non placeat etiam eum dicere siliquam in orbem Mali specie vixisse, siliqua enim oblonga est: id quodam modo posset dici de Pipapæ, cui flos luteus. Non tandem existimamus quemquam, cui cognita fuerit Nicotiana & hyoscyamus, approbaturum similitudinem, quam Ægidius in eas constituit.

Letius asserit Nicotianam Petum dictam, verum Brasiliæ norum Petum non esse, nec quicquam commune habere: Autorem Domus rusticæ affirmare Nicotianam, à Nicot dictam, qui primus ex Portugallia in Galliam miserit, ex Florida allatam, quæ ultra mille leucas à Bresilio distet: Eam verò in hortis Galliarum ob cæli inclementiam adulescere non posse.

Germ. Tobacken, Indianisch vundtkraut, Indanisch Beinwuelle, der Alten Kuenigkraut, & heilighkraut. Gallis, Nicotiane, Herbe de la Rosne, Genevæ Presidiale. Ital. Tornabona, Herba Sancti Croce: hisp. Petum, Tabaco. Sunt denique qui Elemosinariam vocant.

Nascitur plerisque Indiæ locis, humidis præsertim & vmbrosis, & exculco lentique solo. Seritur omni tempore: cum verò prodiit, à frigore præseruanda est, & secundum parietes plantanda ad eorum ornatum: siquidem toto anno viret. Citriorum modo, referente Monarde. Nascitur omni solo [inquit Clus.] & semel sata, se-

Cccc

Tempus

meinq; ad maturitatem perducens, seipsam deinde ferit, nec opus habet alia sarione. Si tamen ferenda erit, Augusto aut Septembri id fiat, quoniam semen ex gummi diutissime sub terra latet, antequam germinet : & Martio aut Vere telluri creditum deinceps Augusto germinat. Floret autem hæc planta calidioribus regionibus Iunio & Iulio, semen Septembri maturet[ur] [vidi in Lusitania tota Hieme florentem,] at alibi à mense Augusto in Hiemem vsque floret, & subinde semen profert, deinde primo gelu flaccescit, peritque tota; neque Hieme assuetuari potest, nisi admodum difficultè, idque fictilibus aut capsis ligneis, in quibus satis, in fornem aut penum illatis, uti Viennæ Austriæ fieri amat, ubi ante fenestras non tam ornata, & umbræ gratia, quam ob insignes facultates, de quibus deinceps sermo erit, præsertim à nobilibus quibusdam matronis, rei herbariæ studiosis, colitur.

Temperam.

Calida & sicca est in secundo gradu : itaque calefacit, resoluit, mundificat, & aliquantulum adstringit, ut ex sequentibus facultatibus iudicare licebit. Confert enim Tetanum : Dentium dolorem : Pectoris vitia : Lienis & lecoris obstructions : Cruditates ventriculi : ventris tinea : Nephritides : Suffocationes uteri : Articulorum dolores : Perniones : Venena : Carbunculos : Ictus virulentos : Vulneta : Polypum : Podagram, Impetigines : capitis scabiem : Asthma : Famem : Sitim : recreationem, & alia innumera, ut fassus & specialius in huius tomii Appendice docebinus.

NICOTIANA SIVE TABACVM FOLIO angustiore.

Descriptio



capitula, semina ex maioris comparatione addiscuntur.

Petum angustifolium.

Clus. apud Monardem, est Petum angustifolium, siue Petum alterum paulò minore folio, Solano, quod Bellam donam vulgò vocant, simili; sed magis mucronato, longoque pediculo inherens : floribus per umbellulas natis saturatoribus aliquantò : radice, ex illius, lignosa & multifida.

Priapeia apud quosdam non bene nuncupatur : Siquidem nec effigie, nec habitu, nec radice, nec colore, nec aliter Satyrio respondet.

Camer. hort. Tabacum angustifolium : Lob. in Synonym. Icon. Plant. p. 483. Tabacum siue Herba sancta minima : Obi. p. 116. He. ba. sancta siue Tabacum minus : Cast. Herba sanctæ crucis mas : Dodon. Hyok. yamus Peruvianus alter : Sch. v. enckf. Nicotiana minor, & Sana sancta minor : C. Bauh. phyt. & pin. Nicotiana 2. siue maior angustifolia : & Eyst. Hist. Lugd. p. 1895. Alterum Tabacum minus Lobelij, siue icona : An Perebecenec eiusdem Historiæ?


NICOTIANA SIVE TABACVM MINVS.



Peti maris & formæ semine deciduo, spontè in Belgij hortis Petum tertium siue Peti tertia quondam & dubia speciem sibi natam ait Clusius apud Monardem, superioribus paulò humiliorem, cuius folia, ut in maiore, caules amplectitur, sed multò angustiora, etià infra secundi generis foliorum amplitudinem : floribus tamen saturatiùs rubentibus magis hoc quam illud æmulator.

Tabacum minimum Camer. hort. Tabacum, siue Sana sancta minima Lob. in Ic. Pl. p. 88. Sana Synonyma, siue Tabacum minimum eidem in Obi. p. 316. & H. Lugd. p. 1896. Nicotiana 4. siue minima C. Bauh. phyt. & pin.

PRIAPEIA QVIBVS DAM NICOTIANA MINOR.



Rebris albis donata est huius radice minimo digito suppar : caulis cubitalis & sesquicubitalis, rotundus, ramosus, hirsutus, glutinosus : folia Bellæ donæ, pinguis, hirsuta, subalbida, gustu acri, graui odore Matrh. flores calathi effigie, ex luteo viridates, oris extrorsum reflexis & in quinque lacinias obiter diuisis, foris hirsuta.

ris hirsuti splendent, iatus glabri, nullo splendore nitentes : apices staminum cineracei : insidet autem flos calyci hirsuto, viscido, quinquepartito: *pericarpium* subrotundum, umbilicatum, glandem virgæ virilis detestam representans, *semen* continet pusillum, maius Nicotiana, sublauium: Lobel. Irionis, & pusillum, gustu acre, vnde Rondeletio dicta Priapæa.

Clus. Petum 4. siue Peti aliud genus, pet omnia minus, folio rotandiore, nec hirsuto, pinguius, licet succulento, flore minore, & per extremum rotundo, pallefcente.

Hyoscyamus luteus Dod. Gesn. hort. Lon. Camer. & Gerardo, atque Anguill. qui multum cum secundo Dioscoridis conuenire ait. Lob. in Adu. *Hyoscyamus solanifolius* dubius, inter *Hyoscyamum* & *Solanum* furiosum ambigens. Cap. de Sana. sancta Indorum dicit *Hyoscyamum* luteum esse non posse. In Obsp. 1. 40. Dubius *Hyoscyamus luteolus* [*Solanifolius* addit in Ic. Plant. p. 269.] potius calefaciens, quam refrigerans, vt minus rectè scripsit Matthiolus. *Hyoscyamus Peruvianus* Tabernæmontano. *Hyoscyamus niger* vel 3. Matthiol. Cast. & Hist. Lugdun. pag. 1717. Nicotiana 3. siue minor, C. Bauhin. phyt. & pin. itémque Eysl. Tornabona congener, Celsalp. Priapæia, à forma fructus, Gesn. hort. Peti 3. genus Euerardo.

Semel in horum translata in semine vndique nimis copiose repullulat, & mense Maio apparere incipit.

Ad pleraque, ad quæ Petum, conferre, verum longè imbecillius esse, testatur Clusius. Matthiolus eiusdem cum cæteris *Hyoscyamis* naturæ esse scribit, adeo vt ordine tertio completo refrigeret, & soporem inducat. Sed quis obsecro assertioni [Euerardus etiam perperam humidum & frigidum statuit] Matthioli subscripserit: Lobelius neutiquam vsu receptam, aut exploratam dixit. Porentius passim Nicotianam vocant & ad eadem vtuntur. Aqua verò stillatitia saporem vehementer acrem præ se fert. Herba aduersus pediculos utilis est, & imprimis pulices necat, vt in canibus periculum fieri potest. Nam folijs huius affricatis cuti, vel sucro illito, tanquam incantamento fugati decidunt. In Italia semine vtuntur ad priapissimum sedandum, & hinc fortè Priapææ nomen illi inditum fuit.

HERBA COHOBBA INEBRIANS. CAP. V.

Huius meminit P. Martyr. l. 9. dec. 1. sequentibus: Cum de belli euentu, de annonæ, de incolumitate, Zemes [deos suos] reguli Hispaniolæ Insulæ consulunt, domum Zemi dicatam ingrediuntur, ibique per nares absorpta *Cohobba*, sic herbam vocant inebriantem, quæ & Boitij in furorem statim vertuntur &c.

C. Bauhin pin. fortè est Nicotiana 5. quæ in insula Mambonit, Pyratæ comestâ inebriantur & dementantur, ita vt omnia pericula postponant: part. 7. Ind. or. 20.

HERBA CASSIANA, FAMEM, sitimque retardans.

CAP. VI.

E Nicotianæ sextæ [vt vocat in pin. C. Bauh.] siue Cassianæ herbæ succo potionem constituit. Tom. III.

ciunt in Florida, quam, vbi in locum periculosum se conferunt, bibunt, eoque famem & sitim per horas 24. tollunt: part. 2. Amer. nauig. 4.

BVGLOSSO SIMILIS PLANTÆ Indica.

Nascitur apud Gangen flouium plantæ hæc Buglossio consimilis, quam conterentes succum ipsius seruant; & profundâ nocte latibulâ Tigridum circumfundunt: ipsæ verò propter facultatem effusæ viriditatis cum progredi non possint, moriuntur, sicuti memorat Plutarchus, non Cheroneusis ille, ex opinione Callisthenis in l. 3. venationum.

HELLEBORVS ALBUS ET NIGER veteribus.

CAP. VII

Helleborus niger, & albus videntur æquiuoca [veluti æquiuocè dici apparent, Gaza.] sed de facie differunt [varia sententia est,] alij enim similes esse aiunt, & solo colore inter se differre [præterquam quod radices colore inter se differant:] Esse namque vnius radicem [hoc vocabulum radicis omittit Gaza] albam, alterius nigram: Alij folium Nigri laureum [*S. aquatilis*,] albi verò porraceum [*apocynifolia* sed fortè legendum *variegata*] reddunt: radices autem similes, colore excepto. Qui similes dicunt, formam huiusmodi tradunt: caulem modò prope Albaci, sed longè breuiorem: folia continuò radici annexa: sparsaque humi: radicem valdè [largè Gaza] multiplicem. Nigram equos, boues, suesque necare affirmant, idèoque eos non depascere [idèoque eum cauere, Gaza.] candido autem pecudes pasci. Atque hinc primò vim deprehensam, cum illo pecudes purgantur: tempestius Autumno, Vere autem intempestius. Niger vbique nascitur: nam & in Bœotia & Eubœa, & multis alijs locis: sed optimus Heliconæ, ac in totum is mons medicaminibus laudatur: at candidus locis paucis exit. Optimi verò & vnicissimi quatuor sunt, Oeræus, Ponticus, Eleaticus, Mallioticus: nasci Eleaticum inter vires aiunt, & vinum vsque aded reddere prouocans vrinam, vt omnes qui bibunt graciles admodum ventre adducto efficiantur. Omnium tam eorum, quam reliquorum optimus est Oeræus. Parnassius verò & Ætolicus [proueniunt etiam ibi multi, emunt & vendunt ignari] durisunt & summæ difficultatis. Hæc igitur quam formâ conueniant, vires tamen proprias fortiantur. Elleborum non solum radice, sed etiam fructu est vtile. Si quidem in Anticyra [vt fertur] fructu [cautè tamen dandus cum validius purget] eius purgantur, quem Sesameum fert. Hæc inter alia sparsim Theophrastus addens cap. 8. Ellebori imas radices, atque tenuiores, [supernam enim in caput extuberantem, inutilem esse asserunt,] & canibus dandam cum purgandum est, [succidi oportet. Item cap. 8. addit, Chios Eudemus arte minimè laudatus, Elleborum bibens, non purgabatur, & viginti duas aliquando purgationes vno die sumpsisse se retulit, foris apud vasa sedentem, nec surrexisse priusquam esset meridies, tunc verò domo petitâ, balnea ingressum cenatumque morè solito,

Theophr.
Hellebor.
niger & al.
bus.

Ellebori ca.
pus canibus
dandum.

nec quicquam euomuisse. Hic tamen auxilio quodam præparato cohibuit : aceto enim acrisperam pumicem bibulis se retulit post septimam Ellebori potionem, rursumque ex mero eodem modo egisse. Tandem de caus. lib. 6. cap. 20. Elleborum nascens in Oera monte, melius Parnassico est. Validius enim esse illud putatur, minusque aptum medicamini. Causa quamobrem validum ita, similis, atque in fructibus. Aëris enim duricia, nutrimenti que largitate grauitas in eo quoque tractu, sicut in Bœotia prouenit. Porro alius ager ad alias vires idoneus est, quemadmodum in fructibus quoque perficiendis animaduertimus. Sunt etenim loca, quæ ne excoquere quidem vilo modo vires medicas valeant. Quippe multis in locis, & niger Elleborus hebes imbecillique comperitur. Unde credi haud temere possit, aëre frigido & solo aperto, atque etiam alimento modico, opus esse. Et quidem venena, in montibus plurima nasci videntur, & in ijs maxime, qui altissimi sunt, atque amplissimi.

Diosc. Elleborus albus.

Elleborus albus, ex autoritate Dioscoridis, folia fert Plantaginis aut Beræ filuestris, sed breuiora, nigriora, & [dorso] colore rubra, caulem palmi altitudine concauum: qui quidem tunicas quibus inuoluitur, abdicat cum arescere incipit. Radices subiacent numerosæ tenues ac fibrosæ ab exiguo & oblongo capitulo, ceu Cæpa exennites, eidemque annexæ. Nascitur in montosis & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum autem habetur Veratrum, quod modicè extenuum est [πετυμένος vet. πετυμένος Sar.] candidum, fragile [ὀυδαυρος. Alter ὀυδαυρος, sed perperam, Sar.] carnosum, minime exacutum, aut luncum referens, aut dum frangitur puluerem emittens, sed renuem habens medullam, gustuque non admodum feruens, neque salinum subinde ciens: humiosum siquidem strangulat. Primatū tenet Anticyrenum. At Galaticum æque atque Cappadocicum emendius est, & puluerulentum, maioremque strangulandi vim habet. Purgat per vomitum varijs coloris humores: collyris admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiendi vim habet: menses pellit partuque necat, appositum: sternutamenta mouet, ac mutes interficat cum melle & polenta subactum: quin & carnes colliquat & absumit, si coquatur vnā. Datur & jejunis per se, itemque cum Sclamo, & puillanæ aut alicæ cremore, aut cum aqua mullæ, aut pulte, aut lente, aliâve sorbitione. Sed & cogitur cum pane, atque ita inassatur. Apparatus verò insuperque victus ratio videntibus accommodata diligenter ab ijs tradita est, qui ex professo de ipsius dosi scripturarunt. Sed maxime Philonide Siculo Enneco assentimur. Longum enim foret, in hac, quam præcipue institimus, materię medicæ tractatione, victus rationem ad medendum necessariam simul & semel exponere. Sunt tamen nonnulli qui dent ipsum cum larga sorbitione, aut copioso cremore: vel etiam exhibitio parciore cibo post illico Veratrum offerant: ac ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut corporis imbecillitas adest. Illo enim modo summentibus purgatio periculo vacat, quod non intempestuè iustorve citius medicamentum corporibus accedat. Cæterum, & sedi subditæ ex eo balani cum aceto vomitici nes concitant.

Elleborum nigrum.

Porro Helleborum nigrum aliqui Melampodion, alij Ectomon, alij Polyrhizon vocant, Melampodion verò appellatur, quoniam caprarum pastor nomine Melampus fureantes Præti filias eo primus purgasse & lauasce creditur. Fo-

lia ei viridia, Platani similia, sed minora, folijs Spondilij proxima [ἀπὸ τῆς ἀσπιδίου: vet. carer S. rac.] pluribus diuivitis scissis, nigriora & subaspera: caulis breuis [ἀσπιδίου, vt legit etiam Serap. & non ἀσπιδίου asper, Sarac.] flores candidi purpurascens. figurâ racemosi [βοτρυόδης. Quidam ἐξιδίου, docti nonnulli βοτρυόδης, Sar.] Semen intus Cnici quod & Anticyræi Sclamoides vocant, & in purgationes adhibent. Radices subsunt, tenues, nigre velut è capitulo quodam Cæpæ similis dependentes, quarum etiam usus est. In asperis, editioribus, siccitibusque locis nascitur. Optimum quod ex locis eiusmodi petitur, quale quod ex Anticyra: nigrum enim inibi probatissimum gignitur. Eligi debet carnosum, plenum, cui tenuis medulla sit, acie denique gusta, feruensque. Huiusmodi est quod in Helicone, Parnasso & Ætolia nascitur: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat per inferiora [τῶν ἀπὸ κατωτέρων: Corn. legit nigrum. vt ex ver. Capparet. Ioh. Bauh. Sarac. addit indubitanter ita legendum] trahitque pituitam & bilem, datum per se, aut cum Scammonia & sale, Drachma vna seu obolis tribus. Deoquitur & cum Lente, ac iusculis quæ purgationis causa sumptantur. Prodest verò in comitialibus articulatibus morbis, itemque melancholicis, insanientibus & paralyticis. Subditum menses trahit & partus necat: fistulas inditum ac tertia die exemptum purgat. Similiter in auditu difficili immittitur in aurem, ibique ad biduum triduumve finitur. Scabiem quoque sanat cum Thure aut cera, aut pice ac cedrino oleo perunctum. Viriligni verò, impetigini ac lepris ex aceto impositum per se medetur. Dentium dolorem coctum cum aceto collatione mitigat. Septicis etiamnum medicamentis admiscetur. Quin & hydropicorum ventri cum farina hordeacea & vino vtiliter imponitur. Porro autem confectum proximè Virium radices, vino inde expresso vim purgandi conciliat. Sed & eo domos aspergunt, purgandi expandique vim illi tribuentes. Quamobrem & qui ipsum effodiunt, stantes Apollinem & Æsculapium [de his etiam, ac obscurius Theophrastus] precantur, obseruantesque aquilæ volatus: eam enim alitem tradunt non citra periculum aduolare, atque etiam ei mortem inferre, quem Veratrum effodientem [morum eo anno succedentem cui Aquila prope aduolauerit: Thophr.] conpexerit. Celeriter quoque effodistur oportet, quoniam habitu auræ suæ caput aggrauat: quapropter ad id præcauendum: effossus Allia præsumunt, vinumque subinde sorbent: ita siquidem ab afflatu secutiores, noxæque minis oportuni reduntur. Cæterum, Veratrum hoc candidi modo etiam emedullatur. Veratrum, inquit Plinius, duo sunt candidum & nigrum. Viraque caule palmi quadrantis altitudine Dioscorid.] ferulaceo, bulborum tunicis conuoluta, radice fibrata [simpliata M. & CH.] Cæparum modo. Nigro equi, boues, sues necantur, itaque cauent id, cum candido velscantur. Tempestiuum esse tradunt messibus. Plurimum autem nascitur in Oera monte: & optimum vno eius loco circa Pyram. [Pyra, siue Rogus, locus est in montis vertice, in quo sacrificantem Herculem arsisse ferunt, cum impatentia doloris victus in accellam lignorum fruem se proiecit.] Nigrum vbiue prouenit, sed melius in Helicone, qui mons & alijs laudatur herbis. Candidum probatur Oetæum: secundum Ponticum: tertio loco Eleaticum, quod

in Vitibus nasci ferunt: quarto Parnassium, quod adulteratur Ætolicum [Parnassium & Ætolicum, vendentes & ementes multi discernere nesciunt: duri sunt, perquam rugosi, & flaccidi, Theophr.] ex[de]letur hæc vox in vet. vicino. Nigrum ex his Melampodion vocant, quo & domos [ita & Dioscor.] suffiunt purgantem spargentes [aspergentes se, M.] & pecora, cum precatione solennit[er] eo purgant & sues, & oves, carmen quoddam occinentes, Theophrast[us] hoc & religiosius colligitur. Primum enim gladio circumscribitur. Dein qui succilurus est, Ortum spectat: & precatur, ut id liceat sibi concedentibus Diis facere, observatque aquilæ volatus, ferè enim secantibus. interest: & si prope aduoluit, moriturum illo anno, qui succidat, augurium est. Nec album [arum Dioscor.] facile colligitur, caput aggrauans, maxime nisi præsumatur Allium: & subinde vinum forbeatur, celerit[er]que effodiatur. Nigrum alij Entomon [Cestemon Dioscor.] vocant, alij Polyrhizon: purgat per inferna. Candidum autem vomitione, causâque morborum extrahit, &c. Drusum quoque apud nos, Tribunorum popularium clarissimum, cui ante omnes plebs stans plausit, Optimates verò bellum Maricum imputavere, constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam (vt diximus) Sesamoides admiscet. Cauendum est felici quoque cura, ne nullo die detur: quippe impatibiles cruciatus existunt. Nam Æstate potius, quàm Hieme dandum [Aph. 4. l. 4.] non est dubio. Corpus septem diebus ante præparandum cibis acerbis (esui radiculae cum oxymelite:) abstinentia vini, quarto & tertio die vomitionibus [leuioribus, Gal. comm. aphor. 13. l. 4.] pridie cœnæ abstinentia. Venant dari finibus & pueris: item mollis ac foeminei corporis, animæ, exilibus aut teneris, & foeminis minùs quàm viris. Item timidis, aut si exultata sint præcordia [intestina], vel renes, aut alie partes sub hypochondriis sitæ, vt ventriculus, Dal.] vel tumeant, minimève sanguinem excreantibus, causticis, vel latere, vel faucibus. Medetur morbis Comitialibus, vertigini &c. quæ ex ipso fonte petantur, Dal. hæc inter alia. Plinianis adscribit, Sex modis sumitur Veratrum album. I. radícula torâ nocte confixa eius festucis ad Drachmas sex, postridiè sumitur ex oxymelite. II. infusum in hemina aquæ pluuiæ ad Drachmas sex, citra decoctionem, post triduum bibitur. III. decoctum lib. i. in duobus sextariis aquæ, additis mellis l. a. percoctum, ad cochlear magnum lingitur. IV. Segmenta minutim forfice concisa, suffutis magnitudine, ad drach. ii. datur cum alica, prissana, hydromelite calidis. V. puluis crassusculi forbetur cum cremorè prissanæ, ad drachmam i. VI. puluis tenuissimus ad scetipulos quatuor, cum melle formatis catapotii deuoratur. Antylus & Posidonius apud Ætium.

Galenus tam album quàm nigrum Helleborum extergentis scribit esse facultatis & exsiccantis: quamobrem ad alphas, lichenas, pforas, leprâque accommodat.

Si partes, quæ sunt sub septo transuerso, dolor affligat, nullamque ad iugulum de se significationem præbeat, alium Veratro nigro, aut Peplio emolliendam esse docet Hippocrates, ea quidem ratione, vt Veratro quidem Daucum aut Selsi aut Cuminum, aut Anisum, aut aliud quidpiam bene olens admisceatur: Peplio verò Lactis succus. Quanquam autem inter se misceantur

tur vnius sunt generis, neque dissimiliter agunt. Sed Veratrum nigrum tum melius, quàm Peplii ventrem soluere ait, tum etiam ad iudicationem magis valere: Peplium verò status magis crumpere facere. Dolorem autem hæc duo sedare. In subditio Veratrum album aut nigrum apponit. Porro si quid effluens ex vtero, mordcat, & summas osculi vteri oras viceret, diurnâ flore fluxionem asserit. At si minimè copiosa fuerit, Lenticulæ decoctum cum Veratro, vt vomat exhibet. Nigrum ex aqua tenuiter tritum, & in pesto superpositum, aquam vultu è carnibus educere idem scribit. Veratrum etiam ex vino dulci, cur vomat exhibet. Lolij & Tritici melle subactum subiicit. *Et hæc passim Hippocrates.* Quem his verbis taxabat Democritus: Ad me venisti Hippocrates, vt tanquàm insano Veratrum exhiberes à stultis hominibus, persuasus, &c. Si ab his persuasus mihi tanquàm insano Veratrum propinasses, prudètia in insaniam euasisset. Veratrum. n. sanis exhibitum, menti tenebras offundit, insanis verò multum prodesse consuevit. *Plura de virib. vide stylo de Elleb. albo.*

Scaliger ait Theophrastum lib. 9. cap. ii. de Elleboris rectitate sententias ad eò absurdas, vt pudeat. Laurinum folium attribuerè nigro, & Porri albo, pari mendacio: Album esse folio Gentianæ: nigrum digitato, vt Crotonum. Elleborum album radicem habere initio non multiplicem, vt nigrum: sed simplicem, quæ postea spargatur in fibras: idque in verbis Theophrasti manifestè intelligi. Eum enim dixisse *πεπληγόν* non simpliciter: sed *ταύτην* magnâ efficacia articulâ. In Aruernis & Ruënis, Album penè omnia animantia vel interficere, vel malè afficere. Stragulare enim equos & cætera iumenta. *Nunc, si Scaligero Elleborus niger est Italicus flore modo albo, modo purpurascens, is nobis videtur dici posse folio Laurino: partes enim digitatæ singulares conveniunt cum folio laurino in multis, nec ea similitudo ita absurda apparet, nolimus propterea asserere Italicum Elleborum Theophrasti: multa enim obscura in eius historia. De albo Elleboro nolimus Theophrastum accusare mendacij, sed existimamus potius textus vitium: quid enim si pro *πεπληγόν* legamus *ρεδγόν*, nervis abundantem, quibus sanè Plantaginis modo abundat, quæ etiam *αλκυονίδων* dicitur: apud Plinium etiam & Dioscoridem Limonium vocatur Neuroides. Limonium verò dictum Neuroides appellatur à Plinio Beta fluestris, cui etiam Dioscorides comparat folia Ellebori albi.*

HELLEBORVS ALBUS.

Helleboro albo *radices* subsunt fibrosæ, albæ, in caput collectæ: *caulis* bicubitalis interdum, teres, *folijs* stipatus, quorum pediculus caulem inuoluit: sunt verò ipsa *folia* formâ quidem quodammodò plantaginea, vel potius Gentianæ similia, longitudine verò pedali, haud multò angustiora, mollia, liris densissimis striata, & velut plicata, subhirsuta: *caulis* à medio ferè ad cacumen usque ex foliorum quorundam paruorum altis *thyrsos* emittit palmates & sesquipalmates *florum* creberrimorum, senis, ex herbaceo albicantibus foliolis radiis constantium.

Vulgates herbarios confundere Didamnum; Helleborum album, & Sigillum Salomonis, testatur Cordus in Dioscoridem.

Turpe profectò esse novitio rhizotomo Matthiolo neminem iturum inficias arbitratu Gul-

Lindius in Theone, Consiliginem, à Græcis Hel-
leborum candidum dicit, nondum cognoscenti,
collatis præsertim Vegetij, Apſyrti, Columellæ,
& Plinij verbis.

Helleborum album in Alpium summis iugis



Comp. rar.

Elleb album
flore nigro.



Nom. ling.

αυδιστον, ενδωπον etiam nuncupent: Latinis Hel-
leborus & Elleborus albus, itemque Veratrum
album: aliis etiam Sanguis Herculis dicitur,
Arab. Cherbaben abaid. German. vveiß Niesz-
wurrt, Schanpanier wurrt, el. h. e. vt Tragus red-
didit, Campania, & alicubi hemervurtz, vt Con-
radinus in lib. suo de Hung. febre recitat. Belg.
wittenieffs wortele, aut vunt Nieswurrt. Gall. El-
leboro ou Veratre blanche. Ital. Elleboro bianco &
Veladra. H. sp. Verde gambre blanco & yerua de
balleste. Angl. hellebor. Boh. kaychavvka. Hung.
Feyer hunyor. Ελλεβορος autem secundum Erymo-
logium dicitur Ελλεβορος, quod est
perimar, Veratrum quoddam mentem vertat.

Synonyma

Elleborus albus Brunfels. Trago, Fuchs. Cor-
do hist. Gesner. hort. Ang. Lon. H. Lugdun.
Clus. hist. Elleb. albus flore herbaceo Eysl. Hel-
leborus candidus Græcorum, Consiligo Vegetij,
Abſyrti, Columellæ & Plinij, Guilandino in
Theone: Veratrum album Dod. gall. Turn. Lac.
Cordo in Diosc. Helleborum album Matthiol.

sæpius quidem

obseruavit

Turnerus, sed

sæper animad-

uertit cacumi-

na demotſa,

quantumque

meminit, cau-

les multo pede

lôgiore, qua-

re veteretur, ne

παχυστατον

malè à Corna-

rio sit reddi-

tum, palmitu-

ditudine.

Sturgardia

in horto ill.

Principissa

anno 1608.

in mense Julio

obseruauimus

Elleborum al-

bum flore ni-

gro, vt vocât,

caule ad alti-

rudinem ho-

minis fusco &

maculato, nō

dū tamē flores

expansi erant.

Flore atro ru-

bente, & ex

viridi albesc-

cente, etiam

inibi obserua-

uimus.

Ελλεβορος

Græcis,

& quandoque

sine aspiratio-

ne. Sunt qui

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

αυδιστον, ενδωπον

πρυραπαρην

καλλου, πο

Lob. in Adu. Obs. pag. 167. Ic. Plant. pag. 37. Cæ-
salp. & Castori. Helleborus albus 1. sine flore
subviridi C. Bauh. phyt. & pin. Eid. Helleborus
albus 2. sine flore atro rubente: Helleb. album
floribus atrorubentibus præcox Lobelij Icon. Pl.
pag. 167. Elleb. albus alter floribus nigri-
cantibus Dod. flore ex purpura nigricante Clus.
hist. Ellebori albi alterum genus Cæsalp. Hel-
leborus albus Germ. flore atro rubescens Eysl.
Mas Tab. icon.

Gaudet Veratrum album montanis & asperis, Locus
& non modò in Græcia, Italia, aut aliis calidio-
ribus regionibus verum & in Germaniâ, ac Hel-
uetiorum montibus viret: vniut & in hortis.
Floret Æstate: messibus aut sub Autumnum le-
gendæ sunt radices, vt & plerisque Pannoniæ &
Austriæ siccioribus pratis, vt obseruauit Clusius.

Mefuzo albus Elleborus minùs est tum acer Mefuzo

quam niger, tum etiam minùs mordax, neque

mox acrimonia eius appareat, si amarior est nigro.

Cætera nigro facultate est similis, nisi quòd diu-

tiùs seruari potest: calidus siccus in medio tertij,

similiter tergit, mordet, sed vomitu multo pur-

gar, & sternutamenta violentè mouet, Viran-

dus autem est quòd stranguet. Nam vomitu im-

modico & violento symptomata excitat terren-

da, foris autem afficitur cutis vitia, scabiem, im-

petigines, lentigines valenter iuuat: albus itaque

Elleborus quia huius tempestatis corporibus est

molestus, velut venenum præsertim suffocans, vi-

tetur, Et paulò post: Vtriùsque Hellebori virtu-

tem ex corpore deturbat mulla, decoctum vna-

rum passarum, aut hordei, aut gallorum, aut gal-

linarum, cum oleo nucum, vel Amygdalarum

dulcium, vel simili: puluerem verò Hellebori

sumere tutum non est: datur autem à siliquis sex,

ad tertiam drachmæ vnius, vel vsque ad drach-

mam vnam.

De Hellebori facultatibus Carmen scripsit Maer

Macer, quod ita habet:

Helleborum geminis species testatur habere,

Album quod sursum purgat, nigrumque deorsum.

Vim siccam, calidamque tenet, & tertius illis,

Est in viroque gradus: nigro violentius album

Dicitur, &c. Ellebori radix per 24. horas vino

aut oxymelite mace ara, posteaque resicata, po-

test, inquit Tragus, dimidie drachmæ pondere,

aut saltem tanto, quanto pro constitutione vniuf-

cuiusq; opus esse videbitur, cum vino exhiberi,

furiis & melancholicis. Sin verò potiunculam

ex illa præparare vuleris, tum velobiduo vino

illam maceabis, aut iute carniū decoques, &

cyathum mediocrem ex illa exhibebis ægroto:

hæc purgatio ramerſi & aluum & vomitiones

moueant, nullo tamen periculo coniuncta est. El-

lebori radix acro decocta, ac in ore aliquandiu

retenta, dolorem dentium tollit. In lixiuio de-

cocta, si illo postea caput ablus, pediculus

& furfures enecat: idem vnguento aliquo permista

efficit.

Albi Ellebori dilurum exhibuimus. [Matthio-

li verba sunt] quibudam melancholicis, magno

saue succellu, nullo tamen ægrotantium incom-

modo, nullaque noxa: quòd non alia ex causa

euenisse putarem, quàm quod in Tridentino

agro aliique circumflorimis locis, ea forasse sit

illius cœli temperies, vt non adeo perniciosus fa-

cultatibus scateat vtrumque Helleborum, quem-

admodum illud quod in calidioribus prouenit

regionibus: tamen non dubitarem etiam v-

triùsque acerrimam vim reprimi, ac corrigi pro-

ptiis

priis quibusdam acutis medicamentis. In germanico Botanologic cautionem addit: Veratrum album vehementer est medicamentum, nec sine additis refrænantibus assumendum: quamobrem nusquam legitur Genus radicem eius intro dedisse, sed docere duraxat quâ ratione foris sit usurpanda, ad herpetâ scabiem, & omnem curis impuritatem, quod placet eam intra corpus usurpare, prudenter id sciendum, idque solummodo in morbis magnis ut epilepsia, vertigine, mania, hydrops, ichthia, convulsione, elephantia, & similibus, & quidem hoc modo: primum radices Hellebori albi, viginti quatuor horis macerantur in vino aut oxinice, post siccantur, in pulverem teruntur, cum drachma semis ex vino calido manè propinquant: Possunt eadem radices biddum in vino, aut diem unum in iure carniū macerari, & colamnis cyathus parvus dari: non male adderetur Ciamomum tritum. Verum enimvero non debet adix hæc feni, ptero, fœminæ, nec vili delicato ari. Sunt qui hoc modo vancur: excavatur Raphanus, cui radix Hellebori immittitur, obdito operculo, sinuntur duos dies & noctes, postmodum aucto Helleboro exhibetur Raphanus, qui purgationes molitur.

Elleborum utrumque dicit Gesnerus [si cum aceto & melle decoquatur, ut Syropus fiat:] medicamentum innoxium, & ad plerosque phlegmaticos morbos [thoracis & capitis in primis, ut asthma, Dyspnœia, epilepsiam] *συνεχρον*, sæpe utilissimè se experitum esse: alium enim vrinam, & meatus omnes, etiam cutis, misicè nullâ molestiâ expurgare. Perplacet eidem D. Chrysof. Houberti [olim discipuli sui] medicamentum, quo corpus recreatur & stomachus expurgatur. Recipe autem Ellebori albi drach. β. aquarum Vnc. ij. Fit infusio per dies 14. post exprimitur per filtrum, & dantur pro vice drach. ij. cum vncia vini. Tandem eiusdem Gesneri, aquæ Elleboratæ descriptionem accipe. Ellebori albi Vnc. β. Gentianæ vnc. i. Flor. Centaurij minoris M. i. Anisi drach. ii. baccar. Juniperi drach. vi. Cinam. el. Vnc. β. Maies, Zingib. an. drach. β. Aqu. Fœniculi, Hyllopijan. Vnc. ii. Mellis despumati Vnc. iii. destillentur in cinere [ni fallor addit etiam acetum aliquot vncias: inquirendum diligenter.] Huius liquoris vnciam semis dedit, cum aliquo syrupo, in gravissimis & desperatis quibusdam morbis, febribus præfettim, & summa cum admiratione profuit illico manifestè, nec aliud incommodum attulit, nisi feruorem aliquem stomachi, sed brevem.

Demum, ut Alianus animal. lib. i. cap. 60. perhibet, farina ad Veratrum admixta antea alucos dispersa perniciem adfert lacertis, insidias in apes facientibus & omnibus commemoratis animalibus. De Elleboro & Hispanorum ex eo toxico consulendus est Io. Langius epist. med. l. i. epist. 68.

ELLEBORVS NIGER FLORE ALBO, interdum etiam valdè rubente.

Elleborus, cuius hic iconem exhibemus, radicem habet numerosis fibris, vulgari paulò crassioribus donatam: folia à radice pediculo epithamæo, crasso succulento, tereti, punctis purpureis, ut Dracunculi maioris, notato, appensa, diuisa vtpriorum in folia nouem, viridantia, læuia, rigidiora, crassioraque, quam in vulgari flo-



culento & maculoso, ex foliis quinque caudidis, vogue purpurascens extrinsecus, lubrotundis, striato venularum discursu præditis, ad floris imum foliolum oblongum integrum, pauloque inferius aliud tanquam vagina, interdum diuisum in plura: floris medium occupant staminula multa lutea brevioraque, cum corona decem duodecimue tubulorum virentium: succedunt filiquæ corniculatæ inortæ, septenæ, in quibus semen fit interdum, ut eunte in semina flore, eius folia tam intus quam extrâ colorem contrahant ferrugineum. Aliquando noster Elleborus florem habet valdè rubentem, interdum album pro anni constitutione.

Dod. gall. Plantam leonis inscribit, & Ellebori secundam speciem facit, floribus albis instar niuis, qui postea virides fiant. Latin. Veratrum nigrum. i. dicitur, quod flores habere ait initio albidos, deinde purpurascens, postmodum virentes. Is licet hanc plantam non recipiat pro vero Elleboro nigro, eam tamen probè nouisse non videtur, dum flores ait euadere virentes, sed potius duas plantas confundere.

Lobel. in Adu. voc. t. Elleborum nigrum [Ic. Lob. Plant. 681.] german. *Christvurix*, Belg. *Schvartze Nieskruyt*, Angl. *Ore bele*, and *seier wortte*. Ital. [addit in Obs. p. 388. vbi etiam Napellum Auicennæ Guilandi.] *Elleboro nero*: Hispan. *Verde gambre nero*, & *serua de valleteros*. Ait autem ex Pyrenæis & Alpinis in hortos transectum, in eunte Hyeme, interdum paulò post brumam flores dare ex candore rosos, interdum albos, nonnunquam purpureos: à se collectum in Apenninis Bononiæ. Congruè describit, sed ineptum nomen germ. belg. ital. & hispanicum, vtpote alteri plantæ familiare, huic tribuit: non autem asserit an Dioscoridis, quia dubitat an textus eius corruptus.

Mathioli in Dioscor. tradit Elleborum nigrum cum candidis floribus, quod alterum facit, solo colore distingui ab eo, quod purpureos, & altero, quod herbaceos habet flores: hoc autem alterum & tertium genus adeò viribus imbecillia esse, ut ferè nihil ad alium deiciendam præstent, id quod facto periculo se didicisse scribit. Omnibus in vniuersum eandem esse foliorum speciem. Cæterum, Solerij ineptam ait esse opinionem, æstimantis in scholiis in ætj priores libros, Elleborum hunc, flores Rosa-

re viridi, lata, obtusa, serrata, in extremi folij ora & paulò inferius, crenis autem viduala reliquâ portione tota: pediculi singularium foliorum, ut & aucti folij nervus, purpurascens: inter folia flores occultantur pediculo plurimum palmari & sesquipalmari succulento

Plant. Leonis
Dod. gall.
Veratrum
nigrum.
Lat.

Elleb. nigr.
Lob.

Lob. nep.

rum modo purpureos ferentem, itémque albos, esse Lycodoni, vel Cynodoni Aconiti esse speciem. In comm. post. quamvis dixerit in principio solo flore differre omnes tres Hellebori species: tamen postea ait, folia non esse in omnibus similia: ac ibi describit speciem floribus purpureis, & altera albis, ut solo colore differentes, & folia diuersa ab Ellebore floribus herbaceis, proferentes. Descriptio quidem eius non male conuenire videtur cum nostro Ellebore nigro floribus albis: veluti etiam eius figura, quam ponit in post. comm. sub titulo Ellebore nigri. In Hist. Germ. nescio quomodo factum ut mutatae sint figurae & descriptiones: pingit enim nostrum Elleborem nigrum floribus albis, pro Ellebore. 2. nigro: decriptio etiam quae secundo loco data conuenit Ellebore floribus albis, quamvis eo loco tantum purpurei meminerit coloris, & in descriptione praecedenti faciat omnino similem eam speciem, quam herbaceum florem habere ait, cum ea quae album profert, quod approbare non possum: *Suspicio* ipsi non bene fuisse perspecta Hellebori nigri vulgaris genera.

De nostro Ellebore nigro plantam exhibet, cuius folia descriptioni optime respondent: quoniam tamen caulis laevis est, non alper, femina verò Anisofimilia, ruga a, non autem Cnicus, non possum verum Helleborum nigrum pronuntiare. Nec ausim affirmare mihi inquam obseruatum Helleborum nigrum legitimum. Hoc tamen ausim affirmare, eius defectu licere uti hac specie, quae quotannis perit, quantum supra tetra est.

An Monardi ex versione Cluside nouo Orbe. Helleborus niger Hispanico similis, & iidem facultatib. praeditus. An idem H. Lugd. ex Monardi p. 1907. sine icon?

Clus. hist. Elleboreus niger legitimus, albo, amploque, Roë iustar, flore, qui marcescens purpurea cit.

An Veratrum nigrum Striatum Tabern.?
C. Bauh. phyt. Helleborus niger 3. siue flore magno purpureo. *Est. pin.* Helleborus niger 4. siue flore roseo: Elleboreum nigrum Matth. in comm. & Icon 4. p. 836. Cast. H. Lugd. & Camer. Planta leonis Dodon. gall. Elleboreus niger flore magno purpureo Gesn hort. Helleborus niger 2. Dodon. xi [c. gall.] H. Lugd. Veratrum nigrum 1. Dodon. latin. Legitimum Clus. pann. Striatum Tabern. Elleborei nigri alterum genus Cæs. Elleb. niger annuus Anguill. Nigro legitimum Clus. hist. Nigro verus Gerardi.

In variis hortis & siluis Elleboreum hunc obseruauimus. animaduertimusque eundem pro anni constitutione flores ferre albos aut rubentes valde, etiam non marcescentes. Flos ut plurimum initio albidus, deinde purpureo, postremo virens.

ELLEBORVS NIGER VVLGARIS,
flore viridi vel herbaceo, radice
diuturna.

Descriptio **H**ic tum ab hortenſi flore albo, tum ab adulterino manifesto discrimine coniungitur: licet eam radices fibrosae, nigrae, exq; numerosae, similitudinem magnam cum hortenſi flore albo insinuent, dissimilitudinem verò cum adulterino, reliqua tamen plantae facies differentiae fidem faciet: folia enim ampliora, viridis herbacei, te-

neriora quam villis reliquorum duorum, in plura segmenta conciduntur: si gulae & laciniae in acutum mucronem, non breuium more hortenſis flore albo, deinunt, ambitu se, ratz, nec tam



saturo colore tinctae, nec tam rigida ut adulterinam verò flores pediculis palmatibus & dorantalib. haerentes, colore sunt herbaceo, adulterini Elleborei æmuli, quinis maioribus foliis constantes, umbilicum obfidentibus apicibus crebris, pallentibus, semen corniculis aliquot surrectis coniungitque

aliorum more continetur.

Christus vult, i.e. Christi radicem, appellant, inquit Tragus, eo quod quandoque circa Seruatoris nostri Christi natalem diem flores producat, praesertim quando temperatior fuerit Hiemis: Aut certe *Christus vult*, quod clysteribus quoque adiciatur, quos Germani *Christen* vocant. Recentiores contendunt eam esse Elleborem nigrum Dioscoridis, nec multum ab illo abludit descriptionem. Ego verò sentio Consiliginem esse Ruellij, cuius meminit & Plinius. Matthioli contra Consiliginem esse negat, Veratrinigri speciem herbaceos flores proferentem esse autumnans.

C. Bauh. phyt. & pin. Helleborus niger 2. siue hortenſis flore viridi: Elleboreus niger Binnell. tom. 1. thap. 2. & in 4. p. 35. Helleb. niger nostras Cordi hist. Elleb. niger vulgaris Gesner. hort. & Cæ. alp. Elleb. niger alter Matth. Elleb. niger tertius Dodonæi & Matthioli H. Lugd. Elleb. niger adulterinus domesticus Tragi. Ell. nig. adult. hortenſis Fuchf. Pseudo-helleborus niger Dodon. gall. Helleboraster alter [siue Consiligo] Lob. in Aduers. Helleborastrum in Obs. p. 87. Icon. Plant. p. 684. & Gerardo: Veratrum nigrum Cordo in Diosc. Secundum Lac. Dodon. Clus. in pann. & hist. itémque Tabern.

Ellebore noir Gallis dicitur, ut & *Patte du Lion*: Belgis *voiercruyt*, *vaancruyt* & *vaencruyt*, Ger. *Christus vult*. Anglis *Beere foote*. uip. *Verdugambre negro*, y *gerus de Valleſeros*: Hung. *Fekete hujor*.

In hortis variis occurrit. In Italia abundat montibus Euganeis: floret mense Febr. In Hassia pratis prouenit: affertur Gillenius. Clus. authore copiose crescit ad Viennensis salus initium, quæ Vienna ad Carthusianorum canobium Maubach & Tulbingam iter est, vmbrosis locis, & vicinioribus etiam ad silvarum margines.

Huic cum genuino Ellebore eadem facultas: virentes, idémque temperamentum, testatur fecit experientia. Purgabit itaque perinde atque genuinus inferiorem ventrem, pituitam & flauam bilem ducens, & cætera eadem cum illo præstabit.

BUPHTALMVM DODONÆI,
aliis Consiligo tenuifolia.
CAP. VIII.

Non ab similibus Hellebori radici huius fibro-
la radice, quæ sicca qualis in officinis pro-

stat, selqui-
palmatis, fi-
bris nigrican-
tibus tenuio-
ribus constat,
quàm Helle-
bori nigri ra-
dix à capite
magis etiam
diuiso pen-
dulis, sapore
amaro prædi-
tis, non parua
tandem acri-
moniam re-
linquentibus:
caules aliquot
proferens spi-
thameos, stri-
atos, tenues, in
quibus folia
tenuissimè
dissecta, Eran-
themii quorū-
dam, seu Flo-
ris Adonidis
modo, sapore
subamaro, o-
dore, ubi atte-
rantur digitis,
intuui: flores
pulchri, flau-
i nullo excel-
lente odore,
ex foliis sedem
oblongis,
striatis acumi-
natis, circa
mucronem
nonnihil cre-
natis, compo-
siti: in medio
artere a pluri-
morum stami-
num partium

herbitorum corōna capitulum circumstat, ob-
longum, echinatum, ut in Ranunculis: subsunt
flori quina folia hirsuta, viridantia.

Dux nostræ icones sunt ex emptis sculptis:
natura verò placet, quia non adsunt omnes
partes.

Tragi verum & nigrum Elleborum Ingelhei-
mii effodiunt inter Bingium & Moguntiam, de-
feruntque Venetias.

A minoris Sesamoidis Dioscoridis historia
non multum abluere testatur Cordus in Diosc.
eam herbam, quam Agyrtæ pharmacopolis pro
Helleboro nigro vendunt. Vires enim eandem
habere credit. Germani *klein Christwurtz* vo-
cant. Idem in hist. vbi figura pro Helleborina
tenuifolia describitur.

Matth. pingens in Dioscor. adductus est, ut
suspiciatus fuerit eam plantam esse veram Con-
siliginem Colomellæ & Plinij, quam Tragus le-
gitimum Veratrum nigrum esse putauit, non si-

Tom. III.

ne euidenti, ut ait, errore, In hist. Germ. vo-
cat Pseudo-helleborum, *Vermehrte schwartz
Nieswurrtz*.

Sunt [inquit Dod. lat.] qui volunt hanc plantam
Veratri nigri speciem esse: nonnulli Consiligi-
nem, quidam Sesamoides: Elleborastrum aliis.
Nullam tamen harum appellationum huic stir-
pi conuenire mihi visum est, sed solum Buph-
thalmi nomen apud Dioscoridem. Quare Buph-
thalmum inscribo eam.

G. In contrā hort. author est Dodonæum non
rectè Bupthalmum facere herbam illam quā
pro Helleboro nigro quidam videntur. Idem
rursus Ellebori nigri speciem facit veteribus in-
dictam: In app. verò ad Anonimas potius refe-
rendam censet.

Lob. Adv. p. 1515. & 146. Helleborus ferulaceus:
Item, niger Helleborus Theophrasti, caule & fo-
lii Ferulæ, & Hippocratis. Obs. p. 456. vbi figu-
ra, Sesamoides minus Gelsneri: Bupthalmus
Angustifolius. Icon. Plant. p. 784. Helleborus ni-
ger ferulaceus Theophrasti.

H. Lugd. sub trifolij, Pseudo-elleborus siue
Consiligo Matthioli: & Bupthalmus Dodo-
næi: Duas habet figuras eiusdem plantæ.

Taber. Helleborus hippocratis: Gerar. Buph-
thalmum siue Helleborus niger ferulaceus, *Cetera Sy-
nonima.*
Ore etc: Camer. apud Matth. germ. Bupthal-
mus Dodonæi, uelleborine flore lateo: C. Bauh.
pin. Helleborus niger 9. [7. in phyt.] siue te-
nuifolius Bupthalmi flore: Elleb. niger verus
Lon. Bupthalmum Dodonæi, Clus. pann. & hist.
Elleborastrum nigrum Gesn. hort. & Camer.
Elleborum alterum Castori. Fuchsius cum Tu-
bingæ apud eum esse vocabat Elleborinem
Dioscoridis.

Montbelgardi in Ill. E. C. horto colui floren-
tem Aprilis & Maio Clusius vulgare ait omnib.
apicis collibus & ficciotibus vtriusque Panno-
niæ & Austriæ gramineis campis. Plurimum nasci
in Bohemia, præsertim in agro Pragensi testatur
Matthioli. Provenire circa Ienam in Thuringia,
& circa Viennam in Austria prodit Ca-
mer. Apud Belgas hortensis est, Dod. Maio aut
Iunio floret.

Quod ad facultates attinet: Tragus æpenu-
merò vidit homines circa periculū huius radice
scilicet sanatos. Matth. ait in Bohemia tū Me-
dicos, tū Pharmacopolas huius radicibus pro
Veratri nigri vi: priuatim magno successū ad
pecorum morbos: sed in medicamentis radices
huius *αὐτὴ βαλάνου* radicum Veratri esse non
affirmat: idque, ut manifestum errorem, refutat
Dodonæus, expertus eas minime per inferna
purgare. Eas etiam non sumendas esse pro Ve-
ratro nigro, quod verum haberi possit, suadet
Camerarius: addens tamen si radices externè
admoveantur, durities ac in scirrhū abituras
collectiones certò dissipare.

DE SESAMOIDE EX
Dioscoride & aliis.
CAP. IX.

Incidimus in Sesamoidum mentionem, quæ
Veratri potentiā ac viribus proxima sunt, &
ex purgantium numero: opportunum idcirco
eorum historias ex Dioscoride & aliis hic repe-
tere. Duo autem ea sunt: Vnum magnum: al-
terum paruum. In magni autem Sesamoidis
descriptione inter Veteres non satis conuenit.
Plinius lib. 22. cap. 25. Senectioni [i. e. *νεκτεριν*]
D d d

*Elleb. veteris
indiciū.*

*H. Lugd.
notatur.*

*Cetera Sy-
nonima.*

*Vires &
Vfus.*

*Sesamoides
duplex*

similem herbam scribit Orisbasius Rutæ similio-
rem facit. Dioscoridis verò exemplaria utique
he bz Sesamoides istud comparant. Similis est
herba, aiunt, Senecioni aut Rutæ: [hypericæ] h. an-
[?] folijs longis: flore albo: radice gracili, inef-
ficace: semine simili Sesamo, amaro gustu.

Sive autem Dioscorides, siue alius, huius de-
scriptionis auctor extiterit, oculari fide Sesamoi-
des magnum non agnouisse videtur: sed ex alio-
rum scriptis tantummodò descriptionem eius
collegisse: atque idcirco disunctiva particula *h*
vsus: ignorans videlicet, cui simile Sesamoides
magnum esset: Seneciorine an Rutæ. Vtrique
autem simile esse, vix possibile, id primùm anno-
tante Dodonæo. Sont etenim dissimiles multum
Senetio & Ruta, qualiscunque etiam ea sit, siue
grauetolens, siue altera Hyperico similis.

Veratrum
Anticyrense.

Recentiores, inter quos Ruellius & nonnulli
post eum, Sesamoides magnum existimant, quod
à Theophrasto Veratrum nigrum describitur.
Cognominat enim ipsum Sesamaceum, siue *σασαμοειδές*:
Anticyrenses, inquit, fructum sesama ei
Veratri dare solent &c. Lege plura cap. de Hel-
leboris. Er à Dioscoride, qui Sesamoides ma-
gnum apud Anticyrenses Veratrum [si modò ge-
nuina lectio] vocari refert: & à Galeno in lib. de
simpl. med. fac. ubi Sesamoides magnum, Anti-
cyciticum Veratrum esse scribit. Dodonæus verò
nonndum tepetum esse, nec facile agnosendum
existimat.

Dicitur autem *σασαμοειδές*, vt Dioscoridis &
posteriorum exemplaria habent in Anticyra *Ἰα-
νίδος*. Causa additur, quoniam Veratro albo in
purgationibus miscetur. At propter hanc causam
fortasse rectius *ἑνὶ καὶ* nuncuparetur. Nam
Helleborines semen Theophrastus ait purga-
tioni ex Veratro misceri, quod haud aliud
quam ipsius Sesamoidis esse verisimillimum est:
Hippocrates enim, Strabo, & Dioscorides non
aliud admisceri scribunt quam Sesamoidis se-
men. In *ποικίλῃ*, ait Strabo, nascitur *σασαμοειδές*, cui
permixtum parantur Oream Helleborum.
A Sesami autem formæ & similitudine, Sesamoi-
des nomen, vt Plinius ait, accepit.

Vires

In abstergendo, excalescendo, desiccandò
que similem Veratro vim, Galeno auctore, ob-
tinet. Purgat pituitam & bilem supernè, vt Dio-
scorides refert, quartum tribus digitis capi po-
test tritum, accipit cum Veratri albi sesquio-
bolo, in aqua mulsâ. Eadem de hoc ferè Hippo-
crates sub finem libri de vict. rat. in morb. acut.
attamen non enim aqua mulsâ, sed cum aceto
mulsâ siue oxyrinclie exhibet.

DE SESAMOIDE PARVO EX DIO- SCORIDE.

Descriptio.

Sesamoidi paruo, vt Dioscorides habet, do-
drantales sunt caules, folia habentes Coro-
nopo similia, hirsutiora tamen ac minora: in
summo cauliculorum capitula sunt florum sub-
purpureorum, quorum medium album, in qui-
bus semen Sesamo simile, amarum, & rufum: ra-
dix tenuis: nascitur locis asperis.

Nomina.

Nonnulli *καρπὸν σασαμοειδὲς μικρόν*, alij *σάσα-
μοειδὲς* vocant: Galenus *σασαμοειδὲς μικρόν*: &
semen eius amarum qualitate continere, mul-
tùmque amarum esse, excalescere, rumpere exter-
gereque scribit.

Vires

Purgat, inquit, Dioscorides, pituitam & bilem

deorsum semen acetabuli mensura potum cum
aqua mulsâ. Idem impositum cum aqua turber-
cula & tumores discutit.

SANICVLA FOEMINA QVIBVS DAM, alijs Elleborus niger.

CAP. X.



Cvbitum Descriptio

Calos ma-
ioresque pro-
mit caules, tere-
tes, striatos, qui
mansu saporem
exhibent Im-
peratoria: folia
Pentaphylli
modo quin-
quepartita, sin-
gulis segmen-
tis serratis, Im-
peratoria: foli-
is supparia,
rugosa, supernè
atro-virentia,
infernè ex vi-
rote in luteum
tendentia. Flo-
res simul ali-
quot Saniculæ,

longè, maiores, ex multis glomeratis flosculis vi-
rescentibus, quos folia obvallant multa striata, ex
albo virentia, pauca admista purpurâ: semen
oblongum, alterâ facie planum, alterâ gibbum
& canaliculatum, colore cinereo: radix multum
fibrosa, Hellebori modo, atra.

Sanicula altera Fuchsi ab omnibus ferè Her-
barijs pro specie Osterinij vulgò vocari habetur,
sed falsò quando neque in folijs, neque in radi-
ce vlla appareat acrimonia, sed perinde atque in
mare Sanicula amaritudo & adstrictio. Germa-
nis etiam errore quodâ die *klem Meisterwurrt*,
h. e. Imperatoria minor, nominatur. Fuchsius e-
andem quodd & forma & facultate ad veram Sa-
niculam, quam matrem facit, proximè accedere
crediderit, Saniculam foeminam nuncupavit.

Dod. gall. vocat Veratrum nigrum & Ellebo-
rum nigrum, nullâ factâ mentione Neoterico-
rum: sed tantum veterum nomina, quæ Elleboro
competunt, apponens. Idem de purg. & in fol.
lat. pro Veratro nigro, non quidem Theophrasti,
Dioscoridis depingit & describit.

Trago est lib. 1. cap. 14. de Smyrnio, Osteri-
tium 3. siue montanum, quinque folijs diuisim
vntco pediculo insidentibus, Osteritij veri aut
Saniculæ modo. Eid. cap. 173. Sanicula 2. siue fe-
mina adulterina.

Tantò minus Lobel. in Adu. huic quadrare
contendit Astrantiæ nigæ, siue atræ nomen,
[huic Astrantiæ nigæ nomen minime conveni-
re tradit etiam Dodon.] Germ. *Schwartz As-
frentz oder Muetterwurrt*, quam periti Sanicu-
lam alteram putarunt, alij Helleborum nigrum,
leuiusculâ, vt ait, coniecturâ. Is à luteo, quem ef-
fundit, succo vniuersa planta ac etiam alijs no-
tis Astrantiæ, assimilavit, idèoque nigram appel-
lauit: Obf. p. 381. I. p. 681.

Apollo Rad. 1. supra elect. Iosinum, quartam
facit Pentaphylli speciem, dicens foeminam nun-
cupari, Diapensiam & Saniculam. Sed vbinam
quæso legit vocatam fuisse Diapensiam?

Gefin.

Gels. hort. Saniculam fœminam cognominatam à Sanicula genere toto differre contra Fuchsum concludit. Dodonæum verò falli scribit, putantem esse verum Elleborum nigrum Dioscoridis.

C. Bauh. pin. Elleborus niger §. [4. in phyt.] siue Saniculæ folio, maior: Sanicula fœmina Fuchsi, H. Lugd. & Clus. hist. Veratrum nigrum Dioscoridis, Lac. & Eyst. Veratrum nigrum 2. Clus. pann. Imperatoria nigra Tabern. Elleborus niger Dodonæi, H. Lugd.

Saniculæ fœminæ Fuchsi semina Montbelgardi sæpius terræ mandauit, sed nunquam prouenit. Obseruauit Lugduni *au bois de la bonne Allemande* prouenientem Martio mense: Basileæ florentem Iunio ac etiam Septembri. In monte Thuri Julio, vnde in hortum translata, Genevæ folia producebat Aprili, florebatque Maio ac Iunio. In montibus ac syluis Tubingæ vicinis quoque reperimus. Abundant hæc etiam Pannoniæ vtriûsque & vicinarum Prouinciæ præta, vmbrosæ siluæ, & montes. Talibus in locis montis Iuræ frequentem collegit Io. Schvab. in asperis ac in cultis, ætatis mensibus florentem, toroque anno virentem.

Fuchsius affirmat Saniculam suam fœminam formâ & facultate ad veram Saniculam proximè accedere, & in ea ut in matre amaritudinem & adstrictionem esse. Dodonæo tamen visa est Veratro nigro Dioscoridis, formâ & viribus respondere. Ad omnia tamen efficacius habendum.

Atros autem aliôque humores radices huius expurgare, testes habet in German. nonnullos exercitissimos Medicos, qui his melancholicos purgatos feliciter ad sanitatem reducere. Purgandi quoque huic facultatem adesse, testatur etiam Gesnerus in epistola quadam ad Occonem, in qua Alstrantiæ nigre Helleboro albo ferè similem vim, sed tamen mitiorem, & & per alium purgatricem primùm se expertum refert. Quæ sententiam Dodonæi, Dioscoridis scilicet Veratrum nigrum esse, confirmant. Fab. Hildanus ad curationem scirrhii lienis in apozemate præscribit Saniculam fœminam Fuchsi.

Nos minimam Fuchsi Saniculam fœminam inuenimus in Rheticiis montibus quæ vix vncias duas excedebat, nec floribus, folijs & radicibus pisci quantitate, differebat. Hæc C. Bauh. phyt. Elleborus niger §. [Pin. 6.] siue *Sanicula* folio minor dicitur.

met non habet, cur neget non videt. Air vulgo Herbariorum Diapensiam græcè, latinè Ferrariam maiorem, & Consolidam minorem dici. Dod. verò gall. cum Io. Agricola negat speciem Pentaphylli.

Camer. hort. scribit Saniculæ delineationem Ruellij nostræ non omninò conuenire: eam etiam inter Ranunculos ipsum retulisse. Sed non video vbi Ruellius hanc Saniculam ad Ranunculos retulerit: tradit quidem cap. de Ranunculis plantam Seniclon dictam sed ab hac diuersam. Satis autem conuenit descriptio Saniculæ Ruellij cum Sinicula mare Fuchsi.

Corn. constanter affirmat hanc Symphyti Græcis appellatam aliquam speciem esse, videturque Consolidam minorem appellare.

Quam Fuchs. Saniculæ maris nomine depingit & describit, quamque à nullo veterum describi ait, eam Gels. hort. præcipuè & Simpliciter Saniculam appellat. Matiholus Quinquifolium siue Pentaphyllon quintum vocat, ac in Hist. germ. annotat quibusdam Saniculam nigram dici. Apollo rad. 1. facit Pentaphylli 4. speciem matrem: Amatus confundit Coralloidem cum Diapensi.

Quid veteribus fuerit Sanicula, inter Ranunculos se dicturum promittit lib. 2. cap. 147. Ruellius. Inuenio ego cap. 106. vbi de Ranunculis tractat, cum hæc dicere: Ranunculum 4. flore lacteo, rura nostra, ab Herbarijs, ut arbitror, edocta, *Seniclon*, quasi verò Saniculam appellant, &c. *Sed emendanda* Plinii lectio, qui pro lacteo in hac specie luteo habet, quod verbis Dioscoridis conspicuum cognoscitur. Si Ruellius Saniculam ad Ranunculum refert, quomodo à confusione excusandus sit, non video.

Trago est vulneraria herba, quam Consolidam minorem dicendam putat. Ipsi certè videtur verum esse *αὐτὴν ὡς τὴν Dioscoridis*. Quæ causa fortè ut Apollinaris Saniculæ eas vires tribuat, quæ Symphyto propriæ sunt.

C. Buhin. phyt. & pin. Sanicula officinarum: Sanicula Brunf. Trago, Anguill. Gels. hort. Lac. Lon. Cæs. Camer. Thal. Tabern. [cui & Consolida quinquifolia] & Eystett. Sanicula & Diapensia. Lob. Adn. Obs. 386. Icon. Plant. p. 663. & Gerardo. Diapensia Brunfels. Matth. Calt. cui & Pentaphylli 5. species. Sideritis 3. Dioscoridis Colunæ.

Sanicula à sanandis vulneribus nomen traxit, se videtur. Germ. Belg. & Angl. *Sanickel*: Gall. *Sanicle*, ou *Senele*: Ital. *Cinquefoglia maggiore*: Beth. *Zanykel*: Vngaris *Sanicor*.

In radice montis Saleuz viret Februario. In siluis vmbrosis nascitur: gaudet pingui gleba, læto, humidòque solo: Florem Maio ac Iunio profert: semen deinde maturat: herbæ verò folia toto anno virent, nec hybernū horrent frigoris. Abundant Sanicula vulgaris, subdit Clusius, Pannoniæ vtriûsque & vicinarum Prouinciæ præta, vmbrosæ siluæ & montes. Translata ad hortos subinde adolefcit.

Tragus, qui sibi persuadet, sed malè: Saniculæ esse Symphytū petraeum, ascribit ei omnes vires à Dioscor. ei attributas, quæ an quadrēt, aliorum relinquit iudicijs. Inter alia verb Chirurgis familiarissimam ait, & siccum obtinere temperamentum, ac ipsam penè cum Tormentilla pollere viribus, & posse adhiberi ad omnia interna vitia herbam hanc cum radice, sicut &

D d d d i

SANICULA MAS FUCHSII siue Diapensia.

Concinnæ sunt Saniculæ folia, quæ à radice adstringente, foris nigra, intus, alba, fibrosa, exeunt, cum splendore virentia, rigidula, ferè rotunda, quinquepartita, singulis segmentis subdivisis, quorum omnium pulchritudine: *caulis* cubitalis, enodis, læuis, in fastigiis diuisis *flosculis* sustinet, tanquam in vmbellis exiguis confertos, albos, quinquifolios, quos *lappule* excipiunt, vestibus adhærescentes.

Brunfels. tomo 1. rapl. Diapensia, Senicula, Pelium Hermolai [Coroll. 739.] Pentaphyllon Collinatij. Pentaphyllum verò ne sit, cut affir-

Tom. III.

Tormentillam: vulgò nomen Saniculæ traxisse à mira sanandi vi, indeque potionibus vulnerarijs addi. *Fuchsia* non est simplicis naturæ, gustu id indicante adstringit simul & amara est, vt hoc nomine calfactoriam & exsiccatariam esse nulli dubium sit. Sarcitur autem calida & sicca ordine secundo. Herbarum succum vulneratis in potu miscificè conferte, experientia compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositam, aut eius succum illitum tam in homine, quam in pecoribus constat. Neque enim aliud præsentius est auxilium, cum ad fauces, vel pulmones vitium decubuit. Et in summa omnia quæ Symphyton præstat etiam Sanicula. Potissimum verò sanguinis spuro, dysenteria, renumque vitij medetur. Nos contra non omnibus renum vitij conuenire putamus, sed duntaxat exhiberi posse, vbi aliqua vena in renibus rupta, vel in diabete, vel in vlcetibus, si vires habet Symphyti, vt *Fuchsia* quoque perhibet. Internis & externis vulneribus, dysenterijs, ruptis & vulsis auxiliatur, decocta, pota & imposita. Dodon. qui siccam facit tertio gradu, sumptam & admodum commendat aduersus hernias. Saniculæ puluerem intritum melle & Glycyrrhizæ succo, ieiuno ventriculo potum, interanea omnia phlegmiantia & pituita obducta expurgare dicit Brunfels. Idem efficere quoque eius decoctum cum melle rosaceo, & saccharo. Sic & Lonicetum, qui varias attribuit vires cum aqua, tum herbæ, quæ ferè ab alijs ascriptæ sunt, purgatricem quoque herbam pronunciat. Sed & Wirsung, ad aluum mouendam Saniculam cum radicibus & melle rosato optimè decoquit, decoctique vncias quatuor sumendas præcipit. Sed si tantam glutinandi & adstringendi vim possidet, qualem non solum alij perhibent, sed etiam quotidiana praxis comprobatur, quomodo a' uisum ducet: laissent lectores an qui purgatricem statuerunt, non eorum errore, qui Peplidem pronunciant, seducti decipiantur. Quia denique Saniculæ succus vulneratis in potu commendatur: ideo G. illis in adagium venit vulgò iactatum, eos non egere Chirurgo, qui Saniculam habuerint.

EPIPACTIS ET ELLEBORINE VETERIBUS & in genere.

CAP. XII.

Diosc.

Epipactis, referente Dioscoride, ab alijs Elleborine vocata est, estque frutex [*Δευκισιον*]. vet. quidam *παρα* herba parua: pusillus, perquam exiguis constans foliolis [Ald. folijs, vet. addit *δυσος*] contra venena, & iecinoris vitia pota prodest.

Epipactis, inquit Plinius lib. 17. c. 9. ab alijs Elleborine vocatur, herba, exiguis folijs, iecinoris vitij vtilissima, & contra venena pota. Porro non sine mendo in aliquibus Plinij codicibus Epipactis pro Epipactis, & Emboline pro Elleborine legitur, vt rectè annotat Gesnerus. Galenus huius mentionem omisit. Paulus sua ex Dioscoride transcripsit. Epipactis, inquit, quæ & Elleborine dicitur. Bibitur ad lethalia medicamenta, & ad hepatis morbos.

Theophrastus lib. 9. cap. 11. vbi de Veratro agit, ad Ellebori albi potionem, vt probè vomitus succedat miscetur, inquit, Elleborines semen. Hæc autem herbula est. Cornutus tamen hanc Theophrasti Elleborinem, aliam rectè putat ab

ea quam Dioscorides etiam Epipactin appellari dicit.

Epipactis, Helleborine, Gesnero incognita herba est, vt faceret in car. pl. Idem de Lunarijs dicit apud Dioscoridem vocem *Βελιον* inter spuria mutilam esse pro *Εδωβελιον*. Ait autem Plinius 1. 27. c. 20. ineptissime Epipactin inter arbores, & frutices reponere: commodius autem inter herbas. Cæterum, Elleborinem dictam suspicatur à facultate vomitoria.

Epipactidis & Elleborines nomine proponuntur sequentes plantæ: Epipactis Matthioli, quæ commentaria videtur. Consilio seu Helleb. niger sil. adulterinus. Sanicula. Damafonium quorundam. Gentianella. Herniaria. Lunaria bottritis. Alina.

EPIPACTIS MATTHIOLI.

Si Epipactis Elleborine ex eo dicta est, quòd Locum cum Helleboro nigro similitudinem habeat, eam equalem credidit cum inquit Matth. in Goritienis agro nasci. Quandoquidem inibi frequens quædam parua herba reperitur, cuius figuram do, quæ folijs floribus & radicibus Elleborum nigrum repræsentat.

Scio Matthiolum herbæ cuiusdam, inquit Gesnerus, iconem dare cuius folia non absimilia inquit esse Ellebori nigri folijs: sed quis veterum præsertim, Epipactidis folia Elleboro nigro comparauit: Adde quòd neque fruticosa est, quam pingit herba &c.

Lobel. in Adu. de Epipactide, contra Matthiolum præsertim inter alia hæc scribit: Non inde quia similis foret Helleboro videtur Epipactis dicta & Elleborine, sed propterea quòd Helleboris misceretur, forèq; quasi frænum impressioni vehementissimæ pharmaci Helleborati: neque vtri Helleboro Dioscorides similem fecerit constat, in dñe fecisse quidem. Ea propter quid hic Commentator hæret, qui vult videat, & rideat &c. Et Senensis arbitretur nobis Epipactidem pictam, nec describam: vt solet innumeris locis, vt pote aliunde nutuatus nec stirpem conspicatus: at si ubi fuerit: nactus Brassicæ aut Verticis describendas, vel alienas inuaserit delineationes, enecat verbis, aut Crambe recocta. Sed rariore & cognita digniores, pictori mandati: & ilico elogio illo centies inculcato addit, *Est similis prorsus nullis re-lamantibus notis*: subijci que non ad nostram cognitionem, sed ad sui ostentationem, non quidem se scire num Helleborine sit: sed tamen Epipactida esse ridiculè perinde ac si dicat quis, incertum esse num sit Helleborum, sed tamen certum, esse Veratrum.

C. Baub. apud Matth. scribit sibi Epipactidem Matthioli nondum conspectam. In pin. tamen vocat Helleborum nigrum 7. [*A. phyt.*] siue Saniculæ facie: Epipactidem Matthioli & Lacunæ: Elleborinem, Matth. H. L. g. 1. & Tabern. Elleborinem alpinam Saniculæ & Ellebori nigri facie, Lob. Obf. p. 378. 1c. Plant. p. 664. Helleborinem Matthioli communitat Ad. Clus. in Gup. non encl. pann. Helleborine Matthioli dicitur *Sarkokarchon*.

POLYRRHIZOS PLINII DALE-champij.

CAP. XIII.

Polyrrhizos hæc Plinij Dalechampij, apud H. Lugd. p. 1140. pingitur & sic describitur.

Radice



Radice est multiplici, nigra, caulis multis, angulosis, palmum altis: *foliis* Myrti paulo obrufioribus, per interualla geminis: *flore* pallido: *semine* in oblongis vasculis: gaudet asperis. A radicum multitudine herbę huic nomen datum.

Polytrichizo Plinij hanc cognoscere autumant, de quo ait: Folia habet Myrti & radi-

ces multas, quę tunc dantur in vino contra serpentes: prorsus & quadrupedibus. Hist. Lugd. aliam habet ibidem Polytrichizon latifoliam Dalechampi, quam Ranunculum montanum album esse suspicatur, de quo H.n. lib. 30.

Cæterum, quid sit Polytrichos hæc Plinij Hist. Lugdunensi, ut verum fatear, ignoro. C. Bauh. in pin. quærit an sit Elleborus niger 8. siue Elleborinæ nigra species.

STAPHIS AGRIA VETERIBVS.

CAP. XIV.

Staphisagria Dioscoridis folia habet veluti Vitis siluestris, filia: cauliculos rectos, molles, nigros: *florem* fert latidi similem: *semen* in folliculis viridibus, veluti Cicero triangulare, asperum ex nigro subfolium, intus album, gustu acre. Cæterum, ubi flos Glasto similis, non de figura herbæ Cæsalpino accipiens videtur, sed de colore, quem Glastum inficit.

Plinius lib. 13. cap. 11. Astiphisagria & Staphim vocat, quam Vuam taminiam aliqui vocant falsò, suum enim genus habet: cauliculis nigris, rectis: foliis Labrutæ: fert folliculos verius quàm acinos, virides, similes Cicero: in his nucleum triangulum. Maturum sit vind. m. a, nigrescitque, quum Taminia rubentes norimus acinos, sciaturque illam in apicis nasci, hanc non nisi in opacis: *Hecille*. Qui sibi in hoc non constat, teste Cornario, quod Staphydem agriam falsò veam taminiam vocari asserit: & quod paulò post de Labrusca dicit: Ita ac potius crediderim esse, quam vultus Vuam taminiam vocat. Nam contra hæc lib. 26. c. p. 13. in fine ait Vuam taminiam resistere phthirici, id est, morbo pediculari, his verbis: Nascuntur in sanguine ipso hominis animalia exsuta corpus. Resistitur Væ taminia succo, aut Veratri, cum oleo perunctis corporibus, Taminia quidem in aceto decocta, etiam vestes eo tædio liberat: Hic itaque Vuam tamineam dixit Staphydem agriam. Nam de hac Staphide siluestri idem tradit Galenus lib. 1. cap. 7. secundum loca. Cornelius autem Celsus lib. 3. cap. 21. Vuam taminiam, *scilicet a dyelis* Græcis nominari aperte dicit, quem sanè Plinius resellere voluisse videtur. In Scribonio appellatur Herba pedicularis: in Marcello vetere empirico, Peduncularia, eò quod ped-

Tom. III.

diculos necat. Officinæ & græcam appellationem retinent, & Pituitariam vocant, itidem ut Plinius priori loco citato. Sed tamen Pedunculariam potius, quàm Pituitariam legendum censet Cornarius. Cur autem non æquè Pituitaria, à pituita, quam è capite ducit?

Staphidis agriæ si quis grana decem, aut quindecim, trita in aqua mullā exhibeat, crassā per vomitus educunt, authore Dioscoride: qui autem hauserunt, obambulare debent: Et diligenter animaduertendum est, ut aqua mullā assidue detur, eò quod strangulationis periculum affert, & fauces vit: Herba ipsa trita & cum oleo illita, ad morbum pedicularem, pruritus & scabiem facit: Communia verò pituitam plurimam ducit: Cum aceto cocta si collatur os, ad dentium dolores prodest, & gingiuas fluidas constringit: feruida oris vlcera sanat cum melle: miscetur & malagmatis fetuorem inducentibus.

Astiphidis agriæ nucleis ad purgationem vti non censuerit Plinius, idque propter ancipitem strangulationem: nec ad pituitam oris succidam. Fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti, facilius admixta Sandarachā: Item pruritu & psois. Ad dentium dolores coquantur in aceto, ad aurium vitis, rheumatismos cicatricam, vlcera manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur. Semen idem abdicauit propter nimiam vim ardoris: Quidam eam Pituitariam vocant.

In Plinio in eo quod dixit rheumatismos cicatricum, manifestus error est *dardis* i. e. cicatrices, pro *dyelis* agnoscende. Dioscorides enim *dyelis agriæ* i. e. gingiuas fluidas habet: & alioqui cicatricum nulli sunt rheumatismi.

Galeno Astiphis agria cerem vehementer vim habet, ut pituitam de capite ducat, & valde extergeat. Quæ etiam ad scabiem commoda est. Participat & vrente quadam facultate.

Apud Hippocratem morbo muliebri statuitur *sicuti dyelis* medicamentum, quod illinatur ad anginam.

STAPHIS AGRIA.



Hæreturum Defectus.

Habet Staphis agria caulem, cubito altiore, teretē in multos ramos diductum: in his folia longis hærentia pediculis, ampla, viridiora, vnde toti plantę nomen comparatum, vel Ricini magnitudine, & diuisura digitatā, pillosa: flores pediculis frequentibus, tum è foliorum sinu, tum ex caulibus

fastigio, tum ex ramis insident, singuli suo, cærulei, è quinque foliolis hirsutis compositi, apicibus & staminibus foliaceis medium tenentibus *semen* rugosum, nigrum, angulosum, vridæ fastigio

D d d 3

Pedicularia
vera.

cultatis vi gu-
statu os incen-
dit.

Hanc sunt
qui veram Pe-
diculariam.
quod sc. pedi-
culos & lendes
enecet, statuât
& eam quæ
Dioscoridi, Pli-
nio, Galeno, &
alii veteribus
Staphis agria
dicunt, sed cū
descriptione
non planè res-
pondet, inquit
Tragus. Quæ-
re dicam eam
Staphidis a-
grias speciem

esse, non ipsam Staphidem. Alij Pénitariam la-
tinè. *Speichel wurcz* germanicè appellant, quod
commanducata fetore multam pituitam tra-
hat. Ego germanicè *Leijß wurzel*, Pediculariam,
leijßwurder: semen verò. *Meusßwund* Pfeffer,
q.e. Piper murium aut glirium appellabo. Porro
alii *Bisßwurz* german. etiam vocant: Belgæ
leuyseruyt, *leuyßedere*, Galli *Herbe aux poulx*:
It. *Stafaria*: Hisp. *Terna pioienta*, *Caparas* sine
Fabraz & *Papraz*: Terna *piolheya*: Angl.
Sreniusa krr.

Synon.

Staphis agria Trago, Matth. Fuchf. Dodon.
Geln. hort. Lac. Turn. Lob. Adu. Obs. p. 393. Icon.
Plant. pag. 689. [vbi & vitifolia.] H. Lugd. Cæsalp.
Cast. Camer. & C. Bauhino: Pedicularis Cordo in
Diosc.

Quia autem vñatimj consensu præfens planta
Staphidem agriam Diosc. oridis esse statuitur, non
abique ratione antiquorum appellationes adcri-
bimus. *Staphis agria* igitur Dioscoridi dicitur:
σταφίς αγρία Galeno: aliquib. *τρίφυλλον* [Trifolium]
aliis *στίον* [stefium] aliis *σταφίς* [Asthaphida]: aliis
φθινοκτόνον [Phthinoctonon, quasi pediculos ene-
cans: aliis *οδοντο* [Phthirion]: aliis *αποανθρον*
[Apanthronon]: aliis *πολυδης* [Polyides]: aliis
αδονταδης [Pseudopithes: aliis *απονοτι* [Arse-
note] *Αγρπυς ιβναρις* [Ibnaede]: Has appel-
lationes aliis dicurundas relinquimus. Astaphi-
sagria, & Staphis Plinio: Latinis Herba pedi-
cularis, ab effectu, vnde & Phthinoctonum dicta
est, & nunc in cræcia *φθινοκτόνον* granum pedi-
cularium nominatur.

Locus

Nascitur in opacis. In Istria, inquit Matthio-
lus, Dalmatia, Apulia, & Calabria frequentissima
provenit. Apud germanos non nisi in hortis sata
reperitur. Requirit terram cultam & irrigaram,
non nimium Soli expositam, placet meridionalis
ymbra: verno tempore feritur, semen colligitur
principio Iulij, iuxta Oliverium de Serres: Do-
donæo tamen semen maturefcit & nigrescit cum
vindemia.

Diosc.

Cici aut Croton [*κίκι ή κρότων*, *κρότων* quidem
nominat, à Crotonis animalis similitudine.]
alii, referente Dioscoride, Sesamum silvestre

[*σάρανον αγριον*] alij Seseli Cyprium [*σάραν ή σαπείον*]
appellant. Ricini verò nomen [*κρότων*] accepit à
similitudine quæ est illius semini cum ricino a-
nimali. Arbutula autem est parvæ Ficus, filio Pla-
tani, at maiore, lauiore & nigriore: *ramis*, cau-
ditibusque cænis in Arundinis modum: *semine*
[aluis fructu] in visis asperis, quod decoratum
ricinum animal repræsentat. Ex eo oleum nomi-
ne cicinum [siue ricinum] exprimitur, cibis qui-
dem ineptum ac fœdum: sed alijs lucernis &
emplastis vtile, [Hodie in Officinis non est in
vfu: de eo vide plura apud Diosc. lib. 1. cap. 33. &
apud Plinium lib. 15. cap. 7.] Grana numero tri-
ginta [Matth. tria] purgata & trita pota, pituitam,
bilem, aqua que per alium extrahunt, ac vomitio-
nes etiam cient. Veruntamen admodum ingra-
ta laboriosaque est eiusmodi purgatio: siquidem
valenter stomachum subvertit. Tusa verò & im-
posita eadem varos & vitia cutis à Sole contra-
cta depurgant. At folia cum poleuæ polline tri-
ta, oculorum cætemata inflammationesque le-
niant. Eadem len per se, seu etiam ex aceto illita,
lactis vberitate rurgentes mammas cohibent, &
erysipelata restingunt.

Theophrastus aliarum arborum folia ipsa si-
biipsis similia esse dicit, sed Populi, & Hederae, &
eius, quæ Croton appellatur, dissimilia & figurâ
alterata. In hac enim noua rotunda sunt: vetu-
stiora angulosa. Et hæc lib. 1. hist. loquutus, repe-
tit lib. 2. de caus. cap. 22. Foliorum transfiguratio
percipitur in Crotone. Nam postquam cum ro-
tundo principio proveniêre, in angulum deinde
se colligunt: quasi formam istam suæ perfectio-
nis demum capessere debeat. Quod ita fit, quia res
simplex facilius est, quam multiformis: & princi-
pium re difficile peragere nequit, quia debile est.

Galeno Ricini semen, quod & purgæ, exter-
gendi & discutendi vim habet. Ita & folium, sed
omnino debilius. Oleum verò ex semine calidi-
us, & magis tenuium partium est, quam oleum
commune, & propterea discutendi vi præditum.
Guiland. in epist. ad Andr. Patricium multâ
verborum contentione, magna constantia & as-
sensatione irrevocabili tueretur atque defendit,
Ricinum hic à veteribus descriptum esse He-
bræorum *kikaton*, idque etiam contra omnium
interpretum sententiam: atque tum ex Hierony-
mi verbis, tum ex Arabica, Syriaca, & Maurita-
nica dictione comprobat.

Eandem Stirpem, quam scilicet Deus Ionæ
Propheta iuxta Niniven pro vmbraculo præpa-
rauit, & quæ subito à verme corrosa est [cuius
fortè imaginem fructus adhuc hodie etiam im-
pressam retinet, si opinari haud nefas sit] & col-
lapsa, Ricinum fuisse, Arias Montanus in comm.
suis in Ionam quoque contendit, & *κικαδον* He-
bræis dici euidenter ostendit. Idem etiam super
per hac re concludit contra August. & Hierony-
mum Lambert. Dicitur ius in Ionæ c. 4. Comm.
kikajon Ricinum interpretans. Ac eius etiam
meminit I. G. Struckius l. 3. antiq. conuivial. citans
Leuonum Lemnium cap. 31. de Herb. biblicis, &
Ariam Montanum, eadem cum iis docens.

RICINVS EX VETERIBVS.

CAP. XIV.

RICINVS VVLGARIS.

Ricinus insigni actu celeriter adolescit, can-
le crasso, litrato, glauco, geniculato, inani,
truncum, quatuor & plurium cubitorum, Dodonæo
superius

superius ramoso, ex obscura purpura nitente & glabro; candido videlicet, deterfo, tenui instar farinæ, pulvere, quo veluti confusus subinde apparet: folia ampla, Cordo Platano & Aceris similia, digitata: in septem, octo, aut novem, acuminata, tetraque segmenta, in quorum singula nervus è folij centro exporrigitur, diuiduntur, atrouirentia, splendida & interdum acetabuli instar conuata, possimum loco quo segmentorum nervi cœunt, vnde & pediculus aucto-



fo folio oritur dodrantalis, purpurascens, concinnus: quantò autem superiora fuerint folia, tantò etiam ampliora existunt, sic ut ex his peractum, equità sit repetiri, nullum è vulnere lac minantia: flores 6-gere thyrsoside furculo peculiari racematim idè,

è sanguineis, crispisque staminibus, quæ terna è fructus rudimento emicant, conflatis quibus mucata varicula triquetra succedunt, quæ femina claudunt oblonga, Ricini animalculi æmula, Dod. foris luidi & maculosa, interiore medullâ candidâ, quæ capsulis per maturitatem fissis ac rimas fissis, duras, unimpenetrabiles præter flores videt: est in eodem thyrsi muscosa glomerata nucemuta coloris herbacei, quæ nullo relicto suo tandem marcescunt radice subest simplex, longior, crassa, dura, candida, crebras circum circa fibras apertis.

Bellin. apud Auic. vocat Cataputiam maiorem, Venetorum vulgi Mirafol, & Granum regale quorundam. Brunfelsius Cataputiam arborescentem esse, vel palmam Christi suspicatus est. Triagus, qui huius purgatione non delectatur, Dioscoridis Croton asserit, auctoremque adducit M. Virgilium in Hetruria & Thracia Phaselum Romanum vocari.

Mouachi in Mef. dist. 12. cens. 386. Brassavolam admittantur dicentem, interpretem Serapionis errasse interpretando Cheruam esse Cataputiam maiorem: quin ipsum deceptum autumant. Serapioni, inquit, Cherua dicitur Cataputia maior, Mesueo Albenesuch maior: Granum regium: Ricinus, Cici seu Cicum Dioscoridi: nonnullis Pentadactylus, Cultos horri, Heliotropia, Giratolis, Mirafolis, & Sponta Solis: Incolis Fieghiera del inferno: Auerrhoi 5. coll. Halbarea.

Σίκυς ἡ ῥόζου Græcis dicitur, Ricinus Latinis, ut Trago, Matth. Fuchf. Dod. Anguill. Cordo in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lac. I. on. Lobel. Adn. Obs. 392. & Ic. Pl. [vbi & Cerua maior, Cataputia maior, Granum regium Mesue] Cæf. Cast. H. Lugd. & Tab. Cici Gesn. hort Ricinus vulgaris Camer. Ricinus maior Eyst. Ricinus, kerua Tripoli Rauwolf. Cerua aut Cataputia maior, Frag. Palma Christi Gall. Manus Christi Offici-

natum Corn. Sillo: yppium Herodoti Gesn. cat. Ricinus i. siue minor C. Bauh. phyt. Eid. pin. Ricinus i. siue vulgaris: Folij ludij, inquit: quare Theoph. i. hist. cap. 16. [ut iam antè annotatum] Crotonis folia initio cum proueniunt, rotunda sunt deinde in angulos formantur: tanquam perfectè articulata: Ratione loci magnitudine variat: nam hominis crassitudine in Hispania Clusius, & magnas arbores in Creta Bellonius vidit, ut scalis admotis conscendi debeant: ex quo apud Hispanos oleum conficitur, quod oleum Ficis infernalis nominant, Monarde & Fragolo monentibus. Fit etiam in horto Eystettensi mentio Ricini minoris, qui omni ex parte prædicto magnitudine cedit.

Germ. dicitur vveunderbaum, siue vpondel blaum, Creutzbaum, Tourckischer hanff & Kœmischen hanff: gyttis aliquibus: Kœnigliche Bonen: vel Kœnigliche Bonen. Semen ipsum Zecken kerner. Nam Ricinus animal, Cornario perhibente Germanis Zecken poellatur. Belg. vrunderboom, Mollencruys. Gall. Palme de Christ. It. Girasole, Mirafale, aliqub. Faguolo Turchescio. Hisp. Figueira del inferno. Angl. Palma Christi: Clus. in stirp. nomencl. pannon. Sar sis. Officinis passim Cerua siue Cataputia maior.

In Aegypto spontè nasci auctor est Matthiolus. Locus & Tempus Seritur in hortis, cum apud Germanos & Gallos; tum & alibi; non modò ad spectaculum, verum etiam aduersus talparum iniuriam, quas ferunt Ricinum fingere. Annua verò in Germania stirpis est: perfruitur eodem quo sata est anno: semen, si Aestas calida fuerit, Autumno maturatur. In calidis regionibus multos restit annos, vbi in maiorem excreuit, ita tunc tunc.

Vires & usus ex Dioscoride. Plinio, & Galeno priori capite adscriptimus. Eadem ferè de granis istis, quæ Dioscorides, Mesues habet, sed quinque aut septem, vel ad summum quindecim numero tantum exhibenda tradit: eademque ex iure veteris galli, colli, iuncturarum, & coxendicis doloribus vtilia; & cum aqua casei, vel lacte caprino, hydropicis prodesse. Matthiolus suspicatur in Dioscoridis exemplari subesse mendum. Grana enim triginta seminis non sine periculo vitæ dari posse, nostro iudicio, rectè statuit. Quo sit ut cum Oribasio legat tria grana, non triginta.

RICINVS MAIOR AMERICANVS CVR-cas dictus, & Faba purgatrix Indiarum occident.



Clusius Ricinum Americum sic describit: Hoc Ricini genus, inquit, ego vidi quod ante aliquot annos ex America adferri cepit, vulgari paulò maius, cuius operimentum, seu siliqua illa triangula, quæ semina continet, tuberculis asperis non est oblita, ut in vulgari; sed

Nom. ling.

Locus & Tempus

Vires & usus

Diosc. notat.

Descriptio

lævis & cinerei coloris. Ipsum granum siue semen vulgari simile, nigrum tamen & non maculosum, ut illud. An arbor quæ Cercas Americorum profert similis sit Ricino in Hispania & Creta provenienti, planè ignoro, cum qui inde fructum attulisset, arboris formam describere non posset.

Synonima.

Clus. apud Monardem [qui Hispanorum Ficum infernalem, Arborem cum fructu, tum foliis Ricino similem, sed in maiorem altitudinem ob soli vberitatem excrecentem, vocat] Ricinus Americus, & Cercas Americorum, Ricinus Americus Lob. Obser. pag. 392. Icon. Plant. pag. 688. H. Lugd. pag. 1790. Tab. & Ferd. Imperato, qui ab aliquibus Dende falsò existimari refert. C. Bauh. phyt. & pin. Ricinus 2. siue maior Americanus: Camer. Ricinus Syriacus.

Habeo ex dono Illustrissimi mei Principis, à Paludano missum.

Vires & vrus

Mirificà, ut aiunt, purgandi facultate præditum: nam etiam si dimidia tantum vnius granii pars sumatur, valenter supernè & infernè purgare relatum est Clusio. Gelisco, novæ Hispaniæ provincia, oleum, seu liquor quidam adfertur, cui Hispani, Oleum Ficus infernalis, nomen indiderunt, eò quòd ex arbore Ricino simili elicatur. Eadem verò ratione hoc oleum Indi eliciunt, quum docuit Dioscorides, h. e. confuso semine, deinde in aqua cocto, postremum oleo innatante cochlearibus excepto. Hæc eliciendorum oleorum ratio è feminibus & fructibus, Indis admodum familiaris est, quippe qui nullam expressionem norint: sed etiam hoc oleum isto modo quàm expressione facilis elicitur.

Morbi frigidi.

Magnis viribus poller, veluti experientià & multo eius vfu comprobatur est, cum in India, tum in Hispania. Omnes morbos ab humoribus frigidis provenientes sanat, omnes tumores dissolvit, flatusque discutit, præsertim ventris, eaque ob causam non modò in Anasarca vtile, sed in omnibus hydropis generibus, si, ventre illo inuncto, aliquot guttæ vino aut alio liquore commodo exceptæ sorbeantur: etenim aquas euacuat: quod etiam minore noxa facit clysteribus iniectum. Venterculum frigidis humoribus & flatibus liberat: & coli doloribus vtile, si partes affectæ eo inungantur, & aliquot guttule sumantur. Efficacius subuenit ilei doloribus, ut experientià didicit Monardes. Articulorum morbis, à causa non admodum calida natis, auxiliatur, humorem euacuando, si aliquot huius olei guttæ pingui iure gallinæ dissolutæ sumantur. Contractos artus, si eo inungantur, curat, nervos molliter distendendo, stomachum, vterum, & lienem obstructionibus liberat inunctione. Aluum puerorum emollit, illito toto ventre, atque ventris animalia pellit, maxime si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure pingui propinentur. Ad ploræ & vlcera capitis manantia valet: confert aurium doloribus, & surditati: omnibus præterea cutis vitis, præsertim faciei: varis quæ mulieribus plerumque infestis, illito expurgat.

RICINVS PARVS ORIENTALIS,
Dende dictus, quibuldam
& Faba purgatrix.

Locus

Fructus hic, pro Dende Avicennæ ex Creta delatò mihi à Bernh. Paludano, qui est Faba

purgantis Indiæ Orientalis nomine eundem misit, & ab Ill. Medico à Saxonia, ac etiam fratre C. Bauhino oblatus, est dimidio minor Ricino Americo, cortice rectus cinericio, maculis hinc inde pullis asperso, gibbo, altera parte elatiore, pauloque plantiore, tribus interdum eleuatis costis còspicuo: cortici vulgari simili, tenui pellicula inuolutus subest nucleus, bipartitus, consistentià Ricini maioris Americi, sed colore pallido: saporis non ingrati, acris, & fauces diu & multum vellitantis.

Descriptio

Huius icon

expressitur præcedenti capite in tabella Ricini maioris Americani, loco infimo. Et aliæ eiusdem hic ex Imperato traduntur Icones.

Porro Ricinum paruum Orientalem sic describere videtur Monardes: Faba purgatrix, quæ Carthagini & Nomini Dei nascuntur, nostris similes sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula quadam tenui, ut Ceparum tunica exterior, illas per medium interfecante, quæ cum cortice abicienda est, &c. vide inter vires.

Aliquot peregrinos fructus Faba purgatiuæ nomine insignitos accepit Clusius:

sed nullus ipsi conspectus est, qui Faba purgatiuæ Monardi descriptæ conueniret. Nos contra, nostro Ricino Orientali, & Faba purgatrici, siue Dende, has purgatrices subiungimus. Quare lectorum erit iudicare an conueniant, nec ne.

Semen plantæ dictæ Mauuitanis Albelmoluch, à Serapione aliquique Arabum antiquis scriptoribus descriptæ sub nomine Dende, hodie apud eandem nationem in frequenti est vfu ad corporum euacuationes. Quia magnam habet similitudinem cum semine Cataputiæ multi idem putarunt cum Ricino Americano quamuis falsò, inquit Imperator. Serapio cæterique Arabes tres species Dende describunt, Chinenle, Indicum, & Sahaticum ex quibus Chinenle semen fert crassitudine & similitudine Pistachio-

rum



Albelmoluch
Mauuitanis
nomine

rum : Sahaticum magnitudine seminis Cataputiae : Indicum verò mediæ proportionis inter illa duo. Idem præ alijs celebrat Chinesse : Sahaticum verò reicit propter operationis tarditatem & status quos generat , & alia grauissima symptomata quæ producit assumptum. Repurgari debent semina vt idem docet , à cortice extimo , & lingulis interioribus , à quibus maximè periculum imminet. Habent namque vim causticam & carnis corrupticem , vt vel sola masticatione tactuque labiorum colorem immutent. Vnde misari subit à tam eximie calido pharmaco causari posse status. Nos vti non asseruerimus Auicennæ Dend siue Dende nostro Ricino paruo Orientali conuenire : ita etiam negare nolumus , inter obscuram & Barbaram eius delineationem. Lectores poterunt apud Auicennam legere , quæ fusè de Dende scribit.

C. Bauh. pin. Ricinus 4. siue Americanus falsò creditus : Dende Serapionis , & Abelmoluch Mauritanorum , Imperato : Serapioni , species tres sunt, Seni, Sahati, & Indiat Imperator legit, Chinesse , Indiarum , & Sahatense , minùs probatum.

Fabæ purgatricis tenuis pellicula cum cortice abicienda est ; alioquin tantà vehementia superne & inferne purgant , vt in vitæ discrimen fumentem concitiat. Assandæ autem sunt , vt illarum acrimonia infringatur ; deinde in puluerem comminuendæ. Datur hic puluis vino aut saccharo exceptus : ad cochleare vnum ; deinde haustus vini iunior. Apud Indos hoc medicamentum celebre est ob sumendi facilitatem : nam sine molestia bilem , pituitam , & crassos humores , multò lenius & facilius , quàm Nuclei piciei cathartici , Auellanæ purgatricis , & alia id genus , medicamenta. Dantur in febribus diuturnis & importunis , in coli doloribus , & articulorum morbis. Dosis esto alutarum à quaternario numero ad senarium , pluriusve aut pauciorum , pro ægri viribus. Calidè in secundo , sicchè in primo , Fabarum vulgaribus similia , quæ vomitum ciunt & aloum valenter purgant meminit Ferd. Lopez de Castagneda cap. 78. lib. 7. Hist. Indicæ.

ERAWAY RICINI PVSILLVM GENVS.

Valichius Syuertz anno 1599. redemerat de paucis ex America reducibus , Eravay , Ricini pusillum genus , quale ex Guinea etiam aliquoties aduehi meminit Clusius in Exot. l. 2. c. 21. Eo porro nonnullos empiricos aduersus varios morbos vti , non semel obseruabat : etenim quum vehementer purget , succedit illis interdum ex animi sententia : eam ob causam valde commendabant , & tanquam peculiare secretum sibi reseruabant.

C. Bauh. pin. Ricinus 4. siue Americanus minor : Eravay Clus. Exot. lib. 2. cap. 21. & Ricini semina exigua , eodem lib. cap. 25. sub fructu notat. Vter ex fratribus melius docet ? An Eravay à Ricini seminibus distinguitur ?

RICINO SIMILIS FRVCTVS.

Inter exoticos fructus , qui anno à Christi natiuitate 1601. ex Orientali India aduecti fuere , præter eos , quos in certas classes distribuere poterat , quatuor videbat , qui antè non conspecti

Tom. III.

ipsi fuerant. Horum quartus Ricini fructum valde æmulabatur , nam triangularis erat

& in tres cellulas distinctus , quarum singulæ semen continebant rugosum , vt antè maturitatem lectus fuisse videretur , nigrum : exterior cortex fuscus & glaber erat , pendebatque inter quinque foliola longiuscula & latiuscula [quæ medium fructum tegebant] è pediculo semenciali , satis firmo.

Synonima.

C. Bauh. pin. Ricinus 5. siue

Ricino affinis fructus : exoticus fructus 4. Clus. exot. lib. 2. cap. 24.

TOXICVM IN GENERE.

CAP. XVI.

Toxicum Dioscorides in proœmio libri sexti inter ea plantarum ramosarum herbarumque genera reponit quæ exitialem ac maleficam vim sortita sunt , quorumque sæpè continuo vñs homo in perniciem agitur. Consequenterque quæ priuatim Toxico conueniunt auxilia , eiusdem libri capite 20. sequentibus docet. Toxicum [*πικρὸν*] ex eo appellatum creditur , quòd Barbarorum sagittæ eo illinerentur [Plin. tingerentur.] Qui biberunt haud ita multò post labiorum & linguæ inflammationeprehenduntur , iisque furor mentis incoercitus varias imagines obuersat : quare vix medicinæ locus est , raròque qui hauserunt , incoluēs euadere contingit. Vinculis attamen cohibendi , vt vinum dulce [Ald. passum] cum rosaceo bibere , protinusque remouere , ac Rapi quoque semen ex vino haurire cogantur. Priuatim verò iis conuenit Quinquæfolij radix , itemque hircinus sanguis , aut caprilus eodem modo sumptus : proficit & Roboris , Fagi , aut Ilicis cortex cum lacte tritus. Profunt etiam Mala cotonea in cibo sumpta , aut trita [non habet Ald.] cum Pulegio & aqua bibita. Amomum denique bene facit , vt & Balsami semen [*βαλάνιον καρπός*. Vet. tamen *καρπὸς ὁμιλὸς λαμνάνων* , i. e. fructus similiter sumptus] ex vino. Quod si qui periculis defuncti sunt , longo tamen tempore in stratis decumbunt , ac ubi surrexerit , sui impotes ac velut attoniti [*ἰσπονημένοι*. Manardus legendum censet *ἰσχυμένοι* , i. e. tabefacti. Et tale quid etiam habet Auicennas cap. de Napello , qui Toxicum esse videtur : Sarac.] reliquum vitæ tempus transigunt. Et hæc Dioscoridis de Toxico verba refert etiam P. Agineta lib. 4. cap. 54. Quin & Aëtius tetr. 4. serm. 1. cap. 70. ferè eadem cum Dioscoride habet , inter alia , alexipharmacum , corticem quercinum commemorans tantum. Cùm tamen , teste etiam Galeo lib. 2. de antid. cap. 7. si quis Toxicum ebiberit , auxilium quoque afferat vinum dulce , oleum ro-

Eccc

farum, sanguis caprinus, semen Napi contulum ex vino, Polygoni succus. Plantaginifve, aut Origani, vel Thymicriam aliquantulum vino admixtum.

Tusson corrupte Aulic. Signa porro quæ ab Auicenna [qui lib. 4. fen. 6. tr. 1. summa 2. cap. 29. nominat corrupto vocabula Tusson.] ponuntur in eo qui hauserit Napellum, sunt eadem his quæ hic à Dioscoride & Paulo scribuntur in iis, qui Toxicum biberint.

Vtrum autem Toxicum frequenter nominatum à scriptoribus, sit reponendum inter Aconiti genera, nunc decernendum est. Promotus Græcus fuit huius sententiæ Toxicum fuisse non simplex genus stirpis, sed venenum quoddam compositum. Sed Mercurialis de venen. lib. 2. cap. 10. putat Toxicum, neque fuisse apud veteres vllum genus stirpis venenatæ, neque medicamenti venenati compositi. Sed appellatum fuisse Toxicum omne veneni genus, quo tela & sagittæ venenabantur, quæ à Græcis vocantur *τοξικα* seu *τοξικατα*. Vnde cum inueniatur [apud Virgilium *Æneid.* 9.

Vngere tela manu, ferrumque armare veneno. Itemque apud Ovid. lib. Trist. 3.

Nam voluerit ferro tinclile virus inest.]

Veteres consueverunt tingere sagittas Napello, Aconito Pardalianche, Elleboro, & plerisque alijs succis venenatis, tum simplicibus, tum mixtis, sit ut puter, omnia hæc & potuisse & posse hoc tempore appellari toxica, scilicet à sagittis, quæ tinguntur ipsis.

Certa veneni species. Gorrh. defin. *τοξικόν* apud Antiquos certam quandam speciem veneni terribilissimam fuisse concedit quidem, nec tamen quid esset constare arbitrat. Plinius cum scribit auctores esse qui à Taxo arbore toxica denominent venena, merito controuertitur. Sunt enim hæc duo genera venenorum manifestè distincta apud Nicandrum & Dioscoridem, suntque tam sibi aduersa vtriusque symptomata, ut iure dubitare liceat. Taxus vniuerso corpori frigoris infert, &c. Toxicum verò inflammationes & furorem. Toxicum porro, ut diximus, inter herbas exitiosas cum Taxo sapariam nominatur & describitur.

contra Plinium Apud Galenum lib. de Ther. ad Pisonem cap. 10. scripta est quædam historia Helenij, qua videtur existimasse Helenium esse venenum, quo tingebantur sagittæ, & quia certum est apud scriptores Helenium non fuisse, neque esse venenum, sed herbam quandam aliam ab Helena repertam, Ital. Scaliger in comm. ad librum Aristotelis de plantis putat locum illum Galeni ita esse corrigendum, ut loco Helenij scribatur Velenium, sc. *ἀπὸ τῶν βέλων*, h. e. ab armis, & sagittis, quasi, eo in loco vsus sit hac voce populari & romana, quæ idem significat, quod sonat apud Græcos vox Toxici. Ex certè hæc coniectura Hier. Mercurialis non displicet, ut si enim huiusmodi vox, nimirum Velenium, non reperitur apud scriptores Græcos, nihil refert, quia vox est materna populi Romani, & Galenus solet interdum usurpare huiusmodi voces, quemadmodum 7. min. nominat decoctam, quæ vox est non græca, sed populi Romani.

Toxico veneno, seu autè obiter insinuatum est, venena concta, quibus sagittæ tinguntur, generali appellatione denotantur. Huiusmodi sunt [stirpes intelligimus] Aconitum, Napellus, Taxus, Dorycnium, Sardoia herba, Cicuta, &c. Ladanium etiam quod in Syria atque Africa fit, auctore Plinio, Toxicum vocatur.

ACONITVM IN GENERE.

CAP. XVI.

Theophr. *Locus.* IN Aconiti historia tradenda eum obseruamus ordinem, quo ipsemet auctor id nobis delineandum proposuit.

Aconitum igitur iuxta Theophrasti auctoritatem, in Creta atque Zacyntho, sed plurimum, optimumque in Heraclia Ponti. *Folium* habet Cichorio simile [*κικαριώδες* : sed fortasse legendum cum Dodonæo *βατραχιάδες* : Gesnerus autem *καλαπανώδες* legit : quod & Dioscorides Plantani folium ei tribuat, & ipse eâ facie Lupariam suam, cuius flores esse ait, nouerit.] *Radice* figura coloreque Nucis [*καρυφ* : ita Gesn. cum Gaza vertit, aut etiam *καρυφ*, i. e. aridæ sicui Dod. addit : sed neutrum legendum, quin potius *καρφία*, i. e. Squillæ :] simile, & vim in hac lethalem : folium autem & fructum nihil facere aiunt : *fructus* est herba, non humilis materix : brevis est herba & nihil superuacui habens, sed fumento similis : ita Gaza. Alius sic : Herba autem semen est, non furculosæ materix : Brevis tamen herba ipsa nequequam egregiam habens [hæc omittit Dod.] Tritico similis. Cæterum, *μὲν περιττόν*, nihil egregium, vel eximium, vertit quoque Marcellus, & probat Gesnerus : quasi dicatur, etsi maximè venenosum sit Aconitum, & miris facultatibus præditum, nihil tamen herba ipsa insigni habet, aut admiratione dignum, nisi radicem fortassis.]

non tamen semen illi spicem [semen tamen in spica non habet, Gesn. Marthiolus nescio quomodo negationem non vidit, & semen in spica, velut frumentum habere falsò scripsit.] nascitur vbique, & non in Aconitis solum, à quibus habet nomenclaturam. Est autem vicus in Periadynorum [Dodonæo attestante, alij rectius Mariandynorum legunt. Theophrastus, inquit Gesn. de Lupo, loquitur de secundo Dioscoridis Aconiti genere. Non Periadynorum, ut græcè & latine legitur, & à Marcello aliisque citatur, sed Mariandynorum legendum est : sunt enim Mariandyni populi vicini Paphlagoniæ, ut Dionys. Alex. scribit, & eius interpretes Eustathius, &c.] agro. Amat maximè locos petrosos. Non vescitur eo ovis, neque vllum aliud animal. Compositum id quodammodò ferunt ad operandum, & hoc non cuiusvis esse [Gaza, confici ad efficiendum modo quodam enarrant, nec nosse quemque.] Et ideo Medicos componendi ignaros pro corroderent uti. Esi ad alia quædam bibatur, nulum sui sensum inducere, neque in vino, neque in aqua malsa. Compositi autem ita ferunt, ut certis occidere temporibus possint, videlicet duobus, aut tribus, aut sex mensibus, item anno : nonnullos etiam duobus annis elapsis. Pessimè verò illos de vita decedere volunt, quibus plurimo tempore corpus consumitur : facillimè quibus statim. [qui plurimum temporis resistere possint, quod paulatim tabescat corpus & languore pereat diuturno : facillimè illos, qui confestim obeunt, Gaza.] Nullum autem aliud pharmacum repertum esse quod nasceretur, sed quædam auxilia his qui illud ingerunt, excogitata esse.

[Remedium nusquam esse compertum, sed falsò dici quoddam aliud resistens illi adhiberi, Gaza.] Nam incolæ seruasse quosdam non herba, sed melle & vino & quibusdam eiusmodi : atque id raro factum, summaque difficultate. Aconitum verò inutile ijs esse qui præparare ignorent, nec licitum

scitum possidere, sed capitalem poenam institutam. Temporis differentiam pro collectionis ratione sequi autant, motes collectum temporibus cōpares euenire. *Haecenus Theophrastus de Aconito*. Ea autem neque Plinius, neque Dioscorides de posteriore Aconito habet: vno excepto, inquit Cornarius, quod Dioscorides etiam radices *πλεντινὰς καρίδων* comparauit, id est cirris Squillarum. Quanquam in Theophrasto non *καρίδων* sed *καρίδων* legatur, & Nuci, non Squillae Gaza veterit.

De Nepae [ira Gaza malè *νεπαίων* reddidit] vocatæ radice, quàm 9. hult. c. 14. figura scorpioni similem ait, vilemque ad eius ictum, sub Telyphono, planta diuersa à Scorpio spinoso, cap. 19. sequentibus agit. Telyphonon aliqui Scorpion vocant, eò quòd radicem similem scorpioni habet: hoc super scorpionem d. rasum, ipsum occidit. Si verò quis veratrum album inspergat, rursus resurgere dicunt. Interim & boues & iumenta, & oues, & in summa omnes quadrupes eodem die, si radix aut folium in pudenda ponatur. Vult verò est ad scorpis plagam potum. Folium habet simile Cyclamini: radicem, velut dictum est, scorpio similem. Nasctur velut Gramen, & genicula habet: amat loca vmbrosa. Si autem vera sunt quæ de scorpionibus dicuntur, iam etiam alia huiusmodi non incredibilia existunt.

Dioscorides duo ponit Aconiti summa genera. Vnum, quod aliqui Partaliches, alij Cammaron, alij Thelyphonon: alij Myoctonon, alij Therophonon [Ruell. Therophonon] vocant, & folia habet tria aut quatuor, similia Cyclamini, aut Cucumeri [Cucumeris. Marc. Cucumeri silu.] sed minora [iuxta Plin. nam perperâ legunt Dioscoridis exemplaria *μακρότερα*, Dod.] & subaspera [*κατὰ χυλὴν*, quidam verò subhirsuta, Marcell.] caulem palmi altitudine: radicem similem scorpis caudæ, Alabastri modo splendens. Hæc scorpio admodum, resoluere ipsum dicitur: excitari autem iussu Veratro appposito. Ammiscetur & ocularibus dolorum eximentibus compositionibus. Occidit & pantheras, & lupos, & omnes feras, carnibus inditum & obiectum. Aconitum alterum [iuxta Gesnerum qui re. c. cæneæ retinet] sunt qui Cynoctonon, qui Lycoctonon, qui Cyanon leucon, Romani Colomestrum appellant. Huius tria genera sunt: vnum quo venatores, duo quoque Medici vtuntur. Ex his tertium, quod Ponticum plurimum in Italiæ Iustinis montibus nascitur, antè dicto [Gesnero altero, quo Medici vtuntur, quod non descripsit, vt neque venenatorum] efficacius: Platani folia habet, sed magis incisa [Gesner. *μεκκον ἰσχυρὰ*, pluribus quàm Platanus incisus Iussif, Marcell. & Ruellius: sed licet etiam profundiores non crebriores incisuras acciperet] multoque longiora [Gesner. Ruellius & Matthiolas, qui *μακρότερα* legerunt: breuiora, Marcellus qui *μικρότερα* legit: quam vocem commodius forte latine reddas minora vel angustiora] & nigriora: caulem instar pediculi in filice, glabrum, altitudine cubitali, & aliquando maiore: semen in siliquis quadrantenus oblongis, radices citris marinarum Squillarum similes & nigras: quibus ad venationem luporum vtuntur, crudis eas carnibus imponentes: quæ in cibo ab illis sēptem eos enecant: *Hæc Dioscorides*. Hic tamen dissimulandum non est, verba illa, Huius tria genera, &c. in vulgaris codicibus

Tom. 111.

Græcis exarata non esse, sed statim huius Aconiti nominibus, natalem & descriptionem subiungit, sine vlla generum distinctione: quæ nec in Orbasio reperias, & Marcell. vt spuria respuit.

Sed antiquorum inquit lib. 27. cap. 2. Plinius, curam diligentiamque quis possit satis venerari, cum conflet omnium venenorum occisimum esse Aconitum, & tactis quoque genitalibus foeminini sexus animalium eodem die inferre mortem. Hoc fuit venenum, quo interemptas dormientes à Calphurnio Bestia vxores M. Cæcilius accusator obiicit. Hinc illa atrox peroratio, eius in digito mortuas. Fabulæ narrare de spumis Cerberi canis, extrahente ab inferis Hercule: ideoque apud Heracleam Ponticam, vbi monstratur eius ad inferos aditus, signi. Hoc tamen in vsus humanos vertere, scorpionum ictibus aduersari experiendo, datum in vino calido. Ea est natura vt hominem occidat, nisi inueniat quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus inuenit. Sola hæc pugna est, quum venenum in visceribus reperit: miumque, exitia per se ambo quum sint, duo venena in homine commoriantur, vt homine supersit. Et paulo post: Torpescunt scorpiones Aconiti tactu, stupentque pallentes & vincisse confitentur. Auxiliatur. his Elleborum album, tactu resoluente: ceditque Aconitum duobus malis, suo & omnium. [Locum hunc esse corruptum nemo huc vsque animaduertit: Cum tamen non facile possit intelligi, quomodo Aconitum duobus malis cedat, suo scilicet & omnium: nec vetus codex ita habet: fore legendum ita: Ceditque Aconitum duobus malis suo dominio, proclui lapsu vocis Dominio in voces & omnium.] Et rursus: Tangunt carnes Aconito, necantque gustatu earum pantheras, nisi hoc fieret, repleturas illos situs. Ob id quidam Partaliches appellauere. At illas statim liberari morte, extremum notum hominis gustu, demonstratum. Quod certe casu repertum quis dubitet? & quoties fiat etiam nunc vt nouum nasci, quoniam sevis ratio & vsus inter se tradit non possit. Pudendumque rursus, omnia animalia, quæ sint saluaria ipsis nosse, præter hominem. Sed maiores oculorum quoque medicamentis Aconitum miseri, saluberrimè promulgauere, apertâ professione malum quidem nullum esse, sine aliquo bono. Fas ergo nobis erit, qui nulla diximus venena, monstrare quale sit Aconitum, vel deprehendendi gratia. Folia habet Cyclamini aut Cucumeris, non plura quatuor, ab radice leniter hirsuta [Plinius legisse videtur *κατὰ χυλὴν*, pro *κατὰ χυλὴν*, subaspera, Dal.] Radicem modicam, cammaro similem marino: Quare quidam Cammaron appellauere, alij Thelyphonon, ex qua diximus causa. Radix incuruatur paulum, Scorpionum modo, quare & Scorpion aliqui appellauere. Nec defuere, qui Myoctonon appellare mallent, quoniam procul è longinquo odore mures necat. Nasctur in nudis cauitibus, quas *ἀκόνες* [*ἀκόνες* saxa ne puluere quidem tecta, *ἀκόνες*, cores, Dal.] nominant. Et idem Aconitum aliqui dixere, nullo iuxta, ne puluere quidem nutriente. Hanc aliqui rationem nominis atulere. Alij, quoniam vis eadem in morte esset, quæ coribus ad ferri aciem deterendam, statimque admodum velocitas sentiretur. *Huc vsque Plinius*, qui de vno & priore Dioscoridis Aconito scribit variegatius quàm ille, eadem omnia tradens, & plura insuper ad-

Eccc 2

dens. De posteriore Dioscoridis Aconito, velut sibi ignota, penitus silet: Theoph. seorsim de Thelyphono agit, & seorsim de Aconito, velut ab illo diuerso. Quæ autem de Thelyphono prodidit, ea omnia, inquit Cornarius, ad prius Dioscoridis Aconiti genus pertinent, velut etiam Plinius transcripsit.

*Aconiti
sumpti signa*

Porro de Aconito hæc passim apud Plinium leguntur. Pantheras perfricatâ carne Aconito Barbari venantur: occupat ilicd fauces earum angor, quare Pardaliches appellauere quidam, &c. Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum adstriptione quadam dulcescit, & subinde, potissimum cum qui biberunt, exurgere conantur, vertigines effundit: lachrymas ciet: grauitatem pectori & præcordijs adfert, simulque crebri spiritus distillantur. Oleum balsaminum aduersatur Aconito ex lacte potum, ex Heraclide verò Eryngion in iure asneris decocta: Omasi item ius, ac vitulinum seum, & castores ex lacte, aut aqua. *Hæc ille.*

Ceterum, Panthera cum Pardaliches venenum ederet, stercus hominis querit: eo enim ipse iuuatur. Quocirca venatores stercus sibi propinquum suspendunt ex arbore aliqua, ne procul bellua abeat, petens suum medicamentum. Itaque insiliens ibidem, & spe capiendi perseverans, in se efferenda emoritur.

Locis

Hoc Acherontæ litorea gignunt, authore Nicandro in Alex. pharmacis, ubi vorago irremediabilis inferni, & vrbes Priolai subiectæ resonant. Cuius omnes dentes, & superius palatum, gingiuaque adstringit amarus potus. Circa verò prima voluitur pectora malo errore grauans, Viti cor conscendens. Calamitate verò mordet summum ventris imi, non clausum attollens os ventriculi. Poræ autem obstruit principia, primum coli. Vbi omnis mortalium confestim inuehitur cibus. Semper verò ex luminibus humidis subillat sudor. Ipse verò ventriculus turbatus [inflatus] sursum quidem eructat spiritus: plurimi verò intus supra medium vmbilicum status sedent. In capite verò onus inimicum, sub temporibus verò palpitatio densa [crebra] infertur. Duplicia videntur oculis, qualia meraco noctu domiti vino &c. [tradit verò & ipse Nicander hausti Aconiti remedia: quæ apud eum videnda reliquimus, ea in genere tum ex eo tum ex alijs dilucidius tradituri.] Idæ in conuallibus, Phalacrae saltibus scæminas necans, *θηρίσπον*, & Cammorum. In cauitibus verò scæminam Aconitum producit in cacuminibus. Hæc Nicandri verba Diphilus ita interpretatur. Aconitum ex vomitu aiunt factum. Est verò plantæ radicula, similis Gramini, cuius potio amara cum sit, os quidem omne constringit: cor autem mordet. Spiritum verò ob refrigerationem pulmonis præcidit, singultus crebros perficiens. Ideo etiam stomachum continuò se mouentem impediens claudit. Ventrem verò flatibus implet & colon. Temporibus verò palpitacionem exhibens, & capiti onus, & membris sudores dementes facit & debiles. Aconitum species plantæ est, quod vocant ex accidente Pardaliches, quoddam pereat ab ipso Pardalis. Ille verò remedium habet humanum stercus. Et non prius comedunt illud [scilicet Aconitum] pardales, nisi habeant stercus vicinum, vt statim offendant auxilium. Pastores igitur oletum suspendunt in arbore. Deinde postquam comederint pardales Aconitum & impetum faciunt in stercus, tetrahunt verò illud pastores, & circumsilientes moriuntur.

Velutiebrj

Memorat Aristoteles de animal. Aconitum ex vomitu Cerberi apparuisse. Recensetur enim Cerberum ex inferis emeruisse, cumque non posset sustinere Solis radios, euomuisse, & ex ipsius vomitu hanc natam esse plantam. Acheron autem esse fluuius in Heraclæa Ponti, ubi infernalem canem Hercules eduxit. Hæc inter alia Diphilus Nicandri explicaturus sententiam tradit.

Galeno 6. simpl. septicæ & deleteriæ facultatis est. Aconitum itaque in cibo, potique fungiendum: attamen ad putrefaciendum quædam extra os & sedem aptum est: herbæ autem radix ad hæc est villis. Est & Aconitum lycocotonum similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos. Idem ad Paterniacum: Aconitum herbula est, quæ folia habet à sua radice duo vel tria similia Cucumeri, & thyrsolum non altum, radicem oblongam, & ad vnum magis tenuiorem & minutiorem: Speciem & colores ad similitudinem scorpionis pusilli sine pediculis. Vires autem habet quasi Thapsia, & valde venenosa dicitur.

De duobus Aconiti generibus Auicenna Galenium secutus sub nomine strangularis adib, id est Lupi, & strangularis Leopardi, seorsim à Napello tractauit.

Aetius tetr. 1. f. 1. Aconitum pardaliches simile facit Seridi siluestri, eademque quæ Galenus de simpl. ei adscribit, habet. Tetr. verò 4. sect. 1. cap. 59. eius recenset Symptomata & remedia. Facit, inquit contra assumptum Aconitum ius Pulli gallinacei, vt & vitulinum pingue ius potatum & vomitu reiectum. Maxime verò propriè Trixago potata, & Castorium, & Iris ac Ruta. Quanquam aliqui à nullo horum se auxilium sensisse asserant.

Diogenes Laert. lib. 5. de Aristotelis vita agens, refert eum ex Aconito hausto mortuum esse septuagesimo ætatis anno. In eum autem hoc scriptis epigramma:

*Nuper Aristotelem, laesa ut pietate nocentem
Deiulit Eurymedon sacrificis Cereis:
Ille Aconita bibens subterfugit: ceris Aconitis
Hoc erat iniustum vincere sacrificium.*

Theopompus Hist. scribit Agatarchum tyrannum multos Aconiti veneno sustulisse, conatumque esse latere: verò detectâ, plerisque Heraclæotarum non antè domo egressos, quàm Rotam edissent: Diodorus verò Siculus lib. 5. de antiquor. gestis, refert Heratem scæminam omnium primam Aconitum inuenisse, quæ scilicet ad venena mortifera conficienda summum studium operamque impendisset.

Aristoteli genere duplex esse statuit Gorthæus: Vnum cui folia Cucumeris specie, minora tamen & subhirsuta: alterius tria facit genera, &c. Ceterum, cuiusnam temperamenti sit Aconitum, nondum à Medicis definitum esse ait: humidum & frigidum statuens, ac non illis, sed totius substantiæ qualitatibus delictum. Contrà verò, Gorthæum carpens, calidum & humidum, vt pote septicum, statuit Mercurialis, eo fundamento, quodd Galeno & Auicenna distantibus calida & humida sunt Septica omnia, seu putrefaciencia venena. Quod etiam Plinius dixit Aconitum esse omnium venenorum ocissimum, falsum esse ita contendit Mercurialis. Si veteres cognouissent venena reperi quæ hodie habentur & præsertim in regionibus Indiciæ & Mauritanis, dixissent multo acutiora & celeriora Aconito haberent. Planta hæc neque folio quicquam nocet, sed tantummodò succo radices, vt apud Theophrastum

stui quidam aiunt. Cur autem potius in radicibus venenum hæc planta gerat, quam in folio, vel in fructu, puto ego nullam potius posse assignari causam: quam proprietatem specificam ipsius. Nicander vnum genus Aconiti videtur proposuisse: Dioscorides duo fecit: sunt quæ tria, & recentiores inuenerunt quoque nouem genera, inter quæ adnumerant Napellum, celeberrimum venenum, aded quod quæcunque de Aconito dicuntur, possint quoque referri ad ipsum Napellum, &c.

Dioscoridi duo, inquit Matthiolus, produntur Aconiti genera, quorum postremum triplici distinguit differentia. Primum, quod pardos enecet, Pardalianche: alterum vero quod canes luposque conficiat, Cynodonon, Lycodononque vocari ait. Hoc (vt diximus, in tria genera distribuit: veruamen postremum tantum describens, duorum priorum historiam, & vires silentio præterit. Quo sic vt Hermolai & Marcelli sententiam probandam purer Matthiolus: qui non temere quidem suspicantur, in altero capite plura desiderari, quibus & priorum historia, & quoniam pacto tum Medici, tum venatores, iis antiquitus vicerent, palam fieret.

Considerandum an Lacuna in Dioscor. bene attribuat Aconito nomen Vuz versæ, & Vuz lupinæ.

Ex veterum autem sententia sic inter Aconita distinguit Dodonæus: Dicitur Græcis ἀκόνιτον *akoniton*, item & ἀκόνιστος, μυκόνιστος, ἀκόνιστος, ἀκόνιστος. Theophrastus tamen de Aconito, Myophono, & Telyphono [quod Aconito Pardalianchi Dioscoridis responder] seorsum egit. Existimat Marcellus, quæ de primo Aconito & altero traduntur, spuria esse, & vnicum tantum à Dioscoride describi, quod videlicet plurimum in Iustinis gignitur montibus. *Is olim [Dodonæus] dicebat in hist. gall. folia subhirsuta, similia Cucumeri glaucescentia, vt ait Dioscorides, minor tamen: in posticis tamen: quia Doronicum, Aconitum existimat, dicit Cyclamini ampliora, ad Cucumeris magis accedentia, minor: suspicor eum intelligere Cucumerem fatium.*

Cæterum, nomen Aconito ab ipsis cautibus præruptis & saxosis locis esse, quæ Græcis ἀκόνιτον dicuntur, præter Theophrastum & Plinium, sentit quoque Ouidius Metamorph. 7. his versibus:

*Qua quia nascuntur durâ vimâcia cote
Agrestes Aconita vocant.*

Auson. in eidyll. 12. monosyllaborum tantum in fine positum:

Aspergit cautes, & dira Aconita creat cos.

Pallida, etiam, Nigra, Virola, & Stygia dixerunt poetæ Aconita, vt & Lurida, vnde Ouid. metamorph. 15.

Lurida terribiles miscet Aconita nouerca.

Sed aptior, inquit Aduersaria, fuerit Aconiti nomenclaturæ interpretatio, si eam ab herba succo, vel radice, quibus quasi cote spicula à venaribus effusa & subacta celerius subirent, & perniciose afficerent, quam si à cautibus, aut à pagocognomine deducas: tamen possit etiam ἀκόνιτον ἀκόνιστος deduci. Eustatius in Dionis. Afrum scribens, Aconitum sonare putat inexpugnabile venenum. Xenophon sanè in libro de venat. ἀκόνιστος φάρμακον, hoc est, Aconiticum venenum, nominat, pro quo apud Helychium & Varinum non rectè ἀκόνιστος legitur, vt testatur Gesn. de lupo. Cammaron appellatum esse refert Agricola, quod malo fato & malo interitu occidat.

Tom. III.

In insula Geo Menander scribit lege sancitum fuisse, ne turpiter viuerent, qui bene viuere non possent: nempe vt essent capularisque senes stunda. Aconito vitam finirent, ne reliquis alimentum deesset.

Ex hæcenus dictis ceterò constat Aconitum plurium stirpium vnum fuisse nomen, quas inter multas lethales compertum esset celeritatem & certissimam mortem adferre: de quibus quia veteres succinctè nimis, atque minus apertè scripsere, factum est, vt alij atque alij Aconita alia atque alia statuerint. Aconitum autem dici posse omnem herbam venenosam, Syluaticus & alij quidam huius farinae stultè persuasi sunt.

Infelicitatem Matthioli de primo suo Aconito mox demonstrabimus.

Cæterum inter Aconita recensentur sequentes Aconiti species, aliaque plantæ: Thora Valdensis. Herba paris, à Fichsio malè. Doronica. Petasites alba. Luparia. Ranunc. fl. in medio folio. Acon. lycoct. filiquosum. Dentaria. Hecateis Ouidij. Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus. Aconitum Napello simile sed minus, cæruleum, præcocius. Aconitum, lycoctonum autumnale Napello simile. Aconitum lycoctonum cum magno calcar, cæruleum. Aconitum Napello simile flore purpureo Neubogenese, foliis latioribus. Aconitum lycoctonum Lynceanum Napello simile. Aconitum coma nuntante, maximum. Aconitum 4. Matthioli, fortè Delphinij flore. Aconitum lycoctonum flore Delphinij. Aconitum lycoctonum flore maximo. Aconitum lycoctonum radice bulbosa, flore cæruleo, siue galea elatiori. Aconitum saluterum, vocant Antitoram flore luteo Aconiti. Aconitum racemosum, à Cæza quibuldam. Elleb. niger. Iris glaucescens. Ephemerum. Ranunc. fl. globoso, siue Trollius flos.

ACONITVM PRIMVM MATTHIOLI foliis Doronici.

Aconiti primum genus Thelyphonum appellatum græcè ἀκόνιτον παρδαλιαν, Ital. *Aconita pardalianche*. germ. *vulff beer* & *Dol-vventz*. Hisp. *Cenelba*, gall. *Herbe de la tova*: sapius legi [inquit Matthiol. in comm. impr. anno 1554.] in Tridentinis montibus. Huius generis est & illud, quo videntur quidam in Romano & Neapolitano agro, lupis eo tantum cadem procurantes. Radices eius pluries venales vidi Romæ in Aurelio ponte iuxta molem Adriani: quandoquidem non desunt, qui eas expetant ad mures, canes & lupos enecandos. *Hæc ille, dans iconem sine descriptione, in qua deest flos: radix autem sine vllis fibris aliquomodo exprimit caudam scorpionis: videtur autem nobis fictitia: folia quaterna accedunt ad Doronicum vulgare. In editione anni 1559. prædicta repetit, nihil addens, præter appendicem, in qua inuehitur in Gesnerum, qui existimat & scripserit imaginem esse fictitiam, allegans pro teste, contra Gesnerum, suum pictorem, & alios: Sed ipsemet si vidit plantam integram, cur non descripsit ante quinque annos, aut nunc saltem describit, accersit ex Trid. montibus vel Roma, vbi venalem (si fas est ei credere) pluries vidit, vel Neapol. agro. Si misisset aliquam radicem Gesnero, melius consuluisse suo honori, quam temere debacchando in tam modestum virum, veritatis studiosissimum. Si radices venales Romæ, &*

Eccc 3

*Contra no-
mina.
Matthioli
salsanina.*

vsus earum sit in Romano & Neapolitano agro, procul dubio suum habebat nomen Italicum, quod reticendum haud erat. In Hist. germ. impressa anno 1591. hæc habet: Aconitum pardalianches noui scriptores nunquam cognouerunt: ego autem primus reperi non longe à Tridento in monte vallis Ananiz: ne quis putet me fabulari, ostendi, &c. Aconitum quod Matthiolus primò inuenit, totum eradicauit, vt nullus hætenus simile potuerit reperire. Ei in Editione anni 1571. folia maiora quàm sint cucumeris tribuit, quæ olim in prioribus editionibus minora Cucumerinis dixerat. Tanta est huius planta cognitio apud Matthiolum.

Lacuna not.

Lacuna in Diosc. Aconiti primi Matthioli foliam effigiem habet, & præter veritatem dicit bene cognitam in Italia. Dodon. verò Gall. Aconiti Pardalian: h. Matthioli eandem cum eo dat Iconem, nec alium se dare posse scribit, eò quòd in Belgicis regionibus non proueniat, quæ excusatio au sufficiens sit, iudicent alii.

Sed & Clusius in fine historiz Dodonæ eam plantam, quam Matthiolus pro Aconito pingit, fictitiam dicit. Quare constanter adhuc crediderimus, Fuchsum & Marantham sequuti, folia quæ pingit Matthiolus, esse Doronici vulgò dicti.

Matthioli verò defensionem suscepit author H. Lugdunensis in Append. pag. 16. Eius picturam & verissimam & certissimam asserens, sed mutilam & radice tantum picta cum foliis: ac se integram nactum plantam à Sepalsario quodam in cuius horro multæ extiterint. Nasci verò in Allobrogibus in arduo & confragoso monte dicto *les Escheles*. Quis autem quæso non miretur hominis impudentiam & temeritatem? Si vidit Aconiti Matthioli integram plantam, tantopere à Gesnero & Guilandino, aliisque pluribus expectitam, & quæ nunquam potuit integra à Matth. demonstrari: cur non reposuit & misit doctis Viris, ac pingi curauit, non emendicans folia Doronici Matthioli cum eius radice ficta, cuius ipsemet Matthiolus peræ aspoitea eam mutauit, non tamen efficitur à meliore: cur appingit ei præter mentem Matthioli flores Petasidis flore albo. An non videt ille stultus, florem quem describit, non respondere Matthioli dictis, qui in vno loco scripsit flores Chrysanthemo similes esse: & in alio dicit, caulem edere hirsutum, florem videre non licuisse, verùm (si sua non fallat opinio) Doronici æmulum illum esse se existimare. Quid blaterat mendax impostor de radice simili æmulæ scorpionum quam nunquam vidit in planta quam describit, diuersa admodum à Matthiolina. Icon quam proponit, magis est falsa, quàm Matthioli, composita ex floribus Petasidis, foliis Doronici, & falsa radice Matthioli, egregium profectò monstrum.

*Aconitum
Matthioli
nondum
visum.*

Aconitum pardalianches Matthioli (inquit Camer. in Epit. in append. vbi quemadmodum & in Hist. germ. curauit sculpendam iconem, qualem Matth. habet in suis comm. cum mag. fig.) tam rara est planca, vt nondum etiam diligenter iher. barie studiosis sese vspiciam offerre voluerit. De ea itaque nihil adhuc certi indicare possum: alii planè negant extare.

Synon.

C. Bauh. pin. Aconitum pardalianches 3. siue Dioscoridis creditum Matthiolo: Aconit. pardalianches Matth. Lac Dod. gall. Cast. H. Lugd. & Tabern. An in rerum natura sit Aconitum Matthioli, dubitat Gesnerus de hort. & lunariis. In Lugd. hist. primum Matthioli figura exhibe-

tur: dein in append. iconi prius proposita, ramulos floribus onustus adpingitur: Quod aliqui fictitium existimant: Lugd. historiz author plantam in Allobrogibus nasci scribit: quid sit ignoro.

THORA FOLIO CYCLAMINI.

Caulis habet singularem, palmarem, aut festucæ etiam dodrantalem, iuncum: folia duo aut tria ex radice statim principio oriuntur, cauliqueque circiter medium adnascitur, nullo in-

terueniente pediculo, folium vnum aut alterum, vnuquodque singulare, ordine caulem confundens, circinnatæ ferè rotunditatis, Cyclamini foliis par, aut etiam depid. maius, in medio per marginem aliquando sinuatum, interdum minus, rigidum, nervosum, glabrum, argutis denticulis concinnè in ambitu crenatum: reliqua super-



riore caulis parte parua, oblonga, acuminata, simplici, aut in lacinias aliquot fissa, Thaliætri folia æmulatur: flos summo cauli insidet vnicus [interdum bifidus caulis in singulis ramis singulos gerit flores] Ranunculi & figuræ, & colore luteo: nec dissimile Ranuncolorum echino capitulum & seminibus coaceruatis conglobatum: radice numerosis constat habitaculis, oblongis, Aphroditi imitatione ad caput vnum obliquum annexis radiculis, in tenuia longaque filameata desinentibus.

C. Bauh. pin. Gesnerum sequens Thoram duplicem statuit maiorem & minorem. Maior, inquit, foliorum exortu & numero variat: nascitur enim vno folio, vel duobus, idque vel statim à radice, vel nullo à radice, sed in caule duobus maiusculis, vel trib. vel quatuor, vel quinque ad summum: hinc Tabernamont. feminam quatuor, marem duobus foliis magnis pingit. Minoris folia breviora, supernè latiora, & magis incisa: huius flos Clusio quinis, illorum, quaternis [quina nec pauciora in Clusii figura obleruo] duntaxat foliis exprimitur.

Gefn. de Lun. Tora venenata, Dora fortè dicenda potius. Lunaria quorundam, Aconitum 1. Dioscoridis, Aconitum verum pardalianches Alexandri Peieri. & Gabr. Fallopii. Eid. de quadr. in hist. lupi p. 748. Herba rara, Tora nomine in Baldo proueniens, flore violaceo. p. 947. Aconiti primum genus, folio Cyclamini, Tora Valdensium. p. 651. Aconitum Dioscoridis primum, Tora quorundam. De hort. Aconitum 1. siue pardalianches, Tora siue Toxicum vulgò Valdensium, folio nunc singulari, nunc binis, ternis, quaternis, aut etiam quinis ab vna radice: Hæc quidem sunt Synonyma Tora-
re Gef-

*Thora
plex.*

iz Gesneri, qui Matthiolum merito in eo labi affirmat, quod scribit folium ei semper singulare esse. Sed rursus aberrat, quod Toræ contra aliorum sententiam violaceum dicit.

Anguill. epist. 14. huius plantæ meminit, dicens, Ghinum Aconitum vocasse: ipse autem eam opinionem, non probat.

Thoram, Tauram, aut Turan, ut vocant, Dodon. Valdensium cognominat, ad differentiam Napelli, qui & ipse Thora vocatur. An porro cum Farfio Auicennæ eadem fuerit, disquirendum proponit, quod hoc affirmare difficile sit;

Rhegin. in exercit. refert Nepam, *oxyphion*, ex Theophrasto Aconitum primum esse: hoc autem seculo produci herbam quandam nomine Nepæ, quæ aliqui plerique herbariis Thora existimetur. Consulerent quæso lectores an Rheginus non confundat nomina duarum plantarum?

An sit verum Aconitum dubitat Gesnerus.

De *phora* Valdensium hæc in Adu. Lobelius. Non incutere quis inferet huc [inter Gramen Parnassi & Cyclamen] illam istis persimilem herbulam, quæ passim montium, Alpiumque accolis vocatur Thora, interdum nulla adiectione, interdum Valdensium. Etenim multum diu quæ venatores illius alpinæ gentis hæc vi sunt, vti etiamnum multi alij, a ferarum capturam, quibus solo sacco expresso, & spiculis illito certam citamque parant perniciem, quæ namque hæserit telum, aut vulnus fecerit, tubere repente virus, quo illico ora vulneribus [isti præcisione anteverrant] corruptur, putrescunt: unde Phthora nuncupata, vestigio manifesto de Græcis relicto: quippe *phora* corruptio, nex, venenum, aut mors. At hi quibus multis periculis noxæ sunt vires earum omnium herbarum, quæ vulgo nuncupantur Sagittariæ, cuiusmodi pluri multis Aconitis, etiam Hellebori sunt, Hispanis vocati *Hierua de los abalesireros*, propterea ista est, cæteras prope columbes & incertas ducunt. Huius verò incunte Vere ius premitur, atque vesiculis, aut potius ungulis & cornibus bouillis reconditum emittit, mittiturque venenum ad emporia finitima, ubi ad vñs annuus venationum sibi comparant ferarum insidiatores, quos vicini Delphinates, Allobrogi & Prouinciales vocant, *Besiers*, vel *Lo batiens*. Qui quidem monere potuissent pseudo-commentatorem Matthiolum, ne Pseudo Aconitum astrueret, ut quæ suæ dote superet quoduis Aconitum & toxicum.

Thoram Valdensium Clusius inter Ranunculi genera, quæ grumosa radice constant, referendam censuit, idcirco Ranunculum grumosa radice tertium cognominavit, inferens Gesnerum voluisse in epistolis operâ Wolffij editis, esse Cyclaminum tertium Plinij lib. 25. c. 9. & Limeum eiusdem lib. 27. c. 11. descripta.

C. Bauhin. pin. Aconitum pardalanchæ s. seu Thora maior: Pseudo-Aconitum pardalanchæ Matthioli: Aconitum s. seu pardalanchæ maius Gesn. hort. Aconitum Ghini Anguill. Limeum Plinij Anguill. H. Lugd. Herba thora, Limeum falsò vocari creditum Guill. pap. Tora venenata Gesn. lun. Phthora Valdensium Lob. in Adu. & Icon. Plant. p. 604. ac Clus. hist. Thora Valdensis Clus. pann. Cast. H. Lugd. & Camer. Thora mas & femina Tabern. & Gerat. Thora maior Cam. epit. Huc nos referimus Vulpariam alteram Cæsalpini. Eid. Acon pardalanchæ alterum sive Thora minor: Aconitum s. minus Gesn. hort.

Thora minor Gesn. de Acon. & Cam. epit. Thora, Valdensis Dod. Thora Sabaudica & Thora montis Bald. Tab. & Gerat. Limeum pard. l. genus vno folio H. Lugd. Ranunculus grumosa radice 3. Clus. hist.

Clusius cum Tabern. non demonstrat quare binæ illius icones differant: in foliis florum nulla est diuersitas. Vtraque enim tam Phthora Valdensium montis Baldi, quam Ranunculus grumosa radice, quinque folia floris habet.

Thoram copiosè inuenimus in monte Iura, non solum vno folio, sed etiam duobus, tribus & quatuor: florebat Iunio: semen dabat Iulio. Cæterum, in Alpibus & Allobrogum, Helueticorumque montibus gigni refertur, & apud Valdenses, ac Baldo Italia monte frequens.

Perniciosa autem & venenosa huius Thoræ vis, Napelli excedere fertur malitiam. Tantam autem esse aiunt, ut homo quidem præcipue, deinde & quadrupes, ac aliud etiam quodlibet ferarum, vulneratum aut ictum telo huius succo imbuto illitum intra semi-horam pereat ac moriatur. Negatur tamen mortiferum, si bibatur, aut deuoretur, tamen si absque noxa id non sit. Venatores succi vim expellunt, acim eo insiciunt, quæ ranam pungunt: quæ si illico moriatur, præsentaneum iudicant: auctor Gesnerus.

THORA APVLA FOLIO ALCHIMILLÆ.



Mirum nō Mannotare Tabernmontanum, vbiā terrarum Thoram suam hanc Apulam sive Neapolitanā, Alchimillæ sive Stellariæ foliis, asperis & maculosis, ut ait, alioqui aliis Thoris similibus, obseruari. Si vidit vnam cur non diligentius describit? De hac nobis nihil constat, quare

posteris de ea cogitandi occasionem non eripimus. Vbi etiam C. Bauhin. in suo pinace eius meminere, nondum intelleximus.

ANTITHORA SILVATICI folio rotundo.

Antithora 3. à Siluatico descripta, radicem habet ex rotundo oblongam, magnitudine & figurâ oliuari: folia rotunda, a fari similia, per ambitum leuiter serrata, nullis fibris donata, a fari instar. Hanc herbam semel tantum mihi contigit [inquit Tabern.] videre ab Italo quodam

ex monte Gargano allatam [qui & in Sabaudia & Pedemontij montibus copiose prouenit adferebat] sed sine floribus, quos Cyclaminis floribus similes perhibebat, colore violaceo, tribuit. Eum pro pictura nunquam licuit nasci. Radix sapore est amaro. Qui aliquando Garganum confendent montem, Siluatici Antitoram perquirent. Nos non multum tribuimus relationi Tabernamontani, & minus eius Rhizoromo, aurori Pandectarum.

Synon.

Hermol. & Ruell. Antitaura vel Antithora, herbæ Tauræ siue Toræ venenosæ, per antipathiam occurrentis. Gesn. de lun. Antithora flore subrubeo, foliis rotundis & modice incis. Eid. de Aconit. Anthora folio Violarum, floribus subrubris. Cæsalp. Figarella.

Quid est?

Quid per Antithoram intelligant affirmare non ausimus, rem diligentius exmincent lectores.

ACONITVM FOLIO PLATANI, FLORE luteo pallescente.

Descriptio



EX radice flexuosis, numerosis, nigricantibusque fibris, circilue implexis satis iucundo odore præditis, caulis surgit leuiter hirsutus, duobus cubitis altior, inanis, striatus, rotundus, tenuis, lentus, & nonnihil flexuosus, in alas diuilius: folia ampla quinque-partito primario diuisa, singulis segmentis denud subdiuisis, superius ex atro virentia inferius albicantia: vel, ut ait Lobelius, filia viticea, alie incisæ, nigricantia, & Geranii maioris vt similia, ita maiora: flores ex pediculis vncialibus, & plusquam sexantalibus, quorum singulis appositum foliolum oblongum, interdum distictum, sæpius integrum, lutei, aut ex luteo albæ herbacei, oblongi, concavi, inferius hiantes, & foliolis quinque compositi, duobus lateraliibus breuibus & latis, infimorum altero lato, altero acuminato, quinto in tubi modum, concavo, in cuius intimo recessu, duo cornicula in tipram conuoluta extremo, dorso breuem huiusmodi canaliculum sustinentia occurrunt, ad quorum coitum in floris biatu staminum conspicitur congeries herbidorum, apicibus vel albidis, vel herbidis, vel nigro mixto versicoloribus: Lobelio, flores lutei sunt, vel pallentes, Linariæ colore & effigie: siliquæ ternæ vel quaternæ, Aquiligiæ, rectæ, simul iunctæ, in quibus semen. Lob. angulosum & atrum, Trago pullum, Cephæ vel Nigellæ semini non dissimile, quod degustatum crebra spuma prouocat, naturâ calidissimum, veluti Pyrethrum.

Luparia
Ruell.

Ruellius ait Lupariam vulgò nominatam, quod sc. lupos enecet, folio vitis, multas habente diuisuras & maculas? Rose oblongo, luteo,

ideoque recentiores Lycostonon esse abstratos.

Matthiolus Aconitum Ponticum statuit, in omnibus ferè Italæ montibus præsertim verò Tridentinis nascens, foliis magis quàm Platani incis: caule filicis: floribus luteis figurâ similibus Ranunculi floribus, sed multò maioribus: vulgò Lupariam vocari perhibet, quanquàm in Tridentino, Herba vulpis nominetur, quòd radices eius tritæ & carnibus mixtæ vulpes interimit. Duae autem proponit Matthiolus in impress. anni 1554. icones: vni titulus est Aconitum 2. Et hæc icon est Aconiti quod nos hoc capite exhibemus flore luteo. Alteri titulus est. Aconitum tertium: quod nobis figmentum est, compositum fortè ex præcedenti & Trollio flore: de hoc autem agimus H. n. lib. 30. sub titulo, Ranunculi flore globoso. De hoc ait Gesn. de lupo: Matthiolus in in prior. comm. dicit Pontici Aconiti, quod Dioscorides descripsit, flores luteos figurâ similes Ranunculi floribus, sed multò maiores, & c. vulgò Lupariam dicit. Verum nostra Luparia & lutea, & cærulea, flores habet cucullatos, vt ita dicam, Ranunculi floribus longè dissimiles, quare deceptum hic Matthiolum puro. Hæc Gesnerus de Pontico Aconito Matthioli quod in impress. anni 1554. Aconitum tertium inscribit. Cæterum, ritè consideranti verba Matthioli, apparebit illud nesciuisse, quid scriberet, eique incognitas plantas fuisse, ac duas confudisse: Tridentini Medici & pharmacoꝝ ei pendunt an vtraque planta, Aconitum 2. & 3. in proximis montibus proueniat, an ibi sit in vltu Aconitum Matthioli flore Ranunculi, quod nobis persuadere haud possumus. In comm. anno 1559. impressis, antè citatis, de tertio genere loquens, hæc addit: Quamquam Gesnerus de animalibus, negat inueniri Aconitum cuius flores lutei sint, atque Rosas æmulentur, attamen de cipitur: siquidem plures exstant montes, qui hoc Aconiti genere scatent. Quare me hic vera scripsisse, Gesnerum contra veritati refragari, posteris omnibus testatum relinquitur. Sed modestè Gesnerus scripsit, vt ante ostendimus, prudenter quoque fecisset Matthiolus, falsus si fuisset suum lapsum, pari modestiæ erga Gesnerum vsus. Ille nunquam, nec eius buccinatores patroni, fautores, & discipuli monstrabant Aconitum prouenire in Tridentinis montibus, nec in aliis, quale suâ iconè proponit Matthiolus. Esto sanè prouenire planta planè similis eius figmento: non tamen propterea foret Aconitum Dioscoridis Lycostonon, & Luparia communiter dicta, de qua Gesnerus & nos hoc capite agimus. De Aconito Matthioli flore Ranunculi, pluribus locò à nobis dicto agimus, quod non negauit Gesnerus prouenire in Tridentinis montibus, si vera iconè exhibeatur, nec veritati refragatur in iis, quæ scripsit contra Matthiolum loco allegato. In comm. cum magna figura eadem scribit cum præcedentibus, mutatâ nonnihil iconè. In icon. impressis anno 1571. Aconito suo secundo, in altis montibus nascenti, & præsertim in Baldo in Veronensi agro, & Aconito tertio flores adscribit purpureos, ita vt manifestè appareat has plantas non sibi notas fuisse: cum in aliis Editionibus Luteos, vt reuera sunt, verisque Aconitis flores tribuat.

Per tertiam & vltimam Lycostoni Dioscoridis speciem, licet Lacuna intelligat hanc plantam, Lupariam vulgò dictam, & aliquibus Nappellum existimatum, floribus luteis, Linariæ similibus

milibus, attamen Aconitum secundum inscribit.

Gefn. hort. Aconitum secundum, vel lycoctonum, Radix lupi Tigurensum: efficacior floribus luteis: Item, Aconitum 2. flore albo, Napellus albus. Eid. in app. Aconitum pallido flore Luparia vel Lycoctoni nomine vulgo dictum; Aconiti species alia floribus albis, folijs minoribus, radice simili, nempe latiuscula, distincta: In monte fr. Aconitum luteum. De quadr. secundi Dioscoridis Aconiti genera duo agnoscit, luteum & ceruleum: quorum illud multo venenosius & vehementius est, à Theophrasto & Dioscoride descriptum, ac Germanis Luparia per excellentiam dictum. Hoc quoniam radix interdum filius nigra, fusca scilicet & nonnunquam albicans Lupariam albam nominant. Alij Patam lupinam vocant.

Luparia [inquit Silaut.] est herba interficiens lupos, & potissimum pulvis ex ea: quidam falsò dicunt Radiculam esse, siue Helleborum nigrum, cum reuera sit Strangulator adip.

Turn. Aconitum alterum Dioscoridis, folio Platani profundè inciso, floribus luteis, siliquis brevis, semina nigra continentibus, in hortis duntaxat nascens.

Dod. Aconitum ponticum: Eid. de purg. Aconitum luteum maius: officinarum plerarum Napellus: strangulator lupi Arabum, hoc est *Cannab. adip.* Avicennæ: In fol. lat. Aconitum lycoctonum maius.

Thal. Aconitum licoct. luteum. Lob. in Icon. Plant. p. 677. & Obs. p. 385. Acon. luteum ponticum, Lupicida.

Camer. hort. Acon. lycoctonum fl. luteo, Lupariam Helveticè duplicem statuit: & Maiorem folio latissimo, minus nigro, & serotino magis flore ait à minore discrepare, alioqui similes esse plantas. Hinc in Epit. & Hist. Matthioli duas habet figuras: Vnam inscribit Aconitum secundum, floribus luridis, aut luteis pallecentibus: Alteram, Aconitum sextum, Napello simili folio, sed multò maiore, & albis quibusdam luteo-virentibus, floris figura ad Lupariam accedens, colore pallecente luteo-vire. Celsalp. lib. 15. cap. 32. Napellus primus, folio Platani, &c. Eid. cap. 33. Lycoctonum ponticum Dioscoridis, folijs effigie Platani.

Tabern. Icon. & Hist. Aconitum Matthioli secundum: Item, Aconitum 7. siue luteum seu ponticum. Eid. hist. Aconitum 8.

C. Bauh. phyt. Aconitum 1. siue lycoctonum luteum: dilutius quandoque viret, interdum & flos pallidior, communiter ex pallido luteus. Habetur & flore albo in monte Murreto. Eid. Aconitum 7. siue inflexa comâ, folijs latioribus: Acon. 6. Matthioli, floribus purpureis, Camerario pallecentibus luteisve. Apud Marth. Acon. siue lycoct. luteum; Acon. 2. Matthioli floribus purpureis: Item, Acon. 10. siue sextum Matthioli floribus splendens purpureis. *Nos nunquam* compertimus Matthiolum dixisse aconitum suum 1. floribus esse purpureis, imò manifestè ait subluteis. Sexto quidem adscribit purpureos; Verùm ubi splendete dixerit, nondum legimus. Illud nobis constat, eum nihil certi aut serij de hoc aconito, sed tantum ineptam proposuisse figuram sine descriptione: descriptio, quam hic addit, convenit descriptioni 2. à Matthiolo posite: frater etiam ponit figuram Tabernamontani. Quæ occasiones ut non separemus hoc sextum à Matthioli, donec nobis de Tom. III.

demonstretur, cuius plantæ imaginem Matthiolus exhibuerit.

Ακόνιτον ἱερεῖον, ἀκόνιτον κυνέκτονον & λυκόκτονον Synonyma Græcis: Germ. *uolffs uunrtz*, Luparia: Rhætis Nom. ling.

Ris de lup, id est Radix lupi: Gall. *Tue loup*. *Estrangle loup*. *Madriettes*, Fuchl. It. *Aconito per amassar lupi & cani*: Hisp. *Terna mata lomos*: Angl. *uolfs bayne*, *Telobbe uolfs bayne*, *Playne*: Boh. *uomog*.

In altissimis montium vallibus nascitur in variis Germaniæ Aultræ & Pann. ac Helvetiæ locis: in sylva Hercynia præsertim. Refert Matthiolus in Italiæ omnibus ferè montibus nasci, præsertim in monte Baldo in Veronensi agro: Thal. in montibus cædis, præsertim ubi graminum maxima est luxuries, Strolberg, Ilfeld, &c. Genueris sapissimè iuxta petras montium emicare vidit, etiam in ipsis petris & rupibus sed terra interdictis. Matio floret: in hortis ex semine nimium propagatur.

Qui Aconitum antiquorum esse admittunt, vires ex antè dictis petant. Lupariæ herbæ, semen aut radix in puluerem redacta, & cum oleo temperata, ut vnguentum inde fiat, illiciti pediculos ac fures quocunque tandem inueniantur loco, cæcat ac expellit: idem radix præstare potest, si in aqua vel lixio decoquatur, ac cum illa postea caput abluatur: est autem adurentis facularis sicut & Napellus: quare intro sumi non debet, inquit Tragus. Quam enim noxia sit planta internis corporis partibus, interitu conuiuarum Antuerpiensium, qui in acetarijs harum radice vescentes diem suum obierunt, abundè demonstratum fuit. Perhibet & Dodonæus, cui olim calida & sicca erat in quarto gradu, facultatem huius, veluti & reliquorum Lycoctonorum hominibus exitalem esse, & reliquis quoque animantibus perniciosam. Inter venena atrocissima reponitur à Lobelio. Pro deteriore cæteris Aconitis veneno habent venatores, inquit, qui Lupicidam vocant, non quòd idem non faciant aliæ, sed quia citius & certius: quin hominibus in locis adultæ flores, vel solo mansu fauces linguamque tumore excitato adurant & vertiginem cient. Germani rhizotomi mures occidi promittunt, si Lupariæ radicem tritam cum pulvere ex Aueniæ aut Frumentii farina mixtam gustauerint.

Vires. & Vius.

NAPELLVS VETERIBVS.

CAP. XVIII.

AVicennæ Napellus est venenum perniciosum. Temperam. Asum. natum à in summo caliditatis & siccitatis gradu. Est venenum destruens bibentem se, maior verò potio est medietas drach. & minus hoc interficit. Theriaca verò eius est mus Napelli, qui eo nutritur, semen se. ex eo cibans. Ex omnibus autem confectionibus diamoschum magis Napello resistit: lib. 2. Coll. tractat. 2. cap. 499. Est & Napellus Moyfi buha [subdit cap. 500.] quæ est herba nascens cum Napello. Et cuiusque Napellus appropinquat, non crescit, vel non fructificat arbor eius. Et est maior Theriaca Napello. & in ipso sunt omnia iuuantia, quæ sunt in Napello ad albas & ad lepram. Napellus verò Moyfi est animal, quod moratur in radice Napelli, sicut mus. Confert ad albas & ad lepram. Est Theriaca omni veneno

ffff

& viperæ. Napellus porro est [vt refert lib. quarto fen. 6. tract. 1. summa 2. cap. 1.] de deterioribus. Et accidit potanti ipsum, vt apostementur labia ipsius. Et lingua eius, & egrediuntur oculi eius, & frequens sunt super ipsum vertigo, & Syncope, & non exercere seu non mouere potest crura ipsius, & est malum, & qui euadunt ex eo raro euadunt quin cadant in hecticam, aut phthisim, & quandoque facit epilepsiam odor eius. Et eius succo imbibuntur sagittæ, & interficiunt, quem inueniunt, statim. Oportet autem vt festinetur ad faciendum vomere bibentem ipsum cum decoctione seminis Napi: & Rapæ, & dentur in potu vinum, & butyrum coctum vaccinum, dando potum super potum, & similiter decoctio corticum glandium cum vino. Deinde cura eius principalis est Bezahar, & medicamen de muscho, & Algeduar, & buha seu bis mus buha, & theriaca magna quandoque confert in eo vsque ad terminum. Et de melioribus rebus est vt detur in potu muschas in fricatione albezahard: aut quantitas 3 j. de medicamine muschi cum filiqua vna muschi. Et existimant quidam quod radices Capparis sunt Bezahar Napelli. Et omnia albezahard sunt bona ei, & propriè illud quod simulatur alumini, & habet fila sicut fila lithargyrii. Et animal mus nominatum Napelli, & est mus contrarius Napello, & destruitur eius operatio, cum comeditur ex ipso. Resistit & Zedaira Napello, cum quo illa crescit. De Napelli assumpti signis & curatione consulendus etiam Rhazis & Haly.

Cæterum, crediderunt aliqui Napellum Auicennæ esse speciem Aconiti: Verum Manardus eius fuit opinionis Napellum Arabum & Toxicum Græcorum idem esse venenum, quam opinionem non omnino repudiandam censuit Lacuna.

Auicenna [inquit Leonie de err. Med.] existimat Cicutam, Succaram, esse Napellum, aut venenum, quod interficit hominem, & non interficit turdos. Galenus non de Napello & turdis, sed potius de Cicuta & sturnis hæc intelligi voluit. Signa quæ ab Auicenna ponuntur in eo qui hauserit Napellum sunt eadem quæ à Diosc. & Paulo scribuntur, de ijs qui Toxicum biberint. Quod in autore Pandectarum legitur, atque ab omnibus ferè Medicis creditur, Napellum esse speciem Aconiti, id ex Auicennæ sententia affirmari non potest. Aconitum enim duplex est auctore Galeno: de ijs autem duobus Aconiti generibus Auicenna eundem Galenum secutus est, sub nomine strangulatoris adip, id est lupi, & strangulatoris leopardi, ac scorum à Napello tractauit. Quod Galenus de Cicuta & sturnis, non autem de Napello & turdis, vt in ore est omnium ferè Medicorum, qui solà Auicennæ auctoritate freti id constanter affirmant, interpretandus sit, experienciâ compertum habetur. Quis enim dixerit an Turdi sine noxa Napello vescantur: cum quid sit Napellus ex ipso Auicenna non constet.

Idem Pandect. author, vnum Aconiti genus idem facit cum Napello apud Arabes celebri, sed falsò, cum potius videatur Geinero Ellebori nigri species esse.

Equiuoca

Cæterum inter Napellos sequentes recipiuntur & recententur plantæ: scilicet, Aconitum folio Platani flore luteo pallescente, quod est Napelli primum genus Clusio, Napellus officinarum plerarumque de quo antè Aconitum magnum

purpureo flore. Aconitum Lycoctonum autem naturale Napello simile. Aconitum lycoct. Napello simile, flore purpureo, Neubergeris, folijs latioribus. Aconitum lycoctonum flore maximo. Acon. lycoct. radice bulbosâ, flore cæruleo, galea elatiori. Aconitum racemosum, adæa quorundam. Antihora, flore luteo Aconiti. Crescentij Napellus, siue, vt ait, Napsus marinus, in litore maris crescens, venenum pessimum & perniciosum, summè caudum & sicum, quod linitum delet maculas cutis, &c.

NAPELLI MUS VEL MVSCA.

De animali, quod Napello nutriatur, hodie autores miris conueniunt. Sunt enim qui murem sunt & alij qui muscam esse contendunt.

Aduersus Napellum tam perniciosum venenū remedia quædam enumerat Auicenna, quæ post venenum ipsum vomitione redditum præsidio sunt: atque inter ea murem etiam [vt autè videre licet] reperiri Napello enutritum, qui naturæ eius maleficæ totâ substantiâ aduersetur, & assumentem ab omni vindictæ ac liberet periculo.

Antonius Guainerius Papiensis suâ ætate celeberrimis Medicis, in tractatu suo de venenis, hunc non murem, sed muscas esse existimat. Refert siquidem quendam Philosophiæ ac veritatis studiosum, sollicitè admodum ac diligenter murem huiusmodi quæsiuisse, neque vnquam vel murem, vel arrosam etiam Napelli radicem ab eo repertam: sed muscas abundè multas folia depascentes inuenitas, quas Philosophus ille muris loco accipiens, antidotum ex ijs confecit, quam & aduersus venena alia, sed contra Napelli vtilissimam ac efficacissimam comperit. Accipit hæc terræ Lemniæ, baccarum Lauti, antidoti Michridatis singulorum Vnc. duas, muscas Napelli 24. mellis & olei, quantum satis est.

In eadem cum Guainerio & Philosopho illo sententia sunt quoque P. Pena, & M. Lobelius, qui murem Napellum depascentem nusquam asserunt visum: sed muscas esse, quæ turmatim aduolant, & floribus huius insident. Napellus, inquit, à quouis animalium illibatus perstat, præterquam à muscis quæ illi turmatim insident & aduolant, & floribus fortè innaicuntur, sunt enim ferè concolores, maiores quam communnes, alis capitulisque ex lurido viridive cæso virentes, quasi cantharides, vel cincedulæ. Hæc attentius obseruauimus quidem continenter de floribus rostellis delibantes: cæterum murem Napelli frustra diu & multis auulis plantis quæsiuimus, & an vidissent opitiones percontati, vsquam sibi visum negabant. Quare siue murem, è musca siue musca fecisse istos Arabas, iam rum suspicio nos incescit: quippe nullum antidotum è mure parant, è muscis præstantissimum, aduersus funestum tarantæ morsum, atque epidemicos morbos, cuiusmodi est hæc: 14. Muscas quæ passim ceperint de Napello n°. 20. Aristolochiæ, boli Armeni añ. Drach. 1.

Cæphas porro muscas, quæ ex Aconiti cærulei seu Napelli floribus viuunt, studiosè Anglos obseruasse testatur etiam Thalius.

Matthiolus corâ gloriatur se murem, qui Napelli radicibus vigilat, pluries in Ananienibus montibus inuenisse. Sed quandoquidem controuertitur, an mus vel musca ab Arabibus rectè reddatur, cur Matthiolus non descripsit murem, & quo

Citra

Toxicum
Græcorum

Pandect.
error alius

Remedia
aduersus
Napellum

Musca
Guainerii

Musca
Lena

Cæphe
Anglorum

& quo in loco, quaque figura, quibus auxilijs denique eum deprehenderit? cur non indicavit, an eum noctu vel interdum obfervavit? cur non iconem, quâ formâ radicem arrofam eruerit, exprefsit? cur diutifimo id eam pingit?

Verifimile itaque est, vel Dodonæo teste, non muræ esse, qui Napello fuffeteretur, sed mufcas esse, quæ linctæ eius vivunt. Nam Aconitum, cuius Napellus species, mures ipsos interimit: atque inde *μυρμηκίων και μωσφόρος*, siue Muricida dicitur.

ACONITVM MAGNV. PURPUREO
flore, vulgò Napellus.



Consultius ex hortis exularet perneabile Napelli virus, nisi stultæ voluptatis illecebrarum quam sanitatis studio flores esse velimus, facileque illice hoc oculorum pabulo intractatum cum, gelubrium aut falsè innocentium, tum amœnorum fecunditate carere possint viridaria & paradisi: est autem trium cititer cubitorum altitudine, ac etiam

humanâ, rigido, fractoque contumaci caule, teretibus, purpurascens: qui in ramos diductus, in singulis longâ gestat florum spicam cæruleorum, & cucullo folia reliqua, quaternâ numero, obtegentium quos sequuntur, singulos tria ferè Aquilegiæ cornicula, semine plena: folia alterno situ vncialibus pediculis, atro virore nitentia. Aconiti lutei lycoctoni folijs maiora, in crebriores lacinias angustas multum diuisa: radice Napi parui magnitudine, nigra, fibras è lateribus producit, sæpè & alios Napos collaterales adnatos habens.

Herbam, Germanis *Eisenhuetlin* dictam radice Lupariæ, satis locundo odore, Tragus trium generum esse statuit. Maximam, Minorem, & Flore luteo. Nos hoc præsentis capite de maxima specie agimus, & de minore fortè sequenti. Fruticem flore roseo suspicamur esse Nerium. In Hist. germ. Aconiti facit speciem alteram, Napellum vulgò dictum, eas tamen picturam non exhibet.

Labello in Aduers. [vt etiam in Obs. p. 687. Icon. Plantar. pag. 679. vocat] Napellus vulgaris, vulgò Germanis *Kappenblumen*, dicitur, & propter similitudinem Brabantis *Mueneschappen*: Insignis, inquit, radix, insignior & flos, arguto naturæ opere: præ se namque fert cucullæ hiantis aut caldissis speciem. Hulus vides acclives montium saltus Iunio & Iulio perquam elegantem, & luxuriantem furdere vberatam in Rhæticiis alpinis, cui tamen [puncto illic arroso Gramine] parcat quantum est pecoris, præsertim secus iter, quo Constantia Nataretum versus itur, vbi à quouis animalis milibatium pessat, præterquam à mufcis Nec in villa Tom. III.

planta huic Napello congenerè, mufcæ hæc cæruleæ insident aut victitant, quo certior est coniectura istam Napellum esse Arabum, idemque Dioscoridis vnum ex Aconitis: Fortè autem Rappen pro Cappen legit Lobelius.

Turnerus vocat alterum, Aconiti secundi genus, folio magni aliculus Ranunculi, copiosè proueniens in ipsis Alpium iugis inter Splengen & Clauennam. Fuchsius in suis paradoxis, nihil aliud Aconitum esse putat Mauritanis & præsertim Auicennæ quàm Napellum. Quâ in re meo quidem iudicio [Matthioli verba sunt] fallitur, quippe quoddam reperio Auicennam de vtroque Aconiti genere scriptitasse, & alterum appellasse Strangulatorem adib, alterum verò Strangulatorem Leopardi quæ nomina eadem sunt, quæ apud Græcos Lycoctonos & Pardalianches: atque eundem prius magnâ differentiâ speciatim de Napello egisse constat. Præterea Napellus radicem Aconitis longè dissimilem proferit: sicuti & folia, quæ potius Artemisiâ, quam Cyclaminum & Platanum referunt. Flores item edit purpureos, qui antequam dehiscant, mortui hominis carnationem repræsentant, dehiscentes verò pandunt seic Vitiæ mortuæ modo. Caules ei bicubitales, & aliquando maiores: semen paruum, nigrum, corniculis conclusum breuibus. Quæ cerè omnia & harum plantarum discrimen aperit ostendunt, simul & Fuchsi sententiam refellunt. Hinc itaque colligendum putauerim Aconitum cuiusque generis nullam habere cum Napello cognationem &c. Ceterum addiderunt Manardus & Leonie, quod Napellus & Toxicum Græcis vocatum inter se non differant: sed isti aberrarunt. Hæc Matth. qui pro Napello iconem exhibet minùs artificiosam, & fortè ipsi minùs cognitam: quandoquidem Napello radicem assignat Aconitis longè dissimilem. Quæ autem est dissimilitudo in radicibus Aconiti eius 2. & 4^{ti}, & Napelli? Quæ item in com. cum mag. fig. in radicibus Aconiti sexti & septimi, vbi Napelli longè diuersam proponit iconem, potissimè radice & folijs: caules etiam Aconitorum Matthioli aliquid commune habent, cum caulibus Artemisiæ: flores etiam, quamvis colore variant, formâ conueniunt: sed & vires quoque penè eadem sunt.

Lacunæ Napellus, caulibus Artemisiæ maioris, floribus pu. puris. Thal. Acon. cæruleum seu Napellus cum cæsis mufcis. Geln. hort. Aconiti altera species cæruleo flore: Tota Italorum quorundam, etiam flore purpureo: Sueui aliquæ Germani vtramque Lupi radicem vocant. Eid. de lupo, Aconiti secundi Diosc. genus alterum cæruleum, luteo minus venenosum & vehemens: Napellus Arabum: Luparia nigra.

C. Bauh. pin. Aconitum 10. [u. phyt.] siue cæruleum, seu Napellus 1. *Eisenhuetlin* Brunf. in. 4. p. 292. siue icones; Trago. Napellus Matth. Lon. Dod. Cast. H. Lugd. & Cam. vulgaris Clus. pann. Napell. a. boreus Eyll. Napellus verus Lob. Obs. p. 387. cæruleus in Adu. & Ici Plant. pag. 679. Napellus maior latifolius & angustifolius Tabern. Napellus reticulatus, Cæsalp. Aconitum lycoct. cæruleum Dod. gall. Aconitum 2. vel lycoctoni species altera Geln. hort. Aconitum lycoct. 6. Clus. hist. Aconitum cæruleum Geln. coll. Thal.

Foliis est latioribus, & angustioribus [siue maior & minus, vt habet in phyt. & hinc apud Tabern. binæ figuræ: [flore communiter cæruleo, aliquando purpureo, roseo, albo, & è cæruleo &

Ffff 2

albo colore variegatus, qui Napellus flore variegato Byk.

Germ. *Eisen huetzelin*, *Narren cappen*, *Capenblinemet*, *blauw voolffvuerle*, & *Tenfelsvuerle*. Belg. *voolffvuerle*, It. & Hisp. *Napello*. Angl. *Blauw voolffvuerle*, Gall. *Cappe de Moyne*, *Ebleu the lomp*.

Locus

In Alpibus Ananise & Rhatizæ, tum alibi in montibus, vt Hircynia Saxo nō huringica, sæpè quidem iuxta saxa, sed magis in terrenis, nullo ferente provenit: apud Belgas quandoque in hortis reperitur, teste Dodonæo. Maio aut Junio, interdum etiam feriùs, aliofif locis flores vigent: semen Augusto dat. montbelgardi spontè copiosè provenit inter pontem Vauvaucourt & Dampierre, ac vltèriùs inter dumeta. Non longè à pagō Audincourt ad Dubin elatiori loco, qui non alluitur, Septembri mense copiosis floribus vidi anno 1608. ad hominis circiter altitudinem ex crescere.

Vires & Virus.

Vis & facultas Napelli & homini & quadrupedibus multis perniciofa est. Evidenti, sed perquam miserabili experimento, id Antuerpiæ olim compertum, in recenti adhuc est memoria. Cùm enim ab imperitis huius inter acetaria illata essent radices, quicunque eas ederunt, mox sauisfimis correpti symptomatibus breui vitam cum morte commutaverunt, testimonio Dodonæi, qui olim calidum & siccum ad quartum gradum pronuntiabat. Quin & Turnerus perhibet Gallos quosdam Antuerpiæ, pro Imperatoriz, in acetario comestis Napelli radicibus, intra biennium omnes obiisse, exceptis duobus histriionibus, qui eas reuenerunt. Caueant sibi igitur mortales, ne brevis florum elegantia, graui dispendio veneni radicum compensetur. Carulei Aconiti radicibus qui pro Elleboro nigro vtebentur, pharmacopolas in Sabaudia vidit Gesnerus. Sed & Syluius alicubi reprehendit: idem à nonnullis in Gallia fieri: cuius erroris occasio eis fuit radicis color, & quod ventris proflutium similiter moueant, & quod Elleborus ipse eis deesset. Saxonie se audiuisse narrat fuisse Medicum Germanum, qui omnes peste correptos curarit imposito pro vesicante Napello, eo scilicet vitulentiam omnem ad se trahente. Narravit nobis nobilis quædam femina, multas aliquando gallinas, quæ *Narren Cappe* comedissent, fuisse mortuas: quibus verò Allia & acetum fuisset exhibitum, euis fuisse.

Descriptio.

ACONITVM NAPELLO SIMILE, SED minus, caruleum, præcocius.

VNius aut duorum cubitorum proceritatem assequitur minor Napellus, caule gracili, sabbiifuro & subrobente, non ita recto: folia Napelli, minùs tamen crebrè partita, licet in quinque lacinias profundas primarias diuisa, quarum singulæ rursus variè subdividuntur, colore atro-virente nitido, ex pediculis duas tresve uncias longis: flores carulei, coccullati, pilosi, quorum galea lingulas duas occultat purpurascens, quorum capitulis impositus viticulus liquoris mellis: continet: duæ florum alæ (supremo s. o. margine galeam ingrediuntur, infimos margines excipiunt duo subiecta folia, quorum quatuor complexu comprehenduntur atro-purpureorum staminum villi: radix subest nigra, oblonga, fibrosa.



Camer. Synonym

hort. Aconitum alterum, Napellus citius florens & vulgarior. Trago Aconitum minus. Clus. pann. p. 406. & 407. Aconitum Lycoctonum 2. siue præcox Tauricū: Eid. hist. Aconit. lycoct. 4. Tauricum. C. Bauh. pin. Aconitum 11. [siue phyt. 12.] violaceū seu Napellus secundus.

Inuenitur in Tauricis montium iugis, non Loc. procul à Salisburgo, in quibus floret Iulio, in cul- Temp. tis verò multò maturius, imò reliquis Lycoctoni generibus præcocius, nempe Maio interdum mense, autore Clusio. Montbelgardi floret Iulio, & citius Napello, cui adèd simile, vt difficulter ab illo distinxeris.

ACONITVM LYCOCT. AUTUMNALE, Napello simile.

Folia huius media quodammodò sunt inter Defect. Thora[Aconiti lycoct. radice bulbosà] & ter- tij generis peregrini [Aconiti lycoct. Neubergeri] folia, Thora quæ dem Italicæ foliorum quasi æmula, nonnihil tamen ad terrij generis peregrini foliorum formam accedentia, nec illis minùs ampla, atra viriditate splendens: superne: caulis illi bicubitalis, crassus, firmus, striatus, virefens & splendens, lumino fastigio florum spicam, ter- tio peregrino generi ferè unilem gestans: quibus etiam succedunt parces siliqua seu capita, & simile semen: radix illius etiam radicis par, perennis, & multis ad latera adnatis se propagans.

Descriptionis auctori Clusio dicitur in pann. & Synon. hist. Aconitum lycoctonum 7. vel autumnale: Dod. purg. & in fol. lat. Aconitum lycoct. alterum tota externa facie Napellum referens, sed radicem filamentis ac citris multis tantummodò confibratarum ac Napo nequaquam simillum differens, Napello feriùs muld, proliferum. Lob. Obs. pag. 386. Aconitum autumnale, facie Napelli toto vultu, & paritate Napellum referens, Belgis hortenses, Augusto & Septembri florens.

C. Bauh. phyt. Aconitum 6. siue caruleum Napelli flore, radice fibrosa, Acon. lycoct. 2. Dodonæi. Eid. Aconitum 15. siue purpureum autumnale seu Napellus, Acon. lycoct. 7. siue autumnale Clusij. N. g. duo sunt, sed vnum Aconitum. Quare in pin. sub Aconito 7. siue caruleo Napelli flore meritiò comprehendit.

Alebat hoc genus in Belgicâ Clusius, Bruxellâ primùm ipsi communicatum, deinde eius opera Viennam delatum, eius vrbis elegantiores hortos ornate cæpit. Florebat feriùs, nempe Augusto, eam ob causam Napellum Autumnalem appellare solebat.

ACONI-

ACONITVM LYCOCT. CÆRVLEV, calcar magno.

Altitudine vix cedit Napello, caule inani, purpurascens, qui subhirsutus videtur: folia Aconiti lycoctoni lutei foliis simillima, in latis dissecta lacinias, hirsuta: summus caulis in longam abit spicam florum pulcherrimorum cæruleorum, longo rostrato Aquileg. æ, vel Consolide regalis corniculo, librantis se columbæ æmulo, cuius extremo hianti folia subsunt quaternæ, aliorum Aconitorum modo, & in horum medio stamina multa: ad florum verò exitum bina foliola angusta ceu cornicula quædam eriguntur: hinc succedunt terne iunctæ corniculatæ siliquæ, semen continentes, nigricans, rugosum: vixit, auctore Cluio, crassa, tuberosa, uti alterius Lycoctoni flore Delphinij quod apud B. l. gas alitur, nigra, rugosa, concaua, graviter olens, multis tenuibus, fuliginosæque lanugine pubescentibus fibris



prædita, ad cuius latera secundum infimum caulem singulis annis nova germina repullulant.

Camer. hort. Aconitum flore Delphinij, trium vel plurium cubitorum. Clus. pann. p. 404. Aconitum lycoct. 1. Lycoctonum flore Delphinij cæruleo, Silesiac incolarum Lupinæ radix: Eid. hist. Aconitum lycoct. flore Delphinij 1. Silesiacum. Gesn. hort. & in App. Acon. cæruleum aliud, luteo illi, quod Lupariam vocant, cognatum, in montibus quibusdam Bernensium ditionis, Großberg Rittersporen:

Camer. apud marth in hist. Aconitum 3. Eid. in Epit. Aconitum 4. flore cæruleo caudato. Taber. Icon. Aconitum matthioli fixum: Eid. hist. Aconitum 7. matthioli 6. flore Consolide regalis. Tabern. longè diversam ponit figuram à matthioli. Ea enim in floribus calcaria habet, matthioli contra nulla.

C. Bauh. pin. Aconitum 5. [4. phyt.] siue cæruleum hirsutum flore Consolide regalis, Acon. lycoct. cæruleum aliud Gesn. hort. Hoc Aconitum Gesneri C. Bauhin, olim referebat ad Aconitum seu cæruleum glabrum, quod inscribimus Acon. lycoct. flore Delphinij.

An Alcionium Anguillaræ epist. 12?

Nascitur referente Achille Cromero frequens in montibus territorij Freyvaldensis in Silesia, ubi in tricubitalem altit. interdum exrescere & angusto florere ait: in horto verò Iunio.

Radix hinc amara est sicut Anithoræ, & virium, ut Gesnerius conicit, eandem, non ita venenola ut cætera Aconita.

Tom. III.

ACONITVM LYCOCT. NAPELLO simile, Neubergerse, foliis latioribus, flore purpureo.

Atiora vulgari Napello habet folia, licet similiter incisa & laciniosa, magis atra similiter & splendens: caulem rectum, firmum, rotundum, trium interdum cubitorum altitudinem æ-



quantem, & in multos ramulos superiora parte sæpè numero diuisum, qui flores spicæ instar congestos, ferunt, colore purpureos. Napelli vulgaris floribus planè respondentes, hoc est, quatuor foliis constantes, quinto veluti galeola supereminente, & bina circumvoluta, instar litui, cornicula occulente, stam-

inum tamen media congeries magis fusca est: florum spica in extremo caule nascens, reliquis oblongior est, & magis expansa: singulis floribus terna succedunt cornicula, interdum quaternæ aut quina in caput vnum congesta, semen atrum & inaequale continentia: radix illi vulgaris Napelli instat, parvo Napo similis, cui in lateribus adherent alij Napi, fibris præditi, quibus se propagat.

Clusio, descriptionis auctori, dicitur in pann. p. 406. Aconitum lycoct. 3. vel Neubergerse: Eid. hist. Acon. lycoctonum 5. quoad iconem, 3. quoad descriptionem, Neubergerse. C. Bauh. pin. Acon. Sync. nitum 12. [4. phyt. siue purpureum foliis Napello latioribus] siue purpureum, seu Napellus tertius.

Crescit in montis Neuberger Ducatus Stirie iugo, ad vaccarum, istic æstius mensibus pascendum, habula. Floret paulò post vulgarem, videlicet Iulio.

Locus & tempus.

Aconitum lycoct. Lynceum Napello simile.

Medium quodammodò inter vulgarem Napellum, & genus Aconiti præcedens, quartum hoc peregrinum genus, siue ordine septimū, statui Clusius: folia enim illis similia obtinere scribit: caulem inter illos medium, infirmiore tamen, & supernâ parte aliquantulum nutantem, flores utriusque floribus prorsus respondentes, nisi cassis supra quatuor folia eminens, magis subleuaretur & haret, rostròq; magis mucronato esset: semina in ternis corniculis simul iunctis similia: radicem etiam non multum variantem.

C. Bauh. phyt. & pin. Aconitum 8. siue comâ inflexâ foliis angustioribus. Acon. 7. Matthioli H. Lugd. Acon. lycoctonum 4. vel Lynceum Clus. pann. p. 409. & hist. Eid. apud Mart. Acon. 11. siue sextum Matthioli. Non audemus nos gerere

Ffff 3

asserere huc esse referendam ineptam Matthioli figuram Aconiti eius 7. flore purpureo. Siquidem de ea, ut ei confectum, nihil solidi scribit. Sursum igitur perit. Clusij iudicio assentimus. Titulum porro in flexa comæ nolumus ei tribuere, ex sola inani Matthioli figura, quia Clusius suo Lycoctono in flexam comam non adscribit.

Missum fuit Vennam hoc genus Clusio, & Lyncæanis floribus erutum, quod postea in hortu aluit, floreus cum superioribus, aut paulo etiam serius.

Vires &
vires

ACONITVM LYCOCT. COMA nutans maximum.

Descriptio



Trium interdem cubitorum altitudine allargit, caule tamen satis gracili, rotundo, superiore parte in multos ramos diuiso & nutante: summo caule longam forum spica fert, Lycoctoni cærulei vulgaris, siue Napelli dicti floribus sinilium sed paulo dilutior purpurâ splendentium,

quorum singulis (ut in aliis Lycoctoni generibus) succedunt terna longiuicula cornicula ex eodem pediculo nascentia, semine inæquali, fusco plena: foia ampla & oblonga, in multas reuolues profundâque lacinias magis diuiduntur, quam in villo alio Lycoctoni [præter id quod à Belgis flore Delphinij nomine alitur, inquit Clus.] genere, quæ supernè atra quidem viriditate prædita sunt, non splendunt tamen: radicem habet crassam & longam, Napi ferè magnitudine, foris nigrescentem, & per intervalla multis fibris donatam, ac superiore parte in multa capita extuberantem, quibus caules emergunt: subinde tamen recentes exigui Napi ad latera enatos habet, quibus se propagat.

Clus. pann. p. 410. Acon. lycoct. comâ nutante 5. siue Lycoct. maximum: Eid. hist. Acon. lycoct. 5. quoad descrip. 8. quoad iconem, comâ nutante: forrè Matthioli nonum. C. Bauh. pin. Aconitum 9. sine inflexâ comâ maximum: Acon. 9. Matthioli H. Lugd. Aconitum comâ nutante Clusij. C. Bauh. in phyt. Acon. 9. Matthioli diuersum erat ab hoc Clusij. Hoc quidem, nonum ipsierat: Illud verò decimum, siue bulbosum inflexâ comâ. Nos autem potius existimamus Aconitum 9. Matthioli esse Antithorac amplexit aliter sentit Clusius. Suspicionem nostram mouet flores, quos luteos ait, & figura, quæ aliquo modo Antithorac respondet.

Hoc Aconitum à Frid. Sebizio primum ex Italia Vienoam delatum est, & Clusio communicatum. Floret autem Iulio.

Locus.

Aconitum 4. Matthioli forrè Delphinij flore.

Apud Matthiolum in impress. anni 1554. est icon sine vlla descriptione, nec indicat, à quo habuerit eam, contentus solâ inscriptione Aconiti quarti. Habet autem ea icon folia in multa segmenta diuisa, ad Napellum accedentia: caulis vnus diuiditur in aliquot ramos, abundantes floribus, in quibus calcæria: radix fibrosa est. In iconè Compendij impressi anno 1571. non sunt flores magni, quales ei in delineatione ipsius textus adscribit. Quare existimarem ea verba, si rei mittit aureos magnos, pertinere ad Aconitum tertium, sed id prohibent post dicenda. In comm. in pressis 1559. præter iconem & titulum nihil habet Matthiolum. In comm. cum mag. fig. anno 1583. hæc addit: Sane mihi sex Aconiti species, de quibus qui meminere habeo neminem. Harum imagines, quas appingi curauit, misit ad me Hier. Donzellinus, qui tamen Dominico Moulesuro has acceptas referebat. Harum historiam describere operæ pretium non duxi, quod appisset imagines eas ad vium repræsentent. De floribus tantum dicam, qui in quarto & nono aurei sunt, in reliquis verò purpurei. Ex quibus Matthioli verbis apparet, ignotas ei fuisse plantas sex, quarum proposuit icones. Quartæ tribuit colorem luteum. Ego putabam fuisse aliquem Typographicum errorem, nunc tribus ignorantia Matthioli, qui omnes sex scribit ad vium repræsentari cum tamen quinque pessimæ sint. Nec potuit ferre sententiam Matthioli, non viliis plantis ipsis sicis, vel virentibus. Nec plura in comm. Ital. habet, impressis anno 1568. Ibidem etiam tribuit colorem giallo: in Hist. verò germ. dicuntur flores purpurei.

Camer. apud Matth. in hist. german. Aconitum 4. Eid. in Epit. Acon. 4. floribus cæruleis caudatis. Synonyma

C. Bauh. phyt. Aconitum 5. siue cæruleum glabrum flore Consolida regalis: An quartum Matthiolum licet floribus dicat aureis, Camerarius tamen in Matth. dicit cæruleis: Acon. cæruleum aliud Gein. hort. Eid. apud Matth. Acon. 5. siue 4. Matthioli: An forrè Acon. lycoct. flore Delphinij cæruleo Lobelij & Dodonæi? Item pin. Acon. 6. siue cæruleum glabrum flore Consolida regalis: Aconiti genus floribus cæruleis Gein. hort. Acon. Lycoct. flore Delphinij Dod. Lob. Acon. secundum Clus. hist. Acon. lycoct. cæruleum i. fl. Delphinij Dodonæi Hist. Lugd. p. 1742. An. Acon. 4. Matth. Lac. & H. Lugd. p. 1742?

Aconitum cæruleum, aliud ego potius ad Acon. C. Bauh. lycoct. cum magno calcari, quod ipsi 4. est in phyt. referendum censeo. Idem in pin. ad Aconitum 5. quod ei in phyt. 4. est retulit. Acon. flore Delphinij Dod. Lob. Clus. & H. Lugd. hinc commemoratum, ab eius glabro separato.

ACONITVM LYCOCTONVM Flore Delphinij.

Aconitum lycoctonum, quod à flore Delphinij cognominatur à Dodonæo, procerum assurgit caulibus instar Napelli: folia variè similiter & creberrimis incutis diuisa: flores secundum caules superius, veluti in longam compoliti spicâ, è pumice ac obscuriore colore purpuream

puram emulantur; formâ ferè floris Regij, in posterius videlicet corniculum desinentes: *siliqua* & *semen*, vt maioris lycoctoni lutei: *radices* oblongæ, crassæ, tres aut quatuor demittuntur, paucis adhærescentibus filamentis.

Ob floris differentiam, Aconitum lycoctonum flore Delphinij [inquit Lob. in Obs. pag. 386.] discernunt nuperi; cui radices ternæ, quaternæue Anthoræ, quasi nodulo aptæ in fibras desinen-

tes: caulis binnûm, interdum ternûm cubitorum: folia altè & minutim diuisa, Anthoræ vel Napelli, sed minora: semine & siliquis non diuersis.

H. Lugd. p. 1742. Acon. lycoct. cæruleum 1. flore Delphinij Dodonæi. Clus. Acon. lycoct. fl. delphiniij.

Hanc plantam esse Aconitum quatuor-

tum Matthioli nandum asserere audemus. Matthioli radix est fibrosa: Dodonæo verdè & Lobelio bulbosa: Iconem nostram sculptam emimus.

Hoc Aconitum munere Robini hortulani Regij Parisi primo vidit. Montbelgardii semen terræ communissimam plantam dedit, quæ floruit Iulio.

ACONITVM LYCOCT. FLORE maximo.



lem nonnunquam, rotundum, non valde crassum, firmum tan en & rectum; ex viridi purpureascentem, superne quinos aut senos fereutem,

flores, inter omnia Lycoctoni generâ maximos, quatuor foliis vt reliquorum generum, constantes, supereminente galeâ longè maiore, & vncialis aliquando longitudinis, elegantis è cæruleo purpurei coloris, sub qua bina longa cornicula extrinâ parte latiora, & litui veterum Romanorum ferè instar inflexa, coloris dilutius purpureascentis, teguntur, staminibus nigris medium florem occupantibus, floribus succedunt tria plurimum cornicula, coniunctim ex eodem pediculo nascentia, interdum quaterna & quina, vt in tertio peregrino Clusij genere [in Lycoct. Neubergerli.] sed longè maiora. *semen* inæquale, & fuscum continentia: *radix* parui Napi formam æmulatur, nigricantibus fibris prædita: alias præterea similes radices lateribus adnatas habet, tenuioribus adhuc fibris quæ singulis annis adhuc recentes caules proferunt: sed etiam infimi caulis nodis adnascuntur tubercula, non secus ac in Italica Thora.

Clusio dicitur in pann. p. 410. Aconitum lycoct. 6. [9. ad iconem] Iudenbergenf. C. Bauhin. pin. Aconitum 13. [14. in phyt.] siue cæruleo-purpureum, flore maximo, siue Napellus 4. Acon. fl. cæruleo. Napellus serotinus Camerarij.

Spontè prouenit in Iudenberg, altissimo totius Scitiæ monte: Floret Augusto; in hortis Loens & verdè sub extremum Iulium, seriùs reliquis superioribus. Anno 1585, copiosè quoque inueniebat Clusius, in quodam Schneeberg iugo, quâ diffillimus est ascensus.

ACONITVM LYCOCT. FLORE cæruleo, galea elatiori, radice bulbosa.



hirsuta: flores galeati, rari, cassidem longam erigunt, colore dilutè cæruleo.

Clusio Aconitum Lycoctonum 10. dicitur. C. Bauh. pin. Aconitum 14. [16. phyt. & 11. apud C. B. in con Matrh.] siue cæruleum minus, siue Napellus minor, in editionibus locis exilior proueniens. In phyt. dubitat an esset Aconitum 8. Matthioli: apud Matthiolum id asserit: in pin. negat, & facit 15. Aconitum, siue ramosum paruo flore; Aconitum 8. Matthioli H. Lugd. Floribusque ait esse luteis: Matrh. purpureascentibus: at Camerario tubescantibus.

Describitur à Dod. de purg. & fol. pro Aconi-

Præter fibras quibus subinde radicatu terre hæret, bulbos gerit turbina- tos, è quorum basi fibræ altè exeunt: siliis ex caule alternatim produ- cuntur, me- diocri ampli- tudine, quæ in quinque pro- fundas laci- nias, rursùm leuius subdi- uisas, conscin- duntur, splen- denti virore prædita, sub-

Descriptio

Dod. notat.

to lycoctono tertio, pingiturque sub titulo Aconiti lycoctoni cerulei parui. Dod. huc refert Aconitū minus Tragi, contra opinionem nostrā. Descriptiones duas habet Lobel. in Obs. pag. 186. Vnam titulo Lycoctoni cerulei parui, Napelli facie: Alteram titulo Aconiti minimi. Neutra autem cum descriptione Dodonzi in totum conuenit, cuius figuram etiam in Ic. Plant. p. 678. sub priori titulo proponit. Remperpendant lectores.

Camer. apud Matth. huius ineptam figuram habet, sub Aconito octauo. Eid. hort. Thora Italica.

An Alcionium A. guillare?

Aconiti genus hoc radice paruo Napo simili Tiguri in Gelnerti orto, Iulio mense florebat.

Locus

ACONITVM RACEMOSVM, ACTÆA quibudam.

Descript.

Christoph. viana herbarijs dicta. radice crassiuscula, foris nigra nititur, fibris donata Dodonæo interius lutei colore lutea: caules ter quicubitalēs, ramoli, reuēs, teretes, geniculati: folia rugosa, inferne spicidentia, nonnunquam virinque, & si tota cui fiderentur, valde ampla: abeunt enim in tria segmenta pediculis palmatis & setis upatimibus donata, atque hæc rursus trifariam diuisa, sapiusque interdum triplici illā diuisiōe dissecta, ut tandem terna simul folia singularia conspiciantur, Imperatoriz quodammodo similia, oblonga, acuta, profunde satis incisa, quorū medium foliū incursus duobus profundioribus dissectum tripartitū appareret: Flores racematim dispositi, cāidi, ex foliis quinque caducis



compositi, intra quæ stamina candida, herbido nonnunquam apice: bacce succedunt, vel, ut ait Dod. fructus rotundi, paulò longiores, per maturitatem nigri, striam lineamue, ab vna parte ostentantes, vuarum acinis alioqui similes, & in vix modum coherentes. Nostram interim ætatem Christophorianam, & S. Christophori herbam vocitare tradit Lobelius (qui quoddam vas ferat æqualeis annumerauit. Jussieuque qui Costum nigrum dixerit: alios tamen maluisse Aconitum bacciferum nominare. Costo autem nihil habere respondens. Aconitis verò annumerari, propter perniciosam & Aconito similem, quam habere credatur, facultatem.

Cæalpino Barba capri quorundam. Aret. apud Geln. Aconitum racemolum. Geln. hort. Christophoriana vulgo Italarum. C. Bauh. pin. Aco-

nitum 16. [7. phyt.] siue racemosum: An Actæa Plin. lib. 27. cap. 7. Christophoriana Clus. hist. Tab. Camer. & Eyst. cui & Costus niger quorundam. Napellus racemosus H. Lugd.

Plerisque Germaniæ & circa Rhenum Mosamque locis, in syluis præsertim montosis occurrit, viuaci & diuturna radice, quorannis cauliculos & folia regenerans. Flores Maio, sed fructus Augusto, aut ferius, perficiuntur.

Fertur exitialis Christophoriana, ac non minus noxia quàm Aconitum.

ANTITHORA FLORE LVTEO, ACONITI.



Antithora pernecabili Thoræ veneno aduersa, dodrantem alta, interdum & cubito procerior, caule est singulari, rigido, anguloso, subhirsuto, cui folia alternatim adnascuntur, Napelli æmula, tenuius dissecta, & splendoris illius expertia, auersâ parte albicantia, sapore amaro prædita

Lobel. Nigellæ quadantenus similia: flores non inguato odore præditi, cucullati, & rictu hiantes Napelli penitus, excepto colore, qui huic ex flauo pallens: corniculata feminis vascula itidem consimilia: radix ex bulbis oliuariis constat, foris fuscis, intus albis, gustu amaris, fibratis.

Lobelio geminz radices, Cyperti aut Orchidis, foris rugosæ, fol. de. Dod. foris sublauescentes, interius candidiores, fractu, ubi resiccant, contumaces, friabiles tamen, ubi quidem suæ spontis est: fecunditate enim læti aut hortensis soli, lasciuienti subinde longiores ac plures subnascuntur radices.

Pro Zerumbet à Constantinopolitanis vsurpatis radicibus mihi olim eiusmodi exhibita, nempe pyri-formes, siue turbinatæ, aliz viciales, aliz duplò maiores, crassiusculæ, quædam rugosæ modicè, quædam minime, in quibus Zonulæ quædam, & aularum librarum vestigia, coloris extrinsecus fusci, intus albi, capite umbilicato, vnde emerisse videretur caulis: consistentia dura, solida: sapor amarus.

Matthiolum in prior. comm. est Napelli genus alterum. Is hoc tantum pingit. Meminit quidem Napelli Moyli, quam aliqui Anthoram vocent, quæque antidotum sit: verum non demonstrat quæ herba sit. In post. comm. lib. 4. cap. 80. eandem pingit sub Anthoræ titulo, immutatâ tamen nonnihil figurâ, cui ex auditu flores purpureos adscribit. ac addit: missam sibi esse radicem Anthoræ orientalis à Qualcebeno, dicente, mercato-

ics vo-

res vocasse Zedoariam, ideoque se existimare, quod si Anthora, Zedoaria Auicennæ non fuerit, nihil aliud esse quam Napellum Moysi, ab eodem descriptum: Imò se credere Napellum Moysi, & Zedoariam apud Auicennam idem cum planta hac, quam integrè non cognouerit.

Camer. in Epit. Math. Anthoræ attribuit flores in luteo pallecentes, refertque purpureos à se non visos. Adhuc se obseruasse, non vnius modi figuram representare radices Anthoræ: aliàs enim singulare tuber habere, aliàs geminas coherere: esseque vel turbinatas, vel oblongas, nonnunquam triplices inueniri, nonnunquam quæ scorpionum imaginem imitentur. Et hanc varietatem iconibus binis hic adiectis rei herbariæ studiosis indicari voluit. Eadem in hist. germ. tradit. An eadem Aconitum nonum?

Gesl. hort. Antithora vera, Aconitis cognata, Antora & Napellus Moysi Matthioli, Item, A-

conitum salu-
tiferum, Anti-
thora & Antora
vocatam. Eid. de Lun. in
fine, loquenti
de Antithora,
Anthullia Gal-
lorum Alpihus
Italiæ finitimo-
rum.

Anthora, in-
quit Dodonæus,
estigit Napel-
lum refert. La-
cus Lemani ac-
colæ & Taurini
figures vulgo
Antithora appel-
lant. Dicta au-
tem Anthora,
quasi *ἀντιθώρα*

quod nempe
Thoræ aduerse-
tur, & alexi-
pharmacum e-
ius sit. Thoræ
autem ac Antho-
ræ, siue Tura
& Antura
voces, nouæ
quidem viden-
tur: sed tamen
extant apud
veterem Mar-
cellum Empiri-
cum, qui ex
Tura & Antura
aduersus leu-
comata & al-
bugines oculo-
rum medica-
mentum coh-
ficere docet.

Meminerunt
quoque Antho-
ræ Simon Ianuensis in Synonymis & Arnold.
Villanoua in tractatu de venenis: sed quæ adfe-
runtur, non satis notam aut cognitam ipsis fuisse
Anthoram ostendunt.

Lobelium quod attinet, is in Adu. p. 329. Anthoram Delphinii delineationem explorare posse

Tom. III.

credidit.

Tabern. Anthoræ duas species tradit. Harum primam ait esse flore ex luteo pallido: Alteram solo flore cæruleo à prima distinguit, & iisdem locis provenire scribit, sed rariorem. Anthoram Dioscoridis Delphinium arbitrat. An autem flore cæruleo vident Tabernam. dubito: fortè recordatur Antithoræ Matthioli. Sed quæ rarior sit, cur non particulatim describit, & loca, ubi repperit indicat? Medici & pharmacopœi ab eiusmodi Anthora sibi caueant. C. Bauh. pin. ignorat & quærit quid sit.

Gerardo Anthora, siue Aconitum salutiferum Casp. Bauhino phyt. & pin. Aconitum 17. siue salutiferum, Napellus Moysi, & herba Napello similis eiusque veneno repugnans, Auicennæ: Anthora Matth. Gesl. hort. Lon. Cæalp. Cast. & Camerar. Anthora Lob. Dod. Tabern. & Ger. Vulgaris Clus. hist. Aconitum salutiferum Gesl. hort.

Zedoaria vera Serap. Zedoaria Gieduar Aëtio, Aëtuario Zadoura, Zadouaria, Zadwa. Zaduaria Auic. Napellus Moysi. Germ. Giffibeyll. Gall. Anthole. Ital. Antora. Angl. hol/once vvoes barv.

Anthora Rhetici atque Sabaudici alpihus emicat Æstate: quæ Taurinorum, Ligurum & Lemnorum accolarum operâ, plurima cōpiâ cœpta Venetiis adferri plusculis ab hinc annis. Est enim prope Geneuam & ad Allobrogum Delphinium alpes multa, Lobelio: Vt & in Galliæ Cisalpinæ & Liguriæ montibus; Matthiolo: Ac in Heluetiorum Alpihus Tabern. Ex his autem in Germaniam infertur & colitur in hortis, ac facillè ex radicibus provenit: ex femine rarè ante triennium oritur. Geneuæ in monte Thuri florèt copiosè Iulio: semen maturat Septembri.

Anthoram magno quodam providentiæ div. munere aduersum Thoræ pernecabile virus comparatè rentur Taurini, Ligures & Lemani accolæ. Addit Anton. Guainerius tractatu de peste, diff. 2. cap. 3. magnæ etiam esse aduersus pestem efficaciz. Præstant Anthoræ radices [inquit Matthiol.] non solum ad epotum Napellum, sed ad cætera quæcunque venena, quinetiam ad viperarum & reliquorum venenosorum morsum. Ligures Anthoræ radicibus [vt audio] felicissimè vtuntur ad intestinorum vermes. Dantur quoque vtiliter aduersus pestilentiam: & ad omnes internos dolores. Auxiliantur omnibus cordis affectibus, nec minùs præstare dicuntur, iis in febribus pestilentibus in quibus exanthemata lentium figura exoriuntur. *Hacilla*. Sed iuvenes Medici & prudentes non nimium credant virtutibus quæ à Matthiolo huius plantæ radicibus tribuuntur: caueant ne pro Antithora [Matthioli opinionem sequentes, dicentelque Antithoram esse flore luteo] sumant Aconiti, vel Napelli speciem: caueant etiam à radicibus sibi incognitis, quæ venduntur pro Anthora siue Antithora, facillè enim venenata radix pro salutifera obtrudi potest: fortè Matthiolus habuit copiosè missas Constantinopoli, quas cupiebat diuendi, dum tantopere eas extollit, & ad omnes internos dolores vtiliter dari scribit, & auxiliari omnibus affectibus cordis [cur ita vendit radices plantæ sibi incognitæ. Considerent lectores an radix purgans conueniat commorlis à viperis & cane rabido: itemque peste laborantibus? Quis tandem credat radicem purgantem

Gggg



auxiliari omnibus cordis affectibus. Agrytis plurimi fit, ad omnium venenorum amolenda nocumenta, dum plebeculam panegyricis declarationibus excitam præstigiis illis oblectant, & illudunt. Amorem auerſatur plebecula illic, aitque si quidpiam peramarum gustarit, amarior esse Anthora. Aduerſus morbos cōtagioſos & febres vruntur Veneti. Dodonæo Anthoræ radix est valdè & insigniter amara: aduerſatur venenis omnibus: vrilis ad purgationes: serofos liquidem & mucosos etiam per inferiorem ventrem educit humores: lumbricos & ventris tineaſ pellit educitque, Hugo Solenius non modò per inferiorem ventrem, sed & per superiorem largas ait Anthoræ radices expurgationes moliri: modum esse ad quantitatem Faselii [quem vulgò Fabam vocat] ex iusculo aliquo aut vino: darique duris corpore.

DE TITHYMALO IN GENERE.

CAP. XIX.

Tithymali genera, Dioscoridis, Plinio, Galeno & Apuleio auctoribus septem sunt. Primus Characias siue masculus; Alter Myrtites siue Myrsinites, fœmina; Tertius Paralius; Quartus Helioscopius; Quintus Cyparissias; Sexus Dendroides; Septimus Platyphyllos.

Theophrastus tres tantùm enumerat 9. hist. c. 12. maritimum: masculum Olæ folio: myrtarium candidum, folio Myrti: Vel, secundum Dodonæum, Paralium, marem & fœminam: Myrtitem: Vel, Characion, Myrtitem & Paralium, Coin.

Differentia
florum.

Plures autem hodie, quàm vel apud Dioscoridem extent, habemus Tithymalos, quarum partim consulas ab authoribus, nec verbis designatas, partim affectas orationi non intellectæ Dioscoridis, quambilet suis indicis deinceps illustrabimus & emendabimus. Dioscoridis quidem oratione quasi filo Ariadnæ ducti, sed nostrum ordinem sequuti, accuratioremque ex inspectione descriptionem; quò quælibet planta, cui proprius quadret, magis perspicuum fiat. Tithymalorum historiam satis confusè Mauritanii tradiderunt. Mihi difficile videtur, inquit Matthioli, discernere quæ Tithymali genera ex iis quæ à Græcis representantur, ea duo sint quæ à Mesue & Auicenna Scebram & Alsebram nominantur: quoniam horum neuter, quod extet, earum plantarum faciem noris explicauit. Credit Brasauolus illud esse Mesuei Alsebram minus & Auicennæ Scebram, quod Dioscoridi paralium. Sed ab eo dissentio, quòd nusquam legerim in horum monumentis Alsebram minus in maritimis nasci, & Auicenna dicat Scebram in hortis coli, foliis Tarco similibus. Nec possum cum eodem sentire, quod Alsebram maius apud Mesuem, & Mehezehegi apud Auicennam, idem sint Mauritanis, quod Græcis Tithymalus platyphyllos. Putauerim minoris generis, Scebram siue Sebram, esse officinarum Esulam minorem, Tithy, cyparissiam Dioscoridis. Alsebram maius siue Mehezehegi eam omninò plantam, quæ Pitusa.

Nomina
linguar.

Τιθύμαλον Dioscorides: τιθύμαλλον Theoph. Lactarium Gaza vertit. Latini, Plinio auctore lib. 26. cap. 8. Lactarium herbam, & Lactucam capri- nam nominant. Sic etiam Columella, à lacti si-

mili humore, qui secto aut vulnerato folio, caule, aliæque parte defluit. At Celsus lib. 5. cap. 7. Lactucam maritimam appellat. Non tamen omnis Tithymalus, sed marinus ita propriè vocandus. Reperitur & Lactoris Esulam officinæ dicunt, teste C. Bauhino. Rei herbariæ periti etiam apud Germanos omnia Tithymalorum genera, *Wolffsmilch* & *Tausfel* milch vocant, h. e. Diabolicum lac, sicut illud Lupinum lac. Belgæ *Wolfs melck*; Galli *Herbe à laist* nominant: Itali *Tithymalo*: Hisp. *Leſche tresna*. Angli. *vulde spurge*: Boh. *kolovratce* & *Ehrvogka*. In vniuersum Tithymalus ab Arabibus nominatur *Xanſer* & *Ethuha*, Matth. Maucitanis *Xanſer* & *Ethulia*, H. Lugd. A succo lacteo quo turgent differentie cunctæ, nomen factum commune Tithymalis vel per diphthongum potius, auctore Lobelio, Tithimalis, quòd mamam siue papillam vberis exitiolam virolamue non inſcitè interpreta- tur.

Quod porro Theophrastus lib. 9. cap. 15. è Tithymalo Hippomanes fieri dicit, Theod. Gaza *neis thyma* Hippophaſ legendum contendit, & multi sunt qui ipsum sequuntur, sed haud ita clarum quâ ratione ducantur, teste Cornario. De Hippophae & Hippomane ageinus ante Tithymalum ferratum.

Cæterùm, florem semenque Tithymali æstate perſciant: nonnulli seriùs, alii citiùs; in quibusdam regionibus priùs; in frigidioribus tardius.

Omnes porro vincentem habent acrem calidamque facultatem, inest verò & amaritudo. Valentiſſimus eorum est liquor: dein fructus & folia: postremò radix. Hæc aceto incocta, sanat erolorum dentium dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæterùm, si aliam partem contingat, continuò adurit, vlceratque illam, ex quarto existens calefacientium ordine, qui ad exurentia pertinet. Sic pilos quoque & verrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inunctus succus euellit: detergitque lichenas & pſoras, propter amaritudinem: nec non vlcera phagedænica, anthracode, & gangrænode, quia valenter caſcit & deſiccit, aliquando inuare poterit. Ad hæc fistularum callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus præſtare poſſunt, sed imbecilliùs. Quibus sanè & ad piſces in aqua ſtagnali capiendos vr̄i aſſolent: celeritè enim ab illis in vertiginem acti, ac ſemimortui rediſſi, ad aquæ ſuperficiem ſeuantur. Porro cùm ſepem ſint Tithymalorum genera, valentiſſimus eſt, quem Characion maremque nominant: & fœmina vocata myrsinites: & qui in petris naſcitur arboreſcens. Deinceps qui Phlomo aſſimilis eſt: & Cyparissias. Dein marinus: ac denique Helioscopius. Proportionem autem facultatis ipſorum & cinis, & lixiuium exiſtet, *authore Galeno*. His ſimilia Tragus habet. Omnia Tithymalorum genera adurendi vim obtinent, inquit, in primis verò lacteus eorum ſuccus, quare rarò citra noxam ſumi poſſunt. Semina pares, habent facultates, ac calidiora & actiora ſunt, aliumque turbant, & vomitiones poſenter excitant. E radicibus, herbis & lacteo Esularum ſucco vnquentum efficaciſſimum aduerſus ſcabiem capitis contagioſam, quàm Germani *Den herbgrinde* vocant, conſici poſſet, eſtque hoc ſingulare quoddam medicamentum. Tithymalorum verò omnium ſuccum per inferna purgandi validam vim habere atque potentiam: Biſem, pituitam & que-

& aquosos humores ducere etiam in exigua quantitate sumptum; sed ventriculorum vehementer conturbare, & interna viscera inflammare: eamque ob causam ab eius usu doctos ac prudentes medicos abstinere, refert Dodo-næus, qui nec foris eos tunc adhiberi monet. Facinam Tithymali succo suffusam ante alueos dispersam gittantibus lacertis, omnibusque animalibus aliis pernitiem adferre testatur Alianus. Narrat apud Plinium lacte tithymali inscripto corpore, quam inaruerit, si cinis inspergatur, apparere literas, & ita quidem adulteras alloqui maluerit, quam codicillis. Nonnulli tandem succo Tithymali albo propter calorem intensum in eo existentem coagulant Mercurium, & eiusmodi liquorem Lac virginis appellant: verum falsum fundamentum hoc fuisse perhibet Paracellus.

TITHYMALVS CYPARISSIAS.

Radix minimò digito crassior, sæpè tenuior, fibrosa, lignosa, & non u. quam icpens, caules promit dodrantales, & cubitales, primò simplices, postea ramulos, in quibus folia primò



Linariæ, mollia, quæ postea tenuiora multò cum in ramulos diuiditur: flores in umbellæ quasi formâ dispositi, longis pediculis folia quibus donantur perforatis lutei, ex quatuor quasi semilunulis coniunctis extrorsum vergentibus corniculatis, apicibus item luteis: quibus triquetri succe-

dunt loculi, in quibus semen: ab eadem quoque radice exurgit cauliculus, (ego pro abortiu habeo, licet à nonnullis pro priuata specie proponatur,) quorum folia breviora multò, pinguiora, subrotunda, auersâ parte plurimis punctulis seu stigmatis rufi notata, in quibus ramulis non memini florem obseruare: est mihi etiam platicaulis: lacte autem partibus omnibus turget.

Hic Tithymalus pro anni tempore & ætate insigniter variat. Quare nemo posthac mirabitur, si authores in eo delineando non parum variare percepit.

Dioscor. Tithymalus quintus siue Cyparissias caulem proferit dodrantalem [οὐκ ἀπὸ τοῦ] aut etiam altiore, subrubrum [ὑποερύθινον], ver. non habet] ex quo folia Pini similitudine pullulant, molliora tamen, tenuioraque: atque in totum nuper nascentem pinum æmulatur, vnde & cognomen traxit.

Plin. quintum Tithymalum Cyparissiam vocari testatur propter foliorum similitudinem, caule gemino aut triplici, nascentem in campestribus.

Tom. III.

Tragi icon τὸ *ὑμῶν* *κυμαρίσιος* non differt à Icon Trag. Fuchsi icon; quæ est Tithymali Cyparissias verno tempore prouenientis priusquam in ramos diuideretur.

Si Matthiolo coniectandum esset, potaret nil aliud Mauritani esse minoris generis Alcebram siue Scobræ, quam plantam hanc, officinis Esulam minorem vocatam. Hanc autem eam esse suspicatur, quam Dioscorides Tithymalum Cyparissiam. In post. comm. item Hist. germ. & Epic. miratur quod Dioscorides hoc Tithymali genus *κυμαρίσιος* appellauerit, cum Pinum, non Cyparissium referat. Matthiolum imitatur La-
Disse. net. cuna.

Lonic. duas habet icones Tithymali Cyparissias, quarum Altera male posita est pro Tithymalo dendroide.

Gesl. hort. Tithymalum Cyparissiam Matthioli, Pityusam aliorum esse, & non aliam quam Esulam vulgo dictam videri refert, sc. minorem, vt etiam Anguill. testatur: Pityusam ad hanc etiam refert Cordus in Dioscoridem, eamque Tithymalum Cyparissium siue Lactariam quintam vocat.

In Obs. pag. 192. figuram habet sub falso titulo Tithymali cyparissias. Sub titulo enim Pityusæ, siue Pineæ, officinarum Esulæ minoris, Turpeti nigræ Actuarii, & Tithymali Cyparissias Tragi, Adu. p. 151. Angl. *Pyne's surge*, Hisp. *Esula menor*, posita figura eo non pertinet, aliqui sibi contrarius esset Lobelius: pingit namque ex Dodonæo Tithymalum pityusam. In Ic. Pl. p. 356. est eadem etiam figuratum transpositio. Nam ex mente Lobel. in Adu. non conuenit titulus Tithymali cupressini, sed Tithymali Pineæ.

Dod. gall. vnus plantæ duas proponit figuras: prior autem est ex Matthiolo sub inscriptione Tithymali Cyparissias: posterior ex Fuchsi, sub titulo Pityusæ minoris. fieri tamen potest vt intelligat Pityusæ siue Esulæ minoris nomine aliam plantam, quæ non demonstratur per effigiem eo titulo propositam.

H. Lugd. p. 164. Tithymalus cyparissias Matthioli: p. 1648. Tithymalus cyparissias Dodonæi: p. 1654. Pityusa siue Esula minor, Dod. hist. stirp. Tithymalus cyparissias Fuchsi. Conlacinator H. Lugd. tres icones vnus plantæ posuit.

Compil. Tabern. tres quoque picturas dedit. 1. est Tithymalus cyparissias: 2. Tithym. cupressinus primus: 3. Tithym. cupressinus alter. Prior effigies est plantæ verno tempore prouenientis.

C. Bauh. apud Matth. Tithym. cypar. maior: Tithym. pinea Lob. in Ic. Plant. Esula minor Dod. in fol. & Lugd. Pityusa minor Dodon. gall. Pityusa siue pinea, & Turpetum nigrum Actuarii Lob. in Obs. Nos Tithymalum pineam & Turpetum nigrum Lobelii, quoad iconem, huc non referimus. Esulam etiam minorem Dod. in fol. hoc capite non relinquimus, sicuti neque H. Lugdunensis. Pityusam autem minorem Dod. gall. quoad iconem huc referimus.

Eid. phyt. Tithym. 14. siue Cypariss. maior purpurascens coma: Pityusa siue Pineæ offic. Lob. Obs. & Icon. Plant. Item, Tithym. 15. siue Cypar. minor; Tithym. cypar. Dod. lat. & Lobel. Obs. & Ic. Plant. Huius species minor, vix palmum alta, robente capitulo. Nos Tithym. cyparissiam Dodonæi & Lobelii ad hoc caput pertinere non negamus.

Gggg *

Synon. Eid. pin. Tithym. cypariss. 2. Tithym. cypar. Matth. Trago (cui & Esula vulg. maior & quinta) Fuchf. Anguill. Dod. (vt & Pityusa minor.) Turn. Lac. Geln. hort. Lon. Lob. in Adu. & Obf. Cast. Thal. H. Lugd. (quæ Matthioli & Dodonæi figuram habet) Tab. Cam. & Calceol. in itin. Baldi: Tithymalus pinea & *πικνύδα* Disc. *Efelskraut* Schvvenckf. Tithymalus cupressinus, siue Humipinus, Lob. ic. Plant. Esula officinarum Cæsalpini.

Varietates Variat: 1. foliis Lini virentibus, comâ flauâ, aliquid subrubente, Tithym. cyparissias rubente capitulo Schvvenckf. in collibus & montibus sterili & aridior Solo. 2. in montibus candidior, foliis angustis, Esula candidior Cæsalpini 3. vix palmum altus, capitulo rubente. Iudicium nostrum supra nouissima hæc C. Bauhini synonyma ex prioribus colliges. Hoc duntaxat monemus nos latere, quam plantam Cæsalp. intelligat per Esulam suam candidam: C. Bauh. hæc plantas coniungit, quas in phyt. olim separauerat.

Locus. Pratorum margines & sepium istam sæpius alunt Esulam: in Francia, Belgio, & Anglia non nisi horti pharmacopæorum, Lobelio: Turne- ro testatur provenire plurimum in agris inter stipulas, demersæ segetibus, aded Chamæpity similem, vt non aduerentes facile fallat.

Vires & ylus. Vim habet similem Characiæ, Myrsinit, Palio, & Helioscopio, Diosc. & Plinio auctoribus. Utillissima inter omnes Esulas ea est, inquit Tragus, quæ longis & strictis, veluti Linaria, foliis vestitur ita tamen vt radix solummodò intra corpus vsurpetur, repudiato lacteo liquore: vt pote ad hydropem optimè præparantur pilulæ.

TITHYMALVS STICTOPHYLLOS.

Etymon Tithymali genus hoc *caulibus* foliosis, simplicibus, non brachiatis, seu Tithymalus *σικτόφυλλος*, quod sic nominare solet Thalios, ob foliola micè punctellis notata, duplex est, *Major* & *Minor*. Præcedentis autem abortum existimamus.

Synon. C. Bauh. phyt. Tithymalus 16. siue foliis punctis croceis notatis. Eid. pin. Tithymal. cyparissias 1. siue foliis &c. Tithym. *σικτόφυλλος* Schvvenckf. duplex Thalio: Tithym. aruensis Camer. Esula scabiosa Geln. coll.

Locus. Ceterum, Schvvenckf. se hunc Tithymalum in asperis & sabulosis passim cum Pineæ secus itinera & agrorum margines collegisse perhibet.

TITHYMALVS MINIMVS ANGVSTIFOLIUS.

Descrip. Palmaris aut semipalmaris est plantula, *radicula* nitens tenui, tres aut quatuor uncias longâ, *cauliculis* & ramulis multis eâ quâ iam dixi longitudine, ac etiam dodrantes, *foliis* stipatos semunciam, vncique trientem longis, semiculmum latis, crebris, sursum spectantibus, lacte turgidis: *stipulus* herbidi, & pericarpium triquetrum, Tithymali Cyparissie, sed multis numeris minora.

Synon. Trago Esula exigua, Dioscoridis Peplos &



spumcum Papaner. Lob. Obf. p. 193. Ic. Plant. p. 357. Esula exigua Tragi. Ponè in Baldo Esula minor Tragi. H. Lugd. p. 1656. Esula minima Tragi: Eid. p. 1659. Peplis minor Dalechampi: *Dua figura.*

Dod. gall. Tithymali genus admodum paruum: Lat. Tithymali Cyparissii species minor, vel

Tithym. cypariss. alter. Tabern. Tithym. minimus. C. Schvv. Tithym. leptophyllos, *Steinmisch* h. e. Tithym. petreus: *Nomen* autem hoc germanicum minus placet: nec enim in locis petrosis, sed in agris provenit.

Thal. Tithym. leptophyllos Matthioli: Et sic etiam Camer. in epit. Apud Math. hist. germ. Tithym. minor.

C. Bauh. phyt. Tithym. 24. seu Esula exigua Eid. pin. Tithym. Cyparissias 3. Esula minima Tragi, & Peplis minor Dalechampi, ac etiam Tithymalus leptophyllos Matthioli [siue descriptione, addit in Animad.] H. Lugd. Vna eademque est planta. *Summitas* Tithymali Matth. multum euarians à summitate Tithym. minimi facit vt diuersum statuam, nec dicam in H. Lugdunensi tres icones esse vnius plantæ, & Matthiolum potius mereri reprehensionem ob neglectam descriptionem, quam Compilatorem H. Lugdunensis.

In segetibus Gallo-Belgii & Angliæ sæpius æstiuo tempore reperit Lobelius: Tragus in agris à mense autumnali tempore.

Tota planta lacteo succo turget, & corpus vehementer purgat.

Tithymalus siue Esula exigua, foliis obtusis.

Tithymalus 2. in prod. 4. Cyparissias in pin. siue Esula exigua foliis obtusis C. Bauhini, *radice* est exili, oblongiuscula, capillata, *cauliculis* pluribus ad terram resupinatis, aliquantum repentibus, biuncialibus, triuncialibus, aliis palmo minoribus, rotundis, lacteo succo turgentibus, qui foliis oblongis, angustis, sed semper in summo obtusis & velut abscissis, inordinatè vestiuntur. Hic in agris Patauinis & Massiliensibus reperitur.

Tithymalus exiguus saxatilis C. B.

Tithymalus 3. in prod. Cyparissias 5. siue exiguus saxatilis in pin. C. Bauhini, *radicula* habet capilli modo tenuem, longiusculam, *cauliculis* tenues, vnciales & biunciales, angustissimis & brevibus *foliis* cinctos, *stipulos* exiguos, rubentes: circa Monspelium locis asperis provenit.

PITYVSA VETERIBVS ET IN GENERE.

Pityusa, quam alii Clema, alii Crambion, alii Dioscoridion, alii denique Canopicon vocant, à Cyparissia Tithymalo specie differe existimatur, ideoque etiam & in Tithymali genere conuincitur.

meratur. *Caulem* profert cubito altiore, crebris geniculis interseptum, *foliis* acutis ac tenuibus circumdatum, Pini (*πίπυρος*) folia imitantibus: *flores* exigui penè purpureos (Lac. legit in vet. cod. *ἀνδρ. μικρὰ λινὰ ὡς διαπόρρα*): (*semen* latū infat Lenticulæ: *radicem* candidam, crassam, lacteo succo repletam: quibusdam in locis frutex hic prægrandis reperitur. Purgat per inferna radix drachmis duabus data in aqua mullâ: semen verò, drachma vna. At succi farina excepti cochlearium in catapotio datur: foliorum denique modus, drachmæ tres.

Plinius lib. 24. cap. 6. de herbis propter cognationem nominis cum Pino & Picea agens: Et Pityusa, inquit, simili de causa dicitur, quam quidam in Tithymali genere numerant, frutex similis Piceæ, flore parvo purpureo. Bilem & pituitam per alium detrahit radix, decocti hemina, aut feminis ligula in Balanis. Folia in aceto decocta, furfures capitis emendant: mammas quoque mixto Ruta decocto, & tormina, & serpentium ictus, & in totum collectiones incipientes.

Ita vetus codex, inquit Cornarius. Nam verba quæ præmittuntur in vulgaris exemplaribus, cum honore [ve etiam legit C. Bauhin.] & redundant, & penitus incepti adiecta sunt. Cæterum vsus medicus à Plinio traditus, in Dioscoride non habetur: nec descriptionem totam Plinius expressit. Quod verò Dioscorides inter Tithymalos connumerari dicit, & à Cyparissia solum specie differre: hoc etiam Pityusæ nomen probat, cui descriptio Cyparissæ magis conuenit, quam ipsi Cyparissæ tithymalo. Sed & Glesius confirmat Pityusam quosdam Tithymali speciem esse putare, eò quod succū habeat quemadmodum Tithymali: & quod similiter purget, ut illi: & per alia omnia viribus ipsis similis sit. Pityusam officinæ, itemque Herbarum petiti Esulam hodie vocant. Nostri (Germani) communi reliquis appellatione *wolffsinich*: Arabes magna ex parte Turbit vocant. Nec est fortè cum Leoniceo & aliis, Syluio teste, hæc vox expungenda. Arabes sequuntur etiam recentiores Græci, inter quos & Actuarius est, qui Turpeti duo genera faciunt, alterum nigrum, Pityusam; alterum album, Alypon. At contra hos, altera Arabum pars, Serapio, & qui ipsum sequitur Turbit allerunt esse Tripolium: & totum Dioscoridis de Tripolio caput, ipso autore citato, suo Turbit attribuant, ut qui illos sequi velit, cautum esse oporteat etiam hac in parte, sicut sanè etiam in omnibus aliis. Nullus autem est potior cauendi modus, quam ut illis in totum relicti, Græcos Medicos tutissimè sequamur. *Hucusque Cornarius.*

Dodonæo videtur Pityusa esse, Arabum Alsebra, aut Alsebra & Scebra, officinarum Esula, siue Ezula, quod nomen à *πύρος*: luxatum esse suspicatur, duabus scilicet prioribus syllabis sublatis. Sic enim remanet *esra*, cuius diminutium *Esula*, & vocali primâ mutata, Esula.

Censerem, inquit Matthiolus, Alsebram maius, siue Mehezeregi esse quæ Græcis dicitur Pityusa. Serapio de Scebram agens, ea omnia ex Dioscoride illi attribuit, quæ Pityusæ idem Dioscorides assignauit. Myrepsus quibusdam in ant. Esulam imponit cognomine Chamæpityn, quam Fuchsius nihil aliud quam Chamæpityn, non autem Tithymali speciem, referre scribit: ego tamen æstimo Myrepsum Dioscoridis, Pityu-

sam intellexisse.

Sententiam Plinii de Pityllio nonnulli minus accuratè de eius lacte gummiue expendentes Tithymali quoddam genus Pityusa dictum interpretantur. Sed Anguilla non potuit reperire plantam quæ respondeat Pityusæ Dioscoridis.

TITHYMALO CYPARISSIÆ SIMILIS.

Pityusa multis.

Tithymalus hic rarus, et si Cyparissæ vulgò dicto similis, ab eo tamen alius est, *radice* longiore, crassiore, minusque fibrolâ: *caules* multos, fere cubitales, simplices, interdum in ramos multos dodrantes diducti; per quos *folia* conferta, crassiora similiaque quàm Cyparissæ, & magis glauca: ex venis ramorum insident *umbellæ* magnæ, folius peltatis, non maioribus Cyparissæ.

Icon quam proponit Dod. gall. Pityusæ minoris titulo, est Tithymali Cyparissii ex Fuchio, verno tempore prouenientis, quicquid dicat C. Bauh. Lat. Ezulæ minoris inscriptione nostro Tithymalo correspondentem quidem proponit: verum eius descriptio non placet.

Lob. in Adu. Tithym. Cyparissias, siue Cupressinus, vel Hamipinus. Eid. in Obs. p. 192. Tithymalus Cyparissias, quoad titulum, quo verò ad effigiem, Pityusa, siue Pineæ, officinarum Esula minor, Turpetum nigrum Actuarii, Tithym. Cyparissias Tragi Adu. p. 151. Videntur namque figuræ transpositæ in Obs. alioqui non respondent quæ in Obs. scribit, iis quæ in Adu. prodit. In Ic. quoque Plant. p. 357. Tithym. pineæ titulus huic figuræ non competit.

Schvvenckf. Tithym. cupressinus, Lobelio Hamipinus, Tithym. Cyparissias Dodonæi. Nos non intelligimus Schvvenckfeldium: Tithym. cyparissias Dod. non est diuersus à Tith. Cyparissia Matthioli & Tragi, quem Pityusam Dioscoridis facit. Nec etiam icon Lobelii in Obs. transposita sub titulo Tithym. cupressini, diuersa est à Matthioli Tith. cyparissia.

C. Bauh. phyt. Tithym. 14. siue Cyparissias maior purpureascente comâ: Eid. pin. Pityusa 1. siue Tithymalus foliis Pini, fortè Pityusa Dioscoridis: Esula vulgaris maior & 5. Trago: Pityusa Esula vulgo dicta Gesn. hort. Pityusa siue Pineæ, Esula minor officinarum Lob. in Adu. & Ob. Tithym. pineæ, in Ic. Esula minor Dodonæi Histor. Lugd. p. 163. Esula maior ad Pityusam reducenda Cæf. Tithym. cupressinus 2. Tabern.

Crepidines sabulosæ fluminum, & vicini colles frequentius hunc alunt. Ego florentem Apr. in Sabaudia collegi. Abundat in planitie arenosa prope Argentinam, & Basileæ ad Rhenum versus Haltingen: ut & prope Monspelium.

TITHYMALVS, FORTE DICTVS

Lucæ Ghino Pityusa, quibusdam Characias Pannonicus.

Pityusa Lucæ Ghino dicta est ea, si rectè conicio, quam in Gallia Narbonensi meminime olim colligere, *radice* magnâ, longâ crassâ: è qua crebri nascuntur *caules* inæquales, dodrantes, sextantes, ac fortè dodrante maiores: *foliis* multis amicti, Paralii foliorum latitudine, longitudine maiore, interdum breuiore, acuminatis, spissis, colore ferè Myrsinitis.

Gggg 3

An Tith. Characias pannonicus, siue Characias 3. Austriacus Clusio.

Nascitur plerisque Pannoniæ locis: sed Vientiensi agro tantâ copia in graminibus & siccioribus pascuis, ut Iunio mensetur, tum enim floret, omnino pallefcere videantur.

Pityusa
Chini An-
guill.

Quidam demonstrant, Anguill. epist. 14. referente, pro Pityula plantam foliis similibus Myrto Tarentino, in acumen delincentibus quæ omnino Tithymalum Myrsinitem repræsentant; verum caules nullos habent nodos, nec florem purpureum, nec semen Lentis: dicendum igitur non esse Dioscoridis Pityulam, aut textum Dioscoridis corruptum. Prædicta planta provenit in maritimis: reperitur & in monte nigro Liuvorini Pisanorum.

Dod. gall. Tithymali Cyparissæ species tertia foliis omnino albis, in cæteris Cyparissæ similibus. Lat. Tithym. Characias 4. quam nonnulli perperam Myrsinitem faciunt.

Dodonæus lat. eandem cum Clusio habet figuram, sicut & Lobel. in Ic. Plant. p. 361. titulo Tithymali Myrsinitis alterius: & Obl. p. 196. sub intitulatione Myrsinitis alterius, & Turbith Alexandrini quorundam, Characiæ quartæ Dod. & Belgarum. Sed nec H. Lugd. p. 1646. sub inscriptione Tithymali Characiæ quartæ Dodonæi, diuersam pingit: Hanc autem affirmat esse Myrsinitem alteram Lobelii. Et hinc Sole meridiano clarius patet, C. Bauhinum manifeste errore inter Tithymalum Characiam tertium Clusii, seu quartum Dodonæi, & Myrsinitem alteram Lobelii, H. Lugdunensis, discrimen facere.

C. B. lapsus

Synon.

In phyt. Tithym. 3. siue Characias rubens germanicus, etiam in palustribus Michelsfeldentibus frequens: Tithym. Char. pannonicus Clusii Item, Tithym. 4. siue Charac. longifolius: Myrsinites altera Lobelii: Eid. pin. Tithym. Char. 4. siue rubens germanicus: Tithym. pentactonos Cordi hist. Tithym. Char. 4. Dod. Characias pannonicus Clus. pann. Charac. 3. Austriacus, Eid. hist. Tithym. fruticosus alius stipitibus rubris Camer. an Tithym. latifolius alter, Cæsalp. Item, Tithym. 5. siue Charac. angustifolius: Tithym. myrsinites altera, Lob. Lugd. Tithym. myrsinites angustiorib. foliis Cæsalp. Tithym. myrsin. 3. angustifolius Tabern.

Locus

Fruterosi locis nasci scribit Cordus: Dodonæus verò latinus nasci in Belgii hortis.

Tithymalus incanus hirsutus C. Bauh. dictus Pityusa Anglica Camerario.

Descriptio

Caules pedales, rotundos, rufescentesque profert: foliis incanis & hirsutis, Myrsinitis legitimi forma, confuso ordine vestitis, in summitate in virgulas diuisos, quibus ut in Myrsinites, flores & capitula triangula, semina continetia, insident.

Synonyma

Tithymalum hunc 20. siue foliis per ambitum hirsutis [ita in phyt. vocat:] Aut [viti in prod.] Tithymalum 1. siue incanum hirsutum: Vel denique [viti in pin.] Pityusam siue Esulam 4. C. Bauhino ex Italia Neudorfferus attulit. In phyt. autem admixtum esse Pityusam Anglicam Camerarii: aut in pin. dubitat, non tamen meliora docet.

C. B. not.

Pityusa Anglica, missa Camerario à Th. Pennæo, foliis Tithymali arborefcens, sed magis glaucis & per ambitum hirsutis prodijt, sed neque in fideili sub testro, neque sub dio per Hiemem durare voluit. Semen erat non dissimile arborefcens Tithymali femini.

APIOS.

Facilis è radice est Apii cognitio, quæ quia oblonga, turgida, inque Pyri modum turbinata, plantæ nomen fecit, quam Napi radici rectè comparaueris: huius è capite ramuli aliquot exeunt palmo breuiore, foliis latis frequentibus amicti Esulæ rotundæ seu Peplii minoribus, ex angusto principio sensim dilatatis, perque extremum rotundis.

Apios, aliis Ischas (ἰσχος οἰ δὲ ἰσχυρά). Malim inquit Saracenus, ἰσχυρά vel potius ἰσχύς, in recto casu. Sic enim nominant Theophrastus & Plinius: sitque verisimilius ex radicis cum carica similitudine id nominis inditum illi fuisse, quam ab efficacia contra coxendicum dolorem: [aliis Chamæbalanos (Sed & ἀντίρῳ χαμαίβαλονος χαμαίβαλονος ex Paulo legendum censuerim, Sarac.



via ἰσχυρά. Ald. ἰσχυρά, h. rectos:] & paullum à terra sese attollentes, foliis Rutæ (ἀρχίον addit πηγύνη, Cat.) oblongioribus tamen & angustioribus, herbaceis: semine paruo: radice Hastulæ regie [ἀνθοδύλον. Sunt qui σπινθύνον seu σπινθύνον legere malint, vti Marcellus & Cordus. Cæteri, ἀσποδύλον, indubitanter legunt, vti etiam legitur apud Theophrastum. At Plinius Apion radice Cephæ describit] & ad Pyri formam accedente, rotundiore tamen, lacteique succi plena, cortice, extrâ quidem nigro, intus verò candido.

Plinius auctor est lib. 26. cap. 8. Apion, Ischada, siue Raphanon agrum iuncos duos siue tres spargere in terra, rubentes, foliis Rutæ, radice Cephæ, sed ampliore, ideoque quoddam Raphanum siluestrem vocare.

Ischada siue Apion (ἰσχυρά οἰ δὲ ἰσχυρά). Gaza reddit Carciam seu Pyrum. describit Theoph. lib. 9. cap. 10. folio quidem rutaceo, sed breui: caulibus ternis, aut quaternis humi fratis: radice, quâ Albucum, verum squamosa.

Galenus, Paulus & Aetius, inter simplicia Apion non recensent. Sed Paulus inter ea quæ pituitam euacuant, Apij dimidium habet. Hoc quale sit, iam diximus.

Apios antiquis dicta radix à Bellonio Obs. lib. 1. cap. 45. vera depingitur. Nostra autem icon Synce Guariniana non placet: fortè ad radicem siccam Nostra facta est. Dicitur, illo referente Chamæpidia. Anguillæ: verò in Apulia Esula rotunda: in Græcia

Græcia & in Candia Pirraria.

Apios dicitur Matth. Anguill. Dod.gall. Lac. H. Lugd. p. 1595. (habet hæc & alteram figuram & descriptionem, f. Dodonæi lat. p. 1651. hoc titulo, Tithymalus tuberosus siue Apios) Tabern. & Castori. Dodon. lat. Tithymalum tuberosum inscribit: Clusius Tithymalum tuberosa radice. Apios vera Gesn. hort. & Lob. in Ic. Plant. p. 164. Apios Aduersariorum, eisd. in Obs. p. 198. Radix prægrandis, turbinata, Americi orbis Chinam emittit, in Adu. p. 29. Item p. 204. Apios vera, siue Pytiformis radix Dioscoridis, malè à quibuldam China existimata.

Planta à Matth. [inquit Turn.] proposita pro Apio, pro vero potuisset ab omnib. haberi, si probasset semen habere paruum, radicemque purgantem, quod de Apio scribit Dioscorides. Verum cum neutrum faciat, tam de ipsius Apio dubitare quis posset, quàm ille de Apio Ruellii dubitat. Hæc ille, cuius rationes ceu infirmas pluribus refutandas haud decreuimus.

C. Bauh. phyt. Tithymalum 25. siue tuberosa radice; *In pin.* Apium siue Tithym. tuberosum, siue Tithymalum tuberosa pytiformi radice. Hunc duplicem tradit: 1. est radice crassiore & maiore, foliis & ramulis minoribus: 2. radice minore, ramulis longioribus & foliis maioribus. Hanc ipsam distinctionem ex iconum diuersitate desumptam dicimus.

Τριχας dicitur, quod *τρίχας*, i.e. Caricam seu Ficum acidum cuius refert, Saraceno monente. Item & *χαμαβάλανος* siue Terrestris glans à figura quoque. Sunt tamen & alii Chamæbalani Germaniæ familiares ac edules, de quibus alibi. Et hinc factum est, ut quidam ex herbarum peritis eam radicem, quæ *Erdtunus*, & *Sewubros*, & *Erdseygen* Germanis dicitur, Apion esse viderint. Alii Ornithogalon esse asserunt. Alii rursus ad Cyclaminum referunt. Cornarius Raphani siluestris genus quoddam esse putauit, ignotum tamen.

Nascitur in montosis & asperis aliquando & herbosis, auctore Plinio: effoditur Vere. Ichas Dioscorideæ adductæ ex Creta. Sed Apuleiæ etiam peculiatem esse monet lit. peratus.


Superior pars radicis assumpta, vomitione bilem citiusque extrahit; inferior per aluum. Tota vero sumpta, utraque parte purgat. Liquorem si hiber excipere, radices tundito, & crateri aqua inditas agitare, ac liquorem qui supernat penna collectum efficcato. Huius sesquiobolus potus, per superna infernaque purgat. Hæc Dioscorides, à quo in succi collectione dissentit Plinius. Effoditur Vere, inquit, tutaque in scitili mergitur, deicctoque quod supernat, reliquus succus purgat utraque parte, sesquiobolo in aqua mulsâ. Sic & Hydropicis datur acetabuli mensura. Inspersitur & aridæ radicis farina potioni, autque superiorem partem eius, vomitione biles extrahere: inferiorem, per aluum. Non autem omnes partes ad idem viles esse, fortassis mirum non est, verum eiusdem radicis has partes sursum, illas deorsum purgare, magis admiratione dignum est, velut Thapsiæ & Ichtiadis. Nam eadem rursus & sursum & deorsum purgare, velut Veratrum nihil absurdum est, auctore Theophrasto. Hanc autem purgatricem esse norant omnes Monachi in monte Athor, teste Bellonio. Facultate & temperamento vehementer calidus & siccus, est, reliquis Tithymalis similis, ac perinde quoque molestus ac noxius.

Apios siue Ichas altera.



Tithymalum tuberosa oblonga radice.

CHAMÆSYCE.



specant rubentia, superne viridantia, nisi quoddam in medio purpurea nota sunt maculosa, quoddam tamen in extremis ramulis supra infraque omnino saturâ rubedine tineta sunt: *flosculi* ad ramulorum diuicationes inter folia emicant purpurei: tota planta lac fundit vulnerata: pericarpia tricoeca Elulæ exiguæ Trago dictæ, sub foliis latitant.

Chamæsyce, quam aliqui Syceen (*χαμαί-συκε* *Chamæsyce* *unc. ai d'ouan*) nominant, refert Dioscorides ramos emittere quatenus digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: folia Lentis figurâ, Peplio similia, parua, tenuia, ac terræ inheerentia: semen sub foliis rotundum, ceu Pepli radicem tenuem, ac superuacuum: sed neque florem, neque caulem promere.

Chamæsyce Plinius lib. 24. cap. 15. Lentis folia ascribit, nihil se attollentia.

Chamæsyce Tithymali species est Cord. lib. 5. hist. cap. 6. Eam Matthiolus in Pepli genere ponit, Peplumque minorem suspicatur. Haud verò ipsi notam fuisse satis patet, quod ne vnicuique

Liam e- Descriptio
A tiam tradit & describit Clusius, cuius hic iconè damus, & quæ ab illo Apios siue Ichas altera inscribitur: eius autem à lacob Plateau iconem acceperat qui semine peregre accepto sibi natam duntaxat aciebat.

C. Bauh. in pin. facit. Apion, siue Tithymalum tuberosum 2. vel

Gracilem Descriptio
Gracilem habet, longitu sine circiter palmari fibris aliquot tenuissimis donatam: ramulos quadrantales ac etiam pedales, in alas subdiuisos, rubentes, subhiusos, in orbem teretæ appropinquat: quibus ad genicula adnascuntur *foliola* coniugata, opposita, subrotunda, quæ teriam

Chamæsyce
Diosc. Syce

quidem notam scribat, quæ non habeatur in Dioscoride. Præterea in Epist. & Hist. germ. eam planè omisit.

H. Lugd. 201. H. Lugdunensis Chamæfycen Dalechampiij p. 660. quam Dioscoridis Chamæfycen constituit, à Chamæfycæ Penæ & Lobelii separata, sed absque ratione.

C. B. 201. Chamæfyces figuram eam Matthiolum non haberet, existimabat C. Bauhinus se eam ipsi apposuisse in comm. per ipsum illustratis. Ast figura appposita Matthiolo non est Chamæfyces, sed Anthyllidis Valentiniæ Clusij, quam Compilator Tabern. malè pro Chamæfycæ exhibuit.

Synon. Chamæfycæ Dioscoridi & Plinio, quasi humilis Ficus, C. Bauh. phyt. *Eid. pin.* Chamæfycæ Matth. Anguill. Hefn. hort. Dod. (*μικρὸν ἀφροδισιόν*) appellari dicitur.) Lob. in Ada. Obs. p. 198. Ic. Plant. p. 363. Clus. hisp. & hist. (hic author est Salmanticensis *Noguernela* appellare, quasi pumillam nucem exprimere vellent, à seminis nimium, uti putat, forma.) Cæsalp. H. Lugd. (quæ duplicem figuram habet, ex C. Bauhini opinione) Camer. Tabern. & Gerardo. Nos H. Lugdunensis figuram alteram p. 1381. Anthyllidis Valentiniæ Clusij titulo propositam, à Tabernamontano falsè pro Chamæfycæ, ac etiam à C. Bauhino apud Matthiolum exhibitam, huc non referimus. Si H. Lugd. duas habet figuras, habebit & Clusius duas.

C. B. 201. In aridis, squalidis, petrosisque locis nasci dixit Plinius & Dioscorides. Nuppiam in Italia aut Germania apparet, inquit Lobelius, sed duntaxat in Narbonensis Gallia: oliuetis vinetisque, ubi plurima præsertim aridis sabulosis, non procul Montepelio ad patibulum viâ, & tractibus maritimis. Montbelgardi in orto Ill. E. C. Aprilis fata, floruit Iunio & Iulio: ex semine deciduo quotannis propagatur, etiam apud Belgas. Nasci aridis & sitientibus hortorum areis, solo aspero, omnibus locis in sinibus Bononiensium, etiam intra vitem, testatur Cordus. Comosam ubique vidit Clusius in agro Salmanticensi squalidis & petrosis locis, atque etiam inter ipsa vineta, & plerisque aliis Hispaniæ locis.

Locus & Tempus. Rami ex vino triti vulvæ dolores sedant in pello appositi: tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibo alius resoluatur: succus simili affectui prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur: aduersus caligines oculorum utilis, hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. Plinius à Dioscoride euarians, linteolum pro pello usurpat, & amplius orthopnoicis prodesse addit. Chamæfycæ abstergentem simul & acrem vim Galenus attribuit. Itaque acrochordonas, & myrmecias, caules eius teneriores intriti, in modum cataplasmati admoti, quique ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices deterguunt: hebetudinem visus à crassitie ortam, adiuuant: sicuti & suffusionum principia.

PEPLIS.

TERRÆ faciem ceu muliebrem flammeum patulis ramis variè diuaticatis sesquipalmaribus, rubentibus, crassiusculis operit, per quos veluti ad articellos *folia* aduersa nascuntur, rubentia, duplè triplique Chamæfyces maiora, crassiora

pauillò, per extemam rotunda, quorum parsea quæ sub nervo est, productior est quàm quæ supra nervum, & veluti pinnata, flosculi luteoli proxime ramos oriuntur: capitula trilocca, leuia, duplè maiora quàm Chamæfyces: vbicunque vulneretur, lac fundit, radix longiuscula, crassiuscula, simplex.

Peplis, quam Dioscorides aliquos siluestrem Portulacam (*ἀνδροχύνῃ ἀγρίαν*,) Hippocratem verò Peplion [*πέπλιον*] vocare refert, in maritimis maximè nascitur. Frutex autem est ramulosus, quoque versum expandens, vel in latitudinem sese diffundens, candidi succi plenus, *foliis* hortenstis Portulacæ, rotundis, & infernè rubentibus: *semen* sub foliis rotundo, ceu Pepli [*τὸ πέπλον*] feruente gustu: *radice* tenui, singulari, ac superuacua.

Plinii, Galeni, Pauli, & Aetii de Peplide (*πέπλιδος*) verba inter vires dicemus.

Apud Matthiolum in comm. lat. cum mag. fig. Peplis vocatur, sed tanquam non visa non describitur. In ital. icon transposita est pro Peplio. In Hist. germ. malè inscribitur Peplis.

Verisimile est Dodonæum Peplidem non nouisse: siquidem in Hist. gall. nullam dedit iconem: in lat. verò pro ea Anthyllidem Valentiniæ Clusij pinxit.

H. Lugd. huius plantæ duas effigies eadem p. 1659. sub diuersa tamen inscriptione proponit. 1. Peplis Matthioli. 2. Peplion Dalechampiij.

Peplis, vt nomine, sic effigie Peplum præ se fert, & propius adhuc etymum Pepli vel Flammeoli exprimit, auctore Lobelio, ac idcirco *θαμνὸν ἀμειρανίν* Dioscoridi designari ait.

Plinium autem Portulacam siluestrem eiusdem generis ac naturæ cum Portulaca satua, cum Peplio herba diuersissima confundere, idèd quod nonnulli Peplion, agrestem Portulacam vocarint, rectè Dalechampijs monet.

Dioscorides quamvis vnus tantum meminerit Peplidis, Anguillara tamen duplicem facit, & hanc priorem constituit: Alteram verò se obseruasse scribit in monte Maiellæ in Abruzzo, se extendentem per terram sicuti prior, foliis denariorum modo orbiculatis, Numulariæ modo dispositis, spissis, semine albo, radice digitum crassa.

Peplis Matth. Turn. Lob. in Ada. Obs. p. 197. & Ic. Plant. p. 363. Clus. hisp. & hist. Cast. quoad descr. Cam. Tab. ic. & Ger. Peplis Cast. quoad iconem: Peplis minor Tab. hist. Peplium Cæsalp. Peplis i. siue maritima folio obtuso, varians caule rubro & albo C. Bauh. pin.

Litora Norbonensia Thyrreni & Adriatici maris hanc repticem abundè fundunt, ignotam alioquin Septentrionalibus, nisi hortis. Obseruatur quoque in insulis circa Venetias ab vtraque parte maris. Sed & abundè nascitur in omnibus Hispaniæ Mediterranei maris litoribus: in Oceani litoribus nunquam obseruauit Clusius: imò nec in cultissimis quidem Belgicis hortis ipsi conspecta.

Colligi, reponi, darique vti Peplum, itidemque condiri solè: ac eisdem quoque vires habere, Col. autorem habemus Dioscoridem. Est & Portulaca, quam Peplion vocant, non multum satiuæ efficacior, cuius memorabiles traduntur vsus. Ita Plinius lib. & cap. 29. Hic mox subiungit per

git per longum eius vsum. Sed quum ea omnia à Dioscoride penitus omiffa sint, ibidemque Peplion cum Portulaca filuetri confundat, etiam nos hoc loco tanquam aliena omittenda duximus. Peplion tum sursum, tum deorsum, pituitam bilemque purgare, flatusque deducere prodidit Hippocrates. Galeno Peplion frutex succum habet velut Tithymali, radicem quidem inutilem, quemadmodum etiam Peplio succum autem fortem, & nec ipsam admodum vilem. Sed vile est semen, & feruidum: similiter ut Pepli semen purgans. At hoc Galeni loco, quod feruidum dicitur, *φωσφός* in græcis codicibus falsè legitur, i.e. flauosum, pro *σπορῶδες*, velut Dioscorides & Paulus habent: & alioquin Peplion esse *φωσφός κατὰ ῥῆμα* Aëtius ex Hippocratis sententia scribit. Quod itaque flatus rum-pit ac discutit, flauosum dici non potest.

TITHYMALVS HELIOSCOPIVS sive Solissequus.



B Revis huic & plerumque singularis caulis, teres, modicè hirsutus: folia Portulacæ, vel proprius Peplios, minus pingua quam Portulacæ, ex viridi lutea, in ambobus crenata: *sterculi* è caule summo nati umbellam quodammodo efficiunt, flores sustinentes exiguos, herbidos, Myrsinitæ facie peltatis: semen in pericarpis

triquetris. Radix singularis, fibrosa.

Qui Helioscopius Tithymalus Dioscoridi dicitur, foliis est Portulacæ, artamen tenuioribus rotundioribusque, ramulis ab radice quaternis aut quinis, dodrantali altitudine, tenuibus ac rubentibus, lactei succi copiosi plenis, capite Anethi: semine velut inter folia locato. Comem cum Sole circumagat, ideoque Helioscopii nomen accepit.

Tithymali quartum genus Plinii, Helioscopion appellatum, quoniam capita cum Sole circumagat, foliis est Portulacæ, ramulis stantibus, à radice quatuor aut quinque rubentibus, semipedali altitudinis, succi plenis: semine albo, columbis gratissimo.

Matthiolus pro more suo ponit sine descriptione iconem Tithymali Helioscopii inscriptione, foliis non serratis, Peplion potius representantem, quam Tithymalum helioscopium. Camerarius aliam pinxit, ac etiam Casparus Bauhinus. Lacuna qui & Tithym. coronatum vocat, iconem Matthioli referuat, ac etiam Hist. Lugd. p. 1644. Sed p. 1648. meliorem exhibet Tithym. Helioscopii Dodonæi titulo.

Tom. II.

C. Bauh. phyt. Tithym. 13. sive Helioscopius: Eid. in animado. in Hist. Lugd. Tithym. heliosc. Matthioli, foliis non crenatis p. 1644. Tithym. heliosc. Dodonæi, p. 1647. foliis integris, cuius in contextu non meminit H. Lugdunensis: Item, p. 1648. Tithym. heliosc. Dodonæi, quæ vera icon. Videtur nobis prior icon. H. Lugdunensis esse Pepli. Secundam suspicamus esse Tithymali verrucosi: ergo huius plantæ hoc loco unica figura, & non tres.

Esula Brunfelsi, tom. 1. rhaph. 13. sine iconem: in 4^o pag. 124. cum iconem. Esula vulgaris & texta Trago.

Helioscopius Tithymalus Ang. Fuchs. Dodon. Cordo in Diosc. Turn. Gesn. hort. Lac. Lonic. Lob. in Ad. Obs. p. 192. Icon. p. 356. Thal. Camer. Tabern. & Hist. Lugd. cum Iconem Dodonæi pag. 1648. Item C. Bauhin. qui in Pin. præterea vocat Tithymalum Dendroidem Dodon. in icon. & Thali.

Ceterum, hunc Tithymalum duplicem facit: alium foliis crenatis, non vique tamen ad caulem: alium non crenatis & rotundioribus, caule leviter hirsuto.

Græcis τῖθυμαλὶς ἡλιοσκοπίος: Germ. Sonnen-ovend vvolffsmich, & groß vvolffsmilch: Belg. Croonkenscruyt. Gall. Rencille marin suivant le Soleil: It. Torticonaglio, Tithymalo helioscopio: Angl. overtegrasse: Lat. Tithym. solissequius, & Lactaria solisquæ.

Cunctis gentibus familiaris, & hortis etiam olitoris frequenter molestus: quin & passim provenit, circa rudera, prope vibium & oppidorum mœnia, in campis incultis, collibus, & vique, tam cultis quam incultis solo.

Colligi succum & semen huius Tithymali, vel etiam aliorum: ac vim eandem habere cum Characia Myrsinitæ, & Paralio, sed non ita intensam, docet Dioscorides: Plinius addit bilem trahere per inferna in oxymelite, dimidio acetabulo.

PEPLOS SIVE ESULA ROTVND.



Peplos, quem aliqui Syccen [συκύν] alii Papauer vameum (μυρῶνα ἀγριόδον) vocant, referente Dioscoride, frutex est succo albo plenus, folium parvum habens, Ruræ simile, sed lacius: vniuersa coma palmi altitudine est, rotunda, per terram cistuta, & sub vno ver. Lacunæ codex legit in Cicorilæ [sic] foliis se-

men est paruum, rotundum, minus quam Papaueris albi. Multi autem vltis herba est, radicem vnam habens, inutilem, à qua totus frutex enascitur. Itaciam describit Plinius.

H h h

Peplon dici etiam Chamælycen [*χαμαίλευκος*] & Papaver pinnatum (*πυκνόν* *αγ. αἰθ.*) & Meconium [*μεκόνιον*] testatur Galenus in gloss. in Hipp. Meconium & Pepli Papaveris sunt ei de. *h. ep.*

*Fuchsi-
natur.* An Vineale Reuchom Rotlii? De Esula rotunda officinarum & vulgi, Fuchsius ita scribit quasi eam nunquam viderit. Iconemquam Lonicetiam & Dod. g. exhibent non repræsentat Esulam rotundam: folia longa & acuta sunt in eorum iconibus.

*Matth. &
Lacuna
notum.* Non placet quoque Pepli effigies apud Matth. in prior. com. & adhuc minus ea quæ in post. cum intelligi habetur. Non male nostio inde eo huc retinuit iconem sui Tithymali helioscopii: neutrum describit, quare diuinatione opus est. Matthiolum imitatus est Lacuna iconem & descriptionem nulla.

Peplum passim in hortis Venetis & Patavinis prouenire, nec tamen Esulam rotundam vocari testatur Anguillara. Cæspino verò non fuisse notum Peplum, suspicamus quia nihil proponit de eo præter verba Dioscoridis & Plinii.

Synon. Peplus Matth. Fuch. Anguill. Dod. Cordo in Diosc. & hist. Turn. Lac. Lon. Lob. Obs. p. 162. H. Lugd. p. 1638. Cast. desc. Thal. Tabern. Ger. Calc. & Camerario: Peplis Cast. icon. Esula rotunda Gesn. coll. Peplus siue Esula rotunda prima C. Bauh. pin.

Erym. Peplus autem siue Esula rotunda, quod ramulorum ambitu & quasi rotundo amictu velum efformaret, aut tellurem operiret, dicta fuit, nisi potius, ut Lobelius opinatur, ob purpuream foliorum luperficiem, siue xerampelinam, quæ huic in vinetis nascenti & Peplidi in maritimis fabuletis degenti, ut plurimum inest. Peplum namque fuisse purpurei vel phœnicei coloris, multæ historiæ testantur. Succus lacteus, quem tora fundit planta, Tithymali speciem fatetur.

*Nomina
ling.* Πηλος, quibuldam *συντάξις* *ἀγ. αἰθ.* *πυκνόν*. Germ. Teuffels milch, Rûde wölffsmilch, Gall. Renelle marin de vigne, i.e. Eugilium matutinum vineale. Hisp. & It. Pepla.

Locus. Germaniis & Galliis passim Peplus spontè prouenit, secus sepes, fossimenta, margines hortorum & in vinetis, in quibus etiam Diosc. & Plinius nasci scribunt.

Peplus colligitur in messe, siccaturque in umbra, & assidue versatur. Reponitur semen contusum & depurgatum. Ducit pituitam & bilem acetabuli mensura cum aquæ mullæ hemina (*κεῖρα, κεῖρα* legendum indicat Corn. potum. Sed & obsoniis ammixtum aluum turbat. Conditur etiam muria, auctore Dioscoride. Sic ferè & Plinius Galeno Peplus frutex paruus, succum habet similem Tithymalis, qui purgat velut illi.


PEPLVS MINOR.

Descrip. **P**atulis in orbem ramis, varièque diuicatis terram subiectam obumbrat: foliis Pepli maioris rotundis ferè, in modicum acumen leuiter desinentibus, dimidio minoribus: pericarpa pusilla Maioris aut Chamælyces, triquetra, læuia, tribus locellis rotidem claudunt semina.

Synon. Tabern. ic. & hist. Peplus minor, Peplis Diosc. Portulaca siliu. vocata, Peplion ab Hippocrate, ab aliis *ἀνδράγχο* *αἰθ.*

Montepeli & Montbelgardi prouenit.

TITHYMALVS PLATYPHYLLOS Fuchsi.



Descriptio **A**nnua est planta ex deciduo semine sese rypantibus: cithi radix lignosa interrim lircaulis sesquicubitalis & bicubitalis, rectus, singularis modò, modò plures, inter quos eminere medius, inter contractioris altitudinis socios, per quos tamen omnes frequentes obseruantur ram-

mi, quorum exortui solum magnum semper apponitur, duarum vtriusque longitudine, latitudine vnciali, alia quæque fortuito ortu per caules ramosque spectantur; at caulis fastigium in pediculos aliquot vtriusque mentientes abicit, quo modo in Helioscopio diximus, quorum coitum, coronat rota folio, um oblongorum, nec ad Helioscopii rotunditatem vllatenus accedentium, crenis parum conspicuis denticulato: e quibus pediculis vnusquisque subdiuitur, ramulis ex acerabulo exeuntibus: stolis cotylis insident luteoli, quos sequuntur vix dum delapsos trioccei fructus, minores paulò quàm Verrucosi, quibus & asperitate cedunt, in quibus semina parua, oblonga, carulea.

Dod. gall. Fuchsi figuram Tithymali septimi siue platyphylli i.e. latifolii, applicat Esulæ maioris siue Pityusæ maioris, cum tamen in descriptione, Fuchsi plantam, quæ non est Tithymali *κατάφυλλος* Dioscoridis, haud intelligere putamus.

Tabern. ic. & hist. inscribit Tithymalum characiam Matthioli, licet Matthioli non sit, nec descriptio, quam in histor. dat, cum iconem conueniat.

An Tithymalus annuus Pityusæ facie Lobelio?

Lonic. qui iconem Fuchsi habet, ut & Ponæ in Baldo, & Turn. dicitur Tithym. platyphyllos. C. Bauh. phyt. Titym. 18. Eid. pin. (vbi duplicem statuit, sc. maiorem & minorem, & hunc foliis hirsutis. Tithym. arvensis latifolius 2. siue germanicus. H. Lugd. p. 1639. Pityusa siue Esula minor (legendum maior.) Dod. hist. stirp. Tithym. platyphyllos Fuchsi.

Ceterum, plantam exprimere videtur Fuchsius primò prouenientem, antequam umbella sit ramosa.

Genevæ & Basileæ atque Montbelgardi crebram in agris & circa dumeta obseruari, florentem adhuc Augusto & Septembri, sed rarius. Cum prodit initio Veris folia sanguineis guttis, in hoc Tithymalo arvensi annuo Camerarii, aspersa conspiciuntur.

TITHY-

TITHYMALVS MAGNVS MVLTICAV-
lis, siue Efula maior.

Mirum quàm luxuriet fecundiore solo enatus Tithymalus ille, quem vulgò Efulam maiorem germanicam vocant. Lignosa enim candidaque radix non brachii modò humani crassitudinem assequitur, sed & suræ nonnunquam superat, longè latèque vario implexu propagata, perennat: nec minor caulium quos emittit luxuriosa vberitas, minimi digiti circiter crassitie, rubefcentes & compluribus alis concauos: folia Cataputiae minoris, oblonga, multùm illis magnitudine cedentia, Hyme decidunt: *flosculi* vmbellati, concaui, luteoli, quatuor peltata foliola furrigunt, vt & è staminibus totidem, reliqua in concauitate occultantes: *semen* in loculis triquetrum, reliquis non dissimile.

Per Pityulam & Efulam maiorem Matthioli, cuius radices è Gargano pro Turpeto adferri dicuntur, Dodonæus eam intelligit, de qua hoc capite agimus, quamvis icon Matthioli non respondeat, & alia sit, vi diximus proprio de Pityula Matthioli capite. An Gesnero Efula maior foliis Oleæ?

Icon Tithymali maximi apud Tabern. quamvis non placeat, tamen ad Efulam maiorem accedere videtur; descriptio quidem non quadrat. Verum nihil mirum, ignaro Compilatori quadrata rotundis miscere placuit, nec fortè Tithymalos hoc capite distinguere nouit.

Efulam maiorem germanicam, vt vsu crebro apud Germanos & Belgas receptam ait, sic sanè nulli Tithymali speciei, quàm Pityulae grandi frutescenti propiorem statuit in Aduerf. Lobelius, addens nisi hac accomoderetur, Dioscoridi aut minùs notam, aut prætermisam fuisse.

Trago Tithymali alterum genus *Grosz. zensfels mitch.* Efula magna siue maior, Efula dendrodes seu arborelcens. Cæsalp. Tithym. palustris, frequens in paludibus Pisanis. Schvv. Tithym. fruticosus palustris, *unasser vnolfs mitch.* Camer. hort. Tithym. fruticosus germanicus, in litore Rheni frequens. Cordo in Diosc. Pityula maior Dioscoridis, Efula maior recentiorum. Lob. Ic. p. 538. Efula maior germanica, vt & Obs. p. 194. vbi & Turbith nigrum & adulcerinum; Gail. Turbith noir: H lo. *Efula mayor: Efula maggiore* Ital. Pityula grandis Thalia. C. Bauh. phyt. Tithym. 19. Eid. pin. Pityula siue Efula 2. seu Tithym. palustr. fruticosus. H. Lugd. p. 163. Efula maior Dodonæi Hist. purgant. Efula maior germanica Penz, Eid. p. 1634. *Dua effigies vnius plantae.*

Rarior in Italia & Gallia & Anglia nisi in hortis colatur: in Germania verò superiore & inferiore ad Rhenum: vt & in Silesia ad sabulosas fluminum crepidines.

Mesues Efulam purgatorium rusticorum esse scribit, & maiorem viscera interna exulcerare, atque eam ob causam perniciolosam, monente Dodonæo. Impensè calida est, acris & exulcerans, ventriculoque molestissima. Errant verò non parum qui cortices harum radicum in medicamentorum compositionibus Turbith loco substituere temerè audent.

Pityula Matthioli.

Pityulae radices, quam officinæ Efulam maiorem nominant, Herbarii è Gargano Apu-

lia monte ad nos (inquit Matthiolus) comportant, & magnà impetura pro Turpetho venditant. Quod cum non ignorasset Actuarius album Turpetum Alypia esse radicem prodidit, nigrum verò Pityula. Nec hinc obstat quod dixerit Dioscorides Pityula radicem sub esse candidam: nam is de interiore substantia tantum intellexit, non autem de exteriori corticis membranula, quæ viridis rufescit, siccata nigrescit &c. (*aterium* quæ planta ab ipso tradatur, Pityula siue Efula maioris titulo (etiam in Egit. & Hist. germ.) donata, nondum certò concludimus. Nullibi enim eam describit, præterquam in Hist. germ. vbi tamen Dioscoridem solummodò delineationem, ipso quidem non citato, dedit: in qua radix dicitur alba, quam ipse Matth. in comm. facit cortice esse rufescente & nigrescente. Glossarum hinc & Patronorum eius declarationem requirimus ampliorem, qui nihil lucis ipsi attulerunt. Iconem in comm. cum mag. fig. & Hist. germ. non nihil variat quidem, sed ad priorem videtur facta effigiem, & non ad plantam ipsam. In neutra porò icon folia emulantur Tithym. cyparissiam ab ipso Matthioli depictum, qualia sunt Pityula in Italia passim provenientis, licet in omnibus maioris. In eius picturis folia latiora multò sunt, sed longiora, nec simile quicquam cum prædictæ Efulæ foliis habentia, sed potius cum Tithymali nostri Verrucosi.

Castori & C. Bauh. apud Matth. cuius iconem Synon. pinxit, Pityula: Eid. in pin. Pityula siue Efula 3. Tithymalus foliis breuib. aculeatis.

Lonj. (vt & Camerarius) quoque Matthioli imaginem habet, iam dictis addens, quæ Dioscorides de Pityula scripsit, confundens suo more omnia. Sed & Lacuna suo nomine eandem cum Matthiolo stirpem pingit, eademque refert, additque in toto regno Neapolitano haberi Pityulam Efulam minori similem, sed in omnibus maiorem: verum non indicat quam plantam intelligat. Hos imitatur etiam H. Lugdunensis, quæ & ipsa præter Pityula Matthioli siue Efula maioris effigiem p. 1632. exhibitam, & Matthioli inania verba nihil docet

TITHYMALVS SYLVATICVS
toto anno folia retinens.

Tithymalus sylvaticus radice nititur albâ, validâ, lignosâ, intortâ, variè diuisâ, multis fibris donatâ: à qua exsurgunt rami lignosi, cubitali longitudine maiores, flexiles, cortice exteriori insigniter rubente, & hirsuto: interiore virente, folia supra

rami medietatem crebris, quatuor ferè vncias longis, semunciam aut paullo plus latis, infernè canâ lanugine pubescentibus, excurrente per longum nervo ad medium vsque folium rubente, deinceps viridi, supernè quoque pilis, sed minus evidentibus, leuiter hirsutis, atro virore splendentibus. Ex summis ramis oriuntur *pediculi* in vimbellæ formam, rubentes similiter & hirsuti, singuli singula folia ad exortum, iis quæ in ramis sunt minora, reliquis similia, habentes, fescunciam longi ad geniculum quoddam, vbi rursus duo folia præcedentibus minora, opposita, pedicellique bini ex præcedentium pediculorum vnoquoque explantantur, iique rursus cum foliis suis minimis bipartiti *flosculos* sustinent foliolis circumdatos, minimos, herbaceo colore præditos, ita compositos ac si quatuor semilunulæ gibbis omnibus intrò spectantibus rhombum aliquo modo quis imitetur. Tota planta odore graui est, præter lignosam radicem, & lac fundit.

Odr.

Cordus in Diosc. Tithym. dendroides, Tithymalus sextum locum habens, *Lactaria* Germanis *Stein milch* vocata. Lobel. in Adu. Tithymalus characias Anglicus & Francus. Anguill. Tithymalus platyphyllos Dioscoridis. Cam. hort. Tith. fruticosus alius stipitibus rubicundis perennibus, foliis modicè hirsutis, lariusculis. Clus. hisp. & hist. Tithymalus characias alter, floribus pallidis, sine icone.

C Bauh. nos.

C. Bauh. phyt. Tithy. 7. siue syluaticus: an *Esula* multicaulis Tragi, Tithymalus quibusdam *Esula* rotunda. Nos Tragi *Esulam* hac non referimus, quia melius conuenire videtur cum Tithymalo verrucoso quem *Esulam* rotundam Cæsalpini suspicamur. Eid. pin. Tithym. characias 3. siue folio lanuginoso: Tithymalo characiæ primo similis Clus. hisp. Tithym. characias alter, eid. hist.

a n Ti b. en. r. G. s.

An Gesl. hort. Tithym. dendroides? An Cæsalp. Tithymalo characiæ similis in montibus. An Calceol. in Baldo Tithym. maior? An Tabern. Tithym. amygdaloides latifolius? Schvv. Tithy. *παραύλλος* latifol. montanus, *Esula* latifolia, Berg. *volffsmilch*. An aliqua ex Tithymali Characia speciebus Thalii?

Locus & Tempus.

Cæterum, i. ueni florentem in montibus Euganeis inter Balneum Aponense & Arqua, aliisque in locis. Basileæ in montibus prope Krenzack, Dornack, ac Mutets. Genecæ virentem in principio Februarii circa montē *Salene* & pontem d' *Arne*: Montbelgardi abundat in siluis, & circa fontem admirabilem. Clusio referente crecit etiam in Hispaniis: deinde in Gallia tam Narbonensi quàm reliqua, Heloetiis, & reliqua Germania: in Belgii hortis semel satum copiosè prouenit. Lobelio teste, frequentior in Germania & Franciæ Aureliæ vicinis siluosis, quàm calidiori solo: nulli bi quàm in Anglia copiosior: primo Vere floret: per Iunii menses fœtura. Anguillara ait copiosè in Italia prouenire, & Illyria potissimè Baldo & in Maiella di Abruzzo.

TITHYMALVS AMYGDALOIDES, siue characias.

Theoph. 9. hist. 12. *Lactuarium* [*τιθυμάλων*] *mafcula* vocitata, Oleæ folio constat, & magnitudine cubitum aquat: huius lac, cùm vindemia incipit, exprimunt, & præparato vtuntur: purgat interius.

Dioscor. Tithymalorum *mafculus* characias

[*χαρμύλας*, i.e. Vallaris.] vocatur: ab aliquibus *Cordatus* (ita reddit Sarac. vocem græcam *καρμύλη*) quæ ab effusa & ampla coma nomen traxit.) *Amygdaloides* (*αμυγδαλοειδής*, à foliorum forma, Amygdalæ similium:) aut *Gobius* (*γούβος*) nominatur. Porro (sunt huic *caules* supra cubiti altitudinem, rubicundi, acri lacteoque succo repleti: *folia* circa ramulos Oleaginosis (*ὀλαίοις*) sed longiora:



radix: crassa & lignosa: in caulium cacuminibus coma est iunceorum virgultorum (*χαίροις δέν' παρδ' ἐν*) & sub ipsis [*ἐν*] *αὐτῶν*. Daclech. putat legendum *ἐν* *αὐτῶν*, supra ipsa) caueat quædam peluibus aut alueolis similes, ac in iis *semen*.

A Plinio lib. Tithym. 26. cap. 8. primus Tithymalus cognominatur Characias, qui & mafculus existima-

tur: ramis digitali crassitudine, rubris, rugosis [succosis ex vet. cod. reponendum] quinque aut sex, cubitali longitudine, è radice foliis pendulis, in cacuminibus coma lunci. Et hæc est Plinii de Tithym. characia opinio.

C. Bauh. pin. Tithymalus Characias 2. [Synonym. phyt.] siue rubens peregrinus: Tithym. characias Matth Lac. Lon. Cast. & Tauern. Tithym. characias Matthioli, secundus Dodonæi, H. Lugd. pag. 1642. Tithym. characias legitimus Clus. hisp. & hist. Tith. characias alter Dod. & Cæsalp. *Dicimus* nos Cæsalpinum hunc intelligere per Characiam i. siue magnitudine præstantem, in asperis maritimis ortum: Camer. per Tithymalum characiam circa Veronam plurimū: Et fortè Calceolarium in Baldo, & Anguillaram per Tithymalum Characiam, in Italia quibusdam locis Herba lazza, ac etiam Tortomaglio magiore dictum.


Spontè prouenientem nullibi obseruauit, præterquam Monspelii, ubi abundat locis saxosis circa Castelnou, florens Februario & Martio. Nascitur, auctore Clusio, in asperis montosisque per Hispanias, Valentino regno, circa Malacam, atque etiam supra Arelatem itinere Massiliensibus, & quibusdam aliis Narbonensis Galliæ locis: Martio flores profert.

Dioscoridis succus lacteus per aluum pituitus tam bilemque trahit, obolis binis in posca sumptus: at cum aqua nullâ vomitiones etiam mouet: circa vindemiam succus is congestis ramulis, mox dissectis, & in vas inclinatis, excipitur. Aliqui adiecta Erui farina pastillos ex eo fingunt, qui Erui magnitudinè impleant. Alii in ficos quæ exsiccantur ternas quaternasue guttas instillant, vt cum iis marcescant, eiusmodique ficos ad vsum recondunt. Sed & per se tritus in pila cogitur in pastillos, atque reponitur. Porro, qui succum colligit, minimè obuersum vento stare, aut oculis manus admouere oportet: quinimò antequam

quam operi sese accingat, corpus, præsertimque faciem, collum, scrotumque & vicinas partes, adipem aut oleo cum vino perungere. Quoniam vero fauces idem exasperat, catapotia quæ ex eo concinnantur cera aut decocto melle oblini, atque ita dari par est. Caricas vero binas ternasue soluendæ alui gratia satis est. Recens idem succus ex oleo illitos in Sole capillos detrahbat, renascentelque flauos & exiles efficit, tandemque omnes abolet. Dentium cavis inditus, eorum dolores leuat: sed cera dentes oblinendi: ne forte præterlapsus is, fauces, linguamue malè afficiat. Tollit & illitu myrmecias, peniles verrucas, & quæ Thymi florem præsentant, itemque lichenas. Valet idem aduerlus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas, atque fistulas. Legitur semen Aurummo, & siccatum Sole leuiter tunditur, tandemque ab acerbis repurgatum loco mundo reponitur. Similiter & folia siccata reponuntur: quæ haud secus ac semen lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui ipsa inueterant, admisso etiam cum lacte Lepidio, calcoque confuso. Sed & radix drachmæ pondere hydromelitis inspersa potaque per alium purgat. Decocta eadem cum aceto, dentium doloribus auxiliatur, siquidem eâ colluantur.

Trahit pituitam, inquit inter alia Plinius, sale addito in potu, bilem aphronitro. Si per alium purgari libeat, in posca: si vomitione, in passlo, aut aqua multa. Est enim tam feruentis naturæ, ut per se extra corpori impositus, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in visu sit.

TITHYMALVS VERRVCOSVS.



Plures huius radices, tenues, in vnam tandem coeunt, minimi digiti crassitudine, ac etiam maiore, lignosam, cubitalem ferè, cortice externè nigro, internè albo, lacte viscido prægnante: *virga* multæ, lentæ, & fractu contumaces, tenues, subtubentes, pedales, ac etiam

cubitales, alternatim adnata, folia sustinent, deorsum ferè secundum caulem reflexa, vnciam longiora, semunciam ferè lata, tenui lanugine oblecta, magis tamen infra, quàm supra quo fit ut inferior quoque pars magis quàm superna albicer: inferiora folia interdum rubent, nec non etiam superiora: flores in umbella flauescunt, ex foliolis petatis, ut Vimbilici veneris primulidum à satù è terra prorumpentis: quibus succedunt capitula rotunda, crispo ceu areolarum minutissimarum congestu, aut verrucarum instar asperata: quæ matura ubi se aperiant, in tres partes diuiduntur, in quibus terna semina, colore & figura ferè similia Gallitricis, medullam habentia albam, oleaginosa valde.

Tom. III.

Trago Tithymali genus quartum, Tithymali Helioscopii species. H. Lugd. p. 1647. Tithym. helioscopius Dodonæi: Item p. 1650. Tithym. verrucosus Dalechampi: *figura due*. Thal. Tithym. helioscopius Dodonæi. Ponæ in Baldo Tithym. verrucosus Dalecham. C. Bauhin. phyt. Tithym. 6. siue Myrtifolia fructu Verrucæ simili: In aridis & sabulosis gignitur propè Lugdunum ad Rhodani fluentia: obseruauit & alibi.

Tithymalus mon acris, flore rubro.

Tuberculis inæqualem habet radicem, longiusculam, fibratam: caules pedales, vel cubitales, primò purpurascens, non sine adnatis ramulis, foliis amicti Tithymali verrucosi, modicè in acutem rotundum desinentibus, glabris: pediculis è caulis fastigio aliquos exeunt (subiecta foliorum oblongorum rotula) umbellæ formæ, in furculos subdivisi singuli, *foliis* in medio foliorum duorum, similibus acetabulis, parvis, quadripartiti, rubentes: è medio flosculo rubro exoritur ex breui pediculo fructus parvus triquetus, ut in cæteris Tithymalis, tuberculis exasperatus, ex cuius medio stilus & ad latus pediculus vel ramulus, sustinens folia alia duo, & in medio alium florem ac fructum. Ceterum, manat è vulnere lacteus liquor ut in reliquis Tithymalis, verum nequaquam acris aut feruidus, sed astringens, unde Tithymali aut Etulæ dulcis nomen meruit.

Eos errare scribit Tragus qui Miliariam Plinii statuunt. Gesn. hort. Erino cognatam herbam dixit, ut & Lobelius qui lupinum dulce *Erino cognata herbam dicit, ut & Lobelius qui lupinum dulce* *sub vvolffsmilco nuncupat* vel Lactoridi, Miliariæ, Etulam dulcem Tragi. Etulam dulcem vel 7. Tragi etiam C. Bauhinus: & H. Lugdunensis, cui etiam Piti uia.

Montbelgardi & Genevæ obseruauit florentem Maio, nec non in vmbrosis ac vliginosis montibus ac vallibus.

Radix vulnera mirificè glutinat, sed intrò assumpta vehementer vomitiones mouet. Eius exterior cortex lacte ex aceto per diem & nocte maceratus, deinceps autem resecatus, tulus & in puluicem redactus postea dimidiz drachmæ pondere in vino vel melicrato potus, quousvis aquosos humores & choleram expellit, & hydropicis apprimè conducit, inquit Tragus.

TITHYMALVS SERRATVS.

Dalechampi.



Tithymalus serratus cubitali caule præditus est, per quem folia vncialia, alia culmo latiora, alia etià minus lata, pleraque non acuminata, sed subrotunda, denticulis per ambitum crenata, glabra, ut verò quæ umbellæ pediculis adcoitum subiciuntur folia,

Hhhh 3

multò latiora quàm longiora, nonnulla quoque orbiculata, nihilque secius in ambitu ferrata: flores acetabulorum eano insidentes, muscosi, lutei: capitula masculula, triquetra, ex tenui pediculo Myrsinitis ferè paria. In nostra imagine non bene representantur ferraturæ: folia etiam nimium acuta pinguntur. In Narbonensi agro frequens est, nec alibi temerè reperitur.

TITHYMALVS MYRSINITES.

Descriptio



positos: quibus inter folia insident flores colore herbido, quorum singularia foliola puluilli instar habentia, anulis croceis donata sunt: pericarpia triquetra totidem grana continent.

Myrraria cognominata candida, Lactaria [*τιθυμάλος*] est foliis Myrti condita, verùm aculeatis parte postrema, sarmentula in terram demittens longitudine palmi, quæ non simul, sed alternatis annis, Theophrasto quidem auctore, fructificant, alia hoc anno, alia postero, quam omnia eadem radice exorta: loca montuosa desiderat: fructus Nux [*νύκκον*], vade huic Tithymalo *καρυων* cognomen, appellatur, &c.

Tithymalum alterum, qui fœmina [*θηλυή*] existimatur, Myrtitem [*μυρτιτὴν*] sc. à foliorum cum myrto cognatione] quem & Caryitem [*καρυίτην*] aut Myrsiniten [*μυρσινίτην*] vocant, Dioscorides similem scribit suapte natura Daphnoidi, foliis Myrti, sed maioribus ac firmis, in summitate aculeatis: sarmentis ab radice dodrantalibus: addens fructum proferre, alternis annis, Nuci *καρύδος* Lac. legit in vet. cod. *καρύδος* alacrynos] similem, sed leniter linguam mordentem: nasci & hunc in asperis.

Alterum genus Tithymali, quod Myrtiten vocant, alij Caryitem, Plinio est foliis Myrti acutis, pungentibus, sed mollioribus [ex vet. cod. maioribus] & ipsum etiam in asperis nascens. Colliguntur comæ eius Hordeo turgescente, siccataque in vmbra diebus novem in Sole inarescunt. Fructus non pariter maturefcit, sed pars apno sequente, & Nux vocatur. Inde cognomen Græci dedere. Demetur, &c.

Mat. h. 14. xxiij.

Matthiolus in Diosc. hist. germ. & epit. Tithymalum myrsiniten ita pingit, ut eum nunquam observasse videatur, vel voluisse accommodare

descriptioni Dioscoridis malè intellexit, nullam *Lacuna* appingens vmbellam eam nuculis, sed veluti magnam nucem: præterea eum non describit. Matthiolus imitatur *Lacuna*.

Tithymali Myrsinitis nomen vulgare italicum, præter *Torromaglio* nullum novit Anguillara. Eos falli testatur cum Gesnero qui existimant hanc plantam nucem ferre fructum quidem concedit nuci similem, sed non magnum ut nux, quemadmodum voluit Matthiolus, & Lonicerus.

Quin & Lobel. in Aduers. commentitium Tithymali myrsinitis effigiatum risit Matthioli nam.

Duas icones proponit compiler Tabern. *Tabern.* sine descriptione: Tithym. myrsinites 1. & 2. *Lob. 17. C. Bauh. notantur.* Duas quoque Lob. in 1c. p. 353. Tithymalus myrsinitis Obl. p. 192. Item, Tithym. myrsinitis Dioscoridis Adu. p. 150. Ego has duas non separo, licet C. Bauhinus diueritas statuerit in pin. ut mox dicemus.

Duas quoque habet H. Lugdunensis: Vnam p. 1642. Tithymali myrsinitis seu fœminæ Matthioli titulo: alteram p. 1643. Tithymali myrsinitis melius expressi inscriptione.

Nunc quævis C. Bauhinus in phyt. Tithymali 8. siue myrsinitis primi duas apud Lobellum & Tabern. icones existere dixerit, atramen in pin. eandem rursus separat, tanquam ab invicem differentes, minus sano, meâ quidem sententia, iudicio. Tithymalus myrsinites 3. siue latifolius, inquit, est Tithym. myrsinites Matth. Anguill. Dod. Gesn. hort. & app. Lac. Lon. Lob. Cæsal. Lugd. Cast. Camer. (hic addimus) Bellon. Obl. lib. 1. cap. 18. & 55. & Schvvenckf. cui & Esula myrsifolia dicitur: Tithymalus myrsinites, myrsifolius fœmina repens Dioscoridis Aduers. Tithym. myrsin. legitimus (hunc Hispanis & Gallis ignotum ait) Clusio: Tithym. myrsin. Tabern. Tithymalus verò myrsinites 4. siue angustifolius, est Tithym. myrsinites Dioscoridis Adu. Lob. icon. Tithym. myrsin. alter Tabern. Tithym. myrsinites in montibus Cæsalpino.

Non alibi quàm in Angliæ, Belgij & Franciæ *Locus* hortis natum vidit Lobelius. Anguillara reperit *Tamp.* in Maris, & multis Abruzzo locis, & montibus Nursiæ. In hortis diuersis diuerso tempore & florentem & semina maturantem ego observavi. Semel verò in hortum translatus, inquit Camerarius, sese variis in locis propagat, ac illi facillè assuescit. Non caret admiratione, quod aliquando superfluas plantas à me euulsas, & in orto per acerrimam Hiemem proiectas, sequente Vere repererim adhuc integras & illælas, quæ postea à quodam amico rutilum aliò transplantatæ fuerunt. Crescit sua sponte in Samnitibus.

Succus lacteus, radix, semen, & folia confimulæ ante dicto [masculo characæ] fortiuntur facultatem. Sed ille ad citandas vomitiones hoc ipso efficacior, præceptore Dioscoride.

TITHYMALVS PARALIVS.

Lactarium (*τιθυμάλιον*) quod maritimū graecum [*παρωλιον κόκκον*] appellant, Theophrasto folio est rotundo: caule, totaque magnitudine ad palmum, fructu candido: demetur cum vva nigrescere incipit, & siccatus fructus tritus potui datur, acetabuli tertia parte.

Tertius

Tertius Tithymalus παραλίος Dioſcoridi vocatus, quē aliqui Tithymalia (τιθυμαλία) aut Meconia (μεκονία), Dalech. mallet γλήχωνα, appellare, naſcitur in maritimis, rariſſis palmum altis (σπιθαμιαίς) crectis, ὅρθους. Sic vet. cod. Lacuna etiam legit ὅρθους Ita & Serapio, & Apul. lubrulentibus, quinis, ſeniſae à radice exeuntibus: circa quos folia ſerie quadam diſgeſta: eaque parua, quadantenus anguſta, oblonga, & Lini foliis ſimilia (οἰκόντα λίνω, vet. ἰοκόντα): capite in acumine orbiculato (vet. addit πυκνόν). Sic etiam legunt Lac. & Orib.) in quo ſemen Erui ſimile, varium (album Plinio, Semen is incipiente vua colligi, & Siccātū teri ſumique acetabuli meſura ad purgationes tradit) flores albi. Frutex totus cū



radice lacteo succo turget.

Icon hic exhibita facta est nobis absenti-bus, non ut optauimus.

Credidit Brassauolus illud esse Alſebran Melucinus, & Aui-cēne Scēbiā, quā Dioſcoridi Paralium est: sed ab eo merito diſſerit Matthiolum. Hunc autem fuisse notum Tithymalum paraliū dicere non possum:

non enim deſcribit, nec umbellam appingit: sed in extremitate caulium quiddam oroboides forte, quia Dioſcorides ait ſemen eſſe Erui ſemini ſimile.

Lacuna & Loniceri Matthiolum imitantur, eādē cenſurā digni.

Dod. lat. in fol. [ubi ait à Celſo Tithym. marinum propriè Lactucam marinam vocari] duas proponit icones: vni titulus, paralius ex locis maritimis: alteri Tithym. paralius ex hortis. Dubitat Geſn. hort. an Tithym. paralius à Matthiolo & Dodonæo pictus ſit Cypariſſias?

C. Bauh. phyt. Tithymalus ii. ſive maritimus: Eid. pin. Tithym. maritimus i. Tithym. paralius Matth. Ang. Dod. Lac. Geſn. hort. Cluſ. hiſp. Lob. Lon. Caſt. Lugd. qui tres figuras vnius eiſdemque plantæ habet, Camer. & Tabern. Tithym. maritimus Catalp.

Variatis, qui in maritimis natus ab hortenſi, hinc duæ figuræ apud Dod. Aduerſ. præter Tithym. paraliū virgis robellis, foliis ſubnigris, ſoſculis ex herbaceo luteolis, meminit & cærulei in torum. Non modò in Italia & Hiſpaniæ, ſed & in Hollandiæ, Zelandiæ, reliquaque inferioris Germ. maritima ora, locis incultis, aridis & præaltiſ ſubinde naſci reſtat Dodonæus: atque hunc ad hortos tranſlatum, luxuriantibus cauliculis & in longitudinem excreſcentibus, rariſſis effici foliis. Ego apud mare prope Monſpelium ſemine pregnantem vidi menſe Auguſto.

Parali Tithymali uſus & reponendi modus ſimilis eſt Characiæ & Myrſinū, Dioſcoridi.

Tithymalus Dendroides.

Tithymalus ſextus δ' αὐτὸν ποιεῖς vocatus, inquit Deſcripti. Dioſcorides, qui in petris naſcitur, folioſus eſt in acumine, denariamque ſpargit comam, ſucco lacteo prægnaus, lubrulentibus ran. is, foliis circa ipſum Myrti tenuioris, ſemine Characiæ.

Septimum Tithymalum, inquit Plinius, Dendroidem cognominant, alij Cobion, alij Leptophyllon, in petris naſcentem, comoliſſimum ex omnibus maxime (maximis in vet.) cauliculis rubentibus, & ſemine copioſiſſimum, eiſdem effectus cuius Characiæ.

Tithymalum a boreſcentem dictum Dendroidem in Creta vidit excreſcere Bellonius ad altitudinem duorum hominum, caudice craſſitudinis cruris.

Dod. gall. Tithym. 6. ſive δ' αὐτὸν ποιεῖς, leptophyllos quorundam, Bellonij. Eid. de purg. & in fol. lat. i. Tithym. characiæ 3. ſive caule non rubens, ſed exalbidus ac candidus, forte Dendroides Matthioli: Item, Tithym. dendroides ex codice Cæſareo. Iconem à Lobelio pro Tithymalo dendroide propoſitam, exhibet Dodonæus pro Characiæ tertio, ac diſtinguit eum ab arboreo, cuius effigiem proponit ex cod. Cæſareo, cuius folia noſtra plantæ ſunt ſatis ſimilia. Dendroidem [ſubdit] in petroſis locis exire Dioſcorides prodidit: in Creta Bellonius: Aloſius in Tuſcia, Liguria, & prope Maliliam. Matthiolum Dendroidem extra Terracinam agri Neapolitani urbem offendiſſe ſe reſcit inter ſex antiquiſſimæ ſpecūs, plantæ arboreſcentis effigie: & in Tergeſtino littore haud procul Titmao fonte in ſaxoſis quibuſdam rupibus. Qui tamen ab eo exhibetur, nequaquam amplius eſt coma aut Myrti foliis, ſed oblongis, & Characiæ æmulis pingitur: Hac ille. Et tanè mirum eſt Matthiolum non deſcribere Tithymalum dendroidem, & ei appingere comam ſive umbellam quæ nihil commune habet cum illo Tithymalorum genere.

H. Lugd. duas proponit figuras: p. 1644. Tithym. dendroidis Matthioli: p. 1645. Tithym. dendroidis Dodonæi ex cod. Cæſareo.

Anguill. narrat Tithym. dendroidem vel petraeum ad altitudinem magni hominis creſcere, trunco foliis vacuo, lignoſiſſimo: comā conſtare ex tenuibus ſurculis: foliis ſimilibus Myrti, paullo anguſtioribus: floribus luteis, aliorum Tithymalorum.

Cameraſio Tithym. arboreſcens ſive petræus, eſt altitudine trium cubitorum, copioſiſſimo lacte abundans.


Separat C. Bauh. Dendroidem Lobelij à Dodonæi ex cod. Cæſareo, præter noſtram opinionem. In phyt. Tithym. 9. ſive arboreus folio Myrti: Item, Tithym. 10. ſive dendroides ex cod. Cæſareo. Eid. pin. Tithym. myrſinites i. ſive arboreus: Tithym. dendroides Matth. Geſn. hort. Lac. Lob. in Adu. & Obſ. p. 194. & Caſtori. Tithym. charac. 3. Dod. Tith. arbor. myrſiſolius Lob. ic. p. 359. Tithym. arboreſcens Cæſalp. Item Tithym. myrſinites 2. ſive dendroides ex cod. Cæſareo, Dod.

E ſemine facile in Germania naſcitur, ſed diſſiculter tenellæ plantæ, utpote frigoris impatientes in alterum annum durant, in hortis: Cætera de loco ex Dodonæo antè habentur.

Tithymalus Dendroides ſimiliter ut Chara- Locus. cias, Myrſinites, Paralius, Helioſcopius & Cypariſſias reponitur & ſimiliter operatur.

ALYPVM MATTHIOLI, TITHYMALIS
affine. CAP. XX.

Descript.



Alypi
li nomine mi-
hi Sturgar-
diz per D
Schvartzium
demonstrata
hæc planta.
Ex ea autem
ramulus quem
asseruo, tenu-
is est, dodra-
tali longitudi-
ne, foliis onu-
stus, alterna-
tim positus,
vnciam plus
minus longis,
vix culmum
latis, in acu-
men desinen-

tibus, secundum longitudinē decurrente nervo.


Verba autem Matthioli de Alypo, si quis cum
figura plantæ quam describit, conferat, depre-
hendet eum sibi non constare, vt merito eum
inrepat Dalechampius.

Ac hallucinatur Coldenbergius in eo, quod
in Dispensat. Cordi supra diacast. dicit, herbam
quæ Alypi nomine hodie cognoscatur, affabrè
Matthiolum in suis comm. depictam exhibere.

An Anguill. epist. 14. Alypum passim in Scla-
voniz (Illyriz) insulis proueniens?

ALYPVM QVIBVS DAM, SIVE ESULA
rara flore purpureo.

Descript.



Sesquicubito
longiores
profert caules,
non sine ramis
frequentibus &
longis, per
quos folia Len-
tisci, vel Gly-
cyrrhizæ, ob-
longa, per ex-
tremum obtu-
sa, nisi quod
nervus qui se-
cundum longi-
tudinē vultur,
in exiguum de-
finit stylum,
glabra, euiden-
tibus obliquis
crebris nervis
in margines ex-
porrectis distin-

cta, coniugatis ex modicis interuallis, breuibus
pediculis donata: flores è ramorum cacumine

pendent, aliâ tepositione quàm villo Tithymolo-
rum, coacernati in racemum pensilem, singuli
oblongi, noliæ xigæ formâ, colore purpurascen-
te: radix valde proluxa & satis crassa. Lac ex om-
nibus partibus acre & feruidum Tithymolorum
more fundit.

Duas figuras habet Lobel. in Ic. Plant. p. 372.
sub titulo Esulæ raræ è Lio Venetorum insula,
In Obf. verò p. 202. vnam tantum.

C. Bauh. phyt. Tithymelus 2. siue purpuraf-
centibus floribus marina. Eid. pin. Tithym. ma-
ritimus 4. siue purpurafcentibus floribus: an A-
lypum Anguill.?

H. Lugd. p. 1655. Esula rara, Penzæ & Lobelii:
Item Esula rara è Lio Venetorum insula, Penzæ
alia. Dux eiusdem plantæ effigies.

Non alibi quàm littoribus, & insulis sinûs A-
driatici reperitur, & in Lio insula exigua.

Licet autem Turbith Antiquorum esse neget
Casp. Bartholinus in suis parad. inter Botanica:
posse tamen huius radicem succedaneum veri
Turbith esse admittit, & Turbith Venetum ap-
pellari, quodâ pares in purganda pituita molitur
effectus.

TITHYMALVS APHYLLOS.



Caulis recti
cnuus qua-
les Sparti aut
Genistæ, aut
certè paucis-
simis foliis do-
nati circa Veris
medium & Au-
tumni; cum flo-
ribus in summi-
tate pallidis,
qui breui deci-
dentes, caulicu-
los nudos re-
linquunt, anni
reliquo. Intra
flosculos au-
tumnales semen
latitat, etli autè
perfectè matu-
ra, apud nos ta-
men sata non

crescit. Attamen frequens admodum est hæc
planta in maritimis Africæ. Ex ea lac abundanter
exsillat colore albo, sapore acutissimo & quasi
caustico.

Æthiopes hæc plantâ siccata & in puluerem
redacta vtuntur in condimentis, sicut nos Pipe-
re, inquit hist. nat. lib. 28. cap. 1. Ferd. Imperatus.
Quidam existimant esse Xabram & Camarro-
num Rhasis, quam Rauuolfius se circa Tripo-
lim obseruasse scribit, & quæ H. Lugd. Plantala-
ctaria: vt & C. Bauh. phyt. dicitur. In Africa de-
nominatur vocabulo quod nobis Piper longum
denotat.

FINIS LIBRI TRIGESIMI QVARTI.





HISTORIÆ VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXV.

HERBÆ CRASSIFOLIÆ ET SVCCVLENTÆ.

Nunc reuertemur ad eas, quæ penè rote succi sunt, quarum quadam inter eas, peculiari privilegio donata, ut etiam radice tenui cuncta viuunt & crescant, etiam nullo suffecto nutrimento, quod miraculo quis proximum putet.

PORTVLACA, ANDRACHNE, VETERIBVS.

CAP. I.



DRACHNES [*ῥῆ ἀδραχ-
νῆς*] nomine diuersa stirpium
genera comprehenduntur.
Theophrastus enim libr. 1.
hist. plant. cap. 8. & 15. item
4. hist. 4. Adrachnes arboris,
quam Portulacam Gaza red-
didit, meminit. Sed de hoc

Adrachnes genere cum alibi petraetatum, plura
hic repetere instituti nostri non est. De herba
duntaxat, quam 1. caular. 10. & 4. caular. 3. exhi-
bet, sermonem facere decreuimus.

Huius igitur Dioscorides duo genera consti-
tuit: *Ἀνδραχνῆν* [satiuam intellige] & *Ἀνδραχνῆν
ἀδραχνῆν*, h. e. Andrachnem syluestrem. Hanc sic de-
scribit. Portulaca syluestris [sic Ald. Paris. ca-
ret] cognominata, foliolis est quàm antè me-
morata [satiua] crassioribus ac densis. Locis
petrosis nascitur: interdum & in hortis. Folia
verdè habet Olæ, sed minora multò, verùm plu-
ra, eaque tenera: *cauliculus* rubicundos, ab una
radice frequentes, in terram inclinatos: qui
quidem commanducati succolenti percipiun-
tur, viscidè & subfalso gustu. Vim calfactoriam, a-
crem & exulcerantem: ac strumas quoque cum
axungia imposita discutit.

Et hæc portulaca syluestris Dioscoridis, hirsu-
ta, exulcerans, quam plantam sit, nos adhuc sa-
tere, ingenue færemur. Dodonæus autem Ille-
cebram esse sibi persuadet. Præter Portulacam
maiores satiuam, & minorem syluestrem, am-
bas eiusdem generis, & aliam quandam, & qui-
dem syluestrem, à Græcis quoque *ἀνδραχνῆν*

ἀδραχνῆν nuncupatam, veteres referunt, quæ alio
nomine Illecebra à Latinis appellata est, inquit
Dod. Confunditur autem hæc quandoque cum
minore, siue syluestri Portulaca, eiusdem soge-
neris cum hortensi. Neque ab hoc errore ple-
raque Dioscoridis exemplaria libera sunt. Nam
quod in Portulacæ syluestris descriptione, *cauli-
culos manducatos bonum succum parere, viscosos &
aliquantulum salios* esse affirmatur, ad minorem
syluestrem referendum est. Quod verdè sequitur:
vis ei ex calfactoria, acris, exulcerans, &c. non hu-
ius, sed Illecebræ facultas est.

Iam & Peplis, ab Hippocrate Peplion, non-
nullis quoque Portulaca sylvestris appellatur, *Peplis. Pe-
Dioscoride teste.* Quæ occasio cur Plinius lib. *plion.*
& cap. 20. scripserit, Portulacam, quam Peplion
vocant, non inultum satiuam efficaciorè esse:
sed ibi Portulacam cum Peplio herba diuersissi-
ma confundit: confundit quin etiam vires sylue-
stris cum satiuæ Portulacæ viribus. *Plinij error.*

Recentior ætas & quandam superioribus ma-
tinam dictam Portulacam annumerat, quæ cum
fruticosa sit, lib. 8. H. n. post Halimum requiren-
da. *Portulaca
marina.*

Telephium etiam, quod à nobis Anacamferos
inscribitur, ob formam ei concessam, Trag. Por-
tulacam maiorem dicendam putauit, licet nemo
antiquorum herbariorum ita vocarit. *Anacamf.*

Sic Alfinem palustrem minorem folio oblògo,
sibi Portulacæ aquaticæ nomine misit ait C. B. *Alfina pa-
lustris.*

Portulaca verdè aquatica Thalii, foliis satiuæ
minoribus, seminibusque iisdem, quid sit inquit-
rendum.

Tom. III.

liii

Cæterum quam Græci *ἄνδραχνη* nominant, & *ἀνδράχνη*, Latini Andrachnen & Adriachnen vnus literæ elisione dicunt, & Portulacam: Germani *Burzel*, & *Burzelkraut*; porcelen item, ac *porcelenkraut*: Belgæ *porcelleyn*: Galli *du Pourpier*, aut *Pourcellaine*: Itali *Porcellane*, *Procaccia*: Hispan. *Verdolagas*, *Baldroegues*: Angli *Porcelain*.

Adrianus Turnebus Adv. l. 8. cap. 23. edit. Luc. Portulacam etiam Portulatam dicendam existimavit, quod foliis portulas imitetur. Sed exemplar antiquorum voluminum desunt.

Nobis porid triplex Portulaca cognita est, de quibus nunc agendum.

PORTULACA SILVESTRIS minor, siue spontanea.

Descriptio



PAssim in hortis & vineis nascitur spontanea & silvestris Portulaca, multis numeris minor, quam sativa, tota terræ appressa, nec huiusmodi: gens, radice crassiusculâ, sicuti & ramis, succulentis, multifidis: folia vngue digni miuimi ferè paria, succulenta, crassa, atroviuentia: flores pulilli, multifidi.

Negatur esse genus germinum

Portulacam siluestrem siue alteram, vt vocat, Fuchsius negat esse Aizoi genus tertium, contra quam vt aliqui seducti mendosis Dioscoridis exemplaribus credunt. Nam quod plerique nomina harum plantarum confuderint, factum subinde esse ait vt multa adulterina, quæ tertii generis Aizoo debeantur, capiti de Portulaca siluestri inserta fuerint, quæ omnia expungenda veniant.

Caput de Portulaca silv. videtur superfluum.

Marthiolus integrum ex Dioscoride caput de Andrachne agria demit, licet Portulacæ silvestris genus hoc depingat. Et certè in iis exemplaribus, quæ Colonie All. L. Stoer exquidit, cum comm. Marcelli Virgilii, vnus tantum generis Portulaca describitur, sicut & Ruelliana habent exemplaria.

Videtur deprauatum.

Quod itaque ad silvestris Portulacæ appellationes attinet, variant exemplaria Dioscoridis. Et optandum sanè esset, vt suo loco quæque placita, in Veterum scriptis collocaretur, quod si fieret, maiori cum fructu illa legeremus, inquit Tragus. Sed ea semper fuit sciorum in deprauandis optimorum autorum scriptis perueritas, vt cum aliquid minus intelligerent, statim immutato ordine pro libito transponerent, aut omnino expungerent, substitutis in locum adulterinis sententiis, quo factum est, vt vetusta & emendata exemplaria prorsus perierint, reliquis nouis & deprauatis, quibus, si rem diligenter consideres, quod alibi deest, alio loco superfluum

inueniatur. Id cum in aliis multis capitibus Dioscoridis contigerit, tum verò in descriptione Portulacæ haud obscure videre est. Nam Andrachnen duorum generum esse ait, hortensem & agrestem, sicuti rei veritas sese habet. Rursus sub descriptione Sedi minoris, tertium illud genus, Portulacam agrestem esse, & Illecebram, ac Telephion dici tradit. Præterea Telephio proprium dicatum est caput, quo loco Portulacæ agrestis seu Illecebræ iterum facta est mentio. Quis ergo non videt, in his mendosis exemplaribus, omnia esse confusa, nihilque vel suis propriis nominibus appellatum, vel suis locis dispositum? Sed cui adscribemus hæc, nisi temporis, quo omnia & variantur & abolentur, iniquitati, & herbariorum ac medicorum imperitiæ & negligentia?

C. Bauh. pin. Portulaca 2. siue angustifolia, vel silvestris, vt Trago, Math. Anguill. Fuch. Dod. Lob. Obs. p. 210. Icon. p. 388. Hist. Lugd. Cast. & Gerardo: Portulaca aruenfis Tabern. Portulaca spontè nascens Cordo hist. Portulaca angustiorib. foliis Cæsalpin. Cepæa Cordo in Diosc. Lon. deser.

Portulaca exigua siue aruenfis Camerario.

Herbula nō ab aliis, vt autor perhibet, demonstrata, pinguis, sublucea, coliculis incuruis aliquantulum procumbentibus, foliis minutis, Portulacæ silvestris, pallidioribus tamen, semper geminis: nigro semine in vasculis paruis, Portulacæ similibus, sed quæ longioribus Pediculis, & gracilibus, nituntur, & maturè incipiunt hiare antequam semen plenè perficiatur. Sapor illi nullus qui notari queat, præterquam herbaceus, vt in Alūne.

Camer. Portulaca exigua siue Andrachnion aruense. C. Bauhin. pin. Portulaca 3. siue exigua Camerarii.

Primo Vere in agris frumentariis frequens est circa Lypsiam ante Cremensem portam.

PORTULACA HORTENSIS latifolia.



SImplice fecit est radice, progressu temporis lignescente, cui libræ paucae appensæ: caules plures emittit pedali longitudine, non raro breviores, teretes, subrubentes: folia incondita, succulenta, ex angusto principio, quo cauli adnascuntur, sensim dilatantur, sapore subacido:

inter quæ oriuntur *stipules* lutei, stellati, apicibus concoloribus: hisce succedunt pericarpia rotunda, semen continentia pusillum, pullum.

Portulaca quamvis græca *ἄνδραχνη* voce exprima-

primatur tamen *αράχνη* dicendam potius contendit Lobelius, quod teneritudine quadam lactea & carnosa in exortu luxuriet, ramulique ac folia albicent, quadam spumosa fuligine, siue tenui quapiā aspergine cinerea, & aura spumosa, quam *αράχνη* dicit, additque non adstringere, sed refrigerare, legendum esse apud Dioscoridem, idque notandum cum, qui attentius caput de Portulaca à carcere ad calcem lustraturus sit: hanc enim illius primam & summam esse facultatem. Facilem autem esse lapsum, rerum ignorum amanuensium, typographorumque, græcè productum legentiumque, *ΣΥΡΤΗΝ ΕΧΕΙ* *ΔΥΣΑΙΝ*, pro *ΣΥΡΤΗΝ*.

Turnero dicitur Portulaca, vt & Cordo in Dioscor. fatua Anguill. (*γλισπιδά* in Græcia) Cordo hist. Dodon. gall. Hist. Lugd. & Eyst. Portulaca hortensis Brunfels. descript. Trago, Fuchs. & Dodonæo. gall. Portulaca domestica Matth. Lob. in Obs. p. 210. Icon. p. 388. Cast. Tab. & Gerardo. Portulaca maior Camer. hortensis Gesn. hort. Portulaca latioribus foliis Cæsalpino.

In hortis ac eorum areis subactis ac stercoreatis commodè feritur Martio aut Aprili: Iunio verò ac deinde in Autumnum usque viget ac viret: Solum desiderat letum, pingue, non aridum.

Vim habet, vt author est Dioscorides, adstrictoriam (*συσπικτική*: *Συσπικτική* refrigeratorem, & Lob.) Imposita cum polenta capitis doloribus, ac tum oculorum, tum ceteris quoque inflammationibus: itemque stomachi ardoribus, & erysipelatibus, ac vesicæ denique cruciatibus auxilio est. Pro cibo verò sumpta, dentium stuporem & stomachi ac intestinorum contractionem, fluxionemque deuulcerat. Erosione tentatos renes & vesicam adiuuat, ac veneris impetus exoluit. Simili effectu prodest eius succus epotus, etiam in febribus hecticis, valet & tui multumque cocta, contra teretes lumbricos, cruentam excretionem, ac dysenteriam: itemque ad hæmorrhoides, & sanguinis eruptiones, nec non & aduersus sepsim (*σηπτική*) mortuus. Sed & oculorum medicamentis vtiliter admiscetur, ac intestinis fluxione laborantibus, erosive vulvis infunditur. Quin & ad capitis dolores ab æstu obortos cum rosaceo aut simplici oleo irrigatur. Erumpentes quoque, in capite papulas cum vino exterit. Vulneribus denique, quæ ad fiderationem spectant, cum polenta imponitur.

Ex Plinio memorabiles Portulacæ vîas perhibentur: Sagittarum venena & serpentium hæmorrhoidum & præteritum resinguit pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Item Hyosciamopo, è passoque expresso succo. Cum ipsa non est, semine eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum vitæ, capitis dolori, vlcerebulque in vino tusa & imposita. Reliqua vlcera cum melle commanducata sanat. Sic & infantium cerebro imponitur, vmbilicoque prociuo, In epiphoris verò omnium fronti, temporibusque cum polenta. Sed ipsi oculis è lacte & melle. Eadem si procidant, prodest, foliis tritis cum corticibus Fabæ. Pusculis cum polenta & sale, & acetato, ac cerâ. Et vlcera oris, tumoremque gingivarum commanducata cruda sedat. Item dentium dolores. Tonfillarum vlcera succus decoctæ. Mobiles dentes stabilit commanducata. Cruditates sedat, vocemque firmat, & stimulat. Cervicis dolores cum galla & Lini semine. Tom. III.

mine pari mensurâ sedat. Mammæ vicia cum melle, aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachum in acetariis sumpta corroborat. Ardentibus febribus imponitur cum polenta. Et aliâ manducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenteria & vomitis datur ex aceto, vel bibitur cum Cumino. Tenesmi autem cocta, & comitialibus cibo vel potu prodest. Purgationibus mulierum acetabuli mensura in sapa. Podagris calidis cum sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuuat, & vesicas. Ventris animalia pellit. Ad vulnerum dolores ex oleo cum polenta imponitur. Nervorum duritias emolliat. Venerem inhihet, venerisque somnia. Prætorii viri pater est Hispania princeps, quem scio propter impatibiles vix morbos, radicem eius filo suspensam è collo gerere præterquam in balneis, & ita liberatum incommodo omni. Quin etiam inueni apud autores caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare putatur.

Portulacâ quidâ vt cibo vtuntur, inquit Gal. *Galenus*.

2. alim. sed imbecille præstat alimentum, idque frigidum humidum & glutinosum. Vt medicamentum autem dentium stupori medetur, oblectorem suum morsus expetent. Et rursus lib. 6. simpl. Portulacâ frigida & aqua temperamento est, paucâ cuiusdam pariceps austentatis. Proinde fluxiones repellit, & maximè biliosas & calidas, cum eo quod eas muret, & alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertii excessus à temperatis, in humectando verò secundus. Hâc ratione æstuant, vt si quid aliud, adiuuat tum ventris oculo imposita, tum totis hypochondriis, maximè in febribus hecticis. Præterea stuporem dentium sanat, neque qui ab acidorum contactu asperè exsiccati fuerant, leniens atque replens, vt potest quum viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaque non fortis modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanè & toti herbe comelæ accidit. Quoniam autem restringit, vtiliter in dysenteris editur, & muliebri profluuiio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multò est, quàm herba, succus ipsius efficacior. In his curatium torporem discutiatur Portulaca, causam reddit Galenus. Alexander tamen Aphrodisius hoc Portulacæ munus cæcis rerum facultatibus, & abditis causis acceptum retulit.

Cæterum, Vallembertus infantibus laborantibus crustis faciei particulatim interdicit Portulacam nutricibus, propter proprietatem occultam, huic morbo nocuam, si internè sumatur, licet externè applicata vtilis sit.


C E P Æ A.

CAP. II.

Spargit per terram folia succulenta. Portulacæ similia, minora, subrotunda, alia per caules cubito proceriores, ramulos, ex oblongo per extremum rotunda: flores in caulibus à medio, summo tenus ex vncialibus pediculis plures congesti, suis tamen petiolis minoribus nixi, parualbicantes: radix obliqua, gracilis, brevis, multis fibris capillata.

Matthioli. veram & legitimam Cepæam sibi

cognitam asseuerat: nec tamen villam notam addit, vel figuræ, vel naturæ, nedum locorum, quæ nos certiores faciat, illum ad amissum *Cepæam* exploratam habuisse.



Synon.

[quoad iconem C. Bauhin.] Lob. in Adu. & Obs. p. 14 ac Ic. pag. 393. Cast. Cæf. Tabern. Clus. hist. & C. Bauh. pin. *Cepæa*. Germ. *Cepenkrant*, *Velfch harnkraut*, Tabern.

Locus & Tempus.

Obseruavi *Cepæam* variis in hortis virentem Nouembri, repositamque Ianuario, ac Æstate florentem. Occurrit inter Valentiam & Lugdunum, au boss de la bonne Alemande: Genevæ extra portam S. Geruasi. Author est Plinius *Cepæam* Portulacæ similem, nigriore radice, sed inuribili, in litoribus arenosis nasci.

Vires & v. sus.

Cepææ Dioscoridæ folia pota cum vino vrinæ stillicidio & scabiosæ vesicæ (vesicæ malis, Plin. nec plura) auxiliantur. Maxime tamen hoc faciunt, si cum asparagi myacanthini appellati radicem decocto bibantur. Paulus radicem cum Myacanthino asparago potamvrinæ stillicidiis ex obturatione obortis prodesse scripsit.

SEDVM ECHINATVM, vel stellatum flore albo.

CAP. III.

Descriptio

EX radice breui, multis fibris capillata, caulis vnus, vel plures prodeunt spithamei, pingues, supini, teretes, sæpe simplices, aliàs in duas alas diuisi, non tamen faciliè fragiles: folia Portulacæ, subacida, carnosa & succulenta, coloris viridis, extremâ orâ, quæ latior etiam est, serrata, saporis Sedi maioris vulgaris: folia inferiora caulibus excrecentibus exsiccantur & corrugantur: caulibus ex certis interuallis ad latus adnascuntur flores stellati, Sedi, quinquepartiti, albi, apicibus purpurascens, quinque foliis acuminatis, teretibus, viridantibus, totum florem obvallantibus: capsula stellata succedunt ex radiis quinque plurimum, rariùs sex, compressis, semen continentes, minutum, Aizoi vulgaris.

Aizoom peregrinum Clam.

Camerario hort. qui Aizoom peregrinum vocat, *Cepææ* non ineptè adscribi posse visum fuit. Quidam Lunariam appellant.

Dux (Cepææ sc.) sunt Cæsalpino in parietibus opacis nascentes, vix excedentes quatuor digitos foliis latitudine vnguis, modicè angulosis:

quæ Alteri quidem prope radicem densa sunt, vt in Semperuiuo: Alteri autem rara, quæ & ramiflor est: flosculi candicantes: radix tenuis: fructus stellatus. Quidam Umbilici speciem putat: Dioscorides herbâ Paronychiam appellat. Ego



contra Cætalpinum non duas, sed vnâ constituo, ætate quidem differe ntem.

Fab. Columne Semperuium tertium Dioscoridis & Plinii.

C. B. phyt. dicitur Sedum 25, Synon. siue flore stellato, & Telephium Imperati Cam. hort. Ego Telephium Imperati non noui, quod sciam, saltem sub eo nomine. Verum

non possum mihi persuadere Camerarium descripsisse nomine Thelephii eam plantam, quam pro Aizoom peregrino descripsit & depinxit iconum libro n. 2. Quis in tam excellenti Botanico putet memoriam ita labilem circa plantas sui hort: mihi longè alia stirps est.

Fœl. Platerus in cuius horto primum à me visa, vocabat *Cepæam* alteram, non obstantibus nonnullis, qui Tragium nominandum putarunt.

Montbelgardi in horto E. C. quotannis spontè pullulat, virescens Hieme, vigens Iunio, Iulioque florens.

SEDVM ECHINATVM flore luteo.



Simile iam dicto, sed minus, quod spontè ortum vidit Columna in pariete veteris ædis D. Antonii extra urbem, postea multis locis humentibus: toro habitus est similis superiori, foliis tamen variat non sinuatis, magis ad Portulacæ folia accedentibus, sed minoribus: flores item non albos, sed luteos promittit, eodemque tempore perficitur: gustu etiam simili.

Nec dubium est, inquit Columna, quin idem Vires. specie & viribus sit Semperuium hoc tertium Dioscoridis flore luteo, cum Semperuiuo eiusdem tertio flore albo.


ANACAM.

ANACAMPSEROS, VVLGO

Faba crassa.

CAP. IV.

PEdalis & altior est Anacampseros, *caulibus* rectis, teretibus, quibus perquam crebra adnascuntur *folia*, surrecta, succulenta, Portulacæ foliis longiora, colore glauco, rubedine aliqua subinde perfuso, crenata, aliàs integra: flores in umbellis digesti, albi, quorum singuli quinque foliis constant: *radix* subest tuberculis glandulosis itumosa: nullo v. nec sapore, nec odore excellit.



Per Fabam inuersam, *Geniandæ bonen*, herbæ latis foliis, ad Halicacabi folia accedentibus, existimamus Eucharium Ræsi. Anacampserotem intellexisse, cuius iconē habet p. 207. sub titulo *Mau-*

pfeffer, Vermicularis & Crassula. Ibi tamen nulla descriptio conueniens. Fabulosum etiam est quod dicit ferre Fabas inuersas: id enim desumpsit ex nomine.

Faba autem inuersa dicta est, quia radix immaniter tuberculifer, quæ Fabarum impleant magnitudinem.

A Dorsthenio inter vulnerarias numeratur, diciturque esse. Telephium Dioscoridis, argumento à pictura & viribus petito. Verum ab eo & ineptè describitur, & pro ea importunè, Orchididis maioris icon proponitur, quæ in Botan. hæc edum Egenolphi pag. 297. exprimitur.

Pro Telephio hanc videtur quoque admittere Lobel. in Afu. Quin & Fuchsius Anacampserotem ad Dioscoridis caput de Telephio reducit, esseque perhibet (nouimus Bellonium & Solenandrum) qui Acetabulum alterum esse putent, quorum sententiam non admodum obsecram esse iudicat. Mirum autem eum credere, Illecebram Romanis dictam propriè huic plantæ conuenire. Alii inter spurcia Telephii hanc vocem delent.

Porrò an sit Telephium hæret Tragus, dicēs: Quod illi in Dioscoride sit nomen, Herbarii nihilum exposuerunt certi. Nam alius Scrophulariam, alius Fabam grossam, alius Portulacam maiorem, alius postremò Semperuium nominant: Quod ad me attinet subscribo opinionibus duabus postremis. Nam si respicias formam, Portulaca maior non ineptè dicitur: rursus si perpetuicarem eius consideres quid obstat quominus *αἰζών* vocetur? Et videtur mihi omnino esse Aizoon, quod Dioscorides Chrylocomé appellat. Et quamuis nomina quæ eo loco adfert Dioscorides, non satis ad præsentē herbam quædrent, non tamen de nominibus semper sollicitos esse oportet, vbi de ipsa constat. Multi

propter radicis formam ad Satyria pertinere arbitrantur. Sed si totam eius substantiam perspicias, rectius ad Portulacam, Sedū maius & minus referes. Sin verò Telephium fuerit, vt multi arbitrantur, certè id est, quod à Diosc. Portulaca agrestis dicitur. Trago verò nunquam subscripserit Cronenburgius, quod Telephium illud *hymel schlutem* vocatum Dioscoridis Chrylocomé crediderit: ac eos minùs verè sententia scribit, qui Sedi genus alterum, ac Semperuium minus, Fabam hanc crassam & inuersam arbitrantur, cum potiùs hoc nomine Telephium hoc, Cæli claus dictum, intelligendum veniat.

Cronenburgii sententiam respuit Amatus asserens lib. 4. cap. 91. Fabam crassam, Sedum minus Dioscoridis esse. Idem lib. 1. cap. 18. negat *Sedum minus* Diosc. Crassulam maiorem Telephium esse. Cuius opinionis quoque est Rob. Constantinus.

Anacampseros piguitur à Matthiolo nomine Fabariæ, memòque negatur esse Telephium huius verbis. Quamquam non desunt, qui existiment Telephium esse Fabariam: cum tamen nulla reperitur qualitate prædita, quæ abste floræ, siccantisque facultatis particeps dici possit, vt Galenus Telephium esse testatur, foliaque proferat Portulacæ longè maiora, eorum locè sententiæ planè aditipulari non ausim: tamen ea compluribus notis Telephium referre videamur. Velim tamen in his, vt in aliis quoque dubiis plantis, suum cuique esse iudicium. Lib. verò 3. cap. de Teuctrio, quosdam producit, qui Teuctrium alterum Plinii esse contendunt.

Dicitur Scrophularia Trago: Scrophularia media vel tertia Brunfels. tom. 1. thap. 37. Herba crassula, Cordo disp. Crassula maior, Amato, Cæ. Thal. & Dod. gall. Crassula siue Faba inuersa Gerardo: Faba inuersa Ioub. dec. 1. par. 2. Faba inuersa, siue Crassula Gesn. hort. Lob. in Adu. & Icon. p. 389. Fabaria Beton. hæc. Egen. p. 74. Matthioli. Gail. & H. Lugd. Acetabulum alterum Cordo in Diosc. Acer. alteri album Fuchsi. Sedum minus Amato. Sedi genus alterum, & Semperuium minus, Cronenburgio. Telephium Matthiolo, Gesn. hort. Lob. Obs. pag. 211. Tabern. Cast. & Camer. Telephium album Fuchsi. Telephium alterum, siue Crassula Dod. lat. Telephium 1. siue vulgare C. Bauh. pin. Telephium vulgare siue secundum, Clusi. hist. Corilodon alterum Dioscoridis, Columnæ: Vmbilici veneris species Bell.

Alii, vt annotat C. Bauhin. pin. foliis crenatis & subrotundis, vt Basileæ provenit, pingunt: Varietas alii oblongis & integris, vt Lob. Dod. & Clusius. Flore est communiter albo, est & lateo: reperitur etiam flore purpurascēte, & foliis rarioribus, estque Telephium 3. purpurascēte flore, Clusi. hist. Huc referendum id quod solo folio glauco, cæruleoquæ à vulgato differt, quod Telephium glaucum verius, Lob. Obs.

Cum autem aduersus hernias hæc herba vsurpetur, idèò Germ. *Bruchwurzel* appellata est & Nomina *knabenkraut*. Sortita est & alia nomina, nam à linguar. sanandi facultate, *vundkraut*: & à forma radicum, *zumpenkraut*, *foizzeuain*, & *foizzuang* & à similitudine foliorum, *Bonenblatt* cognominatur. Dicitur etiam *Fettebene*, *Donnerbonen*, & à superstitione, Herba S. Iohannis. S. Iohannis kraut. Inter omnes plantas, inquit Tragus, vix alia reperitur, quæ diutius vireat, & ab interitu vindicetur, hac ipsa nostra Scrophularia, qua de causa nonnulli, præsertim Medioma:

trices in vigilia D. Ioannis illa ad superstitiones suas, vt & Artemisia vtritur. Nam quamprimum ea diu transierit, suspendunt hanc herbam in conclaibus suis, alii etiam parietibus imponunt, & supra ianuas collocant, quibus in locis longo tempore virescat, & continuo repullulascit, ita vt circa festum Natiuitatis virentem eam repenias. Hoc verò illi faciunt, et spe & fiducia perfusi, quia credunt illi homini qui herbam suspenderit, nullam lethalem agnitudine accidere posse, tantisper dum illa incolomis sit & vigeat. Sed relictis his superstitionibus, ad propositum redeamus. Belgæ vocant *vuendecruyt*, & *Smeruortele*. Gallis *Reprise*, *loubarbe des vignes*, *Fene effesse*. quibusdam *Grassete*, aliis *Orpin*, aliis denique *Chicotrin* dicitur. It. & Hispan. *Faba grassa*: Angl. *Orpyne* Nomencl. pann. *Suly* fin.

Locus & Tempus. Nascitur sine vilo negotio, & præcipue locis vmbrosis. appetente Maio mense caules emittit, qui Iulio & Augusto flores proferunt.

ANACAMPSEROS PURPUREA.

Descript.



Pari cum alba, magnitudine caulem habet ex radice strumosa, rectum & rigidum: foliorum dispositio eadem quæ in hoc, angustiora, longiora, dilutiorque virore tinctæ, perinde denticulis quibusdam per ambitum incisa: flores furculis insident vmbellati, iam dictæ Anacamperotis, sed rubentes, quo etiam

colore sunt stamina media & apices.

Synon.

Est hæc Scrophularia seu Portulaca maior, Tragi: Fuchf. & H. Lugd. Telephium purpurascens: Lob. in Ic. pagin. 389. H. Lugd. Cam. ep. Tab. & Ger. Telephium floribus purpureis: Clus. hist. Telephium 5. purpureo flore: Fuchf. ic. Acetabulum purpureum alterum: Lon. Fabricia: Cæf. Crassula montana: Columnæ par. 2. Rapuntium vmbellatum: C. Bauhin. pin. Telephium 2. siue purpureum maius: Hoc, inquit, foliis est longioribus & profundius crenatis: naps aliquando paucioribus, aliquando pluribus, quod posterius, Telephium quartum est Clusi in hist.

Varietas

Telephium purpureum minus [C. Bauh.]

C. 2. descript. A radice nodosa, & aliquot veluti minimis naps constante, multisque fibris prædita, cauliculus vnum vel alterum rotundum, semipalmare, fragilem ac succulentum promit: quem folia crassiuscula, succulenta, parua, in ambitu crenata, sine ordine ambiunt: strobili quinque folii, purpurei, velut vmbellæ insident: quibus capitula pentagona, minutissimum semen scobis instar continentia, succedunt.

In editissimo monte Brigoiz, Belchen dictæ, locis humidis Iulio florens, collegit author, quod in pin. tertio loco recenset.

ANACAMPSEROS MAXIMA.



Habet duos, tres, plures caules x radice proleantes, cubitales succulentos, in latus se inclinantes, in quibus ordinata sunt folia, hoc ex interuallis bina, semper aduersis pediculis nascentia, crassa, succi plena, vt in Crassula maiore, sed maiora, & magis carnosa: strobili in extremis ramis quasi vmbellati nascitur, quemadmodum in Crassula maiore. pallidus: radices illi plurimæ, glandulosæ, Crassulæ vulgari similes: sic describit Clusius, addens, ambigi an ad Telephium hæc planta sit referenda nec ne.

C. Bauhin. pin. Telephium 4. siue latifolium peregrinum: Teleph. Hispanicum Clus. hisp. H. Lugd. & Tabern. Telephium 1. Dodon. 1. siue Hispanicum Clus. hist. Telephium seu Crassula maior Hispanica Lob. Obs. 212. Ic. Plant. pag. 390. & Getardo. Floribus est albis atque etiam rubris.

Huic omnino simile, modò idem non sit, ad Austriacarum Stiriacarumque Alpium radices locis vmbrosis spontè nascens inueniebat Clus.

Lutetiz apud Robinum hortulanum Regium, & Florentiz in cænobio à Innocenti vidi.

ANACAMPSEROS MINOR

rotundior folio semper virens.



Inter Anacamperota valgè notum, & hanc speciem hoc interest discriminis, quod non tantum minores hæc, sed & radices fibrosæ Sedi vermiculatis, non rubrosæ: foliorum series non minutis stipata: verum ea, excepto colore glauco, ad Portulacæ foliaquam proximè accedunt, magni

magnitudine & circinata ferè rotunditate : suntque admodù caduca, sic vt sapè maior pars caulibus, vbi exciderint, foliis vidua conspiciatur, relictis interim vbique foliorum, vbi exciderint, vestigiis: *caules* graciles, teretes, nonnihil rubres, per terram repunt, dodrantem longi: *flores* in umbella Anacamperotis vulgaris, quorum singuli quinque foliolis ex albedine in purpuram vergentibus constant: *apices* verò sunt lutei in medio autem flore coeunt quinque veluti alabastra mucronata.

Telephium minus repens semper virens, Lob. Obs. p. 212. & Icon. 390. Hist. Lugd. & Camer. Telephium semper virens Gerardo: Telephium minus Tabern. Telephium 3. Dod. sextum, Clus. hist. fortè Dioscoridis; Eid. Cepaea Pancii, & Camerario: Telephium 4. siue minus repens, C. Bauh. phyt. Eid. pin. Telephium 5. siue repens folio deciduo.

Tota Hieme viret: facillè se propagat: rarius est, & hortis apud Belgas & alibi familiare.

Scrophularia [vt Tragus vocat] maximè quod ad folia pertinet, humidæ & frigida est temperaturæ: radix verò ferè est calidæ qualitatis, potestque hæc planta vtrinq; vulneris adhiberi. Aqua verò, ex herba & foliis distillata & pota, non levis est medicina ad rupta & conuulsa, ac vulnera etiam, & vlcera interna, nec non erosiones stomachi, pulmonis, hepatis, matricis, & intestinorum: his omnibus vitis medetur ista aqua, per aliquot dies continuò bibita: est autem illa aqua præstantissima medendis erosionibus intestinorum, quæ ex dysenteria accidere consueverunt: radix cum melle in vino cocta & pota, iisdè pollet facultatibus: herba ipsa glutinat & sanatur omnis generis vulnera, præsertim verò hernias: eadè rufa & imposita sanguinè è vulneribus manantè sistit: magna; dolores sedandi facultate præstat, idque tam in recentibus vulneribus, quam inueteratis ac fœdidis vlceribus efficiunt rufa folia & imposita:

RHODIA RADIX.

CAP. V.

Tuberosa radice nititur, quæ à rostratū cōsimili odore, saporeque Rhodiam appellant, foris in fusco splendēte, intus albā, fragili, roseum odorem halante, gustu Rosæ similis, non ignauiter adstringente: virgæ ab vna radice plures oriuntur tenuēs, numeroso foliorū agmine densè



stipatæ, substantia & positu Telephii vulgò dicti, angustorum, oblongorum, acuminatorum & circumquaque serratorum, colore glauco, excepto mucrone purpurascēte, sapore adstringē-

te: *flores* in umbella gerit, quibus succedunt *siliquæ* oblongæ extrā reflexæ, corniculorum Aquilegii, aut Acopiti instar, rubentes, in quibus *semen* minutum, oblongum & paleaceum.

Rhodia autem siue rosea radix dicitur, quoniam vti insinuat, contrita rosas ædoleat, & non à Rhodo insula, vt Fuchsius monente, imperiti putant: Gall. *Racine sentant la rose*: Germ. *Rosenwurzel*: Belg. *Rosē vuortelen*: Italis *Rhodia radice*: Hispan. *Rayz rodia*: Boh. *Ruozovnykoren*: Græc. *ρῶδα ῥίζα*, vt Dioscorid. & Galeno.

Flore & semine carere dixit Fuchsius, id quod Galenus etiam asserit, alii contra rei veritatem. Cordo protulit flores & semina maiori Crassulæ similia. Flos quidem nunc palefcentis, nunc rubefcentis coloris est.

Rhodia radix dicitur Trago. Matth. An-Synonyma guill. Cord. in Diosc. (vbi & Rhodias & Rosaria radix) & histox. Gesner. hort. Lac. Clus. pann. Hist. Lugd. pag. 981. Cast. Cam. & Gerardo, ac C. Bauh. phyt. & pin: Rhodia, siue Rosea radix, Fuchf. Lobel. in Adu. & Obseru. p. 212. itemque Icon. p. 391. Rosea radix Lon. & Tab. hist. & Icon.

Dioscoridi nascitur in Macedonia: Matthiol. in altiss. montium rupibus saxosis, præruptisque locis, vbi vix tantum terræ circum habet, vt illi inhætere possit: Nasci copiosè in Alpibus circa Saltzburgum Cordus refert. Pennæus monuit Camerarium in altis Angliæ montibus copiosam semper provenire. Ex Allobrogum & Delphinatium saxosis, montosis, nec nò Taurinis alpibus, translata in vitetis multis Belgicis, Gallicis, Anglicis & Italicis Iulio & Junio umbellæ edit, referente Lobelio. Partes radicis refectæ iterumque plantatæ facillè crescunt. Nolunt autem nimis profundè terra obrui, sed ita vt gemmæ turgentes prope superficiem collocentur.

Vtilem esse dixit Dioscorides in capitis dolore: si cum modico rosacco trita imponatur, & frons & tempora ex ea irrigentur. Galeno est tenuium partium, & discutientis facultatis. In calefaciendo verò secundi recessus esse censet, aut certè tertii incipientis. Valere scribit Matthiolus ad capitis dolores à quacumq; causa provenientes, si recens contracta, & rosacea aqua perfusa, vbi calidus est affectus, aut aqua Amari ci, si frigidus sit morbus, fronti temporibus illinatur: Adhæc cerebrum roborare odoris iucunditate, vt pote quæ temperatis sit qualitibus prædita. Dodonæo tamen refrigerans, & Rosæ odore & temperaturâ affinis videtur, & aduersus capitis ex solùm calida causa dolores efficax esse posse. Galenus, inquit Cordus, tantum digerendo capitis dolores pellere credidit, cum tamen id partim propter aliquam partium tenuitatem faciat. Constat enim ex contrariis qualitibus, humida ac calida, terrea & frigida, quemadmodum ipsæ etiam Rosæ. Nos iudicamus non procul abesse à Rosæ aut Crassulæ temperamento, quamuis Galenus, eumque secuti, secundum caloris gradu eam donarint.

COTYLEDON VERA, RADICE

tuberosa.

CAP. VI.

Eradice tuberosa exiguis fibris donata pediculi excunt palmares in medium peltati circina

tique, folii crassi succulenti, glauci, in umbonē inferti, saporis visci & aquei : indidēque adēd



Synon.

ta *Cotyledon* [αυτολεδων] dicitur, ab aliquib. *Scytalum* (σχυταλιν) : ab aliis *Cymbalum* (κυμβαλιν) : Latinis, vt Matthiol. (cui & *Acetabulum*) Lac. Turn. Cæf. Cast. H. Lugd. Tabern. & Gerardo, *Vmbilicus veneris* : *Vmbilicus veneris* maior Camer. in epit. Matth. *Vmbilicus veneris* species 1. Anguill. *Cotyledon* Lobel. in Adu. & Obf. pag. 209. *Cotyledon* verus Cordo in Obf. filua. *Cotyledon* vera Dod. gall. *Cotyledon* 1. Dod. lat. *Cotyledon* 1. siue maior C. Bauhin. apud Matth. in phyt. & pin. *Cotyledon*, *Vmbilicus veneris*, Cluf. hisp. & hist. *Cotyledon*, *Acetabulum*, *Vmbilicus veneris*, & *Cymbalion* maius, Lonic. *Cotyledon* minus montanum Sed. folio, Lobel. in Ic. Plant. p. 386. quo ad figuram : titulus alterius est plantæ, quam primo loco posuit sub *Vmbilici veneris* titulo. *Herba coxendicum*, Plinio : *Scutum cæli*, Scatellum, & *Scatuncellus*, Manlio in *Luminari* maiori, referente Dodonæo, qui & hæc nomina inter nothas appellationes extare refert, καπα: & φραδ: i. e. Hortus veneris : γη: & μαλαδος, Terra *vmbilicus*, & γη: & φραδ: & φραδ: & φραδ:.

Nomina
liagar.

Germ. *Nabelkraut*, *Groß Nabelkraut*: Belgic. *Naelderuyt* : Gallis, Latinos sequentibus, *Nombri de Venus* : item *Escudex* & *Escueller*: Ital. *Vmbilico di venere* & *Copertoiole*: nunc etiam *Orban* in *Apulia* *Cotili* à *Cotyledone* voce corrupta: in *Abruzzo* & *Tuscan*, *Cimbalaria* : in *Græcia* *Carichachi*, Anguill. Hisp. *Capadella*, *Scudetex* & *Oreus de monte* : *Salmaticensium* vulgò *Vasillo*, i. e. *acerabula* aut *vascula*, à *caua* folii capacitate *acetabulum* referente: Lusit. *Cocithelos*:

Locus &
Tempus

Nascitur frequens in faxis & vetustis ædificiorum parietibus, & in oppidorum mœniis : in locis calidis in fine Autumni orti incipit, foliaque per Hiemem seruat : Aprilis & Maio florer, & tunc folia marcescant.

Vires
vius.

De *Cotyledonis* viribus hæc scribit Dioscorides : Succus eius cum vino circumlitus, instillatue, contra genitalia nudat, inflammationib. sacris ignibus, strumis, pernionibus illitu auxiliatur : stomachi ardorem refrigerat : folia cum radice comesta calculos frangunt, vrinam cient, hydropicisque ex melle dantur : herba vtuntur ad amatoria. Miste est Galeno 7. simpl. facultatis, nempe humidæ subfrigidæ, & cuiusdā ob-

scure adstringentis, & cum ea leuiter amaræ : vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit itaque phlegmonas erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode curat : & maximè stomachi ardore æstuantis adhuc vtilis epiplasma: putantur folia cum radice manducata calculos cōfringere, & vrinam mouere.

COTYLEDON ALTERA OLIM

Matthiolo.



Cotyledō altera Def. quicquid habet foliorum, id omne per terram spargit: sunt ea verò numerosa, pediculis vncialibus, latiusculis, vnde veluti ex ceruice incipiunt dilatari, vtrādem circumscriptioe sic rotunda, pulchrè crenata, semuncialis magnitudinis, crassiuscula, & ne vel siccata quidem corrugi-

folita: caulis vnicus tenuis, septē vel octo digitorum altitudine, nudus plurimū, rariū vnā supra radicem vnciā foliis donatus, superius in aliquot tenues ramuloscos diuisus, quorum extremis hærent stigmata parui.

Vmbilicum Veneris alterum, *Cymbalion* quibusdam vocatum, se vidisse ait Matthiolus in *Ferrolulensium* ciuitate Austria, in hortulo quodam Medici Iuliani à Marostica: porro in pluribus montibus faxis inhaerentium. Iudicat omnes prorsus huic conuenire notas, quæ alteri *Vmbilico* à Dioscoride tribuuntur. Proponit autem in comm. Ital. anno 1554. & 1559. excusis, & in Epit. iconem plætæ cuius nullam dat descriptionem, & quam in post. comm. mutat: nec tamen causam mutationis indicat.

Dod. gall. titulo *Cotyledonis* alterius figuram habet Matthiolinam : ipsam autem plantam ab eo non visam existimo : nec etiam eius descriptio alicuius momenti est. Eadem tradit lat. in fol.

Quin & Lonic. pro *Vmbilico veneris* minoræ figuram ex Matthiolo proponit : an autem descriptio bene conueniat, alii iudicent: mihi non placet.

C. Bauh. apud Matthiol. *Cotyledon* media foliis subrotundis : *Vmbilicus veneris* alter Matthioli in 1. edit. & iis quæ minores figuras habet, Eid. phyt. *Cotyledon* 3. siue media foliis subrotundis : *Cotyledon* altera Matthioli, Clufi. Si quis conferat iconem in Matthiolo per fratrem exhibitam cum ea quam Clufius proponit pro Matthioli *Cotyledone*, magnum comperiet discrimen.

Eiusdem adhuc opinionis est in pin. vbi inquit : *Cotyledon* alter Matthiol. & Lac. *Cotyledon* altera Dod. Cluf. panæ. & H. Lugd. pag. 1322.

Coty;

Cotyledon altera quarta, Clus. hist. Phylum thelygonum Dalechampii, Hist. Lugd. siue Lichen 1. Plinii, & Semperuium montanum. Nos Clus. siue Cotyledonem alteram quartam, siue Matth. itemque Phylum thelygonum Dalechampii, H. Lugd. p. 1195. referendum ducimus ad Sedum feratrum, de quo infra. *Gesnero* de Lunaris cognominatur Crassula.

Reperitur in montibus circa Comum & Gothardum; itemque in Styriae alpinis.

CYMBALARIA FLOSCVLIS purpurascens.

CAP. VII.



Ex parietum rimis aut apud nos vasculis figlinis, pendulas fibras, euibrat, tenues, purpurascens, teretes, laues, longas, nervo, quem facile stringendo linquit cortex farctas, in varias variè brillas facientes, per quas folia est cernere longis appendiculis, hederacea; and

gulosi, supernè atrouirentia, inferius Cyclamini modo purpurascens, tenera, succulenta, obscuro quodam amarore prædita: ad exortum porro pediculorum quibus hærent folia, tortiles surgunt alii pediculi, quibus flores singuli insident, Elatines aut Anthurini minoris, purpurascens, calcari breui, rictu pallido; succedit capitulum globosum, semina claudens parua, crispata.

Hæc quæ vulgò Cimbalaria appellatur, non est Cotyledon, etiam si hoc etiam Cimbaliom à Dioscoride vocetur, inquit Hermolaus in Dioscor. Est autem Cimbalaria herba folio anguloso, hederaceo, flore parvo, purpureo, in muris terræ nascens, quam nonnulli, genus alterum Capni dictæ faciunt. Est namque Capnos, siue Capnion, h.e. Fumus, duplex, &c. Plinio Pes Gallinaceus: Ætio verò Chelidonia phragmitis nuncupatur.

Apud Insuæ officinas legitimæ Cotyledonis loco Cymbalaria hanc vulgò vocatam vsurpare, evidenti quidem errore, notat Marthiolus. Isin ost. comm. Ital. pulchrè depingit & describit, flores tamen luteos ei tribuit [vt & in Erit. Camer.] quales obseruare non memini: ibi inuersam oportebat esse figuram.

Cymbalaria Italice folio hederaceo (vt vocat etiam in Obs. p. 337. & Icon. p. 615.) quam Venetiis & Patavi pharmacopœi penuriâ & ignoratione Cotyledonis veri Populeo vnguento miscere testatur, flores ex luteo virentes, adscribit Lob. in Adu.

Quantum iudicio Lonicerus per Vmbilicum Tom. III.

veneris officinarum intelligit Cymbalaria: an autem bene appingat adscribatque radices Olin. uarum, iudicare poterunt, qui plantam cum radice eruerunt.

Cymbalaria autem à cymbalo nomen duxisse testatur C. Bauhinus, qui Hermolaum Capnon primam Plinii fecisse credit.

Dicitur verò Cymbalaria Matthiol. Hist. Synon. Lugd. Cæf. Cast. & C. Bauh. Cymbalaria vulgaris, Lacunæ: Cymbalaria foliis hederaceis flore cæruleo, Eyll. Linariæ Hederæ folio, Column.

Nascitur, vt dictum, in antiquis viginosque Locis ædificiorum parietibus, maceris, & saxis.

Facultatis est humidæ frigidæque cum adstrictione quadam. Iis profectò hanc plantam pol-Vires. lere facultatibus, facto periculo constat, quibus primi generis Cotyledonem. Sunt qui eâ vtantur ad alba vteri profluvia, eandem recentem in acetariis propinantes, teste Marthiolo.

SEDVM VETERIBVS ET neotericis in genere.

CAP. VIII.

Genera Sedi (αἰζόου) Dioscorides tria fecit: Genera 3. Gmaius, minus, & tertium, quod aliqui Andrachnem siluestrem (αἰδράχνην ἡ δὲ γὰρ αἰζόου) aliqui Telepium (ἡ τῆς αἰζόου) Romani Illecebram vocant, cuius facultates à prioribus duobus diuersæ traduntur. Huic enim vis excalcatoria adscribitur: illa duo refrigerare dicuntur, vt suo quolibet loco demonstrabitur.

Plinio lib. 25. cap. 13. Aizoi duo genera sunt: Genera 2. Mains, quod aliqui Buphthalmion vocant, alii Zoophthalmion, alii Stergethron, quod amatoris conueniat: alii Hypogelon, quoniam in subgrundiis ferè nascitur. Sunt qui Ambrosiam, à sempterno eius virore; potius vocant, & qui Amerimnon. Itali, Sedum magnum, aut Oculum, aut Digitellum. Alterum minusculum, quod Eritiales vocant, alii Trithales, quia ter floreat, alii Chrysothales, aliqui Isoëthes: Sed alii Itali Sedum, alii Aizoom utrumque, quoniam semper vireat: aliqui Semperuium. Huic similis quam Græci Andrachnem agnam vocant: Itali Illecebram: hæcenus Plinius secutus Dioscoridem. à quo in eo rursum recedit, quod omnium harum vim eandem, perfrigerare & adstringere scribit.

Galenus quoque duo duntaxat Aizoi genera esse dixit. Ac sanè Dioscorides & eum secutus Oribasius, Illecebram non esse, sed videri tantum Aizoi speciem esse scripserunt, vt eam Aizois similitudinis & affinitatis gratia duntaxat subdidisse videantur.

Αἰζόου μᾶζας, inquit Dalech. apud Hist. Lugd. Apuleius αἰζόου, & αἰζόου μᾶζας vocant, Galli Dal. c. grande loulbarbe: It. semperuium maggiore: Germ. grofz. haufzerrurtz: intelligit autem Sedum vulgare maius quod potius minori Sedi Plinii responderet. Αἰζόου μᾶζας (pergit Dalech.) Apuleio Eritiales dicitur, Plinio vero Eritiales: Gallis Triquemadame. & Petite loulbarbe: German. klein haufzerrurtz, klein donderbart: Itali Semperuium minore, & Pignola, à folio tereti pineo. Αἰζόου τῆς μᾶζας, quidam αἰζόου τῆς μᾶζας, i.e. Portulacam siluestrem, & Thelepium nominauerunt, Romani Illecebram; Arabes Andrachabara, Alcebram, & Tilafon.

Herbarii plura assignant genera, & aliter distinxerunt. Fuchsius tria descripsit & depinxit: Primum maius Aizoon, deinde minus, quod duplex facit: alterum marem, quod floribus luteis spectatur: alterum foeminam, quod floribus candidis seu pallidis conspicitur, postremò Aizoon minimum, quod tertium Dioscoridis esse putat.

Quatuor
Dod.

Dodonæus quatuor genera constituit, maius, minus, & Crassulam minorem siue vermicularem officinarum, quarum tertium genus statuit: his quartum addens minimum, quod Portulaca agrestis, & Romanis Illecebra dicitur.

Sedi ge-
nera duo
nota
Matth.

Matthiolus ex Sedi generibus, à Dioscoride descriptis duo nota esse ait, nimirum maius & minus: minoris duo esse genera: Vnum, de quo Dioscorides tractat, quod foeminam recentiores appellant: alterum marem: tertium diu incognitum tandem Ghini opera & industria veluti in lucem prodiiisse. Quibus addit Aizoon arborescens, idque varium.

Horum omnium, ac etiam aliorum, vti & nostra de Aizoi generibus sententia, ex descriptionibus dilucidior reddetur.

Nomina
Linguar.

Cæterum, Ἀἰζὼν Græci, δὴ τὸ ἀειδύλον ἢ φῖμος, quod perpetuò folia vireant, tam Aestate sc. quam Hyeme nec vilis frigoribus, aut cœli iniuria, quantumvis frigida aut sicca nimis, emoriatur: quare Ἀἰζὼν nomen apud Theophrastum i. hist. 16. Semperuium Gaza vertit, vt cui à natura datum sit, humidum, viridēque semper durare eodem authore 7. hist. 14. Semperuium & Sedum Latini vocant, Apuleius vitalem, Macer Acidulam, vulgus Iouis barbam. Sedum, inquit Festus, alii Sedum appellant, herbam quam Opilius Aurelius Sessuium vocari ait, eamque in tegulis feri: fortè, quod nonnullis locis plebis animos inuaserit opinio, non ferri fulmine domum, in cuius tegulis Sedum vireat. Hæc etiam superstitione induciti Germani Donnerbart & Donnerblat appellat, magis tamen proprie hausvurtz, h.e. si interpretaris, Domestica radicem, quod sc. in culminibus domorum feratur. Belg. Donderbaert: Galli Ioubarbe: It. Semperuino. Hisp. Semperuina: Angl. houselike. Boh. Netrefk.

SEDVM MAIUS ARBORESCENS.

Descrip.

Rutex est potius quam herba, duorum cubitorum nonnunquam altitudine, brachiali vero crassitudine, multos ferens ramos pollicaris crassitudinis aut maiores, qui in multas alas diuiduntur digitalis crassitudinis, sumo fastigio velut in orbem desinentes, multis foliis confertim & imbricatis sibi mutuò incumbētibz constantem, perinde ac in Sedo maiore vulgari, siue Coryledone altera Dioscoridis. Carnosa sunt autem ea folia, succi plena, & linguæ instar efformata, h.e. ab infima sede paulatim in latum sese dilatantia, in ambitu, crebris & minutis veluti denticulis aded leuiter serrata vt vix appareant, gustu paululum adstringente: cortice denso, carnoso, fuculento totus frutex cinctus est, cuius membrana exterior subfusca, maculisque, seu potius sedis foliorum vestigiis respersa, vt in Tithymalo characia. Interdum summis maioribus ramis emergit crassus, & veluti foliosus quidam pediculus, tanquam thyrsus gerēs multarum gemmarum, quæ successu temporis in flores sese explicant ex flauo pallefcentes, stellularum instar in aliquot folia diuisus, cum suis staminibus. Iam maturefcere incipientibus floribus, & ad seminis



efformationem properantibus, gracilescit hic pediculus: semen exile est & nigrum.

Legitimum autem hoc esse Sedum aut Semperuium maius, Dioscoridi dictum, Plinio Aizoon maius, nemo est, qui inficias ire possit, si modò in stirpium cognitione medicoriter versatus sit.

Sed hæc assertio vtrorū-

que descriptionibus confirmatur. Ἀἰζὼν ἢ ἰκία, inquit Diosc. caules edit cubitales, aut etiam altitudinem eam excedentes, crassitudine pollicari, pingues, egregiè virentes, Characiæ Tichymali modo incuturis distinctos: folia pinguia, pollicari magnitudine, & extremo acumine linguæ similia, & infima quidem in terram conuexa: quæ verò sunt in capite, ita conferta adductaq; inuicem, vt orbiculato ambitu effigiem imitentur oculi.

Aizoon maius Plinio cubiti altitudinem excedit, crassitudine plusquam pollicari. Folia acumine linguæ similia carnosa, pinguia, largo succo, latitudine pollicari, alia in terram conuexa, alia stantia, ita vt in ambitu effigiem imitentur oculi.

Sic haud dubiè Dioscor. est Ἀἰζὼν ἰκία, quod Apuleius Vitalem ac Semperuium appellat. Quidam ab immortalitate, Ambrosiam: alii ab oculorum animalium similitudine, Zoophthalmion: nonnulli ab amore, quem conciliare fertur, Stergethron. Anguillara annotat Semperuium maius in Chio Amarendos, & in Corfu Anastasiam dici, ac vtramque vocem Immortalem significare.

Matthiol. in post. comm. Semperuium arborescens, Constantinopoli delatum: Item, Semperuium alterum à Cortuso ex Corfu missum. Eidem Hist. germ. Gebaumte hausvurtz, Semperuium arborescens: & postea, Semperuium maximum, ex Corcyra in insula Ionici maris.

H. Lugd. p. 1131. Aizoon Arborescens Matthioli: Item pag. 1132. Semperuium arborescens alterum Matthioli.

C. Bauhin. phyt. Sedum 23. siue arborescens Sylosculi candidis: Item Sedum 24. siue arborescens alterum. Eid. pin. Sedum 1. siue maius arborescens flosculis candidis: Aizoon magnum Dioscoridis, si caulis altitudo, & foliorum longitudo spectetur. Semperuium arborescens Matthiol. & Cast. Sedum maius verum, Gesh. hort. Semperuium maius, Anguill. Semperuium siue Sedum arborescens maius, Dod. Sedum arborescens Græcum, Illyricum, & Anglicum siue maritimum, Lobel. in Adu. Sedum arborescens maius flosculis candidis, eid. in Obs. p. 206. Sedum arborescens maius Græcum, in Icon. Pl. pag. 379. & Eyst. Semperuii maioris alterum genus arborea specie, Cæsalp. Sedum maius, Clus. hisp. legitimum, Eid. hist. Aizoon arborescens, Camer. hort. Eid. apud Matth. Semperuium

peruium arborefcens primum & Maius. Item Sedum 2. siue Semperuium arborefcens alreijū Matthiol. an diuerſum à priore? *Mirum* Lobelium dicentem floribus eſſe albis, quodd Cluſius, cuius iconem aſſumpſit, flores tradat eſſe luteos. Cur non annotat ubi candidis floſculis obſeruauit, aut ſaltem utroque repetit colore.

Dioſcorides in locis montofis & argiloſis naſci ſcribit, eſſeque (hæc tamen in quibuſdam codicibus deſiderantur) qui & ipſum ſupra domicilia ferant, in ſiccilibus valis addit Plinius. Planis parietinis naſcitur, inquit Theophræſtus, nec non & in tegulis, cum terræ conſuetum quoddam arenaceum factum eſt. Vidit Camerarius aliquando in horto regio noui caſtri Neapolitani in ſiculis florere: In Germania non diu viuit: cum Italicum ætem ferat. Ex Sicilia allatum ait Cataplanius: ſi in ramo, ſed impatiens algois: nam Hieme aſpera amittere folia: aliquando perire ex toto. Prouenire reſert Auguſtara in Græcia, vt in Zante, Ceſſalonia & Corfu & Cnjo etiam ſupra muros veteres Multas plantas Vponæ Patavij, Venetis, & in Hetruræ hortis Lobelius vidit. Vſumque obſervauit Cluſius ſequentiſſimum in ædiam rectis & muris, Hiſpali verò in ſicilibus, florens Decembris & Januario. Non vulgata autem cura indiget: Hiemis enim inſidiam ferre nequit in frigidiſſimis regionibus nec celæ cameraræ ære conſulitur: patitur: quæ propter in vaporario conſervari cupit.

Dioſcorides vim ei perſeuerantem & adſtringentem in eſſe dixit. Quamobrem ſolutum per ſectum etiam cum polenta impoſita, valebunt ad eryſipelata, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, ambuſta & podagras. *Sycus* autem ad capitis dolores cum polenta & roſacco inſtillabitur: moſis à phalangio dabitur, itemque profluio alui laborantibus arque dyſentericis. Sed & teretes lumbicos pellet ex vino potus, & fluore muliebrem ſitit in velle ſubditus: denique oculorum lippitudinibus, à ſanguine obortis vtiliter inungitur. Addit Plinius ſolia impoſita, vel ſuccu inunctu, vlcera oculorum purgare, expleſque, & ad cicatricē perducere, palpebrarūq; deglutinare aduerſari Acori ito præcipua ſcorpionibus quoque habentem id ſerui negari. Luſitanicæ mulieres ad detergendos capillos, & repurgandos dentes hoc Sedum uſurpant, referente Cluſio. Leuiter quidem deſiccatur inquit Galenus/ quandoquidē & mediocriter aſtringit, omnis alterius yehemētis qualitatē expers; quare in eo plūs cæteris abundat eſſentiā aqueæ: cæteri ſum non mediocriter refrigerat: eſt enim ex tertio ordine, & reſciſa refrigerantium. His Macri poſſion ſubnectemus:

Dicimus Acidulam, quam Græci dicunt Aizoon Sic dici credunt ſuper illis quod ſit aceti. Creſcit arenofis in pratis, & ſecus amnes. Hanc auide quidā comedunt in tempore veris, Expertumque ſerunt ſibi, quod ſiſtidiā tollat. Virtus eſt illi ſiccans & frigida valde, Tertius à Mediciſ datus eſt gradus huic in utroque. &c.



ſerie quadam ſuccedentes gerit ſtulos, purpureſcentes.

Noſtrā ſententia ii à verò longè recedunt, qui ſibi temerè contra doctorem Botanicorum decretum perſuadent hanc eſſe *deſcens* magnum Dioſcoridis & Plinii: in hoc ſiquidem notè quedam deſiderantur, quæ in Sedo maiore arboreſcente comperiuntur. In hoc errore verſantur inter alios, Cronenburgus. Trag. Fuchſ. Dod. gall. Turn. Hiſt. Lugd. & C Bauh. in phyt. & apud Math. Item Amato. Tabern. & Matth. atque Lonicerus.

Melius forſè cum Cluſio ſentiunt, qui Coryledonem alteram eſſe ſtatuant. Nos maluiſſus inter Semperuium retinere, cum perpetuò vi-reat.

Sedum, Trago: Vulgare Eyſt. Sedum maius. Synon. Fuchſ. hiſt. & icon. Matth. Cordo in Dioſcorid. Tabernam. Geſn. cat. & Fab. Columnæ Sedum maius vulgare Nomencl. pann. Sedum 1. ſiue magnum, Turn. Sedum 1. (3. pin.) ſiue maius vulgare, C Bauh. phyt. Sedum ſeu Semperuium vulgare maius, Geſn. hort. Aizoon magnum Dioſcor. quoad poſtrema Dioſcoridis verba, C Bauh. h. p. Aizoon ſiue Semperuium. maius, Camer. hort. Lobel. Oberu. pag. 202. Thal. Hiſt. Lugd. pag. 129. Aizoon & Sedum maius, Amato. Semperuium 1. Lon. Semperuium maius Brünſell, Camer. epit. & Dod. gall. Semperuium maius 1. Caſalp. Semperuium maius alterum ſiue lous barba Dodon. lat. Barba lous, & Sedum maius, Euch. Roſſ. & Theod. Doſt. Semperuium ſiue maius crenatum myriſolum, Lobel. in Adu. & Icon. pag. 373. Onobletum (hoc ad aliam plantam reſert C Bauh.) Hippocratis m. m. & Coryledon 2. Dioſcoridis, Anguill. Viniblicus venetis 2. ſiue Coryledon 2. & Semperuium Italicum, Eid.

Huic plantæ & illę appellationes adſcribuntur, quæ capite de Sedo in genere & ſequenti de Sedo maiore arboreſcente, leguntur. Vocatur etiam Aithales. hæc ſemperuens, & Chryſoſpermon ab aureo ſemini colore. Aconion denique Aichryſon, Holochryſon, Chryſanthemon, Protogonon, Boron, Norion, Paronychiam, Chryſin, Ceriam, Cuiſiam, lous caulem, Leapetern, & Pamphaen nuncupari aiunt. Ortho Brünſellius Trithales, quodd tæc in anno floreat, nominat.

Kkkk 2

SEDUM MAIUS VVLGARE.

In orbem ſpargit terræ appreſſa ſolia, alia aliis incumbentiā, craſſa, ſucco lento, frigido præ- Tom. III.

Sed hoc nomen ad minus Sedum pertinere testatur Plinius.

Nom. ling. Αἰζὼν μέγα, Germanis *Groß hausewurz*, *groß Sonderbart*, *groß Sonderblatt*, & *hausewurz*, hoc est Domus Porrum: Belg. *Sonderbaert* & *Tabern. Bladerloofen*: Gallis, *grande sonbarbe* Ital. *Semperviuo maggiore*: Hispan. *Semperviuo*, seu *Vernapuntera*: Angli *houfelike* & *Sengrene*, rectius *houfelike*: Boh. *ančny muncyk*: Hung. *filbe evorzo sin*.

Locus.

Nihil vspiam gentium vtriusque, vulgariūque Semperviuo hoc, quod perenni vegetoque foliorum virore viget, eūque Hieme & Aestate in parietibus, vel imbricamentis, etiam nullis vti videtur, radicibus nixum aduersus quolibet cœli impressiones tueretur. Caulis floriferus est post Solstitium æstiuum, subinde circa Augustum mensem demum allurgit, sed Aprili, post vernum videlicet æquinoctium, inter folia tenues hinc inde exeunt fibræ orbiculorum rudimenta proferentes, quibus tandem adactis seipsam in complures orbiculos multiplicat. Caulis cum appetente Autumno defloruit, protinus arefcit. Seritur in regionibus nostris in tectis & muris, quibus locis felicissimè prouenit. Nam radices eius exiguae, capillatæque cum sint, faciliè humi hærent, nutriunturque. Quin & inter petras, & ad macerias, & muros, vbi terra planè destituta est, virentior quandoque conspicitur.

Qui legitimum Aizoo maius esse contendunt, ei vires & vñs Aizoi Veterum huic attribueret solent. Tragus planè humidæ & frigidæ esse qualitatē statuit, indèque calidis morbis, & inflammationibus adhibendum consulit, idque in externis frequentius, quàm internis corporis partibus. Et quidem in intensissimis acutarum febrium caloribus, nec non & dysenteris, aliisque profluuiis [& præterea in nonnullis aliis morbis] aqua distillata exhiberi potest, mensurâ triū aut quatuor cochlearium. Succus & aqua distillata, linteolis in eo madefactis, ac impositis, inflammationibus quibuscumque corporis, imprimis verò phrenetico morbo apprimè cōducūt. Quibus oculi, propter abscessum aliquem aut inflammationem, noctu præcluduntur, in aquam distillatam infundat, quo facto non solùm inflammatio ipsa, sed & dolor tollitur, nec non fluxus oculorum calidus: idem auribus instillatus efficit. Rursus ille ipse succus & aqua distillata doloribus & inflammationibus iecoris & renum succurrunt, & articulorum morbo & podagra medentur. Auxiliantur etiam ambustis igni, illita, & linteolis imposita. Succus Solatri succo admixtus, & cum oculis populeis decoctus in a-xungia suilla, ac percolatus, ut fiat vogueuntum, mirè efficax est, omnibuscumque populeis vnguentis, Tragi iudicio præferendus, & longè gravior.

Sedum vulgari magno simile.

Visserat author noster descriptionem & figuram ex virente planta, ex hortu Ill. C. Wirt. esse paradam. Verum cum inibi perierit, nec aliunde haberi queat, Lobelii effigiem assumptimus ex Ic. Plant. p. 373. sub inscriptione Semperviuo maioris crenati myrtifolii, primo loco exhibitam, quam author Sedo suo optimè respondere dixit. Suspiciatus autem quondam fuit Semperviuum * sequens culturâ in hoc mutari,

quoddam fortè veritabile. A Clusio hæc icon malè pro Sedo vulgari maior pingitur.



SEDVM MONTANVM LATIFOLIUM
flore purpureo.



Sedi genus habeo, cui radix crassa factis, ocellos circum circa crebros progignit: folia semuiciâ breviora, acuminata, latiuscula: caulis factis crassius, hirsutus, angustioribus viciis foliis, mucrone subinde purpurascens, trium vnciarum altitudine, senos, plures pauciores in cacumine, gestat flores magnos, longis, perangustis, purpurantibus foliis constantes, multis in medio luteis apicibus, folioso circumiecto calyce.

Clusius hanc plantam in pann. pag. 481. vocat Cotyledonem alteram Tauricam: p. 482. Cotyledonem alteram secundam: in hist. Cotyledonem alteram tertiam. Camer. hort. dicitur Aizoon minus odorato & purpureo flore, fermè Asteris Attici. An Lob. Obs. p. 204. Sedum minus facie & foliis maioris? An eid. ic. p. 373. Semperviuum siue Sedum maius, primo loco pictum? An Aizoon montanum H. Lugd. p. 137. C. Bauh. pin. Sedum maius montanum foliis non dentatis, florib. rubentibus: Sedum minus flore rubente, Eyst. Item, Sedum alpinum 14. siue rubro magno flore. Aizoon montanum H. Lugd.

In montibus Rhæticiis & Tyrolensibus frequens occurrit. Clusius in Taurinarum Alpium iugis non procul Saltzburgo crescere scribit: ac flore re Iulio, in hortis etiam Maio.

SEDVM

SEDVM QVODDAM MONTANVM
pulchrum.

Aliud quoddam Sedi genus ex Baldo nobis
allatum altitudine vix palmum minorem,



aut ad summum
quatuor vacias
aequat. *Radix*
longa & plan-
tulæ longitudi-
nem æquans,
simplex, In ca-
pite umbellam
prodit dēlam,
foliorum Sedi
ferè maioris,
minutissimorū,
& vix ac ne vix
quidem conspi-
cuis serraturis
donatorū: que-
dam etiam nul-
lā, quantum ex
sicca dignosce-
re est. *Caulicu-
lus* teres, sub-
hirsutus, *foliis*
vestitur aliquot

longiusculis, alterno ex ipsorum foliorum distā-
tia positi. Quem ordinem & flores in summo ser-
uantes, mediam ferè cauliculi partem occupant,
sed breui pediculo hærentes, nec vt in plerisque
Sedis, per ramos diuiduntur. Flosculus ex sex fo-
liolis, vt in plerisque Sedis constare videtur, cu-
ius colorem in sicca discernere non est. Mili
frater in Balbo monte collectum à D. Bechio.

SEDVM LATIFOLIVM FLORIBVS
magnis albicantibus.

Foliorum ocellum Sedi maioris in modum
habet: *folia* Succulenta & acuminata sunt, a-
spersa & per oras hirta: coliculus palmaris, cuius
summitati plures flores insident magni, senis ob-
longis foliis constantes, calyculo in multa quo-
que folia diuiso. In sicca planta flos albicat.

An Coryledon altera montana: vel Coryledon
altera secunda, Clusio? An Gesn. hort. Sedum
faxorum montium, folio in margine piloso, non
serrato? An Dod. lat. Semperuiui maioris ge-
nus alterum, foliis secundum margines tenuissi-
mis veluti pilis, instar mollium spinularum ad-
natis, floribus ex luteo pallescentibus.

C. Bauhin. pin. Sedum 4. [2. phyt.] siue ma-
ius montanum dentatis foliis: Aizoon siue Sem-
peruiuum maius Thalic.

Nobis Agerius communicauit sub inscriptione
Cotyledonis pannonicæ Clusii.

SEDI LATIFOLII FLORE ALBICANTE,
minor species, magis dentata.

Frequens in omnibus iugis vrbi Viennæ vici-
nis, atque in Austriacis Stiriacisque alpinis,
est & hæc altera species Cotyledonis alterius
secundæ Clusii histor.: cui etiam valde similis,
per omnia tamen minor, eiusque folia magis
dentata. In pann. pag. 481. vocatur Cotyledonis
alterius montanæ species alia minor.

C. Bauhin. pin. Sedum 5. [3. phyt.] siue maius

montanum dentatis foliis alterum. Cotyledon
altera montana minor Clus. pann. Cotyledonis
alterius altera species, Eid. hist.

SEDVM SERRATVM.

Tenus nigra est radix, subinde productis fi-
bris latius se propagans: *folia* plurimum per



terram sparsa
rariùs humo se
tollunt, Sedi,
pinguia, oblon-
ga, extremo ro-
tundo, ac etiam
quædam non-
nihil in acutum
desinentia, vn-
ciam vnā, vel
duas longa, co-
lore glauca, ar-
gutissimis in
ambitu denti-
culis rigidulis,
reliquoque folio
candidioribus,
eternata, spore
strenuè adstrin-
gente: ex quo-
rum medio sur-
git caulis pal-
mum vnū aut

alterum altus, foliosus, in alas aliquot diuisus:
flores albi quinque foliis constant, umbilico vi-
tidæ apices croceos habente. Huius aliam spe-
ciem habemus multò maiorem, *foliis* trium, qua-
tuorue vnciarum.

An Coryledon altera Matthioli Clusio?

Gesn. hort. Sedum in faxis montium, malè
Phyllon nominatum. Arcio in descr. montis
Stockhornii, Sedum montanum maius folio ser-
rato. Cordo hist. Aizoon serratum: hic addit
Gesnerus ab aliquibus vocari Germ. *Fischzung*,
apponens duas figuras, vnā sub titulo Aizoi ser-
rati, & alteram pro Aizoo serrato altero: cui
autem rariore flores sunt, eodem punctis san-
guineis distinctos habet.

Tabern. Icon. & Hist. Palmaria: Item, Vmbi-
licus veneris minor, 1. & 2. Non placet separari
Palmariam ab Vmbilico veneris: prior enim fi-
gura, sc. Palmaria, est plantæ siue caule: cur au-
tem Vmbilicum 1. & 2. tradat, me latet: figuræ
non differunt.

Thalio, Aizoon serratum Cordi, seu Crassu-
la serrata. Cæs. Phyllon 1. siue foliis pusillis,
fermè oleagineis, candida quadam lineâ, in am-
bitu leuiter denticulatis.

Lob. in Adu. & Obs. p. 210. (vbi & Onobletum
Hippocratis, Anguill.) Cotyledon minor Sedi
folio: Eid. ic. p. 386. Cotyledon minor montana
altera, sedifolia, umbellifera, floribus albis, pun-
ctulis rubris aspersis.

Figura Aduersariorum respondet nostro Se-
do: in Iconum libro typographi incuriā ponitur
p. 386. sub titulo Vmbilici veneris: in Obl. præter
mentem Anguillare dicitur Onobletum: Figura
tom. 2. ponitur à Clusio pro Cotyledone Mat-
thioli.

An Matthiol. in post. comm. cum mag. fig. Vm-
bilicus veneris minor, Cotyledon minor, Aceta-
bulum & Cymbalion minus. Camer. apud Mat-
thiol. germ. & Epir. lat. pingit titulo Vmbilici ve-

Kkkk 3

Sed hoc nomen ad minus Sedum pertinere testatur Plinius.

Nom. ling. A' *Λωω* μ¹² α, Germanis *Groß hausz wirtz*, *groß. Sonderbart*, *groß. Sonderblat*, & *hauszlauch*, hoc est *Dormus Porrum*: Belg. *Sonderbaert* & *Tabern. Bladerloosen*: Gallis, *grande lonbarbe* Ital. *Semperviuo maggiore*: Hispan. *Semperviuo*, seu *Vernapuntera*: Angli *houfelike* & *Sengrene*, rectius *houfelike*: Boh. *tučný mizyk*: Hung. *silbe erezo sin*.

Locus.

Nihil vspiam gentium vscarius, vulgatiūse Semperuiuo hoc, quod perenni vegetoque foliorum virore viget, eūque Hieme & Aestate in patietibus, vel imbricamentis, etiam nullis vti videtur, radicibus nixu, aduersus quaslibet cæli impressiones tuetur. Caulis floriferus est post Solstitium æstiuum, subinde circa Augustum mensem demum assurgit, sed Aprili, post verum videlicet æquinoctium, inter folia tenuēs hinc inde exeunt fibræ orbiculorum rudimenta proferentes, quibus tandem adauctis seipsam in complures orbiculos multiplicat. Caulis cum appetente Autumno defloruit, protinus arefcit. Seritur in regionibus nostris in tectis & muris, quibus locis felicissimè prouenit. Nam radices eius exiguae, capillaresque cum sint, facillè humi hærent, nutriunturque. Quin & inter petras, & ad macerias, & muros, vbi terra planè destituta est, virentior quandoque conspicitur.

Qui legitimum Aizoë maius esse contendunt, ei vires & vltus Aizoi Veterum huic attribueret solent. Tragus planè humidæ & frigidæ esse qualitatē statuit, indèque calidis morbis, & inflammationibus adhibendum consilic, idque in externis frequentius, quàm internis corporis partibus. Et quidem in intensissimis acutarum febrium caloribus, nec non & dysenteris, aliisque profluuiis [& præterea in nonnullis aliis morbis] aqua distillata exhiberi potest, mensurâ triū aut quatuor cochlearium. Succus & aqua distillata, linteolis in eo madefactis, ac impositis, inflammationibus quibusvis corporis, imprimis verò phrenetico morbo apprimè cōducūt. Quibus oculi, propter abcessum aliquem aut inflammationem, noctu præcluduntur, ii aquam distillatam infundāt, quo factō non solū inflammationio ipsa, sed & dolor tollitur, nec non fluxus oculorum calidus: idem auribus instillatus efficit. Rursus ille ipse succus & aqua distillata doloribus & inflammationibus iecoris & renum succurrunt, & articularum morbo & podagræ medentur. Auxiliantur etiam ambustis igni, illita, & linteolis imposita. Succus Solatri succo admixtus, & cum oculis populeis decoctus in axungia suilla, ac percolatus, vt fiat vnguentum, mirè efficax est, omnibūque populeis vnguentis, Tragi iudicio præferendus, & longè gravior.

Sedum vulgari magno simile.

Visserat author noster descriptionem & figuram ex virente planta, ex hortu Ill. C. Wirt. esse paradam. Verū cū inibi perierit, nec aliunde haberi queat, Lobelii effigiem assumpsimus ex Ic. Plant. p. 373. sub inscriptione Semperuiui maioris crenati myrtifolii, primo loco exhibitam, quam author Sedo suo optimè respondere dixit. Suspiciatus autem quondam fuit Semperuiuium * sequens culturā in hoc mutari,

quod fortè veritabile. A Clusio hæc icon malè pro Sedo vulgari maior pingitur.



SEDVM MONTANVM LATIFOLIVM
flore purpureo.



Sedi genus habeo, cui radix crassa factis, ocellos circum circa crebros protiginit: folia semuiciā breuiora, acuminata, latiuscula: caulis factis crassus, hirsutus, angustioribus vetustis foliis, mucrone subinde purpurascēte, trium vnciarum altitudine, senos, plures paucioresue in cacumine, gestat flores magnos, longis, perangustis, purpurantibus foliis constantes, res, multis in medio lateis apicibus, folioso circumiecto calyce.

Clusius hanc plantam in pann. pag. 481. vocat Cotyledonem alteram Tauricam: p. 482. Cotyledonem alteram secundam: in hist. Cotyledonem alteram tertiam. Camer. hort. dicitur Aizoon minus odorato & purpureo flore, semē Ateris Attici. An Lob. Obs. p. 204. Sedum minus facie & foliis maioris: An eid. ic. p. 373. Semperuiuium siue Sedum maius, primo loco pictum? An Aizoon montanum H. Lugd. p. 1131. C. Bauh. pin. Sedum maius montanum foliis non dentatis, florib. rubentibus: Sedum minus flore rubente, Eyst. Item, Sedum alpinum 14. siue rubro magno flore. Aizoon montanum H. Lugd.

In montibus Rhæticis & Tyrolensib. frequens occurrit. Clusius in Taurinarum Alpium iugis non procul Saltzburgo crescere scribit: ac flore Julio, in hortis etiam Maio.

SEDVM

SEDVM QVODDAM MONTANVM
pulchrum.

Aliud quoddam Sedi genus ex Baldo nobis
allatum altitudine vix palmum minorem,



aut ad summum
quatuor uncias
æquat. Radix
longa & plan-
tulæ longitudi-
nem æquans,
simplex, in ca-
pite umbellam
producit dēsam,
foliorum Sedi
ferè maioris,
minutissimorū,
& vix ac ne vix
quidem conspi-
cuis serraturis
donatorū: que-
dam etiam nul-
lā, quantum ex
sicca discerne-
re est. Caulicu-
lus teres, sub-
hirsutus, foliis
vestitur aliquot
longiusculis, alterno ex ipsorum foliorum distā-
tia positis. Quem ordinem & flores in summo ser-
uantes, mediam ferè cauliculi partem occupant,
sed breui pediculo hærentes, nec vt in plerisque
Sedis, per ramos diuiduntur. Flosculus ex sex fo-
liolis, vt in plerisque Sedis constare videtur, cu-
ius colorem in sicca discernere non est. Misit
frater in Balbo monte collectum à D. Bechio.

SEDVM LATIFOLIUM FLORIBVS
magnis albicantibus.

Foliorum ocellum Sedi maioris in modum
habet: folia Succulenta & acuminata sunt, a-
spersa & per oras hirta: coliculus palmaris, cuius
summitati plures flores insident magni, lenis ob-
longis foliis constantes, calyculo in multa quo-
que folia diuisi. In sicca planta flor albicat.

An Cotyledon altera montana: vel Cotyledon
altera secunda, Clusio? An Gesn. hort. Sedum
faxorum montium, folio in margine piloso, non
serrato? An Dod. lat. Semperuiui maioris ge-
nus alterum, foliis secundum margines tenuissi-
mis veluti pilis, inftar mollium spinularum ad-
natis, floribus ex luteo pallescentibus.

C. Bauhin. pin. Sedum 4. [2. phyt.] siue ma-
ius montanum dentatis foliis: Aizoon siue Sem-
peruium maius Thallio.

Nobis Agerius communicauit sub inscriptio-
ne Cotyledonis pannonicæ Clusii.

SEDI LATIFOLII FLORE ALBICANTE,
minor species, magis dentata.

Frequens in omnibus iugis vrbi Viennæ vici-
nis, atque in Austriacis Stiriacisque alpidis,
est & hæc altera species Cotyledonis alterius
secundæ Clusii histor.: cui etiam valde similis,
per omnia tamen minor, eiusque folia magis
dentata, In pann. pag. 481. vocatur Cotyledonis
alterius montanæ species alia minor.

C. Bauhin. pin. Sedum 5. (3. phyt.) siue maius

montanum dentatis foliis alterum. Cotyledon
altera montana minor Clus. pann. Cotyledonis
alterius altera species, Eid. hist.

SEDVM SERRATVM.

Tenuis nigra est radix, subinde productis fi-
bris latius se propagans: folia plurimum per



Descript.

terram sparsa
ratiùs humo se
tollunt, Sedi,
pinguia, oblon-
ga, extremo ro-
tundo, ac etiam
quædam non-
nihil in acutum
desinentia, vn-
ciam vnā, vel
duas longa, co-
lore glauca, ar-
gutissimis in
ambitu denti-
culis rigidulis,
reliquoque folio
candidioribus,
erecta, sapore
strenuè adstrin-
gente: ex quo-
rum medio sur-
git caulis pal-
mum vnum aut

alterum altus, foliosus, in alas aliquot diuisus:
flores albi quinque foliolis constant, umbilico vi-
ridi apices croceos habente. Huius aliam spe-
ciem habemus multò maiorem, foliis trium, qua-
tuorue vnciarum.

An Cotyledon altera Matthioli Clusio?

Gesn. hort. Sedum in saxis montium, malè
Phyllum nominatum. Arcetio in descr. montis
Stockhornii, Sedum montanum maius folio ser-
rato. Cordo hist. Aizoon serratum: hic addit
Gesnerus ab aliquibus vocari Germ. Fischzwang,
apponens duas figuras, vnā sub titulo Aizoi ser-
rati, & alteram pro Aizoo serrato altero: cui
autem ratiore flores sunt, eodem punctis san-
guineis distinctos habet.

Tabern. Icon. & Hist. Palmaria: Item, Vmbi-
licus veneris minor, 1. & 2. Non placet separati
Palmariam ab Umbilico veneris: prior enim fi-
gura, sc. Palmariæ, est plantæ siue caule: cur au-
tem Umbilicum 1. & 2. tradat, me latet: figuræ
non differunt.

Thalio, Aizoon serratum Cordi, seu Crassu-
la serrata. Cæf. Phyllon 1. siue foliis pusillis,
fermè oleagineis, candida quadam lineâ, in am-
bitu leuiter denticulatis.

Lob. in Adu. & Obs. p. 210. (vbi & Onobletum
Hippocratis, Anguill.) Cotyledon minor Sedi
folio: Eid. ic. p. 386. Cotyledon minor montana
altera, sedifolia, umbellifera, floribus albis, pun-
ctulis rubris aspersis.

Figura Aduersariorum responder nostro Se-
do: in Iconum libro typographi incuriā ponitur
p. 386. sub titulo Umbilici veneris: in Obl. præter
mentem Anguillæ dicitur Onobletum: Figura
tom. 2. ponitur à Clusio pro Cotyledone Ma-
thioli.

An Matthiol. in post. comm. cum mag. fig. Vm-
bilicus veneris minor, Cotyledon minor, Aceta-
bulum & Cymbalion minus. Camer. apud Ma-
thiol. germ. & Epit. lat. pingit titulo Umbilici ve-

neris alterius, Sedum ferratum.

C. Bauhin. apud Matthiol. ponit iconem ex Tab. sub titulo Coryledonis medix foliis oblongis serratis. Habet porro C. Bauhin. in phyt. etiam Coryledonem laxam, siue minorem foliis oblongis serratis, semipalmari caule, florulis albicantibus, longè quam in priori minoribus. Eam verò in pin. silentio præterit, & cætera longè aliter recitat. Vocat autem Coryledonem, siue mediam foliis oblongis serratis, Coryledon minus Eyst. Umbilicum Veneris minorem. Lonic. & Gerardi: Onobletum Hippocratis Anguil.

C.B. not. laræ: sed præter huius mentem.

Inter Iornick & Gotardum inuenitur, & Genæ in monte Salene copiosè, in faxis & rupibus apricis. In quibusdam alpinis Allobrogum [inquit Lobelius] & Pedemontii, Sabaudæque Ostensi valle vocata, & Mindenis montibus Auerne & Germaniæ mihi visa. In montis Iure rupibus ad verticem dictum *Suchet*, collegit Ioannes Schvab Sedum ferratum frequenter.

Vires. Adstringit tota herba: folia verò efficacius.

SEDI SPECIES SIVE COTYLEDON

altera Etscheriana, lanugine alba, hirsutis foliis.

Descript. **A**ffine Sedum Cotyledoni alteri Matthioli, sed mollius, angustioribus & longioribus foliis non dentatis, sed alba duntaxat lanugine hirsutis, minis etiam incanis, breuiore, crassiorèque pediculis, & multis foliis septo, quæplerumque tam superne quam inferne nonnihil hirsuta sunt, paucioribus floribus hinc inde secundum caulem ad singulas alas sparsis.

Synon. Clus. pann. p. 484. Coryledon altera Etscheriana. Eid. hist. Coryledon altera quinta: Coryledonis genus quintum affine Coryledoni alteri Matthioli.

C.B. not. C. Bauhin. phyt. & pin. Coryledon 4. siue media subhirsuta floribus punctatis: Sedum foliis minoribus albicantibus serratis, Gesn. hort. Coryledon minus montanum alterum, Lob. ic. tom. 2. p. 279. Coryledon altera 5. siue Etscheriana Clusii. *Nihil horum* Clusius: non meminit is florum punctatorum: folia dentata negat, aut serrata, qualia sunt Gesnero, & pingit Lobelius.

Locus & Tempus. Obseruatum hoc genus ab autore in Etscherianis iugis, menis Iunio suis floribus onustum.

COTYLEDON MINOR FOLIIS

subrotundis, serratis, C. Bauhini.

Descript. **C**otyledoni huic quatuor C. Bauh. in pin. radix subest tenuis fibrosa, fusca, circa quam folia multa, semi vogue minora, non vt in altero oblongis ligulis similia, sed subrotunda, margine crenato, crassiuscula, candicantia & nonnihil adstringentia: è quorum medio caulis semipalmaris, quandoque palmatis, subasper, minimis & paucis, foliis cinctus assurgit: in cuius summo, pedicelli, flores, multo quam in secunda (Umbilicum veneris alterum Matthioli in prior. comm. fortè intelligit,) ex quinque, quandoque etiam sex foliis & mediis apicibus compositos, sustinentes, qui albi, aliquando rubentibus punctis aspersi: nonnunquam extrinsecus lineis ternis, foliola floris percurrentibus, ita vt flores pallide purpurascens appareant: hos

capitula exigua, nigrum semen continentia, sequuntur.

In Helætiæ montibus ipsis faxis ac scopulis adhæret: Iunio & Iulio flores: at ea quæ flo-
re est pallide purpurea, apud Montiphanes in horto Dei collecta fuit.

Sedo Serrato humilissimum Phyllon alterum, flore singulari purpureo.

Phylli [Sedi serrati] alterum hoc genus humilissimum, cauleculis est simplicibus, altitudine quatuor digitorum, aut paulo altioribus, in quibus frequentia foliola specie alterius, longè exiliora: flores autem grandiusculam fert purpureum, irregularem in acumine fructum oblongum, bifidum in extremo, in cæteris similem priori: nam & huic semina minuta vt Papaueris nigri in duplici cuitate continentur: saporeque constat adstringente: vt author est Cæsalpinus.

SEDEM MINUS, FOLIO LONGIUS-
culo, tereti, flore candido.



Vermiculari huic nomen fecerant folia, quæ pin-
gibus cauleculis
p. et centum
vermicibus sunt
simillima, alter-
natim in cau-
lis spirantibus
& dodrantali-
bus, ligno-
sis, rubentibus,
aut viridanti-
bus, disposita,
atro viridia,
vel punctis r-
bris guttata:
flores conferti
veluti in umbel-
la, stellati, quin-
que foliis con-

stantes, internè albis, apicibus multis atropurpureis umbilicum conoideum albidum circumstantibus: radix tenuis, fibrosa. In hoc Sedo nullam percipio acrimoniam, quicquid dicat in Ad. etiam Lobelius.

Bunt. atom. 3. hist. 6. 43. Semperuium minus Synon. album: Eid. in 4. pag. 278. Semperuium femina Camer. hort. Aizoon minus, albo flore, staminibus purpureis: Thal. Aizoi minoris species, hinnerbeer vocata. H. Lugd. p. 129. Aizoon minus Matthioli, idem cum proximo: Item pag. 130. Aizoon minus femina Fuchsi, Crassula minor seu Vermicularis, & pag. 132. Vermicularis, siue Illecebra maior Lobeli, siue Semperuium minus alterum Dodonæi. Aizoon minus Matthioli Hist. Lugdunensis ad aliam plantam referimus.

Matthiol. Sedum siue Semperuium minus, floribus herbaceis seu subcandidis: Sedum femina recentiorum quorundam. Eid. hist. germ. klein haufz roritz, flore herbaceo, grafs grun, aut subcandido, bleich gelb: in quibusdam albo, roritz: Sedum minus, Vermicularis, Crassula minor. Vbi nam vidit Sedum minus, quod pingit Matthiolus, flore herbaceo, seu subcandido

dido. At satis in hist. germ. demonstrat sibi non notum fuisse discrimen inter hoc Sedum flore albo, & alterum flore luteo, dum ita indistincte scribit. Tragum si consuluisset, non tam grauitur impegisset. Duo sunt, inquit, minoris Sedi genera, quæ hoc pacto inter se differunt, vt primum candidos & stellatos flosculos ferat: alterum verò subluteos & pallidos.

Fuchf. hist. & ic. Sedum minus fœmina, *klein hauszvurtz* vreibl: Eid. hist. Sedum minus alterum, gall. *Ioubarbe à petite fleur*.

Amatus vocat Vermicularem alteram flore albo, nonnullorum fœminam: verum confundit cum Sedo paruo acri. In meo Amato adest figura nomine Semperuiui.

Dodon. gall. Sedi 3. species, Crassula minor, & Vermicularis officinarum, Belg. *Bladeloose* & *Pappecullekens*: Lat. in fol. Semperuium minus alterum floribus albidis: Itolorum *pignola*. Cur non dicit flores albos? Cord. in Dioscor. Anton. Musam errare scribit, quod Itolorum Pegholam Aizoon minus esse statuerit.

Gefn. hort. Sedum minus alterum, Crassula minor quorundam: Eid. in cat. pl. Sedum minus, vulgò Vermicularis. & Cauda muris, *das waz mur-pfl.*, *Klassenkrant*, *Katzentrubell*. Item de coll. Sedum minus vulgare album.

Anguill. Semperuiua minor dicta Vermicularis.

Sedum minus, vulgò primum, inquit Clusius, est vulgaris illa in muris editisque aridioribus & fabulosis nascens, vulgò Vermicularis cognominata, à teretibus, breuibuscque vermiculorum modo foliis, albo flore.

Lobel. in Icon. pag. 377. inscribit Vermicularem, Crassulam minore officinarum (hunc titulum in Obsl. p. 205. omittit, vocatque anglice *Mous taylor*, alias tamen *vyvyle prikymadam*) & Illecebram maiorem, deque ea in Aduers. hæc scribit. Sæpissime etiam hæc colligentes fallit propter natales eosdem, faciẽque aded minoris Sedi similem, vt mirum magis sit prorsum contrariâ pollere, nempe calfaciendi facultate: tamen discernuntur foliis rotundis, carnosis, magis, & superne retusis: flosculis pallidulis, vel albidis: demumque quia non semper viuet, ed ad Illecebram referenda videtur, cuius est facultas e. *Supina admodum negligentia* Commentatoris, qui nobis hanc fortè pro secundo Sedo dedit, nescius vt vulgus ignarum, facultatum, & immemor verborum Dioscoridis, qui sicuti monuimus cap. de Telephio & Portulaca, quia nec semper viueret, nec refrigeraret, non asserit hanc genus Semperuiui, sed tantum cognationis & similitudinis causa proximè subdidit, viderique speciem dixit. Et hæc hætenus Lobelius. Nobis autem facile fuit cognoscere Sedum minus florè albo, à luteo, ac etiam vrente luteo. Vermicularẽt quam vocat Lobelius nunquam obseruari cum flosculis pallidulis vel albidis, sed tantum cum albis.

Cur hanc Tabern. in hist. & icon. vocet *klein rot katzentrublin mit vveissen blumen*. Sedum minus hæmatodes, non video: in descriptione duntaxat florum alborum mentionem facit.

An Fab. Columnæ, Sedum seu Semperuium 2. vermicularis foliis?

C. Bauh. phyt. Sedum 4. Eid. pin. Sedum minus 1. siue teretifolium album: Semperuium minus, Cast. & Cæsalp. Sedum fœmina, Turn. Semperuium 4. Lonic. Tragus herba, Cordi.

& Passim in veteribus muris; circa aggeres sepimentis agrorum, locis apricis exit; Dodonæo:

mensibus æstiuis flores promit.

Solenarder Sedum minus alterum inter ea medicamenta recenset, quibus dolentes cum calore, rubore, ardore, & pruritu, hæmorrhoides haud difficulter curari possunt. Succus, inquit, Vermicularis, linteolis sæpius madefactus, applicatus bene facit. Mitius est, si cum hoc succo vnguentum populeon misceatur, appliceturque, ita dolorem sedat, & pruritum tollit. Apponitur etiam emplastrum ex Vermicularis istius manipulis duobus, Semperuiui maioris, manipulo vno, & butyri insulsi vnciis duabus confectum.

Sedum minus teretifolium alterum.

Hic folia alteri penè similia sunt, sed frequentiora & densius in caule stipata. In muris & maceris etiam nascitur, sed priore minus frequens, hami procumbens, & fibris subinde Loc. se firmans.

Est hoc Clusio Sedum minus alterum Sedi minoris genus secundum Semperuium 3. Lon. Aizoon minus Marthioli, Hist. Lugd. pag. 1129. Semperuium paruum Lob. Obsl. p. 205. Sedum me-
Synonyma.
ma. C. E. me.
diū teretifolium, siue Semperuium minus officinarum, Eid. ic. p. 176. Hoc C. Bauhin. in phyt. ad Sedum teretifolium luteum retulit, non sine errore. Quare rectius in pin. vocat Sedum minus 2. siue teretifolium alterum.

Sedi minoris albi, Monspeliensis species maior folio auito.

Parietinis hæret passim Monspeliensibus & Nemausenibus Sedum quoddam satis magnum caulibus crassiusculis, frequentibus, ex vna radice subulescentibus, quos folia vestiunt, Sedi Descrip. minoris maris Fuchsii flore luteo, foliis similia, sed maiora, crassiora, longioraque, in acumen desinentia: floribus comatur albis. Floret loco natali mense Iulio.

SEDUM PARVVM FOLIO circinato, flore albo.



scribitur.

Aizoon dasyphyllum, i. e. densifolium, Dalech. in parietibus & muris Viennæ. Allobrogum nasci obseruauit, radice breui, capillata, & pallida,

Pvssillum Sedi genus cuius per ramos folia parua non maiora quam Sedi acris, sed densiora, non longa sed orbiculata, non tam hilari virore perfusa, sed ferè glauca. Iconem ex ipsa planta dare non possumus, quapropter à Dalechamptio traditam alluissimus, cui Aizoon dasyphyllum, id est densifolium in-

gracili, in exigua terra & parietum cemento hærescente: ramulis plurimis, quatuor digitos altis, perquam spissè congestis, foliis numerosissimis, crassis, teretibus, albicantibus, confertissimè stipatis, gustu fatuis, cum leui quadam adstrictione: flore in virgulis tenuibus candido, copioso, Semperviuo medio simili. In Gallia nusquam in eo tractu à se visam & repertam meminit.

Clusius non valde absimile dixit Semperviuo tertio Dioscoridis (Sedo minori caustico), sed folia paullo crassiora esse, candidiora, teneriora, nec ut illa feruidi gustus, sed viribus secundo respondentia, & frigida: florem item candidum: semen exiguum & subruffum. Improbatur autem appellationem Aizoi dasphylli (αἰζοὶ δασυφύλλου) ceu omnibus Sedi generibus, quorum folia sunt crassa & densa, communem.

Synon. Cordo in Obs. fil. dicitur Tragus siluestris vulgari minor: Gefn. hort. Sedum minimum: H. Lugd. p. 1133. Aizoon dasphyllum Dalechampij. Clus. hisp. Sedum minimum, frigidum: Eid. h. Sedum minus septimum. C. Bauhin. pin. Sedum minus 4. siue folio circinato.

Locus & Tempus. Genue & Lugduni in muris viret Februarius: floret Maio. In rupibus, veteribusque muris cum in Hispania & Lusitania: tum in Gallia Narbonensi, præsertim Mompelii in muris suburbiorum, ad portas vrbis protensis, obseruabat Clusius.

Frigidum statuitur & secundo respondens.

SEDVM ALPINVM MINIMVM foliis cinereis, flore candido.

Descrip.



Tam dense foliolis minimis rigidulis cinereis stipati sunt ocelli, ut conferto incubitu foliorum exiguum, crassum alterum alteri veluti locum præcipere videatur, nec minis fecundus ocellorum numerus serpit radicibus lentis, lignosis, crassiusculis, nigricantibus, propagatorum, & quorum umbi-

lico coliculus nascitur trium quatuorve vnciarum altitudine, fili instar gracilis, hirsutus, raris foliis angustioribus donatus, in fastigij ramulis flores maiusculos gestans, colore albos præditos, quinque foliolis constantes, cum aliquot intus staminibus luteis.

Synon. Gefn. Fr. Sedi aut Phylli genus minimis omnino foliolis, cinereis ferè: Clus. pann. p. 486. & 488. Sedum alpinum 3. siue 1. flore albo: Eid. h. Sedum minus 9. siue alpinum 3. C. Bauh. phyt. Sedum 15. Eid. pin. Sedum alpinum 2. siue album foliolis compactis: Sedi aut Phylli genus Hosculis albis, Gefn. Fr.

In Baldo, Braulio, & monte Fracto siue Pilati iuxta Lucernam reperitur. In præruptis Schne-

alben iugi locis, atque inter saxa, quæ descensus est ad monasterium Neuenberg, atque etiam in Sneberg, nascitur, teste Clusio. Iulio & Augusto floret.

SEDVM PURPUREVM PRATENSE.



Folia quæ per caulem sunt, vermicularis folia referunt, nisi quod planiora existunt: multiplex verò est summi caulis diuisio & ramuli numerosi, quibus singulis folia insidet vnicus, non adeò magnus, Vermicularis florem æquans, foliis contans coloris carnei, striâ per mediû productâ, apicibus in medio pallidis.

Trago, Sedi minoris 4. species in humidis, flore purpureo ac roseo: Clus. pann. pag. 486. & 487. Sedum palustre: Eid. hist. Sedum minus tertium, siue palustre: Camer. hort. Aizoon palustre à Clusio depictum: C. Bauh. phyt. Sedum 12. Eid. pin. Sedum palustre subhirsutum purpureum Sedum palustre flore incarnato, Eyst. Huius speciem assignat alteram maiorem & candidiorem, seu marem & feminam: flore purpurascens aut carnei coloris.

Nascitur humentibus pratis circa Norimbergam, unde siccam habuimus. Sed & Clusius hoc Sedi genus florens obseruabat vlginis locis apud oppidulum Freying, quæ Pragâ iter est Norimbergam, sub finem Iunii.

SEDVM MINVS FLORE LVTEO.



Nigrat huic tenuis radícula, fibris aliquot donata: ramus inde exeunt dodrâtales, qui si natalitiû solum fuerint parietine, penduli mox re collectis viribus rectâ furriguntur, quibus male firmo nexu apposita folia, crassa, pingua, acuminata, sursum spectantia, crebra: flores stellati, lutei, eiusdemque coloris apices.

An Sem-

An *Semperiium* paruum Diofco? An *Aizoon* minus Plinio? An *Sedum* alterum Matthiolo?

Amatus Sedi huius meminit, nomine tertii & *Vermicularis* flore luteo, masculi nonnullis dicti. Verum, ut monuimus, confundit cum *Sedo* paruo acri: est figura ipsi nomine Sedi minoris.

Fuchs. in hist. & icon. dicitur *Sedum minus* mas, *klein haustvornitz manlin*: Eid. hist. *Sedum alterum minus*, siue *Aizoon* Diofcoridis minus, Græcis *τριδακτυλ*: vocatur, vulgò *Vermicularis* & *Crassula minor*: Gallis *Triquenadame*, *tonbarbe*, & *Rabaui*: Germ. *klein donderbart*: Belg. *klein donderbaert*.

Dodon. *Semperiium minus*. *Sedum minus*. *Hæmatodes* 1. Tabern. & Gerardo: *Aizoon hæmatodes*, Lob. icon. p. 378. *Aizoon minus*, siue *Semperiium* Dodonæi, H. Lugd. p. 129. *Sedum* 2. Diofcoridis, Gallis *Triquenadame*, Clus. pann. p. 484. Eid. hist. *Sedum minus* 5. siue *Sedum minus* Diofcoridis alterum, cuius ramuli summo fastigio non incurvantur. C. Bauh. apud Matth. *Sedum* 3. minus: Eid. phyt. *Sedum* 11. Item pin. *Sedum minus* 5. siue luteum folio acuto.

Vulgò in hortis alitur: sed & spontè nascitur in Hispaniis muris & macetis, referente Clusio. Montbelg. in horto, licet annua planta non sit, Hiemem pertulit. Florens Octobri obleruavi Basileæ ad Rheni litus: Genevæ in monte vicino *Salute* Februario: Florens Iunio inter *Monspeliu* & *Lugdunum* passim in quibusdam silois.

Inter acetaria multis locis recipitur, in quibus & sapit, & palato gratum: æstuanti ventriculo confert, teste Dodonæo.

SEDVM MINVS ÆSTIVVM luteum.



Palmaris, fruticosaque est planta, folio exiguo, Sedi minoris, rotundiore, flore luteo, radice inutili gustanti, *Semperiium minus æstiuum* Lobelii Obs. p. 205. Icon. pag. 379.

C. Bauh. phyt. *Sedum* 6. siue minus teretifolium album alterum: *Semperiium minus æstiuum* Lobelii: *Aizoon dasyphyllum* Hist. Lugdun. Variat floris odore al-

bo, & luteo. Negamus nos *Sedum* hoc Lobelij reperti flore albo: *Aizoon* præterea *dasyphyllum* Lugd. diuersa est planta. Nec huc referimus *Sedum minus teretifolium alterum album*. Qua de re monitus in pin. tres distinctas plantas esse concludit. De *Sedo* minore teretifolio altero diximus alibi. De *Aizoo* verò da-

Tom. III.

syphyllo cap. de *Sedo* paruo folio circinato, flo- re albo. *Caterium* in pin. *Semperiium minus æstiuum* Lobelii H. Lugd. p. 1133. sine icone, vocat *Sedum minus* 3. siue teretifolium luteum: Sedi minoris secundam speciem Tragi: *Aizoon medium* Thali.

Belgis hortense est.

Locus.

Sedum minus luteum flore se circumflectente.

Teretibus, crassis, succo plenis, & mucrone præditis foliis, & flauis floribus est, ut *Sedum minus* flore luteo, mas quorundam, eius tamē summus caulis in ramulos diuitus sese inflectit instar summmitatum *Scorpiini* siue *Heliotropii* maioris, recte Clusio, cui in hist. dicitur *Sedum minus* quartum, vel *Sedum minus* Diofcoridis primum: Camer. hort. *Aizoon* intus flore luteo infl. xo: Lobel. Ic. 377. *Aizoon* Scorpioides C. Bauh. pin. *Aizoon minus* 6. siue luteum ramulis reflexis. Eius in phyt. confusè meminit, sub *Sedo* 11. siue minore luteo, acuto folio.

Idem cum *Sedo* luteo minore mare natali. Locus: bus gaudet, eundemque usum habet.

SEDVM ARVENSE FLORE RVBENTE C. Bauhini.

Radice est lignosa, fibris capillata, cauliculis aliquot palmaribus, rotundis, rugoso, rubescente cortice tectis, qui in ternos, quandoque plures, ramulos [quorum aliqui recuuantur] diuiduntur: hos folia longiuscula, angusta, succulenta, sine ordine ambiunt: ramulis superioribus flores plures, vulgaris Sedi floribus similes, sed rubentes insident, semenque vulgari simile succedit.

Sedum hoc minus 7. [ut in pin. vocat] Vel (ut Synon. in prod.) *Sedum* nonum non longè à Basileæ, in agris Huningenfibus, Autumno iam exsiccatum Locus, reperitur: quod etiam in agris argillosis ad Pyrenæos, sed minus, reperitur.

Sedum paruum montanum luteum.



Caulum v- *Sedum* plurimum, erigit palmarem, dimidio nonnūquam minorem, foliis crebris vestitum, Sedi minoris maris, siue florib. luteis, minus acutis, planioribusque, qualia etiam per terram sparsa caulis imo adhærent: superius diuiditur in ramulos satis frequentes caulis, qui flores gestant pul-

chellos, maiusculos, ex pluribus & foliolis, & apicibus luteis compositos: radice summa ferè tellure vagantur, & subinde nouas plantas pro-

LIII

ducunt, subinde terram subeunt.
 Synon. Clus. pann. p. 484. & 485. Sedum alpinum 1. si-
 ue flore pallido, vel ex luteo colore pallescente,
 quinque foliis constante: Eid. hist. Sedum mi-
 nus 6. siue alpinum 1.

C. Bauhin. phyt. Sedum 13. siue alpinum palli-
 dum: Bld. pin. Sedum alpinum 5. siue flore palli-
 do: Aretio Stockh. Sedum montanum minimum
 luteum.

Prouenit in monte Baldo, in monte Pilati, &
 Gothardo. In Sneberg, aliisque Stiriacarum al-
 pium iugis, in Tauro monte, arque Iudenberg
 crescere scribit Clusius: florere sub finem Iulii
 Augusto.

SEDVM ALPINVM ERICOIDES CÆRV-
 leum, nonnullæque aliæ Sedi species
 C. Bauhini.

Descript.



Synon.

Hoc (Sedum 10. in phyt. 4. in prod. Alpinum
 17. in pin.) cum anno 1579. Martio mense, per
 Loc. Rhætiæ alpes iter faceret author, è rupibus, ob
 Varietas. aquam defluentem, humidis, instar Cymbalarie
 dependens, florénque collegit. Idem in Got-
 thardi summitatibus, & in Valesia, ad thermas
 Leccenses supra Gemme reperiit, à priore ta-
 men differens potissimum foliorum exilitate, &
 colore florum: item & colore, & magnitudine.

Tradit & describit idem C. Bauhinus & alia
 Sedi genera, ab ipso tum in Rhæticiis tum in
 Valesianis Alpibus obseruata, vt pote *Sedum*
Alpinum Ericoides purpureum. *Sedum Alpinum* fo-
 liis crenatis asperis. *Sedum saxatile variegato flore*.
Sedum saxatile atrorubentibus floribus. *Sedum sa-*
xatile hirsutum purpureum.

SEDVM PARVVM ACRE, FLORE
 luteo, & aliud non acre.

Descript. Obuium in muris est, capillaribus *radiculari*
 fibris appensum, vnde *ramuli* plurimi, pal-
 mates aut breuiiores, tenues oriuntur, foliis exi-
 guis admodum, densitate cum longitudine ferè
 pari: *flores* in extremis ramulis plures, lutei,
 quinque foliis radiatis constantes, apicibus in
 medio similiter luteis.

Seminarium 3.
 Diofco. Et hoc est *Semperuium* illud tertium Dio-
 scoridi creditum, quod aliquos *Portulacam* &

grestem (αὐτὸ δὲ παλαιὸν ἀγρίαν) aut *Telephium* (τὸ λε-
 γον) vocare tradit, Romanos verò *Illecebram*,
 pusillis foliis crassiusculis [πυχύτρηρα]. Lac. legit in
 vet. cod. τὸ λεγόν τρηρα: ad *Portulacæ* similitudinem,

ac densis in
 petris nascens.
 Et huius opi-
 nionis alle-
 clas habemus
 inter alios,
 Cæsalpinum,
 Matth. Lob.
 Dod. Gesn.
 Anguill. Fuch-
 sium. Amat.
 Clus. Histor.
 Lugd. & Casp.
 Bauhinum:
 contrà verò
 perperam sen-
 tit Matthio-
 lus: Suspi-
 cantur etiam
 nonnulli hanc
 plantam non
 esse *Semper-
 uium* tertiū



Dioscoridis, quòd illi folia desint. Sed *Diosco-
 rides* hoc non *Portulacæ* esse folio, sed ad illius
 crassitiem tantum accedere folia refert.

An *Aizoo* minori similis, Plin: Malè autem
 eiusdem Plinii *Illecebram* Italorum vocat Cæ-
 salpinus.

Tragus *Sedum* nostrum pingit nomine Ver-
 micularis: non tamen nominibus distinguit ab
 Aizoo siue *Sedo* minore floribus albis, nisi colo-
 re florum. Differentia tamen non in solo flo-
 rum colore consistit, sed etiam in foliis, quæ
 huic multò breuiora sunt, & paulò acutiora, &
 ab basim nonnihil latiora. Differt præter hæc
 ab illa sapore feruido, vrentèque, vnde merito
Maurpfeffer dicitur, h. e. Piper murorum, vel
 murale, quòd sc. in muris proueniat, gustique
 acris admodum sit, vt Piper. Dicitur quoque
 Germ. *Blattfz*, quasi foliis destitutum, eò quòd
 pro foliis acinos quosdam habeat. Alii à for-
 ma *Judentrenbel*, & *Katzentrenbel*, hoc est *Vuas*
Iudaicas, vel *Felium vuas* nuncupant. Belg. di-
 citur *Muerpeper*: Augl. *Stone crop*, & *Stone bore*.
 Quidam volunt *Katzentrenbel* esse *Hippuridem*
 non leui errore. In eo etiam hallucinari de-
 prehenditur: quòd calidum temperamentum ei
 inesse negat, quòd auulsa vt reliquæ plantæ tem-
 peramento calidæ, non arefcant. Nec enim om-
 nia calida, euulsa arefcunt, vt *Aloe*. Suo gustui
 potius fidere oportebat Tragum quàm friuolæ
 imaginationi.

Apud Apollinarem pingitur quidem *Aizoom*
 acre, sed inter vires malè omnia confunduntur, *Apoll.*
 nec fit mentio acrimoniz, licet ipsam nomen
Maurpfeffer apertè denotet.

Brunfels. de *Sedo* paruo vrente confusè egit,
 quate nomina & vires, quas ei assignat, non ad-
 scripto.

Eidem B. *Portulacæ* tertia: Trago, *Sedum* Brun-
 minus tertium & *Vermicularis*, cuius nomine
 Camerarius etiam addit iconem Mathiolo,
 cui vt & Castori *Semperuium* minimum si-
 ue tertium, Anguillare Gramen 3. Plinii, &
Semperuium 3. & *Vermiculata* acuta. Dod.
 lat. *Illecebra* siue *Semper* 3. Eid. in h. gall. *Sed*
 di 4. species. Sedi 3. genus, Fuch. Lac. Turn.
 & Cro-

& Cronemb. Aizoon minus, malè pro Vermiculari acceptum, Cordo in Diof. Aizoon acre, Eid. hist. Sedum tertium Diofcor. Gesner. horto Illecebra, quibusdam recentioribus Soldanella dicta: & tertia species Sedi, Eid. cat. pl. item, Sedum 3. Illecebra, & Portulaca filiostris Semperuium 3. quoad descr. at 2. quoad iconem, Lon. Sedum minimum, Lob. ic. p. 379. siue Illecebra, Obs. p. 208 & Sedi tertium genus non semper vivens, in Adu. Semperuium tertium minimum, alterum, Cæs. Aizoon minimum repens 3. Diof. H. Lugd. p. 110. Aizoon minus feruidi gustus, Thal. Sedum minimum, Tab. Vermicularis siue Illecebra, Ger. Sedum minus 8. Cauliticū Clus. h. Sedum minus seu minimum cauliticum Eyst. Aizoi facie planta, quæ Dactylon 2. vel 3. Plinii, Columnæ.

C. Bauh. apud Marth. Sedum 4 siue minimum acre. Eid. phyt. Sedum 8. seu minimum, duplex, aliud gustatum, paulò post fauces exiit, aliud penè insipidum: - floribus item candicantibus aut luteis. In pin. Sedo minori 8 siue vermiculato acri, hanc varietatem à sapore petitam, non amplius adscribit, meliora docuus.

Passim in tectis, muris & petris nascitur etiam in aggeribus, salebrosis & aridis locis, tenui gramine oblitis: adè autem viua, vt tenuissima ramulorum fragmenta faciliè radices agant, non tamen tempore vires, vt voluit Dodonæus. Astitus mensibus cum floribus repetitur.

Diofcor. tertio Semperuium generi, vim adscribit excalescentiam, aciem & exulcerantem, aitq; impositum cum auxugia strumas discutere. Sed hanc facultatem in polichiam esse & Diofcori dis textui insertam, non sine iudicio censet Columna. Foris adnota (inquit Dod.) rubicincta, vesicæ excitat, ac tandem exulcerat. Succus cū aceto, vel alio liquore extrahens vomitum mouet, & crassos, pituitosos, ac biliosos humores ducit; & subinde ita quantis, aut aliis diuturnioribus febris liberat: aduersus assumpta venena & hoc modo confert.

Sedum minimum luteum non acre.

Coliculis & foliis minori [acri, Gesn.] perfinitie existit, multò tamen exilioribus, minorit utque his partibus constat: flores habet foliolis quinis stellæ modo radiatis cōstantes, quinque exiguus acuminatis in medio apicibus semiterendo natis, indeque decem staminibus circumvallatis, Aizoo acni floribus, formâ, quantitate, & luteo colore similes, positu tamen differentes, non enim minoris aut acris Aizoi modo umbellam siue capitulum constituunt, sed deinceps ab vncialibus aut longioribus coliculorū adnatis vtrinque alterno situ exeunt: ex his qui ab vno latere enascuntur, oppositorum spatii iunguntur. Radicibus nititur tenuibus & capillatis.

Cauendum monet descriptionis author Cordus, qui Aizoon minimum vocat, ne Acris & huius similitudine fallamur, illam pro hac accipientes: addit hanc virere semper, & inde nomen inuenisse.

C. Bauh. pin. Sedum minus 9. siue vermiculatum insipidum: Semperuium 3. minimum, Cæs. Aizoon minus & Vermicularis insipida. Thal. Sedum minus seu Vermicul. insipida, Eyst. A. priore non solum gustu differt, sed etiam foliolis magis teretibus & tenuibus: floribus est vtraque luteis, rariùs albis.

Tom. III.

Nascitur iisdem, quibus acre & minus Aizoon natalibus.

Adstringunt vehementer coliculi, foliola & flores, quemadmodum minus Aizoon, sed vehementius: siccius enim est.

Sedum minimum arborescens, vermiculatum, flore luteo.

SYRIÆ natalitii naturæ munifico lusu & luxu plantulam hanc pinxit Lobelius in Obs. pag. 206. Ic. 480. Sedi minimi arborescentis vermiculati, in inscriptione, fruticosam, & densè geniculatam, confertisque foliis & ramulis, floribus luteolis, Vermicularis acris, vt tota facie. Et hanc in Italia quoque oriri opinatur. Hæc autem figura Lobelii non demonstrat plantulâ, sed plantam arborescentem.

H. Lugd. p. 112. Sedum minimum arborescens Lobelii C. Bauh. phyt. Sedum 20. siue minimum fruticosum: Eid. pin. Sedum minus 10 siue fruticosum: An Polygonum masculum fruticosum Thallio?

SEDVM ALPINVM HISPIDVM FERE, spinosum, flore pallido.



rem in cacomine gestant singuli, Sedi montani minimi lutei parem, pallescetem, apiculis in medio multis: succedit unicuique capitulum, Lini simile, minus, turbine bifurco parente, è quo cōcussu excidit semen longè copiosissimum, minutissimum, puluisculi instar, colore nigrum.

Ex monte Calcaris, item Gothardo, quem traiecit Iulio ex Italia rediens florentem attulit. I. H. Cherlerus.

SEDVM MVSCOSVM.

Cespites totos operit luxurie fecunda, Sedorum in morem, radicularum reptatu, folia maiora quàm Sedi alpini cinerei, acutiora, molliora, muscum terrestrem imitata: coliculus ex umbilico natus vnciam vnam aut duas altus, foliolis crebrioribus vestitus, vnicum plerumque in fastigio gerit florem magnum.

LIII 2

Locus



SEDVM MINIMVM SYRIACVM.
luteolo flore, Saxifragæ albæ.

Locus.

Descript.



Synonyma

Lob. Obs. p. 204. Icon. Pl. pag. 376. Sedum minimum tertium. A Dodon. lat. huius figura pro Sedo serrato ponitur. Casp. Bauhin. phyt. Sedum 9. siue minimum peregrinum, Saxifragæ albæ flore: Eid. pin. Sedum alpinum 1. siue Saxifragæ albæ flore, vel grandiflorum: Sedum minimum tertium Lobelii, H. Lugd. p. 133. An Sedum alp. 4. Col. part. 2.

SEDIS AFFINIS TRISVLCA
alpina, flore albo.
CAP. IX.

Descript.

Svmmo cespite vagatur, magnūque spatiū occupat, terræ appressis coliculis, tenuibus, fuscis, è quibus nascuntur folia vncialia, intrisulcum tridentem, latiusculum, Chamæpityos minorem desinentia, subhirsuta: alia in oblongum vtriculum glumofum conuoluta, lanugine pinnata, granum Auenæ affabrè referunt, trisulcis illis foliis subinde obvallata: caules surgunt quidam teretes, palmates, superitis in pediculis aliquot[orum foliolum indiuisum pu-


Frater, à quo habui, prope riuiolos in Alpibus crescere annotauit.

fillum appositum] diducti, quorum vnusquisque florem gerit Spergulæ patem, albidum, striatum, vasculo succedente paruo, feminibus pleno, quod circumdat florum calyx laciniis denticulatus.

Clus. pann. pag. 491. Sedum Alpinum Augæ folio. Eid. hist. Sedum minus 13. Casp. Bauhin. phyt. Sedum 19. siue alpinum laciniato folio: Eid. Sedum foliis laciniatis 1. siue Sedum alpinum trifido folio.

Ex præruptis faxis, hiulcisque saxorum rimis Iunio collegit in monte Calcaris gener I. H. Cherlerus. Nasci in summo Sneberg, iugo inter saxa paulld ante à niuibz libera, florereque Augusto, testatus est Clusius.

ALOE IN GENERE.
CAP. X



Succulenta, Smagda, dentata, crassa, in terram reclinata aliquantulum, æterni viroris habet folia, addè vt per hybernos menses extra terram etiam in hypocaustis suspensa non marcescat, sapore apud nos minimum amaro: caulis inter folia surgit.

Ruellius ait Aloe thyrso striatos esse,

quàm verè autem iudicent qui Aloem viderunt, inuenio quidem Plinium dicentem folia striata, vbi Cornarius merito legere videtur strata. Hinc etiam lib. 3. cap. 19. in Dioscor. asserit folia vtrinque ex obliquo longioribus interuallis striari: Sed hæc autopsiæ committimus.

Matthiolum in h. germ. ait florum colorem esse incarnatum intar florum Granatorum: Gesn. autem hort. scribit florem ferre luteum: Tragus tamen album habere testatur, secutus Dioscoridem, dicentem: Aloe folium habet Scillæ (σκίλλα) similitudine, crassum, pingue, in rotundo modicè latum, retrorsum pandum. Sed vtrinque habent folia ex obliquo spinulas raris interuallis prominentes, cæque breues, & quasi decurtatas (mutilas, Corn.) Caulem verò profert Antherico non dissimilem, florem album & semen ceu Hastulæ regie. Est autem tota odore graui & gustu amarissima. Vnicâ verò radice ceu palo in terram demisso vititur.

Aloe [inquit Plinius lib. 27. cap. 4.] Scillæ similitudinem habet, maior, & pinguioribus foliis, ex obliquo striata (strata, vt diximus, Corn. legit:) Caulis eius tener est, rubens medius, non dissimilis Antherico: radice vñ ceu palo in terram demissa graui odore, gustu amarâ.

Cæterum, dum Dioscorides dicit Aloem folia Scillæ habere: & Plinius Scillæ similitudinem: si longitudinem tantum consideremus, recta quidem est comparatio: si verò alia, non item: ac propterea addit ille, in rotundo modicè lata, crassa, pin-

sa, pinguis, retrorsum panda, vt rectiorem comparationem redderet. Et hæc obscure admodum à Plinio dicuntur.

Herbar. antiq. Io. Cubæ, Aloes monstrosam exhibet imaginem.

Quàm benè autem Leu. Lemnius de herb. bibl. Aloen, arborem smaragdini coloris faciat, ipse viderit. Neque enim arbor est, neque arbutuscul, id quod Munsterus voluit.

Cæterum, in omnibus ferè linguis apud omnes ferè authores Christianos vnum & idem nomen hæc planta obtinet, quod est *Aloe*. Sic autè dicta videtur, quia maritimis gaudet. Particulatim tamen Camerar. Aloen communem vocauit: Aloem vulgarem, Schvvenckf. fortè ad differentiam Aloes Acoltæ, quæ est Americana. Dicitur Aloë Dioscoridis, Columæ: Aloë marinum, folio planiore, Horto Scholzia: Aloë in Rama Iudææ copiosa, Rauvolf. Aloë siue vulgaris, C. Bauhin. pin. Aloë in insula Socotra, part. 2. Ind. Or. cap. 6. Aloë, siue Semperuium, Arabum Schar, Arca, Catecomor, Linsc. part. 4. Ind. Or. cap. 38. & fig. 19. Azauar, siue Semperuium, quo campi pleni, part. 4. Ind. Or. Aloë & Semperuium marinum, Lobel. Obs. p. 202. Icon. pag. 374. Semperuium marinum, Turn. & Hort. Lusit. Semperuium quidem à recentioribus vocatur à sempiterno vitore, quod è laquearibus conclauium suspensum, quàm diutissimè viget: Marinum autem, à natali loco cognominatur.

Sedum amarum appellat Columella, ab eius succo amaro. Alii, vt inter Dioscoridis reiectanea legimus, Amphibion [*ἀμφιβιον*] quoddam modo terræ matri adhærens, sed inde etiam exempta, de quæ trabibus volupratis gratiâ suspensa, in aëre vitam tueatur diutissimè, nominant: alii Tragoceron (*τραγοκέρων*) à cornuum hircinorum similitudine: alii Eryngion, *ἐρύγγιον*: alii demum Hermionon, *ἑρμιονον*, vel, vt Corn. *ἑρμιον*.

Germ. *Aloeparick* & *Butterwurrtz*: Belge, Itali, & Angli *Aloe*: possit tamen ad succi concreti differentiam, qui simpliciter *Aloe* nominatur, herbe *Aloe* nuncupari, Turn. Galli *Aloës* & *Perroquet*, quod foliorum habitu & colore pfitatum viridem refert, incerto autore. Aloë vulgaris, inquit Holler. inst. chir. lib. 2. cap. 5. patrio nomine *Zambana* appellatur: Hisp. *Cañulla*, yerna de acibar, yerna babosa: à phris *Saber*, *Paper*, siue *Subar*. Chaldaeis *Alluauan*. Arab. vt Scrapioni *Laber*: Auertho: *Cauar*.

Quæ Aloë Latinis, & officinis, *ἀλὼν* Græcis, hanc Arabes, Persæ & Turci, ait Garcias, *Cebat* vocant: nam quod *Laber* à Scrapione dicatur, interpretis errore, aut libratorum negligentia factum esse existimo. Guzarate verò, quos Gedrosios putant, & Decan incolæ, *Arena*: Canatini, *Catecomer*: Hisp. *Acibar*: Lusitani *Azeure* appellant.

Veterum de loco natali placita, inter vires recentiores. Aloës herba pluriima nascitur in Cābāya, Bengala, aliisque multis locis. Cæterum laudatissima est in Socotora, quæ inde ad Arabes, Persas, Turcos, denique per vniuersam Europam deferretur, eamque ob causam Aloen socotrinam appellant. Distat autem hæc insula à freti [maris Erythræi] centum viginti octo leucis: qua de re non minus Arabica, quàm Aethiopica dici potest, quoddam altera parte freti Arabia terminetur, altera à Aethiopia, teste Garcia. In regione quadam circa Caput bonæ spei, in Sinu Aguada Sanbras dicto, ingentem copiam, immò

plenos campos Semperuii obseruauit Linschottanus, quod incolis *Aceuar* appellatur. Viri altitudinem facillè superat, & è longinquo visas herbas loci incolæ esse existimabat. Ea ipsa est herba ex qua incolæ insulæ Sacotra Aloen conficiunt, quam Sacotrinam vocant. In quamplurimis Italix locis virefcere conspicitur, præsertim Romæ, Neapoli, Venetiis, Ticini, & Genuæ: Item Parauii, Veronæ, Bononiæ & Florentiæ, quibus omnibus in locis super ædium fenestris, ac atrijs, fictilibus in vasis, terra plenis alitur, ac fouetur, ad spectaculum potius, quàm medicum vsum. Auditio autem ibi ultra triennium non durare. Geneuæ Allobrogum aiunt Hiemem perferre non posse. A matris partibus ad nos [Gallos Parisienses, ait Ruell.] deferretur, sed solo credita nunquam comprehendit, imò breui canie confecta demoritur, licet in tabulatis propendens, plerumque biennio vitam proroget. In Germania, quod ad folia attinet, nullo negotio prouenit, ac in Autumno lætissimam se ostendit. Hiemis tamen frigora in hortis ferre nequit, vnde Hieme aduentante euellitur, ac in hypocautis suspèditur, quæ causa est vt in nostris terris florere non queat. Reposita per tres septimanas quasi peritura colorem suum amittere videtur: sed tamen paulò post tantum natuum suum colorem recuperat, sed è incrementum accipit, ac si è mortuis reuiuiscat. Exacta Hieme in hortos rursus transfertur, & plantatur, in quibus aliquantulum augetur.

Potè nullam amaritudinem in nostrate Aloë reperies. Sed aliud quibusdam Hispaniæ locis Aloës genus inuenitur, in cuius sanè folijs manifestè amarorem cum acrimonia coniunctum iuuenies, teste Clusio. Quædam de Aloës plantæ vii leges inferius ex Garcia obseruatione.

Præter Aloën vulgarem est & alia Americana muricata a nobis cognominata. Nunc & Aloë monstrosa Atiniani nata, à Clus. & C. Bauh. traditur, quam nondum descriptam inuenimus. Sed & Aloës, palustris tamen appellatione addita, nobis Bononiæ demonstrata planta, à D. Vlyssè Aldroando, quam ad Dodonæi galli Statiotem aquaticam, Sedum aquaticum Lobelii referimus, de quo H. n. l. 38. Gentiana tandem, à Dioscor. Apuleio, pluribusque aliis quia amarissima, Aloë gallica nominatur de qua H. n. l. 31. Est & Aloë lignæ, de quo H. n. l. 4.

ALOES SVCCVS.

CAP. XI.

EX Aloës folijs expressus, succus in vesicis aut aluta concretus aduchitur. Eius autem paratio. di rationem talem intelleximus: Rhodiis herbâ ipsam accipi, in frustra dissecari & contundi, deinde in vas oblongum reponi, in eoque viginti quinque dies fini. Interea autem spumam attolli, inutilem & abiiciendam. His peractis, conchâ superiori succi partem demi, ad quandam visque demendo apparentem eiusdem succi differentiam: hunc in vesicam reponi, adque Solem exsiccati, Aloëmque succotrinam effici. Secundo demi succum in medio consistentem, & in vtres reponi, exsiccatiue, ac Aloëa hepaticam confici. Postremò sequi Caballinam, cæterorum veluti faciem. Tres itaque eius hodie cognoscuntur differentiæ, ex eadem tamen planta

expressæ. Optima Succotrina appellatur, omnium purissima, quæ dum frigida est, malleo percussâ, in splendida, nitidâque fragmenta dissilit. Colore fulva, aut ruffa & pellucida, inter tractandum mollescens, in Sole diffuens, atque foris nitido, fuscâque, aut nigro colore bonitatem suam intrus latentem, abscondens & dissimulans. Saporê habet insigniter amarum, adstringentem, aromaticum, aliquantulum tenuem, & oris halitum commendantem. Odorem autem aromaticum, & tamen grauem. Impurior secunda, *Hepatica*, quod hepatis colorem exhibeat, dicta, primâ dârior est, aridior, iecinoris modo crenata. Colore in citrino subruffa, & Succotrina minùs pellucida, vixque oculorum aciem luménue admittens, quanquam interim micæ splendide sint. Odore & sapore Succotrinam æmulat, grauius tamen oler, paulloque amarior existit, magisque adstringit. Et hæc quoque calida ducitur, & frigido celo friatur. Tertia sordida, inquinamenti multis contaminata, *Caballina* vocatur, veterinariis relinquenda medicaminibus, cui ob id nomen videtur inditum. Hæc omnium ponderosissima, aridissima, dâssimâque. Colore nigra, & minimè translocens, terra arenisque plena, & maius, quàm prædictæ virus olens. Gustu amarissima & valdè adstringens, non sine horribili qualitate aliqua palatum & stomachum afficiens. Eligito in quouis genere pinguisimam, purissimam, Hieme friabilem, Aestate molliusculam, & in manibus lentescentem, calculis, arenis ac tetrâ carentem, tam gustu quàm olfactu aromaticam, amaritudinem respicientem, somnum odore conciliantem, & dissolutu facillimam.

De Aloes succi generibus, viribus & vsu hæc Dioscorides memoriæ tradidit. Aloe herba plurima in India præpinguisque nascitur, ex qua etiam coactus succus importatur. Nascitur & in Arabia, Asia, ac in locis quibusdam maritimis & insulis velut in Andio, non valdè eliciendo succo idonea, sed ad conglutinenda vulnera sanè quàm vtilis, si trita illinatur. Duo sunt porò succi genera: alterum arenosum, quod purissimè veluti sæx, & crassamentum esse videtur: alterum, quod ad iecinoris imaginem vergit. Eligito pinguem, quæ nihil doli senserit, calculorû experrem, nitidam, subfluam, friabilem, iecinoris modo coactam, quæque faciliè humescat, eximieque sit asparitudinis. Nigram contrâ fractuque contumacem improbat. Sunt qui eam gummi adulterent: id quod gustu, amaritudine & odoris vehementia deprehenditur, eoque indicio quoddam attrita digitis, non ad minima vsque ramenta resoluatur. Neque desunt qui Acaciam immisceant. Vim habet adstringendi, somnum conciliandi, exsiccandi corpora, corpora dâsandi, aluum soluendi, stomachumque repurgandi, si binum cochlearium mensura ex aqua frigida, aut lactis instat, tepida seu egelida bibatur. Sanguinis etiamnum excreationes sistit, & morbum regium emendat, ex aqua tribus obolis, aut drachmæ pondere, in potu. Deuorata verò cum resina, aut aqua, vel melle cocto excepta, aluum soluit: ternum autem drachmarum pondere, perfectè purgat. Sed & aliis medicamentis purgantibus admista, præstat vi minùs stomachû infestent. Sicca verò inaspera, vulnera glutinat, vlcerâque ad cicatricem perducit, cohibetque: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia agglutinat. Quin & condylomata, timâque sedis dulci vino ammixta sanat. Sanguinis ex hæmor-

rhoidibus eruptiones sistit, pterigia ad cicatricem perducit, liuida, & sugillata, hypopia dicta, ex melle tollit. Scabras quoque lippitudines, angulorumque in oculis pruriginis mitigat. Dolorê capitis sedat, ex aceto & rosaceo fronti & temporibus illita. Sed & cum vino fluentem capillum continet: itidèque tonsillarum, gingivarum, cæterarumque oris partiû vitii cum melle ac vino proficit. Cæterum, ad oculorum medicamenta torretur in munda & candente testa, ligulâque subinde versatur, donec æqualiter tostâ fuerit. Lauatur & Aloe: atque id quod arenosum subsidet, tanquam inutile secernitur: pinguisimum autem quodque læue est, recipitur. Hæcenus Dioscorides. Qui statim in præmio Nigrum præter veritatem falsò prodidisse scribit, Aloem fossilem in Iudæa nasci.

Aloe laudatissima [ait Plinius] ex India affertur, sed nascitur & in Asia: non tamen ea vtitur, nisi ad vulnera recentibus foliis: misce enim conglutinant, vel succo. Ob id in turbinibus cadorum eam ferunt, vt Aëzoum maius. Quidam & caulem ante maturitatem seminis incidunt fucci gratia, aliqui & folia. Inuenitur & per se lachryma adhærens. Ergo pauimentandum, vbi sata sit, censent, vt lachryma non absorbeat. Fuere (Niger id nugatus erat) qui traderent in Iudæa (super Hierosolymam metallicam eius naturam: sed nulla magis improba est, neque alia nigrior est, aut humidior. Exit ergo optima pinguis ac nitida, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, faciliè liquefces. Improbanda nigra & dura, harenosa quoque, quæ & gustu intelligitur. Gummi adulteratur & Acacia. Natura eius piffare, densare, & leuiter calefacere. Vfus in multis, sed principalis aluû soluere, cum penè sola medicamentorum, quæ id præstant, confrimet etiam stomachum, adeò non infestet vlla vi contraria. Bibitur drachma: ad stomachi verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, cochlearis [binorum cochlearium, Diosc.] mensura, bis tæne in die ex intervalis, vt res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota cû sumatur cibus. Capillum fluentem continet cum vino austero, capite in Sole contra capillum peruncto. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti impofita ex aceto & rosaceo, dilutiorque (liquidior, ex alto instillata, Dal.) infusa. Oculorum vitia omnia sanati eâ conuenit, priuatim pruriginis & scabiem genarum: item insignita ac liuida (generum suggillationes, τὰ ὑπόμυα, Dal.) illita cum melle, maximè pontico. Tonsillas, gingiuas & omnia oris hulcera. Sanguinis excreationes, si modica sint, drachmæ pondere ex aqua: si minùs, ex aceto pota. Venerum quoque sanguinem, & vndeunque fluentem sistit per se, vel ex aceto. Aliàs est etiam vulneribus vtilissima, ad cicatricem perducens. Eadem inaspergitur exulceratis genitalibus virorum, condylomatibus, timâque sedis, aliàs ex vino, aliàs ex passio, aliàs sicca per se, vt exigit mitiganda curatio aut coëcenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit. Disenteriz infunditur. Et si difficilis concoquantur cibi, bibitur à cena modico intervallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur & pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, vt quod sit arenosissimû, subsidat. Aut torretur in testa, penâque subinde versatur.

verfatur, vt poffit æqualiter torrerī. *Et hæc Plinius.* Quod autem dicit Aloën inter torrendum pennâ verſari, inſtrumentum omninô ineptum indicauit. Contrâ aptiffimè Dioſcorides myſtrû ad hoc vſurpari dicit, & *μύστρον μεταβάλλει δας* ait. Eſt autem *μύστρον*, ligula, quam Germ. *Einkelle* vocant. Porro quod dicit Plinius, fuere qui traderent in Iudæa ſuper Hieroſolymam, metallicam eius naturam; ſed nulla magis, &c. Dioſcorides de Aloë non habet, ſed Aloën foſſilem in Iudæa naſci, Nigro falſò dictum eſſe.

De Aloë diuerſos Galeni libros legenti, videbitur ipſe quibuſdam in locis ſibi maximè conſul. tradicere. Quandoquidem 8. de comp. medic. ſec. loc. vbi de Hiera agit, quæ ex Aloë paratur, maniſeſtè aſſerit, Aloën vim habere purgatoriam non à modum valentem, & proinde non niſea purgare, quæ circa ventriculum & aluum continentur. Etenim, vt ipſe inquit, eſi quandoque ampliori pondere exhibita, vſque ad locos circa iecur ſe diffundat: non tamen totius corporis purgatoria Aloë exiſtit. Atqui contrariò modo ſcripſiſſe videtur l. de Ther. ad Piſonem, vbi aptiſſimè ſcribit, Aloën vniuerſum purgare corpus, his verbis Aloë atque etiam æris (quæ ſupercreſcentes in vlcibus carnes cohibent, & fluxiones quæ illis adueniunt ſubinde exſiccant: aſſumpta verò per os, vniuerſum corpus purgant. Hæc ille: Quæ quidem illis maximè repugnare videntur, quæ de Aloë priori loco citato ſcripſit, ac etiam 6. ſimpl. med. vbi Aloën inter ea medicamenta reponit, quæ Græci ab excremento ſtercore, *ἐκσπρωγνικὰ* vocant. Aloë herba, inquit, non admodum apud nos prouenit: & quæ naſcitur in magna Syria, aquoſior eſt, & facultatis imbecillioris: at tamen vique adeò deſiccare poteſt, vt vulnera glutinet. At in regionibus calidioribus, qualis eſt Cæloſyna & Arabia, meliò eſt melior.

Optima autem Indica, cuius liquor eſt id quod ad nos importatur cognominatum Aloë, medicamentum ad plurimàs res propter ſiccitatem mordicationis expertem (intrò ſumptum, foriſque applicatum, quod paucis medicamentis contingit. Vide Alexandrinum in Gal. cap. de Aloë) vtile. Eſt autem non ſimplicis naturæ, ſed, vt eſt indicio gultus, adtingit ſimul, & amara eſt: adtingit quidem modicè, ſed fortiter amara eſt. Subducit & ventrem, vt puta ex numero medicamentorum Ecceprotritorum. Eſt autem tertii ordinis exſiccantium: caſfacientium autem, aut primi intenſi, aut ſecundi remiſſi. Sed & ipſius facultatis miſturam atteſtantur particularia eius opera. Nam & gratum ſtomacho medicamen eſt, vt ſiquid aliud: & ſinus glutinat. Sana & vlcera, quæ ægrè ad cicatricè duci poſſunt, & maximè quæ in ano ſunt & pudendo, luuat & eorum phlegmonas aquâ ſubaſta, & vulnera eundem ad modum glutinat. Congruit ſimiliter videnti & ad phlegmonas in ore, ac naribus & oculis. In ſumma repellere & digèrere ſimul poteſt, cum hoc vt paulum extergat, quantum videlicet vlcibus puris non ſit moleſtum. Hucaſque Galenus 6. ſimpl. Idem 3. ſimpl. dixerat Aloën totam aut parum, aut nihil purgare. Et hinc lic. 8. de comp. med. ſec. loc. antè citato hæc ſubdit: Ad ventris ſubductionem illota Aloë eſt aptior: ciota autem multum de medicamentoſa vi amittit: quam etiam febricitantibus dare aliquis poſſit, ſi febris ſit valde mitis. Infeſtiſſima autem eſt Aloë, vel lota: iis qui circa vitioſos ſuccos intemperie aſſiguntur calidâ &

ſicca. Proximam ab his cladem percipiunt, qui ſiccâ intemperiem habent, vel frigidiſſi etiam implicatam: & in vniuerſum, qui ex ſola qualitate particulam aliquam aſſectam ac læſam habent, &c.

Diu autem multumque agitata eſt quæſtio: An Aloë venarum ora aperiat, necne. Sunt autem qui negatiuam tucatur, ſunt & alii qui cum Meſue aſſumatiuam amplectentur, concludantque aperire. Quod quidem miſum videri non debet in multiplicium virium medicamento, ad tertium vſque a temperamento reſeſſum, ſiccò, & ad ſecundum calido, terreſtriſque, ſi adapericiatium quoque, quæ anatomaticæ ſunt, facultatem aliquam retineat, intus à calore noſtro ad actum cum deductum, vt, quod foris acria multa faciunt anatomaticæ facultatis, intus ipſum, ignea concepta vi, & acrimonia, faciat, venarumque oſcula aperiat, proleſto ſanguine.

Huic autem ſententiæ etiam Fallopius ſubſcribere videtur, cuius verba hic ſubdimus. Meſues inter benedicta vocata medicamenta, eò quod leuiter euacuent, vel ſaltem moderatam habeant vim purgatoriam, & nullum incommodum, moleſtiæque nihil afferant, Aloën recenſet. Eſt hæc duplex in officiis: vna quæ ſuccus eſt, & Aloës ſimpliciter dicitur: altera verò lignum, de qua alibi. Eius, quæ ſuccus eſt, varia genera nouere Antiqui. Et Meſues primò quatuor differentes ſpecies, ratione loci, vnde deferreſatur, cognouit. Harum prima, erat, quæ ex Succotti regione deferreſatur: Altera ex Perſia: Penultima ex Armenia: Poſtrema ex Arabia. Auicenna autem & Iſaac nouerunt tres tantum ſpecies, Succotinam, Arabicam, & ex Senegia delatam. In officiis ſicè Fuchſius & quidam alii duas tantum Aloës ſpecies nouerunt tres habentur, Succotrina, Hepatica, & Caſballina. Succotinam decurtatâ voce ait Fuchſius, appellatam, quaſi Succotinam, à ſucco citrino: ſed decipitur. Nec enim à ſucco, ſed natali loco, quæ eſt inſula Succotia, denominatur. Eius nota vna inter præſtantioreſ eſt, vt ſit ſaporis in principio ſubdulcis, in fine autem amareſcentis, auctore Meſue, quod mirum eſt. Nam Galenus, Ruſſus, Paulus, & reliqui aiunt Aloën omnem ita amaram eſſe, vt nihil ſit amariuſ. Aſt ego horum ſententiæ adſtipulari non poſſum, quia

Abſynthium, Colocytidem & alia quædam, Aloë amariora eſſe credo. Sed ſat eſt quod Aloës ex communi omnium conſenſu ſit inſigniter amara, & in principio, & in fine, contrâ quam Meſues aſſerit. Variè hæc purgat. Nam ſi Ciceris vniſus quâritare (doſi vniſus ſcrupuli) & poſt cibum exhibeatur, euacuat tantum fæces. At ſi vſque ad vnam drachmam offeratur, euacuat à tota ſuſtantia bilem ex primis venis, vſque ad hepâr, quod viſcus ſua facultas tamen non excedit. Porro tantum bilem, non autem craſſos, viſcidos, & frigidos humores euacuare, perhibet Galenus 8. comp. med. ſec. loca. Meſues tamen & Ruſus vir Galeni antiquior apud Oribasium etiam pituitam purgare teſtatur. Sed omnes meâ ſententia rectè dicunt. Nam Aloës ex ſe, i. e. ex ſua natura & ſubſtantia euacuat bilem tantum, vt vult Galenus, & alii non pauci, teſte experientiâ. Sed euacuat etiam humores craſſos, viſcidos & tenaces, quâdo ſe tales humores ſunt in cauitate vetriculi, vel in teſtinoſi. Amara ſiquid eſt & detergit. Hoc autem inter cetera habet Aloës incommodum, quod correptione egeat, correptione hepatis

Anquiritur an Aloë ora vniuerſum aperiat.

Aloë medicamentum benedictum

Fuchſ. 172.

Aloë non eſt omnium amariff.

Meſues & Galenus cōſentiantur.

noceat, calfaciendo & aperiendo ora venarum, existentium circa sedem, vt ait Mesues & alii multi, quos tamen alii accusant, vt qui Dioscoridi aduersentur. Sed pro Mesue rursum insurgit Fuchs, & alii. *Ego vero* ab experientia discendum non iudico, ed quod habeam ipsam dirimentem hanc litem. Docet hæc autem, quod frequens Aloes vsus, hæmorrhoidarum venas aperiat, quod ego millies obseruaui, & vos excentum eorum qui Aloes ad excernendas fæces vtuntur, videbitis nonaginta hæmorrhoidarum fluxum pati: omisso verò Aloes vsu, venas illas claudii. Cur autem Aloes aperiat ora illarum venarum, equidem credo, quod à tota substantia id faciat: non autem quia tardè euacuet, & continuè ac lentim deorsum descendat, vt quidam volunt: quia & alia, quæ tardè euacuant, vt Mirobolani & Terebinthina idem facerent: Nec aperit venas illas adstringendo, quia multa alia etiam pharmaca cum adstringant, idem præstarent, vt Mirobolani & alia non pauca. Itaque credo quod à tota substantia aperiat venas hæmorrhoidales. *Ne igitur* id faciat, oportet commiscere, vt dicit Mesues, Mastichem, Gummi Tragacanthæ, Bdellium & similia. Corrigitur etiam hoc incommodum si Aloes abluatur aqua Endiuizæ, quæ ablutione redditur etiam minus purgatorium.

A tota substantia.

Io. Iuuenis in annot. in Galeni lib. de Theriaca ad Pilonem statuit Aloem adstrictione suâ humores quos attingat depellere ac purgare. Malim ego cum Fallopio purgandi vim præter proprietatem, amaritudinem potius quàm adstrictioni, attribueret: amara enim, non adstringentia, detergunt.

Aloes species dua Ruell.

Ruell. Aloem Caballinam & Succotrinam solam agnouit, volens Succotrinam iocinotis modo esse coactam. Gesnerus præfert è tribus speciebus Hepaticam, asserens Aloes plantam in Germania esse inspidam, in hypocaulstis verò suspensam, amarescere, virereque ac viuere. Amarus Succotrinam cæteris antefert, iocinotis modo concretam, ruffam, splendens, &c: La cuna narrat Arabes meliorem Aloem & puriorè reliquis, Succotrinam vocare: bonitate secundam, Hepaticam: malam & adulteratam, Arabicam. Succotrinam ex se distillare, ideòque qui magnâ copiam colligere desiderant, solere argillâ solum optimè inducere, ne à terra imbuatur. Apollo testis est Succotrinam cognomento præferri, optimamque ex Aegypto conuehi, vtrum particulis, globulis ac arenulis interdum viciatam, vt pondere incautos fallat. *Sed antiphaebus* malè itradians, ait Mesuem optimam celsere Indicam, posthanc Persicam, tertio loco Armeniacam, Arabicam ignobilissimam, quæ tamen multò melior est, approbante Galeno.

Apollo malè.

Garcias verum agnouit.

A Garcia immeritò reprehenditur Brassauolus: quasi negaret Aloem esse amaram: non enim negat hic simpliciter Aloem amaram esse, sed in Europa amaritudinem amittere. Plures etiam id cum Brassauolo asserunt.

Centur. Læmonia.

Cum autem nobis præ reliquis in Aloes translatione satisfaciatur Garcias, plurimos, qui in illa occurrunt soluat nodos, atque multum afferat lucis, rei reliquum ipsi committimus. Sic autem ille. *Succus* hic non extrahitur in quadam duntaxat vrbe, vt ait Lacuna: sed per totam insulam, quæ nullis vrbibus exculta est, pagòsque duntaxat habet cum multis gregibus: neque laterculis ad excipiendum succum subternitur pau-

mentum, vt idem auctor est, quandoquidem in tota insula non est tanta polities. Nec audiendi sunt, qui succum ex superiori plantæ parte profluentem, ed qui mediâ, aut infimâ parte profluat, præstantiorem faciunt: siquidem omnis succus bonus est, & arena caret, si adhibita diligentia extrahatur. *Præterea* non adulteratur: nimia etenim eius est quantitas: sed quòd incolæ negligentiores sint in auferendis sordibus, quas hic succus secum trahit: alius alio peior videtur. Hanc ob causam minus adhibenda fides est Dioscoridi & Plinio, qui eam gummi & acaciâ adulterari scribunt, cum exigua sit is regionibus Acaciæ copia: imò nulla, quemadmodum à viris fide dignis accepti. *Illud* verò Aloes non negauerim, quin translatum à his in regionibus adulterari possit. Porò quòd laudatissima sit quæ in Socotora nascitur, non solum vulgari fama, sed à celebribus viris accepti, qui còperunt se habere aiebant, Aloem quidem plerisque aliis Indiæ locis nasci: facillè tamen dignosciam quæ in Socotora nascitur ab ea quæ à Cambaya, Bengala, aliisque locis aduehitur: Socotorinæque pretium quadruplo maius esse, illius quæ aliunde adfertur pretio. *Nec eius* plura sunt genera, vt volunt Arabes, sed vnicum duntaxat, tametsi varia illi indant nomina. *Quod* verò Dioscorides & Plinius scribunt laudatissimam ex India adferri, alii verò ex Alexandria, aut Arabia non simpliciter id intelligendum est, sed de ea quæ ex Socotora primum in Indiâ delata est. Nam etiam ex Cambaya & Bengala defertur Ormus, Adem, & Gida. Itaque minus male Mesue, qui vnum Aloes genus ex Socotora adferri scribit, aliud è Persia, tertium ex Armenia, quartum ex Arabia. Nam quæ in Lusitaniam defertur, ea ex Socotora allata est. Alexandriam autem à quibusdam præferri hinc factum est, quòd pleraque aromata Ormus deferrentur, inde Batora, Adem Gida: inde camelis Saez, & Alexandriam, vnde Veneti petentes, ea reliquæ Europæ communicabant: non autem quòd in Alexandria fiat Aloes. Nascitur verò non modò in maritimis, sed etiam desertis Indiæ locis, Nullum eius inueniri gummi certum est, sed interdum aqua quædam viscida è foliis stillat, neglecta, & nullius efficaciz. *Huius vsus* est non modò apud Arabes Turcòsque Medicos, sed etiâ apud Indos in purgantibus medicamentis & collyriis, cum etiam in vulneribus carne explendis: in quem vsum plerumque in suis officinis medicamentum habent, cui nomen *Mocebar* ex Aloes & Myrrha paratum, quo etiam plurimum vtuntur in equis curandis, & vulnere lumbricis necandis. *Medicum* vidis magni Sultani Badur Regis Cambaya, ipsâ herba Aloes vntem pro medicamento familiari, in hunc modum. Folia Aloes concisa cum sale coquebat, eius decoctio octo vncias propinabat, quæ aluum sine molestia & nocumento subducebant quater aut quinque. In vrbe Goa Aloem probè tulas & cum lacte mixtam propinquant iis, qui vlcere renum aut vesicæ laborant, vel qui purulentas excernunt vrinas, non sine magno successu & ægrotum còmodo: nam illicò curantur. Illius vsus etiam aucupibus notus est, qui contracta auium crura eâ conglutinant. In India similiter maturandis phlegmonibus idonea. *Quamobrem* ballocinari mihi videtur Matthiolus qui Aloem ad spectacula potius foveri [in Italia dixit non in India] asserit quàm ad medicum vsus. Quòd verò Mu-

Alaen. prim.

Alaen. xxi.


Alaen. xxi.

sa negat Aloen herbam amaram esse, magis mirum: nam sæpè degustatam admodum amarā inueni; quoque vicinior pars erat radici, eò amarior mihi vis est; extrema autem folia amaritudine carere mihi videbantur. Tota planta viroso odore prædita est. *Cateris*, quoniam controuersia est inter nonnullos auctores, debeantne ea medicamenta quæ Aloen accipiant, ante cibum sumi, an verò secūdum cibum, & an illicd à cibo; pauca visum est hic adiciere. Galenus [Galeno adscriptus ad Paterniacum, Clus.] eis quinque capotia exhibet (tria grana Ciceris magnitudine dat post cœnam, Clus.) & bene quidem, quoniam hæc ratione capitis dolores sedat. Plinius autem lib. 27. cap. 5. efficaciorē esse, si potā eā sumatur cibus, modicus vi telicet & boni succi; quæ ratio multum mihi probatur, eamque sequuntur Indiæ regionis Medici. Cum enim Aloe medicamentum sit debile, non euacuabit, nisi statim vires confirmetur modici cibi eiusque boni succi sumptione, vt eo digesto melius euacuare possit. Paulus lib. 7. cap. 4. contrā, manē sumendam præcipit, eosque reprehendit, qui eam à cibo exhibent: corrumpit enim, inquit, cibum. Sed idem rursus lib. 3. cap. 43. Aloen post cibum quoque exhibet, quam controuersiam Nicol. Rorarius in suis contradictionum veterum auctōrū libris conciliat. Singuli autem suis nituntur firmis rationibus & auctoribus. Manardus alique Recentiores multi acerrimè in Mesuen, Serapionem & Auicennam inuehuntur, quod affirmauerint Aloen venarum oscula aded referare, vt inde postea sanguis faciliè fluat, eamque ob causam hæmorrhoidibus non conuenire: deinde quod scripserint melli admixtam minùs purgare, minusque stomacho noxiam esse, quàm reliqua purgantia medicamenta. Dicunt enim Manardus & huic similes, Aloen non modò non appetire hæmorrhoides, sed eas potiùs obstruere: neque rectè scribere Mesuen, qui illam stomacho minùs noxiam faciat, quandoquidem huic sic admodum volis, nec nocumentum aliquod adferat, nullique admixta magis euscuet reliquis purgantibus medicamentis. Priora confirmant Galeni auctoritate: postremò verò, quod mel, cum sit purgantis facultatis, alteri purganti adiunctum necessariò magis debeat purgare. Rectius Musa, nullius in verba magistri iurans, Mesue opinionem confirmat, sæpius expertum se esse affirmans, Aloen hæmorrhoidas aperire. Et faciliè hoc præstare potest ob amaritudinē. Quod verò oscula venarum obstruere afferant, cum Iacobo de partibus respondeo, foris quidem adhibitam adstringere, intrò autem sumptam aperire. Ad ea, quæ obiciunt de melle, Mesuen videlicet asserere, Aloem cum melle mixtam minùs purgare, sic responsum volo. Quandoquidem vtrumque medicamentum purgatoria facultate prædictum est, validioris facultatem, debilioris, mellis sc. facultate infringi: Sic etiam stomachum roborat & firmat accidentaliter, euacuando videlicet sine nocumento, aut eo certè perexiguo, humores, qui ventriculū infestant. *Plinium* mirari fuit, qui Aloem metallicam inueniri tradit. Ego non modò medicos Iudæos, sed etiam pharmacopolas, Hierosolymarum incolas diligenter interrogavi de Plinii loco. Sed illi negabant vnquam fuisse repertam huiusmodi Aloē tota Palestina. *Hastennus Garcias*. Non affirmat autem Plinius, talem inueniri, sed fuisse ait, qui traderent in Iudæa super Hierosolimam metallicam eius naturam.

Tom. III.

ALOE AMERICANA MVRICATA.

CAP. XII.



Longè maiorior est *Descriptio*
foliis, bicubitalibus; cainatis, repandis, duplò crassioribus, in longum præacutis, rigidis, rectis; aculeum delinquentibus, per ambitum rigidis quoque, sed aculeis aculeis muricatis.
Aloe Americana. Dod. Clus. Hist. & histor. Cast. Camer. and Matthioli. Hist. Lugd. Tab. & Eyst. Synon.

Aloe in Pisano vieto, Lob. in Adu. Aloe folio mucronato, Eid. in Obs. p. 202. Icon. pag. 374. & Gerardo: Aloe spinosa Camer. hort. & Schvæckf. Aloes alterum genus nuper ex India occid. allatum, Carl. Aloe Maguei Mexicanum, Bry fratibus: Aloe 2. siue folio in oblongum aculeum abeunte: Aloe Acoftæ: Allagucy Indorum, *Ely Agulla*, id est, Filum & Acus Hispanorum, spinis venenatis, Trag. America planta Aloes facie, Column. Manguey mexicanum, alio nomine Metl. Linsc. Part. 4. Ind. or. fig. 19. Manguey arbor, ex qua parantur aquæ, vina, oleum, acetum, mel, syrapi, fila, acus, & res aliæ infinitæ, in noua Hispania, quarum plerumque vnam domibus suis, ad vitæ sustentationem cōstitam, colunt, & c. part. 9. Ind. ocid. lib. 4. cap. 23.

Circa Mexico, tanta copia nascitur, quemadmodum apud nos vitæ: facit florem, & semen. *Locis.*
Eam cadere solēt antequam nimium adolescat: tum enim radix crassior fit, quā excavatā quidam *Liquor* colligitur, qui Serapii modo illic densatur: is aliquantulum coctus mel fit; depuratus *Saccharum*; dilutus *acetum*; & addito *Ocpathi* (radix ea est, quam ob eius præstantiam, Vini medicinam nominant) *vinnum*, illis quidem in vfu, sed parum salubre: etenim valdè caput ferit & inebriat: nullum autem cadaver, aut impura sentina aded fœtet, atque illorum anhelitus, qui eo vino inebriati fuerint. Ex huius germinibus & tenellis foliis, fit *conserua*. Foliorum prunis assatorum *succus*, recentibus vulneribus aut vlcibus instillatus, breui ea curat. Germinum & radicum succus cum Absinthii illius regionis succo mixtus, viperarum moribus viriliter instillatur. Illius foliis paratur *charta* in vsum vulgarem sacrificiorum & pictorum: & ex iis [Linii aut Cannabys modo paratis videlicet] fiunt *alpergates* (calcei genus Hispanis admodum famulare ex funiculis contextum) storceæ, *chlamides*, *cingula*, *capistræ* & *fines*, denique sunt illis cannabinum filum. Horum foliorum culspides aded firmæ sunt & acutæ, vt illis *acus* aut subulæ vicem præstent, eas cum fibris extrahendo.

Itis spinis sacerdotes illius regionis in sacrificiis.

M m m m

ciis se pungere solent, etenim cuspis non infringitur, & satis altè penetrat exiguò foramine factò. Ex hac planta ignem struunt, & eius cineres parando lixiuo idonei: truncus ligni locus est, folia vero regularum aut imbricum. *Hactenus Gomara.* Veneram luem hac planta Americanos curare solitos tradit Clusius. Ac ex huius foliorum fibris reticula contexta, vt & indusia exiis parata Hispani venalia inueniri.

GRANAL HOLANDORVM, INTER
Aeizoa reponenda.
CAP. XIII.

EX Indiis in Holandiam aduecta herba, propter nouitatem & virtutem à multis experita. Nutritur neque in terra, neque in aquis, neque in aere, sed in domibus suspensa, iuxta ignem aut longè ab eo, prout libitum fuerit. Holandi Granal vocant patrio idiomate, quod perpetuò virentem significat. Propagatur hoc modo. Ramus aut furculus digitis frangendus, nec villo ferro secandus: cum terra pingui & argilloso oleo imbuta inuoluendus, ita vt summities sese exerat. Argilla seu terralinteò inuoluta funiculo trabibus appendatur, vt cauliculi prominentes deorsum spectent. Ita nouos ramos proferent, latos penè, pollicem ferè crassos, longitudine sequepedali. Semper virent, sed foliis orbi. Perpetuò noua protrudit germina & furculos, vtilis arcentibus. Hæc herba nec florem fert, nec fructum, nec vllum semen. Succus eius venenatus putatur. Raritas eius merebatur narrationem historicam, quanquam nulla ex ea vtilitas horis. Ex theatro agriculturæ Oliuerii de Serres, qui eam terræ tuberibus & fungis accensuit. An fortè Aloes Americana, Oliuerio non bene nota?

CALI VULGARE.
CAP. XIV.

Planta est bicubitalis, latè se pandens, nullis spinis horrens, intensè rubens, diuisa in ramos rectos, crassiusculos, cubitales, in quibus folia, infima quidem palmaria, angusta, pingua: superiora, minora quoque magis ad summum scapum nascuntur, breuiora, incurua, ex lato principio in mucronem ferè desinentia: iuxta quæ veluti capitula, Tragi Matthioli capitulis similia, sed non aculeata, in quibus semina limacibus siue cochleis similia: sapor totius plantæ salus, ingratus: annua planta.

Kali Mauritanorum, aliqui ad Anthillidem Diotcondis: alii ad eiusdem Tragon referunt, quibus merito contradicit Matthiolus, & Dioscorid. donatus.

Kali magnum (& Italis Soda in) Obs. Sedi medii folio, semine cochleata dicitur Lobelio. Amatus Barrilham Valentini vocat: Dioscoridis Telephium falsò Leoniceus, vt idem annotat Amatus. Vñen Auicenna & Serapio. Kali Empetron Bap. Montanus, sed perperam.

Matthiol. in Dioscor. l. 2. cap. de Attiplice, Kali titulo, insignè figmentum, tribus plantis confans, exhibet, confundens turpiter hanc plantam, cuius ramulum pingit, cum Salicornia, & Cali minore arborescente vermiculato.

Kali appellatur à Dod. lat. Cast. & Matthiol. Herba Kali à Bellon. Obs. l. 2. c. 25. & 35. Kali magnum Penz. H. Lugd. p. 1377. Kali Dalechampi,

ab eodem p. 1378. Kali cochleatum maius Carmer. hort. Kali species, ab Eod. apud Matthiol germ. Kali t. siue maius cochleato semine, C. Bauh. phyt. & pin. Anthillis Salsola appellata, Corn. Anthillis Græcorum, Kali Arabum, de la Soule, Bellon. Obs. lib. 2. cap. 24. Anthyllis prima ab Italis Salsola & Stercus passerum, Cord. in Diosc. Herba vitri, Fontano lib. 2. c. 5. Salsolæ genus vulgò ligarum vocatum, Cæsalp.

Ad lacus salos Monspelii satum vidimus, vbi Leon colunt diligenter ad sal Alkali conficiendum: Temp. mense Augusto ad mare Monspeliense coaceruant in eundem vsum conspeximus. Vere autem prouenit. Sapor & forma seminati in hortis nonnihil mutatur, vt obseruauimus in hortis meis Geneuæ, Lugduni, & Basileæ. Notioem tradunt Aduersaria in maritimis Gallie Narbonensis, tum spontaneam, tum satam: minus obuiam Septentrionalibus, inò usquam ferme.

Ex Cali autem constari sal Alkali nobis referebant constatores ipsi, hæc ratione: Scrobiculo effosso propè mare transversim assulas ligneas imponunt, quibus superaggerunt cumulatum herbam prædictam, ex qua accenso igne stillat in subiectam scrobem liquor, qui tandem conrescens, fit sal alkali coloris partim nigri, partim cinericei, valdè acre & catharteticus, salum. Et saxum hoc Kali vocatum, vel Sode ad vitrum conflandum aptum in Italiam, inque Septentrionem ex Gallia Narbonensi & Aquitania deferunt.

CALI PARVVM HIRSVTVM.



EA quam Cali hirsutum voco, plantula est Monspelii ad mare Cali minori nonnihil similis, ramosa, succulenta, altitudine ferè pari: ramulis multò breuioribus, nec ita rectis, sed incuruis: foliis nonnihil breuioribus, crassis, succulentis, salis: tota planta albicante lanugine canescens, Cali minore mollior.

scens, Cali minore mollior.

An C. Bauhin. in pin. Kali 4. siue minus villosum, in prodromo Kali primum? Kali gramineo folio etiam tradit, quod ipsi 2. in prod. 5. in pinace.

CALI ARABICVM.

CAli minori nostri haud absimilis est planta: denso prodit colicorum agmine, in varios furculos graciliores diuisorum: quibus summo tenus capitula hærent penitus repleta: sub quibus angustissima acuminatæque sunt foliola, formâ & viribus Cali minoris iam dicti, cum leui quadam acrimonia, infernâ patte penitus alba,

ba, superat cinerea, inquit Rauvvolf.

Dicitur autem ei Kali i. Arab. eis Vñen ditum, incolis Schinan. Kali Arab. i. genus Hist. Lugd. p. 19 in app. Kali 4. Caisp. Bauh. phyt. Kali 6. Eid. pin.



Iuxta Tripolim copiosissimum observant Rauvvolf. cuius cineribus ingentes naues onustas Venetias transeunt ad saporem & alba vitra conficienda idem testatur.



perpusillis stipate per ramos scapos longa serie, singularibus plerumque & longioribus, vniuersusque finem implere globulo exiguo, Mili granum equante, qui vbi explicatur, apiculos ostentat numerosos luteos: semen exiguum, nigrum, lucidum compressum.

Dod. gall.

Anthyllis altera Dioscor. Borda Neotericorum, Anthyllis species Kali, vel Alkali. In fol. lat. verò sub Kali albo describit & depingit. altera Dodon gall.

Amatus vocat Anthyllidem crassam, suam sponte nascentem, Valentini Borda dictam & Anthyllidem Dioscoridis. Sed obscurum admodum est quod folia crassa ait. Sunt verò qui Caudam muris, propter quandam cum cauda similitudinem, vocent.

Matthioli eos errare contedit, qui hanc Dioscoridis Anthyllidem esse dicunt. Is autem hanc nunc cum Kali maiore & Salicornia confundit, pingens eam in summitate figure ad dextrum latus: In descriptione autem eius meminit his verbis: Vbi denique planta adulta senescit, folia in caulium cacuminibus longè minora exilio, aque conspiciuntur, colore rufo: ex quorum ortu pilule prodeunt rotundæ ac parvæ, quibus exile semen includitur.

Kali minus Rauvvolf Lob. in Adu. & Ic. p. 394. Synon. Hist. Lugd. pag. 1377. [ibi tamen sub falso titulo, Kali maioris Penè] & Eyst. Kali alterum seu minus, Camer.

C. Bauh. Kali 2. siue minus album: Eid. pin. Kali 2. siue minus album (habet & tradit etiam pin. Kali tertium, siue minus alterum. Semine splendente: Anthyllis altera Dodonæ, H. Lugd. p. 1380. Salsola quædam in maritimis, Cæs. alpin. Fallitur C. Bauhinus: Anthyllis altera Dodonæ Hist. Lugd. non est Kali hoc album, sed Medica marina, quam aliò referimus.

Montepelii ad mare cum superiore crescit, mē-Locus. se Augusto semine abundans. Non solum autem calidioribus regionibus hæc, sed etiam ad Septentrionem Angliæ, Nortmanię & Belgis familiaris, Lobelio.

Eosdem ad vsus, ad quos Kali magnum, sedulo vsus: colligunt coloni Narboneules.

KALI HIRSVTO AFFINIS, ANTHYLLIDIS fortè aliqua species.

TEnella etiamnum & adolefcentula est plant. Descrip. ta, radice tenui, simplice, palmatâ longiore, cœliculo duum vnciarum, statim supra radicem in ramo diuicato, tomentoso, quemadmodum etiam folia propter lanuginem densam cancellatâ, quorum ortus alternatus, ita interim vt ex eodē

M m m 2

CALI SIVE VERMICULARI marinæ non dissimilis planta.



R Ainaudeto maritimam ignotam Vermiculatam nō dissimilem hanc acceptam refero, radice longâ, & crassâ pro plantæ modulo, eaq; lignosa, ramis dodrantalibus, lignosis, gracilibus, nigricantibus, multifidis & versus radicem veluti in articulos distinctis: multis foliis ex inter-

uallis verticillatim ferè caulem circumstântibus, Vermicularis marinæ dimidio minoribus, ad Thymum accedentibus, canaliculatis. Hanc ex sicca describimus & depingendam curauimus.

An Lob. Obs. p. 207. Vermiculata exiliior, totaque minor altera, minus crebris foliis, retortibus, oblongis; & flosculis herbaceis Centinodii, ex viroto generosi Viri Brancionis oriunda?

KALI MINVS, SIVE SEDVM minus arborescens vermiculatum.

D Vris lignosisque ramis cubicalibus, interdū rubescentibus, aliis albidis fruticat, è quorum lateribus densissimè enascuntur propagines vnciales & sextantales, sursum spectantes, foliis Tom. III.

Locus.



puncto plu-
cula nascuntur,
quorum infimū
duplō reli-
quis maius,
Hysopi folio-
rum forma,
sed minus, mu-
rone obruso.
In arenosis
quibusdā iuxta
Romam colle-
git gener I.H.
Cherlerus.

CALI SPECIES SIVE VERMICULARIS
marina arborecens.

Locus.

Descriptio



Vermicu-
laris mar-
itimæ arbore-
scens, & Ai-
zoi maritimi
subfruticantis
nomine ex
Prouincia plā-
tam misit Ia-
cob. Rinaude-
us, cubitali-
bus, teretibus,
glabris, ligno-
sis foliis cin-
neri coloris,
fruticantem, in
ramos longi-
uculos didu-
ctis: per quos
confectum na-
scuntur folia
semuncia bre-
uiora, quædam

etiam vncialia, succulenta, Cali nostri hirsuti,
excepta hirsutie, similia, alternatim disposita, sa-
pore salso. Hæc planta habet multa, quæ cum
Caliminore conueniunt. Lobelii autem figu-
ram cum ramulo nostro pingimus.

Synon.


Anthyllis 4. siue Chamæpitydes frutescens
C. Bauhin. phyt. & pin. Anthyllis altera Chamæ-
pity similis, Cordi in Dioscorid. Chamæpity
vermiculata Lobel. in Ad. & Ic. pag. 381. Cha-
mæpity prima Dioscoridis Penæ & Lobelii, H.
Lugd. p. 1160.

Locus.

Fruticat maritimis littoribus, atque insulis An-
glia: & Zelandia:, nec non in squalidis campis
Arelaten inter & D. Aegidii oppidum, non pro-
cul à Rhodani fluentis vbertima perennans.

CALI SPECIES SIVE VERMICVLATI
fruticis varietas maior.

L Ob. Obs. p. 207. Vermiculatæ fruticis varie-
tas maior [ita in Ic. p. 381. etiam inferibitur]



An Chamæpi-
tys altera ver-
miculata Dios-
coridis? Den-
si conferti ra-
muli: sed quæ
maior, foliis
latis, densissi-
mè conferta,
denticulatis,
Vermicularis
acris, maiorib.
Item Obs. pag.
613. Erica Ale-
xandrina Italo-
rum, Sanamū-
da 3. Clusii. An
autem figura e-
ius hîc apposi-
ta competat a-
licui Cali Ver-
miculato asse-
rere nō auiam,

ob historiam per Lobelium obscurè traditam:
conferat obsecro lector figuram Lobelii in Ad.
p. 163. & descriptionem: Item figuram Obs. pag.
207. & p. 623. figuram Ericæ Alexandrinæ, cum
descriptione Clusii, nec inueniet quidquam cor-
respondens. Infani fuisse videntur pictores,
qui nihil simile pinxerunt, aut correspondens
Sanamundæ Ericæ Alexandrinæ dicte Cortu-
so, teste Clusio, quod oportuerat monuisse, & re-
iecisse duas figuras, vt planè inutiles.

H. Lugd. pag. 113. Vermicularis frutex maior
Lobelii. C. Bauhin. phyt. Sedum 21. siue minimū
fruticosum alterum: Eid. pin. Sedum minus 11.
siue fruticosum alterum: Cassia lignea: similis
frutex tertius, Cæsalp. An sic Chamæpity altera
Dioscoridis dubitant Lob. & H. Lugdunensis:
Selaginem Plinii Cæsalpinus suspicatur, & qui-
busdam Semperuium maritimum, & Vermicu-
lariam arborecentem dici.

CALI ARABVM ALIVD.



N Vmëro-
sis surgit Defe-
colentis, no-
dulis articula-
tis, instar E-
quiseti: radix
crassa, cine-
rea, lignosa:
Circa Tripo-
lim obuia.

Rauuvolff.
& H. Lugd. in Syno-
app. pag. 20.
Kali Arabum
secundum ge-
nus. C. Bauh.
pin. Kali 10.
[7. in phyt.] si-
ue geniculatū
alterum, vel
minus.

Cali geniculatum, siue Salicornia.

Salicornia dicta Dodonæo copiosissima apud
mare,

mare, frutex est sæpè cubito altior, rectus, sapore salso: folia non habet, sed ramos duntaxat teretes, densos, ut sunt folia Aizoi, Ceperæ, & similiù, densè geniculatos, pixida tim geniculo alio aliud excipiente, succellu temporis circa radicem lignescentes, quibus succedunt noui, crassi, virides, interdum intensè rubentes; in quorum extremitate flores parui, lutei, ex apicibus paruis constantes: *semina* non obseruauimus, nec radices.

Matthiol. hanc confundit cū duabus alijs pro Kali in Diosc. lib. 2. cap. 112. ilq; est ramus quem ad sinistram latus poluit, & sic describit, huic cū primū ē terra emergit, folium est tereti formā, immori Sedo non ab simile, ac deinde crescens, caule recto, geniculato, erecto: quæ sequuntur non pertinent ad hanc plantam, sed ad ipsam Kali de qua supra.

Kali herbæ, *Vluen* Mauritanis dictæ, Italis *Soda*, & *Salsola*, Gall. *Soede*, Camerariis apud Matthiolum plurima genera haberi tradit, è quibus quat or exhibet. *Mirum* interea nobis videtur, cur Camerariis apud Matth. verius Kali omiserit, cuius

tamen portionem Matthiolus pinxerat. Trium autem hic damus icones: quantum primo est affine.

Kali Anguill. & Leu. Lemnio, cui & Vermicularis, vel Crassula, vel Aizoon, vel Sedum maritimum. Kali geniculatum Tabern. Camer. Kali geniculatum Penæ. Hist. Lugd. p. 1378. (vbi & alia figura, mala tamē ex Matthiolo, Salicorniæ, & c. titulo.) Kella Egyptiorum species prima, & Kali primum, Alpino: Kali 7, huc geniculatum, C. Bauhin. phyt. Kali 9, siue geniculatum maius, Eid. pin. vbi differentias duas tradit, vnum simplicius & breuius, dodranci altitudine, rectū & anouum: alterum multis ramis fruticans, ligulosum & grandius, perpetuum: Haberi testatur Tom. III.

& rubrum & viride. Alkali Gefn. hort. & Lonic. *Trag. per.*

Dodon. gall. & lat. sub titulo Salicorniæ depingit, & pro Kali tertia specie describit, tametsi minus ad vsum expectatur. Gall. porro Tragi speciem facit: Lat. verò Kali articulatum à nonnullis nominari.

Salicorniæ siue Kali geniculati vermiculati inscriptione pingitur & describitur à Lobel. in Adu. & Icon. p. 395. Glossisp. Salicornia nonnullorum; Semperuium marinum Monspeli-notum. Anthyllis terria, Amato. Anthyllis constans veluti Tricici gravis Cordo obsylua. Salsolæ genus aliud, Vluen & Kali Serapionis, Cæsalp.

Mulè frequentissima ad quaslibet maritimas Locis, oras, tum Oceani, tum mediterranei maris, auctore Lobelio: Ego copiosam florentem viridi Monpelii mense Augusto, iuxta mare, & inde delatam habeo Montbelg. in orto: reposita per Hiemem durat.

Gustu ait esse Lobelius non infalso, nec temperamento, aut vsu dispari à cæteris Kali generibus, verum vbique neglectam. Calida & sicca est herba Camerario, & calidior ex eo confectus cinis, qui ad quartum qualitatis viriùs gradum accedit, viendis; & causticam vim habet. Comburuntur in cinerem hæ plantæ, quo liquefiunt contriti lapides ad patandū vitium. Lixiuum inde percolatum acerrimum & mordacissimum, addito oleo in saponem decoquitur ad ablundas vestes vtilissimum. Herba exigua quantitas intrò assumpta, viuas & menses potenter euocat, fortum ejicit, aquosos per aluum humores educit, hydropicos purgat. Eius nidore fugantur serpentes. Miscetur etiam cinis, quæ scabiei & curis fœditatibus illinuntur, meditentis: superfluam & excrecentem in malignis vlcibus carnem exest.

Temper.

Vires.

KALI SECVNDVM ALPINO.

K Ali altera species, *Synonyma* Kali album nonnullorum: plāta salsa, atque acris sapore linguam feriens, Alpino.

C. Bauh. pin. Kali 7. siue Crassule minoris folijs: Kali 2 species, Anthyllis quibusdam Alpini: Kali floridum repens, Aizoides Neapolitarum, Columnæ part. 2.

In Ægypto Locis, alitur, ex qua Vitis.

vri & alijs, combusta cineres sunt, ad vitra, saponem, & alia multa.

KALI ÆGYPTIAC. M 3. ALPINO.

H Ancum priore sub Anthyllidis secundæ genere reponendam censuit Guilandinus. *Anthyllis* M m m m 3



Alpino autem dicitur Kellu Ægyptiorum species terra, & h. Ægypti propin.

C. Bauh. pin. Kali 8. sive Ægypti. foliis valde longis, hirsutis: Kali tertia species Alpini.


V. us.



hilem exstam purgare. Idemque ex foliis expressum succum facere.

Ex tribus his Kali Alpini speciebus Sole in primis exsiccat & mox combustis cineres preparantur, qui illinc Venetias ducebuntur ad vitra, atque alla conficienda. Aiant multi illorum, folia tritum harum plantarum, sed maximè secundæ atque tertie Kalli in pulverem redacta, per os sumpta phlegma atque

TRAGUS SPINOSUS MATTHIOLI, huius Kali spinosum.



chleæ formam conuoluta, in vasculo, acutissimis rigidis spinis per oras munito: radix fibrosa, inutilis. Figura nostra ex Fuchlianis non vndique placet.

Matth. reprobo.

Lob. in Ic. p. 797. Obs. pag. 463, inseribit Tragum Matthioli, & Drypin Theophrasti Guilandini: In Adu. Tragum improbum Matthioli, Kali speciem spinosam, Scorpium Theophrasti: Matthiolum reprehendens, quod Tragum Dioscoridis vocarit, & cum Scorpio Theophrasti confuderit: negat enim Tragum Dioscoridis, & meritò.

Gefnerus contrà de hort. & Tragum Dioscoridis, & Tragum maritimam herbam, & Scorpium Theophrasti & Plinii vocat, ac Fruticem pusillum aculeatum, sine foliis. Ast non bene frutex sine foliis dicitur, sed herba foliosa.

Sunt & alii qui Tragum Dioscoridis asserunt. Sed Tragus esse non potest: nam in primis frutex non est, sed herba excedens cubitum, in multis diuisa ramos, per terram se spargens. Secundo, Tragus foliis caret: hæc herba autem folia multa habet, &c. Tertio, non habet illos veluti racemos: sed iuxta folia, veluti capitula spinosa, in quibus continetur semen conuolutum cochleæ instar, vnde factum ut cum primum hanc plantam intus essem, nomen Cochleiformis ei inderem: Postremò, adstrictionem non habet, sed salsa est, & potius aperitiua.

C. Bauh. pin. Kali 8. sive Ægypti. aut Kali 7. aut Diosc. & Plinii: Tragum 2. sive Kali spinoso Synonymis: Tragum Matthioli. Lac. Castr. de scr. Lon. & Tabern. cui germ. Meer Stachelkraut: & Scorpiophyllum. Tragus & Kali 2. genus Dodon. gall. Drypis Guill. Tragum Matthioli, Lob. H. Lugd. p. 1477. & Gerardo: An Tragum Cæsalpini?

Montepelii obseruari mense Septembri iuxta lacus salios quæ itur ad mare & in agris. In hortis sata degenerare videtur, foliaque progignere longa & tenuia, minus acuta & rigida, & crassa.

SAXIFRAGA ALBA, RADICE granulosa.

CAP. XV.



Radix ex plurimis bulbis, Coriandri seminis magnitudine, purpurantibus, amaris, fibris tenuibus inter se conuissis, constat, quam & aliis præterea fibris longioribus, crassioribusque sit donata: caulem proferit singularem nonuquam, aliàs ternos, quinos & plures, teretes, purpureos, hirsutos, ramulis

brachiatis: quibus insident flores albi aliquot, quorum non idem omnium tempus florèdi, quinis foliis constantes, staminibus luteolis & stilo viridi, odore nullo euidente: flores includuntur foliolis quinque viridantibus cum ora purpurea, hirsutis, & tactu nonnihil viscosi, cuius lentoris particeps est cum foliis caulis: folia ex pediculis vncialibus, & palmaribus, hirsutis, ferè rotunda, cristata, ad Hederæ terrestris folia quodammodò accedentia: pingua: eorum verò quæ in caule sunt, videas aliqua nullam dissectionem experta, integra, lanceolata, mucrone spadicæ: alia fimbriata quidem, sed non ita prope orbem complentia. Hæc nonnullis locis foliis est maioribus, altiusque exurgit: frequentius tamen minoribus est, & humilior, vel C. Bauhino teste, cum Dodonæo.

Tragus pingit & describit nomine Saxifragæ albæ. Gelin. coll. stirp. Saxifraga maior, seu alba: Item

ba item : Item Saxifraga granata. Eid. hort. Saxifraga alba : In cat. Calcifraga, *quæ rep. A-* pollinaris vocat *Steinbrech* : Galli *Rompipierre* & *Saxifrage blanche* : Belgæ *zwitsteinbreck* : Saxifraga, Lon. Saxifraga alba, Trago, Dodon. Fusch. ic. Gesner. hort. H. Lugd. p. 113. Thal. Camer. & Tabern. Saxifraga alba chelidonides, Lob. Adu. & ic. p. 612. Saxifraga alba tuberosâ radice, Clus. hist. Saxifraga 1. siue rotundifolia alba, C. Bauhin. phyt. & pin. Saxifraga, Bronf. rhap. 33. tomo 1. Saxifraga maior, Eid. in 4. p. 100. Fusch. & Lacunæ. Saxifraga 4. Matth. in comm. cum mag. fig.

Locis herbosis incultis, in montibus, collibus in Germania, tum & in Bohemia, gignitur Maio mense cum floribus reperitur, paulo post folia, caulesque inarescunt, relicti circa radicem granis, quæ tempestiue colligenda, alioquin & euania futura.

Saxifragam ab effectu dictam esse affirmat C. Bauhinus quod sc. eius tum stillaritia, tum decoctum, lapides renales & frangere & pellere dicatur, ut & farina granorum ad radicem, ex decocto sumpta. Grana hæc, & folia, ac radices, calida & sicca statuit Dodonæus, utriusque qualitis ordine secundo. Feruntur autem hæc, vesicæ ac renum vitii ac doloribus mederi : calculos dissolvere : urinas prouocare : stillicidioque auxiliari.

SAXIFRAGA AVREA DODONÆI.



Herbulæ est foliis multis figurâ terrestris Herbaræ minoribus, interdum maioribus, præsertim postquam defloruit, rotundioribus, succulentis, in ambitu laciniatis, & tring; hirsutis, superprema tamen & minora sunt, & utrinque glabra: gutta subacido, & amaricante, stypti-

cogue. *Pediculi* angulosi, solidi atque albi (interdum tamen rubescentes) ad terram villosi, quasi coliculi, assurgunt palmari & dodrantali altitudine, vel paulo altius in duos ut plurimum, tresve ramulos angulosos sulcatos diuisi: in quorum summitate super foliis *stipulis* terni aut quaterni lutei, floribus Ribes vulgaris simillimi, inodori, foliolis quaternis crucis instar collocatis, aliquot staminibus luteis in medio calathicæcum ambientibus: *femine* paruo, nigro: *radiculis* innititur longis ex albo rubescentibus, aliis crassiusculis: geniculatis, fragilibus, reptantibus, plurimis verò fibrosis, tenuitate capillari.

Saxifraga aurea, Dod. & Gesner. hort. Thal. Cam. Ger. & Hist. Lugd. p. 113. Saxifraga Romanorum Lobelii, Eid. p. 114. Item Saxifraga alpina. Saxifraga aurea Lichenis facie, & nata-

litiis, Lob. Adu. & Icon. p. 612. Saxifraga Sabauda, Rob. Constantino, qui cum Pileola Herbariorum, & natalibus, & facultate, multisque figuræ notis continere hanc scribit. Chrysoflemion, *Gulden Miltzkraut*, Tabernam. Erythimi species Aldroando. C. Bauh. pin. Saxifraga 3. (2. phyt.) siue rotundifolia aurea: hepatica palustris, Eyst.

German. *Gulden Steinbrech* dicunt: Belgæ *Gol-* den *Steinbreck*: Galli *Rompipierre*, ou *Saxifrage dorée*.

Humidis, vmbrosis palustribus, riguis, musco- *Locus.* sique obseruati locis, Maio & Aprili florentem, diuersaque gerentem folia, ita ut diuersas eius species quis existimarit.

Chrysoflemio saporem quem Licheni, ad- *Vires.* scribit Tabernamontanus: hinc existimant quidam facultates eandem habere, hepaticæ & lienis obstructions referate.

SANICULA ALPINA GUTTATA.

CAP. XVI.



Radix *Saniculæ* guttata est crassitudine minimi digiti, nigra, densissimo fibrosum bubarbitio capillata, sapore insigniter adstringente: *caules* hirsuti, reteres, & nonnihil tortuosi: *folia* rotunda, lata, pingua, hirsuta, albis per ambitum incisuris serrata, sic ut minima folia tanquam digittata videantur

sapore adstringente & subacri, alia à radice orta longis pediculis, palmariibus & sesquipalmariibus, hirsutis propter terram rubentibus, appensa: in caule, aut breui aut nullo pediculo donata: ex quorum alis pediculi semipalmares & palmares, tenues, hirsuti, infortâ ceruice prodeunt, in alios breuijores subinde diuidui: quibus insident flores raræ pulchritudinis, nullo excellentes odore, stellati, sex foliis oblongis constantes, albis, sanguineis punctulis guttatis: quorum singulorum medio *stamina* singula albida apprimuntur, & totidem foliis intericiuntur: vmbilicus bicornis in meditullio surgitur.

Gesner. hort. *Sanicula alpina*: Eid. de Lunar. *Saniculæ alpina* genus, *Sanicula guttata*: Item *Synon.* lib. 5. ep. ad Zvving. *Sanicula alpina* *Coryleodon* cognata. Io. Fabricio ad Gesner. *Sanicula alpina guttata* Clus. pann. p. 439. *Sanicula montana* siue *guttata* Eid. histor. *Sanicula montana* altera, *Saniculæ guttata* nomine Ferraria missa, quia eius flores sanguineis veluti maculis aspersi sunt. Montanorum pastorum & venatorum *Sanicula alba*, *vesicæ Sanikel*. *Dubitat* Clusius an easit quam Lobel. in Aduers. & Icon. pag. Garyophyllatam & Geum alpinum recentiorum

folio herbaceo inscribit. Et mirum sanè quid sibi velit Lobelius, planta enim hæc quam pingit Lob. cum Caryophyllata nihil habet commune.

H. Lugd. H. Lugd. Caryophyllata siue Geum alpinum Penæ: Eid. Coryledon tertia Dalechampi. Duæ effigies eiusdem stirpis.

C. Bauh. phyt. Sanicula 9. Eid. pin. Sanicula rotundifolia 2. siue San. mont. rotundifolia maior: Sanicula mont. altera Eyst. Sanic. alpina Cam. ep. guttatæ, Eid. hort.

Locus & Tempus. Genevæ eundo Lugdunum inter *S. Germain* & *Chaffillon* Sabaudia reperi florentem Maio & in principio Aprilis. Crescit in omnibus Austriæ & Stiriaë alpinis umbroso loco, h. e. ubi plerumque silvæ in alpium iugis desinere incipiunt. Floret lunio, interdum etiam feritibus in hortos verò translata, teste Clusio, multò maturius.

SANICULÆ ALPINÆ aliquatenus affinis.

Descript.



radiculis sparsis. capillaribus, drantalibus surgit caulibus, sine nodis, cauis, subhirsutis, superius in ramulos abeuntibus: quorum extremis hærent flores Saniculæ alpinæ guttatæ, quinque candelis constantibus foliis, apicibus cum bifido ambilico turbinato medium obtrinentibus, circûiectis toti

ridantibus: folia per terram sparguntur, subhirsuta, vnciam aut fescunciam longa, sensim dilatata, semuncialia, serrata, superiore potissimum parte crassiuscula, gustu adstringente.

Hanc reperi in rivulo fontis pulcherrimo, qui est in cacumine Vogesi montis dicti Balon ubi florebat Augusto.

An Saniculæ montanæ alterius species secunda, Clusii?

C. Bauh. in pin. vocat Clusii Saniculæ montanæ alterius speciem secundam, Saniculam rotundifoliam tertiam, vel Saniculam montanam rotundifoliam minorem. Nostra verò in prod. illi est Sanicula: siue montana minor.

OPHIOGLOSSON.

CAP. XVII.

Descript. Multis fibris & satis crassis cinctatâ, Ellebori modo, si præsertim pinguius nanciscatur solum, radice donatur, post dulcedinem quam primam linguæ ingerit, caloris & acrimonie non nihil in palato relinquens, & paululùm amarefcentis Camer. Hæc surgit pedicellus palmaris, folium singulare sustinens, Betæ parvæ quodammodò, pinguius tamen & carnosum, minimèque

neruosum, modò angustum & longiusculum, modò latum & subrotundum, læve, erectum, sapore



dulcisculo cū viscositate & virositate aliqua: è cuius sinu quâ pediculo committitur, ligula exiit, bifurcata, non tamen secta, in acumen sensim desinens, citra extremitatem, vtrique denticulata, scobinæ aut limæ aurifabrorum effigiatura. Seminis loco, inquit Camerarius, ei tenuis quasi pollen in linguæ infectionibus, quibus

per maturitatem dehiscit, excidit. Cæsalpinus ait esse vestigia feminis, ac semen nullum conspicuum contineri, vivere tamen radicibus, quibus copiosè propagetur.

Ophioglossum variare scribit C. Bauhinus: aliquando, inquit, folio est sinuato: ligula communiter simplex est, aliquando duplex, & etiam triplex, quemadmodum Camer. in Epir. Matth. pingit: est & abortivum à Lobelio in Icon. p. 809. pictum.

An Plinio lib. 24. cap. Lingua herba circa fontes nascens: siue Lingulaca, lib. 25. cap. 17. An Fab. Columnæ, Epimedio congener, id est Lunaria?

Dicitur Ophioglossum, Trago, Fuchsi, Dodonæi, Thal. H. Lugd. Cast. Cam. Tab. & Eyst.

Ophioglossum: siue Encephallum Lobel. Adu. Obl. pag. 471. & Icon. p. 808. ibi tamen Ophioglosson & Henophyllum legitur.

Gesl. hort. [ubi de veteri eius nomine ei constat] Ophioglossum Fuchsi, Henophyllum & Monophyllum: Italarum, præsertim Bononiensium [si non fallitur,] Serpentina: aliquorum (Belgarum, Dodon.) Lancea Christi, & Lucciola, vel Lucciola, quod noctu luceat. Eid. de Lunar. Ophioglossum Fuchsi, Lingua siue Lingulaca Plinii: & sic etiam in car. plant. vt & Occom in pharm. Lingua vulneraria, Gord. hist. & Cam. Lingua serpentina, Cæsi & Cast. Serpentina secunda, Bionelli. Echioglossum, Schwenck. φύλλον, Folium, Einblatt, Amato in Diosc. non quoad figuram, sed quoad descriptionem. C. Bauh. pin. Ophioglossum i. siue vulgatum.

Ophioglossum autem floris arguta cuspis, linguam serpentis extertam imitata, nomen imperpetuum, fictum quidem ex germanico, quod est lingua Natterzungen, & Schlangenzungen: Silesii tamen vocant Einblatt, aut Rechter Wiederthorn mit Zunglin: Belgæ Ons geeren Speer cryt & Natterzungen: Galli Herbes sans costure, Langue de serpent: It. Lingua serpentina, Herba inciola: Angli Adders tonge: Boh. hady jazky.

In humidis ac palustribus prætis vt plurimum provenit: nonnunquam tamen & in montanis occurrit. In hortis locis umbrosis posita durat & annua-

& annuatim repullulat. In Belgio, Germania, & nonnullis Austriæ & Italiæ locis, Aprili vel demum Maio mense prodit, & ad vlcq; Ionium quandoque viger: paulò post tota marcescit, nec deinceps vlcquam conspicitur. Euulsi radix contumax.

Fuchsiò, citra caliditatem exsiccat insignem, id quod gustus satis indicat: vulneraria est herba, maligna siquidem & curatu difficilia vulnera sanat. Tumores etiam discutit, & ferè Symphiti facultates obrinet. Dodonæus frigidum quidem, sed moderatè asserit: siccum verò temperamento ampliùs esse ait, ad secundum gradum videlicet accedens. Ad recentia vulnera conglutinanda conducere, & admirabilis esse efficacitæ, Bapt. Sardus scribit. Recentia folia vulnera mirificè conglutinant & enterocelas sanant. Datur poranda ex aqua Equiseti ad intrinseca vulnera: auxiliatur sanguinem reicientibus, pota ex aqua foliorum Quercus, quo modo & alba vteri excrementa sistit: decoquitur in vino austero ad collachrymantes oculos. Illinitur recens cum adipe gallinaceo ad vulnerum inflammationes. Succus illius apum idibus auxiliatur. Herba puluerem aliquot diebus exhibitum ramices omnes curare posse affirmat idem Sardus. Conficitur ex hoc Oleum, foliis cum oleo Oliuarum ad Solem diutius maceratis, quod non modò recentia vulnera & rupta, sed & vetera vlcera citè sanat. Laudatur & ad ramices exterius illitum.

Ophioglossum anguloso folio, C. Bauhini.

Ex radice crassâ, in fibras crassas abeunte, vnus vel alter pediculus, vncias quatuor longus, post medium dilatatus, effertur, cui *folium* vnicum, vncias tres longum, selquiunciam latum, ad exortum vtrinque dilatatum & angulosum insidet & stylum selquiunciale linguam referentem, pediculo donatum obtinet.

Helmstadio missum hoc *Ophioglossum angulosum anguloso folio*, quod i. in prod. 2. in pin.

Ophioglossum minus subrotundo folio, Einsdem.

Ophioglossum 2. in prod. 3. in pin. *radiculis* est fibrosis, *pediculo* simplici & breui, cui *folium* vnicum, subrotundum, vnciam latum, selquiunciam longum insidet: ad cuius exortum, & veluti è folij sinu, *stylus* serpentis linguam referens, vnciam longus, exit: in humidis circa Mospellum provenit.

EPIMEDIUM, EPIMETRON
& Epipetron.

CAP. XVIII.

Diosc. Epimedium caulis est non magnus, Hederæ foliis, denis aut duodenis, neque semen, neque flores proferens: *radicibus* tenuib. nigris gravi odore, gustu fatuo, seu insipido: nascens in aquis. Huius folia incisa, & cum oleo trita, mammisq; cataplasmatris instar adhibita, eas ita cohibent, vt non augeant. Et radix (sem partus admittit conceptionem impedit. Corn.) Et folia trita, postque menstruum purgationem quibus drachmis in vino pota quinque diebus præstant mulieribus ne concipiant. *Eadem & Plinius.*

Epimedio vis est [vt ait Galen. 6. simpl.] moderatè refrigeratoria, cum aquea humiditate: quæ Tom. III.

re nullam habet insignem qualitatem. Vberibus illirum ea rectè seruare potest. Aiunt verò si pota hauriatur, sterilitatem parere.

Theophrastus h. l. 7. cap. 2. inter plantas quoddam omni penitus flore carètes. Epimetrum collocat. Hoc autem Epimetron Theophrasti Geslin. in cat. pl. idem Epimedio Dioscoridis, Galeni, & Plinij esse suspicatur. Sed hæc coniectura, vt à nobis non probatur, ita nec impugnatur.

Plinius lib. 21. cap. 15. de herbis spontè nascentibus, quibus pleræque gentium vtuntur in cibis maximèque Egyptus, Acinon commemorat, Epipetron vocatam, quæ nunquam floret. At Turnebus hoc loco Aduer. lib. 6. c. 9. legendum putat Cynops. Dalechampius tamen (Acinos) nomen in Plinio retinendum censet, & vocem copulatiuam [&] interponendam, ita vt sensus sit, Acinos, & quam Epipetron vocant, &c. Ait enim in Theophr. l. 7. c. 4. in principio capitis Cynops nomen legi, & à Gaza Canariam reddi.

Rob. Constantinus in Lexico suspicatur apud Theophrastum pro *Ἐπιμετρον Ἐπιμετρον* legendum. *Ἐπιμετρον*, ait idem, cuius & meminimus Hippocrates, & Plinius planta est ex earum genere, quæ etiam solo aulicæ, suspensæque tantum, folio diu durant.

Quare Epimedium in Dioscor. appellatum sit, ignorare fateor, inquit Columba, nisi *ἔτι μᾶλλον*, quia in Media frequens oriatur. Apud Theophrastum Epimetron legitur, & pro eo in Plinio Epipetron. In Dioscoride legitur fructu carere, & forsitan hic *καρπὸν* fructum, pro semine usurpasse est censendum, non legitur enim in Theophrasto, nec in Plinio. Quare aliquo adiuncta hoc loco verba *ὅτι καρπὸν* censo existimanda: aut legi debere & interpretari, non semen, neque florem fert: atque etiam dici posset suspicatum adhuc esse eiusmodi lectionem: nam quælibet planta, priùs florem, deinde fructum, & semen perficere videtur.

Porrò, quæ planta sit Epimedium asserere non dum audemus: sed præstat forè etiam ignorari hanc malignam herbam, hominibus probis vitandam, si præcipua eius vis est ea, quam Dioscorides ei assignat, & post eum Plinius & Galenus affirmant, conceptionem impedire. Et talis vis lege non solum diuina, sed & humana videtur interdictus, & planta huius nota esset, impiis minime demonstranda.

Epimedi, Epimetri & Epipetri [vna scripta & non distinctæ plantæ Column.] æquiuocationes vt tradamus, reliquum est. Is autem nominibus sequentes donantur plantæ: sc. Lunaria minor. Trifol. hepaticum. Epimedium multorum. Mossus ranae. Ornithogalon maius spicarum. Caltha palustris. Acinosa. Ocymum. Anacampteros. Lens palustris.

LVNARIA BOTRYTIS.

CAP. XIX.

Fibrosa Ophrys *radice* prædicta, *pediculus* mittit vnicum palmarum, aut paulò longior, rem latiusculum, cui vtrinque quatuor, aut quinquæ, aut plures adherent coniugationes *foliorum* falcatorum, crassorum, gibbo inferioris conuexum excipiente: ex eodè pediculo ex infirmæ coniugationis sinu *surculus* prodit palmaris, succulentus, crassus: è cuius lateribus alternatim nascuntur pediculi racemulis onusti, tubam imitantes.

Columna sic describit. Exit ab *radice* tenui; Nnn

Epimetro
Theophr.

Plin. refert
tunc.

Theophr.
corrigitur.

C. dista
Epimedium.

Æquiuocatio.

Descriptio.

sub signâ, intus flavescente, repente, atque fibris diuisâ, folia edens rotunda, Hederæ formâ. Lævia, Soldanellæ marinæ similia, minora verò, terrij Sedi (Sedi echinari flore luteo) primis foliis ferè aequalia, quæ etiam Hederæ similia sunt, sed non ita crassa, atque molliora, singulari *cauliculo* ex opposito alternatim hærentia, densa, aut duodena, vel aliquando etiam plura pauciorâ: secundum loci anrique temperiem: è medio verò caulibus parum sub primis foliis producitur petiolus tenuis in summo plures edens racemos utrinque petiolo hærentes foliorum etiam numerum æquant, acinos habentes



congestos, paucos, virides, qui nec florem unquam edunt, nec semen ipsius habere conspiciuntur, sed pro eo pallido colore polvis tenuissimi, atque impalpabilis inuenitur, quo sato, an ex eo plantæ exeat, incertum est, sæpè quidem cum expertus sim nunquam ex re aliquid cognoui. Tota planta dodrantalis ad summum est. Radix gravem odorem terreum, putidumque remittit, gustu insipido aqueo. Hæc ille. Nobis autem degustata radix atque etiam tota planta subdulcis videtur.

Fuchf.
nos.

Fuchsio Lunaria hæc minor in caulis summitate semen Betæ simile profert. Quod quàm verum sit: ij qui Betæ semen in hac planta viderunt, testentur: nos nunquam id observauimus. Tragum quidem semen exiguum, copiosum: Gesnero sunt veluti semina quædam rotunda (sterilia, ut conicit, non solida, sed luteo polline plena) colore giluo. Marthiolos describit semine ruffo, rotundo, minutoque. Lobelius ait ramosum florem edere, Ambrosiæ aut Botrydis, conuexione quadantenus Ophioglossi.

Lunaria
petraea
Gefn.

Lunaria, quam petrazam cognominare libet (inquit Gefn. de Lunar.) ligulam habet, cui coherent racematim veluti semina colore giluo, per summum in spiram retortam, quæ fortè per maturitatem explicatur. Et fortè spira illa in causa est, ut à Luna sit impositum nomen, quod instar Lunæ crescentis incuruetur, sicut in Filicem generibus & Phylliride, cum folia primum crescant, radix simplex descendit, pluribus in imum adnatis: gustus è dulci adstringit. Pastores Tauram vocabant, vel Teram, quod vacca hac degustatâ, taurum requirant. Sunt in Italia qui Epioactin vocitent, quæ & Elleborine dicitur Dioscoridi. In agro Bernensi audiui nominari ab Empirico Cleum diaboli, h. e. *rensfels*: *schluffel*. Denique quod cum Luna augeri & decrefcere quidam putant, quis non fabulosum existimet?

Lunaria minor dicitur Chymistis, ab aliis Lunaria botrytis ob semen racemosum. Ferunt autem equos in montibus, ubi hæc copiosa proue-

nit, eam supergressos, aulhis ab ea clausis, suos ferreos calcæatos amittere, & ob id vulgò à nonnullis *Sferra cavallo* appellari. Sed perperam, vel Marthioli iudicio, quod alia sit planta, quæ vel ab ipso effectu legitime sic fuerit appellata, vel quod semen profert ferreis equorum calcæis simile. Magnificè hanc quidam, præsertim Chymici, eâ nque pluris ferme æstimant, quàm auro n. Sed quàm isti in suis vanis opinionibus deludantur, ipso magno sæpè suo damno experiantur.

Perelegantem hanc Lunariam racemosam, Ceterach foliis, racemulis Ophioglossi, antiquis indictam in A. I. herb. scribit L. belius: recentiores autem Lunariam vocasse perhibet, à foliolis Lunæ crescentis in morem subter falcatis.

Cæsalpinus Lunariam hanc minorem cognominatam, seu racemosam, Ophioglossæ affinem tradit: quia unico exit folio, incipiente A. tate, quod citò disperit: putat verò totidem habere folia, quot Luna dies habet: & inde Lunariam dictam esse: scribit enim incipiente Luna, incipere eius exortum, augeri que in dies foliorum numerum, particulatim explicat folio, ut in Pille.

Columna ait apud Theophrastum hanc plantam Epimetron vocari, & pro eo in Plinio Epipetron, & alibi, ut in Dioscoride, Epimedium, in aliis nomenclaturis Erineos, & Thyron, quia aquis gaudeat locis.

An veteribus cognita, ambigitur, inquit C. Bauhinus: aliqui Ceratium Plinij censent: quidam Tragium secundum Dioscoridis, quod in montibus folio Scolopendrij, radice tenui & candida nati scribit: nonnullis *ημιοειδής* & *αμμοειδής*, quia aliqui Hemionidæ Lunariâ maiorem vocant, hæc verò minorem & botrytem à plurimis racemulis utrinque thyrulo hærentibus & foliorum numerum æquantibus: Epipactis quibusdam. An *αμμοειδής* Dioscoridis, & Plinij E. imedium, quod fortè Theophrasti Epimetrum Lunaria hæc foliis est densis, vel duodecis: nouendecim in Baldo notant: quare putant aliqui totidem folia habere, quot Luna dies, vnde nomen habet.

Lunaria, Trago & Dodon. Lunaria minor Marthiol. Fuchf. Dod. gall. Gesn. hort. Lon. H. Lugd. Cxf. Ger. & Thalo. Lunaria racemosa, Lob. Obsp. 470. & Ic. pag. 807. Lunaria maior, Cast. Lunaria vulgaris minor, Clus. h. ap. alt. ad l. 5. Lunaria botrytis, Thal. Camer. hort. Col. & Eyst. Lunaria botrytis minor, Clus. hist. Ruta lunaria vel iecoraria, Tab. Epimedium Dioscoridis, Colum. *ημιοειδής* & *αμμοειδής*, Schvvenckf. Lunaria i. vel minor racemosa, C. Bauhin. phyt. & pin. An Lunaria nobilis, Fabricio in epit.

A foliis hanc plantam germanicè *Monfranten*, quasi Lunaticam Rotam dicas, & *Monfrant*, Lunarem herbam, appellare libuit: item *leber Rauten*, iecorariam Rotam, & *vveisser vviderthon*, *Recht vviderthon*, Silestis aliis nonnullis *May Arnyssum*: Brabantis *Cleyn Maerneyss*. Gallis *Tauve ou Lunaire*: Ital. *Lunaria del grappolo*: Boh. *vrat se zafe*.

In monte Rheticæ Burmio dicto Iunio mense collecti: Geneuz in monte *Saleno* vigentem Maio: in monte autem Thuri racemum suum habentem, Iulio. In quibusdam altissimis siluis nasci refert Tragus: Iulio mense apparere, deinceps verò non item: esse qui dicant cum Luna augeri & decrefcere, ita ut quod diebus supra terram Luna fuerit, tot etiam incisuris dissectam Lunatiz folium videatur. Tubingæ in pede montis Austriaci in fine Maij & Iunio mense copiosissimam

firmam inuenit Fuchf. Gefn. in petrosis Sabaudia montibus, & satis frequentem circa Clauennā insignem Rhetia pagū. Lobel. in Angliæ collibus. qui Grenuici regis ædibus, & Tameli raminis, satis multum reperit. Mordena iuga eā etiamnum habent: ericeta, strigola, iteriliæque montio amat. In laxis, locis alpestribus, ac frigidissimis oriri testatur Cæsalpinus. Columna frequentem perhibet in monte D. M. Vinctis, vulgò *Māte vergine* appellari, frigido & excelso, locis humidis aquosis, prætenibus: Vere exire, Martio semine: Maio vero & Iunio cum botrydas racemotam inueniri. In montium aut colliculorum decliuis, ac herbidis locis tubino gignitur. Solio tamen gracili ac molto: Sub finem Aprilis. Maio ac Iunio inueniri potest: ceteris anni mensibus temere fuerit nusquam apparentem requirere, inquit Dodonæus. Crescere etiam in Pannoniis, Noricisque, ex veteran Geographorum descriptione, ingis præteritum verò in pratis, quæ siluis cinguntur antè quam suprema Alpium suspensilia attingas, author est Clusius. In monte Iura non raro occurrit. In hortis translata non diu durat. In Silesiæ pratis nec non montium gramineis colliculis Maio conspicuam tradit Schvvenckfeldius.

Multi præclara quædam de Lunaria sibi & aliis pollicentur, præteritum verò Chymistæ, qui eam in arcanis habent, promittentes eius succo argenteum vinum coagulat. Triagidum exsiccatoriam habet vim [Cæsalpino, frigido & siccus est temperamento] possetque fortè ad calidas ventris fluxiones viurpari. Terrestre quid præ se fert [inquit Fuchsius] gustata, atque parum adstringit, ut hinc medicèriter frigidam & siccam esse verisimile sit. Vis foliorum eius haud dubiè vulneribus efficax, glutinandi namque facultate prædita est. Constat experientiâ ad suppitendos menses & album muliebrem profluvium misicè conferre hanc herbam. Ophioglossum ipso aspectu & facultate eximîâ vulnera feruiminandi, vlceraque & luxata cogendi, vel stimulat, vel superat, si Lobelio credimus: gustu præsicca & adstringens. Ad enterocelas & hemias magnæ commendationis ex vilitatis pota & imposita. Matthiolus toti plantæ vim mirè efficacem vulneribus glutinandis ascribit: iterque intus fecit, atque extrinsecis corporis fracturis sanandis. Datur v. iliter commodèque dyentericis, planta in puluerem contrita. Plebecula simplex ad quodvis fascinum abigendum superliti- tiosè hanc plantam celebrat. Tauram vocant pastores Gelneto referente, quod vaccæ eâ degultatæ ad libidinem moueantur, & requirant taurum. In Rhetia Clauenna aiunt rusticos ibi iumentorum vlcera hâc herbâ curare. Idem verò de Lunariis semini vim vâuatam attribuit.

LVNARIA BOTRYTIS MINOR multifolia.

Amerarius in Epitome Matthioli, prodidit in Angliâ speciem hanc Lunariæ nostræ rariorem inueniri, pluribus foliis donatam, & nonnunquam pluribus etiam racemulis.

De hac eadem, ni fallor, à Thelio hæc scribuntur: Lunaria botrytis, πολυφυλλος, quam copiosam in montium quorundam iugis summis circa Andersbergum reperit initio Veris, iam sub niuib, Fauoniorum flatibus colliquefcentibus proutemntem, est radiculis paucis, multifidis,

Tom. III.

tenuibus ac luteis: *colicula* primùm rotundiore, luteo, palmari ferè, in brachia diducto, quæ gemino latere iterum brachiata, vtrinque *folia* lunata, flaua, securicularum instar continent; sed breviora quàm in priori: deinde alium prope radicem coliculum exurgere obseruauit (& fortè plures prodeunt inde) eodem modo foliatum & brachiatum. Medio loco inter hos coliculos *thyrsulus* exortitur *racemosus*.



Clus. hist. Lunaria minor racemosa Camerarij, Lunaria minoris alia elegans species etiam ramosa, ex Anglia allata.

Schvvenckfeld. Lunaria botrytis minor polyphyllus, rarior inuentu, Grofse vrelbleuerichte leber Kente.

C. Bauhin. phyt. Lunaria 3. siue racemosa ramosa: Lu-

naria botrytis polyphyllus Thelio quidam Lunaria minor ramosa Clusij: *Eid. Pin. Lun. 2.* siue racemosa ramosa maior. *Frater* in phyt. suspicatur Lunariam botrytitem polyphyllon Thelii, eandem esse cum Lun. minore ramosa Clusij: sed nos has duas ab inuicem separamus, ut postea dicemus.

Schvvenck Lunar. πολυφυλλος in hortis suo inter gramina cum priore copiosè crescentem reperit. Anno à CHRISTI natuitate 1603. ex Ioannis Biedumpheij procerum Austriæ Medici epistola Viennâ Austriæ missâ intelligebat Clusius, hanc plantam spontè nascentem fuisse obseruatam & lectam circa arcem Vveichelsbach. cum vulgari illa minor copiosè nascentem.

C. B. not.

Locus.

LVNARIA BOTRYTIS RAMOSA Silesiaca.



Ivbat *race* mi selqui- palmari cras- sifusculi pedi- culi fastigium ornant: *folio- rum* situs & numerus longè diuersus siquidem pe- ccululus texan- talis, crassitie eius qui race- num sustinet, nudus, in tres abit pediculos minores, quo- rum singuli rursus tri- partiti *folia* sustinent fal-

Defecti- pto.

Nonn 2

cata formâ, & posita Lunariæ vulgaris, minora, sæpè per marginem serrata.

Hanc habemus munere Agerij siccam sine radice: Clusius pingit cum radice, siue racemis. Tenore plantam sic describit.

Descriptio Clusii.
 Dodrantalis est planta, statim à radice vnam aut aliam foliorum alam protrudens, siue folium ramosum & multifidum, frequentibus foliis, vulgaris Lunariæ minoris foliis ferè similibus, coactis, sed longioribus & crassiusculis, crebriusque incisurâ diuisis, colore, vt in vulgari, viridi dilutiore & quodammodò pallescente: secunda ala, vt tenerior est, & postmodò nata, tenui quâdam, sed rarâ admodum lanugine pubescere videtur, succulentiorque est quam prima: ex eius quasi vteroque, secundum radicem emergit *cauliculus* pinguis & succulentus, sustinens multifidam & maiorem *vnam* [florifera an fructus, dicere debeam, hæreo] quàm vulgaris, alioqui admodum similem, quæ an in albam firmam, quemadmodum in vulgari, resoluatur, affirmare non ausim, quandoquidem nondum maturæ erutæ fuerant, quas accipiebam, plantæ, inter quas vna fuit, quæ ternos botros protrulerat: *radix* vulgaris insitat, multis fi-

bris latè in ambitum sparsis, crassioribus tamen constat.

Et hanc Lunariam minorem ramosam, siue Lunariæ speciem rarissimam, quam Silesij *Rechten viderthon* appellant, h. e. Trichomanes legitimum, Clusius quidem nullibi nascentem vidit: sed in Silesiæ quodam monte natam & erutam ad ipsum mittebant Viennam Austriæ Doctor. viri Frid. Sebizius & Achilles Cromerus, significantes in altis Silesiæ montibus gignit apparere autem, & florere eodem cum vulgari tempore. Cæterum, Io. Aicholtzcius Medicus Viennensis, ad quem etiam mittebantur ab ipsdem aliquot recentes eius plantæ, sæpè in hortum suum intulit: sed comprehendere noluerunt, omnem enim culturam respuere videntur, quemadmodum pleræquæ aliæ montanæ.

C. Bauhin. pin. Lunaria 3 siue racemosa multifido folio: Lunaria ramosa Silesiaca, Cam. Lunaria betryitis πολυπυλλος Thal. Lunaria minor ramosa Clus. pann. p. 510. & histor. *Ego Thaly* Lunariam ab hac diuersam facio, & ad præcedentem refero.

Synon.
 C. Bauh.
 not.

Finis Libri trigesimi quinti.

HISTORIÆ





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXVI.

HERBÆ STELLATÆ ET COGNATÆ.

Non sat erat artificiosissima natura, florum, fructuum, radicum atque foliorum varias & multijugas ex-
hibuisse figuras, in etiam sporum, foliorum in orbem posituradiantes quodammodo stellas perbellè expri-
mit, et, in sequentibus plerijq; apparet.

A P A R I N E.

CAPVT I.



Ast it fima radícula oriun-
tor viticulæ, quæ datæ, as-
peræ, geniculatæ, proxima
quæque scandentes
adhærescentiæque: foia
fena. Rubræ modo, stellæ
instit radiatæ, singulis ge-
niculis circumnascuntur,
aspera, in spinulam desi-
nientia: flosculi pusilli, albidie, quatuor foliolis
compositi, quorum singulis didymæ succedunt
lappulæ, bina femina concludentes, cortice ni-
gro, pulpa alba.

Aparin Græcis, vt Diosc. & Galeno: φιδισίον &

φιδάτιον seu
φιδάτιον, Hip-
poc. ἀπτελέαρι-
ον, vel vt me-
lius ex Galeno
corrigitur, ὀμ-
φάλεαριον, aliis
nonnullis φι-
λάτιον, &
φιδάτιον: qui-
buldam deni-
que ἰζόν.

Aparinen, in-
quiuut Plinius
& Galenus, ali-
qui ὀμφακοκαρ-
πον, alii Philan-
thropon ab aspe-
ritate vestrum
tenaci, &c. vo-
cant.



Tem. 111.

Quum itaque appellationes hæc etiam in his au-
toribus legantur, videntur rectè quoque in Dio-
scoride legi, etiam si non desint qui ipsas cum a-
liis, ad supposititias remoueant. Galenus in gloss.
Hipp. Philoterion speciem herbæ esse dicit, quam
Aparinen nominant: & subdit Philoterion eandem
esse cum Aparine, & Philoterio. Et alludunt cer-
tè hæc appellationes ad vocem Philanthropon.
An verò ὀμφακοκαρπος, rectè dicatur, velut Gale-
nus, Plinius, Paulus, & Aetius habent: aut potius
ὀμφάλεαριος, ex eo quod semen subcapum sit in
medio, velut umbilicus, vt Dioscorid. ait, dobitat
Cornarius. Philanthropos autem, quasi hominis
amica, quòd vestitui eius adhærescat, dicta vide-
tur. Et ea de caulâ à nonnullis Philadelphos quo-
que appellatur.

Aparinen fuisse primùm Asperulam dictam,
& ab imperitiis in Asperulam mutata, ac
tandem in Snergulâ & Spargulâ, testatur Fuchsius
in Nicol. Myrsid. sed. 3. n. 46. & 2. comp. sed. 15.
Tamen Luminare maius negat Spargulam esse
eâ herbâ quâ veteres Rasparulam dicunt. Raspara-
lam autem vulgò Aparinen dici refert Apollo
rad. 19. supra Martiat.

In officinis per Terrahit intelligi Aparinen le-
gitur apud Clorenburgum lib. 9. de comp. in
Mart. vbi addit, à Pandetario cap. 32. Apari-
nen dici, & cap. 177 Lappaginem, hanc tamen ibi
cum Persona iam confundere.

Aparinæo Lappa genus Cornarius facit. Et
perhibet Dodonæus subinde Lappam & Lappâ
minorem à Latinis appellati. Sed & Lappam
Gaza apud Theophrastum 7. hist. 8. & 14. vertit.
Muthioli contra hallucinati tenent Brasiauo-
lum, quod id suo simpl. examine Lappam credi-
dunt.

Nunn 3

Pandetario
rij error.

Brasianoli
halluc.

derit esse Dioscoridis Aparinen.

Plin. corrigitur.

Plinius Lappaginis (speciem esse affirmat. Lappagines autem, ipso auctore, duæ: una aspera, Asperugo ab asperioribus foliis dicta, ad quod nomen vulgare alludit: altera mollis, Mollugo. Et Aparide quidem Asperugo est. Lappago, inquit Plin. lib. 26. cap. 10. similis Anagallidi [forte cum Dodonæo melius legeris Galio] nisi esset ramosior, ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris succi, grauius odoris: quæ talis [mollis forte legendum cum Dodonæo] est. Mollugo vocatur: huius, sed asperioribus foliis, Asperugo.

Synonyma

Aparine Brunfels. Trago [cui & Aparina, & Viscus] Marthiol. Fochl. Anguill. qui in Graecia καλὴ Ἰδα vocati scribit [Dodonæo in Dioscor. Tac. Hist. Luf. Lente. Nomencl. panth. Porz phyt. [vbi conceptum viperarum imitari ait. [Lob. in Adu Obs. p. 464. & Lappago aspera] & Icon. p. 800. & H. Lugd. pag. 130. Cels. & Castori. Aparine aspera. Thal. Aparine i. siue vulgaris, C. Bauh. pin. vbi meminit Aparines alterius purpureis floribus, quæ non vidimus.

Nomina linguarum.

Germ. Klabkrant, & Nabelfarnen, h. e. Semen umbilici: & quibuldam kleren, q. e. Lappa. Belg. Cleeb odor cleefmyt. Gill. Rôbte, ou Grateron. It. Speronella. Hisp. Pressera. Amor di hortulano. Ang. Goshaweth, Shyer, quod vestibus adhaerent. Sic & Haug. ab adhaerendo, Raga duany dicta.

Locus.

Exit iuxta margines agrorum, & quandoque in ipsis agris frugibus permixta: nem secus vias, scrobes, sepes, & inter sentes. Æstiuis mensibus ubique frequens. Flores quandoque etiam quandoque Vere, & interdum Autumno profert.

Temper.

Theophrastus & Galenus in Lente eam coalescere scribunt, & amplexu suo eam suffocare: itaque modo illi grauem ac molestant esse.

Vires.

Aparine, inquit Dioscorides, pastores colli vice videntur, ad eximendos è lacte pilos [nimirum circum actis per loca foliis quorum asperitas ad id tenax est, ut facili quicquid tetigerit, apprehendant. nam & vestibus hæret prætercunium.] Seminis caulium, ac foliorum succus, potus contra viperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: insusul auriolum dolori medetur. Herba cum azungia trita strumas disciunt. Sanguinis etiam abundantiam ex vulneribus reprimere folia imposita Plinius tradit. Modicè autem ut Galenus ait, extergit, & desiccatur, habetque nonnihil subitilium partium. Aquam destillatam bis in die mensura trium ligulium potam, aiunt aluum cohibere, efficacissimamque esse aduersus morbum regium: Trogus.

Vires.

Aparine, inquit Dioscorides, pastores colli vice videntur, ad eximendos è lacte pilos [nimirum circum actis per loca foliis quorum asperitas ad id tenax est, ut facili quicquid tetigerit, apprehendant. nam & vestibus hæret prætercunium.] Seminis caulium, ac foliorum succus, potus contra viperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: insusul auriolum dolori medetur. Herba cum azungia trita strumas disciunt. Sanguinis etiam abundantiam ex vulneribus reprimere folia imposita Plinius tradit. Modicè autem ut Galenus ait, extergit, & desiccatur, habetque nonnihil subitilium partium. Aquam destillatam bis in die mensura trium ligulium potam, aiunt aluum cohibere, efficacissimamque esse aduersus morbum regium: Trogus.

Temper.

RVBIA VETERIBVS.

CAP. II.

Erythrodanum.

Erythrodanum, ab ἐρυθρόν, i. e. ruber] seu Ereuthodanum, alijs quibus ἐρυθρίον vocaturum, radix est rubra, tingendo idonea, Dioscoridi, cui duplex est. Una quidem siluestris, facitua altera, ut in Thebana Galilee, & Rauennæ in Italia. Sed & in Caria inter Oleas scriptum, velut in aruis [scilicet de Tatis aparine, vet. caret.] Viliiter autem colitur [quæ] inter vicia, addit Lac. ex vet. cod.] quod multo polleat quætu, ex eaque amplissimus reditus percipitur. Sunt ei caules quadranguli, longi, asperi, quales Aparinæ: sed omni ex parte maiores, atque robustiores, folijs in orbem per interualla, nempe circa singula genicula, stellæ modo decussatim

Descriptio.

radiatis: semine rotundo, inter initia vitidis, mox rubro, ac postremò, cum ematuruit nigro. Radix est tenuis, longa, rubra.

Erythrodanum Theophrasto 6. hist. 1. plura sunt genera, summiusque differentiis discretæ: & 7. hist. cap. 9. radices rubicundæ. Verum 9. hist. 14. folia Hedera, sed rotundiora Rubiam (ἐρυθρόδανον) habere scribit, nasci humi velut Gramen, loca amare vmbrosa, citere vrinam, idcirco huius vsum esse, ad lumborum & coxæ dolores. Cæterum Ereuthodanon hoc, si mendo exemplaria carent, à priori multum differens est. Sunt qui Numulariam putent: sed vires non conuenire possunt. Licenter nimis asperum caulem spinosum vocat Plinius 1. 19. cap. 3. Spinis Erythrodanon carere Theophrast. aperte docet 6. hist. 1. Porro quod ibidem tradit fructum eius rubrum esse, fructum principio vitere, deinde demum rubescere, & edum maturus est, nigrescere monuit Dioscorides. Sic verò idem Pinus 1. 24. cap. 11. Alia est Erythrodanum (ab Erythro, siue Rhoe, qui fructus est) quam aliqui Erythrodanon vocant, nos (Itali) Rubiam [à radicis colore] quæ tinguntur lina, pellisque perficiuntur. Distat ab eo, qui Alysson vocatur, folijs tantum & ramis minoribus. De Alyssio Plinij plura suo loco.

Paulus Ægineta & Dioscorus quoque nuncupari refert lib. 4. cap. 2. & ἐρυθρόδανον à Romanis: Dodonæus tamen ἐρβασίαν legit. Eundem ibidem βουτάνην ῥεγοῖδαν etiam cognominat, & ῥοβίαν. Sunt præterea quibus ὀδονανος dicitur: alius ὑποβάσις, à rubicundo colore. Marcellus antiquus interpret etiam Polygonon appellat. Idem tamen Millefolium, Sarginaltem & Verbenam Polygonon quoque facit.

Tragus præterea Eathrion [sed malè fortè pro Teuthrion] & Sophobi apud Dioscoridem nominari scribit: apud Marcellum verò Florentinum, à vulgo Radicem & Manum piceantem, quod asperitare sua trahata manibus picis modo hæret, vocat tradit: à Scapione Patz, Galeno Rhodiam (Rhobiam legendum) rhizam. Ipse verò vocat ait Rubiam & Rubeam tinctorum, Spargulam veram tinctorum. Crocum vasicum quorundam, Roxam, Roxami, Falmam, Rodiam, & Enam, Diximus Rhodiam pro pū, Cuius falsò legi.

Rubiam (actiuam à Dioscoride descriptam nihil aliud esse affirmat quàm Thapthiam Alclepiadus, Anguillaria.

Rubiam Dioscoridis notam ait Cornarius in multis Germaniæ locis, & nasci in Spiteni agro, à fullonibus & tinctoribus maxime expectatam. Dodonæo verò Rubiæ propriè species nullæ sunt, quamvis hodie plures cognitz sunt plantæ, de quibus deinceps agemus.

RVBIA SATIVA.

Armenta longa producit, quadrata, vinctu-
Sis crebris harmata, geniculata, ad quorū singulos nodos folia rotatim radiata circumponuntur, Aparines modo, sed multis numeris maiora, confimiliter aspera, hispidis crebulis per ambitū incisa, vestibus tenaciter hærentia: ex quorum alis pediculi exeunt: flores sustinentes ex luteo herbidos, stellatos, quinque folijs constantes, apiculis luteis: quibus semina succedunt rotunda, per maturitatem nigra: radices sub sunt numerozæ, reptantes, succulente, ruffæ, miniatæ, duæ,

Genera plura Theophrast.

Thapthiam Pauli.

Robia.

Manum piceantem.

Tragus corrig.

Rubia Dioscoridis nota.

Descriptio.

durâ lignosâ matrice factâ, sapore mixto, dulci, acerbâ, & cordato.

Synon.

Rubia Cordo & Corn. in Diosc. Anguillar. Dodon. lat. & Cæsalpino qui Theophrastum folio Hederæ d. f. ripisic ait, se tamen talem non vidisse. Rubia sativa, Brunf. Trago (cuius plora nomine priori titulo adscripsimus) Matth. [qui suis comm. figuram sine descriptione applicat,] Fuchl. Dol. gall. Gesner. horr. Lacun. Turn. Lon. Fracast. H. Lagd. p. 1329. & Castori. Rubia maior, Lobel. in Adu. obs. p. 463. Ic. p. 768. & Clus. Hist. Rubia tinctorum, offic. Rubia i. siue tinctorum sativa C. Bauh. phyt.

Nom. hog.

Græcis ἐρυθρὰ δάκρυον & ἐρυθρὰ δάκρυον Germ. *farber Rotte*, aut simpliciter *Rotte*; *Einheimisch Rotte*. Rubia domestica Matth. Belg. *Grappe & Mee*; & pulvis radices, *Meerappen*. Gall. *Gavance*; Ital. *Rubbia*, vel *Robbia*; Hisp. *Runia*, Royn, *Granja*; Angl. *Madder*; Boh. *Marena*.

Locus & Tempus.

Scribitur Rubia non paucis Italic, Hispaniæ & Galliæ, nonnullis etiam Germaniæ, præsertim apud Silesios, & plurimis Belgij locis, pingui secundoque solo. Altare floret semenque facit. Maio ac Iunio radices leguntur, quæ rescicant & attrita in usus & medicinz & tinctorum veniunt.

Rub. asperitua Diosc.

Rubia radix, inquit Dioscorides, ciendæ vrinæ vi prædita est: quæ de causa arquare auxiliatur pota cum aqua multa: itemque ischiadicis atque paralyticis. Crassam porro copiosamque vrinam pellit, ac interdum etiam sanguinem: bibentes tamen quotidie lanari oportet, & excrementorum quæ reddunt differentiam contemplari. Contra serpentium morsus caulem cum foliis imponere prodest. Semen verò ex aceto multo potum lienem absumit. At subdita radix, partus menses, secundasque trahit. Albæ quoque vitilligini illita ex aceto medetur. Subdit Plinius, Rubiâ tinguntur lanæ, eaque pelles perficiuntur: in medicina vrinam citet: morbum regium sanat ex aqua multa, & lichenas ex aceto illitas: & ischiadicos & paralyticos, ita vt bibentes lauentur quotidie. Radix semenque trahunt menses, alium sicut, & collectiones discutiunt. Contra serpentes ramum cum foliis imponunt. Folia & capillum tingunt. Invenio apud quosdam morbum regium sanari hoc fructu etiam si adalligatus spectetur tantum, Galenus 7. simpl. rubram tinctorum radicem, Rubiam esse dicit, eamque acerbam & amaram, proindeque prætere omnia ea quæ ab huiusmodi facultatibus sperari possunt: nimirum quæ Dioscorides recensuit.

Eperant. de Dodon.

Rubia autem radices vt potentiam ac vim haud obscure adstringentem obtinent: ita quoque natura ac temperamento frigida sunt ac sicca: partes interim nonnullas tenues habent, quarum potentia color earum facile permeat: aded vt & vrinæ assumentium ab his tingatur, inquit Dodonæus. Gustatæ liquidem acerbam saporem referunt, cum exigua tamen quadam dulcedine, primò occurrente, quam acerbâ & adstringens mox excipit qualitas. Quod non modò à nobis, sed & ab Auicenna observatum, qui cap. 58. Rubiæ radicem pontici esse saporis scriptum reliquit. Commendatur verò passim Rubiæ radicem decoctam, ruptis, cæcis, vulneratis, ex alto præcipitatis: fluores reprimere; inflammationes mitigare: offensas quassatasque partes ad sanitatem perducere creditur. Miscetur his de causis portionibus, quas vulnerarias recentiores appellat. In quibus tantam earum vim ac effi-

ciaciam, Matthiolus quoque esse refert, vt etiam thoracis & intestinorum lethalia vulnera his curari posse speretur: Accedit huic sententia Io. Spirngus, qui in rhapsodiis suis annotatum reliquit, Rubiæ decoctum cum Triphera magna exhibitum valere aduersus fluxum menstruorum, hæmorrhoidum, & dysenteriam: idque euentibus experimentis compertum, quod Rubiam adstringentis esse facultatis confirmat. Idem sentiunt cum Dodonæo Erasius & alij. *Vnde constat*: extergendi aut aperiendi potentiam Rubiæ nullam vehementem esse, & Dioscoridem huiusmodi vim ei temerè tribuisse: ac post eum Plinium, Galenum, & posteriores reliquos, in verba eius iratos. *hinc* manifestè hallucinari deprehenditur Eschapius, qui Rubiam in portionibus vulnerariis ceu pessimum medicamentum damnauit, eò quod ora venarum in tantum aperire crediderit, vt etiam cruentum lorum ducere, literis confirmat. Et Timoth. Reslin. qui in suppress. mensium huius puluerem cum saccharo exhibet.

Contra
Dioscor.
Plinium
Galenum
quæ
alios.
Fallo.
halluci-
natur.

Tim. Ro-
stin. la-
plus.

Cæterum insciendis lanis aptissima Rubia. Experimur folia Senenibus mulieribus ad stantia vala detergenda: siquidem mirum dictu quàm pulcherrimè nutescant, quæ Rubiam fuerint experta.

Rubia siluestris Monspessulana maior.

Locus &
tempus.

Monspelij passim provenit: Vere flores profert paruos, luteos: fructum fert. Ætate & Autumno, qui per Hiemem durat: sed nec ipsa herba inarescit: inter sepes minor est, & asperior sativa.

Synon.

Lob. obs. p. 453. Rubiæ maximæ varietas, C. Bauh. pin. Rubia i. siue siluestris aspera, quæ siluestris Dioscoridi: Trago, Rubia erraticâ & siluestris: Cordo obs. sylva, Rubia silu. vera. Cæf. Rubia silu. in Etruria.

ALYSSON PLINII FOLIIS

Erichthodani.

CAP. III.

Dicit inquit Plinius lib. 24. cap. 11. ab Erithrodano, qui Alysson vocatur foliis tantum & ramis minoribus: nomen accepit, quod à cane commorosos rabiem sentire non patitur, potus ex aceto, adalligatusque. Mirum est quod additur, infaniam [Cornar. singultum legendum putat] sanari, eo fructu confecto. Sed adhuc alia lectio hæc est: Mirum est, &c. sanem sicari. Plutarchus tamen 3. sympos. scribit Alysson, si manu teneatur, vel omnino aspiciaur, singultu liberare: quo loco pro *λυπη* quidam legendum putant *λύσσει*.

Alysson
est
dici-
tum.

Plinii
dici-
musa
lect.

Alysson:
Plutar-
chi.

Alysson autem hoc Plinij Dioscorides historiæ nihil conuenit. Sed nec cum Alyllo Galeni, folio Prassi, flore ciano, 2. de antid. quicquam commune habet, vt ij prorsus reticiendi non sint, qui Alyllo Plinij, herbariorum Asperulam cum Gesnero esse putant, auctore Dalechampio.

Alyllo:
Plin. dicit
musa
Diosc. &
Gal.

Est etiam apud Pausaniam in Arcadicis Alyllo fons, oppido Cinethænsium vicinus, cuius aqua potu sanat à canerabido commorosos.

Alyllo
fons.

RVBIA ANGVLOSA ASPERA

& parua Geneuensis.

CAP. IV.

Indus rubet huic radix, quàm satiniæ maior, minusque salidam tingit masticata, fa-

Defectio.

pore tamen non multum dissimilis, tenuis, ligno-
sa, albâ matrice refectâ huic surgunt *Flagella* lon-

Descri-
ptio.



Icon.

An Rubia quadam minor.

Varietas.



Matth.
not.

Camer.
arv.

Lab. de-
mos ana.

Cetera
Synony-
ma.

Locus.

Tempus.

chicæ, odorati: sapore nullo manifesto.

Matthiol. in suis comm. Rubiam siluestrem sine descriptione ponit & sub titulo non conuenienti: quia non est Rubia silu. Dioscoridea. Camer. apud Matthiol. in h. germ. & Epit. malè sub titulo Rubiæ siluestris. Rubiis accedentem, Asperulam pingit. An Mel'ago Clusio: Lob. in Obs. p. 468. & Adu. dicitur Rubia silu. minor: in l. p. 798. Rubia siluestris. Habet & huius plantæ aliam figuram p. 802. sub falso titulo nempe Molluginis Belgarum, & Molluginis montanæ Dodonæi.

C. Bauhin. pin. Rubia 3. siue siluestris lævis: Rubia siluestris, Brunfels. Matthiol. Fuchs. Dod. gall. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Lob. l. c. pag. 798. Hist. Lugd. pag. 139. Camer. Cast. Thal. Tab. & Gerardo.

Plurima nascitur tam in Germaniæ siluis, quàm Angliæ, Galliæque: copiosissima in Vecti insula: et pulcherrima maximæque apud Vincetiam, in itinere Southantonensi. Genæus quidem circa dumeta Februarij principio florebat Monspelij, Lugduni & Patavij florebat Maio: Basileæ à Iulio in Augustum usque,

RVBIA PRATENSIS LÆVIS acuto folio C. Bauhini.

CAP. V.

EX radice caulis cubitalis, levis, quadratus, ru-
fescens; geniculatus, caues, & communiter
vnus exurgit, ex cuius nodis ramuli semipalmates
prodeunt, quorum summis *foseculi* plures quadri-
folij, pallidi insident: *folia* lævia, quaterna, vn-
cialia, in acumen abeuntia, ad quemlibet nodum
in orbem disposita sunt.

Rubiam hanc pratensem læuem acuto folio, Synon.
2. in prod. 4. in pin. apud Valesianos in pratis ad
thermas Leucenses natam aiunt, ac etiam in pra-
tis Lipsensibus reperi, inquit author.

Descri-
ptio.

Synon.
Locus.

RVBIA ERECTA QVADRIFOLIA. CAP. VI.

REDUM hoc
Rubie ge-
nus, Genæus, in
Rhæcia & alibi
occurrit: caules
eius non planè
cubitales sūt, fir-
mi, quadranguli,
in ramos diuari-
cati: *folia* quater-
na, Rubiæ mino-
ris, solida & dura,
geniculis circum-
posita: in ramo-
rum escumine
flores copiosi, al-
bi, iucundi odoris.

Locus.

Descri-
ptio.



aliquam similitudinem. Verum ab ea multum dif-
fert: caulis enim inter cætera illi rotundus est.
Floret Iunio.

RVBIA SILVATICA LÆVIS. CAP. VII.

AMOSA
R præ reli-
quis est hæc.
caulibus rectis
lævibus, tere-
tibus, rubero-
sis geniculis
nodosa, per
longa inter-
vallâ interce-
ptis: *folia* cir-
cum articulos
radiatim posi-
ta, Asperula
odoratæ, mol-
lia, ac quàm in
Rubia angulo-
sa molliora: *fo-
res* summis ra-
mulis & per
furculos tam
copiosi ut mul-

Descri-
ptio.



carium imitentur, candidi.

Summitas florum & stiris in caulibus nostræ
conis Fuchsiæ non placent. Huius alium ra-
mum frequenter cap. pingimus.

Locus.

Trago, Matrisylux cognata, Matrisylux se-
cunda,

cunda; *Asperula recentiorum*. Gener. hort. Rubia sylvatica altera, siue folijs laevis: Eid. app. Rubia silvatica major: Item coll. Alysson. Plinij majus, *grosyvald Meiser*. Dod. purg. & in fol. lat. Mollugo montana, Lappaginis species: Mollugo montana Dodonæo descripta, Thal. Mollugo altera montana Dodonæi, H. Lugd. p. 1089. Lob. obs. p. 456. Ic. p. 801. Mollugo Belgarum, Mollugo montana Dodonæi. An Mollugo Clusij? An Mollugo montana Tabernæmontani?

Montium incolæ hæc est, & in dumeris non raro abscondita: mensis Aprilis principio prodit: Iunio fleret. In asperis quibuscumque Rhenum ad Mosam montibus nasci prodiit Dodonæus.

GALLIUM LATIFOLIUM, CRUCIATA quibuscumque flore luteo.

CAP. VIII.



M Vltos à radice, compluribus fibris capillatâ, reptantēque caules, profert, dorantes & plurquam cubitales, geniculatos, quadratos, striatos, hirsutos, ad quorū singulos articulos quaternaria folia in crucis formam disposita, hirsuta, oblonga, mucrone obtuso nonni-

hil, sapore amaro: ad quorum ortum oriuntur flosculi cruciformes, verticillati, quatuor foliolis lateis toridemque concoloribus flaminibus compositi.

Gallij secundum genus, Trag. Gallion, Turn. Gallium latifolium. Schvv. Cruciatæ, Dod. gall. & lat. vi. Gesn. hort. quæ Gallo cognata, Cam. Cast. Ic. Cruciatæ, Cæsalpino, (tenet Maranthæ, dubitat Hermolaus.) Cruciatæ herniariæ, Thal. Cruciatæ siue hirsuta, C. Bauh. pin. Cruciatæ autem ac Crucialis nominatur à foliorum crucis in formam sita, licet ad Aparines & Rubiæ similitudinem aliquomodo accedat. Inguinaria etiam Plinij dicitur à quibusdam, forcé quia in hernijs & rupturis plurimum præstare sibi perluent.

Trago germ. dasz. ander Megerk. aut: alijs Gids vvalds Meiser, hoc est Asperula aurea. vt Lob. alibi verò Geelb. krenzk. aut. Silef. Geel. Glicegenge. Belg. Cruciatæ: Gall. Croisèe.

Genus Martio provenit. Basilæ & Montebelgardii passim in sepibus, Maio fleret: in Italia inter Vincentiam & Villanovam. Dodonæo teste juxta fossis, aquarum rivulos, & quandoque agrorum margines, inter sentes, à Maio in finem usque ætatis reperitur; & quidem cum flore.

Ceterum facultate Cruciatæ Dodonæo non nihil videri habere ad strictionis, simul cum re-

Tom. III.

siccatione. Recentiores inter vulnerarias dictas numerant: & recentes aiunt ramices hac curari posse, decocto ejus aliquot diebus potio, herbâ verò ipsâ loco impostâ. Folia amara ait Schvv. kfeldius, abstergere & calefacere, atque siccare. Potam thoraci, ventriculo, venis melaicis, & visceribus obstructis prodesse, excrementa pituitosa foras propellere, appetitum juvare.

RUBIA QVADRIFOLIA, GLABRA, angustifolia.



Hæc quàm Galium Trag. secundum, graciior & delicatior esse videtur: foliorum, cætero qui ordine & posita haud absimilis: Verum angustiora sunt, acutioraque, glabra omnino dicerentur, nisi per ambitum tantum exigua quadam hirsutie simbrata essent. Cauliculi toti glabri sunt.

Ab Agerio propè Patavium in Italia collectam nomine Cruciatæ glabræ accepimus.

Figuræ huic ramum Gallij secundum Trag. adpingi curavimus, cùm Guariniana nostra non vique adeo fœliciter videatur facta.

Gallium latifolium glabrum, C. Bauh.

Radice est tenuis, repente, geniculata: cauliculis tenellis, quadrangulis, geniculatis, palmo minoribus: foliis è singulis internodijs quaternis, decussatis, glabris, instar Plantaginis nervosis, palidè virentibus, & sesquijuncialibus: flores habet paruos, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, luteus, brevis pediculis donatos.

Rubia quadrifolia rotunda, laevis, Einsidm.

Ex radice capillacea rufescente, cauliculis tenellis, quadratis, geniculatis, palmo aliores, quorum aliqui in ramos brachiatos, exurgunt: ad singula genicula folia quatuor rotunda, nervosa, tantillam aspera, in orbem disponuntur: extremis cauliculorum, flosculi albi, quadrifolij, pedicellis capillaceis insident, quibus capitulum parum, geminum, asperiusculum, succedit.

Rubia hæc quadrifolia rotunda lævis, 3. in prod. in pin. in montibus Helveticorum, vt Gotthardo, & ad Eremitanos provenit: hanc & circa Argentinam crescere dicunt.

RUBIA QVADRIFOLIA ITALICA hirsuta.

CAP. IX.

Planta est hæc Rubiæ species, caulibus cubitalibus & majoribus, quorum geniculis qua-

000

terna decussatim folia circumposita, formâ plan-
taginæâ, nervula, acuminata, mollia, lobhirsuta,

Synon.



Ludg. pag. 1170. Rubia laevis Taurinenfium Lo-
belij. Ioach. Burf. Rubia latifolia albo flore glo-
buloso. Eandem accepi ex Italia (vbi & ego eam
collegi: Butlerus iuxta Lucernam reperit) delu-
tam, nomine Stellariz cruciferae.

RVBIA QVADRIFOLIA, SEMINE
Duplici hifpido.

Defcrip.



amaricantibus, ornatos. Cauliculi capus in ra-
mos binos, hi rursus in ternos, folijs viduos
subdiuiduntur, in quorum summitatibus, semina
binæ, hispida, multò minora quàm Stellariz, ni-
gricantia.

Locus.

Neminem reperio qui hanc rubiæ (speciem
descripserit, quam nusquam etiam obseruavi,
præterquam in monte Rosberg propè Masoco-
uium [Matzmunster Germani vocant] mense
Oâobri, inter saxa, locis vmbrosis & frigidis.

RVBIIS ACCEDENS, ASPERVLA
quibusdam, siue Hepatica stellaris.

CAP. X.

Compluribus geniculis intercepta radícula
Ctenella summa tellure serpit, capillaribus fi-

bris demissis: vnde cauliculi surgunt, reñues, qua-
drati, palmates & dodrantes: ad quorum sin-
gula genicula, folia radiatæ Rubiæ posita nascu-
tur, lobhirsuta: circa fastigium diuiditur caulis in



Defcrip.

binos terni ô-
ve ramulos, ex
quibus pedi-
culi stipes
sustinent: tua-
uiter olêres.
Valerianæ fe-
rè formâ, âti-
dos, è quatuor
foliolis cõpo-
sitos: semè par-
uum rotundû.
An Cefalp.
Rubiæ silue-
stris genus
quoddam, bre-
uiori caule cõ-
stans, fructu
subaspero ac
nigro? An cid.
Alysson Her-
molai?

An Rubia
siluestris
genus
aliquod,
Cef.

Camer. apud
Camer.
nos.

Math. in h. germ. & Epit. malè pingit & descri-
bit Asperulam nostram pro Rubia siluestris.

Theodorus Dorstl. Iconem Hepaticæ stella-
tiz apposuit quoque Caprifolio, sed ei haud
congruit.

Dorstl.
reprob.

Trago Galatij genus, & tertium quidam esse
videtur. At infelicitè nomen exprimit, dum
Gallion Dioscoridis esse definit Matrisyluam.

Trago
lappas.

Stellaria hæc herbula malè pro Caprifolio
apud Brunfelsium pingitur Caprifolium enim
longè alia herba, imò quasi frutex est. Hepatica
3. ei melius dicitur in 4.

Brunfels.
error.

Ignaris pharnacopœis Herba moschata, &
sua moschata dicitur, pro qua etiam non sine
errore videntur.

Error.
quorum-
dam.

Quibusdam Alysson Dioscoridis viderur, sed
folia non respondent. Lonic. Matrisylua, n. Apa-
rines (speciem dicendam statuit, è semine sc. lap-
pato, quòd vt Apparine vestibus adhærescat. Ast
hæc ratione facile quoque Lappam, Aparines ge-
nus quis dixerit. Nos propter florum & folio-
rum similitudinem Rubijs adjungemus.

Alysson.
non est.

Matrisylua, Trago, Cordo in Diosc. Lonic. &
Thalio. Mater silua: Hier. Brunsch. Asperula.
Dod. gall. [eid. Herba stellaris & Spergula odo-
rata] Frac. & Gerardo: Asperula Dodonzi. H.
Ludg. pag. 870. Asperula odorata flore albo, Dod.
lat. Eid. de flor. Asperugo Plinij. Hort. Lus. Af-
perula siue Aspergula, odorata Matrisylua.
Asperula, odora Dod. purg. Cast. & Clus. pann.
& hist. Aspergula, pandet. à Moreto reform.
cap. 63. Asperula aspergula, Disp. Colon. p. 13.
Asperula aut Aspergula odora nostras, Lob. in
Adu. (vbi queritur an Mollugo, aut Asperugo
Plinij) in Obf. p. 464. & Ic. p. 801.

Synon.

Rubra syluatica aspera Gesn. hort. Rubia
syluatica alia minor, Eid. app. Alyssum ex
descriptione Plinij, In cat. Alyssum Plinij
minus, Collect. Alyssos denique Eid. hort. vs
& Lac.

Hepatica stellata, Tab. Aparine siluestris qua-
dam, Cordo in Diosc. Asperula i. siue Rubicola
montana odora, C. Bauh. pin.

Germani hertzfrondi, hoc e. Cordis læticiam,
& Cordialem, nominant: Alij leberkraut, Hepa-
tariu, Hepaticam, Epaticam & lecorariam:

Nomina
linguas.

alij

lij *Sternisberkyanus*, *Hepaticum Bellarum*: Et quæ in filius maximè reperitur, idem vulgèiori nomine, *Waldmeister* & *Walds Marbo* vocant: Belg. *Waldmeister*, & *Lenscrum*. Holl. *Waldmeester*: Gall. *Belgerus*.

Apud Belgas, vbi Maio, Iunio, ac ferius florer,
horrens est. In Germaniæ montibus, ac etiam
monte Iura: sponte reperitur, Iunio & Iulio, in
siluis locis opacis, pingui solo.

Facultatem hanc, Gallio aliquatenus similem, sed tamen imbecilliorē tribuit Dodonaeus. Fertur in vinum coacta hilaritatem efficere, cordi ac recipi: prodū. Repertus hodie in celebrata illa pōne vulneraria, *das Balleslerisch vunde trank*, vocata.

RVBIA CÆRVLEA ERE.

Quor elatióve.

CAP. XI.



Plurimum hæc differt à parua illa repente Rubia. Hæc siquidem *canes* furtigit cubito maiores, angulosi; *foliis* vestitis ad genicula radiatis, multis, Molluginis paribus; ramulorum extremis hærent ex longo pediculo *floribus* multi simul ignis, oblongi, cæ-

zule, circa imū hirsuti, quibus circūposita radiata folia aliquammulta, pilosa, flores luperantia, eosque veluti occultantia. Ad Rubiolum hāc caeruleo flore refertur Alysson Turn. à C. Bauhino. Nos potius ad sequentem reducendā æstimamus.

Dod. *Asperulum cæruleum* inscibit, vt & Lob.
in Ic. p. 801. & obf. p. 466. vbi Alysſen Galeni per-
peram vocari ſcribit. H. Lug. p. 870. *Asperula*
cærules Lob. Cam. hort. *Asperula flore cæru-*
leo. C. Bauh. pin. *Asperula* 2. ſive *cærules* *arūcūſis*.
In Flandriæ plerique agris ſpontè exiit: annua
eſt, ſed ex deciduo ſemine ſeiſſam ſerit. In hortis
mihi floruit Malo, Geneuæ & Lugd.

Rubia parva flore caruise se spargens.

Palmam non temere excedit pumila hæc Ru-
bia, *obsculis* pro terræ pargens, plures, quatuor-
dratos, rubentes, hirsutes, et interdum ramosos:
folia radiata pro plantulis portione satis lata, hirs-
ta et asperiuscula: *flores* in medio aliquot folio-
rum, alpiarines, sed colore d. lute purpurascens: *vascula*
exigua lingulis foribus succedunt gemi-
na, coherentes, nonnihil oblonga, et in summo
digitata, in quibus *semine* solum, alterâ parte
globum, alterâ planum. *Radix* fuscescens, dura,
lignosa.

Turneron hanc intelligere credimus per
Tom. III.



RVBIA QVADRIFOLIA

verticillato femine.

C A P. XII.



Alyssum Plinij
& Diofcoridis:
Dalechapium,
& H. Lugd. p.
1364. per Ad-
rianum sine Stellis-
tium, Monpe-
liensium co-
gnoſcitam.
C. Bath. in pi-
per Kubolan-
ſine areculum
reſpoſum cau-
tulum: qua 5.
in prod. Cani-
hor. per Ru-
molan. anen-
ſem, ſine are-
culum, in agri-
Bonaie ſicu-
que Italia fre-
quentem.

Genere, ubi
altitudinem pe-
cis aliquando
attingitur, flo-
ret in agris Fe-
bruary mens-
is principio:
Monspelj
Marro: circa
B. Glean adhuc
Octob.

FAciei gra-
tia meritis
sanè Rubris
annumeranda
plantula. *Rad-*
iculū exigūā
nitiur, angu-
stant, longi-
tudinis fibris
per terrā fu-
sa : *surculi*
exerunt nume-
rosi, palma-
res, rigiduli,
rependi, hu-
milique sparsi,
crebris invec-
tis. *Stipulae*
etiam quæ *fa-*
lota quærens
exigua retun-
da, pulli.

De ferre
prie.

flosculi apiculorum modo luteoli emicant, verticillatim aggregati. Quos *vascula* sequuntur triquetra, rigida, albicantia, ac veluti rostellis asperisculo donata: quæ virentiam spinæ ferpentis figurâ pulchre amant. Eorum ut & foliorum densior stipatus in extremis, quàm propter radicula: Huic plantæ natura saporem amaricantem impræstat.

An Cæsalp. Crucialis quædam minima in maritimis, quatuor digitorum altitudine: fructu in orbibus pungente?

Synonym. C. Bauh. pin. Asperula 4. siue verticillata luteola: Asperula verticillata muralis minima, Colum. &c.

Locus Collatam ætulit gener Cheilerus ex asperis & saxosis propter Nemausum.

RUBEOLA SAXATILIS, C. BAVH.

C A P. XIII.

Descriptio. Plantula est tota incana, semipalmaris, cauliculo tenui quadrato, geniculato, in viciales ramulos brachiato floribus parvis, aspera, angusta, acuminata, communiter octo, roræ modo disposita habet: ramulorum summis *flosculi* plures, exigui quadrifolij, apicibus & minimis pedicellis donati, luteoli insident. In saxosis, Galloprouinciæ prouenit Rubeola hæc saxatilis, 6. in prod. Rubeola 3. in pin.

Rubeola maritima aspera, C. Bauh.

Descriptio. Radice est oblonga, tenui, repante & rufescente: cauliculis plucibus, geniculatis, binomialibus, per terram sparsis, & capillaceis fibrillis terræ affixis, foliolis pluribus, breuibus, acuminatis, virentibus & asperis, cauliculos inordinatè cingentibus: *flosculi* minutis, pallidulis. Hæc Rubeola maritima aspera 7. in prod. Rubeola 3. in pin. copiosè in litore maris Mediterranei non longè. Monspelio, & etiam Massiliæ occurrit.

Synonym. *Asperula hexaphylla purpurea.*
Quam C. Bauhin. in pin. Asperulam 3. siue hexaphyllon purpuream nominat, ea apud Hist. Lugdunensem p. 117. Myagri alterius minoris Dalechampi intrusione pingitur, & ab herbariis quibusdam exhibetur, *radiculis* multis, candidis, tenuibus, *foliis* Erythrodani, minoribus, pallentibus: *cauliculis* multis, pede altioribus, flore in summo cauliculorum vertice copioso, purpureo: *semine* minutulo, pingui & oleoso.

Locus In agris & nonnunquam in hortis gignitur.

GALLIUM VETERIBVS ET IN genere. C A P. XIV.

Ætymon. Gallium, siue Galerium, aut Galatium (γαλακτιον, γαλακτιον γαλακτιον) nomen ex eo traxit, quod coaguli vice γαλα lac cogat & coagulare teste Galeno & Dioscoride, qui ipsum ramulo folio Aparine simillimo, ipsoque recto, & in summo flore melino, tenui, densio, ac multum odorato, describit.

Gallij appellationem Plinius ad Galiposin retulit. Cæterum, plantæ, quibus Gallij vox adscribitur, plures occurrunt, de quibus posthac separatim dicturi sumus. Rectius autem sentire eos nulli amplius dubium sit, qui Gallion plantam illam constituunt, quæ propter foliorum tenuitatem in omnibus Aparinæ simillima est, atque inter cæteras notas florem luteum in cacumine possidet. Maxime verò decipiuntur, qui

Gallion Dioscoridis eam esse, lantam existimant, quæ Crucialis herba à nonnullis occupantur,

GALLION VERVM: ET NONnullæ Gallij species.

C A P. XV.

Fractu contumaci radicula donatum est, longotactu repente, tenui, lignosâ, fuscâ: x qua



vigile surgit dodrâles, & cubitales, tennes, subhirsutæ: folia adgenicula exintertualisradialitum caulem ambiunt, longiora & angustiora quàm Rubiæ siluestris, & uia, nitentia: *flosculi* copiosi in racemulos digesti, odorati quorum singuli quatuor foliolis stellatarum radices imitatis constant, succedentibus unicuique binis *seminibus*.

Gallium hoc flore luteo inter Gramina prouenit, & ingruentem tempestatem (suauissimo odore pronunciarè, suauis que etiam apparente lride olere, testatur Camer. hort.)

Gallium [vi Matthiol Lac. & Castor vocant] officinas ignorare falsè credidit Cornarius.

Gallium, Fuchf. Dod. Lon. Anguill. Apollini & Nomencl. pann. Gallium luteum, Lob. in Adu. & Obf. p. 467. ac lc. p. 804. Thal. Hort. Lut. Ger. & Pone in Baldo. Gallium 1. Tabern. ic. & hist. vbi & Gallium Dioscoridis, & Gallia muschata quorundam. Gallium tenuifolium, Schvvenckf. Gallium aruense luteum, C. Bauh. apud Matth. Gallium 1. siue luteum, Eid. phyt. & pin. Gallium luteum Matthioli, H. Lugd. pag. 1088. Gallion, Cordo in Dioic. Lob. Obf. p. 467. & Geln. cat. Gallion, Lappagini similis herba, Cæsalp. Gallion, herba vulgaris, minor quàm Aparine, Eur. Cordo. Gallion, Geln. de lacte, & Trago, cui & Galij 1. genus. Gallion, species Aspergulæ, Cordo in Mitrid. Andromachi: Alter Atticus, Aspergula minor quorundam, Geln. cat. cui & Bubonium. Spargula Cordo supra Martiatum.

Γαλιον siue γαλακτιον, Germ. *Mergerkraut*, Walstro, Westro, vnser *framen Berstro*, & *libkraut*: Saxonibus & Misnicis *labkraut* & *Rayurutzen*. Belg. & Flammandis *Walstro*. Gall. *petit Muguet*, *Aspergute mineur*. It. *Galio*. Hisp. *Costa lache yerua*. Angl. *Maydes here*: Boh. *Syrystio* *Wa Bylina*: Hung. *Tey sugoryto* *siu*, & *zont luan veraga*, h. e. Flos S. Ioannis Bap.

Nascitur apricis locis in collibus iuxta margines agrorum, solo latiore: Iulio & Augusto floret.

Facultatem, auctore, Galeno, exthecatoriæ obtinet, & subactrem. Flos eius, vi Dioscorides ait, ambustis illinitur, & sanguinis profluvia sistit: miscetur cerato rosaceo: in solatur donec albescat: & tale accopum est lassitudinibus vile.

Radix

Radix, eodem teste, venerem excitat. Florem tu-
sum & impositum factis igitur mederi scribit
Scyvenckfeldius : item contra cancerum & can-
crofa ulcera commendari : fati articulos luxatos
restituere : comam in lacte maceratam illud coa-
guli modo condensare.

Galium flore pallido.

Radice[m] habet fibrosam, repentem : caules
quadrangulos, articulis distinctos, cubit
folia ad genicula ex interuallis radiatim caulem
ambientia, prædicto maiora & latiora : flores pal-
lidè luteos, minimos, in racemulum digestos, non
ramè ut illud ita copiosos, nec ita odorosos. Maio
flor[et] locis humentibus circa pratorum fossas &
riuulorum margines.

Hoc Gallium Tabernamontano secundum est
quoad descriptionem, eius enim nullam propo-
nit figuram.

GALLIVM ALBUM.



rotunda, pusilla : radix reptat, quamquam & ex
reptantibus coliculis fibris demissis se quoque
propagat.

C. Bauh. pin. Mollugo 2. siue montana angustifolia, vel. Gall. album latifolium : Gall. tertium Trago : Gallium album, Lobel. in Adu. Cam. hort. & Thallio : Galion candido flore, Cordo in Diosc. & Cæs. Mollugo 1. Dodon. H. Lugd. & Tabern. Mollugo vulgarior herbariorum, Lobel. in obs. p. 465. & Ic. p. 802.

Floret Maij principio circa Burcken, & inde
versus Kentzinguen.

Galium flore rubro Sprengerianum.

Magna segete ramulorum terram operit
ubrum Gallium, magis patulum, quam
procerum : caulibus angulosis tenuibus, ex satu-
rato virore rubentibus, admodum ramosis & rigi-
diusculis : geniculis folia accrescent radiata in
stellæ morem, tenuia, satis rigida, & veluti pun-
gentia flores inter folia crebri, Gallij albi floribus
pares, sed colore coccineo saturatiore tincti, qua-
drupariti.

Clusius hist. Gallium flore rubro inscribit, ac
ab inuenitore Sprengero Gallium Sprengeria-
num cognominandum putat, C. Bauhin. pin.

Tom. III.



vocat Galliu[m]

2 siue rubrum

Hanc stirpem primus

in Italia ob-

seruabat D.

Sprengeri fi-

lius, aptat que

plantam cum

semine in pa-

triam refere-

bat. Floret

Astate (emen

sub Augusti fi-

nem maturu[m]

est. Vidiautè

ego mensis

Septembris

primip o Ba-

silex florens

in horto D.

Chmielecij.

RUBIA SPICATA.
CAP. XVI.



Angulosis caulis est

Rubia spicata,

tenuibus, co-

loris cinerei,

in ramos pla-

res, pede lon-

giores, didu-

ctis : ad quoru[m]

genicula ra-

diata folia, A-

parines non

maiora : rami

in spicas abeunt

temipalmates,

atque etiam

palmis longio-

res, glumis lo-

gicatis ramo

appressis, è

quorum sicu

flor[et] tenelli videntur erumpere,

Ferd. Imperato Rubia spicata, planta Can-
diz proptia. Clus. hist. Rubia spicata Cretica
C. Bauh. pin. Rubia 12. siue latifolia spicata.

Rubia quidem à similitudine quadam, quam
eius folia cum Rubiz folijs habere videntur, no-
minatur : & spicata cognomen additur, quia sum-
mi cauliculi & rami in spicæ formam desinunt.
Cum autem tota planta non nihil aspera sit : non
minùs commodè Aparinem vel Asperuginem
appellandam suspicatus est Clusius.

RUBIA MARINA NARBONEN-
SIUM. CAP. XVII.

Rubia marina frutex est qui cubitales possi-
det caules, angulosos, candicantes, durius-
culos, multos, è radice crassa, lignosa, rubente, sin-
gulari, longiuscula, prodeutes, iam simplices, iam
ramosos, internodijs modò breuioribus, modò
longioribus distinctos : folia verò articulis adna-
ta aliàs frequentiora, aliàs confertissima, inal-
bent, breuia admodum, angusta, acuminè leuiter
pungentia, sapore nullo : flores parui, longi, pal-
le.

0000 3

Locus &
Tempus.

Descri-
ptio.

Non rae
tio.

Descrip.

conferentes. *Sentia* conuulsi nostram figuram potil-
mum in A. ribus.



Rubia ma-
rina, Camer.
apud Meth.
& hist. germ.
Clas. herb. &
hist. Rubia
marina Nar-
bonensium, in
Ann. & l. p. 3.
799.

C. Bauhin.
pin. Rubia 9.
siue mariti-
ma: Erythro-
danum mari-
num H. Lugd.
p. 137. & C.
crualis mariti-
ma Celsipini.
Sed quoniam Ca-
lculis sit mini-
ma quatuor

Locus &
tempus

digitorum ego ad hanc non refero.

Monspeli apud mare abundat: Aret Vere &
Autumno. Prater in littore Veneto collegit, flo-
rentem Iulio. In mediterranei maris, quod His-
paniam & Galliam Narbonensem, alluit littori-
bus frequentem etiam nasci testatur Clusius.

SPERGULA. CAP. XVIII.

Descrip-
tio.



Palmariis aut
tetraquale-
maris est plan-
ta, ad cubiti etiā
altitudinem ex-
crescens, caulis
multis, tereti-
bus, frequenter
gemmatis, sub
hirsutis, ramo-
sis: folia ad lin-
guos articulos
numerosa, ta-
diatim ut in
Galio caulem
ambiant tenui-
tate, quae par-
ti, sed nequequā
ita rigida, ve-
rū si. ceteren-
tia, superiora
cum coliculo
leniter hirsuta,

aut si parte sulcata, sapore nullo evidente: ca-
pulae in ramulorum fastigiis multa, singula sin-
gulis pediculis donata (quorum vnus aut alter
deorsum pender, alij surriguntur, ut in Holotheo
cary, phyllo anarisi Tabernamontani) Alisines
similia, hirsuta: quae in flosculos albos & quinque
foliis compositos explicantur, apicibus luteis, qui-
bus succedunt vascula Alisines, semina continen-
tia pusilla, nigra: radix subest singularis, recta al-
bis raris fibris donata.

Dod. gall. ait Spergulam officinā & antiquis
innotuit nisi sit Salsamides minus, cuius hi-
storiz satis conuenire scribit. Idem tamen sub
Elarines (specie collocandam censet. De purg.
verd. & in fol. lat. vulgò in Brabantia *Speris*,
atque inde latine Spergulam appellari refert, &

nonnullos Polygonum nominare, quod lo & a-
bandantiam huius promoueat: non esse tamen
Dioscoridis Polygonum, sed multum ab eo differ-
re concludit.

Lob. in Obs. p. 467. itemque l. p. 803. Saginā
Spergulam inferibit, & Polygonum: *knauos* Ger-
manorum Tragi asserit. Sed secundum opinio-
nem Dodonaei: aliud ab hac Spergula censetur
esse illud Polygonum.

C. Bauhin. pin. Alisine Spargula dicta i. siue
minor [Est & et Alisine Spargula facie media, &
Alisine Spargula facie minor.] Spargula H. Lug-
dan. p. 137. Alisine tenui folia altera, vel terre-
stris altera *sparguloides*, Col.

Montbelgardi in agris inter fegetes prouenit:
florēt Iulio, Iulio & Augusto. Serit in agris & po-
tissimum quoniam Autumnum, ut Home, ac primo
Vere, cum alia pabula defecerint, bubus præbea-
tur, testis est Dodonaeus.

Pabuli igitur causa feritur, nec aliam vsum, vñs.
quod constat, habet. Semen quidem vomitione
pituitosos humores educere plerique referunt:
est tamen à gallinis & columbis, quae non solum
citra noxam id ipsam sublegunt, verum
etiam, hoc passim, & oua plura, & citius excludere
credantur.

Spargula purpurea.



Spargulam
purpuream
voco herbulam
radice singula-
ri, longa, cras-
sifuscula, apo-
phytes qual-
dam è lateribus
emittente, sa-
pore betaceo:
caules multi,
per terram spar-
si, ut in Polygo-
no; Tragi, do-
drantales &
minores in ra-
mulos diuisas
quorum singu-
los nodos folia
stellatim adoa-
scuntur, tenuia,
semuncialia

Descrip-
tio.

circiter, qualia Spargula, alia aliis maiora, plu-
rimū glabra, rarius hirsuta: quibus ad exortum
veluti squamulae duae, albæ, ut in Polygono, cir-
componuntur: sapor herbaceus: in extremita-
te ramulorum variè diuisorum flores multi pur-
purei Anagallidis phœnicez floribus similes è
quinque foliolis compositi, alij recti, expansi alij
penduli, occlusi, calyce quinquefolio oblongo,
herbaceo, subhirsuto, pediculis longiusculis hir-
sutis nixi, positi florum Alisines: semen in cap-
sulis Spargulae minutissimum, arenæ subtilioris
instar fuscum, aut cinereum.

Plantam hanc antè nunquam visam reperi flo-
rentem mensis Maij medio, ieiunari à Beblingen
versus Stutgardiam prope pagum *Faingen an den
Sildern*, secus viam arboribus haud constitam, nec
herbosam. Basileæ etiam ad Wism in sabu-
letis & salicetis haud infrequens ab aliis obser-
uata.

Spargula marina nostras.

Crassior est radice quàm mediterranea Sper-
gula, ex qua caules similiter multos profert
palmates

Descrip-
tio.

palmares & pedales, ad quorum genicula nascuntur radiata in orbem *folia*, *aspergulae* jam dictae modo, crassitula, *folia*: ramulorum cuminibus *flores* è calyculis hirsutis erumpunt, similes, quoque foris à sed colore lutei; valcula nonnihil turbinata *femen* continet.

Perpendendum an non hæc apud H. Lugd. sit p. 1385. *Spergula marina* inscribatur, licet nostra magis brachiata & minor sit. Verum hæc euenire possunt ratione locorum.

Mense Septembri reperitur apud lacum salum propè Monspelium quâ ad mare itur.



Locus & tempus.

RVBIA GYNANCHICA.

CAP. XIX.

Non pauca habet cû Gallio communia, cuiusmodi fuit receptatrix *radix*, lignosa, *folia* ad ramulorum genicula, radiata, perinde angusta & splendens, sed longiora, pauciora: *ramuli* quadrati tenues, cubitales & minores etiam, plerumque in terram proni: *folia* longè pauciores quàm



Descriptio.

Gallij, nec racemosi, quadrifolij, rubentes, aut ex rubore in album fatiscientes, majores & longiores, quàm in Rubia angulosa non aspera: nullus flori odor. Plantæ sapor exiccans: *femen* ferè geminum, Aparines modo, oblongum nonnihil laue, pulpa alba.

An Tab. Ic. & h. Gall. album minus, *klein vreis*, *Megerkranz*: Gall. quartum? Geln. hort. Rub. species ūla. multò minor, circa Bononiam Squinathica aut Herba vitæ appellata: Eid. coll. Rubiæ paruum genus, *Aspergula*, & Rubiæ cognata. H. Lugd. pag. 1185. *Cynanchica*, quoddam anginas sumpta & admota valet.

C. Bauh. pin. Rubia 6. siue *cynanchica* (erat ille præerea & describit Rubiam *cynanchicam saxatilem*, circa Valentiam Delphinatû à

D. Butfero collectam:) *Aspergula* herba repens G. fu. coll. *Saxifraga* altero Catalp. Gallium *traphyllon* montanum cruciatum Columnæ.

Genus florabat in E. Maio & Junio *au plain palais*: Biliæ multis in locis adhuc Octobri: Montholgar si in collibus vrbis vicinis, Iulio & Augustum fabuletis & multis locis provenit.


Cynanchica Rubi. licet abique moris: & ad anginas vtilissima est, sumpta & admota.

Locus & Tempus.

Vires.

IVNCARIA.

CAP. XX.



Habet in singulis geniculis bina *folia* ex aduerso sita, *Aspergulae* odorato flore folijs quodammodo similia, breviora tamen & Lini satini folijs non abfimilia: frequentes ramuli ex alarum non prodeunt, similibus folijs præditi, copiosos, paleaceos, candidi & proferentes *flores*: *femen* deinde exile, nigricans: *radix* tenuis est, candicans, non vivax, sed singulis annis semine deciduo, novellæ plantæ enascuntur, illo ipso anno etiam sub finem mensis Augusti.

Descriptio.

Clusij descriptionis author propter foliorum quandam similitudinem, hanc herbam, quâ Salmaticenses à juncorum canaliculorum forma & gracilitate Iuncariam appellant, Gallio rubro flore præfigendam iudicavit.

Lob. in obs. p. 461. & Ic. p. 757. & Gerardo, *Iuncaria Salmaticensis* Clusij. *Iuncaria*, Tab. *Cynanchica* species. H. Lugd. pag. 1185. *Rubia* 8, siue *linifolia aspera*, C. Bauh. pin.

Prævenit locis arenosis, inter vineta, secundo à Salmantica militari. Florèt Iulio: *femen* Augusto maturum est.

Gallio rubro alio, quatenus similia Clusio.

Synonyma.

Locus & tempus.

ARENARIA.

CAP. XXI.

Delicatula plantula, vix palmaris, ex *radicula* longiusculis, albis, crebris geniculis intercepta, ramulos satis frequentes proferre tenuissimos: *folia* ad radicem multa vncialia & geniculis inferioribus circumposita, semuncialia longiora, sed insignis tenuitatis, vñ cum minoribus quibusdam adjunctis: at per articulos bina, in superioribus verò radiatim penè disposita, breviora minutaque, vñ nihil suprà, verticillos imitata, hirsutiem interdum per colicolum exhibet, extremisque ramis *florem* *Spergulae*, album, minorem, calyci incurrentem viridi, foliofo,

Descriptio.

synon.



D. Stephano Sprengero à quo primò accipi dicebatur Polygoni vel Holostei genus. Itaque Vlamam collegerat.

CRUCIALIS FRUTICOSA, CÆSALP.

CAP. XXII.

scri-
tio.

CRucialis quædam dicitur his fruticosa: ramula tenuibus binis foliis, angustis, in singulis geniculis: in alijs grana singula acerabuli figura in quinque barbula desinentia, parua, dura, viridia, & iturata: intra semina bina continentur: oritur in montibus.

Cum quædam hæc fruticosa sit nos lateat, eam post Rubiolas relinquimus, eò quòd & ipse Cæsalpinus eam post illas locauerit.

ASPARAGVS ET CORRVDA

in genere.

CAP. XXIII.

Asparagi
generalia
describitur.

Est Asparagus, vel Atheniensium more Asparagus [ἀσπάργος] vel Sparagus, ut efficitur de re huiusmodi a dicunt, Galeno 2. de alim. teste, generatim quidem omnes prope modum coliculos teneriores, & teneriora germina seu olerum & herbarum, seu suffruticum, seu fruticum, arborumque denotet: attamen peculiari generi plantæ etiam tribuitur, quæ sic dicta, quod cauliculos hos, qui in germinatione de terra prodeunt præcipuos habeant.

Asparagi
describitur.

Asparagus in petrosis [ἀσπάργος πετρώδης] nascens, quem Mycanthos vocant, & paulò inferius. Quidam autem Mycanthos vocant, quæ arietis cornua contrusa deest. Asparagus quoque (αὐτὸς αὐτῶν, alitalem, veteris: quod tamen probabile mihi non videtur. folijs numerosis, longis, fœniculo proximis: radice rotunda, grandi, tuberculum [nodum] habente.

Galenus 2. alim. duo quoque Asparagi genera memorat, Asparagum regium, & Asparagum palustre.

Theophrasto 6. hoc [ἀσπάργος] hanc solam vocem per geminam Asparagum, Corrudam Gaza vertit [ex toto aculeata est, & nullum juxta aculeum folium gerit. Et 6. hist. 3. ait juxta aculeos pusillum quiddam clauæ simile producere: ex quo flosculus tandem ipse erumpat: radice largâ, altâ, numerosâ, eadêque tam crebrâ inniti, vix pars supetna radicum tota connexa & continua reddatur, ex qua vel ipsorum caulium prouentus facit iterum, &c.

Siluestres fecisse naturam Corrudas, ut quisque demeteret passim: sed ecce & altiles spectari Asparagos, hortorum curâ, testatur Plinius lib. 19. cap. 4. Et ait hinc ejusdem libri cap. 8. Omnium hortensiorum laudissima cura Asparagis. De origine eorum in siluestribus curis abundè dictum, & quomodo eos juberet Cato in harundinetis feri. Est & aliud genus incultis mitius Corrudâ (Asparago hoc spinoso ut sponz coronarentur apud Bæstios in more fuisse, tradit Alex. ab Alex. c. 4. l. 1) passim etiâ montib. nascens, refertis superioris Germaniæ cæpis, non infaceto Tiberij Cæsaris dicto, herbam ibi quandam nasci similimâ Asparago. Nam quod in Neside Campaniæ insula sponte nascitur, longè optimum existimatur. Hortensium [hortense, Dal.] feritur spongijs. Est enim plurimæ radicis, altissimæque germinat. Vixit thyslo primùm emicante: qui caulem educens, tempore ipso fastigiatus in totos striatur. Potest & semine feri. Nihil diligentius comprehensit Cato, nobilissimæque libri est, ut appareat repetitam ac nouitiam viro curam fuisse. Locum subigi juber humidum & crassum. Semipedali vniq;que intervallo feri, ne calcetur. Præterea ad lineam grana bina aut terna paxillo dimitti: videlicet semine tum tantum seiebat. Id fieri secundum æquinoctiū vernum. Stercore satiari, crebrò purgari, cauere ne cū herbis euclatur Asparagus: primo anno stramento ab Hieme protegi. Vere aperiri, sarriti, runcari. Tertio incendi verno. Quòd maturius incensum est, hoc melius prouenit. Itaque harundinetis maxime conuenit, quæ festinant incendi. Sarriti juber idem, non antequam Asparagus natus fuerit, ne in sarrendo radices vexentur. Ex eo velli Asparagum ab radice. Nam si defrangatur, stirpescere & intermori. Velli, donec in semen eat. Id autem maturescere ad Ver, incendi que: ac rursus, cum apparuerit Asparagus, sarriti ac stercoreari. Ac post annos nouem, cum jam vetus sit, digeri subacto solo, stercoreatque. Tum spongijs feri, singulorum pedum intervallo. Quin & ouillo fimo nominatim uti, quoniam aliud herbarefecerit. Nec quicquam postea tentatum velius apparuit, nisi quod circa Idus Februarij defosso semine acruatis paruulis scrobibus serant, plurimum maceratum fimo. Dein nexis inter se radicibus, spongijs lictas post æquinoctium Autumni disponunt pedibus intervalis fertilitate in denos annos durate. Nullum gratius his solùm quàm Rauennatium hortorum. Indicauimus & Corrudam. Huc enim intelligo syluestrem asparagum, quem Græci Ominum aut Mycanthos vocant, alitve omnibus. Inuenio nasci & arietis cornibus (fabulosum vniq;que id sibi videri scribit Dioscor.) tuis atque defossis Lib. 20. cap. 10. ait syluestrem Asparagum aliquos Corrudam, aliquos Lybicum vocare, Atticos Orminium, cujus efficacior vis & candidior major. Lib. 21. cap. 16. concludit in totum spinam esse Asparagum.

Cornarius, nostro judicio, acriter est reprehendendus, dum ait Asparagum palustrem Galeni, Dioscoridem petrum aut Mycantham appellare, & de ipso etiâ prodi affirmare, quod si quis arietis contrusa cornua defodiat, nasci Asparagum, ut sic satius ex siluestri fiat: Plinium verò Corrudam & siluestrem Asparagum vocare.

Reperio antiquos Græcos, inquit Fallopius in Epistola ad Mercurialem, vnde vox ista originem traxit, nō solùm Ἀσπάργον sed etiam ἀσπάρδα.

Aspara-
gus opti-
mus ubi

Corruda
Aspara-
gus.
Mycanthos.

Libycum.
Orminium.

Corn. opi-
nio repro-
banda.

parag appellasse remde qua loquimur. *Asparagos* quidem communior erat appellatio, quâ torâ ferme Græcia utebatur: *ἀσπάργος*, vti magis celebrata vox, quasi solis Atticis referuata, vti ex Athenæo conuincitur lib. 2. & ex Galeno lib. 6. simplic. & 2. alim. colligere possumus, videmusque (nisi scriptura mendosa sit) hoc confirmatum apud Theophrastum, cum aliquando *ἀσπάργον*, alias verò *ἀσπαργον* in hist. pluriscriptum reperimus. Vnumque hoc subinde addam, quod apud eosdem Græcos *ἀσπάργος* guttur ac fauces aliquando significat. Quanquam Apion Grammaticus tollendæ homonymiæ gratiâ non *ἀσπάργον*, sed *ἀσπαργον* scribendum dixerit, veluti multæ etiam teste Eustathio, in hoc Homeri loco fecerit, qui non *ἀσπάργον* sed *ἀσπαργον* scribendum iudicauerunt. Dicitur autem *ἀσπάργος*, quasi *ἀσπαργος*, i. e. *ἀσπαργος*, nō satus, quia, vt inquit Athenæus, inter omnes asparegos, hi qui minime satiantur, principem locum tenent, etque iidem medentur omnibus interitus morbis: qui verò feruntur, non in eodem pretio sunt. Quid autem per Asparagum intellexerit antiquitas, satis constat ex eodem Athenæi loco, atque ex Galeni 2. alim. & ex libro de attenuandæ viti, quod secutus Oribasius 2. & 3. coll. & Paulus & Aëcius lib. 1. hæc nos docuerunt. Quatuor se esse Asparagorum genera, quorum primum illud erat in ordine, quod omnia olerum gemina, aut caules tenerimos, sub se continet, cum primum illos planta ad flores, seminâque procreanda, aut fructus sustentandos emiserit, talesque se iunt, vt cocti, aut crudi elui aptè accommodentur. Vnde teneros Brassicæ cauliculos *ἀσπαργός* vocabant antiqui, ita etiam & reliquos oleum, vt Bliti Lactucæ, Articipicis, Malicæ, Betæ Napæ, Raphani, Lampinæ, Nasturtii, Pyrethri Brassicæ, & lauc similitum, quib. hoc primum Asparagorum genus continetur. Cui adiungimus secundum, quod sub se omnia germina, aut recētes colliculos *ῥίζα ἀσπαργίου* fructuum [vt Ruscii, Oxianthæ, Vitis, &c.] se. complectitur, qui tenerissimi erumpentes elui apti sunt: nam quæ Vere primò erumpunt germina, huiusmodi etiam ab antiquissimis scriptoribus Asparagi nomini & sociata sunt.

Hic addamus tertium genus, quod in quibusdam plâis quæ *ἐμπύκνωται* sūt, nec inter olera domestica, aut syluestria, neque inter frutices commemorantur, prociunt, suntque tenerissima illorū germina, aut cauliculi, antequam flores vel fructus protulerint. Vitis enim albæ Bryoniæ dictæ, & vitis nigræ viticulæ asparagi nomine ab Antiquis in cibos assumebantur: ita & caules teneri elaphobolci & Hippofelinii, & Anonidis, nostris quoque temporibus additis lupuli & equiseti cauliculus tenerissimus, quæ plantæ omnes olera neque sūt neque carib. antichoræ præfuit, illa quoque partes tenerissimæ dum erumpunt, pro asparagis ad mensas veniunt: & quamvis asparagi isti à scriptoribus nuncupentur, alias tamen proprias appellationes possident, videnturque quasi improprie Asparagorum nomine donati cum quatuor generis, ad quod jam venio, illud sibi propriè, asciuerit. Sit itaque Asparagi quartum genus quod sub se plantam continet quādam quæ propriè & peculiari quadâ dote *ἀσπάργος*, & Asparagus à scriptoribus tam Græcis, quàm Latinis vocatur. Quæ planta Asparagus propriè dicitur, & cum tenerissima est & noua, nondumque se in spinas aut folia, aut capillamenta explicauit, antiquorum, & nostrorum hominum etiam mensis valè digne, est eodem nomine insigni-

ta, quo tota planta, ob summam quam inluit cum palato & sanitate corporis humani gratiâ, atque vti de facie multiplicem nouimus plantâ hanc esse, multiplicem item legimus apud Scriptores, quoniam Asparagi peritæ meminit Dioscorid. & Galenus, cecnon Asparagi myacanthini vel myacanthæ dicti, Regij verò meminit idem Galenus & Oribasius: montani Athenæus, & hoc est palustre Asparagi idem Athenæus, Gal. Orib. Paulus, & Aëcius mentionem fecerit, vt etiam *ασπάρ*, id est hortensis Paulus solus: Inter Latinos verò Asparagi satium meminit Columella, quem Asparagum simpliciter, vel hororum cerudam vocat Plinius: Asparagi quoque syluestris meminit Plinius, idem & Palladius. Et quamvis plures sint voces istæ, non ob id tamen mea sententiâ, plura quàm tria infima Asparagorum genera significant, Myacanthinum scilicet, & Myacanthum h. nem cultu emollium, tertium palustrem, neque alia sunt Asparagorum genera ab his tribus, quæ dixi, distincta, &c. Sententia autem mea hæc est, magis probandas esse radices sylvestris, illasque afferendas, & in medicamentis collocandas; primò quidem quia in locis saxosis oriuntur, sintque duriores, & ob id etiam incorruptiores seruari possunt. Secundò, quia sylvestri Asparagus efficacior est ad omnia. Tertio, quia in satuo inest vis quædam *ῥιζοτοξικὴ*, & quasi venenata, cum dicat Dioscorides vim ipsius sterilitatē ac infertilitatem parere, quâ malâ qualitate fugiendam esse censeo. Quam ob rem, vt jam finem faciam [inquit Fallopius, cuius, verba hæcenus recitauimus] jassero de syluestri tantum locutum esse Dioscoridem: Et si de vitroque, *sylvestrem* tamen, ipsius sententiâ meliorem, ipsumque cum ejus vis sit ruior, afferendum. Satium verò ad delitias mensarum, ac ad gulæ irritamenta esse magni faciemus.

Radicibus
sive As-
par. in
medica-
mentis
utendum.

ASPARAGVS HORTENSIS ET Pratenfis.

CAP. XXIV.

Cordus Asparagum satium & campestem Definitio:
Etiam editis, quàm planis locis nascentem sic
describit: Asparagus caules emittit primo Vere
teneros, longos, teretes, virides, glabros sine folijs, ab vno cespice plures, qui paulatim in numerosos, tenues, lentos, diuiduntur ramos, & virgas & circa has foliola frequentia, vncie longitudine, indiuidua & capillorum aut setarum modo tenuia: tota itaque herba cum Fœniculo aliamquam in folijs similitudinem habet, & duum cubitorum altitudinem perit. Flores Sole in Geminos transeunte circa ramulos copiosos, paruos, & pallidos producit, & post eos bacant Pisti quantitate, rotundas, rubentisque, intus carne sua duo aut tria nigra & corneæ soliditatis semina claudentes. Radicibus hitur perennibus, numerosis, ab vno transuerso, & propter caulium vestigia, aspero, villorūque dorso, vtrinque in obliquum descendibus, longis teretibus, lentis, foris cineraceis, intus autem candidis, quibus dulcis & glutinosus est sapor: cauliculi item adhuc teneri admodum suauem saporem habent, sic ipsa etiam semina.

Alterum Asparagi genus Cæsalpino, crassiores habet, & gustu grauioribus aspatagos, quàm primum [Corruia] lapore quodam fungos Prunulos imitante: caules breuiores, per se stantes: longiores ramulos: foliola mollia, non pungentia: sterculos longiore pediculo pendentes: frug-

PPP

et paulo crassiores, in quibus semina ad summum sex usque continentur: amat hortorum umbrosiora: floret Vere.

Synonyma.
ma.
Catech.

Asparagus, Brunfels. Trago: [qui non bene distinguit à Corruia, quam ei ignotam fuisse suspicamus] Matchiol. Fuchs. Dod. gall. Cordo in Dioscor. & hist. Gesn. hort. (ubi majoris & minoris meminit. An eid. in append. Asparagus Italicus, in nonnullis Germaniæ hortis crescens, & à Germanico differens? (Lon. & Elachsi Tab. II. quem tamen figura non exprimit. Asparagus altiss. Fuchs. Turn. & Tabern. Asparagus domestica Bellon.

Asparagus altiss. Diosc. idem cum sativo & hortenfi, Anguil. Asparagus laticus, Lac. Cak. H. Lugd. pag. 610. & Germ. Asparagus hortenfi, Hort. Luf. Dod. lat. Lob. in Adu. & Camer. Asparagus domesticus, Eysl. Aspar. domesticus vulgaris, Lobel. in Obs. pag. 452. quoad titulum.

Asparagus: Germ. Spargen: Belg. Asperges, nonnullis Coralloruy: id est Herba coralli, à baccis coralli instar rubentibus: Gall. Esparge: Ir. Asparagos: Hisp. Eparagos: Angl. Spargae: Boh. Vromovye korenny: Hung. Sparga.

Locus.

Asparagus folio molli i. siue sativa, C. Bauh. pin. qui cum in pratis Alsatiæ Basileæ vicinæ, & in pratis ad Danubium sitis, & in Burgundia circa Vesontium sponte proveniat, hunc Plinium intelligere censet, cum in superioris Germaniæ campis provenire scribit, & Clusio dici Asparagum minorem sponte nascentem Hisp. & hist.

Asparagus altiss. ubique in hortis frequens est.

Asparagus marinus.

Descriptio.

Minimi digiti ferè crassitudine sunt lignosa virgulta, in tortuosos ramos dinaricata, per quos folia breviora, crassiora, latiora, robustiora que quam in altissimi Asparago, multò majora molliora que quam Corruia: baccæ duplò luniperinis majores, rubentes, aut nigricantes, semina complectuntur quatuor aut quinque majuscula.

Asparagus palustris Galeni.

A Regio quid distinetur.

Synonyma

Et hic est Asparagus Galeni, cujus meminit Galenus lib. 3. alim. Voco autem palustrem hunc Asparagum, quia provenit apud lacus palustres propè mare Monspeli. Qui præterea hic describitur, non multum differre videtur à Regio, siue eo qui in hortis colitur, & tam à Fuchsio, tum à Matthiolo pingitur, nisi quod videtur contrahere sanguinem aliquam propè mare. Baccæ etiam, ut dictum, majores videntur, folia etiam crassiora & firmiora. Præter has notas & alia occurrunt, quæ à vulgari distinguitur, nempe color subcæruleus, vel cinereus, non viridis, qualis in vulgari.

C. Bauhin. pin. Asparagus folio molli 3. siue As-

parag. maritimus crassiore follo: Asparag. idem siue palustris Galeni: Asparagus palustris Matthioli. Anguill. & Tab. Asparagus marinus Clus. hisp. & hist. itemque Camer. Asparagus maritimus Dioscoridis Lob. in Adu. & Ic. p. 786. Asparagi alterum genus (Asalp. hoc Asparagi genus alterum Crl. huc non referimus.) Asparagus sylvestris Gerardi.

Indicandum hic erat, Asparagum hunc maritimum Dioscoridis Lobelij in Obs. 458. Asparagi domestici vulgaris titulo donari, & tamen pro maritimo inibi describi. Clusius Corruia negat, & Asparagi altissimi genus asserit, & quia maritimis declivioribus & herbidis locis sponte provenit, marinum vocat.

Monspeli ad mare provenit, floret Aprilis: baccæ maturæ Augusto vel Septembri.

Locus & tempus.

Asparagus platycaulis.



Monstro: (a nostro Defectio. judicio Asparagi hortensis varietas hæc data nobis fuit à D. Friderico Meyer a gentinæ: qui narrabat primo Vere in hortu Ill. Comititis à Leiningen propè Creutznau in Palatinatu, & quotannis tali formâ prodire. Caulem exerit trinitalem, vnicam latam

compressum, striatum, ex quo utrinque ramuli prodeunt quales Asparagi vulgaris, temerè & nullo ordine positi. Foliola, flos & fructus qualis vulgari.

Figuræ Asparagos è radice emergentes, & flores cum fructu & acinis sua magnitudine appinximus.

CORRUIA.



Droris, con- Defectio. gulis virgulis ad hominis altitudinē fructificat, in frequentes ramulos striatis, alternarim ferè divisis: foliola ex vno puncto plura exeunt, veluti in Larice, duriora & breviora quam Asparagi altissimi, & spinosiora, quam foliorum nomine digniora, quippe acriter pungentia

Asparagi vires & usus.

gentia : flores parui pallidi , altis Asparagi æmuli : bacca prima fronte ejusdem bacis similes , ingrati saporis , & tædine obnoxie , in quibus primum occurrit pellicula alba , pellucida , dein de rubra , densa , terit nigricans , postremò semen vnicum , vel duo , alba , latelescentia , duriuscula .

Asparagi primam speciem , Dioscoridi petream vocatam , Anguillara eandem cum Corrua facit , & Asparago spinoso , qui à Plinio Lybicus dicitur & Horminus . Nec species diuersas esse , vt multi putant , statuit .

E tribus Corruæ generibus prior dicitur , inquit Clusius , Gicè *ἀσπάριος πετράιος ἢ πυλῆνας* , i.e. Asparagus petreus siue sylvestris , & Murina (spina . Plinius , etiam à Latinis Corrudam , ab aliquibus Lybicum , ab Atticis Orminium vocari tradit .

Corrudam nonnulli dictam volunt , teste Ruellio , quòd , vbi adoleuit , faciliè corruiat , decidat : sic Horminum *ἀπὸ τῆς ὀψιᾶς* , q.e. uo : Lybicum autem , à patria , Germ. *Siein Spargen* , siue *Stich* : aut *dorn Spargen* , & *woilder Spargen* , Gall. *Epargel saunage* : It. *Asparago saluatico* : Hisp. *Spargaga* & *Elparagos* indifferenter , tamen si Elparagos irrigueris quia in agris fimento confitis apud eos plurimumque crescit , appellant . Angl. *Prickly Spargage* , propter aculeos .

C. Bauh. pin. Asparagus Corrua dictus 1. siue Asparagus folijs acutis : Asparagus petrea Dioscoridis & Galeni : Corrua & sylvestris Asparagus Plinij : Asparagus petreus & Corrua Dod. gall. Cordi hist. Rauv. Bellon. Lob. in adu. & Icon. p. 787. (Corrua differens ab altili Asparago) H. Lugd. p. 611. (icones duæ Dodonæi & Penæ) & Turn. cui & Asparagi alterum genus , & Asparagus sylvestris . Asparagi prima species Anguill. & Cæsalp. Asparagus sylvestris , Germ. app. Lac. Dod. lat. Camer. epit. siue Corrua Bellonij : Corrua prior Clus. hisp. & hist. itémque Tab .

Circa Monspelium locis siccis & aridis prouenit : in Italia verò , Castella & Granatenfi regno abundat . Floret uò maturiscente , hoc est Augusto : semen Octobri maturum est .

Habet autem præterea duas alias Corrudas Clusius , quarum vna quæ ipsi altera inscribitur , C. Bauh. pin. dicitur Asparagus Corrua dictus 2. siue Asparagus aculeatus alter , tribus aut quatuor spinis ad eundem exitum . Asparagus sylvestris alter Dodon. & Ger. Corrua altera , Clus. hisp. & hist. H. Lugd. p. 613. & Tab. cui in Ic. Corrua Hispanica : Corrua hispanica altera quæ Lusitanica Lob. obs. p. 459. at suprâ iconem , vt & in Ic. Plant. 787. Corruæ varietas , Asparagus petreus , & Myacanthinus Galeni : Asparagi genus quartum , Cæsalp .

Alia verò quæ ab ipso tertia inscribitur dicitur C. Bauh. pin. Asparagus Corrua dictus 3. siue Asparagus aculeatus spinis horridus . Polytrocha , Bellon. de negl. cult. & obs. lib. 1. cap. 18. Asparagus sylvestris tertius , Dodon. Corrua 3. Clus. hisp. & hist. Lob. obs. pag. 459. p. & Ic. pag. 788. H. Lugd. pag. 613. & Tabern. cui in icon. Corrua hispanica altera : Asparagus siluest. spinosus , Germ. Asparagi Theophrasti nomine , cui spina pro folio , ex Creta ab Honor. Bell. transmissa . Harum verò vtraque in Lusitania & Bætica tota occurrit . Nouembri fructu onusta , interdum floribus hinc inde sparsis , nec alibi visa .

Tom. III.

Hæc ita traditis , reliquum est , vt vires & usus ascribamus . Asparagi igitur in petriolis nati cauliculus leniter decoctus , & pro cibo sumptus , ventrem molli , urinamque cit . Radicum autem decoctum eorum , ægri meientibus , regio morbo laborantibus , nephriticis & ischiasticis auxiliatur : itidemque morbis à phalango , siquidem & vino decoquatur . Sic & dolore dentium infectatis proficit , si modò decoctum super affecto dente contineatur . Semen quoque eorum ad eadem valet . Aliunt & canes , si Asparagorum decoctum hauserint , emori . *Altis* verò Asparagi cauliculus ex vino albo tritus , renum dolores sedat . Coctus enim assulve Asparagus in cibo sumptus , urinæ stillicidium , difficultatemque ac dysenteriam mitigat . Eiusdem radix in aceto , aut vino decocta luxatos artus mulcet . Cum siccibus autem , cicericibus decocta , sumptaque , regium morbum sanat , & coxendicum cruciatus , urinæque stillicidium leuat . Ceterum , amuleti ratione alligata radix , itemque haustum ipsius decoctum , partum impediunt , sterilitatemque inducunt , ex autoritate Dioscoridis .

Vtilissimus stomacho cibis Asparagi , vt traditur , inquit Plinius . Cumino quidem addito infusiones stomachi colicæ discutiunt itidem oculis claritatem afferunt . Ventrem leniter molliunt . Pectoris & spinæ doloribus , intestinorumque vitij profunt , vino cum coquantur addito . Ad lumborum & renum dolores , semen trium obolorum pondere , pari cumini bibitur . Venærem stimulant . Urinam cient utilissimè præterquam quod vesicam exulcerant . Radix quoque plurimorum prædicatione trita , & ex vino albo posita , calculos quoque exturbat , lumborum & renum dolores sedat . Quidam & ad vultus dolorem radicem cum vino dulci propinant . Eadem in aceto decocta contra Elephantiasin proficit . Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant . Sylvestris Asparagi ad suprâ dicta omnia efficacior vis , & candidiori major . Regium morbum extenuat . Venæris causa aquam eorum decoctam bibi iubent ad heminam . Ad idem & semen valet cum Anetho , ternis vtrumque obolis . Datur & ad serpentium ictus succus decoctus . Radix miscetur radici Marathi inter efficacissima auxilia . Si sanguis per urinam reddatur , semen Asparagi , & Apij , & Cumini ternis obolis in vini cyathis duobus , quinis diebus Chrysippus dari iubet . Sic & hydropicis contrarium esse , quamvis urinam moueat , docet . Item venæri : Vesicæ quoque , nisi decoctum : quæ aqua si canibus detur , occidi eos (hoc Dioscorides tantum famâ hominumque sermonibus vulgatum ait .) In vino decoctum radicis succum , si ore contineatur , dentibus mederi : *Huc vsque Plinius* .

Asparago petreæ siue myacanthino Galenus 6. simpl. extergendi vim ascribit , & neque calesfacere , neque frigefacere manifestè , scribit . Ideoque & renes & hepæ ab obstructione liberare : & maximè radices herbæ & semen . Quin & dentium dolores siccando sanare , quo sanè dentes maximè opus habeant .

Tradunt nonnulli , teste M. zaldo , radices Asparagi siccatas & dentibus infixas , illos absque dolore eradicare . Qua de re consule Schenckium lib. 1. Obs. 4. 14. titulo , vt dentes sine dolore & festo extrahantur .

Vires & usus.

Aperit.

Anili.

Amula.

Plin.

Galen.

Temp.

Perhibet Tragus Asparagi recentia gemina; vino cum butyro & aceto decocta, qua ratione & Lupuli turiones parari solent, aluum emolli-ri, vitia pectoris expurgare, urinam promouere, sed & genituram minuire, si quis continuò illis vratur. Semen aut herbam vino decoctam, & aquam distillatam, eadem cum radicibus obtinere facultates: aduersus morbum regium deco-qui radicem cum fici & cicere, & hac portione sumpta, morbum pelli, asseri.

DRYPIS THEOPHRASTI, ANGVILLARÆ
CAP. XXV.

Descri-
ptio.



Theulo Dry-
pis Theo-
phraſti miſſa ad
fratrem Caſpa-
rum planta, lu-
tea tota, herba-
cei potiùs, vti
videtur, quàm
fruticoſi gene-
ris: rami in fur-
culos diuiſi, fra-
giles, tenues, po-
liti, geniculis
creberrimis di-
ſtincti, ad quo-
rum vtrūquod-
que bina aduer-
ſo ſitu naſcun-
tur folia, ſine pe-
diculo quidem
ſed non amplexi
caulia, ſemū-
ciam plùs minùs

longa, ab eortu latiora ſenſim accuntur, lunipe-
rinis qualibet parte anguſtiora, fragilia, & ſpi-
nam mitiorem ſerè imitantia, ſuperius veluti ca-
nulata, auerſa parte ſubrotunda.

Hæc Drypis videtur aliquid ſimilitudinis ha-
bere cum Camphorata glabra, quæ tamen non
ſerpiſcit: Huic etiam quodammodò ſimilis Echi-
nopus Plutarchi quorundam, verùm illa eſt fru-
ticuloſa planta.

Iconis.

Icon quam ex alijs aſſumpſimus deſcriptioni
noſtræ non reſponderet. Optaſſemus vt ex planta
Fratriſ delineata fuiſſet.

Synony-
ma.

Cæterùm, Drypis Theophræſti Anguillaræ di-
citur Lob. Obſ. p. 460. Ic. Plant. pag. 789. Tab. &
H. Lugd. p. 1480.

Drypis
Theophr.

Asperula Theophræſtus i. hiſtor. 16. tantùm memi-
nit, eam ſemel duntaxat nominâs de genere ſpi-
noſo eique loco folij ſpinam aſſignans. Dicitur
autè *ἀνὰ τὴν ὀπίσθιον* i. e. *κατὰ τὴν οὐρὴν, ἔξωθεν*,
à lacinando, pungendo, vellicando, quòd acu-
leis ſuis attrèctantes & colligere volentes vulne-
ret. Quibuſdam Eryngium marinum Drypis
Theophræſti videtur eſſe: Alij Drypis eſt Aca-
nos Plinij. Sed neutra opinio ardet. Gui-
landinus Drypida Theophræſti, Tragus Mar-
thioli fecit: aſt apertè hallucinatus eſt. Sunt qui
Carduum capite nutante velint, ſed errât & ipſi.

CAVCON, EPHEDRA, ANABASIS,
Veteribus. CAP. XXVI.

Locus.

Caucon, & Ephedra, & Anabaſis [his no-
minibus appellatur quoque Hippuris c. 13.
l. 26.] ab alijs eſſe vocaram, Plinius c. 7. jam di-
cti libri, memoriz prodidit, addens naſci vento-
ſo ſerè tractu, ſcândens arborem, & ex ramis pro-

pendens folio nullo, citris numeroſis, quæ ſint
lunci geniculati, radice pallida. Dari ex vino
nigro auſtero tritam ad tuſſim, ſuſpiria, tormina,
& ſorbtione factâ, in quâ vino addi conuenit.

Facile autem apparet cur Ephedra & Anaba-
ſis vocetur, quibus nominibus Plinius verba tan-
quam originis expoſitionem ſtatim adiungit, vt
ſuperuacua ſit Hermolai coniectura, Ephedron
legi poſſe, quoniam in aquoſis naſcatur, monen-
te Geſnero, Quadr. de equo.

Porro exiſtitant quidam Plinij Caucon,
Ephedram & Anabaſim eſſe Hippurim, de qua
poſthac agendum.

Alij ſibi perſuadent Caucon Plinij eſſe Cuſcu-
tam. Hæc autem opinio minùs placet.

Mihi præ cæteris eorū opinio magis proba-
tur qui arbitrantur Caucon Plinij poſſe conue-
nire Tiago quorundam, ſive Vææ marinæ: de
qua H. n. lib. 39.

EQUIETA VEL HISPVRIDES ANTIQVIS
CAP. XXVII.

Dioſcorides Equiſeti duo genera fecit. Pri-
mum, quod in rignis & ſcrobibus naſcitur,
cauliculoſque edit inanes, ruſcentes, ſubſpe-
ros, ſolidos, geniculis in ſeſe factis interſectos:
ac circum ipſos folia juncea, crebra, tenuia que.
In ſublime autem attollitur, vicinos ſcandens
arborum caudices, ex iſſique dependet, circum-
ſuſum comis multis, nigris, vt eſt equi cauda:
radix lignoſa eſt ac dura. Alterum caule eſt re-
cto, æquali, cubito maiore, quodammodò inani,
comis per intervalla breuioribus, candidioribus
que & mollioribus.

Plinius & tertium agnouit. Equiſetum [inquit
lib. 26. cap. 13.] Hippuris à Græcis dicta & pratis
vituperata (quoniam viginioſius pratum eſt, vbi
naſcitur, ceu l. 18. cap. 28. ſcribit Plin.) nobis, eſt
pilus terræ, æquina ſeræ ſimilis. Alij Hippurin,
alij Ephedron, alijs Anabaſim (Eæſem quoque
ſunt appellationes Cauci plantæ ab hac diuerſæ,
lib. 26. cap. 7.) vocant. Traduntque juxta arbo-
res naſci, & ſcandentem eas dependere comis
junceis multis nigris, vt eſt equorum cauda,
geniculatis ramulis folia habere pauca, tenuia.
Semen rotundum. [Nihil Dioſcorides: præterea
ſuſum id eſt. Nullum enim ſemen edit,] ſimile
Coriandro, radice lignoſa: naſci in arbuſtis ma-
ximè. Faciunt & aliam Hippurim (hæc ſecun-
da eſt Dioſcoridis) breuioribus & mollioribus
comis, cãdioribusque, per quàm vtilem iſchia-
dicis, & vulucribus ex aceto impoſitam, propter
ſanguinem ſiſtendum.

Cæterùm, Equiſetum lib. 18. cap. 28. dicta eſt
Equiſetis & Equiſelis, quoniam littera t facile in
l mutatur. Ab hac porò planta veteres Code-
ta quaſi caudeta nominarunt trans Tiberim loca
obſita caudis equinis apud Feſtum. Dicta enim
& *ἵππων*, ſive Cauda equina, quòd folia ſeris
equinis reſpondeant.

Eur. Cordus ſuſpicatur pro altera Sanguinali
poſſe Equiſetum intelligi, cum credidit hodie
Equiſetum, hiſtoriz Dioſcoridis non vndiqua-
que reſpondeat.

EQUISETVM MAIVS AQVATICVM.

Asperago primùm protrudit palmares, &
cubito altiores Polygoni fœminæ craſſitie,
internodijs longioribus, pyxidata inferione, di-
ſtinctos (cotyla ſimbrista nigricante alterius ru-
bylum excipiente, quâ notâ etiam à Polygono
fœmina

Locus &
Tempus.

tinet suspicamus naturæ lufum.

In ferobibus ac locis aquas habentibus subinde & in pratis humentibus ac riguis reperitur. Aprili & Maio prodit.


Equisetum minus terrestre.

Descrip-
tio.



Haud secus ac Equisetum majus, *Asparagus* emittit, sed graciliores, longioribus & laxioribus fimbriatis nigricantibus cotylis tubulos excipientibus: nucamenti æmulum capitulum apicibus albidis confertum confimile: verum ex geniculis folia radiatim enata, dodrantem æquant, & ipsa, quoque ex articulis sobolem radiatim pariunt, tota plantula aspersa est sapore impense siccante: radix nigra, caulis crassitie respondet, fibris hinc inde exortis capillata, plerique caules emittens.

Matthiol. in Dioscor. picturam tantum habet sine descriptione, sub titulo Equiseti alterius, quod ait vocari vulgò



Math.
not.

Synonyma.

C. Bauh.
not.

Asprellam. In post. comm. It. eandem figuram tetinet sub inscriptione, *Coda di cavallo seconda*, omitrens dici Asprellam, quâ occasione motus, nescio. Nullibi etiam describit suum Equisetum tertium, nec quâ in re à præcedentibus differat, declarat: suspicor ego alterius præcedentis varietatem: male autem id C. Bauhin. phyt. Equisetum 7. siue junceum ramulosum folijs nudum, vocat. Sed cur lunceum & folijs nudum: Matthioli figura demonstrat caulem cum folijs geniculatis, qualia ceteris.

Tab. Ic. Hippuris arvensis, siue segetalis minor, *grab Vöster Schaffheuv*: Item, Equisetum palustre, *groß vasser Schaffheuv*. Eid. hist. Hippuris 3. siue arvensis t. major: Dioscoridis, *ἵππουρος ἁγρία*, *ἵππος & ἁγρία*, vel, ut quædam exemplaria legunt, *ἵππουρος*: Hippuris altera, Equisetum alterum. Gynus, Equisitium, & Equisetum minus. Equisetum arvense majus. Hippuris arvensis, & Segetalis major, ac Corfanda, Herbariorum: Italorum, *Scevola*, & *Equiseto minore*: Gall. *Prelepis*: Angel. *Lyttel horse sayle*: Belg.

Cley Peerdiseert, & *Cleyen Caustonsteert*. Item Hippuris 4. Equisetum palustre majus, *groß vasser Pferdscheuvant*. Et tandem, Equisetum 3. siue minus arvense, Hippuris, 5. siue arvensis minor, *lei Vcker Schaffheuv*.

C. Bauhin. phyt. Equisetum 4. siue pratense longissimis folijs, Hippuris maior Tragi [qui duo genera tradit, Majus & Minus]: Item, Equisetum 5. siue arvense, Hippuris minor Tragi. Eid. pin. Equisetum 8. siue pratense longissimis setis: Equisetum alterum Mart. (& apud eum, Cam.) Lac. Cæf. & H. Lugd. Hippuris altera Trago & Amato: Hippuris & Equisetum, Geln. cat. Equisetum Fuchf. ic. & Cordo in Dioscor. Equisetum longius, Dod. gall. [figurâ transpositâ] & Fuchf. Hipp. major, Thal. prima, Lonic. Hipp. fontalis & Equisetum 2. Dioscor. Lobel. Hipp. minor. Lob. ic. figurâ 2. Equisetum palustre majus Tabern. palustre Gerardo. Item pin. Equisetum 9. siue arvense longioribus setis: Hippuris minor, Trago, Dod. & Thal. Hipp. altera, Geln. cat. Equisetum, Er. Cordo, minus, Fuchf. figurâ transpositâ: minus vel 3. & 4. Lonic. Polygonon forma Fuchf. ic. Equisetum alterum, Cordo in Diosc. & Lob. ic. Hippuris arvensis major, Tab. Equisetum segetale, Gerardo.

In sabulosis ac arenosis exit, sed tamen haud irriguis: in vligniosis non raro. Aprili & Maio prodit.

Synonyma.
C. Bauh.
lin.

Locus &
Tempus.

EQVITI SPECIES ALIQVOT C. BAVH.

Equisetum nudum minus variegatum Basleense.

Ex radice patua nigra, transversâ, nonnihil capillatâ, cauleculi plures inæquales, rarissime pedales, communiter palmares, senipalmares, & multò breviores, striati, pallidè virescentes, geniculis parte inferâ nigris, superne albidis, articulati: folijs carentes & cavi: in quorum summitatibus capitulum brevissimum juli iustar insidet, quod à corona alba, ex octo, noxem, etiam duodecim, foliolis acutis composita, sustentatur: & quando pedibus calcatur, crepitar. Equisetum hoc quod authori 4. in prod. est, in pin. verò 13. provenit ad ripam Rheni, juxta locum *dis Baar* dictum.

Descriptio.

Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis, Eiusdem.

Culmo aut inani, bipedali, geniculis pixidatim coherentibus articulato, cum cæteris conveniens, exceptis folijs, siue setis junceis, longis, multòque [Polystachio] tenuioribus. Equisetum 3. in prod. 6. in pin. in palustrib. Michelfeldensibus.

Descriptio.

EQVISETVM SIVE HIPPVRI TENVIS- fima non aspera.

Ad caulium articulos exoritur saxe in orbem numeroz, longissimæ, filli instar tenues, geniculatæ, & ad singulas juncturas cristatæ, moles, siue asperitate, multò tenuiores, quam Equiseti minoris vulgaris: diversum tamen longè, à Polygono femina, ne quis confusionem aliquam suspicetur.

Descriptio.

Tabern. hist. Equisetum 6. Hippuris sylvaticæ: Eid. ic. Equisetum sylvaticum, *vvalds Schaffheuv*: Germ. *vwood horse tail*. C. Bauh. pin. Equisetum 7. siue sylvaticum tenuissimis setis, Hippuris

Locis & Tempus.



Vires & visus.

Temper.

Vulnera tenuium intestinum.

Defectio.

Hippuris maritima, non altera T. gi.

In mōte Balneo admirabili proximo mēse Augusto ad torrentem in silua. Item in pratis iuxta fepes loco non nimium humido, vltra Mafmonster Soncouiz, non lōgē à Sibēthal vltra lacum.

Dioscorides Equisetum vim tribuit spissandi: quare sanguinem nari-

bis erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: vtinam cit: sanguinolenta vulnera glutinantur tritis folijs & illitis: radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaque adiuuat: folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, Enterocelæque vnum coalescere, cogique feruntur. Equisetum alterum cum aceto tritum vulneribus remedio est, eademque fungitur facultate. De Cauda equina hæc prodit Galenus, Hippuris adstringentem cum amaritudine qualitatem possidet, ac proinde valenter, simulque citra mordacitatem efficacem. Itaque vulnera vel maxima cataplasmate imposita glutinat, etiam si præfectos esse nervos contigerit: præterea vocatas enterocelas glutinat: sed & ad rejectionem sanguinis, ad profluuium muliebri, potissimum rubrum, ad dysenterias, & reliquos ventris fluxus, strenuum ac generosum est remedium herba ipsa, aut ex aqua aut ex vino epota. Vni quæ de ea scribant, quod nonnunquam etiam vesicæ, ac tenuium intestinorum vulnera sanant: ejus succus prodest etiam profluio sanguinis prorumpenti ex nari- bus, tum fluxui obnoxio in ventre passionibus ex austeriorum vinorum quoptam potus: ac si febre teneantur, ex aqua. Quæ Tragæ de vfu externo habet, antè adscripsimus. Germen tenerum, juglandis julo simile, refert Matthiolus, rura vulgò vocatê Palustrisalo, inque cibum assumeret, jejuniij quadragesimalis tempore: etenim illud prius elixant, mox farina circumpergunt, & oleo in sartagine frigunt, manduntque piscium vice: ex quo cibo alius quandoque eorum adeo constringitur, & conspatur, vt in coli cruciatum facile incurrant. Sunt qui primum hoc Equiseti germen siccum asserunt per annum, quo subinde æstate vtantur ad dysenteriam: quippe quod aqua calida nocte maceratum eo modo decoquant, quo dictum est, & in cibum magno successe exhibent. Lintea Equiseti aqua stillaritia repente madentia, erysipelas sanant imposita, ardenti aut calorem extingunt, alui profluuium sistunt pudendorum tumores reprimunt.

EQUISETVM FOETIDVM SVB aqua repens.

CAP. XXVIII.

Supra modum fragiles habet culmos, vt vix cōnectari possint, quin in puluerem ferè solua-



tur, aquis autem innarat, crebris tenuibus albican- tibus culmis, alpericinis & veluti sulphurearum aquarum sedimento areuoso oblit- tis.

Hæc est Hippuris minima, non descripta à Dioscorid, non descripta, semper in aquis nascens, præcipuè cœnosis, & in ijs sapius demersa, inter- dum emet- gens, grauis odoris & lutu-

A Diosc. non descripta.

Equis. Pini folijs simile Plin. Dal.

Chara Lugdunensis.

Equis. foetidum, C.B.

lenti, inquit Dalechampius apud Plinium. Intelligit autem Hippurim Plinianiam, Pini folijs similem, nigricantem, cujus vim admirabilem tradunt, quod sc. sanguis profluuiis vel tacto ea tantum homine sistat.

Est H Lugd. p. 1070. Equiseti quintum genus. Equisetum minimum, aquis cœnosis innatans vel sub ijs occultatum semper breuissimis & asperis feris, ac caulibus, lutosum virus olentibus, quod Lugdunenses Chara vocant, & quo lances escarias & reliquam ejusmodi suppellestem abstergunt.

C. Bauh. phyt. Equisetum 8. siue olidum, Eid. prod. Equisetum 5. (13. in pin.) siue foetidum sub aqua repens.

Solum in cœnosis demersum reperitur, quod primum Patavij in fossis Thermarum Aponitarum: dein non longè Lucernâ: tum Basilæ cis pontem, Michelfeldæ & Hanningæ in fossis obseruatum. Reperitur & Genue, vbi ejus vis est ad emundanda venilia.

POLYGONVM FOEMINA, VETERIBVS.

CAP. XXIX.

Polygonum foemina (πολύγων ὄνυχα) Sanguinaria terminâ vertit Ruell. Romani inter spuria, Seminalē vocant. Diosc. frutex est exiguus, vno caule præditus, tener, & Arūdinī similis, geniculis densus: quorum alia alijs tubarum modo inserunt, infurcunturve. Ipsos verò geniculorū articulos cingūt in orbē apices foliolis Pini similes: radix Superuacanea [ἀρρηκτα]. Nascitur in aquosis. Huic vis adstringēs ac refrigerās, ad eadē valens, ad quæ Polygonum mas, sed inefficacior.

Diosc. l. 2. c. 3. v. 1.

Plin. l. 27. c. 3. (Polygoni) genus facit ac Oreon (Horeum, ὄρεον pulchrum, Vet. Ourzon.) vocari refert, in montibus nascens, Harundinī teneræ simile, vno caule, densis geniculis, & in se fractis [in se fractis, Dal.] folijs autem Piceæ, radicis superuacue, inefficacius quàm superiora (quàm primum & secundum genus.) Peculiarē ilchiadicis.

Plinij not.

Eodem verò nomine sequentes insigniuntur plantæ, scilicet: Polygonum 3. Dodonæ. Equisetum majus palustre. Equisetum folijs nudum non ramosum, Cals. Bauh. Equiseti facie Polygonum foemina.

Synon.

Equiseti facie Polygonum femina.

Conferuntur etiam ex radice alba surri-
guntur rectos, Equisetorum modo crebrius ar-
ticulis pyxidatis geniculatos, crassiusculos, mol-
les, *muscos*, minime striatos, quibus ad jun-
cturas nascuntur in orbem folia radiata, Galli
indiat aut Rubie Lewis, vocantur circiter longa per-
argutta, vni-
co nervo per
longum dona-
ta, supra quæ
ad eodem ar-
ticellos cir-
cum circa *se-
mina* nuda, ex
rotundo oblo-
ga, herbe con-
coloria, Fra-
garit *seminib.*
paria.

*Seminalis
Romano-
rum Pinus
aquat.
Gallorum.*



Polygonum
femina Rom-
anos eodem
nomine Semi-
nalem appel-
lare: Rura gal-
lica verò a-
quaticâ Pinû
testatur Ruel-

lius. Miratur is (vt & Delechampus & Sarrace-
nus) Plantam, tradentem tertium Polygonum ge-
nus. Montanum siue Oreen ab eo appellari, in
aquosis autem sic familiare, nec in montibus
nisi forsitam opacis multiplicique aquarum sca-
turigine madentibus, inveniri conset.

Polygonum femina, Dioscor. Matthioli. Er. *Reliqua
synon.*
Cordo, Gesn. hort. & eat. Dodon. lat. Amato,
Anguill. Cast. H. Lugd. & Tab. Polygonum
femineum, Thal. Polygoni tertium genus,
quod Oreen, Plinio: Sanguinalis femina, Dod-
gall. Cruda equina femina, Gerardo.

C. Bauh. phyt. Equisetum 2. siue aquaticum bre-
vioribus setis: Eij. pin. Equisetum 4. siue palu-
stre brevioribus foliis polyspermon: Sanguina-
lis femina Cordi in Dioscor. Hoc communiter
siue femine reperitur, aliquando ad singulas ar-
ticulorum commissuras dena & plura semina
(hinc polyspermon) adnascuntur. Nos negamus *C. Bauh.*
esse Sanguinalem feminaem Cordi: Ejus enim
Polygonum femina est Equiseti genus.

Πολύσπερον Σπίλο Græc. German. thannen vadel: Nomina
linguat.

Ital. Polygoni femina, & Corregiola femina:

Hisp. Polygoni hombra: Gall. Rosevée
femelle, & Pin aquatic. Belg.

Duyfene kneop vryfsken.

Angl. the femelle
horse tail.

FINIS LIBRI TRIGESIMI SEXTI





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXVII.

SAXATILES, VT FILICES ET CAPILLARES, HIS QVÆ
ALIQUA SIMILITVDINE ACCEDENTES.

SATIS iara satis Plantarum notis atque ex his classibus estimandis inhaesimus. Nunc & loci privilegia a-
stimatur (cum & horti, campi, prata, ac sylue satui lustrata videantur) montium praeuipia & confragosa;
itemq; rudera, parietinas, crepidines, etiamq; speluncas uisitemus, ut quid etiam in his resset, videamus. Ad
per rudetorum, colliumque caespites propterantibus, uulgatissima statim occurrunt Filices, & his cognata qua-
dam alia.

FILIX VETERIBVS.

CAPVT I.



HEOPHRASTVS

Hist. c. 16. folia ad-
scribit Filici multifi-
da, & quasi serrata, ut
Abieti. Porro 8. hist.
8. addit sterco ratio-
nem fluentis & reli-
quis herbis, præter-
quam Filici, prodesse
: hanc enim fumo
superinjecito interire

possunt, ita ut ad germen etiam excitandum mo-
uere se valeant: nam ea quoque solitiis floret,
quod permirum est. Et licet sicca omnino sentia-
tur, principium tamen quoddam ejusmodi ha-
beat necesse est, quod una cum aëris mutatione, al-
terationeq; moueatur. Mirum præterea quod non
remissa, sed potius intentâ scuitia temporis in-
cipiat: nisi forte dies halcyonides suffecturas pu-
taueris: nam ad imbecillorum, exiguoq; tunc
mutationem, vel quantumlibet temporis satis
est.

Duplex est Dioscoridi Filix, mas & femina.
Filiciq; mari scilicet quæ simpliciter *πτερίς* etiam à
Theophrasto vocatur] quam aliqui Blechnon
[βλέχνον, Vet. βύλχρον, Theocriti scholiastes βλή-
χρον appellat,] alij Polychizon [πολύχρον] ap-
pellant, sola sine caule [ἀκαυλα], sine flore [ἀνὰ-
στῆ], sine semine [ἀκαρπα]: eaque ex uno pediculo
cubitali ferme longitudine exeunt, incisa, & pin-
narum modo utrinque expansa, sub graui odore:
radicem uero habet per summa caespitum nigram
[δέντινον, vet. addit.] quadantenus longam, mul-
tas fundentem propagines, quæ sunt sub adstrin-
gente gustu. Nascitur in montanis, saxosisque lo-
cis. Huius radix latum lumbricum, quem teniam
vocat, excutit, sumpta drachmis quatuor ex a-
qua mulla: melius, si cum Sammonij aut Ellebori
nigri toridem obolis detur: verum eos qui su-
munt alia prius edisse oportet. Eadem laboran-
tes ex liene efficaciter restituit. Quinetiam cum
axungia contrita & imposita, ichus ab arundine
efficaciter auxiliatur: cuius rei probatio talis fer-
tur. Perimetur Filix, quam per ambitum lata co-
piofior arundo cinxerit, & è contrâ, extinguetur
& enascetur arundo, quam multa Filix circumq;
dederit.

Diosc. Fm
lix du-
plex.
Masibq;

Locus
Vires.

aliquos affirmare: interire & pecore incumben-
te Libro autem 9. c. 10. tractat de Filice femina,
& quid differat à mascula: sequentibus docet. Filix
femina uillis contra interancorum animalia la-
ta, melle subacta, & contra tenuia, in uino dulci
cum farina hordeacea data: si mulieribus grauidis
detur, abortum facere: si cæteris, steriles in totum
reddere, aiunt. Differt femina Filix à mascula,
quod folium unico artu porrectum hæc habeat,
& radicem crassam, & longam, & nigram. Harum
igitur vires sterilitati addixisse natura putatur.
Eodem lib. 9. cap. 12. addit ejus radicem colliqua-
tam tantum in uinum uenire: gustum adstringere
non sine aliqua dulcedine: lumbricum latum ex-
pellere: semē ei nullum esse, nec succum *ὀδὲ ὀπὸν*: ut sit
legendum arbitratu Cornarius. *ὀδὲ καυλόν*: ut sit
quod Dioscorides ait, *ὀύλα ὅτιν ἀκαυλα*. Nam &
ipse Theoph. succum habere dixit, quem *χυλόν*
appellauit: ut de *ὀπὸν* negare non debuerit] quem
emittat, hanc habere: Autumno succidi tempesti-
uè affirmari. Blechni ramuli de Filice hæc scribere
Theophrastum lib. 1. caul. cap. 8. concludimus]
plantâ abscissi, seruare suum vitale principium

Thelypteris,
Pteris

Trelypteris [*Θαλυπτερίς*, i. e. Filix fœmina] quam aliqui Nymphæam Pterin (*Πυμφαία Πτερίν*) nominant, foliis est Filicis, quæ tamen non singulari ut illa, pediculo hærent, sed è numerosis, alioribusque propaginibus exeunt. Radices subiacent longæ in obliquum, numerosæ, ex nigro hæuescentes: aliquæ etiam rubræ inveniuntur. Et hæ quoque radices cum melle in eclegmate sumptæ lara interaneorum animalis pellunt: potæ verò ex vino drachmis tribus teretes lumbricos eiciunt. Datæ fœminis, conceptum impediunt: quod si à grauida fumantur, abortum illa faciet. Earundem farina præhumidis & ægrè sanefcentibus ulceribus inspergitur, ac iumentorum quoque ceruicibus medetur. Cæterùm elixa folia, quæ reccus eruperint [ultima hæc periodo, vet. catet] olerum vice manduntur, ut alium emolliant.

Genera
duo
Plinii.
Pteridis.

Filix duo genera [ait Plinius lib. 17. cap. 9. nec florem habent, nec semen. Pterim Græci vocant, alij Blechnon (*Νικανδερ Βληβρον*: Interpres *Βλαχρον* Sed Phantias apud Athenæum lib. 2. filicam *Βλαχρον* vocari scripsit, Dal. (cuius ex vna radice complures exeunt filices, bina etiam cubita excedentes longitudine, non graues odore. Hanc matrem existimant. Alterum genus Thelypterin Græci vocant, alij Nymphæam Pterim. est autem singularis atque non fruticosa, breuior, molliorque & densior, foliis ad radicem canaliculata. Vtriusque radice [extremi Northmaniz populi panem conficiunt, & : Hæc Dalech. interponit] suas pinguescunt. Folio vtriusque lateribus pinata [pinis, *Πικ. Αρσεν.* autum similia, vnde *πικρὴ δαλ.* Græci vocant, & Celsus in suis Geopon, apud Columellam, Aviam, quam ad iumentorum collum in opere contrasum, cum sale tritam & impositam, remedium esse præsentissimum scripsit, ad quem vsum Filicem fœminam Dioscorides commendat. Dal. [vnde nomen Græci imposuere. Radices vtriusque longæ in obliquum, nigre, præcipuè cum maturuere. Sicari autem eas Sole oportet. Nascuntur vbique, sed maxime frigido solo. Effodi debent Vergilijs occidentibus. Vlus radice in trimatu tantum neque antea, neque postea. Pellunt interaneorum animalis, ex his tæniæ cum melle: cætera ex vino dulci tridud potæ. Vtraque stomacho inutillissima. Aluum soluit: primò bilem trahens, mox aquam: melius tæniæ cum Scammonij pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post vnus diei abstinentiam bibitur, melle prægustato contra rheumatismos. Neutra danda mulieribus, quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Farina earum ulceribus tetrus inspergitur: iumentorum quoque in ceruicibus. Folia cimicem necant: serpentem non recipiunt. Idèd subterni vtile est in locis suspensis: vltæ etiam fugant nidore. Fecere Medici huius quoque herbæ discrimen. Optima Macedonica est, secunda Cassiopica. Idem libro 24. cap. 11. ait Filicis radicem contritam & impositam, Harundinem corpore extrahere, & contrà. Libro autem 18. cap. 7. dixerat Filicem biennio moti, si frondem agere non patiaris. Id efficacissimè contingere, germinantis ramis baculo decussis. Succum enim ex ipsa defluentem, necare radices, famam esse & circa Solstitium auulsas non renasci, nec Harundine scissas, aut exaratas vomeri Harundine impositas. Similiter & Harundinem exarari Filice vomeri imposita, præcipi.

Celsus.

Cæterùm, pessimam ex furculis Harundinem

esse, quia aspera sit, eademque offensam etiam Filici inesse, Plinio prior Celsus lib. 5. cap. 16. tradidit, vsuque cognitum esse scribit, vtramque aduersus alteram medicamentum esse, si contrita superimponatur.

Galenus lib. 8. comp. med. secundum loca cap. 8. inter auxilia hepatica ab Asclepiade conscripta hanc enumerat: vnde in hepaticis affectionibus medicis admodum suspectam esse miratur Aug. Ferrerius.

M. Rulandus cent. 3. cur. 24. ad ictericiam nigram, splenem oppilatam, induratum, dolentem, & pungentem, pro potu in vino exhibet radicem Filicis.

Tragus virium non meminit vel fructus, vel seminis, quæ se in fœmina reperisse affirmat: sed nec Turnerus eas expertus est, non tamen vanà coniecturâ se colligere scribit in multis morbis curandis maiorem esse virium, quàm radicem, aut folia.

Et licet Theophrastus, Dioscor. Plinius & Galenus Filicem *ἀκαρπον* esse affirmauerint, id est, sterilem & sine semine: & nec Medici Arabes & Persæ ad magicas vanitates nati, huius seminis meminerint: tamen vel agrytæ circumforanei, vulgi ignorantiz ad quæsum impudenter illudentes, & semen ostendunt, & venditant, quod Filicem ferre aiunt, auersis folijs inherens, sed adèd minutum, ut visum ferè fallat: legique abscessis prope radicem folijs, & in domo suspensis, subtrato linteco, aut papyro, circa finem Iunij, vigiliam sc. D. Io. Baptizæ. Alij ipsamet Solstitiali nocte eam florere, eademque horâ cum deflorat, maturum semen in terram cadere: ideoque nisi quis præsens tunc fuerit, nec videri florem, nec colligi semen posse, scripserunt. Et hæc tametsi à plurimis commenticia esse & superstitionia putentur, ideoque refutantur, tamen nonnulli etiam docti aliter rem se habere cognouerunt, & à Theophrasto aliter traditum sciunt. Tragus enim eadem publico, scripto asserere non dubitavit, testatus se neque (superstitione ductum, neque præstigijs, aut incantationibus, aut vllis caracteribus vsum, rem aggressum, esse, & quater in vigiliâ D. Ioannis nocte tentasse, substratis linteis & Verbalci folijs, an semen id deprehendere & excipere posset: & sanè contigisse sibi fatetur, ut manè ante illucentem diem, semen paruum nigrum Papaueris specie repererit, & hoc amplius & copiosius sub alia atque alia Filice, alio item atque alio anno. Quare Cornarius immeritò mendacij insinuat Tragum. Numquid enim ipse Theophrastus 1. causa 8. *βλαχρον* circa Solstitium florere, velut rem maxime admirandam producit?

Nunc, Filicem contra idus ab Harundine factos, idèd vtilem ait Dioscorides, quod Filix per ambitum satâ Harundine pereat, & vice versâ, Arundo Filice septa. Sed hanc probationem ceu vanam damnat Dodonæus. Sed & vanum est, existimare Filicem Arundinis familiaritatem per singularem aliquam antipatheiam respicere seu refugere, ita quidem ut veteres perituram dicant Filicem, quam per ambitum satâ copiosior Arundo coronet, & contrà evanescentem & abituram Arundinem, quam obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Hoc enim haud aliunde contingit, quàm quod Filix in humidis non adolescat, nec Harundo in secco. Hæc enim nusquam latius prouenit, nulloque alio genitali loco gaudet, quàm folijs, vliginosis & humectis præijs ac campis:

Semen Filicem ferè non esse germinatum.

Dioscor. opinio vnde probatur.

pis : Illa verò sylvis, rorulentis taxis, arenosis agris, & limitibus imprimis gaudet, ita ut binæ hæ plantæ, ob diversitatem natalis loci, simul habitare non possint. Nunc verò quiddam Filix loca sterilia, arida, ac deserta amet, testatur Horatius.

Tempus.

Neglecte vrenda Filix innascitur agris.

Marcescit Filix sub Hiemem: nova Vere erumpunt folia, tota Æstate in vigore futura.

Filix secundum Isidorum à singularitate folij dicta, quòd ex vna virgula altitudine cubitali scissum folium gignatur: Nicander in Ther. *Ἐν δὲ πρὸς τοὺς ἀγροὺς ἐλαθροὺς πυρὶ βάλαντο χάρων* Interper. Multifidam Filicem crepitantibus iniice flammis.

Nomina
linguar.

Πτέρις autem & Πτέριον à Græcis dicitur ab alijs, autum, vt ante ex Dalechamp. in Plinium dictum, quarum speciem in ramulis disposita ejus folia referunt: pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Vocatur ab Arab. vt Serapione, *Sarax* & *Sarache*: Auicenna *Kildarum*, vel *Childarum*: à Germ. *Farn*, *faren*, *farnkraut*, *farenkraut*, *vvaldisfaren*, *steinsfaren*: Belg. *Varencray*: Galli. *Fougère*, *Feuchère*: Ital. *Felce*: Hiisp. *Helechierua*: Angl. *Ferne*: Boh. *Kapradý*: Hung. *Papragy*.

Aequiva-

ca.

Obseruandum autem hoc loco subscripta nomina cum præcedentibus, omnibus ferè Filicium generibus attribui. Pteris sc. Pterion, Filix, Filicula, Polyrrhizon, Pterineon, Dasyclonon, Anasphoron, & Blechnon: item, vt magis vocant, Hermbubain, vel, vt Egyptij, *Asio* sanguis, vel, vt alij, *Iacula*.

Mitari autem subit, quo pacto Filiculæ appellatio ad Catanancem de qua Dioscorides, agit, peruenerit. Trichomanes autem vocari Filiculam dicitur suo capite. Filix & Filicula dicitur etiam de Polypodio. Et quæ sunt aliæ plantæ Filicis nomine donatæ, de ijs posthac agitur.

FILIX MAIOR ET PRIOR TRAGO, sive ramosa, repens.

Descri-

ptio.

Res quatuorve cubitos altus hujus *caulis*, isque rigidus, fibrosus & in ramos fissus, aliquatenus angulosus: *Folia*, quod nomen indicat, pinnat, alarave, dissecta, superius glabra, inferius hirsuta: *radix* digitum lobinde crassa, foris nigricat, intus, albet, longè latèque importuno reptatè terram occupans, sapore amaricante, succoq; glutinoso prædita.

Filix
sæm Dod.

Dodonæo est fœmina Filix, flore ac semine carens: caule vnico striato, medullâ referto, versicolore, quo obliquè inciso, bicipitis aquilæ species quædam apparet: odore radicis graui.

Filix ma-
ior prima
Trago.

Trago, filicis majoris i. genus, filix vstratissima, in arenosis agris proueniens, vnico, purpureo, rotundo, longo & læui caule, multiridis lateribûq; pinnatis & viridibus folijs vestito, radice longâ, læui, foris nigrante, longè dique intra humum sese propagante, quo nomine magno est nocumento agricolis. Ita enim in agris temoratur, vt non facile exiripari queat. Quamobrem ad suspensiones quidam confugiunt, persuasi si frumentarius ager, quem filix obfedit, in die Io. Baptistæ sacro aratro vertatur, perituram filicem, nec vnquam eo in

Tom. III.

agro locum habituram. Sed certiorẽ perendendi filicis rationem Theophrastus demonstrauit. Atque hæc est Trago filix mascula prior, filicis maximum genus primum, Pteris Dioscoridis, cui florem & semen attribuit, vii antea diximus, & cap. de filice floribus insigni fufius repetemus. Et huic adscribit nomina præcedenti capite appofita. Hoc demum admiratione dignum censet quod filicis, maxime vero masculæ, radix incisa, vtrique in parte aquilam nigram duo habentem capita ex albo ostendit, quæ nil aliud re ipsa est, quàm congeries venarum quæ per vniuersam radicem sparsæ sunt.

Cornarius vtramque filicem notam sibi ait, nec tamen inter marem & fœminam discernit facit. Oportebat autem eum, priusquam impudenter Tragum mendacij accusaret, circa festum D. Ioannis sub filicibus sternere chartas & obseruare an vera dixerit Tragus diligens botanicus, quæ non tantum ex libris, sed repetitâ autopsiâ scripserat. Nec etiam veteres omnia obseruare potuerunt, nec potest adhuc, aut vnquam poterit vllus mortalium. Et sanè plures hodie obseruantur plantæ semen ferrè, quas veteres steriles pronuntiant. Et hæc occasio quare contra veterum & neotericorum opinionem omnes filices & similes, quæ veluti florem habent in folijs, semen ferre putamus, sed ita tenue, aut citò excidens, vt difficile conspiciatur.

Corn. ubi
darg.

Lonicerus pro Thelypteri siue vilice fœmina haud congruam ponit iconem, sed talem, quæ potius filicis multifloræ videatur. Quin ea, quam pro Dryopteride exhibuit, melius conuenit.

Lonic. fœ-
minæ
icon.

Dicitur filix fœmina Cordo in Diosc. Anguil. Matth [qui eam sine descriptione pingit] Juchf. Lac. Dod. gall. & lat. Lob. in Adu. Obl. p. 47, Ic. Plant. p. 812. Cast. Tabern. & Gerar. filix fœmina Matthioli, H Lugd. p. 1122. filix mas, Gesn. hort. & app. filix mas major, fœmina vulgò Herbariorum credita, Clusio pann. & hist. filix fœmina prima, Thallio.

Synon.

C. Bauh. pin. filix ramosa i. siue major pinna lib. obrufis non dentatis, communiter per ambitum aliquando, tantum folijs inferioribus, ad formam foliorum Scabiosæ, diuisis. filix siluestris, Brunfelsio.

Cæsalp. filicem singulari pediculo attollit; crasso, duro, læui, striato, cubitali, in cacumine in magnos ramos fissis, &c. foliolis in aduersa parte furfuracè quâdam lanugine præditis, copiosiores in tenellis, nuper etumpentibus è terra: Lanuginem potèd procedente tempore decidere, renascentique ex ea novellas plantas probat, filicibus, ubi antea non fuerint, in terram projectis, aliisque copiosè nascentibus.

Filix vbique siluis & neglectis, inculisq; nascitur agris, adeoque viuâ & restibili vbertate luxuriat, vt etiam Sole seruidissimo, tenuique solo, vicinis enectis plantis non marcidia perstet, totòque colles impleat: ex decidua lanugine renascens, vt tradit Cæsalpinus.

Locuq;

Rarè in medicina locum habet, quanquam radix naturâ suâ sicce temperaturæ, in puluerem redacta, ac pondere semine læ ex aqua mulla sumpta, latis tinea ventris enecandis conducatur, teste Trago. Quiddam Scammonem, aut Veratrum nigrum adijceris, eò efficacius reddes medicamentum. Eadem in vino decocta, ac per aliquot dies pota, laborantes lienis excremento recreat. Ad

Vires &
vius.

Q q q q a

ambusta vel igne, vel feruida aqua, aut Oleo, singulari experimento radicis succus expressus fuit, si ei miscueris aquam rosaceam, aquam è simo vaccino, aut è flore Tiliz, distillatam, vel si harum nulla suppetat, fontanam. posteaque percolaueris, tum enim leuiter quidam succus ex his conficitur, qui mirificè ambustis, ubi reliqua omnia medicamenta negauerint auxilium, medebitur. Armoricos & Neustriorum ultimos, qui vastas siluas colant, in fugam inopia, è radice Filicis panem conficere notum est ex Dalechampi relatione, ejusdemque cineribus nitri loco injectis, saxa liquare, & vitrea vasa fingere, colore viridi & subobscuro, quibus vinum album, dulce, turbidum potare Andes, Vuelli, Cenomani gratissimum habent.

Filix maior mollis ramosa.

Descriptio.


In ramos prælongos diuisa, similis Filici ramosa Tragi: alarum etiam rursi particulares eodem modo alternatum habent exortum: quorum singularia segmenta paulò videntur latiora brevioraque, denticulorum expertia, vt jam dixit Filicis, quæ non tamen vt illi dura, sed mollia, nec subrus incana quantum hæcenus aduimauerim.

Locus

Filicis hoc genus, ni fallor, circa Tigurum Helueticorum collegimeminitque ejus Gesu. in app. hort. nomine Filicis maris mollioris.

FILIX FLORIBVS INSIGNIS.

Descriptio.



sum spectant, tria, quatuorve vnciatu longitudine, semoniam lata, ex principio latiore sensim attenuata, in obusum tamen vtriusque mucronè desinentia, nervo per longum decurrente, exportectis in marginis (qui integri sunt, nec crenis secti) infinitis oblique venulis: Tragus comparat folia Polypodii: caulis scapus in surculos aliquot diuisus, racemulos vnciales in singulis surculis multos sustinet, *seminibus* multis confertissimos, vt obseruabat Gargillus, licet dicat Tragum florem fere in vertice copiosum, candidum, similem Pycnocomo, qui circa festum Io. Baptistæ, nullo post se relicto semine decidat. Vel, vt dicit Lobel. palmares & sesquipalmares thyrsos & florù ligulas oblongas, densis racemulis, Lunariæ & Ophiglossi æmulis, aut potius Tamari-

cis Narbonensis nuper erumpentis, quæ ex ferrugineo, fulcescunt, inque cariosum & pulverulentum situm fatiscunt, seminum speciem aut spem ostentantes: Dodonæo circa ramulos densa veluti seminum futurorum rudimenta adherent, quæ tamen semina non sunt, nam steriles & hæc Filix, vti cætera.

Ruell. lib. 3. cap. 92. Sideritidis eam speciem facit, quam Chymicos & Herbarios quoddam Lunariam majorem, alios verò nonnullos Filicistram appellatè refert. Sed vereor ne Filicistram falsò attribuat, semen Betæ, rotundius ac durius.

Gesnero Filix latifolia Cordi eadem aut proxima videtur cum hac nostra Filice, quam Tragum Filicis majoris alterum genus inseribit, & Filicis masculæ genus esse statuit.

Lonic. videtur picturam hujus exhibere titulo *Großwaldsarn vnsblin*: hujus tamen Filicis descriptionem non ponit.

Gesl. hort. Filicis genus rarius, floribus insignis, à Trago depictum, De Lunar. picturam Osmundæ Dodonæi (quam Sideritidem alteram Dioscoridis asserit, & Chymicorum atque herbariorum quorundam Lunariam majorem) diuersam putat à Tragi Filice majore & fluuettiore cæteris, cujus hic effigiem damus. Sed ab eo hac in re dissentimus. Non placet quidem figura Osmundæ Dodon. gall. quam Filicem aquaticam & Filicistram quorundam cognominat: gall. *Osmunde ou Fengiere aquatique*: Belg. *vvaater Varen*, & *vvaldt Varen*, quibusdam *Sintè Christoffels, cruyt*, hoc est, S. Christophori herba. Album verò illud in medio radicis, Cor. Osmundæ vocat. In fol. lat. ubi duæ Icones vulgò quidem Osmundam in Belgio dici testatur: sed rectius Filicem palustrem aut aquaticam nuncupari ait, viderique haud dissimilem ei Filici, quæ *mlé ex pur d'au* à Theophrasto appelleretur, cui Polypodium simile facit: siquidem hujus singulare folium, Polypodij folio satis simile sit.

Nullam licet viderit Turnerus plantam, quæ rectius Sideritidis alterius descriptioni conveniat quam hæc Osmunda quibusdam dicta: veretur tamen ne cacumen & semen ventent.

Recentiorum Osmundam, Filicem floridam, regiam cognominat in Adiu. Lobelius, à regijs, vt ait, ac præclaris viribus. In Obs. pag. 474. & lc. pag. 84. Dodonæi duas imagines hoc titulo donavit: Osmunda, Filix florida, Filix latifolia Cordi.

H. Lugd. pag. 122. prodit Filicem aquaticam Dodonæi [gallici sc.] & Osmundam regalem, Pseudo-Lonchitidem asperam vocare Matthiolum, eoque nomine depingere: Porro Tragum aliud Filicis majoris genus exhibere, idque Osmundam vocare Lobelium, hæc tamen ab Osmunda Dodonæi differre: Item, Filicem florecentem Tragi, fortè Dryophoron Plinij lib. 27. cap. 9. fore. *Sed compiler.* Hist. Lugdunensis dupliciter, meo judicio, fallitur. *Primo*, quòd Filicem aquaticam Dodonæi eandem faciat cum Pseudo-Lonchitide aspera Matthioli: *Secundo*, quòd eam Filicem separet à Tragi Filice florecente, & Lobelij Osmunda, deceptus fortè Icone minus bona Dodonæi gallici, qui eam in fol. lat. mutauit.

C. Bauh. pin. Filix ramosa 7, non dentata, florida: Sideritis fortè Ruellio: Filix mas An. guill. Filix latifolia Cordi hist. Filix palustris, Gesl.

Sideritis Ruell.

Fil. gener. rarius Gesl. hort.

Cætera synon.

Gefu. app. Lunaria, maior, seu Filix lunaria & Filicasterum, Eiusdem de Lunar. An Filix palustris, Cels. ? Huius species tenuiter dentata reperitur.

Locus & Tempus.

Nascitur locis rigis ac palustribus: non raro in fossis aquas habentibus, in humidis quoque siluis. Apud Gallos, tum apud Britannos plerique locis reperiri recitat Dodonæus: Germaniæ ac Belgio quoque frequentem ait. Vigere autem Æstate: Hieme marescere folia, radice restitit li. Ego in diuersis hortis obseruavi, etiam floridam.

Vires & vsus.

Quo pacto ad ambusta faciat, præcedenti capite diximus. Scribit Lobelius radicem ad hernias & vlcera exploratissimi cōmodi esse. Quinetiam colicis & pleneticis plurimum confert. Nonnihil calidam esse & acrem, odoris non ingrati. Radix, inquit Dodonæus, calidā est & sicca, sed minus quā vel maris, vel fœminæ Vtilis habetur, ac præsertim, pars illa radices media, subcandida, quæ efficacissima putatur, non modò vulneratis, sed & cæcis, ruptis, ex alio deuribatis, decocta vel etiam tuta, & cum liquore aliquo sumpta: In decoctis, quæ vulneraria recentiores appellant, eā de causa ab empiricis additur. Sunt qui tantam huius potentiam existiment, vt sanguinem alicubi intra corpus hæcentem ac concrementum dissoluere queat, & foras etiam per vulnus expellere.

HERMIONITIS ALTERA DALECHAMPIJ, Filici floridæ similis.



IN illa provenitradicib, multis capillaceâ tenuitate, breuib, subnigris: cauliculis, pedalem altitudinem vix attingentibus, in folia septem seu aut nouem diuisis: quorum quaterna, sena vtriusque cauliculi pari ordine vestiunt, terna verò in summo caule extantia inferiorum versum claudunt. Sunt autem

tem ea omnia longa, angusta, in ambitu nonnihil crenata, obliquis incisuris vtriusque parte distincta, quas per medium folium procedens & eminentes costa separar. Flores ei nullus, nullum semen, atque adeo ne auersam quidem foliorum partem sub flauis puluisculis contegit, qui in alijs id genus plantis cernitur.

non.

C. Bauh. pin. Hermionitis 4 sine multitudine. Hermionitis altera Dalechampi, H. flor. Lugd. p. 128. Lingua ceruina ramosa, Colum. Agleofotidis seu Marmoriz, seu Phyllitidis aut Scolopendriæ nomine à Cortulo accepta.

cultras.

Vis ei eadem adscribitur quæ Hermionitidi, seu Splenio attribuitur.

Tom. III.

CHAMÆFILIX MARINA ANGlicana.

CHAMÆfilicem marinam Anglicanam non nisi saxorum rupiumve interuenijs aut petrosi asperginibus Cornubiæ innatam, Lobelius reperit ad maris alluviones non procul ab ædibus generosi viri D. Moyle: Epusilla multis implexa pulis citris, & compactâ radice, Trichomanes aut Adianthi Pliniani, foliola binum ternumve vnciarum, rigida, carnosa, numerosa, atrouentria, lucida, Filicis maris diuisiua, ortu, positu, & gustu: lituris item auersâ parte extantibus ferrugineis, quorum pediculi & medius nervus sericeo nitore ex fulco lucent.

Defectio.

Chamæfilix marina Anglica: Lob. Obs. p. 471. Ic. p. 814. & H. Lugd. p. 126. Filicula fontana 3. siue Filicula maritima ex insulis Stræchadibus, C. Bauh. pin.

Synonyma.

DRYOPTERIS DALECHAMPIJ



DAlechampi hanc pro vera Dryopteride exhibet, eamque in editissimis montibus nasci tradit, ad Quercuum musculos radices, foris per terram vagantes, radice capillata fibris densis, valde tenuibus, inter sese implexis, subatris, gustu adstringentibus cum paucula dulcedine, quæ cum aliquâ diu mensæ fuerint, percipitur.

Defectio.

foliis multis, obliquis, virentibus, & herbaceum vitorem constanter seruantibus, etiam in dudum collecta planta, vnico pediculo adnexis, altius incisis, pennarum ritu explicatis, superne læuibus & glabris, inferne exiguis & subluteis punctis, & quasi vermiculis puluerulentis & asperis maculatis: siue caule, siue flore, siue semine, nisi quis [ve vulgò multi de Filice nugantur] sessiles & pensiles in aduersa foliorum parte quasi vermiculos, dum flauis adhuc hærent, florem esse putet, cum nigricantes decidunt, fructum ac semen.

Cæterum, nimium secutè Compiler H. Lugd. donensis asserit Dryopterem Dalechampi p. 128. esse veram. Et quia locus particularis huius plantæ non assignatur, non abs re quid sit dubitatur etiam à C. Bauhino in pin. vbi Filix non ramosa sexta vocatur.

Compiler.

FILIX VVLGO MAS DICTA, siue non ramosa.

Filix mas vulgò, quæ non ramosa mense Aprilis, autore Trago, promittit multos asparagos, primo extortu iuxtos, cano capillitio obductos, non aliter atque Scolopendriæ suæ primæ folia, atque ij progressu temporis abeunt in folia am-

Defectio.

pla, duorum, utrimque cobitorum altitudine, crebra, recta, frangi facilia, dilato colore virentia, Triago purpurea, ferruginea lanugine hirsuta.



(Plumatum, inquit Lobelius, foliosa, alæ figuram imitatio, unde nomen: Dod. audit, odore gravior, & secundum margines crenata, ac tergo veluti tenuissimo, fordidoque pulvere aspersa, qui remeare semen esse à plerisque creditur, inquit ille.) Ceterum, vtrinque inæquali ortu nascuntur cristæ

palmares, sensim in mucronem tenuata, laciniis obtusis seu foliolis diuisæ, in ramis Filicis morem: radix crassior, multis conuoluta & implexa appendicibus.

De eodem Tragis hæc scribit: Incisuræ foliorum parte aversa Mato mente quamplurimis exiguis, rotundis, & excrementis bruchorum similibus punctulis notantur, quæ cum maturuerint, ac nigra euaserint, id quod circa festum S. Ioannis fieri solet, prorsus decidunt, & à mulierculis quibusdam colliguntur, pro quæ Filicis semine deinceps venduntur. Nolo recensere quas vanitates & superstitiones eiusmodi semine exerceant. Hoc genus Filicis saporem præ se fert tubarum ac talem profusus, qualem glandes habent, quem neoterici Medici Ponticum nominant.

Filix. Brunfels. tomo 3. rhaps. 51. iconem habet titulo Filicis, Filicis siluestris, vel magnæ: Trag. nomine Filicis vulgaris. Eam tamen, quod plerumque in silvis, locisque saxosis moretur, à Germanis etiam *Waldsfarn*, h. e. Filicem siluestrem, à Dioscoride verò *βυλάνθηρον*, Fœmellam Filicem, & *Nymphæam* Pterin dici refert.

Fil. fem. Cæs. Cæsalp. dicitur quoque Filix, fœmina in vmbrosis nascens, multis ab eodem cespite folijs: Thelypteris Dioscoridis, & Filicis alteram genus Plinij.

Fil. fem. Cæs. Filix hæc non mihi (Gesneri verba sunt apud Cordum in hist. lib. 2. cap. 174. cui figuram Tragi apponit) mas, sed fœmina ex Thophrasti & Diosc. verbis videtur, etsi plerique hodie marem eandem faciant, quam hic Cordus, errore veluti per manus tradito, Filicem masculam vocat. Filix fœmina hæc exerat enim qui hanc marem faciunt, inquit idem de hort.] quæ multis à radice statim folijs, oritur, passim in silvis abundat. Appello enim (ait in stirp. append. ubi sequentes Filicum diuersas species assignat) fœminam, quæ pluribus ab una radice folijs germinat, nullo canle: multis iam annis horri mei incolæ: molior vel tenerior aspera, &c. Obscurus est in sua Filicum Historia Gesnerus. Nos verò contra Tragum, Gesnerum & Cæsalpinum ijs assentimur, qui Filicem ramosam, fœminam constituunt: non ramosam verò marem.

Lonicerus Pertrida marem Diosc. facit dicitque

in eius radice aquilæ imaginem apparere. Tragum sequutos. Verum illum oportebat annotare marem Tragi à suo mare diuersum.

Matth. Filicem marem etiam pro Dryopteride ponit, ut dicitur capite de Adiantio nigro officinarum.

H. Lugd. p. 122. Filix mas Matthioli: Item, p. 127. Dryopteris Matthioli. Modò insinuauimus has duas plantas à se inuicem non differre, nec etiam Matthiolum inter has distinguere.

Filix mas Matth. Fuch. Dod. Lac. Lon. Lob. in Adv. Obs. p. 473. lc. p. 811. Cast. Tabern. Ger. Filix mascula, Cordo in Diosc. & hist. Filix mas altera, Thelio: Filix mas, Osmunda, Anguill. Filix non ramosa 3. siue dentata, C. Bauh. pin. qui dupplicem asserit: alteram, cui pinnule in ambitu sunt dentatæ: alteram, cui non sunt ferratæ: Et illam Filicem marem alteram, hanc Filicem marem primam, Talio dici.

Tragus & Nipior. Germ. Waldsfarn man. Nomina le: Gall. Feugiere masle. Angl. fern the male: linguar. Belg. Varen manchen: It. Felsche maschio: Hisp. Helecho.

Passim in vmbrosis, viginosis, & arenosis valibus, limitibus etiam agrorum, & arenosis saxis, felicissime autem in silvis, provenit.

Quod si equus conciderit, nesciaque quæ aggritudine laboret, tunc particulam huius radicis, lingue eius subijce, eoque facto equus confestim vtrinque deiciet recrementa, rursusque confurget: id quod Tragus ipse ita se habere competit. Folia Filicis tenera adhuc decocta & comesta ventrem emolliunt: radix in puluerem redacta humidis vlcibus & cicatrici repugnans inaspergitur: pari ratione iumentis adhibetur. Filices siccata, vice stramonis asseruntur pro pecoribus, maxime in ijs locis, quæ à culta terra longius absunt, vt sunt pagi in Hercinia silua aliisque similibus siti.

FILIX MOLLIS SIVE GLABRA, vulgari mari non ramosa accedens.



REtis surgit & simplicibus pediculis Filicis vulgaris in modum, sed glabris pinnis, omnique hirsutie destitutis: tarsi particulares in segmenta diuiduntur duplè fere longiora, longius multò ab inuicem distantia mucrone acutior, modò æqualibus marginibus, modò obiter profundius incisus, nullo tamen

ordine, nec ferratis aut dentatis: hanc quoque mollities à vulgari distinguit, & segmentorum modò dictorum varietas: Circa Tigrum legimus.

An

An Gesner. hort. Filix mollis, cuius descriptionem dedimus sub Filice non ramosa, vulgò mas dicta.

FILIX FONTIS ADMIRABILIS AD MAREM vulgarem non ramosa, accedens, non dentata.

Masculæ vulgò dictæ Filicis non ramosæ in morem simplices erigit caules, quos rami non diuidunt, non sine hirsutie aliqua: cristæ singulares paulo videntur longiores, diuisione ferè foliorum Ceterach, segmentis minime crenatis, sed acutioribus quorum aues: à parte puluerulenta ferruginea puncta agminatim

proximè margines circumcirca conspiciuntur, medio libero. In montibus prope Fontem admirabilem in Ducatu Wirtemb. Augusto mense collegimus.

An Gesn. hort. Filix aspera, de qua antè sub Filice mare vulgò non ramosa? An C. Bauh. pin. Filix ramosa pinulis acutissimis non dentatis, Filix ramosa altera?

FILIX LONCHITIDI AFFINIS.

Lonchitidi Filicis foliæ similis est: pediculi tamen glabri sunt plures, vnde ex aduerso posite oriuntur alæ, palmates & semipalmates, quarum unaquæque in cristas vnciales & semunciales diuiditur, singulas denudè in alia segmenta non admodum profunda, minutibus spinis donata subdivinas.

Hanc observauimus in proximis filis fontis admirabilis Ducatus Wirtemb. & in valle fontis Griesbachiana.


Hanc (aut certè sequentem) eadem suspicamur cum Filice aculeata Casp. Bauhini, quam in Prod. in maiorem & minorem subscriptis verbis distinguit.

Tom. III.

Filix 2. siue mas aculeata maior, radicem habet nigram, fibrosam: pediculos pedales, foliosos, in multas alas pinnatas, modò maiores, modò minores, profundius diuisos, pallidè virentes, primis in ambitu dentatis, & in breuem spinulam desinentibus: in monte Wasserfall lecta.

Filix 3. siue mas aculeata minor, pinulis est breuib, totis integris, non dentatis, sed in spinulam acutam breuemque omnibus desinentibus eodem quo prior loco prouenit, & in Hartcynia & Stolberga veteri. Illa in pin. est Filix aculeata 1. siue maior: Hæc, Filix aculeata 2. siue minor: Filix mas tertia Thalij, quam spinosam seu aculeatam cognominat.

FILIX TENVISSIME ET profundè denticulata, Montbelgardica.



Magnitudinem non cedit vulgari Filici mari non ramosæ: foliorum haud dispar positus, verùm cristati folij portiuuncule valde sunt coccinæ, angustæ, profundis & at: gutis denticulis incisæ: cristæ vero totæ costæ annexæ alterutrim oriuntur: similibus Rhæticæ, quæ tenuior, aliud quid similitudinis habet cum nostro Adiantum tho albo officij.

narum folio Filicis.

Prouenit in siluæ prope Montbelgardum: item in monte Malmunster mense Octobri, ac in monte Rosberg, necnon in valle fontium acidorum Griesbachiana.

FILIX TENVISSIME SECTA EX monte Balon.



Folia cubitorum aliquot fetragineo mucro oblectis pediculis: in ramos particulares diuisa, non planè ex aduerso respondent, palmates & sesquipalmates, quorū unusquisque cristas habet alterutrim positas, semunciales & duarum vnciarum, in segmenta exigua per extremam oram crenata subdivinas.

Qqqq 4

Locus cũ
tempore.

Hanc reperimus in Vogeli montis parte Ba-
lon quem ex fodinis Argenti dictis Gerardme-
gori concedimus mense Augusto.

FILIX RHÆTICA TENNISSIME dentata.

Descri-
prio.



fert non solum in eo quod maior est Adiantho,
sed præterea quod pediculi Adiantho ad radi-
cem rubent, quodque segmenta sunt quoque
diuersa.

Reperi in Rhætia primò, dein etiam in monte
Rofenberg propè Mofemunster.

DRYOPTERIS.

Descri-
prio.

Dryopteridem *Spumalepis*: Orib. *Spumalepis*: in
muscosis veterum Quercuum *Spum*: Ro-
borum vertic Sarac. (partibus) Filici similem nati-
ci, at multò minore (tenuiore Sarac.) foliorum
incisurà, auctoritate Dioscoridis comprobatur.
radicibus inter se implicitis, hirsutis [pilis] *Sarac* lae-
dens & crebris, pro hirsutis legit Dalech [gustu
ip. dulcedine acerbis, Hæc vna cum radicibus
siccis illinatur, pilos abolet. Primum autem po-
steaquam cutem enudauerit, Priorem detradere,
& rursus recentem imponere oportet: & hæc
Cornarii est lectio, quam alij, Plinium potius se-
cuti, quam verba & sensum Dioscoridis, malè cū
Ruellio, sic conuerterunt. Psilothrum est cum ra-
dicibus trita: illinatur enim primum vsque dum
sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens
imponitur.

Plinius.

Plinij autem l. 27. c. 9. verba sunt hæc: Dryopte-
ris Filici similis, in arboribus nascitur, tenui folio-
rum subdulcium incisurà, radice hirsutà: vis ei
caustica est, idèd Psilothrum est radix tusa. Illini-
tur enim vsque dum sudores euocet: iterumque
& terit, ut ne sudor abluatur.

In Drypti.
historia à
Diosc. ve-
riat Plin.

Primum itaque foliis dulcedinem quandam
Plinius tribuit: Dioscorides verò non folia, sed
radices in dulcedinem vergere scribit: deinde
pilis, *Sarac*, id est densas & crebras, Plinius hirsu-
tas dixit: præterea radicem tusam Psilothrum
esse, Dioscorides verò herbam ipsam cum radice
tusam. A hæc adhibendi Psilothi modum vide-
tur non ex *Sarac* expressis, verit enim *inpa* *Sarac*,
sudorem euocare, cū scribit illineandam esse ra-
dicem, v'q' te dum sudores euocet, &c. cū *inpa* *Sarac*

sit humectare & mollire, ut Diosc. intelligat cor-
poris partem depilandam aqua repida foris prius
humectandam esse, quod est *inpa* *Sarac* deinde pi-
lum deradendum, si *inpa* *Sarac* legas, vel auellendus,
si *inpa* *Sarac*, quod huic loco optime conuenit, quo-
niam efficacior est vis psilothi profundius su-
beantis auulso pilo, vt pote viâ magis patefactâ,
& postremo recentem Dryopteridem, non radicem
solum, sed cum ea herbâ ipsam cataplasmatas aut
emplastri modo imponendam. Sic igitur Diosc.
locum conuertendum ducit H. Lugd. Dryopteris
cum radicibus trita & imposita pilos abolet. O-
porteret autem cū pars pilosa aquâ humectata
fuerit, primum eam deradere, vel pilum auellere,
deinde recentem Dryopteridem cataplasmatas
modo imponere. Quibus verbis Diosc. id quod
plerumque facit, non solum Dryopteridis depila-
toriam vim, sed vtendi quoque modum declara-
re voluit. Siue enim Psilothrum, i. e. medicamentū
quod pilos detrahit, causticâ & septicâ vi id effi-
ciat, quod prius est psilothi genus: siue insigni-
ter & extremè frigida, aut à totius subtilitatis pro-
prietate, quod alterū genus est, capillum renasci
prohibet: primum oportet vt cutis tepentis aque
fotu rarefcat, & relaxetur, deinde pili auellantur
vel deradantur nouacula, aut septico causticove
aliquo detrahantur: (quod hodie Toræ illiui sui
Rhusma faciunt,) tum alterū psilothi parti im-
ponatur, ne pili renascantur, què ordinè hic docet
Diosc. Vult enim prius *inpa* *Sarac*, deinde pilos
inpa *Sarac*, postremo *inpa* *Sarac* *inpa* *Sarac*.

Galenus
mixta
quantita-
tis est.

Galenus itidem scribit Dryopteridem gustu
mixtam qualitatem præ se ferre, dulcem, acrem,
amaram, in radice verò etiam acerbam: facultate
tem habere septicam, proinde etiam pilis gla-
briam cutem efficere.

Cæterum, Dryopteridis appellatio pluribus
adscribitur plantis. Et nimium quidem temere
Cōpilator Hist. Lugd. asserit Dalechapii Dryop-
teridem esse veram Diosc. Pari lapsu Math. pro
Dryopteride Filicem vulgo marem dictâ pinxit.
Filicem præterea minorum non ramosam plures
Dryopterida vocant. Sed & Filix ramosa minor à
nonnullis Dryopteris putatur, quorum opinio
non placet. Adiantum album folio Filicis Dryop-
teridis albæ cognomentum etiam assumpsit: Et
Dryopteridis nigre Dodon. Adiantum nigrum
officinarum.

Æquiuo-
ca.

FILIX MINOR NON RAMOSA.



Repit radici-
bus tenui-
bus, nigris, ca-
pillatis: folia do-
drantalia & cu-
bito longiora,
non ramosa,
quorum cristæ
ex aduerso nas-
cuntur, trium
circiter vacia-
rum longitudi-
ne, diuisurâ cre-
brâ, non peni-
tūs costam at-
tingente, seg-
mentis singula-
ribus æquabili
ambitu circū-
scriptis: distor-
sunt similes Fi-
lici

Descri-
prio.

lici mari vulgò dictæ: folia siccata contrugantur & sunt acuta, quod idè monemus, ne quis salutaris videns siccitatem non statim inter chartas disposuerit.

An Pteridion masculinum Cordo? Gesnerus asserit, Nos vterius indagandum censemus. Icon Dryopteridis, aut Quere Filicis Lobelij in Icon. p. 83. posita, nobis aptè conuenire videtur cū nostra planta: sed Pteridion fœminam Cordi, vt in Obs. p. 475. cognominatur, aliò quoque referimus.

Tabern. ic. est Filicula petræa fœmina tertia: Eid. hist. Filicula petr. fœm. quarta, quam Compiler eius describendam superuacaneum duxit. Sed quum sic Dryopteris, cum ceteris Filicibus haud ita temerè confundenda erat, sed necessariò describenda.

H Lugd. pag. 127. huius meminit, dicens: Sunt qui aliam Dryopterim, eamque veram sic describunt, Folia hinc Polypodij piorsus, &c. Omnia autem hic ex Lobelio transcribit eo non citato, omittens etiam eius effigiem, quod mirum.

C. Bauh. in pin. videtur vocare Filicem non ramosam s. siue quernam, plures & diuersas confundens eo titulo plantas.

Tiguri prope lacum selium reperimus, & in valle acidularum Griesbach. Diu viuit in siccis etiam hortis, palustribus aliàs luxurians pratis, vnde Filicem aquaticam olim denominauimus.

gura secundum proportionem omnino similis est: sed multò minor, ac tenerior.

Cordus in Diosc. (annotante Gesnero) vocat Dryopteridem Thelypteridi similem, multò tamen minorem, & quoniam parua est Filix germ. Erdfarn & Lichfarn, & ad græcæ vocis imitationem, teste Cornario, Lichfarn, eò quod cæsarum Quercuum caudicibus pleiunque proueniat.

Lonic. appellat Filicem quernam & Osmundulam Gallorum, Græcorum Dryopteridem, eiusdemque naturæ cum alijs Filicibus esse ait. Sed icon quam habet, est potius Filicis ramosa, quæ vulgò fœmina dicitur. Præterea si eadem natura est, quæ aliarum Filicum, non est Dryopteris, vt dicimus contra Tragum.

Tabern. ic. Filicula petræa fœmina 4. Eid. hist. Filicula petr. fœm. tertia. Hanc Compiler, vt regat suam ignorantiam aut negligentiam, dici non necesse esse describere.

An Gesa. hort. Dryopteris Adiantho ferè cognata herba in colle lapidoso ad Badam Heluetiorum spontè proueniens? An Eid. app. Filici palustri similis Dryopteris, Badæ infra thermas statim iuxta fluvium ad lævam?

C. Bauh. pin. Filix ramosa 4. siue minor pinnullis [malè legitur primulis] Jentatis: Pteridion masculinum Cordi [hoc aliò referimus]: Filix fœmina altera tenuifolia Thali: Filix querna seu Dryopteris, Gerardi.]

Non vbique locorum duæ Filices exiguæ Tragi inueniuntur, sed in altissimis montibus quales sunt der ydar, Hercinia silua, Walsgoia, & mons Tonitroi. Filix pumila saxatilis i. ita Clusius Filicem ramosam minorem vocat (copiosissimè nascitur in saxis, non modò ad Gaminam & Neuberg: sed ad omnium ferè montium radices Austriæ & Stiria. Ego Tiguri, Lugduni, Geneuæ, Montbelgardi & Basileæ in montibus annotauimus).

Filices tuas binas exiguas temperaturâ vulgari Filici multicauli respondere putat Tragus, post seque pro Filice, cui gustu satis respondere ait, viurpari. Sed si vetum Dryopterim Tragi esse eadem temperaturâ cum vulgari Filice, Dryopteris veterum esse non potest, consideratis ijs, quæ antè proprio cap. ex veteribus scripsimus.

FILIX RAMOSA MINOR.

Parietinas & rudera sequitur, radicem habens labyrinthico textu multipliciter implexâ, Polypodij radicibus tenuiorem, repentem, & in obliquum se spargentem, nigrâ, raris fibris tenuibus & duris capillatam, inquit Clusius, sapore cū leui dulcedine insigniter acerbis: coliculi multi, tenues, ex viridi fusci,

palmares & dodrâtales, longioresque ramosi, Filicis fœminæ vulgò dictæ instar (cui tamè magnitudine multum cedit [quibus pinnarum annexa folia Filicea, crenulis denticulata, subinde auctâ parte puluerulentis tuberculis resperfa].

Tragus duo Filices exiguas genera tradit, non quidam formâ, sed loco natali differentia: nam vnum ex crenosis saxis & rupibus proflit: alterum verò in veterum & cætorum Roborum caudicibus nascitur, folio vtrumque Filici simili, multò tenuiore

Hinc & Cordi Pteridion fœminam referimus, quæ Thelypteridi, i. e. Filici fœminæ [sic vocat monochlonon, i. e. vno periclo surgentem, quâ maiorem facit Gelo. & nos Filicem maiorem & priorè Tragi, &c. inscribimus] coliculi foliorumque fit.

Tom. III.



ADIANTHUM ALBUM FOLIO FILICIS.

CAP. II.

Parietinarum Descrip.



Parietinarum Descrip. amasium Adiantum album quibuldam dictum, satiscensibus commissuris rimas ægentium, radice se insinuat transversâ, satis crassâ, pro herba magnitudine, fibrosa, ferrugineo mulco obsita, sapore cum pluri adstrictione subduli, herbaceo Polypodij colore: ramuli, vel potius foliorum

Rrrr

pediculi dodrantales & pedales, tenues, viridantes, nigricantesve inferna parte, plumarum annexis Filicis folijs stipati, inæquali ortu sæpe minutis denticulis incisis, aversa parte atomis virentibus, tandem ferrugineis extantibus, aspersis: mollia verò sunt folia hæc, & ad folia Filicis nostræ tenuissimè dentatæ, ac etiam Rhæticæ accedentia minora, tamen nec diuisuris ita dispositis, & facillè marcescentia, sapore citra adstrictionem eundem, dulci, tam euanido, vt penè farum dicas, cum viscido lentore. Planta ipsa commune quiddam habet cum Ruta muraria, minùs tamen quàm Adiantum nigrum officinarum, quo reuerius muldè & candidius. An Peridum masculum Cordo? An Dryopteris candida, Dod. gall. cuius Icon potissimum postrema non multùm arrides, sicut nec nostræ?

Adiantum album & nigrum Plinij Libel.

Adiantum albo & nigro Plinij, inquit Lobelius in Adu. [quo titulo in Ic. Plant. p. 810. duplicem effigiem ostendit, sed priore quæ etiam in Adu. ponitur, potissimè demonstrare videtur nostrum Adiantum album filicifolium] pleræque omnes Belgicæ, Germanicæ, Burgundicæ, Francicæ, Sabaudicæque officinæ, non modò hoc quoque, sed etiam ab omni memoria, semper vitæ sunt. Radix pusilla, filamentis crebribus compacta, atris, rectis, junceis, paulò crassioribus & ptilioribus, quàm Trichomanes: ex herbido pallentibus, foliolis vtriusque & altrinsecus plumarum distitis, Filicis maris diuisoræ & sitæ, sed muldè minoribus, altera facie virentibus, altera in glauco punctulis rubiginosis series geminas habent, sequi palmum eoque plus atra, hæc alba, immo utraq; ne quæ nihil planè differunt: quia nigro Adiantum cauliculi nervulive nigricant politiore nitore, foliaque sunt saturatiore virore, vires eadem prorsum, quas etiam doctis multis, nedum nobis, exploratas scimus ad quotidianas & consuetas potiones multis annis, magno commodo, nullo detrimento. Vt tandem conuiciari dediscant isti tenebrofi commentatores, qui hæc Dryopteris virium ignoratione rejiciendas autumant: nihil enim actis, nedum caustici, hæc innoxie capillares habent: nam Dryopteridem aliam [forte hic intelligitur Filix non ramosa minor] esse scimus: audiuiusque nos in frequentissimo studioforum cœtu, Rondeletio præceptore docente. Dryopteridem nostram nonnullis suis ægrotis (dum in Allobrogum ad Rhodanum vrbi-bus factitaret medicinam) exitio fuisse ob pharmacopœorum flagitiosam inscitiam, qui non parum Dryopteridis potiunculæ, Polypodij vice, miscuissent. Hæc proinde, conjectura certa ducti, Plinio memoratùm vtrumque album & nigrum Adiantum, Filicis foliis, imòque cauliculis fuscis & asperis, arbitramur. Hæc Ad- uerf.

Synonyma.

C. Bauh. mot. Locus

C. Bauh. pin. Filicula fontana i. siue major, vel Adiantum album Filicis folio: Dryopteris candida, Dod. Dryopteris alba Dodonæi. H. Lugd. p. 1227. Adiantum album Plinij, Lobelij. Item Filicula fontana i. siue minor: Filicula fontana, Tab. fœmina, Gerardi. *Hæc duas Filiculas fontanas C. Bauhini nondum separamus, censemusque vocandam Rutam murariam alteram.*

In muris & rupibus subinde occurrit. Blau-montij in veteri cisterna & circa castellum inter saxa obseruauimus, & Genevæ circa montem *Sallene* pulchrè virens mense Februarij principio.

ADIANTHVM NIGRVM Officinarum.

In capillarum etiam numero habent officinæ Defectio. Quod Adiantum nigrum vocant, plantam filiciformem, aliam tamen ab Adiantum albo filiciformi. *Coliculis* hæc dodrantales, firmiores, nigiores, cui inæquali ortu adnectuntur cristæ vnciali circa principium latitudine, sensim in tenuè mucronem desinètes, quarum segmenta lacinias Rutæ murariæ imitantur, latiora, longiora, altius crenata, firma, punctulis puluerulètis aversa parte de Filicum more, distincta: radix crassa, fibrosa, qua degustata prope Patavium, dulcedinem cum magna adstrictione lingua percipit.

An Peridion Cordo?

Matth. scribit Dryopteridem, Filicem ad vnguem referte, nascique etiam humenti solo & inter vepres circa Quercuum caudices, vel in Goritiensi agro, pluribus in locis, nullis repugnantibus notis, notissimam etiam ipsi qui silvas ingentes frequentant. Sed vti Matthiolus temerè ait Dryopterem ad vnguem Filicem referte & notissimam esse, ita temerè anno 1554. & 1559. Icone parvâ nihil aliud repræsentat, quàm Filicem marem, ei & vulgo dictam. Quin adhuc in Epit. anni 1571. Filicem pro Dryopteride proponit, nihil addens de suo, nisi dici, Ital. *Felce quercina*, Germ. *Baumfarn*. Gall. *Feuchie des Chênes*. Admiranda sanè Matthioli levis inconstantia, vt qui in comm. cum mag. fig. lat. & ital. remanentibus allegatis verbis, aliam longè diuersam, & Adiantum nigri imaginem exprimentem, exhibeat iconem. *Camer.* in sua aucta Matthioli Epitome nouam effigiem, forte Adiantum nigrum vulgare pro Dryopteride demonstrantem, dedit. Verùm si id intelligit, pictura videtur minùs benè efficta.

C. Bauh. apud Matth. ponit iconem ex Tabern. sub intitulatione Dryopteridis Matthioli in minoribus iconibus. Brunfell. Cordi in Dioscor. Gesn. hort. & app. Lobelij, & H. Lugdunensis: Dryopteridis candidæ Dodonæi gall. & lat. Pteridij fœminæ cordi in hist. Filiculæ petræ fœminæ primæ Tabern. & Filicis generis parui in montibus Cæsaliini. *Secundè nimis C. Bauhinus pronunciat Filiculam Tabern. petræ fœminâ primam esse Dryopterem Matth. in minorib. iconib. quandoquidem ab iconè Matt. multùm differat, vt quæ sit Filicis maris, vti sæpius dictum. Concesserim quidem potius esse Dryopteridem in mag. fig. quæ Adiantum nigrum vulgare, ad quam accedere videtur Tabern. modò dicta Filicula. Secundò, Cordi Dryopteris, non eadem est quæ Dryopteris Matth. vel majorum, vel minorum iconum, neque etiam est Filicula Tabern. Cordus enim ait Dryopteridem suam esse Thelypteridij similem, sed muldè minorem. Thelypteris verò siue Filix fœmina Cordi, ramosa est planta. Quare Cordi Dryopterem meritò referimus ad Tragi Filicem arboream, de qua sub titulo Filicis ramosæ minoris. Tertiò, per Dryopteridem Gesn. in app. eam intelligimus, quam Cordus in hist. pro Pteridio fœmina descripsit, quæ nobis eadem cum Filice ramosa minore. Quartiò, Lobelij in adu. Dryopteris diuersa & ipsa planta est non ramosa, quin imò diuersa quoque à Dryopteride Cordi, de qua sub titulo Filicis minoris non ramosa.*

Dryopteris fœm. Ma.

Dryopteris fœm. Ma. C. Bauh. multipli. citat. vtriusq.

mosc. *Quint.* Matthioli Dryopteridem in commentarijs cum magnis figuris existimamus potius Dryopteridem nigram Dodonæi & Hist. Lugdunensis, de qua p. xxi. in capite, quam albam, de qua præcedenti. *Plum.* Filicis genus paruum Cæsalpini, quod duplex traditur, non putamus convenire: Vnum enim non ferratum, ut Polypodium, alterum denticulatum: Fortè intelligit duas Lonchitidas asperas, ut suo dicitur loco.

Dod. in-
constan-
tiam.

Dod. gall. satis commodè pingit Dryopterem nigram, admittens eam pro Adiantho: Si anarum, id est, Capillo veneris. Lat. verò in fol. contrā, eos in errore verari fecit, qui Dryopteridem nig. à Adianthi loco videntur.

Gelucos apud Cordem annorat Periadion Tiguri in mur. sed easd. pronuntiare: frequens autem Badæ in colle juxta Lugdunum, mox à frathermas: ibi & Dryopterem [Filicem ramoriam minorem] nasci: qua cum ne quis confundat, cavendum esse.

Præter alia multa duo potissimè esse restatur Turnerus, quæ verat ne hæc veri sit Dryopteris, 1. quòd in parietinis cum Trichomane nascatur, nec non fruticum radicibus, in primis earum, quæ in opacis proveniunt, non autem. Quercu, à quibus & à Filice, Dryopteris nomen habeat. 2. est, quòd vim pilorij & septicam (quam ei tribuit Dioscor.) hæc non possideat. Angl. vocat, *Oke fern*.

Adiant.
nigr. Plinij, Lob.

De Adiantho nigro Plinij, ut Lobel in Adn. & Icon. pag. 810. inscribit, præced. cap. diximus. Hist. Lugd. pag. 1228. dicitur Dryopteris nigra Dodonæi.

Onopteris
major, Tabern.

Tabern. Adianthi genus. *Groß. Efelsarn*. Onopteris major [sic in Icon. tribuitur] similis Adiantho mar. [Trichoman] cum quo generali descriptione excepta foliorum magnitudine, convenit, quæ paulò major. *Fregia* descriptio & distinctio Compilatoris Tabern. nisi adesse Icon. nullus utquam posset divinare quid velit, quòd fortè ipse met. haud intellexit. Quid si eadem sit cum ejusdem Tabern. Filicula petrae femina prima, quam Compilator non ducit esse necesse ut describatur, quia eam procul dubio ignorat.

Clus. na-
turalis.

An Filix 1. saxatilis Clusij? Is autem ejus Iconem exhibet radicem repente, quæ non respondet descriptioni.

Synon. C.
Bauh.

An Cæsalp. Adianthi nigri genus aliud? C. Bauh. pin. Adiantum siue Capillus veneris officinarum 1. vel Adiantum folijs longioribus pulverulentis pediculo nigro: Adiantum pulchrum Lugdunensi simile, Thalij: Dryopteris [Onopteris falsè legitur] nigra Dod. & H. Lugd. Adiantum nigrum Plinij, Lob. Adianthi nigri aliud genus, Cæsalp. Onopteris major, Tab. mas Gerardi. Cæterum, C. Bauh. ab Adiantho nigro separat Dryopterem Matthioli & Camerarii in Epit. item, Filicolum petrae femina 1. Tabern. ac Filicem saxatilem 2. Clusij, de quibus jam dictum.

Locus.

Patauij in monte di *Venda* inveni sesquipedalem excendens.

Vires.

Experientiâ Turnerico pertum est plantam, quâ Louanenses vsi pro Adiantho, plurimum conferre contra calculum cum vino, aut emulsionem amygdalarum extracta cum aqua Capilli veneris. Dryopteridis radices (inquit Matthiol.) in pulverem contritæ & cum suffutibus addito salis & sulphuris momento, equis deuorandæ aduersus intestinum vermes, exhibentur: nam-

Tom. III.

que potenter illos expellant & interficiunt. Cæterum, quom. Matthiolus nescierit quid exhiberet pro Dryopteri, difficile est statueri, cui Filicum generi hæc tribuendæ vires: censuimus tamen sine periculo experientiâ posse fieri, ut Adiantho nigro vulgò dicto debeantur.

Adiantho nigro similis si non eadem missa pro Capilligno.

A Clariss. Paludano missa hoc titulo: *Folia & Radix trullus Capilligno*. Ramulus est ipsihamæ longitudinis. Adiantho nigro similis, si non idem, cujus ramuli foliati alternatim quoque ex costa pendent. *Folia* obicure videntur, sed non in tenuia ad apices per extrema diuisa. Per cætera ita similia, ut ovum ovo. Summis verò folijs in dorso singulo folij segmento velut *semen*, quodâ Milij figurâ & magnitudine pullo colore adheret, quod per mediam corpusculi sui longitudinem rima fulcarum videtur. Inrus verò exardis intuenti pulverulentum quid apparet. Huius portio est in superiore parte Adianthi nigri officinarum.

An Cæsalp. Bauh. pin. Adiantum 4. fruticosum Icon. 1. Brasilianum?

ADIANTHVM ALBVM TENVIFOLIUM,
Rutæ murariæ accedeos.



attulit gener. Cherlerus.

C. Bauh. pin. Adiantum siue Capillus veneris officinarum 1. vel Adiantum folijs minutim in oblongum scissis, pediculo viridi.

P Edales ex radice, emittit, sed tenues, caules, qui superius in ramulos alternos ferè diuiduntur, atque hi de quibus sæpius in alios minores, nullo ferè ordine, folijs, Rutæ murariæ dimidio minoribus, incisis, pulchre viridantibus tenerioribus, mollicellis. Ex Gothardo

Describe

Synon.

LONCHITIS VETERIBVS.

CAP. III.

L Onchitis Dioscoridi duplex est. Prior, folijs, *Lonchitis* habet, Porto perquam similis, latiora tamen & rubentia, plurima ad radicem circum fracta, veluti in terram procumbentia. Habet & circa caulem pauca, in quo quidem, *flores*, cen pileoli, hiantibus comicis personis figurâ similes, siue nigri, sed è rictu albam veluti parum linguam exerentes, quæ ad labrum inferius spectet: *semen*, inuolutris clausum, triangulum & lanceæ cuspidi simile, vnde etiam planta ipsa sibi cognomentum arrogauit: *radix*, Daucij

RIFE 2



ea, quæ per medium folij transit, puniceæ est coloris. Matthioli scribit mitiora & tenuiora, angustiora quæ folia, quam præcedentem, promerere, & magis Polypodio similia, hirsuta & aspera: nos autem hirsutiem non animaduertimus, firma alioqui & satis rigida sunt folia.

An Cordo hist. (in Diosc. enim vocat Lonchitidem alteram asperam cognominatam) Struthiopteris, Filicis insignis species, in Hercynia sylua propè Goslariam inuenta, figurâ admodum spectabilis, &c. quæ Struthiopteris ab ipso nominata quoniam aspectu ac crispis foliorum [quæ gustu, cum tenuitate aliquâ astringunt] habitu Struthionis siue Struthiocameli pennas imitatur? An Lonchitis aspera minor Marth?

Gesl. hort. Lonchitis altera, *Spicant*, Germanorum aliquorum. Eid. app. Lonchitis aspera alia, Asplenium sylvestre Tragi, Ghini & Maranthæ Lonchitis dignior.

Tragus cap. de Scolopendria secundo loco describit & depingit pro Aspleno silvestri, *Walds Asplenon*, *Waldhirsung*, & addit esse verum Dioscoridis *ἀσπλην* se existimare. Sed interim aliam rursus plantam subdit, quam verum Dioscoridis Scolopendrium statuit.

Dod. gall. & Lat. Lonchitiam asperam inscribit, facique *δολοχίτην ἀσπλην* Græcorum, Struthiopteris Tom. 111.

rim Cordi, Longinati & Calabrinam quorundam, Neotericorum Asplenium, & Asplenium silvestre, aut Asplenium magnum, Germ. *Groß Miltzkraut*, Belg. *Gracht Varen*.

Pro Lonchitide altera pingitur in Icon. p. 815. & Obl. p. 475. eique in Adu. à Lobelio tribuntur Polypodij folia, non inora, tenuiora, tamen usque incisa: palmos binos alta, pusilla. Polytrichis, Cæterâ hve radix: multæ si apiculi, vermiculorum in modum, præsertim promerita & ate glomerati, spemque & speciem dantes feminis luteoli & racemoli, Oleæ semine: tamen si sint enanida rudimenta, vti Filicis.

H. Lugd. pag. 1216. Asplenium sylvestre, Scolopendrium alterum Tragi, Lonchitis aspera Dodonæi. Item p. 1221. Lonchitis aspera Dodonæi. Extrat eadem pag. Icon. Lonchitis aspera Matthioli, ve à non sub titulo Pseude lonchitidis asperæ Matthioli, & Lonchitidis asperæ Maranthæ: non autem erat exhibenda sub Pseudolonchitidis titulo, sed pagina 1210 sub suo titulo: sunt etiam ipsius officinae icones errore fortè typographico.

Tabern. Ic. & hist. Lonchitis altera scemina: Eid. apud Wirsing. Lonchitis altera Diosc. *Groß Nesselwurm*. Corn. Asplenium spicatum, nomine ad siluam Herculiam familiari. Lonic. in Diosc. Asplenium, Lingue ceruinæ silvestris species, & Scolopendrium verum Tragi: Eid. hist. Scolopendrium majus: Item, *Spicant*, ex genere Filicum. Lonchitis aspera Dioscoridis, & Lancelularis. *Lonscortus deceptus*, malâ figurâ non benè separat, *Spicant* à Scolopendrio majore.

C. Bauh. Lonchitis 2. siue minor: Lonchitis aspera minor Matthioli, Hist. Lugd. & Camer. Lonch. aspera, Thal. & Germ. Scolopendrium majus, Lonic. Lonch. altera Neotericorum, Clus. pann. & hist. C. Bauhinus debet anno- rare apud Lugdunensem, figuram esse sub alieno titulo exhibitam.

An Filicis paruum genus Cæsalp?

Elegantissimam hanc plantam non passim occurrere testatur Tragus. Vbi tamen inuenitur, tenebrosis sc. & humidioribus siluis, ibi magnâ copiâ prouenire solere dixit. Lobelio Lonchitis altera locis nemorosis & asperis, in Anglia, Belgio, & Basileæ, propè montem arduum, vno ab urbe miliarî distito, occurrit. Dodonæus natci refert in scrobibus ac fossis, locis viginosis, humidis atque ymbrosis: nec caulem, nec filicem proferre: perpetuò vitere: *Ætate vigere*.

Herbam esse vulneribus glutinandis, lenticulique absumentis idoneam docet Matthioli. Illis enim imposita, ne inflammentur vulnera, impedit.

LONGCHITIS ASPERA MARANTHÆ.

A Superioribus tribus haud obscure differt. *Descript.* Ista, toto habitu alia: rami dodrantales [vt in nostra planta sicca obseruauimus] in spadicco nigricant, splendensque, ex rufa lanugine prodeuntes, cui longæ, nigraque capillares fibræ numerosæ subiectæ: nudi suprà medium sunt rami, inde verò summo tenues, breues exeunt, *pediculi folijs amicti*, quæ auulsa, planè dicas Aspleno, vulgò Cæterach dicto detracta, ita arcta est similitudo diuisionum, lanuginis parte inferiore, foliorumque in Scolopendriæ formam conuolutio- nis. Camer. *radix nigra*, citrosa que.

Rrrr 3

Synonyma.

Matth. in comm. cum mag. fig. Pseudolonchitis: Lonchitis aspera legitima Marāthæ. Camer. in Epit. Lonchitis aspera Marāthæ. Clus. histor. Lonchitis altera maranthæ, Filiculæ elegans genus. Tab. Ic. & hist. Lonchitis adulterina. Cæsalp. Ceterach. quoddam in Ilua nascens, locis editis & saxosis, folio dodrantali, ramofo, ac magis hirsuto: Lonchitis aspera Dioscoridis.

H. Lugd. notatur.

H. Lugd. pag. 121 Pseudolonchitis aspera Matthioli, Lonch. aspera Maranthæ. Icon. sub hoc titulo posita, haud convenit. Quæ enim ei debetur, malè pag. 120. pro Lonchitide aspera minore Matthioli pingitur. Alia præterea proponitur descriptio & Icon. nomine Lonchitidis asperæ, Iluensis, quæ non est diversa, ita ut duas vnius plantæ Icones habeat H. Lugd. quarum prior magis aridet.

Syn. C.B.

An Anguill. Lonchitis secunda, in monte nigro Pisis inuenta, Ceterach ramofo species?

C. Bauh. not.

C. Bauh. Lonchitis 3. siue folio Ceterach, magnitudine varians: hinc duæ figuræ apud H. Lugd. 1. Lonchitidis asperæ minoris titulo: 2. Lonchitidis asperæ Iluensis. Lonchitis 2. Dalmatica, Anguill. Lonchitis Maranthæ, Lobel. Polypodium Iluense, H. Lugd. pag. 120. Filicula petraea mas Ger. Ic. Nec. Polypodium Iluense, H. Lugd. huc referri posse non negamus, sed Lonchitidem Dalmaticam Anguill. à Polypodio jam dicto distinguimus.

Locus.

In Stratiacatum alpium jugis locis æditis & saxosis, vel in nemoribus aspero loco nascitur.

POLYPODIVM VETERIBVS

CAP. IV.

Descriptio.

Ratio nominis ex Dioscoridis descriptione colligitur: *πολύπους*. Inter spuria aliqui Scelopendron, alij Pterin: alij, à multifidis, *radicum* incutitur, Polyrithon Romani Filiculum, seu Filicularem herbam vocant. Inscitè in muscosis perris, & vetustis, Quercuum caudicibus, palmi altitudine, Filici simile, subhirsutum & incisum, ac non perinde tenui diuisurā *Radix* (subjacet pilosa, citros habens ceu polyporum, crassitudine minimi digiti minimi, acerbis, in petris nascens, aut sub arboribus vetustis, floret & semen non fert.

Plinius.

Detrahendum Polypodium quam nostri (inquit, Plin. lib. 16. cap. 44.) Filiculam vocant: simili enim est Filici. Radix in usu, pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine digiti minimi, acerbis, in petris nascens, aut sub arboribus vetustis, floret & semen non fert.

Semper autem post imbres erumpit, autore Theophrasto, cui radix hirsuta (*δασύς*) est & acetabula habet, ceu polypi citri: purgat autem dorsum, & si quis adalliget, Polypum innasce negant. Habet folium simile Filici magnæ, & in petris nascitur. Et sic quidem Cornarius hunc locum accipit de adalliganda Polypodij radice, & ita prohibendo ne polypus alicui in naribus nascatur. (Gaza quod *δασύς* legit Cornarius, habet *δασύς*, sed ridiculè & perperam.)

Plinius ut corrigendus contra Marantham.

Iam mendum apud Plinium legitur in Polypodij historia, hanc plantam florere, & semen non ferre, cum ita potius, vel consimili modo reddendus sit locus, Nec floret, nec semen fert, inquit Marantham. Alit contra, florere Polypodium, veluti & Filicem nobis non dubium, nec

etiam semen ferre, licet ob tenuitatem vix appareat. *Nolimus*, igitur cum Marantha Plinij textum corrigere: Vel, si corrigendus, potius delendum vocabulum, non existimemus.

Cæterum, ut ad æquiuoca deveniamus, Polypodium majus & minus, nobis vnum tantum specie cum Lobelio est (nec diversa, ut frustra quidam faciunt. Polypodium etiam Iluense pro Lonchitide aspera Maranthæ nequaquam impretabamus. D. yopteris assumpta pro Polypodio, exitio fuit multis ægotis. Est & Polypodium Indicum quod deliripium habemus in Exoticis Clusij. *De his nunc agendum.*

Æquiuoca.

POLYPODIVM.

Polypodij radix obliquè sub terræ superficie reptat, aliàs fibras suas ex tuberculis, quibus plurimis scaret, demittens, ad crassitudinem ferè minimi digiti accedens, nunc tenuior, colore foris buxæo, intus ferè herbaceo, sapore dulci, tandem aceto & adstringente. Lobel. radix prolixioribus anfractibus, nodulis, acerbulisque donata & flagellis, Polypi pilcis similibus, cujusmodi ferè Coralli albi sunt: crassitudine digiti minimi, intus porracea, gustu nonnihil adstringens & subdulcis, querna præsertim: modò vnam, modò plura, folia ex transversa radice, filices, ex folijs multis, gustu adstringentibus, non denticulatis, superne virentibus, inferne ad nervi latera utriusque ordine quodam acetulis quasi pulvisculi rufi punctatis, eisi interim hoc non semper observetur, ad costam vnam med. à sui parte folijs viduam, tenuem, rigidam, annexa.

Descriptio.

Matth. Sylvaricus non absque errore, ut lac. de Manlij scitè annotavit, Polypodium Dipterim vocavit. Ac melius vix fortè alij ex similitudine foliorum cum Filice Filiculam nuncuparunt.

Tragus, qui vnam tantum speciem depingit, refert perperam à nonnullis, *Stenifarn*, hoc est, Filicem saxatilem, sicut & Trichomanes appellari.

Matth. in Dioscoridem duas exhibet, Polypodij species. Earum autem Icones in post. comm. (non quidem variatà priori descriptione) mutavit, ita ut difficile sit, se ex ejus historia extricare, si quis figuras conferat. Sed majorem pariunt obscuritatem, sequentia ejus verba. Polypodium siue Filicula quæ in montibus procreant in itinere, quo Goritiâ per montes in Carniolam itur, folijs argustioribus & admodum virentibus. Cæterach per quàm similibus, quamquam paulò amplioribus. Tanti quæ est similitudo, ut mihi hanc herbam insipienti ea ferè visa sit verum Asplenium: quæ tamen efforsâ radice statim pro Filicula agnosceatur. Quibus verbis quid sibi velit Matthioli, tunc lector committimus prudentiæ.

Dod. licet in Hist. gall. vnicam tradat Polypodij speciem: in hist. tamen lar. [ubi Filicis genus facit & flore, & semine atque caule carere scribit] duas Icones proponit. Vni, quæ planè nostræ similis, titulus est Polypodium minus, alteri Polypodium majus.

Duo quoque Polypodia pingit H. Lugd. scil. Polypodium primum Matthioli, p. 1219. & Polypodium secundum Matthioli, p. 1230.

Comi-

Compilator apud Tabern. distinguit Polypodium 1. & 2. tantum magnitudine. Hunc sequitur C. Bauh. in pin. *Polypodium* 1. siue vulgate, faciens Polypodiū Brunell. rom. 3. rhaps. 40. Tragi. Matth. Ang. Fuch. Dodon. gall. Cordi in Diosc. & hist. Turn. Lon. Lob. in Adu. & Obl. p. 473. [vbi & Herbarioli Apulei] ac Ic. p. 814. Czel. Cast. Cam. Tab. & Gerardi: Polypodium maius Dod. lat. Polypodium 1. Lugd. *Laudāque quod in Quercu nascitur*: reperit ait in Fago, Corylo: in antiquis & caudis salubus. gustu amariorem prouenire, quam syluaticam censet: in ruderibus saxosis. *Polypodium* 2. siue minus, est ipsi Polypodium alterum Matth. Lac. Lugd. primum Tab. Polyp. minus Dodon. lat. Polyp. quercinum Gerardi. Nobis probatur iudicium Lobelij, non distinguentis inter hæc duo Polypodia. Quæna, inquit, sola in vfu, nec alia visitur, nisi si quando macilentius nata solum, gracilior. Sic etiam quibusdam opacis nemorib. paululum folio est aduolte, neququam tamen specie diuersa ut frustra faciunt quidam.

Πολύποδιον Græcis, Lat. & Officinis Polypodiū, à radice, quæ cirrhos & acetabula polyporum modo habet, dictum est. Arab. vt Auicennæ *Desbers & Budeg*: Serap. *Bibeg*: alijs Mauritanis, *Asbeg & Bessag*, Manlio verò *Besgeri*, Phrilius in suis synonymis plura alia recenset nomina, quæ hic studio omitimus. Quis enim tot barbaras appellationes enumerare possit? Germani *Engelsatz* vocant, *Suszarn*, h. e. Filiculum dulcem, *Suszvornzel* Radicalem dulcem, à gustu quo prædita est: *Baumfarn*, & *Broppfarn*, & *Corallen-vornzel* à forma: alij etiam *Droppfarn* à maculis quibus notatur plūs quam aliud quodcunque Filicis genus. Belg. *Boom varen*, & quibusdam *Eyken Varen*, h. e. Filix quercina. Gallicè *Polypode*: Ital. *Polypodio*: Hispan. *Filipodio* Angl. *Okeferne*: Boh. *Oladye*.

Nascitur in siluis, radice in muscosis petris serpente: nec non in collibus placidioribus, iuxta radices, caudicēque vetustis arborum, præsertim verò Quercum & Quorum. Non raro etiam in vmbrosis & vlgiginosis vallibus, è musco iam memoratis arboribus adhærente Polypodium proflere vidit Tragus. In Alatia, vti quoque in ditione Dominorum Bernensium intra Auenticum & Paterniacum in capitibus antiquarum & cedarum Salicum affarim luxuriare vidimus, gustu amariorem alterā, quæ syluatica censetur, quæ & præstantiore, nonnulli iudicant. Nascitur in veterum arborum carie exarāt caudicibus, inquit, Dodonæus, tum & super veteres muros, ac ædiū tecta: reperitur & in aggeribus secus agrorum margines, præsertim sub arboribus ac sentibus. Quovis anni tempore viret, colligique potest: Vere nouo, noua folia promit.

Quæno Polydodii bonitatis notas octo Mesue attribuit, vt postea dicitur, sed obscure molitum & non conformiter bonis autoribus. Deligendum itaque censemus, quod eas habet notas & proprietates, quæ illi Dioscorides & Plinius assignāt. Dioscorides quidem Polypodij radicem purgandi vi præditam esse prodit: dari autem ad aluum soluendam, coctam cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua. Atridæ farinā aquæ mulse insperſam, detrudere pituitam ac bilem. Triam eandem luxatis efficaciter imponi, & aduersus rimas digitorum. *Galenus* Polypodio dulcem simul & austeram attribuit vincētē qualitatem, vt facultatis sit admodum dēscāntem, citra mor-

sum. Plinius testis est radicis exprimi succum aquā madefactā, & ipsam concisam inspergi oleri, vel Beta, vel Maluæ, vel fassamento, vel cum pulicula coqui, ad aluum vel in febris leniter soluendam: Stomachum offendere: Atridæ farinam natibus inditam polypum consumere. Radicem cubitorum ac pedum [Digitorum] in pedibus, veteris rimis prodelle, & illitam luxatis.

Mesue Polypodium radix est plantæ lapidibus & arboribus incescentis, quam *Δυο ποτλίον*, i. e. arborum Filicem, Græcos vocare dixit. Quod autem lapidibus innascitur, humiditate extremē tota, crudā, flatulenta, ventriculum ad nauseam euertente, abundare prodidit. Præstantius, quod arboribus præsertim glandiferis, innascitur, affirmavit, præsertim si magnum sit, recens, solidum, foris ex nigro rubescens, colore intus herbaceo, vt Pistacium, sapore dulci, austero, tandem subamaro, non nihil aromatico. Dioscoridi calidum esse tertio gradu, siccum secundo, addit idem, quod tamen Dioscorides non dicit: item, humores crassos, lentosque tergere, digerere, siccare, bilem atram & pituitam vel crassam, vel lentam purgare, etiam à iuncturis. Affectionibus ob hæc melancholicis prodelle, vt quartanis, præsertim cum mulla Epithymo, sale Indo: colico etiam dolori, & splenis duritiei quovis modo vsurpatum. Contra rimas verò digitorum idem triā illiniri, quod corpora extennet & siccat. Ne porrò ventriculum ad nauseā euertat, vtque citius vacuet, dari ex mulla, vel aqua Hordei, vel vuarum passarum, vel ex iusculo Gallorum & Gallinarum [vt Hamech suaserit] decoctum, vel sero lactis: Bibi vtilissimè tē miltis feminibus odoratis, vel alijs aromaticis, vt Dauco, Aniso, Fœniculo, Zingibere, vel simili, animam & facultatem ventriculi naturalem corroborante: Longam satis concoctionem sustinere: dari à drachmis duabus ad aureos quatuor. Auicennæ calidum est secundo gradu: siccum tertio. *Agnetæ* ait radicem Polypodij lenem mullā insperſam, aut cum ea contritam, eundem quem Colocyinthidem, effectum præstare, & addit, corpora extenuare, & ventriculum ad nauseam euertere, quod negat Auerrhoc, qui Polypodium censet medicamentum, & Epithymo præstantius, cui assentitur Manardus, asserens Polypodiū imbecilliter & leniter purgare: quare corpora extenuare non posse, idemque per se exhibitum nullam stomacho inferre iniuriam. In eadem est sententia Actuarius lib. 5. meth. Filicula bilem & maximè atram ac pituitam ducit. Dantur, inquit purgatæ radicis seni scrupuli affusa aqua mulla: purgat autem mediocriter, & citra molestiam, in gallinaceo iure, & in prisanæ cretore cocta radix. Acrius vt bilem nigram & pituitam euacuet, expurgatæ radicis scrupulos sex, qui in aqua mulla præferbuerint, exhibet. Oribasius drachmas duas coquit in prisanæ sacco, datque bibendum succum. Sunt tandem qui vnciam integram sine noxa dederint, parum enim & sine molestia vncia nostratis Polypodij euacuat. Apuleius etiam sine labore ventrem subducere tradit, & ad capitis dolorem commendat. *Et hæc ex sententia veterum scriptorum dicta sufficiant. Ad Recentiores deuenimus.* Polypodij illius radicem in vsum duntaxat recipit Fallopius, quod ex Quercu assumitur, & quercinum ob id vocatur: illud autem quod accipitur ex alijs arboribus, cum malum improbat. Raro autem per eos exhibendum suadet, sed vt plurimum in medicamentis compositis, vt infusionibus & decoctis. Lonicegus

Mesuem secutus statuit Polypodium calidum in tertio gradu, & sicum in secundo. Sed tantum calorem non demonstrat quicquid dicat Lonicerus & Mesus. Polypodium, inquit Tragus, temperatura sicca est præditum, & modicè calida. Radix eius purgandi vim obtinet in hominibus & pecoribus, bilem & pituitam trahens, si cum gallina decoquatur, admixto semine Anisi & Zingibere, ac à ieiunio iusculum illud calidum bibitur. Alii, nonnulli Cuminum Romanum, seu sativum Fœniculi & Anisi semina, cum radice Polypodij & Zingibere in minutas particulas confectis, æquali pondere cum vetulo gallo gallinaceo decoquunt, posteaque iusculum hoc cœlica passionibus laborantibus exhibent. Estque decoctio hæc medicamentum certè perquam vtilissimum torminum. Radix in pulcrem redacta drachmæ pondere ad minis, ex aqua mulla potatur, non ut prædictum, sed aut quatuor horti ieiuniorum pollet viribus, quibus & decoctio iam dicta. Aqua destillata ad febrem quartanam, tussim, asthma, & pulmonis affectiones, aduersus melancholiam, & grauiam & molesta somnia, aliquot dies continuè habita facit. Cum pestis inter suos grassatur, hæc radix in vino illis exhiberi potest, sic enim, purgabitur, & à pestifera luce conseruabuntur, quod nulla alia procul dubio de causa fieri consuevit, quam quòd constet, eam choleram trahere, quæ multum etiam suis ne gotij facessit. Hodie interis frequentius, quam externis adhibetur corporis partibus.

Turnarus ad quartanam & melancholiam magis probat decoctum radicis ex vino, saccharo, aut melle dulcoratum, quàm aquam stillatitiam. Imò tam huius, quàm aliarum plantarum efficacior Turnero videtur succus aut decoctum, quàm aqua stillatitia. His coronidis loco quædà ex Dodonæo adscribamus. Purgandi inquit, vim habere Diosc. & Actuarius referunt: Alijs nulla, aut, si quæ sit, exigua, clemensque subducendi vis Polypodio esse videtur. In qua sententia Manardus quoque, qui admodum imbecilliter ipsum purgare sentit: cui & accedit ipsa rerum magistra experientia: Nam re verà Polypodium per se haudquaquã purgat, sed ex iure veteris galli cum Beta, aut Malua, alijsve lubricantibus aluum, decoctum, ad alui lenitionem nonnihil tantummodò confert, &c.

POLYPODIUM ILVENSE.

Locus



Ilua Tyrtheni maris insula Polypodiū hoc gignit, quod H. Lugdunensis auctor ab alijs diuersū facit, sicut etiam à Lōchitide asperā Iluensi [Lonchitide aspera Maranthæ] separat. Nascitur autem in saxis, radice vt in alijs generibus velut polyporū citris nodosā, fibratā: caulis pedalis, è rufo nigrescentibus, læuibus, infernè hirsutis: fo-

lia oblongis, pinnatis, inæquali situ in caule dispositis, altera parte virentibus, altera puluisculo obfusa, gustu subdulcibus, & nonnihil austeris, nullo flore, nullo semine. Ad eadem valere aiunt, ad quæ alterum Polypodium, nisi quod magis siccet, ob natalium ariditatem, tum soli natura, tum maris afflatu maiorem.

An Lonchitis aspera Maranthæ;

POLYPODIUM INDICVM.



V Aldè. elegans Polypodij siue Filiculæ genus hoc, anno 1602. ex Orientali India adferebatur Amstelredamum, quod inuentum in sportulis Doctoris Nicolai Colij Medici, qui cum ijs, quos Mercatorum societas biennio in Indiam aromatum compaaderum gratia ablegauerat, profectus, in reditu

extinctus fuerat, Cl. V. Petrus Pavvius, primarius in Academia Lugduno Batava Medicinæ professor dono acceperat.

Radice autem nitebatur sex uncias longa, vnam pænè crassā hirsā, quemadmodum Europæi Polypodij radices, ferruginei coloris, & eodem modo summā tellure oblique serpente: è qua tereta prodibant folia, quorum tertium reliquis duobus minus: bina autem maiora vndecim uncias longa erant, à medio verò nervo satis crasso, folij longitudinem secante, vtroque latere in quinque pænè unciarum latitudinem expansa, peroras laciniata, instar foliorum Quercus in nouellis furculis natorum, quæ plerumque ampliora ijs quæ in vetustis ramis nascuntur, esse solent: è medio illo nervo alij minores in lateribus oriabantur, vsque ad laciniarum extrema propensi, inter quos multiplices venula reticuli instar contextæ, & sese inuicem secantes excurrabant, quæ magnam venustatem folio conciliabant: firma autem erant ea folia, coloris ex spadiceo fulci, qualis in Quercus siccis folijs conspicitur, & à Gallis couleur de fusille morte appellari solet, infima parte breui pediculo à radice emergentia, etiā aliqua ex parte illam regentia, quia statim ab exortu in latera se spargebant: radix manducata Polypodij vulgaris saporem quodammodò retinebat, minus ramen dulcem, sed leui quadam acrimoniâ præditum, quam ex calidioris regionis, in qua planta nata, intemperie, aut ex vetustate forsitan contraxerat.

Clus. Exot. lib. 4. cap. 17. Polypodium Indicū. Casp. Bauhin. pin. Polypodium 3. siue exoticum foliis Quercus: Polypodium Americane incognitæ nomine à Pona Veronā acceptum.

ASPLENYM.

Locus

Descript.

Aequiuo-
ca

ASPLENVN EX VETTERIBVS, ET
in genere.

CAP. V.

Appella-
tiones na-
the, Diosc.Defecti-
pito.

Vites.

Vitis.

ocus.

Terba
vula
theophr.

A Splenon, quod aliqui Scolopendrium, Splenon alij Hemionion, alij Pterys, alij Pteris, quidam Lonchitum, nonnulli Auium, Apuleius Teutrium, alij Phrygiam, alij Phrygitin, alij Philtrodem, Prophetæ, Multelæ aut Felis sanguinem, vocant, folia habet scolopendrix animalis similia, plura ab una radice prodeuntia [sic Corn. ex vet. quæ delect. περιχρημασθαι id est in ambitum sparsa. Sic enim Sarac. reddidit.] Nascitur in petris, parietibusque confectis & calculis, filicibusque, iisque opacis [sic enim legere malum est cum Sarac. quàm cum Cornasio φῦται ἐν τοῖς οἰκῇ καὶ πετρίαις] Nam vel inter saxa, vel in parietibus humidioribus, qui & calculis filicibusque coagmentati sint, ferè Asplenon inuenitur. Ita verò parietes id genus distinguere voluit author, ab ijs qui & solida structura, nempe vel è quadrato lapide, vel è lateribus probè iunctis eriguntur. Nec verò caulem, nec florem, nec semen [ἀναπνεύουσι, ver. delet.] Folia autem Polypodij [Filiculae, Sarac. Imodo incinctis diuiduntur, subter flauescencia, hirsutæque, superne verò viridia. Vim habent liquandis] abluendi, Sarac. [Splenon, folia in aceto feruifaceta, & ad quadraginta dies pota. Sed oportet etiam folijs cum vino titis lientem integrere] illius, Sarac. [Sraranguræ quoque, singultui, & regio morbo auxiliatur, calculoque vesicæ comminuunt. Cæterum ipem partus seu conceptionem impedire, tum per se, tum etiam cum muli liene amuletis instat. Verum aiunt noctu, lunâ silente, ipsam effodere oportere, ut hoc præter. *Hælenus Dioscorides.*

Asplenon (ait Plin. lib. 17. cap. 4.) sunt qui Hemionium vocant, folijs trientalibus multis, radice limosa, cauernosa, sicut Filicis candida, hirsuta, nec caulem, nec florem, nec semen habet. Nascitur in petris, parietibusque opacis, humidis, laudatissima in Creta. Hujus foliorum in aceto decocto, per dies quadraginta pota, lientem absumi aiunt. Et illi uocant, [ita emendatius ex veteribus in vulgatis legitur. Et, illinuntur autem, eadem sedant singultus. Historia Leguminis.] Non danda feminis, quoniam sterilitatem facit.

Folium herbæ mulæ vocata (ἡμίονον) sterilitatē mulierib. facere volunt, & aliquid vulgæ ac seminis [aliqui codices nō σπέρματος, sed δέρματος, pellis, vocem præferunt] muli animalis miscendū præcipiunt: constat hæc folio linguæ ceruinæ [ἡμίονον τῆς ἡμῆς οὐλλῶν σχολοπενδρίου, sic vulgati codices habent, sed legēdum ex Dioscoride τῇ σχολοπενδρίᾳ] appellatæ, radice numerosâ & tenui: montanas planities & saxosâs amat: mulas hæc herbâ plurimum delectari afficiant. Vius ejus vel ad lienes, quemadmodum Volucrisiue ut H. Lugd. Clymeni. Et his verbis videtur Theophrastus lib. 9. cap. 19. Hemionij solum Scolopendrio simile facere: Dioscorides autem Asplenon & Hemionion & Scolopendrium idem vocati ait. Et licet Theophrastus, ἡμίονον & σχολοπενδρίον primâ fronte aduerso fecisse cupiam videatur: tan è eo loco [ἡμίονον ἢ τῶν πολλῶν σχολοπενδρίων] legēdum fortasse fuerit, ut apud Dioscorid. σχολοπενδρίον, vel etiam σχολοπενδρίον Nam & id animalculi genus utroque modo apud Græcos effectur. Cæterum, ut medicamentum ad conceptionem impedi-

dam, Dioscorides adalligatum tum per se, tum cum muli splene, Asplenon commendari scribit, qui vltus in Theophrasto est ambiguus: nec enim indicat an adalligari, an potari velit, cum vngula, aut semine muli. Sed hæc commode ignorari possunt. Et quod ejus rei gratia tradit Dioscorides silente Luna effodere oportere, Serapio aliter expressit, nempe oportere ipsum suspendi dic aliquo in cuius nocte Luna non apparuerit.

Asplenon à Scolopendrio videtur quòque distinxisse Galenus lib. 5. simpl. cap. 12. dum remedia majoribus lienis obstructionibus dicata recensens, utriusque sortium enumerat. Scolopendrium sc. & eam quæ lientem nomine repræsentat, Asplenon appellatam. Verum eo loco alterutram sedundare facile crediderimus [præter Galeni sententiam inibi accreuisse Scolopendrium censet etiam Matthiolus qui dum Plinius lapsus arguit, quasi ipsi inter Hemionium & Asplenium nulla intercederet differentia, confundit inter se Hemionij & Hemionis vocabula quæ expressè Dioscorides ab invicem disiunxit: nec enim ipse nec Plinius voluit aut scripsit Hemionisidem, Hemionium nominari, quoniam idem ipse, locis alijs, & maxime libro nono, de compend. med. sec. loc. ἡμιονίδης, σχολοπενδρίον nomina, hinc vni eademque plantæ manifestò tribuit, teste Saraceno. Galenus breuius his verbis Aspleni vires perstrinxit: tenuium quidem est partium, non tamen calida est herba, hac itaque ratione & lapides frangit, & lienes liquat.

Asplenon
Galenus.

ASPLENVN SIVE CETERACH.

Capillarib. Defecti-
filamentis
nigricantibus
perenniib. con-
texta est radix,
vnica, inquit,
Tragus, ex qua
quadraginta,
nonnunquam,
interdum &
pauciora, haud
temerè suprà
digitum longa,
vel, ut ait, bre-
uius pedicu-
lis appensa ex-
surgunt folia,
falcatis utrin-
que incisuris,
Polypodij, sed
longè breuiori-
bus, licet ali-



quantò latioribus interdum, diuisa, pinguiscula, superne viridantia, inferne lanuginosa, ruffa farina aspersa. Eas, inquit Dod. cum tuarescunt complicantur & in teretem figuram contrahunt, foris que hirsuta, Scolopendrix similia apparent. Cordus ait, folia interiori sua parte viridia, exteriori verò & à tergo, flauo, hirsutæque & squamoso pulvere, eoque non punctatim diuisa, sed continuo obduda: saporem folia adhuc stringentem & aliquantulum tenue habent. Cæsalp. Folia raris utroque diuisuris non conjugatim, sed alternatim digestis: color superne vires, inferne rubigo quædam inest fuscescens, initio argentea, postea flauescens.

cap. 21. Aliud Adiantho miraculum: Etate vitet, brumâ non marcescit, aquas respuit, perfusum, mersumve sicco simile est, tanta dissociato deprehenditur, vnde & nomen à Græcis, aliisquin fructui topiatio. Quidam Callitrichon vocant, alij Polytrichon, vtrumque ab effectu, &c. Duo ejus genera, candidius, & nigrum breviusque. Id quod majus est Polytrichon, aliud Trichomanes vocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, folijs Filicis. Ex quibus interiora aspera ac fusca sunt: omnia autem contrarijs pediculis densa inter se ex aduerso: radix nulla: umbrosas petras, parietumque aspergines, ac fontium maxime specus sequitur, & saxa manantia, quod miremur, cum aquas non sentiat. Calculos è corpore mirè pellit, frangitque vtrique nigrum: qua de causa potius, quàm quod in faxis nasceretur, & à nostris Saxifragum appellatum, crediderim: bibitur è vino quantum tenui decerpere digiti, &c. Lib. 21. cap. 17. Adiantho æterna folia esse scribit.

Perperam autem Adianthi duo genera statuent, minus Trichomanes nominari referunt: nam Trichomanes ab Adiantho differt. Et hoc testatur H. Lugd. talibus verbis: Plinium Theophrasti verba convertere voluisse, sed ejus sensum haud assecutum fuisse, perspicuum est. Trichomanes enim alterum facit Adianthi genus, scilicet candidum. At Theophrastus cum de vtriusque Adianthi genere dixisset, de Trichomane, cui diuersa planta, seorsim verba fecit.

Montspelij Adiantho albo & nigro abundans. Quid autem intelligit Fernellius in suo syrupo per Adianthum simplex; me latet, inquit Sanguier, cum duo tantum genera Adianthi proprie dicti reperiantur in officinis, nisi sit Polytrichum quod Filiculam vocat Gaza. Nos suspicamur Fernellium per Adianthum album, Rutam murariam intelligere, per nigrum, Polytrichum, per Adianthum simplex, legitimum.

Potro, ut dictum, nil aliud sonare videtur Adianthum quàm quoddam non madescens, neque aquam admittens, propter siccitatem sc. superficiem, quæ aquæ contraria est, & eam solet repellere, quemadmodum, ut testatur Fracastorius lib. de symp. & antip. rerum; in pulvere & pennis, & alijs siccis contingit: in quibus non consistit aqua, sed aut elabatur, aut in guttulas rotundatur. Signum autem quod in Adiantho non consistat aqua propter siccitatem, id est, quod duabus existentibus Adianthi speciebus, albo, & nigro, nigrum quidem madescit, quod humidis superficiali sit, album autem non, quod siccioris. *Nican-der* contra Adianthon haud dictum ait, quod folium perfusum, mersumque aqua, & *Saxifraga*, nunquam madescat, semperque immadidum permaneat: quasi verò enim longiore morâ in aqua submersum æquè aliæ herbæ non irrigetur: sed quoddam imbris è cælo decedentis stillicidia folijs ejus non infideant.

Fuchsius tamen magis placet, ab interioribus pureorum parietibus, & fontium marginibus, quas coronat, dictum esse Adiantum, quoddam nimirum quasi sitiens illorum aquas, quas tamen odit & respuit, quærat.

Trichomanes à luxuria capillitij nomen habet, quod sc. faciat luxuriare capillos & subnasci. *Polytrichon*, autem quasi multicomum, quoddam pillorum multitudinem creet, eosque densos faciat, simulque eorum profluvia expleat. *Callitrichon*, verò, quasi pulchricomum, quoddam crines tingat, crispet, pulchriorisque reddat. Nec alia ratio.

Tom. III.

tione, *Capillus veneris* hæc herba dicta est, quàm à speciosis reddendis capillis: nec alio nomine veneris vox adjecta est, quàm quod hæc pulchritudine pingatur. Quibusdam etiam *Ebenotrichon*, appellatur, præsertim nigrum genus [*Trichomanes*] quæ vox nihil aliud significat, quàm *Ebeni* capillum, id est, nigrum, & quali colore *Ebenus* est. Oborta quidem suspicio est ex corrupta voce illa *Ebenotricho*, Latinis nomen factum esse, quod in communi vultu est, *Capillus venetis*. Be-lyllabam, Græci, Ve pronunciant, facillisque potuit lapsus esse ab audito *Euenotricho*, in *veneris* trichas, id est, capillum. Ab Hippocrate, teste *Hermolao*, dicitur, *Caliphylon*: sed est ubi & *Caliphylon* scribitur. Dicitur etiam *Saxifragum*: non tam quia nascitur in faxis, quàm quoddam calculos mirè frangit.

Sequuntur Adianthi, Polytrichi, Callitrichi, & Capilli veneris nomine donatæ plantæ. Verum Adiantum siue Capillus veneris, quod Adiantum album dicitur Syluius & Tagaultio, vocat Triagus Adiantum magnum & verum. Idem perhibet esse qui vulgatem Capillum veneris (sic Rutam murariam vocat) contendunt Adiantum album Theophrasti, alijs inquit id negantibus, aliâque in locum ejus substituentibus. Trichomanes vulgò Polytrichum dictum; quidam existimant Adiantum nigrum; Syluius Adiantum alterum Dioscoridis, & nigrum Theophrasti. Anglos pro Adiantho benè usurpare Trichomanes autor est Turnerus. Dodonæus e contra Plinium perperam Trichomanes inter Adianthi genera referre contendit, Trichomanesque ab Adiantho differre. *De hæcenus autem nominatis posthac agemus.*

Filicula fontanâ C. Bauhini, siue Dryopteride candidâ Dodonzi, officinæ olim pro Adianto albo Plinii vñ sunt. Vide caput de Adianto folio Filicis.

Sed & Dryopteridem nigram Dodonzi, sequitur Lobelius, Adiantum nigrum officinarum inscribimus. Adiantum etiam nigrum officinarum, quidam ex recentioribus *Lonchitidem* asperam esse volunt: Sed hoc negat Dodonæus.

Adiantum Syriacum Tabern. quid?

Adiantum pulcherrimum Thalij non nouimus, & tamen ex eo describimus. Adiantum aphyllum aureum quibusdam dicitur de Polytrichio Apulei quibusdam dicto. Siluiam transmarinam Callitrichon Herbarij magno errore vocant, teste Tagaultio & Ruellio. Inter Adianta recententur præterea Adiantum Syriacum Tabernæmontani: & Adiantum pulcherrimum Thalij.

ADIANTVM SIVE CAPILLVS VENERIS.

Muco ruffoque cæspiti implexæ sunt capillares radicum fibræ nigæ: caules, exeunt multi, tenues, nigri, dodrantales aut etiam cubitales, in ramos stamineæ tenuitatis diuisi, per quos tremulo filo appensa videntur crebra, folia mollicella, tenellaque, læuia: Coriandinis primis erumpentibus similia, nec magnitudine multum cedentia, ferè triangularia, sectionibus per extremum rarioribus, altioribus cæsa. Folius, Anisi Lobelio: incisa Apij modo odore velut Fungi, Cæsalp.

Syluius apud Mesuem de comp. med. libr. 1. vertit Capillum veneris, Adiantum album.

Sist 2

Aequius
ca.

Descriptio



Adiantum
hoc candidum
& majus, A-
diantum appella-
tione indicare
Dioscoridem,
author est Ta-
gulus, & Poly-
trichum prop-
rie cognomi-
nari, atque hoc
quidem esse
verum Capil-
lum veneris,
qui in Gallia
Narbonenſi
plurimum repe-
riatur, circa
puteorum in-
teriores parie-
tes & fontium
margines: Hinc
topiarum fru-

ticem, vulgò Capillum veneris nominatum per-
petuum vocant.

Cord. in hist. pro Adiantum nigro describit. In
Dioscor. verò aut ejus textu nulla quia nescit,
adjecta est.

Tragus quidem hoc pro Adiantum magno pin-
git, sed non describit, ceu de peregrinis terris aridum
ad se delatum. Hoc verò cum Lobelio pro
Adiantum verò Dioscoridis admittit, & H. Lug-
dunensis.

Compiler Tabern. [qui in Ic. Adiantum
nigrum verum in Hist. Adiantum, i. nigrum,
Venus harr Weiblia, inaequib.] etiam suam
ignotitiam in descriptione Adiantum demonstrat,
dicens: folia folijs Rutæ esse, plac. similia, deinde
addit suæ descriptioni, quod Tragus de
Rutæ immixtae duratioris scripturæ nomina præ-
terea confundit.

Casalpini ad Capillum veneris vulgò appella-
tum, herbam nascentem in puteorum & fontium
parietibus, ad quæ locis, aqua frigida
ingressa, redit in Adiantum Dioscorideum, ac
Theophrasti genera duo, candidum & nigrum:
Ab eo tamen rursus separat Adiantum nigrum
Punij.

Vetus Avicennæ glossographus, referente
Gesnero, Quod de sue. Adiantum siue Capil-
lum veneris, Capillum porcinum vocat: nimi-
rum quod cuniculos nati scelerum proferant.

Adiantum dicitur Mar. h. Fuchs. Dod. (cui
Adiantum nigrum Theophrasti & Plinij.) An-
guill. Lac. Turn. Lob. in Adu. Obs. pag. 471.
(vbi & Callitrichon Apulei.) & Icon. pag. 809.
ac Castori. Adiantum Mart. h. H. Lugd. p. 102.
Adiantum Lugdunense, Camer. Capillus vene-
ris verus, Germ.

C. Bauh. apud Matth. vocat Adiantum galli-
cum, & quoddam Monspelio Lugdunum adferatur,
Lugdunense: in pin. (vbi Adiantum album &
nigrum nihil differre scribit, nisi quoddam nigrum,
cauliculi politiore nitore nigrescent, foliaque sa-
turatiore vireant: albo minus) Adiantum siue
Capillum veneris siue Adiantum folijs Cortian-
dri. Hocque variate perhibet magnitudine & so-
liorum consistit.

Porro, herbæ à nobis pictæ & descriptæ etiam
illa nomina adscribuntur, quæ præcedenti capite
leguntur. Germani, *frayvenharr*, *langfrayven-*

harr, & *Venus harr*, appellant. Belg. *Vronem-
harr*, *Ende Venus harr*: Gall. *Cheneux de venus*:
It. *Capel Venere*: Hisp. *Collantrillo de pozo*: Angl.
Venus harr: Arab. *Berscegnascen*, seu *Bersusan*,
Culbars albir, & *hailbare albir*.

In parietibus, locis petrosis, umbratis, humi-
dis, secus fontes & aquarum stillicidia exire, re-
statutur Dodonæus: Italix verò & Gallix notius
esse, quàm Germaniæ & Belgio: Virere quavis
anni parte: nunquam tamen vel florem, vel se-
men facere. Adiantum verum Dioscoridis nul-
libi quàm Narbonenſi tractui frequentius: fa-
xis, & riguis umbratisque petrosis, Végano, ste-
rilibus, Seuenæ finitimis, ac rupium, fontium, &
puteorum labris vel asperginibus Monspelij,
Nemausque: raro alibi in Gallia, Germania,
Belgio, & Anglia, aut nusquam provenit, quin in
Italix quidem locis multis, multum videre me-
mini Lobelium. Quare ex supra dictis locis Lug-
dunum, Lutetiam, Antuerpiam & in alia cele-
briora emporta asportatus, caroque à Sepiasianis
emittit.

Quantum thoracis affectus, hepatis, renu-
que juvet, Dioscorides docet his verbis. Deco-
ctum herbæ porum prodest spirandi difficultati,
suspensioſis, lieni, & felle suffuso, & vrinæ diffi-
cili calculos frangit: alium sinit: serpentium mor-
sibus auxilium est: contra stomachi fluxiones in
vino bibitur. Secundas ciet & menstrua: sangui-
nis rejectiones inhibet. Contra serpentium mor-
sus cruda herba illinitur: alopecias densat, stru-
mas discutit: furfures & manantia capitis vlce-
ra ex luxu emendat: defluentes capillos con-
tinet cum ladano & myrtino, aut Susho, vel
Hyssopo [sic enim vulgata habent exemplaria,
nisi certi quod non dicitur, ut & Ruellius conuertit,
sed in vetere rectius legitur, *crucis* & *naï dicitur*,
quod est, susino aut ælypo.] vinoque. Decoctum
ejus cum liliis & vino infusum idem præstat.
Cothurnices & gallos pugnaciores facit, in ci-
bos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pec-
corum circa ouilia. Eadem ferè de Adiantum siue
scripsit Plinius, tradens inter alia, Folia in vrina
pueri impubis, trita quidem cum aphronitro, &
illita ventri mulierum, ne rugulos fiat, præstare
dici. Adiantum, inquit Galeus in caliditate lym-
metrum est. Verum desiccet, & extenuat, & di-
gerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis
conectit, & strumas & abscessus digerit, lapidè-
que frangit epotum, & viscosorum crasso, um-
que è pectore pulmonisque excreationibus non
mediocriter cõfert, & ventris profluuium sinit: nõ
tamè vllà manifestà caliditate affert, sicut nec fri-
giditate. Verò posuerit ipsu quispia secundu hanc
oppositionem & temperiem in ordine medio.

Mesues etiam Adiantum temperiem & vires in-
signes recenset, inter quas & vim purgatoriam
ei tribuit, ei assentiente Saguiro. Græci verò &
Plinius nullam: ac cum auctoritate ratio & ex-
perimentum falsum id esse comprobant.

Dioscorides etiam Adiantum vires & facultates
multas refert, non modò differentes, sed & repu-
gnantes: & inter alias, sanguinis rejectiones
ipsum cohibere ait: paulò verò antè, secundas ac
menſes cohere. Quæcunque verò sanguinis reje-
ctiones cohibent, ea etiam menſes supprimunt.
Addit idè in fine, Seri circa ouilia utilitatis pec-
corum gratia: quæ autem utilitas ex eo, non offen-
dit. Iam & seri Adiantum nequit, cum semine ca-
reat: nec etiam commodè transferri. Apparet
idcirco hoc loco multa aliudè translata, hoc loco
Dioscoridi

Locus &
Tempus.

Vires &
vires.

Adiant.
nigrum
Cordo.
Ad. ma-
gnum.
Trago.

Ad. ni-
grum ve-
rum, Ta-
bern.
Compil.
notatur.
Capil. ve-
neris vul-
gò, Casp.

Capillus
porcinus

Synon. co-
veta.

Nomina
lingua-
rum.

Dioscoridi addita. Et fortassis, ut suspicatur Dodonæus, ex Cytisi historia accersere.

Emblema de vupia & Adiantum ibi ramum lo. Scribit O. u. s. ut & hoc coronidis loco addamus, vppam ubi (enferit ex vuarum, quas appetit summo petere, esu nimio noxam se incurrisse, decerpit Adiantum herba, quam officinarum Capilli venetis nuncupant, mederi sibi, tamulūque ejus herba circumferētem obambulare. Quibus itaque remulencia valetudinem concussit, ij abstinētiā ramulo se sustinent: siquidem seipsum vincere, palmarium se habet. Junius Emb. 15.

ADIANTUM PVLCHERRIMUM.

Defcripio. Adiantum pulcherrimum, quod Thalium Lugdunensi simile facit, folia à tergo lanugine densa, puluerulentā ac penē rubente ex fulcēdine quadam, exornantur, quasi folia Ceterach seu Scolopendrij veri. Folia autem illa sunt in brachiatis coliculis ex nigro rubentibus ac flexibilibus, incisa, crenata, non ita latis aliquantulum particulis constantia, ut in Lugdunensi, sed tenuioribus, oblongioribusque & mucronatis. Ipse auctor hoc non reperit, sed in libro quodam chartæ agglutinatum in pharmacopolio Northusiano natus fuit, allatum ex Harcina à vetula quadam herbaria. Lectorum esto judicium, an sit Adiantum nigrum officinarum, id quod vulg. Q. Bauhinus. Vocat autem in pin. Adiantum siue Capillum venetis officinarum secundum, vel Adiantum folijs longioribus puluerulentis pediculo nigro.

RUTA MVRARIA FORTE AFFINIS.

Adiantum album crispum alpinum Schvenck.

Defcripio. Radice pluribus tenuibus capillamentis implexita Coliculi plures, graciles, juncei, leues, in summo brachiati nascuntur, foliis Adiantum albo (Ruta murali) similibus, magnis, virentibus, crassioribus, crispis, ac veluti punctis Ledi insignitis, absque flore & semine: aspectu jucunda plantula.

Rarissimum inuentum: non nisi altissimorum montium petrosis erit. In Raufchengrundi. Eiusdem cum Adiantum facultatis.

RUTA MVRARIA.

CAP. VII.



Tom. .III.

Radice tenuissimis fibris nigricantibus capillata, vel, ut ait Tragus, radice vni ca nigra & capillata, lubastringente, parietibus rimosis occupat, pedunculatos promes multos, Trago quadraginta aut quinquaginta coliculos, semipalmates, tenues, juxta radicem nigricantes, aut atroxbenies, reliqua parte

virentes, nonnihil in summo diuaticatos, ex quorum tum extremitatibus, tum lateribus folia oriuntur, Ruta, vel Adiantum veri, sed multo minor, striata, rigidula, per ambitum crenata, superna parte virentia, inferius puluisculo ruffo aut fusco aspersa, gustu nonnihil acerbo & subadstringente, cum tuncillo dulcedinis leuiusculæ vestigio. Trago folijs est copiosis & quincunciali ordine inuicem conjunctis, incisuris suis instar teneri Coriandri diuisis, & quā testā spectat, aureis punctulis Julio mense notatis: gustu cum Hemionitide satis coarctis, nisi quod in his austerior paulo & asperior: deprehenditur. Cato, cum Tragus, tum alij non pauci ex Romanis Rutam muralem non florere, sed sterilem esse, ut Filices omnes, quod nobis persuadere non possumus: quinimo, florem & semen, habere, ac semine tenuissimo propagari censemus: nec enim has plantas in muris sine semine oriri credibile est. Nihil siquidem in calce, arena & lapidibus inuenitur, quod ad generandas ejusmodi plantas aptum sit.

Fuchs, Rœff. & Hier. Baunsch. diuersarum plantarum nomina confundunt, vocando, e Maurrauten, græcè Adiantum, lat. Capillum venetis, Coriandrum putei, Capillum porcinum, & Portulicium.

Rœff. & Baunsch. notantur.

Sylu. de compos. med. lib. 1. Saluam vitam vulgò dictam facit Adiantum quartum quartumque curandis efficacem esse scribit. Rutam murariam, vulgus Herbariorum Capillum venetis & Cinnamule herbam nominat, inquit Tragus, estque ea Adiantum album a cuius meminere veteres, aut certe illius genus. Vide plura c. de Adiantum veterum. Fuchs. Saxifragam inscribit, vocatque græcè saxifragum, & capillagium, quod calculus è corpore peilat frangaturque. Empteron verò, quoniam in saxis proveniat.

Adiantum quartum quartum Sylu.

Matthiol. de pingit nomine Paronychia etiam in com. cum mag. fig. lat. & ital. dicens: Non desunt qui sententiæ meæ de Paronychia repugnent, atqui eorum calumnias ridere soleo: porius iidem [Dodonæus] accusandi sunt, qui hanc plantam alterum Theophrasti Adiantum faciunt, nequē quod album ipse appellauit: siquidem is nullam inter nigrum & album interponit differentiam, nisi coloris in caule. Ecce quancquam non desunt [Lacuna & Castor] qui hanc plantam vñ mecum Paronychia faciunt, quoniam tamen sunt qui reclamant, ne dissensio vterius protrahatur, non Dioscoridis, sed meam Paronychia esse volo. Fuchsius pro Saxifragia Dioscoridis deprexit: verum quid hæc conflat folio Ruta, illa verò Euphymii, capillo umque modo tenui, cur plene ejus sententiam comprobem, non habeo. Hæc autem Matthiolus. Is autem juxta Guiland. opinionem, in hujus plantæ ignorantia, duplici de causa verberibus credi dignus est, cum quod parietum Rutam, Adiantum candidum esse, tum quod Adiantum candidum s. l. pro Paronychia exhibet. Mirum ipsum erroris istius non potuisse admonere, Pepli, quam proponit, figuram. Etenim si quis Peplum & parietum Rutam juxta se collocet, eandem inter eas sit: penitusque nomen deprehendet, quæ sitet Adiantum nigrum & Portulacum cernitur.

Vulgò Rutam murariam, aut Rutam muralem Nomina appellant: Germani, e Maurrauten, steinrauten, libuat, & Eyselzarn Belga flectunt: e. Gull. Rue ou Muraille & Saune vic. Wall Rue: Hong Kuo feli Ruta. Ruta quidem dicitur, ob quandam foliorum cum

Rura similitudinem : sunt qui Viræ-salviam nuncupant : officinæ Belgij Capillum veneris nominant, ac pro legitimo multo vix sunt tempore.

Synonyma.

C. Bauh. pin. Ruta muraria : Capillus veneris Teigi : Saxifraga major & Brunfels. Ruta muraria Gesn. hort. & Germ. Adiantum candidum Cordi in Dioscor. & hist. Guil & Thali : Adiantum album Lonic. Camer. Hort. Luf. & Tabern. Adiantum nigrum Gesn. hort. & Cæsalp. Salvia vitæ Lob. in Adu. Obs. p. 472. & Ic. 811. & H. Lugd. p. 1113.

Lonic. 14. SAINT.

Lonicerus duas habet figuras vnius Rutæ murariæ ex quibus duas facit plantas. Neutra autem est Capillus veneris. Quin & veri Adianti nomina suo more cum *Maurantien*, confundit.

Nasci testatur Dodonæus in parietibus ac muris vetustis [arborum truncis malè Matthioli] juxta aquas, puteos, fontes, locis videlicet humectis, ac quæ sæpius rigantur, rarò quæ à Sole illustrantur. Adèò vivax est, vt si quando hyberno frigore cæterarum capillarium villa deficiat, aut vicia sit, illa ipsidem inter cæteras locis faxeis lubens copiosè proveniat, non priùs emarcescens quàm noua inceperint emergere foliola, quæ quotannis Aprilis mense appetente inter vetera prodire conspiciuntur, quæ Iulio punctulis aureis donantur. Plantationem autem non admittit, sed sponte sua naturâ cooperante è saxis nascitur, culturam refugiens.

Adiantum & Trichomanes vicem supplens.

Rutâ murariâ, vbi Adiantum verum, vt & Trichomanes defunt, aut vetusta sunt, vtendum suadet C. Bauhinus. Malè Tragus frigidam & siccam, statuit, si enim frigida & sicca esset, non præstaret quæ de ea jactat, tamen si nonnulli callidam & siccam statuunt. Eam ad Tussim cæteris capillaribus præfert Lobelius. Dodonæus verò Adianto temperamento ac facultatibus haud multò abssimilem censet : idèò quæ prodesse dixit rufiscentibus, difficiliter respicantibus, latere dolentibus : crudorum pulmōni inhzarentium concoctionem decoctam promouere : valere ad renum & vesicæ dolores : vrinam elementer cietæ : calculosque expellere & arenulas. Peculiariter autem præstare hanc compertum esse refert Matthioli, ad puerorum enterocolas. Testatur enim nonnullos esse sanatos, haustos tantum huiusce plantæ puluere continuis quadraginta diebus, quibus manifestè collapsa intestina in sanorum cernebantur.

TRICHOMANES VETERIBVS.

CAP. VIII.

Dioscor. pto.

Trichomanes Dioscorides nonnullò Adiantum appellare nouit, locisque ipsidem [cum Adianto] nasci, Filici simile, ac longè exilius : foliis tenuibus, ordine vtrique dispositis, Lenticulæ similibus, aduersis inter se, in virgulis ipsidem tenuibus, splendentibus, nigricantibus, iisque acerbis. Idem memorat eadem quæ & Adiantum præstare posse credi. In nothis vocatur ab aliquibus Pterion, quasi Filicula, ab alijs Eupreton : à Romanis Capillaris & Pinula atque Filicula.

Centra Plinij & Jussieu. vici.

Iam licet Plinius à nonnullis acriter accusetur, quòd lib. 21. cap. 21. perperam Trichomanes inter Adianti genera retulerit : ij tamen non minus accusandi sunt, quòd Plinium Trichomanes

ab Adianto distinxisse, non perceperint. Trichomanes Adiantos similis est (ipsidem locis nascitur quibus Adianton, sed valdè paruum, Dioscor.) exilius modò, nigricansque, folijs Lenticulæ, densis, amaris, aduersis inter se. Decoctum ejus strangurias sanat in vîno albo potum, additum Cuminò rustico. Succus cohibet capillos defluentes, aut si effluxerint, separat. Alopeciâ quæ densat tritum & in oleo illitum. Sternutamenta quoque gustatu mouet. Ea ita de Trichomane Plinius lib. 27. cap. 13.

Theophrastus lib. 7. cap. 13. refert ex quorundam opinione Trichomanes (Fidiculam Gaza reddit) vel ad destillationes vrinæ vnicè facere : caulem verò Adianto (Capillo veneris, Gaza) nigro similem gerere : folia admodum parua, densa, contrarijs inter se pediculis pendentia [aduersa, inter se condita, Gaza] radicem, illi nullam (minimam, Gaza) esse : loca amare vmbrosa.

Cæterum ipsa Trichomanis appellatio, ab insana quâdam in materiam & folia luxuriâ, in quæ se largissimè, ac velut furiosè effundit, ducta videtur Cornario. Vel, vt vult C. Bauhinus, dicitur Trichomanes à vi sua, quòd rara cute fluentem capillum expleat, & subnasci faciat : *πυρρόν* enim Græci rarum vocant, & *τρίχον* capillum : hinc Latinis Capillaris dicitur : Officinis Polytichum, quod nomen, secundum veteres, Adianti est.

TRICHOMANES, SIVE POLYTICHUM.



Trichomanes capillaris, nigricansque radice, & conferta nititur : foliola habet ad costam pedalem, nonnunquam breviora, vt digitalem Trago, tenuem, teretem, rigidiusculam, fragilem, nervulo albo fasciatam, atro-rubentem, splendentemque adnexa, plurima, impari folio extremam alam claudente, parua, semiancia-

lia, in ambitu nunc crenata, nunc nullis crenis conspicua, interdum crispata, supernè virentia, infernè ruffo puluisco aspersa : Lob. Atragali, Tribulivæ terrestris æmula : Trago, rotunda, Lenticulæ palustris consimilia, vt rudimentum pennæ satis expriment : sapore mixto adstringente, subdulci, subamaro : Trago, gustu cum Hemio nitide [quæ nobis Phyllitis] satis conuenit, nisi quod in hoc austerior paulò & asperior reperitur.

Tagault. purg. lib. 2. cap. 19. contendit Polytichon hoc officinarum, Trichomanes esse Dioscoridis, i. e. [vt ipse explicat] Adiantum nigrum, in vetustis

in vetustis parietibus & inter saxa frequentissimum. Sed Theophrasto clarissime apparet Adiantum nigrum à Trichomane esse diuerfum.

A Compilatore Tabernamontani non distinguitur à cæteris Adianthis Adiantum mas, *fravven oder Venus haarmantel*, usque adeò stirpium ignatus est: Icon tantum proponitur.

Trichomanes i. siue Polytichum officinarum, inquit in pin. C. Bauhinus, magnitudine variat: & hinc duæ figuræ apud Tab. Trichominis maris, & Trichomanis maris majoris, Trich. maris Gerardi.

Trichomanes Trago, Math. Fusch. Arg. Dod. (cui & Callitrichum Apulei) Cordo hist. Getn. hort. Torn. Lac. Lob. in Adu. Casti. H. Lugd. part. 1. & Camer. Trichomanes Dioscoridis Lob. Obs. p. 47. & Icon. p. 89. Trichomanes nigrum, communiter Saxifraga rubra, Thaho, Adiantum rubrum, Lonic. nigrum, Bander. Philib. sect. 1. Polytichum vulg. Trichomanes Diosc. & Theophrasti, Cæs. Saxifraga minor vel rubra Braunfellio.

Ex antiquis emergit muris, sed plerumque in umbratis & humidis locis, interdum etiam arenosis & sabulosis saxis, aliquando etiam specubus, ut plurimum autem tenebrosis & humidioribus à Trago reperia dicitur. Cordus nasci referre copiose in umbratis solcidique petris, quavis neque caulem, neque florem, neque semen producere contendat, sed pulvisculo folijs à tergo inherente se propagare dicat, instar aliarum Filices specierum: mox addit ejus esse in Hircynia continentem: Lobelius assignat ubique Belgicæ & Angliæ parietinis glorioseque opacis vijs vberissimum. Subdit Dodonæus etiam juxta fontes & rivulos locis humidis nonnunquam exire. Diuturnum ac viax quodque esse: Hiemis injuria non effidi: sterile sit, uti Adiantum & reliquas omnes Filices, cujus speciem esse tradit.

Tragus Rotam murariam & Trichomanes cotitrarias fuculatas obtinere prodit, adstringendi, digerendi ac educendi: temperatū à frigidis & siccas. Binæ hæc herbæ simul, vel si gulæ vino aut hydromelite decoctæ, per aliquot ex ordine dies potæ, obstructions jecinoris solvunt, morbum tegium expellunt, pulmonis vitia expurgant, spirandi difficultati prostant, melancholiam per viam ducunt, tumores lienis duos emolliunt, calculos trahunt, nec non venenum haustum: mulie ù neque menses expellunt. Rursus prædicta decoctio, pulueres herbæ utriusque, necnon ex ipsis confecta eclegmata, syrapi, aqua dentique destillata, qua suis alui fluxiones, inflammationesque jecinoris refrigerant. In lixivio decoctæ, si ex illo caput ablucatur, distantes capillos continent, istibus serpentum medentur, aliorumque venenatorum, animalium moribus. Pastores quidam Trichomane, in medendis porcorum affectionibus utuntur, singulari experimento. Sed periti dijudicent, an herbæ adstringentes frigidæ & sicce possint ea præstare, quæ hic prædicantur de Trichomane & Ruta muraria.

Trichomanes minus album.


Quod album Trichomanes vocamus vulgari simile est, mollius ramen siue tenerius, & albidius: *foliola* nonnihil sinuata videntur: inferiō parte *pediculi* nonnihil nigricant: *radices* capillares.

Tom. III.

C. Bauh. pin. Trichomanes i. siue mirus & tenerius: Thal. Trichomanes candidum: Tabern. Synon. Trichomanes minor mas.

In Helvetiæ monte propè W. s. n. cepiosum in Loc. ropibus nascitur, nec non in monte Burgundicæ propè Meche.

TRICHOMAMES RAMOSVM.



Aperio Turnero accepimus Trichomanes ramosum anno 1571. in duos ramos, costata siue nervo diuisum: in cæteris an à vulgari differat, nos later.

Pingitur à Tabern. in hist. & Icon. sub titulo Trichomanis femine, videri videri videri, item, Trichomanis minoris femine, videri videri videri. Compilator non describit, nec ullam tradit differenciam à cæteris Trichomanis generibus. Nostrum an sit majus vel minus asserere non possumus. Casp. Bauh. in pin. vocat Trichomanes i. siue ramosum majus & minus: Trichomanes femineam, Gerardi.

FILIX SAXATILIS TRAGI.



Innumeris capillaribus nigricantibus cithis radicans, nec minorem numerum colorum profert, palmam altioris, capillaceæ quoque tenuitatis, qui circa summum in ætæve portunculas paulo lariores, & ferrugineo pulvisculo, Filicum aut Asplenitum, resperfas fiaduntur.

Filix tertia seu saxatilis Trago.

Filix petrea, Lonic. Filix saxatilis Tragi, H. Lugd. p. 127. Filix saxatilis i. siue cornuta, C. Bauh. pin. Holostium alterum, Lobel. in Adu. & Ic. part. 2. pag. 47. vbi & Filix saxea Tragi. Holostium petreum, Tabern. & Gerardo. Adiantum apocrysum, seu furcatum passim in scopulis arboribus Hircyniæ Saxono-thuringicæ, Thaho.

Tragus è saxis quibuidam prodire vidit in v. § 111.

celo, *Ernfz vœitler* propè Bipontium sito : deinde & in silua Biditensi non procul à *vvalghorn*. Iuueni ego mense Septembri in monte Rang, juxta Than, inter saxa.

Vires. Saxatilem Filicem ejusdem cum Capillo venetis temperamenti esse, & pro eo usurpari posse, author est Tragus.

PHYLLITIS VETERIBVS

CAP. IX.

Descriptio.

Dioscoridi fert *folia Phyllitis Rumici* [*ῥαδι-
δης*] similia, sed oblongiora, & magis virentia (quidam *ῥαδι-
δης* septuaginta) lena, septenave, recta [*ῥαδι-
δης*, vet. delet.] quæque parte anteriore laevia cernuntur, posteriore verò tenues quasi vermiculos annexos ostendunt. Nascitur in vmbrosis locis ac vicidarijs, gustu acerbo. Neque verò caule, neque semen, neque florem profert. Folia in vino pota se, pentium moribus aduersantur. Quatridupedibus iridem per os infusa auxilio sunt. Bibuntur & ad dysenteriam, & diarrhoeam.

Diase-nthe appellationes. Sunt qui Phyllin vocent, alij Acaulon, quasi caule carentem, alij Lapathum agron, hoc est Rumicem siluestrem.

Galehen. Phyllitidis Plinius mentionem non fecit. Galenus acerborum qualitatis esse ait, quare non absque ratione alui pro fluxia & dysenterias pota fuit.

Etymon. Græcis *φυλλίτις*, quasi foliosam dicas, cum nihil nisi foliosus cæpes appareat: Latini quoque græcum asseruauerunt nomen: officinis lingua ceruina dicitur, inquit Casp. Bauh. qui Phyllitide Theophrasti *ῥαδι-
δης* pro, quam Gaza Linguam ceruinam vocit, ut peratur.

PHYLLITIS SIVE LINGVA CERVINA vulgi.

Descriptio.



Caulis vi-
dua, ex capillari-
bus radicibus nigricantibus, numerosis, Trago: Cordo, mascula Filici [id est, vulgari] similibus, implicitis foliorum vestigijs consistentibus, si bratis, foris nigricantibus, intus autem in pallido viridibus, *folia* fudit oblonga lena, octona, vel dena, inquit Lobel. dodrantalia aut pedalia, duarum vnciarum plerumque latitudine, Cordo acuto Rumici similia Trago & Cæsalp. spleni, vel ligæ exerte instar, imâ parte salicæ Lunæ modo corniculata, læto virore splendentia superne, inferne verò obliquis puluerulentis areolis, seu lumbicis, ruficis: Cordo fluvis aut rubentibus, Trago subluteis, virgatis: sapore subacerbo: odore, Dod. graueolente, *caule*, *flore*, *semine*que destituitur. Cordo etiam neque caulem, neque florem, neque semen fert, è vermiculis tamen foliorum in puluerem resolu-

tis & sparsis nascitur: saporem habet tota herba adstringentem, cum tenuitate aliqua. Quid de præsentia planta sentiendum, tandem inuestigandum. Magna apud rei herbariæ scriptores, Marnardum præsertim & Leoniceum: Ruellium & Fuchium [qui Linguam ceruinam vulgò vocatam Hemionitidis esse contendunt] Item Matthiolum, Cordum, ac Turnerum: Dodonæum, Marantham, & Lobelium [qui Phyllitum pro Lingua ceruina admittunt] controuersia viget, quam nostris hisce scriptis breuitati studentes nequaquam inferere possumus.

C. Bauh. pin. Phyllitis i. siue Lingua ceruina officinarum: Lingua ceruina Eric. Cordo, Lonice. & Cæsalp. Phyllitis siue Lingua ceruina, Tab. emacul. Phyllitis vulgaris, Camer. & Clus. hist. Phyllitis Matth. Dod. Ang. Lat. Turn. Cordo, Gesn. hort. Lobel. Obsp. 468. & 469. Ic. p. 265. H. Lugd. p. 129. & Thallio: Hemionitis Leoni c. Marcardo. Ruell. & Fuchio: Scolopendrium, Brunfels. Scolopendria vulgaris, Trago. Est & latifolia, teste Camerario: sæpè etiam in fontibus exigua reperitur, C. Bauh.

Græcè *φυλλίτις* dicitur: Latini nomen seruant: officinæ Linguam ceruinam appellant. Germani *hirschen Zung* & *hirschen Zung* aut *hirschen Zung*: Belgæ *herfonge* & *steenherfonge*: Galli, *Langue de cerf*: Hisp. *Lengua ceruina*: Angli *hartes tongue*.

Cordus prodidit vitere tota Hieme, & ab ipsidem radicibus noua folia singulis annis proferre, prioribus numerosiora: prouenire vmbrosis & saxosis montibus: solum amare pingue, non tamen ex ipsa terra immediatè nasci, sed ex musco lapides & præsertim calcarios regente. Nullo ex semine, ut ait Tragus sed spore sua in vmbrosis & vliginosis montibus, vallibusque, nec non quibuldam fontibus & humectis muris nascitur, præsertim verò in montanis Heluetiæ, & silua *Vederouadi* vocata, è regione Mosellæ, & in ijs montibus qui ad Comitatum Valentie pertingunt. Hodie passim in hortis plantari continevit. Folia appetente Maio prodeunt. Viret quouis anni tempore, haud aliter quàm Polypodium. Teste Lobellio vniuersa occidua Anglia caret Phyllitide. Nulla prouincia est Clusio peragrata, præsertim quæ montosa sit, in qua Phyllitidem non obseruari vel vmbrosis locis nascentem, vel in ipsis puteis inter lapidum sine laterum commissuras. Cæsalpinus addit orti in vmbrosis lapidibus & juxta vetera sepulchra.

Idem celebrem facit ad lienem extenuandum decoctam in aceto, vel aqua destillata, in potu. Plura ex veteribus antè dicta sunt.

PHYLLITIDIS SPECIES SIVE HEMIONITIS Lobelio.

IN Anglia occidua, ad rupes antrosasque cautes D. Vincentij vno miliari ab urbe peramœna Bristoia vberimè luxuriantem hanc, facie Lingæ cernine, plâta inuenit Lob. sed ternis quaternisve folijs, minoribus multo: vix enim quàm maxima tres digitos longitudine excedit: minimè crassa aut rigida, sed mollicella, quasi Adianti veri, inter quod & alias plâtas capillares, alioquin lætas & benè adultas ita exilis nascitur: nec villis à tergo lituris asperata, ad mucronem lateribus vtrinque ad medium sinuatis & reductis: basi latiore lunata: segmento quasi vtrinque interius recuruo. Londinum in hortis plantandes cæspites misit author, sed parum diu superstitibus fuerunt:



Hemionitis Anglica mihi iconē & oratione exhibita, Mechliniæ à D. Bracione & Georgio Rye, studiosè in fidei libris diu propter raritatem & reneritatem enutrita, tandem admirabili sui metamorphosi & transmutatione, in Phyllitidem abiit. Quod facit, ut facile credam Phyllitidem & Hemionitidem easdem & congenetes esse, & cultu subire huiusmodi mutationes, nec magis differre, quam agreste Cichorium à sativo: neque facultates, quas utriusque tribuit Dioscorides, refragantur. Attamen longitudo foliorum huius Hemionitidis, quam Roma transmissam in fidei Mechliniæ alebat D. de Bracion, viz vicalis & sesquialialis erat, fortè transplantatione, injuriæ adeò obnoxia fuit, & velut semianimis, ac multum imbecilla. Pingitur in Ic. pag. 806. hoc titulo. Hemionitis siue sterilis.

Dodonæus quoque testatur Hemionitidem ex Britannicæ umbræ delatam tenellam quandoque in Belgium, posteaquam adoleuisset, Phyllitidem angustis & oblongis foliis, & mulari repertam esse: solòque angulos inferiores, paulò prominentiores, nonnihil discriminis ostendere. Idem se observasse testatur & Clusius.

PHYLLITIS POLYSCHIDES.



Tomus III,

Alterum elegans Phyllitidis genus: folia foliorum formā à vulgari Phyllitide differt, alioqui reliquis nōn ei per simillis: prodeunt verò ipsi ex radice multis fibris nigris & veluti capillamentis prædita, senu, aut septena filia palmaris longitudinis, ejusdem cum vulgari foliis lævioris & viriditatis interea parte: ac externā, nullis aut rarisimè trans-

versis lineis insignita; extrema verò parte multipliciter dissecta, inquit Clusius, qui Phyllitidem laciniato folio inscribit.

Dodonæi fert opinio Phyllitidem per ætatem quandoque folium in partes veluti lacinas quasdam fiodere, ita ut ex vno folio alia exite ac prægigni videantur. Et hanc Phyllitidis varietatem Phyllitidis laciniata titulo pingit. Lob. Obs. p. 469. dicitur Phyllitis multi fido folio, cui in Ic. p. 805. incuria Typographi falsus titulus appositus, nempe Phyllitidis, siue Lingua cervinæ officinarum. Tabern. Phyllitis folijs laciniatis.

G. Bauh. pin. Phyllitis 2. siue Lingua cervina multifido folio: Phyllitis laciniata. Clusij, H. Lugdun. pagina 129. Phyllitis multifida, Gerardo: Phyllitis, Cast mucronata, Camer. In Sommerfeti Anglicis cautibus frequentem oriri refert Lobelius, in Cantabris verò Clusius, sed raram.

Cæterā
Syaon.

PHYLLITIS CRISPA.



Phyllitidem Locum
crispā nullibi vidimus, quam
Basilæ in horto
Io. Heitzmāni, Descrip.
Pharmacopœi, amici nostri
veteris ann. 1688.
mensē Octo-
bris, angustiori
folio quam in
vulgari, in cir-
cuito toto val-
de crispā: sapore
eodē cū vulga-
ti. Quod dole-
mus, & neglexi-
mus tunc viri-
tē plāā accura-
tius delineare.

HEMIONITIS VETERIBVS.

C A P. X.

Hemionitis seu σπληνίτις Gæcis, Latins similiter Hemionitis, quasi mulariam dicas & Splenium vocatur, quòd eius folia sicut & Phyllitidis, & edicorum splenia, nimirum oblongas plagulas, formā imitentur: quid si potius ab eorum vlu, quòd spleni medeantur: siquidem ex aceto porta lientem absument, Dioscoride auctore, cui folium emittit simile Dracunculi, curuat in cornua Lunæ modo sinuatum: radices subiacent mulæ, & que tenues: sed neque caulem, neque semen, neque florem profert: in saxosis nascitur, adstringente sapore prædita: ex aceto, &c. Suspiciatur Dodonæus ex asplenij facultatibus hæc esse translata.

Hæmionitidis Theophrasto lib. 9. cap. 19. mularum Gæza verit, quàm folio Lingua cervinæ constare, & radice numerosā & tenui esse, asserit. Hemionium autem Theophrasto Asplenium esse, testatur Dodonæus.

Galenus lib. 9. cap. 11. de comp. med. sec. loc. vbi ea pharmaca ab Andromacho conscripta recēset, quæ epota splenetici opem ferunt, Hemionitidem ab aliquibus ex antiquis Asplenium, ab alijs

Hemionitidis
spleni

Disce.

Hemionitidis
quid Theophr.

Galenus

T r e e

Scolopendrium appellatam esse prodidit.

Si Matth. fides haud deroganda, inter Hemionium & Asplenium Plinio nulla intercedit differentia: qua de re consule caput de Aspleno. Creditur nos jam dudum cum Hermolao & Ruellio. Teuctrium & Hemionitum, vnam tantum Plinio plantam esse deprauatis ejus exemplaribus id insinuantibus l. 25. ca. 5. vbi pro Hermionion, legendum Hemion.

HEMIONITIS.

Descrip-
tio.



Hemionitidis folium elegans muneris nobis dedit Cl. D. Zvingerus amicis noster, Româ delatum, cujus longitudo quatuor vnciarum latitudo diametri ab vno ad alterum appendicem ferè æqualis, figurâ quodammodo ad sagittam accedente: ipsum quippe folium in pyramidem falkigiatum, circa ima virgâ, appendicem insignem habet, vt apparet ex icone.

Sinus circa pediculatâ quales ferè Aristolochiæ rotundæ, quem folij prætenso quædam in angustâ porrecta comitatur. Ipse *pediculus* an integer nescimus, videtur duarum vnciarum esse, costam insignem per folij mediam longitudinè emittens à qua ab imo statim ad ambitum quaquaversum, ipsæ etiam apophytes diriguuntur. Pæte aduersâ in ambitum, eminentiæ vermiculatæ eminent, quales in Phyllide cernuntur, sed magis sursum spectantes: facies opposita glabra.

nivâ-
Matth.

Non modò olim Matthiolus compertum habebat veram Hemionitum, quæ è Dioscoridis historia nihil prius diffidet. Romæ nasci in quibusdam rudibus, ædificiorumque ruinis propè magnam Amphitheatrum: sed ipse quoque eam accepit ab Anguillara, qui Hemionitis plantam, cujus picturam dedit ille, ad se Patavio misit.

Eam nonnullis rupibus, saxorum interueniis, provenire scribit Lobelius, loco autem sacre à Matth. notato minime: folia breviora multò, ad basim latiora & falcata habere, inquit, contexi, quorum aliqua palmum vix superabant, nonnulla verò sesquialbum longitudine æquabant.

Synon.

Clus. Hemionitum veram inscribit, quandam præterea tradens & describens quæ ipsi Hemionitis peregrina nuncupatur. Lobelio verò Hemionitis varietas. H. Lugd. pag. 127. Hemionitidem Matthioli Hemionitum i. siue vulgarem. C. Bauh. pin. Hemionitum, Anguill. Gefn. hort. Lac. & Lon. nic. vocant.

Hemionitidem qualem pingit Matthiolus vidimus apud Gesnerum. Folium Româ delatum bis communicavit D. Jac. Zvingerus, quod expressimus in tabella iconis Matthioli.

LICHEN VETERIBVS.

Lichen [λεχλῶ] qui petris ionascitur, & ab aliis quibus Bryon [βρυον] appellatur, Dioscoridæ ceu muscus est roscidis petris inhærens. Is impositus sanguinis eruptiones sistit, inflammationes lenit, ac impetigini medetur. Iuat & arquatos cum melle illitus: cæterum de fluxionibus oris ac lingux succurrit.

Descrip-
tio.

Sunt qui dicunt Lichen Plinio duplex esse: nos autem contrà ex ultimis ipsum eandem plantam bis describere, provi inuenit in diversis autoribus traditam: & quidem postremum ejus genus desumptum esse ex eodem autore, ex quo Dioscorides habuit.

Plinio an
duplex
Lichen.

Lichen qui in petris nascitur, esse quidem velut muscum quendam, sed plantarum generis rectè dici posse, vel ipse Galenus 7. simpl. testatur: ita verò nominatum suspicatur, quòd lichenos, id est impetigines curat.

Galeno
planta po-
tius quàm
Muscus.

Hermolao in Dioscor. coroll. 665. Plinium imitatur, eo tamen non citato, duas tradit Lichenas. Quæ autem prima sit, non ostendit: an porò per secundam, siue Ficatellam Apulorum intelligat Lichenem herbam, quæ Hepatica fontana cognominatur, dubitamus. Si tamen, quod suspicamur, eam intelligit, non bene separat à Lichene Dioscoridis, quem simpliciter muscum dicit.

Hermol.
taxatur.

In Lichenis remediis, inquit Cornarius, quem nos impetiginem dicimus, Plinius duos Lichenis herbæ genera prodit: sed Dioscorides posterius solum genus novit, de quo etiam Galenus verba fecit. Hic Lichen officinis notus est Hepaticæ nomine. Unde & Germani *Leberkraut* vocant.

LICHEN SIVE HEPATICA fontana.

Aspersionis saxi ad hæret, folijs ceu ligulis multiformibus,

Descrip-
tio.



nitis cinninnis, lanæ similibus (quos saxorum commissuris infigit) subitis demissis: verustate tandem *pediculos* erigit vnciales & sesquiciales, tenues, glabros, quorum unusquisque *florem* stellatum herbacei coloris [Lobelio dicuntur candidi] sustinet, qui exprimit paruum galcerum suis radiis deorsum nutantibus, qui satis commodè expressus in nostra figura Guariniata. Ex folijs (quæ

quæ saporis sunt aliquatenus aromatici & amaricantis ac nonnihil mordicantis Jeminent interdum parvi veluti *umbilici*, quales exprimentur apud Lobelium.

An Hermolao Lichen & Lechen, Apulis Iecoraria & Ficatella cognominata: de qua antè egimus.

Plateario dicitur Hepatica, quia præcipue hepati confert: herba in aquis, & præcipue in lapidosi locis nascens, minuta habens folia, terræ & lapidibus adherentia, quæ quidem quanto maiora habet, tanto melior est.

Brunfels. tom. 1. rhaps. 24. huius plantæ, iconem vocans eam græcè *λεγχω*, lat. Hepaticam, Hepatariam, & Iecorariam: germ. *Leberkraut*: Serapionis Hazozalfacher: Hieron. Herbarij Hepaticam primam.

Lichen Græcis nominata, hæc, quam Medici quidam, nescio, inquit Leonice, de morbo gall. quâ ducti ratione, vel vsu, Hepaticam vocarunt, neque enim apud celebrem authorem, vel Græcum, vel Arabem legitur Lichenem herbam, hepati vtilem esse.

Inscribitur à Trago, Iecoraria seu Hepatica fontana *Bynnenleberkraut*, *λεγχω*, seu *λεγχω*, seu *λεγχω*, dicente: si vires huius herbe spectes, fortassis Hepatica appellari poterit: Sin autem veterum scripta consideres, nihil aliud est, quam serpens herba, quæ à Dioscoride *λεγχω* appellatur. Matthiolo est Lichen Dioscoridis. Dodonæo Musci species est quam officinæ Hepaticam vocant. Ferdin. Imper. Epatica, Muscus aut Lichen.

Ceterum, quam Græci *λεγχω* appellarunt, quod lichenas serpentes nomen, inposita sistat & sanet, Latinis item Lichen dicitur: Arab. Azez alsachez: Ital. Lichene: Offic. Hepatica German. *steinleberkraut*, & *Bruni berkraut*: Hisp. Hepatica, & Figadella: Gall. *Hepatique*, & *Porcoran*.

Lob. in Ic p. 246. tomo 2. itemque Obs. p. 645. sub hoc titulo, Lichen, Hepatica, tres icones ponit, sed non demonstrat in quibus differant.

Compiler quoque Tabern. in ic. & hist. easdem tres icones habet, quas Lobelius, nec tamen ipse indicat differentiam. Sed & Compiler H. Lugd. eandem proponit p. 1084. nec tamen eas distinguit.

C. Bauh. pin. Muscus saxatilis 1. siue Lichen petraeus latifolius, vel Hepatica fontana: Hepatica, Brunf. Lonie. prima, Tabern. Lichen, Matthiol. Fusch. Anguill. Dod. vt Cordo in Diosc. Lac Turn. Cast. Lugd. Cæs. & Thallio: Lichen 1. Lob. petraea, Gerardo. *Irem*, Muscus saxatilis 2. siue Lichen petraeus stellatus: Lichen 2. Lob. & Lugd. Hepatica 2. Tab. & Gerardi. *Ac demum*. Muscus saxatilis 3. siue Lichen petraeus umbellatus: Lichen tertius, Lob. & Lugd. Hepatica tertia, Tabern. *Casp. Bauh.* apud Matthiolum Lichenis nam tantum speciem commemorat.

Lichenem, Solis æstui inimicum, vmbrosis simulque humidis locis gaudere, ideoque in fontibus profundioribus ac frigidioribus, nec non rorulentis petris duntaxat nasci perhibet Tragus. Dodonæus tamen non solum vmbrosis, humidis, lapidibusque stratis viis, sed & alijs semitis, quò Solis radij rarius perueniunt, & quas nullus viator frequentat, crebro reperiri ait: Maio ac Iunio mense capitula stellata proferre, & simul alia sæpenumero foliola prioribus addere. Lobelius verò scribit mense Iunio & Iulio proferre.

Tom. III.

Vim habet, auctore Galeno, extergendi, simulque moderatè refrigerandi, & iuxta ambas siccandi: & sanè extergendi vim habet de petra, refrigerandi verò ab aquositate. Nam in humidis & roscidis petris nascitur. Quod verò eiusmodi substantiis componitur, inflammacionem arcere nihil mirum est. An verò sanguinis eruptiones sistat, velur Dioscorides ait, non habet quod pronuntiet Galenus. Ego non ausim dicere abstersionem Lichenis esse à petris. Qualem enim succum abstergentem fugere potest Lichen ex petris ita siccis? abstergere tamè non nego considerato sapore. Nec simpliciter frigidam ausim facere, sed malim calidam primo gradu & humidam dicere. Iterum illi curare, vt voluit Dioscorides & Plinius, cedere vix possumus: fluxionibus tamen posse vtilem esse facile concefferimus, quamvis Cornarius eam lectionem non probet. Hepatica fontana, inquit Tragus, frigida & humida est: potest vtrique adhiberi commode: vino decocta, aut præter decoctionem è vino pota vitis pulmonis iocinorilque medetur, inflammaciones sedat, fluxiones capitis cohibet. Ad multas præterea calidas affectiones efficacior est, quam vulgò existimetur, etiam extrinsecus inposita. Tragea ex ea siccata coriacea, saccharo, aut pie aromatibus & speciebus admixtis, iisdem succis vitis. Lonicus de viribus eadem tradit. Dodonæo frigida & sicca ac aliquantulum adstringens temperamento est. Aduersus ioci notis inflammaciones, calores, febres acutas & tertianas ex bile ortas efficax habetur. Secundum Platearium valet contra oppilationem hepatis & splenis ex calida materia. Quare omnibus syrups contra dictam opilationem, & hepatis calefactionem indi debet: soluit enim istericiam. Contra calida apostemata superponitur trita in principio: operatur enim repercussionem materiæ influentis.

LICHEN ARBOREVS SIVE PVL-monaria arborea.

Pulmonaria Licheni siue Hepaticæ fontanæ similis squamato *filicium* incubitu, ineffabili lacinarum variatione, quæ quâ matris suæ hærent, albicant, altera verò parte virent, rugosa, lacunis, eminentiisque inæqualia, sapore amaricante, non sine adstrictione.

Hanc sic tradit Tragus: Herba, quæ vulgò Pulmonaria dicitur in muscosis Quercubus & Fagis prouenit, nonnunquam etiam in muscosis petris, & vmbrosis syluis, Iecorariæ seu Hepaticæ fontanæ confimilis, sed maior per omnia. *Folia* habet rugosa, inuicem incumbencia, viridia, lentiora & sicciora prædictæ, eâ quâ arboribus adhærescit parte albida, lanuginosa, similiterque aspera & lenta, instar corij. Et hæc Germanis *Lungenkraut* nuncupatur, potestque Lichen siluestris & arboreus, *quod dicitur Lungenkraut* vocitari. Tragus in hist. germ. turpiter hallucinatus credidit Plinium hanc ad impetigines commendasse.

Vt veteribus Græcis & Latinis nominata fuerit hæc herba, Fuchsis scire non licuit. Sufpicatus autem fuit Pulmonariæ nomine donatam esse, propter folia veluti pñtis aut punctulis quibusdam notata, arque hoc signo aliquam pulmonis humani formam referentia. Pulmonariam præterea dictam esse conicit, quod pulmonum vitis, exulcerationibus potissimum eorundem, præfens remedium sit.

Tabern. icon. & hist. Pulmonaria, *großbaum*.

Titt 2

Descrip-
tio.

Descrip-
tio.
Tragi.

Vet. igno-
ra.

flechten, lungenkraut: Eid. ic. & hist. Lichen arboreum, *stein baumsflechten*. Imperat. Pulmonaria & Muscus arboreus.

Syn. C.B.

C. Bauh. pin. Muscus arboreus 7. siue pulmonarius: Pulmonaria, Trago. Matth. Fuchf. Dodon. vt Gesn. hort. Lac. Lon. & Tabern. Pulmonaria i. Cast. tertia, Clusf. pann. Pulmonaria fungosa, H. Lugd. vulgaris, Thal. Pulmonaria Lichenis quoddam genus, Cæsalp. Hepatica terreftris, Ger. icon. Muscus pulmonarius, siue Pulmonaria officinarum, Lob. Obs. p. 647. Ic. tom. 2. p. 248.

Varietas.

Variat laciniis latioribus & angustioribus: & hæc Lichen arboreum, Tab. & Ger. dicitur, arboribusque, præsertim Quercui, Sorbo aucupariæ, & aliis adnascitur: petris quoque, sed hoc candidius est.

An Musc.

cus i. Ch. 2.

Dod gall.

Dod. gall. quoque fortassis exprimit iconem Lichenis arborei Tabern. sub Musci sc. titulo, de quo scribit, Primum Musci genus crescit supra arbores, quod propriè dicitur Muscus, qui constat pluribus foliolis albis, laciniatis, & profundè sectis, inter se complicatis, sine radice, flore, & semine. Secundum Musci genus crescit circa arbores, dicitur *Herbe aux poumons*, i. e. Pulmonaria, Hepaticæ aliquo modo similis. Germ. *lungenkraut*: Belg. *lungensuyt*: Angl. *lungwort*: Boh. *Plenník*.

Nomina
lingua-
rum.

Locus.

Annosis rimosisque caudicum Quercus, Fagi, aliarumque corticibus non modò, sed etiam lapidibus, & duris, paucisque germinibus, instar crustæ aut lorice inducuntur coriacea folia: nusquam tamen cauliculorum, aut florum vestigiis conspicuis extantibus, distante Lobelio. In veterum Quercuum, Fagorum, aliarumque siluestrium arborum caudicibus, in opacis ac densis siluis gigni: æperiri & in petris quantioque, vel etiam umbrosis aliis locis, testis est quoque Dodonæus. Tota Æstate inuenitur, inquit, Fuchsius.

Vires &
vires.

Pulmonariæ herbæ vulgò ad pulmonis affectiones, asthma, suspicia & tussim curantur, confecto ex ea puluere, aut aqua distillata. Puluerem ex ea sic fieri docet Tragus. Accipitur Pulmonaria herba sicca, Anisi semen, pulmo vulpis in acrescicatus, semen Foeniculi, Glycyrrhiza, radix Enulæ, Zingiber æqualis ponderis, eaque singula seorsim accuratè contunduntur, posteaque cribro purgantur, vt tenuissimus fiat pulvis. Demum accipitur optimum saccharum tanti ponderis, quanti reliqua omnia extiterint, & misceantur omnia simul. Vfus huius pulueris in modum Tragæ manè & vesperi. Hoc & asthma soluitur, & obstructione liberantur pulmo & iecur: aspera denique tussis eo iuuatur. Magistri pecorum & veterinarij herbam, seu puluerem sale mixtum, pecori aduersus spirandi difficultatem, & tussim, singulari experimento exhibent. Recentiores quidam frigidam & humidam esse, Fuchsi quidem sententiâ, falsò statuunt: admodum enim adstringit, vt hoc nomine idem cum Quercu, in qua nascitur, habeat temperamentum. Desiccatur itaque & paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt. Quia verò desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, idèò vulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoque ac crescentes phlegmonas utilis: vt & ad vtrumque muliebre profluuium, vlcera & disenteriam.

POLYTRICHVM APVLEI MAIVS quibusdam.

C. A. P. XII.



Polytrichū Defc. pri-
mi Poly-
trichi.

Apulei quorundam constat radicibus tenuibus, longis: cauliculi duas vncias circiter longi abundant foliolis lungiusculis, postea nudis sunt & ad totidem vncias leues, quorum summitati innascitur capitulum sublongum, hians & nutabundum.

Huius aliud genus est radicibus multò lon-

gioribus, cauliculis etiam multò maioribus, tum parte foliosis, tum nudâ, quæ palmaris: capitula quoque maiora, huius, è quibus concussu leui pulvisculus excidit luteus.

Ad Polytrichum nobile siue primum Tragi, quod secundo loco describimus, & C. Bauhinus in pinace Polytrichum aureum 2. siue medium vocat, refert idem Polytrichum Apulei aureum, vel 1. Lonic. Muscum capillarem Dodonæi, minorem Gerardi, Adiantum *εφαλλος* medium Thalii, Adiantum aureum minus Tabernæmontani, & Herbulam Gramini similem in parietibus maiorem & minorem Cæsalpini.

Germani *vuidertodt* & *Gulden vuidertodt*, ac *lungfrowe*, *senhaar* appellant: Belgæ *guldene vuidertoot*.

Montbelgardi in sylua prope Souchaut inueniuntur abundanter quoque in silua inter Montbelgardum & Arboians capitulis puluere plenis mensis Iunij sine.

Polytrichum Apulei minus quorundam.

Quam plantulam, Apulei Polytrichum minus nonnulli appellant: contemnendæ exiguitatis est: ex muscoso capite tanquam stamina capillaria, recta & rigidiuscula se attollunt, semuncialia aut vncialia, tenuissima, colore purpureo aut aureo: quorum vniciue infidet apiculus falcatus, quem auicularum vnguiculis minimis haud ineptè comparaueris, quem conuestit confimili figura inducta vaginula: quæ vbi cedere incipit, extrema cauda surrecta, galleritæ caput miro naturæ exprimere arbitris: vbi deciderit, capitellum relinquit oblongum, atropurpureum. Linguae vinioli saporis aliquid imprimit.

Dodon. Musci capillaris altera species omnino minor ac humilior. Lobel. Obs. pag. 648. Muscus capillifve aureus minor: Addit in Hist. Belg. tom. 2. pag. 281. minus specioso nitore coloreque viuido, tristioreque aspectu. Tab. & H. Lufa. Adiantum aureum minus, *Kleiner guldener Vuidertodt*, Muscus 2. siue saxatilis aut siluestris Trago.

C. Bauh.

C. Bauh. pin. Polytrichum aureum tertium siue minus, Capillus veneris Brunfels. Polytrichum Apulei minus Fuchs. Polytrichum aureum minus Dod. gall. & H. Lugd. Polytrichum aureum tertium Lonic. Muscus quidam in parietibus & tegulis Cæsalp. Adiantum *ἀνδρόλιον* minus Thal.

Visitur in compluribus complutis ruderibus, asperginosque limbis parietinorum vetustiorum, Galliae, Germaniae, Belgiae & Angliae.

Polytrichum scoparium.

Prolixæ radices, cubitum plerumque longæ, rigidae, rubentes, angulosæ, tenues, in scopas excutendo pulueri vestibulique purgandis plesti solitæ, terræ superficiem versus foliosis squammis vel pilis nitentibus rutilisq; comosæ.

Lob. Obs. p. 645. Muscus scoparius (ita quoque Hist. Belg. p. 28. tom. 2. & Ic. p. 244 tom. 1.) inuscidorum & vdorum Belgij & Frisiae Orientalis sectator.

An Polytrichon majus Trago? Lonic. forte hoc etiam comprehendit sub titulo Polytrichi Apulei. C. Bauh. pin. Polytrichum aureum i siue majus. Easdem plantas exstimamus apud H. Lugdunensem p. 132. Muscum scoparium Lobelij, & pag. 137. Muscum scoparium Lobelij.

Compiler Tabern. titulo Musci eræti; hoc *wachsend. miefz.*, assumpsit iconem non bonam Lobelij & descriptionem separavit è Polytricho Apulei, quod non oportebat; nec placet radix.

Hodie ad philtra amatoria, veneficia, magicas artes, multaque alia superstitiosa potius, quam ad tuendam vel instaurandam corporis sanitatem in vsu esse Polytrichum Apuleianum vulgò dictum perhibuit olim Tragus. Si tamen quid de eo dicendum sit, videtur facultatibus Capilli Veneris præditum. Ego autem planè mihi persuadeo ex iis parari scopas vestium Belgicas.

ROS SOLIS.

CAPVT XIII.



Dvum generum, petita ex filiis differentia, observatur Ros Solis: alteri folia oblonga, alteri circinata rotunditatis: exeunt autem utriusque septena aut octona folia, pediculo longiusculo nixa, ex rubro purpurascencia, corollæ tenuissimorum flaminum, veluti cilio, rubescentiumque circumquaque limbiata, aspergine rorida guttularum per feruissimos etiam æstus madida, modicè concava, auriscalpium imitata: *caliculi* inter hæc exsurgunt graciles palmares & altiores, *strobili* gerentes candidulos: *radices* fibrosæ, tenues.

Tom. III.

Gesnerus Cordo in hist. Rorellæ figuram addidit, ejus sc. quæ retundior est folio, licet ibi Salsifiora oblongifolia describarur.

Tragus Roræ Solis pingit in tabella Politrichi Apuleiani tertio loco, cum cõfundens cum primo siue nobili, quod nos Polytrichum majus quorundam inscribimus. Idem ejusdem figuram exhibet cap. de Musco, primo loco. Videtur autem præsentem plantam non agnouisse. Lonic. præ Polytricho Apulei, cui flores paruos albès adscribit, Rorem Solis exprimit.

Lob. in Adu. & Obs. p. 472. itemque Icon. p. 81. (vbi speciem alteram majorem jungit) Rorida siue Solis rorem & Drosion recentiorum inscribit, sed aliam à Drosio Alchimilla statuit.

Tab. ic. & hist. pingit Rorellam minorem primam & secundam, magnitudine (vt ait Compil.) tantum differentes. Ceterum non recordatur compilator se Rorellam antea quoque tradidisse, dicendo Lonicerum & Tragum aliud Adianthi genus floribus albis, foliis verò rotundis describere. Nos nullam inuenimus apud Tragum mentionem factam Adianthi floribus albis: Lonicerus quidem mentitur, vt jam dictum, Polytrichi Apulei floribus albis.

C. Bauh. pin. Ros Solis i. siue folio rotundo: Polytrichum minus, quoad figuram, Tragi: Ros Solis, Dod. Lon. Cast. Camer. (cui & Solaria) major, Gerardi: Rosa Solis vulgò, Caio Britanno: Rorida siue Ros Solis major, Lob. Salsifiora seu Sponsa Solis, Thal. Rorella minor i. Tab. Rorella siue Ros Solis. Eyst. Mas & femina, inter Musci albicantis & subalbicantis & subrubentis genera crescunt. Eid. Ros Solis 2, siue folio oblongo: Rorella siue Salsifiora, Córd. hist. Ros Solis, Lunaria quibusdam & Artemilla Gesner. de Lun. Ros Solis alia, Dod. Lugd. minor Ger. Polytrichum Apulei album, Lonic. Rorida siue Solis ros, Lobel. Rorella minor 2. Tabern.

Porro, Ros Solis, Rorellæ & Salsifiora, quæ veluti stellæ alicujus jubare sub Sole fulget, à mirabili natura nomen adepta est: nam quantumvis ardentissimus Solis estus æstare eam illustret, ejus tamen folia semper rore & humiditate madent, eorumque lanugo guttulis aspersa manet: & quod admiratione dignum, humidum illud in foliorum acetabulis contentum, vbi extremis digitis leuiter attingitur, dum adhuc natali suo solo adhaerens, aut confestim inde euulsa Solis radios experitur, mox velut in exigua filamenta sericea candidiuscula deducitur, quæ confestim concreta, ita postea semper perdurant. Hanc ob magnam cum capillaribus affinitatem, hic subiungendam duxit Cæsp. Bauhinus.

Exit locis desertis, arenosis; apricis, sed riguis, & rarò alibi, quam in ipso humi nascente candido palustri musco. Æstate viget: Maio aut Junio florere colligendus Ros Solis cum cœli constitutio siccissima ac serenissima fuerit.

Mirifica hæc herbula (subdit Lobel.) & efficitate nequiquam posthabenda plerisque plantis apud antiquos decantatissimis, quibus forè non nota fuit: ac ne quidem hodie admodum Italiae, Norbonæ, Austriae plagæ Herbariis. Est quippe vernacula Borealiū. In Franciæ autem & Brabantiae sabulosis ac vdis scrobibus interdum obuia fuit: Angliæ, Cantiae, & Somerseti præfeturæ hæc adeò scærent, vt non procul illustri Cænobio & monte Glossembærio vocatis, quantum sat sit equo onerando suppetat.

Tragus
notatur.

Rorella i.
p. 2. Tab.
bern. no. 6
inr.

Synonyma
C. Bauh.

Locus &
Tempus

Vires &
vltus.

PHYLLON THELYGONON

Dalechampio.

CAP. XIV.

Descript.

Craſſus longis lignoſiſque præditiſt eſt *radicebus*, in tot ſere capita diuiſis, vt latè nata-
li ſoli faciem obumbrant: è ſingulis radicum ca-
pitibus *folia* exeunt conſertiſſima, circinatim in
orbem digeſta, vnciâ breuiora, per anguſta, vnico
neruo per longum donata, exſucca, minimè
denſa, aſpera, & pilis circumcirca hirta; ex cir-
culi vmbilico *caules* ſurgunt, glabri, ſoliis nudi,
duarum triũmve vnciarum, ſimplices, qui à me-
dio ſerè ſummo tenus *flores* gerunt maiuſculos,
luteos, foliaceo viridi calyculo circumdatos:
ſiliqua ſuccedunt Burſæ paſtoris, quam *Gianſ. blu-*
men vocat Tragus, paulò acutiores, ſemine far-
tæ, paruo, compreſſo, ruſſo, intermedia mem-
brana duobus loculis diſcluſo.

Syn. C. H.
Mor.

C. Bauh. pin. Sedum faxatile 1. ſiue alpinũ hir-
ſutum luteum: Sedum faxatile foliis margine
piſoſo, Gefn. hort. Phyllon thelygonon, Dalech.
in Dioſc. Phyllon arthenogonon Dalechampij,
H. Lugd. Sedum petraeum montanum, Log. Se-
dum alpinum ſextum, Cluſ. pan. p. 491. Sedum
minus 12. ſiue alpinum 6. Eid. hiſt. Leucoion lu-
teum aizoides montanum, Colum. part. 2. Sedo
autem affinem facere non poſſumus: nihil enim
huius folia cum illis commune habent, præter
ſitum: nec enim craſſa, nec ſucculenta ſunt, ſed
tenuia, anguſta, & in quibuſdam plantis vngue
multò breuiora, in aliis longiora.

Locus.

In ſummis Auriſtiacarum & Striſtiacarum Al-
piũ jugis, inter ſaxa prohenit, vti etiam in môtis
Iuræ, ſummitatib. Meminit quoq; Cluſius dum
olim è Narbonenſi Gallia per Heluetioſ in pa-
triam rediret in Allobrogum alpiſbus eruerè.

Phyllo Dalechampij aliquatenus ſimilis.

Descript.



Simili cū Phyl-
lo Dalecham-
pij eſt ortu, *ra-*
dicibus rubenti-
tibus, ſerpenti-
bus ex interval-
lis denſam radia-
torum *foliorum*
coronam ſimili-
ter proferentib.
ſitu eodem, ſed
foliis longioribus
mollibus, gla-
bris, è quorum
centro *caulis* v-
nus, aut duo,
dodrantes, te-
retes, glabri, ſu-
perius in duos
ramos ſextanta-
les diuiſi, quo-
rum diuicationi ſtellula circumpoſita foliolo-
rum vix quadrantem vnciæ longorum, vnici-
que ramulo in ſummo ſaſtidio *ſlor* inſidet vni-
cus, maior quàm Phylli Dalech. è caliculo ſtriato
quinquepartito, intra quem ſuccreſcit poſtea
vaſculum in quinque lacinias dehifcens, ſemen
continens.

Sedum Alpinum 5. ſiue minus 2. Cluſ. Pann.
C. Bauh. pin. Sedum faxatile 4. ſiue Sedum alpi-
num granineo folio, lacteo flore.

Locus.

Seipens inuenitur in Sneberg, vicinijs iugis.

Sub ſinem Iunij & Iulio iſtic floret, & etiam in
Monte Baſileenſi *Vvaſſerſal*.

TRIDACTYLITES TECTORVM

flore albo.

Tridactylites puſilla eſt plantula *radice* te-
nui: *cauliculus* duas vncias aut palmum altus,
hiſſutus, rubefcens, in ramulos ſubinde diuiſus:
ſilia Lob. Rotæ, biſidâ, interdum triſidâ à inciſu-
râ, eademque magnitudine quadantenus: nobis
priora oblonga, ſimplicia, alia verò ſine pediculo
cauli appoſita, pingua, ſiue ſucculenta, pallida,
hiſſuta, taçtu glutinoſa, in tria ſegmenta ceu di-
gitos diuiſa, vel quina, *flores* ex calyculo oblon-
go hiſſuto, albi, quinque foliolis conſtantes: in
medio *ſtaminula* lutea: in calyculo vmbilicato
quinquepartito *ſemen*, Lob. in folliculis Scor-
pioidis Myoforidis non diſſimilibus.

Hanc Tragus l. c. 111. nomine *hendelkya* de-
ſcribit: Lobel. Paronychiam alteram folio ruta-
ceo appellat. Tabern. ic. & hiſt. Alfinem pe-
traeam rubram, & Paronychiam tertiam. Thal.
Daçtyliobotanon alterum Trag.

C. Bauh. phyt. Alfine 4. ſiue Tridactylites albi-
cans: variat ratione loci, quæ enim in teſtis pro-
uenit, maior eſt & ramoſior, altera verò in are-
noſis & ſiccis proueniens minor multò. Flore a-
liquando eſt niueo, communiter pallidè purpu-
raſcente.

Eid. pin. Sedum foliis laciniatis 6. ſiue Sedum Syn. C. H.
tridactylites tectorum: Paronichia altera, Dod.
petraeo folio, Lob. Lugd. & Ger. cui & Parony-
chia laciniata: Vmbilici ſpecies quibuſdam,
Cæſ. Daçtyliobotanon alterum Thal. Alfine pe-
traea, rubra, & Paronichia, tertia, Tabern. *Hendelkraut*, Trago.

In parietinis, lociſq; vmbroſis & petroſis naſ-
citur. Exeunte Hieme, Vere primo ſcoſculos edit:
deinde minimo æſtu mareſcit, vt nuſquam toto
anno compareat. Montbelgardi in muris floret Locus & Tempus.
Aprilii: Monſp. in locis ſiccis & muris primo
Vere.

Tragi iudicio *hendelkraut* binæ plantæ vim Vires & Vitis.
habent refrigerantem & humidam, poſſuntque
citra noxiã vtrinq; aduerſus inflammatio-
nes vſurpari. Intrinſecus quidem cum cæteris
in acetariis, Portulacæ ad modum, cui facultatib.
parem ſtatuit: Extrinſecus verò vt Anagallides.

TRIDACTYLITES ALPINA.



Palmæis in- Descript.
terdum, &
major multò e-
tiam eſt planta,
folia pleraque
humî fundens,
interdum vni-
ciali longitudi-
ne, ac etiam
multò minora,
per extremum
tripartita: alia
verò nullam a-
gnoſcunt diui-
ſionem, vt quæ
in *cauliculis* ſūt,
in ramulos pau-
culos diuica-
tis: *flores* parui,
vaſcula magna:
radix vt Agerati
pur.

purpurei propagat. Inter nostras annotationes competimus, nos anno 1761. in monte Braulio reperisse minimas plantas, floribus odoris gratissimis: & Genevæ postea in proximis alpi- bus maiorem speciem invenisse.

Hanc etiam describit C. Bauhinus, titulo Alpinæ Tridactylitis Alpina: sic etiam Saxifragiam albam petræam Ponæ nuncupans: quamvis petræam, ut ex utriusque descriptione patet.

MVSCVS VETERIBVS, IN GENERE.

CAP. XVI.

Musci differentia multiplex. De arboreo hæc Dioscorides: Muscus, à nonnullis Splachnos appellatur. In arboribus, Cedro, Populo alba, aut Quercu reperitur. Præstat verò Cedrinus: proximus huic populneus: quo in genere probatur, qui odorator est & candidus: nigricans autem deterior censetur. Muscum adstringendi vim habet, in caliditate & frigiditate medius. Parisi hæc non habet. Facitque decoctus infusum ad vulgæ affectus. Misceatur & vnguentis [hic interponit vet. &c.] balanitis, ac oleis sine illitibus, propter eam, quæ prædictus est, inspissandi vim. Est & ad suffitium & acciporum medicamentorum preparationem utilis, & accommodatus.

De arboreo intelligendus est quoque Galenus simpl. 6. Bryon, vel secundum quosdam Splachnon, invenitur in Quercubus, & Piceis, & Populis albis. Vim habet adstringentem inualidam. Nec enim multum est frigidum, sed proximè ferè medijs, quæ videlicet & digerendi & emolliendi facultatis sunt, maxime quod in Cedrinis lignis reperitur. Et hic Muscus arboreus ab eodè Galeno lib. 1. cap. 1. sec. loc. etiam Bryon aromaticum appellatur. Ab Aërio verò etiam Hypnon, ac Sphagnos vocatur. Plinio etiam dicitur Sphagnos, præferret autem Cyrenaicus: secundum locum obtriente Cyprio: tertium Phœnicia.

Pretiosissimum odoris genus est (ait Hermol. in Diosc.) & quod Muscus vulgè nominatur ab Aërio, itemque Paulo, sed & à Phocione Grammatico recentiore, moschus odoratus capteæ, seu quod idem est, dorcadis peregrine sanies, ex vin bilico eius & vomica. Gazellam vocant animal id barbari, &c. Quis autem sit peregrinus mus, odoratè celebratus pelliculâ, non video, nisi quis animal id intelligat, ex quo zibetum excipitur. Bryon potè h. e. Muscus, verbum ex verbo dicitur & Ipon. Sunt ex hoc nomine panni arentes musculo villo, quales è glandiferis sola ferè Agilops fert: non in cortice modò, verum è ramis dependentes, cubitali magnitudine, sed præstantes odore Differentia hæc, quod Bryon aliarum arborum cani quidam sunt villi: Bryon verò Populi candidæ, vva.

Appellatur, ait Cornarius, Muscus hodie Latine, qui Græcis *μύσχος* dicitur & pharmacopolarum offi. ins in vitæ, vehementer odorata res, quæ animalis cuiusdam sanguinis, aut sanies potius esse à Serapione traditur. Hic autem Galeni tempore ignotus fuit. Etiam tamen ipsum non esse putandum est, qui cum alibi, rum 12. c. 46. in medicamento purgante ex Hermodactylis, Musci si- liquam vnam habet.

Bryon, cuius Strabo meminit, Solerius *ανδρυν* reddit, & interpretem malè Algam vertit, aut Idem Bryon Theophrasti & Plinii diversum à Bryo Dioscoridis suspicatur: & Bryon Theo-
Tomus III.

phrasti & Plinii esse Lichenem Dioscoridis, Hepaticam officinarum. Sed apparer eum non vidisse Bryon thalassion Theophrasti, quod Plinium cum Phycò confundere credit.

Cæterum, Muscum vocant Cæsalpin' omnem villolam substantiam, sordis potius similem, quam plantæ, aut caudicibus aëneis hærentem, præcipuè umbrosis, aut saxi madidis: aut in aquis palustribus, aut mari. Et hinc varia genera Bryi à Græcis vocati, diversis etiam nominibus donata esse perhibuit. Sed Dioscorides incanos villos qui ex ramis quarundam arborum pendens simpliciter Bryon vocat.

Cæterum Musci appellatione donantur sequentes plantæ scilicet. Lichen, Polytrichum Apulei minus. Spica celtica. Lenticula palustris. Polytr. scoparium. Lichen arboreum. Ros solis Corallina. Lactuca marina. Elichara. Musci propriè dicti.

MVSCVS ARBOREVS VILLOSVS.

Ex arboribus adultis, imprimis verò senio confectis, nisi frequenter tenuerint puratoris faciem, villi dependent incani, lignosi, tenuib. contexti filis, gusto adstringente. Trago est muscus quocunque tandem loco natus, potissimum verò incanus & albidus ille, qui vetustis & aridis arboribus & lignis adnascitur, nihil aliud quam villorum aut capillaceum quid, quâquam aliis in hoc genere magis tenuis, alius crassior, quidam brevior, hic prolixior cernatur, proæ arbor, vel lignum, cui inhaeret, humidius aut siccus fuerit. Vocat *σπύρον* & Splachnon Græcorum, Vinea officinarum, & Serapionis Axnech.

Dodonæo arborei musci villosa quædam sunt, ex multis tenuiter ac variè dissectis, subinde veluti folijs inter se implicitis, confusa, quæ arborum adhærescentia corticibus, à truncis ac ramis dependent, ut plurimum colore candescentia: tamen quandoque & nigra quædam sunt, sed minora & tenuiora. Græci *σπύρον* vocant: Latini Muscus dicitur & *σπυρόν*, *σπύρον*, & *σπύρον*. Oribasius *σπυρόν* appellat: Arabes & officina: Vinea Vinea: Germanis *Moos*, *Baummoos*: Belg. *Mosch*: Gall. *du Mosch*: Ital. *Musco*: Hiip. *Musco de los arboles* Aphris, *Axnech*, aut *Vinea*: Italicè, *Mosco*: Boh. & Polonis, *Mech*.

Cani arborum villi, quales in Quercu etiam videmus, videntur Lobelio è genere earum plantarum, quas parasitas festinè quis dixerit, propterea quia non nisi alienâ quadâ maxima ex parte videntur. Horum omnium varietates villorum exilitate, differentiâ, & figurâ discernit.

C Bauh pin Muscus arboreus 1. sine Vinea officinarum: Muscus arboreus, Trago. Match. Ang. Dod. H. Logd. Cast. & Thalia: Muscus, Dod. gall. & Cordo in Diosc. Arborum Lonic. & Tabern. Muscus quernus, Lob. Obs. pag. 643. Icon. part. 2. p. 242. Musci genus privatim Splachnon vocatum, apud Dioscoridem, apud Plinium Sphagnon, itemque alibi vva Populi albæ, Cæsalp.

Reperitur potissimum in Quercu, Robore, Populo alba & nigra, Ulmo, Betula, Py. o, Pyrastrò, Pomo, Pinu, Pinastro, Picea, Piceastro, Abiete, Cedro, Larice, ac alijs compluribus arboribus antiquis, absque radice, ac sine folijs, nunc tenuior, nunc crassior, prolixiorque, modò brevior, modò longior, ita ut ab e. Vt in pinu & nobilitatis & odorati sunt, Cedrinus, Lariceus, Piceus, Pineus,

Musci gē-
nera Plin.
16.Asquies-
caDactyl.
pico.

Dodon

Nom lin-
guarum.Synony-
ma
C. Bauhin

Locum

& Abienus: secundum locum tenet Populneus, sed candidus præstat, nigricans improbat: rutilans medium tenet vilissimus quernus.

Virus

Cæterum, Muscus refrigerandi ac adstringendi nonnullam vim ac potentiam obtinet, quæ tamen pro natura ac facultate eius, cui adnascitur, arboris, ac potissimum eius corticis, vel remittitur, vel intenditur: eius siquidem cui adhæret corticis, veluti parentis sui, aliquam sibi asciscit ac retinet facultatem. Idcirco in Quercu natus Muscus refrigerat, ac valde adstringit: præter propriam, asciscit etiam ipsius querni corticis vehementer adstringente facultate. Ex Cedro, Pino, Picea, Abiete, Larice, & resiniferis, minus adstringit, & præterea digerendi ac emolliendi facultatis particeps est. Serapio vinum in quo Muscus aliquot diebus maduerit, alium aut somnum inducere, ventriculum roborare, vomitiones compescere, & alium sistere. Plura de viribus lege capite præcedenti.

Muscus arboreus peltatus & scutellarius.

Descriptio.

SOlet & in arboribus crescere Musci genus, secretibus crassiusculis rigidis veluti *colicula*, ramosis, quos circhi tenues vestiunt, incano colore, in ramorum fastigio sedente peltato orbiculo, cuius oras radij flaminei circumcirca coronant.

Synonyma.

Cortusius cum Patavij essemus, vocabat Androsacen alteram. Tabern. dicitur, vii & Gerardo, Muscus ramosus floridus: H. Lugd. Muscus feniculaceus: C. Bauh. pin. Muscus arboreus 3. siue cum orbiculis: Muscus quernus fruticosus *τρυφάλλος*, Colūm. Giottolara Ferd. Imperato. Hunc muscum C. Bauhinus eundem facit cum sequenti. Potissimum in Quercu & Fago variat, umbellis maioribus & minoribus, planioribus & radijs, multò diametro longioribus ramosis ac hirsutis.

Muscus arboreus ramosus.

Ferd. Imperati *Foglio di ramato*, Muscus arboreus, in truncis arborum reperitur cum scutellaro iam descripto, cuius natura prope eadem, quod & odoramentis miscetur, effectu pari. Similis est Pergameno dissecto. Principium latius in ramos diuisum, ortus rami sui latitudinem æqualem segmentis impertit.

Muscus arboreus barbatus.

Arbuta seu barbatus Muscus Imperati arboreus, ramos producit similes chordis longis, cum capillamentis longis adherentibus, colore viridante.

Muscus villosus herbaceus.

Muscus villosus, ut idem Imperatus auctor est, ex filamentis herbaceis constat, è pediculo pollicari & simplici pratensis, absque ramis.

Muscus amarus Absinthii folio.

Muscus amarus Imperato in ramos abietrium vnciarum ab ortu quaquaversum expansos. Nam hoc ei proprium quod ab angusto principio dilatetur in ramos, diuisurâ ferè cornu cerui simili, Sapor eius amarus est. Imperatus

describit hos suos Muscos lib. 27. cap. 12.

Muscus coralloides.

Ambigit inter Muscos & Fungos, in carlo-
sis lignis & sita mucidis viginosis locis nasci solitus, duarum triumve vnciarum altitudinis, rectus, fundo natali veluti appressus, non descendens, ramis permixtis crebrique diuaticatis, Coralli plantulam imitantibus, substantia Fungi, pallida, aut ex cinereo flauescente, compressa. Hæc est illa Musci varietas, Coralli æmulatione ramosa, Lobelij in Obs. p. 643.

Muscus arboreus Pennachio.

Plumatius Muscus arboreus [Pennachio *Mosco arboreo*, inquit Ferd. Imper. lib. 27. cap. 12.] crescit in arboribus & muris impluviatis atque humidis, filis subtilibus similis, breui pilo, colore viridi, ad tactum mollis, serici instar: dum siccatur pediculos quosdam producit cum capitulis.

Fortè hic Muscus Imperati idem est cum Musco sequenti terrestri & hortensi. An C. Bauh. pin. Muscus terrestris repens 2. & 3. Muscus vulgaris pennatus maior & minor?

Muscus terrestris & hortensis.

Omnium vulgarissimus est hic mollicellus aspergine madentibus saxis, terræque humidiori appressus, repens, mollicellus, ramis longis tenuibus, foliolis acuminatis plumatim costæ hærentibus, colore viridi, aut ex viridi flauescens.

Trago Muscus 3. siue hortensis: Lobel. Obs. pag. 643. Muscus querno vilissimo vilior, saxis & vdis terræ glebis adnascens, quum à natali atque parente suo Muscus naturam imitetur. Eid. in Ic. part. 1. pag. 241. Muscus terrestris vulgaris: vt & Dod. in fol. lat. C. Bauh. pin. Muscus terrestris repens 1. siue vulgarissimus.

Empirici hoc Musco ad sistendum sanguinem vtuntur ab vris admoniti: hi enim quamprimum vulnerati sunt, eo sanguinem sistunt. Vsum Musci ij proinde etiam notunt, qui naues, aquatica ædificia fabricant. muscus qui hortos & prata humecta obsidet, ita vt gramen supprimat, Martio mense cinere aboletur, sed eo quo luxurium fuerit confectum.

Muscus ex cranio.

Quidam medici & Pharmacopœi reponunt cranium hominis aliquamdiu loco humido, vnde tandem oritur muscus, quem reponunt & ad vsum referunt. Dicitur particulare experimentum contra fluxum sanguinis, si pulvis eius inpergitur. Pingitur à Tabern. in ic. & hist. muscus ex cranio humano, *Mosk Von todten kopff*.

M V S C V S F I L I C I N V S.

Tabern. muscum suum Filicinum à Filice, cui similem facit, denominat, germ. *farn mosk*, in ic. & hist. vbi Compiler non monet an arboreum aut terrestrem intelligat. Videtur is nobis depingere terrestris varietatem, in tenues ramos diuisam, coloris viridis, cuiusmodi memini obseruare iuxta rupes, in

Locus

Locus

Descriptio.

Muscus 3
siue hortensis.
Trago
Muscus
terrestris
vulg. Lob
& Dod.
Vfus

Muscus
licinus,
Tabern.

Varietas
eriplex.*Musci abietis facie.*Descript.
Synon.

Prædictio non multum abfimilis, viticulis in ramos diuisis, folijs capillaceis, vtrinque (vt in Abiete) costæ oblongiusculæ adnatis, multò quàm in priore breuioribus & viridioribus. Auctori C. Bauhin. in prod. Muscus tertius: Eid. pin. Muscus terrestris repens 6. siue Abietis facie Muscus.

Musci in Ericetis proueniens.

A pud Lobelium frustra delineationem aliquam huius plantæ inquisiueris, præter eius picturam, quæ in Icon. Plant. tom. 2. p. 243. sub dicto Musci in Ericetis proueniens titulo exprimitur, & in Belg. hist. ni fallor, *heyde Mosch* inscribitur.

C. Bauh. pin. Muscus terrestris ramosus 11. siue Muscus parvus stellaris dicitur.

*Musci Stellaris roseus.*Descript.
Synon.
Locus

Ex fibellis nigris radicem constituentibus, pedicelli viciales prodeunt, quibus singulis folia plexa instar Rosæ compacta, pallide virentia, acuminata, in modum stelle disposita, insident. Muscum hunc octauum in prod. Muscum terrestris ramosum 12. siue Muscum stellarem roseum, auctor in saxosis Telamontij prouenire scribit.

Musci sericeus quidam, forte arboreus.

Descriptio.

Ex cortice alicuius forte arboris tenui, aspero, huic prodeunt villi breues, sericei, tactu lenes, rufi, nullius saporis. Vnde acceperim, non recordor.

Musci pulcher parvus repens.


Descriptio.

Sperit Chamæcissæ modo pulchellus hic Muscus, cui ad costam tenuem, fili instar, denticulata foliola, aduersa, valde tenera, lucida, coloris Musci terrestris Tragi. Cæterum, in varios diuaticatur ramulos, qui hinc inde tenues radículas emittunt.

Lobel. Icon. tom. 2. pag. 243. Muscus terrestris denticulatus, cui in Obs. pag. 644. Musci varietas Tom. III.

in siluis vmbrosis, non longè à Maszmunster & Roszberg.

In Musco filicino Tabern. & Gerardi, C. Bauhinus, qui in pin. Muscum terrestris repentem quartum facit, & Muscum filicinum maiorem cognominat, triplicem varietatem obseruari testatur.



aliam, denticellis & sarmentosis viticellis pinnatis compressis arguà natura solertia elaborata, reptatū serpētūque innumeris flexibus implicata. Dodonæus iconem proponit sine descriptione, Musci terrestris minoris intitutione.

Tabern. ic. *Compilator notant*
Muscus tertius: Eid. hist. Muscus 2. Vbi notandum Compilatore male iconem hanc

pro Beerlapp. & Musco terrestris Tragi hoc loco exhibuisse. Habet enim iconem illam pro Lycopodio.

C. Bauhin. pin. Muscus terrestris repens 7. siue Muscus denticulatus maior: Muscus denticulatus Lobelij, Hist. Lugd. Muscus minor denticulatus, Ger Muscus tertius, Tabern.

Musci terrestris Lusitanicus.

Tenerissima herbola est hic Muscus, dodrantalibus aut pedalibus interdum repens *visculis*, filo tenuioribus, numerosis, vtrinque adnatis ramulis in obliquum expansis, & subinde capillariibus quibusdam, quas producant, fibris, teræ inhaerentibus. Omnes autem viticulæ rectæ sunt si frequentissimis foliolis, siue squamulis potius tenuissimis & tenerimis, pulcherrima serie digestis, dilutiorèquè & quodammodo pallescente viriditate præditis tactu quidem mollibus, sed veluti siccis, adstringente gustu, cui tamen grata quædam dulcedo admixta sit, inquit Clusius, qui Muscum terrestris Lusitanicum inscribit.

Lob. in Icon. 2. pag. 244. dicitur Muscus terrestris denticulatus alter, vt in Obs. p. 644. vbi præterea Muscum terrestris repentem Lusitanicum Clusij vocauit.

Sola iconem proponit Dodonæus Muscum terrestris minorem alterum. Tabern. ic. Muscus 2. Eid. hist. Muscus 1. Inepit admodum Compilator Musci terrestris Lusitanici effigiem hoc loco ponit pro Beerlapp Tragi. Nam vera icon ab eo Lycopodio pingitur.

C. Bauhin. pin. Muscus terrestris repens 8. siue Muscus denticulatus minor: Musc. terr. repens, Clus. hisp. Muscus terrestris denticulatus alter Lobelij, Hist. Lugd. Muscus denticulatus, Ger. Muscus 2. Tab.


Nusquam hoc Musci genus Clusio conspectum, quàm in vmbrosis aggerib. Oliuetorum, ad Colibriam Lusitaniam vibem, & Academiam totius regni celeberrimam, vulgò Conimbræ dictam, trans flumen Mondego, Latinis Munda nuncupatam, non procul à deserto quodam sacello in colle sito.

* *

Vuuu

MUSCVS TERRESTRIS REPENS
à Trago pictus.

Deformis.



est Muscum terrestrum, *Beerlap*, caule & semine carere, nihilque aliud esse, quam sicum & serpentem quandam Muscum, multifariam, tenuissimum quasi filis dilatatum, quibus radicis vice vatur, petriique adhærescat, sequè serpendo vulgari siluestri & saxatili Musco admisceat, per omnia vermi admodum longos nam interdum novum cubitos longitudine æquare } & hirsuto similitum: Mense Junio julos non aliter atque Corymbum emittere digitum longos & lutos, qui farina aspersi videantur: atque hunc illius statem esse, qui & protinus sine fructu decidat: Addit Germanos variis nominibus hanc plantam donare, *Beerlappen*, *teuffelsklavven*, *Seilvoder Gartelkraut*, *Neunseyl*, *Neunseyls harschar*, & *Gartelkraut* illam appellantes, quosdam etiam *vveingrein*: Latine autem Muscum terrestrem non male dici arbitrat, quod formâ sua Cornutium imitetur, licet aliâ cum aliis nonnullis Herbariis Soldanam & Soldanellam appellare solebat, quam *Terapio Chalkile* & *Solabar* vocat.

Lobelius, in Icon. pag. 144. tom. 2. & Obs. pag. 645. inscribit Muscum clauatum, Pedem leoninum, quem Cordum perperam Chamæpucen vocare scribit. Non autem reperimus nos ubi Cordus Chamæpucen appellârit: scimus quidem apud Cordum hist. lib. 1. cap. 89. iconem Tragi positam esse titulo Chamæpucen, sed non Cordi, ubi ibi expressè annotatum.

Tragopodium sine Musco. Des. gall.

Dod. gall. depingit, sed minus feliciter quam Tragus, describit que nomen Musci quati, vocans Græcè *λυκώπιον*, id est, Pedem lupi: Brabant. *vveufelsklavven* & ex quorundam opinione *vveingrein*: *Pied de loup*. Lat. in fol. meliorem exhibet iconem Musci terrestris, siue Lycopodij inscriptione, de quo inter alia ait: Reperitur nonnullis locis major, aliis minor & tenerior. Officinæ pleræque perperam Spicam Celticam nominant: pejus ac cum maximo errore pro Spi-

ca Celtica in medicamentorum compositionibus substituant.

Anguill. ep. 13. vocat *Bermonstiam* & *Pulmonariam*, quâ communiter pro Spica Celtica uti solebant. Cæsalp. etiam ex Musci genere est, quæ pro Spica Celtica vendebatur.

Permonstria & Pulmonaria, Anguill.

Math. in hist. germ. vocat Muscum terrestrum, Boheemicè *Mech Zemsky* ac *Rutck* In comm. in Dioscor. narrat non deesse ignatos pharmacopolas, qui pro Nardo Celtica plantam quandam emant arborescendentem, &c. Quamvis Matthiolus vaquam vidisset natali solo provenientem, non dixisset arborescendere: quod in post. comm. omisit. Melius in hist. germ. & Epit. Camerarij scribitur viticulis sæpe ad septem octoque vltiarum longitudinem protendi, compluribus vtrinque adnatis ramulis: serpenteque humi.

Cordis in Dioscor. vehementer eos errare dicit, qui præsentem plantam, quam ipse *Kartenteilerlein* & *Munizengyun* appellat, montanam Nardum esse putant, cum Muscus potius sit.

Catal. Francof. pag. 21. Chamæpucen, Muscus serpentinus, Lycopodium, *Schlangen mossa*, *Wolfs klavven*.

Tabern. ic. & hist. dicitur Lycopodium. Compilator autem insignem hic ignorantiam suam demonstrat: ponit iconem plantæ exhibitæ à Trago pro Musco terrestris, cum tamen antè tradiderit Muscum, quem *Beerlap*, *Bartelkraut*, &c. germanicè vocat, Tragumque eius viam declarare, dixit. *Confidendum* præterea lectores cupiditate hominis: Pagina 485. ponit duas icones pro *Beerlap*, sub titulo Musci primi & secundi, quæ ex Lobelij iconibus desumptæ, qui eas non pro *Beerlap*, sed pro diversis Muscis ponit.

Synops. ma.

C. Bauh. pin. Muscus terrestris repens 10. siue Muscus terrestris clauatus: *vveinkraut* Brunfel. quo vinum pendulum restituit: Muscus terrestris Trago, Math. Lac. Dod. & Cast. Muscus vitifolius, vel Pes vitifolius, Gesn. frac. Lycopodium, Dodon. gall. & Tab. Chamæpucen, Cordo hist. ic. Gesn. & Turn. *Pemmonstria* siue *Pulmonaria*, qua pro Spica Celtica uti sunt, Ang. Muscus clauatus & Pes leoninus, Lob. & Ger. Muscus terrestris 2. & alius terrestris, H. Lugd. Musci genus quod pro Spica vendebatur. Cæsalp. Silaginis species altera, Thallio.

Locus

Matthiolo nascitur in silvis, sabulosis & inuijs locis, inter saxa: gignit Junio mense iulos. Tragus reperit in silvis ac desertis, cuiusmodi sunt Hercinia silva, &c. Lobelius mulcitorum & opacorum sobolem statuit nemorum & sterilium vltorum. Iunio mense spicæ vigens: reliquo tempore inanes & effusæ apparent. Moutbergico in comitatu & in monte Balon etiam obiterant.

Muscus hic vino decoctus ac potus calculos comminuit & educit, experimento, ut plerique apud Tragam testantur, certissimo. Nonnulli etiam aquam ex eo distillant eandem affectionem. Contusus aut in vino decoctus dolorem aut inflammationem sedandi vim obtinet ideoque podagra calida impositus prodest. Vino pendulo impositus, intra paucos dies illud restituet. Tabulum autem Musci recipiendum erit, quantum vas ipsum, siue magnum postulare videbitur. His addit Matthiolus, Pulvis eius drachmæ pondere sumptus cum vino subro-

Vires & Vitis.

rubro cohibet fluxum alui & dysenteriam: in eodem vino coctus, si eo ablatur os, tremulos dentes confirmat. Vbi quis refrigerare & siccare voluerit, totò hanc herbà vti poterit. Lonicæ eadem ascribit vires, quas Tragus: sed temperamento aë esse calido ac sicco, aliter quàm Marthiolus. Vrinæ mouere scribit Dodo næus. Camerarius tenuem subtilẽm florem rem exsiccatum vtilem facit admodum aduersus calculum.

Muscus terrestris vclm.

Descri-
ptio.

Locus

IN nostra peregrinatione Rhætica obseruamus hanc plantam Musco terrestris repenti ac cedentem, ramis crassioribus, dodrantalibus ferè rectis, in duas ac etiam quatuor partes diuisis, vti digitis exprementibus: folijs longiorib. paulò & latiorib. sursum tendentibus. Inueniebatur Gesnerus in Engadina inferiore Rhætorum, mense Iunio, Maio verò inter Bellenzonam & Lugan: in monte Gothardo quoque vidimus.

An Sautina sterilis, siue filio Trago? An Marthiolo in Diosc. est herba illa, quam aliquando vidit assumi pro Sabina, licet nec sapore, nec odore eam referat: quamque sæpius existimauit esse Selaginem à Plinio lib. 24. cap. 11. commemoratam.

Syn. C.B.

C. Bauh. in pin. Sautina sylvestris Tragi, Gesner. hort. & Lonicæ cui & Brathys sylvestris: Muscus terrestris tertius, H. Lugd. Chamæcyparissus, Turn. Tabern. & Gerardi: Sautina Tragi sylvestris, seu Silaginis Plinianæ prima species, Thallio: Similis herbæ Sabinae Selago appellata, Plinio lib. 24. cap. 11.

MVSCVS TERRESTRIS, FOLIIS retro reflexis.

Muscum hunc vnde habuerimus non occurrat: ramulus quidam nobis ab Agerio datus Argentinæ: Eam autem repere satis apparet ex sicca, fibrilique in terram demittere.

Descri-
ptio.

Hanc itaque sic describimus: Ex repentibus ramulis emittit coliculos multos, palmates, sed tenuiores multò, quàm in Musco terrestris Tragi, singulares, in singularem veluti iulum desinentes, vnciam circiter longum, qualis prædicto Musco est, sed minorem & carentem pediculo folijs nudo: folia ad Sabinam quodammodò accedunt, vel potius Iuniperum nisi essent breuiora, similia modò dicto Musco, quæ in eo differre videntur, quòd sursum non tendunt, nec cauli appressi sunt, sed expansi a retrosum, & deorsum reflexa vel repanda.

An C. Bauh. pin. Muscus terrestris ramosus 9. siue Muscus Cupressiformis ramosus?

MVSCVS TERRESTRIS RAMOSVS palcher.

Descri-
ptio.

Muscum ramosum pulchrũ vocamus quendam Musco terrestris repenti affinem, longè tamen ramosiorem, aspectu hilariorẽ, cubitalibus sarmentis, per quæ vix vlla obseruare licet folia: rami eius accedunt vtrunque ad Arborem vitæ, pulchro virore insignes, compressi, & veluti prælum extertij, denticellis hinc inde incisi: clauarandem producit, quemadmodum in Musco Tomus 111.



ramosus 1. siue Muscus erectus ramosus saturatè viridis: Selago 3. Thallij. Hæc inter folia aliquando granula habet.

MVSCVS CORNICVLATVS.



istro quidem iudicio confundit. An Eid. pin. Muscus terrestris ramosus 11. siue Muscus ceranoides maior & minor?

MVSCVS PYXIDATVS.

ECortio terreo saxi instrato granulatus fungo- (æ substantiæ Muscus nascitur, surgentibus hinc inde semuncialibus & vncialibus pyxidulis crassis, cinerei coloris, superius in acetabuli formam patulis, pede angustio nixis. Vbi obseruauerimus non recordamur.

C. Bauh. pin. fortè Muscus terrestris ramosus 13. siue Muscus pyxiodes terrestris: Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus. Lobel. belg. Eid. pin. Muscus 14. siue pyxioides tabulis maioribus & candidioribus constans.

Muscus pyxioides saxatilis.

TVbulis est longè minoribus, copiosioribus, nec ita candidis, qui petris saxilive latissimis

Vauu 2

terrestri epen- te priore diximus. Sunt nobis alij cubitales ramuli, sed tenuiores præcedentibus duobus, qui & ipsi repere videntur ac etiam fibras dimittere, quibus teræ alligatur. Pro hac planta posset substitui icon Sautinæ sylvestris Tragi, nisi noster Muscus ramosior esset. An C. Bauh. pin. Muscus terrestris ramosus 1. siue Muscus erectus ramosus saturatè viridis: Selago 3. Thallij. Hæc inter folia aliquando granula habet.

Synony?
ma.
C. Bauh.

Descri-
ptio.

innascitur, ea quæ obtegit, quemadmodum in via Telamontium versus, videre est.

Autori C. Bauh. prod. Muscus 16. siue pyxioides alter, siue saxatilis: Eid. pin. Muscus terrestris ramosus 14. siue Muscus pyxioides saxatilis.

MVSCVS ALPINVS FLORE INSIGNI,
dilute rubente.

Defectio.
ptio.



Cl. R. assusculas habet radices, in multa capita diuisas, numerosis fibrillis donatas: unde folia infinita, angusta, vix vociam longa, terræ incumbentia, nascuntur, Phyl- lum Dalecham- pij magnitudi- ne æmulantia, sine vlla aspe- ritate; inter hæc pediculis exeunt vix unciales, tenues, quo- rum vnicuique flos insidet v-

nus, magnus, rubellus, ex calyce oblongo striato, Lychnidis florum formâ.

Clus. in pann. vocat hanc suam stirpem p. 344. & 316. Caryophyllum 7. siue pumilionem alpi- num: In hist. Caryophyllum nonum, suspici- caturque esse Muscum alpinum Gesneri in epi- stolis. Testatur autem hunc Caryophyllum, in Iudenberg. celsissimo Stiriz monte interdum to- tum nunc nasci, alias reliquis notis cum illo conuenientem.

Casp. Bauhinus phyt. Gentiana 18. siue Gen- tianella omnium minima, Asculo pallidè cæ- ruleo, quam muscum aliquem floridum pronun- tiaret, nisi summè amaram diceret. Ego tamen tā- tam amaritudinem observare non potui. Eid. pin. Gentiana alpina minor 8. siue Gentianella om- nium minima: pro qua H. n. g. l. 31. descripta est.

Caryophyllum Clusii vocat in pin. Lychnidem alpinum 4. siue pumilam folio gramineo: & Mus- cum alpinum Lychnidis flore: Muscum floridum, Gesn. epist. & Fracto: Ocimoidem muscolum Ponz.

* In alpihus Rhæticis, monte Pilati, & Cor- thardo provenit, Caryophyllum Clusij summis Austriacarum & Tiariacarum alpium iugis inue- nitur, nudo petroloque solo. Floret Iunio, semen Augusto plerumque maturitatem adipiscitur. Ac in hortos translatus etiam sub Aprilis finem flo- ret: nonnunquam etiam secundò sub Septembris initium.

FINIS LIBRI TRIGESIMI SEPTIMI.

HISTORIAE



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXVIII.

AQVIS INNATANTES PLERÆQUE

EThaëlenus ita se habent terrestribus gaudentes plantæ. Transcarnus ad aquaticas, ut vel frigidis solemus umbris, vel ipsa adeo herbarationis nouitate paulisper respicillimur, omnes una quasi sportula collectas exponendo.

NYMPHÆA VETERIBVS.

CAP. I.



AUTHOREST Aristoteles libro 1. de plantis Nymphæam medicamentaria [Γρυπάριον τὸ λανθάνον] in dulcibus dixit, γλυκερότερον, ad differentiam ὅτι ἀλμυρόν. Alius forte vertit, lei perennibus, Scalig.] locis, in quibus sit, ut nō

admodum alienetur aqua, cum aer inclusus terrâ fuerit adeptus siccitate: & aque compactus humor: idemque aer manserit intra aquam: exire: extensam autem non esse, propterea quod ejus radices agantur in terræ superficiem.

Theophr.

Theophrastus Aristotelis & discipulus & scholæ successor, scribit lib. 9. cap. 13. dulcem esse radicem Nymphææ: Nasci autem in lacubus & palustribus: vocare hanc Bæotos Madonaim [μαδοναίαν] Gaza Madoniam vertit: aliqui tamen Madon legunt, & fructum comedere: habere folium magnum super aquam: dici sanguinem sistere, si contritum quis plagæ impulerit: vtilem quoque esse ad dysenterias potam. [Dalechampi] sententia Theophrastus Sidæ nomine Nymphæam delineat.]

genera
no.
ocus

Nymphææ genera duo Dioscoridi, Plinio, & Galeno. Cæterum, Dioscorides à Nymphis Nymphææ nomen sibi vendicasse credit, quoniam loca amet aquosa. Nymphæa, inquit, in paludibus, stagnantibusque aquis nascitur. Plurima autem inuenitur in Helide, Anygro amne, & in Bæotiz Aliatro: falsa verò habet Egyptiæ Fabæ similia, at minora, oblongioraque, plura ab una eademque radice prodeuntia: quorum alia super aquam quodammodo extant, alia in ea ipsa demergunt: *florem album, Lilio similem, in quo*

Tom. III.

medium croceum est. At cum defloruerit, calyculus rotundus, figura Malo aut Papaueris capiti similis: idemque niger extuberat, in quo semen [ναρπός] nigri, latu [πλευρὸς] dēstū[vet. pro πλευρὸς] ἔχοντες, tantum πρὸς legit:] atque gustari letum, glutinosumve recluditur. Caulis est læuis, minimè crassus, niger. Egyptiæ Fabæ cauli similis: radix nigra, scabra [ραχία Orib. παχία.] clauæ similis, quæ Autumno secatur. Ea sicca cum

Vires;

vino pota, cœliacis ac dysentericis auxiliatur, lienemque consumit. Stomachi quoque ac vesicæ doloribus sedandis ipsa radix imponitur, & alphas ex aqua emendat: alopecij etiam non cum pice impolita medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur, si quidem illa in totum admittit: quin & aliquot diebus continentur epota, genitale ita infirmat, ut arctigi minimè possit. Idem porro seminis quoque poti effectus est. Est & altera Nymphæa, cuius flos [ἡ τὸ ἀνδρὸς, vet. non habet,] Blepharia dicitur, folijs ante diæz similis, at radice alba simul & aspera: flore luteo, splendente, Rosæ simili: radix & semen ad inhibenda femininarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur autem in Thessalia, iuxta Penæum amnem. Sunt qui hanc Nymphæam vocent,

Plinio lib. 15. cap. 7. prior Nymphæa nata traditur Nymphææ zelotypiæ erga Herculem mortuæ. Quare Heracleon vocant aliqui, alij Rhopalon à radice clauæ simili. Idemque eos qui biberint eam, duodecim diebus coitu genitali praeuari. Laudatissima in Orchomento & Marathone. Bæoti Madon vocant, qui & semen edunt. Nascitur in aquosis, folijs magnis, in summa aqua, & alijs ex radice prodeuntibus, flore Lilio simili, & cum deflorit, capiti Papaueris. In caule secatur Autumno. Radix nigra in Sole siccatur, aduersaturque aluinis: Est & alta Nym-

Plin. Nympha
pha à
Nympha
dicim.

Vuuu 3

HISTORIÆ PLANTARVM,

phæa, in Thessalia, amne Peneo, radice alba, capite lateo, Rose magnitudine. Hæc ille loco citato. *Idem passim hæc habet.* Alopecias emendat Nymphaeæ radix, si vnâ cum cicuræ radice trita illinatur. Stomachi vitia sanat Nymphaea Heracleia illita: Aluum sistit semen eius cum vino potum: Tenebino verò radix è vino bibitur. Aluum leniter soluit (imò porius retinet. Plinius negligenter hoc prodidit li. 26. cap. 8.) & Nymphaea in vino austero. Radix è vino pota lienem consumit, & vesicæ dolores sedat. Venerem in totum adimit Nymphaea Heracleia, semel pota, in quadraginta dies: In somnia quoque veneris à jejuno pota & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet non solum venerem, sed & affluentiam genituræ: ob id corpus alere vocemque [quoniam habiliores sunt & voce magis canora, qui venere non vtuntur] dicitur. Nymphaea trita plagis imponitur. Humidis viceribus, priuatim ipsa, quæ calcamento facta sunt, prodest Nymphaea arida infriata. Apposita Nymphaeæ Thessalæ radix [quæ florem luteum gignit] vulgæ dolori medetur. In vino nigro pota profluua inhibet. Heracleia verò illita Nymphaea omnes cutis maculas emendat.

Galenus

Galenus refert Nymphaeæ tum radicem, tum semen desiccandi vim habere citra morsum. Quare ventris profluua cohibere scribit, semenque siue per in somnia, siue alio pacto immodicè profluens retinere: iuuare porro etiam dysentericos. Cæterum, Nymphaeam candidam habentem radicem, potentioris esse facultatis, vt muliebri medeatur profluui. Verum & hanc, & eam quoque, quæ atram habet radicem, ex vino nigro austero bibi. Porro nonnullam habere quoque & abstergendi potentiam. Itaque & alphas sanare, & alopecias. Cæterum, ad alphas macerari aqua: ad alopecias spice liquida. Sed ad hæc aptiorem esse eam, cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

Radix & semen in usu flor non est in modum

Nymphaeæ radicibus & semine vtendum, non autem flore solo: & frigidam & siccam esse illam totam, neque florem esse humidum Aug. Ferretius Castig. pract. med. cap. 6. sequentibus docet. Non probant quidem inquit, quod radicibus & semine Nymphaeæ in medicina vtimur, absurdum existimantes aliud præter florem ex ea asumere. Sed vide quàm prudenter: Nam Dioscorides, Theophrastus, Galenus, Paulus, radicem & semen vsurpant, nulla floris ad medicinæ vsus factâ mentione: & Auicenna radicis & seminis, æquè meminit ac floris. Taxandi ergo illi potius, qui radicem & semen negligunt, & veteribus præteritum florem tanti faciunt, vt totius plantæ dignitatem in eum transferât. *Essentiam* in facultatibus controuersia. Auicenna enim & tota ferè Arabum familia Nymphaeam frigidam statuit. Galenus verò siccam facit, de frigiditate nihil certi decernens, nisi quod ex viribus satis indicat eam quoque frigidam esse. Quod verò sicca sit apparet ex eo quod plagis imposita sanguinem sistit, Theophrasto: & ventris profluua cohibet, semen genitale fluens retinet, dysenterias iuuat, & muliebri profluui medetur, Galeno, Paulo, & Aetio. Quas facultates Auicenna etiam agnouit in radicibus, & semine, non autem in flore. *Pnde conciliandi* eos occasionem sumptum quidam docti, radicem & semen frigida & sicca dicentes, florem verò frigidum & humidum. Quanquam ex compositijs medicamentis, quibus admiscetur, facile est iudicare,

hunc non humidum, sed siccam esse. Vtuntur enim mulierculæ aqua illius stillatitia, tum solas tum cæteris permixta ad erugandam cutem, & poliendam faciem, quod citra absterforiam facultatem effici non potest: quæ non humiditatem, sed siccitatem potius arguit, nec mirum florem absterforium videri, cum totâ plantâ ad alphas & alopecias vsi sint veteres. Nec existimandum hos tam cæcos fuisse, qui in te tam facili & sensibus obuia distinctionem illam (si modò vera fuisset) in flore, seminibus, & radice non animaduertissent. *Syrupum ex Nymphaeæ floribus*, non solum frigiditatis, verum etiam humiditatis ratione, in conciliando somno, primas à syrupo papauerino obtinere aiunt. Verum cum solus ac simplex reuocatur in vsum, Syrupus violaceo inferior deprehenditur. Id manifestè probat recentiores floris temperaturam & vsum non benè cognouisse. Cæterum, solebant pharmacopolæ parare hunc syrupum secundum descriptionem cuiusdam Pedemontani, qui multa commiscet, nullo delectu, addens vtriusque Nymphaeæ flores.

Cardanus flores solum Nymphaeæ crocæ frigidos & humidos, eosque odoratos esse perhibet & somnum dulcem stratos conciliare.

Nymphaea crocea floris.

N Y M P H Œ A A L B A.



Nymphaea alba, luteæ paullò pòt describendæ, antè floris productionem, similisima est rotundioribus tamen foliis, Dod. & foliorum & florum pediculis rotundis: radice crassissima cortice tegitur: nigriore, intus cædida ac fungosa vade plurimæ exeunt fibræ, quibus in fundo hæret: flores autem longissimis aquas

Descriptio.

trajicientibus pediculis hærentes, candoris emaculati, nonnihil odorati, liliaceis floribus similes, multiplici foliorum agmine stipati, verum extrema folia exteriori parte ex albo virescunt, vt Ornithogali: medium occupant flamina numerosa. Dodon. aurore post florem capitulum prodit rotundum, in quo semen nigricans, splendens, Milio majus.

Lotus Ægyptia planè eadem est Alpino, quam Itali Nymphaea atque Arabes Nuphar appellant. In toto quidem flumine Nilo, Ægyptia loca lambente nulla alia planta est inuenta, quæ notas Loti præ se ferat, quàm hæc Nymphaea, quæ profectò planta similis est, vt de Loto affirmat Dioscorides, Colocasia, seu Fabæ Ægyptiæ, floremque fert album, Lilio valdè similem, quam clariùs expressit Theophrastus, qui dixit florem habere candidum,

Lotus Ægyptia, Alpina.

candidum, Lilijs foliorum angustia proximam, verè enim hic maiotis Nymphææ flos est, qui Sole occidente clauditur, atque sub aqua occultatur, atque Oriente suprà aquam affurgit, & foras exit, aperiturque. Quod non modò in Ægypto, verùm in multis Italiæ locis in hac planta obscuratur, maximèque in locis omnibus circum Venetias lacunosis vel palustribus.

Non iraque possum non vehementer admirari Theophrastum, Dioscoridèque, atque alios, qui omnes à Nymphæa distinctissimis capitib. Lorù Ægyptiam se iunxerint, quando vtrique vnum atque idem planè sit, & mirandæ ad Solem conuerfiones de Loto celebratæ eadem sint, quæ in communi hac Nymphæa ab omnibus animaduertuntur. Ipsa enim occidit Sole florem claudit, deinde tota cum folijs sub aqua occultatur, cò quo oriente, florem primò extra aquam demittit, aperit, atque paulò pòst cum omnibus folijs supra ipsam affurgit. Ægyptij tales crudos cum suis capitibus per Ætatis calores mandunt: sub dulces enim sunt, atque humidi, admodumque refrigerant & humectant, quos appellant *Raxenil*.

Miratur & Guilandinus Plinium lib. 1. cap. 17 & 18. de Loto Ægyptiæ crispissè, qualia, teste Alpino, huic Nymphææ conueniunt, *Nobis quidem* attidet Alpini sententia: verùm non conuenit descriptio radicis, quæ non malè quadrat Colocassæ vulgaris, ut faciliè dici possit duas plantas in Loto descriptione mixtas. De Loto Ægyptia Veterum sententias mox infra prosequemur.

Nymphææ Apuleius falsò Chichorææ folium adscribit, id monente Eur. Cordo.

Brunfels. germ. p. 3. Loniceras & Dorsthenius ignauus Botanicus plures stirpes cum Nymphæa commiscet, vocando (imitando Apuleium, qui & Herculaniæ matrem nuncupat) Clauum, vel Digitum veneris, Clausum, vel Radicem Herculis, Algum palustrem: Papauer palustre: german. *Seebium, Keller Wurzel, keulwurzel, vassermaehen, haerwurzel, haerstrang, & herculiswurzel*. Apud Tragum eadem nomina latina leguntur: addit tamen, quosdam Heracilion, & Heracleam Rosam vocare germ. *vasser Seebium, vasser Gilgen, herwurzel, & herstrang*. Apud Hist. Lugdunensem quæ extant huius Nymphææ effigies, errore quidem Compilatoris: vni hæc est inscriptio p. 1008. Nymphæa maior alba: alteri p. 1009. Nymphæa lutea maior.

Latinis sicuti Græcis *Nymphæa* vocatur: Arab. *Nilofar, Nenofar, & Nilufar, & Nenufar*: offic. *Nenuphar*: Gall. *Blanc d'eau, & Lis d'estang*: Hispan. *Escudetes del rio, & Higos del rio*. Nenofar vocat Arabes: & græcà voce corruptà, propter natales aquas, *Golfana*: Itali nomen à discis mensarijs indiderunt. Belgæ *Plompen witte Plompen*: Angli *water Rose, water lily*, vel *lilie*: Boh. *lekuo Stulik: Vixi tok*.

Marthiolus testatur Fuchsum lib. de comp. med. alias Græcorum Nymphæas, alias Arabum putare. Habebat is in primis comm. Nymphæam albam iunctam cum lutea: in post. verò commodè propriâ figurâ vtramque expressit.

Dicitur Nymphæa alba, Brunf. in 4. p. 1. Dod. Cordo hist. Lob. in Adu. Obs. p. 121 & 124. Icon. p. 595 & tom. 2. pag. 279. Acolæ, Tab. Thal. & Gerardo. Nymphæa flore albo, Anguil. & Clus. pann. & hist. Nymphæa cæcàda, Trago, Fuch. Turn. & Cæsalp. Nenuphar album, Brunf. tom. 1. shapf. 3. Nymphæa 1. siue alba maior, C. Bauh. Tom. 111.

phys. & pin. Nymphæa maior alba, Hist. Lugd. Calt. & Eyst. Habet Eyst. aliam quæ nullatenus primæ sit dissimilis, nisi quòd omnia minora habeat. Nymphæa alba minor Est.

Nascitur in paludibus, stagnantibus aquis, amplioribus fossis, & pigro lapsu delabentibus rivulis, ac subinde fluminibus, Maio & Iunio florens.

Vires Nymphææ vtriusque vide ante ex veteribus. Nostra ætas candidæ flores ad capitis ex causa calida affectus commendat. Nymphææ, vel Loti Ægyptiæ, inquit *Alpinus*, vtuntur floribus & folijs contritis ad omnes calidas inflammationes, atque etiam succo, præsertimque ad demulcendos dolores, à calida causa obortos, laudè atque oleo rosaceo misto, eodèque itidem modo oleo, quod ex floribus parant, ad calidos dolores, inflammationes, exustiones, vlcera & dolores capitis in febricitantibus, vigilijs, tum exteriùs folia contusa applicant, tum eius succo cum oleo & aceto frontem & tempora, illinunt. ad conciliandum somnum syrupum ex eo paratum frequentant, atque tum seminum, tum radicis puluerem ægrotis cum eius decocto exhibent. Vius radicis semini &que secreti loco habetur apud multos. ad gonorrhæam, & in mulieribus ad album profluuium firmandum, & ad dysenteriam. Multi verò ab huius plantæ vfu cauent, eius loco alia sequentes, eo timore ne is eorum duntaxat desiderium, tum vires minuantur, apud eos etenim omnes compertum est vsum semini atque radicis homines reddere ad vnerem valde frigidis actardos. Hinc vsum hunc multos ibi sanctos heremitas sequi aiunt, ut faciliùs vitam cælibem ducere queant.

NYPHÆA LVTEA.

Haud temerè herbam aquaticam inuenias, quæ maiore radice nitatur quàm Nymphæa, quippe quæ hominū cruris crassitudinem nonnunquam assequatur. Harum quæ lutea est, radicem habet foris virentem; intus albam, fungosam & porosam, sapore subamaro præditam cum quadam adstrictione, cui multa appensa adnata crassitudine digitalis, foris nigricantia, fibrisque multis capillata: folia squæ innatant, spithamam aut sesqui pathamæ longa latitudine palmari, formâ soleæ equinæ, propemodum rotunda, paulò oblongiora quam candidæ, pinguioribusque virora splendens, superiore parte glabra & læuia, inferiore verò



fibris aliquot distincta, pediculis digitali crassitudine, cubitos duos aut tres longis aut etiam longioribus, teretibus, [Dod. foliorum florūque pediculis angulosus, quod considerat.]

Vuuu. 41

ranum, Jredulla fungosa creberrimis cæcis caliculis perna : quibus ad exortum interdum concurrentibus pleribus pediculis, lanugo candidissima, quæ & folia nondum explicata, hæc mucronem æmulantia, exteriore parte obestit: flores pediculis confimilibus insident, sapore cum dulcedine aliquâ streuè adstringente, odore Silymbrij Cardamines, quinq; folijs crassifolius constantes, colore luteo præditi, exceptis vnguibus, qui externa parte virefcunt: intra verd: septium foliorum quinq; duplex est corona, prior minutissimorum foliorum quæ externis appressa nigosa conspiciuntur & similiter lutea, quo etiam colore prædita est interior, sed dilutior ex complurimis ligulis retroactis & apicibus priorem coronam contingentibus: medium occupat pericarpij rudimentum ex luteo viride, quod delapsis coronis, folisque florum totis jam viciantibus, saturo virore sed nitente tingitur papaueracei capitis magnitudine, sed forma vireum effabre exprimens, turgido ventre in angustam ceruicem desinente, quæ sensim dilatata margines virei effigis, strijs extantibus asperatis, & quicij loco aliquovique pestulos: in his semen continetur Dodonæ, testis, splendens, majus quam alba, Triticeo grano minus.

Compil. Huic Compiler H. Lugdunensis malè ascripsit titulum Nymphææ luteæ minoris, cum sit majoris figura. **Matth.** verò in post. comm. & hist. germ. Nymphææ luteæ novam habet imaginem, cum in puor. portio esset picta cum albo.

An Lilia Herodoti. Considerent lectores, an Lilia Herodoti lib. 2. Rosis similia in flumine nascentia, sint Nymphæa lutea, ipsi forè minus cognita, & malè descripta.

Apollin. rideur. Egredia Apellinatis comparatio, qui flores cum Croci colore confert.

Synop. Nymphæa lutea, Trago, Matth. Fuchf. Anguill. Turn. Dod. Lon. Lob. in Adv. Obl. p. 323. & 324. & 10p. 594. Acolthe, Cast. Tab. Ger. & Eythac Thallio, Geln. de coll. stirp.

C. Bouh. pin. Nymphæa lutea 1. siue maior: Nenuphar luteum, Brunfels. Nymphæa lutea maior. H. Lugd. & Clus. hist. Nymphæa altera, Cordo in Dioscor. flore extoto luteo, Cæsalp. Nymphæa citrina, Cordo hist. *Item.* Nymphæa lutea 2. siue minor magno flore: Nymphæa lutea minor, Lugd. Ger. Dod. ed. belg. Nymphæa secunda, Tab. *In phyt.* Nymphæa 2. siue luteo flore maior: Item, Nymphæa 7. siue minor magno flore: Nymphæa lutea minor, H. Lugd. *Nullem* nos particularem Nymphæa luteæ speciem minorem in H. Lugdunensi agnosceimus. Icon enim quæ proponitur hoc titulo, est Nymphææ luteæ maioris, ut patet consideranti iconem Nymphææ luteæ maioris apud Tragum, Fuchsum, & Dodon. gallicum, quam imitata est H. Lugd. licet vel Compiler, vel Typographus pro minore exhibuerit.

Nomina linguar. Germ. gal. Seebumen, Gelb. Seebumen: Belg. Ghela Plompen: Gall. jaunes d'eau: Hisp. Golfan amarillo: Angl. yellow water lilies. Græcis Nymphaea lutea, cuius flos Blephara.

Locus & Tempus. Nascitur ubi alba, eodemque tempore floret.

Vires. Huius radicem, renem & vesicæ calidis morbis mederi, & aduersus gonorrhæam efficacem non temere exultimarunt Neoterici, vel Dodonæi opinionej

NYMPHÆA MINOR LVTEA flore simbricato.




R Adenlia multis vli- ginof, ceruo- aduxa est, capil- laceis, è cauiù nodis protel- tibus: folijs multis, longo reuandoque pediculo nixis, gusta amaris, aque inuuantibus, densis: canibus teretibus, genicula- tis: floribus luteis, flori Cucurbitæ perquam similibus, quinq; tantum foliis constantibus, non, ut in lutea maiore, numerofo stipatu congestis, aut multos apices iatus gignentibus, per ambitum venustissime simbricatis: cauliculo oblongo, lato, & compresso, seminebus pleno oblongis, latis, in ambu piosis, Attriplicis ferè modo, gustus quoque amari.

tea maiore, numerofo stipatu congestis, aut multos apices iatus gignentibus, per ambitum venustissime simbricatis: cauliculo oblongo, lato, & compresso, seminebus pleno oblongis, latis, in ambu piosis, Attriplicis ferè modo, gustus quoque amari.

Hanc H. Lugd. Compiler p. 100. Nymphææ minorem albam, pro lutea inscripsit. Luteam autem in titulo esse legendam, ex descriptione colligitur, quod non animaduertit C. Bauhin. cui in phyt. dicitur Nymphæa lutea 4. siue minor altera: In pin. Nymphæa lutea 4. siue minor flore simbricato: Nymphæa alba (in phyt. albam dixerat) minor, Lugd.

Aquarum etiam est alumna: verù regionum maximè Septentrionalium. Et quidem in Sebastianorum parte, quam vulgò Bressiam vocant, plurimis stagnis ac viuarijs innatat. Præterea in Sequanæ ripis ad Mantam oppidum gignitur.

NYMPHÆA MINOR LVTEA



E Limoso fundo, inquit Lobelius, ejus descriptionem & iconem tradidimus, trajicit nymphas iuncis pediculis, ternum & quaternum cubitorum, crassifolius, Portulacæ singulare folium, in summo gestantibus: floribus ex vno quasi iunco exortu Primulæ minoris Cheli,

plerosque etiam Nymphæam parvam, & *Clavicornem*: Fontinalis tamen, siue Potamogetonis speciem videri: eiusdemque cum eo facultatis.

An Cordo in Dioſc. *An Lens p. lufius m. a. gna, Cord*
 aroſi uoſſer ſinſen h. c.
 Lens palu-
 ſtris magna,
 de qua dubi-
 tat an ſit Stra-
 tiotes aquati-
 cus, & an le-
 gendum in
 Dioſcoride
 Aſati pro Ai-
 zoi.

Lobel. in
Adu. magis
Nymphæis,
quàm Pota-
mogeroniac-
cedere scribit
flosculis in-
termicâtionibus

Folia habet Nymphææ, paulò maiora quàm
Brassicæ marinæ: *flores albi, tenues, flaccidi:*
capitula capparibus similia, plena semine par-
uo, papaverino: hæc Matth.

hefinall white
 nymphæ 3. siue al-
 ba minor: Eid.
 pin. Nymphæa
 2. siue minor:
 nymphæa par-
 ua, Matthioli.
 Nymphæa al-
 ba 2. siue mi-
 nor: Nymphæa
 parua, Matth.
 Nymphæa al-
 tera lutea mi-
 nor, Lugd. ic.
 Nymphæa al-
 ba minor, Lo-
 bel. in Adu.
 Tabern. & Ge-
 rardi.

Et hæc aquarū
alumna regio-
num Septen-
trionalium dū-
taxat, præfer-

tim Angliæ, via quæ Londino Oxoniam & Bri-
ftoiam ducit, fecus & trans aquas viarum pi-
griores, minúſque profundas.

In aqua fluitans multiplicat se flagellis suis tenuibus, in quibus veluti parua capita, vnde *foliorum* exortus & *radices* tenuissimam fundunt versus tendentes: *foliis* circinatæ rotunditatis, teneribus, vncialibus, interdum duplo maioribus: A-fati *foliis* ferè similibus, sed minoribus, pediculis nixis palmaribus, *flores* veluti è vesica prodeunt, masculi, foliis albidis constantes, Dod. medio late.

Dod. gall. licet Morfui ranæ denegat nomen
græcum & latinum, tamen nihilominus *Cantharis*
iuspiciatur. Lat. duas icones exhibet pro Ranæ
morfui, dicens Belgas *Werschen beet* appellare:
Tom. III.

luteolis, alibi lacteis, aut melinis, trium foliorum:
gustu Nymphææ aut Lenticulæ palustris. Et hinc
in Ic. p. 96. inscribit Nymphæam, siue, vt etiam
in Obs. p. 324. Ranæ morsum.

Compilator. R. Lugd. male confandit p. 1010. *Compil. Et.*
Ranz morsum cum Nymphaea alba minore, ac *Lugdun. 18-*
mira de hac tradit Floret, inter Augulli mensis *profr.*
principio. Flos noctu compremittur, & sub aqua
lateat, interdum patet, & aquis lese exeret Euul-
sa herba & rursus in aquam injecta viriditatem
dieu retinet, & quamvis radicibus careat, reuiuif-
cit tamen, nouamque sobolem pignit : saporis
qui & Lenticulae palustris vis refrigerandi & hu-
meandandi.

Svenckf. vocat Morsum ranæ, froeschbitt & Synon.

Violam palustrem. C. Bauh. phyt. Nymphæam
5. siue albam minorem tertiam: idem pin. Nym-
phæam albam 3. siue minimam. Nymphæam mi-
norem albam, Lugd. Nymphæam parvam, Cæs.
Morsum ranæ Dod. Lob. Cast. ap. & Tab.

In lacustribus, stagnantibus, torpentibusque
aquis, ubi ranæ lubentius stabulantur, vnde ne-
men: ad arcem Londini regiam & mœnia plu-
rima, Junio, Julio, & Augusto, mensibus flo-
ret.

Neoterichis, in genere.

CAP. II.

Theophrasto lib. 4. cap. 10. Lotus vocitata, planis parte maximā profluit, cum rura inundantur: hinc natura *caulis* fabae [*Egyptiæ*] & fructus eodē modo, verū minores, gracilioresque. Nescitur fructus in capite, modo quā in fabas: los candides. Liliis foliorum angustia proximus, multus, densus & promiscuus, qui Sole occidente comprimitur, capitūq; integritate ortum aperitur, & super aquam affurgit: quid facit dum caput perficiatur, foliūq; defluunt: sapitis magnitudo quanta Papaveris maximi, & percipitur incisus non alio modo, quā Papaver: nisi quod in his fructus frequentior habetur, qui Milio non absimilis est. In Euphrate caput, floresque mergi referunt, atque descendere

 $\chi_{\lambda\lambda\lambda}$

utque in medias noctes: tantumque abire in altum, ut ne demissa quidem manu capi possit: diluculo deinde redire, & ad diem magis. Sole oriente iam extra vndas emergere, floremque patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut planè ab aqua abscidat. Ægyptij capita ipsa acervis putrefaciunt, cumque tegumenta putruerint, in flumine lauando separant fructum, & siccantes, pinsentesque panem faciunt, eoque cibo vuntur. Corsion vocant Loti radicem hanc. Ea rotunda est, Cotonei mali magnitudine, cortice nigro foris vestita, quali nux Castanea tegitur: intus candida, quæ tosta elixâq; vitellis ouorum similis sapore est, gustu suavis. Estur eadem & cruda, sed gratior decocta, seu aquâ, seu prunâ.

In Loti Ægyptiæ historia Diosc. l. 4. & Plinius lib. 13. cap. 17. & 18. Theophrastum imitati sunt. Plinius tamen cap. 18. addit, non aliunde magis quam purgamentis Loti radicis sues crassescere. Idem lib. 22. cap. 11. ait eos, qui Loton, arborem tantum putant esse, vel Homero autore, coargui posse. Eum enim inter herbas subnacentes Deorum voluptati, Loton primam celebrasse. Esse & Lotometram, ex Loto factam, ex cuius femine, simili Milio, panes in Ægypto fiant à pastoribus, maxime aquâ, vel lacte sebacto, &c. Cæterum, videtur hic Plinius Lotum Ægyptiam cum Loto latius confundere, eumque secutus fortè & Galenus 7. simpl. Ægyptiæ Loti cum Nymphæa conuenientia supra ex Alpino demonstrata, & quomodo vnum & idem sint ex eiusmet verbis probatum est.

Anguillara epist. 9. Homerum per Lotum intellexisse Ægyptiam existimat, de qua Theophrastus: sed quæ planta sit non indicat. Aliqui dicant in ripa Nili solum Fabam Ægyptiam reperiri: eius autem radicis descriptionem & vsum, suspicionem præbere Lotum Ægyptiam & Fabam Ægyptiam idem esse: & quidem fuisse, qui Lotum, Fabam vocarint: Theophrastum autem de vtraque planta eodem capite, sed fortè de Loto ex auditu verba fecisse. Idem Anguill. epist. 14. de Loto Ægyptia nihil aliud nouit, quam in Ægypto Colocasiam vocari: deque Loto Theophrastum sibi contradicere: huic enim semen attribueret Fabæ Ægyptiæ semini simile, sed minus & subtilius: postea verò Milio simile adscribere.

DE FABA SIVE CYAMO ÆGYPTIO ex veteribus.

CAP. III.

Theoph.

Faba in paludibus, stagnisque exit, inquit Theophrastus. *Caulis* eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato, rimas intrinsecus habet tendentes per totum Lilij modo: caput super hunc fauo orbiculato [σφακίον] vespærum non ab simile: inque singulis cellis [ἐν ἐκάστῳ τῷ κυλίῳ] singulæ Fabæ continentur paululò super id eminentes, multitudine plurimum ter denæ: *stos* duplex. Papaueris magnitudine: color roseus in plenum caput Papaueris super aquam, folia ad singulas fabas amplexa exeunt magnitudine galeri Thessalici, quæ caulem habent Fabarum. Fabam quamque contenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patefcit. Fructus ita se habet. *Radix* crassissima, Harundine plenior, rimas similiter, atque caulis,

habens: manditur & cruda, & elixa, & assa, eo- que cibo qui incolunt paludes vtuntur. Nascitur itaque spontè vel plurima: cæterum, & feritur in limo, paleis largè admistis, ut descendat, incorruptaque maneat, sicque fabeta faciunt. Sin autem semel apprehenderit, perpetuò manet: radix enim valida est, nec infirmior Arundinis radice, verum spinis subhorrens: quamobrem crocodilus eam fugit, ne occurrens oculos offendant, quoniam acutè non videt. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciaque, sed tractus ipsi non plenè conficiunt. Et circa Toronem agri Chalcidici quodam in lacu exit, magnitudine mediocri, vbi & percoquit, & perficit, & absoluit fructum. Et hæc ex auctoritate Theophrasti. Apud quem *Gaza* ἐν ἐκάστῳ τῷ κυλίῳ, vertit in singulis cellis, & rectè. Sunt enim κύλαιοι τῶ σφακίῳ καὶ σφακίῳ, καὶ τῷ κρεῖντι καὶ ὀδύνητι, fauotum vespærum foramina, & fauorum canitates. Gazam sequutus est *Hermolaeus*, & locum hunc sic reddidit. Calyx in cæcumine rotundus, vespærum fauo similis, triginta plurimum loculis, qui singulas singuli continent, non quidem omninò rectas, sed paulò extantes. Atque ad horum etiam imitationem reliqui Diosc. interpretes, id quod ille dixit σφακίον σφῆρις, ἐν ἐκάστῳ τῷ κυλίῳ, διὰ τὴν οὐκ ἐν ὁρίῳ, ὡς ἐν τῷ κυλίῳ, ὡς ἐν τῷ κυλίῳ, ita conuerterunt. Vbi desloruit, fert folliculos siue vtriculos vespærum fauis similes: quum tamen nulla σφακίῳ mentio fiat, sed dicat tantum folliculos capsulis similes proferre, in quibus sit faba parum supra operculum velut bulla eminens. Hoc autem operculum πῦλα ab ipso dictum esse videtur ἡ καὶ δία, Theophrasto appellata, & quam caput & calicem illi conuerterunt. Atque hoc modo etià Cornario videntur idem dicere Theophrastus & Diosc. in diuersa adeò & meritò nobis moram iniiciente dictione.

Porrò, Fabæ Ægyptia, quam nonnulli Ponticâ *Disco* [ἀνίστατος] vocant, & *Sarac.* [ἡνι καὶ τικα]. Vet. codex hoc caput non habet, *Sarac.* vocant, Diosc. etià teste, in Ægypto quidem magnâ copiâ pronenit, sed & in Asia quoque & Cilicia palustribus locis inuenitur. *Folium* verò habet amplum instar Petasi (ὡς αἰγῆς), vet. *ἡνι καὶ τικα*, inquit Sarac. nimis vel temerè, vel obliuiosè Dixerat enim antea vet. codicem hoc caput non habere, (seu galeri: *caulem* cubitalem, digiti crassitudine: *florem* roseum, dupla papauerini floris amplitudine. At vbi desloruit, vtriculos gerit folliculis similes, in quibus faba paululùm supra operculum instar bullæ prominat. Ciborium aut Ciborium ideò nominatur quasi loculentum, quod seratur eiusmodi faba, ipsa humenti glebæ indita, atque ita in aquam demissa. *Radix* autem subiacet Harundinis radice crassior: quæ cocta, crudâque estur, & Colocasiam nominatur. Fabæ quoque ipsa vires comeditur: sed exsiccata nigrescit, & Fabam græcam magnitudine superat. *Vim* porrò habet adstringendi, stomachumque iuuat. Quamobrem dysentericis, coliciâque conuenit iniperfa earum farina polenta vice: sed & in pultem quoque redacta exhibetur. Efficaciores autem sunt cortices, si decocti in vino mulso tenui cyathorum mensura propinentur. Cæterum ad aurium dolorem facit quod in earum medio viride spectatur, gustu amatum, si cum rosaceo coctum instilletur.

Plinius ex 4. bist. plant. Theophrasti sua transcripsit, & quædam variauit, quædam omisit pro sua voluntate, si non exemplaria fallunt, ita quidem ut Theophrasti verborum sententiam non reddat.

Diosc. & Plinius in-
stantur.

Lotus He-
meri, An-
guill.

reddat. Licet autem seorsum de Faba Egyptia, seorsum & de Colocasia egerit, tamē proprie eiusdem plantæ sunt Faba, Ciborium, seu Cibotium appellata, & Colocasia radix.

Quod verò ex Colocasia foliis, in variam vasorum speciem implexis, potare gratissimum habere tradit Ægyptios: id habet etiam Strabo lib. 17. & testatur adeo magna esse illa, ut poculorum & catorum vsum præbeant, aptam insuper ad id habentia concanitate, ut Alexandrinæ officinae hinc plenæ sint, & ut valis vtantur. Appellatur autem hæc folia, Ciboria & Cibotia: Dioscorides tamen ipsas fabas sic appellari ait.

Colocasia porro etiam Colocasium dicitur Virgilio in Pothione: Ecloga 4.

Mentisque videns Colocasia fundet Acantho.

Galenus lib. 2. de alim. Ciboria & Colocasiam modicum alimentum corpori præbere ait, & talia omnia mali succi esse. Eri. alim. Faba Ægyptiam naturā humidiorē & excrementitiā esse dicit. Quod verò ad vsum medicum attinet, ipsam præterit. Ita etiam Aëtius viridem quidem Fabarum Ægyptiarum fructum, Ciborium appellari dixit, & de ipso in Fabarum tractatione considerandum esse proponit. Sed hoc postea de Fabis agens, non facit. De Colocasia tamen tractas Manzianon ipsam appellari ait, & similem eius vim rapis & cepis esse, & corpus ipsius viscosum, ut extergendi vim habeat: esse etiā aluo cōmodā.

Hæc longius, ut aliquam saltem huius plantæ cognitionem in assequeremur, quæ Italiae etiam hodie ignota est, quamvis suo tempore seri ceptam Plinius dixit. Sunt tamen qui Venetiis satam vidisse, & radicem sapore Castaneæ sub cinere coctam se comedisse, & in multis recens inuentis insulis, panem ex ipsa fieri affirmant. Sed nec desunt, ut præcedenti capite diximus, qui Fabam Ægyptiam, eandem cum Loto Ægyptia esse suspiciunt. Hermolaus nobis author est, Fabam Ægyptiam siue Colocasiam ab Herodoto, quemadmodum & Lotum ipsam, Liliū Ægyptiū vocari. An v. seqs. peregrin⁹ fructus valde elegans, sit Faba Ægyptia Diolcor, ambigit Clus.

FRVCTVS VALDE ELEGANS, FABAE fortē Ægyptia Diolcoridis.

CAP. IV.


Silene fructus alicuius arboris, an alterius plantæ: incertus sum (inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 13.) quia, qui mihi munus dabat, Emanuel Syveert, & apud quem simile cōspiciebā Henticus ab Os, Aristelredamenses, qui eum à nautis redemerant, nihil affirmare poterant: mea tamen opinio in eam partem inclinat, ut plantæ alicuius esse existimē, & forsitan in aqua nascentis, ut Nymphaeæ: quæ si vera sit, Diolcoridis Ægyptiam



Tom. III.

TRIBVLVS AQVATICVS.

CAP. V.



Descriptio

EX vno capite populus, & folia multa, fescuncialia, duobus quadrantibus superioribus forata, suprà glabra, subius rugosa, Populneis quodammodò similia, pediculo palmari, & sesquipalmari, fungoso, & paulò infra inferiori nem tuberoso, hærentia: flores paruos albos sequuntur muricati fructus

spinulis armati, nigricantes, Castaneis pares, pulpâ, nucleoque non dissimiles, candido, eduli, gustu haud ingrato, qui autore Dod. & recens mandis, & arefactus, molâque contritus in panem cogi posse fertur: nos in suo cortice aqua elixum comedimus: radices longissimæ ex intervalis veluti ad genicula staminum, vtrinque cæcariem promunt, partim in aqua natantes, partim limo hærentes. Cum flore à nemine pitam esse testatur Gesner. in epist. ad Cos. Holztz, nec etiam placet nostra ex Fuchianis Icon.

Hic autem est Tribulus alter siue aquaticus *bulus alter*. Diolcoridis, qui in fluminibus nascitur, & comam supra aquas attollit, aculeos verò condit, & ipsi aquis occultit: foliis latis à pediculo longo dependentibus; caule parte summâ quàm inâ crassiore: ad hunc & ei adnata quædam capillamenta spicacea: fructus verò durus est, uti & Tribuli terrestris.

Fluuiorum singuli priuatim, inquit Theophr. 4. de hist. pl. cap. 11. aliquid ferre videntur. Nec enim Tribulus in omnibus, nec vbiq; erumpit, sed palustribus fluminum tantum altitudine cum profundissima quoniam cubitorum aut paulò profundiore, ut in Strymone fluuii. Merlus in aquam, prorsus ad imum vergit: folio amplo ad effigiem mei, pediculo admodum longo, caule parte summa quidem crassiori, vnde folia, fructusque dependent, qui nigri durique vehementer: nascitur semine decedente, germinemque in Vere suum emittit. Radicem alij annuam, alij diuturniorem affirmant, &c.

Tribulus (inquit Plin.) non nisi in palustribus nascitur, dirares alibi, iuxta Nilum & Strymonē amnes excipitur in cibis, inclinatus in vadum,

folio ad effigiem Vmi, pediculo longo: [Quæ sequuntur] Tribulum terrestrem spectant] de hoc plura de viribus Tribuli terrestris, in Hist. nostr. gener.

Non desunt, qui populares & coctivas Plinio vocatas Castaneas, esse censent tuberosos fructus, in stagnantibus aquis enascentes, quibus recte non adscribitur Ruellius.

Tribulum aquaticum sine descriptione pingit Matthiolus, vocans græcè *τρίβυλον* ἰσὺς ποτῶν: It. *Tribolo aquatico*: Arab. simpliciter *Tribulum Hafach*, seu *Hafek*: Hisp. *Abroyos*, & *Abrolhos*. Galli vocant *Mades*, & *Chastagnes d'eau*, teste Bellonio Obsclib. 1. cap. 18. Dod. tamen *Macres* gallicè nuncupat: Lob. *Esharbotz*, *Saligotz*, & *Truffes d'eau*: Germ. *Wassernuß*: Aquatica nucem, *Wassernuß*: *See-nuß*: Lacustris nucem *Stachelnuß*, Gallicum autem vulgus *Satigos*, *Cornuillas*, *Truffes*, *Trapas*, *Castaneam aquatilem* & *Castaneam Ferratiensem* appellare author est lib. 3. cap. 2. 4. & *Spiznuß*: Brabant, *Waternotten*: & à similitudine aculeorum ferreorum *Waternotten*.

Aquaticus, siue aquatilis, seu lacustris Tribulus, officinis marinus dicitur. Fructus seu nubes eius aculeata sunt, tribus robustis aculeis, ubi indurata sunt, quo tempore etiam nucleus durus enadit, vix mandari possit, qui tamen recens valde mollis est, & admodum aquosus. Ab huius nucis similitudine dicti sunt tribuli, murices latine appellati, machina ferrea, aculeata, in quamque partem incubuerint, quæ sub terram defodiebantur, Curtio lib. 4. Nunc etiam sparguntur, maxime in fuga, ut hostium insequentium impetum morentur.

Tribulus aquaticus, Trago, Marth. Dodon. Anguill. Lac. Cordo in Dioscor. Gesn. hort. Lon. Lob. Cæs. Cast. & H. Lugd. ac C. Bauhino: Tribulus lacustris, Cordo Hist. Tribulus aquaticus maior, Claf.

Nascitur variis in locis, ac ferè stagnantibus fluuiorum partibus, lutosis lacubus, & vrbium fossis, quibus limosus sit fundus: inter Montbelgardum & Basileam obseruauimus, & ubi floret mense Iunio. Matthiolus in plerisque Italiae fluminibus & lacubus provenire ait, præsertim in agro Mantuano & Ferratiensi: neque solum in dulcibus aquis gigni, sed etiam in mari. Theophrastus autem non dixit in fluminibus nasci, sed fluminum palustribus. Si in mari provenire obseruauit, cur locum non annotauit?

Dioscorides adstringentis refrigerantisque esse naturæ, ut Tribulum terrestrem, aquaticum statuit, ideoque ad omnes, ad quas terrestrem commendauit, tristes sensationes adhibendum censuit. Idem & Plinius fecit. Additur tamen ab his, Thraces, ad Strymona habitantes foliis Tribuli equos saginare: ipsos verò nucleo viuere, panem facientes prædulcem, qui & ventrem contrahat. Radicem castè purèque lectam, strumas discutere. Semen adalligatum, varicum dolores sedare: tritum verò, & in aquam sparsum, pulices necare. Plura lege antè in hist. n. gen. ubi de Tribulo terrestri Refrigerantis autem Tribuli istum esse naturæ: exque humida & frigida essentia componi, inque ea aquæ magis esse, quàm in terrestri, in qua terreum frigidum potentius, ex autoritate Galeni ait Dodonæus. In vnguento Agrippæ [inquit Saguyet. in pharm. Fern.] omisit Tribulos Nic. Alexandrinus. Tribuli autem marini, qui Venetiis videntur in foro, aquæ quid possident cum calore & acrimonia, propter qualitatem aquæ maris: quæ ad foveas adhibita cale-

facta elicit & discutit. Aquaticum vidit sæpè in Burgundia extractum ex stagnis, cuius fructum in aqua coctum comedebant vulgares quasi castaneas: alij sub cineribus calidis decoquebant. Habet autem Nic. præpositus aquaticos Tribulos non marinos, ut Fernelius. Sed hic melius quàm ille. Siquidem huius vnguenti munus est emollire, attenuare, &c. ventrem etiam illurifunducere, ad quam rem marini Tribuli aquaticis sunt efficaciores: qui si non sint in promptu, lauandi & macerandi erunt fluuiatiles aqua salsa. Obseruatione dignum est quod scribit Plantius ex Fernelio & Cordo, Tribulos recentes esse debere, & parum coquendos, ne vis coctione perdat. fruit tandem ex Tribulis verticilli precatorij.

POTAMOGETON. CAP. VI.


Potamogeton Dioscoridi folium habet Betæ simile densum [sæpè, & non ut falsò Cæsalp. legit, Plinium secutus, hirsutum] & parum extra aquam eminens. Porro refrigerat & adstringit, proindeque conuenit pruriginibus ac depascentibus vetustisque vlceribus. Nomen autem ex eo inditum est, quod in paludibus & æquosis locis nascatur. Dicitur tamen aliis inter spuria Stachyites, quasi spicata, nisi malis Stagnitem legere, corrupto à stagno vocabulo. Latinis Fontalis, seu Fontinalis, Egyptiis Etenchis.

Medetur Potamogeton ex vino dysentericis & cæliacis, similis Betæ foliis minoribus tantum hirsutioribusque, paulatim supereminens extra aquam, peculiariter refrigerat, pissat. Vnus in foliis, cruribus vitiosis vtilis, & contra vlcerum nomas cum melle vel aceto. Castor hanc aliter nouerat, tenui folio Myriophyllon aquaticum Dodon. putat Dalech. velut equinis fetis, thyrsio lōgo & laui, in aquosis nascentem. Radice sanabat strumas & duritias. Potamogeton aduersatur & crocodilis, itaque secum habent eam, qui venantur illos. Ita Plinius lib. 26. cap. 8.

Potamogeton Galeno 8. simpl. adstringit & refrigerat similiter Polygonum: sed essentia eius crassior, quàm Polygoni est.

Potamogeton officinis ignota est. Nomen autem eius apud Diosc. Limonio tribuitur. Et rursum apud eundem cap. de Trifolio nomen Potamogetonis inuenitur. Herbarum tamen periti eam censent esse, quæ Germani *Samfrait* vocant & *Stehalden*, quod lacus occupet, cuius plures sunt species, de quibus posthac dicemus.

Potamogeton rotundiorij folio.



Potamogeton rotundiorij folio. Potamogeton folia plataginea, pallido virore splendens, nervis secundum longitudinem decurrentibus striata, haud aliter ac Nymphææ aquis innatant, pediculis longis appensa, ex ramis fungosis, teretibus: ad exortum pediculi folij, quod plerumque singulare est, membrana digitum longa apponi-

Nomina
linguarum.

Synonyma.

Locus.

Vires &
usus.

rus, folium id, ac etiam florum caulem involuens: *flor.* Perficariæ aut Bistortæ, purpureæ, centes, in spicam dispositi, pectiolo insident crassitudine cū caulibus pari, quos racematim congesta sequuntur *semina*, rufescentia, latiuscula, in aduncū mucronem leuiter desinentia, medullam albam continentia, Trago copiosa, dura, & folliculis quibusdam inclusa: *radix* capillaris, fibrosa.

Ποταμογετον, quasi fluminibus vicinam dictam perhibet Fuchsius, quod palustribus & aquosis nascatur. Stachitidem verò quasi Spicam, ob caulem, quem floribus & semine spicatum ex se mittit. Alij tamen lat. Fontalem & Fontinalem quoque nominant. Germ. *Stechsal* den & *Santirau*: Belgæ *fonteyncruyt*: Galli *Epis d'eau*: It. *Potamogeto*.

Tragus quartam Algarum facit, & verum *Ποταμογετον* Dioscoridis asserit. Sed & Rob. Constantinus apud Amatum pro genuino Potamogeto hanc pictam exhibuit.

Lobelius in Adu. adscribit Potamogeto Matthioli folia Plantaginis aquaticæ aut Betæ minoræ, aut Perficariæ, diuisiucula: flores Bistortæ aut Perficariæ: radicem flexuoso anfractu excurrentem, ex geniculis multas propagantem fibras, trans aquam fundo immerfas: guttu adstringentem, siccantem. Sed hæc descriptio Lobelij competit potius sequenti Potamogeto, quam Matthiolino. Existimo Lobelio non fuisse notum Potamogetonem eum, aut vtrumque confundere.

Potamogeton t, siue rotundifolium, C. Bauh. pin. Potamogeton, Trago, Matth. Fuch. Anguill. Lac. Lon. Cæf. Cast. Lugd. & Tab. *Potamogeton*, Dod. gall. latifolium, Ger. Potamogeton *λεπιδωλλος*, Thal. Potamogetoni similis rotundiore folio, Cordo in Dioic.

Nascitur in lacustribus & aquosis locis: floret Iunio & Iulio, quo mense & semen maturat.

Ex veteribus antè traditæ sunt vires: Fuchsius ait refrigerare & exsiccare gustum abundè docere: is tamen non docet qualis sit gustus, quod oportebat.

POTAMOGEITONIS SPECIES VARIAE. CAP. VII.

POTAMOGEITON SIVE FONTALIS Perficariæ folio.

Manifesto discrimine à Potamogetone primo secernunt *folia*, Perficariæ foliis similia, nisi essent maiora, venis obliquis & transuersis in marginem à neruo, qui vnicus secundum longitudinem decurrit, ex porrectis, alioqui etiam non ita sunt obtusa, sed in acumen desinentia, & pro loci situ nonnunquam hirsuta: aquis plurimum innatantia *pediculo* scissuralia aut sextantalia, ex *caulium* geniculis orto: inter quæ palmo sæpè breuior *pediculus* exit in spicam congestos *foliuculos* Perficariæ gerens ex albo rubentes.

Dod. in fol. lat. sub antè dictis Potamogeti nominibus eandem penè descriptionem, quam in fol. gall. habet: verum icon plurimum differt: folia non sunt similia Plantagini, vt olim in hist. gall. scribebat, sed Perficariæ: quare suspicor non bene eiotam, quam in fol. gall. exhibebat. Lobelium autem hunc cum precedente confundere antè diximus.

C. Bauh. pin. Potamogeton 2. siue Salicis folio: Phyllitis lacustris, Cordo hist. Potamogeton Tom. III.

Dod. Potamogeton, siue Fontalis & Spicata, Lob. in Adu. Obs. & Ic. Potamogeton 2. Dalechampij, Hist. Lugd. Potamogeton *ιτιόφυλλος*, Thal. Potamogeton angustifolium, Tabern. & Ger.

Reperitur in paludibus, lacubus, vrbium fossis, & aliis stagnantibus aquis, non rarè etiam in riualis, autè fluentibus: vbique frequens: flores conspicui sunt Augusto aut Septembri, Dodon. Montbelgardi in Itagnis floret Maio.

Locus & Tempus.

FONTINALIS LVCENS MAIOR.



Descriptio.

Fontinalis lucens maior, aquis innatans, in longos ramos deducitur, in varios rursum ramulos subdividendos: *folia* alternositu non aduerso ex breuib. latis pediculis, longiora quam Potamogetonis, angustioraque, tota lucida, neruo medium percurrente: quò in latus tenues vtrunque fibre

disseminantur: ad singulorum foliorum minus, appositum longiusculum, aliquouque *caulem* amplectens. Gesnerus vocabat Vuam aquaticam. Tiguri reperti in fartenstet mense Maio: Montbelgardi in Dubio flumine.

Locus & Tempus.

FONTALIS MEDIA LVCENS.



Descriptio.

Fontinalem mediam lucentem voco herbulam aquis innatantem, cui ex tenuibus radiculis *rami* multi, imbecilles, pedales, densè geniculati: *folia* per genicula, bina sibi correspondentia, oblonga, in acumen desinentia, viridia & pellucida: *flores* ex pediculo vno aliquot parui simul iuncti formæ & colore quodammodo Moschatellæ Cordi, quibus succedunt *semina* similiter conferta, parua, centorta, vt

Meliloti vulgaris, cui quodammodo similia. Clus. hist. vocat Tribuli aquatici minoris speciem alteram.

Tribuli aquatici minoris speciem alteram. Clus.

Locus &
Tempus.

Florat & semen profert Genevæ mense Junio, in riualis iuxta Rhodanum versus castellum *la Bastie*. Eadem etiam provenit iuxta Dubin Mompelgardii, quæ itur *Clermaux*. Clusius videbat apud Eberstorf arcem in lacunis, secundum purissimæ aquæ riuos decurrentes nascentem.

FONTINALIS CRISPA.

Descriptio.



Fontinalis crispa, similis Fontinali nostræ mediæ nisi quod maior: folia longiora, quadrantalia ferè, non ita crebra, crispa, aspera, in ambitu dentata, ex appposito sita, lucida: flos herbacei, parvi, verrucosi, ex pediculis sextante longioribus: tota planta insipido gustu natales suos refert: semina

ramorum extremis hærent racematim coherentia, angulosa, acuminata, modicè recurva.

Hanc Clusius in pann. p. 714. & hist. Tribulum aquaticum minorem vocat.

Alga secunda, Trago.

Trago dicitur Alga secunda, in fluentibus quidem aquis nascens, piscinis tamen & stagnantibus familiarior, quæ quibuldam in locis deuoranda decoquitur. Hanc sub Fuco seu Alga marina Diotcoridis comprehensam iudicat, deque ea egisse Theophrastum lib. 4. cap. 7. ubi inter cetera, aquaticas plantas vulgarissimas Gramini similes esse calamis & caulibus asserit.

Lobelius in 1c. pag. 286. Pusillum fontis Lapathum inserbit, ut in Adv. ubi & Lapathium tenellum vocat.

Synonyma.

C. Bauh. pin. Potamogeton 6. siue foliis crispis, seu Lactuca tanacetum: Potamogeton εὐφροδίων, seu crispum, seu fimbriatum, Thallio. An Alga Hydrolapathi folio, Gefn. coll.

Locus &
Tempus.

Florat Iunio in fluuiis Alant circa Mompelgardum: atque in variorum urbium & arcium fossis inuenitur, Iunij initio florens.

Potamogeton altera Dodonai.

Descriptio.

Compluribus tenuibus ac teretibus cauliculis luxuriat, in alas subinde distributis: folia huic sunt lata, oblonga, acuminata, multo quam prioris [Perficariæ folio] minora: è sinu ramulorum ac foliorum pediculi subinde prodeunt, in quibus spica breuis, flosculos proferens candicantes, mucosos: ac dein semina plana, rotunda veluti Aphaces: radix fibrosa fundo adhæret.

Synonyma.

Dodon in fol. lat. Potamogeton, siue spicata altera. C. Bauh. pin. Potamogeton 4. siue foliis latis splendentibus. Potamogeton μαλακόφυλλος, Thallio, cui maior & minor species.

Locus.

Tota sub vndis nascitur, eminente tantum-



Fontalis minor lucens.



Potamogeton racemosum angustifolium.

Radice est capillacea, rufescente, cauliculis tenuissimis, palmaribus, in aqua fluentibus foliis angustis, longis, binis ex opposito respondentibus: aliquibus in ambitu leuiter sinuatis, aliquibus minimè sinuosis: perispermio tenui, breuique, flosculi pusilli, vix in morem congesti, insident, quibus grana aculeata, simul iuncta, succedunt.

Autori C. Bauh. prod. Potamogeton 1. Eid. Syn. pin. Potamogeton 7. siue ramosum [legendum ut ex descriptione patet, racemosum] angustifolium: Tribuli aquatici minimi nomine à D. Franco misum, ex Lusitania. Idem prope Mompelium, ad molendinum in aqua fluitans reperitur.

Potamogeton gramineum ramosum.

Ex cauliculo pedali, etiam cubitali tenuissimo, Descriptio. rotundo, albicante, in plures alas brachiato, folia graminea, oblonga, atro-virentia, non alternatim,

modò cacumine, sed in aquis haud profundis & dulcibus, quæ tamen maritimo æstu attolluntur: veluti in sinu illo, qui à Dordraci Hollandiæ ciuitate, ad Bredam Brabantii ciuitatem patet.

alternatim, sed multum ab invicem distita, prodeunt, quæ in alia folia, ferè capillacea, abeunt, nihilominus tamen ex primi folij ala, cauliculus in similia folia abiens, exurgit in extremo caulis pediculus triuncialis, *fl. foliis* minutos, & granula subsequentiâ minuta & subsæpera, nõ racemi modo, sed magis & velut in spica, dispersa, sustinet.

C. Bauh. authori prod. Potamogeton 1. Eid. pin. Potamogeton 8. siue gramineum ramosum: Fontilapathi graminei nomine, à D. Bursero, ex Austria missum, vbi in paludibus fluitat.

Potamogeton minimum capillaceo folio.

Hoc paruum est capillaceo & caule & foliis oblongis, inordinatè dispositis, pallidè virentibus: in summo pedicello paruo, modò vno, modò duobus, capitulum minimum & acuminatum, prioris tamen formâ, quod minutissimo *stipula* pallidulo successit, sustinens, quorum aliud quasi vesiculæ foliaceæ in acumen desinentis, inclusum est.

Descriptori C. Bauh. dicitur in prod. Potamogeton 3. Eid. pin. Potamogeton 9. siue minimum capillaceo folio. Hoc cum sequenti, Montpelio D. Bursero attulit.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis.

Hoc *cauliculus* est palmari, pilo non crassiore, ramoso, articulado, ad quem libet articulum: folia bina, oblonga, quovis pilo tenuiora, ex aducto respondentia: quorum alis, minutissimi *stipula*, palliduli insident, quæ iuncti, nodulum quasi referunt, quo maturato, nodulus siue capitulum, ex tribus portiunculis semicircularibus in apicem abeuntibus & rufescentibus compositum conspicitur: nihilominus tamen ex priorum foliorum alijs, pedicellus exurgit, qui in tria, ac etiam plura foliola absumitur, similisque in medio nodulus adponitur, in summitate namque capitulum nullum est.

C. Bauh. prod. Potamogeton 4. Eid. pin. Potamogeton 10. siue capillaceum, capitulis ad alas, trifidis.

FLUVIALIS PISANA, FOLIIS denticulatis. CAP. VII.

Ramuli molles quaquaversû sparsi, ac variè diuicari in aquis fluitant. Distincti sunt geniculis foliorum oppositorum, quæ imâ parte latiuscula, extrema angustissima, vtrinque eleganter serrata, vel denticulata, vbi quoque densiore stipata hærent: ad foliorum cõmissuras, & veluti



Tom. III.

PERSICARIA MITIS.

CAP. VIII.



Foliorum, quæ habet ista, cum Persicæ arboris foliis similitudo, nomen ei apud Latinos fecit: sût enim illis similiter oblonga, acuminata, similique venarum discursu prædita, sed subhirsuta, & interdum liuidâ maculâ notata, vnde maculosa cognomen, sapore adstringente acerbo: *caules*

teretes, tubentes, ramosi, geniculati: *flores* in racemulis Bistortæ æmuli, colore purpurascetes; vel albo: semen fuscum, latum, lubricum: *radix* tenuis, obliqua, lignosa & fractu contumax.

Non clam Fuchium est quàm variè à multis diuinatum sit, quo nomine Persicaria vocata veteribus sit. Sed eius quidem sententiâ omnes decepti sunt, nec ipsi constat nû à veterib. descripta sit. Vulgus herbariorum vno consensu Persicariam nominat. Germ. *Versickerkraut* & *Versickerkraut*. e. Pulicariam: Belge *Versickerkraut*. *Versickerkraut*. & *Moerkrans*: Galli *Persicaria*, & *Culrage*: Nomencl. pann. Bolyha fid, Keleren fid.

Fuchius porrò Persicariæ maculam nõ denegat, sed ei saporem admodum adstringentem, aliter ac Dodonæus, adscribit, qui vt plurimum saporem nullum manifestum habere ait, & præterea maculâ differentem facit ab Hydropipere, in quo contra Tragum maculam negat.

Loeb. in Obs. Persicariæ plures species assignat, sc. Persicariam floribus albis Antuerpiensem, & aliam pusillam repentem, flosculis alijs candidis, alijs purpurantibus: tertiam in agro Neruiensi, multò maiorem, foliis hirsutis, gustu acerbis, floribus albis, aut purpureis. Hanc quosdam Britanniam appositè dicere scribit.

Pulicaria femina dicitur Bräsel. tom. 1. thapf. 3. Persicaria femina, Eid. in 4. pag. 155. & Lön. Persicaria, Fuchf. Dodon. Anguill. Cast. Persicaria altera Trag. Matth. Tab. Persicaria maculata, Eur. Cordo. & Ger. Persicaria maculis nigris, Gesn. hort. Persicaria mitis maculo-

Nomina linguarum.

In sapore dissentit Fuchius à Dod.

Persicaria plures species Loe.

Synonyma.

fa, Lob. Icon. pag. 35. Persicaria prima, Britannica Plinii, Cæf. Cratægonum, Lacunæ. Persicaria Matthioli, H. Lugd. pag. 104. Persicaria pusilla Lobelii, Eid. quam ait in Antæcipia agri glaucos foliolisque vdis quadruplè minorem hami repere, reliquâ facie illi similem.

C. Bauh.
nos.

C. Bauh. phyt. Hydropiper 2. siue Persicaria mitis : Eid. pin. Hydropiper 1. seu Persicaria mitis maculosa, & non maculosa : Lappathum quorundam. Eid. phyt. Hydropiper 3. [4. pin.] siue Persicaria minor : Pulicaria pumila, Tabern. Cur separat hanc, quæ magnitudine tantum differt.

Locus.

Reperitur similibus, & sæpe iisdem quibus Hydropiper locis, floretque eodem tempore.

Vires

Sapore acris non est, sed subacidum quippiam relipit, quare frigido siccitque est temperamento. Ob id inflammationibus incipientibus & recentibus vulneribus fertur prodelle imposita. Podagricis utilis habetur.

PERSICARIA ACRIS SIVE

Hydropiper.

Descriptio.

C. A. P. IX.



Qui Persicaria nobis descriptam nouerit, idem Hydropiper nouerit : radix persimilis : folia Persicæ, maculosa & non maculosa : flores spicati, albi vel rubri : semen latiusculum, nigricans : Sapor verò nō, ut illi, acerbus & adstringens, sed Piperis instar acris, tum foliis, tum semine.

Dioscoridi

Hydropiper (ὑδροπύπερον, id est, aquaticum Piper, quod à loco & sapore nomen habet) apud aquas maximè stagnantes lenitèrue fluentes gignitur. Caulem edit geniculatum ac solidum, circa quem alarum sunt concavitates, ac folia Menthæ similia, sed maiora, delicatiora, candidioraque, gustu acris Piperis modo, citra tamen vllam odoris gratiam. Fructum verò gerit in furculis paruis prope folia erumpentem, & racematim coherentem, qui & ipse acris est. Ceterum, radicem habet paruum, nullius in medicina vtilis.

Persicaria
fœmina tri-
plex varia-
tas, Trago.

À Trago Persicariæ fœminæ titulo pingitur proque Primo Persicariæ genere describitur. Tres autem coloris florum ratione species constituit. Aut enim flores esse in quibusdam ex roseo rubicantes, alios colore Breslici præditos, nonnullos candidos. Hanc autem plantam iure Piperitin vocari posse, ob insignem suam acrimoniam, plus linguam vellicantem, quàm vel Piper, vel Aron : Dioscoridem tamen pro Piperis aquatico descriptissile, & Latinos quosdam Persi-

cariam, ob foliorum, quam cum Persca arbore habent, similitudinem, & Herbam S. Mariæ vocasse : lac. Manlium, Sanguinem Christi : Aucennam lib. 2. cap. 748. Zinziber caninum. Esse autem hæc propria illius nomina, Persicariam, Molybdenam, Maculatam & Plumbaginem. Germanos porò Rappi & Rioschtrait, id est, Pulicarem herbam, quod pulices abigat, vocare : posse & Ruckentrail, id est, Muscarum herbam appellari, quod expellendis muscis, vix quicquid efficacius reperias. Si quidem quæcunque in periculis vulnera vel vlcera huius succo oblita fuerint, ea ab iniuria muscarum tuta maneant, etiam feruentissimâ Æstate. Idem Tragus aliud Persicariæ tradit genus, quod à priore distinguit solo sapore, quem huic postremo non adeo acrem attribuit, ut linguam mordicet, sed subacidum quale Acetosa. Huius autem radicem per terram serpendo se propagantem, hortis & agris frumentariis, magnum ait afferre damnum. Esse verò quosdam subdit qui alterum hoc Persicariæ genus, in hortis & agris nascens, Cratægonon & Theligonon velint. Qua de re Ruellium l. 3. c. 64. consulendū suadet : ubi is ab Hippocrate Polycriton, & à valgo Gallorum Curaginem dici testatur. Sed tum Ruellius, tum Tragus satis intricatè tradere videntur historiam Persicariarum, ut patet ex superioribus, & potissimum si quis vtriusque capita legat. In Trago porò figura vna superflua est, si plantæ sapore tantum differunt.

Dodon. de frum. vnam eandemque imaginem pro Persicaria & Hydropipere exhibet, aliter quàm in fol. lat. Matthioli eorum opinionem haud censet approbandam, qui putant Cratægonon esse quandam Persicariæ vocatæ speciem, quod Persicaria nullis ferè notis Cratægonum æmulari videatur : contra quàm sentiat Tur-nerus.

Ceterum, non desunt qui hanc plantam germ. N. faurensstigel. & N. faurensstigel. h. e. P. aonū speculum, à maculis, quibus est notata, nominent.

Malè autem à Theod. Dorsthenio Hydropiperi est apposita icon Anagallidis aquaticæ, quam Beccapungam vocant : non placet etiam ab ipso Piper montanum appellari.

Persicaria 2. [1. phyt.] siue vrens, & Hydropiper, C. Bauh. pin. Persicaria mascula, Brunfels. tom. 2. rhap. 4. Persicaria mas, Lon. Persicaria 1. genus, Trago & Tabern. Hydropiper, Fulch. Aug. Dodon. Matth. Cordo in Diosc. Lac. Cast. Cæf. & Gerardo. Hydropiper Matthioli, H. Lugd. pag. 1038. Cratægonon, Anguill. Persicaria mordax, Thal. & Eur. Cordo, cui & Piperitis, Plinio Siliquastrum dicta. Hydropiperi, & Persicaria hydropiper, Lob. Ic. pag. 35. Eid. in Obs. p. 171. Persicaria vrens, Hydropiper & Cratægonum Cordi : germ. wasser Pfeffer : belg. waterpeper : gall. Cultrage : Angl. Rarmirthe : It. Peppo aquatica : Hisp. Pimiema aquatica.

Nascitur locis palustribus, in fossis & scrobibus, hybernis mensibus aquas habentibus, & iuxta stagnantes aquas. Iulio verò & Augusto potissimum floret.

Facultatem habet euidenter calidam & siccam : non tamen, Dodonæo teste, uti Galenus affirmat, tam calidam quàm Piper. Vim autem habent folia, autore Dioscoride, cum semine imposita ædemata veterique duritias discutiendi, & sub oculis

loculis sagittata emendandi. Siccata verò & tusa, sali & obseis pro pipere admiscetur.

COTYLEDON AQUATICA.

CAP. X.

Descrip-
tio.

Folij pelratis vncialibus rotundis, per marginem obiter incisus, inferitur in ipsam umbilicam (vnde in oras radiarum nervi excutunt) pediculus palmatis, tenellus, è coliculis & ramis, adeoque & ipsis perplexis capillaribus radiculis enatus, indiditque & ramulorum diuersionibus vnciales pediculi exeunt, glomeratum sustinentes singuli caputulum, Ranunculi aquatici, foliis præcedunt non multum absumptis hinc acriculus Striatus.

Synon.

Lob. in Adu. Obs. p. 209. & Ic. p. 387. aquatica Cotyledon acris Septentrionalium, an Calenche Plinij? Cordo in Diosc. Cotyledonis, quæ Cimbabion Scitalion, Acetabulum & Umbilicum verneris vocant, nomine, herba à quibusdam indicata, sed plurimum ab Acetabuli descriptione differens. Dod. gall. Cotyledon aquatica, Pennineæ Belgarum: Eid. in fol. lat. Cotyledon palustris.

An Turn. Cotyledon altera in palustribus nascitur?

C. Bauh. phyt. Cotyledon 2. siue palustris: Eid. pin. Ranunculus palustris 4. siue Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio, Ranuncul. aquat. umbilicato folio. Ccl.

Locus &
Tempus.

Palustribus locis inuenitur, & præsertim humidioribus, & quæ frequentius hybernis mensibus rigantur. Iulio mense apud Belgas cum flore repetitur ait Dodonæus.

RANUNCULVS AQUATILIS ALBVS.

Tenuifolius.

CAP. XI.

Descrip-
tio.



tata, satis crassa, subrotunda, in aliquot partes diuisa, sed non profundè: flores satis frequentes, explicante se capitulo folijs videntibus obnoluto, apparent candidi, Violæ aquaticæ, vel Ranunculi, apicibus multis in tuberculum ranunculosam congestis, mediocris occupantibus: foliola octo obseruauimus in planta, ex qua facta nostra pictura.

Dodonæus inscribit Ranunculum aquaticum, Tom. III.

vocatque etiam Polyanthemum aquaticum, ac subdipharmacopæorum & herbariorum plerisque Hepaticam aquaticam & Hepaticam albam, perperam appellare.

Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie Lobelij in Obs. p. 491. & Ic. tom. 2. p. 35. Ranunculus fluuiatilis, Hepatica fluuiatilis, & Polyanthemum aquaticum Tabern. Ab H. Lugd. p. 1021. pingitur huius imago inscriptione Hepaticæ aquaticæ & palustris.

Isst. herbariorum.

C. Bauh. phyt. Ranunculus 15. siue aquaticus folio integro & capillaceo. Eid. pin. Ranunculus palustris 5. siue Ranunc. aquaticus folio rotundo & capillaceo: Polyanthemum palustre aut aquaticum, Dod. gall. Ranunculus tertius, Gesner. hort. Ranuncul. aquaticus, Ger. Ranunculus in aquis nascens folio parum scisso, Ccl. Hepatica palustris, Thal. De hoc ait: In nostro duplicia folia obseruantur, quæ sub aqua multifida, capillacea, quæ extra aquam rotunda & crenata.

Synon. C. Bauh. hini

In fossis aquas habentibus & lentè decurrentibus riuis: nec non iuxta eandem ripas, ac alijs locis humentibus gignitur. Aprilis, Maio & subinde Iunia mensibus abundè & late florere. Abunda in flumini Necari glareosis, ubi aqua non profunda, inter Heidelbergam & Neckergrunde: vt & in alijs etiam aquis fluentibus, vt Mæno, & in Ducatus Burgundici, Sene.

Calida herba est Ranunculorum modo, non ita tamen vrens. Eius autem nullus medicus vsus est, nisi quod ab ignavis quibusdam, magno quidem errore, Hepaticæ albæ loco, medicamentis hepares refrigerantibus miscetur, teste Dodonæo, & Tabern.

Vires

RANUNCULVS AQUATILIS OMNINO



In hoc nulla foliorum differentia vt in Hepaticæ aquatica: siquidem omnia inter se similia, tenacibus illis duntaxat Hepaticæ folijs proxima, ceteroqui tam florere candidi, capitula acerola continent.

Descrip-
tio.

Tragus pro primò Alcegenere describit, Algamque primam facit, vocans germ. generali quidem

Alga-
go.

vocabulo Samkraus. Iudicat autem & hanc sub Furo marino. Dissolens esse comp. rheumatis, de râque egisse Theophrastum lib. 4. cap. 7. ubi inter ceteras aquaticas plantas vulgissimas Gramini simile esse calamis & caulis, asserit.

Dod. gal. huius meminit nomine Polyanthemum omnino tenuifolij, sine latioribus folijs. An Gesn. col. ut Ranunculus p. 1021. Ranunc. minimum folijs minimis multifidis vt in Corul.

not. an-
not. sel:

Yyy

Ranunculus Chamæmeli folijs, rara herba & caustica, locis peritib. 2.

Syn. C. B.

C. Bauh. phyt. Millefolium 4. siue aquaticum Ranunculi capitulo. *Eid. pin.* Millefolium aquaticum 6 siue folijs Abrotani, Ranunculi flore & capitulo: Alga: Triglo: Alga palustris & flouiatilis, Gesn. coll. Millefolium maratryphyllon. 3. flore & semine Ranunculi aquatici Hepaticæ facie, Lobel. Ins. p. 79. & Gerardi: Millefolium aquaticum flore albo, Clut. hist. Millefolium retitum, Oucisfachs, Wasserfachs, Schvv. Fœniculum aquaticum, Wasserfuchel, Tabern. Ranunculus tritophyllon aquaticus in medio luteus vel, Ranunc. aquat. fœniculaceus *replegarden*, Colm.

Locus. & Tempus.

Prope riuiolos habitat: degit & interdum in ipsis: necnon etiam ad riuos fluminum: florēt April, Maio & Iunio mensibus.

Utes


Triagus Algam suam naturā frigidam ait, idcircoque non in iō sunt endam, sed podagricis & calidis uti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

RANUNCULO SIVE POLYANTHEMO

aquatili albo, siue Millefolium maratryphyllon dictus.

C A P. XII.

scrip.



L Oag-
fissimilis, in aliquot partes diuisis, teretibus, leuibus, inanius flagellis rotundis, aquæ metum, cuius est alumina plasmimitatur: fortis ad geniculatæ Fœniculi, vel potius Peuce-lani, multo longioribus, & quam Hepaticæ aquaticæ Dodonæi tenui folio, in pauciores partes diuisis: ex hisdem etiam articulis surgit

pediculi concaui, quibus insident flores Ranunculi, lactei, quinque foliolis striatis constantes, apicibus in medio luteis: quibus succedunt capitula consimiliter Ranunculi, viridantia, echinata.

An Fœnicu. cu. aquat. H. Lugd.

An H. Lugd. p. 1023. Fœniculus aquaticus? Huc C. Bauh. ad Millefolium maratryphyllum palustre alterum Lobelij refert, dicens figuram eius esse imperfectam.

Fluitans abundat in flauio Mompelgardensi Alant dios, & in Dabi: florēt Maio & Iunio.

RANUNCVLVS HEDERACEVS RIVVLO-
rum, sed extendens, atra macula notatus.

C A P. XIII.

scrip.

E St cauliculis multis, humi iacentibus, & serpen-
tibus, rotundis, radículas exiles & præ-



nues, & nodulis quibodā emittentibus, folijs multis, paruis, Hederæ similibus: quā mobiem Hederaceus cognominatur. atra macula notatis, pediculis brevissimis, ad quorum floris conceptus emergit, granulis tuberosos, oblongus: flore luteo, Ranunculis alijs simili. Sapore

acer est feruidus.

H. Lugd. p. 1021. Ranunculus hederaceus Dalechampi. C. Bauh. phyt. Ranunculus 34. *Eid. pin.* Ranunc. palustris 3. siue Ranunc. aquaticus hederaceus luteus.

Synon:

Nascitur in riuiolis & fluentis fonticulorum, locis fabulosis & macris.

Logus:

MILLEFOLIUM AQUATICVM, DICTVM

Viola aquatica.

C A P. XIV.

Descript.

V iolam aquaticam vocant aquarum amasiam plantam, cui radices longæ subinde obliquo actu se propagant sesqui palmares, & quibus orti pediculi trium quatuorve vnciarum, foliolorum pinnatim adnexis segmentis vncialibus, angustis: caulis rectus, inanis, striatus, geniculis aliquot perianthia nodosus, ad quorum vnumquodque quinti, aut seni verticillatim nascuntur flores pulchri, maiusculi, Leucoijs similes quinque folijs albis, apicibus in medio luteis, constantes, pediculis vncialibus & sesuncialibus hærentes. [Dodonati:] florem calycis vice obuallant foliola oblonga, viridia: ipsique pediculis apposita foliola aliquot longiora acuta radiata. Tota herba, autore Dodonæo, ante caulis prouentum, sub aquis conditur, atque tunc ei innatans nouella videtur Abies: caulis verò ubi excreuerit vnâ cum floribus superficiem superat, ac supra aquas eminet.

Myriophyllum alterum vocat Matth. in Diosc. & Epit. Camer. id non describens, sed Dioscoridi attribuens, quod tamen asserere nolum.

Matth. notatur

Dodon. in fol. lat. inscribit Violam aquaticam, vocans Belg. *vvater Violieren*, German. *vvasser Veiel*: Gall. verò *Gyrosflees d'eau*. Testatur idem Matthiolum Myriophylli speciem facere, tamen cum descriptione eius parum conuenire dicat. Nec enim caule esse ait singulari, nec radice vnicâ, quale Myriophyllum à Dioscoride describitur.

C. Bauh. phyt. Millefolium 12. seu Viola aquatica latiore folio: *Eid. pin.* Millefolium aquaticum 4. siue Viola aquatica caule nudo: an Potamogeton Castoris apud Pliniū l. 26. c. 5. Schvvencckf. Millefolium palustre secundum: Myriophyllum alterum, Matth. Lac. & H. Lugd. Myriophyllum, Caf.

Synon:

Cef. Myriophyllum equisetifolium fluviatile, Lob. in Adv. & Obf. p. 460. Statiores fluviatilis, Gese. hort. Viola palustris, Gerar. Fœniculum aquaticum & Tabern. German. *Uvasjer fenckel*.

Locus & Tempus. Aquarum residuum & rivulorum vadibus innascitur lubens: Alibi etiam, ut apud Belgas frequens in lacubus occurrit, & aquis stagnantibus, aut pigris. Floribus: prodiit iunio flores.

Vire. Et frigidam & siccam facultatem habere videtur Dodonæo.

Millefolium aquaticum, dictum Viola aquatica, secundum.

Synonyma. Vnt qui cum priore idem velint, ac illud foliatiore, hoc vero angustiore multo est.

Inscribitur à Lob. in Obf. belg. p. 966. & Icon. Plant. 790. Myrio; hyllum equisetifolium palustre, A. D. ad in fol. lat. Viola aquatilis altera Icon. Ab H. Lugd. Viola palustris.

Cef. Bauh. phyt. Millefolium 13. seu Viola aquatica altera: Eid. pin. Millefolium aquaticum 5. siue equisetifolium caule nudo.

Millefolium pennatum aquaticum.

Descriptio. Longis præditum est caulibus & fungosis, internodiis satis crebris interceptis, ad quorum nodos quinque aut plura folia circumposita tenerrima, pulcherrimè cristata, & plumas avium imitata: spicam Equiseti capitulo similem habet. C. Bauhin. est in phyt. Millefolium 16. In pin. Millefolium aquaticum 8. siue pennarum spicarum. Trago est Alga tertia, vel Alga Virgilij. An Myriophyllum vel Martiophyllum palustre, Lobelico? An Millefolium aquat. Martihol? Millefol. pa-



lustre spicatum. Schvv.

Obs. Observavi ego Genevæ in lacubus circa sodochium: postea etiam inter Mompelgardum & pontem Vauiaucourt & Dubim, ac prope urbem & præterea juxta Bessfordiam, florentem mense Maio. Alga, Trago nascitur in piscinis & stagnantibus aquis, humo limosa & forti. Iudicatur planta terreæ substantiæ & Saturnia planè.

MILLEFOLIUM AQUATICUM minus.

LÀ se fundentibus scapulis præditum est, qui rotundi, virides, frequentibusque nodis intercepti sunt, è quibus tenues, capillaceæque fibras spargit, quibus telluri inhaerent: superior scaporum pars palmum supra aquas eminet, quam ad singulos nodos quinque tenuium parvisque foliolis Tom. III.

præditorum foliorum alas ambiunt, vix vnciam longæ, virides admodum quæ sensim circa scaporum summitatem minuantur, sic ut in pyramidalem quasi formam scapi definant, qui tunc facit stigmatotidem *flosculos*, quorum foliorum alas in singulis nodis ferunt, pusillos valde, ostioris caudis dis foliolis simul junctis, nec sese explicantibus;



præditos, quæ deinde in quadam tubercula quatuor radios in capite habentia transcurrent.

Cuius descriptionis auctori dicitur in panno. 711. & histor. Myriophyllum aquaticum minus. C. Bauhin. phyt. Millefolium 11. siue equatillum minus. Eid. pin. Millefolium aquaticum 3. siue flosculis ad foliorum nodos. Vulgare admodum est in Pan-

nonie. Austriæ, vicinarumque provinciarum lacubus, secundum rivus sitis, nec profundis. Flore & semine onusta conspiciebat author hanc plantam mense iunio.

MILLEFOLIUM AQUATICUM flore luteo galericulato.

Tenuissimis filamentis totum est contextum, usque ferè indigestis, appetis hinc inde crebris emblematis orbicularibus, Lenticulam a-

Descriptio.

quaticam amulantibus: caulis tenuis, dodrantalis, nudus, in ramulos aliquot parte superiore divisus, flores gerit luteos, maiusculos, cucullum referentes.

C. Bauhin. Synon.

phyt. Millefolium 17. siue aquaticum lenticulatum luteum: Eid. pin. Millefolium aquat. n. siue lenticularum: Lenticularia, & Meon aquaticum, Gese. coll. Millefolium aquat. flore luteo galericulato, Lobel. hist. Belg. p. 967. & Icon. p. 791. Fœniculum aquat. galericulatum, Tabern.

Vocaui autem (inquit C. Bauh.) lenticularum, quia vesiculæ parvæ lenticulares, non tantum vitæ foliorum parti adherent, sed in finitæ omnibus foliorum partibus subijciuntur, quod ta-

Xyyy

Aduers. Sunt etiam qui Lentem lacustrem, Lentem aquaticam, seu aquatilem, & Lentem viperalem appellant, aliqui quoque Lentiginem & Muscum palustrem.

Vocatur denique inter Dioscoridis nomina etiam *παρὰ δ' ὅτι*, hoc est, Lens siluestris, seu agrestis, ad differentiam sc. Lenticulæ sativæ, Epipetron [Epipetron, ab Aristotele lib. 2. de plant. appellari ait Getn in cat.] Viperata [Bipetralis Trago,] & Icofmgtonos.

Atao, vt Serapion, Tabach, seu Thalet. Germ. Meer, & Wasserlinsen: Belg. Waterlinsen. sed frequentius, Eodengmen, hoc est, Anatum herbam, quod videlicet eam anates palcantur. Gall. Lenticille de mer, Lenticille d'eau. Italic. Lente da paludi. Hispanicè, Lenteja del lago, & Lenticias de agua. Angl. Dryckment, Du les male. Hung. Bekalencbe, hoc est. Ranz lens. Beh. Kaza, aut Okchky.

Sunt qui putant Ipnum plantam Orchomeni lacu, à Theophrasto lib. 4. cap. 11. hinc, propositam, Lentem palustrem esse, & ab ipso, siue à Bræotis sic nuncupatam, quod familiaris è camino furnove euolantibus similis sit: nam *in voc* caminum furnove signi fiat, conjectura, vt aiunt, eò probabiliore, quod nusquam aliquam hujus Lenticule herbæ frequenter notissimæque meminerit Theophrastus.

In lacubus, & stagnis, alii que non decurrentibus aut fluentibus aquis, vt vibrum fossis, innatans & late sæpe superficiem earum occupans reperitur. Hæc si (quod nonnunquam accidit) aquarum inundationibus à pigris aquis influentes transferatur, cum litoribus inhaerit, mirum in modum propagatur: nam sobnatis quibudam capillamentis, quæ radicum vice esse videntur, sese terræ alligat, atque ita adolescens tandem crescit, in plantam aquatico Silymbrio haud dissimilem. Id quod naturæ operum indagator Dalechampius non sine admiratione obseruauit. Vis est ei authoribus Dioscoride, Plinio, & Galeno refrigerans. Quare omnibus inflammationibus, ignibus factis, & podagris conuenit, tum per se, tum cum polenta impasta. Agglutinat etiam in pueris hernias intestinorum. Magis facit quidam, vt tradit Matthiolus, pumilæ hujus plantulæ stillatissimam aquam ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres. Quinetiam eandem præferunt ad oculorum ruborem & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum & testiculorum collectiones antequam augeantur: nam illita non obsecutæ fluentes humores repellit. Herba ipsa recens ex aquis allata, & fronti adhibita, capitis dolores mulcet, qui à calore prouenerint. Vescuntur ea anates magnâ volupate, vt etiam gallinæ cum aquis exempta sursumbus permiscetur.

LENS PALVSTRIS QVADRIFOLIA.

Fibrosis radiculis nectitur ex crassiore alia (licet eâ tamen tenui) transversa demissis: unde propagantur, rami multi, multifariam diuisi, atque tum ex istis, tum ex radicibus pediculi ad aquæ superficiem pertingentes, quorum singulorū extremis adherent aquæ innatantia quaterna folia, triquetra, per extremum lata, angulis acutioribus ad pediculum coequantibus, circa verò ramulorum diuersiones pediculorumque exortus numerosa femuncialibus pediculis nixa coherent gratia.

Tom. III.

na nigra, dura. Lentibus majoribus paria.

Hujus plantæ Compiler, H. Lugdunenſis Icones
duas, & picturas
& descriptiones
Lugd.



Lenticulæ alterum genus, Cæsalp.

In lacubus itaque, siue agri S. gusani limpido aliquem trodam ex optenibus nascitur. Copiosa quoque in Altariæ fossis, via illâ quæ Argentorato ad domum & pontem vedigalis itur.

LENS PALVSTRIS PATAVINA.

Adynam costam longiusculam adnascuntur utrinque in alæ modum, folia denso agmine mutuo se plurimum, tangencia, ex oblongo rotunda, semuncialia, superius stigmatibus notata, inferius musco obdacta.



res, radicum vicem gerunt.

C. Bauhino sub folijs subrotundis copiose lenticulæ, aliquando singulæ, aliquando ternæ, & quaternæ, rugoso præterui cortice donatæ adherent, quibus semen copiosissimum, minutissimum & fluescens includitur. Sapore aqueo constat.

C. Bauh. phyt. Lens palustris; Eid. prod. Lenticula palustris 4. (s. in pin.) siue latifolia punctata: in fossis Patavinis aquis supernatans, & in Silesia circa Vratislauiam. Pisis in Aueni fluuio quasi stagnante, qui aquas thermæ ex monte

Yyy 3



crassiorib. lyrarū fidibus, aut longis lombri-
cis perfoliatis, quæ ab ipso
folia promen-
te, breui capite
descendentes,
aquæ fundum
petunt, quem
tamē rariū as-
sequuntur. Ex-
eunt ab eodem
et aliq oblique
fibræ quib. ubi
Ranz mortuus
multiplicatur.
C Bauh pin.

Aloë 4. siue pa-
lustris: Planta
foliis Aloës,
quæ Stratiotes

non est, Anquill. Stratiotes siue Militaris aizoi-
des, Lob. in Adu. & Ic. p. 375. Stratiotes aquatica
H. Lugd. pag. 1061. Nam reperitur in stagnantium
aquarum lacubus & fossis vel pigre fluentibus,
maxima foliorum parte vna cum floribus aquas
superante, reliquis ipsius stirpis partibus sub
aquis conditis, unde cognomen inditum.
Ionio, Iulio & subinde Augusto Mores.

Cæterum, fibræ, quæ pro radicibus habet, sce-
lerati agyriæ in aqua plena phiala, quod maiores
apparent, mulierculis ostentatis impudenter
mentuntur vermes esse, quos medicamentis suis
ex intestinis eduxerint, teste Dodonæo. Facul-
tatem habet refrigerandi & siccandi.

STRATIOTES ÆGYPTIA.

CAP. XXI.



Propè Pe-
lusiū, nunc
Damiatim vo-
catum, Ægy-
pti ciuitatem,
quam Nilus
perterrens
largius inun-
dat, & ad li-
bitum irrigat,
in fossis, aquā
dictis fluminis
decurrente
plenis, hæc
herba copio-
sè provenit,
aquæ Lenti-
culæ poslostris
modo super-
nataus, sine
caule, folijs
Cynoglossi,

breuioribus, latoribus, densioribus, den-
tioribus, hinc latoribus, quæ ac albidioribus, quibus pro ra-
dicibus exigua ac rara quædam lanugo pender.
Quæ planta majori, Sedo est similis. Eam appel-
lant Hayh. lem ei n. aut, quæ dixerint aquatum
Sedum. Nullo odore est cæta, eo excepto, quæ
ab aqua accipit: sapore tamen adstringenti & ac-
siccò linguam ferit, non secus quàm Acacia facit.

Hanc plantam Alpinus & Guilandinus voc-
Tom. III.

rum esse Stratiotem Antiquorum existimant, &
verum loquuntur, nostro quidem iudicio.

Stratiotem verò fluuiatilis cognomen tum ex
eo traxisse testatur Dioscorides, quod in aquis
nascatur, inque ijs supernatans, sine radice viuat,
quamvis folium habeat Aizoo simile, at majus.
Ægyptijs Tibus nuncupatur, Magis autem Elu-
ri languis.

Plinius tradit eam in Ægypto tantum nasci,
quod non credendum, cum n. Dioscorides indefi-
nitè dicat aquis innatare. Celebratur, inquit lib.
24. c. 8. & à Græcis Stratiotes, sed eam in Ægypto
tam in inundatione, Nili descendit, herba Ai-
zoo similis, ni majora haberet folia.

C. Bauh. pin. Lenticula palustris 6. siue Ægy-
ptiaca, vel etiam Stratiotes aquatica folijs Sedo
majore latoribus. Cur ad Lenticulam pala-
ustrem refert? Quæ stratioti & dictæ Lenticulæ
affinitas?

Folia refrigerant, & sanguinem qui defluit à
renibus, pota sistunt: vulnera quæ inflammatio-
nem mutantur, inrumescere non sinunt: ignibus
sacris & tumoribus illinantur, Dioscor. & Plin.
auctoribus, Plinius, hæc paullo aliter: refrigerat
mirè, vulnera sanat ex aceto illata. Item ignes
sacros ac suppurationes. Sanguinem quoque qui
defluit à renibus pota cum thure mauculo miri-
ficè sistit. Stratiotes aquaticus, inquit Galenus 8.
simpl. humida & frigida facultate est, terre-
stris verò nihil habet adstringentis: proinde
sanè vulnera glutinare potest, & viceribus ef-
ficè vtilis. Sunt qui eo ad sanguinis eruptiones
vtuntur, & ad fistulas. His addit, Alpinus: Ægy-
ptij ad eadem ipsa mala vtuntur, quibus Plantagi-
nem conducere compertum est. Ex quo mulie-
res rusticæ, quæ Bedoni vocant, ad sistendum lan-
guinis eruptionem ex vtero, atque alijs partibus,
ejus decoctum, vel succum, vel puluerem per os
quotidie ad drachmæ pondus sumunt. Rustici
quoque ad vulnera sananda folijs contritis super-
positis vtuntur, mirificèque ea sanant: tamque
frigida vique ad primum gradum, & siccam lu-
pra secundum esse arbitrantur.

PLANTAGO AQUATICA.

CAP. XXII.



Folium. Descri-
psit.

Eum caulis
imo quod in-
uolunt ad
tenues vique
& numerosas
radicum fibras
tubinat^o coi-
tus bulbi faciē
aliquaten^o mē-
tur: caulis au-
tē striatus, an-
gulosus, ina-
ri, sububer,
plè umq;
ubitalis, non raro
etiam proce-
rior, alis indi-
cè oitis in or-
bē coronatur,
atq; hęc rursū in
radiatos ex in-
ternallīs, surculos facillime: quorū extremis infi-
dent, siccata diluati purpurā pallentes, simy

Yyyy 4

brariis folijs tribus constantes, totidem toti fiori subjectis foliis minoribus viridantibus, herbacei coloris staminibus senis è medio stoculo exeuntibus: *semina*, Milio vix majora, vixque compressa, matine sulcato, in trigonum, junctis lateribus, disposita, copiosa: *folia*, Plantaginis, longiora, acuminata, nervosa, glabra, sapore subacido prædita.

Matth. in Dioscoridem ait affirmare Ruellium, eique etiam subscribere Fuchium, Plantaginem aquaticam, Alisma esse, vocarique à nonnullis Pastoralem fistulam, ac etiam Barbam sylvanam, nullis tamen notis hanc Plantaginem cum Alismate convenire. *Hallucinatur*, autem Matthiolum: Fuchius enim hanc non recipit pro Alismate. Quod autem nonnulli Alismatis nomen ad Plantaginem aquaticam pertinere contendunt, nullam aliam rationem demonstrare possunt, quàm quòd Alisma ad loca aquosa provenire dicatur, inquit Tragus. Qui licet & ipsemet Plantaginem aquaticam vocarit, tamen inter Plantagines commemorandam haud censuit, quin & Gesn. de hort. improprie Plantaginem dici testatur Et hinc in cat. & Alisma, & Damasonium appellavit.

*Fistula
pastoris.*

Rob. Stephano, Amato in Dioscor. Rhegino in exer. Brunschweig & Ruellio. ènque Bachanello in cons. Fistula pastoris & Plantago aquatica, vna eademque est herba. Cæterùm hi omnes Alisma esse judicant, cù que illis etiam Euric. Cordus, qui tamen vulgares herbarios Alineam corruptè vocare scribit, aliamque à Barba sylvanæ aquaticam Plantaginem esse contendit.

Lonicerus contrà cum Durante tenet Barbam sylvanam omninò eandem esse cum Plantagine aquaticâ, ejusdemque opinionis est quoque Pandecta Morer. cap. 8. & Eucharis, qui Barbam sylvanam etiam Centumviam aquaticam vocant.

*Fistula
pastoris
perperam.*

Fistula pastoris verbum à recentioribus perperam tribus Plantaginis aquaticæ, utpote putantibus Damasonium esse, concludit Cæsalpinus.

Querit Lobel. etiam in Obs. num Plantago aquatica sit Limonium, aut potius Alisma siue Damasonium: Et respondet Aguiarra epist. 4. nihil inveniri quod melius conveniat Limonio Plantaginis aquaticæ. Concludit verò in Adu. Lobell. Græcis antiquis Moutanis & Latinis fuisse incognitam.

Synon.

Nostræ ætatis Herbarij, ut Brunfels. tom. 1. rhaps. Trag. Matth. Fuch. Dodon. Turn. Gesn. hort. Lob. in Obs. pag. 100. Cast. Thal. Schvvenckf. Cæsalp. H. Lugd. Tabern. [cui & Plantago palustris & Cochleia palustris] & Gerardus, Plantaginem appellant aquaticam: Lob. in Adu. & Icon. p. 300. Plantaginem aquaticam folijs Betæ aut Plantaginis, flore Gallij albi: C. Bauh. phyt. & pin. Plantaginem aquaticam: i. siue latifoliam, & Limonium Anguillare. Dubitat autem an Alisma siue Damasonium quæ Fistula pastoris dicitur Germanis, ut Cordo in Dioscor. & Lonicero, huc sit referendam. De hac nos inferius. Licet autem omnes hi Plantaginem vocent, Plantaginis tamen non admodum similis est: præter eum solum, nihil habet Plantaginis, quod tamen & ipsum Plantaginis folio non satis responderet: nam longius, magis fastigiatum, & minus nervosum est.

*Nomina
linguæ
germ.*

Germanis dicitur, *Wasser Wegrich, froeschwegrich*, Plantago ranalis, *froschlöffel, froeschlöffel-*

lane, id est, Ranæ cochlear; *hirtenpfell*, hoc est, Fistula pastoralis, & *Wegdisbart*: q. e. Barba sylvanæ. vt Simon Ianuensis, Eustachius, & Pamphilus Herilacus de nat. aq. lib. 2. cap. 24. vocant. Belgis, *Water wechbree, vwater weegbree*: Gallis *Plantain d'eau, & Plantain aquatique*: It. *Plantagine aquatica*: Angl. *water Plantain*.

Exit humilioribus & aquas habentibus locis, in fossis juxta lacuum & rivulorum margines. Floret Junio, Julio & subinde Maio & Augusto, mensibus.

*Locus &
Tempus.*

Facultatem autem hæc Plantago frigidam videtur Dodonæo habere & siccam. Videtur nobis, si frigida ad tertium gradum, vt vult Euch. in calidiori vtero ad conceptionem facere posse. Schvvenckf. refrigerare & siccare quidem testatur, non tamen profus caloris expertem esse, sed aliquantulum acrem abstergerdi vim habere. Procidantiam curare, rubentem podagram, capitis dolorem à calida causa mulcere, cruento spuito, vrinæque mederi. Radices in vino decoctas, ijs qui calculo renum & vesicæ molestantur, solatio esse. Summum terecrum & experitissimum quo subitò lac in mammillis consumatur, esse ait Timor. Roslin, succum hujus Plantaginis illis applicatum.

*Viros &
Vius.*

Plantago aquat. ca. humilis angustifolia.



Racilino-
doq; cau-
le pedali & al-
tiori prædita
est, verticilla-
tim circa me-
dium, pediculis
quadratis, &
trientalibus ex
geniculo ortis
radiato, consi-
milisq; alijs
ejusmodi umbel-
latis sum-
mum caulem
coronantibus,
quorum vni-
cuique flos insi-
det parvus, al-
bus, è tribus ca-
dudis foliolis
compositus,

*Descrip-
tio.*

glomerato in parvi echini modum capitulo reli-
cto: folia ex radice scæna, septenave, junceo pedi-
culo palmati & sesquipalmati mixta, angusta, acu-
minata, minora multò quàm Plantaginis angu-
stifoliae terrestres, glabra, tribus longis nervis dis-
tincta, grati odoris, saporis farui: *radix* fibrosa
majoris Plantaginis aquaticæ.

Lobel. Icon. pag. 300. Plantago aquatica humi-
lis angustifolia & longifolia: Schv. Plant. aqua-
tica angustifolia humilis: Tabern. Ic. & hist. item-
que Cæf. Plantago aquatica minor: Gerardus,
Plantago aquatica humilis: C. Bauh. phyt. & pin.
Plantago aquatica 2. siue angustifolia. Dicitur
ger. *klein vasser weegrich*: Angl. *duarfe Plantain*.
Huic congenetem facit Clusius suam Plantagi-
nem aquaticam minimam, vel suam Plantaginis
elegans genus.

Montepelii propè fluminum ripas, floret Aprili
& Maio. Reperitur & in Silesiæ vdis.

Synoni.

*Locus &
Tempus.*

PLANTAGO

PLANTAGO ITALICA RYFFIO, AQVO-

lis locis proveniens, quæ Fistula
pastoris multis.

CAP. XXIII.

Plantago
italica.
Ryffio.

Desert.
Puo.

Alisma
Bisfolium.

Alisma
spald.

Euchf.
upfauw.

Deseri-
ptio.

Synony-
ma

Verum hoc Alisma (si credere fas est) ex Italia ac ferri curavit, quod in Germania non proveniret. Eius autem picturam dedit Ryffius in Diosc. lib. 3. cap. 144 nomine Plantaginis Italicae, germ. *Welch Wegrich*, filio Attingelli, sed angustiore, & temper in terram demulo: caule vixco tesquipedali, cuius fissig. vnde Alisma, fistulæ in caulem concoloris floris de hisce radicibus crebris, v. Ellebori nigri, tenuibus, acris, pingui- bus: flore tenui, in candido pallecente: aquosus amarissus.

Facetur C. Bauh. in phyt. seigniorare quid sit Alisma, siue Damasonium, veleriam Fistula, v. floris, Luniceii, Ryffij & Cordi in Dioscor. lib. 3. cap. 169.

Nos verò inquirendum proponimus an Cordi Alisma, seu Heibariorum Almes, sit Bisfolium maius, id quod aliqui volunt, vel Damasonium de quo in historia eius, lib. 1. cap. 107.

Bransfeld in Diosc. lib. 4. 1. exegrem 2. pag. 171. perhibet Alisma in aliquibus comm. pro Fistula pastoris interpretatum reperiri: in alijs pro aquatica vel palustri Plantagine. Euch. Roslino Fistula pastoris, *buten pfeiff*.

In Agricola edunt ead. quodam, qui Alisma seu Damasonium Fistulam pastoris vocent, nullâ tamen ad hanc herbam comparatione, binis & nunquam pluribus folijs &c. Non in iustè autem Plantaginem aquaticam fore dicendam, si non Barba silusna hoc ei nomen præcipuisset. Apparet autem ex his Eur. Cordi verbis, ex quo ea habuit Agricola, Fistulam pastoris, à B. folio & Plantagine aquatica esse diversam. Non tamen nobis constat, quæ sit Fistula pastoris Eur. Cordi & Brunsfeldij, & an eadem cum Ryffij Plantagine Italica.

Quam denique plantam Euch. sius intelligat per Pastoralem fistulam, quam nonnulli Alisma seu Damasonium putant, quâque à Plantagine aquatica vulgari, & Bisfolio, quod et Ophry, dicitur, separat, nos latet.

DAMASONIUM STELLATUM, DALECH.

CAP. XXI V.

Deseri-
ptio.

Synony-
ma

Habemus à Dalechamio nomine Damasonij stellatam hanc, quæ aquaticæ Plantaginis fibrosas radicales in nodum collectas possidet, vnde palmaribus nixa pediculis folia exeunt, Plantaginis aquaticæ æmula, multò minor, & ad pediculi inferiorem punctata, interdum verò minimè: *colicula* plates, alij t. i. iociales, alij selqui- palmares, teretes, inanes, nodis ex longis inter- vallicis articulatis, è quorum gniculis, inque sum- mo caulium fastigio, radiati in orbem exeunt re- duculi vnciales, quorum vnicuique insidet qui- nûm seu ÷veve radiorum stella pulcherrima, At- zoi illius peregini Camerarij stellæ æmulan- tia.

Lob. Obs. p. 160. Alisma pusillum argusifoliû muricatum: Eid. Icon. p. 301. Plantago aquatica minor altera: H. Lugd. p. 108. Damasonium stel- latum: C. Bauh. pin. Plantago aquatica 3. siue stellata.

Tom. III.

Humidis & aquis locis gaudet.

Locus

SAGITTA.

CAP. XXV.



Sagittæ radi- ces sunt mul- tæ, albæ crassu- scule, fungosæ, non sine capil- libus fibris, à quibus propa- gines nascun- tur longissimæ, interdum bicu- biales, iuncæ tenuitatis, sub- ter aquam ser- penes, similes radicibus Lys- machiæ luteæ, Matth. compa- rat Plantagini aquaticæ: folia aquis innatant rari formæ pul- chre alata sagit-
Deseri-
ptio.

æ mucronem æmulantia, fuscis hic inde in su- perna parte maculis notata, quædam, vt Mom- pelgardi observavimus, ex primis in acumè non desinunt, sed rotundantur. In eorum porro sin- gulas alas longi, terni, aut quini nervi per longû porriguntur, obliquis à nervo in nervum venu- lis intercurrentibus, lævior Plantaginis aquati- cæ, pediculo minimi digiti crassitudine, fungoso, striato, penè triangulo, duos aut tres cubitos lon- go, pro aquæ profunditate, in qua vivit. Folia sa- pore nonnihil subdulci & viscido, cum veltigis obscure acrimonie: caules rectos duos aut tres emittit, non multò folijs altiores, rotundos ferè, striatos, crassos, fungosos, in quorum parte su- periore plures flores exoriuntur, plerumque terni, caulem amplectentes, ex pediculis siue ramulis modò lor giusculis, modò brevioribus, pulcher- rimi, medio criter magni, tribus folioliis albis con- stantes, vixque purpurascente notatis: *florum* A- mygdalarum foliolis paulò minoribus, in medio apices multi, rubentes. Sub fl. r. a foliola tria, viti- dia. Flores excipiunt echinata capitula, subpurpu- rea Matth. magnitudinis penè fructuum Arbuti, vel Fragorum, ex aculeis veluti constantia, qui nihil aliud sunt quam *semina* lata, compressa, in acumè desinentia, vixque auium similia: emen- minutum aut Matth.

Cordo hist. Sagitta, siue Sagittalis: hic annota- tum à Gesnerto, esse Sagittam inter vltas [existi- mo legèdum inter vndas] quam Mago apud Pli- nium legendum inter vndas [quam Mago apud Plinium lib. 21. cap. 17. Pistanam dicit à Græcis vocari, quâque ab Idibus Maij vique ad finem Octobris mensis decorticari, atque leni Sole sic- cari iubet.

Matth. in post. comm. vocat Sagittam Plinij, e- ius maiorem & minorem assignans speciem, v- tramque copiosam in Bohemia, ubi Sagittam Herculis vocant. Dicitur Græcis *misava*, Germ. *Pfeilkraut*, It. *Saetta*. Aut autem cognationis es- se Plantaginis aquaticæ. Nos huc Sagittam mino- rem referimus.

Lob. in Adu. dicitur Sagitta minor. Huius tam
Yyyy 3

in Obs. p. 161. quàm Icon. p. 301. duas exhibet figuras: priori titulus, Pistana Magonis, siue Sagittaria aquatica Plinij; Alteri, Sagitta minor. *Minorem* autem eum exprimere locis iam allegatis, Sagittam suam in Adv. maiorem, per effigiem Sagittæ minoris Matthioli: utæque enim imagines eam delineant, quæ acutioribus est folijs.

Synonyma.

Dicitur hæc C. Bauh. pin. Sagitta aquatica 2. siue minor latifolia: Sagitta minor, Matth. Dod. Lob. in Adv. H. Lugd. pag. 1016. Cast. & Tabern. Sagittaria minor, Lob. Ic. pag. 302. & Ger. Pistana Plinij, Ang. Germ. *klein Pfeilkraut*.

Locus & Tempus.

Nascitur in aquis cum stagnantibus, tum decurrentibus, Floret Julio & Augusto. Ebroduni obuia est pluribus in locis, in Lacu & fossis, atque piscinis.

Temperamentum.

Temperamento est frigido humidoque, & ipsædem cum Plantagine aquatica viribus pollet, dictatore Matthiolo. Id autem temperamentum & vires sapor à nobis obseruatus, præ se ferre non videtur. Matthiolus fortè non degustatâ, plantâ, nec factâ experientia hæc asserit.

Sagitta maior.

Descriptio.



Phleas mas latifolia, H. Lugd. p. 1016. Barban syluana recentioribus, Cæf. Sagittaria maior, Ger.

Sagitta 2. Sym.

Sagittam porio, à foliorum forma tricuspidi, supernè in vnam, infernè in duas desinentium, nomen habere, non dubitandum. Phleum autem Thophrasti 4. hist. 9. & 11. esse volunt quidam: vbi tamen notandum apud Theophrastum Phleum & Phleas differre: nam Phleum genere neutro, palustris planta: at Phleas & Stœbe 6. hist. 1. idem sunt, & fortè Poterium erit. Plinius lib. 21. cap. 17. inter vltas, ut antè ex Gesnero traditum, Sagittam vocat, eamque Magonem, à Græcis Pistanam dici refert prodiit. Græcis itaque *πι-σ-ά-να* *μεγάλη* dicitur: Germ. *groß Pfeilkraut*: Ital. *Saetta maggiore*.

Locus

Nascitur ut altera stagnantibus & decurrentibus aquis. Per multis quidem annibus ac leniter labentibus in Italia, Gallia, Germania & Anglia: subter aquas è fundo vadoso exit. Maio & Iunio in Anglia prope Oxonium, pone mœnia, in amœnissimis illic residibus, & limpidissimis aquis: etiam Londinæ ad arcis regie vallum, &

in Tamefis crepidinibus paludosis. Paribus alteri viribus præstat.

Vire

Sagitta minor angustifolia



Minori & Descriptio.

Hæc per omnia similis, sed omnia minora sunt ei, foliaque angustiora multo, magisque acuminata.

Tabern. & Synon.

Ger. Sagitta minor angustifolia: C. Bauh. pin. Sagittaria aquatica 3. siue minor angustifolia: H. Lugd. pag. 1016. Phleas mas siue Stœbe Theophrasti, angustifolia. Germani *klein spitz Pfeilkraut* vocant.

ANAGALLIS AQUATICA, FLORE CÆRULEO, foliolo rotundiore, minor. CAP. XXXVI.

Anagallis aquatica folio rotundiore minor, *Adasibus* nittitur albis, fibrosis, quas ex geniculis subinde demittit: caules rubentes, rotundi, fungosi, in terram reclinati, quam vbi attingunt, fibris enatis radicanitur: *folia* ex aduerso bina singulis geniculis, longiusculis pediculis hærentia adnascuntur, pinguiscula, atro virentia, ad vncias duas longa, subrotunda, crenata: è quorum sinu ramulus prodiens flores sustinet spicatos, cæruleos, ex quatuor foliolis compositos, striato umbilico albo, apicibus dilutissime cæruleis, ternis, ex calycibus, quos quaternaria folia viridia componunt: *semen* capulis superuenientibus, didymis clauditur: sapor plantæ nullus manifestus.

Descriptio.

Existimant quidam hanc plantam Sium Dioscoridis esse: sed hallucinati sunt: folia enim Olusarii desunt, & inodora sunt.

Sium non est.

Puriorum tamen alij Cepæam esse. Et sanè Dodonæus cum ea Anagallidem istam aquaticam conuenire posse arbitrat, si per *αντιπορρον*, *καππαλα*, id est, horrensis dicatur. Quod si verò idcirco *καππαλα*, quoddam vel solum, vel vplurimum in hortis nascatur, nominata sit: parum ei Anagallis hæc Cepææ respondere videtur, ut quæ nusquam minus quam in hortis nascatur: natura sua in totum siluestris, aquosa requirens loca, perenniterque rigari postulans.

Cepæa non est.

Plantæ huius in aqua nascentis verum nomen se ignorare fateantur Monachi in Mes. dist. 1. cent. 4. vbi à quibusdam Lauer falsò appellari scribunt, quanquam alij etiam falsò Crescionem vocare non desinant.

Sion Brunfelsi 3. rhaps. 84. Sion nō odoratū primū, Trago: Sium, Eur. Cordo, Theoph. Golio in Onō. Lonic. & Fuch. hist. Sij alterū genus, Eid. ic. Sium non odoratum, recentiorum quorundam, Gesn. hort. Sium siue Lauer commune, non repens pondens Dioscoridis descriptioni, Anguill.

Synon.

Cepæa

Cepæa, Dod.gall. & Turnero. Anagallis aquatica, Dod. de fum. & in fol. lat. Lob. Obs. p. 48. Ic. p. 466. Gesner. coll. Toxiti in Onom. philof. Harch. Thal. Hort. Luf. H. Lugd. Lon. Cæf. Colum. & Ponæ in Baldo: Anagall. aquat. Schvvenckf. Anagall. qu. minor 1. Tabern. Anagall. aqu. siue Becabunga Lob. in Adu. Anagallidis tertium genus palustre. Ryffio in Dioscor. Anagall. aq. 2. siue minor folio subrotundo, Cæf. Bauh. pin.

Græcis ἀναγallis ὑδροεις: Germ. Bachpungen, Wasserpungen: Belgis vasserpungen & Beekpungen: Gallis Berle nominatur, vnde & Berula latine dicitur. Marcellus tamen Berulam dici refert, quam Græci καρδαμύνη vocant. Italis & præsertim Hieruscis: Gorgolestro.

Et hæc in seledibus exit aquis, & circa fontes, ac riuorum ac fluuiorum margines. Iunio, Iulio, ac Augusto, flores, semênque profert.


ANAGALLIS AQUATICA, FOLIO rotundiore maior.

Anagallis hæc aquatica est iam dictæ omnium d. similis, nisi quod *caulis, folijs* (quæ ubi maxima, trientem longa sunt, & sextantem lata) & *floribus* maior est, ac latius, diffusa.

Berula, siue Anagallis aquatica, Tabern. Anagallis aqu. folio maximo, Thal. Anagallis siue Becabunga, Ger. Anagallis aquatica 1. siue maior folio subrotundo. C. Bauh. pin. Anagallis aquatica maior rotundifolia, Hort. Luf. Pfundue.

ANAGALLIS AQUATICA FLORE Cæruleo, folio oblongo, maior.

Illis similis & hæc *radicibus* fibrosis ex articulis caulium herens. Verum *caules* recti, angulosi, crassi, caui, cubitales, & maiores, infernè tubentes: *folia* bina opposita, sine pediculis caulem applexa, longiora quàm iam dictæ Anagallidis,



palmi longitudine, latitudine vnciali & scissurali circiter crenata, sapore nullo insigni: *caulis* in ramulos finditur ex foliorum alis ortos: *floribus* spicati, crescendi modo, figurâ prædictæ Anagallidis similes, calyculis & capsulis didymis itemdem respondentibus.

Pro hac habemus iconem

Fuchsianam ex emptitijs: folia tamen sunt longiora & angustiora huius plantæ.

Tabern. Berula maior: Anagallis aquatica, Gerardo: maior Gesn. coll. Anagall. aquatica 3. siue maior folio oblongo, C. Bauh. pin.

ANAGALLIS AQUATICA FLORE purpurascens, folio oblongo minor.

Et hæc Anagallis proximè dictæ *foliorum, florumque* formâ similis: verum *caule* rotundo,

floribusque purpurascens, & crescendi modo nonnihil differt. Non enim in caules ita brachiatum, neque radicibus tam latè propagatur.

Anagallis aquatica minor, Ger. secunda, Tabern. Anagallis aquatica 4. siue minor folio oblongo, C. Bauh. pin.

Omnes passim in locis viginosis ac scaturiginibus.

Cum acero & butyro tosta Anagallis aquatica ac calida imposita, & subinde renouata, tumoribus quibuscumque & sacris ignibus prodest: apud veterinarios in magno est vsu: eâ namque in discutiendis tumoribus & sananda equorum scabie, aliisque id genus affectibus curandis vtuntur, teste Trago. Lobelius Anagallidam vires imitari dicit, totam gustu acriore Nasturtij, odore non ingrato. Sed & Dodonæo qualiter ac temperiem Anagallis aquatica calidam habet & siccam, Nasturtio aquatico similem, remissiore tamen: editur etiam vt illud. & ad Germaniæ maritimæ *impro-* prium malum, quod Scorbutum nuncupant, vtilis quoque, eodem quo Nasturtium aquatile sumptum modo. Facultate tamen ac viribus minùs potens.

ANAGALLIS AQUATICA angustifolia.

Uniculatim incedunt paræ *radices*, demissis fibris ad iuncturas ortis firmate: *caules* cubitales, simplices, interdum in longos ramos propagati, ad quorum singulos nodos bina nascuntur



ex aduerso sita *folia* trium quatuorve vnciarum longitudine, latitudine culmi, acuminata, neruo vnicio per longum donata, & quorum siu *caulis* summitatè versus, *pedicellis* palmato longiores, tortiles pluribus cuncti propaginibus enascuntur, *floribus* omnium parvis, sequentibus semper didymis capsellis

compressis. è fissura stamen tenue nititur.

C. Bauh. pin. Anagallis aquatica 8. siue angustifolia scutellata.

In aquis Helætiæ, vt Tiguri prope felium lacum, prouenit, & Mompelgardi versus pagum Sochaux iuxta riuulos. Sic & in paludosis & fossilibus Lusitiæ, etiamque circa Francofurtum ad Oderam, & Viennam reperitur.

SAMOLVS VALERANDI.

Pro *radicibus* fibras habet capillares, albas, *caulem* verò cubito altiore, *folijs* alternatis:

Synon.

Locus:

Virg. &

Vitis.

Thymus.

Descriptio.

Descriptio.



vestitam, vicia
viam aut alte-
ram longi vo-
cia strobili, ex
oblongo per ex-
tremum inobro-
tandis, glabris,
nequaquam in
magine nullis.
crallus, pediculo
nunc longior,
nunc brevis,
temper articu-
lo: caulis caper-
nus in ramos
caebros fingitur,
atq; haec in in-
alio minor, in
quibus positi
sunt, Anagalli-
os, aquaticas se i
colore albo pro-

Synon. diri.

Venerando Samolus Plinii quoru. Jam. Lob.

O. p. r. s. Anagallis coerulea, abera, fere non
non odoratum, nec in T. r. g. folio Palegg. aega-
lis: E. d. l. p. g. 467. Anagallis aquatica L. r. g. a.

Label. not. *fl. dubia* Labelus ve huc planta an si Sim
non odoratum T. r. g. secundum: nec enim que-
quam commane demonstrat. potest.

C. Bauh. pro. Anagallis aquatica c. sine folio ro-
tando non cretato: Anag. aq. altera Labelij,
H. Lugd. p.

Gauland. modò Alisma, modò Cochleariam
nominavit.

Locus & Tempus. In aquosis siliis florentem vidi mense Julio.

HYSSOPIFOLIA AQUATICA.

CA P. XXVIII.

Descri-
ptio.

Caulis multi, dodrantales, vel etiam longio-
res, striati, virides, foliis amicti alternatim
positis, Hyssopifolia quando brevioribus, brevis vi-
ta, nervo unico secundum longitudinem distin-
ctis, sapore nullo manifestis, è quorum sinu ab i-
mo ferè ad summum usque cacumen flus vnus, vel
duo longiusculi, caerulei, sex foliis fluiatis con-
stantes, è calyculo viridi, cauli adnato, succedunt
pro strobilorum numero siliqua longæ, teretes,
membranulâ viridante involutæ, quâ detracta
calyculum propriè constituens tunica fusca sa-
men continet copiosum, minutum: radice brevis,
fibrosa. An Trago, Polygonum minus, Polygoni
genus alterum.

Cordo in O. s. filia Grasse Poley, herba Polygoni
malcalæ, non humi prostrata, sed erecta: Camer.

her. Hyssopides Io. Thalij. Gesn. coll. & Casp.
Bauh. ad M. h. e. l. m. Graciosa tripa. Bauh.



phyl. Hyssopi-
folia Io. Bauh.
m. Anagallis a-
quatica Mon-
speliensis. I-
tem pu. Hyssopi-
folia: sine Hyss-
opos 14. n. uce
Hyssopifolia
n. j. o. l. m. b.
foliis, floribus
caeruleis, ranti-
simè albis, mi-
noribus: at ex
Hispania flori-
bus oblongis,
saturatioris ca-
erulei coloris.

Florentem re-
perimense Au-
gusto, locis hu-
midis circa
Bockkichen &

Locus &
Tempus.

Falken. Wiler in Alsatia. In Patauinis paludibus
etiam occurrunt.

*Hyssopifolia minor, vel potius Thymifolia
maritima.*



Defcript. Simpliciter li-
gnosa con-
torra radica
nititur, caulem
tollens palma-
rem, aliâs do-
drante altorem
in ramos didu-
ctum, per quos
caebra folia,
Camphorata,
sursum vergen-
ta: ex quorum
angulorum sinu
ab imo ad sum-
mum usque cri-
stare siliquæ per-
erigunt ruben-
tes Hyssopifoliæ
majoris, semine
referre, minuto,
ex albo flaves-

cente: flus vt alterius, minor, qui vix facile discer-
ni possit.

In vineis maritimis & ad vinearum margines
prope Gramontium in agro Monspelienfi colle-
git I. Henric. Cherleus.

Locus



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXIX.

DE PLANTIS MARINIS.

COMPLESSE poterant miraculum Tellus eiusque prioribus voluminibus recensita diuinitas, totque genera plantarum, cultibus hominum, aut voluptatibus genita. Sed quando plura quam difficultate, mirabiliorque inuentio? Nec maria quidem, & immane illud pelagus medicinis carent, opifice natura ne in illis quidam cessasset, & per undas scilicet ac reciprocis altus, rapidosque cursus indecessas vires suas ostendentes, nec videri in miraculo maiore, si verum fieri volumus: quae ipsa est D. O. M. inestimabilis benignitas atque potentia. Ergo ut omnem insumamus operam, neque vllum falsidii periculum vrisse ostendamus, quando sita decreuit, ista continuatur, marina quoque & profundus Oceani doctus, quantum humanitus fieri poterit hoc tempore, indagabimus, ipsum adeo pelagus prouocantes: ut videat posteritas nos & curatores, & copie diuinitatum naturalium nullo posthabito periculo insitisse.

DE ALGA, FVGO, BRYO, SIVE MVSCO Veterum sententia.

CAPVT I.

Theoph.
Alga ge-
nera quatuor
qua.



HEOPHRASTVS
4 hist. c. 7. clare &
diffuse quinq; Fuci
marini genera assi-
gnat, Zoitica siue
Prasson: capillaceum,
siue feniculaceum:
Tinctorium, spon-
giatorium, siue Pe-
lagicum: Gramineum
& Lactuceum.

Diosc. Fu-
ci marini
genera
tria.

Dioscorides vero tria genera ponit. Fucus
marinus, inquit, nascitur partim latus (μακρόν)
partim oblongus (ἰσχυρόν): Oris. *Amuicus* &
poniceus [*καρπύνη*]. partim albus, qui in Creta
ad terram nascitur, valde floridus & non putre-
f. ens. Refrigerandi vim (ψυχρὸν) Oris. *Amuicus*,
astringentem) habent omnes, in cataplasmatibus
ad podagras & inflammationes efficaciter vtilis:
vbi nunc adhuc humentibus vti conuenit, prius-
quam exarefiant. Nicander poniceum asserit
aduersus serpentes valere: diptamque est, quo
existimare nonnulli colorem suum meriti
mulieres: cum tamen radícula sit eiusdem nomi-
nis, qua sese fucant. Idem Dioscorides scribit
Muscum maritimum (βρύον θαλάσσιον) in saxis te-
riliisque ad mare nasci, capillaceum, gracilem, sine
caule, valde adstringentis gustus: ad inflama-

tiones & podagras, quas refrigerare opus est, effi-
cacem.

Plinius indistincte & inconstanter Fuci mari-
ni genera tradidit. Tria autem genera eius fa-
cit: latus, & alterum longius, quadaatenus ru-
bens: tertium crispis folijs, quo in Creta vestes
tinguntur, omnia eiusdem usus. Bion, addit
lib. 27. cap. 8. marina herba sine dubitatione
est, Lactuce folijs similis, rugosa, veluti con-
tracta, sine caule, ab ima (vna, Theoph.) radice
exeruntibus folijs. Nascitur in scopulis maximè,
restisque terra compiechis. Principia siccan-
di et ipsandique vis, & collectiones omnes
in inflammationesque cohibendi, præcipuè poda-
græ, & quicquid refrigerare (Hæc Plinius ex ca-
pitæ Diosc. de musco marino, quo tantum agitur
de Alga feniculacea, vulgè Corallina, non au-
tem de hac Lactuce, Dal.) opus est. Libro porro
32. c. 6. scribit Algâ maris iheriacen esse, Nicandri
tradere. Ludarissimam, quæ in Creta insula
iuxta terram in petris nascitur: tingendis etiam
lanis ita colorem alligant, ut elui postea rō pos-
sit. E vino autem inbet eam dari. Et hæc Plinius,
qui apertè Phycæ thalassion, h. e. Phocum siue
Fucum marinum, Algam vertit, licet rursus in
alia lingua nomen habere negarit, modò herbam
vocando modò fruticem. Adde quod βρύον, i. e.
Muscum & φύκος confundit, ut id clare ex iam di-
ctis patet.

Facit Plinius, inquit Cornarius, herbam & fru-
ticem ex Musco, ipsique Lactuce folia attribuit.

Zzzz

quam Dioscorides pilosum dicat pro folijs, h. e. *περὶ ὧν*, quod fortassis Plinius *ὑπὸ ἀνδρὶ* legit, & *Laetue* folio reddidit. Quod verò Dioscorides ait, podagras, quæ ad strictionem opus habet, i. e. *ὑπὸ ἰσχυρῶν διουρίων*, fortassis *ὑπὸ ἰσχυρῶν* legendum, pro *ὑπὸ ἰσχυρῶν*, etiam si utraque lectio recte habeat. Nam & Galenus Muscum marinum ex terrea & aquosa essentia, utriusque frigidis, compositum esse dicit, & in gustu adstringere, & omnia calida impositum manifestè refrigerare, ipsiq; prodesse.

Nomina
linguar.

Alga, quod nomen plantis ferè omnibus, marinis commune est, vocatur græcè ab Had. Iunio *φύκος θαλάσσιον* vel *θαλάσσιον & λιμανίων*: Lat. *Alga* & *Vlva*: hanc ait Itagorum esse: illam maris: & Fucus marinus: Germ. *Moorgras*: Belg. *Wier*: Gall. *Vray ou Vrac* (in Oceano Normannico, *Bray*, aut, *Brac*, à voce græca *βρύον*,) *fuesiles de mer*, *Coralline*: It. *Aliga*: Hisp. *La ensa del mar*: Ona, *eyerua de la mar*.

Poetæ cognominant Algam marinam, inuribilem, mollem, viridem, fluidicolorem, litoralem humidam, tortilem, tenuem, putrem, & vilem: hinc vilior Alga.

ALGA ANGUSTIFOLIA VITRIARIO- RIORUM.

CAP. II.

D. sed.
prio.



Folia longissima, ciliatula, & longiora, plana, leuia, mollia fragilia, modò alba, modò rubra, vel atroviuentia, ligulas atroforas emulantes, ex his quedam aut latiora, alia angustiora: habent subitaneæ cuidam ligulæ, nigrae, umbelliferatæ plantarum instar comosæ, capillamentis cinereis, quæ in fibras fau-

centia folia vetera & decidua reliquerunt. Existimamus detriptam plantam, radicem esse à Plinio lib. 31. c. 6. nomine *Algei* à Dioscoride verò titulo Phyci marini.

Mathiol. in Dioscor. huius reminit eadem vocando Algam vulgarem. Veterum: N. Gale autem videtur esse Fucum marinum Antiquorum. *Laetue* in Dioscor. lib. 2. cap. 44. dicitur Alga marina & *Olea maritima* Hippocrati: Eit. l. 4. cap. 101. Alga vel Phucus marinus secundum Dioscoridis, quæ Venetiis inuoluntur vitæ & Romam deferuntur.

Fucus
mar. alter.
Dod.

Dod. in fol. lat. inscribit *Facū* marinū alterum, *Fuci* marini proximum siue secundū genus Dioscoridis, sublongius ac rubēs. *Anat.* contra negat Algam mariuā, quā apud Muranū Venetiis vitæ vala parātur, esse Phycos thalassii veterū genuinū.

De nostra Alga vitriariorum angustifolia hæc Rob. Constantinus apud Amatum: Phycus siue

Fucus marinus qui etiam Latinorum est Alga, vocatur in Oceano Northmanico *Vray* aut *Vrac*, [*Bray* aut *Brac*, H. Lugd.] à voce græca *βρύον*. Nam B. yon & Alga alreuan pro altero, usurpat etiam Plinius. *Tria* autem Phyci genera existunt: vnum folio est Caricis, i. e. Graminis, sed æquabiliter lato ac molliore, nec mucronato, nihilque penè differt ab Vlva palustri, nisi colore, quem Vlva habet prafum, Alga verò lubridentem tendentem ad rufum, quem planè inducit in mari cum vel diu euallum atque inueteratum, vel cum in aere exaui. Pollicari mensura latorem non vidi, aut vlva vna longuere. Strips in nostro mari nondum visa est. Folia taurum vndis innatant figura ligulæ longioris, aut teniz vitæ: in corollis leuissimas. Hæc Alga est cui Dioscoride in odore Corallia comparat, de qua etiam N. cander ait. *ἡ γὰρ λεπτὰ περιλαβοῦσα θαλάσσης*. Qui etiam scitè admodum in Alexiph. protulit, *φουόντας ἀρρώς*: Algas vias exponeret Plinius, e litora. Nam ut etiam Virgilius canit,

Scopulū illisa refunditur Alga.

Quod fit præteritum cum tetrapestuosū est, & sœuit mare. Tunc abundanter latoribus cicatam & dispersam iustici Aestare, vt Fœnifeces [Fœnum nam hoc marinum est] rascillis accumulans, & in campo expositam fuscillis versant quoad perarecat. Phyci siue Alga alterum genus est latifolium, folio quidem Atizæ, sed minime acuminato, verum latitudine æquabili, & vndique sui simili, quales cithyræ: solum enim longiusculum, aut fasciolam explicatam diceres cum vndis superinat. Hoc genus est quod describit Plin. l. 17. c. 6. vltimum, folio lato, colore viridi: congruitque optimè quod quidam ait, Praion & Zosteræ vocasse. Sed mihi videntur herba folia, quæ frutescunt esse ait. Ruscifera arida & complicantæ, renitescunt tamen aque imposita, & subito se explicant, ac diffundunt, vt accitus vellet se imagnetur, qui nunquam ipsa viderit.

Celsus. Alga in vadis limosis nascitur prafundioribusque: expellitur autem ad litus cum fluxu: trahens fert digitu crassitudine, geniculatas, nigras, humi repentes ramosas: quæ in multas veluti epicus desinunt, pilis sc. candidis, singulos geniculos circumuoluentibus, similitudine Spicæ Nardis: folia Typhæ palustris, graciliora tamen, mollioraque, initio viuentia: dein cum exsiccantur, albescunt. Viderit Dioscorides Gnaphalion appellasse: item Galenus & Plinius. Theophrastus Phycou, & vt Theod. vertit, Algā, quod Praion, i. e. Potū vocant quidam, alii Cingulum, cuius radices Capis gerhyis comparant. Spicæ enim huiusmodi capas referant, quas vulgo Maligas vocant.

Imperatus Algæ, plantæ marinz folia ascribit, primo octo iuncta, acuta. Algæ autem nomen obtinuisse scribit, primo octo iuncta, acuta. Algæ autem nomen obtinuisse scribit ab eff. Quicquid in Algæ præstat. Et hinc proque Brauis & 7celandis à foliorum similitudine *Nabalen* dicitur, quasi dicas ligulas atroforas.

Ab H. Lugd. pag. 374 huius plantæ duæ figuræ proponuntur: Prior inscribitur, Fucus hic Alga marina graminæa: Altera, Fucus, seu Alga marina Lobelii. Hæc vocatur etiam: Fœnum mari-num & Palea marina Monspeliensium: item Algula Dioscoridis, & *ἡ βρύα λειπτα* Nicandri.

C. Bauh. pin. Fucus, siue Alga angustifolia siue vitriariorum: Fucus marinus primus, Augaill. Fucus marinus, Lac. altera, Dod. Alga, Cæli.

Fœnum
marinum

Plin. 17.

Alga Gæp
sals.

Gnapha-
lion.
Diosc.

Algaeum
diu.

H. Lugd.
icones duæ

Palea ma-
rina.

Cæs. & Imper. marina, Lob. ic. p. 284. tom. 2. & in Adu. app.

L'omer.

Toto tractu Mediterraneo ad aquas Marianas Adriatici & Occidentis maris vniuersi penè littoribus nihil vilius & frequentius fluctuante Alg.

Vires & rhus.

Lacuna ait esse insignè remedium & venenum lethale cimum & pulicum, aduersus eos Romæ expertum. Algam, eo quo Rob. Constantinus dixit modo, probè siccitam pecorum & boum hybernæ stabulationi referunt. Ex eoque qui hinc conficitur simo, agros nimia defrutatione emaciatis & exinanitos stercoreant, laro segetum prouentui: tametsi Alga ipsa per se, acutè est mari aduecta, pro pingui simo letamine sit, non fecus atque marga. Alium etiam vsum præstat hæc Algula tenuioris fortunæ hominibus: ea enim siccata, tomenti loco suas culcitra infarciunt. Quæ olim consimiliter ipsius cognita commoditas in faciendis centonibus, viridisque in caltris, locum habuit, id quod etiam ex Vitruuio lib. 10. c. 2. intelligitur.

ALGÆ POMVM MONSPEL. CAP. III.

Defectio.

Pilæ palmarie simile est quod vocabant Monspelij Pomum Algæ, pilâ Modò maius, modò minus: turgit & plenum est aquâ, coloris spongiae, vel Fungorum Iuglandium, qui in sicco in album mutatur. Comprimitur etiam instar orbis, habetque umbilicum, & iuxta illum nonnunquam pilos similes Algæ pilis.

An Alga fructus.

Sine Algæ fructus, ut quidam volunt, non assero. Iuxta mare mediterraneum Narbonense collegimus, cum Alga reiecta. Huius iconem in præcedenti tabella expressimus.

Nomina lingua sum.

Cæsalp. vocat Bursam marinam, pilam rotundam, intus concanam, ex muscosa substantia constantem, sc. capillari, colore viridi, relicto ostiolo rotundo, quâ lapidibus adhæret nigro quodam petiolo pendente: cum extrahitur ex aqua, ob velleris molliem confidet: siccata autem salûgo quædam tenuis & alba efflorescit, mordaci gustu. Hanc inter Alcyonia reponendam putat, & Alcyonium quatum Dioscoridis esse suspicatur. C. Bauhin. pin. dicitur Alcyonium 12. siue Bursa marina Cæsalpini.

Bursa marina Cæs.

PILA SIVE SPHÆRA MARINA.

CAPVT IV.

Defectio.

Sphæramarinâ rotunda est instar pilæ luforice, minor, ac etiam maior, penè pugnum æquans: constatque pilis, capillifve tenuibus & paleis, quales in Alga vittriorum cernuntur, coloris resuscantis. Iconem proponimus ex iis, quas sculpsit eminus. Cuius autem plantæ sit, nos latet.



Clariss. & ingeniosiss. Felix Platerus exiit.
Tom. III,

mabat esse Pilam marinam, cuius meminit Galenus de comp. med. lib. 1. cap. 2. in fine, & Arist. lib. 9. Sed hæc opinio non placet Lacunæ.

Pilam marinam [ῥομφαία θαλασσίαν] appellatam Halcyoni, genere esse asserit Cornarius, etiam si αἰόλον pro voce ῥομφαίας legendum esse, aliquando cum ratione, non temere putauerit.

Eos verò meritis hallucinari crediderit Matthiolus; qui sibi persuadent, id esse Adarcem, quod vulgò Itali Pallam marinam vocant.

Rob. Constant. de genere Alcyonij pilam marinam esse ait & in algosis reperiri, atque etiam Algæ odorem referre: Northmannos vocare, Pilote demor.

Ex maris lanugine constant Pilæ quædam in littore reperiuntur, inquit Cæsalpius, sed nulla intus cauitate; agglomerantur enim festucis pilis vndis, reiectis aliquando in tantam amplitudinem, ut vtraque manu complecti vix possit: Pilam marinam vocant, cuius sit mentio apud Galenum inter medicamina ad capillos conferuandos, & apud Myrepsum ad lumbricos enecandos.

Imperatus negat Ballam marinam esse de numero vegetabilium, quod sit ex minutulis paleis atque pilis congestus globus, à volutatione ab aqua marina factus. Et huius pilæ, quoad substantiam aliquot statuit species: alias filitro similes, alias conuolutis paleis minutissimis, & aliis glomeratis radiculis.

Confusæ enim maris lanugine.

Bella marina, 177

ALGA CRISPA SCABIOSA RUBRA & pallida.

CAP. V.



Ex foliis foliâ tractu contumacia nullo ordine, itémque ex ramulis, exoriantur: filia quidem sunt tenuia, lucem transmittentia, vinctalia, & sescuncialia, culmum quædam lata, alia latiora, crispa, rubra, vel ex fusco pallida, in ramos diuisa, aspera, quandoque hinc inde verrucis albis, crustisque cinereis & Halcyonij, sapore præ-

Defectio.

ditâ falso: in quibusdam adhærent radices crassæ, capite villosæ, Algæ radici similes, quæ an ei propriæ asserere non ausim, potius tamen contrarium censuerim.

An Alga luteo folio siue Algæ membranaceæ ceranoides C. Bauh. pin?

Gener Chelerus attulit plantam aliquot Mōspelio ex tractu Narbonensis maris mediterranei.

Synonyma fortis Cæs. Bauh. hinc.

OLEA MARIS RUBRI, THEOPHRASTI. CAP. VI.

In mari rubro vocato in Arabia arbor exit, quam Oleam appellat Theophr. 4. hist. 8. Est autem hæc Ariz folio similis: fructum verò proximum nostris Oliuis parit, & lachrymam emittit, ex qua Medici sistendo sanguini, medicamentum componunt.

De hac Plinius lib. 13. cap. 17. In Arabia & O.

2222 2

Inhamon
not.

Plin. not.

lea dotatur lachryma, qua medicamentum conficitur, Græcis inhamon dictum, singulari effectu contrahendis vulnerum cicatricibus. In maritimis &c. Quæ hic sequuntur Theophrastus non de Arabicis Oleis, sed Oleis Indicarum insularum scripsit.

Diximus nos lib. 5. h. contra Apollinem & Cæsalpinum, Gummi elemi & Oleam Æthiopiam non esse hanc Oleam maris rubri.

VLVA. CAP. VII.

Alga similia.

Locus.
Epiheta.

Vlua simillima est Algæ vitrariorum, sed multò minor. Sunt veluti teniæ angustæ coloris rubescentis, vel albi, quæ reiciuntur copiose à lacubus falsis, prope Perous & Frontign. Vluæ palustris meminit Virgilius Aeneid. 2. cum ait:

Limosæque lacu per noctem obscuris in vluæ.
Delat. Et l. 6. f. acid.

*Tandem trans fluvium incolomes vluæque viri-
runtque*

Infermi limo glaucæque exponit in vluæ.

In Bucol.

Propter aquarum viridi procumbit in vluæ.

Et 3. Georg.

Nec nescit Salicem frondes, vluamque palustris.

Vluam commemorat & Ovidius 4. Metamorph.

Nec steriles vluæ Idem 6.

— gratæque pauidibus Vluam. Idem 8.

Lenta Salix, Vluæque leues. Et

In medio thorvis est de mollibus Vluis.

Idem 5. Fast.

Fluminem Lino celaverat Vluam.

Luc ret. 1.

Ex limosa Marini caput abdidit Vluæ.

Mirand.

Viridanti furit in Vluæ.

De Vluæ loquitur etiam Vitruvius lib. 1. c. 1. cum nonnullos scribit, ex Vluæ palustri, componere ruguria tecta. Seruius Maurus Virgilij explanator Algal & Vluam congeneres facit. Algam quidem mari propriam ait, paludi vero Vluam. Et hinc ille versus.

Alga venit pelago, sed nascitur Vluæ palude.

Locus.

Et hæc occasio est, cur palustrem, lacustrem, fluviatilemque Matthiolus cognominare, ir.

Alga nihil penè differt ab vluæ palustri inquit Rob. Constant. J nisi colore, quem Vluæ habet præsium, Alga vero subviridem, ad rufum tendentem. In viginosis autem & palustribus locis provenit, sine caule, foliis Graminis, ab imò cespitem prædeuntibus, longioribus quidem, nec acutis in summo: in stagnis sub aqua, recta, demersa conspicitur: cuius leuissimo aquæ motu vibrantur frondes quæ viridissimæ sunt: figuræ ligulæ, euulsæ ab radice aquis fluitant.

LVCVS MARINVS, DICTVS ROCCELLA tinctorum. CAP. VIII.

Locus.

Fvcum multi vocant quamlibet plantam marinam: alij tamen terrestres plantæ radici similem specie faciunt. Allatum ex oceano habemus. Materies eius colorem præbet nobilissimi purpurei. Quapropter priscis feminis tingendis generis expetitur, in fucum. Vnde Fuci nomen dimanauit, quod pulchritudinem fucatam atque apparentem tantum conciliat. Existimat Dioscorides Fucum esse herbe radicem, sed deceptus fuit similitudine Nam & hæc & aliæ multæ marinæ radicum herbarum terrestrium figuram a-

Fucus non
men un-
de.
Diosc. la-
psus.

mulantur. Fucus hic antequam in tincturam redigatur, parte interna ex rubello candicat, externa nigricat. Euocatur viuus eius color maceratione facta in vrina. Sic paulatim tincturam acquirit, donec vltimò species quædam (Soda) salis alkali complementi loco, & vt densetur, addatur. Fuci in compositione portio ad vrinam est quintupla, plus minùs, pro bonitate Fuci. Maceratio vno mense complebitur. Salis pars duodecima additur, quod maceranti Fuco adiectum colorem pariter, odoremque Violæ excitat atque producit. Vocant hodie *Fucum Rocellam* à colore rubro, quem præbet, inquit Imperatus lib. 27. c. 9.

Coloris pa-
randi ra-
tio.

ALGA TINCTORIA. CAP. IX.



Algæ habui a Valerando Doures portunculam, cuius inscriptio erat Alga 2. ex Candia quæ ei non abfimilis, quæ inuoluuntur vitra, latior, pari tenuitate, & lentore, fructu contumaci, colore purpureo obscuro, seu spadiceo, sapore nullo euidente, propter vetustatem forte: charam, cui inuoluebantur, purpu-

Descriptio.

reo floridior tinxit.

An Ferd. Imperato, Alga Fucus de Jata ex Synonyma. Candia quæ tinctorum videntur nomine Rocellæ.

An C. Bauhin. pin. Fucus siue Alga angustifolia 6. siue Alga cornu cerui diuisura. Herba Cretica Imperati, quæ tinctoribus Rubella dicitur:

Fucus capillaris tinctorum.



Fucus hic capillaris, quem Imperatus lib. 27. c. Descriptio citato ex otio. riente delatum scribit nomine Rocellæ, & excellentissimum ait ad tincturam, cum nobis incognitus sit, fusiùs describi non potuit.

An C. Bauhin. pin. Fucus ex Imperato 2. siue Fucus capillaceus Rocellæ: an Fucus 3. Anguilla-

Fucus

*Fucus verrucosus tinctorius.*Descri-
ptio.

ET hic ex eo-
rū numero
est, in nobis ha-
ctenus incogni-
ti sunt, quique
apud tinctores
etiam Roccella
dicitur, eodem
Imperato, loco
superius citato,
auctore.

C. Bauh. pin.
dicitur Fucus
ex Imperato in-
cognitus
3. siue Fucus
verrucosus tin-
ctorius Roccel-
la.

CORALLOIDES LENTA

fœniculacea.

CAP. X.

Descri-
ptio.

A Pede la-
to, quo
scopulis ap-
pressa hære-
re solet, rami
prodeunt co-
pules, do-
drantales,
multipliciter
divisi, lenti,
flexiles, tena-
ces: quorum
minores in
minima fœni-
culacea &
propemodum
mucosa at-
que capilla-
cea, crispæque
segmenta se-
cantur. Colo-
re porro va-

riant. Sunt enim quæ liuido, aut pallido, ac al-
bo; aliæ quæ fusco, subnigro, rufo, saturatè ru-
bro, vel purpureo; aliæ denique quæ viridi sunt
colore, & hoc in eis visu jucundum, quod bico-
lores plerumque sunt singulæ plantæ, crassiores
rami vni. tenuiores alteri, colore donati plari-
que transparenti. Quorum colorum varietates
multas adferuamus. Sapor & gustus saluginosus,
pisculentus, sub dentibus nihil sabulosi ex-
hibent: sed glutinis modò atteruntur, cui qui-
dam rami penè concolores visui. Qui hepatis
venas à parenchymate separatas videntur, rem
huic Coralloidi apprimè similem conspexe-
runt. Quædam asperantur hinc inde crustaceis
tuberculis albis; alteri adharens portio spon-
giæ ramosæ Corallinæ officinarum.

Pro hac placet apud H. Lugdunensem pag.
1372. Fuci siue Algæ tinctoriæ figura, sine de-
scriptione. An C. Bauh. pin. Mucus marinus 4.
siue tenuissimè dissectus ruber? An Lewino
Læm. de occult. nat. mirac. Algæ altera species,

Tom. III.

Zelandis VVoer, nonnullis voceri dictâ?

Copiosè obseruauit atque collegit Cherlerus Lœus:
in tractu illo Narbonensi maritimo quo Magda-
lona Agdam tenditur.

FVCVS CAPILLARA DICTVS.

CAP. XI.

C Apillara dictâ planta, est ramis donata lon-
gis, minutissimis, frequentibusque, ideoq;
capillaribus, colore rufo atque purpureo. Trun-
cis aliarum plantarum innascitur, instar Epi-
thymi. Frequenter reperitur in Fuso cupres-
sino, inquit Imper. lib. 27. cap. 9.

Descri-
ptio.

ALGA ANGVSTISSIMIS FOLIIS.


CAP. XII.

A Lgæ minimum quoddam genus Cæsali-
ni, foliis est angustissimis: cauliculo spico-
so, Gramini simili, dodrantali; cui lanosa sub-
stantia infernè est agglutinata, qualis Adarce
fertur apud Dioscoridem. Planta hæc quam
Theopr. tradit Gramini similem, reperitur in
nostro mari, inquit illic. C. Bauh. pin. vocat Fu-
cum siue Algam angustifoliam 7. siue Algam
gramineo folio.

Descri-
ptio.

ALGA CERVI CORNV DIVISVRA

CAP. XIII.



EST nobis
ex Cher-
lerianis plan-
tis vna, foliis
membranis,
rubentibus,
duarum aut
trium vnciarum,
ceruini
cornu denti-
culis incisa,
sapore fasso.
Enascitur ex
excremento
marino vt Fu-
cus Capillara,
quam non au-
sim asserere
planè diuer-
sam esse ab
Alga cris pa.

Descri-
ptio.

Lœus.

Huius figu-
ra fortè in media tabella Palmæ marinæ Chon-
dryllæ diuisurâ.

PALMA MARINA QVIBVSDAM.

CAP. XIV.

Palmæ marinæ Theophrasti nomne mitte-
batur & hæc ex Italia fructu C. Bathino.
Ejus ramuli erant plani, dimidiati culmi latitu-
dine, multifidi, nigri, aut cinerei, foliis amicti
gracilibus, brevibus, diuisurâ accedentibus ad
Chondrillam, multò tamen minoribus.

Descri-
ptio.

C. Bauh. pin. Mucus marinus 3. siue viridis
multifido folio: Mucus marinus Clus. hist. Pal-
mula marina Imperati. Næ ad Bryi genus quod-
dam referendam censemus.

Syno-
p.

Zzzz 3

Coralloides tenuifolia obsequiosa minima.

CRASSUSculi sunt ramuli, nigricantes, cornei, obsequiosi, multifidi, Coralloeidis fruticosis chorulis similes, sed minus duri, perpussilli, nulla crusta obducti. Ex Italia Fratri C. Bauhino missi.

DE MARINIS ABIETE ET QVERCV,
veterum sententiae.

CAP. XV.

Locus.

QVERCUS & Abies, auctore Theophrasto l. 4. cap. 7. ad mare, terræ quidem ambæ spectantur: sed tamen nascuntur super lapides atque hîstilia: carent radicibus, sed modo patellarum adhærent. *Folium* ambabus velut carnosum, oblongius, crassumque: & Abieti crassius, frequens, nec leguminum siliquis ab simile: concavum intus, nec quicquam intra se continens: Quercui tenue ac potius Tamaricis; color ambabus accedens ad purpuram: forma tota Abietis erecta, Quercus flexuosa, atque in latitudine magis ampliata: ambæ multicaules fiunt, sed simplior Abies: rami Abieti, longi, recti, solutique: Quercui breviores, contortiores, spissioresque: magnitudo tota ambabus cubitalis: parumve altior, verum major Abieti. Quercus ad lanas inficiendas vel mulieribus utilis: ramis adnexa pendunt pleraque animalium testigerorū, subter alia quædam cauli adhærent: ad quædam rota obesa ingrediuntur millepedæ, & aliæ quædam generis ejusdem bestiolæ, quodque polypti specimen gerit. Hæc itaque terræ, contemplatūque constant facilia. Quidam porrò vel alteram Quercum nascentem in alto referunt, quæ etiam fructum fert, & glans ejus commoda est Quin & alias magnitudine insignes quædam comperitas, homines nantes, seque submergentes referre, traditur. Hucusque Theophrasti interpretes Gaza. *Ceterum* Quercus & Abietis historiam confudisse videtur Theophrastus, multasque notas Quercui tribuisse existimat etiam Clusius, quæ Abieti, aut ejus generis arbori marinæ melius fortasse conveniant.

Quercus
alia.

Theoph.
not.

CREMENEI ISTRIS ABROTONI,
vel Thymi foliis.

CAP. XVI.



Descript.

placiter dissectis, quorum segmenta in oblongum intumescunt, turgescuntque, colore pullo

Figura ejus & facies, ceu si quis arborem quandam aspiciat. Nam primum, *truncus* est pedali ferè, crassiusculo, tuberoso, ad radicis alicujus instar fibroso, nigro. Ab hoc supernè rami exeunt compures, pedales, breviores, in alios minores divisi, foliis vestiti Abrotoni & multi-

aut nigricante: plerisque cæterum locis cinerea quadam falsugine incrustatur, alicubi etiam fungoso & spongioso tegumento. Sapor falsuginosus, sicut & odor.

Valerandus qui ex Istria detulerat, atque à quo habuimus, hæc illi adscripserat: Abies marina, Cremenei vocant Istri. Communicavit tandem ramulum ex Italia missum, frater C. Bauhinus, nomine Abietis marinæ, foliis intumescens. Et hæc jam dicto nomine bene depingitur ab Imperato, qui Fuci follicularis speciem facit & Gongolaram vocat. Figura etiam à Lobelio in Obs. p. 653. & Ic. Plant. tom. 2. p. 234 exhibita, titulo Fuci marini foliis Abrotoni maris, quidem exprimit nostrum Cremenei Istricum:

Abies marina.

C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 8. sine foliis Abrotoni: Fucus marini foliis Abrotoni maris Lob. Fucus marini tenuifolius Tab. Muscus marini foliis Abrotoni H. Lugd. p. 137. sine icone. Gongularis marina Theophrasti Imperati. *Hus* nos etiam referimus Fucū, quem Hist. Lugdunensis ibidem vocat *marinus* Theophrasti, & Tincturum, in scopulis & petris nascentem, unde avulsū vrinantes Spongiarii referunt, foliis tenuibus, Foeniculo similibus, rubris, sic tamen, ut quædā intermixta spectentur adhuc albicantia.

Synonyma

FRUTICOSA MARINA PLANTA, QVI-
busdam Conferualignosa.

CAP. XVII.



Descript.

Latā basi *Level* radices scopulis adheret: hæc fruticosa marina planta, quæ pedialis vel cubitalis ferè. Ejus *caudex* lignosus, tortuosus, totus niger, vel pulvis, quasi adustus foret, rugosus, fragilis, in ramos palmares diuiscatus, quos obident vndique verrucosa tubercula, modò longiora,

modò breviora, ad radicis Polypodij tubercula accedentia, quæ versus superiora Ciceris penè magnitudine, oliuari formâ, rugosa, crispa racemorum modo coherentia, in quorum turbato sine exeunt *coliculi*, ramulive nigri, vel rufi, in que segmenta incòdita cæsi, subinde à medio ad summum vsque denticulati, in quibusdā *folia* segmentis ad Abrotonum accedunt, paulò tamen latoribus. *Fruticosa* hæc planta non parum variat, ita ut quis diversas plantas suspicari posset. Quædam enim statim à radice plures stolones producit, aliàs vnum plerumque; videtur proferre. Obseruantur etiam ad radicem pili, quales in Algæ vitrariorum radice: Quædam tophaceis cinereis crustis obducuntur: aliis adheret linum capillare, vel muscus tenuissimus: aliæ mytilos habent, aliæ ova Sepiarum credita: aliæ pilâ marinâ obuoluntur. Sapor ligno nullus insignis, nisi aliquantulum adstringens, cum leui

leni callegine, quæ in folijs euidentior.

MYSCI MARINI GENVS FOLIIS pinnatis: & Abies Clusij Belgica,

CAP. XVIII.

**Defcri-
ptio** **T**Rium vnciarum est altitudo, in pulchros
ramulos vnciales & fescunciales fissa, viuio
viore tincta, folijs pinnatis annexis, vt in Viola
aquatica, apophysis vnnnullis inæqualibus.

**An Mus-
cus** An Lob. Ic. pl. tom. 2. p. 1050. Muscus co-
ralloides alter abus? Icon Lobelij quidem con-
uenit sed color, qui nos dubitare facit, discre-
pat.

Abies Clusij hift. Lobelij icones habet pro Abie-
re marina Belg. de qua scribit quæ sequuntur:
Abietem marinam Theophrasti mihi ignotam
facior; memini autem obseruare annis 1566. &
60. in Flandriæ ora maritimâ arbusculam ostre-
orum testis & mynelorum conchylijs adnatam,
quæ Abietis figuram ita referebat, vt pumila
Abies videretur, ramulis ordine vtrinque dispo-
sitis, fragilis admodum, pusilla, rarb palmi altitu-
dinem excedens, ex tenuibus veluti iquamis con-
texta, nonnunquam omnino plana, & alia inter-
dum in orbem prominentibus ramulis dispo-
sita.

Synonyma C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 13. siue A-
bieri similis maritima. H. Lugd. p. 1368. siue ico-
ne, Muscus candidus coralloides, iquamulis lo-
catus.

ERICA MARINA QVIBVS DAM CAP. XIX.



**Defcri-
ptio.** **V**est quam
Cremi. ea Alg-
gita tota te-
rior, ramuli
tenuibus, non
signosis, rigi-
dive, non nū-
rūs tamen fre-
quentibus, imò
lavis diuolus
& ad fœcula-
laccam Algæ
accedentibus, fi-
bris tamen vi-
cunq; tenuio-
ribus, inque
turgidulas ve-
ficulas desinen-
tibus: nigricat
iam sicca.

Similis missa
est fratri C. Bauh. ex Italia siue nomine, in quâ tur-
gidula folia non animaduertit: An eadem, vel di-
uersa asserere non auidemus: in nostra icone por-
tionem pictam exhibemus.

Synonyma An Myrica marina Batavica Clusij
C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 14. siue Ta-
marisco similis maritima: Myrica marina Ba-
tavica, Clusij hift. An Tamariocia Fucus, Im-
perati: Nos hanc sui generis plantam facimus.

FVCVS CUPRESSIVS IMPERATI.

CAP. XX.

**Defcri-
ptio** **F**Vcus cupressinus, quem aliqui existimant
Quercum Theophrasti, Imperato monente,
scopulis & telluris marinis adhæret. In

ramos abit, & hi rursus in minores, frohde breui,
copiosâ, & acuminata, colore virecente atque ni-
gro, quando exsiccantur. Altitudo dodrantalis, fi-
gura quasi in conum fastigiata, & Cupresso simi-
lima. Frequens admodum est planta, qua piscato-
res ad cooperiendos pilces vtuntur quos recen-
tes conseruare volunt.

Faciem hanc cupressinum Imperati vocat C.
Bauh. pin. Fucus folliculaceum 15. siue Cupresso
similem.

Cupressus marina Belgica, Clusij.

ME ninit Clusius anno 1566. & 1567. in Flan-
diæ ora maritima arbusculam ostreorum
testis & mynelorum conchylijs adnatam obserua-
re arbusculas, quæ Cupressos ita æmulabantur,
vt satis mirari nequiret providentiæ diuinæ opus
& artificium, ramulis frequentibus in orbem, sed
nullo ordine nascentibus, & sursum spectanti-
bus, cupressinorum foliorum modo efformatis.
Harum autem, tametsi aliquot annis inter char-
tas adseruatarum & compressarum rami, si in vi-
trum aut aliud vas aqua plenum injiciantur, sta-
tim sese explicare, & in orbem diffundi, seque
surgere incipiunt: eaque aded de causa
piscatorum vulgus satis obicænum illis nomen
indidit.

FVCI PLVRIMI ALII. CAP. XXI.

Fucus marinus dictus Lanuta, albus.

Planta marina, dicta Imperato Lanuta Fucus
marinus, proximius quam vlla reliquarum
dictarum ad herbæ cuiusdam radicem accedit.
Rami candidi, flexiles, lumbricis similes, super-
ficie inæquali, retis instar intertexti, breui lanu-
gine vestiti: quorum extrema in germina finiun-
tur, orbiculati, in speciem alicuius stellæ, aut
ramulorum umbellæ congesta. C. Bauh. pin. Fu-
cus Imperati incognitus 5. siue Fucus marinus la-
nuta.

Fucus Radicella dictus, siue Vermicu-
latus albus.

Imperato Radicella est Fucus vermicularis qui-
dam, tridemque herbarum radiculis similis.
Color albus & cū adhuc recens est aliquantulum
purpureus. Alijs herbarum stipitibus increscit
quemadmodum Epithymus: Estque Fuci cupres-
sinæ frequens incola. C. Bauh. pin. Fucus ex Imper-
ato incognitus 6. siue Fucus Radicella, siue Ver-
micularis.

Fucus Terzola, Vermicularis species, facie Myrica,
coloris crocei.

Terzola Imperato species est Fuci vermicula-
ris, summi nati Myricæ quodammodò effigie
respondens. Eius substantia tenera fragilis, pelluci-
da, & ad virorem vergens ramis præcipui parvis
quibusdam appendiculis circumdari ordine quo-
dam tertio quoque interstitio: quorum exma
quasi truncatæ, sepe etiam bifida. Altitudo mediæ
spithamæ ad lummum æquat. Et quavis ramis
sit subtilibus, facillè tamen in ære suapte nature
sustinetur. Appendices interdum inæquales fiunt,
alijs supereminentibus alijs. Nascentur in Tropæ
agminatim, & marcescens erecsum acquirit colo-
rem.

Synon?

Lotus

Defcri-
ptio

Synon?

Defcri-
ptioSynony-
ma.Defcri-
tio

Locus

Synonyma. C. Bauh. pin. Fucus ex Imperato incognitus 7. siue Fucus Terzola, Vermicularis species

FVCVS TAMARICIOLO, SIVE TAMARISCIFOLIA marina.

IN ramulis palmaribus gracilibus denticulata pulchre foliola, vt Myricæ Narbonensis ramulum arbuteris.

Descriptio. Tamariciola, inquit Imperatus, est inter Fucos teneros & fragiles recensenda, sicut Terzola. Scapos erigit rectos, teretes, in acumen desinentes, à pede ad summa vsque minutulis appendiculis circumdatos, quarum vnaquæque fronde quadam præterea vestita, à Tamarisci fondibus non admodum dissimili. Color vix plurimum aqueus. Siccata pennarum fasciculorum quodammodò refert.

Synonyma. Fucum hunc Tamarisciolam Imperati, C. Bauhinus in pin. eandem suspicatur cum Myrica marina Barauca Clusii, quæ ipsi est Fucus folliculaceus 14.

Fucum maritimu Forcellata Lumbricaria species.

Descriptio. Forcellata, Imperato autore, est à numero Lumbricarum dictæ, quæ ab imo loci (siue in frequentes ciliatæ ramulos, tandemque in impuras terminatur forculas Tertiam quæ hæmez aleitudinis partem nanciscitur. Color ex rufoso & purpureo mixtus. Casp. Bauhin. pin. Fucus ex Imperato incognitus 8. siue Fucus forcellata lumbricalis species.

Fucum Tremula, media inter Palmetam & Lumbricariam.

Descriptio. Tremula Fucus medius inter Palmetam & Lubricariam. Rami vna parte compressi, quorum distans folia quibuldam ferulaceis similis aperta, expansa, rarique, quorum extrema incuruuntur. Contrectus est tremulus, quod à mediocti crassitie cum firmitate coniuncta accidit. Inuacitur testaceis marinis, vt Imper. annotat. Casp. Bauhin. pin. Fucus ex Imperato incognitus 9. siue Fucus tremula.

FVCVS SCOPARIA, SIVE PENNACHIO MARINO.


Descriptio. Scoparia, Pennachio marino dicta fronde villosis pennarum similis est, pilis longiusculis, ite alijs breuissimis vestita. Nomen tribuit à frondis illosi ramos ambientis specie: Summis in æqualem & quasi derafam planitiem terminatur, id èque & opam quodammodò repræsentat, aut pictorum penicillum.

ROSA MARINA.

CAP. XXII.

Descriptio. Petrus in orbem est ramis palmo longioribus, angustioribus, coloris cinericei, per extremum diguatis, crispis, asperis.

Hanc habemus ex plantis Valerandi qui eam



Rosæ marinæ vitulo donauit. An quis alius, & quo nomine hanc agnouerit, non occurrat.

BVLEVS MARINVS CRINITVS. CAP. XXIII.



DE hoc Bulbo. Anno 1596. hæc leguntur in Navigationibus Indico. le. more conscriptis. Inter quasdam Insulas huius tanta stirpis eleganter expressa copia prouenit, vt naues hanc supergredi coactas quandoque remoretur. In fundo maris crescit, quatuordecim vel

quindecim. bra. horum longitudo, quatuor vel quinque altitud extra aquam emmens, colore cæruleæ, caule latis crasso, ex quo per intervalia oriuntur bulbi ex fastigiis capillitium quoddam erigentes. Radix et filia, bulbosa, quam plurimis fibris capillata.

H. Lugd. p. 109. Bulbus marinus crinitus, & C. Bauhino phyt. & pin. ubi inquit quid sit

ALGA MEDERENSIS GRANDI FOLIO.

CAP. XXIV.

IN Algarum genere recipit Cæsalpinus grande quoddam folium, æquale, ac planum, simile prælo: g. s. chartarum ichedis quod ex Medera aduenit cum saccharo: vixitur enim eius folijs pro veste acimento, ne panes sacchari atterantur. Hoc genus quod adfertur cum saccharo ex Oceano Atlantico, est Theophrasti, quod admirabili magnitudine crescit circa Herculis columnas: Dioscoridis verò Phyci genus lato folio.

Imperatus lib. 17. cap. 11. vocat Fucum giganteum, alij Algam latam: Nasciturque in maris sinibus, folia sunt substantia tenacia & coacta.

cea. Iis vtuntur Oceani inhabitatores loco chartæ, & faccharum etiam iis inuoluunt. Eidem dicitur Palmifolium Giganteum, aliis *Barandine*, à folij longitudine.

Lobelio in obs. p. 652. dicitur *Vrack* Nortmannorum. Hist. verò Lugdunensi *Zoster*, id est, Cingulum & Baltheus.

C. Bauh. pin. Fucus siue Alga latifolia 6. siue chartæ similis, costa carens: Folium grande ex Algæ genere &c. *Eidem* Fucus siue Alga latifolia 7. siue coriacea. Palmifolium giganteum, siue Fucus giganteus Imper. An vrak Nortmannorum Lobelio.

LACTUCA MARINA SIVE Intybacea.

CAP. XXV.



expansam. Talis Istriaca, talis & Narbonensis quæ minor, cui adhæret Muscus marinus.

Lactucarum in mari meminit Aëtius lib. 19. cap. 15. aitque esse germina lata, & oblonga ac viridia, tenuia & subrugosa, ac veluti conduplicata, ad littora maris per fluctus eiecta.

Facile tamen crediderimus Bryō Theophrasti, Dioscoridis & Plinij esse stirpem de qua hoc capite agimus, & Aëtij Lactucam maritima.

Dodonæo gall. Muscus marinus, Theophrasti *βρύον θαλάσσιον* gall. *Mousse marine à large feuilles*, Brab. *Zee mosch*, videtur prima species *oivoc*, i.e. Fuci aut Algæ Dioscoridis, Lat. in fol. vocat Fucum marinum priorem, Fuci Theophrasti genus primum, non modò folio lato, sed & extenso, ac herbidi coloris: aitque hujus meminisse Aristotelem de animal. hist. c. 6. definientem esse purgamentum maris, fierique Aëtatis initio, eoque ostreas tum & pisciculos ali. Atque hujusmodi Fuci genus Oceano germanico familiare ait Dodonæus, circa saxosos scopulos, quod vnà cum mitulis, conchis, ac ostreis prima Aëtate subinde ad vicinalia loca defertur.

Rob. Constantino apud Amat. Algæ siue Fuci marini genus hoc suffrutic. videtur potiùs, quàm herba. Vocat autem Viscum marinum, folio crispè Lactucæ, & colore ab Alga differens, quòd furculis rubris germinat, substantia verò & toto aspectu glutinum taurinum ementiatur. Celsipinus Bryon Theophrasti & Plinij vocat. Impegratus Folium marinum, siue Lactucam marinā,

Tom. III.

C. Bauh. pin. Fucus siue Alga latifolia 1. siue Muscus marinus Lactucæ folio, Fucus marinus, 1. Diosc. & Theophrasti: Bryon Lactucæ foliis Plinij & Lobelij: Muscus marinus alter, Martiol. & Cast. Muscus marinus Theophrasti, Dodon. gall. & Lugd. Therapidian. Cratenæ, Ang. Bryon. thalassion, Turn. Muscus marinus virens latifolius, Dodon. Belg. Lactuca marina, Tab. *Fallitur C. Bauhinus*: dicitur Tabern. Lichen marinus, *Meerflecken*.

Vires Bryi Dioscoridis & Plinij huic plantæ conuenire non negamus. Eæ autem traditæ sunt cap. 1. hujus libri, Commodius autem hæc applicatur arthritidi quàm Muscus capillaceus, siue *Co allina*. Camer. easdem penè vires, quas Pulmonariæ arborum adscribit, nisi quod propter salfuginem magis extenuare dicant. Ea propter vtilissimam prædicat applicatam calidis tumoribus & podagræ à bile ortæ.

Fucus Linza dictus, Lactuca marina similis.

Fucus Linza dicta, Lactucæ marinæ similis: sed in eo differt quod tota in fascias (Linze) longas diuisa sit, eodem Imper. authore cap. 12. C. Bauh. pin. Fucus siue Alga latifolia 2. siue Muscus Lactucæ marinæ similis.

ALGA LONGISSIMA, LATO TENVI- que folio.

CAP. XXVI.

Hæc posteriori non multum absimilis, ex radice nigra, fibrosa, pediculus tenuem, triuicalem emittit, qui in folium sesquicubitalis longitudinis, vnciarum quinque vel sex latitudinis, planum, per margines hinc inde conuolutè absumitur: coloris pallide virentis est, substantiæ tenuissimæ membranæ: hunc cum aliis maris mediterranei purgamentis reiectum, non longè à montis Cetij radice, collegit C. Bauhinus. Dicitur autem ei in prodr. Fucus maritimus 4. siue Fucus longissimo, latissimo, tenuique folio. Eid. pin. Fucus siue Alga latifolia 4. siue Alga longiss. lato tenuique folio.

Alga longissimo, lato, crassoque folio.

Radice est breui ex crassis fibris composita, Rex qua pediculus crassus, rotundus, semipalmaris prodit, qui in folium expanditur: folium vnum ingentis longitudinis pedes aliquot & vltas excedit (rarior ex vna radice duo folia ejusdem omninò formæ & longitudinis,) & latitudine vncias quatuor superat, ejusdem ferè per totum folium, principio excepto, latitudinis, in medio æqualiter planum, ad vtrumque verò latus paruum, conuolutum, tortuosum & sinuosum, obscure virens, crassum, & dum terræ adhuc affixum, tactu forma gelatinæ, viscosum & madidum: quare propter nimium madorem vix asseruari potest, licet sæpius Soli exponatur: nam quoties chartæ reponitur, mador iste cum fetore recrudescit, ita vt à corruptione non nisi post aliquot septimanas, donec planè siccetur, seruari possit. In Galliis ad maris littora versus S. Malo provenit & è natali solo facile eruitur.

C. Bauh. prod. Fucus maritimus 3. Eid. pin. Fucus siue Alga latifolia 5. siue Alga longissimo lato crassoque folio.

Aaaa

synonym
C. Bauh.

C. Bauh.

Vires
& Vitis

Defect
ptio.

Synon

Defect
ptio

D

Synon

Synonym
C. Bauh.

Defect
ptio.

Lact. mar.
Aëtio.

Nomina
linguat.

Alg. sus-
frutic.

Fucus axungie accedens.

Descript. *A* *Spongiale* dicti Fuci sunt consistentiâ crassâ, & dum in aqua adhuc sunt, tenera, & axungiam referente, quippe qui contracti liquescant & dissoluantur. Sed in aërem expositi, humor exhalat, & membranæ remanent siccae atque subtiles.

Est & hujus species quædam cristæ gallinacæ similis, quæ ab exiguo principio instar Rosæ majoris dilatatur. Folia ejus in eminentias terminantur, in morem cristæ galli, colore suo primario croceo.

Alia etiamnum Fuci cristati est species latifolia, cujus nimirum folia ad palmarem amplitudinem extenduntur, in ambitu Aloes Americane instar fimbriata, colore ruffo & croceo sicut prædicta. Nascuntur ambæ in cauernis & locis opacis. Dantur à nonnullis phrhyficis & hædica febre consumptis.

C. Bauh. pin. Fucus ex Imperato incognitus
sive Fucus axungia.

PENNA MARINA.

CAP. XXVII.

Descriptio. *P*enna marina *caulem* surrigit substantia Adianto similem: figura totius alam auis aliquis refert pilis raris è costa prodeuntibus. Scopulis innascitur, testisque marinis modico intervallo à se inuicem distita.

Synonyma. Imper. 1. 2. c. 12. Penna marina C. Bauh. pin. Muscus maritimus, sive pennæ similis.

Pennaria marina.

Descript. *E*st hæc pennæ similis, attamen ramorum diuisura dissimilis: qui subtiles & Adianti firmiusculi in palmum expansi sunt, sicut alia plurima marina. Ramorum diuisuris muscositas quadam telam aranæ referens adhæret, quæ eadem & in pennis ipsis obseruatur.

Synonyma. Imper. Pennaria marina: Casp. Bauh. pin. Muscus maritimus 7. sive Adianto affinis.

MYRIOPHYLLVM PELAGIVM.

CAP. XXVIII.

Descript.

*E*legantis & peregrinæ hujus plantæ picturam, Clusius cum caulis infima parte & radice à Cortuso accipiebat qui valde apto nomine Myriophyllum pelagiū Cortusi, appellauit Muscū maritimum 6. sive Filicis folio, C. Bauh. pin. Piscatores verò Italici *Pennachio delle Nimfe*, & *Palmna di Nettuno*: quidem etiam

Sectro di Nettuno nuncupabant.

Locus.

Nascitur in altissimis gurgitibus maris Illyrici, vnde piscatores extrahunt hamis & instru-

mentis, quæ ipsi *Sperne* appellant.


Referebant præterea vtilem esse aduersus morsum omnium serpentum marinarum, & virulentos piscium ictus: applicatam supra leuia recentia vulnera; ea vigintiquatuor horarum spatio curare. Cortusius autem ejus periculum se fecisse scribebat, ad vermes necandos & ejciendos, illamque non minoris esse efficacitæ deprehendisse, quàm quævis Corallina, etiam minore quantitate datam.

POLYPODIVM MARINVM.

CAP. XXIX.

*N*omen obtinuit à similitudine *caulis*, quam habet cum terrestri, qui repens hinc inde locis hæret, vnde prognascitur, *filia* quoque simili ratione modoq; Polypodij quercini surriguntur, sed figura dissimili, & ad Adianti folia accedentia. Scapus substantia constat lanuginosa. Sæpius Zoophytis hæret, quæ referente Imperato, Italici Neapolitanis *Carnume* dicuntur.

Polypodium marinum, Imper. Muscus maritimus 8. sive Astiante similis alter, C. Bauh. pin.

SCVTELLARIA SIVE OPVN-
tia marina. CAP. XXX.

*I*nter naturalia nostra à multis jam annis pulchellam plantam marinam referuamus sub nomine *Colique*, forte à piscatoribus marinis ita dictam: vnde verò nacti sumus, non amplius recordamur. Pede est crassiusculo, fungoso vnciali. A quo *surculi* (si ita vocare fas sit) prodeunt

plures ex meris *foliis* mutuo incubitu constâtes, ita vt alterum ex alterius margine enasci videatur, instar corollæ cujusdam qua preces connumerari solent: aut vti propius accedamus in re non vsq; adeo dissimili, sicut in Ficu Indica quâ Opunciam vocant. Surculi isti rursus in alios terales diuancantur. Singularia porro istius concatenationis *filia* orbiculata sunt, vtcunque latiora quam longiora, nummi instar compressa crassiuscula tamen, nonnihil rugosa, quæ diligentius inspecta velut ex binis membranulis compacta videntur: ac prima quidem vnguis ferè latitudine, pauca quedam lupino paulò majora, alia medio modo se habentia: Cæterum superius plerumque solum quâ gibbum inferioris excipit modicè sinuatum est. In extremis quæ sunt foliola, plerumq; vix Lentem superât. Adhæret nostræ plantulæ in quibusdam foliis, muscus quidam candidus, capillaris. Tota plantula saluginosa est tum odore, tum sapore: Dentibus muscus adhærens commoritur stridet.

Eam ad Clusium mittebat Neapoli Imperatus, adscripto Sertulariæ nomine, quia veluti sertum aliquod, aut corollam ipsius folia ita com-
repre-

Vires:

Etymon.

Synonyma

Descript.

ea representant. Cortufus verò è Corfica plantam se accepisse scribebat Coralline latifolig appellatione: nomen autem illi imposuiffe, Opuntia marinae littoralis & saxatilis; satis (Clusij quidem sententia) commodè ratione. Nà Theophrastus 1. cap. hist. c. 12. scribit circa Opuntem herbulam esse quandam, quæ ex foliis radicem mittat, ac cum suavitate mandi possit. Plinius verò ipsum sequutus lib. 21. cap. 17. circa Opuntem, inquit, Opuntia est herba, etiam hominidulcis: mirumque è folio ejus radicem fieri, ac sic eam nasci. Et certè credibile est hanc plantam recentem cum aceto, sale, & oleo, vel etiam sine sale, non minus suaviter edi posse quàm Portulacæ marinæ & similium folia.

Cæterum qui Cortufus plantam è Corfica insula mittebat, addebat iisdem facultatibus eam pollere, quibus reliquæ Corallinae.

C. Bauh. apud Marth. vocat Ficum maritimam, atque in foliorum summitate producere florem paruum oblongum, modò vnum, modò plures, colore rufescente. In pin. vocat Ficum subrotundum, siue Ficum folio rotundo: Serotariam Imp. Corallinam latifoliam & Opuntiam marinam Cortufi: Lichenem marinum Clusij histor.

PALMA SIVE MANVS MARINA quibufdam.

CAP. XXXI.

Amputata à radio cubitoq; manum affabrè exprimit, ac ex carpo crassiflore (compresso tamen) albicante, angustiore, in metacarpum sensim dilatatur, hinc in digitos quater-nos, quinos, pluresve ferugineos, rugosos, fungos, multifidos diuiditur, qui rursus in minores particu-

las subdividitur. Tota substantia coriacea quodammodò est & membranosa: sapor & odor salus.

Gesneriana icon de Zoophytis marinis ord. 7. circa 15. digitos habet. Vocatur autem Manus marina à similitudine quadam.

C. Bauh. pin. Fucus ex Imperato incognitus 17. siue Fucus aliquibus Palma marina duplex, vel cortice rugoso, vel læui.

FVCVS CAVVS. CAP. XXXII.

Descript. Cava dictus Fucus marinus nascitur cum foliis longis, fasciis aut tæniis similibus, sed cepaceis foliis in morem concauis atque canaliculatis, colore viridi, substantia subtilissima.

Sygon. C. Bauh. pin. Fucus subrotundus 5. siue cauus, Herba caua Imperati.

Tom. III.

CORALLIVM RVBRVM

CAP. XXXIII.

Corallium, quod aliqui Lithodendron (Κοράλλιον ὅτι ἐν τοῖς λίθοις ὡρίσθαι) appellant, marinæ esse plantæ constat ex Diosc. Ea quidè alto mari exèpta, duratur statim atq; emergit, quasi à circumfuso nobis aère, lapidescat, concrefcâtve. Plurimum inuenitur in promontorio Syracusis imminente, cui Pachyno nomen est. Probatissimum rubens, colore Sandarachæ, aut Sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, & æquabili vsquequaque concremento, in superiq; Musci aut Fuci marini odorem referens, & quàm ramosissimum, forma fruticis, Cinnamomi emulium. Quod autem in lapidis duritiem coit, scabrosum, fistulosum, ceu concauum, præterea & inane, seu spongiosum, vitiosum existimatur.

Ouidius 4. Metam. in fabula de Andromeda & Perseo, Coralli proprietatem ita describit.

Nunc quoque Corallia eadem natura remansit,

Duritiem talio capiant ut ab aère, quodque

Vim in equore erat, fiat super æquora saxum.

Idem lib. 15. ejusdem operis:

Sic & Corallium, quo primis contigit auræ

Tempore, aurefcit, mollescit herba sub undis.

Corallium, marinū esse fruticem, & ex alto extractum durari statim, atq; idè Lithodendron vocari comprobant verba Plinij. Quantum apud nos (inquit lib. 31. cap. 2.) Indis margaritis pretium est, tantum apud Indos Curalio. Namque ista persuasione gentium constant. Gignitur quidem & in rubro mari, sed nigrius: item in Persico, vbi vocatur Iace. Laudatissimum in gallico sinu circa Stæchadas insulas, & in Siculo circa Heliam ac Drepanum. Nascitur & apud Grauiscas, & ante Neapolim Campaniæ: maximeque rubens, sed molle, & idè vilissimum Erythris. Forma est ei fruticis, color viridis. Baccæ ejus candidæ, sub aqua molles: exempte cõfestim durantur & rubescunt, quasi Corna sativa, specie atq; magnitudine. Aiunt ractu procius lapidescere, si viuat. Itaq; occupari, euellique rebus, aut acri ferramento præcidi. Hac de causa Curalium vocitarum interpretantur. Probatissimum quàm maximè rubens, & quàm ramosissimum, nec scabrosum aut lapideū, vel rursus inane vel concauum. Authoritas baccarum ejus nō minus Indorum / Iudeorum, malè Bas. cod.) viris quoq; pretiosa est, quàm fœminis vniones Indici. Aruspices eorū vatesq; imprimis religiosum id gestamen amolendis periculis arbitrantur. Itaq; & decore & religione gaudent. Prius quàm hoc notesceret, Galli gladios, scuta, galeas adornabant eo. Nunc tanta penuria est vendibili merce, vt per quàm rarè cernatur in suo orbe. Idem lib. 37. c. 10. ait Gorgoniam nihil aliud esse, quàm Corallium: nominis verò causam esse, quòd in duritiem lapidis mutetur. Cæterum addit, sed falsò, emollire maria: legendum enim est, mollem in mari esse.

Matthiolus perhibet Coralliū ex Tyrreno & Siculo mari extrahi, atque inde ad Italos deferri. Plinium miratur (vt etiam Amarus, Lacuna & Cornarius) quòd tam facile sibi persuaserit, Corallium per se baccas ferre, quasi Corna sativa specie atque magnitudine, perinde atque cæteræ arbores suos proferunt fructus. Quandoquidem, vt fatentur ij, qui Corallia expiscantur, & in iis mercaturam exercent, nullas per se baccas edunt, Baccæ enim quæ in-

Lithodendron apud Dioscorid.

Locis

Ouidius

Curalium Locis.

Vitis

Coralliorum monilib. cornis ac cerasis similes visuntur, ex ipsorum truncis torno, & lima prius parantur: mox smyridis lapidis puluere, & terra quadam, quæ è Tripoli Aphricæ adfertur, expoliuntur, & lucidum læuorem contrahunt, cum iis diutius fricantur. Adhæc Corallia è mari circumquaque muscosa eximuntur, nec tunc vlla ex parte rubescunt, verum inde artificibus tradita, derafo cortice rubent, & perpolita nitescunt.

Cesalp.

Corallium frutex, inquit Cæsalpinus, villosa substantiâ oblitus est, instar Musci: colore viridi, aut cinereo, intus rubro, qualis est color carnis, aut intensioris rubedinis, qualis cocci: tradunt succosam esse plantam, succo lacteo: renascenti, ubi lac contigerit. Figura autem est arborea, lapidibus hærens, cubito breuior: multis ramis, tortuosis, sine foliis, sine fructu, ac sine radice. Falsò Plinius putauit baccarum formam, artificio paratam, spontè nasci.

Gesf.

Gesnerus de fig. lap. inter alia, Corallium sexu distinguit. Ac rubri quidem, marem rubentiorè tradit, fœminam verò dilutiorem. Ad hominis proceritatem aliquando accedere dicitur.

De Corallio vide Agricola lib. 4. de nat. fossil. & Leuinium Lemnium lib. 2. c. 22. de occult. ubi ait mulieres Coralium deterius facere. Aperit autem hallucinatur Agricola credens Bryon Dioscoridis & Plinij esse Corallium.

Imper.

Ferd. Imperato Coralium rubrum vegetabile marinum est, quod à primo tritico in ramos abit, qui rursus in alios, atque minores diuiscuntur: sic speciem gerens arboris foliis & fructibus orbata. Substantia petrosa est, densa, quæ præclaram atque insignem polituram admittit. Scopulis aut fortè cuidam substantiæ testaceæ affixi reperitur. Vegetabile esse non tantum inde constat, quod crescens propriis sese viribus sustinet, sed quod scandentium instar vicinis plantis lignosis innititur, atque fulcitur, quæ figura & ramorum diuiscatione ipsi Corallio similes.

Corallij huius species colore etiamnum variantes aliquot sunt. Sunt enim aliæ saturè rubræ, aliæ laceritiæ, aliæ dilutiores, aliæ ad flauum tendentes. Sunt & quædam in fusci coloris varietate permixti, quasi earum substantia ex succo minus purgato variòque sit compacta.

Hist.

Lugd. not.

H. Lugdunensis Rhapsodus maximè hallucinatur, quod pro Corallis rubro & albo p. 1375. ponat figuram Coralloidis fruticis Lobelij.

Synonyma

C. Bauh.

C. Bauh. apud Matth. pro Corallio albo & rubro ponit figuram ex Lobelio, qui tantum pro albo posuerat, & non pro rubro. Eid. pin. Corallium i. siue rubrum: Corallium Gesn. Lob. Lugd. & Cæs. Corallium rubrum Imper. coloris vel intense, vel dilute rubri est, vel sublauescentis, vel fusci.

Nomina linguar.

Græcis κοράλλιον & λιβιδόειδος: Lat. Corallum & Corallium: Germ. Corallen Bassad, Belg. Corael Gall. Coral. Ital. & Hisp. Corallo: Arab. Bassad, Mergen Bassad, siue Morgan.

Vires.

Corallium adstringit & refrigerat mediocriter, ex crescentia coercet, oculorum cicatrices abstergit, vlcera eorundem caua explet, ac cicatrices extenuat. Contra sanguinis reiectiones excretionè seu efficax est, & vrinæ difficultate laborantibus auxiliatur. Quin & potum ex aqua, lienem absument. Surculi infantia alligari, tutelam habere creduntur, ait Plinius. Contra verò torminum, vesicæ, ac calculorum mala in puluerem igne redacti, potius cum aqua auxiliantur.

Simili modo ex vino poti, aut, si febris sit, ex aqua, somnum afferunt. Ignibus diu repugnat. Sed eodem medicamine sæpius potò tradunt lienem quoque absument, sanguinem reiectionibus excreantibusque medentur. Cinis eorum miscetur oculorum medicamentis. Spissa enim & refrigerat. Vicerum caua explet. Cicatrices extenuat. Corallio usque adeo abundare Italiam, addit Matthiolus, ut ferè nullibi reperiantur infanti, nullæque puellæ quibus non gestentur Corallij monilia aut collo, aut brachiis suspensa, quo item vtuntur fœminæ in templis ad suas preces faciendas, Cæterum scribit comitilib. commodè ad alligari, hauriendumque præberi. Famam esse Corallium ædes à fulminura iniuria tueri. Idem mensium abundantiam cohibere, dentes commotos firmare, desquamatas gingiuas emendare, itemque oris vlcera sanare. Potum dysentericos iuuare, feminis profluuium in viris, nocturnasque pollutiones, & in mulieribus albos vteri fluores reprimere. Recenseri inter ea (Aucenna teste) quæ cordi hilaritatem adferunt. Corallio, inquit Lobelius, ædes à fulminum iniuria tueri superflitiosum & fabulosum. Quoties siccandum, & sistere oportet eruptiones quasvis menstruas, dysenterias, & cruentas deiectiones, ad Corallia refugium quidem, sed vltà efficacius siccant. De iis nihil Galenus in lib. de simpl. med. facult. De variis verò eorum Hermetici præparationibus consulantur Chymici.

CORALLIVM NIGRVM SIVE ANTIPATHES, & adulterinum.

Corallium nigrum.



PRO Corallio nobis ab amico demonstrabatur stirps hæc, à vero Corallio haud paucis notis differens: Erat hoc firmum, nigrum, lentum, lucens & læue quidè, paucis tamen veluti verrucis alicubi inæquale, ramosum, durum, ac penè osscum Verum quia flectebatur, & dentium attritu tenacissimum erat, accidit vt an scitum esset, dubitauerimus. Saltem hoc scimus non lapideam habere substantiam, sed lentam potius. In medio neruulum habet rufum.

Quod à γρυμὰς vocant, κοράλλιον esse putauit vel ipse Dioscorides, specie quidem solum differens. Describit autem colore nigrum, arboris figurà etiam ipsum, sed magis ramosum: aitque vim eandem, quam rubrum habere. Corallio simile dixit etiam Plinius & sine foliis esse.

Cornarius statuit Corallij tertium genus nigrum, rarum in Germania, Antipathes Plinij, & fort. His

De seipso.

fortassis eiusdem Idos Plocamon.

Corallium nigrum. Matthiolus nigrum Corallium primum vidit Neapoli, Eburnum colore referens. Post pulcherrimam eius plantam dono ipsi dedit Anzianus quidam, prope radices brachij ferè crassitudinem æquantem, & à medio trunco in ramos sese diffundentem; rarà quidem; sed visu dignam.

Pseudo Corallium nigrum.



Synonyma

Amatus in Dioscor. ait se Corallium nigrum, Antipathes, vidisse Ferrariæ & Anconiae. Antipathes hodie rarissimum, siue

Corallium nigrum verum in Gallicia Hispaniæ inueniri ait Gesn. de fig. lap. c. 10. Antipathes siue Corallium nigrum Dioscoridis (vt vocatur in Obs. pag. 6. & Ic. Plant. tom. 2. pag. 251.) Matthesii inter Corallia occurrere, insigni leuore perpolitum, colore nigerrimo, testatur Lobelius. Imperatus Corallium nigrum, substantià omnino simile ait rubro, & colore nigro tantum separatur, atque raritate.

Antipathes siue Corallij nigri iconem ex Lobelio proponit H. Lugd. p. 137 6. itemque C. Bauhin. apud Matthiolum vbi Corallium nigrum Dioscoridis vocatur. Est hoc ei in pin. Corallum 2. siue nigrum.

Antipathes bifurcum, siue Corallium foliatum.



Pona in Baldo monente, Antipathes siue Corallium foliatum est foliis minutis, instar setæ porcorum, seu aristæ triticeæ. Inuenitur in maris Sardiniae fundo inter Corallia piscandum. Est autem longitudine vnus hominis staturæ, & vocatur in illis partibus vulgò Sambeggia.

An C. Bauh. pin. Corallina 6. siue nigra setacea? Antipathes secunda species Ponæ.

Corallium album & Corallium album officinarum oculatum.

Inter naturalia nostra Corallij albi officinarum truncum ramosum aduersamus. Maxima



crassities nostri, ferè carpi humani est, pars quæ hæret lapidea, porosa; substantia solida, lapidea, ponderosa, exteriùs læuis, tota candida; multis foraminibus radiatim intus striatis donata. Rami tementè & inæqualiter diuisi, tortuosi, quos cum radice Polypodij, si figuram spectes, haud malè conferri posse dixeris.

Cornarius notum ait vulgò vbique Coralliū albo colore. Albi tamen neque Plinium, neque Dioscoridem mentionem secisse, nisi id sit, quod Dioscorides colore pallidum dixit atque damnavit

Suspiciatur Cæsalpinus Ebur fossile esse apud Theophrastum, quod vt Plinius refert, candido & nigro colore inuenitur. Apud Auicennam etiam mentio fit albi Corallij.

Cæsalpino porro si credimus, incertus est Corallij albi officinarum, nitore & candore Eboris, odus. Matthiolus tamen author est Corallium nūc candoris in Tyrreno & Siculo mari reperiri, non quidem, vt rubrum, compactum; ponderosumque, sed læuius ac rarius, spongiarum modo inane.

Rapodus Hist. Lugdun. non bene posuit pag. 137 4. figuram Coralloidis fruticis pro Corallio albo Lobelij in Obseru. pag. 650. Ic. tom. 2. pag. 153.

Imper. distinguit Corallium album à nigro densitate & politura, quam recipit, sed in cæteris omnibus rubro simile dicit, albedine pura & lactea; non adeo siuequens. Tradit & alterum Corallium album, fistulosum, valde ramosum, in superficie foratum, quod ex Sicilia adferri testatur. Cæterum eius pictura optimè respondet iconi nostræ ex Corallio nostro paratæ.

Corallium album, Amato. Lac. Gesn. de lap. fig. & C. Bauh. pin.

Amatus adstringendi & refrigerandi vim adscribit omni Coralli generi, sed albo potentior, proinde eo vtuntur Medici vbi maiore est opus refrigeratione.

Corallium candidius verrucosum punctatum, & Corallium stellatum albi puri coloris.

Corallij hæc species Imperati colore est quam vulgatè candidiore, superficie tenus punctata, tuberculosa. Trunco cæteroqui ramisque crassioribus quam rubri. Prouenit in Oceano. Reperitur quoque in Mari maiori.

Imper. Coralli candidioris species tuberculosa punctata: *Corallo puncticchato tuberculo.* C. Bauh. pin. Corallum 7. siue album verrucosum punctatum; Corallum album punctatum, Imper.

Corallium stellatum quod ab Oceano habetur substantia est cæteris Corallij speciebus simili, colore exquisitè candido, superficietenus denso agmine stellarum minutularum impressarum oblit-

A a a a 3

H. Lugd. not.

Synonyma
Vires.

Defectus
Locus.

Synonyma



Corallium stellatum minus album.

ta, vnde & nomen inde primum. Planta est de Coralliorum genere, magna satis, trunco & ramisteretibus, quadam sui parte striata.

Imper. Corallium stellatum. C. Bauhin. pin. Corallium 8 siue album stellatum: maius & minus, quod nobis nunc describendum.

Icon. est coralli verr. punctati.

Descript.



Synon.

stellatum minus.

Coralli albi varietas stellata.

Descriptio.



Synonyma.

Stipite longè scradore, brachium equante, & materiâ magis fungosâ, multis, acerbulis insculpta aut intercripta. Vniuersa planta pedem vium longa est, vixque cubitum proceritate superat.

Lobel. Obs. p. 61. Ic. tom. 2. pag. 253. & Hist. Lugd. pag. 1376. Coralloides siue Coralli albi varietas. C. Bauhin. pin. Corallium 6,

siue Corallium album, amosum alterum.

Corallium geniculatum album.



EX argamento nomen inditum est. Cōstat enim hoc Corallium internodiis quibusdam cœu articulatis animalium. Ramosum enim est, & rami, ad instar articulorum animalium, ad invicem committuntur. Figura cœu qui sunt rectâ, circa articulos, nodos, per longitudinem striatâ. Substantia eius densa, alba, in medio exiguum

meatum, medullâ v̄t puto vices supplem̄, habet, qui à radice productus in omnes ramos propagatur. Est v̄t & alicubi velut pluribus corticibus constare videatur, alioqui cortice vnico obiectum est, vndique corallineo, albo, & reliquâ substantiâ. Percussu secundum longitudinem facto facile distinguitur.

Imper. Corallium geniculatum. It. Corallo articulo. C. Bauhin. pin. Corallium 9, siue album articulat.

Crescit in Maiorica insula, vnde ab Imperato allatum est.

Corallium asperum candicans adulterinum.



EX lato principio ciallus exoritur caudex, qui mox in ramos diuicatur minutius diuisos, albicantes, superficie asperos, tortuosos. Substantia interna minutissimis poris pertusa est, & quâ externa facies albicantior. Omnium maxime lapideum hoc Corallium esse videtur. Altitudo vix quatuor uncias adæquat.

An Gelsin. fig. lap. Gypsum quod Coralloides cognominari potest? Est enim Corallio albo persimile, ramosa seu fruticante specie.

CORALLIIS AFFIN. PLANTÆ MARINÆ.

CAP. XXIV.

Poreosa Planta, & Porus magnus.

PORUS de genere vegetabilium sunt, substantia Coralliis propinqua: ac poris ab iisdem differunt, qui eorum proprii sunt & peculiare horum tamen alij proprius ad corallia accedunt, alij

Descript.

Synon.

Descriptio.

Synon.

alii longius distant. Omnes communiter albi sunt. Et qui candidiores, densioresque sunt, ij Corallii similiore sunt, & eundem ramorum diuicationis modum seruant. Quorundam trunci superficie rugosa, alij eadem punctata sunt. Qui rugosi sunt, lineas habent striatas secundum longitudinem tum truncorum, tum ramorum ad extrema vsque. Sed & meatus interna sua substantia porosa habent, per ramorum longitudinem procurrentes, medio quodam atque communi filo interposito. Quorum superficies punctata est, meatus habent, quos rami à centro à filo medio constituto ad ambitumeducti interceptiunt.

Poro qui magnus dictus ab vna radice in ramos diffunditur: Truncus circa radicem crassitudine ferè est brachij humani: At cum Corallii collata altitudine sua non respondet. Nam breui interuallo, quæ truncorum diuisura est, à crassitie sua deficit atque minuitur. Neque enim altè asurgit. Terminatur in germina crassitudine digitali. Circa truncos solidus est, instar Corallij: at vltimi rami admodum porosi sunt & fragiles. Coloralibus, superficies rugosa, cæterasque obtinet conditiones, poris in genere tribui solitas.

Porus
mag.

Synon.

Imper. dicitur Porus magnus: C. Bauh. pin. Porus Corallo affinis i. siue magnus. Ait hic Pori lapidis seruandis corporibus idonei meminisse Plinium lib. 36. cap. 17. his verbis: Pario similis (lapis) candore & duritie, minus tamen ponderosus, qui Porus vocatur. Sed quia Plinius ita brevis, est, an de his Poris locutus sit, ambigit. Lapides autem hos substantià Corallii proximos esse non negat, & potissimum porositate, vnde nomen habere affirmat, & à Corallii differre.

Porus ramosus.

Descript.

Porus ramosus Imperati effigiem habet Coralli albi, dictus est autem ramosus, ob frequentem ramorum diuisuram & dilatationem. Circa radicem crassitudine est digiti humani: Rami exquisitè teretes, superficie tenus punctati, in amplitudinem spatiam panduntur. Durities ejus præ cæteris Poris ad Corallij naturam accedit. C. Bauh. pin. Porus corallo affinis 2.

CORALLIUS AFFINIS MADREPORA.

CAPVT XXXV.

Descript.



Matropora quibusdà dicta multis canis ex vno trunco prodeuntibus, & circa ortum sibi mutuo coherentibus constat. Ergo faui formam quodammodo representant. Substantia tubulorum ossi spongioso similis est, in quorum extremis cavitates apparet, radii à centro ad ambitum



quodam purpurea obteati sunt, quæ temporis progressu nigricat.

Madrepora, Imper. Porus Corallo affinis 4. siue Corallii affinis Madrepora stilita.

Synonyma

CORALLIUS AFFINIS MADREPORA ramosa.



Madrepore ramose extrema sunt plana, quemadmodum præcedentis. Sed in trunco & ramis magna est differentia, Quippe primarius truncus densus est & candidus, sicut Corallium. Sequentes qui velut annui adjuncti sunt, rari admodum ac debili substantia, colore obscuro & purpureo. Eadem substantia aliquid habet membranæ, vnde colligi potest, Spongiarum in morem participare aliquid de vita sensitiua.

Descripti

Madrepora ramosa Imper. Porus corallo affinis Madrepora ramosa, in qua varietas & in substantia, & colore pro partium diuersitate reperitur.

Madrepora ramosa Imper. Porus corallo affinis Madrepora ramosa, in qua varietas & in substantia, & colore pro partium diuersitate reperitur.

Synonyma

ABROTONOIDES PLANTA SAXEA.

CAP XXXVI.

Elegantem hanc plantam marinam, A'brotonoide saxeam Amstelredami anno à CHRISTO nato 1600. Clusio donabat honestissimus vir Walichius Syuertus ejus vrbs Pharmacopæus, illo ipso anno à Batavis ex orientalibus regionibus delatam.

Locu

Erat porro, inquit Clusius, ea planta tota la-



Synon.

Fucus folliculaceus 20. siue Abrotono similis
saxea C. Bauhin. pin.

Porus similis Sabine.

Porus Sabine similis: ramos qui habet subtiles, altera parte compressos: Superficies eminentiis quibusdam acutis donata est.

C. Bauh. pin. Porus Corallo affinis 6. siue Porus facie Sabine, Imper.

CORALLIVM ADULTERINVM. porosum.

C A P. XXXVII.

Numeroso densoque agmine ex lapideo ferè principio exeunt fistulæ albicantes, striatæ, palmares, longiores plus minus, intus porosæ, quæ à centro ad ambitum ita radiatæ sunt, vt stellam multiplicem repræsentent Substantia earum planè lapidea est, dura, nec ita fractu facilis. Primum pondere superat.

De scri-
ptio.Millepora
Imper.

Imper. ait Milleporam numerosa producere gemmina quæ cannularum iuxta se inuicem positarum instar denso stipatu nascantur. Quodlibet itaque germen formam referre cannæ cum nodis suis. Eius porò superficiem secundum longitudinem esse striatam, circa extrema porosam.

Milleporam hanc Imperati ego eandem constituo, cum corallio adulterino poroso, licet hoc strias per longitudinem non præ se ferat. Pseudo-Corallium album aut fungosum, Gesn. fig. lap. Porus Corallo affinis 3. siue Millepora Imperati, C. Bauh. pin.

Synon.

CORALLIIS AFFINE ALCYONIVM FI- stulosum rubrum: & Tubuli marini albi.

C A P. XXXVIII.

Marinarum naturalium elegantissimæ specimè inter naturæ recondita nostra adferuarius, quod figura & specie partium corallio rubro quodammodo accedens totum agmentatum Halycionium quibusdam æstimatur. Ex meris tubulis rubris, Corallio rubro ferè concoloribus, aut certè saturatiùs tinctis, crassitudine culmorum Auenæ, ex semunciali aut breviori intervallo crustulis lapideis connexis, cætera parte æqualiter dissidentibus coagmentatum est. Pleraque tamen superficietenus albicante

De scri-
ptio.

quadam aspergine obiter vestite sunt. Tota substantia lapidea est, sed Corallio rubro fragilior.

Imperati Tubularia purpurea, quam quidam *Tubularia Imper.*



inter Alcyonia recensent, & quidam Alcyonium Milethum vocant, pororum ratione Tubulariæ purpureæ similis est, de marinorum quoque genere, ex parvis tubulis, concavis, atque vt plurimum connexis coagmentata, colore puniceis, intus politioribus, foris mediantibus quibusdam crustis transuersis, æquali intervallo ordinatis, vnitis. Matriculæ purantur animalculorum marinorum in quibus nascantur, sicut apes in fauis.

Tubularia purpurea, Imper. Synon. Porus Corallo affinis 12. siue Corallio affinis Alcyonium rubrum, C. Bauh. pin.

Vitima autem ex propositis Iconibus est Tubulorum mari-



porum alborum Imperati.

Porus tubularis.

Porus tubularis dictus, quod partium tubulorum formam referat, ex quibus alij tubuli etiamnum pronascuntur. Superficie interna rugosi, externa punctati & porosi. In his sæpe materia Alcyonii, aut alterius cuiusdam substantia reperitur.

De scri-
ptio.

Porus tubularius, Imper. Porus Corallo affinis 10. C. Bauh. pin.

Synon.

ADARCE EX VETERVM ET NEOTORICORVM SENTENTIA.

C A P. XXXIX.

Ignitur in Galatia quod Adarces appellatur. Est autem tanquam concreta falsilago (concremetum subfalginosum, Corn.) quæ humidis & pallustribus locis siccitate emergit, & circa arundines, graminæ concretis, colore flori lapidis Alij similis, tota verò forma molli, & multiformi Alcyonio proxima, vt videri possit

Locus.
ex Dispo.

sit Alcyonium palustre. Ad extendas lepras, maculas à Solis ardore contractas, lichenas, lentiginis, similiaque vitia, accommodatur: & in summa vis ei acris. Sed humores ex alto euocat: quamobrem & ichthiadicis opitulatur, auctore Dioscoride.

Inter aquatilia dici debet & Calamochnus, latine Adarce appellata. Nascitur circa arundines tenues, è spuma aquæ dulcis ac marinæ, vbi se miscent. Vim habet causticam. Ideo acopis additur contra perfrictionum vitia. Tollit & mulherum lentigines in facie. Ita Plinius lib. 32. cap. 10. Nec de alia Adarca loquitur l. 16. cap. 36. Est & in Italia nascens Adarca nomine palustris, ex cortice tantum sub ipsa coma, utilissima dentibus, quoniam vis eadem est quæ Sinapi. Temere ergo Plinium accusant (inquit Corn.) qui hoc loco Arundinis speciem ipsum fecisse affirmant: & de eadem Arundinis specie repetiuisse l. 20. cap. 22. vbi ait: Sinapis naturam effectusque eisdem habere traditur Adarca, inter syluas nacta, in cortice calamorum sub ipsa coma nascens: est enim vna & eadem Adarca, de qua omnibus his locis agit. Hæc autem & Calamochnus dicitur, i. e. Arundinis lanugo, Latinis recepta Græcorum voce Adarca.

Galeno Adarcium, quod aliqui masculino genere, Adarcum, aliqui feminino Adarcem vocant, secundum essentiam velut spuma quædam est concreta aquæ saluginosæ, quæ circum stiores & Arundines conerescit. Est autem acerrimum & calidissimum, & per se ipsum inutile. Miscetur autem his quæ vim ipsius obrundunt, atque ita multi vñs euadit, in affectionibus calleseri postulantibus foris adhibitum. Intra enim corpus fieri non potest vt quis ipsum assumat, ob virium vehementiam. Idem Galenus lib. 1. cap. 1. *τὴν νάρκα τόνος* ad finem, in enigmatica compositione, Pericalamitidem appellari posse dicit, id quod ab aliis Adarce, & Adarcium dicitur, propterea quod calamis adnascatur. Appellatur & Limnitis à paludibus, à Galeno, & Aetio, & Paulo, multis locis.

Aliud est Cætalpino apud Dioscoridem Adarce quàm Alcyonium, quamvis similis illi molli figura: est enim concreta salislagæ, iuxta calamos & festucas agglutinata, locis palustribus & maris admisione cū aquis dulcibus: colore cædido, similis cœcretioni quæ in spogiis reperitur: corpus omnino inanimatū, inordinata cōpoge.

Conspici Adarcem in multis Hispaniæ paludibus auctor est Amarus, dicique voce Hispanica Fluminis sterus, siue Fluminis lixum, & ad multos vñs ab iis adseruari: circa mare verò potentius inueniri. Ait porro Plinium & illius defensorem Collutium, duas Adarces ponentes, nugari.

Lacuna vocat græcè *ἀδαρχή*, latine Adarcem, Arab. *Arharach* [Matth. Adarchi, seu Adaraca] Castil. *Alburreca*, refertque se Patauī apud Fallopiū verum vidisse. Quid autem pictura exhibeat, cū non describat, me later:

Gefnero Adarce planta non est, sed plantis adhzrens crusta.

Matthioli. verò negat legitimam Adarcem, quæ Diosc. & Plinii placitis respondeat, in Italia nasci, et si id tradiderit Plinius.

PORUS ANGVINVS.

CAP. XL.

Descripti: Porus anguinus dictus Imperato, quod exuiis serpentum similis sit. Substantia sua Tom. III.



ter extremam subtilitatem tunicarum, colore candido, & ea parte qua altera tunica ab altera separata conspicitur, argenteo splendore lucida.

Porus anguinus, alias Adarte appellatus, in a-Synonyma quis salis & maris quieti stagnantibus concreuit. Algas aliq. corpora compicciens Reperitur in tractu Neapolitano in mari mortuo sub Baia.

Porus Corallo affinis. siue Porus anguinus Imperati, C. Bauh. pin.

SALIX MARINA.

CAP. XLI.



Descriptio
Rami mul-
tari ex glu-
co nonihil ru-
bescit in aqua
nat. ut; & ius
comantes lon-
gis, Sal ci simi-
libus, maxima
ex parte per o-
ras nō incis-
quis, quibusdam
veluti incisuras
nonnullas os-
tendentibus,
gustu s. l. s. In-
ter ramulos
virgule surri-
gunt, f. r. e. Sa-
lis sustinenti
furculo hand
abimiles, api-
cibus plurimis

veluti squammatim compactis, non alia forma quàm quæ spectatur in Salice, dum herbaceo iulo florem parturit. Testis ostreorum & faxis quæ sub aqua marina sūt, innascitur & sic adhæret, vt is agglutina: rano: radice defixa, videatur

H. Lüg. p. 179. Salx marina. C. Bauh. pin. Synonj
Fucus folliculaceus 16. siue Salx marina.

ARBVSCVLA MARINA CORALLOI-

des rubra. CAP. XLII.

Descriptio
Plantam hanc marinā Christianus Porretus
pharmacopœus à quodā circumforaneo redi-
mebat anno à Christi natiuitate 1595. quā cum
Clus. ostenderet, merito arbuscula appellandā cō-
fuit, eod quod maiore videre nō meminerit. Tres

Bbbbb

autem pedes alta erat, & in multos ramos laterales eoque anteriorem partem nutantes, diuisa: caudex infimâ parte septem vncias in ambitu crassus erat, firmusque & solidus quum videretur, materiâ tamen quodammodò fungosâ constabat, illâque candicante, & Zingiber rescitum referē-




te: totus caudex cū ramis, innumeris tuberculis resperſus erat, ipsique rami in maiuscula tubera desinebant, intus fūgosa, & seminum, inanium tamē, speciem in cauernulis continentia, externē autē orbicularibus nodulis, lapidis stllatis instar, distincta. Tota plāta, siue verius arbuscula, tenui quidem, sed grumoso cortice recta erat, eoque rubri coloris, vt minio inducta videretur, qui an ascititius fuerit ignorat Clusius: aded autem falsi saporis erat tota arbuscula cum suo cortice substantia, vt merum sal referret. E quo portò mari fuerit eruta, latet, & an scopulo alicui innata esset, an in imo maris fundo creuisset, certi quidpiam proferri non potest: nam eius truncus integer non erat, sed imâ parte reſcissus.

Synon.

C. Bauhin. pin. Corallina n. siue Corallina facie grumoso cortice: Arbuscula marina coralloides Clusii exot. lib. 6. c. 1.

CORALLOIDES FRUTICOSA PLANTA marina rector. CAP. XLIII.

Descriptio




fors tulit, huc illuc diuaticatos, dodrantes, & palmates, singulos thorulo corneæ duritiæ & flexibilitatis, nec non coloris, factos, crusta obductos iam penitus niuea, iam cinerea, modò lutea, modò conchylifata viuida: aliàs cinerea &

rubra, aliàs lutea rubra, non rarò omnis coloris stigmatibus punctata.

Has plantas redemimus à circumforaneo, qui dicebat collectas in mari Gilbratrar, vocabatque Italicè Fior di corail.

Lob. Coralloides fruticolæ in Obsl. p. 650. duas habet figuras: Lob.



sub titulo Corallinae albæ: alterâ sub inscriptione corallinae rubentis Anipathis facie. Dubitat autem an sit Quercus marina folio Myricæ Theophrasti, eiusque varietat. aliquas assignat, quippe Corallina Antipathis facie albam, rubrâ, & luteam, thorulo intus corneo, Antipathi cœolori & nō abſimili.

Reperiri autem ait non modò in Narbonæ & Gallo prouincia mediterraneis litoribus, sed etiam Angliæ occidentæ & Nortmanicæ. In Icon. Plant. vtraque effigies pingitur.

Gesl. lib. de fig. lap. de Corallina fruticosa hæc scribit: Litophyton marinum Arbusculam hanc marinam à Io. Bauhino Medico diligentiſſ. accepi. Collegeram autem priùs similes in mediterranei maris litoribus: species eius duæ sunt, vna omni ex parte albicat foris alterius crusta in quibusdam partibus rubri seu purpurei coloris est: vnde nonnulli Corallus cognatam plantam esse suspicant. Ligni duritiem si species, Quercum marinam dixeris, aut Ebenum, Cytisumue: si aspera virgarum vestigia, Riccam aut Ericam marinam &c.

H. Lugd. p. 134. Corallus frutex saxo inhærens: qui altera sui parte & scirculofiore candicat, minutisque foraminibus pertusus est, altera in pauciores virgulas diuisa rubet, & tubercula quædam veluti baccas tuberosas fert, cornis satinis non dissimiles. Quare immeritò reprehenditur Plinius quòd huic frutici baccas tribueat, vt aliis arboribus suos fructus. Et hæcenus Rhapsodus, à quo Plinius non sufficienter excusatur. Planta cuius figuram exhibet, & quam describit non est corallium, neque dureſcit & rubescit, vt Corna: præterea non bene Coralloidem fruticem Lobelii ponit pro corallio albo & rubro Lobelii, qui non vocauit corallium, sed corallinam. Icon H. Ludunensis depicta est ex eadem stirpe ex qua nostra Coralloides rector.

Anguill. Iuncus lapideus Theophr. in officinis quibusdam Venetis Coralli bianchi. planta extra aquam lapidescens

Tabern. ic. & hist. Corallina alba, & Corallina rubra: Item corallina lutea, & Corallina nigra: & Corallina rubra, & Corallina nigra. Quæ ignorantia Compilatoris Tab. vocare coralloides frutes germanicè corallenmoſ/h.e. Mulcum Coralli, cuius tres proponit valde similes figuras: Dein corallinas non describit sed tantum

tā in pelago Tyrreno inueniri addit, in quo corallium Lobelius reperi dicit, & non corallinas.

Frutices in nostro mari corallii similes, corallinas vocant, inquit Cæsalpinus, ligno intus durissimo ac nigro, specie Ebeni, sed ob tenuitatem inutili operibus: crusta his obducitur verius, quam cortex, friabilis, pumicosa, aliis cādida; aliis rubens: adhærent lapidibus testacea quadam substantia dilata. Qui ex his cortice rubro integitur, tortuosis ramulis constat, durissimisque, prope radicem nigris, hi in tenuem gracilitatem desinunt, perlucidam ablato cortice. Qui cortice albo integuntur duo sunt; vnus ramulis cōstitit erectis, lunci modo, flexilibus, numerosisque ab eodem veluti caudice prodeuntibus, cubitali altitudine, qui veluti punctis quibuldam signati sunt, vt Abietis ramuli. Abietem marinam puto apud Theophrastum. Alter ramos fert ad latera tendentes, crusta candida, veluti denticulatos, quibus sapē adhærent lapidosa substantia, ex maris salugine concrēta, ac testacea quadam animala. Quercus marina apud Theophrastum: folium his nullum neque muscus, sed loco eorū crusta videtur data. Quartum genus humi serpit, sarmentosum ex lapidibus pendens, vndique muscosa lanugine oblitū, nigricāte, aut cinerea, extremis capillis in tenuia veluti granula desinentibus. Vitis marina apud Theophrastum.

C. Bauh. pin. corallina 1. siue fruticosa recta alba: Iuncus petrosus Ang. Lithophyton marinum albicans Gesn. f. Quercus marina Theophrasti, Clus. h. s. p. 1. & exot. Corallina alba, Lobel. Tab. Corallium album, Lugd. Muscus marinus fruticulosus, Cast. Corallii similes frutices, Cæsalp. Corallium ligno intus durissimo & nigro, cui crusta obducitur, aliis candida, aliis cinerea, aliis rubens, testacea substantia. Eid. corallina 2. siue lutea punctata: Item, Corallina 3. siue fruticosa purpurei coloris, Gesn. Corallina rubens Antipathis facie, Lob. Corallina rubra, Tabern. Quercus marina Theophrasti, Clus. exot. lib. 6. cap. 4. Quercus marina cum sua basi, Eid. cur. post. An C. Bauhinus has tres Corallinas recte separet, atque Quercum marinam Clusii huc merito referat, aliorum esto iudicium.

ERICA FACIE FRUTEX MARINVS.

CAP. XLIV.



Marinum hūc fruticem, quem Clusius anno à Christi natiuitate 1597. à Doctissimo viro Henrio Hoiero, Bergensi in Norvegia Medico accipiebat, non incommode Ericam marinā appellari posse arbitrabatur.

Erat verò is frutex cubitalis aut amplioris altitudinis, statim ab infi-

mo in frequentes ramos affurgens: atque illi denud in minores alios diuisi erant: interdum simul coalescebant, vt in plerisque plantis in mari nascentibus euenire solet: tenui cortice tegebatur, terrestriusque coloris erat. Torus porò frutex planā forma excreuerat, & in sesquicubitalē latitudinem expansus erat. Omnes autem rami tanquam quibuldam tuberculis erant obferti: sed minores longè frequentioribus, & maioribus (quod pictor per lupinam quandam negligentiam non obseruauit) vt tanquam flosculorum gemmis ornati viderentur, quæ trita in tenuissimum pollinem resoluebantur. Tota alioqui planta lignosa & dura erat, atque lapidi aut scopulo innata fuisse videbatur, salsi saporis, vt quæ in Oceano nata plantæ.

C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 17. siue Ericæ similis maritima: Frutex marinus Ericæ facie, Clus. Exot. lib. 6. cap. 5. Eid. Corallina 4. siue rufescens exasperata: Ericæ facie frutex marinus, Clus. Exot.

FRUTEX MARINVS ELEGANTISSIMVS

albus, Corallium nautis.

CAP. XLV.



Elegantissimus hic frutex marinus, inquit Clus. Exot. lib. 6. cap. 2. Arbutule marine Coralloidi quodammodo eongener, pedē & septem uncias longus siue latus erat, & tredecim unciarum amplitudinem habebat, quā parte latissimus: triū verò pedum & decem unciarū erat eius ambitus; durus, porosus & ligno-

sus atque valde planus, flabelli instar, in ternos aut quaternos crassiusculos ramos diuisus, à quibus innumeri alii tenuiores ramusculi exoriebantur, in longum & latum se spargentes, ad eum ordine, vt simul quodammodo coalescerent; vacuæque tantum quædam spatia relinquerent, cribri aut reticuli maculas imitantes. Integer frutex purpurascēte colore obductus fuisse videbatur, quem deinde saluginosa candida materia obduxisset, vt ex infima fruticis parte, & aliis quibusdam locis, à quibus salugo detraha erat, apparebat: illam verò saluginem creberrimis, usque valde exiguis, foraminulis tanquā acu impressis, tam affabre tantoque artificio elaboratam conspiciere licebit, præsertim in minoribus ramulis, vt nullum opificem imitari posset mihi persuadeam: sed quum in adeo exiguo spatio, cuius capax est lignea tabella, illam elaboratam saluginem pictor exprimere non posset, istam fruticem nudam & sine salugine delineare coactus est, vt ramulorum tenuitatem

Bbbbb 2.

facilius obseruari & conspici possent. Latam autem habet sedem, quâ scopulo inhæserat sub marinis aquis, ex qua binæ aut ternæ alia adnata plantæ, siue potius rami abrupti fuisse videbatur. Eius materies dura, ut vix cultello scindi posset. Nautæ Corallium appellabant: sed ad Palmæ marinæ à Theophrasto descriptæ genus aliquod veriùs referendum esse arbitror.

Synon:

C. Bauh. pin. Corallina 14. siue cortice reticulato maculoso purpurascente.

PLANTA MARINA RETIFORMIS.
CAP. XLVI.

Deser.



Plantam quandam marinam ex America aduectam anno à natiuitate Christi, nostri Redemptoris, 1597. mittebat ad Clusium ornatiss. idemque humaniss. vir Simon Parduyus, Consul Medioburgensis in Walachia Zelandia, valde raræ formæ. Nam instar virgulti lignosæ erat, prorsus tamen

plana, in frequentes ramos eosque etiam planos, sparsa, ex quibus in longitudinem & oblique exiunt multi nerui, retis instar ferè contexti, aded firmi, ut ex æreo filo conflati viderentur, lumini tamen oppositi glutinis substantiam veriùs referrent. Tota planta cubito longior erat, prorsus, ut dictum, plana, & multis maculis, retis instar, pertusa, subrubescens, quadam tamen falsugine multi locis infecta, extrema parte ferè pedem lata, infima verò palmum: sed ea non integra: nam ex utroque latere plurimùm abruptum fuisse apparebat: falsus eius sapor. Cui rei innata fuerit, non liquet, ut cuius infima pars cōfracta esset: verisimile tamen scopulo, aut lapidi innatam Corallii modo: Nam triennio post se similes conspexisse refert Clusius Amstelredami in museo cuiusdam ciuis, quarum infima pars plana erat, ut quæ scopulo adnata fuisset. In Americano autem Oceano natas aiebat.

Casp. Bauh. pin. Corallina 15. siue reticulato cortice altera: Planta marina retiformis, Clus. Exot. lib. 6. c. 3.

HIPPVRIS SAXEA.
CAP. XLVII.

Descriptio **C**lusio ostendebatur hæc venusta planta marina Amstelredami anno à Christi natiuitate 1601. à perhumano viro Ioanne Langhe Cheirurgo, qui etiam illius ramo pedalis ferè longitudinis ab ipsa planta abrupto eum donabat, qui in subiecta tabella Lectoris oculis expressus proponitur.



C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 19. siue Equiseto similis saxo: Hippuridis saxca, Clus. Exot. lib. 6. cap. 8.

RESEDAE FACIE PLANTA MARINA.
CAP. XLVIII.



Totus lignosus & durus erat hic frutex, non secus ac Erica fruticans, falsa & albâ materiâ obductus, sesquipedalis longitudinis, non tamen integer, sed infima parte fractus, in decem vel plures ramos iniquiter & nullo ordine nascentes diuisus, quorum aliqui abrupti: qui supererant,


toti testæ erant exiguis quibusdam vasculis rugosis, deorsum propendentibus, coloris ex albo cineracei, Resedæ vasculis, quæ semina iam matura cōtinēt, non valdè dissimilibus, longè minoribus, & infima parte, ut plurimum connexis ipsis ramulis, quæ vacua & valdè fragilia, ut quæ digitis attrita, facillimè in puluerem resoluébatur, falsi admodum saporis.

Hanc marinâ plantam, quam fruticem siue suffruticem appellandam censet Clusius, nanciscatur Amstelredami anno à Christi natiuitate 1601. Quo autem in mari erutus fuisset hic frutex intelligere non potuit, quia nautas qui retulissent conuenire ipsi non contigit, & qui redimunt, ista minimè curant.

C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 18. siue Resedæ similis maritima: Planta marina Resedæ facie, Clusio Exot. lib. 6. c. 6.

CORALLOIDES GRANVLOSA ALBA.
CAP. XLIX.


Ex magno ramo decerptam portionem adferuamus, quæ ceruini cornu instar plures ramos



Reginæ Angliæ se accepisse referebat, ex magno ramo decerptam.

ALGA MARINA *πλάτυς πορὸς* POROSA.
CAP. L.

Descriptio



Maritima elegantissime pulcherrima aspectu est. Ab vno principio plures exeunt ramuli trium quatuorve vnciarum, lati atque paruli, compressi, flexiles, crustosissimi, pallidi, colore exalbido, cum striis obliquis quasi texturam demonstrantibus, damæ cornua lata non infeliciter æmulatur. Vnde *πλάτυς πορὸς* dici

potest ex re nata. Dono dedit Emanuel Vurfistius Medicinæ Candidatus lectum in portu Bourensi: atque ex ea planta confecta nostra si gura.

Imper. lib. 27. cap. 3. Poru ceruino siue Porrigenus quod ramorum diuicatione ceruina cornua æmulatur, cuiusque superficies punctata altitudine spithamæ inferior.

C. Bauh. pin. Porus Corallo affinis 7. siue Porus ceruinus, Imper.

ESCHARA. CAP. LI.

Descriptio

Quæ Eschara Rondeletio dicitur pro radice principium habet latiusculum, ex quo foliacea quædam, & Lactucæ crispæ in morem, substantia exit lapidea, crassiuscula, albicans, fragilis, cribri instar, rimarum longiuscularum plena: dentibus: facile atteritur, nullo manifesto nec odore nec sapore.


Synonyma

Cæsalpino Rosa marina inter Muscos mari-

mos de se mittit modicè recutuos fursu- que spectantes. Tota porò albo granulosoque cortice obducta est, ac si Saccaro incrustata esset. Interior eius substantia, cui crusta hæc granulosa adhæret, nigra est, duraque. Accepimus ab amico quodam qui ex theatro naturalium Serenissimæ



ESCHARA MARINA FRONDIPORA.
CAP. LII.



Frondipora Eschara marina, Reticulorum descriptæ similis quodammodo: frondes quippe substantiæ similes, itidemque ramosæ & in ista, quibus extrinsecus eminentiæ quædam costis aut nervis foliorum similes adnatæ: quarum extrema mutuo conexa vnita poros constitunt, & retis formam quodammodo efficiunt.

RETICVLVM MARINVM.
CAP. LIII.



Nomen ex Reticuli ratione assignat. Sic namque veluti stamine atque subtegmine intertextum est, ut rete aliquo modo representare videatur. Compressum duriuscula est, neque renitens. Colore subcinereo obsoleto. Odore atque sapore saliginoso: dentibus attritum credit ob

lentam & tenacem substantiam, nec facile comminuitur. Maritimorum accola est. Nostra icon non in omnibus placet: foramina non satis manifesta, nec stamina satis tenuia.

An Imper. lib. 28. cap. 1. Rete marinum.

RETICVLATVM TOPHACEVM
marinum. CAP. LIV.

Describe.



Flamentorum conuolutorum in morem, totum ex filis tophaceis, cādicantibus, ac etiam quod in tanta exilitate mirum histulosis ac cauis coagmentatū est, ut rete quodammodō in vnum glomerem confusum repræsentet. Ipsa crassities fusti coagmentati vncialis est, multis cauernis Spon-

gie aut pumicis ferē instar cauita, substantia leui, & dentibus facilē fissibili, dura, digitis non cedente, odore salso, sapore nullo.

An Imper. Porus in figura di Marassa, filo concauo, quāuis subtili: Adhærescit aliis substantiis & rebus marinis.

CORALLINA.
CAP. LV.

Describe.



Vnam aut alteram alta est, colore incano, cinericoque, ramulis pyxiditini geniculatis, gracilibus, pinis interdum è latere excrecentibus, odore nauseoso, pisculento, sapore salso ingrato: sub dentib. lapillorum instar crepitat, & facile vel attritu digitorum in puluerem fatiscit.

Nomina

Corn. vocat Bryon siue Muscum marinum Dioscoridis, Plinii (qui legendum *Spidaxel dret*, Lactuca folio, quod Dioscorides *πυξιδίτης*) & Galeni, quam Germanos *Meermoss*, officinas Corallinam vocare scribit: Et recentiores Græcos *κοράλλι*, *Coralli*, ab usu ad vermes ex alio expellendos, vulgō venalem Scoliborani proclamantes. Et quamquam hic vsus à veteribus traditus

non sit, tamen *κοράλλι* esse, non ambigit: eiusdem etiam opinionis est Musa, Cordus, Anguill. Lac [cuius tamen figura vulgarem Corallinam non demonstrat] & Turnerus.

Gefo. de fig. lap. cum Medicis vulgō Corallina appellat, herbulam maritimam, in faxis sine radice nascentem, & substantiam foris tanquam è limo quodam albicante circumnato, ferē lapidescentem habentem.

Amatus ait omnium doctorum consensu muscum marinum, officinarum Corallinam esse: eam autem Anconæ magna in copia reperiri: Hispanos *Malhorquinam* appellare, quia primo ad illos ex Maiorica altera insularum balnearii aduecta sit.

Casalpino Muscus marinus lanugo est capillosa, in scopulis maris triperita, modò lapillis, modò testis, modò aliis fruticibus marinis inhaerens, præcipuè Corallo, quam Corallinam vocant: mollis quidem quando sub aqua est, extractus autem & siccatus riget ob turgidinem: quidam erectus quidam humi sparsus: color varius, nunc albus, nunc rubens, aut flauescens, aut cinereus, aliquando niger, quidam & herbaceus, mollior. Dioscorides Bryon thalassion vocat Theophrastus Phycon trichophyllon: Gaza Algam crinito folio, & Plinius Phycon capillaceo folio.

Lod gall. quoque Corallinam hanc officinarum, græcè *κοράλλι* vocat. Lat. Muscum marinum, gall. *M. usse de mer*, Arab. *z. H. of dy*: & ex quibusdam indoctis Soldanellam.

Crediderim & ego, inquit Matthiolus, Corallinam esse Muscum marinum, quod certò sciam, eam ab iis reperiri, qui Corallia expiscantur: corallii, sicuti etiam scopulis & piscium testis inhaerentem. Is vique ceteris præfertur, qui corallii adnascitur, vnde ei nomen. Probatum secundo loco, qui faxis adhæret, colore rubicundo: cinereus verò improbatum. Plinium constat errasse, in historia Musci marini quod hunc perperam fecerit foliis Lactucæ similem: Arab. dicitur Tahaleb, siue Taleb, quibus tamen Muscus is cum Lentæ palustri confunditur. Hisp. *M. ihorquinana yerna*: Germ. *Meermoss*: Corallienmoss. In Epit. cum add: Camer. dicitur Muscus marinus gracilis, capillaceusque, provenire, caulis expers, colore, cum liceatur, subrufescente, sapore salso, odore concharum marinarum simili?

Camer. in Epit. & Hist. Matthioli vnâ iconē septem species pingit. I. à Matthiolo traditur. II. parui ramuli, sulphurei coloris, articulati. III. supra tophaceum lapidem album, coloris etiam sulphurei. IV. supra rubentes lapides. V. supra testacea. VI. & VII. pulchrè alba est, aut nonnihil ex cæruleo virens est: & rubescens. Subdit tandem reperiri & alias species, quas ait recenseri non posse sine nimia prolixitate, densius tamen omnes provenire, ac pictas esse.

Loebel. duas dat imagines. Prior est in Obs. p. 648. in Ic. verò p. 249. tom. 2. hoc titulo, Muscus candidus coralloides squammulis loriciatis: Altera in Obs. p. 649. in Ic. pag. 250. inscribitur Corallina, circatis copiosis corallii æmulatione implexis tenuibus furculis, caulis expers, colore rubicundo, alias luteolo, herb. co. ciner. o, aut candido, ossè duritie, ad vermes prodigandos decantatissimis viribus.

H. Lugd. p. 1368. Muscus marinus: siue corallina Dodonæi. Item, Muscus marinus candidus corall-

Muscus marinus Casalp.

Muscus marinus Matth.

Delectur.

Itomus d. Lab.

Hist. 1. 1. 1. 1.

coralloides: Cæterum, Rhapsodus suo more ponit tres figuras vnius plantæ, addens Corallinae vnam speciem sine descriptione.

Tab. ic. & hist. Muscus marinus siue Corallina secunda: Eid. Corallina altera. Eius compilator non distinguit, proponendo tantum figuras: Prima Matthiolineæ imagini accedit, quam etiam C. Bauhinus apud Matthiolum posuit: Altera icon conuenit cum vulgari nostra Corallina geniculata.

C. Bauh. pin. Muscus coralloides 1. siue Muscus maritimus, Corallina officinarum: Muscus marinus Matth. Ang. Dodon. Cordo in Dioscor. Lac. Turn. Cast. H. Lugd. Cæsalp. & Tabern. Corallina, Lobel. Lemnio. Fucus capillaceus, Lugd. Eid. pin. Muscus coralloides 2. siue squamulis loriceatus: Bryoa thalassion, Turn. Muscus Marinus; Dodon. vel 2. Eid. Belg. Muscus candidus coralloides, Lugd. Corallina altera, Tab. Nos nondum distinguimus: præterea Bryon thalassion Turneri refert C. Bauhinus quoque ad Lactucam marinam.


Corallinam circumforanei in puluerem contritum in plateis venditant ad puerorum vermes necandos: siquidem non modò interficit lumbricos, sed eos quoque eodem die expellit, magna sæpè cum adiutantium admiratione, quòd quandoque visus sit puer, qui ex assumpta huius pulueris drachma, centum vermes excreuerit. Puerculis, qui nondum annum ætatis quartum attingerunt, datur drach. semis: adultioribus drach. j. Aduertendum autem inueteratam & exoletam non esse sumendam: præterea cùm ea vti volumus, prius in puluerem terendam, non eum quidem subtilem nimis, sed crassiusculum, quòd diutius in ventriculo & intestinis hæreat: datur puluis in vino, lacte, aut Cassia. Cur Matthiolum in comm. mèminit centum vermium, quos vidit reiectos: in hist. autem germ. dicit circiter septuaginta? An Matthiolum circumforaneorum more scribebat quæ veniebant in mentem, siue visa, siue non visa. Quæ nunc dico non sunt vt eleuem Corallinae vim aduersus lumbricos, sed vt demonstrem quantum in rebus dubiis credendum Matthiolo, qui quid dicant de eo glossatores, fautores, & alii in cognitione stirpium minùs versati, quamuis in cæteris docti viri, qui extollunt Matthiolum, de eo iudicantes, vt cæci de coloribus. Is ait in Epit. se cum Galeno & Dioscoride facillè concedi, posse quidem Muscum marinum, qui recens fuerit, refrigerare: quod verò sicus id efficere possit, quòd gustu salso scitur, non ita facillè sibi concedendū videri.

CORALLINA FISTULOSA

fragilis duplex.

D Vm triumue vnciarum numerosos progit coliculis, cinereo filo crassiori pares, superficie crispâ seminum saccharo conditorum, aliàs læui, & veluti rorulo eleborata, circularibus zonis densis præincta, intus fistulosa, de-
cussatisque cruciformium interstitionū cancellis distincta, fragilis admodum & læui digitorum attritu in arenam solubilis, sapore fatuo; propagines mediante tenui breuissimoque filo adnectuntur. Adnascitur quoque eidem fungo rudiori Fucus ille Abrotani nomine Lobelio pictus, quem nos Cremenei litorum nominamus. Gener Cherlerus collegit in mari Adriatico.

Est nobis alia subtilior multò, ac ceu pili aut



CORALLINÆ AFFINIS, SIVE MUSCUS marinus tenui capillo.



filamenta quedam crustulis obiecta essent. Intus enim veluti pilus est tenuissimus: crusta interea porosa est, alba, in plures ramulos verticillatos diuisa, Corallinae in modum, sed minimos, exiguos, delicatulos.

Sax aut Scopharium fixum: sinascitur, verū latius multò se spargit, propiginitous, etiam quatuor vnciarum, abut de circumfultis, adteretem, durum, nigricantem, nectum adnatis cirrhis capillaceis mollicellis, ramosis, colore albicante, cinereo, viridanti; vel denique nigro, sapore

Corallinae falguginoso: Verum licet ad tactum mollis sit, sub dentibus tamen Corallinae instar varietas crepitat, & nescio quid lapidei refert. Est & vt vix vnciam altitudinem superet, villis indem ramosis, densissimis. Eiusmodi candidissimam Pilæ marinæ inhaerentem adseruamus, vti Pilæ eius figura docet. Hæret etiam aliquando Coralloidi flexiosiori.

An Imperato lib. 27. c. 3. Peluccio pettigno.

C. Bauh. pin. Muscus maritimus 1. siue Muscus capillaceus multifido folio albidus: Muscus marinus vulgarissimus, Lobelii in Obseru. pag. 648. in Icon. tom. 2. pag. 249. & Lugdun. pag. 1568. Muscus marinus 2. Dodon. [figura sine descriptione,] at 1. Eid. belg. Muscus marinus, Gerardi: Muscus marinus 3. Tabernam. Muscus marinus herbaceus mollior, Cæsal. Muscus albus marinus, Imper.

Compilator Tabern. exhibet adhuc aliam picturam huius Musci marini, primo loco, sine quidem descriptione, aut distinctione, per quam intelligo Muscum marinum pollicem vix excedentem, in tenuissimos tamen ramulos diuisum, quod non demonstrat icon.

CORALLINÆ AFFINIS NODULARIA.
CAP. LVI.

Descriptio **R**Amulus est breuius multifidus, coloris cinericeus, concretione lapidea, fragili: sub dentibus crepitat. Cum Corallina nescio quid commune habet, nullo tamen thorulo facta, ut sunt Coralloides frutices.

Imperatus l. 22. c. 13. Nodulariam numerandam censet inter Muscos marinos. Considerandum autem an vna ex Nodulariis Imperati non conveniat cum Corallina officinarum à nobis descripta.

Corallina Casp. Bauhin. pin. Corallina 10. siue Corallina affinis Nodularia, varians colore albe, pullo, puniceo. Fratri mista est hæc planta marina Neapoli n. mine Nodularia, Fuci generis.

ANDROSACES VETERIBVS.

CAP. LVII.

Locus: **A**ndrosaces [Androsaces, Ald.] in maritimis Syriæ nascitur. Est verò Dioscoridi herba alba λευκή, ut in Orib. legitur. Apparet autem vel ex Plinio λευκή pro λευκή in Dioscor. legendum: Corn. quin & Marcell. & Matth. ex aliquo fortè antiquo codice, albam venterunt. Tenibus cirrhis amara, sine foliis (ἀνθη), quidam putant legendum ἀνθη, Matth. folliculum habens in cacumine, qui semen continet. Ea vim habet duarum drachmarum pondere cum vino pota, ut urinas multas in hydropicis ducat. Sed & herba decoctum, & semen potum, eundem præbet effectum. Illinitur etiam vtiliter podagricis. Inter norba alii Picrida, alii Leucen, & alii Thalassiam vocant.

Pin. Androsaces herba est alba (inquit Plin. l. 27. c. 4.) amara, sine foliis, folliculos in cirrhis habens, & in his semen: nascitur in maritimis Syriæ [Ithrix, alius] maximè. Datur hydropicis drachmis duabus tusa aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino. Vehementer enim urinas ciēt. Datur & podagricis, illiniturque. Idem effectus est & femini.

Galen. Galeno c. simpl. Androsaces humida [ὕδαρ], Paulus ὑγρὰ, & ita quoque Dioscor. & Plinius, Corn.) & actis herba est. Potest autem siccata & pota tum ipsa, tum semen eius, urinas abundè mouere, & discutere nimium, ac siccare.

Etymon Androsaces autem dicitur, quod hydropicorum aquas ducat: Vel, Hydrofaces, quia non nisi in aquis crescat. Non desunt qui eam plantam, quam nos Cuscutam nominamus, Androsacen esse, affirmant. Sed falsam eorum esse opinionem, nemo non videt. Alii hoc nomine nuncupant Tragum Gesneri. Androsacen alteram, Matth. Alsinen. Androsacen Matth.

ANDROSACES MATT. SIVE FVNGVS
petreus marinus, siue Vmbilicus marinus.

CAP. LVIII.

Descriptio **V**itam agit sub aquis, concharum striatarum gibbis, scopulisque innascens: staminibus filii instar tenuibus, vncialibus & fescuncialibus, quorum singulorum extremum excipit vmbilicus clypeoli circumatæ rotunditatis, lineolis à centro creberrimis productis striati: color cinereus: sapor saluginosus.

Plantæ hoc genus inuentum in Hetruriæ maritimis, Matthiolo misit Pifus Lucas Ghinus, qui si Androsacen statuisset, & Androsaces in Italia n. cretetur, Matthiolum ex eo non discernendum

putaret, quod, præter alias notas, hæc planta tota candida spectetur, ut Oribasius ex Dioscoride transcripsit. Sed à pluribus iam annis plantam Gesnero, clarissimo præceptoris, minimus, addidimusque Matthiolum multum titubare, stirpemque hanc Dioscoridis Androsaces descriptioni non respondere, sed potius Fungum esse aliquem, conchis & lapidibus adnascens: nec maritimam esse, sed marinam: non amaram, sed non nihil salis, nec actimoniam habere manifestam: Galenum autem dicere acrem. Mordacitatem præterea non sentiri: licet sint qui mordaci sapore eam participare dicant. Denique semina non proferre, quæ requiruntur à Dioscoride & Plinio.

Fungus marinus minimus, inquit Cæsalpinus, inter fungos lapillis innascitur, intra aquam: ei sapor inest salis & mordens. Videretur Androsaces esse apud Dioscoridem, si eius pileoli semen continerent.

Camer. ad Epit. & hist. germ. Matthioli figuram proponit in qua Androsaces supra rupes & conchas pingitur, ac etiam, vt mihi videtur, ea species quæ minoribus est capitulis.

C. Bauh. phyt. apud Matthiolum & pin. Androsaces duas species tradit. I. eide dicitur Androsaces petra innascens, vel maior: Androsaces, Matth. Icon. cast. & H. Lugd. p. 1362. Musci marini genus, Guill. II. Androsaces chamae conchæ innascens, vel minor: Androsaces, Cotyledon foliosum marinum Lob. in Adu. & Ic. pag. 387. Androsaces, Eid. in Obs. pag. 210. & Lugd. (cui & Vmbilicus marinus Monspeliensium) & Camer. Epit. qui utramque vna figura exhibet. Fungus marinus minimus, Cæf. Androsace communiter conchæ, rarius petra innascens, in stagnis circa Magalonam & Frontignanum. Non statumimus nos cum Casp. Bauh. in eo discrimen, quod petrae, vel conchæ innascuntur: fungus enim latiori capitulo, qualis à Matthiolo pingitur, equè supra petram, ac supra concham prouenit. Præterea stagnis innatantem non obseruauimus.

Cæterum, crelucit & viuut in aqua, non in aere, Locut vt Matthiolum pinxisse scribit Lobelius.

Idem ventrem sistere nouit, vt hic scrupulus Anguillæ eximitur, nec expeti, vt alium soluat.

FVNGVS SIVE MVSCVS PETROSVS.
CAP. LIX.

Imperatus h. nat. lib. 27. cap. 8. author est plantam hic depictam Muscum petrosum (Itali Muscus petrosus) à quibusdam nuncupari, & ab aliis Alcyonium quintum Dioscoridis statui.

Casp. Bauh. pin. facit Alcyonium II. & Fungum auricularem, Cæsalpini: Muscū fixatilem, Imperati.

FVNG

FVNGI LAPIDEI.
CAP. LX.

VT in terra, sic etiā in mari Fungi nascuntur: at hi non molles, sed lapideā duritie præditi, quorum genera, partim in Indico mari partim in Nilo eruta sunt, vt Clusio referebat cuius quidam Amsterodamenſis, apud quem eos anno 1600. conſpicebat.

E maiori- bus porro qui ē mari erūti, nullum exprimendum curabat, quia nulla apparebat pediculi, qui eos ſuſtinuiſſet, veſtigia. Sed quem cuius ille dicebat in flumine Nilo natum, duntaxat tamen maiorem, quia integer, & alium præterea minorem & magis cōtractum, exprimi curabat, & maioris quidem pronā & ſupinā partem, in prima & ſecunda tabella, quæ hic appoſitæ; minorem, in tertia.

In Nilo natus, decem vnciarum habebat circumferentiam, eius diameter tres vnciæ cum ſemiſſe: totus autem faxeus erat & candidus, ſupernā partē, ab umbilico ad circumferentiam multis profū-



*



*



*

dis ſtriis; oblique quodammodo excurrentibus ornatus, inferna autem, minus elatis ſtriis, niſque aſperis & quodammodo echinatis, erat præditus, quæ à circumferentia ad pediculum productæ

Tom. III.

deſinebāt, quā videlicet parte magis fulvus erat, pediculus eius brevis & craſſiſſculus, qui à ſcopulo aut petra abruptus videbatur.

Minoris, qui compreſſus, ſloris formam quodammodo exprimebat, circumferentia & ambitus [qui valde ſinuofus], ſex vnciarum erat diameter, in longitudine duarum cum ſemiſſe, in latitudine autem, vnius aut paulò plùs, & quia in ſloris quodammodo formam aſſurgebat, altitudo pæne duarum vnciarum erat, ab extermo orbe deſcendendo ſenſim gracileſcens: pediculum habebat breuem & craſſiſſculum: ſtriæ quæ externā partē à pediculo ad circumferentiam excurrerant valde conſpicuæ: quæ autem in parte interna, profundiores & magis conſpicuæ, ſimul etiam in medio cōeuntes, quemadmodum ex icone in vltima tabella expreſſa conſpicere licet.

C. Bauh. pin. Fungus lapideus 1. vel maior in Nilo natus: fungus faxeus Nili maior Cluſii Exor. lib. 6. cap. 10. Eid. Fungus lapideus 2. ſive minor: Fungus faxeus minor, Eiuſdem ibidem.

LICHEN MARINVS.
CAP. LXI.

Lichenis marini à Lobelio in ſc: Plant. pag. 247. rom. 2. inſcripti delineationem lege in Lob. Teut. rom. 2. p. 18.

FVCI FVNGIFORMES.
CAP. LXII.

Fuci fungulari dicti Imperato, ſunt de numero foliorum marinarum, folio quaſi circinò orbiculato, non ſine impreſſis lineamentis, itidem in orbem contortis. Adherent rebus quibus innasuntur ea parte quæ in vicem eſt centri. Accedunt colore & figura ad Fungos quosdā qui ſupra arbores creſcunt. Maiores redditi ſinduntur ſecundum lineas, quæ ab ambitu vergunt ad centrum. In hoc genere altera ſpecies, quæ maior eſt, acquirit ſpithamæ longitudinem ſive altitudinem, atque in aqua provenit, minutulis nixa pedicellis. Hæc in ambitu foliorum criſpatur. Minor verò duas vncias vix excedit, & plana eſt: & ſæpè alterum folium ſtat ſupra alterum, color vt plurimum ſpadiceus eſt.

C. Bauh. pin. Fucus ſubrotundus 4. ſive Fungis affinis: Fucus fungularis maior & minor, Imper.

Cecce Acan-

SPONGIÆ EX ANTIQVIS ET IN
genere. CAP. LXIV.

QUÆ Latinis Spongia est, Græcis σπῆγξ & dicitur: Etymologicus autem sic appellari scribit *ἔσπερος τὸ σπῆγξ τὸ ὑγρὸν*, quodd humorem attrahat, & combibat. Dioscoride referente, ē Spongiis alias nonnulli mares appellauere, quæ tenuibus sunt fistulis, ac spissæ densæque, ē quibus rursus duriores *σπῆγξ* nominauerunt: alias verò fœminas, quæ cōtratio, ac antè dictæ, modo se habent.

E Plinio lib. 9. cap. 45. Spōgiarum tria genera accepimus spissū ac prædurū & asperum, Tragos id, ab odore gaudi vocatur: minus spissū, & mollius, Manon: tenue, densumque ex quo penicilli siue turundæ[quæ sinuosis ac cauis vlcerib. immittuntur] parantur, Achilleum. Nascuntur omnes in petris, aluntur conchis, pisce, limo: intellectu inesse iis apparet, quia vbi auulso rem sensere, contractæ multò difficilius abstrahuntur. Hoc idem fluctu pulsante faciunt. Viuere escā, manifestò conchæ minutæ in his reperiuntur ostendunt. Circa Toronem nasci illas (vesci illis corrupta lectio) auulsas etiam aiunt, & ex relictis radicibus recrefcere. In petris cruoris quoque inheret color, Africa præcipue, quæ generantur in Syriis. Maximæ sunt Manæ, sed mollissimæ, circa Lyciam. In profundo autem, nec ventoso, molliores. In Helleponio asperæ, & densæ circa Melam. Putrescunt in apricis locis: idè optime in gurgitibus. Viuentibus idem, qui mandentibus, color nigricās. Adherent nec partē, nec totæ: inter sunt enim fistulæ quædam inanes, quaternæ ferè aut quinæ, per quas pasci exilitantur. Sunt & aliæ fistulæ, per totum corpus earum sparæ, verū hæc superne oclusæ & obturatæ sed superne concretæ. Et subesse membrana quædam radicibus earum intelligitur. Viuere constat longo tempore. Pessimum omnium genus est earum, quæ Aplyiæ vocantur, quia eius quodd ad eò fordida sunt & inquinatæ non possunt, in quibus magnæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissā. Et hæc Plinius ex Aristotelis libro 5. de hist. animal. transcripsit. Idem rursus lib. 11. cap. 11. per longū de Spongiis & ipsarum vſu agit, quæ nos inter vires tradituri sumus. Hæ sanè *σπῆγξ* & *σπῆγξ* dicuntur, quæ vt habet Plinius, neque fruticum, neque animalium, sed tertiam quandam ex utroque naturam habent.

Plin illu.
stratur.

Fer. Imperato Spongiarum natura Fungis proxima est, de vegetabilium marinorum genere, quarum substantia velut ex lana compacta, fistulosa seu foraminata, & vndique mucagine quadam membrana vestita. Viunt Spongiæ scopulis, testaceis & arenæ radice sua affixæ. Habent intus vim quandam motiuam quæ se contrahunt atque dilatant, qui motus apprimè eius materiæ conuenit. Ergo vento aut tempestate aliaue re extrinsecus accedente contractæ, retrahūt se versus radicem, atque constringuntur: tum melius rem, cui adherent, firmiusque amplectuntur. Auulsæ à sua radice, hæc nihilominus repululant, & vt aliæ plantæ recrefcunt. Spongiarum eius nodi proprium est, facillè constringi, & in pristinam amplitudinem dilatari: adhæc humoris esse sitibundas, quem facillè imbibant, & compressæ emittant. At in mucagine obhaerescere propriè sensus earum est & vita, à qua & facultatem habent se contrahendi. Dicimus ergo: alterum earum motum esse ab anima earum, alterum à conditione materiæ. Viuentes tantum

suo pte Martæ, vique propria se constringunt. Sed dilatio communis est his cum non viuentibus: nam & mucore orbis si constringas, resiliunt, & in pristinam molem ampliuntur. Differunt Spongiæ flacciditate, lentore: duntie, mollitie: densitate & raritate: poris que crebrioribus aut rarioribus, quæ omnes differentiæ materiæ sunt propriæ. A figura quoque differentiæ, aliis globosis, aliis lacinatis, aliis denique ramosis existentibus.

Spongia globosa.

NEapōlitanorum littorum propria est, auctore Ferdinando Imperato, figura pomi, aliquantum turbinata, substantia tenera, flexili [atrendeuole] & Spongiarum simili, sed maxime foraminata, hiantibus apertisque cauernis. Repertur sanè magnitudine capitis humani aut etiam maiori.

C. Bauh. pin. Spongia 1. siue Spongia globosa, Imperati. Locus Descriptio Synon.

Spongia compressa Schiacciata.

Figura sunt orbiculatæ, latæ, parum crassæ, substatia flexuosa, & quæ facillè compri possit, tenaci, foraminata, sed exiguis poris, ceteris omnibus ad Spongiarū vſum, ob plures conditiones requisitas, quas habet, expetita. Has Spongiæ, si Imperato credimus, antiqui Achilleas nominarunt propter earum subtilitatem, firmitatemque: quapropter ad arma sustinenda corporibus equitum interponuntur, & vt motum eorum atque impulsū prohibeant. Fulciuntur pediculo instar Fungorum, quibus similitudine quadam respondent.

Caſp. Bauhin. pin. Spongia 2. siue compressa Imperati. Synon.

Spongia compressa Schiacciata, Oceani latissima.

Ethæc Oceani Spongia propter substantiam densam atque tractabilem ad vſus à Spongiis expeti solitos valet, teste Imperato. A figura amplitudine commendatur, quippe cuius diameter, duos æquet cubitos: crassitudo duorum digitorum, figura plana, expansa, atque compressa. Habet præterea foramina quædam quatuor radiis stellata. Centro hærens viuūt, sicut cæteræ Spongiæ.

C. Bauh. pin. Spongia 3. siue compressa magna: Spongia marina alba & flaua (meiß vndt geel Meerſchwamm, Badſchwamm) Tabern. & Gerard: Spongia compressa latissima Imperati. Descriptio Synon.

SPONGIÆ HIRCINÆ.
CAP. LXV.

SPONGIÆ hircinæ dictæ Imperato, sunt eæ quæ duræ sunt, idèoque à Spongiarū bonitate degenerant. Tales figura sunt inæquali, cum eminentiis diuersis, cauitatibusque, per quas aqua marina transimeat.

C. Bauhin. pin. Spongia 4. siue hircina Imperati.

Vires Spongiarum in genere.

SPONGIÆ vſionem eandem habent quam Alcyonium. Noua vero & non pinguis vulneraria est, & tumores reprimi, & recentia vulnera glutinat eum aqua posca: cum melle autem cocto

cocto veteres sinus agglutinat. Vetus Spongia inutilis est. Sed & si filo diligenter & ipsæ aridæ velut linamenta indantur, conclusa vlcera & callos disparant. Si verò sicca, recentes, & inanes imponantur, fluida, cuniculosa, & diuturna vlcera resiccant. Cohibent & sanguinis eruptionem cum aceto. Vltæ eadem ad lippitudines faciunt, & ubi quid extergere opus est. Verum ad ocularia medicamenta melius faciunt lotæ. At cum pice vltæ ad sanguinis eruptionem conueniunt. Dealbantur tenerimæ ex ipsis, in ardoribus solis, spuma salis in petris consistente madefactæ & insolatæ: quod dum fit, caui ipsarum pars sursum spectet, deorsum verò quæ relectæ sunt. Si verò fuerit serenitas astuæ, etiam sub lunam exponuntur, & spuma salis, aut aqua marina, asperguntur, & taleæ albissimæ fiunt, auctore Dioscoride

Plinius.

Atarçia fœmina.

Plin. corrig.

Vires

Vires.

Spongiarum genera diximus [inquit Plinius lib. 31. cap. 11.] in naturis aquatilium marinorum. Quidam eas ita distinguunt. Alias ex his mares [Lugdunenses, duriores & fistulis minoribus pertulas, mares vocant] molliores autem, laxiores, & amplioribus cauernis fistulosas fœminas. Dal. Jexistimauere, tenui fistula, piffioresque, perforatis cum quæ tinguntur in deliciis, aliquando & purpura: alias fœminas maioribus fistulis, ac perperius, & maribus duriores alias, quas appellant Tragos, tenuissimis fistulis atque densissimis. Candidæ curâ sunt, & nouissimis recentes per Ætatem tinctæ salis spuma, ad Lunam & Pruinâs (rores potiùs. Nam Ætate nulla pruinâ fit) sternuntur inuersæ, h.e. qua parte adhaerere: vt candorem bibant. Animal esse docuimus, etiam cruore inhaerente. Aliqui narrant & auditu regi eas [Plutarchus Spongas ab animali, simili araneo, regi scribit] contrahique ad sonum, exprimentes abundantiam humoris, nec auelli petris posse, idè abiciendi, ac fanicem emittere. Quin & eas quæ ab Aquilone sunt genitæ, præferunt cæteris. Nec vquam [in aliis maris locis, quàm Aquiloniis.] diutius durare spiritum [narium, quem è mari natalibus suis conceptum, & fistulis abdicum celant: Medici affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia nostro suum misceant, & idè magis recentes, magisque humidas: sed minus in calida aqua [saluginem citius diluit, quàm frigida.] minusque vinctas (Oleosa enim ac pinguis saluginis vim obrundunt) aut vinctis corporibus impositas: & spissas minùs adhaerescere. Mollissimum genus earum penicilli [Achillas Aristoteles vocat lib. 9.] oculorum tumores leuant ex multo impositi. Idem abstergendæ lippitudini vtilissimi: eosque tenuissimos & mollissimos esse oportet. Imponuntur Spongiæ ipsæ epiphoris ex posca: ex aceto calido ad capitis dolores. De cætero recentes discutiunt, molliunt, mitigant. Veteres conglutinant vlcera. Vfus earum ad abstergendam (non tantum membra corporis, sed alia quævis, vt mensas & thesuros æneas, Homero: fouenda, operienda à fori dum aliud imponatur. Hulcera quoque humida & senilia impositæ siccant: fracturæ & vlcera Spongiis vtilissimè fouentur. Et ipsæ vlcusculum inflammationibus imponuntur nunc sicca, nunc ex aceto inspersæ, nunc è vino, nunc ex aqua frigida. Ex aqua verò celesti impositæ, secta recentia non patiuntur intumescere. Imponuntur & intergis paribus, sed fluctuatione occultâ laborantibus, quæ discutienda sit, vt iis quæ apostemata

Tom. III.

vocantur, melle decocto perunctis. Iteri atticulis alias aceto falso madidæ, aliàs è posca. Si ferueat impetus, ex aqua. Eadem & callo salsâ madidæ: at contra scorpionum ictus ex aceto. In vlcusculorum curatione & succidæ lanæ vicem implent, nunc ex vino & oleo, nunc ex eadem. Differentia hæc, quod lanæ emolliunt, spongiæ coëscunt, rapiuntque vitia, [prauos succos, lotides, excrementa, fanicem] vlcusculum. Circumligantur & hydropicis sicca, vel ex aqua tepida poscæ, vt cunque blandioribus opus est, operiunt aut siccari cutem. Imponuntur & his morbis, quos vaporari oporteat, feruenti aqua perfusa, expellæque inter duas tabulas. Sic & imposita itomacho profunt, & in febris contra nimios ardores. Sed spleneticis è posca, in quibus sacris ex aceto, efficaciores quàm aliud. Imponi oportet sic, vt sanas quoque partes spatiosè operiant. Sanguinis profluuium sicut ex aceto, aut frigida. Liuorem ab ictu recentem, ex aqua salsa calida sæpiùs mutata tollunt, testis tumorem, caloremque ex posca. Ad canum morsus vtiliter concisæ imponuntur ex aceto, aut frigida, aut melle, abundè subinde humectant. Africanæ (quæ generatur in Syrtibus) cinis cum Porri secti succo sanguinem reicientibus haustu salis ex frigida prodest. Idem cinis vel cum oleo, vel aceto fronti illitus, tertianas tollit. Priuatim Africanæ ex posca tumorem discutiunt. Omnium autem cinis cum pice crematarum, sanguinem silit vlcusculum. Aliqui raras tantum, ad hoc cum pice vrunt. Et oculorum causa comburuntur in cruda olla figulini operis, plurimum proficiente & cinere contra scabritias genarum, excrecentemque carnes, & quicquid opus sit ibi distingere, spissare, expleri. Præstant & strigulum vicem lint.olorumque & affectis corporibus, & contra Solem aptè protegunt capita. Medici incitiâ ad duo nomina eas redegerunt: Africanas, quatum firmitus sit robur, Rhodiacasque ad fouendum molliores. Nunc autem molliissimæ circa muros Antiphelli vbis reperiuntur. Trogius auctor est circa Lyciam pegicillos mollissimos nasci in alto, vnde ablatae sint Spongiæ. Polybius super ægum suspensos quicquid facere noctes.

Spongia vltæ Galeno actis est & digerentiæ potentia. Spongia noua, non sicut lana, aut linamentum, materia duntaxat, est quæ humores irrigandos excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Quare vlcusculum glutinat, si aqua, aut oxycrato, aut vino admoveatur imbuta: à qua sanè, quæ antiqua est, longo spatio relinquatur.

Subdit Quercetanus antiquos calculi remediū docuisse, ex Spongia calcinata, & in cineres adusta. Item, plerosque recentiores Medicos eisdem Spongiæ cineribus vti ex vino albo propinatis in cura bronchocele, totò vnius Lunæ curriculo, certissima experientia.

SPONGIÆ LAPIS.

Cap. LXV.

Lapides, qui in Spongiis reperiuntur, cum vino potos, calculos in vesica frangere ac continere prodidit Dioscorides. Spongiæ lapides inueniri in Spongiis & esse natiuos testatur Plinius. Quidam eos Cystolithos vocant quoniam vesicæ medeantur. Horum vires re-

Descriptio

Ccccc z.

res retulit Galenus l.9. simpl. medic. his verbis: Lapidēs qui reperiuntur in spongiis, frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapidem in vesica comminuant, unde qui id scriptum reliquerunt, mentiti sunt, verum eos qui in renibus constitunt, rumpunt: &c.


H. L. not.

SPONGIA INFUNDIBVLVM IMITATA.

CAP. LXVII.

Elegans hoc spongiæ genus, quod doctiss. & humaniss. Vir David Sinapius adseruabat anno . reparatæ salutis humanæ 1600. ac cuius etiam formam Clusii rogari ipse delineari curabat, & ad eum mittebat, in hærebat adhuc suo saxo, eique durissimo & nigro, quod duodecim libras pederbat.

Descript.



Synon.

Casp. Bauh. pin. Spongia 9. siue formâ infundibuli: Spongia elegans, Clus. Exot. l.6. c.11.

SPONGIÆ VELARES.

CAP. LXVIII.

Descriptio

Velares Spongas cum Imperato dicimus, quarum textura rara est. Nam ablata mucagine, quæ fibrarum vacua replet spatia, restat tantum quiddam lanuginosum filamentum instar, aut capillorum simul ligaturum. Harum ergo visus non est qualis spongiarum.

Est & huius species quædam cuius processus auium pedes quodammodo repræsentat, quarum superficies asperitatibus eminentibus oblita.

Etiānum alia huius candelæ auiis similis, cuius fibræ ab ortu ad extrema usque extenduntur.

Alia quæ cornu cæui figuram æmulatur: nam è radice allurgens in ramos vna tantum parte, siue altero tantum latere, diuiditur. Huius substantia similis est laxo alicui nec condensato filtro.

C. Bauh. pin. Spongia 5. siue velaris Imperati.

SPONGIA RAMOSA

CAP. LXIX.

Spongia arbor.

Erd. Imperatus l.17 c.7 p.730. vocat Spongiam ligneam arboream: Et p.728. Fungos spongiales dictos Tusfb. Hæc arbuscula in modum à trunco in ramos diuiditur: virgulta filtro duro similia, fissilia, à radice ad extrema usque densa spongiositate, floribus Typhæ [Tusfæ] plantæ palustris simili, vestita. huius materia facillè relaxatur, atque compressa, facillè in pristinum redit statum: quæ in re à spongiarum natura dege-

nerat. Ramorum diuisura ferè est qualis digitorum palmæ humanæ. Sunt & aliæ in rotunditatè collectæ, & ad Pini figuram quodammodo accedentes.

C. Bauh. pin. Spongia 6. siue ramosa.

DE ALCYONIO VETERVM ET

Neotericoꝝ sententia.

CAP. LXX.

Alcyonii, inquit Dioscor. quinque esse genera compertum est. *Primum* in Spissum, acerbi saporis, spongiola facie: item terri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. *Alterum* oculorum pterygio aut spongiæ simile, leue & multicanum, & odore ferè Alge. *Tertium* vermiculi forma & colore penè purpureum est. *Quartum* succidis velleribus nō dissimile, multis inanitatibus hians ac leue. *Quantum* figura Fungi, inodorum, & intus quidem asperum, quodammodo pumicosū, foris verò læue, acre: quod plurimum in Proponotide, circa insulam æsbycum appellatam, gignitur patrio nomine Halos achnen, quasi inanitis spumam aut lanuginem, vocat. *Duo* quidem priora in sinegmatâ tæminarū assument ut, contra lentiginēs, lichenas, lepras, vitiliginēs, nigritias & maculas in facie, reliquoque corpore. *Tertium* verò, iis qui difficillè vrima vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: itēque nephriticis, & ad hydropem lientisque vitia. *Vltimum* autem & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum ad albicandos dentes aptum est: assumitur & in alia sinegmata, psilothraque, cum sale mistum. Quod si quis aliquod ex hisce Alcyonii generibus cremare voluerit, addito sale in crudam ollam mittat, lutoque oblioto eius spiraculo, fornaci mandet: & cum siglinum percoctum assatumque fuerit, extrahat, & ad vsus recondat. Ceterum lauatur vti Cadmia.

Alcyonium, ut Plinius est autor l.32. cap.8. sit in mari, ex nidis vt aliqui existimant, alcyonium & Ceieum: alii ex foridibus spu. narum crasscentibus: alii è limo vel quadam maris lanugine. Quatuor eius genera Cinereum, spissum odoris asperi: Alterum molle, lenius odore ferè Alge. Tertium candidioris vermiculi *Quantum* pumicosū, spongiæ putri simile, penè purpureū, quod optimum, hoc & Milesium vocatur. Quod autem candidius, hoc min⁹ probabile est. *Hæc* Plinius: Qui tamen, inquit Marthiolus, Quintum fungi figura, cuius meminere Dioscorides & Galenus, in his Dioscoridem securus, silentio preterit.

Si Amatus Alcyonia nouit, cur non descripsit? Vocat Halcyonium Hisp. *Spuma della mar*, Gall. *Esume de mer*, Merde de Cormarin, Ital. *Alcyonia*, Arab. *Zebd' lhar*, Germ. *Meerschwam*. Cæsalpino verò vt Dioc. & Galeno quinque sunt Alcyonia.

ALCYONIVM SPONGIOSVM

offinarum.

CAP. LXXI.

Alcyonii huius frustū adseruamus quod & idē in officinis prostat. Duos pugnos crassitudine amplitudineque facillè æquat: Substantia quæ superficie tenus veluti cortice obiectum est, albicat, aliās cinerea est, nonnunquam pulla, pro temporis, vt arbitror, ratione, crustosa

Genera quinque Diosc.

Descriptio



stola, tota punctis canis notata, cauernis pluribus inæqualis. Interior facies Spongiæ similis est, sed firmior, colore pullo, tota porosa. Nam a-cicula vel modico pressu facile penetrat. Pondus, pumicis lapidis non adæquat: odor & sapor saluginosus. Est & nobis frustum ex quo Alga angustifolia protulit,

eique cum terræ inhærescit. In nostra icone demonstrantur radices & capillamenta Algæ.

C. Bauh. pin. Alcyonium i. siue durum, aut i. Dioscoridis Imperati: exhibet frater apud Matthiolum figuram Tabernamontani sed non indicat an eius meminerit Marthiolus, vel sub quo numero tradat.

ALCYONIUM STUPPOSVM IMPERATI.

CAP. LXXII.



Stuppis in glomerem conuolutis substantia interiori quodammodo simile est, ad tactum molle. Inuolucro tenuis Alcyonio duro aliquantulum simile, concavum, calycis formam imitante. Ex cuius concavo odor exprætat piscosus. Et germina interdum protrudit, sicut de molli dictum.

ALCYONIUM TUBEROSVM.

CAP. LXXIII.

Tuberosum est hoc Alcyonium, pediculo latiusculo, firmo, superficie tenuis punctato: substantia interior fibrosa, fibris directè è corticis cavitare porrectis, & circa media iunctis, & quasi in vnum conuolutis. Totum candidum est, & plurimum Algæ radicibus adhaerens, figurâ tuberosâ inæquali, magnitudine interdum quan-



tum vix ambo-bus brachiis amplecti liceat.

Fer. Impet. authori dicitur Alcyonium Synonymum tuberosum, forma Ficûs, Alcyonium 9. Dioscoridis. C. Bauh. pin. Alcyonium 7. siue forma fructus alicuius Ficûs.

ALCYONIUM MOLLE IMPERATI.

CAP. LXXIV.



Descriptio: Huius materiae Spongiæ similis est, ad tactum cedens: cortice obiectum est è quo alia germina exeunt lunco:um specie, crassitudine calami anserini, concava: inter quæ textura quædam tessellata prætenui filo, raroque velamento obducta conspicitur.

Synon:

Imper. Alcyonium molle, Alcyonium 4. Dioscoridis. C. Bauh. pin. Alcyonium 4.

ARANTIVM MARINVM.

CAP. LXXV.

Descriptio: Arantium marinum Imperati, colore est viridi, figurâ Arantii instar rotunda: quod tamen motu quodam adaperit denuò clauditur, quasi sensu quodam & virtute contractrice, quod animalium proprium videtur, sit præditum. Et hæc de Arantio marino Imperati, quod idem suspicamur cum Græno malo Aldroandi. Hæc tamen separat C. Bauh. in pin. cap. de Vatica marina, collocans Arantia marina non loco, Malum verò grænatum Aldroandi, decimo.

Aranta 3.

VESICARIA MARINA DVPLEX,
non ramosa & ramosa.

CAP. LXXVI.

L Obos adseruamus pugno maiores alicubi ad mediterranei maris ripam collectos, ex meris vtriculis vacuis Pisi magnitudine coaggestos, cum foraminulis singularibus inferiore parte vesicularum: qui mutua cohesione veluti ramos efficiunt contortos, compressu spongiæ in modum renitentes, leuissimos, colore flauescente, humido, aut pallido.



Quidam è vulgo Spongiã marinã vocant: verùm cum nihil ferè cū spongiã commune habeat quã colorem & leuitatem, ex re nata vesicariam, hoc est ex vesiculis refertam, vocitare maluimus.


Spuma maris Cespilini, est C. Bauhino in pins Alcyoniũ 15, siue Pila marina velut ex ampullis constans, ad spinã similitudinem.

Vesicaria ramosa prædictæ similis est, sed ramosior & plantæ figurã magis exprimens, quippe Corallinæ instar, variè diuaticati rami ex meris quoque folliculis foliaceis, coloris vel flauescantis, vel virentis, constant. Ramis verò muscus quidam coralloides, capillatus adheret, totus candidus, tenuis & aspectu elegans. Hanc ad prioris differentiam Vesicariam ramosam vocare quis posset. Eam autem habuimus tum à D. Thoma Placero, tum à Iac. Miege.

VESICARIA MARINA NIGRA, FAVAGO
Aristotelis quorundam.

CAP. LXXVII.

Hæc duplex existit: Est enim Fauaginis Aristotelicæ species prima, quæ ex membranaeis cauernulis nigris constat, dispositis quidem more fauorum. Fauaginis Aristotelis secunda species, multis ex poris & cauernulis, faui in modum, coaceruata est. Eam autem vnaquæque ali-



quid inflexum habet. Materia constant subtili.

Fauaginem Aristotelicam Imperatus facit Alcyonium secundum Dioscoridis. C. Bauh. pin. Alcyonium secundum, siue (vt somniat) Fauaginem Austrialem.

Synon.



TROMBÆ.

CAP. LXXVIII.

C. Bauh. pin. Arundo Indica 7. siue fluitans. Trombæ siue arundinetæ fluctuantia in Bali insula: in Hist. Or. Ind. part. 3. cap. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. Arundines longæ, seu Algæ in salso fluctuantes part. 5. Ind. Or.

Synon.

Diarium nauticum itineris Batavorum in Indiam Orientalem vocat Arundines vulgò Trombas dictas, & Arundines tubiformes.

ARBORES CONCHIFERÆ VEL ANATIFERÆ falsò dictæ, vt Telinæ, ac Balani.

CAP. LXXIX.

Conchas quas anatiferas vocant, varia magnitudine accepimus, adhærentes qualdam lignis, qualdam etiam arundini, in quibus apparent veluti pene, aut brachia piscium. Habemus sanè vnciã latiores & longiores, colore & splendore Telinarum.

Balani siue Glandes Columnæ.



Paludanus enim nobis misit. Illustrissimus etiam noster Princeps Fridericus Dux Wirtembergicus, & eius nobiles ex Anglia reduces nobis attulerunt: sibi persuadentes in Conchis illis aues generari. Attulit etiam Gener Cherlerus pia memorie.

Hector Boetius in descriptione Scoriz testatur hos anafes quosdam clakis appellare, eoque perpe-

Variant magnitudine.

LIBER XXXIX.

820

perperam in arboribus in Insulis Hebridibus nasci credere. Mari enim illis interiecto magis eorum procreandi vim quam inesse, quam alicui alii rei credit.

Britannica concha Anatifera credita, subdit Lobel. facit specimen naturæ quippiam boni vel è sordibus meditantis, ut iam multa lubeat

credere, quæ alioqui risssem apud rerum Septentrionalium Historicos, quamquam paulò secus hi narrant, duntaxat in Scotia aut Orcadib. maris Caledonii Arctici, olim à Romanâ classè devictis, compertum. Nos verò non solum ex Scotia, sed etiam ad Tamesim amnem, quâ Londinū præterfluit, primùm conchas pediculo rugosò crassiore è naui annoſæ carina auulſas, habuimus. Deinde Medio-caſtri &c.

Has conchas contrà Rondelet. in Northmannia & Britannia oriri aſſerit, nec aues generari ex his tradit, sed pro Balani ſpecie exhibet atque deſcribit: addens homines & mulieres alia ſatidientes cibaria, hoc eduli genere delectari, atque elixatis in aqua, diſruptisque, internam carnem ex aceto edere.

Hanc etiam communem vulgi receptam ſententiã meritò refutat Columna, dicens has Conchas anatiferas putatas nihil aliud eſſe quàm glâdes marinas deſcriptas à Rondeletio. Dum Conchas hæc, ait, ex quibus anates oriri falſò aſſeritur, minimè vidiffem, atque apud Lobel. quique eum ſecuti ſunt, conſpicerem in maris rupibus arborem eſſe, quæ fructus hos Amygdalæ pares formâ, atque magnitudine, ederet: mentem ſæpenumero cogitatio huius rei perturbabat meam: neque credere poteram, etſi aliquando animum ad credendum inclinabam, ratione hæc motus, quia ſcripta hæc erant à doctiſſimo Medico, atque demum ab aliis receptæ: at quidem iterum reiiciebatur à ſenſu hæc imaginatio fortiore argumento: quia arbor fructus edens depicta exhibebatur, atque ab eodem Medico, iidem fructus Concharum nomine donati erant, quas è naui annoſæ carina auulſas ſe habere teſtatur: quæ quidem inter ſe contraria, atque impoſſibilia cenſentur, &c.

De his apud Lobelium, Columnam & alios ex ipſis fontibus plura petat lector, nos neceſſariis inſiſtentes, hic ſubiſtitimus.

FINIS LIBRI TRIGESSIMI NONI.





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XL.

EXCREMENTA TERRÆ, VT FVNGI ET TVBERA.

TAndem vela contrahentes & receptui canentes, adeoque portum captantes, ipsi in reditu nihilominus memores, Fungos contemplerur, & Boletos ac tubera ex ipsis etiam terra visceribus eruantur. Ad id vñ summa, vel potius infima, natura herbaria per suprascriptos ordines ventum est, ubi tamen etiamnum sua sponte occurrat immensum potentia occultae documentum, ut prorsus nec aliud ultra quari debeat, nec par, aut simile possit inueniri, ipsa se vincente naturā dum absque semine Fungos, absque radice Boletos & Tubera, progenerat. Ideo excrementa a terra Sapientes appellare non dubitant. Et tamen hac præcipua est ventris insania. Omnia namque usque ad hoc volumen tractauimus, hominum causā genti a videri possunt. At in præteritis, si non e mentem eorum voracitate frugum, fructuum, herbarumque, multis variarum donis, ni & Fungos, & Boletos, & S. illi, & terra excrementa, sed gula nouissima irritamenta, sibi progenita siveret. Voramus hæc & magna fatagentia querimus, nullā aliā quam deliciarum, causā, quas transcendisse quoque virum sit. Nam qui sciat sub his latitare venenum, hocque pro delictis interdum sumptum, habeat quod usque cogitet, reputetque secum, qualia sint horum pressa, quæ vitā fugere potius, quam querere debeat.

DE FVNGIS ET BOLETIS IN GENERE.

C A P. I.



Vingorum, inquit Theophrastus, pediculus æqualitatem quandam peculiarem sortitus est: radice carent: è radicibus & iuxta radices Roborum erumpunt. Apud mare rubrum cum aque plures inceserint, iuxta mare quodam in loco Sole tacti, in lapides commutantur.

Dioscoridi Fungorum differentia duplex est, aut enim in cibi vsum veniunt, aut venenosi sunt. Tales autem multis de causis fiunt. Aut enim iuxta clauos rubiginosos, aut panniculos putridos, aut reptilium bestiarum fructus, nascuntur. Quæ priuatim noxios ferunt fructus, nascuntur. Habent tales etiam crustam glutinosam, & posteaquam decepti sunt, repositi facile putrescentes corrumpuntur. Qui verò tales non sunt, cocti ac conditi suaves sunt. Et tamen etiam hi largius sumpti lædunt, vt qui ægre concoquantur, stragulant, & bilis sursum ac deorsum eruptionem inducunt. Ita vt Fungi partim genere, partim copia lædant. Idem lib. i. cap. de Populo scribit quoddam tradere Populi albæ & nigræ corticem in tenuia frusta concisum & in puluinos stercora-

Tom. III.

rios seminatam, in omni anni tempore Fungos edules producere. De Populi Fungis, vide postea cap. de Fungis pluribus simul albis ad arborum radices esculentis.

De Fungis Galenus sparsim hæc prodit. Fungus [inquit 8. simpl. frigida, humidaque admodum planta est. Quamobrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemve facultatem accedit: & sanè inter eos sunt, qui interficiant, potissimum qui ex natura istam habent qualitatem putredinosam. Rursus aliment. 2. Inter Fungos Boleti, si bellè in aqua fuerint elixi, propè accedunt ad cibos inspidos. Non tamen sic solis ipsis vulgè vruntur, sed apparant variè & condiunt, vt alia omnia, quæ nullā insigni qualitate sunt prædita: Alimentum autem ex ipsis est perniciosum, frigidum videlicet, prauique succi, si quis ipsis largius vratur. Omnium igitur Fungorum inimicissimum sunt noxii. Secundi autem post hos sunt Amanitæ. Reliquos verò tutius est omnino ne attingere quidem: multi enim ex ipso esu intereunt. Equidem noui quemdam, qui post Boletorum non satis elixorum (qui innocetissimi putantur) vsum largiorem, ægre feruari potuit.

Inter ea quæ temerè manduntur, Boletos

D d d d

merito reposuerim (inquit Plin. lib. 22. cap. 22.) optimi quidem hos cibi, sed immenso exemplo in crimen adductos, veneno [Hoc euentu Nero Boletos appellat *ῥιζομαστος*, Suet.] Tiberio Claudio principi per hanc occasionem à conjugè Agrippina daro, quo facto illa terris venenum alterum, sibi quæ ante omnes, Neronem suum dedit. Quorundam ex his facili noscuntur venena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colore, rimosa striâ, pallido per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam, si cique & nitri similes veluti guttas in vertice albas ex tunica sua gerunt. Voluam enim terra ob hoc prius gignit, ipsum postea in volua, ceu in ovo luteum. Nec tunice minor gratia in cibo infantis Boleti. Rumpitur hæc primo nascente, mox in pediculo corpus absumitur, raroque vnquam geminis ex vno pede. Origo prima causaque è limo, & acescente succo madentis terræ, aut radicis ferè glandifera: initioque spuma lentior, dein corpus membranz simile, mox partus. Illa pernicialia, protus improbanda. Si enim Caligaris clauus ferrive aliqua rubigo, aut panni marcor affuerit nascenti, omnem illico succum alienum saporemque in venenum concoquit: deprehendisseque non nisi agrestes possunt, atque qui colligunt. Dacunt ipsi alia vitio, nunc quidem si serpentis cauerna iuxta fuerit, si patescentes primo adhalauerit, capaci venenorum cognatione ad virus accipiendum. Itaque cauere conueniet, prius quàm se condant serpentes. Signa erunt tot herbæ, tot arbores fruticesque, ab emerfu earum ad latebram vsque verantes: & vel Fraxini tantum folia: nec postea nascentia, nec ante decidentia. Et Boletis quidem ortus occasusque omnis intra dies septem est.

Fungorum genera.

Fungorum autem lentior (natura) subdit cap. 23. & numerosa genera, sed origo non nisi ex pituita arborum. Tutissimi qui rubent callo, minus diluto rubore, quàm Boleti. Mox candidi, velut apice Flaminis [sic albogalerum & pileum Flaminis vocat, cuius effigies in multis vetustis spectatur, præcipuè Iulij Cæsaris] insignibus pediculis. Tertium genus suilli, venenis accommodatissimum. Familias nuper interemere, & tota conuiuia, Annæum Serenum præfectum Neronis vigillum, & tribunos & centuriones. Quæ voluptas tanta ancipitis cibi? Quidam discreuere arborum generibus, Fico, Ferula, & Gummi ferentibus: nos item Fago, aut Robore, aut Cupressu. Sed ista quis spondet in venalibus? Omnium colos liuidus. His aberit veneni argumentum, quò similior fuerit arborum Fici. Aduersus hæc diximus remedia, dicemusque: interim sunt aliqua & in his. Glaucias stomacho viles putat Boletos. Siccantur pendentes suilli, luncu transfixi, quales è Bithynia veniunt. Hi fluxionibus alui, quas rheumatismos vocant, medentur, excrescentibusque in sede carnibus: minuunt enim eas, & tempore absumunt. Item lentigines & mulierum vitia in facie. Lauantur etiam vt plumbum, in oculorum medicamenta. Sordidis viceribus, capitis eruptionibus, vt & canum moribus ex aqua illinuntur. Liber & coquendi dare aliquas communes in omni genere obseruationes, quando ipse suis manibus delicie præparant hunc cibum solum, & cogitatione antè pascuntur, succineis nouaculis, aut argenteo apparatu comitante. Noxii erunt Fungi, qui in coquendo duriores fient, innocentiores qui Nitro addito coquuntur, si vtrique per-

Exspectatur suilli.

coquantur. Tutiores fient cum carne cocti, aut cum pediculo pyri. Profunt & pyra confestim sumpta. Debellat eos aceti natura, contraria iis. Imbribus proueniunt omnia hæc. Et quidem Boletos, suillosque, gule nouissima irritamenta circa radices gignit Quercus probatissimos (vt idem ait lib. 16. cap. 3.) Robur autem, & Cupressus, & Pinus, noxios.

Boleto peritissimum Claudium Imperatorem sequentibus demonstrat Iuuenalis, Satyra 5.

Vltibus ancipites Fungi ponuntur amicu.

Boletus d'mino: sed qualem Claudius edit

Ante illum uxoris, post quem nil amplius edit.

Item Satyra 6.

— minus ergo nocens erit Agrippina

Boletus, siquidem vnus præcordia pressit

Ille senis, tremulumque caput descendere iussit
In calum.

Martialis

Argentum atque aurum facile est, lanamque, togamque

Mittere, Boletos mit tere diffiule est.

Horat. Satyr. 4 lib. 2. Sermon.

— Præstibus optima Fungus

Natura est, alui male creditur.

Extat iocus Plauti, alludentis ad Fungum maximum vbi seruus quidam vocatur pileatus Fungus:

Pol hic quidem fungino genere est, capite se totum operit:

Idem in Bacchidibus Fungum reddit, hominem stupidum, stolidum, inconsideratum.

Adone me fuisse Fungum, vt qui illi crederem?

Et aliquid potest.

Tanti est, quanti est Fungus putridus.

Fungi cortice, medullâ, neruo, venâ carent, pediculo admodum æquali: quanquam qui ex iis Pezicæ à Græcis vocantur, nec pediculum, nec radicem habeant.

Fungos, inquit Hermolaus, Græci *Mycesas* vocant, nec distinguunt: quanquam Paulus etiam Boletos cognouit, *Boletas* appellando, quibus & principatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum iis, qui *Amanites* nominantur. Sunt & *Egrieta*, sed industria, fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto, aqua protinus coalescentes. Fungos Græci Deorum cibo nasci dicunt, vt Tranquillus in Nerone meminit. Porphyrius non cibum, sed filios Deorum, Fungos & Tuberâ vocabat, quia prouenire viderentur sine semine: Natâ fortè diuersitate, quòd verbum *ἑρμῶφρο*, & eum qui alit, & eum qui alitur, significat accentu modo comitante. Porro Deorum & cibis & alumi idè videri possunt, quoniam & eos, quorum pater ignotus est, filios terre dicimus. Recentiores alia quoque nomina, vel genera dedere: *Ouatros*, ab oui similitudine: *Spongiosos*, à spongia: *Digitellus*, à digitis: *Porriginos*, à porriginè: *Pezicas*, quasi scissiles, & pediculis carentes. *Lacima* priuatim dicuntur à Castanea, magnitudine spectabiles, vt singuli sufficiant. Innocentissimi sunt & Rubis & Carduis Vere, nati rotunditate clusili, quos inde *Prunulos* & *Spinulos* appellant, & *Cardeolos*. Oritur & è saxo, id est, lapide lyncurio, siue lyncæo vulgari voce dicto, Fungus; admirabili natura. Præciditur hic in esum & alius subnascitur anno roto: pediculi pars relicta duratur in silicem, atque ita semper circiter lapis, restibili fecunditate: nec credidi, antequàm domi natos ita manducare. Noui & hoc vira sibi comperit, inuicem; nulla perdit: quanquam est vbi Plinius hoc innuat. Sunt ignari

Boleto peritissimum Claudius Imperator

Fungorum differentia Hermolaus

Deorum cibum

& igniarij quidam Fungi, & quibus strigilium vix constra vntur.

Tarentinus porro author est, vt perhibet Ruellius, si caudice Populi nigre iuxta terram conciso, fermentum aqua resolutum infundatur. illi- co proflire Agiritas Fungos: addens, si monta- num aruum multis calamis, stipulis, & fruticibus scatens, cum cælum imbres parturit, incendatur, permultos sponte naturæ prorumpere Fungos. Si ramen aruo iam ignem experto fortè fortunâ non subsequatur, quamvis impenderet aqua, linteo raro stillatim inbris imitatione conspergendam. Iis itaque incensis locis nasci Fungos quidem, sed aliquantò deteriores: siquidem meliores in hoc genere sunt, qui imbre aluntur. Gallos, Fun- gos *Campiones*, quod in campis tepido imbre pro- ueniant nominare: præferre autem in montibus inter Iuniperos, & in locis apricis enatos. Qui rigitis prodeunt longo pediculo, callo corporis in turbinem mucronato, *Merulis* à metæ figura, quasi *Merulos* nominant. Aliqui à nero futuro glomere, *Fusis* malunt appellare. Il moroso di- uitum palato magis placent. Alij letiore natura breui nituntur petiolo, clusili rotunditate insi- gnes, diluto intus rubore, exterius candidi, qui cibo non improbantur, *Campetresque* nominan- tur. Alij in nemoribus & ex radice n. pituita, ca- llyce parulo, nigris intus aut liliatis membra- nulis horrentes, qui vt noxij cibis abdicantur. Alij terræ coherant nullo sulci pede, in globum circumati, nec vlla sui parte patentes dehiscunt, qui cum rumpuntur, atram fuliginem effundunt, toto callo in fumum abeunt: hos *Crepitus lupi* vulgus gallicum appellat: ij nullo pacto man- dantur. Alij velut succrementa quædam ma- gne molis in caudicibus arborum, aut ramis tam pertinaciter hærent, vt vix auelli possint: hos *Arbores* appellant. Sunt & igniarij quidam Fun- gi, quibus dictus latus conduntur ignem: ijs strigilium aut delectilum Spongiarum vice constra- vntur. Fungus, vt quidam volunt, à funere defleclitur, quod suo veneno ad funus vscientes deducat. Græci *Mycetas* ab ensis capulo, vel sum- mo vertice vaginam occultende appellant, à quo procidente *Mycenæ* nomen deduxerunt, vel ab insigni nympba cuius Homerus memi- nit.

Alcmena, Tero, & fertis redimita Mycena.

Cordo in Diosc. Fungorum multiplex est dif- ferentia: Quidam enim, inquit, edendo sunt, qui- dam verò intra corpus sumpti strangulant. Ger- mani omnes generali vocabulo *Schwemme* vo- cant. Qui autem edendo sunt, suis distinguuntur generibus. Sunt, enim quidam Piperis sapote, & lacteo liquore manant, hos Germani *Pfifferling* vocant. Sunt & Boleti, quos *Bölz* eadem gens appellat, venenati Fungi. Multa habent genera, sed omnia *Poggenstül*, id est, Bufonum cathed- ræ, siue Sella; Saxonibus dicuntur. Sub Betulis arboribus in candido & rufo colore varij nas- cuntur Fungi, quos *fligen Schwem*, id est, Mus- carios Fungos vocant, quoniam muscas lacte in- triti occidunt. Pharmacopolæ in suis officinis Fungos habent, quos ceruinos nominant. Ferunt eos in sylvis ex semine ceruorum enasci, & pro- pterea Venerem stimulare: sed falsum hoc est. Inueniuntur siquidem hi ceruini Fungi in præ- ruptissimis montium sylvis, quò ne damæ aut Rupicapra quidem peruenire possunt, nedum cerui. Nec verisimile est eos venerem stimula- re, cum frigidum, pituitosum, crudum & mali-

gnum succum in humano corpore gignant. Quæ enim venerem accendere debent, contrarias fa- cultates & qualitates habere necesse est.

Multa & varia Fungorum genera commemorat Tragus: quæ nos scorsim recensemus suo lo- co: Cæterum neque plantæ, neque flores, neque semina sunt, inquit, sed nihil aliud quàm terre, ar- borum, lignorum putridorum, aliarumque tri- tilaginum superflue humiditates, id quod inde colligi potest, quod omnes, maxime ij, qui eden- do sunt, & tonitribus & pluuioso cæli itatu fre- quentiùs nasci solent, quemadmodum Aquinas poeta confirmat.

Et facient lentas optat a tonitrua canas;

Fungos Arabes teste Rhaze, *Gofsa*, *Felich*, & *Nomiâ Cantar* nominant, atque *Hatay*. Græci *μυκίτας*: Hebr. *Paapim*: Germ. *Schwem*: omnes scilicet vno vocabulo comprehendentes, siue edendo sunt, siue perniciosales. Innocentissimos autem Bo- letos, quorum omnes ferè docti meminere, Ger- mani *Vliordellen* / *Heiderling* / *Rheling* / *Brä- ling* / & *Pfifferling* nominant, Latini *Tubera*, *Am- musas*, & *B letos*. Illa denum Fungorum genera, quæ super finium, in tectis stramineis domorum, in puerilis lignis, & ad arbores, *Quercum* sc. *Fa- ga*, n. *Nac*, m. *Betalam*, *Sambacum* pomiferatæ denique, nec non in saxis & antiquis muris pro- fluant, recensere neminem, vel peritillimum rei herbariæ, posse arbitror.

Tameti duo tantum Fungorum genera videat- ur recensere Dioscorides, ad Fungos duntaxat noxios & perniciosales respiciens: tamen, vt ait Matthiolus, omnibus palam est plura ac diuersa eorum, quæ in cibis expetuntur, discrimina nota- ri. Et horum quidem inter omnes Italæ regiones feracissima est Hecctoria, vbi illi Fungi cæteros antecellunt qui vulgò dicuntur *Pugnati*. Secun- dum verò locum apud Hetrulos tenent ij qui vulgò *P. rami* hoc est, suilli nuncupantur. Præter hæc multa alia Fungorum genera inueniuntur, vt ij qui vulgò *Pratatioli*, *Thirini*, *Orcelle*, *Cardarelle*, *Maniæ*, *Ordinali*, *Parigiole*, *Vesie di lupo* appellant- ur. *Molytes* qui Græcis, Fungus Latinis dicitur: Arab. *Hazar* seu *Father*: It. *Fonghi*: German. *Pfif- ferling* & *Reysen*: Hispan. *Hingos*, *Cog nuelos*, & *Cylberquas*: Gallicè, *Champignon*, & *Paryr*. n. Et hæc Matthiolus obscurè de Fungis scripsit: Nec cla- rius Castor Durantes.

Ex Fungorum pluribus speciebus, Boletis in pratis plerumque principio Aprilis nascentibus, Amatus primas tribuit: & tamen tam hos, quàm Ananitas, reliquosve, tanquam noxios, ac prauif- simi & frigidi nutrimenti, fugiendos ac rejicien- dos consulit, vt à quorum elu vel tusticos etiam & agrestes homines mori viderit. Quinam autem sint eius Fungi pratenses Aprilis provenientes, non docet.

FVNGI VERNI, MOV CERON dicti, odori & esculenti.

C A P. II.

Fvngi genus illud, quod, quia sub Musco communiter proveniat, ac sub eo latet, *Mouceron* nostrates dicant, magno in pretio est, mensisque laurioribus expetitur. Fungi pri- mulum erumpentes, pediculis breuibz fibras

deorsum agentibus *capitula* sustinent Piso magno æqualia: duodecuplo maiorem molem [nisi auerentur] assecuturi. Sed pediculus ipse teres & in imo crispus vel rugosus ex terra non multum emergit. Ceterum clusiles sunt, rotundique in summo, subius verò quā instar tentorij reflexi, rimosis à centro ad circumferentiam striis donati: vbi penitus excreuerunt, campestrium Fungorum instar expanduntur. Totā verò substantiā intus foris-que candidi, gustus gratissimus, odorisque grati.



Fungi Sir.
rui. Peziza
Peziza.

Locus &
corpus

vsus

Hermolao innocentissimi sunt Fungi è Rubis & Carduis Veronari, rotunditate clusili, quos Prunulos & Spinulos appellat & Carduios seu Ruellius, & Lacuna. Amato Boleti principio Aprilis in pratis nascentes. Matthiolo & Ca-

flori Prignoli, quos Porta villæ lib. 10. cap. 70. vulgò Vinos dici refert: Dalechampsius verò apud Plinium lib. 19. cap. 3. Pezitas Plinii & Athenæi appellat.

Primo Vere sub Martii finem & Aprilis initium protrumpunt locis apricis, nemoribusque inter spinas: Montbelgardi potissimum & per comitatum Burgundicum finitimasque oras, nullo non ferè obseruauimus Vere, vnde & in Ducatum Vvitembergicum interdum inuehantur: latitant sub Musco, ita vt non à quolibet reperiantur, vnde dicti *Mouceron*. Rustici, & alii qui norūt loca vbi crescunt, non facili cuiquam demonstrant, propter emolumentum, quod inde hauriunt, non paruum. Fungi hi omnium optimi, qui vulgò Virni dicuntur, inquit Clusius, quod verno tempore nascantur, primis Aprilis imbribus erumpunt, in siluis sub arborum vmbreis, & vbi nascuntur, quorū annis repullulant. Aliquando, cæsis arboribus, è loco euanescent: Solum in quo crescunt, cinerei est coloris.

Vino alicubi imponuntur, vt gratum concilient odorem ac saporem, & ex eo eduntur.

FVNGI D. GEORGII, COLORIS EXALBIDI cum pauca flauitie, esculenti, pratenses.

CAP. III.

Descript.

Parua Fungi species est, duarum vnciarum amplitudinem vix æquans, orbiculari ferè formā, superne quidem aliquantulum extuberante, & quodammodo puluinatā: intus verò concamerata, & quibudam veluti venis distincta, pediculo crasso breuique, coloris exalbidi, cui flauui quippiam admistum sit.

Synon.

Clusio est Fungorum esculentorum tertium genus, quod Vngari Szent Györgyi gambaia / Germani Sant Georg schwammen appellant,

quia circa dñem D. Georgio sacrum inuenitur. Fortè Fungus optimus Horatio.

Fungus 4. si. Locus. ue orbicularis exalbidus pratensis, C. Bauhin.

Est verò hic *Preparatus* fungus, qui in sicciorebus at-

que pascuis pratis crescit, aliorum Fungorum modo preparandus, qui repurgati vt plurimum elixari solent, & in frusta cōcidi, quæ inter binas lances reposita, infuso oleo Oliuarum vel butyro, & Piperi addito, super prunas coquantur: aut cum larido iniicitur iusculum ex lactis cremore paratum.



*



*

FVNGVS CAMPESTRIS, ALBVS SVPERNE, inferne rubens.

CAP. IV.

Fungi quos à natalitio solo campestri Montbelgardi Champignons denominant, primo pullulatu globosi, postmodum paulatim explicati, membranulas infra ostentant rubentes, superius inoffenso leuore æquabiles & albi: saporis & odoris sunt boni, primulūm ex terra erumpentes.



Hi sunt illi Fungi Ruellio latiore natura breui petiolo nitentes, clusili rotunditate insignes, diluto intus rubore, exterius candidi, qui cibo, non

non improbantur & Campeſtres cognominantur.

Trago dicuntur Fungi vulgares, Boleti Amanitæ, germ. *heiderling* & *Grüßling* (ita quoque *Lonic.* vocat.) & *Gefn. coll.* ſcrip. quod in campis & aridiſſimis locis & iumentorum paſcuis proueniant: & hinc gallicè *Campiniones* vocat, pileolis rotundis & latis ſimiles, inferius prope terram puniceos, ſuperiori verò parte membranulis luidi coloris teſtos.

Matth. Fungorum ſecundum genus facit, eoſque *hetraſcos* vulgò *porcinos*, h. e. ſuillos, vocare ſcribit in Dioſc. in hiſt. germ. pro ſexto genere depingit. An verò apud Dioſc. per porcinos intelligat campeſtres, dubito: quæ de iis ſcripſit relegami ad caput Fungi noſtri poroſi.

Lob. hiſt. belg. rom. 2. p. 305. & *l. c.* Plant. p. 271. Fungi vulgatiſſimi eſculenti, carne proſuſ alba, infernè ſubrubente, dum recentes ſunt: verſitate vitium contrahunt, & noxi ſunt, grauem odorem contrahentes & ſiſcum colorem.

C. Bauh. pin. Fungus 13. ſiue pileolo lato & rotundo luido: Matth. Lac. Lon. Dôd. Caſt. & *l. c.* Lugd. p. 157.

Abundanter inuenimus in Than, Beffordia, & Mompegardi Auguſto & Septembri, in pratorum collibus & planicie, boni ſaporis & odoris recenter è terra prodeuntes. In fine Iunii palmâ manus maiores alicubi obſeruauimus. An verò naſcantur etiam Vere, vt vult Lobelius, in ſabuloſis & recens ſtercoratis agris, ac ſubinde quoque in ſemetis, in quibus tamen inſalubres oriri tradit, nondum obſeruauimus. Vulgares Fungi, qui vulgò coqui ſolent, in campis, graminoliſis agris, aridiſſimis pratis, potiſſimumque iumentorum paſcuis naſcuntur. Iunio menſe primum cernuntur, inquit Tragus, maxime ſi pluuiôſa & humidatim tempeſtas fuerit. Nam neque hæc, neque alia Fungorum genera, niſi pluuiôſi cæli conſtitutione, procreantur, quæ etiam cauſa eſt, vt vno anno tardiùs, altero citiùs oriantur, & ab eodem tempore ad Auguſtum vſque menſem cernantur.

Boletis membranulas luidi coloris, antequam in cibos veniant, detrachere oportet, ac tum demum, ipſos aqua bullire, butyroque & aromatibus condire conuenit. Sunt tamen qui hos Fungos membranâ auulſa ſuper carbonem ignitos aſſare, ſolùmque ſale aſpergere, cibique vſurpare ſoleant, prout cuique videtur.

FVNGVS CANDIDVS REGIVS

odoratiſſimus.

C A P. V.

Deſcript. Porta villa lib. 10. c. 70. author eſt hunc Fungum antiquis indiſtum eſſe candidum, odoratiſſimum, orbem vix vtraque manu diductis pollice & indice cingentem, tam eſui ſuauem, vt crudus edatur, præberi ægris innoxie: incolas *Richione* vocare, quaſi magnum Fungorum regem dicas: Autumnalem eſſe. C. Bauh. pin. Fungus 18. ſiue candidus odoratiſſimus orbe magno.

FVNGVS PIPERATVS ALBVS,

lacteo ſucco turgens,

C A P. VI.

Deſcriptio Exulant à menſis (non tamen omnibus, nec vbiq̃ue) Piperati dicti Fungi, magni illi qui Tom. III.

dem lati, Campeſtres mole ſuperant, pro magnitudine tamen minùs denſi, non ſuprà tantum albi, ſed & ſubtus candidiſſimis tenuiſſimiſque membranulis contexti, cum ex Campeſtribus rubeant. Lactæ turgent ſeruideo: tandem inueteraſcentes, ſurſum flexis oris & pileolo tabeſcente ſuperius caui redditi, metam inuetſam aut inſundibulum referunt.

Cordo in Dioſc. Fungi Piperis ſaporis & lacteo liquore manantes. Trago Fungi tertium genus cibis expetitum, coloris proſuſ candidi, rotundum. In hoc genere ait inueniri, qui diſco latiores ſint, omnes tamen, quum frangantur, lacteum & feruentiſſimi ſaporis [nam omni Pipere linguam magis vellicare] ſuccum fundere. Orbiculatos à magnitudine vocari: à Germanis *Pſiſſerling*, ſed rectiùs *Pſefferling*.

Cornar. ſecundum genus Fungorum Plinii: Fungi candidi. *Lonic.* qui non meminit ſucci lactei, Fungorum tertium genus: Boleti orbiculares. Matthiol. Fungorum quintum genus. *Mirandus* *Lonicerum*, non meminiffe ſucci lactei, licet Tragus tradiderit habere lacteum ſuccum feruentem.

Euch. Rôſlin. Boleti orbiculati, omnino albi, lac fundentes. Porta, Fungus antiquis indiſtus, Piperitis vocatus: quia velcendo linguam vellicat, ac ſi Piper voraremus, ac fauces incendit: naſcitur Autumno: coloris albi, vulgòque Pipitella dicitur.

C. B. pin. Fungus 10. ſiue pileolo lato orbiculati candicante: Fungi orbiculati, vel Fungorū tertium genus, Tragi: Fungi boleti, Cordi in Dioſcor. & *Lonic.* Fungi nemorum, Lob. Belg. Fungi eſculenti octauum genus, Cluſii. *Eld.* Fungus 27. ſiue albus acris. Quo pacto, quæue ratione C. Bauhin. Fungorum tertium genus Tragi, ad Fungi eſculenti octauum genus Cluſii referat haud dum conſtat. Cluſius ſuum Fungum ſtatuit amarum: Tragus piperei ſaporis. Iam quantum inter ſaporem amarum & acrem ſeu feruentem intercedat, vel Fungus iudicat, qui ab Horatio homo inconfideratus myſticè dicitur.

In altiſſimis & tenebroſis ſiluiſ, Septembri & Auguſto menſibus naſcitur.

Qui ſiluiam vulgò *Obentwalde* cognominatam incolunt pauperes, ſale aſperſos carbonibus ignitiſ cibo aſſare ſolent. Caterùm, quum lacteum huius ſuccum (à quo Bollentes eum *Mildſling* vocant) aliquando digitis attigſſem, & ex impropiſo palpebras digitis abſtergiſſem, quamprimùm magnas punſiones & pruritum expertus ſum, talem quidem, qualem à Tithymalorum ſucco euenire contingit.

FVNGVS ALBVS, DICTVS MOMPEL-

gardenſibus & vicinis *Biſſette*.

C A P. VII.

Deſcriptio Auguſti fine anno 1609. obſeruauimus hos Fungos, Campeſtribus ſimiles, ſed infra, ſupraque totos albos, quos Montbelgardentes & vicini *Biſſettes* vocant. Hos olim eoſdem eſſe putabam cum *Colombettes*; verum diſtinguebam à Campeſtribus, quod tardiùs prouenirent, & pede longiores eſſent. In ſiluiſ *Querquum*, ſed rariùs, occurrunt. Præcedunt *Colombettes*, & minores ſunt.

D d d d d. 3

FVNGVS MAGNVS TOTVS ALBVS
sine succo lacteo, edulis, Columbettes
Montbelg. CAP. VII.

Descript.



EX odulium
quoque
Fungorū cen-
su sunt hi, ma-
gnitudine ex-
cellentes, toti
albi, tam sub-
tus quā su-
prā, omnisque
succo lactei ex-
pertes, quo
turgent Pipe-
rati, illis simi-
les. Per ambi-
tum aliās cri-
stati, aliquan-
do reflexi &
inæquales
sunt, interdum
non. Disting-
uuntur autem
Columbettes à

Biserte pede elatiore, & quōd latiores sint, tar-
diusque proueniant.

Locus

Inueni inter Champigni & Passauant Ludren-
sis Abbatis. In silua itē ē regione vrbis Mont-
belgardenis dicta le Chesnais.

FVNGI ALBI VENENATI VISCIDI.
CAP. VIII.

Descriptio



Interest
sanē horum
formam &
naturam vel
apprimē no-
uisse. Eduli-
bus albis ali-
quo modo
similes sunt,
pediculo digi-
tum crasso,
tres quatuor-
ue plūs mi-
nūs alto, qui
clypeum su-
stinet orbicu-
larem, palma-
rem, pressum,
subtus candi-
dissimo mem-
branarum te-
nuissimarum

sqwarro stipatum. Superna facies subcine-
ricea, ad albidum nonnihil vergens, vi-
scido tactu, fungosis verrucis eminentibus cons-
persa, quæ tamen sine membranæ noxa auulsu
faciles, quas merè accidentarias esse putamus, vt
quæ non in omnibus appareant. Sapore sunt mi-
nimè ingrato, sed subdulci, succo aqueo. Vnde
deceptus quidam optimus ciuis Mompelgar-
benſis, vegetæ ætatis vir & corpore robusto, qui
hos ipsos [ad quorum imitationem Eicon hæc
nostra facta] coctos, & ad palatum eius præpa-
ratos nimis imprudenter vorauit. Mox enim
nauseabundo stomacho vomitus infestabat, hinc
vertiginem sentiens, prostratis tandem viribus,
membrisque refrigeratis, soporolus iacuit, non

Icon.

sine mortis periculo. Nam & loquelā priuatus,
pulsu deprehensus fuit perexiguus cum suffoca-
tionis metu. Qui tamen paullo post vomitu pro-
uocato prius, alexipharmacis, Theriaca potissi-
mum, enematis itē restitutus fuit, postquam
non paucas horas dubius & velut oppressus, in-
ter vitam & mortem quasi succubuerat.

FVNGVS NEMORVM AMPLVS, INTER-
dum albus, nonnunquam maculis
nigris distinctus.

CAP. IX.

FVngum hunc nemorum amplum pingit Descrip-
t. Lobel. in Icon. Plant. tom. 2. p. 272. deque eo
hæc scribit in hist. belg. In siluis & nemorosis lo-
cis reperitur Fungi genus planum quod inter-
dum in tantam amplitudinem excreſcit, vt lan-
cem implere
queat. Id ali-
quando pror-
us album, nō-
nunquam su-
perne maculis
nigris & rufis
distinctum, in-
ferne album &
nigris striis exa-
ratum, pediculi
inferiori parte
nigra.



Varietas

C. Bauh. pin- C. Bauh.
misceet hunc cū
Fungorum ef-
fulcentium ge-
nere octauo
Clusii, quod ip-
si est Fungus de-
cimius. Vide ca-
pit. nostrum,
Fungi tres sil-
uarum, &c.

FVNGI LONGISSIMO PEDICVLO, CAN-
dicantes, sed maculati, efculenti.

CAP. X.



NVLlum in-
ter Fungo-
rum, qui inno-
xii æstimantur,
genera esse pu-
tat Clusius qui
hoc longiore
præditus sit pe-
diculo. Aitenim
in octo aut no-
uem vnciarum
longitudinem
esse potrectum,
digiti minimi
crassitudine,
rectum, versico-
lorem, & macu-
los, striis qui-
busdam & ma-
culis paruis &
magnis ex albo,
rufis, & fulco
coloribus com-
mixtis distinctum, marmoris varii instar. Ipsum

Descript.

verò Fungi corpus pilei seu galeri formam quodammodo referre, valdè laxis oris, deinde sensim in turbinatam metam desinens, altitudine trium vnciarum, aut ampliore, orarum diametro uncias ferè octo occupante, candicantis superne coloris, multis tamen maculis magnis & exiguis ex fulco rufescentibus infecti, supremo fastigio prorsus fusco: inferna pars caua admodum & camerata, candicans quidem, sed plurimis striis fuscis oblique, & veluti in cincinnos compositis, distincta: duabus autem ferè vnciis infra supremum pediculi fastigium, corolla digitalis circiter latitudinis ipsum amplectitur, vnde corporis ipsius Fungi oræ abruptæ videntur, dum in laxitatem sele diffundit. Fungorum esculentorum generis huius decimi octavi vnicam speciem obseruabat auctor, quæ in arvis plerumque prouenit. Tribus verò diuersis anni temporibus interdum nasci intelligebat. An autem ille sit Fungus, quem Porta à Neapolitanis *Concielle* uocari scribit, dubitat.

Synon.
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fungus 24. siue Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato: Fungi esculenti 18. genus Clusii. An Fungus pratensis, quem quidam *Scarogias* vocant, Cæsal?

FVNGI QVATVOR: 1. CANDICANTES:
2. etiam albicantes: 3. in albedine magis fusci: 4. rufescentes, siluorum esculenti.

C A P. XI.

HOs sub Fungorum esculentorum nono genere describit Clusius: Eiusdemque generis se quatuor differentias obseruasse scribit: omnes vno nomine cum apud Vngaros, tum apud Germanos dictas, illis quidem *Berendy*, his verò *Kremling*.

Prior species, inquit, secundo generi valde assimilis non est: nam circinata in plano ferè est rotunditatis, vnciam aut binas vncias magna, supinâ parte puluinata & candicans, infernè autem magis est fusca, & euidentionibus striis donata, quam secundum genus.

Ad quinti generis primam speciem (ad Fungos ferè sine pediculo,) plurimum accedit altera species: etenim angulosa est, sed amplior, ut quam vncias quatuor aut plures æquare existimem, supernè etiam albicans, non, ut illa, fusca: infernè verò non læuis & glabra, instar illius: aut alba, sed crassis striis ab umbilico siue pediculo, in oras ductis, insignita.

Tertia magnam affinitatem habet cum octauo generis [cum Fungis tribus siluarum] altera specie: quia ferè orbiculata est, & æqualis pæne magnitudinis: supernè tamen in albedine magis fusca est: infernè illi non dissimilis, nisi quodd eius striæ crassiores sunt, & pediculus illam sustinens crassior, breuior atque magis nigricans.

Sola magnitudine ab octauo generis tertia specie differt huius quarta species. Illa enim amplior est, hæc minor, utraque autem circinatæ ferè in plano rotunditatis: illa supernè rufescens, hæc multò magis rufescens, eamque aded ob causam Vngaris *Vörös Berendy*: Germ. *Rote Fremling* dicta: gracili ore illa pediculo nixa, hæc crassiore & magis albo, ut etiam inferna huius pars candidior est illâ, & minùs euidentionibus striis exarata.

C. Bauh. pin. Fungus 22. siue Fungi pileolo lato

& rotundo: Fungi esculenti nonum genus Clusii.

Nascuntur quatuor hæ species in cauis vt *Locus* & plurimum siluis, sub extremum Maium, aut Iunii *Tempus*, initium.

FVNGI QVINQVE SILVARVM ASPERI

esculenti. I. ex albo virefcens. II. ex cæruleo virefcens. III. purpureus.

IV. haufcens, infernâ parte

alba. V. ex albo fuscus.

C A P. XII.

SVnt hi Fungorum esculentorum Clusii decimum tertium genus. Fungorum autem esculentorum Clusii decimi-terti generis varias assignat is species, quæ apud Vngaros & Germanos varia obtinent cognomina: generali autem appellatione Vngaris *Galambicza*, Germanis *Teubelinge* dicuntur.

Nascuntur omnes promiscuè in siluis, & Iunio *Locus* & Iulioque mensibus inueniuntur. *Tempus*.

Germanorum porò distinctionem sequens auctor, quinque huius generis species facit.

Prima, omnium amplissima est, ut cuius plana superficies quincunciale diametrum habeat, orbicularis ut plurimum est eius figura, digitalis longitudinis pediculo, vnciam crasso, subaxa: superna parte protuberante, colore ex albo virefcente prædita: infernâ candicante & striata. Ista Germani *frate teubelinge* / h. e. Dominarum cognominant. Alterius paulò minor est amplitudo, ut cuius diameter quaternas vncias non excedat, orbicularis etiam & planæ est figuræ, superne tumescens, sed in medio & quasi



centro non nihil compressæ, ut umbilicū mentiatur, coloris ex cæruleo, viridi & fusco commixti, infernè ex albo subfusci, pediculo fulva pollicaris crassitudinis, sed breuiore quàm prima. Huic Vngari *Keck galambicza*, Germani *blau teubel*

Alteri;

Synon.]

lingæ, quod eiusdem est significationis, cognomen dederunt.

Tertia

Aqualis ferè cum superiore est tertia amplitudinis (interdum tamen vix binas vncias superat eius diameter) sed paululum angulosa, coloris supernè elegantis, vt qui ex purpureo & saturato rubro commixtus videatur, emicantibus aliquando, sed raris albis maculis, quas contrahi arbitrat auctor, flore illo ex contactu dererso: inferna pars candidat, & fuscis striis exarata est. oris in ambitu parum & dilutè purpurascens, extremis nempe supernæ partis oris aliquantulum inflexis. Vngaris *Verets Galambicza*: Germanis *Rott reübelinge*, quod idem est, dicitur.

Quarta

Quarta species minor est tertia, nec eius superficiem [quæ orbicularis est figuræ] diametrum binas vncias excedere putat Clusius. Vncialis longitudinis pediculo sustinetur, graciliore quàm superior: superna pars quodammodò puluinata, in medio nonnihil compressa, & vmbilici formam exprimens, colore flauescens, veluti fuligine infecto: inferna pars alba, fuscis striis à pediculo ad circumferentiam distincta. Germ. *Schwarz reübelinge*, i.e. nigrum, cognominatur.

Quinta

Quintæ species cognomen dederunt Vngari *Varas galambicza* / Germani *Rauch reubelinge* quasi dicas asperum. Aqualis autem est cum quarta magnitudinis, circinatæ in plano quodammodò rotunditatis, supernè etiam intumescens & puluinata, asperiorque reliquis speciebus, coloris supernè ex albo fusci: infernà verò parte, candicante quidem, sed quam fuscæ striæ in oras excurrentes veluti inficiunt.

Sexta

Figuræ, quas proponimus, sunt secundæ speciei. Prior quidem pronam partem: altera verò supinam demonstrat.

C. Bauh. pin. Fungus 8. siue vmbilicum referens variegatus.

FVNGI SILVARVM ESCULENTI TRES, vnus eandicans: albus alter cum flauescens maculis: & tertius ex fusco rubens.

CAPVT XIII



Champignon & Petiren vocant: tamen in vniuer-

HOs sub Fagorum esculentorum octauo genere complectitur idem Clusius. Id autem genus in tres species diuidit: quarum primæ & secundæ discrimen in sola magnitudine consistit, nonnihil & colore: omnes tamen tres, similis formæ. Vngari *Keserev gomba*, h. e. amaram Fungum: Germani *Pfifferling*: Galli

sum omninò panè Fungorum genera iis nominibus donent.

Prima ergo species, binas ferè vncias lata est, planæ, sed orbiculatæ figuræ, supernè tamen quodammodò puluinata, & candicans: infernè veluti camerata & conuexa, striis quibusdam à crasso pediculo in oras ductis distincta.

Alteræ huic prorsus similis, sed amplioris magnitudinis, vt quæ quaternas aut plures vncias æquet, eiusdem cum prima figuræ, sed crassioræ pediculo subnixa supernè alba cute, cui insperatæ aliquot maculæ fuscæ & flauescens: infernè flauescens aliquantulum, & magis conspicuis striis à pediculo in extremas oras productis, exarata.

Tertiam speciem Vngari *Voros Keserev gomba*: Germani eadem de causa *Rote Pfifferling* nominant, quia magis ruber præcedentibus: sed & Vngaris *Bix alya* dicitur, quod sub Fagis interdum crescat. Amplior est hæc secundæ speciei, & magis circinatæ rotunditatis, longioræ gracilioreque subnixa pediculo, & colore supernà & infernà parte ex fusco subrubente, non minus euidens, & conspicuis striis, à pediculo in orbem diffusis, inferius distincta, quàm secunda species.

Omnes autem species, vt plurimum, in cædis siluis nascuntur, circiter Pentecosten, h. e. sub extremum Maium aut Iunii initium.

Priores duæ species, palato gratæ esse feruntur, atque iis plerumque vescuntur eodem modo paratis quo Fungus croceus magnus. Tertiam edunt etiam nonnulli, sed pauci.

C. Bauh. pin. Fungus 10. siue pileolo toto orbiculari candicante: Fungi esculenti 8. genus Clusii. *Confundit* C. Bauhinus hunc Fungum cum Fungorum tertio genere Tragi [qui nobis est Fungus piperatus, lacteo succo turgens,] & Fungo nemorum Lobelii, quem amplum cognominamus.

FVNGVS PANÈ CANDIDVS

prona parte erinaceus.

C A P. XIV.

Raro naturæ miraculo parte prona pro membranis innumeris veluti aculeis muricatis, erinaceum in memoriam reuocat, vnde ex argumento nomen imposuimus: maiusculus est Fungus, etiam palmo maior, albus, minus tamen quàm piperatus, & ferè exsuccus. In siluis prope Montbelgardum mense Septembri à nobis obseruatus. An salubris vel venenatus ignoramus.

FVNGI IN METAM FASTIGIATI, esculenti, coloris albicantis fusco tincti.


C A P. XV.

SVnt hi Fungorum esculentorum quartum genus Clusii, de quo ait, Fungorum esculentorum quarti generis, Vngaris *Sylvva* alya dicti, quia sub Pruni arboribus nascitur, germanicum nomen nullum noui. Eius autem plures sunt species. Nam aut paræ sunt aut mediocres, aut maiores. Prima vncialis duntaxat est magnitudinis aut paulò amplior, crassò subnixa pediculo, infernà parte conuexa, & quasi fornicata, sulcis vel striis quibusdam apparentibus notata: superna autem in mucronem quodammodo vel metam fastigiat, coloris albicantis fusco

dammodò vel metam fastigiata, coloris albicantis fulco tincti.

Media species paulò planior est, quasi in orbem circinata, duarum vnciarum, aut maioris amplitudinis, inferna parte similiter fornicatà, & striis quibusdam veluti exarata: color idem qui in superiore.

Tertia, quæ maior, formam quidem primæ



similem habet: etenim superna parte in microscopio fastigiata est, inferna eava & fornicata: sed eius magnitudo plerumque est trium vnciarum, crassioreque pediculo nititur: color huius magis fuscus est, & nris quibusdam interdum distinctus: deinde superna pars, ut plurimum lacera & scissi apparet.

C. Bauh. pin. Fungus 3, siue in metam fastigiata, albus fulco tinctus.

FVNGI TVBEROSI ESCVLENTI, albi fulco permixti, vel maculis distincti.

CAP. XVI.

ETiam hi sunt Ex Clusii Fungorum esculentorum generibus, & septimum constituunt: Fungorum autem esculentorum septimi generis forma duplex illi visa est. Quod vel planos conspiciebat superna parte nonnihil tumentes, interdum etiam in ambitu laceros, coloris aut albi fulco permixti, vel maculis



quibusdam distincti: inferna nonnihil conuexa, & veluti striis siue fulcis, à pediculo crassiore in oras vique ductis, exarata, fulci coloris. Aut orbiculari panè figurà, supernè, immò totà superficie, candicantes, ut ouum exalptum exprimere videretur, præsertim adempto pediculo.

Hoc genus Vngari Choporke gomba, i. e. tuberosum Fungum appellant: Germani Angerling / quoniam in siccioribus pratis, siue pascuis iuxta pagos sitis (quæ ipsi Angerlin nominant)

Tom. III.

proueniat. Ter autem in anno reperitur.

C. Bauh. pin. Fungus 9. siue orbicularis sulcatus, albus fulco permixto.

FVNGI PVNICEL, LACTE DVLCI manantes, pratensibus similes, edules.

CAP. XVII.

Sexti ordinis Fungi in nonnullis altissimis siluis, ut est Odenwaldt appellata, nascuntur, puniceo præditi colore, pratensium Fungorum, quos Boletos vocant, magnitudinem haudquam excedentes, lacteum & dulcem manantes succum. Hi à quibusdam crudi denorantur, sed qui utilitate ignoro, inquit Tragus. Germani Brötling nuncupant.

Lonic. Fungorum quintum genus: Matth. synonyma germ. Fungor. genus octauum. C. Bauh. pin. Fungus 17. siue pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem succum fundens: Fungus sextus Tragi.

FVNGI SILVESTRES ESCVLENTI

duo. I subalbus II. purpureus, maculati. CAP. XVIII.

FVngorum esculentorum Clus. 15. genus faciunt hi: Prior, inquit, orbicularis ferè est figuræ, circiter quatuor vncias ferè latus, breui crassioreque pediculo fultus: supernè nonnihil extuberans & puluinatus, coloris sub. ibidi, sed veluti fuligine infecti: per quem spatæ sunt àiquor albæ maculæ: inferna pars subalbi etiam est coloris fuligine infecti, multis crassioribus striis nigricantibus, à pediculo in circuitum excurrentibus, notata.

Alter priorem amplitudine superat, & eius oræ interiore partem versus magis reflexæ, orbiculatæ quodammodò figuræ, cuius superior pars puluinata, coloræque tincta purpureo, cui ruber saturior commixtus, in medietate tamen flauescens, & secundum oras albis maculis distincta, inferior pars ex albo fulca est, & tenuioribus striis exarata, pediculo, quàm in Alterà, longiore.

Huic decimo-quinto generi Fungorum esculentorum Clusii nomen dederunt Vngari Dizno gomba, h. e. suilli Fungi: Germani eiusdem significationis vocabulo Schweintlin / expresserunt, & postremam speciem à rubro colore Bort Schweintlin.

Cæterum, duas has species manifesto discrimine inter se differentes, Porta Suillos antiquum nomen apud Neapolitanos adhuc retinere ait, atque illis Silli dici.

An potèd hoc Fungorum genus, tertium illud Plinii quod venenis accommodatissimum esse asserit, sit, inquit Clusius.

C. Bauh. pin. Fungus 25. siue orbicularis oris C. Bauh. intrò reflexis: Suillos vulgò porcinos dictos, Boletis crassiores, supernè subfuluos, infernè cinereos, internè candidos, vocat Cæsalpinus.

Fungorum esculentorum decimum-quintum genus Clusii nascitur in siluis, & Iunio, Iulioque mensibus reperitur.

Tamen si autem non valdè probetur hoc Fungigenus: non detur tamen qui illo vescantur, aded intemperantis gulæ reperitur quidam.

Eeeee

FVNGI ABIEITINI, ESCVLENTI, 1. RV-
bens. 2. mixti coloris, infernè
candicans, 3. mixti quoque,
rubescens.

CAP. XIX.

FVngi præfentes à Clusio ad viceſimum genus
Fungorum eſculentorum reuocantur, hæque
deſcribuntur.

Prima viceſimi generis eſculentorum Fungo-
rum ſpecies orbiculatæ (planæ tamen) eſt figuræ,
binas aut ternas vncias lata, ſupernè, coloris vel
dilutè admodum rubentis, aut lateritii, venis qui-
buſdam ſic exarata, vt hirta videatur, non ſecus
ac Fungus villoſus puniceus, cui valde ſimilis eſt,
in medio nonnihil compreſſa, & veluti umbili-
cata: infernè pallescens, & multis ſtriis fulcis à
pediculo, qui vnciæ paulò longior eſt, minimum
digitum craſſis, in orbem ductis inſignita.

Alterâ priorem magnitudine non valdè ſupe-
rat, paulò tamen craſſiore pediculo conſtat, ma-
gna etiam ex parte orbiculata eſt, ſed non com-
preſſa ſupernè, immò potiùs extuberans, coloris

ex albo, pallido,
& fulco permix-
ti: infernè can-
dicans, & ſtriis
fuliginofi colo-
ris, à pediculo
in oras produ-
ctis, exarata.

Tertia, lon-
gè amplior eſt
binis ſuperiori-
bus, orbiculatæ
tamen perinde
atque illæ, figu-
ræ, cuius dia-
meter penè
quincuncialis
eſt, pediculo
ſubnixa non
maiore quàm
præcedentes
duæ: ſupernâ
parte etiam ex-

tuberans, mixtique ex albo, pallido, rufo, fuligi-
noſoque, coloris: inferna pars plana eſt, rubef-
centis coloris, craſſis ſtriis ex arto purpuraſcenti-
bus à pediculo in ambitum excurrentibus no-
tata.

Viceſimum hoc genus eſculenti Fungi ad vul-
gatiorem Fungorum formam redit, & ſub extre-
mum Autumnum in ſiluis, plerumque autem
ſub Abietibus naſcitur: cuius rei cauſa Vngari
ſenyo alya gomba/ Germani thauueling appel-
lant, licet illis Greſſeling etiam dicatur: nam
Vngariſ ſenyo-fa Abies eſt, atque Germaniſ
thannebaum idem ſignificat.

C. Bauh. pin. Fungus 15. ſiue pileolo magno,
plano, orbiculato, venis exaſperato.

Tempus.

Fungi hirtuſi interna parte pernicioſi.

Locus.

Sub extremum Septembrem prouenit Fungo-
rum pernicioſorum viceſimum primum ge-
nus, inquit Cluſius, ſubter Abietibus, quemad-
modum & viceſimum genus eſculentorum, cui
perſimile eſt: ſed quoniam interiore parte hirtu-
ſum eſt, reicitur. Germani Falfche Greſſeling/
quaſi ſpurium, nominant: Vngari ſenyo alya

gomba h. e. ſub Abietibus naſcentem Fungum: ſed
additis hiſ duabus vocibus, nem 10, vt ſolent omni-
bus Fungis non velcis.

Recenti natus hic Fungus vnciæ non multò
maior eſt, oris valdè in ſupinam partem inflexis,
craſſiufculo corpore, & veluti craſſis quibuſdam
venis ſubrubentibus in orbem ſupernè ductis
notato in albicante planicie: Adultus autem, vi-
ceſimi eſculenti amplitudinem adquirit, ſupernè
eiufdem cum primùm naſcente coloris, & pari
ratione ſubrubentibus venis in orbem ductis in-
ſignito, oris tamen magis inæqualibus: inferna
pars dilutè rubet, & multis ruſis ſtriis exarata eſt:
pediculus digitalis ferè craſſitudinis, binaſque
vncias longus, qui contraſtus, rubrâ ſubſtantiâ
conſtare duplehendiur.

C. Bauh. pin. Fungus noxiuſ 34. ſiue abietinuſ
oris reflexis ſubſtantiâ rubra.

C. Bauh.

FVNGI SILVESTRES ESCVLENTI CER-
uini, 1. villoſus puniceus: 2. glaber, ex
rufo fulcuſ.

CAP. XX.

Decimum hi apud Cluſium Fungorum eſcu-
lentorum conſtituunt genus. Primuſ pe-
diculo binas vncias longo, minimum digitu-
m craſſo, nititur: ipſiuſ verò Fungi orbicularis in
plano eſt formâ [cuius diameter duarum vncia-
rum aut amphioris magnitudinis eſt] ſupernè
nonnihil extumefcens, & veluti ſericis villis
obſituſ, colore puniceo dilutiore, & veluti car-
neo, oris in infernam partem valdè reflexis, quæ
ex albo ruſceſcit, & multis ſtriis, inſtar aliorum

Fungorum di-
ſtincta eſt.
Hunc Germani
Ranſche hieſe
chling/ h. e. hirtu-
ſum ſiue vil-
loſum ceruinuſ
Fungum: que-
madmodum al-
terum Schwar-
ze hieſchling/
quod ſignificat
nigrum ceruinuſ
Fungum, ap-
pellant.

Alter longio-
re conſtat pe-
diculo, eiufdem
tamen cum ſu-
periore craſſitu-
dinis & magni-
tudinis: ſed in-

Alter a ſpe-
cies.



ſima huiuſ pars craſſior eſt, & veluti limbo cir-
cumſoluta: ac præterea in hoc hini plerumque
Fungi coniunctim ex eodem pede oriuntur: or-
bicularis etiam ſunt in plano figuræ [præter-
quam quâ parte ſeſe mutuo comprimunt:] eiuf-
dè cū ſuperiore eſt magnitudinis, aut paulò am-
plior, paululùm extumefcens ſup-
riori parte, & glaber, coloris ex rufo fulci, oris non aded in in-
fernam partem inflexis, quæ non minùs frequen-
tibus ſtriis eſt prædita, quàm prior, colore ex
pallido nigreſcente.

C. Bauhino in pin. Funguſ 14. ſiue pileolo in
plano orbiculari villoſo: Fungi eſculenti 10. ge-
nuſ Cluſii. Prima ſpecies iconè exhibitur.

Naſcuntur in cædiſ ſiluiſ ſub extremum Ma-
iũ aut Iunii initium.

Synonym


Locus
Tempus.

FVNGI

FVNGI LACERI SILVESTRES ESCV-
lenti, subfusci coloris, infernè
candicantes.

CAP. XXII.

Descrip:



Initidè quidem inæquali est figura hic Fungus, magis tamen ad orbicularem tendente per oras lacer, duarum vnciarum latitudine, supernè fusci coloris: infernè candicantis, & striis distincti. Adultior autem, magis orbiculata est figura, & per oras laceræ, quàm recens natus, tum longè amplior, ut cuius diameter sit quatuor vnciarum: eius i-

tem color magis fuscus supernè, & albicans infernè, cui fulcèdo quædam admixta.

C. Bauh. pin. Fungus 16, siue pileolo plano subfusco oris laceris: Fungi esculenti n. genus Clusii, qui circa Festum Pentecostes in cædis sylvis nasci scribit.

FVNGI FERE SINE PEDICVLO,
coloris ex rufo fusci, esculenti,
in arborum caudicibus nasci soliti.

CAP. XXIII.

Hos sub Fungorum esculentorum quinto genere comprehendit Cluius: eiusque plures tradit differentias, sed omnes vno nomine appellatas: ab Vngaris quidem Peztricz, à Germanis verò Pesternitz. Sola porò earum differentia in magnitudine consistit, quandoquidem formâ, materiâ, & colore penè conueniunt.

An autem genus est illud

quod Plinius à Græcis Pezicas dici, & sine radice sinèque pediculo nasci asserit:

C. Bauh. pin. Fungus 5, siue angulosus pediculo exiguo: fungi esculenti 5, genus Clusii.

In Vlmorū Populiq; albæ caudicibus deiectis nasci solet, & bis plerumque, etiam ter interdum, in anno provenire.

Tom. III.

Cæterum, Peztricz repurgati eodem modo condiri possunt, quo *Beysferling*: sed & elixi conciduntur, atque in lance compositis frustis, laridum accensum instillatur.

FVNGI LVTEI MAGNI, DICTI

Laseran, speciosi.

CAP. XXIII.



Lactifluos Fungos no-

Descrip:

bis dictos magnitudine æquat, speciosus hic Fungus, & longè aliquando etiam superat, ita ut ad pilei magnitudinè interdum excresecat. Nidus est, levis, cuius membranæ subtus citrinæ, pilei verò facies superna cæceo saturatius tincta est. Pediculus nullus,

citrinus quoque in imo aliquando ceu in fibrâ reflexus fastidit. Quam prodiit primùm & antequam expansus est, magnitudine oui ac etiam minor totus, albâ fungolæque materia ceu involucreto quodam siue voluæ tectis conspicitur. Voluæ verò hæc membranaue obtegere detractâ, subest pilei principium veluti vitellum oui occultatum, quod crescendo paulatim à voluæ detegitur.

Clusio est Fungi esculenti 17 genus, de quo ait: Provenit in silvis rara Quercu consitis, iisque caudis præsertim, & siccioribus edicioribusque locis, bis singulis annis, circa mensem videlicet, & ante vindemiam. Vngari propter excellentiam *Urgomba*, veluti si diceret Dominorum Fungum: Germani ob eandem causam *Beysferling* appellant, quasi cætareum, quod inter Fungos principatum teneat. Et sanè adeo elegans est, ut non mirandum sit, si eos, qui libenter Fungis vescuntur, præceteris generibus Fungorum, ad se edendam inuiter. Illius vnicam duntaxat speciem videre & observare memini: licet ex ætate distimen quodpiam esse videatur.

Locus.

Non dubium autem est, quin hic Fungus sit ille veterib⁹ adeo celebratus Boletus, ac à principibus viris sic in deliciis habitus: nam si conferantur quæ de Boletis scripsit Plinius cum huius historia, similis esse deprehendetur. Infamis autem, & immenso exemplo in crime adductus fuit, quod olim Claudium Cæsarē coniunx Agrippina Boletoveneno illito, sustulerit, ut Neronem filium ipsi successorem imperio daret. Hinc illi Iuvenalis in Satyris sales primo capite huius libri de Boletis adducti perstant. Sed & ipse Nero, Boletum Deorum esse cibum cauillari solebat, quia illo perisisset Claudius Cæsar, & defuncti Cæsares in Deorum numerum referri solerent.

C. Bauh. pin. Fungus 13, siue planus orbiculatus aurcus: Voluæ Plinæ, Eluclæ Iecroni, Boleti Anteece 2.



Locus.

synonyma

guil. & Calsalpini. An Matth. germ. Fungi tertium genus, herren pelz: An Portæ Villæ, Autumnales Fungi, primis imbribus nascentes, pratenses, Boleti Horatii?

Parandi ratio,

Mensas lauiorens ornant ac valde expectantur, variis modis præparati. Vel enim integri, detracto tenui cortice externo, prunis imponuntur: vel membranulæ replentur, butyro addito, sale & Pipere: vel abluti vino in sartagine eodem modo coquantur. Alii in frusta dulces cum prædictis coquant, quæ ratio coquendi melius placet. Sed & exsiccati seruantur, deinde eorum instar coquantur elixanturque, postea additis ZZ. Pipere, vel Caryophyllis eduntur.

FVNGI LVTEI PERNICIOSI SVB PINV habitantes.

C. A. P. XXIV.

Invenitur in
noxia.

Fungorum quibus Pinu nascuntur perniciosorum meminit Matthiolus in hist. german. atque Tragus, qui lib. 3. cap. 1. eos decimo loco ponit, statuens in eos esse & luteos, eosque iumenta magnopere expetere, licet gustatis illis in morbos incidant. Narrauit mihi nobilis Baro à Thon uxorem suam ex esu Fungorum luteorum penè perisse vomitu & evacuatione per alvum, anteaque sue familiæ grauitè duxit in periculo suæ vitæ aliquantulum permansisse.

FVNGI STULTORVM BOLETO SIMILES perniciosi.

C. A. P. XXV.

Locus & Tempus.

Fungus fatuorum

Synon.

Circa Mosam & Vindensiam vndecimum noxiorum Fungorum genus in silvis reperitur, quod è terra primum erumpens, valde Boletum imitatur, imò quodammodo mentitur. Vngaricum nomen nullum intellexi, inquit autor Clusius, sed Germanicum est *Warrenschwamm*, ac si diceret fatuum, vel fatuorum Fungum, quoniam fortè, si quis vescatur, mente turbetur, quod facile contingere potest, ad eius esum invitante, præsertim primum nascentis, tanta cum Boletum similitudine. Corpore dum è sua volua erumpit, est Boletum dissimili longiore, scissuralis latitudinis, in metam assurgens, superna parte candida, infernâ cameratâ & multis striis à pediculo in ambitum productis, notatâ.

C. Bauh. pin. Fungus orbicularis ex atro rufescens, siue Fungus 17.

FVNGVS PALLIDVS

C. A. P. XXVI.

Locus & Tempus.

Fungus capreoli.
Synon.

Autumni munus, Campesri similis Fungus, a pari ferè magnitudine, sed variante coloris tam internè quàm externè luteo pallidi.

Existimo Clusio esse Fungorum esculentorum genus duodecimum, quod prouenit in siluis & reperitur circa Pentecosten. Germanis *Reheling*, quasi capreoli Fungus, dictus.

Matth. germ. Fungi 4. genus *Reisten*: Cordo in Diole. Fungus edulis optimus *Reistefn*. C. Bauh. pin. Fungus 11. siue pilcolo lato orbiculari flauescens: Fungi 4. genus Trago: Capreolini Tabern. Fungi esculenti 12. genus Clusii.

FVNGVS LVTEVS SIVE PALLIDVS

Chanterelle dictus, se contorquens, esculentus. C. A. P. XXVII.

Descript.

Montbelgardenf. dictus *Chanterelle* Fungus, raro dimerientem habet palmarem

sæpius eam latitudinem non assequitur, planò pilco, aliàs cauo, pallidus, oris si binde contortis, vt crispi nonnihil habere videri possit, membra-



nâ infra nec densis cortex: huius pediculus raro in vultu, sed in medio deorsum: & ob id in mensis luteo, & luteo? An Clusio Fungorum

An Trago Fungus quartus generis & vulgaris quidem, colore splendido & luteo? An Clusio Fungorum

esculentorum genus 14. cuius duas facit species, & quod Hungaris *Vitil Gomba*, hoc est, Fungum leporinum. Germanis verò *hasen ohrlein*/leporinum auriculam appellari tradit.

Corn. in Diole. *Reheling* Germanorum, Fungorum Plinii genus primum n. Tab. Capreolini. Synon. Lon. fungorum 4. genus. Matth. Fungorum 7. genus. Hic imitatus *Lonicum* micet hunc laum fungum cum *Digitellis*.

Lobel hist. belg. tom. 2. p. 307. & Ic. Plantar. p. 273. Fungi nemorum, sinuosis oris si perne palentes, & maculis rubris infestis, ferè fabi. & striati. Huius icon optimè conuenit cum nostro fungo *Chanterelle*, verum maculas rubras in nostro non animaduertimus.

C. Bauh. pin. Fungus 20. siue angulosus & velut in lacinas scissus: Fungi genus magnum à figura auriculæ leporinæ Gelu. hort. Arborum Fungi auriculæ Iudæ facie Lobel belg. Fungi gallinacei Calsalp. An Fungus leporinus, quem 7. facit Tragus, qui formam intercanorum vitali repræsentat, qui incanus & plumbei coloris? Credimus nos fungum hunc leporinum Tragi melius ad fungum intybaceum posse referri.

Fungorum *Chanterelle* apud Montbelgardenfes creber vltus. Fungi sinuosi nemorum Lobelii Vires. à nonnullis primum repurgati elixantur aut fringuntur, denique eduntur: ac perinde probantur vt alii eiusdem generis prope arbores, aut sub illis, nascentes, quia purioris sunt naturæ, & absunt à ferreis clauis aut putrilaginosis locis: nisi fortè sub perniciosi arboribus & circa serpentum latibula crescant.

Oritur in siluis & nemorosis locis sub fagis vt plurimum, mense Iunio, ac etiam Septembri.

FVNGI LVTEOLI DICTI,

colorem mutantes, maligni.

C. A. P. XXVIII.

Fungus *Cambicolori* Ital. s. dictus, de numero fungorum penitus malignorum est, autore ferrante, cuius capitelli figura vulgati similis, substantia eiusmodi quæ mox vigorem perdat & in mucum abeat. Infernæ parti hamenta quædam in retis formâ obliquè intricata, facile à suo capitello separantur. Color aliquantulum flauescens,

An Fungus Trago.

Vires

Locus & Tempus.

cens, mox tamen in virentem, & inde in azureum abit.

FVNGVS POROSVS, MAGNVS,
crassus.

CAP. XXIX.

Descrip.

INGRit pedi crasso longo, pileus palmari latitudine, omnium quos vidi densissimus, turbatus, aut ex fusco albicans, infernè candidus, nullo subtus membranarum plexu textilis, sed infinitis por stenuissimis peruius, substantiâ interiorè albâ.

Hic Fungus videtur nobis tradi per Clusium pro tertia specie generis decimi-sexti Fungorum esculentorum, de quo hæc scribit. Prædi-

ctæ autem Tertiæ speciei duplex est differentia. Nā aia est iunioris & recens nata facies, alia adultioris. Iunioris porro figura prioris orbicularis est, diametrum duarum circiter vnciarum habens, valdè in rotundum elata superne, & fulci admodum coloris, fuliginosique: infernè cava & fornicata,

coloris albi & nullis striis deformati: pediculus illam sustinens binas vncias longus est, aut paulò longior, supremâ parte pollicaris crassitudinis, infimâ duorum digitorum. Adultior autem longè amplior est: nam quaternas aut quinas vncias latus est, ternas ferè altus, & in rotundum quasi fastigiatus, coloris superne ex fusco rufescentis: infernè planus, æqualis, albus, nec ullis striis exaratus: pediculo fuscitur ternas vncias longo, supernâ parte vnciam crasso, infernâ binas, coloris ex albicante fulci. Istam speciem Germani grauer Bülz cognominant.

Habet verò hoc Fungi genus aliquot notas ob quas Pauli *apuanus* esse liceat conicere: etenim colore fuliginoso sunt eius species, orbe etiam quarundam tam amplo, vt sæpè humanum caput æquent, pediculo omnium crasso, infra colore nigro virentes. An Fungi porcini Matthioli? An Portæ villæ, Fungi autumnales, Græcis *apuanus* vocati, Latinis Suilli, Neapolitanis Silli & Ammoniti, Apicio Farnei Fungi à Farno Roboris genere? An Corn. in Paulum, Boleri, nomine latino apud Germanos seruato, contracto tamen, & ex trisyllabo ferè monosyllabo factò: *Bölz* enim aut *Bölze* appellantur? An Eid. in Diosc. Boleri Plinii, Germanis corrupta voce *Bölz* dicti? An rursus in Gal. de comp. med. sec. loc. Fungorum terrestrium genus, spongiis marinis simile; Fungi suilli? An Lob. Ic. Plant. tom. 2. p. 273. nemorum Funguli? maior ibi depictus. C. Bauh. pin. Fungus 22. siue Augusti mensis: An Fungi 8. genus Tragi? 6. & 7. genus Leoniceri?

Menfe Septembri inueni fungum porosum Geneuæ locis siluosis & paludosis. Binos interdum Bisantii (vbi abundant) reperi. Ibi ab Italis elixabantur, sale condiebantur, & in Hiemem reponabantur, quos cum edere cupiebant, oleo iucoquebant. Limaces hos appetere, à fide dignis intellexi.

Locus &
Tempus

Cæterum, decimus-sextus vefcus Fungus Clusii apud Vngaros in hunc modum apparati solet. Repurgatus conciditur, frusta, paululum in cibano exiccantur, deinde in aqua elixantur: his deinde exemptis, panis vulgaris, quo videlicet familia vii solet, taleæ supra craticulam tostæ, in prædicto iussulo coquantur, id demum iussulum cubro farinario siccant: postremò, huic condimento [quod nec tenuè nimium, nec crassum nimis esse debet] elixa fungi frusta imponuntur, additoque aceto, Piperis, Gingiberis, atque Caryophyllorum aromaticorum poline eduntur. Tenuis autem fortunæ homines & rustici, illo cum Panici semine pulvis instar decocto, & Pipere denique inperfo, vescuntur.

Qui vulgò *Pruni* Matthiolo dicuntur fungi, prius elixi, ac demum farinâ circumliti, & oleo vel butyro frixi, magis tam cum palato inueni gratiam. Verum hi non adeò tuti sunt, quod in suo genere perniciosi plures, quàm in aliis reperiantur. Cæterum periculosi ac malefici à peritis & oculatis viris facillè dignoscuntur, cum à terra & cortice purgantur, inciduntque decoquendi. Nam culcello dissecati illicet [vt Plinius inquit] dilutus eius aduenit rubor, rancidus subinde aspectus, liuidus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrum: postremò accedit nigredo, & ita protinus computrescunt. Quamobrem rectè scribit A. nec non lib. 4. fen. 6. eos nocentiores esse, qui nigri, vel virides, vel in nigro putrescentes videntur. Proinde amens quidem, & planè stupidus & stipes fuerit is qui tam repentinas mutationes videt, & non cognouerit his notis eorum virus patefieri. Sed accidit plerumque vt illos potissimum Fungi interimant, aut saltem in magnum discrimen adducant, qui eos super fetrea craticula, aut prunis, calentibusque cineribus affatos deuorant. Hoc enim modo decocti, cum in taleolas non secantur, non tam facillè cognosci possunt, vt ii qui dissecati parantur. Adhuc non semper officiosus, quod per se lethiferi sint, sed quod copiosius, quàm par sit, ingerantur. Quandoquidem cum lenti admodum, crassissimi que succi exsiliant, arteriarum oscula vsque adeò obstruant, vt conclusi intus spiritibus suffocent. Quod cum probe norint agrestes in Hetruria mulieres, rarissimè Fungos mandunt, nisi Allio & pipere adiectis. Asseruantur Fungi muriâ, præsertim qui vulgò porcini dicuntur: namque hoc modo parati innocentes redduntur, amisso lentore.

Noxi &
dissecantur.

FVNGI IN METÆ FORMAM
surrecti, perniciosi.

CAP. XXX.

Vigesimum fungorum noxiorum genus constituant hi apud Clusium [quod Vngaris Varganya dictum, Germanis verò *Bülz*, perinac decimum-sextum vefcorum Fungorum genus:] Huius varietates etiam sunt species Clusio, quæ circa Calendas Septembris in cædis siluis nascentes reperiuntur.

Ecccc 3


Forè Ammonita Pauli.



FVNGI SEPTEM PERNICIOSI, FORMA
ad fungum porosum multum accedentes.

CAP. XXXI.

Vndeicimum perniciosorum Fungorum
genus hoc cluſio eſt, quod Germ. *Binfing*



appellant, ſe-
cundum vias &
in quercetis
nascens circa
Calendas Sep-
tembris. Huius
autem multae
ſunt ſpecies,
omneſque per-
niciolae, praesē-
temque inter-
dum mortem
iis inferentes
qui veſcuntur,
quia ſimilitu-
dine, quā cum
16. genere veſ-
corum (Fungo
poroſo) habēt,
illecti, illos ab
innoxiis diſ-
cernere non
ſciuerunt.

Species

Prima quam prior imago exprimit, valdē gra-
cili ſubnixā eſt pediculo binas vncias aut am-
plius longo, ſuſtinente ipſum Fungi corpus or-
biculatae figuræ, ſeſcunciam latum, aliquantū-
lū in ſupinam partem inflexum, coloris ex fla-
uo, rufo, fuliginolo, commixti ſupernē, ex pallido
fulci infernē, & multis ſtriis exarato.

Alterā amplior eſt, nec adēd gracilem habet
pediculum: orbiculatā etiam eſt figuræ, paulu-
lū ſupernē tumefcens, & coloris vel ruſi, raris
quibuſdam maculis conſperſi, vel fulci omnino
& fuliginofi: infernē autem pallidi, frequentibus
fulcis maculis notati, vel ex fulco pallidi omni-
no, nec vllis ſtriis diſtincti.

Tertia ſpecies, Fungi in metam fatigati ter-
tiam ſpeciem plurimum imitatur: craſſo etenim
prædita eſt pediculo, vnciam longo, corpore in
metam aſurgente, vncialis magnitudinis recens
nata, & ex cineraceo fulci coloris: adulta autem
binarum vnciarum, colorique magis exalbidi, &
notis quibuſdam diſtincta, lacera & hians.

Quarta ſpecies, duplex eſſe videtur: nam vel
infra duarum vnciarum magnitudinem conſi-
ſtit, craſſo corpore, gracilioreque pediculo præ-
dita, ſupernē ex atro ruſcentis coloris, infernē
flauī, frequentiffimis paruis maculis inſperſis:
Vel trientalem magnitudinem adquirit, craſſo &
protuberante corpore, fulco ſupernē, & ſciſſuris
quibuſdam albis lacero: infernē ex flauo palles-
cente, ſtriatumque experte.

Quinta ſpecies, latis informis eſt, tuberis [dum
iunior] figurā, ſupernē valde fulca, infernē ru-
bra, ſatura & nigricans, circa oras flaua & ochreæ
colore, binas vncias lata: in adulta magnitudo
amplior, quatuor videlicet vnciarum, orbicu-
latæ panē figuræ, per interualla protuberantis
ſupernē, & fulci coloris, in quo dilutior rubef-
cens color quibuſdam locis elucet: infernē au-
tem ex rubro attri atque obſcuri, ſtriis carente
pediculo valdē craſſo, inæquali & fulco, ipſum
autem Fungi corpus contraſtum cærulei, vireſ-
cente intercepti, eſt coloris.

Sexta ſpecies, magnum Cyclamini tuber val-
dē refert, tum amplitudine; tum colore, & inæ-
quali rotunditate: infernā autem parte ochreæ
colore eſt, venis quibuſdam rubefcentibus, aut
ſubfulcis diſtincto, nullis tamen ſtriis. Hanc
ſpeciem Vngari *Baba Varganya* appellant.

Omnium autem ampliſſima eſt ſeptima ſpe-
cies, vt quæ ſelquipalmaris ſit, inæquali tamen
ambitu, ſupernē magna ex parte purpuraſcentis
coloris, cui permixti ſunt ruſus & fuliginofi:
ipſum internē corpus ſubcærulei coloris, vt
etiam pars ſupina cui pediculus inhæſit: reliqua
pars inferior flaua eſt, binis aut ternis magnis
maculis ruſis infecta. Iunior verò & primū e-
mergens, longē minor eſt, duarum videlicet vn-
ciarum duntaxat, ſupernē & infernē eiſdem
cum Adultiore coloris. Addit oſtend & deſcri-
bit Cluſius Fungum quemdam dubium quem ad
Fungi in metam ſurrecti ſpecies reſerri
poſſe cenſet.

C. Bauh. pin. Fungus noxiuſ 29. ſive orbicula-
ris ſecundum vias & in Quercetis Autumno naſ-
cens: Fungorum noxiuſ 19. genus, Cluſii.
Huius C. Bauh. quinque facit ſpecies, ſc. primam,
ſecundam, tertiam, quartam, & quintam dubiam
Cluſii. Eiſdem quintam ſpeciem conſtituit
Fungum noxiuſ 30. tuberis figurā. Sexta Cluſii
ſpecies eſt ipſi Fungus noxiuſ 31. Cyclamini ra-
dicem colore & formā referens. Septima verò
Cluſii ſpecies, eſt ei Fungus noxiuſ 32. omniū
ampliſſimus purpureuſ.

Synon:
C. Bauh.FVNGI PLVRES SIMVL ALBI, AD AR-
borum radices, eſculenti.

CAP. XXXII.



Thi Fungo-
rum eſculē-
torum Cluſii
genus faciūt,
ſex-
tum ſc. Exigua
autem eſt in
ſexto eſculen-
torum Fungo-
rum genere
Cluſii diuerſi-
tas: aut ſi quæ
eſt in magni-
tudine diſſerētia,
eam ex arate
duntaxat pro-
uenire arbitra-
tur author. Hoc
autē peculiare
habet iſtud ge-
nus, quod non
ſingulare, ſed
conſertim plu-
res ſimul ple-
rumque creſcunt: nam vel bini terniue ſimul
coniunctim naſcuntur, vel etiam quini, ſeniue,
aut plures.

Sunt autem omnes ſerē orbicularis formæ, pla-
næ tamen, infernā parte albi, & ſtriatī, ſupernē a-
liquantulum protuberantes, mediā autem non-
nihil depreſſi, vt umbilicū exprimere quodam-
modō videantur, colore magis fulco quā infernā.
Minores circiter vnciam lati ſunt, aut paulo
ampliores: Medi, binarum vnciarum latitudinem
adquirunt, vel explent: Maximos, quaternarum
amplitudinem ſuperare exiſſimat.

Omnes verò hæ Hungarico nomine dicuntur
Nomen
Lecus &
Temper.

Szil fa termeyvt alya, h.e. ad Vlnos nascentes Fungi: tamen si indifferenter, ad Vlmi, Quercus, Cerni, Fagi, Ostria (quàm Galli *Hestre*, Germ. *bägenbüchen* appellat) Betuli, Populi albæ & Luglandis radices, aut earum deiectarū radices siue caudices à nouo Vere in Autumnum vsque, crescant: Germani *Buchenschwammich*/i.e. faginos Fungos nominant. Vngari autem eum, qui ad Ostria radices nascitur, coloreque magis fulco tinctus esse videtur, & peculiariter *Gilyvæ gyerthyan* fa termeyvt appellant. Magna etiam copia nascuntur in truncis resectis supra dictarum arborum, præsertim verò Vlmi & Luglandis, si leuiter terrâ, vel etiam solo stramine sepulti & tecti putrescant. Quod valde consonum est cum his quæ Matthiolus de populo scribit: cuius verba in studioforum gratiam, hic adscribere libuit, nè quis vana esse existimet: quæ Vngari de Fungi modò descripti natalibus aiunt. Atqui [inquit Matthiol.] sciant velim rei medicæ studiosi, Populum albam, humo tenus sectam ad radicem vsque, & aquâ calidâ, in qua fermentum fuerit dissolutum, perfusam, infra quadriuum Fungos copiosos edere, cui quoque gratissimos.

C. Bauh. pin. Fungus 7. siue Fungi vmbilicum eximentes plures simul albi: Fungus in Populo alba Marth. Populne *alye* rui Dod. Fungi efculenti, 6. genus Clusii: Fungi sub Populo nascentes, *Turini* vocati, subrubentes, & pediculo candido, qui in cibis minime probantur, Cæsalp. Fungi glauci dicti Portæ: bini aut tres vno pediculo prodeuntes, veluti Galli cristæ, odore, comâ veluti villosa.

FVNGI MVLTII EX VNO PEDE, perniciosi.

CAP. XXXIII.

Continentur hi sub 2. Fungorum noxiorum genere Clusii: quod Vngarici dicitur *Touis alya gomba*, Germanis *Vnder dorn schwamm* (quod nomen Vngarici interpretationem exprimit) quia ad spinarum, quæ vultate corrumpi incipiunt, atque inter dumeta nascuntur. Multæ autem eius sunt species, quarum prouentus circiter Calendas Octobris.

Primæ speciei, seni aut septeni nascuntur ex vno pede Fungi, longis & gracilibus pediculis fulti, orbiculato ferè corpore, fornicato tamen, seu camerato infernè) vel semunciali, vel vnciali, colore flauo, quemadmodum ipsi etiam pediculi, qui maculis tamen nigris distincti.

Conferunt etiam nascuntur in altera specie, octo aut nouem Fungi ex vno exortu breuiore, & perinde gracili subnixi pediculo, in orbem veluti expanso corpore, quod vnciam & secundiam latum est, superne pressum, & tanquam vmbilicatum, coloris flauo ruffo suffusi: infernâ autem parte flauâ, & multis fuliginosis stris distinctâ.

Rufi coloris sunt, qui conferunt etiam in tertia specie nascuntur Fungi viceni & plures ex eodem pede, gracilibus pediculis fulti: ipsius corporis Fungi forma orbiculata est, latitudo inæqualis, pro ætatis forsitan vetustate: nam & inueniuntur vngue non maiores, & vnciales, & sesquiunciales, omnes ruffo colore tincti superne, infernè fuscis stris exarati.

Quarta species plurimos habet ex eodem ortu prouenientes Fungos, tricenos videlicet aut plu-

res, & pediculis, pro singulorum ætate, breui aut longo suffulto, orbiculatæ omnes figuræ, magnitudine tertiæ speciei Fungis pares: colore tamen inter se variant in hac specie: nam vel flaui sunt, multo tamen rufi colore perfusi, aut omnino rufi, sed nonnihil tumescentes & fuscis infusis autem nigricantibus stris notati. Germani *Stroßschwamm* appellant, quia in ipsis truncis humi iacentibus nascuntur.

Maiorem orbem habent quintæ speciei Fungi,



quippe cuius diameter sit duarum vnciarum, & quindecim aut plures ex eodè ortu nascuntur simul, dodrantalibus, gracilibus, candidis tribus, uel pediculis fulti, colore supernâ parte vel ruffo vel ex ruffo dilute albicante, infernâ parte quæ aliquantulum camerata est, subalbida, & crassis fuscis stris distinctâ. Fig. ita hic appolita quintæ est speciei.

Turbinato & quasi in metam assurgente sextæ speciei Fungi corpore, seni pluresque ab eodem exortu nascetes, & omnis gracilibus, pediculis mediâ parte crassiusculis, inter caulis Ceparum, fulti, latitudinem habentes vnciale, nam duarum vnciarum, superne cineracei quodammodo ex ruffo coloris, aut fuscis: infernè crassis nigris stris exarati.

C. Bauh. pin. hos Fungos distinguit: nam vice-simi secundi generis noxiorum Fungorum, 1. 2. 5. & 6. Clusii speciem refert ad Fungum suum noxium 35. siue ad Fungos dumetorum ex vno pede prodeuntes. Clusii verò 3. & 4. speciem, ad Fungum truncis humi iacentibus innatum, plures ex eodem ortu producentem.

FVNGI ALBI LVCENTES, EX VNO principio plures ex radicibus arborum.

CAP. XXXIV.

In cariosis arborum truncis occurrunt Fungi ex vno principio plures: longis pediculis indurantes, emaculati vndique candoris, etiam per membranas animalculorum morsuanculis & arrosionibus obnoxias, maiusculi, tenues, lentore viscido superius obducto nitidi.

His similes ex vno pede plures, inueniuntur limidi, variorumque colorum, etiam longis pediculis nitentes. Ex horum etiam genere sunt, quorum meminit Ruellius, dicens ex pituita radicum in nemoribus Fungos nasci, &c.

FVNGI MVLTII EX VNO PEDE, clypeiformes, lutei & rubri,

CAP. XXXV.

Fungorum clypeiformium perniciosorum luteorum forma plana quidem est, sed rugosa & per horas reflexa, flauo coloris, pediculis fuscis,

Descripti

Descripti

Descripti

Descripti


Descripti

Descripti

Descripti

Descripti

Locus:

Alia di-
versitas.

Inueniuntur adhuc alii his non valde dissimiles in aruorum aggeribus, sub sepibus, rubri coloris, quorum nonnulli nullo peculiari odore sunt p. æditi: alii verò Moschi odorem quodammodo referunt.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 23. siue Fungus clypeiformis maior: Fungus alter venenatus clypeiformis olidus Lobel. belg. tom. 2. p. 106. & le p. 172. Fungus alius clypeiformis perniciosus Clus.

FVNGI SVPRÀ LAPIDES. CAP. XXXVI.

Fungus
lyncuriosusLapides
fungiferi.

DE Fungo è lapide lyncurio enato quæ Hermod. scribit cap. 1. huius libri habentur. Eadem & Ruellius pro suis venditat. Similia & Porta vilæ lib. 10. c. 70. tradit de Fungorum genere è saxis nato. Commemorat & Bapt. Fiera in cœna Fungum lyncurium.

Tanta intercessit quondam gratia Fungis cum mensis in Italia, ubi eorum frequentissimus est vsus, vt Neapoli inuenti sint lapides, qui defossi, & in cellas vinarias translati, terrâ aliquantulum operiti, & subinde tepidâ aquâ inspersi, intra quadriduum Fungos non ingratos procrearint. Hos lapides & Romæ & Neapoli se vidisse iactat Matthiolus, ibique magna seruari diligentia, nempe quorum merito quolibet tempore Fungos edant.

Tantus igitur fuit hominum luxus, gulositasque vt pro habendis quotidie fungis, lapides quosdâ excogitarent, quos in cellis vinariis summâ curâ seruabant, & eos terrâ cooperiebant, super quos, singulis 8. vel decem diebus, Fungi nascebantur, de quorum natura ac malignitate tradit Galenus lib. de attenuante diata cap. 9. vbi omnium oleum, pessimum esse Fungos scribit, inquit Amatus.

Castor Durantes quoque meminit Fungorum supra petras prouenientium ex irrigatione aquæ tepidæ.

Tartufi
funtari
imper.

Fer. Imperato Tubera fungifera (Tartufi fungari) consistentia sunt congeneri ac simili cum tuberibus esculentis, sed duriora magisque fibrata. Magnitudo horum multiplex, & sunt qui centenarium librarum pondus superant. Fungos educunt Vere & Autumno. Quidam modicè humectata sub terra condunt. Nimiùm enim madefactâ marcescunt.

Synon.
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fungus 33. siue Fungus in saxis

Innascentur plerumque putridis lignis, aut asseribus veterum ædium rusticarum & stabulorum.

Iisdem locis & secundum rusticorum casas inueniuntur etiam alii eiusdem quidem formæ plantæ & orbiculatæ, sed qui non sunt reflexi, ac quorum etiam aliqui per oras crenati.

proueniens: Fungi è lapidibus Matthioli: Fungorum postremum genus è saxis Portæ: Fungus in lapide fungoso Neapoli (Camerarii in Matth. gerin. & Cæsalp. Fungus petrosus Imper.

Ex hoc Fungos toto anno nasci, si aqua irrigetur etiam domi asseruato, crescereque in dies continuâ fertilitate, pediculis in lapidem induratis, attestatur quoque Cæsalpinus. Porta scribit hunc Fungum ad esum præcidi, alium subnascentem, semperque nouum produci, septem diebus perfici: sexies anno demeti: terrâ dodrante lapidem operiti: ex Vesuuio, ex Fagero, ex Parthenio, ex Gargano, & celsioribus montium partibus affert.

FVNGVS RVGOSVS, VEL CAVERNO- sus, siue Merulius niger & albus. CAP. XXXVII.



LAutioribus mensis expetitus reponitur etiam exsiccatas vt alienis mensibus gula feruiat, formâ turbinatâ, totus circûquaq; serobiculis petuius, vt fauos apû imitur, ex albo nonnihil rubescens, fuluus aut niger: interiori exterum parte totus cauus, albus & velut farinaceo.

quodam leuore aspersus: pediculus verò qui Fungi corpus sustinet, in infra parte crispus, totus albus, cauus quoque.

Quandoquidem verò Clusius horum Fungorum quatuor species obseruauit, lubet etiam earum descriptiones subiungere, quæ sic habent. Prima pollicis extremum articulum raris superat, valde rugosa, & quasi faui instar in cellulas distinctâ membranaceâ cute, coloris albicantis, quasi fuligine infecti, præsertim illius venæ rugosæ & prominentes, pediculo, quo nititur, cauo, vt & totum Fungi corpus. Altera, priorem magnitudine non multum superans, aliquantulum contractior est, & pyri in clybano cocti instar rugosa, vel potius tuber aut radicem Aristolochiæ rotundæ vetustate contractam & multis rugis præditam, valde mentitur, coloris ex rufo fusci: cuius rei causâ Germani Braun Mauerachen cognominant. Tertia primæ formâ non dissimilis, sed duplò maior, orbicularis plerumque, præter pediculum quo sustinetur: interdum autè in trium vnciarum longitudinè, æqualemque aut amphiorum crassitudinè, excrecit, eiusdem cum prima coloris, nec minùs quàm illa rugosa, & veluti in cellulas distinctâ, internè etiam caua: Germanis Strot Maudrach dicitur. Quarta recens natæ figura quodammodo ad tertiam, quæ orbicularis est, accedit, sed rugis magis turbatis & compressis, vt in secunda, color etiam magis candicans, & pediculus longior. Paulò aduolior verò, in longitudinem excrecit, metæ instar, aut pilei, siue Petasii germanici longioris. qui limbo

limbo caret, cuiusque apud eos vsus duntaxat hieme, foris etiam rugosus, & in cellulas distincta, quæ colorem pallentem veluti foligine quadam infectum habet: internâ autem parte caua & hians: Germani illam *Maurachen* nominant. Et hæc Clusius de primi generis Fungorum esculentorum quatuor speciebus, colore & magnitudine differentibus, quas Vngari *Szemerchye* vocant, Germani *Maurachen*.

Videtur porò ipsi hic Fungus is esse, quem Dalechampius spongiosum cognominat, in asperis & saxosis nascentem, sæpè tamen ad Castanearum radices, colore fulvo, corpore spongioso, figura in metam desinente, suauissimi gustus: quam ob rem in delitiis haberi variis modis præparatum, vt hominum palatum variis condimentis oblectatur. Gallos vocat Morilles, inde fortasse, quòd ad Mori fructus figuram non nihil accedat, vt & eum quem Bapt. Porta à Neapolitanis Spongiolas appellari scribit, à spongiarum similitudine.

Scriptis de Fungis & Tuberibus duo capita Dioscorides quorum prius *Isorion*, h. e. Tuber vocauit, quod meâ sententia, inquit Tragus, *Morchellen* dicunt Germani. Etque ea mihi Tuberum & Fungorum prima species, quæ rotunda est pileoli instar, foris foraminulenta, non aliter atque fauus mellis, coloremque canum obtinens: Galli *Truffes* vocant, nonnulli, vt Theophrastus testatur, *Gargana*: Serapio cap. 236. *Ranich*.

Fungos, quos *Morchen* vulgò Germani appellant, Cornarius in *Æginetam* Dolab. lib. i. cap. 77. in Diosc. & Gal. 2. alim. eos esse existimat quos Græci *Amanitas* vocant.

An Fungi Spongioli Hermolai, Ruellii, Tragi & Loniceri?

C. Bauh. pin. Fungus. siue porosus: Fungorum. genus Trago, Lonic. & Matth. germ. Fungorum præcipuum genus. Geln. coll. Spongiola nonnullis Dod. & Imperat. Neapolitanorum Ponz: Fungi fauaginosi, siue Fungi rugosi, fauis mellis similes Lob. Ic. Plant. rom. 2. p. 274. & hist. belg. Fungi rugosi Cast. Fungi præcoces Dod. belg.

Nascitur prima Clusii species apud Vngaros & in Germania plerumque sub Abietibus, in dumetis atque pratis, sed in his altera præsertim: tertia verò & quarta sub Quercubus magna ex parte, mense Aprili vsque ad Maii finem: & ab eo tempore euanescit, nec vsquam apparet, vnde vulgato proverbio apud Germanos dici solet *Dü nimst zu wie die Morchellen im Meyen* hoc est. Non aliter atque *Tuz bera* Maio mense crescit & augetur. Merulii nigri abundant in syluis Abietum & Picearum inter Montbelgardum & Porentruum.

Per vniuersam Germania aded in delitiis est hic Fungus vt filo traiectus & in corollas compositus è clauo suspendant, & adseruent, vt etiam media Hieme eo velci possint. Aqua feruente bullitur, posteaque aromatibus è butyro conditus cibus apponitur. Recens verò apud Vngaros assari solet supra craticulam, vel ex oleo decoqui, sed etiam reficcatu torreri potest, prius tamen macerari non oportet.

FVNGVS CANDIDVS, CRISTATVS, CAP. XXXVIII.

Fungi autumnales antiquis indicti qui vulgò Gallici dicuntur, candoris immaculati, bini Tom. III.

FVNGVS RAMOSVS FLAVVS

& albidus.

CAP. XXXIX.



Substantiâ
Sest cum cæ-
teris Fungis
parili: sed fi-
gurâ longè a-
liâ. Nam ex
vno gemino-
ue crasso trun-
co in alios mi-
nores, hi in a-
lios adhuc mi-
nores, ad mi-
nimos vsque
creberrimis &
anfractuosis
segmentis Co-
rallii fruticis
in morem, hic
longè densio-
re stipatu, sin-
ditur. Est &
varietas quæ-

dam. Nam alii in tenuissimas ad extremum venarum instar hepatis diuisuras abeunt: alii in corallii aut palæ crassitudine subsistunt. Colore sunt aliis flauo, aliis albedo. Et hic curiosiori palatui expetitur.

Hoc fungi genus [Fungorum esculentorum Clusii genus vndeicessimum] quod diuersâ à reliquis est forma, eiusque elegantis, Clusius in tres species colore inter se differentes, nonnihil etiam formâ, diuidi posse arbitrat.

Vndeiceti nam Fungorum esculentorum genus hoc Clusii Vngari *Szermas gomba*: Germani *zigenbart* oder *Geißbart* (quod idem est, vtræque enim vox caprinam barbam significat) cum *Schäberling* appellant: nonnulli etiam *hirschtling* eodem quo Fungus villosus. nomine. Porro affinitatem quandam habere videtur cum illis Fungis quos Porta è faxis ex Gargano monte erutis natci scribit, non pileatos, sed turiones vt alparagos, & in ramos diuisos.

Huc pertinere existimo Fungos digitellos à digitis dictos, quorum meminere Hermolai & Ruellius, itemque Lonicerus, licet non demonstrent quid velint.

Matthioli in Diosc. securus Lonicerum, miscet Fungum *manine* cum fungo *Kheling*: melius autem fecisset si distinguendum Tragam fuisset imitatus. In hist. germ. vocat *hendelschwam*.

Huc igitur referimus quoque Fungorum. 5. genus, Digitellos (*hendelschwam*) luteos proflus, partim ex albo pallidos & roseos Tragi. Digitellos siue Maninas vulgò Celsipini.

Quare hallucinari videtur C. Bauh. pin. distinguens inter Fungum 19. esculentum Clusii, qui ipsi est Fungus 29. siue ramosus Imperati: Et Fungos digitellos aurorum iam allegatorum, qui ipsi sunt Fungus 31. siue candidus digitatus minor. Nec hic fortè eximendus Fungus 30. siue digitatus maior, Eiusdem.

F f f f

Locus &
Tempus

Fungus ramosus Autumno ante Vergiliarum occasum prodit in vmbrosis syluis. Digitelli Tragi in humectis & viginosis siluis reperitur: gaudent iuxta putrida ferè ligna provenire. Fungus escul. 19. Clusii Septembri mense sub Corylis nasci gaudet.

Succosi sunt Trago digitelli eius iudicio frigidis, ac improbe distichisque concoctionis & prorsus insalubres.

FVNGI RAMOSI ARGENTEI.

CAP. XL.

Locus

In putridis deiectionum arborum caudicibus crecit. quod Clusio vicissimum quintum Fungorum non esculentorum, immò pernicialium genus est, circa Calendas Nouembris. Hoc Ungari feyer szarwas gomba à candore cognominant: Germani wild hirsdyling, i. e. siluestrem ceruinum Fungum, ad eius differentiam, qui pro Fungo ramoso descriptus est.

Semipedalis magnitudinis est hic Fungus aut amplior, elegantissimæ formæ: nam fruticosus & in innumeros quodam nodò ramulos diuisus, candoris immaculati, quorum nonnulli abiectum ramulorum figuram exprimunt, adeò vt si splenderet, ex puro puto argento constatum quis æstimare possit: aliquando nullum habet pediculum, sed ipsi deiectionis arboris caudici innascitur: interdum fescunciali nititur pediculo.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 40. siue ramosus candidus: Fungorum noxius 25. genus Clusii at figura habetur Exot. hist. ap. alt. in fine.

Varietas.

Huius generis obseruauimus Fungum digitatum nigrum veluti cornua exprimentem.

FVNGVS GALLINELLA DICTVS.

CAP. XLII.

Descrip.

Fungus Gallinella antiquis indicus, secundum traditionem Portæ de villa, parua est forma, Spongiis, vel nascentibus Poris similis, quatuor digitorum longitudine. Nasctur Autumno locis vmbrosis.

Locus &
Tempus.

FVNGI DELICATISSIMI SAPORIS.

CAP. XLIII.

Vltra Balatoneum lacum Vngariæ, in parua insula cui nomen Fanor Simidiensis Comitatus, Aprilimense nasci intelligebat Clusius alterum genus Fungorum esculentorum delicatissimi saporis, cuius nomen ipsi indicare nemo poterat, sed illis similis esse ferebatur, qui inter perniciosos & lethales Fungi fœtidi serpentine vocantur, & ab Vngaris Kygo gomba, à Germanis Watter schwammen dicuntur: pyramidalis tamen doctantaliq; apice & angusto hunc Fungum esse.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus 2. siue apice pyramidalis & angusto: Fungi esculenti alterum genus Clusii.

FVNGI TRES FOETIDI SVB CORYLIS, serpentine dicti, perniciosi.

CAP. XLIII.

Locus &
Tempus.

Decimum sextum Fungorum noxiarum genus Clusii faciunt hi, de quo ait: Extremo Sextili provenit sub Corylis, fœtidi admodum odoris, quod Rigvo gomba Vng. Germ. Watter schwammen, quoniam serpentinum siue colubrinum Fungum, appellant. Eius porò tres species obseruantur magnitudine parè inter se aequales, sed colore & formâ dispares.

Prior oblongo gracilique fulcitur pediculo, cui insidet initio veluti ouum exalptum vnciac-

lis magnitudinis, coloris albi fuligine perfusi externa parte, nigri striati interna & supina: dein, oras explicans, fescuncialem amplitudinem adquirent, in pilei, paruique galeri similitudinem formatam, albi superne coloris, frequentibus fuscis maculis distinctam, atque ipso fastigio veluti fuligine infecto.

Synon:

Altera longo, gracilique pediculo sustinet Fungus corpus, parui galeri figura formatum, vix vngue maius, initio dilutior fuligine infectum: fescuncialis autem magnitudinis cum adoleuit, galeri etiam formâ, colore superna parte atrâ fuligine tincto: interna autem, instar fornecis camerata, & nigris striis exarata, quemadmodum & iunior.

Tertia corpus, eiusdem cum superiore magnitudinis, valde laceris est oris, & quodammodo in lacinias diuisum, rufi interdum coloris superne, fuliginosis striis notatum inferne, nonnôquâ autem albi coloris fuligine infecti superne, & nigris striis exaratum inferne: aliquando etiam interna & supina parte adeò inuersâ & reflexâ, surrectisq; laciniiis, vt florem aliquem exprimeret vel mentiri videatur.

Aliud Fungorum genus sub Corylis proveniens venenatum, ex Clusio quoque postea tradimus. De quo hoc capite agimus est C. Bauhin. in pin. Fungus noxius 26. siue Fungus oris laceris & in lacinias diuisis.

FVNGVS CORALLOEIDES

cancellatus.

CAP. XLIV.

Descrip:

Nobilis vir N. de Caluas Peitets toparcha misit ad me (inquit Clus. Exot in appendicis altetius Auctario in fine) Fungum admirabilis texturæ Nasctur autem ipso referente, Belgientienſi agro, tum in siluis, tum inter harundines secundum fluuiolum constitas, gallinacei oui forma dum è terra primum



erumpit, colore prorsus niueo, radice inque habere ait tenuem, candidam, in multas fibras valde tennes diuisam, qua firmetur & alimentum sibi necessarium attrahat: ouum autem illud siue voluam, dum matureſcit, sensim dirumpi & dehiscere, & inde exilire, tanquam marsupium ali-quod, distinctione cancellatim reticulatâ constans, & in obliquos veluti ramos inuicem sese secantes atque summâ parte in vnum coeuntes formatum, rubri coloris: vt totidem coralli nam rami simul implexi videantur: sed admirabilem illam externam venustatem & elegantiam prorsus deformari & corrumpi à fœtidissimo quæ exhalat odore: illum autem odorem oriri suspicabatur à crasso cineraceoque quodam liquore rubentes illos ramos supina parte obfidentem, quem

quem, simul atque ex sua volua exclusus est Fungus, varii generis parua insecta misicificè appetunt, & tandem etiam absumunt, omnem alium cibum præ isto spernentes: imò multos alios Fungos, quos alioqui optimos esse credunt & in deliciis habere solent. Inter perniciosos autem Fungos hoc etiam genus referendum esse, nemo vt opinor, inficiabitur: &c.

C. Bauh. pin. inter Fungos noxios quadragesimum tertium facit, vocatque Fungum rotundum cancellatum: Fungum lupi crepitum vulgi, efflorescentem Columnæ. Hunc C. Bauh. a Fungis puluerulentis distinguendum haud censet, licet cum & Clusius, & Columna peculiari figura expresserint, & ipsemet hunc ab illis diuersum pronunciarit.

FVNGVS INTYBACEVS, ET ALIVS
interaneis vituli similis, cinereus.
CAP. XLV.

Memorabilis est magnitudinis & formæ: planus & compressus, d. meriente sesquipedali, ex foliis torus, aliis incumbens: bus, aliis subeuntibus confascinatus: Intybo crispo haud ineptè comparaueris: singulares foliosæ portiones cristatis crispisq; oris, in quas radu ab in-



sertione produuntur, pectunculos imitati: color parte supinâ veluti cinericeus, pronâ albus: inuersus porosus apparet, stellamque marinam arboreâ, ceterum egregiè exprimit. Odor haud ingratus. Substantia liquisior quàm vt in cibos venire possit, mense Septembris repertus:

mensē autem Augusto non ita durus obseruatur, quem quidam edulem dicunt. Nascitur in siluis.

An arborum Fungi Auriculæ Iudæ fabie, Lobelio? Eius Iconem nimis imitatus est pictor, nostrâ plantâ neglectâ cui cristatæ & crispæ oræ.

Huc iam pertinere arbitramur Fungi 7. g. nus Tragi, quod in siluis Augusto mense reperitur, prope radices Quercuum, magnum quidem, & formam interaneorum vituli representans, incanè & plumbei coloris, ac à nonnullis more aliorum Fungorum decoquitur: Germani Eichschwemme, & à forma hasten oblin/h. e. Lepusculos nominant. Lonic. fungos lepusculos: Matth. germ. Fungorum genus nonum: Gessn. coll. Fungi genus magnum.

FVNGI MONSTROSI, VASTÆ
amplitudinis, esculenti, coloris vel
ex rufo nigricantis, vel ex albo
nigri. CAP. XLVI.

Monstrum verius Fungi quàm Fungum censendum iudicat Clusius vicissimū primū
Tom. III.

genus suorum esculentorum Fungorum, quia aded vastè interdum est amplitudinis, vt integram etiam *montopodior* familiam expleat & satiari possit: nam refertur circa Levva Dominorum Dobo oppidum, in extremæ Vngariæ limitibus Croatiae vicinis, tantâ nonnunquam amplitudine excrecere, vt bigam faciliè expleat, præsertim, vt aiunt, si quis præteriens [quod superstitione non caret] admirandus subsistat: immò (quod magis ridiculum) asserunt nonnulli, conuictis protincendum esse, vt in tantam molem excreseat, alioqui manere in ea magnitudine, quâ primū conspectus est, quasi ægrè ferentem se negligi.

Nascitur autem in Vngaria sub extremum Autumnum, vel circiter diem D. Michaeli sacrum, ad Quercuum radices. Vocatur ab Vngaris Bos Froa gomba: à Germanis Schieberling.

Si quis porro Fungos ferè sine pediculo cum hoc monstruoso Fungo conferat, non sine causâ forsitan existimabit, illos esse huius generis nondum adultas species, aded illi ad istius formam accedunt.

Considerandum autem est, an similis fuerit Fungus, qui (referente Diodoro Cassio Nicaeo) Traiano Cæsare aduersus Decebalum Dacia Regem proficiscente, ingens latinis literis inscriptus circumferebatur à Barbaris.

Eum cerò esse concludit Clusius, quem Porta à Neapolitanis Gallinaccia appellari scribit, tantæ magnitudinis, vt sexaginta libras interdum pèdat, sufficereque possit ad vniuersam familiam pascendam. Portæ verba sunt hæc: Est Fungorum species antiquis indicta, Neapolitanis Gallinaccia vulgò nuncupata, mirabili profectò forma, vt nescias cui affimilis: ad magnam crescit altitudinem, vt brachiis diductis vix homo complecti possit, pondus sexaginta librarum, non orbiculari formâ, vt cæteri, sed veluti manus in digitos plures diducta, vt Quercus frondibus affimiletur, albus, callosus, vt vix integro vniuersa familia velci possit.

C. Bauhin. pin. tamen dubitat an Gallinaccia Neapolitanorum Portæ sit Fungi esculenti genus 21. monstruosum Clusii, quod ipsi est Fungus 32. siue maximus Vngaricus.

FVNGI LARICVM MAXIMI LVTEI
esculenti.
CAP. XLVII.

FVngi non tantum humi proueniunt, sed & in arborum caudicibus, qui omni ferè periculo vacant [dummodò non sint arbores noxiæ] quòd è cortice profluant: cui nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpentis cadaver subesse potest. Ex hoc genere quidam, præter Agaricum, Laricibus innascuntur in Ananienfibus montibus, triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum dissecti, in cibis gratissimi, nullo amarore præditi, licet Agaricus ab eadem arbore productus sit amarissimus, inquit Matthiæolus. C. Bauh. pin. Fungus 26. siue lariceus aurei coloris.

Fungus auritus Inglandium, albicans.

ORechinole species Fungi coriacei, figura foliacei, quæ ab vno pedicello, in cupatam abit, in ambitu Rosæ dimidiatæ instar dissecta. Pars inferna, reliquorum Fungorum in montibus
Ffiff 2

Locus
tempus.

Descrip.

Locus.

Tempus.

sem striis foliaceis lecta. Nascitur in arboribus, specialiter in Nucibus, colore albicante. Fer. Imper. lib. 27. c. 6. An species aliqua Fungorum plurimum simul alborum esculentorum, eorum sc. qui ad Iuglandis radices proueniunt?

Fungus lignosus arboribus ad furfures.

FVngus quo, auctore Imperato, ad abstergendos capitis furfures utitur, de lignosorum Fungorum genere est, magnus & maximi capitis medietatem adæquans. Nullo pediculo nititur, sed arboribus immediatè affixus hæret, diuisuras infernè manifestas habens, quarum ope furfures decutiuntur.

An Hermol. coroll. 698. Fungi quibus strigilium vice constringitur? C. Bauh. pin. Fungus noxius 4. siue ad tutum extergendam aptus: Fungus igniarius species, quæ in constringis pro strigili utuntur, Cæsalp.

Fungi Castanearum Lacinie diffi.

FVngorum, qui Lacinia priuatim dicuntur & Castanea, magnitudine spectabilem, ut singuli sufficiant, meminit Hermolaus loco suprâ citato, & post eum Ruellius.

Fungus villosus arboreus, coloris ochra, rufioris.

Descript.

FVngus villosus dictus Imperato, mediocris magnitudinis est, duobus pugnis simul iunctis ferè æqualis, vndique tunica mucosa obiectus, quæ in villos disingitur breues, quorum longitudo ipsam tunicæ crassitudinem æquat. Interior quoque substantia villosa est, quæ arbori adhærens in filamenta, quæ ex cortice emergunt, quaquaersum terminantur. Colliguntur ex arboribus pomorum, colore intus ochra, qui exsiccati nigrescunt. Utuntur mulierculæ horum decocto ad tingenda velamenta lugubria.

Locus

CVBICVVS. VVVS. VVVS. VVVS.

FVNGI ARBOREI AD ELLYCHINIA.

CAP. XLVIII.

Descript.

EX Iuglandibus colliguntur Fungi, truncis anosis adnati, substantiâ callosâ, lignosâque, in ambitu & fibris rectis contextâ, in medullis molliore, in qua si rectè memini vix vlla apparent fibrarum vestigia: color foris cinereus, interiusculus obscurior ad fuscum inclinans: præparatione autem assequuntur molliorē illam, & ignium rapacem vim, quos depopulantes ipsorum substantiam ad extremum fouent.

Ruellius Lac. & Lonic. meminerunt Fungorum arboreorum qui fortè iidem sunt cum iis quos cum Hermolao Igniarios vocant.

Fungi, inquit Tragus, qui radicibus arborum, potissimum Populi nigra adnascuntur, Æginitæ nuncupantur: qui verò caudicibus quarumvis arborum adhærent, Arborei dicuntur, cumque igni concipiendi parantur & vsurpantur. Igniarius germ. Zünderschwem appellatur. Ad hos autem vsus adhibentur ea præcipuè Fungorum genera quæ Fagis & Nucibus adnascuntur: ignem enim quem semel conceperunt, non faciliè relinquunt. Sunt non pauci qui Fungos hos ad id negotij parare norunt, decoquant enim illos in lixivio & siccatos tundunt, rursusque nitro coquant, hoc enim pacto ad concipiendum ignem aptiores redduntur.

Ex Galeno manifestum esse ait Cornarius fuisse Galeni tempore Fungorum genus aliquod, quod Ellychnion priuatim appellaretur, cognomine *ragator*, cuius nulquam mentionem fecerit Plinius, quod fortè Romæ nondum in vsu foret. Et licet hodie quoque qualis materia eorum Ellychniorum, quæ ex Tarso adueherentur, fuerit, haud facile quis dixerit, eod quod res, & nomen perierint: Suspiciatur tamen idem Cornarius Tarsensia hæc ellychnia ex Fungorum terrestrium genere fuisse, eorum videlicet qui similitudinem quandam ad marinas Spongas habent, & quibus etiam hodie ad ignis scintillam ex silice ad chalybem impacto excussam, excipiendam utitur, quum commodissimè ignis in his Fungis seruetur. Nec de aliis Virgilium loqui credit lib. a. Georg.

*Nec nocturna quidem carpentes pensa puella
Nesciuerit Hyemem: testa cum ardente viderent
Scintillare oleum: & putres concrevere Fungos.*

Sunt tamen qui Fungos quosdam crecere & generari sibi imaginantur in lucernis, dum pluuiz tempestas infat, Seruium Grammaticum sequentes, qui hunc locum exponens ait, Nam ut dicit Plinius, cum aer humidus esse cæperit, fauilla quæ cum fumo folio egredi, prohibita aeris crassitate in lucernis residet, & quædam velut fungorum imitator imagines. Cornarius tamen Plinium hæc dicere negat: Et nihilominus tum Seruio, tum iis qui illum hac parte sequuntur, fauillam fungum fieri permittit, at ipsis suum commentum placere finit: modò videant ut istum lucernarum fungum apprehendant, ne aeris crassitate depulsâ, vnâ cum fumo elabatur, si fortè in vsum allumere velint.

Cæterum ex fungis terrestribus fiantes Ellychnia dubitamus: suspicamur non fuisse Contrario bene perspectum ex quo fungorum genere fierent fomites ignis, Spongiis similes, dum dicit esse ex terrestrium genere: colliguntur enim in Germania ex Iuglandibus, & præparatione redduntur Spongiis similes. Hos autem fungos esse Virgilij & Plinii lucernarum non existimamus, ac hac in parte Matthiolo Cornarium reprehendenti assentimur.

An Fungus *Borsaro* Ferd. Imper. An Fungus Agario similis Lobelio?

FVNGVS AVRICVLÆ IVDÆ, COLORIS

ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambuci caudice nascens.

CAP. XLIX.

Est hic Fungus perniciosus primus Clusij, de quo ait: Fungorum perniciosorum primi generis vnicam speciem obseruare memini, licet magnitudo eius vna non sit: sed eam diuersitatē ex ætate oriri arbitror. Quotquot autem conspexi, breuissimo, vel potius nullo pediculo nituntur, sed caudici arboris inhzrent, aut singulares, aut gemini, membranaceâ cute constantes, implicata & sinuosa, coloris ex cineraceo nigricantis. Vagus *Auriculam Iudæ* nominat, cartilaginea enim & membranacea est substantia, quemadmodum auris. Vngari Boza fateremur: Germani *holde schwammen* appellant, quia in Sambuci caudice nascitur, cum huic arbori primum proumpunt folia.

C. Bauh. pin. Fungus noxius i. siue membræ naceus auriculam referens, siue Sambucinus. ut Cast. Fungus ad Sambucum Trago: *Auriculæ Iudæ* vulgo: Fungorum perniciosorum i. genus

Ellychnion
Tarsicum

Contra
Seruicium
eiusque
fauillæ.

Cornarius

Descript.

genus Clus. An Fungus auricularis Imperator?



tus sit, exhibere solent; ad gargandum, & guttur eluendum.

FVNGI TRES DICTI SPONGIÆ lignorum. perniciiosi.

CAP. L.

FVngorum noxiorum vicissimum quartum genus Clusii faciunt hi, quod Germ. holz schwammen appellant, quoniam Octobri mense, in putridis deiectionum arborum ramis crescat. Tres autem eius species obseruantur.

Prima reliquis maior in maiusculis ramorum fragmentis humi iacentibus nascitur: formâ Fungo Auriculæ Iudæ haud valde dissimili, sed colore elegantiore, nempe rubro, vncialis aut duarum vnciarum magnitudinis: interdum plures coherentes, & in vnum corpus veluti coalescentes, valde tamen se remittente colore.

Alterâ longè exilior est, & vnguis latitudinem interdum non superans, nonnunquam etiam laticior, singularis aliquando, interdum bini simul coniuncti, formâ veluti supernè exscalptâ, coloris egregiè rubentis, & adèò floridi, vt coccineû protuocare videatur. Inhzet plarumque tenuibus ramorum humi iacentium, aut corticis illorum fragmentis, in vis obscuris & ab arboribus obfessis, quæ Solis radios adimunt.

Tertia rugoso protus est corpore, vncialis aliquando magnitudinis, nonnunquam fescuncialis, interdum bini simul coherentes vnciâ minores, plarumque etiam terni, & illi quidem elegantiore auresco colore præditi, reliqui flauo: adnascuntur similiter tenuibus vel ramulis, vel eorum fragmentis humi iacentibus.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 2. siue Fungus putridus, arborum ramis inhzrens, plurimis simul coherentibus.

FVNGI VENENATI QVINQVE, MVSCARDII dicti. CAP. LI.

Hic Fungorum noxiorum generi, quod duodecimum est Clusio Germani steigens schwammen appellationem dederunt, à muscis, quæ illud valde appetunt, & plarumque illi insident, non sine ipsarum perniciæ, siquidem quotquot degustant, intereunt. Quinque autem tradit Clusius eius species, omnes extremo exili in cædis filius progenientes:

Tom. III.

Eorum autem elegantissimâ est quam quartam facit, quæ hac tabella exprimitur, cuius ætate duntaxat quoddam discrimen est: Iunioris



enim & recens natus corpus minorem habet orbem, & binas vncias solummodò latum, rubro colore valde saturato instar concretæ sanguinis tinctum, per cuius superficiem frequentes exalbidas sunt conspersæ maculæ: Adultior in maiore latitudinem patet, vt quæ quincuncialis sit aut amplior, tumula super-

nè, rubro etiâ colore, sed paulò remissiore, quàm in iuniore tincta, obscurioribus veluti vncis intercurrentibus distincta, & crebris etiam exalbidas maculis infecta: pediculo autem constat protuberante infima parte, deinde trientem longo, vnciam crasso, à quo infernâ parte crassè nigre striâ ductæ in ambitum: bini interdum eodem pede coniunctim nascuntur.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 19. siue muscas in: Synon; terficiens: Fungi muscarii Trago, Coido in Dioscor. Loni & Tab. Fungorum noxiorum 12. genus Clusio.

Inuenitur quarta species in cædis filius Locus Francosurto ad Mœnum vicinis, vnde rusticæ mulieres lectum, in vrhem deferunt venalem, cum non ignorent plerosque empturos ad muscas necandas: nam cum muscæ libenter illi insideant, diuulsam in fragmenta, variis in conclauis locis ante fenestras spargere solent, ad quæ inuitatæ & excitæ muscæ, succum sugunt ipsi perniciolosum, & paullo post etiam lethalem.

FVNGI BETVLARVM ALBI, MACVLATI, perniciiosi. CAP. LII.

Octauum hi sunt genus Fungorum noxiorum Clusio, quod circa Pentecosten pro- uenit in filius ad Betularum caudices & truncos, cuius rei causa Vngari Vlysa gombaya, Germani Birchenschwammen appellant, h. e. Fungum betulaceum.

Orbiculata, inquit, pæne est figura, superne paullo elatioris, albi coloris, leui fuligine adumbrati, in quo inactile quædam rufescentes: laticiorum duarum vnciarum: inferna pars tota alba est, exceptis striis, quæ fulgine infectæ, à pediculo binas vncias longo & gracili ductæ, in extremas oras desinunt.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 16. siue Fungus ad Betulam Trago.

FVNGI PRVNORVM COMMIXTI coloris perniciiosi. CAP. LIII.

HOs sub Fungorum noxiorum genere secundo tradit idem Clusius. Sub Pruni arboribus, inquit, nono Vere nascuntur: eorum

FFFF

genus noxiorum Fungorum, ideoque, inquit, ab Vngaris Szilve aya nuncupatur, inquit Clusius, qui illius vnicam speciem tradit, numerosam ex eodem pede, nullo tamen pediculo conspicuo, confertim nascentem, variâ magnitudine & formâ: nam Fungorum nonnulli, binas aut ternas vncias lati sunt, atque etiam ampliores, vel orbiculatæ figuræ, aut angulosæ: alii paulo minores, nonnulli vix vnciam lati: omnes coloris ex albo pallido & fusco commixti.

ynon:

C. Bauh. pin. Fungus noxius 10. siue Fungi ex eodem pede, sed non conspicuo, numerosi.

An Prunuli Trago?

FVNGI SALICVM, CÔLORE VARII, perniciosi.

CAP. LIV.

Descri:

Est hic Fungus confertim nascent, & caudicibus Salicum firmiter inhaerens, Lichenis instar in corpus tuberosum excrefcens, variâ formâ & magnitudine: nam pleraque tubera vnciam magnitudinem non superant, alia binas & ternas vncias interdum ampla sunt, coloris elegantis & variè commixti: nam in eis & albedo conspicua est, & pallor, & suaue rubens color, & satur, atque etiam flauus, addo his fuscum siue fuliginosum colorem hinc inde ipsi inspersum.

Locus & Tempus.

Quia autem nouo Vere post præmaturas pluias genus hoc quod est Clusii noxiorum Fungorum quartum, plerumque nasci solet in Salicum caudicibus, ideo ab Vngaris Fiz fa gomba, à Germanis verò Felber (schwammen vocatur. C. Bauh. pin. Fungus salignus Lichenis forma variegatus: Fungorum noxiorum 4. genus Clusii.

FVNGI SVB CORYLIS, ORBICVLATIS figuræ.

CAP. LV.

Descriptio

Extum hi constituunt genus Clusii Fungorum perniciosorum, quod quia sub Corylis crescit, Vngari *Manyaro alja gomba* vocant: orbicularis autem est figuræ, binas vncias latus aut maior, supernè nonnihil tumescens, extremis oris in supinam partem flexis, coloris ex rubescente fuliginosi, cui albedo quædam permixta videtur, interdum etiam omnino fuliginosi & fusci: infernè nonnihil rubescit, striisque exaratum est, à pediculo gracili, binas vncias longo, in ambitum ductis crassiusculis, fusci coloris.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 11. siue coryleus orbicularis. Fungi serpentinei fetidi venenati sub Corylis nascentes, quorum antea ex Clusio meminimus, fortè non absque ratione huc sunt referendi.

Inuenitur circiter Pentecosten, h. e. Maio, aut sub Iunii initium.

FVNGI CERASORVM COLORIS VARII, perniciosi.

CAP. LVI.

Descriptio

Plures Fungi ex eodem pede nati, imbricatum siue regularum instar, alter super alterum conferti nascuntur, infima parte vnciam lati, deinde sensim altitudine crescente, ternarum aut quaternarum vnciarum in extremis oris, palmum autem longi. Superna corporis Fungi pars variis coloribus infecta est: nam circa pedem ex albo pallescit ad vnciam altitudinem, deinde transuersi colores secant, ex flauo tubroque colore commixti, postea flauus: supra illam denudè transuersim secant colores flauus & ruber simul mixti: hos sequitur flauus color, qui-

busdam tamen veluti fuliginosis maculis infectus: extimæ oræ saturâ rubedine nitent, quam nonnihil sedat linea quædam veluti farinâ conspersa: supina verò parte, aut pallescit, aut flauus est.

Est hoc Clusio perniciosorum Fungorum Synonymum quintum genus, quod Vere nouo in putrefactibus Cerasorum caudicibus nascitur: eamque ob causam apud Vngaros Revves cersénye fa

gomba, apud Germanos

Rersensaüm=

schwammen

nomen inuenit.

Est C. Bauhino

pin. Fungus no-

xius 8. Fungus

Cerasorum, im-

bricatum alter

alteri innatus

variegatus.

Sed & hic Fungus

gus, tametsi ho-

minibus noxius,

alicius tamen

est vltus: nam

rustici exsicca-

rum recondere

solent, quia illius

pollinem cum

sale & pabulo

mixtum, agris

bobus & vaccis salubriter dari, sibi persuadent.

FVNGI DVO LATI, ORIS LACERIS, perniciosi. CAP. LVII.

Hi Clusio sunt perniciosorum fungorum decimum septimum genus, cuius duas describit species:

Primam, dodrantalem amplitudinem habentem, & minimi digiti crassitudine præditum Pediculum, binas aut ternas vncias longum, ex cuius imo plerumque subnascitur exigua proles: orbiculatæ ferè est figuræ, oris in inferiorem partem nonnihil inflexis, colore supernâ parte rufo ad nigredinem tendente, cui flauescens circa medium admixtus est: infernâ pars pallida est, striisque fuliginosis exarata.

Secundam, eiudem cum illa magnitudinis, sed graciliore pediculo præditam, cinctatæ etiam rotunditatis, nisi laceras haberet oras in ambitu: in qua color supernè planè luridus, hoc est, ex pallescente fuliginosus, & venis quibusdam exalbidis maculosus, ipsa Fungi substantia, sub externa illa cute, omnino atra, ut etiam est pars infima, sic tamen ut crassæ nigra striz obscurè appareant.

Hanc speciem *Schwarze hor greysen* Germani cognominare possunt, ut priorem *Rote hor greysen*. C. Bauh. pin. est Fungus noxius 25, siue Fungus latus oris laceris.

Circiter diem D. Bartholomæo sacrum planis Locus & & apertis locis provenit Fungorum hoc genus à tempus. Germanis *hor greysen* appellatum.

FVNGI VELVTI IN NODVM COLLEATI, variis coloris, perniciosi.

CAP. LVIII.

Sunt hi è perniciosorum Fungorum vigesimo tertio genere Clusii, coloris ex albo, rufo, & fusco variè commixti:

C. Bauh.



Synon



C. Bauh. pin.
Fungi noxii 37.
sive Fungi orbicularis in palustribus, species 3 & 4.

Circiter Calendaris Octobris, cum secundum vias, tum in lignis putridis & palutribus locis promerent.

FVNGI DVO : BVLBOSO PEDICVLO:
1. pallidus maculatus. 2. tetri coloris.

CAP. LIX.

Locus & Tempus.

Decimum-quintum faciunt hi perniciosi Fungi genus, quod Clusius Vngaros Tumor gomba : Germanos verò Schmeer schwammen appellare refert : perinde ac si vnguinofum Fungum diceret, in cædis silvis crescit extremo Sextili, h.e. circa diem D. Bartholomæo sacrum. Eius autem varietates dicuntur inveniri species: Clusius binas observabat.

Priorem, quæ hic pingitur, triuncialis amplitudinis cum suo pediculo, aliqui corpus ipsi Fungivinciale magnitudinem non superat, pediculus autem binas, supremâ parte pollicaris crassitudinis, infernâ fusciculis, in Bulbi formam excrefcens, coloris ex albo pallescentis: ipsum etiam Fungi corpus supernè pallidum est, sed maculis dilutè nigricantibus distinctum, atque oris in supinam partem

reflexis: infernè multis striis ex pallido fuscis, à pediculo in ambitum porrectis, distinctum. Hanc speciem feyer ti nor i.e. albâ, Vngari cognominant.

Alteri, cognomen dederunt à nigro colore, Vngari Fekere ti nor : Germani Schwartz schmeer schwammen. Informis hæc est species, & valde tetri coloris, ut verius ligni, sive radicis cuiusdam, nodosum & nigrum fragmentum videatur, quàm Fungus, quod utraque manu vix comprehendi queat : crasso breuique pediculo nititur.

synonyma

C. Bauh. pin. Fungus noxius 22. sive Fungus pediculo in bulbi formam excrefcens.

FVNGVS PHALLOIDES.

CAP. LX.

Phallum, ex Fungorum genere in Hollandiâ fabuletis passim crescentem, picturâ ad vivum expressit, & delineavit Had. Junius.

Donum, quod fecunda illa Naturâ vis atque maiestas, & sacra rerum parens Tellus (cuius vtriusque benignitas nusquam clausa, tam sua sponte, quàm etiam coactâ, sua dona liberalissimè impertit omnibus, parca nemini, officiosa vbiq; & obsequiosa etiam, nisi fortè hanc illi laudem venenorum non minùs testibus leges deneget) paucis mortalium cognitum, à nemine Veterum Recentiorumve scriptorum antè me literis proditum, in fabuletis nostratibus enasci dederunt, in literarum monumenta referre, memoriæque consecrare volui: siue ludentis naturæ rudimentum illud sit in experimento veretro, siue singulare sit eius beneficium ad vsum mortalitatis comparatum, hoc præsertim tempore, quo propter effrænas libidines, luxumque, cui modum omnè ademit licentia, podagra & articulares morbi agminatim incubant, ne diutius lateret incognita remedium præfès virtus, quæ permagna esse traditur in ferventi atq;

Locus



Descriptio

into etiam virtutum cruciatu. Hunc igitur Naturâ factum alia nationes admirantur, spectent, fruantur quarens licet: docti verò, quibus liberalius suppetit otium ad omniariam lectionem, & quibus felicius ingenii vena obtingit, diligentius considerent atque expendant secum vitium ratonem. Sed ad rem ipsam.

In medio acuturarum caricum velut umbilico sub extrema arenæ superficiei massula invenitur alba, rotunda, pilam manuariam aut bulbum specie pariter & candore referens, cui nervus bilucis, aut fibra gemina; radicis loco subest, quo succum (ut arbitror) rapit: mucro ea lento, viscido, coacti iusculi cremorisive in modum spisso abundat, grati vsque adeo, ut aquæ pondus superet, fusillius plumbi ferrum adæquet: eodem adeo gelido, ut volæ manus apposita massa [quam Punicano vocabulo dixisse non absre licebit] penetrabilis frigoris sensum adferat. Ea ubi primùm scrobe reucllatur pallidior est, mox paulatim purpurascit, intercurrentibus sparim ceu venulis quibusdam sanguineis: à quo colore nonnihil euariat fibrarum magis liuidus color, in conerati sanguinis nigrorem paulatim emoriens. At mucus reuclsa à terra volua citissimè liquatur ac dissiluit: quin & coles ipse non multò post flaccescit, idemque viscosum vsque adeo halitum efflat, ut vel torius cubiculi aërem sit saturaturus. Hæc volua mensu-

bus autumnalibus citius tardiusue pro diuersa anni facie ac temperie disrumpi vomica instar distindique solet: quo tempore rectus inde scapus eolusue exilit, illæla volua exemptilis ac tum quidem scroti faciem prope mentitur turgida voluæ moles. Neque verò silentio inuoluendum est, id quod miraculi vicem implere posse, ne dicam superare, crediderim, quod nimirum scrobe reuulsa massa, volua etiamnum integra *καὶ ὁλοκλήρως* priuquam colem effuderit, si tortè recondatur in penum, aut quemuis etiam domus angulum seponatur, post exactum diei vnus atque alterius curriculum in iustā suamque magnitudinem erectum scapum emittit, cuius rei documentum ab vno atque altero indubitata fidei homine quum accepissim, volui & ego periculum facere, itaque abstrusus in penetrabile musæi mei adytum binis eiusmodi voluæ, oculatus ipse testis eorum fidem approbaui. Materiam scapus fungosa constat, rarā, plumā leuiore, maculolus, cinerei propè coloris, foramine peruiro rimosus, eoque læui ac velut dedolato, interius latiore, sub exitu arctiore, teres, ad duorum palmorum mensuram accedens. *Sunt* qui etiam dodrantales inuenisse se predicant. Huic insitit, non vti Fungo petasus, sed galea aut capitellum in figuram mææ propemodum fastigiatum, exemptile, cætera glandis virilis specie, nisi quod cancellata sit cute, quale elephanti traditur esse corium, vel qualis echinus, aut bouis ventriculus, cancellis rhombiformibus prædictus spectatur: eiusdem extimus vertex rugis adstrictior foramen habet quā grauis expirat halitus, propterea à muscis frequenter oblectus: id capitellum cauli est color, videt etiam sæpenumero, atrum in caule prorsus niueo, sed senio id acceptum refecti debet, exoleto namque pro candido anthracinus mutatur color: interdum etiam è leucophæro virore induit capitellum illud, qui non multò post in fuluum abit. *Haltenus* germinis istius, ita ut volua, cole, & glandiformi capitulo constat, figuram vtrunque delineauit: *Quamobrem* autem Phallum nuncupauerim facili expleto ratio est, imò cuius obuia, qui vel à limine Græciam salutarit. Fecit hoc similitudo, quam habet cum coriaceo & ficulno veretro, quod in decantatis mylteriis vana gentilitas circūnferre solebat, hoc Phallagogiā, illud Phallum & Ithyphallum indigitante superstitione. Quid veratantum noua in re nouo vti vocabulo? quando & Fungorum diuersitas varia inuenerit nomina. Porro debetne in Fungorum classem adoptari iste Phallus, non ausim temerè velut pro comperto & explorato definire, nolens aliorum sententiæ doctiorum præiudicatum: certè materiæ raritas leuitasque: & (quæ prima Fungi origo est) terræ madentis aculescens succus, vnde gignitur, fungini eum esse generis testantur: tamen striarum ductus, qui nulli huic sunt, reclamant, qui tamen in Fungis videntur: nullum est huius etiam petasi pediculo coherentis vestigium, quippe vbi capitulum, quod petasi vicem obtinet, innoxie demissum: natalis insuper locus repugnat, siquidem istud germen fabuleta tantum, neque ea omnia, nisi caricibus veteribus consista producunt: at Fungos fermè vliginosa, rancida, sicut squallida, & glandiferis radicibus vicina loca gignere scriptores ex confesso prodiderunt.

H. Lugd. p. 1399. icones exhibet Had. Iunii, sc. Phallum Barauium, cuiusque separatas partes, Veratrum, Veratri præputium, & Voluam tanquam scrotum, de quibus omnibus hæc

subdit: Phallus, in maritimis Hollandiæ, ac Zelandiæ arenosis gignitur, hominis pudendo suo præputio confectio adeò similis, ut inde nomen sit tributum. Sicut integrum & partibus adhuc suis constantem: ac compactum, minimè diuisis, siue in partes, è quibus componitur, iam discissum inspicimus, ad verendorum hominis figuram sic accedit, ut in eo generando luisse naturam videatur lasciuus, succo in arenis frigidis siccisque reposito, è quo hominis penem fingere meditata sit, afflatu etiam maris fortassis adiutā, cuius vim maximè genitalem esse periti rerum naturalium omnes testantur, & suis Poëtæ fabulis indicant, *τῇ ἀνδρὸς οὐρίῳ ἀποδιδόναι* veribus celebrantes, nempe Venerem è matris fluctibus exorientem, ac emergentem. Posteriore parte velut inter duas prominulas nates, cauum patet, [mauit enim Dalech. cum podice comparare, quàm cum muliebri vulua.] In id cauum, tanquam in scroti fundum, tenue filum subit, bißidum, quo tanquam radice, in arenoso solo dehitur. Quod terræ proximum est, Bulgæ figura, inferiora Phalli operit, extremaque ora lacinia-ta, in apices extantes diducta, vndeque illum amplectitur, rugosi scroti quadam imagine: Bulgæ detractā subest aliud inuolucrum, tanquam elytroceides tunica in hominis testiculis, Superiore angustius, ac minus, Phallum circumdans orbe simplici linea circumeunte, non tamen continuato, sed interrupto rima, quæ veluti duorum testium interuallum ostendit. In tuberculum subrotundum id desinit, radicis vicinum, cui radix inferitur. Inde penis in longum porrigitur, mentula specie, punctis quibusdam notatus, in summo, sub præputio, pertusus, rotundo foramine, quod in extremo hominis veretro fissuram imitatur, quā vrina profluit. Munus summum illud fastigium, & vestit præputium [sic enim aptissime vocari potest] vndeque circumuolutum, cutis plicatilis modo. Extrema parte præputii carnosiusculi rotundus velut apex eminet, fistulosus, pelle circum crispata, humani præputii corrugato fini similis.

Phallus hic Hollandicus pro Satyrio primo Dioscoridis, Matthiolo tribus foliis Rumicis affixis, fuit venditus, prout Ludou. Fumanellus, qui hunc & illum qui ad Matthiolum est missus, spectauit, aperte testatur: facile autem fuit decipi, propter summam vtriusque, antequam è terra erumpat, similitudinem. M. fit autem Matthiolo Satyriosis Dioscoridis primam illam speciem, quibusdam, ut ait, Trifolium dictam, Calceolarium.

Phallus Had. Iunii paulò aliter pingitur apud Clusium sub titulo Gladii seu capitelli Phalli, ex hist. belgica Lobelii cuius hic iconem subiicimus. Inter naturæ miracula, inquit, celebratur, hic Fungus apud Barauios anno 1559. Antuerpiam ad me missus. Similem deinde Septennio post arenoso loco ad Ligeris fluminis ripam non procul Blasii reperiebam Septembri. Copiosè creuit in Hollandiā è radicibus Sparti, diuersis fabulosis aggeribus, Sparto illo rudi confectis præsertim verò is qui Harlemo & Alcmariæ sunt vicini, Sunt (addit) qui asserant frigidissimum illum voluæ coagulatum & lentum mucum valde vitilem esse ad podagram ex humore calido prognatam profigendam: Muscæ valde appetunt hunc Phallum. perinde atque alios fœtidus Furgos.

C. Bauh. pin. Fungus noxijs 38. siue Fungus fœtidus penis imaginem referens: Phallus Had. Iunio: Phallus Barauius H. Lugd. Phallus Hollandicus,

Materiam.

Longitud.

Graue spirat.

Phallus
unde dictus
dubitatan sit Fun-
gus.Homini
pudendo
similisSatyrium
Diosc.
Matth.Trifolium
quorundam
Phallus
Had. Iun.
Lob.

Locus.

Vitis ad
podagram
calidam.

Synon.

C. Bauh.




landicus, Sary-
rion trifolium
Matthioli [cu-
ius non esse Fū-
gum ceruinum
probat H. Iu-
nius] Ponæ It.
& in Balbo: Fū-
gus virilis penis
arrecti facie
Lob. belg. & Ic.
Plantar. tom. 2.
p. 275. Fungus
marinus Dod.
Belg. Fūgi per-
niciosis 23. gene-
ris species 5.
Clusii. *Clusius*
tamen speciem
suam quintam
Fungorum per-
niciosorum

23. generis, à Phallo Had. Iunii separat, quinimò
huic duntaxat, accedere scribit. Quare & nos de
ea seorsim agimus.

Mirabilem hunc Fungum Doctiss. Vir. D. Mo-
chius Medicus & Professor Academiæ Fribur-
gensis, Brigoie propè sacellum in sylua, D. Bar-
baræ dicatum obseruauit, eundemque mihi trans-
misit.

FVNGI PHALLOIDIS GENVS.

CAP. LXI.



Fungorum no-
xiorum 21.
generis 5. Clusio
valde accedere
videtur ad Phal-
lum ad Had. Iu-
nio olim in fa-
bulosis aggeribus
Hollandiæ, O-
ceano obiectis,
obseruatū & de-
cantatum.

Informi autem
pennè figura e-
mergit, tuberis
instar: deinde ru-
pra illa externā
membranā, siue
voluā, stilus exi-
lit pollicari cras-
situdine, digitali
autē longitudine,
penis aut veretri

canini instar, & tanquam vnciali glande summo
fastigio præditus, initio quidem ex atro virescen-
te, deinde nigra, & cellulis quodammodo prædi-
ta, quales ferè in Fungi rugosi vel cauernosi spe-
ciebus conspiciuntur: ea autem suo tempore
expanditur, & striis infernè distincta est. Volua
ipsa cineracei quodammodo est coloris, inter-
dum etiam subnisi: ipse stilus siue coles, initio
albus, deinde *mutatur* & varius, paruisque notis
subfuscis maculosus: fœtidus est hic Fungus, &
iam periturus quodammodo liquefcit, atque in
eramentum dissoluitur, nigro colore tellurem
insiciens. Dicitur etiam muscas eo degustato
interire.

Circa Calendas Octobris, cum secundum vias

cū in lignis putridis, & palustribus locis prouenit. Locus

FVNGI DVO, A SVE APPELLATI,
albi, sed maculati, filuefres perniciosi.

CAP. LXII.

In cædis filuis extremo Augusto crescit Fun-
gorum noxiorum Clusii genus decimum quar-
tum, cuius Clusius Vngaricum nomen intelli-
gere non potuit: sed Germani *Saw rasch* ap-
pellant, cuius nominis causa quoque latet, nisi
quod à sue appellatio desumpta videtur. Eius
autem binæ obseruantur species, magnitudine,
& supinæ partis colore inter se differentes.

Prima inæqualem habet magnitudinem: nam
recenter natæ corpus, vnciā maius non est, fa-
stigiatum, coloris albi fuligine velut insecti, vnci-
alis longitudinis pediculo, minimum autem di-
gitum crasso, subnixum, interdum geminum ex
eodem pede nascens: Adultā triunciale diamet-
rum habet, in orbem ferè circumscriptā figurā,
supernè alba quidem, sed fusco colore infecta,
flauo fastigio: infernè verò pallida, & rufis
striis, à pediculo excurrentibus, exarata: pedicu-
lus digitalis longitudinis & crassitudinis.

Alterius forma, orbiculatæ, & velut circino
circumductæ, est rotunditatis, cuius diameter
trientem latius est, pediculo breui, pollicemque
crasso, prædita, supernā parte candida, cui macu-
læ parvæ fuscæ, & flauescens nonnihil color
inspersus, & oris aliquantulum in infernam par-
tem conuersa: infernā ipsa parte pallidā, fuligi-
nosique striis insignitā.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 21. siue Fungus la-
tus, orbicularis, oris intus conuersis.

FVNGI STERQVILINI ALBI PERNI-
ciosi. CAP. LXIII.

Clusio Fungorum noxiorum est hoc tertium
genus, quod Vngari Gancion: Germani
Muschschwammen appellant, quoniam in sterqui-
liniis primo Vere nascitur.

Vulgaris autem admodum est hic Fungus, pro-
pterea nemini non notus, formæ orbicularis in
plano, veluti circino ductæ, exili & tenui fastus
pediculo, tenui non crasso corpore, candidus om-
nino, & veluti farina conspersus, cum in-
fernè tum supernè, pars tamen auerfa, fuscis
striis, & à pediculo in oras ductis, distincta est.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 11. siue Fungus fi-
metarius in plano orbicularis, candidus: an Fun-
gus prateolis similis Cæsalpino?

FVNGI TRES BVFFONII, PERNICIOSI.
CAP. LXIV.

Mais aut sub Iunii initium prorumpit septi-
mum fungorum perniciosorum genus
Clusianū, quod Vngaris *Bagolt gomba*/Gerth. *Tempus*
Grotten schwammen dicitur, vtriusque linguae
nominibus eandem rem significantibus, nimi-
rum ruberæ vulgò buffonis dictæ fungum. Cuius
tres obseruabat author species:

Vna valde gracili, & plus quàm duas vncias
longo pediculo sultam, pilei vel galeri panē figu-
rā in metam sublatā, vnciali ferè latitudine, o-
rarum verò circiter trientali ambitu, coloris al-
bi fuligine quodammodo infecti, summo fasti-
gio flauescente: interior & caua pars fusca est
profus, & nigris striis, à pediculo in oras du-
ctis, exarata.

Alteram magis orbiculato: & tumente corpo-
re, crassiore pediculo subnixam: cuius super-
na & tumescens pars duas interdum vncias dup-
Gggg

Locus &
Tempus

Synon.

Locus &
Tempus

Descript.

taxat est ampla, nonnunquam etiam tres, modò fulci omnino coloris, ex albo pallescentis, modò flauì fulgine infecti, singuli autem maculis, albis, & nigris summâ parte notati, vt rubetæ coloris, præsertim fuscus, valde referre videatur: pars inferna alba est, leuibus striis subfuscis, à pediculo in oras excurrentibus distincta.

Tertiam reliquis maiorem, & orbiculatæ prorsus in plano figuræ, cuius diameter trium vnciarum est, supernè albam, cui rubescens aliquantulum color est admixtus, & rarè pallescentes maculæ inspersæ: inferna pars quodammodò pallescit, & frequentibus fuliginosis striis, à pediculo minimum digitum crasso, ad extremas vsque oras secta.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 14. siue Fungus buffonius orbiculatus.

FVNGI RANARVM, ALBI, PERNICIOSI. CAP. LXV.

Est hoc Fungorum noxiarum 13. genus Clusii, secundum vias & semitas in cædis siluis proueniens extremo Augusto: quod Vngari *Wselem tereuig omba*, h. e. ad semitas nascentem Fungum: Germani autem *froschen stiel*, quasi ranarum sedem appellant, quoniam ranæ his libenter insidere conspèctæ sunt.

Discrimen

In hoc genere, inquit Clusius, obseruare licet discrimen quoddam, sed illud ex ætate duntaxat proueniens: nam recens nati corpus, ad binarum vnciarum latitudinem non pertingit, & supernâ parte candicans, fuligine quadam infectum est: infernâ etiam eiusdem coloris, sed raris striis, vixque apparentibus præditum: vbi autem adoleuit, maiorem habet latitudinem, quatuor videlicet vnciarum, & in orbem ferè circinatum est, immaculati supernè candoris, nisi orbis centrum pallescit: inferna pars etiam candida est, multis purpurascens striis exarata: pediculus gracilis & longus.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 20. siue Fungus latus orbicularis candidus.

FVNGI QVODAMMODO ORBICVLATI atro-rufescentes perniciosi.

CAP. LXVI.

Tempus

Circa Solstitium æstiuum inuenitur hoc genus perniciolorum Fungorum quod nomen est Clusii, in siluis nascens: quod Vngari *Borfos gomba* / Germani *hohen schwammen* nominant, quia crasso tumente sit corpore: nam satis breui est pediculo, vnciam non multum superante, digitum aut pollicem crasso.

Eius licet binæ videantur species, ætate tamen eas duntaxat differre arbitratur idem Clusius. Constat verò, vt dictum, crasso & protuberante corpore, sphericæ quodammodò & orbicularis figuræ, binas vncias lato in minutibus: in adultioribus autem; tres atque etiam quatuor, vel etiam ampliore, colore supernâ parte ex atro rufescente: infernâ, exalbido, & multis striis rufescentibus, à pediculo ad oras vsque ductis, insignito.

Synonyma

C. Bauh. pin. Fungus noxius 17. siue Fungus orbicularis ex atro rufescens.

FVNGI DVO PERNICIOSI, PRIOR RVBRI perelegantis coloris, rufus alter.

CAP. LXVII.

Locus & Tempus,

Circa Calendas Octobris, cum secundum vias, tum in lignis putridis & palustribus lo-

cis prouenit hoc Fungi genus, quod est primus & secundus Fungus, Fungorum noxiarum vigesimi tertii generis Clusiani.

Primus autem vncialis magnitudinis habet orbem, supernè tumidum & rubri perelegantis coloris: infernè albicantem, fuscis tamen striis exaratum, vnciali pediculo, non valde tamen gracili, sultum. *Alter* verò orbiculatæ etiam est formæ, paulò tamen amplior superiore, longioreque pediculo subnixus, prolem Fungi ab exortu plerumque proferente: supernè rufus, & ad lateritium tendentis coloris: infernè diluor, & frequentibus striis distinctus.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 37. siue Fungi orbicularis in palustribus species 1. & 2. Synon.

FVNGI SVpra LIGNA PROVENIENTES. CAP. LXVIII.

Fungos Imperatus communes appellat, supra ligna crescunt, capitulo conuexo, concavo, profundis striis ac fulcis foliaceis radiato à centro ad circumferentiam: facillimè verminantur: striæ foliæ nigræ: caputella verò spithameam aliquando amplitudinem acquirunt.

Descripti

FVNGI PARVI, VARII. CAP. LXIX.



Fungos paruos omnino caruleos, inuenimus in monte Tarresce prope Masinunster.

Fungus alius paruos, pilcoli superiore parte alba, altera autem ex lutea rubente, cauliculis daorum digitorum supra lignum putridum, mense

Septembri circa balneum mirabile reperitur. Occurrunt & alii ibidem in prato mense Septembri, fungi minimi, lutei, externè viscidii.

Sunt quatuor Fungi pediculo satis breui & crasso donati, ex luteo pallescentes, capitulo siue pileo turbinato.

Inuenimus tandem Fungos multos simul, longis & elatis pediculis non tamen crassis nixos, luteolos, à radicibus arborum putamus, mense etiam Septembri.



fungi parui vndique luteoli, pediculo tenui admodum, ad tres digitos longo, pileolo turbinato, medio Octobri prope stagnum balnei aduinaribilis sub arboribus inueniuntur. Hi Mörbelgardi etiam, præsertim supra montem vicinum, vulgò la Crotte, finiente Aurumno primulam proslunt. In principio

autem turbinati sunt & vix Auellane minoris magnitudinem adæquant, mox expansi assis regii amplitudinem acquirunt, subrus sulcaris striis in orbem radiati, pediculo vnciali. Tota ad tactum viscidii sunt.

Fung.



Fungus præterea parvus albus cum luteola parte, in summitate capituli, visco nitente resplendens, subtus cinereis pilicis, altitudine quâ pingitur à nobis obferuatus est in Ducatu Wirtemb. non lègè à fonte admirabilis, in agris;

exsiccatum, isthinc olim ad se missum, exotici cuiusdam seminis nomine, explorandi gratiâ, an dignoscere posset: vt reperiuntur quædam ingenia, quæ ex aliorum ignorantia laudem capere & venari student.

FVNGI INFVNDIBVLVM REFERENTES;
flauescetes, perniciosi.

CAP. LXXII.

Hoc quod Clusio noxiorum Fungorum decimum genus est: Bis in anno reperitur: Locutus & circa messen videlicet, & vindemiam, in siluis Tempus

proueniens:

Vngari Bèsse gomba, Germani Geyß Schwammen appellant. h.c. caprinum Filigum.

Valde autem exilis est hic Fungus: nam primum emergens, vix vncialis est magnitudinis, interdum singularis, nonnquam geminus, c. binifimul nascentes, ipso fungi corpore minimi digiti vnguam vix æquante, rufescentis coloris, cum adoleuit corpus in vncialem magnitudinem excreuit, inferna parte valde à pediculo striata se se inuertente, ad ò vt superna pars veluti camæ rata & caua reddatur, & cum suo pediculo, paruum infundibulum mentiri videatur:



color flauescit tam externè quàm internè & superna pars iam in vmbilici speciem contracta, rufis maculis est distincta.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 18. siue Fungus minimus flauescens infundibuli formâ.

FVNGI ALBI PILEOLO INVERSO.

CAP. LXXIII.

Fungus hic albus, parvus admodum, vix ad vnciam digiti se attollens, ac etiam multo minor, instar calicis crescit, plicaturis & foliis se externè demonstrantibus, non sub pileolo, vt in reliquis. Pileolus enim inuersus facit veluti scy-

Gggg 2.

FVNGI PARVI LVTEI, ET CLYPEIFORMES albi, lethales.

CAP. LXX.

Quos Lobel. in Ic. Plant. tom. 2. p. 272. Fungos paruos lethales galeaticulos inscribit, de his in hist. belg. p. 306. vt & apud Clusium ait: Vulgares exiles perniciosi fungi passim nascuntur, in agris, pratis, hortis, & veteribus ædificiis. Horum autem, Quidam sunt exiles, in rotunditate oblon-



gunculæ, & præalti, galeculi instar concaui, colore flauo præditi. Alii ampliores, albi aut cineraceis tuscisque interdum maculis notati, infernè aut in cauitate nigri. Sunt & plani vt acetabula, nonnulli etiam parvis similes.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 24. siue fungus clypeiformis minor: Fungorum alterius generis alter Dod. Fungus clypeiformis lethalis Lob. belg. Fungus perniciosus vulgaris Clus.

FVNGVS MINIMVS, SINE PETIOLO, perniciosus.

CAP. LXXI.

Hunc Clusius *divisus* vocat, & omnium minimum esse existimat, vix semunciam altus est, & Autumno præsumque nullo petiolo fultus lignis tabellis puluinis & areolas in hortis ab inuicem segregantibus adnascitur, cineracei, vel exalbi coloris, formâ panè grossum immaturam referens, minimi digiti extremum articulum magnitudine & crassitudine vix æquans, singularis præsumque, vel (quando plurimi) bini, terni, aut quaterni simul coherentes, qui maturi supernâ parte dehiscentes, pleni apparent lento quodam succo, & seminibus, magnitudine quidem seminis Cyclamini, sed exiles Fungulos formâ figuræ exprimentes, cineracei, vt patens, coloris.

C. Bauh. in pin. Fungus noxius 39. siue Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens: Fungus minimus *divisus* Clusii.

Nasci hunc Fungum etiam in Italia, Clusio nullum est dubium: nam meminit eius semen Tom. III.



tellam: sunt etiam maiores altitudinis trium digitorū, & latitudine duos excedentes. Obseruimus mense Septembri in prato loco cliuoso prope wâlde, & in monte Teck.

FVNGVS PVLVERLENTVS

dictus Crepitus lupi.

CAP. LXXXIV.

Descriptio



Nullo ferè con-
spicuo pediculo
nititur, glome-
rata rotundi-
tatis, luglandis
magnitudine,
& minoris &
maioris, primò
albà cute, &
medullà iri-
dem albà, còs-
picuus, postea
cute exalbidà
uel liuidà, me-
dullà, quum
corrumpitur,
in tenuissimū,
siccissimū-
que puluerem
futei coloris,
abante: calca-

tus crepitum edit, & fumum puluerulentum e-
mittit. Eius autem pulvis grauem & fœtidum
spirat odorem: (Imper.) nec villo pacto est ef-
fulentus [Ruell.]

Clusio est Fungorum noxiarum genus vice-
simum-sexum, cuius tres obseruabat differen-
tias, magnitudine & nōnihil etiā formā inter se
discrepantes, in omnibus prouinciis frequenter
in siccioribus pratis nasci tradens.

C.B. pin. Fungi noxii 42. siue Fungi rotundi or-
bicularis species 1. Fungus ouatus Crepitus lupi
Hermol. Trago & Lonicero, qui videtur aliud
Fungi genus cum hoc confundere. Fungus or-
bicularis Dod. Fungus glomerata rotunditatis
Lobel. Lupi crepitus Matth. Cast. & Columnæ.
Peziza Plinii in pratis, quem esculentum dicit,
Cæsalp. Imperato dicitur vesicarius Fungus, a-
liis Ouum Lupinum.

Germani wolffsfûrg h.e. Crepitum lupi,
weiber fist/i.e. muliebrem crepitum, & Bûben-
fist: Galli Vesse de loup: Ital. Vesie de lupo: Vngari
Doffeteg, appellant. Helfrico in nomencl. dicitur
græcè κρεπίς τῷ λυγῷ h.e. Crepitus lupi, quod
nomen etiam apud Herbariorum vulgus ob-
tinuit. Nos Mense Septembri & Octobri ob-
seruauimus in siluis accedentem ad magnitudi-
nem pilæ palmaris, nondum in puluerem con-
uersum, album externè & internè.

Vires
yus

Inueteratis & fluentibus vlceribus insper-
gitur: ea namque, teste Trago, desiccatur, & quodā

citiùs curentur, efficit. Idem siccatus leuissimus
& subtilissimus in podicem insertus admodum
fluorem hæmorrhoidalem sistit, vii Platerus par-
te 3. suæ praxeos docet.

FVNGVS MAXIMVS ROTVNDVS

puluerulentus, dictus Germanis Psofist.

CAP. LXXXV.

Psofist nomine Germ. nūcupatus Fungus glo-
meratus tantā assequitur interdū magnitudi-
nem, vt caput humanum facili æquet, aut etiam
excedat, cute membrana satis firma [quæ in prin-
cipio ex albo cinerea, mox cum tempore liuida
redditur] vndique cinctus, substantiā partim
coherente sed rara, eorum instar, quos excipien-
dis silice chalybeque excussis scintillis præpara-
tos vendunt, colore etiam persimili: sicci leuissi-
mi sunt, vt caput humanum singuli æquantes
vnciale pondus non excedant.

Est autem hic Clusiani noxiarum Fungorum
altera & tertia species generis vigesimi sexti.

Lonicer. huius meminit sub titulo ouarum
Fungorum, non tamen distinguere videtur à cre-
pitu lupi, licet ad magnitudinem capitis excre-
cere dicat. Hunc sequitur in hist. germ. Matthio-
lus.

C. Bauh. pin. Fungi noxii 42. siue Fungi rotun-
di orbicularis species 2. & 3. an Peziza genus in
siluestribus aliquando humani capitis magnitu-
dine, quod sine periculo esitatur, Cæsalp.

Fungum Germanis Psofist dictum marinis
Spongis annumerat Encel. de re metall. libr. 2.
cap. 45.

Perellegantem huius generis Fungum vidi-
mus Montbelgardi iuxta patibulum in den-
sissimo dumeto: sunt qui pro cerro asserant ve-
tustiores, & iam iustam maturitatem transcen-
dentes, præstare ad cõpescendas sanguinis eru-
ptiones etiam periculosissimas, quo & ipsi mul-
torum cum præsentī salute vti sumus, in eo ipso
casu.

FVNGVS OVATVS.

CAP. LXXXVI.

Non aliàs mihi visus quā ex Alfatæ Schvveg-
haufen arce Dom. Waldnerorum à Freud-
stein cuncti Butzwiller, mense Aprili in pratis fun-
gus, oui ferè magnitudine, & figura ex rotundo
oblonga, albus, quasi hirsutus, pediculo fultus
longiusculo.

FVNGVS ROTVNDVS ALBVS.

CAP. LXXXVII.

Fungus est [vt describitur à Cordo in sylua
Obi.] grandis piræ instar, rotundus, foris
pallenti cortice, intus candida, succosa, dulcique
carne constans, non in puluerem transiens, sed
hyemis iniuriâ, Peponum exemplo, putrescens:
nascitur Vere in eadem silua ex meris arenis.

FVNGVS OLLVLARIS VEL BOTRYOI-
des fimiarius.

CAP. LXXXVIII.

Fungus botryoides vel fimiarius Montbel-
gardi 10. Decembris anno 1606. in equino
fimo repertus fuit. Vuarum autem albarum,
amplarum, crassarum & longarum, veteribus
Græcis βουβας dictarum, similitudinem quo-
dammodo refert.

Cum verò Basilicæ anno 1608. Octobri mense
cum doctis Medicinæ studiosis deambulatam

Descriptio

Locus
Matth.
tatur.Synonyma
C. Bauh.

Locus

Vires

Locus
Tempus

Locus

Tempus

iussim, inueni ad Rheni ripam iuxta finitum, Fungos ollares plures simul iunctos, & quosdam contractos, quorum vnum detegi, qui erat substantia lubrica, molli, globosus, concauus, magnitudine mediocris pomiti superiore eiusque arte, circulari foramine apertus.

REMEDIA ADVERSVS PERNICIOSOS Fungos C A P. LXXIX.

Quia haecenus de perniciosis Fungis sermone habuimus, non abs re nos facturos existimauimus, si remedia aduersus eos nonnulla hic subiiceremus.

Auxilio est omnibus Fungis, inquit Dioscorides l. 4. c. 78. nitri, aut lixiui, cum muria acida potus: aut thymbræ, aut origani decoctum: aut gallinaceum simi cum aceto potu aut melle copiose delinctum. Probè verò alunt, & agrè dissoluantur, & plerique vna cum excrementis integri redduntur. Fungi, inquit idem l. 6. c. 23. partim genere, partim copia laeditur. Omnes autè inducunt suffocationes, strangulationibus per laqueos similes. His statim communibus auxiliis opulari oportet, per oleum ad vomitum cogendum. Mirificè verò opem sentiunt à lixiui cineris sarmentorum Vitis, aut lignorum Pirastri potu, cum posca & sale, aut nitro. Sed & Pirastri fructus aut folia cum Fungis decocta, strugulant vim illam auferunt, eistaque eadem auxiliantur. Iuuar & sterus gallinaceum cum posca bibitum, itemque Aristolochiæ aut Absinthii drachma vna cum vino: insuperque etiam melle, seu in cibo sumptu, seu ex aqua potum. Sic & Apisstrum cum nitro, Panacis radix & semen in vino; fax quoque vini cremata cum aqua, & atramentum lutorium ex aceto, denique Radicula, Sinapi aut Nasturtium esu profunt.

Fungi à venenatis bestiis atrosi non solum suffocant, inquit Paulus & Aecius sed etiam vlcerant intestina. Quare dandum est Absinthium largum, & ficuum & Origani decoctum, & aqua multa. Conducent etiam vomitus, & solum calidum, & cruda hordeacea farina præcordiis imposita. Nouit quendam Galenus, cui post Boletorum non satis elixorum [qui innocentissimi esse putantur] vsu largiorem os ventriculi pressum, ac grauatum, coarctatè fuit, diffillemque habuit respirationem, & in animi deliquium incidit, sudoremque frigidum sudauit, ac demum seruari agrè, sumptis iis quæ humores crassos incidunt, potuit. Cuius generis est oxymel ipsum per se, & cum Hyslopo & Origano ipsi mediocriter incoctis. Is enim tum hæc sumpsit, tum nitri spumam ipsi insperfam: post quæ Fungos quos comederat, vomuit, qui iam quodammodo in succum pituitosum, frigidumque admodum ac crassum erant mutati.

Contra venena Fungorum laudantur passim apud Plinium, Cnicus siue Arctæstylis, & Piorum ligni cinis, piraque ipsa, Raphanus ac Sinapi. Porrum scititum comestum, semen & succus Brassicæ bibitus. Item Brassicæ siluestris, Vriticæ ac Myrti semen in vino potum. Ruta siue in potu, siue in cibo. Lilii radices & Folia Myrti ex vino trita & pota. Absinthium ex aceto. Mel, Vinum merum, & vini fax pota, sed magis cruda. Cimolia creta ex posca pota. Gallinarum simum, duntaxat candidum, in Hyslopo decoctum, aut Mulso. Muli denique piscis recentis è capite cinis.

Conferunt quoque Fungis & Tuberibus pernicio-
Toin. III.

ciolis, & medicamen de Assa, & Diattonipiperon, & sumere in potu piper cum vino veteri.

Quod si quis Fungos vel malè coctos, aut alioquin noxios deuorauit, & inde stranguletur, aut torminibus molesteretur, eum vel Agarici per se, aut pilularum de Agarico drachmam è vino bibere iubet Tragus, vt lanetur.

Tradunt alii præter hæcenus dicta, eum qui strangularis, aut inflationes ex immodico Fungorum esu profectas fenerit, Leuistici aut Angelicæ radicem in puluerem redactam, è vino sumere, aut Raphanum esitare, aut eius succum: aut Absinthithes vinum potare, debere.

Prodest, inquit Matthioli, mirum in modum Theriaca, & Mithridatis antidotus, ex acerrimo aceto pota, vt ex oxymelite, aut ex aqua vitæ vocata: quam obrem quinta essentia nostra theriacalis, in Fungorum malis mirificam fert opem. Prætulit ad hæc Auicenna calida quæcunque aromata: cuiusmodi sunt Diapipereos, Diaciminu, Diagalanga, Diamoschum. Conciliator potandum exhibet magno iuuamento vinum optimu, in quo conferbuerit piper, offertque subinde Allium crudum deuorandum. Id quod vniuersa ferè rusticorum turba etiam facit, quæ [vt Galenus ait] Allio Theriacæ vice plerumque vitur.

Omnia tamen hæcenus enumeratorum remedium aduersus Fungorum malignitatem atque perniciem primu auxiliant vomitiones quocunque modo omni celeritate excitata.

DE TVBERIBVS. C A P. LXXIX.

Nihil aliud sunt Tubera, quàm sine caule, sine Descipulis, magnitudine variâ, pugillari interdum, aliàs



Ingländis, Castaneæ, aut Auellanae, tuberculis extantibus inaequales, externâ superficie rugosa & nigra, tubstantia albâ, consistentiâ carnis castaneæ, gustu satuo, odore non nihil graui.

Dioscoridi Tuber [id est] Disfor. & Galeno. sic vocat & Galeno. Galenus] radix est solum rotunda, sine folio, sine caule, flaua.

Theoph. l. hist. 9. Tubera radice penitus carent.

Tuberum descriptio euidenior est apud Plinium lib. 19. cap. 2. Et quoniam, inquit, à miraculis rerum cepimus, sequemur eorum ordinem: In quibus vel maximum est, aliquid nasci aut viuere, sine vlla radice. Tubera vocantur hæc, vndique terrâ circumdata, nullisque fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtrique extuberante loco, in quo gignuntur, aut rimâ virgente (agente, cornu) neque ipsa terræ cohærent. Cortice etiam includuntur, vt planè nec terram esse possumus dicere, neque aliud quàm terræ callum. Excedunt sæpè magnitudinem mali Cotonei, etiam librali pondere. Duo eorum genera,

Gggg 3

Disfo.

Galeni.

Remedia
Pliniana
contra Fungos.

Arenosa, dentibus inimica, & *Altera* lyncera. Distinguantur & colore rufo nigroque, & intus candido. Laudatissima quæ in Aphrica crescunt. An ne vitium id terræ? neque enim aliud intelligi potest. Malum ne id ea protinus globetur magnitudine, quâ futurum est? & viuat ne, aut non, haud facile arbitror intelligi posse. Putrescendi enim ratio communis est iis cum ligno. Lartio Licinio prætorio viro iura reddenti in Hispaniæ Carthagine paucis his annis scimus accidisse, mordenti tubæ, vt deprehensus intus denarius primo dentes inflecteret. Quo manifestum erit terræ naturam in se globari, quod certum est ex iis, quæ nascuntur, & feri non possunt.

Varietas

Tubera illa solum videtur cognouisse Dioscorides, quæ flauescens radices sunt: sed nigra tubera, quorum maximus prouentus locis Apulix finitimis, quæque in dictorum cænas audissimè expetuntur, non nouit, vt Marantha meth.lib.1.cap.10.concludit.

Imper.
Tuber.
triplex.

Imperato Tartusi [Tubera] è genere vegetabilium sunt, figurâ inæqualiter globosa sub terræ cortice. Substantia eorum callosa est, tenera, nutritioni apta. Crescunt locis arenosis, & intra stirpes. Nostratia vt plurimum ad melonum crassitiem atcedunt, cortice tecta nigro, scabro, atque rimoso: substantiâ internâ colore lacteo, sapore communiter grato. Reperiuntur etiam quæ arenam continent, aut lapillos, aut aliam materiam. Ratio cur hoc eueniat est, quod [de hoc supra Plinius] principium generationis eorum, est humor qui cuiusmodi res obducendo consistentiam acquirit, atque ita crescit. Est & aliud tuberum genus, alibi nascentium, quorum superficies leuis, pallida, magnitudo minor, gustus gratus. Dignoscuntur Tuborum loca natalia ex rimis quæ in terræ superficie spectantur.

Matth. tri-
plex

Matthioli duo Tuberum in Romano agro haberi genera prodit, quorum alteri candida, pulla vtrò alteri pulpa subest: rimosis vtri-que cortex ac niger. Addit & tertium genus in Ananienfi & Tridentino tractu proueniens, læui cortice, colore subrufo, cæteris longè minus insipidum & gustu iniucundo: Tubera autem qualia pingit Matthiolus, talia primo loco in tabella exhibemus. Lobelii in l.c. Plant.tom.1.p.276. Tuberum effigies à Matthioli figura diuersa est. Eius autem Tuberum vnum secundo loco depingimus, simile Tuberibus terræ Tab.

Geranium
Theoph.
Athenæus.

Cæterum, ostendit Athenæus lib.2.cap.22. Tubera dici Theophrasto Geranium (Quærit Gesn. lib.3.de auib. in Græc. an Tuberi appellatio Cranii melius conueniat propter rotunditatem. Ait autem apud Theophrastum græcè legi γεράνιον, & Athenæum pro ea voce posuisse γεράνιον. Hydnor porrò esse quod aliqui Aschion vocant, & Athenæus γεράνιον:] & vnum genus vocari Mison, aliud Istum. *Tubera*, inquit, sua sponte ex terra nascuntur, locis præcipuè arenosis. Theophrastus Geranium nominat. Tuber apud Cyrenem nascens, quod Mison appellant, videtur valde suauis, & carnis odorem habere: quod in Thracia nascitur, Istum vocatur. De his etiam proprium quiddam narratur: dicunt enim, cum aquæ autumnales & magna tonitrua fiunt, quod magna nascuntur, atque cum maximè maxima. Biennium non absoluunt, quamuis annum viuunt. Vlus eorum & vigor est, Vere præsertim. Sunt qui etiam seminis principium hæc habere arbitrentur, quando in Mytilenæorum littore

non prius nasci comperit, quàm pluuialis aqua semen ex Tiaris derulerit, is enim locus est in quo plura nascuntur in littonibus præcipuè, & vbi regio sit arenosa.

Porrò Tubera Latinis [inter alios Hermol. Synon. Ruell. Marcello, Ryffio, Lonc. Anguill. Lac. Corn. Val. Cordo. Matth. & Amato in Diosc. item Dod. Casalp. Lob. H. Lugd.p.1585. & Castori. Tuber J. C. Bauh. pin. Tubera terræ Tab. & Ger.] dicta, græcè vocantur ἵδια ab imbribus, & ἵδια à rumore, ab ἵδια, tumore. Arab. *Ramesh* *Alchamech*, *Tamer* & *Kema*. Germ. *Erde Morchel*. & quibusdam *hirschrünst*: alii tamen Ceruicolum sic vocant, de quo postea. Dicuntur & alicubi *Grublein*. Gall. *Truffe*. Ital. *Tartusi*, *Tartose* & *Tartusola*. Hisp. *Turmas de ricara*.

Aequiuoc.

Cæterum ab iis Tuberibus alii sunt, qui Tuberes arborum fructus dicuntur, & à Plinio lib.15.cap.14. describuntur sub Tuberis ferici appellatione, de quo lib.1. cap.1. de malis fuit tractatum. Tuberum verò appellatione donantur & sequentes plantæ, de quibus in variis huius historiæ Libris egimus: scilicet: Nuciperica, Nuxhendan. Fungi supra lapides. Tuber Peruianus. Manobi, torte Trasi genus. Pappas. Okrepnau. Fungus. Fungi cauernosi siue Merulii. Arachidna. Vitis nigra Matth. Tuber & Sigillum Mariæ. Iulubæ. Guaiacana. Azadarcheni. Cyclaminus. Cerui boletus.

Pommes
Suzines

Vt autem ad Tuberum historiam absoluen- Locus & dam redeamus: Tubera ea quæ peculiari Tempus, ter à Plinio traduntur, trutinâ opus habere videntur. Siccis, inquit, hæc ferè & sabulosis locis fruterosisque nascuntur. Quum fuerint imbres autumnales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maximè è tonitribus: nec ultra annum durare feruntur. Tenerima autem verna esse. Quibusdam locis acceptantur riguis & feruntur, sicut Mitylenis. Negant nasci, nisi exundatione fluminum, inuectio femine ab Tiaris. Est autem locus in quo plurima nascuntur. Gignuntur etiam in Acarnidia, subdit Athenæus, circa Lampscum in Alopecomæso, & in Eleorum regione. Ludouicus Rom. part. nauig. lib.1. cap.7. scribit Damasci Tuberum ingentem esse vbertatem: nam nonnunquam viginti quinque aut triginta Camelos Tuberibus onustus illic conspici, & tamen intra triduum vendi: aduchi ex Armeniæ montibus, ex Asiaque minore. Tandem Author est Matthiolus, Tubera numerosa in Hertruria à rusticis effodi, quod à magnatibus maximè expetantur in cænis. tonitantis verò & vbertatis laudem sibi meritò vendicant quæ in syluula quadam Hornburgensi Vuirtembergensis dominii in Alsatia proueniunt.

Vires
vius.

Tubera & cruda & cocta in cibum venire, testatur Dioscorid. & Galenus 2. simpl. Tubera omnibus nota ait, & in cõpage ipsorum terræ naturam præualere, exigua quadam partium tenuitate ammixta. At libro 2. de alim. inter radices aut bulbos, quibus nulla manifesta qualitas ascribitur, annumerat. Proinde vicitur ipsis ad suscipienda condimenta, quemadmodum etiam aliis, quæ qualitatibus exortia, & innoxia ac aquosa in gustu habentur. Est autem omnibus his commune, vt neque alimentum quod inde in corpus distribuitur, eximiam aliquam vim habeat, sed subfrigidum sit, aut aliquando crassius. Martialis Poeta secundum à Boletis locum ipsis tribuit,

Rumpimus Alricem tenore de vertice terram
Tubera

Diphilus Tuberi naturam n̄ facile digeri affirmat, ac bonum habere succum, extenuare, facileque excerni: inter ea veluti & inter Fungos, quādam lethifera esse. Cum pauco vino & aqua Tubera Montbelgardi coquunt, exsiccant, & demum cineribus calidis imponunt, & calida mensis inferunt, detractoque cortice, ac pipere excepta, non ingrata gustu, edunt.

TVBERVM GENVS QVIBVS DAM

Cerui boletus. CAP. LXXX.

Descriptio



Boletum & Tuber ceruinū appellant Tubergenū, magnitudine Iuglādis, interdum Auellanae & minore, tuberosū & inaequale, substantiā inter duritiem & molliē mediam cortice instructū ex cineracco ad fuluū non nihil inclināte, superficie granulata, cui callus subest atro-purpureus cā quadiximus consiltēria, qui

recentior subadstringit, exsiccatu adstrictione amissa dulcedinem leuissculam linguae offert, medullium fungosa quādam substantia ex albedo purpurascens occupat, texturā perquam rarā, vt similiter araneorum telis conuoluatur, & in nihilum stilo vel mucrone cultelli terendo abeat, relicto quā abscedunt calli latera spacio i-nani. Siccum & iam dudum repositum nihil aliud continere comperitur quā puluisculum vt in Crepitu lupulēd fardiorē, sapore adstringente nonnihil, colore fuliginoso, nulla relicta in medio cauitate, cortice circumiecto satis crasso, durissculo.

De hoc Tubere subterraneo (inquit Matth.) quod ceruinum Boletum Bohemi vocant, nulla apud antiquos extat memoria. Huic eadem ferē facies inest, quam in ceteris spectamus Tubertibus, globosa tamen, & inaequalis. Extima cuticula subnigricat, carnosa verō & ipsa fungosa substantia albicat. Sunt etiam qui genus aliquid reperiri dicant, erectae virilis mentulae formā, adeo vt altera parte detecta glans, in altera globuli quidam testiculos referentes conspiciantur. Hunc autem Phallum non esse diximus ante ex Had. Iunio.

Dicitur Fungus ceruinus siue Cerui boletus Matth. germ. & Lonic. Fungi ceruini. Boleti officinarum Cordo in Diosc. Boleti ceruini orbiculati Thallio: Tubera ceruina Lob. hist. belg. & Ic. Plant. tom. 2. p. 276. item que C. Bauh. pin. cui & Tuber alterum. Sic dicta autem sunt, inquit, quia reperiuntur iis in locis vbi cerui libidinem suam exercent: quamuis Cordus inuenerit etiam in prae-rup-tissimis montium siluis, quod ne damā & rupicaprae quidem peruenire possunt, ne dum cerui. Sanē repertus est, subdit Iordanus, iis locis, vbi ab hominū memoria, nullus vnquam vi-

sus est ceruus. Ad Trenzinium nobile Hungariae oppidum circa Carpathi iuga frequentissimus montuosis locis, syluis opacis, vbi licet ceruos reperias, non tamē eorum tanta copia, quā plaustris Fungorum satisfaceret, siquidem vera censenda quae de eius generatione scribuntur à Matthiolo, dicente: Fungum hunc Tuberum vulgariū modo sub terra nasci affirmant venatores, vbi ceruino semine in coitu inficitur solum. Id quod plerumque fieri solet exempto ē vulua genitali, adhuc seminis aliquid continente, maris impetum fugiente femina. Hunc fortasse inuenire nemo posset, ni cerui ipsi locum quodam statuto anni tempore ostenderent. Scalpunt enim naturali quodam instinctu ducti anterioribus pedibus locum, vbi globosus Fungus sub terra delitescit, quod olfactu percipere eos affirmant. Spirat enim Fungus graui odore praesertim recenter effossus. Qui secreta haec norunt venatores & rustici, qui siluas frequentant, loca diligenter obseruant ceruinis pedibus diducta, effossique scrobe, Fungos eximunt, & pharmacopaeis vendunt, qui dissectos in particulas, & filo tractos siccant, postea in vmbra seruantur in medicum vsum.

Vires & vltus

Hunc Fungum, quamuis in ciborum vsum haecenus non venerit, magnis tamen exornant elogiis, eo enim iis in medicamentis vtuntur quā venerem mouet, siquidem ad hoc plurimū nullū valere putant, & praesertim, teste Matthiolo, qui humani genitalis faciem refert. In quem vsum sicci puluerē ex dulci vino propinant, drachmā vel sesquidrachmā pondere. Lactis vbertatem hunc etiam asserere aiunt ex pitana vel muliebri lacte potum, sed valentius id agere si longi piperris aliquid addatur. Suffitus oculos Fœminarum locos referare tradunt, & vuluae strangulatus auertere. Non desunt superstitiosae mulierculae, quae iis abutuntur in amatoriis poculis quibusdā, prius admurmuratis incantationibus. Affirmant praeterea valere ceruinum Fungum ad epota venena ex mero haustum, quin etiam ad venenosorum omnium mortum, non modō potum, sed etiam illitum, exalfacere ex odoris graecolentia, quispiam facile iudicabit. Haecenus Matthiolum. Cordus non ait verisimile esse Fungum ceruinum venerem stimulare, cūm frigidum, pituitosum, crudum & malignum succum humano in corpore gignat. Quae enim venerem accendere debent, contrarias facultates & qualitates habeant, necesse est. Nec verō similia sunt quae scribit Dorstenius. Si mulier accipiat Cerui boletum ad magnitudinem vnius pisi, & dimidiam partem manducet, & alia parte vmbilicū oblinat, statim absque dolore parituram: si verō imprudenter grauidē vtantur, magnum illis malum inde oriri posse.

TERFEZ AFRICANORVM, TVBERIS
genus album. CAP. LXXXI.

Terfez Africanorum magis propriē radix quā fructus dicitur, inquit Leo Afric. lib. 9. Crescit locis calidis in arena, & quidem copiosē iuxta urbem Sela. Abundat in Numidiā desertis.

Locus

Simile autem est Tuberi sed maius: cortex ei albus: reperitur magnitudine nucis & aurantii mali. Secundum opinionem Medicorum, qui Camba nomināt, proprietates ei refrigerandi. Arabes deloquantur eius esu, quasi esset iaccharum, & bona ratione: certē prunis impositum, postea mundatum, & pingui iure aspersum, singulari & terra

Kotū

delicatus est cibus. Edunt etiam coctum cum aqua aut lacte.

Credidit Dalechampius Terfez siue Tuber album Africanorum, esse Mison Plinii & Athenæi. De quo hic ait, Misi [*αἰοῦν*, Dalech. *Mison*] sub terra gignitur. Eius natura atque generatio eadem est, quæ & Tuberis: circa Cyrenum inuenitur, & suauissimi gustus esse creditur, odore carnis lib. 2. cap. 31.

Simile Tuberibus est, inquit ille l. 19. c. 3. quod in Cyrenaica provincia vocant Misy [Mison, Turneb.] præcipuum suauitate odoris ac saporis, sed carnosius.

CRANION ET CERAVNION veteribus.

C A P. LXXXI.

*Cranion
Theop.*

Theophrastus lib. 1. cap. 9. *κράνιον* is annumerat, quæ omnino non habent radices. Plinius loco citato simile quoque facit Tuberibus, quod in Thracia Ceraunion vocant. Quæ autem peculiariter de Tuberibus traduntur, lege proprio capite.

Athenæus dicto loco refert Theophrastum scripsisse Ceraunion (*κράνιον* quidam nuncupant) læui cortice regi, ut Tuber, &c. Hic autem Athenæo contrarius est Dalechampius, dicens, Ceraunion nigrum tuber, velut ambustum fulmine: aut Tuberis aliud genus in fortidum & nigrum puluerem euanescentes; at vtriusque huius Tuberis verrucosi, quomodo læuis cortex intelligi possit, docti viderint. Apud Theophrastum nusquam scriptum memini Tuberum læuem esse corticem: fortassis legendum fuerit læui cortice regi Fungum & Peziten: scabro Tuber & Ceraunion.

*An Cerui
boletus.*

Considerandum an Cerui-boletus non possit reduci ad Cranion Theophrasti, si læui non sit cortice.

ARACHIDNA IN GENERE ET Aracoides. C A P. LXXXII.

Theop.

Arachidnam & quod Araco simile est [*ἀραχιδνά, καὶ τὸ ὅμοιον τῷ ἀράκῃ*] ostendit Theophrastus lib. 1. cap. 11. *Ἀράχης*, inquit fructum ferunt sub terram, non minorem superno [eo qui in supernis plantæ partibus nascitur.] Pars ipsa carnosa, radicem simplicem (ynam) crassam, altius infingendam [in altum demissam,] mittit: cæteras verd, quibus insidet fructus, tenues (tenuiiores), ac summo cæspite [in summo, & multipliciter filas] coherentes agit: loca arenosa potissimum amant: neutrum foliagerit, neque foliis quicquam simile: sed quasi binorum fru-

ctuum partibus inter se oppositis, foecunda potius extat, quod mirum profecto est: hæc Theophrastus.

Plinius lib. 21. cap. 15. inter herbas, quibus *ϕύμα* tumentur in cibus, horum meminit, inquit: Arachidna quidē & Aracos (Arachidna & Atachoides, Theoph.) cum habeant radices ramosas, ac multiplices, tamen nec herbam vllam, aut quicquam aliud supra terram habent.

Sunt & alia, præter Tuberā [inquit Hermol. in Diosc. sine folio, aut herba, aut caule, supra terram, cibo idonea, in Ægypto maximè, ut Arachidna, & quod Araco simile vocatur à Theophrasto: à Plinio Arachidna & Aracos.

Rob. Constant. in Lexico Arachidnam commemorat ex Theophrasto & Plinio, quem erroris accusat, quod Araco Lentis vitio perperam tribuat, quod Aracoidi, & plantæ Araco simili, erat assignandum. Sed nec ipsemet quidem indicat quam plantam intelligat.

Pandectarius sibi contradicit, dum Arachidne arborum ait habentem radices ramosas ac multiplices, & postea negat habere folium, nec herbam: quomodo arbor denique habebit herbam?

Gelin. in cat. dicitur Aracos, fructus Plinio radicibus solis, nec vlla superficie confatis: *τὸ ἀράχιν, ἀραχιδνά, & ἀραχιδνά*: Aracoides, Arachidna, vel Arachidna fructu vltimo: *ἔιν* & *ἔγυπτις* *ἡ γωμάδα*.

Arachidna autem nomine apud authores donantur etiam Chamabalanus leguminosa: Arachidna Belli: Trasi siue Dulcichini: Dentaria aphyllis: Fungus: Tuber terræ: Papas Indor.: Manihot: Aracus: Batatas: & Igname.

OVITON ET OVIIGON VETERIBVS.

C A P. LXXXIII.

Theophrastus author est lib. 1. cap. 1. illud *ὄβιον* quod in Ægypto, *ὄβιον* [*ὄβιον*, al. *ὄβιον* & *ὄβιον*] vocatum, fructum sub terra parere. Eodem libro cap. 10. *ὄβιον* inter radices quæ sub terra sunt, recenset, & radicem esse negat. Tandem cap. 11. ait, eius quod in Ægypto vocatum est *ὄβιον*, folia quidem esse magna, & germen ipsius breue: ipsam vero radicem longam & esse tanquam fructum, Excellere autem, & edi, colligereque, quando annis defluerit, coronantes aras Deorum.

Cæterum, ut inquit Dalechampius, malè Plinius reddit lib. 21. cap. 15. *ὄβιον* Theophrasti Oetum quod Indi & Æthiopes, apud quos plurimum provenit, adhuc vocant *Hetich*, voce corrupta. Depingit hoc Theuetus, quomodo describit Theophrastus, cuius verba non fideliter idem Plinius exposuit, id quod etiam Solerius animaduertit.

FINIS LIBRI QUADRAGESIMI ET VLTIMI,

atque adeo

TOTIVS HISTORIAE VNIV. I. BAYHINI.



APPENDIX

AD ALIQVOS TOMI TERTII

HISTORIAE PLANTARVM LIBROS

SVBNECTENDA LIBRI VIGESIMI OCTAVI CAP. 120.

Galeopsis siue Vrtica iners minor, folio caulem ambiente.



Galeopsis hæc species minor, planta sesquipedalis: interdum cubitalis, caulibus quadratis, infirmis, non nunquam surrectis, sæpius humi spatis: folia primum protrepentia pediculis donata, similia foliis Galeopsis minoris, rotunda fere, serrata: alia in superiori- bus caulium

partibus oriuntur, bina, immediatè caulibus adherentia, perfoliata: ferè modò caulem ambi- entia, rotunda, hirsuta, profundè crenata, & cus- pa, odore minis fortido quàm præcedentes Galeopseos species, sapore nullo eccellente: flores inter folia ad nodos verticillari caules, & eorum ramos, ambiunt: purpurei, hiantes, & caliculis ob- longis, hirsutis, multifidis: radicem demittit simplicem, rigidulam, fibratam.

Locus & Tempus

Descriptio

Est hæc Dod. gall. Vrtica fortida secunda species. Lobelio in Ic. Plant. p. 463. Morfus gallinæ folio Hederulæ alter. Figura placet, non autem ritulus, qui huic plantæ non conuenit, ceu & in- scriptio Tabern. quæ Alines speciem facit. H. Lugd. p. 123. vocat Balloren crispam, & Coronopum quorundam. Sed rectius C. Bauh. phyt. Lamium s. siue minus folio caulem ambiente: Schvvenckf. Lamium purpureum minus.

Montpelii copiosè prouenit, & circa Mont- belgardum in agris: Geneuæ passim abundat in hortis, mensè Februarii virens & florens: Basi- leæ Maio in hortis, itemque agris quæ itur Rie- hen, & extra portam S. Albani ad Rhenum: Ve- ronæ quoque hanc obseruauit in theatro & circa vibem.

Galeopsis siue Vrtica iners magna fortissima.

Vrticæ radice nititur: caules cubitales & ses- quipedales, quadrati, hirsuti, inanes: non- nihil circa articulos rubentes: vbi & folia bina aduersa, Vrticæ, maiora, perquam acuminata, innocenti lanugine obsita, in ambitu serrata, ad- modum fortida: eodemque loci & ramulis in quos diuiduntur caules, exoriuntur: flores in spica per verticillos digesti, oblongi, tenues, cu-

collati, colore purpureo, concoloribus fibris, la- bello ramentis albis lineis picturato.

Tragus Herculeam Plinii esse arbitrat; Thallio dicitur Vrtica fortida maxima *poppeu- dæus*. C. Bauh. phyt. Lamium 6. siue maximum siluaticum primum. Schvvenckf. Lamium sil- uaticum spicatum, grauissimo & ingrato odore, germ. *Scharlachnessel* / *Gottes Verges* nonnul- lis.

Passim in siluis prouenit circa Montbelgar- dum, Tigurum. Basileam & Geneuam, florens Junio, Iulio & Augusto.

Galeopsis maxima flore magno rubro.



Cubitali cau- te, interdum etiam maiore, quadrangulo, crasso, secun- dum radicem frequentibus gi- niculis prædita, à quibus bina semper inter se opposita nascun- tur folia, Vrticæ folius haud absi- milia, per oïas similiter crena- ta, sed longe ma- iora, palma- remque ampli- tudinè sæp sumè superantia, hirsuta quidem, sed non mordacia: à me- dio caule sursum

versus, ad singulos nodos, orbiculatim feni, o- ctoni, nonnunquam deni nascuntur flores, non simul, sed successuè sese explicantes. Lamii flo- ribus multò maiores, saturè rubri & tanquam purpurei, galæ instar hiantes, labro inferiore [cuius laciniatæ oræ] b fido & frequentibus ad latera barbulis prædita, interiore parte purpu- reis, & candidis lineis dep-cto, quatuor flammis cum stilo sub galæ latentibus, odore grauif- vi tota planta, si teratur, gustu etiam insuauis & amaro: laciniata *vascula*, deciduis floribus, quæ- terna *semina* continere deprehenduntur Molu- cæ similia: radix crassa, fibrosa, perennis, sin- gulis annis augetur, pluresque stiones profe- retens.

Closius descriptionis author vocat Galeopsin maximam Pannonicam: C. Bauh. phyt. Lamium 7. siue maximum seu siluaticum secundum.

Frequentem obseruauit idem Closius in non- nullis syluosis Pannoniæ montibus, Maio mensè florentem, & in hortum translatam qui confer- uauit.

h h h h

Galeopsis angustifolia serotina.

Descriptio

Galeopsis species hæc radice nititur geniculatâ, reptante, adeoque & per fibras è caulium geniculis demissas denudè radicitur: caules duorum aut trium cubitorum altitudine, modicè rubentes, hirsuti, asperi, quadrati, inanes, folia ex nodis profertunt bina ex opposito sita, Lysimachia rubiè spicata Lobelii, angusta, acuminata, hirsuta, mollia, exceptâ aperi folii costâ rubellente, nonnihil aspera, per ambitum serrata, odore graui Galeopseos, sapore subamaro: flores spicati ex pluribus verticillis conflati, quorum singulares cucullati, Heracleæ Tragi, purpurascences, labello variegato: in floribus calyculo subnascuntur quaternâ semina, nigra, nitida, ferè triquetra.

Synonyma

Pingitur planta nostra in H. Lugd. p. 1357. Clymen. minoris Dalechampii titulo, describiturque pro Clymeno minore Herbariorum: A Tabern. pro Stachyde aquatica, braun wasser Andorn: Sed dissimiles plantas iungit, nec bene describit, distinguitque: A Gerardo, pro Marrubio aquatico, Scharpe pintod water horebünd. Camer. hort. vocat stachydem palustrè Gesneri: C. Bauh. phyt. stachydem palustrem fœtidam, & Tertiolam Cæsalpini (sic illi dictam eò quod Tertianus sanet) q̄ nos in dubiū vocamus. An tandem est Trago Marrubium maus aut nigrum, gros schwarz Andorn.

Locus & tempus.

Montbelgardi passim iuxta agros abundat inter dumetâ florens Iulio, semen maturans Augusto: vt & Tiguri in ripa Lacus, referente Gesnero.

Herba venti Consopelienfis

Descriptio

Herba venti Consopelienfis vocata caules habet cubitales, in multos diuisos ramos robustos, quadratos, rubentes, hirsutos: folia ex aduerso sita, Saluiz, vel Parietariæ potius, foliis similia, dura, nervosa, superne virentia & nitida, inferne subhirsuta, albicantia: ex quorum sinu verticillatim ramos, caulemque ambientes nascuntur calyces striati, hirsuti, in acutas barbulas desinentes, è quibus flores promicant galeati Verbasci siluestris Matth. sed coloris purpurei: verticilla autem vndique plumatis rigidulis cristis obvallantibus stipantur.

Gesnerus hort. vocat Herbam venti Consopelienfium: Herbam venti Rondeletii Lobelius, quem dubitare ait an fortè sit Othonna: itemque Parietariam Cordi Consopelienfium, Sideritidis genus Dalechampii, & Verbasci siluestris speciem Italorum in Obs. p. 286. & Ic. Plant. p. 532. H. Lugd. p. 1120. Herbam venti, Parietariam Cordi, Sideritidis genus. C. Bauh. phyt. Marrubiū 8. siue nigrum longifolium peregrinum, Othonnam quorundam.

Locus & tempus.

Prope Consopelium, Castellneuf, & Lunel, florentem conspexi Aprili, Maio & Iunio. Solibus æstiuis, imbris & statu iam marcescentia folia crebro pertusa, & multiflora, quasi vento peruia, visuntur, vnde & Herba venti nomen adeptâ.

Lamium ad Hederam terrestrem accedens.

Ad Lamium referenda est elegans hæc planta, quæ ex radice Vrticæ vulgari simili, plures profert pedales cauliculos, teretes, quadrangulos, frequentibus nodis cinctos: ad quos alternatim bina contrario situ in oblongis pediculis

æqualiter nascuntur folia, Lamio, siue Vrticæ nõ mordaci vulgari & fœtidæ, quæ purpureo flore est, similia, vel proximè ad Hederæ terrestres, siue Chamæcissi vulgaris folia accedentia: inter quæ calyculi terni, quaterni, aut quini, continentes flores Hederæ terrestres floribus formâ proximis, hiantes, nullâ superne galeâ eminente, sed latiusculo folio reflexo duntaxat, mixtis coloribus, cæruleo, albo & purpurascente insignitis.

Clusius descriptionis author appellat in Pan. non. p. 598. Lamium 3. peregrinum: In Hist. post. Lamium Pannonicum tertium. C. Bauh. phyt. Lamium 4. siue folio Hederæ terrestres.

Nascentem plantam nunquam videre contingit auctori: sed iconem suis coloribus diligentissimè expressam ipsi dono dedit anno 1579. Ill. Dn. de Bathyan.

Synonyma

CANNABIS SILVESTRIS VETERIBVS.

Cannabis silvestris similes Altheæ virgæ proferit, minores tamen, pigriores & crassiores [asperiores aliis] cubiti altitudinem æquant: folia latius similia, sed nigriora quoque & asperiora: flores rubellentes Lychnidis similes flores Lychnidis, subrubros aliis: semen verò & radicem Altheæ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, topicos articulorum dissipat: cortex huius torquendis sanibus accommodatur.

Ceterum caput hoc de Cannabi silvestri, quam quidam Hydrastianam, Romani verò Terminalem & Cannabem appellant, in multis Diosc. exemplaribus cum capite de Cannabe latius, de qua antè dictum, coniunctum habetur, an autem ex Diosc. sententia, me latet Tragus illud reducere putat, quod Diosc. contra consuetudinem suam Cannabem silvestrem primo loco ponat. Plinius certè separat. Cannabis in silvis primum nata est [inquit lib. 20. cap. 24.] nigriore folio & asperiore, dein cultu domita feracitate mæsuevit in agris, &c. Plinius cum legisset Cannabi silu. virgæ esse Altheæ similes, oscitanter Cannabi tribuit, quod Altheæ proprium est, vt aquam spisset, quod infra monebimus.

Ruellius Cannabis silvestris meminit, & tamen non satis demonstrat, quid intelligat. Cordus & Lacuna omnibus notam aiunt: quæ tamen sit, non tradunt. Amatus spontè in aruis nasci dicit: verum non describit. Sed & Matthiæ in multis Italiæ locis, cum siluosis, tum etiam campestribus eam provenire asserit in prior. comm. sed in post. se vidisse dicere non audeat. Cannabem silu. nos non habere statuit Tragus, nisi per illam subintellegerit Dioscorides fœtidæ speciem aliquam. Cannabim autem spontè provenire in Virgineis, sed foliis & caule à nostra satius differentem auctor est Thomas Hariot.

Cannabis erraticæ paludosæ titulo, nescio cuius errore, ponitur in Obs. p. 284. & Icon. Plant. p. 527. Cannabis fœmina. Sunt qui silvestrem Cannabim Alceam officinarum esse contendunt. Alii Clinopodium alterius Matthioli genus album, Alceam pentaphylli folio alii. Crissam Galli alii, quod perpendendum. Est tandem Cannabis silvestris quorundam Vrticæ inertis affinis quæ nunc describenda venit.

Cannabis silvestris quorundam, Vrticæ inertis affinis.

Icubitali & altiore surgit caule quadrato, hirsuto, & aspero in ramos diuiso: ad cuius articulo

Descriptio

viculos singulos gemina folia aduersa pediculis appenduntur. Vrticæ foliis paria, acuminata, per ambitum serrata, in singulas incisuras singulis nervis obliquis à media costa exeuntibus, mollia, pilosa, atro-virentia: flores ex foliorum alis verticillatim caules coronant, Lamii effigie, galeati, purpurantes, vel albicantes, labello parili, lineolis sanguineis luteisque verticillato, ex calyce rubente, in quinque spinas abeunte, in cuius fundo semina succedunt quaternis: radix nunc recta, nunc obliqua, ex albo nonnihil rubescit, potissimum quæ caulis committitur, fibris longiusculis donata.

Cannab.
filu. Trago
Cannabim hanc siluestrem in censu vitiorum haberi, neque cum descriptione Dioscoridis convenire placet Trago. Caulem siquidem proferat hirsutum, lanuginosum & nodolum, fono alpe ro vestitum, Vrticæ foliis similimo: flore albo purpureo, alio proflus candido, formâ ipsa Vrticæ fatuæ similimo, semine per omnia satius respondente. An Cannabis erraticâ paludosa silu. Lobel.



herba à foliorum cum Ladano similitudine & natalibus à Plinio Ladanium segetum dicitur, ab aliis Terrahic angustifolium. Quia autem Plinius segetum Ladanium duplex esse ait, id Herbarii sic interpretantur, ut aliud album sit, aliud rubrum.

Locus & Tempus,

Vtrumque nascitur in arvis lapidosis & inter se-

getes passim circa Montbelgardum. Obsistit quoque Monspelii & Genève: itaque Buxleæ Hörens Octobri: Flore albo & purpureo in Ducatu VVirttemberg. inter admirabile Balneum & Kitchen vrbem, & arcem.

Chamaecissus, siue Hederâ terrestris, Veteribus & in genere.

Hed. terr. maior.



Chamæcissus quem quidam Chamæleucô, sterilem Hederam, Terræ coronâ, & Selinitin appellant, & Romani Hederâ sylvaricâ: **filia** Hederæ similia habet, minoratam, tenuioratque, ac in gustu valde amara: ram. lus à radice dodrantales, foliosos, per terrâ sparsos, quinos, senolue: flores Violis similes, mi-

Vitis:

nores tamén: radicem gracilem seu tenuem, candidam, inutilem: nascitur in cultis. Folia vtiliter bibunt ischiadici tribus obolis in aque cyathis tribus; quadragenis quinquagenisve [triginta aut quadraginta Celsalp.] diebus. Eodem pota modo sentis aut septenis diebus, regni motum emendant, & expurgant.

Plinius in Cissi & Chamæcissi voce valde implicitus est, & à Dioscor. alienus. Theophrastus quidem hederæ *in gyno* i. e. terrestris, & *in andro* hoc est, in altis sublatæ meminit, nusquam verò Chamæcissi, teste Dalechampio. Cæterum, Chamæcysson hanc antiquiorum esse Hederam terrestrem vulgarem, negant Cordus, Matthioli, & Maranthæ. **E contrâ Hederâ**

H h h h h

Plin. nat.

Descriptio
Scvvenckf. Cannabis filu. spuria 1. Cannabis spuria facie Vrticæ Lob. Cannabina alba Tabern. *vilde hauffe weis hanfftraut / vilde raub nessel / Acker nessel*: inter segetes enascitur. Item, Cannabis filu. spuria altera Lob. Vrtica fatua filu. aculeata Thal. Sideritis 2. Matthioli *Stachelichte vilde raub nessel / Stachelichte Acker nessel*: segetum pernitit. Er: Cannabis filu. spuria 3. Vrtica fatua filu. aculeata minor, *flam wild raub nessel*. Quam plantam intelligat Schvvenckf. per primam Cannabin siluestrem nobis nondum constat: secunda non est Sideritis Matthioli.

C. Bauh. phyt. Vrtica 5. siue fatua aculeata foliis serratis: Trago Cannabis filu. propter formâ feminis: Lobelio Cannabis filu. spuria altera. Item, Vrtica 6. siue fatua aculeata foliis non serratis.

Vrticam autem hanc fatuam filu. aculeatam Thalii esse filu. aculeatam Lobelii, testatur Camerarius. Dod. lat. in fol. sub titulo Cannabis sterilis depingit & describit: Hist. Lugd. p. 497. pro Cannabi siluestri Dalechampii, flore puniceo.

Locus & Tempus.

Genève copiose floret Nouembri: Basileæ intra portam cineream & lapideam, in & extra urbem, & ad fluvium Birsæ Iulio, Augusto & adhuc Octobri. Montbelgardi passim abundat.

Ladanum segetum flore rubro quorundam: & albo.

Descriptio

Ex radice digitali, aut minori, lignosa, fibrata, caules surgunt pedales, quadrati, subhirsuti, propter terram rubentes, ceteroqui ex viridi canescentes, geniculati, ramosi: *folia* ex articulis oriuntur, Ledi, atro-virentia, subhirsuta, ex aduerso posita, sapore exsiccante: flores indidem ex foliorum alis orti verticillatim caules ambiunt, Lamii floribus persimiles, colore nunc carneo hilariore, nunc albo, labello punctis duobus albicantibus notato, interius paullo notulis in luteum vergentibus resperso: apices sub galea teguntur lutei.

Turner. plantam, quam hic proponimus, Anserariam vocat: atque esse Clinopodium alterum Matthioli, cuius figuram sine descriptione proponit. Tabern. Alyssum (2. statuit in Hist.) Galeni flore purpureo: C. Bauh. phyt. Sideritis 7. siue arvensis angustifoliam rubram: Hist. Lugd. p. 443. Ladanium segetum, *de quo ant.* Hæc

Tom. III.

terrestrem officinis dictam, Chamæcissum esse volunt, effigie quidem, viribus & vulgari appellatione consentientibus, Tragus, Fuchf. Dod. Lob. Cæsalp. & alii nonnulli.

Chamæcissi verò nomine sequentes donantur plantæ: scilicet: Volubilis minor. Hedera. Helix. Consolida media. Consolida regalis. Gramen Fuchfii. Veronica mas.

Hederam terrestrem vulgò appellant Brünfel. tom. i. Rhaps. 22. Trag. Matth. Tabern. & alij, h. e. *χελιδνίσκος*, vt Dod. gall. Fuchf. Chamæcissum, vt Trag. Ruell. Humilem Hederam Lobel. & Hederulam ac Hederam terrestrem Barbarorum: Chamæclema Cord. in Histor. apud quem malè posita figura Floris tinctorii. Elatinen Brunfels in 4. p. 37. & Gesn. in cat. pl. Elatinen Dioscoridis Comes à Neuenare, quàm malè autem, indicat vtriusque descriptio. Germ. *Erdenbeere* / & *Erdenfreuglin* / h. e. Coronam terræ, *h. e. si quavis*; quidam *Gundelrebe* & *Grundreben* / Belgæ *Onderhauwen* / Galli *Lierre terrestre*, & *Rauce*, Gesn. Boh. *Pourz* / Hung. *fody folyo boros* / sian sian / h. e. terrestris serpens Hedera. Sunt nonnulli qui Asclepiada vocare velint, quorum error manifestus.

Passim spontè prouenit Monspelii, Lugduni: item Paçauii & Geneuæ, virens Ianuario & Februuario, florens autem Martio & Aprili: Montbelgardi & Basileæ multis in locis floret Maio. In cultis pariter ac incultis locis reperitur, ac sæpenumero vmbrosis, iuxta sopes, parietes, & hortorum areas. Viret non modò ætate, sed & Hyeme, quouis anni tempore: ab Aprili autem in multam ætatem flores facit, teste Dodonæo.

Locus & Tempus

Sunt qui asserant apud Tragum, folia in aqua decocta & pota, dylienter & prodesse: eademq; vino decocta & pota, vrinam & menses ciere, venenum & regium morbum expellere, obstructiones hepatis & lienis soluere, eadem aquæ destillata tribuunt: folia vino aquaue decocta, exulcerationi vitiiisque colli & faucium gargarisatu conducere: hoc decoctum scabiei aliusque vitis vt & locorum muliebrum vitis mederi: & succum fistulis aliisque id genus malis purgandis maximè prodesse. Hedera terrestris ex vino decoctum, inquit Matthioli, potu vrinam & menses ciet, vermes necat, venenum per sudores pellit, hinc fit vt veterinariis magno sit in vfu ad equos, quos scifel infestat. Frequenter eâ vtuntur Chirurgi Itali, potissimum vulnerato thorace, aut intestinis, in quem vsum compertæ efficacis portionem *την υλατίνην* habent. Dodonæus verò facultate Hederam terrestrem calidam & siccam esse statuit: & quia amara, abstergere, & viscera ab obstructionibus liberare posse, atque aduersus tinnitus & surditates commendari auribus impositam.

Solent [inquit Camer.] alicubi in Italia vlcera inueterata succo Hederæ terrestris eluere, postea puluerem siccæ herbæ inspergere: egregiè platurque iuuat. Aqua destillata & 4. dies cōtinuò bibita, auctore Ludouico de Leonibus Medico olim Bononiensi insigni, in suppuratione pulmonum efficax. Quas veteres Chamæcisso tribuunt facultates easdem omnes Hederæ terrestris adscribunt, neque dubiū est Fuchfio, cū sit admodum amara, quin eandem habeat facultatē, & alia etiā possit quæ illi adscribunt, vt euocare suppressos menses, vrinam mouere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiam tradunt Officinarum esse id quod equites quo-

que sciunt: hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur.

Aqua tandem aut decoctio pondere vnciatum iij. confert mulieribus, tumore membrorum aut ventris laborantibus: idem præstat si epithemetur bis in die. Scribit Lerijs in Hist. Americana cap. vltimo, cū omnes diarrhœa & solutione ventriculi tenerentur, adeò vt nihil penitus retinere potuerint, breui tempore sanitati restitutos fuisse vsu pulvis Oryzæ cum succo Hederæ terrestris cōcocta, quæ amota ab igne contēgenda est probe pannis, in olla postea ei commiscendi ouorum vitelli, omniaque ita confusa in foculo mensario recalfacienda. Vidi ego videntes quosdam ad torsiones post partum, vntri apposita, acipie etiam vtiliter sanè vsum sum. Huius portò felicem vsum obseruauim in expellendis vermibus equorum si concisa detur cum aucta.

Asarina Lobelii flore Hedera terrestris.



A Sarinæ, aut saxatilis Hederula, quam raro & non nisi locis montosis & læxissimis vidit Lobelius, in Galloprovinciæ Delphinatu & Narbonæ, per plures quidem nota sūt quæ Hederæ terrestris conueniunt, proindeque nonnullis Hederæ saxatilis dicitur: hanc vrinam ciere

scit: an alium ducat, compertum haud habet: nec tamen id inficias it: nam huic fortè vsu venit, quod de Alaro asserunt. Idem in Obs. p. 329. vt mihi videtur Asarinam ieunè describit, ac perperam sterilem cognominat. Asarina sterilis, inquit, Senenæ Narbonensis agri, diuersa ab Asarina Matthioli qui florem Anthemidis esse scribit: Huic folia & flores dilutè purpurantes Hederæ terrestris conueniunt: sed maiores, longiores. Rupibus & cauitibus Veginio terminis Scuenæ oriunda.

In Ic. Plant. p. 601. inscribitur Asarina, siue saxatilis Hederula. C. Bauh. phyc. Hedera terrestris 3. siue [etiam Histor. Lugd. pag. 925.] Asarina Lobelii.

* *



tis simplicis herbaceo innocenti sapore prædita floris aureis multiplex: echinus contragofus.

Icon Ranunculi dulcis multiflori apud Tabern. non placet. Eandem inscribit Gerardus Ran. maximum multiplicem, Double wilde Crowfoot.

Ranunculi speciem peregrinam ser-

pentem, & Ranunculum duplicem appellat Cæsar. Ran. luteum multiplicem Schv. Coronopum Ranunculi speciem similem flore multiplici luteo Gesn. hort. An Ran. prat. maiorem fl. multiplici Trag. An Ran. hort. multiplicem Fusch. hist. Ran. multiplicem in Icon. An Ranunculi tertiam speciem vulgatissimam, suis ramis per terram se spargentem, flore valde foliato, Anguill. epist. n. An Ranunculi septimam speciem coronariam Cord. Hist. An Ranunculum hortorum Anglorum polyanthemum Lob. Aduers. An Ran. ro. siue hortensem repentem pleno flore, C. Bauh. phyt. An Ran. hort. fl. pleno secundum siue inclinantem, idem in Pinace? An quoque Ran. hort. fl. pleno tertium siue dulcem, & Polyanthemum multiplex, Dod. gall. Lugd.?

RANUNCULI PLURIMÆ Species Aliæ.

RANUNCVLVS MAGNVS HIRSVTVS repens flore pleno.

Descript. **E**X radice fibrosa caules tollit cubitales, crassos



teriora virentia aut chlora, scandulato incubitu conferunt stipata exterioribus altiore situ

Tom. III.

posita, imbricatam coni Cedri Libani dicti laminarum conglutinationem quodammodo æmulantur, reliqua duntaxat umbilicatâ in summo lacunâ: toti flori subiecta foliola quinque hirsuta viridantia: folia alia à radice oriuntur, alia à ramis, pediculo longo fistuloso, palmati & dodrantali, hirsuto, valde lata: primariâ diuisurâ triplici, quarum vnaquæque rursus tripartita, obtusa, crassa, hirsuta, supernâ parte atroviuentia, splendentia & rugosa, infernâ ex albidovirentia dilutiùs: nonnulla interdum folia, vt circa floris pediculum antequam se expandat, caulem immediatè ambiunt, in tres oblongas diuisuras acutas, ampliùs non dissectas, abeuntia.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret mense Apul.

RANUNCVLVS ROTVNDIFOLIVS

vernus syluaticus.



Descript. **F**ibrosa radice nititur, minime acri, ex qua surgunt aliquot caules fistulosi, cubitales & sesquicubitales, in ramos brachiatis, quorum singulis insident si Ranunculi aureus, quinque foliis caducis confusus, quæ extorsum totidem triplo minoribus virentibus circumdatur.

in medio staminibus donatus plurimis crocatis: succedit echinus qualis in vulgaribus Ranunculis: foliorum autem mica est varietas: nam ex inferioribus quædam circinata rotunditatis integra sunt, & in ambitu serrata: alia manente rotunditate triplice quintupliciue diuisurâ incisa, atque ista quædam omnia longis pediculis apertâ è radice statim oriuntur, & in hortis culta, insigniter crassescunt, vt alterius esse plantæ quodammodò videantur atque ad alas & ramorum diuaticiones, in tenuissima & oblonga segmenta diuisa, radiatæ stellæ more caulem sine pediculo amplectuntur.

Tragus hunc describit nomine ranunculi siluestris, vocatque german. *Nerzen hanenfuß*, quod Martio mense in syluis repertatur: dulcem ait, & ad Apulei Crus galli refert. Figura autem proprio titulo non donatur, sed malè sub inscriptione Ranunculi pratensis dulcis transposita locatur.

Sed & Fuchsius Ranunculi siluestris titulo in Histor. pingit, sed non describit, nec citè à ceteris distinguit. In Icon. Ranunculi primam speciem inscribit.

Dodon. gall. est Ran. auricomus: Anguill. epist. n. Polyanthemum Plinij: Thal. Ran. Martius Tragi: Tabern. (cuius icon non placet) in Icon. ran. dulcis nemorosus in H. (vbi præterea

Trag. n.?

liiii

vocat Chrysanthemum Democriti, Herbariorum Ran. auricomum, aureum, & dulcem nemorosum, Pedem & Vnguem Leopardi, à foliorum quadam, cum eius animalis Vngue, similitudine.] Ran. dulcis secundus: Gerardo, Ran. nemorosus: Lob. in Ic. Pl. p. 669. Ran. auricomus: Schvv. Ran. dulcis siluaticus, βαρυδανον χρυσάνθεμον: Casp. Bauh. phyt. Ran. syluaticus folio rotundo.

Nom. lín. Germ. Süßer wald hanenfuß/wild goldgeel hanenfuß/ & wald schmirgelen: Belg. Lupaerts Elawen/ & Goetbosch hanenuoet: Gall. grenoilletre dorée: Italicè, Ranuncolo dolce salvatico: Angl. Serote moode Cramewoor.

Locus Sylais familiarem hunc Ranunculum C. Bauh. Basilex in pratis obseruauit. Montbelgardi abundat in monte Bar vnde in hortum Illust. E. C. transtuli, vbi Aprili & Maio floret.

RANUNCVLVS PALVSTRIS FLORE minimo.

Descriptio



Valde crassescit aquatico Ranunculo radix caua, & fibris multis donata: à qua caules exurgunt multi insignis interdum crassitudinis, inanes, striati, ramosi: folia Paludapij sublustri splendore virescunt, albis punctis aliquidando guttata: flores inter omnes Ranunculos minimi, quinque foliolis constant

exiguus, aureis: capitula oblonga, tenuiora quam in reliquis, nec alpero semine echinata, sed laxius & minutis granulis compacta. Sapor huius Ranunculi valde calidus & vrens Tabern.

Fuchf. sine descriptione hunc exhibet in Hist. Ranunculi aquatici ita etiam in Ic. vocatur,] & Apj rursus titulo.

Tragi figura Apj aquatici optimè conuenit, non item descriptio. Quare perpendendum an non confundat hunc Ranunculum (primum, vt vocat etiam in Hist. german.) aquaticum cum arvensi. Quà porro ratione Apium hoc suum palustre ad Anemonem agrestem, Plinio aculeatam dictam, referendum dicat, haud video.

Lobel. in Obs. pag. 382. Icon. Plant. p. 669. vocat Ranunculum palustrem rotundiore folio. In Aduers. videtur hunc miscere cum Ranunculo arvensi echinato.

Icones Si Matthiol. sub Ranunculo primo voluit exhibere figuram Ranunculi, quem hic tradimus, ea non vndique placet. Vellem & nostram Fuchianam fuisse meliorem. Camerar. bonam pro Matthiolina reposuit.

Synon. Dod. gall. dicitur Ran. palustris, Ranunculi i. species: In Hist. purg. & lat. in fol. Ran. silu. primus, Ranunculi silu. i. species, Rar. aquatilis, Ran. i. Diolcoridis, ρουπέλιον, & ραννον ύδάτιον. Apium palustre, nec malè Apiastellum: Gesner. hort. Ranunculi primum genus, Apium rtilus, Apium

hamorrhoidum, Ran. i. Matthioli. Thal. Germ. & Tabern. Ic. Ran. palustris: Hist. Ran. j. palustris, Batrachium palustre, Apium raninum. Schvv. Ran. palust. folio Apij, Sardoa vel Sardonia herba.

C. Bauh. phyt. Ran. i. siue palustris rotundifolius lzuis: Eadem in Pin. Ran. palustris & aquaticus i. siue Apij folio lzuis, Ran. & Sardonia Diolcor. Ranunculus, Strumea & Apiastrum Plinij, Scelerata Apuleij, Apiastrum Cordi in Diolc. Ran. i. Matth. Gesn. hort. Lac. Cast. Lugd. Ran. 4. Turn. 3. Lon. palustris Cord. hist. Herba Sardoa Guiland. Ran. alter hirsuto semine folijs Apij, Cæsalp. Folijs & caulibus est alibi maioribus, alibi minoribus, florib. communiter luteo-pallidis: at Cordys & purpureis obseruauit. Si Cordus Ranunculi Diolcoridis primam speciem obseruauit flore purpureo, cur non locum, cum raro talis occurrat, annotauit: suspicor eum legisse in Diolcoride, non autem vllibi vidisse.

An Anguill. epist. ii. Ranunculus i. apud Patavinos locis palustribus, flore luteo? An Cæsalp. Ranunculi alterum genus lzue?

Germ. vocatur wasser hanenfuß/ froschpfeffer/ Nomina scigblattern Eppich/ & perperam tamen, wasser lypguar. Eppich h. e. σκληρον ύδάτιον, Apium palustre. Gallis Grenoilletre aquatique, ou grenoilletre d'eau. It. Ranunculo aquatico: Belg. watter hanenuoet. Angl. watter Croesfoor.

Rariùs cettè, sed tamen alicubi in montosi strigosi que agri scrobibus, fossisque aquas habentibus, visitur. Plurimùm autem videre est, vbi que iuxta torpentium, aut pigre labentium aquarum riuulos, alique similia humida loca & vlginosa. Tiguri, obseruauit, & Geneux ad portam Rine florentem Iunio. Florem dant Maus ac Iunius menses, sed tamen rariùs post sequentes dant, Dodonxo.

Placet Tabernamontino vt quotiescunque Ranunculus simpliciter scribatur, hic intelligatur. De Ranunculi viribus diximus antè. Siccat, inquit Schvv. & calefacit 4. gradu, cum radix, tum vniuersa herba. Herba in oleo violaceo macerata crutis excitandis & hamorrhoidibus referandis apulissima.

RANUNCVLVS PALVSTRIS echinatus.



ITa voco Ranunculum quendam vuidisoli incolam & paludum fecitorem, cui folia aliquatenus Aceris minoris diuisurà, sed m nora, crebra: radix fibrosa: caules plures, palmares & altiores, crebris ramis brachiati: quibus flores insident cæterorum more lutei simplices: quos excipiunt capitula, R. nunculi

aruer. sis capitulis proxima, è decem, duodecimve spi-

Cordus
nar.

Locus

Tempus

Descriptio

ue spinosis oblongis compressis pericarpis congestis conflata.

An Cæsalp. Ranunc. primus, linguam exrens, semine depresso, foliis cum maculis nigris: Ranun. lævis? An Lob. in Adu. Ran. palustris femine echinato, Apium Sardonium Dioscoridis putatum?

Clus. hist. post. vocat Ranunculum præcoccum 3. Ran. Apulei quorundam, & Battachium Apulei Iac. Plateau. C. Bauh. Ran. 23. siue palustrem echinatum Io. Bauhini: cuius meminere Aduersaria: verum cum Ranunculo palustri rotundifolio læui confundunt. Idem in Pin. Ran. echinatum quartum, siue palustrem.

Caudet locis humidis & aquosis Monspelii, ac etiam in fossis. In Belgio alicubi observatus.

RANUNCULVS ARVENSIS echinatus.

Cebet cubitale circiter, subhirsutum, hilarit. virid. centem, cauli, & in ramos plures diuisum: folia in oblonga segmenta tenuia profunde admodum incisa, pilosa: flores Ranunculi aquatici, minores quàm in pratensi genere, luteoli, quibus succedunt echinata capitula ex pluri-



bus subrotundis lappulis compressis & aculeatis composita: radicem habet fibrosam.

Fuchsius, qui nec describit, nec etiam ritè ab aliis distinguit, Ranunculum hortensem simplicem in Hist. inscribit, absque ratione. Magis congruè, Ranunculi alteram speciem constituit in Icon.

Figuram Fuchsii proponit Dod. gall. titulo Ranunculi albi, siue echinati. Lat. in fol. & Hist. purg. Ranunculi silu. tertii & Aruensis nomine & inscriptione, aliam exhibet effigiem. Hanc Lobel. in Obs. p. 380. pratensis Ranunculi varietatem intitulat, & Ranunc. 3. siluest. Dodonæi, eumque ad Ranunculum Aduersar. pag. 298. refert. Sed non inuenio Aduersaria huius meminisse iam d. cto titulo & pagina, nec etiam sequenti, nisi quod describendo Ranunculum rectum cum hoc confundant, lumen attribuentes echinatum. In pratensis enim Ranunculi varietatis descriptione, capitula non dicuntur echinata, sed non diuersa à Ranunculo pratensi vulgari.

Et sanè capitula, quæ in hoc Ranunculo echinata sunt, faciunt, vt suspicer Matthiolum per Ranunculum quartum figuram Ranunculi aruensis malè pictam exhibuisse. Nec me latec alterius esse opinionis Lobelium, Camerarium, & fratrem C. Bauhinum, vt fuis ostendetur locis.

Cordo, cui est Ranunculi quinta species, à Gesnero in H. additur figura, vocaturque Ranuncu-

lus aruensis, ac etiam segetalis: de hort. Ranunculus aruensis, æstiuusque à Fuchsio depictus, Lob. in Ic. Plant. p. 665. & Gerardo, Ran. aruorum. Schuy. Ran. aruensis. Ponæ in Baldo Ran. echinatus Dodonæi. Tabern. Hist. Ran. 1. aruensis, & Esti æster hansenfuß / Ran. 13. aruensis, latifolius sine icone: Item, Ran. 2. aruensis, der ander æster hansenfuß / Ran. 14. aruensis, angustifolius: & hunc in Ic. etiam pingit. C. Bauh. phyt. Ran. 21. siue Geranii tuberosi folio, Battachium verum Curtusi: Item, Ran. 22. siue aruensis echinatus 1. siue aruensis, Ran. satius Turneri: folio aliquando latiore, aliquando angustiore, pro ratione folii pinguioris.

Germ. dicitur feld hansenfuß / & æster hansenfuß. Belg. æster hansenvoet. Angl. feld Coorvesdote. Gall. Grenouillere blanche, ou herisse.

Nomina
linguar.

Basileæ in agris conspicitur mense Maio, vti & Montbelgardi, Monspelii, & Gencuar, vbi in hortis parua plantæ tota Hieme virebunt. Septembri echinata profert capitula. Vulgaris in regionibus vicinis Rheno. Inter segetes Silesiæ latio floret. In arvis denique plerique locis allosis, vbi humidius solum, gignitur.

Ranunculus albus simplicis flore.



Radix cauli R. quæti appositæ palmariibus aliquot fibris, et alis mediocriter, rigidis & albis, disparatis constati ex qua surgit caulis, sequecubitalis & bicubitalis, pallido & virente læuore nitens, supra communent fortè Ranunculi crassus, fol. dos, in ramos aliquot diuisus, foliisque ad alas donatus,

Descripti.

flores gerit vncialibus & sequecubitalibus hirsutis pediculis Ranunculorum vulgarum forma & magnitudine, sed candore niuem prouocantes, suauolentes, quinque vel sex foliis compositos, interdum cultura è longè pluribus; vt multiplicem florem iure possis dicere, quorum medium occupant apices lutei: Folia Aconiti foliis similia, quinquepartita; profundissimè serrata, infernè hilarit virore splendentia: supernè viridia, squallida. Tabern. ait sapore calido & acri, sed minore, & non ita virente, vt in cæteris.

Clus. Ranunculus albo flore à Dodonæo descriptus differt à maiore, humilior, folia læuora, & nonnihil altiora, flores ratiore & minores, maturius flores.

Dodon. in Hist. purg. & lat. in fol. nominat Ranunculum flore albo, Ran. externorum quartum. Camer. ad Hist. germ. Matth. Ran. candido flore. Tabern. Icon. Ran. album, Battachium album: Hist. Ran. 5. album. Ger. Ran. alpinum album. Gesn. hort. Coronopum quorundam; Ra-

Ranunculo specie similem, silu. albam: Item, Ran. 3. in Bernatium montibus *fiderische* appellatum, Chamaeplatanum deinceps fortan vocandum: In app. Ran. album maiorem sil. fl. simplici: In cat. Ran. album simpl. flore non vrentem. Lob. in Adu. [hic dubitar an sit Ranunculus albo flore Diosc.] Aconitum batrachoides: In Obs. p. 38. item Ic. Plant. p. 663. Ran. album flore simplici: Ibi etiam Ran. album alterum, Hic Aconitum batrachoides, cuius figuram in Ad proposuit: In Obs. & Ic. Pleistigiem Dodonæi assumit, ac magnitudine à priore in Adu. exhibitio distinguit.

Figura 3.
Lagd.

Figura Ranunculi montani albi apud H. Lugd. p. 103. non displicet: Ad hanc autem Compilatorem alias duas malas reducere decebat, sc. Polyrhizi latifoliae Dalechampi p. 1140. & Aconiti quinti Matthioli, p. 1740.

Pona nota-
tur.

Pona in Baldo vocat Ran. quartum Dioscoridis: Item Ran. montanum album Dalechampi. Nobis vna solum stirps est.

Nomina
linguarum

Schvv. Ran. Alpinum candidum, Ran. Alp. maiorem leucanthemum folio Aconiti, Ran. max. *seundersii* siue Aconitifor. foliis amplis, profundius sinuatis, Platani instar, floribus lacteis: sapore subacri & nitroso.

Locus &
Tempus.

Perperam C. Bauh. in phyt. hunc Ranunc. 4. Matthioli nuncupat, quia in figura nihil apparet quod respondeat. Præterea Ranunculum quartum Matthioli (quem nos aruensem echinatum vocamus) eundem asserit cum Ran. mont. quarto Clusii, de quo nos proxime dicturi sumus.

Descriptio

Sed quæ picturarum similitudo: quæ foliorum conuenientia? quæ floris eolorum correspondentia?

Locus.

Germ. dicitur *weisser hanensfuß* / *weisser Alphanensfuß* / & Siles. *weiß Trollblum*: Angl. *white montaine Crowfoote*.

Tempus.

Abundat in Episcopatu Argentinensi ultra Rhenum prope fontes acidis Griesbachianum & S. Petri ad siluam Hercyniam: Genevæ in monte *Salene* & Thuri florens Iulio mense. In Pannonicis montibus provenit teste Clusio, ubi maior in Baldo frequentissimus. In viginosis montosis Silesiæ seu ad rivulos ex montibus fluentes nascitur. Tandem in plerisque Galliæ, præsertim Narbonensis, montibus, & apud Allobroges subinde reperitur.

RANUNCVLVS ALBVS FLORE DENSO.

Descriptio

In eo differt à Ranunculo albo simplici, quod *thuc silus* sit multiplex, magnitudinis Ranunculi pleni recti: æquè enim lacteo candore conspicuus est: *caules* recti, solidi, ramosi, sesquicubitalis: *folia* quinquepartito ad pediculum vsque dissecta: reliqua conueniunt.

Synon.

Clusio in Pann. p. 369. dicitur Ranunculus flore polyphylo albo: In Hist. post. Ran. mont. 4. alter flore pleno.

Synon.

Camer. ad Hist. germ. inscriptione Ranunculi candido flore, florum picturam exhibet. Tabern. Ic. Ran. albus multiflorus: Hist. Ran. 6. coron. albus, floribus multò maioribus, quam silu. pleni. Ger. Ran. alb. multiplex. Gess. hort. Coronopus quorundam Ranunculo specie similis, hortensis, flore multiplici albo: An ibidem posita, Ran. alb. magnus fl. multiplici. In app. Ran. alter alb. fl. multipl. In cat. Ran. alb. fl. pleno. Schvv. Ran. alb. multiflorus, siue coron. albus.

C. Bauh. phyt. Ran. 40. siue hortensis albus multiplici flore. Pin. Ran. hort. fl. pleno sextus, siue Ran. Aconiti folio, fl. albo multiplici, Ran. leucanthemos fl. pleno Cam.

Germ. *Gesülter weisser hanensfuß* / *gesülter weißer* Nomina
frans *Schmurgeln*. Angl. *double white* Bar- linguarum
chlers / *butons* or *double white* Crowfoote.

Ranunculus flore albo Alpinus maior.



Describe:

Magna sunt folia, in quinque lacinias secta, viridia & in ambitu serrata, infernè dilutiora, & splendentia, dura, nervosa, quæ præmansa nullam manifestam acrimoniam, sed amaritudinem potius habereprehenduntur: *caulis* cubitalis aut amplior, firmus, licet tenuis, lauis, nodis aut geniculis præditus, in multas alas à medio ad summum expansus, in quibus flores satis ampli [interdum pleni]. Secundi (Ranunculi alpini Narcissi flore) tamen floribus minores, quibus foliis constantes, tenelli, toti lactei: aliquantulum odorati, staminibus pallentibus umbilicum occupantibus, & capituli rudimentum cingentibus, quod ex seminibus simul congestis, quemadmodum in reliquis Ranunculis, constat: *radix* præmorsa videtur, instar radices Secundi, multasque longas & candicantes fibras habet.

Montani Alpium Austriacarum opiliones & venatores, Abbeß / & Teuffels Abbeß / id est, Præmorsæ, & Diaboli morsus, nomen indebant.

Abundatè provenit in acclivi montis Vech-
sel, Schneeberg, & aliorum montium siluosis locis, tempus.
per quæ ad eos montes pater aditus. Floret istic eodem tempore, quo Ranunculus mont. albus Clusii, i.e. Iunio mense: sed in cultis Maio: semen maturat Iunio.

Ranunculus alpinus Narcissi flore.

In celsioribus earundem Alpium iugis, multò humilior & magis hirsuta crescebat hæc plâta, pedalem altitudinem non excedens, flore paullo maiore [& qui Narcissi florem album, medium calicem flavum habentem, æquare posset] eoque etiam magis odorato, quam prioris: eius etiam folia maiore amaritudine & acrimonia erant prædita, tamen primo gustu quandam dulcedinem habere viderentur. Serius florebat priore: nam eam duntaxat florentem reperiebat, quam in inferiore iugo, alteram iam semen habentem observasset author.

Clus. Pann. p. 366. Ranunculi 2. alterum genus, p. 367. Ranun. Alpin. secundus, siue Narcissi flore: Hist. post. Ran. mont. secundi species altera



in Silesiæ montium conuallibus floret.

Ranunculus montanus albus hirsutus.

Descrip.



hirsuta: caulis vnicus cubitalis, vel sesquicubitalis, pilosus, cuius summum in quatuor, vel quinque ramulos palmares plüs minüs facessit, quam diuisionem folium ambit vnicum veluti perforatū, sine pediculo, non minüs profundè quàm inferiora dissectum: flos vnique ramulo vnus insidet, albus, Ranunculi albi similis, an aliquid habeat purpurei non recordor, septem vt plurimū foliis constans, apicibus in medio: hinc oriuntur capitula è latiusculis, ex oblongo rotundis, laui bus seminibus cōgesta, pluribus quàm duodecim, ad semen Pastinacæ Germanicæ accedentia.

Quandoquidem autem planta, quam describimus, nobis minüs integra est, quàm vt possit ex ea bona effigies parari, assumimus Clusii, quæ placet. In ea tamen varietas obseruatur, quod flores constent quinque foliis. Nos semina nostræ plantæ appingenda curauimus: Picturam autem nostram sculptor nonihil corrupit.

In Hist. Pann. vocauit p. 364. Ranun. montanum purpurascens flore: p. 368. Ranun. tertium. Hist. post. Ran. mont. tertium. An Ranunculus quartus Matth. Lobelio: Is in Lc. p. 696. effigiem

Synon.

altera. C. B. phyt. Ran. 42. siue mont. hirsut. Narcissi flore: Pin. 5. siue hirsutus humilior Narcissi flore. Schvv. Ran. mont. hirsut. Narcissiflorus, Ran. polyphyllus niueus, aliquando purpurascens, radice concauâ, fibrillis candidis, miro naturæ artificio contextâ. Iunio & Iulio

haber nomine Alpinae Pentaphyllæ Caryophyllatæ, quæ Ranunculo, de quo hic agimus, optimè conuenit,

H. Lugd. p. 1743. Aconitum candidum *Ἰκαριεύς* H. L. m. Dalechampi, idem est cum nostro Ranunculo & longè diuersum à Ran. Dodonæi albo, contrà quàm Compilerator voluerit, qui floribus sex foliolis appinxit: nos plurimam septem obseruauimus. Porro cum Dalechampus Aconitum hoc suum candidum, Geranium album esse suspicaretur, Herbatii quibus naturæ & facultatis huius plantæ indagandæ negotium commiserat, venenatum esse, & ex Aconitorum genere asseruerunt.

C. Bauh. phyt. Ran. 43. siue montanus hirsutus purpurascens flore. Pin. Ran. mont. hirs. purp. flore.

Geneu in monte Thuri mense Iulio floret & Iunio. Crescit copiosè in monte Iura opacis iugis, semina maturans Augusto.

Locus & tempus.

Ranunculus minimus Alpini, s. albus & luteus.



Minium quos vidi Ranunculorū minimi sunt nulli in Ræticiis montibus collecti. Prior radicem oblique agit pro platuræ ratione magram, flos donatam crebris, longis, perparum coliculo cedentibus, qui diuini aut trium vnciarum altitudine est, vno alteroue foliolo donatus: reliquæ enim tria secta, vel profundè usdūtaxat circumquaque Geranii columbini modo serrata, rotunda ferè, crassa: flos summo cauli insidet albus, aut luteus, à Ranunculorum aliorum flore non differens.

Descripti.

Cæterum, cum Clusius Ranunculos minimos albos ad amissum describar, ac varietatē vnā,

à nobis non obseruatam, tradat, lubuit præter nostram figuram, amborum effigiem inspicendam, & contemplandam proponere.

Prior imago ficas nostras plantas Ranunculi minimi ob oculos ponit: Posterior Ran. mini-

Ilili 3

mi montani effigie Clusianas præ se fert.

Jegerfräut h.e. Venatorum herbam, appellat-
riscribit Simlerus: item, Herbam causticam, &
flore albo *Ranunculum montanum*. Montanos
verò Austriacarum Alpium opilones & venato-
res *sieberfräut* vocare, & ad pellendas febres
[vnde nomen] foliis eius contritis & carpo ad-
motis vti.

Synon.

Gefn.hort.Ran.mont.minimus. Lob. Obs.p.
381. Ran. minimus albus, nonnunquam satione
in luteum mutatus. Fabricio apud Gefn.hort. in
epist.Ran.pariuus fl.albo. C.Bauh.phyt. Ran.16.
sive minimus foliis erenatis: Item, Ran.17. sive
montanus minimus laciniatis foliis. *Eidem in Pin.*
Ran.mont.2. sive humilis rotundifolius flore mi-
nore, Ran. mont. primi species prima: Item,
Ran. mont.3. sive alp. humilis rotundifolius fl.
maiore, Ran. mont. minimus Gef. hort. Ran.
mont. primi species altera Clusii. Ran. montanus
Dod. ed. Belg. flore interdum duplici foliorum
serie constante.

Locus &
tempus.

In Rhætiæ monte Albula floret Iulio. Abun-
danter provenire conspiciebat Clusius in sum-
mis Schneberg & vicinarum Alpium iugis, con-
fragoso solo, & pænè in ipsis petrarum fissuris. In-
nuoque interdum isthic florebat, aliquando se-
rus: ut videlicet nix maturus aut serius soluitur:
in hortos autem translati, maturè admodum, &
ante alios *Ranunculos*, Aprilis sc. flores profe-
runt.

Ranunculus Thaliæri folio.

Descriptio



CAulem ha-
bet peda-
li altitudine
assurgentem,
gracilem, ex
viridi rubes-
centem, in
quo qua-
terna aut qui-
na folia, maio-
ris Thaliæri
flore albo fo-
lis, colore &
formâ valde
similia, sed mi-
nora, & tene-
riora, amaro
sapore: *stipulis*
in singulis ala-
rum sinubus
singulares,

candidi, qui que foliolis constantes, suis petiolis
innitentes: quibus decedentibus succedunt bina
aut terna *cornicula*, *femen* rotundum, subruffum,
Aconiti hiemalis vulgò appellati femini ferè par,
continentia: ex eadem radice, præter caulem, pro-
deunt bina aut terna folia suprà descriptis similia,
singularibus, dodrantalibusque pediculis, eiusdè
cum caule coloris innixa: radix impensè amara,
multis albis fibris donata est, ex quarum capite
alia exit nodosa radícula, subinde ad singula in-
ternodia novas fibras agens, atque hac ratione
se propagans, ideoque perennis.

Synonyma

E tribus *Ranunculi* præcocius florentis ge-
neribus est hic Clusio in post. Hist. alter ideoque
Ran. præcociem secundum Thaliæri folio cogno-
minat. In Pann. ad quam potissimum classem
Ranunculum Thaliæri folio referret diu secum
deliberavit, sc. *Ranunculinè* an Thaliæri vulgò

existimati generibus adscribere debebat: etenim
aliquot notas cum vtriusque convenientes habere
credidit. H. Lugd. p. 321. *Aquilegia minoris*
Dalechampi titulo pinxit, teste Camer. hort.
C. Bauh. phyt. vocat *Ranunculum* 3. sive album
folio Thaliæri: *Pin. Ran. nemoros.* sive Tha-
liæri folio.

Abundè nascebatur in saltu Leytenberg, ^{Locus}
Manderstorf vicino, ultra Leytam flumen, quin-
to ab vrbe Vienna Austriaca milliari, vbi pri-
mum illum observabat author, deinde quibus-
dam aliis umbratis silvis Viennensi agro. Inve-
niebat etiam apud Zollnoek Ill. Herois Balth. ^{Temus}
de Batthyán in Vngaria oppidum, inter vepres.
Florebat Aprilis, semen interdum Maio, plerum-
que Iunio, ad maturitatem perueniebat.

Ranunculus Creticus albo flore, maiore quàm PAPA-
veris thæadis.



Foliis est ^{Descriptio}
Ranunculi
pratensis vel
hortensis rep-
entis, diuisis
specie trifoliâ,
rariùs quin-
quefoliâ, per
margines ere-
natis, per ter-
ram sparsis:
caule rotun-
do, pedali, qui
duos vel tres
flores sustinet
magnos, ex
sex, vel sep-
tem foliolis
compositos,
albos, PAPA-
veris erratici
florema

gnitudine superantes, quibus succedit capitulum
feminibus aliorum *Ranunculorum* more consti-
tutum.

Ranunculum 38. sive *Creticum album* accepit
C. Bauh. [vt in phyt. ait] Patauo à Laurent. Ro-
senavv pharmacopœo germano, cui in horto cre-
uit, nomine *Ranunculi* ex Candia rari.

Ranunculus montanus purpureus catys villos. ^{Synonyma}
Falci.
Placeri.



Plantulae ^{Descriptio}
huius fa-
cies diligen-
ter confide-
ratio facile di-
ligentibus dif-
ferentiam sui à
reliquis *Ra-
nunculi* spe-
ciebus offen-
det. Dodran-
talis est plan-
tula. Folia ve-
lut in digitos
dissecta, par-
tim à coli-
culorum exor-
tu longis pe-
diculis hæren-
tia, partim ex
ipsis pedicu-
lis

lis pendentia. In summo flos infidet singularis, Ranunculi, sed, ut sicca ostendit, purpureus, villosissimo & veluti bysso, eique concolori lanugine obrecto, calyce præditus.

Cl. Fel. Platerus in Alpibus Valesiæ lectum in suo Herbario sicco adseruat, à quo mutuatam descripsimus ac pingi curauimus.

Ranunculus racemosâ radice.

C Vitali caule est, nonnihil hirsuto, quæritur comitantur à radice longissimis pediculis hærentia folia, orbiculata ferè, alia magis, alia minus, profundè dissecta, segmentis modò latiusculis, modò tenuioribus, subhirsuta: flos luteus Ranunculorum vulgariū similis, radix Chelidoni j minoris æmula, è plurimis bulbillis, quos fibræ quædam intercursant, racematim congestis composita.

D. Bauh. phyt. vocat Ranunculum 26. siue racemosâ radice. Agetius siccam dedit pro Ranunculo Chelidoniæ radice.

Ranunculus Illyricus radicibus bulbosis, foliis longis.

Describe.



Ranunculus Illyricus radice donatus est ex plurimis bulbis, ceu Pini nucleis, albis, racematim quasi cõgestis, quibus se mirum in modum propagando multiplicat: folia germinatione prima ex pediculis longis rubentibus paruula, glabra, viridia, tam Plantagineis primigenijs similia, ut internosci vix

possint, nervis per folij longitudinem decurrentibus: adolescentiâ dissecari incipiunt in longissimas portiones ternas quaternasque, varia dein diuisurâ adhuc amplius incisa, simulque molli & incanâ lanugine vnâ cum pediculis pubescere: caulibus cubitalis & sesquicubitalis, in ramos aliquot brachiatus, totus candidus & pilosus, flores gerit maiusculos aureo fulgore micantes, è quinque folijs compositos, interdum gemellos, inodoros. Quibus succedunt capisula alpera, Fragariæ instar, oblongiuscula, semen continencia.

Cæsalp. vocauit Ranunculi peregrinam speciem alteram flore grandi, folijs candidis. Tabern. Icon. Ranunc. Illyricum: Hist. Ran. 16. Illyricum: Item, Ran. secundum Diosc. Gelotophyllin Plinij libr. 24. capit. 17. σελανθόν ἑρπον Authorum Epigramm. σελανθόν ἑρπον Græcorum, σελανθόν ἑρπον aliorum, & χαλτοφύλλιν. Herbam sceleratam Apulei: Herbariorum verdò Ran. Sardonium, Sardoniam herbam, Sardoam herbam, Apium, filuestre & rusticum, German. Windischer hanen füss. German. Ran. Illyricum, Anglicè, Crowfoote of Illyria. Dodon. Externorum Ranunculorum. 1. quem Dioscoridis Ranunculum se-

cundum esse vult: & Ran. Illyricum.

Lobel. in Obleru. f. 83. Icon. Plant. p. 672. & H. Lugd. pag. 1032. p. & Ran. Dodon. Ran. Illyrici habent. Clus. in Hispan. vocat Ranunculum Panonicum: Hist. p. 11. Ran. grumosa radice quartum.

C. Bauh. phyt. Ran. 27. siue folijs oblongis in Synon. cisis lanuginosis: Pin. Ran. grumosa vel etiam C. Bauh. Alphodeli radice 1. siue lanuginos. angustifolius maior: Item, Ran. grumosa radice 2. siue lanuginos. angustifol. minor, Ran. Illyricus Eyst.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. suis bulbis Locus & plurimum se multiplicat: folia æstate pereunt. Tempus. Gener verdò Cherlerus spontaneum obiciuauit prope Romam, florentem Maio.

Ranunculus Tripolitanus flore phæniceo, vel Asiaticus grumosa radice. 1.



H Vinctus è Clusio: cui dicitur in Panon. pag. 374. Describitur Ran. Byzantinus 2. siue simplex flore rubro: p. 376. Ran. Tripolitanus phæniceo flore: Hist. p. 11. Ran. Asiaticus grumosa radice primus. Gerar. Locus & Ran. Tripoli-tempus tanus, Anglic. Crowfoote Tripoli. Cæsalp. Buhin. phyt.

Ran. 25. siue flore simplici rubro: Pin. Ran. grumosa radice 5. siue si phæniceo minimo simplici.

Peregrè inuectus & Constantinopoli allatus Tarabolos catamerale nomine insignitus, quod Tripolitanum plenum florem significat: florèt sub finem Maij, aut initio Iunij.

Ranunculus Asiaticus polytellos, siue grumosa radice secundus.



S Vpicamur Scum ranu. Describitur hoc Clusiano eundem esse, aut certè valde similem ranunculum Illyricum Imperati, cui Hist. nat. p. 755. folia adscribit profundè incisa, & in ambitu serrata, crassiuscula, & nonnihil pilosa, coloris pallidi & viridis, saporis ingrati & mordicantis: flores albos, interdum color. minij: semina alata

& foliola, in spida: radices tuberosas, propter quas multis dicitur Ranun. tuberosus, p. 768. Ran. Tripolitanus radice tuberosâ, fl. puniceo.

C. Bauh. Pin. Ran. grumosa radice 6. siue ramofus. Ran. Afiat. grum. rad. fl. phœniceo ruberrimo, Eyst.

*Ranunculus peregrinus grumosa radice
1. 2. & 3. florib. albis.*

Ranunculi hæc noua genera, Ioanni Bridoul, Insulis Flandriæ vrbs Medico, semine ex Italia accepto, nata, Iacob. Plateau vnâ cum iconne Clusio communicabat, qui fusè describit.

C. Bauh. Pin. dicitur Ran. grum. rad. 8. siue flore albo: Item, Ran. grum. rad. 9. siue fl. albo, leuiter crenato: Et Ran. grumosa rad. 10. siue fl. niueo.

*Ranunculus Constantinopolitanus
fl. re sanguineo pleno.*

Locus



Triplicem hunc facit pingit & describit Clusius qui Constantinopolitani quidem siue Byzantini cognomen illi dedit, quod quibulda hortis Byzantio vicinis & in eius vrbs conspectu, vltra tamen Bosphorum sitis, intellexisset inueniri, quâ fortè ratione Asiaticum vocare præstaret.

Primus autem Ranunculus ex-

ternis à Dodonæo descriptis accedit, sextusque constituitur, ac pro primi generis purpurei floris Ranunculo apud Dioscoridem admittitur, & verisimile est non perpetuè & vbique multipliciter factis flore, sed & simplici non raro nasci. Is etiam inscribitur à Lob. in Obl. p. 384. & Ic. Plant. p. 672. Ran. sanguineus multiplex: & sicut idem à Germ. qui The Double rod Cromfoote Anglicè vocat. A Tabern. Icon. Ran. Turcicus siue sanguineus: Hist. Ran. 15. Ran. sub prima Dioscoridis Ranunculi specie meritò reponendus, Ran. Chalcedonicus, Constantinopolitanus & herbanus f. A C. Bauh. phyt. Ran. 24. siue fl. multiplici rubro: Ab eodem in Pin. Ran. grumosa, vel etiam Asphodeli radice 1. siue flore sanguineo.

Ran. Turcicus.

Prior reliquorum duorum Ranunculorum Clusianorum Asiaticorum fl. pleno, cuius iconem damus, est Ran. Asphodeli radice 2. siue flore subphœniceo rubente, & Ran. pl. flore ruberrimo, Eyst. Posterior, cuius etiam hic posita figura, dicitur Ran. Asphodeli radice 3. siue fl. rolifer miniatus, Ran. Afiat. grum. rad. fl. pleno sanguineo proliifero, Eyst.

Ranunculus grumosa radice, flore niueo,

Locus

Ranunculi grumosa radice plantam semine à Creta accepto natam, ad Clusium mittebat anno à Christo nato 1601. Iac. Plateau, quæ in-



utile esse arbitrabatur idem Clusius.

*Ranunculus Pyrenæus folijs sublongis non
laciniatis albo flore.*

Prorius nouum censet Clusius hoc Ranunculi genus, quod anno Christi 1605. primò illi conspectum, cultum scilicet, suisque floribus onustum sub Martij initium in hortis Ioannis ab Hogelande & Christiani Porreti, quorum vtique à Ioachimo Venerio plantas acceptat præcedente Autumno è Pyrenæis montibus erutas.

C. Bauh. pin. Ranunculus folio longo 4. siue montan. folijs Plantaginis. Ait C. Bauh. & sic Ran. Pyrenæum albo flore Clusij in hisp. app. 2. cum tamen Clus. vnica tantum appendicem ibi annexerit, nec in ea huius meminerit. Idem suspicatur esse Ranunculum phœniceum Myconii. Lugd. p. 1036. sed labitur: Est Ran. angustifol. bulbosus.

Ranunculus longifolius, alijs Flammula.



gitudine circiter palmari, sapore acri: flores Ran. vulgaris pratensis, contractiores, aureo fulgore nitent: radix ex fibris albicantibus conflata est: caules etiam serpunt, & quidem rursus, vt in Ranunculis quibuldam, radicantur.

seque anno florem proferebat, Ranunculo peregrino formâ non valde dissimilem. Flores autem explicabat Ranunculus hic Creteus grumosa radice flore pleno, mense Maio cû Asiatico phœniceum florem gerente, quibus succedebat simile capitulû, non dissimile paleaceo & aceroso semine oblitum, quod in-

Ran. Cret. grum. rad. fl. pleno.

Tempus

Locus

Caulis est Descripti

Codrantali, glabro, fistuloso, geniculis nodoso, nunc solitario, nunc in ramos diuiso, reptante: filia priora ex longis pediculis vnciam semis lata, oblonga alia, alia subperiora per caules ex articulis oriuntur, bina, interdum serrata quæ minùs angusta, longi-

Dodon.

Dodon. gall. Flammulam, quasi flammam, aut Herbam ignis à superante & ardenti caliditate, nominavit: gall. *Flamme aquatique*: Belg. *Egel-coolen*: ferunt enim hanc pastas herbâ, inflammationibus iecioris, internorumque viscerum erosionibus ac exulcerationibus corripit: quod malum *Egel* vulgò appellant: unde herbâ nomen. Qualem autem nomenclaturam apud veteres adepta sit, fatetur se ignorare, si non sit herba illa, quam Octavius Horatianus Cleoma appellat, quæ in locis quoque humidis crescit, & temperamento, admodum calida est. In Hist. verò purg. & lat. in fol. Octavii Horatiani Cleoma esse hic negat: quod sc. flammula Sinapios forma, qualis in Cleomate requiritur, haud respondeat. Suspiciatur etiam non tamen affirmat, Plinio lib. 21. cap. 13. herbam illam esse, quæ ab exitio iumentorum quidem, sed præcipuè caprarum, *Agolechtron* appellata sit.

Synon.

Lob. in Obs. p. 32. Ic. Plât. p. 679. priorem figuram Dodonæi Flammæum Ranunculum aquat. angustifolium, Taracosis effigie, inscribit, & Flammulam vulgi: Posteriori Ran. aquatilem angustifolium ferratum.

Tabern. Icon. Ranunculus lanceatus minor *Specht Kraut* / langer wasser hanc fus: Item, Ran. lanc. ferratus, *geferstter langer wasser hanc fus*: Hist. Ran. 18. lanc. minor, *batzgeren nâpoulan* Cordi, Ran. latifolius, aliorum Famula palustris minor: Ran. longifolius: Item, Ran. 19. lanceat. ferratus, Flamm. aquat. ferrata, Ran. longifol. ferratus.

Gesl. apud Cordû Ranunculi duodecima species Cordi, lævibus & ferratis foliis: Eidem hort. Ranunculi alterum genus, Dodonæo oues occidens, *Ego* Ranunculum Cordi duodecimum refero ad Ranunculum longo folio maximum, Linguam Plinii, Thaliolum imitatus.

Cæsalp. Ranunculus alter folio nulla ex parte scisso, Coronopi, Ran. infectus.

Gerard. Ran. flammeus minor: Et, Ran. flamm. ferratus

Schvv. Ran. flamm. minor siue lanceolat. minor, Lingua Plinii Lugd. *Egelkraut*: Item, Ran. flamm. angustifol. ferratus, lingua maior Lugdunensis. Lingua Plinii est Ran. longo folio maximus: lingua maior, est Virgæ aureæ, siue Solidagini angustifoliæ affinis. Quare Scvv. dupliciter labitur.

C. Bauh.

C. Bauh. phyt. Ran. 32. siue palustris angustifolius non ferratus: Et Ran. 33. siue palustris ferratus. *Suspicio* eiusdem plantæ foliis ludentis esse synonyma. In eadem enim planta utrumque foliorum genus observaui, quæ perbellè nostra pictura ostendit. In Pinace [vbi nobis videtur differentes plantas confundere] Ranun. folio longo 2. siue longifol. palustris minor Ran. 1. Anguillaræ: 12. Cordi, aquat. *app. 12. nâpoulan* maior Thalii, Enneaphyllon Plinii lib. 27. cap. 9. Item, Ran. folio longo 3. siue palustris ferratus.

Lectus & Tempus

Tres huius habet icones H. I. ugd. pag. 1035. 1041. & 1038.

Genevæ circa S. Geruasium floret mense Maio & Iunio, eâ quidem formâ, quâ à nobis pingitur, & circa *Bossey* in paludibus Lugduni & Tiguri copiosè provenit: Basileæ quoque vliginosis locis observatur.

Vires & Vire.

Facultate cæteris Ranunculis similis est, acris similiter, exulcerans, & vesicas faciens. Edendo pecora enecat, & ideo arcent sedulo pecus opiliones, neco verò inflammentur præcor-

Tom. III.

dia, indidemque moriantur, • videre est in balantum extis, quæ huius pabulo ambusta fuerant, teste Lobelio in Adu.

Ranunculus longo folio maximus, Lingua Plinii.



IN vliginosis Descrip.

IN Solo & palustribus exit Ranunculus Lingua Plinii Dalechamptio puratus, caule bicubitali & altiore, crasso, lævi, in ramos subinde ducto, per quem, veluti & per ramos, alternatim folia producantur, pedali circiter longitudine, vix viciam lata, crassiuscula, glabra,

mucronata, saporis acris & amari Dalechamptio: flores extremis inhærent ramulis, magni, Ranunculorum aliorum formâ: quingue foliis luteis constantes, quorum medium obident numerosi apices concoloris: eis superueniunt, auctore Tabern. capita erinacea, parvæ nucleis ligandis magnitudine, cum acutis aculeis. Saporis calidi & vrentis: radix compluribus fibris defixanitur.

Facile adducor, ut credam, Cordum Hist. per Ranunculi duodecimam speciem, platyphyllon non impropiè dictam, foliis inferius Lauri similibus, gracilioribus tamen, Linguam Dalechamptii intelligere, ut asserit Thalius, quamvis figura à Gesnero addita, sit Ranunculi folio longo.

Cæsalp. Ran. folio nulla ex parte scisso, Ran. infectus. Tabern. Icon. Ran. lanceolatus maior, *grosßlang wasser hanc fus*: Hist. Ranunc. 17. lanceolat. maior, Ranunc. flammeus maior [etiam Ger. & Schvv.] & Flammula palustris maior. Cæsp. B. ubi phyt. Ran. siue palustris maior, foliis primis aliquando subrotundis, ad Chelideniæ minoris aut Cochleariæ formam accedentibus.

Synon.

Hunc à fratre habui, qui cum collegerat in paludibus circa Michelsfelden. Nascitur copiosè circa Walckenridam monasterium ad piscinas inter arundines. Prouenit etiam inter vrbem imperialem Wormatiæ, & Electoralem Oppenheim/ paludosis locis & fossis Rheni antiqui.

Locus

Lingulæ circa fontes nascentis radix communis teritur, ac ad ipsi suis nigre admiscetur. Sed id excipitur, ut eius sit suis quæ nunquam peperit. Sic in Sole illa plurimum alopecuræ confert.

Ranunculus gramineus pleno flore.

Exhibemus præsentî capite figuram Ranun. Sinon. Eculi folio Graminis Dodonæi in fol. lat. sed descriptionem eius, quæ herbæ non conuenit, repudiamus. Est enim Ranunculi pumili gramineis foliis, de quo paulò infra dicemus.

Kkkkk

Synon.



Locus.

montanus folio gramineo multiplex.
Colitur in Belgicis hortis.

Ranunculus angustifolius bulbosus.

Descriptio.



lævia, fractu contumacia, neruata, & in acutum desinentia, longitudine palmi vnus: latitudine verò transuersi vnus digiti, Palmæ folium in modo substantiæ & contumacia fracturæ imitantia. Caulem habet cubitalem ferè semper, tenacem, solidum, rotundum, in quo folia minima sunt. In summo caulis flores existunt ex quinque foliolis constructi, in medio muscosi, formæ figuræque similes Ranunculis. Semen habet candidum, magnitudine Milii. In radicibus sapor cum multa humiditate acris est, sed in foliis maior, vt vix Ranunculis cedat. Et ita in Hist. Lugd. delineatur.

Planta veteribus indicta, inter Ranunculi tamen genera Dalechambio videtur collocanda ex sapore, formâ florum, & radicum.

Synon.

C. Bauh. phyt. vocatur Ran. 30. siue montanus longifolius: Pin. Ran. folio longo 7. siue gramineo folio bulbosus, Ran. leptomacrophyll. bulbosus, vel Ran. bulbos. gram. montanus, Columnæ. Hist. Lugd. p. 1036. Ran. phœniceus Myconi.

Locus.

Rara inuentu, frequentissima in montibus D.

Lob. in Icô.

Plantar. p. 671.

Ran. gramineus multiplex. Tabern.

Ran. 24. Ran. gram. 2. multiplex, aut multiflorus, aut

Cotonarius, gefült groß hânlein / gefülter groß hânensfüß.

C. Bauh. phyt.

Ran. 29. siue gramineus flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

flore multiplici: Eidem in Pin. Ran. folio longo 6. siue

gramineus

Marie à Monteferrato, & circumuicinis partibus ad montium radices, iuxta arbuta & quercetâ. Tempus Floret Aprilis & Maio.

Ad eadem præstare creditur ad quæ Ranunculus, minoris tamen esse efficacis.

Ranunculus pumilus gramineis foliis.

Fibræ, quibus radicator, vncias duas plûs minus longæ sunt, satis crassæ, & fibrillis capillaribus donatæ, quæ in radicem minimi ferè digiti crassitudine coeunt, filamentis supra terram comosam, quod haud absurdè fortassis perennitatis fidem faciat: folia è radice statim pullulant, in mea quidem sicca planta, septena, duas vncias longa, aut paulum admodum excedentia, angustæ gramineæ, vnumque vncia breuius mediq

Descriptio.



cauli adnatum, alioqui nudo & enodi, gracili, palmo altiori: cuius fastigio flos insidet vnicus, iuxta magnitudinis, qualis est Lingue Dalechâpii, vel vulgaribus Ranunculis, maior multò quàm Ranunculi flammulæ dicti, è quinque foliis compositus, quæ totidem minoribus, vt in Ranunculis fieri solet, suffulciuntur: succedit Lob. teste semen racemosum Ran. pratensis.

Lob. in adu. dicitur Ranunculus pumilus gramineis foliis, & geniculatus. Sed cur geniculatum ait, cum nihil tale figurâ exprimat aut descriptione tradat? Quare in Obs. p. 383. & Ic. Plant. p. 671. vocem geniculati meritò omisit.

Tabern. Ic. Ran. gramineus: Histor. Ran. 22. gram. primus. Ger. Ran. gramineus Lobelii: s. 466. n. 5. Schvv. Ran. palustris gram. minimus, & [sed perperam] Hydropiper lanceolatum H. Lugd. C. Bauh. phyt. Ranun. 28. siue gram. minimus: Pin. Ran. fol. longo 5. siue montanus folio gramineo, & Hydropiper lanceolatum Lugd. Hos nos aliò referimus.

Parum obuius, duntaxat Narbonensis Gallie pratensibus, pone publicum diuersorium montis Lupi, & in arduis Mindeni Ruthenorum pratibus & pascuis. In Prouincia & circa Montepellum quoque reperitur. Si plantetur pingui & humido loco, valdè excrefcit, & pulcher visu est.

Locus.

Ranunculus Asyrnialis, folio lato, rotundo, serrato.

Clusio describente pro Ranunculi grumosa radice primi speciei secunda pingitur. Sed mirum clusium in Hist. post. istius descriptioni & alteram iconem, Ranunculi sc. grumosa radice primi, apponere, ei non respondente, nec ullam rationem reddere.

Dodon. (qui figuram Clusii, Ranunculi Lusitanici titulo assumpsit) inter externos tertio loco reponit, & Hiemalem Ranunculum cognos-

mi.

minuait, tertiumque apud Dioscoridem esse asseruit, eiusque exemplaria pleraque *diogenes* minus bene habere, pro *ivogon* annotavit.

Lobel. in Ob. p. 384. figuram Ranunculi Lusitanici autumnalis Clusii exhibet, eique in Hist.

Belg. aliam non parum differentem, de qua sequi capite, supponit, non tamen monet eum priorem fultulerit, & aliam substituerit, nec plura in Hist. Belg. de Ran. Lusitanico Clusii, quam in Obseru. In Icon. Plant. p. 673. Ranunculi Clusii imaginem omisit, & Lusitanici titulo, Ranunculum Belgicæ Hist. h. e. bullatum, reposuit.

Tabern. Ran. Lusitanicus Portugalscher

mensfuß: Histor. Ran. 20. Lusit. siue autumnalis. Ger. Ran. autumnalis Clusii. Winter Crowsfoote. C. Bauh. Ran. 36. siue foliis rotundis bullatis: Pin. Ran. grum. rad. 12. siue latifol. bullatus Asphodeli radice, flore paruo.

Frequens est circa Olyssipponem inter Oliueta, & plerisque Beticæ locis, ubi florentem primum Nouembri, deinde Ianuario collegit Clusius, & arcticis in Belgium misit, apud quos Octobri & Nouembri flores protulit, & totâ Hieme folia retinuit in Maium usque mentem: aliis nouis, paullo ante quam florere incipiat, repululantibus. Mechliniæ ipsâ bruma floret Lobelius in hortis.

Sunt in Lusitania qui Montan nominant, quæ tamen appellatione ferulaceæ quædam planta apud eos etiam insignitur,] & ad prouocanda menstrua ex lacte propinant, referente Clusio.

Ranunculus Lusitanicus bullatus.

Hoc genus Ranunculi delatum est ex Lusitania operâ Clusii, & primum à Lobelio [ex cuius descriptione patet esse genus præcedentis, aut ei admodum affine] in suo Herbario exhibitum, Belgico sc. p. 819. itemque Icon. Plant. pag. 673. Ranunculi Lusitanici Clusii inscriptione. Antè diximus nos admirari

sub dicto Clusii titulo Lobelium diuerfas po-

nere icones nullâ indicata mutationis causâ. Tabern. Icon. Ran. Lufz. Clusii: Hist. Ran. 21. Luf. secundus. Ger. Ran. Lufz. Clusii. Clusii in Hist. post ponit iconem Ranunculi grumosa radice primi titulo, quam non habuit in Hispaniis, nec demonstrat cur id faciat: in descriptione verò nulla vitur distinctione quamuis icones sint valdè diuersæ.

C. Bauh. phyt. Ran. 36. siue foliis rotundis bullatis. Inter hunc & præcedentem Ranunculum non bene distinguit: Paullo melius in Pin vocat Ranunculum grum. rad. 12. siue latifolium Asphodelli radice, fl. magno.

G. B. notat.

Quæ hic sequuntur sybnectenda sunt libri xxx. cap. 137.

Auricula ursi siue Primula Veris Alpina, flore rubente.


Quæ flore Descrip:

Auricula ursi, caulem præfert palmatam & maiorem, nudum, teretem, in vinctu albicantem, in cuius fatis ocalathicus foliaceus exalbidus ferè & quasi frumâ conspersus, è quo præseunt flores multi, umbellatim digelli, pediculis leguminalibus & vncialibus, calathicis concoloribus, odorati, suauiter rubentes, fundo intus luteo, in sex laciniis cordatis diuisi: folia à radice multa, oblonga, subrotunda, in ambitu serrata, crassa, magis lupia quam infra virentia, vtrinque farinaceo albo puluere conspersa, sapore amaro & nonnihil acri: radix crassa, fibrola, alba.

Figuram damus plantæ in horto cultæ, quæ vbi adultior, variat foliis & flore, non quod diuersa sit, folia enim longiora euadunt, & flores excrescunt. Ab hac non diuertim existimamus olim collectam in Rhætia, flore rubro, nisi quod omnia minora floresque pauciores. Lobelius in Icon. Plant. p. 570. attribuit Auriculam vrsi flore purpureo. Gesn. hort. Arthritica Alpina, siue Auricula vrsi species minor floribus purpureis, altius in alpihus nascens. De Lunar. Lunaria arthritica species flore rubro, foliis minoribus, & modicè crenatis, in silua Grindelia ditionis Bernensis. de coll. stirp. Arthritica Alpina rubra, Arth. petra montana rubra. Arct. in descr. montis Storchhornii, flüßblumen. flore purpurascente, sanguinis modo: itemque atro colore Clus. Pan. p. 346. & Hist. post. Auricula vrsi 2. vel, rubro flore, Rote Schlüßblumen: Florem atrum in simili planta Clusius nunquam conspexit.

C. Bauh. phyt. Sanicula Alpina 2. siue purpurea, Auricula vrsi flore purpureo Lobelii Item, Sanicula Alpina 3. siue rubra, Auricula vrsi 2. Clusii. Is animaduertens errorem commissum, in Pinace has duas non amplius separat, sed

Kkkkk 2



Synonyma
Tempus

vnam esse rectius pronunciat. Sanicula Alp. foliis serratis 2. siue Alp. purpurea, inquit, est Britannica Anguil. Auricula vrsi Cast. flore purpureo Lobelii, Auricula vrsi siue rubens Ger. Auric. vrsi 2. Clusii, Primula Alp. latifolia, Tab. & Sanicula Alp. rubra eiusdem.

Hanc frustra per Austriacorum Styriacorumque montium altissima iuga quæsiuit Clusius: primum autem conspexit in horto Aicholtzii, Medici & Professoris Viennensis. Ego in Rhæticiis montibus inter Clauennam & Burmum collegi. Montbelgardi in horto Ill. E.C. florere Aprili

Auricula vrsi flore rubro, maculis exalbidis, foliis subhirsutis.

Descript.

Folia habet quàm præcedens minora, teneriora, minus crassa, subhirsuta, per ambitum vndique serrata, inter quæ nascitur cauliculus superiori similis, flores in umbella pares ferens, & rubros, exalbidis tamen maculis asperfos, cuius radix similiter fibrosa, nouasque è lateribus propagines fundens, auctore Clusio, qui Auriculam vrsi tertiam facit, & germ.

Note Schlißselblumen vocari alicubi ait.

Figura est Tabernamontani qui quinque proponit solo colore differentes.

Calp. Bauh. phyt. Sanicula alp. 4. siue flore rubro albis maculis asperfo. Pin. Sanic. alp. fl. variegato.

In Tyrolensibus iugis, præsertim in Kitzspil inueni

niti intellexit Clusius.

Auricula vrsi carnei coloris foliis minimè serratis.



Clusius Hanc Auriculam vrsi quartam vocat. Steim Kößlin autem h. e. petraza Rosula, ob venustatem & roseum colorem, tum quod in scopulis nascatur, à montanis pastoribus nuncupatur.

Calp. Bauh. phyt. Sanicula alp. 5. siue folio non serrato: In Pin. Sanic. foliis non serratis 1. siue alp. rubesc.

cens, fol. non serrato: Auricula vrsi 7. Tabern. rubescens Gerardi.

Inuenitur in Sna. berg, reliquisque vicinis iugis & Stiria Alpibus frequentissima. Rhizomæ mulierculæ singulis annis in forum Viennense venalem inferunt.

Auricula vrsi orbiculata serrata coloris rubicundi.



TYrolensi

[Auricula vrsi flore rubro, maculis exalbidis, foliis subhirsutis,]

non valdè ab similem hanc, in horto Ill. Principis Catorum Wilhelmi Castellii florentem conspiciebat Clusius anno 1599.

Ei autem Auricula vrsi quinta dicitur. C. Bauhin. pin. Sanicula alp. foliis serratis 1. siue alp. foliis

rotundis: quam etiā minoribus foliis reperiri ait.

Auricula vrsi alba.

Minor est rubra. Vnicam autē plantam conspiciebat Clusius, in horto Sprengeri anno 1597. Maio mense, quaterna, aut quina ferentem folia, crassiuscula, dilutè virentia, nullis crenis in ambitu donata, inter quæ prodire fertur caulis è viridi candicans, tres uncias aut amplius longus, summo fastigio ferens quinos aut plures flores, flauæ formæ æquales, sed candidos: radix superioribus respondens, aliquot fibris, vt illæ, donata erat.

Est Clusio Auricula vrsi sexta: C. Bauh. pin. Sanicula foliis non serratis 2. siue alp. alba foliis non crenatis. Huic similis reperitur flore pallido, quæ Auricula vrsi pallido flore, Clus. cur. post.

Auricula vrsi angustifolia colore rubente.



Hanc etiā describit Clusius: Icon autem est Tabernamontani, Auriculæ scilicet vrsi octauæ, quæ Clusii descriptioni respondet excepto quod suæ nullum Tabernamontanus assignat colorem.

C. Bauh. phyt. Sanicula alp. 6. siue angustifolia flore dilutè rubente.

Pin.

Pin. Sanic. alp. foliis serratis 5. siue alp. angustifolia, Auric. vrsi 7. Clus. pann. 7. in Hist. ar. 8. in cur. Auricula vrsi fl. purpureo, Ger. Eyst. Huic similis, breuioribus tamen foliis, cuius Clus. in cur. post. meminit.

Tempus

Crescit hæc, inquit Clus. in quibusdam Alpibus Carinthiæ & Styriæ superioris. Floret sub finem Iulii, h. e. nubibus in summis illis iugis liquecentibus. Rara hæc, quia ex procul diffitis montibus delata, in vnius Aicholtzii horto paucos annos perdurauit, omnem cultum ita respues ut nunquam ad frugem perueniret, imò ne florem quidem deinceps proferre voluerit.

Auricula vrsi minima flore carneo & niueo.

Locus



IN summo Snerberg iugo primus istam obseruabat Clusius anno 1574. neque vlllo alio vicino iugo postea ipsi sese obtulit. In Tauro tamen & Iudenberg, etiam inuenitur, & cum illa rarum aliud genus per omnia simile, sed cuius folia magis pallescent, flores lactei sunt candoris.

Similem Auriculam nobis communicauit Agerius, cuius

figuram exhibemus, earum quas hæcenus vidimus Auriculam minimam, non penitus vnicam altam, foliolis à radice semuncialibus, per extremum latis & fimbriatis, carnosis, petioli inter hæc surgunt semunciales, quorum vnicuique insidet flos vnus satis magnus Auriculæ vrsi, purpureus, vel ruber, quantum ex sicca planta iudicare licet: radix crassifcula, duplò reliquâ plantâ longior, longis fibris appendis donata.

Synon.

Clus. Pann. Auricula vrsi 6. siue minima, flore carneo & niueo: Hist. post. Auric. vrsi 8. minima: 10. cur. post. Lobel. Obs. p. 308. Ic. Plant. p. 571. Sanicula alp. minima Tabern. Ic. & Hist. Auricula vrsi minima, siue 9. flore niueo, interdum singulari, interdum gemino, inodoro, flos roseis Bæcc Sanicel: Item, Ic. & Hist. Sanicula alpina minima, flore rubro, flos berg Sanicel: similis Saniculæ alpinae, nisi quod radice, foliis & floribus paulò maior. Tabern. habet figuram Clusii, quam etiam nos in tabella superiori loco pingimus. Secunda Tabern. figura non videtur differre à priori iam dicta: sed fortè ex illa facta, ut videatur aliquid noui habere. Nos ex planta sicca flore purpureo & rubro, in inferiore tabella parte, iconem eâ magnitudine, quâ eruiamus, expressimus.

C. Bauh. phyt. Sanicula 8. siue alp. minima. *Pin. Sanicula alp. fol. serratis 7. siue alp. minima carnea, Arctichica cæruleis flosculis.* Gesner. hort. Sanic. alp. minima Lobelii, Hist. Lugd. Auricula minima Gerardi. Item, Sanic. alp. minima niuea, Auricula vrsi minima flore niueo Clus. Tab. &

Gerardi: An Auricula vrsi flore alba Eyst.

Auricula vrsi Myconii pilosa, carulea.



Diuersam à dictis plantam Auriculam vrsi vocauit Myconus à foliorum figura pilis multis obsitura, eamque pinxit & delineauit his ferè verbis.

Auricular vrsi Myconii

Radices multas emittit ferè capillaceas, fuscas, perris inhaerentes, gustu adstringentes, circa quas folia per humum repunt, Borragini quadantenus similia, in ambitu nonnihil lacinia, aspera, rugosa, crassa, neruosa, pilosa, maximè prapè radices: ex iis enim ad foliorum exortum magna pilorum congeries tomento cuidam & veluti iubæ adsimilis enascitur. Eadem folia tam superne quàm infernè villosa sunt, atque etiam in ambitu pili vbique rufescent. Ex foliorum medio duo aut tres cauliculi emergunt, rotundi, dorsales, hirsuti, solidi, succoli, purpurascetes, cum dulcedine adstringentes, in quorum fastigiis flores sunt carulei, ex quinque foliolis compositi, & in horum medio stamina lutea, veluti ex valculo, grani Hordei figurâ, sed maiora, in imo floris posito, exeuntia.

H. Lugd. p. 837. Auricula vrsi Myconii: Auricula vrsi ex Pyrenæis, Clus. Exot. app. alc. auct. Eidem cur. post. Auricula vrsi nona. C. Bauh. in phyt. Sanic. alp. foliis serratis 9. siue alp. foliis Borraginis, villosa.

Locus

Nascitur in vmbrosis, monosilique locis, nonnunquam etiam humidis. In Pyrenæis præcipuè reperitur.

Aqua ex hac planta per organum vitreum destillata ad frangendum calculum in vesica, siue in renibus valdè efficax est. Id quod Myconus se experimento confirmasse asserit. Eadem aquâ Hispani aduersus tussim vruntur: quam ob causam plantam hæc *Yerna Tussifera* nuncupant: at huius foliorum copia, *Pedula*.

Chamaejasme Alpina.

Geniculatim serpendo incedit tenuibus atris Gaut ex atro rubentibus radiculis, ocellum, per terram spargens foliorum semuncialium, latitudinis culmi, mucrone leuiter obtuso, hirsuto, rum: è quorum vmbilico cauliculus exit duarum triumue vnciarum: nudus, enodis, hirsutus, cuius cacumien ornât umbellæ florum, pro plantulæ modulo, magnorum, albicantium per ætatem rubescenrium, odoratissimorum, ad Saniculæ Alpine flores accedentium, quorum vbi pediculi caulibus comituntur, foliola subsunt vitidia, hirsuta, infimis humi stratis multò minorâ. Eadem nonnunquam ex interuallis foliorum habet ocellos plures verticillatos, in radice veluti catenâ

Kkkkk 3

terdum flore maiori, planè niueo. Verbasum maximum meridionalium odoratum duplex luteum & album. Verbasum crispum & sinuatum, quod Diosc. videtur. Verbasum angustifolium ramosum flore aereo, folio crassifloro. Verbasum puluerulentum flore luteo paruo. Verbasum flore albo paruo. Verbasum nigrum fl. paruo luteo, apicib. purpureis. Blattaria fl. luteo. Blatt. pilosa Cretica. Verbas. lychni. Syriacum. Verbas. Monsp. fl. luteo hianthe. Verbas. silu. saluifolium. Verb. silu. saluifol. exotium. Aethiopis. Iacobæa. Lychnis. Primula Veris.

Verbasum vulgare flore luteo magno, folio maximo.

Descriptio



Verbasum vulgare ad tres cubitos & altius excreuit, ex radice alba, lig-nosa, satis crassa caulem proferens itidem crassum, multis alis subinde brachiatum, lanuginosum: folia Enulae, lata, longa, mollia, incana lanugine puberula, nullo aut breui pediculo, alia per terrâ sparsa, alia cauli

adnata, quæ pro arate non parum variant, quædam rugosiora: alia magis polita: caules modò singulares, modò plures, modò brachiati: Hinc tanta figurarum diuersitas. Flores in longo thyrsos, plures simul iuncti, rosulae magnitudine, lutei, quinquepartiti, odore obscuro non ingrato: in medio apices quinque, duo glabri lutei, reliqui albi, lanuginosi: semen in capitulis rotundis succedit, minutum, papauerino suppar.

Verbasum 1. Matth. Cordo in Diosc. H. Lugd. p. 1198. & Cæsalpino. Verbasum mas Anguilli. Lob. in Aduers. Tabern. & Castori. Verbas. mas & Candela regia Lob. in Obs. p. 303. Verbasum aut Phlomos vulgaris mas Dioscoridis 1c. Plant. p. 561. Verbas. candidum mas, Lon. & Lacunæ. Verb. album mas, Thallio. Verb. latius Dod. Verbas. latifolium mas, Eyf. Taphus barbarus, Gerardo. Casp. Bauh. phyt. Verbas. 6. siue mas latifol. flore luteo: Eid. Pin. Verbas. 1. siue mas latifol. luteum.

Phlegma Græcis, & μέλας Galeno, ἀπὸ τῆς φλογὸς à flamma, quod eius foliis & caulibus in lateris pro ellychnis vterentur. A caule thyrsus siue funaleam exprimente, vulgò *Torches* vocatur apud Lobelium, & Græcis φλόγος à flamma, quam alunt funales, aut Phlomi folia & caules in lucernis. Cæ-larum quoque recentiores nominarunt, quod caulibus, adipe, seu vel pingui aliquo illtis, nonnulli pro candelis siue funalibus vtantur. Officinæ Taphum aut potius Taxum, quia toxiacis aduersetur: *barbatum* à densa lanugine. Qui obferuarunt, inquit Lobelius, mustelas confixisse in serpente, penèque enscitas & victas, passas

isto Tapho, & factas denuò alactes, duellum instaurasse, *Taxum* vocarunt. Sunt denique qui *Candelam regis*, *Lauariam*que vocent. Barbaris dicitur Cauda lupina, Aspalathum, Pomphilos, Abedonei, Buluri, Flominos. Maplio. Auidon, Auion, & vt quibusdam placet, Auicennæ lib. 2. cap. 2. Buluri appellatur.

Tragus verò Verbasum hoc maius, sueptimum, vt vocat, masculum leucophyllum & Verbasum arborescens esse existimat, tamen si verba Dioscoridis aliam præ se ferre sententiam videantur.

Nomenclaturæ itaque, quas nunc recensimus satis apertæ ac planæ sunt, quare à proxiore illarum explicatione supercedendum, paucis nonnulla indicaturi. *Differunt* itaque *phlegma* & *Phlemos*, quæ est Vipercinæ apud Agulcium cap. 5. appellatio. Aliud etiam est item *Taxus*, venenosa illa arbor, cuius Virgilius in *Æclogis* meminit. Aliud deinde *Taxus* barbarus (sic enim quidam scribunt, licet alii *Taphum* dicant) quod est Verbasci nomen. Quod autem quidam Verbasum Lanariam herbam appellant [quanquam & apud Dioscoridem peculiaris sit herba, quæ hoc nomine insignita est] id sine causa non factum est, cum folia eius pilosa sint, ac veluti *Salvia* omnem attrahant puluerem, vnde & *Blattaria* dici posset, quemadmodum de *Verbena* Plinius scriptum reliquit.

Verbasci apud Germanos hæc sunt nomina, *Wulfrant* / *himelbrande* / *Brentfraut* / *Bergensfraut* / *funigserz* / *Vnholdenferz*; apud Belgas, *woelcruyt* / & *Torseruyt*; Gallos *Bouillon blanc* / *masse*, & alicubi *Bon homme*: Italos *Tasso barbasso* & *Verbasco*: Hisp. *Gornolobo*: Angl. *Mulle* / *leyme* / *Themale*.

Verbasum latioris folii frequentissimum iuxta agrorum aruorumque margines, aggeres, scrobes, aliisque locis haud cultis, à Iulio mense in Autumnum vsque cum flore reperitur: sed altero tamen, à quo enatum est, anno: semen interea perficitur. Et hæc quæ de loco & tempore de hoc Verbasco dicuntur, aliis subsequen-tibus Verbasci speciebus quoque debentur. Anno 1595. mense Augusto & Septembri colui Verbasum vulgare flore magno planè niueo in horto Ill. E. C. Montb.

Recentiores mollium lanuginosorum Verbasci foliorum decocto, cum dolore promouentes hæmorrhoides vtiliter fouent, nam & dolorem sopiunt, & ipsas hæmorrhoides relin-cando resoluunt. Flores lutei capillos tingere posse putantur: Eisdem cum exiguo oleo in si-mo aliquot diebus maceratos, donec videlicet resoluti fuerint, ad hæmorrhoidum dolores Pos-teriores commendant. Sunt qui & gestatam radicem comitialibus prodesse rentur, præsertim eius, quæ nondum flores fecit, quæque collecta fuerit Sole Virginis dodecatimorion, Luna verò Arctis, peragrante: quod tamen super-stitione & vanitate non caret. Verbasci deco-ctum tollit oculorum ardorem, si eo abluantur. Aqua stillatitia in eos injecta, lachrymantes ex-siccant. Saxonum rustica plebs vititur aridis Verbasci caulibus in Naphtham iniectis ad nuptiales faces.

Verbasum maximum meridionalium, odoratum, duplex, luteum & album.

Excellit maximus odoratus meridionalium Thapsus barbatus vt magnitudine foliorum

Locus & Tempus.

fic etiam odore suavi; omnibus Verbascois: varietas tamen si tantum videtur descripti communis Philomii florib. quippe luteis & interdum albis exit

Descriptio



Synon.



Locus.

fenis foliolis; quæ arantur rubris lineolis odore suauissimo, folio longiore, latiore: radice crassa, nec aliubi dissimilis tota planta. Hæc in Adu. Lobelius, qui in Icon. Plant p. 960. vocat maximum odoratum meridionalium Tapsum barbatum fœminam flore albo: Item p. 561. Verbasum maximum album flore subpallido.

In Belgicis & Gallicis Northmannis hortis alitur. Pedimontani verò agri, Narbonæ, Angliæ, & Italiæ, occurrit passim in campestribus.

Nusquam hanc speciem obseruauimus nisi Monspelii, ubi Autumnio passim fleret. Gener tamen Cherlerus præterque secus vias in Italia obseruari retulit.

Verbasum angustifolium ramosum flore aureo, folio utraque.

sunt continua, amplexantia: flores parui, lutei, Blattariæ floribus non abssimiles, caduci, in quinque segmenta laciniati, staminibus totidem villis purpurascens, medium occupantibus apicibus croceis. Non placent pili longiores, qui huic Verbasco appingi solent.

Matth. in post. comm. Verbasum aliud foliis Papaueris corniculati. H. Lugd. p. 1402. Verbasum laciniatum Matthioli. Dod. Verbasum filu. tertium. Camer. apud Matth. germ. Verb. folio Papaueris cornuti. Tabern. Verbasum filu. salui-folium fruticosum, lignosum: Ic. Plant. Verb. sylu. saluiflorum laciniatum. C. Bauh. pin. Verbasum 4. (2. phyt. siue nigrum folio Papaueris corniculati.

Nusquam hanc speciem obseruauimus nisi Monspelii, ubi Autumnio passim fleret. Gener tamen Cherlerus præterque secus vias in Italia obseruari retulit.

Verbasum angustifolium ramosum flore aureo, folio utraque.



Pvlchrum hoc Ver-

basum communicaui Agerius, collectum, vt ait, in Austria, foliis dodrantalibus, vncias duas & semis latis, spissis, albis, veluti lanugine puluerulentâ obductis: caulibus quantum ex portionibus datis iudicare possum, ramosis, vt in Verbasco flore albo minore: floribus aureis,

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Descriptio

Locus.

Verbasum crispum & sinuatum.

Descriptio



Hic Verbasco infima folia sesquipalmum circiter longa, Papaueris corniculati modo sinuata, candida, superiora verò breuiora, in acutiorē mucronem desinentia, ferè hederacea: puluere aspersa vtrinque, magis tamen infernè, videntur, nullo pediculo, alis

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

caulem, cui

cum tantillo amaro: superior caulis pars innumerat edit propagines, foliis parvis vestitas, numerosis floribus onustas, pediculo breui nixis,



colore antequam explicetur, partim luteo partim candido, propter pulvisculum, sub quo latet, qui expansi, Verbasci vulgaris floribus respondent, sed quadruplo minores, lutei; quinquepartiti, duobus foliis superioribus minoribus, reliquis tribus maioribus, in quorum medio apices quoque luteoli, odore

hullo insigni: radix longa, crassiuscula, interius alba, exterius tantillum rubet, sapore amaro.

Matthiolum passim in comm. pro sua consuetudine picturam exhibet Verbasci secundi titulo, sine ulla tamen descriptione; nec annotatione loci, ubi observant. Ea mihi videtur non male quadrare Verbasci huic puluerulento.

C. Bauh. phyt. Verbascum 3. (2. in Pin.) siue mas angustioribus foliis, floribus pallidis; Verbascum 2. Matth. Lac. Cast. & Hist. Lugd. p. 1299. Verbascum siluestre maius Loniceri. An Lonic. Verbascum secundum?

Montbelgardii inuenitur florens Iunio & Iulio intra moenia, à porta Grauer ad portam prope Castellum.

Verbascum flore albo paruo.



Haud aliis horiundum natalibus, nec facie multum diuersa ex Verbascis luteis cognoscendum: radix compar & caulis alis concavus, lanuginosus: Verum folia inferne tantum incana illa lanugine pubescunt, superne verò, si tenella illa & exigua floribus apposita excipias, glabra ex atro-virescent, acuminata: flores verò parui, in alis digesti, Ver-

basci puluerulenti modo, colore albo, foliorum numero ludetes, quippe quos in eodem ramulo, imò ex eodem puncto ortos, consistere modò feminis, modò quinis foliolis, cernere contingat: stamina hirsuta buxei sunt coloris, apicibus imbricatis.

Lob. Adu. Verbascum fœmina albidis floribus. Tom. III.

bus, senis foliolis diuissis, alioqui mati folio conat simili & pari. Obs. p. 303. Verbascum fœmina, floribus albis, & caule summo alis multifido, nû Blattaria Pliniana? Hoc enim mirè capiuntur, & in eo victitant blattæ. Floribus luteis dantur ab hoc diuersum visitur. Icon. Plant. p. 562. Phlomos mas alter, Verbascum fœ nira Lychnite Matthioli: Item, p. 563. Blattaria flore albo, perperam Verbascum fœmina vulgò. An Lobelinus perceperit quid scriberet de Verbascis; valde dubito.

Nec figurâ autem; hæc descriptio Verbasci candidi fœminæ Fuchsi placent; licet eam iam sculptam ponamus. Sed nec figuram, nec delineationem Verbasci albi fœminæ Loniceri approbo.

Trag. vocat Verbascum tertium siluestre, radice & caule secundo generi [i.e. nigro] haud dissimile: foliis candicantibus, modicaque lanugine hærentibus: floribus planè candidis, odore gratis. C. Bauh. pin. Verbascum 5. (7. in phyt.) siue Lychnite flore albo paruo; Verbasc. lychnite Matth. Lac. Tabern. & Gerardi: Verbasc. candidum fœmina, albo flore Dod. gall. Lugd. pag. 1300. & Anguillara. Verbascum fœmina Lob. in Adu. Obs. p. 303. & H. Lugd. p. 131. Verbascum 4. Czf. & Eyst. Phlomos mas alter Lob. Icon. p. 562. Phlomos lychnitis Matthioli, Hist. Lugd. p. 1303. Verbasci tertii altera species Castoris. Item, Pin. & phyt. Blattaria 22. siue alba, Blatt. fl. albo Lob. Icon. p. 563. Camer. Eyst. Hoc variare dixit flore paruo, eoque albo; vel viridi; vel viridi purpurascens, & magno flore, quare hanc vocauit Blattariam alteram.

Quorannis se propagat semel satum ex semine deciduo: primo anno caulem non fert, sed folia per terram sparsa: caule producto perit.

Tempus

Verbascum nigrum flore paruo apicibus purpureis.



Radix Verbasci vulgaris, vt & caulis, non minus altus, brachiatus; striatus, purpurascens, minus hirsutus: folia minoribus; rariora; alternatim posita, pediculis rubetibus duas aut tres vncias longis appenduntur, scetida, at vitentia, minus villosa, leuiter crenata, flores situ & crebriitate pares, sed minores, saturatione

Citoco tincti, à Blattaria vulgaris, purpurantibus staminibus, quinis, villosis: semen vt in vulgari.

Trago Verbascum alterum, nigrum. Dodon. Verbascum tertium; nigrum: Is describit, sed pulchram notam in floribus omisit. Pingitur factis commode à Fuchsi pro Verbascis quarto, cognominaturque siluestre, & Blattaria quorundam: non describitur. Lonicerus etiam vocat

Elili

Verbascum filueſtre, & duas eiusdem herbæ figurâs ponit, nec in deſcriptione vllum deſerimen ſtatuit, præter magnitudinẽ: facit quartum & quintum. Matthiolus Verbaſci tertium in commentariis nullam facit mentionem, ponens tantum figuram.


C Bauh. Pin. Verbascum 7. [1. phyt.] ſue nigrum flore ex luteo purpureſcente: Verb. nigrum Tragi, Dod. Lob. Ic. Tabern. & Gerardi: Verb. Matth. Lac. H. Lugd. p. 1299. & Caſtoris. Verb. filueſtre Fuchſii, Geſn. hort. & Turneri: Verbaſc. ſilu. minus Loniceri: Verb. nigrum ſatifol. purpureo flore Lob. Obſ. Verb. nigrum latifolium, Thalii: Blattaria Plinii, ſeu Verbaſc. nigrum Eſt. Flore variat: alterius ex citrino purpureſcit: alterius ex ſauro candidus eſt: albi flore proſus candido reperitur.

Locus & Tempus.

Præter Brabanticiſ, ſabuloſiſque & herbidiſ, atque in Francia & Anglia, Iuſio & Iunio ſponte prouenit. Baſileæ & Montbelgardi frequens eſt.

BLATTARIA LVTEA.

Deſcrip:



trinfecus lanugine villoſa purpureſcentibus, ſtaminibus ſimiliter lanuginohs, apices miniatoſ ſuſ ſtinentibus, nonnihil odoratiſ: ſuccedunt ſemina nigra in vaſculis Digitaliſ. ex vertice ſtilum proferentibus: cæterum vniuſcuſque ſloris pediculo appoſitum eſt folium acuminatum, vnciam circiter longum, aut maius: reliqua autem folia quibus multis ſcæret, Verbaſci ſunt, anguſtiora, atro-virentia, & ſuperius ſplendentia, nullâ lanugine donata, in ambitu laciniata, odore ingrato. Radix Napi figura, alba, ſapore neſcio quid aromatici reſpieate.

Blattariam Eſt. Cordus Verbaſci ſpeciem fecit, foliis tamen non ita hirtutiſ, ſed viridioribus.

Tragus depingit & deſcribit ſub Blattariæ titulo, appellatque Flein wülſtrauß/h.c. Verbaſcum exiguum ſeu Verbaſculum. Blattariam Plinii eſſe concludens.

Fuchſius Blattariam nominat, & Verbaſcum ſic mentiri ait, vt pro eo ſapius ab imperitiſ decerpatur, eſſeque non paucos herbarioſ, qui decepti eam inter Verbaſci genera connumerent. Sed cur non plantam tantæ cum Verbaſco ſimilitudiniſ inter Verbaſca connumerent? Vi-

quod ſentio, verum fatear, in Blattaria ſimilitudinem quandam video cum Verbaſciſ, ſed non tantam quæ fallere poſſit: quæ ocaſio, vt dubitem an Blattaria vulgaris ſit Plinii. Illud etiam conſiderandum, an noſtra Blattaria abieſta blattarſ contrahat. Noliſ igitur cum Trago & Fuchſio Blattariam Plinii concludere, licet & Matthiolus cum illiſ ſentire videatur. Credo, inquit, quod non aberrent, qui ſibi in animum inducunt, Blattariam Plinii, & Verbaſcum illud Dioſcoridiſ. cui flores inſunt aurei, vnam & eandem eſſe plantam. In poſt. comm. eadem repetit, additque Verbaſculi, Blattariæ Plinii, Dioſcoridem & Galenum non meminiffe. Sed quis non animaduertit Matthiolum ſibi contraria dicere?

Anguillara vult Blattariam tradi à Dioſcoride pro ſpecie Verbaſci, folia habente ſimilia Papaueri corniculato, qua in re hallucinatur. Nos cenſemus Dioſcoridem Verbaſcum criſpum illiſ verbis aſſignaffe.

Lonicerus inter Verbaſci genera Blattariam depingit & deſcribit. Dodonæo Verbaſci nigri ſpecies quædam apparet, quam cum poſteriori ætate Blattariam appellat: atque eam eſſe, ſed temerè, exiſtimat, quæ à Plinio lib. 22. cap. 9. deſcribitur. Lob. liuſ in Obſ. contraria ſcribit: vulgarem Blattariam in Brabantia perennare dicit: & poſtea annuam eſſe plantam. Cameraciuſ apud Matth. germ. Blattariam hanc flore luteo ad Verbaſcum nigrum referendam ducit. Sed & Geſn. hort. Verbaſci nigri ſpeciem fecit. Val. Cordus Verbaſcum nominat leptophyllum: Caſalp. Verbaſcum nouum: Blattariam, vt patet, Trag. Matth. Anguill. Fuchſ. Dod. Geſn. hort. Lon. Lob. obſ. p. 104. Caſt. Tabern. & Gerarduſ: Blattariam Plinii in Icon. Plant. p. 364. Lob. Eſt. Blattariam flore luteo: C. Bauh. phyt. & pin. Blattariam, ſue luteam folio longo laciniatq. Is duplicem tradit: alteram quatuor cubitorum, tria, quatuor, quinque & plura vaſcula coniuncta habentem: alteram humilioſiorem, ſingula vaſcula proferentem, foliis multo viridioribus.

Germani plerique Goldſtopfle nominant: alii tamen, qui ad Rhenum præcipue habitant, Schabentrauß & Mottenſtrauß: Brabantii Motten cruyt/blattarie: Galli Herbe aux mottes, Herbe venimeuſe, & Blattare: Hung. Penüz ſiu.

In hortis Germaniæ, vt Montbelgardi in hort. III. E. C. & Argentiniæ in Frid. Meieri, obſeruari ſe ex ſemine deciduo propagare, & caule ſloreque ſequenti anno productiſ, primùm perire. Sed & paſſim plurib; Italiæ, & Germaniæ vniuſq; lociſ, iuxta aquarum margineſ, in luſoſis aggeribus, & haud longè à fluuiorum ripiſ prouenit. Floret à Iunio meſe in Septembrem vſque: ſemen interea perſicitur.

Blattariæ folliculoſ, monente Trago, in quibus ſemina includuntur, inaurare ſolent puellæ, coronisq; ſuiſ & fertiſ inferere. Cùm autem herba, ſcribit Matthioluſ, guſtu amara deprehendatur, hinc certò colligere licet, quod eadem & aperire & abſtergere poſſit. Dodonæuſ teſtatur eſſe calidam & ſiccam, id quod ex ſapore vt & amara guſtabili qualitate colligit.

Blattaria flore albo.

Qua in re differat à lutea nondum annotauim, præterquam in colore ſloriſ, qui albuſ eſt, & externè violacei quiddam habens, æque inter-

internos capitulis luteis. Argentinae in horto Frid. Meieri collegi semen, quod Montbelgardi in horto Ill.E.C.terrae credidi, unde plantam habui.

Blattaria magno flore.



Blattaria flore caeruleo, vel purpureo.

Blattariae purpureae radix crassa est & longa, succulentaque, cortice obducta rubente, alba medulla intus repleta, sapore subdulci: filiis per terram

expansis ad Conyzā Matthioli maiorem accedit, non tamen ita villosa sunt, flore subacido cum aliqua actinonia: flores & capitula Blattariae vulgari similia tert secundo anno.

Et hanc flore purpureo Blattariam ad Verbascum nigrum refert Camerarius.

Blattaria autem flore purpureo dicitur Gesn. hort. Lob. Icon. p. 5. H. Lugd. p. 135. Camer. & Gerardo. Blattaria purpurea hinc quarta C. Bauh. phyt. & Pinace.

Folius est nigrioribus, non laciniatis, patumque serratis: flos modò obsoleto colore purpurascit, modò nigrae Violæ colore eleganti nitet, quandoque dilutè rubet. Et hanc vocamus Blattariam flore phœniceo. Flore caeruleo purpureoq̃ue floret Iunio & Iulio.

Blattaria flore viridi.

Pingitur hæc à Lobelio in Iconib. Plantar. pag. 565. Blattariae flore viridi titulo. C. Bauh. Tom. III.



Blattaria flore viridi purpurascens.



Blattaria pilosa Cretica, sive Arctus quorundam.



phyt. hanc sub Blattaria 3. (2. in Pin.) siue alba comprehendit, vocatque Blattariam flore viridi. Hanc Blattariam nusquam mihi videre contigit, nec inuenias quenquam qui eam descriperit.

Existat hæc Blattaria flore ex viridi purpurascens à Lobelio picta in Icon. Plat. p. 566. C. B. in phyt. si b tertia, quarta in Pin. siue alba meminit Optatsemus has blattarias ab autoribus diligentius fuisse delineatas.

Pona in descriptione hinc sBaldi huius plantæ iconem proponit pro Arcto Cretico Belli, qui in Epist. ad Clusium sic vocat, licet, ut ipse ait, legitimus non sit siquidem neque folia rotunda habet, neque cymino simile semen: sed folia serrata, betonica, verbasco similia, minoravero, & rotunda laniata, quædam, ut Ethio-

pidis folia aperta, cauliculi insunt recti, floribus luteis, Verbasco aut Blattariæ similibus, onusti, quibus succedunt pilulæ rotundæ, parvæ Blattariæ similes, in quibus semina parva continentur: provenit inter saxa & super parietes, nomine vero caret.

C. Bauh. in Pinace vocat Verbasum 8. [12. in Phyt.] foliis subrotundis, flore Blattariæ: caulibus cubitalibus, viridibus, rotundis, striatis, leuiter villosis, nec ramosis: foliis inferioribus oblongis, reliquis omnibus subrotundis, parvis, caulem basi sua alternatim amplexantibus, infernè incanis, supernè nigricantibus, ad quorum ferè singulorum exortum, duo minora adiciuntur, ex quorum sinu pediculi, unus, duo, tres, rarius quatuor, prodeunt: quibus singulis flos vnicus, luteus, parvus, ex quinque foliis compositus insidet, cuius medio stamina aliquot purpurea, quasi ex caliculo, vt in Blattaria, emergentia insident: hinc vasculum, semen minutum rotundum continens succedit.

Verbasum lychnites Syriacum incaum, summitate Floris Hierosolymitani.

Descriptio



Synoni

mon Lychnitidem alteram Syriacam: H. Lugd. p. 1301. Verbasum silvestre folio Saluæ tenuifoliæ Lobelii: C. Bauh. phyt. Verbasum 3. siue exoticum acuto Saluæ folio: Idem in Pin. Verbasum saluifolium tertium.

Chrysogonum.

Descrip:

Dioscorides Chrysogono folia tribuit similia Quercui, atque fruticem esse densum: florem verò Verbasco coronario parem: radicem Rapo æqualem, intrinsecus vehementer rubram. Hanc cum aceto tritam & impositam mutis aranei moribus auxiliari.

Plinius Chrysogonon non habet, nec Galen. & posteriores medici Græci eius meminerunt: nec Cornarius habet quod de ipso in mediâ afferat, quum sit etiam officinis & Herbariis hodie ignota. Sunt tamen qui Caryophyllatam officinis dictam, itemque Herbam benedictam appellatam, Chrysogonum esse volunt: de quibus iudicent peritiores. De Caryophyllata lib. 30.

Videndum apud Castorem Durantem, vt & apud Rauvvolsum quid per Chrysogonum intelligant: Pro Chrysogono proponunt alii Blat-

tariam de qua paulò antè: alii verò Tormentillam, de qua lib. 17.

Chrysogonum Dioscoridis quibusdam.

Chrysogonum Dioscoridis genuinum esse videtur. Alitudinem Leontopetali ad- Descriptio quitur, estque huic caule, floribus, radiceque rotunda [quæ internâ parte rubra est] haud ab- similes. Cauliculi tamen graciliores in terram repandi & ab origine fili modotenuis, in varios ramulos diuisi: quorum extremis flosculi adhærent conspicui magis, lutei, densiorque stipatu positi, quatuor communiter foliolis constantes.



Folia coliculorum dorso adherent gemina vtinque, & ita sibi inuicem opposita, vt crucis figuram positu suo efficiant, atro- uirentia, in extremo latiora, dissecta ad instar foliorum Quercus.

Concludit descriptionis author Rauvvolsum itin. part. 1. cap. 9. item part. 4. Icon. Numer.

119. verum esse Dioscoridis Chrysogonum. H. Lugd. pag. 23. Append. inscribit Chrysogonum Dioscoridis.

QVÆ SING SEQVNTVR SVBNEC- tenda sunt CAP. vltimo libri xxxi.

Limonium maius multis, alijs B. chen rubrum.



Limonium maius, radice crassâ, rubente gustu adstringente: & in capita quædam diuisa vnitur: folia inde oriuntur Lapathi minora, leuiora, poltioraque, minus atra, sed hilari virore tincta: inter hæc caules surgunt, pedales, tenues, ramis multis latè ductis patul', per quos ordine con'cendunt flores densi, in imam ferè

partem vergentes, coloris ex albo cærulei, parui, calyculis rubentibus: Semen copiosum oblongum

gum rufescens ex cæruleo, vt notat Lobelius.

Limonium
Matth.
Locus
Prouenit Limoniū (inquit Matth.) nullis pro-
fus reclamantibus notis, innumeris serē plantis
in paludibus, quæ Timau fontibus irrigantur, ac
etiam Tergestino tractu. Hanc autem plantam
Sepalaz falsō Behen rubrum appellant, quam si
quis diligenter expendit, eam, ni fallor, inue-
niet omnibus notis Limonio ad stipulari: vnde
cogetur fateri hanc verum Limonium esse, aut
salte eiusgenus, &c. *Supplicor* autē non fuisse bene
notum Limonium, cuius iconem exhibet, quan-
doquidem nullam addit descriptionem: sed tan-
tū frustra repetit Dioscoridis verba: Præterea
duas icones non parū diferentes proponit pro
Limonio, nec tamen discrimen ostendit. Addo,
illum omisā bonā effigie in Hist. germ. exhibere
solum imaginem sui alterius.

Valerianæ rubræ similem pro Limonio mis-
sam inscribit Dod. in fol. lat. atque illam cum Li-
monij descriptione satis respondere.

Herbidus viror, pratensisque & palustres na-
tales Limonio (ita etiam in Ic. Plant. p. 295. & Obl.
p. 157. vbi & Behen rubrum Cordi, Italiceque Be-
tola saluatica dicitur) nomen dederunt, Lobelio
teste, quasi tu pratensem dicas herbam, aut cum
Plinio siluestre pratense Blitum, huius quippe
etiam videtur, aut species, aut perquam affinis
nigræ Betæ, quam eū etiam sistere alium Dio-
scorides author est.

H. Lugd. p. 1024. & Clus. hist. Limonium Matthioli.
Camer. hort. Limoniū i. Matthioli: Eid.
ad Hist. germ. Been album, Limonium, Vermeins-
ter weisser Been. Tabern. Ic. & Hist. Limonium
i. Behen rubrum Cordi: Gesner. hort. Been ru-
brum, Trpolum Dioscoridis quorundam.

C. Bauh. phyt. Limonium i. siue maius: Eid.
pin. Limonium i. siue maritimum maius, Lim-
onium Lac. Czf. Cast. & Gerardi: Been rubrū,
Limonio seu Bistortæ cognata, Gesn. hort. Be-
hen rubrum officinarum, Guilandini.

Difficiliter ē semine prouenit. Non nisi locis
herbidis & vdis maritimis pratis vidit Lobel.
vt Adriaticis & Norbonensibus littoribus, vbi
in maxima copia. Vbiq; in maris littoribus, præ-
sertim autem mediterraneis, frequentem ef-
fere prodit Clusius. Obseruauī ego copiosē prou-
enientem Monspelij iuxta lacus salcos & mare,
florentem mense Augusto & Autumno.

Matthioli aut esse facultatibus Limonij vete-
rum, quas præcedenti capite adscriptis.

Limonium Matthiolinum.

Descript.
Matthiol. Limonium aliud dicitur perperam
Behen rubrum officinarum. Limonium
alterum Matthioli H. Lugd. p. 1024. quæ Matthio-
lum merito reprehendit [vt & Lobelius] quod
inter hoc & illud non distinxerit, nec monuerit
vtrum verū Dioscoridis Limonium repræsen-
tet. Limonium alterum Matthioli non nouit et-
iam frater. Tabern. Icon. & Hist. Limonium 2.
Pyrola.

LIMONIUM MINUS.

Facie conuenit cum Limonio maiore: verū
caules humiliores, strobili non ita cærulei, in
album magis inclināt, copiosi: radix eadem du-
ra, rubra, adtingens: folia per terram sparsa, sa-
tis crassa, interdum tamen exigua, per extremum
rotunda.

Tom. III.

Lob. in Adu. Limonium paruum Narbonen-
se Olea-folium (ita etiam in Icon. Plant. p. 295.)



foliis tamen Oleæ minoribus
aut Myrti pari-
bus, humi radi-
ci proximis.
H. Lugd. p. 1025.
Limonium Nar-
bonense par-
uum, vt & Ca-
mer. hort. C.
Bauh. pin. Li-
monium 3. siue
maritimum (hæc
vox in phyt. o-
missa est.) min.
Olea folio.
Iac. Rainaudes-
tus misit nomi-
ne Phylli Dale-
champij, fra-
ter C. Bauh. ti-
tulo Been la-
pidei & Tripo-

lij minoris quorundam. Cæsalpino Limonium al-
terum exiguum: Gerardo Limonium paruum.

Monspelij floret Vere cum Limonio maiore.
Frater collegit circa litora maris florēt Mrio.
Idem annotat prouenire in monte Ceti, sed non
excedere altitudine spithamam. Inter salebro-
littora & rupes montis Ceti & alibi; Norbonæ
& Gallo-provinciæ saxosis, oriri frequentem scribit
Lobelius. Difficiliter verd ē semine prouenire &
vix ad florem perducī testatur Camerarius.

Limonium maritimum minus foliis cordatis.

Ad radicem crassam, lignosam, rufescentem,
parūque fibrosā, folia plurima densa, cæ-
nosa, læuia, subrotunda, per terram instar cespitis
sparguntur, in quibusdam plantis obtusa, nullō-
que mucrone prædita: in aliis, in summo sinu
habentia, & cordis formam referentia: inter quæ
cauliculi plures, inæquales, trium, quatuor, etiam
sex vnciarum; teretes, nudi, prodeunt, in pluri-
mos breues & recuruos ramulos diuisi, strobili fre-
quentibus paruis, pallidè rubentibus onusti.

Limonium hoc quintum Cæsp. Bauhini in pin-
timum in prod. siue maritimum minus fo-
liolis cordatis, in littore maritimo, vt circa Massi-
liam & Liurnum, reperitur. An Limonium
Olea-folium aliud fortè?

Limonium maritimum minimum C. Bauh.

Tertia plantula vncias quatuor, vix excedit:
nam ad radicem oblongam, rufescentem, in
summo diuisam, foliola minima, subrotunda, cras-
sa, instar Sedi compacta, inter quæ cauliculi vnc-
iales, paucos strobilos pallidè rubentes vel sub-
cæruleos sustinentes, exurgunt.

Hoc in insula quadam non longè Massiliā pro-
uenit, inquit C. Bauh. qui Limonium 2. in prod. &
6. in pin. facit.

Limonium quibusdam rarum.

Strobilos producit cubitales, subhirsutos, tribus
membris crispis secundum longum, sagi-
tarum pennatas alas imitatus, donatis, adeo v-

ELIII 3

angulosi videantur: *folia* sesquipalmaria, hirsuta, Asplenii diuisurâ, paullo latiora: superiora, quæ per caules, ex eorum diuarcationibus oriuntur, terna ferè, palmum plùs minùs longa, acuminata, Graminis cyperoidis aquatici foliis similia, triquetra, rigida: extremis ramulorum hærent numeroſi congeſti flores, Echii florum modo nonnihil recurui, coloris cyanei, quorum ſinguli vni eo folio conſtant criſpo, paruo, patulo ore cælum ſpectantes plurimum, Scabioſæ Hiſpanicæ florum ſingularibus ſtrobilulis pares, nec ita diſſimili figurâ: calyculi vniſculi ſuique floris è pluribus conſtexti ſegmentis, lanugine at-



ſperiuſcula horrent: *radice* eſt auctore Rauwolfio, oblongâ, extrinſecus fulca, intus rubra.

Synon.

Rauwolfii itin. & Icon. n. 314. Limonii pulchra ſpecies H. Lugd. in app. pag. 35. Elegans Limonii genus: C. Bauh. phyt. Limonium 4. huc foliis Asplenii: Eid. apud Marth. Limonium laciniato folio: Pin. Limonium 7. huc peregrinum foliis Asplenii: Limon. peregrinum Cluſ. cur. poſt. Lim. Syriacum Eyſt.

Locus.

Cichoriæ globularis titulo ex Creta delatam accepit Imperatus. Ad portum prope Ioppæ in Iudæa in pratis humidis obſeruauit Rauwolf.

Vires.

Folia, eodem referente, ſiccandi vim habent iſſique in acetariis veſcuntur incolæ.

QVÆ HIC SEQVNTVR SVBNECTENDA

SVNT CAPITI VLTIMO LIBRI. XXXIII.

Heliotropio ſimilis aliquomodo.

Deſc.



cinereæ, hirsutæ, duobus loculis

Requentes ſuper humum lupinos ſpargit coticulos, palmares & ſesquipalmares, ramis multis brachiatos, tenues: foliis veſtitos ex viridi cinereis, alperis, ſemunciâ anguſtioribus, oblongis, & per extremum rotundis: flores luteolos, excipiunt ſiſtiqua oblongæ, in ſtylum delinquentes, rotidem ſemina

ruffa continentes: *Radix* parua lignoſa alba.

Ab Agerio in Aſtria collectum habuimus.

An hæc eſt planta illa Heliotropio ſimilis, cuius meminit Plutarchus de fluminum & montium appellacione, quam incolæ ad fluuii Hidaſpis portas in tenuiſſimum puluerem conterunt, & ſucco æſtibus ſe inungunt, vt ſine periculo immoderatiſſis caloris euaporationem ferant.

APPENDIX AD LIBRI XXXIV.

CAP. IV.

De Nicotiana viribus & uſu.

Folia huius plantæ calefacta & impoſita, præſens in *cephalæa* & *hemisrania* ſunt remedium ſi morbus ex caula frigida aut flatibus ortus ſit: ſæpius verò ſunt reperenda donec morbus tollatur: ſunt qui caput oleo florum Mali Aurantii prius inungant. Idem remedium rigidis ceruicibus, ſiue *terano*, vtile eſt, & in totius corporis doloribus ab eadem caula ortis. Dolores *dentium* à caula frigida non modò ſinit, dente prius deterſo aliquo linteo eius ſucco delibuto, & folio in pilulam conuoluta, dentique indito, ſed etiam, ne corruptio ſerpat, prohibet. *Pectoris vitis*, tuſſi veteri, aſthmati & ſimilibus ex frigido humore ortis morbis, foliorum decoctum ex aqua, & eclegma ex eius decocto, vtilia ſunt. Serapium è ſaccharo & foliorum decocto paratum, paucaque quantitate ſumptum, putres humores pectoris eiicit. Aſthmaticis interdum, eorum tumus ore exceptus auxiliatur: ſed neceſſarias euacuationes præcedere opus eſt, ſi mora ferri poſſit. Sub cineribus calefacta folia, & fordida, non excuſſis cineribus, calidaque ſæpius impoſita, ventriculo perſtriſtionibus & flatibus laboranti auxilio ſunt. Viridia folia alii manibus oleo inunctis confringunt & ſic imponunt. *Ventriculi & lienis obſtrictionibus* atque ſcirrhis folia paullo aceto intrita, diſque illita & adſtriſta, vtilia ſunt: ſed his deinde folia calefacta, aut lineus pannus ſucco foliorum calente intinctus, ſingulis diebus ſuperimponenda. foliorum defectu, puluis communi vnguento obſtructiones aperiente excipitur, & pars obſtructa, aut tumor affecta, diu inſigitur. Indicæ mulieres valde commendant in puerorum, & etiam grandiorum *ſtemachi cruditatibus*: nam ventre inferiore prius inuncto oleo lucerna rum, & foliis ſub cineribus calefactis, altero ventriculi regioni, altero tergiori, quâ ventriculû ſpectat, impoſitis, eas cõcoquant. & aluum emolliunt, ſi quoties opus erit, renoventur. Latas & teretes *ventris tineaſ* expellit foliorum ſuccus cum ſaccharo coctus, & depuratus, pauca quantitate ſumptus: vmbilico tamen etiam imponendum folium tritum, & alius deinde clyſtere eluenda. *Nephriticis* & flatulentis doloribus folia ſub cineribus, vt antea, calefacta, & quàm calide fieri poteſt adpoſita, magnum adferunt leuamen, idem remedium, quoties opus erit, repetendo. Commode etiam clyſteribus iniiciuntur: atque etiam fomentationibus, & emplatris admiſcebuntur.

In *ſuffuſationibus vteri*, folia probè calefacta, & vmbilico, uterique regioni impoſita, præſens adferunt remedium: quod ſi (vt fit interdum) animi deliquium ſubſequatur, fumus illarum naribus obſciatur, illico liberabitur: quod remedium Indicis mulieribus adeò vulgare eſt, vt ea de caula Tabaci folia diligenter adſeruent & magnificiât.

Sunt

Sunt verò qui odorata vmbilico prius admovent, deinde solum superimponunt. Maxime autem conferunt aut Tacamahaca, aut Oleū de Liquidambar, aut Ballamum, aut Caranna, aut ex his omnibus emplastrum constans, & in vmbilico assidue gestatum. *Articulorum* doloribus (modò humores frigidi sint, vel saltem non nimium calidi) efficacissimè folia calida adhibètur, aut eorū succo calente pannus lineus intinctus: etenim humores resoluunt & digerunt, ideòque etiam tumoribus œdematosiis, foliorum succo calido prius elotis, vtilissimè imponuntur. *Perniones* sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes & manus aqua calidā cum sale abluantur experientia docuit. *Veneris* & toxico perniciosissimo, quo Cannibales suas sagittas illinunt, resistere paucis ab hinc annis experti sunt nonnulli: nam ante sublimatum vulneribus inspergere solebāt. Eodem modo venenatis pestiferisque *carbunculis* imposita crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad istius mortificque virulentorum animalium præsens sunt remedium. *Recentibus* vulneribus imposita, illico sanguinem sistunt, eaque glutinant: si maiuscula sint, vino prius eluantur, & labiis vulnèrum cōiungitis, succus foliorum inspergetur, & ipsa folia trita supra vulnus alligabūtur: postmodum, reliquisque subsequentibus diebus idem ordo servabitur, vti quæ ratio necessaria. Vetera vlcera, granatæque succus instillatur, & folia trita imposita detergent, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore ex Medici consilio & missione etiam sanguinis, si necessaria sit, facta: deinde obleruatā, quæ conuenit, victus ratione. Potrò non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus ipsa experientia docuit: nam per vniuersam Indiam frequenter vlcera vaccæ, boues & alia animalia infestant, quæ facili ob regionis humiditatem extremam putrescunt, & vermibus scatent: quibus solebatur inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti: sed cum magno isthic veneat, plerumque quòd vlceribus inspergebatur, pluris constabat, quàm animal curandum æstimari potuisset. Itaque Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam vlam ad putrida, fœtida, vermiculisque scatentia animalium vlcera transfulerunt, atque adeò compererunt, succum eius instillatum non modò vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorū exulcerationib., ideòque Indi Tabaci puluerem semper circumferunt. Quendam noui narium *ulcere* laborantē è quo sanies manabat, non sine cōtagii suspitione: meo consilio instillauit foliorum Tabaci succum, à secunda instillatione multi vermes exciderunt, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum est vlcus: sed quæ erola erant, non restituta. Illius etiā foliis *impetigines*, & *capitis scabies* vtiliter conficiuntur. Hæc est celebrata illa Indicis Sacerdotibus planta, quā vti solebatur ad responsa danda. Etenim apud Indos moris erat, Sacerdotes de bellorum euentu, aliisque magni momenti negotiis consulere. Consulitis, Sacerdos istius plantæ folia sicca vrbat, & eorum sumum tubulo seu cannula quadam in os excipiebat, deinde quasi in exstasin quadam raptus, cadebat, omni motu priuatus, sicque permanebat aliquandiu. Discussā eius sumi facultate, ad se redibat, referebatque se negotium cum dzmone contulisse, & responsa dabat ambigua, vt, vtriusque euentus succederet

Tom. III.

illis facili persuaderet, sic se prædixisse: eoque modo barbaros illos homines miserè decipiebat. Cæterum, vulgus etiam Indorum eum fumum per os & nares recipit animi gratiā, cum insomnia videre interdum, & extra se quasi rapi cupit, tum etiam de suorum negotiorum euentu, ex insomnia, quæ apparuerint, pronūciaturum. Nam vt impostor est diabolus, herbarumque facultates nouit, illos huius vires edocuit, quòd apparentibus eiusmodi insomnia, miseris hominibus imponat. Sed & oneribus ferendis, aut aliis laboribus defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & illico, quasi mente alienati, corrunt: excitati verò, se resocillatos eo sōno, & vires recuperatas sentiunt. Vsus est etiam Tabaci apud Indos, *famis sitisque* sedandæ gratia, hoc modo. Conchyliā quadam cochlearum stauitilium vrunt, deinde atterunt calcis modo, huius & foliorum Tabaci æquas partes sumunt, manduntque, donec ex vtriusque massa quadam fiat, quam in pilulas Pilo maiores formant, atque in vmbra siccata in vsū reponunt. Facturi iter per deserta, vbi neque cibum neque potum, inuenturi os putant, harum pilularum secum delatarum vnam inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent, quā absumptā aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationē triduanā interdum, aut quatruiduanam absoluant: istaque ratione, toto illo tempore neque famē sibi molestam esse, neque sitim asserunt: cuius causam esse puto, quòd sorbentes assidue pilulas illas, etiā humores pituitosos, è cerebro eliciunt qui deglutiti, & in vtriculum demissi, naturalem eius calorem humectant, sed ab eo tandem absumuntur, aliorum ciborum defectu: vt in multis animalibus obseruare licet, quæ tota hyemē in suis latibulis se continent sine alicuius alimentii copia, quæ color naturalis occupatus est in pinguedine absumenda, quam æstatis tempore collegerunt. Et hæc sunt quæ de celeberrima hac planta Tabaco eiusque facultatibus narrat Monardes simpl. hist. cap. 14. Mirum esse addens est quàm insignes & variæ Tabaci facultates singulis adhuc diebus deteguntur. Cæterum cum calidam & siccam secundum gradu concludat, de sicca, nō de calida intelligendū ait Camer. Sūt qui folia singulis diebus manē à ieiuniis mandu iubent, vt podagrā liberentur, quia multam pituitā in os attrahat, eamque in partes inferiores defluere prohibeat. Herba (vt refert Io. Maria Bonardus) pedibus adalligata facit torpescere serpentes. Quidam referebant se expertos, aduersus herpetes quos Galli *darrres* vocant, & aduersus achores. Vtuntur etiam huius foliis apud Belgas plerique aduersus scabiem, cutisque fœditates, & ad vlcèrum curationes. Calidis verò & robustis corporibus tantummodò adhibenda, sunt qui sentiunt. Debilibus siquidem ac senibus non fore tutum horum vsum. Atque hanc, vt videtur, ob causam, à Petun herba mulieres [quod ait Theuetus] in America abstinent, neque vllō vtuntur modo. Matronæ Viennenses, nobiles, præsertim rei herbariæ studiosæ, foliis eius recentibus, aut in vmbra siccatis, & stillatio eorum liquore vitreis organis extracto, & vnguento ex eius foliis parato, frequenter vtuntur ad vlcera antiqua, putrida, maligna, gangrænas, scabiem, impetigines, lichenes, oculorum nebulas, cutis, faciei que maculas, felici cum successu, multisque miseris rusticis auxilio sunt. Quin & stillatium liquorem aëstmaticis conducere, experientiā comprobatur

LIII 4

esse scribit Car. Stephanus. Ad quoslibet morbos è frigido ortos, dolorève abigendos, Panacis olim decantatissimæ more, succus hodie melle excipitur, vel cum stillatitia & saccharo Syrupus conficitur, qui cochlearis mensura asthmaticis orthopnoeivæ medetur.

Petum Indorum [verba sunt Gillenij] hodie non in vfu solum, sed & abusu est. Et certè non tam quia salubre, quàm quia novitate aliqua blanditur, sumitur ab omnibus indifferenter & immodestè. Ast indicatum est ex Hippocrate, qui vult rectè mederi, eum oportere humido per siccum, sicco per humidum, calido per frigidum, frigido per calidum opitulari. Hi ingentem committunt errorem, qui omnibus naturis laborantibus, eodem succurrunt remedio. Calidi omnes non sumus, nec frigidi omnes: sic nec omnia calida remedia, nec frigida omnia iuvant.

Calida autem herba Nicotiana est, quæ gustu madet & feruet in ore: cuius folia vino calente imbuta, cutem, dropacis instar, exulcerant: cuius fumus & ipsa quoque masticata herba pituitam incidit, funditque: quod certè non fieret, nisi calefaciendi illi foret auctoritas. Hinc quibus proficit, faciliè diuinabis: nimirum catarrhis, & continua destillatione laborantibus. Nunc his quoque, qui ad Solana & Hyoscyamos referunt, satisfaciendum est. Neutrius enim facultates habet: Errant igitur, si ad vires: sin ad externam faciem spectent, danda aliqua indulgentia est: nam Hyoscyamum tota æmulatur planta. Sed nescio, an idèd faciendi Hyoscyamus sit. Cur non sui generis herba?

Porro, siccum Tabaci folium, Palmæ conuolutio folio, aut tubulo intextur: deinde illo vna à parte accenso, per alteram fumus nidorque vrentis, patente ore naribusque excipitur: dolorum ita lenimenta: famis, sitisque obliuionem: & hilaritatem quædam inuicè / post largiore vfu ebrietatem etiam, veluti à meracissimo vino, adfert. Expurgati verò & eo modo multos per os, aiunt humores, ac cerebri superfluos absumi.

Plura qui vult, petat ex Raphaëlis Thorij hymno de Tabaco, & Michaelis Neandri Tabacologia.

APPENDIX AD LIBRUM XXXIV. CAP. VII.

Elleborus niger siluestris adulterinus, etiam nigre virns.

Descriptio



Planta est cubitalis odoris vicioli, radice fibrosa, obliqua, cortice subnigro, nonnihil cum acrimonia leui amaricante, lignosam & duram medullam obducète, caule tereti, que inuestit primùm cortex mixto cum virore rubellus, alter pallidè virescens, cui subest caulis lignosus, copiosam medullam

viridantem complexus: folia pediculis palmatis appensa, densissimo stipatu caulem ambiunt, tria, quinque, sæpius nouem, folia subdiuisa, longa, striata, atro-virentia, in ambitu serrata, nullis interdu crenis incisa, dura, rigida, neruo per mediam lōgitudinem valde conspicuo decurrente, à quo vtrinque in latera obscuriores venulæ prodeunt: at superiora folia, vt in pauciores portiones sunt diuisa, ita & latiores sunt tum portiones ipsius folij, tum pediculus: ex alis prodeunt ramuli multi dilutè virentes, ob mollitiem floræ ponderi imparem deorsum reflexi, paucis foliis pallidulis, paruis, integris, dōnati, quib. insident flores singuli, bini, terni, quaterni, ouales ferè, nec ita vt in Helleboris expansi, ex pediculis semipalmatis, quadrantalibusque, ex foliis quinis herbaceis, extremà orà, cū se magis explicant, rubente, striati, compositi: in medio stamina plurima, capitulo sulcato, exalbida, extra quæ intra floris calathum quatuor, rariùs tres aut quinque, seu tubuli concaui, magis virentes, breuioresque quàm staminula oris simbratiis, leuiter interdum purpurantib: penitissimum floris medullium occupant cornicula, Aquilegiæ vel Hellebori, bina, ternæ, tuberculo innixa, in quibus semen.

C. Bauh. phyt. & pin. Helleborus niger i. siue fœtidus, Enneaphyllon Plinii, quod longa folia nouena habere videtur: Pedicularia fœtida 3. Tragi: Ellebor niger silu. adulterinus Tragi, Fuchsi & Lugd. Lycostonum i. Dod. gall. Consiligo, Ruell. Geln. hort. Lon. & Gerardi: Consiligo silv. Turn. Pulmonaria Vegetii, Geln. hort. Helleborus niger alter, vel helleborine maior, Corde hist. Veratrum nigrum 3. Dod. Clus. hist. Sesamoides magnum Cordi, Lob. Ic. Plant. p. 680. Helleboraster siue Consiligo Aconito propior in Adv. Helleboraster maximus Obsp. 387. & Gerardo: flore & semine prægrandi Ic. Plant. p. 679. Helleborastrum magnum Tab. Enneaphyllon Plinii Cæsalpino.

Magnitudine variat: hinc Helleborastrum magnum & minus, Tabernæmontano: At Gerardus sub Consilagine Ruellij, & Helleboro maximo proponit. Et hæc C. Bauhinus, qui Ellebori præsentis alteram speciem, quam Clusius Veratrum nigrum 4. peregrinum inuoluit, in pin. Helleborum nigrum 3. siue hortensem alterum cognominat.

Lugduni abundat, florètque mense Martio au bou de la bonne Alemande. Floret aliàs Ianuario, Februario, Martio & Aprili: semen maturat Iunio. Nascitur in Germaniæ ac Belgii montibus asperis & petrosis: floret circa Ver & ipso Vere.

Hanc herbam internis corporis partibus adhiberi non debere: sed ab illa cauendum, tanquam à pestilentissima herba tradit Tragus. Dod. gall. Vires qui Lycostonum primum facit, venenatam qualitatem ei quoque tribuit.

APPENDIX AD LIBRUM XXXIV. subaccedenda eius

CAPITI XIX.

Lathyrus siue Cataputia minor.

Ad quæ, quam & ipsam *modica* vocant, & inter Tithymalos reponunt aliqui auctores Dioscoride

Synon.

Vires

Descriptio

Dioscoride, *caulem* producit cubiti altitudine, digiti crassitudine, vacuum: in cuius summo sunt alae; *folia* in caule quidem oblonga [*επιμήκη*] sunt, similia foliis Amygdalæ, sed latiora, lætiora [& λεπτότερα vet. cod. Lac.] in summis autem ramulis longiora [μακρότερα Ruell. legendum censeo μικρότερα minora] velut Aristolochiæ aut Hederae oblonga [*επιμήκη*] folia: fructum habet in summis ramis triplici loculo distinctum, rotundum, velut Cappariū: in quo tria sunt *semina* membranis distincta inter se, rotunda, Eruo maiora, quæ decorticata cædida sunt & gustu dulcia. *Radix* est tenuis [*καλὴ νεύη* vet. cod. Lac.] inntilis. Totus autem frutex succo plenus est, velut Tithymalus.



candida, dulcia, facilia purgatu. infra citantur.

C. Bauh. perhibet Lathyrum prout adultior vel iunior est, latiora, vel angustiora habere folia, hincque apud Tabern. duas esse figuras. Lathyrus si. sue maior (inquit in pin.) est Cataputia Brunf. rom. i. rhaps. 41. & Casalpin. Lathyrus Brunf. in 4. p. 166. Matth. Fuchl. Dod. Corn. in Dioscor. Gesner. hort. Turn. Lac. Lonici. Cam. Cast. Lathyrus Matthioli Hist. Lugdun. Lathyrus Dioscoridis Schvvenckf. Lathyrus siue Cataputia minor Obs. p. 197. Ic. p. 362. & Trago: Cataputia vulgaris, Tartago Hispanorum Eyll.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia habet: hinc apud Tabern. Lathyrus latifol. & angustifolius: apud Gerardum Lathyrus siue Cataputia maioris & minoris nomine, figuræ exhibetur.

Λαθύρι: Græcis dicitur, Arabib. Mendana, Mendana seu Mahendane: germ. Sprungfraut / Springwurra / Springföner / Springsamen, Treibfraut, Scheißfraut, & Fuchsmilch: Belg. Sprincruyt & Spurgie: Gall. Espurge: It. Lathyrus & Cataputia minore: Insulribus Cacapuzza siue Scalapuzza, quod alui valenter euacuet, vomitioneque eliciat: vulgò Hisp. Tartago: Angl. Spurge, Nomenclat. Pannon. Nagyob eb tey.

Figuram Lathyridis Matthioli descriptioni non respondere dixit Turnerus: folia enim non esse Amygdalinis persimilia, neque illis latiora. In hortis semel sata, semine quotannis se propagat, etiam Hyeme vires: primo anno fructū non fert. In agrorum Anglorum & Galliarum mar-

ginibus occurrit. In Hetruria frequentissima nascitur & apud insubres. Camerarius scripsit vbiq; sua sponte ad Rhenum pullulare. Ego multa loca Rheni inspexi, verum mihi offendere nunquam licuit. Florer Aestate: semen Augusto & Septembri maturat.

Lathyrus, ex Dioscoridis autoritate, nullus radicis vsus: grana sex aut septem in catapotio, aut cum Ficis aut Palmulis deuorata aluum purgant: sed aqua frigida postea forbenda: trahunt autem bilem, pituitam aut aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus fo li adecoquantur ad eisdem effectus.

Actuarius grana Lathyrus maiora, quindecim; minora vero viginti, iis, qui efficacius purgari cupiunt, mandenda præcipit: iis vero, qui deiectionem non desiderant copiosam, iubet, vt integra deuorent, præsertim, si qui sumit malo fuerit stomacho. Grana, quæ facilia purgatu sunt vicena in aqua mulla, inquit Plinius, pota, hydropicos sanant: trahunt & bilem. Qui vehementius purgari volunt cum folliculis ipsis sumunt ea: stomachum lædunt, ideoque inuentum est, vt cum pisce aut iure gallinaceo sumeretur. Lathyridem Galenus ex quorundam opinione Tithymali speciem esse dicit, quod & similiter vt illi succum habeat, & eodem modo vt illi purget, & facultate illis similis sit, præterquam quod semen gustanti dulce appareat, & maxime purgantem vim habeat. Trago lacteus liquor calidior & acrior est herbæ & semine, quo ab empiricis, multi crudeliter necati sunt. Verum si quis pilos superciliorum & frontis delere cupiat, is oleo lac Cataputiae misceat, frontique vel superciliiis illinat sub Sole, ita tamen ne oculos aut faciem contingat lacteus ille succus: nam cæ partes vbi hoc lacte infectæ fuerint, continuo inflantur ac rubescunt, ita quidem, vt lepre speciem præ se ferant. Idem succus concauis dentibus inditus, dolorem illorum tollit, sed danda est opera, vt gingiua cerâ rubæa muniatur. Adurit enim succus vt aliorum Tithymalorum, erodit, exest. Quare in superfluis carnibus, verrucis & terpigine exterendis maximus illius vsus esse debet. Fernelius Lathyrus vires tribuit Ricini proximas, eiusque grana haud secus preparat à septem ad duodecim. In eundem quoque vsum tria quatuorue folia ex pingui iure cum

oleribus vulgus coquere scribit. Matthiolus decem duodecimue seminis grana à putaminibus delibata, iis, qui philtera, aut alia veneficia deuorant, ad vomitum poterent citandum, vttiliter propinari asserit. Lathyrus autem propriam antidotum esse tradit Hyperici succum, aut herbam ipsam in puluere potam. Tabern. statuit Lathyridem calidam in tertio gradu, humidam in primo. Schvvenckf. ait semen calidæ & sicæ esse naturæ, extenuare, menstrua & vrinam ciere: paganorum qui philtera sumplerint esse medicinam, verum ventriculorum valde lædere: & corpus debilitare. Italæ mulieres sibi persuadent, si quis semina deorsum trahens euulserit, & ea comederit, per inferna purgari: Si vero sursum, per superna. Ab ascite egregie liberare hæc grana experientia edoctus memoriz prodidit Brastanolus. Cataputiae folia & fructus in stagnum aut lacum proiectos, si pisces comederint, ventrem sursum vertent, quasi mortui sint, ita vt manu eos capere possis, quos si in

Vires & vsus.

Desit granorum & Quario.

Extrescemtia.

Foliorum dosi.

Temperam.

Synon.

Varietas.

Nomina linguarum

Gen. Mem. Phil.

aliam aquam frigidam conieceris, reuiuiscunt,
Hollerio teste.

TURBITH VETERIBVS.

Deleat.

DE Turbith ita scripsit Mesues lib. 2. cap. 2. de
simpl. purgantibus. Est radix herbæ La-
tariæ, folia Ferulæ, sed minora habentis. Est au-
tem Turbith quoddam hortense, alterum silue-
stre: Et in his magnum & paruum: Item album,
flauum & nigrum. Locis siccioribus quia lacte est
crassiore, gummosius euadit, & melius. Laudatur
enim gummosum, album, vacuum, arundinosum,
cortice cinericeo & plano, recens mediocriter,
fractu facile. Non gummosum autem imbecil-
lum est, ac ventrem conturbat. Malum quoque est
flauum & nigrum, crassum & gracile, cortice
crispo, & dum frangitur intus ceu neruoso, quod
est siluestre. Recens etiam minus viscera contur-
bat, ac euertit: Vetus imbecillum est. Corticibus
extremis liquato gummi illitis, ipsum quidam
mentuntur, quod si frangatur, intus gummosum
haudquaquam erit. Calidum est ordine tertio:
purgat trahendo mediocriter, status excitat, ven-
triculum ad nauseam euercentes: siccit quoque
excrementis etiam tenuibus vacuatis. Correctum
enim Turbith pituitam crassam, & lentam, & pu-
trem à ventriculo, thorace, neruis, etiam à remo-
tis, præcipuè à iuncturis educit. Ob id ad dolo-
res arthriticos vsus eius est: à plora, lepra, baras,
& aliis vitis pituitosis, tum cutis, tum aliarum,
parium: & pituitosis febribus, aut præseruat,
aut vindicat. Hoc autem sumpto, vitabis Au-
strum, & vsus piscium. Purgat tardè & imbecil-
liter, & stomachum ad nauseam subuertit, & vsu
crebro corpus extenuat. Ob id cortex eius ad al-
bum vsque abradendus est. Acris autem, vt
Zingibere, sic eius actio intenditur, vt propieta-
te quadam mirabili per id commutatum, etiam à
iuncturis, & his remotissimis & profundissimis
pituitam crassam & lentam extrahat, cum per se
solum tamen pituitam educat, idque tardè. Ne
verò stomachum exagitet, ac euerrat, medica-
menta stomachica miscantur, & odorata agita-
tionem eius placatura, vt Mastiche, Zingiber,
Piper longum, Gallia, & Aromatica alia. Ne de-
nique corpus emaciet, oleum amygdalinum, vel
Amygdala, vel saccharum ei miscenda sunt, vel
cum Ruso Pistachia. Iudæus autem Turbith
partem vnam, Zingiberis partem dimidiam, A-
mygdalarum duplum, cum condito, vel siccato
succo Cydoniorum miscet, tanquam purgato-
rium salubre. Hamech verò Turbith partem v-
nam, foliorum Violarum partes duas, Zingibe-
ris partem dimidiam miscet in trochiscos citra
molestiam purgantes. Ioannitus autem, Dacty-
lorum aceto dies duos infusorum, partes cen-
tum, Penidiorum partes quinquaginta, Amygda-
larum purgatarum, partes triginta, Turbith par-
tes triginta quinque, Scammonii partes duode-
cim, Zingiberis longi, foliorum Rutæ siccorum,

an. partes quatuor, miscet cum melle despumato,
& medicamentum fit mirabile. Sed filius Zezar,
Turbith partes decem: Zingiberis partes quin-
que: Sacchari partes viginti: interdum Masti-
ches drach. tres: aliàs alia miscuit, pro variis indi-
cationibus, ad morbos hoc remedio egentes.
Idem quoque Turbith à raso cortice purgarum
succo Cucumeris horas viginti quatuor macerat
& siccit. Firque sic valentissimum ad articulares
affectus. Si quam in corpore noxam reliquit,
pota multa calente, aut quæ saccharo rubro est
dulcorata, aqua calida eam profligabis. Coctio-
nem & trituram mediocrem sustinet. Datur pul-
uere à drach. vna ad duas: Decocto autem à
drachmis duabus, ad quatuor. Et habentis Mesues.
Aben Mesuæ Turbith est calidum & siccum in
tertio gradu, & melius ex eo est illud, cuius color
est albus multum, & lene exterius, subtilis ligni,
non habens lanam. Et proprietates eius est laxare
phlegma viscosum, verum ipsum infert debili-
tatem in animo, propter horribilitatem & abo-
minationem sui (aporis. Porro rectificatio Tur-
bith est, conficere cum oleo de amygdalis dulci-
bus, & dosis eius est à drachma vna, vsque ad
duas, & oportet quod detur solum, &c.

Filius Ze-
zar.

Purgat.

Sapor.

Sic satis sufficienterque cum declarata sit Tur-
bith historia, missis plurimis quæ huius loci esse
possent, hic tantum quedam ex Fallopio, subi-
iciemus: fusiùs fortè alia occasione eius hi-
storiam tradituri. Turbith, inquit, non habet
minorem vim, quàm habet Scammonium, sed
quia non est in vsu succus ipsius, vt est in vsu suc-
cus Scammonii: at est in vsu radix: ideo videtur
habere minorem vim, quàm habeat Scam-
monium. Verum tamen si conferatur succus suc-
co, & radix radici: profectò Turbith non habet
minorem vim quàm habeat Scammonium. Vn-
de aliqui volunt Turbith esse dictum à turbando.
Sed decipiuntur, quia dicitur Turbith ab Ara-
bibus quasi Turpethum, sumpto nomine à Græ-
cis recentioribus, & præsertim ab Actuatio, qui
vocat hoc medicamentum nomine Turpethi.

APPENDIX AD CAPVT VLTIMUM libri 40.

HABB HAZIZ ARABIBVS.


LEo Aphricanus hist. lib. 5. scribens de viba
Capæ edificata per Romanos ad mare me-
diterraneum, recentè ibi esse regionem, quæ
non producat alios fructus, præter fructum sub
terra provenientem, magnitudine Raphani.
Eum illos sugere, quia dulcis sit, prout Amygda-
lum, cuius saporem non nihil referat, non tamen
alimentosum esse, & vtilem, vt amygdalum.
Communem autem esse per totum ferè regnum
Thunenfe: Arabibus vocari Habb Haziz.

Hunc fructum videtur Dalechampsius, qui
Thrah Thunenfe vocat apud Plinium, ad eiu-
dem Misón, de quo capite de Terfez Africano,
referre.

FINIS APPENDICIS TOMI TERTII.







ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

OMNIVM PRAECIPVORVM CAPITVM

QVAE TVM IN PRIMA TVM IN SECVND A PARTE

TOMI TERTII HISTORIAE VNIVERSALIS

PLANTARVM CONTINENTVR

INDEX.

Per pp. denotatur pars prima : per p.2. verò pars secunda , quæ incipit à LIBRO VICESIMO SEPTIMO.



- Bies & Quercus marina veteribus 802. part. 2.
 Abrotonoides planta faxea 811. p. p.
 Abrotonum vulgare 192. p. p.
 Abrotonum cum pulchris Corymbis 194. p. p.
 Absynthia veterib. 164. part. p.
 Absynthium marinum veteribus p. 167. part. p.
 Absynthium Xanonicum veteribus 168. p. p.
 Absynthium vulgare maius. ibid. 168. part. p.
 Absynthium vulgare montanum 173. part. p.
 Absynthium arborescens Lobellii. ibid.
 Absynthium infuspidum ibid.
 Absynthium maritimum latifolium siue Martholi. 174. p. p.
 Absynthium Ponticum vulgare folio inferius albo. pag. 175. p. p.
 Absynthii species, quibusdam chamamelum chrysanthemum Eufhis p. 176. p. p.
 Absynthium & Ponticum & Romanum quibusdam, aliis ceriphium, & varia de eo sententia pag. 176. part. p.
 Absynthium Seriphium tenuifolium Marinum Narbonense pag. 177. part. p.
 Absynthium Seriphium Germanicum succulento folio siue Misnicum p. 78. part. 1.
 Absynthium Seriphium Belgicum p. 178. part. 1.
 Absynthium Valesianum tenuifolium candidum, siue herba alba pag. 179. p. p.
 Absynthium Austriacum tenuifolium pag. 79. p. p.
 Absynthium Aegyptium quibusdam pag. 282. p. 2.
 Absynthium alius floribus, capitulis squarrosis 183. p. p.
 Absynthium umbelliferum Mutellina quibusdam pag. 183. part. p.
 Absynthium Montanum flore Chamamelii p. 184. p. p.
 Acanthium veteribus 54. p. p.
 Acantha leuca, spina alba veteribus 71. p. p.
 Acarna flore luteo 91. p. p.
 Acarna similis flore purpureo, chameleon Salmanticensis Clusii 92. p. p.
 Acarna affinis Loo serox, flore pallido 92. p. p.
 Achyllea millefolia odorata 140. p. p.
 Acinos veteribus & in genere 258. p. 2.
 Acinus Menardi Matth. calaminta fol. 258. p. 2.
 Acinos multis 259. p. 2.
 Acini pulchra species 260. p. 2.
 Aconitum in genere 647. p. 2.
 Aconitum primum Matthioli foliis Doronici 649. p. 2.
 Antichora Siluatici folio rotundo 651. p. 2.
 Aconitum folio Platani flore luteo palestense. 652. p. 2.
 Aconitum magnum purpureo flore, vulgò Napellus 655. p. 2.
 Aconitum Napello simile, sed minus, caruleum, praeocius 656. p. 2.
 Aconitum lycost. Autumnale Napello simile, ibidem.
 Aconitum lycost. caruleum calcari magno 657. part. 2.
 Aconitum lycost. Napello simile, Nenbergense, foliis latoribus, flore purpureo ibid.
 Aconitum lycost. coma nutante, maximum 658. part. 2.
 Aconitum Lycostonum flore Delphinii. ibid.
 Aconitum lycost. flore maximo 659. p. 2.
 Aconitum lycost. flore caruleo, galea elatiore, radice bulbosa ibidem.
 Aconitum 5. Matthioli effigie alicuius Ranunculi vel Anemones 419. p. 2.
 Aconitum Racemosum Altae quibusdam 660. p. 2.
 Adarce ex veterum & neotericorum sententia 796. part. 2.
 Adiantum Album folio filicis p. 749. p. 2.
 Adiantum Nigrum officinarum p. 750. p. 2.
 Adiantum nigro simile si non eadem missa pro Capiligno p. 751. p. 2.
 Adiantum tenuifolium album Ruta muraria accedens ibid.
 Adiantum veteribus 758. p. 2.
 Adiantum siue Capillus veneris 759. p. 2.
 Adiantum pulcherrimum 760. p. 2.
 Aegyptus vel Aegyptus veteribus 298. p. 2.
 Aethiopi veteribus & in genere 315. p. 2.
 Aethiopi multis ibidem.
 Ageratum veteribus pag. 142. p. 2.
 Ageratum plerisque herba Italia quibusdam ibidem.
 Ageratum purpureum Dalechamp. 144. p. p.
 Agriopaslinaca Cretensum pag. 149. p. 2.
 Aizoi maioris ortu persimilis exotica planta Lobel. p. 96. p. p.
 Alfine verna glabra, stoculis albis, vel poridis Linum minimum 455. 2.
 Alecyonium Veterum & Neotericorum 818. p. 2.
 Alecyonium spongiosum officinarum ibid.
 Alecyonium stuposum Imperati fol. 819. p. 2.
 Alecyonium rubrosum ibidem.
 Alecyonium molle Imperati ibid.
 Alga, & de easuso, bryo, & musco, veterum sententia 781. 2.
 Alga angustifolia vitriariorum 798. 2.
 Alga pomum Monspel. 799. p. 2.
 Alga crispascabiosa rubra & pallida ibid.
 Alga Tinctoria 800. p. 2.

<i>Alga angustifolius</i>	801.p.2.	<i>Ananas Linschot.</i>	ibid.
<i>Alga ceruicornu diuisura</i>	ibid.	<i>Ananas filuestris folio Alue. fructu Cupressino.</i>	96.
<i>Alga marina porosa</i>	815.p.2.	p.p.	
<i>Alga Mederensis grandi folio</i>	804.p.2.	<i>Anchusa veteribus & in genere</i>	581.p.2.
<i>Alga longissima lato tenuique folio</i>	805.2.	<i>Anchusa minor lign. flor.</i>	582.p.2.
<i>Alga longissimolato, crassoque folio</i>	ibid.	<i>Anchusa minor lutea</i>	583.p.2.
<i>Alisma Matthioli siue Plantago montana</i>	20.p.p.	<i>Anchusa flore albo aut pallido Clusii</i>	ibid.
<i>Alisma T. Sani Caroli</i>	519.p.2.	<i>Anchusa Monspeliensis</i>	584.p.2.
<i>Aloe in genere</i>	696.p.2.	<i>Androsamon veteribus & in genere</i>	381.p.2.
<i>Aloes succu</i>	697.p.2.	<i>Androsace Matthioli altera.</i>	368.p.2.
<i>Aloe Americana muricata</i>	701.p.2.	<i>Androsaces veteribus</i>	816.p.2.
<i>Aloe siue Aizoon palustre</i>	793.p.2.	<i>Androsaces Marsh. siue fungus petraeus maximus siue umbilicus marinus</i>	ibid.
<i>Alpium Matthioli Tithymalis affine,</i>	p.676.p.2.	<i>Anethum syluestre semine exiguo, Ameos.</i>	7.p.2.
<i>Alpium quibusdam siue Esula rara flore purpureo ibidem.</i>		<i>Anethum</i>	5.p.2.
<i>Alsyon Plinii foliis Eriothodani</i>	715.p.2.	<i>Anemone hortensis Tragi</i>	401.p.2.
<i>Alsyon in genere veterib. & neotericiis</i>	319.p.2.	<i>Anemone in genere</i>	400.p.2.
<i>Alsyne veteribus & in genere</i>	362.p.2.	<i>Anemone latifolia flore flauo I. Clusii</i>	ibid.
<i>Alsyne maior repens perennis</i>	ibid.	<i>Anemone latifolia duplo flore flauo II. Clusii</i>	402.
<i>Alsyne maxima H. Lugdunensis</i>	363.p.2.	p.2.	
<i>Alsyne Vulgaris siue m. r. s. Gallina</i>	ibid.	<i>Anemone Italica latiusculis spinosis foliis III. Clusii</i>	ibid.
<i>Alsyne plantaginis folio</i>	ibid.	<i>Anemone latifolia ex purpura diluore albicante flore IV. Clusii</i>	ibid.
<i>Alsyne maxima Dodon.</i>	364.p.2.	<i>Anemone latifolia flore ad carnum colorem tendente, albicantibus unguibus, V. Clusii</i>	ibid.
<i>Alsyne corniculata Clusii</i>	359.p.2.	<i>Anemone latifolia purpurei ser. coloris, unguib. albicantibus Bizzantina, VI. Clusii</i>	403.p.2.
<i>Alsyne minima</i>	364.p.2.	<i>Anemone eiusque species alia varia</i>	403.
<i>Alsyne tenuifolia</i>	ibid.	404. & 405. & 406. & 407. & 408.p.2.	
<i>Alsyne muscosa quibusdam</i>	365.p.2.	<i>Anemone magna alba plurima parte anni florens</i>	413.p.2.
<i>Alsyne longifolia uliginosis proueniens lucis ibidem.</i>	ibid.	<i>Anemone trifolia flore albo</i>	412.p.2.
<i>Alsyne fœtida Fabio Columna Dioscoridea</i>	ibid.	<i>Anetho similis planta, semine lato laciniato</i>	7.p.2.
<i>Alsyne fœtida quodammodò similis laciniata, p.2.</i>	366.	<i>Angelica sativa</i>	140.p.2.
<i>Alsyne ferrato folio glabro</i>	ibid.	<i>Angelica officinarum</i>	ibidem
<i>Alsyne ferrato folio hirsutiori floribus & loculis cauliculis adherentibus</i>	367.p.2.	<i>Archangelica</i>	143.p.2.
<i>Alsyne oblongo folio ferrato flore caruleo</i>	ibid.	<i>Angelica filuestris magna vulgarior</i>	144.p.2.
<i>Alsyne folio profunde ferrato, flore purpureo siue violaceo</i>	ibidem	<i>Angelica filuestris repens</i>	145.p.2.
<i>Alsyne genus Eufasio, folio hederule</i>	368.p.2.	<i>Angelica filuestris hirsuta inodora Casp. Bauhini</i>	146.p.2.
<i>Alsyne aquis innatans</i>	793.p.2.	146.p.2.	
<i>Alsyne & Anidum veterib.</i>	133.p.2.	<i>Anisum veteribus & in genere</i>	91.p.2.
<i>Ambrosia veterib.</i>	189.	<i>Anthemides siue Chamamelæ veteribus</i>	115.p.p.
<i>Ambrosia quibusdam</i>	190.p.p.	<i>Anthyllis duplex veteribus & in genere</i>	173.p.2.
<i>Ammi antiquis, & in genere</i>	24.p.2.	<i>Anthyllidis species quibusdam</i>	ibid.
<i>Ammi odore Origani</i>	25.p.2.	<i>Anthyllis lentifolia, peplios effigie, maritima</i>	374.
<i>Ammi semine tenuissimo & odoratissimo</i>	ibid.	p.2.	
<i>Ammi vulgare maius latioribus foliis, semine minus odorato</i>	27.p.2.	<i>Antirrhinum vulgare</i>	462.p.2.
<i>Ammoniacum veterum</i>	53.p.2.	<i>Antirrhinum angustifolium syluestre</i>	464.p.2.
<i>Ammoniacum</i>	54.p.2.	<i>Antirrhinum minimum</i>	465.p.2.
<i>Anacampteros, vulgò faba crassa</i>	681.p.2.	<i>Antirrhinum album ferrato folio</i>	437.p.2.
<i>Anacampteros purpurea</i>	683.p.2.	<i>Antirrhina flore luteo Aconiti</i>	660.p.2.
<i>Anacampteros maxima</i>	ibid.	<i>Antrifus Plinii quibusdam, semine longo Cicuraria vel Charephylli</i>	70.p.2.
<i>Anacampteros minor, rotundior folio, semper virens ibidem.</i>		<i>Antrifus quorundam semine aspero, hispido</i>	83.
<i>Anagallis phœnicea & carulea</i>	369.p.2.	p.2.	
<i>Anagallis phœnicea, mas</i>	ibidem	<i>Apatine</i>	713.p.2.
<i>Anagallis carulea, femina</i>	ibid.	<i>Aphyllantes Monspeliensis</i>	335.p.2.
<i>Anagallis lutea, numularia similis</i>	370.p.2.	<i>Aphyllanti affinis Scabiosa quinta Clus. Bellidi affinis</i>	
<i>Anagallis serpillifolia aquatica</i>	372.p.2.	13.p.p.	
<i>Anagallis aquatica flore caruleo, folio oblongo, maior</i>	796.p.2.	<i>Aphyllantes anguillare, siue globularia Bellidi similis</i>	ibidem.
<i>Anagallis aquatica flore purpurascens, folio oblongo minor</i>	ibid.	<i>Apios</i>	666.p.2.
<i>Anagallis aquatica angustifolia</i>	ibid.	<i>Apios siue Ischa altera</i>	667.p.2.
<i>Anagallis aquatica flore caruleo, folio rotundior, minor fol.</i>	795.p.2.	<i>Apium quod Petroselinum Dalechamp. folio tenui, A. pii Hortensis, semine subrubro amaro, radice m. gra</i>	19.p.2.
<i>Anagallis aquatica folio rotundior maior</i>	796.	<i>Apium siue Petroselinum Macedonicum multis</i>	101.
p.2.		p.2.	
<i>Ananas Acofia</i>	55.p.p.	<i>Apium Montanum siue Oroselinum veteribus</i>	103.p.2.

INDEX.

'Apium montanum Dalechampii 103. p.2.
'Apium aliud, seu Orofelinum Sequanorum ibid.
'Apium montanum nigrum 104. p.2.
Apium petraeum, seu montanum album 105. p.2.
Apium silvestre Dalechampii 106. p.2.
Apium Selinumue Veteribus & in genere 95. p.2.
Apium horensi, seu Petrofelinum 97. p.2.
Apium hortenfe magnum, seu Anglicanum quibusdam 99. p.2.
Apium palustre siue Eliofelinum 100. p.2.
Apium vulgare ingratus ibid.
Apium seu Selinum quod Petrofelinum Antiquis dicitur 102. p.2.
Apium silvestre Dodonaei, siue Thysselinum quorundam 188. p.2.
'Apium Cicuta foliis, seu Selinum alterum Clusii ibid.
Aquilegia flore simplici 484. p.2.
Aquilegia flore pleno 485. p.2.
Aquilegia flore simplici & pleno non corniculato ibid.
Aquilegia degener ibid.
Arachidina in genere & Aracoides 852. p.2.
Arbuscula marina coralloides rubra 713. p.2.
Arenaria 736. p.2.
Argemone Veteribus & in genere eiusque species varia 396. p.2.
Ageratum ferulaceum Dalech. 152. p.2.
Aristolochia veteribus & in genere 556. p.2.
Aristolochia rotunda eiusque species varia 559. p.2.
Aristolochia longa eiusque species varia 560. p.2.
Aristolochia Clematidis eiusque species varia 561. p.2.
Aristolochia polyrrhizos ibid.
Aristolochia Pistolochia altera 563. p.2.
Artemisia veteribus & in genere 184. & 186. p.2.
Artemisia tenuifolia siue leprophyllis, aliis Abrotanum silvestre 194. p.2.
Artemisia tenuifolia si non idem Abrotanum inodorum Lobelii 195. p.2.
Asarina Lobelii flore Hederae terrestri 856. p.2.
Asparagus & Corrida 736. pag. 2. p.2.
Asparagus hortenfe & pratensis 737. p.2.
Asparagus marinus 737. p.2.
Asperula hexaphyllis purpurea 734. p.2.
Asplenium seu Cicerach veteribus & in genere 757. p.2.
Artium veteribus & in genere, eiusque species 569. & 570. p.2.
Asa fetida nostras officinarum 133. p.2.
Asarum 548. p.2.
Asarum muri 541. p.2.
Ascyron veteribus & in genere 580. p.2.
Atractylis veteribus & in genere eiusque species 82. & 83. p.2.
Auriculamuris, siue Myosotis veteribus & in genere, eiusque species varia 358. 359. 360. p.2.
'Auricula leporis in genere, eiusque species varia 200. & 201. p.2.
'Auricula orfi flore luteo 499. p.2.
'Azarina Matthioli flore Anthemidis 566. p.2.

B Accaris Dioscoridis Rauwolfii 163. p.2.
Barba Capri 488. p.2.
Baque Cannabi simile 449. p.2.
Baranica planta foliis Helenii 111. p.2.
Been album officinarum 356. p.2.
Been albo officinarum similis planta semper virens 357. p.2.

Been album Rauwolfii 36. p.2.
Bellis minor silu. spontanea 113. p.2.
Bellis flore viridi 113. p.2.
Bellis hortenfe, siue flore multiplicata ibid.
Bellis siluatica 114. p.2.
Bellis maior ibid.
Bellis montana seu alpina maior & minor 115. p.2.
Beronica vulgaris purpurea 301. p.2.
Beronica flore albo 302. p.2.
Beronica folio Alopecuro quorundam 303. p.2.
Beronica coronaria siue Caryophyllea in genere, eiusque species circiter triginta elegantes 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. & 338. p.2.

Bifolium maius, siue Opbrys maius quibusdam 533. p.2.
Bifolium minimum 534. p.2.
Biflora maior rugosioribus foliis 538. p.2.
Biflora media folio minus rugoso ibid.
Biflora minima 539. p.2.
Blattaria, eiusque species varia 874. & 875. p.2.
Blattero, eiusque species varia 859. p.2.
Borrage silvestris tenuifolia 577. p.2.
Borrage floribus caeruleis & albis 574. p.2.
Botrys veteribus & in genere 297. p.2.
Botrys plarisque Botanici 298. p.2.
Botrys verticillata ibid.
Britannica veteribus 517. p.2.
Bubulus marinus crinitus 788. p.2.
Buglossum veteribus & in genere 523. p.2.
Buglossum folio Borrageinis Hispanicum 577. p.2.
Buglossum vulgare maius & minus flore atrumque duplici 578. p.2.
Buglossum similis planta Indica 631. p.2.
Bunium & Pseudobunium veteribus & in genere 28. & 29. p.2.

Bunium Dalechampii ibid.
Bulbo-Castanum 50. p.2.
Bulbo-Castanum Tralliano 29. p.2.
Euphrasium Dodonaei, aliis Consiligo tenuifolia 637. p.2.
Euphrasium Italicum segetum altissimum affine Chamamelo 120. p.2.
Euphrasium antiquis 123. p.2.
Euphrasium tenuifolium folio millefolii ferè 124. p.2.
Euphrasium tenuifolium simile Chrysanthemum Valerianianum Clusii 125. p.2.
Euprestis veteribus & in genere 199. p.2.

C

Cacalia siue Leonice veteribus & in genere 568. p.2.
Cacalia quibusdam 569. p.2.
Calamintha veteribus & in genere, eiusque species varia 227. 228. 229. & 230. p.2.
Cali vulgare 702. p.2.
Cali Arabicum 701. & 704. p.2.
Cali, siue vermicularis marina arborecens eiusque varietates aliquot 703. & 704. p.2.
Caltha 101. p.2.
Caltha flore simplici & flore pleno ibidem
Caltha prolifera 102. p.2.
Caltha minima 103. p.2.
Caltha palustris 470. p.2.
Caltha palustris flore multiplicato 471. p.2.
Calochiermi Carduus Crerensis 85. p.2.
Camphorata Manspeltensium 379. p.2.
Cannabis mas & femina 447. p.2.
Cannabis silvestris quorundam vetrica inerti affinis 838. p.2.

INDEX

<i>Cannabis fluestris veteribus</i>	ibid.	<i>Chamamelum faridum, siue Cotula farida</i>	ibid.
<i>Caput aquila Hyssopi folio, summitate Stachadis</i>		<i>Chamamelum faridum marinum</i>	121. p. p.
279. p. 2.		<i>Chamamelum marinum</i>	122. p. p.
<i>Carduus veteribus</i>	450. p. 2.	<i>Chamamelum Chrysanthemum quorundam</i>	ibid.
<i>Cardiaca</i>	320. p. 2.	<i>Chamamelum purpureum</i>	123. p. p.
<i>Carduus Carlina minor fluestris Clusio flore luteo</i>		<i>Chamaeflix marina Anglicana</i>	745. p. 2.
84. p. p.		<i>Chamaeleon albus & niger, aliaque eius species varia</i>	60. 61. 62. 63. & 67. p. p.
<i>Carduus veteribus & in genere, eiusque species varia circiter triginta sex 42. 43. 44. 45. 46. & sequentibus usque ad 96. p. p.</i>		<i>Chamaeleuce & Chamapence ex veteribus</i>	470. p. 2.
<i>Carlina caulifera siue acaulos</i>	64. p. p.	<i>Chamaecyparissus</i>	135. p. p.
<i>Carlina fluestris quibusdam, aliis Atractylis</i>	81. p. p.	<i>Chamaeyritis vulgaris odorata</i>	295. p. 2.
<i>Caros veteribus & in genere</i>	68. & 69. p. 2.	<i>Chamaeyritis alia species varia</i>	296. & 297. p. 2.
<i>Carpefium ex veterum sententia</i>	207. p. 2.	<i>Chamerops</i>	423. p. 2.
<i>Carthamus siue Chnicus</i>	79. p. p.	<i>Chamaefice</i>	667. p. 2.
<i>Carthamus siue Chnicus fl. scaruleo</i>	80. p. p.	<i>Charephyllum</i>	75. p. 2.
<i>Caruisolia</i>	171. p. 2.	<i>Chelidonium minus veteribus & in genere</i>	465. p. 2.
<i>Caryophyllus arvensis umbelliferus</i>	361. p. 2.	<i>Chelidonium maius veterum</i>	481. p. 2.
<i>Cassia siue Cuscuta</i>	266. p. 2.	<i>Chelidonia</i>	482. p. 2.
<i>Catanance Dalechampil</i>	26. p. p.	<i>Chelidonium folio laciniato</i>	483. p. 2.
<i>Catanance affinis Sesamoides</i>	27. p. p.	<i>Chirithium marinum terrium Mattiislo</i>	106. p. 2.
<i>Caucalis veteribus & in genere</i>	81. p. 2.	<i>Chirithium & Baris veteribus</i>	193. p. 2.
<i>Caucalis species varia</i>	83. 84. 85. & 86. p. 2.	<i>Chirithium siue Faniculum marinum</i>	194. & 195. p. 2.
<i>Caucum Ephedra anabasis veteribus</i>	738. p. 2.	<i>Chrysanthemum veteribus</i>	100. p. p.
<i>Cali geniculatum siue Salicornia</i>	704. p. 2.	<i>Chrysanthemum maius, Creticum, latifolium, minus, siue Bellis lutea parua latifolia</i>	104. & 105. p. p.
<i>Centaurium Collinum Gesneri flore purpureo & albo</i>		<i>Chrylocome veteribus</i>	155. p. p.
32. p. p.		<i>Chrysogonon</i>	876. p. 2.
<i>Centaurium collinum, siue Lacea spinosa flore luteo</i>		<i>Cicuta veteribus & neotericis in genere, eiusque species varia</i>	174. & 175. p. 2.
34. p. p.		<i>Cicutaria eiusque species varia</i>	176. 177. 178.
<i>Centaurium maius veteribus & in genere</i>	37. p. p.		179. 180. 181. 182. 183. & 187. p. 2.
<i>Centaurium maius inglandis folio</i>	38. p. p.	<i>Cirsium veteribus & in genere</i>	42. p. p.
<i>Centaurium minus flore purpureo & albo</i>	353. p. 2.	<i>Cirsium Anglicum, Pannonicum, Britannicum, Tomentosum, & Maximum, aliaque Cirsii species</i>	44. & 45. p. p.
<i>Centauroides folio glabro flore flauescente</i>	40. p. p.	<i>Clinopodium quibusdam Mastichina Gallorum</i>	243. p. 2.
<i>Centaurium maius alterum folio integro</i>	41. p. p.	<i>Clinopodium veteribus & in genere, eiusque species varia</i>	250. p. 2.
<i>Centaurium maius, siue Rha capitatum folio Enula, subtus hirsuto & incano</i>	ibid.	<i>Consolida regalis in genere, eiusque species varia</i>	210. 211. & 212. p. p.
<i>Centaurium siue Rha panicum alterum angustiore folio</i>	ibid.	<i>Consolida media eiusque species varia</i>	430. & 432. p. 2.
<i>Centaurium minus flore purpureo & albo</i>	353. p. 2.	<i>Coris veteribus & in genere</i>	381. p. 2.
<i>Centaurium minus adulterinum, quibusdam Lychnidis viscida genus</i>	355. p. 2.	<i>Coris Monspessulana lutea & purpurea</i>	434. p. 2.
<i>Cerinthe veteribus & in genere</i>	601. p. 2.	<i>Corallii plurima species varia</i>	803. & sequentibus p. 2.
<i>Cerinthe quorundam maior versicolore flore</i>	602. p. 2.	<i>Corallii affinis Madrepora</i>	811. p. 2.
<i>Cerinthe quorundam maior spinoso folio, flauo flore ibidem.</i>		<i>Corallii affinis Alcyonium fistulosum rubrum, & Tubuli marini albi</i>	812. p. 2.
<i>Cerinthe quorundam maior flore ex rubro purpurascence</i>	603. p. 2.	<i>Coralloides eiusque species varia</i>	801. 813. & 814. p. 2.
<i>Cerinthe quorundam minor flauo flore</i>	ibid.	<i>Corallina eiusque species varia sol.</i>	815. pag. 2. p. 2.
<i>Chaa herba laponia</i>	5. p. 2.	<i>Corallina affinis Muscus marinus</i>	816. p. 2.
<i>Chamadrys spuria species varia sex 285. & 286. p. 2.</i>		<i>Corallina affinis Nodularia f. l.</i>	816. pag. 2. p. 2.
<i>Chamadrys veteribus & in genere</i>	ibid.	<i>Coriandrum veteribus & in genere</i>	86. p. 2.
<i>Chamadrys vulgo vera existimata</i>	288. p. 2.	<i>Coriandri species varia</i>	89. 90. & 91. p. 2.
<i>Chamadrys spinosa</i>	289. p. 2.	<i>Coronopus veteribus & in genere</i>	508. p. 2.
<i>Chamadrys montis Sumani</i>	ibid.	<i>Coronopus eiusque species varia</i>	509. 510. & 511. p. 2.
<i>Chamedrys alpina, aliaque Chamedrys species 289. & 290. p. 2.</i>		<i>Corruda</i>	721. p. 2.
<i>Chamaecissus siue Hedera terrestris veteribus & in genere</i>	855. p. 2.	<i>Cortusa</i>	499. p. 2.
<i>Chamamelum vulgare amarum</i>	116. p. p.	<i>Coryledon vera altera & minor</i>	683. 684. & 690. p. 2.
<i>Chamamelum odoratissimum repens flore simplici & flore multiplici</i>	118. & 119. p. p.	<i>Cranion & Ceraunium veteribus & in genere</i>	852. p. 2.
<i>Chamamelum aureum peregrinum capitulo sine foliis ibid.</i>		<i>Cremenei</i>	802. p. 2.
<i>Chamamelo affine Buphratum Italicum segetum altissimum</i>	120. p. p.	<i>Crista galli mas & femina, aliaque eius species varia</i>	446. & 447. p. 2.
<i>Chamamelum inodorum, siue Cotula non farida ibidem.</i>			

INDEX

Crocodylium veteribus 68. p.p.
Crucialis fruticosa Casalp. fol. 736. pag. p.2.
Cuminum sativum & silvestre veteribus & in genere, eiusque species variae 21.22. & 23. p.2.
Cumini veteribus 271. p.2.
Cupressus marina Belgica Clusii 803. p.2.
Cyanus veteribus & in genere, eiusque species varia 21.22.23.24. & 25. p.p.
Cyclaminus veteribus & in genere, eiusque species varia 51.52.53. & 54. p.2.
Cymbalaria 685. p.2.
Cynoglossum veteribus & in genere 597. p.2.
Cynoglossum vulgare, minus, Creticum, aliaque Cynoglossi species 598.599.600. & 601. p.2.

D.

D *Damasonium Alpinum siue Elleborine floribus albis* 516. p.2.
Damasonium Alpinum floribus luteis 517. p.2.
Damasonii species quibusdam aliis Calceolus D. Maria 518. p.2.
Damasonium stellatum Dalechampii 795. p.2.
Daucus veteribus & in genere 55. p.2.
Daucus Creticus, Tyburinus, Petreus, Tenusfolius, Selinoides, Cyanopus, Montanus, aliaque Dauci species varia 56.57.58.59. & 67. p.2.
Daucus pratensis Dalechampii 9. p.2.
Daucus glauco folio similis Feniculo tortuoso 16. p.2.
Dauco glauco similis Libanotis 17. p.2.
Delphinium aeterebus 210. p.p.
Dictamnus & pseudodictamnus veteribus & in genere 251. p.2.
Dictamnus Cretica seu vera 253. p.2.
Dictamnus adulterinum, quibusdam verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum 255. p.2.
Dipsacus veteribus & in genere 72. p.p.
Dipsacus sativus 73. p.p.
Dipsacus silvestris siue Labrum veneris 74. & 75. p.p.
Doronicum veteribus & in genere, eiusque species varia 17.18. & 19. p.p.
Dracunculus hortensis, siue Tarcon 148. p.p.
Drypis Theophrasti Anguillara fol. 738. pag. 2.
Dryopteris 745. & 748. p.2.
Durtoa herba soporifera 625. p.2.

E.

E *Echium Fuchsi siue Borrage silvestris* 581. p.2.
Echium veteribus & in genere 585. p.2.
Echii species varia plurima 586.587.588. & 589. p.2.
Echinopus maior 69. p.p.
Echinopus minor 72. p.p.
Echinomelocactos 93. p.p.
Elaphoboscum veteribus & in genere 148. p.2.
Elatine veteribus & in genere, eiusque species varia 371. & 372. p.2.
Elleborine, Epipactis, & Damasonium in genere 515. p.2.
Elleborines species varia 516. & 517. p.2.
Elleborus niger flore albo, interdum etiam valde rubente 635. p.2.
Elleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna 636. p.2.
Epimedium, Epimerum, & Epipetron 709. p.2.
Epipactos & Elleborine veteribus & in genere 640. p.2.
Epipactis Matthioli ibid.
Epithymum veteribus & in genere 264. p.2.
Equisetum maius aquaticum 738. pag. 2.
 Tom. III.

Equisetum minus terrestre 739. pag. 2. p.2.
Equiseti varia species aliae ibidem & 740. p.2.
Erauvay Ricini pusillum genus 645. p.2.
Eruca facie frutex marinus 814. p.2.
Eruca marina quibusdam 803. p.2.
Eryngium vulgare 85. p.p.
Eryngium caruleum 86. p.p.
Eryngium marinum ibid.
Eryngium pumilum, pusillum, planum, latifolium, Alpinum, eiusque varia species aliae 87. & 88. p.p.
Eschara 815. p.2.
Eschara marina frondifera ibid.
Euphrasia 432. p.2.
Euphrasia parva purpurea 433. p.2.

F.

F *Faba seu Cyanus Aegyptius veteribus* 766. p.2.
Fabregue 243. p.2.
Ferula siue Ferulago veterum 42. p.2.
Ferula folio faniculi, &c. 43. p.2.
Ferula Gaza, Narthecium Theophrasti 44. p.2.
Ferula facie Thapsia siue Turbith Gallorum 45. p.2.
Ferula species aliae ibid.
Filipendula 189. p.2.
Filix veteribus & in genere 741. p.2.
Filix maior & prior Trago, siue ramosa repens 743. p.2.
Filicis varia species aliae 744. & sequent.
Filix saxatilis Tragi 763. p.2.
Flos Constantinopolitanus, miniatus, albus, & varius 344. p.2.
Flos Cuculi, Odontis quibusdam 347. p.2.
Flos Cuculi flore multiplicato, purpureo & albo 348. p.2.
Flos Adonidis vulgo, aliis Eranthemum 125.
Fluvialis piscina foliis denticularis 787. p.2.
Faniculum seu Marathrum veteribus & in genere 1. p.2.
Faniculum silvestre, siue Hippomarathrum duplex, semine cachry simili & rotundo veteribus 2. p.2.
Faniculum vulgare minus ibid.
Faniculi varis species aliae 2.3.4. & 5. p.2.
Faniculum tortuosum 16. p.2.
Fontinalis media lucens 795. p.2.
Fontinalis lucens maior ibidem.
Fontinalis crispa 780. p.2.
Fontinalis minor lucens ibidem.
Fraxinella, officinis Dictamnus 494. p.2.
Fructus valde elegans, Faba forte Aegyptia Dioscoridis 781. p.2.
Frutex marinus elegantissimus albus 814. p.2.
Fruticosa marina planta, quibusdam Conserua lignosa 802. p.2.
Fucus cupressinus Imperati 803. p.2.
Fucus marinus ibid.
Fucus Radicella dictus, siue Vermicularis albus ibid.
Fucus Terzella Vermicularis species ibid.
Fucus Tamariscola, siue Tamariscifolia marina 804. p.2.
Fucus marina Forcellata, & Lumbricaria species ibidem.
Fucus Tremula ibid.
Fucus Scopara, siue Pennachio marino ibid.
Fucus Linza 805. p.2.
Fucus axungia accedens 806. p.2.
Fucus cauus 807. p.2.
Fucus capillaris tinctorius 808. p.2.
Fucus Capillaria dictus ibid.
Fungus siue Muscus petrosus 816. pag. 2. p.2.

INDEX

Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente, maius & minus 479. p.2.
Geranium speciosum annum longissimis rostris, Cre- ticum ibid.
Geranium Robertianum murale 480. p.2.
Geranium lucidum 481. p.2.
Gingidium veteribus & in genere 78. p.2.
Gingidium Matthioli 79. p.2.
Glancium veteribus & neotericis in genere 397. p.2.
Glauk exigua maritima 363. p.2.
Gnapbaliu veteribus & in genere, eiusque species varia 157. 158. 159. 160. 161. & 162. p. p. & 255. p.2.
Gramen Parnassi Dodonaei, quibusdam *Hepaticus* flos 537. p.2.
Gramen Fuchsi, siue *Leucanthemon* 361. p.2.
Graminis Fuchsi affinis herba ibid.
Gramen aque innatans cum utriculis, siue *Feniculacea marina* 791. pag. 2. p.2.
Grana Hollandorum 702. p.2.
Gryophyllatus flos apophyllocaulos siue iuncus maior & minor 336. p.2.
Gratiola 434. p.2.
Gratiola alpina 435. p.2.

H.

H *Acap* siue *Silybum* quibusdam 84. p. p.
Helleborus albus, & niger veteribus 631. p.2.
Helleborus albus 633. p.2.
Helenium siue *Enula campana* 108. p. p.
Helichrysus, *Helichryson*, & *Helioschrysus*, & *Helioschrysus* veteribus 149. p. p.
Helioschryson quorundam folio *Abroroni* 150. p. p.
Helioschryson *Tragi*, siue *linaria* tertia 151. p. p.
Helioschryson veteribus & in genere, eiusque species varia 603. 604. 605. & 606. p.2.
Hemionitis veteribus 749. p.2.
Hemionitis 750. p.2.
Hemionitis altera *Dalechampii* *Filici* floridis similis 729. p.2.
Herba Nalucana *Acofia* 3. p. p.
Herba de la Rotta 144. p. p.
Herba marina 106. p. p.
Herba siue denominata 551. p.2.
Herba Cohabba inebrians 631. p.2.
Herba Casiana, samem sitimque retardans ibidem
Herba Paris 613. p.2.
Herba Orientalis 536. p.2.
Herniaria glabra 378. p.2.
Herniaria hirsuta 379. p.2.
Hippuris faxea 814. pag. 2. p.2.
Holoetium veteribus & in genere, eiusque species varia 507. p.2.
Hypericum veteribus & in genere, eiusque species varia 380. 381. 382. 383. 384. p.2.
Hyssopus veteribus & in genere, eiusque species varia 274. 275. 276. & 277. p.2.
Hyssopifolia aquatica 796. pag. 2. p.2.
Hyssopifolia minor, vel potius *Thymifolia* maritima ibidem.
Hyosciamus veteribus & in genere, eiusque species varia 626. 627. & 628. p.2.

I.

I *Acea nigra* vulgaris capitata & squammosa, aliaque *Iacea* species plurime 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. & 35. p. p.
Iacea moschara 34. p. p.
Iacea tricolor, siue *Trinitatis* flos 546. 547. & 548. p.2.

Tom. III.

Imperatoria 537. p.2.
Imperatoria alpina 339. p.2.
Isatis, siue *Glastrum montanum* *Dalech.* 602. p.2.
Iuncaria 736. p.2.

K.

K Alii eiusque species varia 514. & 707. p.2.

L.

L *Aspericium* *Maffilia* allatum 117. p.2.
Lasericio similis angustifolia ibid.
Lanaria, siue *Siranthium* *Dioscoridis* *Imperato* 347. p.2.
Lappula *Canaria* flore pulchro, magno, albo 79. p.2.
Lappula *Canaria* flore minore tenuifolia 80. p.2.
Lappula *Canaria* latifolia, siue *Caucalis* ibid.
Lappula *Canaria*, siue *Caucalis* maritima 81. p.2.
Laurendula multifido folio 281. p.2.
Lens palustris 791. p.2.
Lens palustris quadrifolia 793. p.2.
Lens palustris *Parauina* ibidem
Lenticula aquatica trifolia 793. pag. 2. p.2.
Leontopodium in genere ex antiquis & recentibus 489. p.2.
Leontopodium veteribus atque *Cemos* 514. p.2.
Leontopodium *Candia* quorundam ibidem
Leucantra 90. p. p.
Libanotis veteribus & in genere, earumque species varia 37. 40. 41. 164. 165. & 167. p.2.
Libanotis quibusdam siue *Fenulago* 41. & 42. p.2.
Libanotidium *Theophrasti* species aliquot 164. & 167. p.2.
Libanotis altera quorundam, aliis *Cornu nigra* 165. p.2.
Lichen veteribus & in genere 750. p.2.
Lichen siue *Hepatica* fontana ibid.
Lichen arboreus, siue *pulmonaria* arborea 51. p.2.
Ligusticum vulgare foliis *Apri* 112. p.2.
Ligusticum veteribus & in genere 146. p.2.
Ligusticum quorundam foliis *Angelicæ* 147. p.2.
Ligusticum alterum *Belgicum* ibid.
Ligusticum maius, siue *Imperatoria* maior 147. p.2.
Ligusticum *Matthioli* & *Lobelia* ibidem
Ligusticum *Rauwolfii* foliis *Aquilegia* 148. p.2.
Lilium conualium vulgo 331. p.2.
Lilium conualium flore rubente 535. p.2.
Limonium veteribus 540. p.2.
Linaria lutea vulgaris, parua annua, parua serpens, *Pannonica*, maxima *Dalmatica*, odorata, *inodora*, *Montepellana*, purpurea magna & parua, *carulea* &c. 456. 457. 458. 459. 460. & 461. p.2.
Linaria *Beluodere* dicta, eiusque species varia 462. p.2.
Lincofisis herba *Aristorelis* 93. p. p.
Linum 450. p.2.
Linifiluestris species varia 452. & 453. p.2.
Linum las. *linum* luteum 454. p.2.
Linum luteum *Narbonense* ibid.
Linum pumilum 458. p.2.
Lichospermum siue *Milium* *Solis*, eiusque species varia 590. 591. & 592. p.2.
Lychnis coronaria ac filuestris veteribus & in genere, eiusque species varia 339. 340. 341. 342. 351. 352. 357. & 358. p.2.
Lycopersum veteribus & in genere 120. p.2.
Lycopsis veteribus 584. p.2.
Lycopsis *Dioscoridis* quibusdam ibid.
Lonchitis veteribus 731. p.2.
Lonchitis altera com foliis denticulatis siue *lonchitis* altera *Matthioli* pag. 752. p.2.

- Lonchitis Altera* clem. foliis denticularis siue lonchitis altera Martialis p. 752. p. 2.
Lonchitis altera folio polypodii ibidem
Lonchitis Aspera Marantia p. 753. p. 2.
Lorus Aegyptia veteribus & neotericis in genere p. 781. p. 2.
Lucus marinus dictus Rocella tinctorum. pag. 784. p. 2.
Lusitica marina siue Intibacea pag. 800. p. 2.
Lumbricorum semen pag. 805. p. p.
Lumbricorum semen Rauwolfii ibid.
Lunaria botrytis pag. 709. p. 2.
Lunaria botrytis minor multi folia pag. 711. p. 2.
Lunaria botrytis ramosa Silesiana ibidem
Lutea Plinii quibusdam 465. p. 2.
Lutea maxima Cretica Honorii Belii 466. p. 2.
- M.
Maiorana *Smirnum* uibusdam dicta 126. p. 2.
Majorana varia species alia 241. & 242. p. 2.
Mandragora ex veteribus & neotericis in genere 614. p. 2.
Mandragora mas 617. p. 2.
Mandragora semina 618. p. 2.
Marrubium veteribus & neotericis in genere 316. p. 2.
Marrubii species varia ibid.
Marrubium 317. p. 2.
Marrubium nigrum siue Ballote 118. p. 2.
Marrubium aquaticum quorundam ibid.
Marum Curtusi 242. p. 2.
Marum veterum ibid.
Marum supinum 243. p. 2.
Matricaria vulg. minus *Parthenium* 129. p. 2.
Matricaria flore pleno 130. p. p.
Matricaria odorata ibid.
Melanthium veteribus & in genere 207. p. 2.
Melanthii species varia 207. 208. & 209. p. p.
Melanthium siluestre siue arvense 209. p. p.
Melissa vulgaris odore Citri 232. p. 2.
Melissa adulterina quorundam amplis foliis, & floribus non grati odoris 233. p. 2.
Melissa Turcica multis dicta 234. p. 2.
Melissophyllum veteribus & in genere 231. p. 2.
Mentha *Corymbifera*, siue *Costus* hortenensis 144. p. p.
Mentha *Saracenica* species pl. *Antibemidis* 146. p. p.
Mentha veteribus & in genere 213. p. 2.
Mentha varia species plurima 225. 216. 217. & 218. p. 2.
Menthastrum in genere eiusque species varia 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. & 227. p. 2.
Mentha *Aquatica* siue *Sisymbrium* 223. & 224. p. 2.
Mentha *Cartaria* 225. p. 2.
Mentha vulgare siue radix *Vrsina* ibidem
Mentha veteribus 111. p. 2.
Mentha *stereum* italicum quibusdam 15. p. 2.
Millefolium aquaticum *Feniculo* simile 8. p. 2.
Millefolium aquaticum in foliis *Coriandri* 9. p. 2.
Millefolium stratiocres pennatum terrestre 136. p. p.
Millefolii alpini species 138. 139. & 140. p. p.
Millefolium tomentosum alpinum 138. p. p.
Millefolii plurima species varia 771. & sequ. p. 2.
Mola aurea odore facido, quibusdam *Lycopersum* 620. p. 2.
Moluca 234. & 235. p. 2.
Moschatellina 206. p. 2.
Muscipula eiusque species varia 349. & 350. p. 2.
Muscus veteribus & in genere 7. p. 2.
Muscus arboreus villosus ibid.
Muscus arboreus peltatus & scutellaris 772. p. 2.
- Muscus arboreus* ramosus ibidem
Muscus arboreus barbatus ibidem
Muscus uillosus herbaceus ibidem
Muscus amarus absinthii folio ibidem
Muscus *Coralloides* ibidem
Muscus terrestris & hortenensis ibidem
Muscus ex *Cranio* ibidem
Muscus *Filicinus* ibidem
Muscus *Abietis* facie ibidem
Muscus in *Ericetis* proueniens, stellaris, roseus, sericeus, parvus, repens ibidem
Musci terrestres species aliquot 773. 774. & 775. p. 2.
Muscus *corniculatus* 775. p. 2.
Muscus *pyxidatus* ibidem
Muscus *pyxioides* saxatilis ibid.
Muscus *alpinus* 670. p. 2.
Muscellina 66. p. 2.
Myriophyllum siue *Millefolium* veteribus 7. p. 2.
Myriophyllum pelagium 806. p. 2.
Myrrhis veteribus & in genere, eiusque species varia 77. & 78. p. 2.
Myosurus 512. p. 2.
- N.
Nana siue *Scriobolus* *Peruvianus* & *Ananas* 94. p. p.
Napellus veteribus 653. p. 2.
Napelli *Mus* vel *Musca* 654. p. 2.
Nardus *Indica* veteribus 201. p. 2.
Nardus *Indica* vulgaris 202. p. 2.
Nardus *Celtica* 205. p. 2.
Nardo *Celtica* similis siue *Hirculus* 206. p. 2.
Nardus, siue *Salimna* *Neapolitana* ibid.
Nardus *montana* veteribus ibid.
Narthecium *Theophr.* *Ferulago* *Gaza* 44. p. 2.
Nicotiana siue *Tabacum* eiusque species varia 629. & 630. p. 2.
Nummularia siue *Centimorbia* 370. p. 2.
Nummularia rubra 371. p. 2.
Nux *Methel* veteribus 623. p. 2.
Nymphaea veteribus & in genere, eiusque species varia 777. 778. 779. 780. 781. p. 2.
Nymphaea minor siue *Morsus* *rana* 781. p. 2.
- O.
Ocimum veteribus & in genere, eiusque species varia 243. 244. 245. 246. 247. 248. & 250. p. 2.
Ocimum *garyophyllum* *Monachorum*, siue *Ainos* *Columus* 260. p. 2.
Ocimum *odoratum* siue *Basilicum* 245. p. 2.
Ocymoides eiusque species varia 342. 343. 344. 351. & 353. p. 2.
Odontidi siue *Flori* *Cuculi* affinis *Lychnis* *siluestris* 348. p. 2.
Oenanthe veteribus & in genere 189. p. 2.
Oenanthe siue *Filipendula* *Monspessulana* folio *Apii* 190. p. 2.
Oenanthe, siue *Filipendula* *aquatica* 197. p. 2.
Oenanthes siue *Filipendula* species alia 190. 191. 192. & 193. p. 2.
Olea *maris* rubri *Theophr.* 799. p. 2.
Onobrychis *lutea* *Dalechampia* 386. p. 2.
Onosma veteribus 586. p. 2.
Ophioglossum 703. p. 2.
Ophioglossum minus subrotundo folio ibid.
Opium & *Mecanium* 392. p. 2.
Opium officinarum 394. p. 2.
Opopanax 155. p. 2.
Origanum veteribus & in genere 235. p. 5.

INDEX

<i>Origanum Heracleoticum</i> Ruellii, siue <i>Majorana</i> maior 237. p. 2.	<i>Phyreum</i> 386. p. 2.
<i>Origanum varia species alia</i> 236. 237. 238. & 239. p. 2.	<i>Phyllonchelygonon</i> Dalechampii 70. p. 2.
<i>Origanum siluestre</i> 239. p. 2.	<i>Phyllitis veteribus & in genere eiusque species varia</i> 764. & 765. p. 2.
<i>Origanum facie Corymbi</i> 183. p. p.	<i>Phyllitis siue Lingua ceruina vulgi</i> 764. p. 2.
<i>Oribonna veteribus</i> 97. p. p.	<i>Phyllitis siue Hemionitis</i> Lobelio ibid.
<i>Oniton & Oniggon veteribus</i> 836. p. 2.	<i>Phu veteribus & in genere</i> 209. p. 2.
	<i>Picrocoryn</i> 227. p. 2.
	<i>Pilosella eiusque species varia</i> 162. & 163. p. p.
	<i>Pimpinella in genere dicta</i> 103. p. 2.
	<i>Pimpinella Saxifraga tenuifolia</i> 112. p. 2.
	<i>Pimpinella Sanguisorba inodora</i> 121. p. 2.
	<i>Pinguicula Gesneri</i> 546. p. 2.
	<i>Pityusa veteribus & in genere</i> 664. p. 2.
	<i>Pityusa Matthioli</i> 671. p. 2.
	<i>Plantago marina retiformis</i> fol. 764. pag. 2. p. 2.
	<i>Plantago veteribus & in genere, eiusque species varia plurima</i> 501. 502. 103. 504. 505. 106. & 507. p. 2.
	<i>Plantaginis simile Antipharmacum, siue Contrayerba</i> 507. p. 2.
	<i>Plantaginis aquatica species aliquot</i> 794. & 795. p. 2.
	<i>Polemonium petraeum Gesneri</i> 351. p. 2.
	<i>Polemonium veteribus</i> 356. p. 2.
	<i>Polium antiquis & in genere eiusque species varia</i> 299. & 300. p. 2.
	<i>Polyacanthus Casabona Acarna similis</i> 52. p. p.
	<i>Polygonum femina veteribus</i> 724. p. 2.
	<i>Polygonum eiusque species alia varie</i> 376. 377. 378. & 379. p. 2.
	<i>Polygonum</i> 386. p. 2.
	<i>Polygonatum veteribus & in genere</i> 528. p. 2.
	<i>Polygonatum vulgo Sigillum Salomonis, aliisque Polygonati species varia</i> 529. 530. & 531. p. 2.
	<i>Polygala eiusque species varia</i> 387. & 388. p. 2.
	<i>Polypodium veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 338. & 756. p. 2.
	<i>Polycnemum</i> 347. p. 2.
	<i>Polytrichum eiusque species varia</i> 768. & 769. p. 2.
	<i>Porus tubularis</i> 814. p. 2.
	<i>Porus anguinus</i> 815. p. 2.
	<i>Portulaca, seu Andrachne, veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 677. & 678. p. 2.
	<i>Portamogeron eiusque species varia</i> 784. 785. 786. & 787. p. 2.
	<i>Pomum de Hiericho Melongenii congener</i> 619. p. 2.
	<i>Priapeia quibusdam Nicotiana minor</i> 630. p. 2.
	<i>Primula Veris veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 496. 497. 498. & 499. p. 2.
	<i>Prunella in genere, eiusque species varia</i> 428. 429. & 430. p. 2.
	<i>Pseudo-Nardus que vulgo Spica</i> 281. p. 2.
	<i>Pseudo-Nardus que vulgo Lauendula</i> ibid.
	<i>Pseudo-Melanthium</i> 342. p. 2.
	<i>Pseudo-Corallium nigrum</i> 809. p. 2.
	<i>Psyllium veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 512. 513. & 514. p. 2.
	<i>Pearnicia in genere eiusque species varia</i> 146. & 147. p. 2.
	<i>Pulegium eiusque species varia</i> 256. & 257. p. 2.
	<i>Pulmonaria eiusque species varia</i> 595. 596. & 597. p. 2.
	<i>Pulsatilla, eiusque species varia</i> 409. 410. & 411. p. 2.
	<i>Pycnocomum in genere ex veteribus & Neotericis</i> 621. p. 2.
	<i>Pyrethrum veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 20. & 21. p. 2.
	<i>Pyrola in genere eiusque species varia</i> 536. & 537. p. 2.
<i>Alma siue manus marina</i> 791. p. 2.	
<i>Peonia mas, semina, promiscua, aliisque eius species varia</i> 492. 493. & 494. p. 2.	
<i>Panaces veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 10. 67. 154. 155. & 158. p. 2.	
<i>Papauer satium & siluestre veteribus</i> 389. p. 2.	
<i>Papauer satium</i> 390. p. 2.	
<i>Papauer erraticum veteribus</i> 395. p. 2.	
<i>Papauer spinosum</i> 397. p. 2.	
<i>Papauer corniculatum ex veteribus & recentioribus in genere, eiusque species varia</i> 397. 398. & 399. p. 2.	
<i>Papaver spumum in genere</i> 400. p. 2.	
<i>Papaueris alia species plurima varia quentibus p. 2.</i> 391. & se-	
<i>Pappas Americanum</i> 621. p. 2.	
<i>Paronychia Anguillaria quibusdam, & Paronychia siue Alsinifolia incana</i> 366. p. 2.	
<i>Paronychia Hispanica Clusii, siue Anthyllis niuea</i> 374. p. 2.	
<i>Parthenium veteribus & in genere</i> 128. p. p.	
<i>Parthenium Indorum inodorum, siue inodorum Acha-houan Egyptianum</i> 131. p. p.	
<i>Parthenium equisetifolium</i> 141. p. p.	
<i>Passerina Lobelii</i> 455. p. 2.	
<i>Passerina Tragi</i> 456. p. 2.	
<i>Pastinaca siluestris, siue Staphylinus Gracorum</i> 621. p. 2.	
<i>Pastinaca satius, siue Carota lutea & alba</i> 64. p. 2.	
<i>Pastinaca Syriaca siue Secacul Arabum</i> 66. p. 2.	
<i>Pastinaca, siue Staphylinus veterum, siluestris & satius, Daucus etiam dicta</i> 59. p. 2.	
<i>Pastinaca Germanica siluestris, quibusdam Elaphoboscum</i> 149. p. 2.	
<i>Pastinaca marina, quibusdam Secacul & Crithmum spinosum</i> 196. p. 2.	
<i>Pastinaca satius Germanica</i> 150. p. 2.	
<i>Pecten veneris eiusque species varia</i> 71. 73. & 74. p. 2.	
<i>Pedicularis eiusque species varia</i> 437. 438. & 439. p. 2.	
<i>Penna marina</i> 806. p. 2.	
<i>Peplis</i> 668. p. 2.	
<i>Peplis, siue Esula rotunda</i> 669. p. 2.	
<i>Peplis minor</i> 670. p. 2.	
<i>Percheper Anglorum quibusdam</i> 74. p. 2.	
<i>Perfoliata in genere, eiusque species varia</i> 197. 198. & 199. p. 2.	
<i>Perfoliatum Centauryum luscum</i> 355. p. 2.	
<i>Perficaria mitis</i> 787. p. 2.	
<i>Perficaria acris, siue Hydropiper</i> 788. p. 2.	
<i>Personaria, siue Lappa maior aut Bardana</i> 570. & 571. p. 2.	
<i>Peristereon, Verbena, & Hierobotane, siue Herba sacra</i> 441. p. 2.	
<i>Petasites</i> 566. p. 2.	
<i>Pescedanum veteribus & in genere, eiusque species varia</i> 35. 36. & 37. p. 2.	
<i>Phellandrium Plinii</i> 183. p. 2.	
<i>Phellandrium vel Cicutaria aquatica</i> ibid.	

INDEX

R.

R Anunculus, eiusque species varia	412.
413. 414. 415. 416. 417. 418. & 419.	p. 2.
Ranunculus aquatilis	775. p. 2.
Ranunculus hederaceus rivulorum se extendens, atra macula notatus	ibid.
Ranunculi varia species alia	857.
858. 859. 860. 861. 862. 863. 864.	p. 2.
Refeda lucea	467. p. 2.
Refeda alba	ibid.
Refeda facie planta marina	814. p. 2.
Reticulum marinum	815. p. 2.
Reticulum tophaceum marinum	ibid.
Ricinus veteribus & in genere	642. p. 2.
Ricinus vulgaris	ibid.
Ricinus maior Americanus Caracas dictus, & Faba purgatrix India occidua	643. p. 2.
Ricinus parvus Orientalis Dende dictus quibusdam, & Faba purgatrix	644. p. 2.
Ricini similis fructus	645. p. 2.
Rhodia radix	683. p. 2.
Rosa marina	804. p. 2.
Ros Solis	769. p. 2.
Rubia veteribus & in genere	714. p. 2.
Rubia sativa	ibid.
Rubia silvestris Monspeulana	715. p. 2.
Rubia plurima species alia 715. 716. & sequenti- bus.	
Rubeola saxatilis C. Baubini folio	718.
pagina 2. p. 2.	
Rubeola maritima aspera C. Baubini	ibid.
Ruta veteribus & in genere	195. p. p.
Ruta sativa vel hortensis	197. p. p.
Ruta silvestris maior	199. p. p.
Ruta silvestris minor	200. p. p.
Ruta que dici solet Harmala	ibid.
Ruta aperioides Siciliana affinis, siue Tragium	383. p. 2.
S.	
S Agapenum	156. p. 2.
Sagitta	795. p. 2.
Sagitta maior.	ibid.
Sagitta minor	ibid.
Salix marina	810. p. 2.
Salvia latifolia	304. p. 2.
Salvia serrata crassa	305. p. 2.
Salvia tenuifolia	306. p. 2.
Salvia Absinthium redolens	307. p. 2.
Salvia species alia	305. & 306. p. 2.
Samolus Valerandi Dourez	794. p. 2.
Samolus seu Amaracus veteribus & in genere	239. p. 2.
Sanguisorba minor	115. p. 2.
Sanguisorba maior flore spadiceo	120. p. 2.
Sanicula Alpina guercata	707. p. 2.
Sanicula Alpina affinis	ibid.
Sanicula femina quibusdam, aliis Elleborus niger	638. p. 2.
Sanicula la mas Fuchsi siue Diapensia	639. p. 2.
Saponaria minor quibusdam	344. p. 2.
Saponaria vulgaris	346. p. 2.
Satureia sativa	272. p. 2.
Satureia durior	ibid.
Satureia tenuifolia	273. p. 2.
Saxifraga veteribus & in genere	274. p. 2.
Saxifraga Matthioli tenuifolia & umbellifera	18. p. 2.
Saxifraga multifida folio Pannonica	19. p. 2.

Saxifraga tenuifolia affinis, quibusdam Caulicibus	
ibidem.	
Saxifraga hircina maior	109. p. 2.
Saxifraga hircina media	113. p. 2.
Saxifraga hircina minor	ibid.
Saxifraga hircina minima siue Pimpinella crispa	
Tragi	113. p. 2.
Saxifraga Anglorum	171. p. 2.
Saxifraga Antiquorum quibusdam & de Gypsophyta seu Symphyto maiore & minore Thulis	338.
Saxifraga Bauarica	ibid.
Saxifraga alba radice granulosa.	706. p. 2.
Saxifraga aurea Dodonai	707. p. 2.
Scabiosa in genere	1. p. p.
Scabiosa maior, communior, bifurcata, folio laciniato & non laciniato, & latifolia	2. p. p.
Scabiosa minor vulgaris	3. p. p.
Scabiosa prolifera	5. p. p.
Scabiosa rubra peregrina, quibusdam Indica	6. p. p.
Scabiosa reliqua species alia plurima	7. 8. 9. 10. & 11. p. p.
Succisa siue Morsus Diaboli, Scabiosa species	11. p. p.
Scabiosa squammata argentea	30. p. p.
Scandix veterum	70. p. 2.
Scandix, quibusdam umbella ex quamplurimis apici- bus coagmentata	71. p. 2.
Scordium	292. p. 2.
Scordis siue scordium folio salvia	293. p. 2.
Scordis tomentosa Cretica	294. p. 2.
Scrophularia vulgaris & maior, varietque alia eius species 421. 422. & 423. p. 2.	
Scrophularia minor, siue Chelidonium minus vulgatum	468. p. 2.
Scutellaria Teucrii facie	291. p. 2.
Scutellaria, siue Opuntia marina	806. p. 2.
Sedum echinatum vel stellatum flore albo	680. p. 2.
Sedum echinatum flore luteo	ibidem
Sedum Veteribus & Neotericis in genere	685. p. 2.
Sedum maius arborescens	686. p. 2.
Sedum maius vulgare, montanum, latifolium, ferratum, atque nonnulla Sedi maioris species	687. & sequentibus p. 2.
Sedum minus ceteris folium longiusculo folio circinato, folio cinereo, flore luteo, flore purpureo, flore rubento, siue se circumflectente: pratense montanum: alpinum: arvense: acre, non acre: arborescens: hispidum: muscosum: Syriacum: nonnullaeque alia Sedi minoris species.	690. 691. 692. 693. 694. 695. & 696. p. 2.
Sedi affinis rufuscula Alpina flore albo	696. p. 2.
Selinum tuber. sum	101. p. 2.
Selinum montanum pumilum Clusii, foliis femiculis aut Peucedani, flore albo, semine Selini	17. p. 2.
Serpillum veteribus & in genere	267. p. 2.
Serpillum vulgare	268. p. 2.
Serpillum Citrii odore	270. p. 2.
Serpillum angusto lanuginosque folio	270. p. 2.
Serpillum Thymi folio Narbonense	ibidem
Serpillum silvestre, Zigu Clusio, Thymo vulgariori rigidiori similis	271. p. 2.
Serratula	23. p. p.
Seseli Massiliense, Aethiopicum, & Peloponnesiacum veteribus & in genere	32. p. 2.
Seseli Massiliense Nuperorum	33. p. 2.
Seseli montanum angustifolium 3. Clusio folio Seseli Massiliensis Matthioli, semine Angelica	34. p. 2.
Seseli Creticum, Tordylium veteribus	84. p. 2.
Seseli Aethiopici Matthioli genus aliud Clusio	86. p. 2.

INDEX

11

Seseli alpinum siue montanum primum Clusio, folio
splendente, &c. ibid.
Seseli siue *Siler* montanum vulgare ibid.
Seseli Poloponnense Martioli, siue *cicutaria* quo-
rundam 184. p.2.
Seseli palustre laetescens 188. p.2.
Seseli Aethyopicum fruticosum folio Periclymeni 197.
p.2.
Siciliana, aliis *Ciciliana*, vel *Androsamon* 386. p.2.
Sideritis veteribus & in genere eiusque species varia
424. 425. 426. 427. & 428. p.2.
Silaus veteribus 170. p.2.
Silaum quibusdam flore luteo ibid.
Siler Creticum quibusdam semine longo crispo incur-
uo ibid.
Silphium siue *Lasercitium* veterum 129. p.2.
Sion veteribus 171. p.2.
Sion umbelliferum 172. p.2.
Sium medium 173. p.2.
Sium maximum latifolium 174. p.2.
Sison veteribus & in genere 106. p.2.
Sison siue officinarum *Amomum* 107. p.2.
Sisymbrium veteribus & in genere 222. p.2.
Siser veteribus & in genere 152. p.2.
Sisarum multis 153. p.2.
Sisymbrium veteribus & in genere 222. p.2.
Smyrnum veteribus in genere 124. p.2.
Smyrnum Creticum persoliatum 125. p.2.
Smyrnum peregrinum folio oblongo 126. p.2.
Solanum seu strichnos veteribus & in genere 607. p.2.
Solanum species varia 608. p.2.
Solanum Halicacabum vulgare 609. p.2.
Solanum siue *Halicacabum* Indicum ibid.
Solanum verticillatum 610. p.2.
Solanum furiosum ex veteribus ibidem
Solanum manicum multis, siue *Bella dona* 611. p.2.
Solanum species ex Apennino 614. p.2.
Solanum pomiferum fructu rotundo 618. p.2.
Solanum pomiferum fructu incuruo 619. p.2.
Solanum pomiferum fructu spinoso ibidem.
Solanum pomiferum fructu rotundo, striato, duro 620. p.2.
Spergula veteribus & in genere, eiusque species varia
719. p.2.
Spina alba silvestris fuchsis 54. p.2.
Spina Arabica veteribus 70. p.2.
Spina alba quibusdam capite echinato 71. p.2.
Spina lutea 84. p.2.
Spina Solstitialis 90. p.2.
Spondylium ex veteribus & Neotericis in genere eius-
que, species varia 158. p.2.
& sequentibus 160. 161. & 163.
Strachys veteribus & in genere 319. p.2.
Strachys Fuchsis ibid.
Straphis agria veteribus & in genere 641. p.2.
Struthium, Radicula, seu lanaria Herba veteribus, &
Conditi 345. p.2.
Struthium Dioscoridis Imperato 347. p.2.
Struthium spinosum, siue *Conditi Bellunensis* ibid.
Strabe veteribus & Neotericis in genere, eiusque spe-
cies varia 323. 35. & 36. p.2.
Strachas Arabica vulgo dicta 277. p.2.
Strachas viridis 279. p.2.
Strachas serrata & crispa folio ibid.
Strachadis varia species alia, & *Strachadi* affines plan-
ta 153. & sequentibus 154. 155. 156. & 157. p.2.
Seramonia multis dicta, siue *Pomum spinosum* 624.
p.2.
Seramonia altera maior, siue *Tarula* quibusdam ibid.
Serratotus Aegyptia 794. p.2.
Strychnodendros 614. p.2.
Symphitum petraeum veteribus 433. p.2.

Symphitum maius Veteribus 593. p.2.
Symphitum rubrosum 594. p.2.
Symphitum pumilum repens, siue *Borrago* Herbario-
rum 597. p.2.


T.


T *Arula* quibusdam, siue *Stramonia altera* maior
624. p.2.
Tagetes Indicus minor simplici flore, siue *Caryophyllus*
Indicus, siue *Flos Africanus* pag. 98. p.2.
Tagetes Indicus minor multiplicato flore 99. p.2.
Tagetes Indicus modus flore luteo pallido ibid.
Tagetes maximus rectus flore simplici ex luteo palli-
do 100. p.2.
Tagetes maximus rectus flore maximo multiplica-
to ibidem
Tanacetum vulgare flore luteo 131. p.2.
Tanacetum crispum flore luteo 132. p.2.
Tanacetum album 133. p.2.
Tataria Hungarica adulis 163. p.2.
Telephium purpureum minus Casp. Bauhini 682.
p.2.
Terres Africanorum Tuberis genus album 835. p.2.
Tertonaria, aliis *Lysimachia galericulata* 435. p.2.
Tetralyx veteribus 68. p.2.
Teucrium Veteribus. 290. p.2.
Teucrium multis ibidem
Teucrium Baticum & *Creticum* Clusii 291. p.2.
Teucrium Scordonia folio ibidem
Thalictrum Veteribus & in genere 485. p.2.
Thalictrum nigrum caule & semine striato 486. p.2.
Thalictrum speciosissimum glaucum semine & caule
striato ibid.
Thalictrum maius folliculis angulosis caule laui
487. p.2.
Thalictrum minus, siue *Ruta pratenfis* genus minus,
semine striato ibidem
Thapsia Veteribus & in genere 47. p.2.
Thapsia siue *Turbit* Garganicum semine latissimo
50. p.2.
Thapsia prima, secunda, tertia & quarta Clusii 186.
p.2.
Thapsia Carota facit 187. p.2.
Thapsia Casalpini semine candido crasso ibid.
Thora folio Cyclamini 650. p.2.
Thora Apula folio Alchymilla 651. p.2.
Thymbra Veteribus & in genere 271. p.2.
Thymbra Graeca 273. p.2.
Thymus Veteribus & in genere 262. p.2.
Thymum Creticum ibidem
Thymum vulgare rigidius folio cinereo 263. p.2.
Thymus repens Pisanus 264. p.2.
Tithymalus Veteribus & in genere 662. p.2.
Tithymalus Cyparissia 675. p.2.
Tithymalus Stryctophyllos. 664. p.2.
Tithymalus minimus angustifolius annuus ibid.
Tithymalus Cyparissia similis *Pityusa* multis 665.
p.2.
Tithymalus incanus hirsutus C. Bauh. dictus *Pityusa*
Anglica Camerario 666. p.2.
Tithymalus Helioscopius siue *Soli* sequus 669. p.2.
Tithymalus platyphyllus Fuchsis 670. p.2.
Tithymalus magnus multis caulis, siue *Esula* maior
671. p.2.
Tithymalus Sylvaicus toto anno folia retinens 671.
p.2.
Tithymalus Amygdaloides siue *Characias* 672. p.2.
p.2.
Tithymalus verrucosus 673. p.2.
Tithymalus non acris s. rubro ibid.
Turbit 882. p.2.
Tordylium veteribus, siue *Seseli* Creticum 84. p.2.

<i>Tithymalus ferratus</i> Dalechampii.	ibidem	<i>Verbascum</i> in genere eiusque species varia sequentibus p.2.	370. &
<i>Tithymalus Myrsinites</i>	674. p.2.	<i>Verbena vulgaris</i>	443. p.2.
<i>Tithymalus Paralius</i>	ibidem	<i>Verbenaca supina</i>	444. p.2.
<i>Tithymalus Dendroides</i>	675. p.2.	<i>Verbenaca nodiflora</i>	ibid.
<i>Tithymalus Aphyllus</i>	676. p.2.	<i>Verbena Peruviana perperuo virens</i>	ibid.
<i>Toxicum herba Brasiliiana</i>	450. p.2.	<i>Veronica in genere</i>	281. p.2.
<i>Toxicum in genere</i>	645. p.2.	<i>Veronica vulgarior folio rotundiore</i>	ibid.
<i>Tragium primum & secundum veteribus & in genere</i>	383. p.2.	<i>Veronica spicata recta maior & minor</i>	ibid.
<i>Tragium alterum Dioscoridis quibusdam folio Trichomanis</i>	279. p.2.	<i>Veronica maior & latior, foliis splendentibus & non splendentibus</i>	281. p.2.
<i>Tragoriganum veteribus & in genere</i>	260. p.2.	<i>Veronica samina quibusdam, aliis Veronica Pauli</i>	ibid.
<i>Tragorigani species varia.</i>	291. p.2.	<i>Serpillifolia</i>	285. p.2.
<i>Tragus spinosus Macchioni, quibusdam kali spinosum</i>	706. p.2.	<i>Veronica petraea semper virens</i>	289. p.2.
<i>Tribulus aquatilis albus</i>	789. p.2.	<i>Veronica maior angustifolia caulibus viridibus</i>	284. p.2.
<i>Trichomanes veteribus & in genere</i>	762. p.2.	<i>Veronica spicata, recta quibusdam, aliis Lysimachia</i>	ibid.
<i>Trichomanes siue Polytricum</i>	ibidem	<i>Veronica saxatilis</i>	ibid.
<i>Trichomanes minus album</i>	763. p.2.	<i>Vinosa siue Vinacea herba, rusticis gallis Minone dicta</i>	295. p.2.
<i>Trichomanes ramosum</i>	ibidem	<i>Viola barbata angustifolia Dalechampii</i>	335. p.2.
<i>Trichomanes aquaticum Dalechampii</i>	791. p.2.	<i>Viola in genere</i>	542. p.2.
<i>Tridactylites rectorum</i>	790. p.2.	<i>Viola Martia purpurea flore multiplicato maiore cum speciebus</i>	ibid.
<i>Tridactylites Alpina</i>	ibidem	<i>Viola Martia inodora silvatica in cacumine semen ferens</i>	543. p.2.
<i>Trifolium paruum quoddam, siue Lotus pratensis purpurea Dalechampii</i>	366. p.2.	<i>Viola montana folio multifido</i>	544. f.2.
<i>Tubera in genere</i>	849. p.2.	<i>Viola montana purpurea solidiore folio</i>	ibidem
<i>Tuberum genus quibusdam, aliis Cerui boletus</i>	851. p.2.	<i>Viola Martia lutea</i>	ibid.
<i>Tussilago</i>	563. p.2.	<i>Virga pastoris vulgaris</i>	75. p.2.
<i>Tussilago Alpina minor folio rotundo</i>	565. p.2.	<i>Viscago auricula facie Cretica, & varia alia Clusii</i>	351. p.2.
<i>Tussilago Alpina folio longo</i>	21. p.2.	<i>Vitica</i>	799. p.2.
V			
<i>Valeriana in genere</i>	207. & 208. p.2.	<i>Vmbellifera maximo femine, quibusdam Caebris Hispanica</i>	41. p.2.
<i>Valeriana maior odorata radice</i>	209. p.2.	<i>Vmbellifera Alsatica magna, umbella parva sublutea</i>	106. p.2.
<i>Valeriana silvestris magna aquatica</i>	210. p.2.	<i>Vrtica Romana siue mas cum globulis</i>	445. p.2.
<i>Valeriana minor pratensis</i>	211. p.2.	<i>Vrtica vulgaris maior</i>	ibid.
<i>Valeriana rubra latifolia & angustifolia</i>	ibid.	<i>Vrtica minor annua</i>	446. p.2.
<i>Valeriana graca quorundam colore caruleo & albo.</i>	212. p.2.	X	
<i>Valeriana peregrina, seu Indica</i>	ibid.	<i>Xeranthemum</i>	25. p.2.
<i>Valeriana minima Nardifolia</i>	206. p.2.	<i>Xeranthemum aliud siue Psammica quorundam</i>	ibidem.
<i>Valeriana bulbosa</i>	207. p.2.	<i>Xeranthemi forte species</i>	26. p.2.
<i>Valeriana tuberosa</i>	ibid.	<i>Xanthium, siue Lappa minor</i>	572. p.2.
<i>Valeriana maior odorata radice</i>	209. p.2.	Z	
<i>Valeriana silvestris magna aquatica</i>	210. p.2.	<i>Zatrendi herba</i>	256. p.2.
<i>Valeriana minor pratensis vel aquatica</i>	211. p.2.		
<i>Valeriana rubra latifolia & angustifolia</i>	ibid.		
<i>Valeriana graca quorundam</i>	212. p.2.		
<i>Valeriana peregrina seu Indica</i>	ibid.		
<i>Valeriana Alpina</i>	208. p.2.		
<i>Valde bona dicta planta</i>	167. p.2.		
<i>Verbascum silvestre folium exoticum folio rotundiore</i>	307. p.2.		
<i>Verbascum silvestre Monspetiense flore Europae hians</i>	ibidem.		

FINIS







RARE
FOLIO

QK

41

B34

1650 v.3

Inv. #

71

157

